

HAGERS HANDBUCH

DER

PHARMAZEUTISCHEN PRAXIS.

IN ZWEI BÄNDEN.

HAGERS HANDBUCH
DER
PHARMAZEUTISCHEN PRAXIS

FÜR
APOTHEKER, ARZTE, DROGISTEN UND MEDIZINALBEAMTE

UNTER MITWIRKUNG VON

MAX ARNOLD GERMNITZ, G. CHRIST BERLIN, K. DIETERICH HELFENBERG,
ED. GILDMESTER LEIPZIG, P. JANZEN PERLSBERG, C. SCHUBA DARMSTADT

VOLLSTÄNDIG NEU BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN

VON

B. FISCHER, UND C. HARTWICH,
BRESLAU ZÜRICH

MIT ZAHLREICHEN IN DEN TEXT GEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN

ERSTER BAND.

ACHTER UNVERÄNDERTER ABDRUCK



BERLIN.
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1919

Alle Rechte, insbesondere das der
Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten

Druck ²² von Oscar Brandstetter in Leipzig

Vorrede.

Der Herausgabe der ersten Auflage des Handbuches der pharmaceutischen Praxis durch HAGER lag die Erwägung zu Grunde, dass das Material, welches dem Apotheker bei Ausübung seines Berufes täglich durch die Hände geht, nur zum kleineren Theile in den jeweilig geltenden Pharmakopöen eine wissenschaftliche Durcharbeitung erfahren hat, dass vielmehr der weitaus grössere Theil des Gesammtmaterials von den Pharmakopöen nicht berücksichtigt ist und der ganzen Sachlage nach auch nicht berücksichtigt werden kann — Eine Zusammenfassung dieses vielgestaltigen Stoffes in seinen mannigfaltigen Beziehungen zu Wissenschaft und Praxis, in seinen Beziehungen zur Arzneibereitung sowie zum gewerblichen und praktischen Leben, das war das Ziel, welches HAGER bei der Abfassung seines Handbuches s. Zt. vorgeschwebt hatte — Und dass er dieses Ziel erreicht hat, davon legt die ausserordentliche Verbreitung dieses Werkes beredtes Zeugniß ab. In vielen Tausend Exemplaren ist es seit seinem ersten Erscheinen von dem Büchermarkte aufgenommen und über den ganzen Erdball verbreitet worden. Aber auch dieses Werk entging nicht dem Schicksale aller Bücher: es begann, obgleich es auch heute noch stark begehrt ist, allmählich zu veralten, ein Vorgang, den auch die im Jahre 1882 erfolgte Herausgabe eines Ergänzungsbandes auf die Dauer nicht aufzuhalten vermochte.

Der Erkenntniß dieser Thatsache hat auch HAGER in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens sich nicht verschlossen, vielmehr wiederholt ernstliche Anstalten zur Verjüngung dieses seines Lieblingswerkes getroffen — Indessen stellten sich diesem Unternehmen zunächst ernstliche Schwierigkeiten entgegen. Die ursprüngliche Idee HAGER's, einen weiteren Ergänzungsband herauszugeben, musste bald als unausführbar fallen gelassen werden, da es nicht möglich erschien, die zeitlich mehrere Jahrzehnte auseinander liegenden Bände durch einen neuen Ergänzungsband zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden. So blieb denn eine völlig neue Bearbeitung als einzig mögliches Auskunftsmittel — Aber auch an dieses weitausschauende Unternehmen ging HAGER zu Anfang der 90er Jahre nach langen Erwägungen mit frohem Arbeitsmuth heran; allerdings um allmählich zu der Ueberzeugung zu kommen, dass seine Kraft allein zu einer raschen Beendigung dieses Werkes wohl nicht ausreichen würde.

Auf Wunsch der Firma Julius Springer trat HAGER daher gelegentlich der Arbeiten zur Herausgabe des Kommentars für das deutsche Arznei

buch mit dem ersten Unterzeichneten auch wegen einer gemeinsamen Neubearbeitung des Handbuches der pharmaceutischen Praxis in nähere Beziehungen — Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, das Erscheinen der neuen Bearbeitung zu erleben

Das Dahinscheiden HAGER's führte nochmals einen Aufschub des Unternehmens herbei

Da indessen alle Betheiligten in dem Wunsche sich begegneten, das schon ziemlich vorgeschrittene Unternehmen zur definitiven Ausführung zu bringen, so wurde es möglich, die entgegenstehenden Schwierigkeiten so weit zu überwinden, dass Ende December 1898 mit der Drucklegung begonnen, und die erste Lieferung der neuen Bearbeitung im Januar 1899 aus gegeben werden konnte, umsomehr als es gelungen war, die Zusage bewährter Fachgenossen für die gemeinsame Arbeit zu erhalten

Nach dem Ableben HAGER's hatten sich die unterzeichneten Herausgeber dahin verständigt, dass unbeschadet des gemeinsamen Zusammenwirkens die verantwortliche Redaktion des pharmaceutisch-chemischen und galenisch technischen Theiles von Dr. B. FISCHER, diejenige des pharmakognostisch botanischen Theiles aber von Prof. Dr. C. HARTWICH übernommen werden sollte

Das Ziel, dessen Erreichung sie sich gesteckt hatten, war in Kürze folgendes

Vor allem sollte dem Werke sein ursprünglicher Charakter gewahrt bleiben. Ein praktisches Nachschlagewerk der Pharmacie zu sein, in welchem die Apotheker und Angehörige verwandter Berufsarten auf möglichst viele Fragen sich Rathes erholen könnten. War damit auch grundsätzlich eine lediglich theoretische Bearbeitung des Stoffes ausgeschlossen, so erschien es doch unabwieslich, das praktische Material im streng wissenschaftlichen System zu behandeln und rein wissenschaftliche, ja unter Umständen sogar theoretische Erörterungen da einzuflechten, wo sie dem Verständniss für die Praxis förderlich zu sein versprachen — Für die Bearbeitung des Textes war als Grundsatz aufgestellt worden, das gesamte Material in möglichst einfacher, punktkloser Weise darzustellen, einmal damit das Werk nicht zu sehr anschwelle, dann aber auch, damit die Darstellung möglichst verständlich werde

Es wurde ferner in Aussicht genommen, die Betrachtungen nicht auf das Arzneibuch für das Deutsche Reich zu beschränken, sondern ausserdem noch das Ergänzungsbuch des Deutschen Apotheker-Vereins, ferner die lokalen deutschen Vorschriften sammlungen und von fremden Pharmacopöen die *Austriaca*, *Britannica*, *Gallica*, *Helvetica* und *United-States-Pharmacopoeia* zu berücksichtigen — Man mag über die Zulänglichkeit der Pharmacopöen denken wie man will, so steht doch fest, dass in denselben eine ungeheure Menge Detail-Material niedergelegt ist, welches dem, der zu lesen versteht, reiche Anregung gewährt. Da von abgesehen, wurde natürlich die gesamte Litteratur des In- und Auslandes, soweit sie Beziehungen zur Pharmacie hat, in Berücksichtigung gezogen

In ihren Einzelheiten gestaltete sich die Bearbeitung etwa in folgender Weise:

Bei den chemischen Bearbeitungen wurde für jede Substanz zunächst eine sorgfältige Aufzählung ihrer Synonyma gegeben. Bei den im Grossbetrieb hergestellten Präparaten wurde von Darstellungsvorschriften im allgemeinen abgesehen. Dagegen wurden für diejenigen Präparate, welche voraussichtlich oder möglicherweise einmal im pharmaceutischen Laboratorium dargestellt werden könnten, um so genauere Vorschriften gegeben, die, wo es nöthig erschien, durch praktische Versuche erprobt worden sind. Es ist hierbei grundsätzlich von allen allgemeinen Angaben abgesehen, vielmehr jede Vorschrift thunlichst in festen Gewichts- oder Maassverhältnissen angegeben worden, auch wurde versucht, die Beschreibung der Darstellungsverfahren in möglichst anschaulicher Form zu geben. — Der Litteratur-Kundige wird unschwer zu beurtheilen vermögen, wo aus eigener Erfahrung geschildert, wo lediglich referirt worden ist.

Präparate, welche in mehreren Handelssorten vorkommen, sind so genau beschrieben worden, dass es nicht schwer sein kann, die einzelnen Sorten in den Preisverzeichnissen wiederzufinden.

Die Abschnitte. Eigenschaften, Prüfung, Aufbewahrung, Anwendung enthalten alles für die Praxis Wissenswerthe in möglichst knapper und unzweideutiger Form. Unter Anwendung ist nicht nur die theiapeutische, sondern auch diejenige in den Gewerben und im Haushalt behandelt worden.

Die auf die analytischen Arbeiten sich beziehenden Kapitel sind so bearbeitet worden, dass in jedem Falle nur durch eigene Erfahrung bewährte Methoden aufgeführt wurden. Es war nicht beabsichtigt, etwa eine Sammlung aller bekannten Methoden zu geben, es wurde vielmehr besonderer Werth darauf gelegt, dass die mitgetheilten Methoden auf ihre Zuverlässigkeit durch eigene Erfahrung geprüft und mit einfachen Hilfsmitteln ausführbar sind.

Bei der Bearbeitung der Drogen wurde gesucht, die Beschreibungen möglichst kurz und präcis zu geben, so dass meist nur das wirklich Charakteristische aufgeführt wurde, das zur Erkennung der Droge nothwendig ist. Ganz besonders sollen diejenigen Elemente hervorgehoben werden, die bei Erkennung der Drogen auch im fein zerkleinerten Zustande am wichtigsten sind. Wo es irgend nothwendig erschien, wurde das Verständniss durch Abbildungen zu unterstützen gesucht. Die Angaben über „Bestandtheile“ geben, so wenig Platz ihnen auch meist eingeräumt werden konnte, hoffentlich doch eine Vorstellung von den neuen und bedeutenden Ergebnissen der Forschung auf diesem Gebiete. Besondere Sorgfalt wurde den Gehaltsbestimmungen der Drogen zugewendet und fast nur selbst erprobte Methoden aufgenommen, die an zahlreichen Stellen mitgetheilten Grenzzahlen durften nicht fehlen, können aber hier und da nur bedingten Werth beanspruchen, da die Untersuchungen, aus denen sie abgeleitet wurden, noch zu wenig zahlreich sind. Denjenigen Drogen, die auch technisch, als Genussmittel u. s. w. verwendet werden, musste eine eingehendere, über das pharmaceutische Interesse hinausgehende Bearbeitung zu Theil werden, da der Apotheker erfahrungsgemäss oft genöthigt ist, ihnen auch nach andern als den rein pharmaceutischen Richtungen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Zweifelhafte Angaben wurden im Texte nach Möglichkeit vermieden. Wo irgend eine Angabe zu Zweifeln Veranlassung geben konnte, wurden diese durch Beifügung der chemischen Formel, oder des specifischen Gewichtes oder des Procentgehaltes zu beseitigen versucht. Dadurch gewinnen die gemachten Angaben ausserordentlich an Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit.

Bei der Auswahl des Stoffes war besonders der Gesichtspunkt maassgebend, alles das aufzunehmen, was der Apotheker in der ihm gewöhnlich zur Verfügung stehenden Litteratur nur schwer oder mangelhaft oder gar nicht auffinden wird, so dass in gewisser Beziehung die neue Bearbeitung dieses Handbuches eine kleine Bibliothek ersetzen dürfte.

Besondere Sorgfalt ist auch den modernen Arzneimitteln, den galenischen Präparaten, Magistral-Vorschriften, Specialitäten und technischen Artikeln, überhaupt der pharmaceutischen Nebenindustrie und den Beziehungen der Pharmacie zur Hygiene und zu den Gewerben zugewendet worden. Wo es nützlich erschien, ist versucht worden, das Verständniss durch zusammenfassende Aufsätze zu fördern, welche den gegenwärtigen Stand der betreffenden Fragen darstellen.

So glauben denn die Herausgeber in der Neubearbeitung des Handbuches der pharmaceutischen Praxis das Beste gegeben zu haben, was sie vom Standpunkt der praktischen Pharmacie aus zu geben vermögen. Die Erfahrungen ihrer und ihrer Mitarbeiter wissenschaftlicher und praktischer Thätigkeit während eines Menschenalters.

Möchte auch die neue Bearbeitung von HAGER's Handbuch der pharmaceutischen Praxis dem Apotheker ein treuer und zuverlässiger Berather werden in seinem vielgestaltigen und verantwortlichen Berufe.

Breslau und Zürich, im März 1900

B. FISCHER, O. HARTWICH.

Abelmoschus.

Abelmoschus moschatus Med. (syn. *Hibiscus Abelmoschus* L.) **Malvaceae-Hibisceae** Heimisch in Ostindien, jetzt in allen Tropengegenden kultivirt
Verwendung finden die Samen

Semen Abelmoschi. Semen Alceae Aegyptiacae. Grana moschata. Semen Abutilontis Avicennae. Semen Althaeae aegyptiacae. Semen Ketmiae americanae. Semen Moschi arabici — **Abelmoschuskörner. Bisamkörner. Bisampappelsamen. Dessmerkörner. Moschuskörner.** — **Grains d'Ambrette.** Die Samen sind nierenförmig, 4 mm lang, 3 mm breit, grünbraun, mit hellen Längsstreifen und riechen stark nach Moschus. Besonders geschätzt sind westindische Samen (Martinique), ostindische, die seit 20 Jahren vorkommen, sind oft stark verunreinigt. Sie verdanken den Geruch einem ätherischen Oel, von dem sie 0,1–0,25% enthalten, das in der Parfumerie, zur Herstellung von Likören etc. verwendet wird.

Ein aus Amerika in den Handel gebrachtes Ambresetteseed-Oel roch wenig nach Moschus und bestand im wesentlichen aus Coparvabalsam Oel. Den Samen substituirt man zuweilen die geruchlosen Samen von *Abutilon indicum* (L.) G. Don.

Abrus.

† **Abrus precatorius** L. **Papilionaceae Viciaeae** Ursprünglich wohl in Ostindien heimisch, jetzt überall in den Tropen

Verwendung finden die Samen

Semen Abri. Semen Jequirity. — **Giftbohnen. Paternosterbohnen. Süßstrauch-samen.** — **Grains ou pois d'Amérique. Red bean. Love pea. Scarlet seed. Preyer bean.** Sie sind etwa erbsengross, etwas länglich, hartschalig, scharlachroth mit grossem schwarzen Fleck um den Nabel. Sie gelten allgemein als giftig, sollen aber in Aegypten gegessen worden, in Ostindien benutzt man sie als Aphrodisiacum.

Neuerdings (seit 1882) haben sie Aufmerksamkeit erregt als Heilmittel bei gewissen Augenkrankheiten. Man hat gefunden, dass ein aus dem zerkleinerten Samen kalt bereiteter Auszug, in die Augen gestrichen, eine hochgradige, eiterige Entzündung hervorruft, nach deren Ablauf manche Leiden, wie granulöse und diphtheritische Bindehautentzündungen, gebessert erscheinen sollen. Indessen werden die günstigen Erfolge bei Trachom und inveterirtem Pannus neuerdings geleugnet. Man schrieb die Wirkung ursprünglich einem in dem Auszug sich findenden Bacillus zu, weiss aber jetzt, dass sie dem stark giftigen Abrin (Jequiritin) zukommt. Das Abrin soll aus zwei Eiweissstoffen, einem Globulin (Paraglobulin) und einem der Albuminose verwandten bestehen. In Amerika verwendet man diese Samen auch gegen Lupus und andere Hautkrankheiten.

Wurzel, Stengel und Blätter der Pflanze schmecken süß in Folge des Gehaltes an Glycyrrhizin, von welchem die Blätter 9-10% enthalten sollen.

Aufbewahrung Unter den vorsichtig aufzubewahrenden Arzneistoffen

Zur Anwendung werden die Samen grob zerstoßen, mit 50 Theilen kaltem Wasser eine halbe Stunde lang ausgezogen, und der schwach gelbgefärbte Auszug filtrirt. Oder es werden 3 gr der Samen mit 5 cem kaltem Wasser 24 Stunden macerirt, dann wird eine gleiche Menge heissen Wassers zugesetzt und nach dem Erkalten filtrirt.

Acacia.

Mimosaceae — Aesciaceae

I Acacia anthelmintica Baill Heimisch in Abyssinien und Kordofan. Die Rinde kommt als *Musena*, *Massena*, *Basena* etc. zuweilen nach Europa und wird als Anthelminticum empfohlen. Enthält *Musenin*, einen dem Saponin verwandten Stoff. Dosis 30,0 g im Aufguss.

II Acacia Giraffae Willd (Camelthorn). Heimisch in Südafrika. Die 1,2 cm langen, 0,8 cm breiten, 0,4 cm dicken, grünlich braunen Samen sind als Kaffeesurrogat empfohlen. Liefert auch minderwerthiges Gummi (s. d.).

III Acacia Farnesiana Willd Wahrscheinlich in Westindien heimisch, in den Tropen vielfach kultivirt. Die wohlriechenden Blüthen (fälschlich als *Cassia*blüthen bezeichnet) verwendet man zu krampfstillenden Theeaufgüssen, als insektentödtendes Mittel und als Aphrodisiacum.

IV Eine ganze Reihe von Arten liefern in der Rinde ein geschätztes, gerbstoffhaltiges Material, das freilich in erster Linie technisch, aber auch medicinisch als adstringirendes Mittel verwandt wird. Es kommen hauptsächlich in Betracht *A. arabica* Willd in Asien und Afrika, *A. dealbata* Lk., *A. decurrens* Willd., *A. homalophylla* A. Cunn. alle drei in Australien. Die Rinde der erstgenannten Art enthält 22–32% Gerbstoff.

V *A. arabica* Willd., *A. Bambolab* Roxb., *A. cineraria* Willd., *A. nilotica* Desf. liefern in ihren Hülsen das Gerbmaterial *Bablab* mit etwa 20% Gerbstoff und 4% Gallussäure.

VI *Acacia Catechu* Willd., *A. Suma* Kurz liefern *Catechu* (s. d.).

VII. Ueber die Gummi liefernden Arten vergl. *Gummi*.

VIII Flores *Acaciae* sind die Blüthen von *Prunus spinosa* (s. d.).

Acetalum.

I. Acetalum Acetal, Diäthylacetal, Aethylidendiäthyläther, $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$, ≈ 118 . Ein Kondensationsprodukt des Acetaldehyds mit Aethylalkohol, in dem durch Kohle filtrirter Rohspiritus enthalten.

Darstellung. Man destillirt 2 Th. Weingeist (95 Vol. Proc.) mit 3 Th. Braunerstein, 3 Th. conc. Schwefelsäure und 2 Th. Wasser, bis 8 Th. Flüssigkeit übergegangen sind. Das Destillat wird rectificirt, alsdann das Acetal durch Zusatz von krystallisirtem Calciumchlorid, event. einer conc. wässerigen Calciumchloridlösung ausgesalzen. Man erhitzt die Acetal-Schicht, um Aldehyd und Aethylacetat zu zerstören, in geschlossenen Gefäßen mit Natronlauge auf 100°, schüttelt mit conc. Calciumchloridlösung aus, entwässert durch geschmolzenes Calciumchlorid und destillirt fraktionirt. Die bei 104 bis 106° übergehenden Antheile werden gesammelt.

Eigenschaften. Farblose, ätherisch riechende, neutrale Flüssigkeit, spec. Gewicht $\approx 0,821$ bei 22° C., Siedepunkt 104–106°. Löslich in 25 Theilen Wasser von 15°, aus dieser Lösung wird es durch Calciumchlorid ausgesalzen. Mit Alkohol und Aether in

jedem Verhältniss mischbar Durch wässrige Säuren wird es leicht in Alkohol und Aldehyd gespalten, dagegen ist es ziemlich beständig gegen Alkalien Es giebt daher mit Jod und Natronlauge nicht direkt, wohl aber, wenn es vorher mit etwas verdünnter Schwefelsäure erwärmt worden war, Jodoform

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, in nicht zu grossen Gefässen

Anwendung Innerlich genommen erzeugt es Schlaf und Anästhesie Man giebt es in Dosen von 8—15 g in starker Verdünnung, meist mit Arabischem Gummi emulgirt, als Schlafmittel Der Geschmack ist schwach bitter, wenig brennend, mit pfefferminzahnlichem Nachgeschmack

II Methyalum **Methylal.** Methylendimethyläther $\text{CH}_2(\text{OCH}_3)_2 = 76$. Ein dem obigen analoges Präparat Kondensationsprodukt aus Formaldehyd mit Methylalkohol

Das stellung Man erwärmt in einer Retorte ein Gemisch von 1 Th Methylalkohol, 1 Th Braunstein und 1,5 Th konc Schwefelsäure, die mit 1,5 Th Wasser verdünnt wurde Unter Eintritt einer lebhaften Reaktion destillirt eine Flüssigkeit über, welche neben Methylal noch Methylalkohol, Ameisensäure und Wasser enthält Man rectificirt das Destillat und fängt die zwischen 40 und 50° C übergelenden Antheile auf Alsdann entwässert man diese Fraktion zunächst mit geschmolzenem Calciumchlorid, sodann mit geglühter Potasche und fraktionirt so lange, bis man ein bei 42° C vollständig übergehendes Produkt erhält

Eigenschaften Farblose, spec leichte, bewegliche, neutrale, nach Chloroform und Essigäther aromatisch riechende Flüssigkeit, spec Gewicht 0,855 bei 15°, Siedepunkt 42° Löslich in 8 Th Wasser, mischbar mit Alkohol, Aether, fetten und ätherischen Oelen, nicht leicht entzündlich Von Alkalien nicht verändert, von Säuren wird es in Formaldehyd und in Methylalkohol zerlegt

Prüfung. 1) Es sei neutral 2) Das spec Gewicht gehe nicht über 0,860 hinaus 3) Löst man 5 Tropfen Methylal in 10 cem Wasser und fügt 1 Tropfen Kaliumpermanganatlösung hinzu, so darf innerhalb 5 Minuten Entfärbung nicht eintreten (Alkohol, Aldehyd) 4) Auf Chloroform würde durch die Isonitril-Reaktion zu prüfen sein, s Chloroform

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt in nicht zu grossen Gefässen

Anwendung. Aeusserlich als schmerzstillende Einreibung Innerlich in Gaben von 1—5 g als Hypnoticum Eingeathmet (30—50 g) als Inhalations-Anästheticum Die hypnotische Wirkung tritt auch nach subkutaner Injektion ein Antidot des Stychnins!

Rp Methylal 10,0	Methylal 15,0	Methylal 2,0
Olei Olivarum 80,0	Sirup Sacchari 100,0	Aquae destillatae 8,0
§ Zur Einreibung	§ Abends 1 theelöffel	§ Zur subkutanen Injektion

Als „Acetal“ wird bisweilen auch folgende Mischung bezeichnet Aetheris acci 15,0, Olei Auranti, Thymi, Serpylli, Caryophyllorum, Lavandulae, aa gtt 3 Olei Citri gtt 6 Olei Rosmarini gtt 7 Olei Bergamottae gtt 10 Mentholi 5,0, Alcohol absoluta 150,0 g


Melange de Grégory. Forméthylal Dumas Unter diesem Namen wurde früher ein rohes Methylal, aus Methylal, Methylalkohol und Ameisensäure bestehend, verwendet

Acetanilidum.

† **Acetanilidum** (Brit., Germ., Helv., U-St.) Antifebrinum (Aust.) Acétanilide (Gall.) Phenylacetamid $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}(\text{CH}_2\text{CO}) = 135$.

Darstellung. 2 Th Anilin werden mit 3 Th Eisessig in einem Rundkolben a mit aufgesetztem Lufikührohr 5 so lange zum Sieden erhitzt, bis eine herausgenommene Probe beim Erkalten rasch und vollständig erstarrt, was in etwa 5 Stunden der Fall ist Alsdann giesst man die noch heisse Flüssigkeit unter Umrühren in etwa 6—8 Th kaltes Wasser, sondert die Krystallmasse nach völligem Erkalten von den flüssigen Antheilen und krystallisirt die Krystallmasse aus der 20fachen Menge siedenden Wassers um, bis

der Schmelzpunkt 112—113° ist. Ist es nothwendig, die Krystalle zu entfärben, so kann dies durch Digeriren mit etwas Thierkohle geschehen.



Es ist nicht erforderlich, chemisch reines Anilin anzuwenden, es genügt das technische „Anilin für Blau“. Dagegen ist es zweckmässig, dieses kurz vor der Verwendung zu rektificiren.

Eigenschaften. Farblose, glänzende, geruchlose Blättchen von schwach brennendem Geschmack, bei 295° siedend. Der Schmelzpunkt liegt nach Austr. etwa bei 112°, Helv. bei 112 bis 113°, Germ. und U-St. bei 113°, Brit. bei 113,5°, Gall. bei 114°. Löslich in 200 Th. kaltem oder 18 Th. siedendem Wasser, in 3,5 Th. Weingeist, in 18 Th. Aether, leichtlöslich in Chloroform.

Durch Erhitzen mit ätzenden Alkalien wird es in freies Anilin und essigsaures Alkali gespalten. Durch Erhitzen mit konc. Salzsäure entstehen Anilinchlorhydrat und Essigsäure $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH(CH}_3\text{CO)} + \text{H}_2\text{O} + \text{HCl} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$.

Prüfung. 1) Es sei neutral, farblos, geruchlos und zeige den geforderten Schmelzpunkt. 2) In konc. Schwefelsäure löse es sich in der Kälte ohne Färbung. (Färbung durch verschiedene organische Verunreinigungen, starke Verkohlung durch Zucker.)

3) In Salpetersäure (von 1,153 spec. Gew.) löse es sich ohne Färbung (Phenacetin = Gelbfärbung). 4) Die kalt gesättigte wässrige Lösung werde durch Eisenchlorid nicht violett gefärbt (Anilin-Salze). 5) 0,5 g Acetanilid verbrennen, ohne einen Rückstand zu hinterlassen (unorganische Beimengungen).

Aufbewahrung. Nach Germ. und Helv.: Vorsichtig.

Anwendung. Innerlich bewirkt es beim fiebernden Menschen Temperatur-Erniedrigung. Man giebt es als Antipyreticum und Antineuralgicum meist in Pulverform. Nebenwirkungen: Schweißse, cyanotische Verfärbung. Vorsicht ist geboten, da grosse Gaben Methämoglobin erzeugen können. Grösste Einzelgabe: 0,5 g (Germ., Helv.). Grösste Tagesgabe: 3 g (Helv.), 4 g (Germ.). Aeusserlich nur selten als die Eiterung beschränkendes Antisepticum.

Technisch als Verdünnungs(fälschungs)mittel für riechende Substanzen, z. B. Piperonal, Moschus, Vanillin etc.

Analyse. Man erkennt das Acetanilid an den physikalischen Eigenschaften, ferner an folgenden Reaktionen: 1) Kocht man 0,1 g Acetanilid mit 5 cem Kalilauge, so treten eigenthümlich riechende Anilindämpfe auf; fügt man zu der erkalteten Flüssigkeit einige Tropfen Chloroform, so entwickelt sich beim nochmaligen Erwärmen der widerliche Isonitril-(Carbylamin-, Isocyanphenyl-) Geruch. Das Reagensglas ist nach der Beobachtung sofort zu beseitigen. 2) Man kocht 0,1 g Acetanilid mit 2 cem Salzsäure (25 Proc.) eine Minute lang, fügt 3 cem Karbolwasser (1:20) sowie 20 Tropfen filtrirte Chlorkalklösung hinzu: Es entsteht zwiebelrothe, trübe Flüssigkeit, welche durch Ammoniak in indigoblau verändert wird. (Indophenol-Reaktion.)

Hat man in Gemischen eine Bestimmung des Acetanilids auszuführen, so kann diese, falls andere stickstoffhaltige Substanzen nicht zugegen sind, dadurch erfolgen, dass man den Stickstoffgehalt, z. B. nach KJELDAHL, ermittelt. Durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffes mit 9,64 erhält man die Menge des vorhandenen Acetanilids.

Im Harn findet sich das Acetanilid z. Th. als Acetyl-Paraamidophenol-Aetherschwefelsäure, z. Th. als Paraamidophenol-Glukuronsäure oder Acetyl-Paraamidophenol-Glukuronsäure. Diese spalten beim Erhitzen mit Salzsäure Paraamidophenol ab, welches die Indophenol-Reaktion giebt. Der Harn reducirt alkalische Kupferlösung und dreht links wegen des Gehaltes an gepaarter Glukuronsäure.

Man kocht 10 cem Harn mit 2 cem Salzsäure. Nach dem Erkalten giebt man




Fig. 1.

2 cem 3 procentiges Karbolwasser sowie etwas filtrirte Chlorkalklösung hinzu Zwiebelrothe Färbung, die durch Ammoniak in Blau übergeht (Indophenol-Reaktion)

Acetanilid ist Bestandtheil einer grossen Anzahl von Geheimmitteln und Specialitäten

Antikamnia Gemisch von 80 Acetanilid mit 20 Natriumbikarbonat, zuweilen auch etwas Koffein

Antinervin-RADLAUER (Salbromalid) Gemisch aus Ammoniumbromid, Salicyl säure je 25, Acetanilid 50 (RITSERT)

Exodyne. Acetanilid 90, Natriumbikarbonat, Natriumsalicylat je 5

Headline. Acetanilid 70, Natriumbikarbonat 30,0

Phenatol Mischung aus Acetanilid, Natriumbikarbonat, Koffein, Natriumsulfat, Natriumchlorid

Phenold. Acetanilid, Natriumbikarbonat 22

Pyratine. Acetanilid 60, Koffein 7, Natriumbikarbonat 20, Calciumcarbonat 13 (WELTER)

Rp Acetanilidi 2,0—5,0
Sacchari 8,0
fiat pulvis, divide in partes X
Dosis bis viermal täglich ein Pulver

Rp Acetanilidi 2,0
Sacchari albi
Gummi arabici 22 1,0
fiat cum Aqua pilulae 20
2—4 Mal täglich 3—4 Pillen

Tinctura dentifricia cum Acetanilido

Rp Acetanilidi 5,
Glycerini 20,
Spiritus 75,
Tinct Coccolutae 5,
Olei Menthae pip
" Geranii 22 gtt V
1 Theelöffel voll in 1/2 Glas Wasser als antiseptisches Mundwasser

Acetanilidi Derivata.

Von den näheren Derivaten des Acetanilids kommen pharmaceutisch folgende in Betracht

Ammonol (amerik. Ursprungs) soll angeblich Ammoniumphenylacetamid (Formel?) sein Zweifelhaftes Präparat Analgeticum und Antipyreticum

† **Antiseptin** Asepsin p Bromacetanilid $C_6H_4Br(1)NHCH_2CO(4)$ Man löst 185 Th Acetanilid in Essessig, trägt 160 Th Brom ein und krystallisiert den entstehenden weissen Niederschlag aus heissem Alkohol um

Farblose, monokline Prismen, Schm P 165—166°, in Wasser fast unlöslich, in Alkohol mässig löslich. Aufbewahrung Vorsichtig, vor Licht geschützt Ausserlich als Antisepticum auf nicht blutende Wunden Innerlich 0,02—0,05—0,1 g als Antipyreticum und Antineuralgicum (Vorsicht wegen Kollaps)!

[**Antiseptin**—VIGUERAT ist eine Art Lymphe, welche in der Weise erhalten wird, dass man 1—2 cem einer 0,5procentigen Lösung von Jodtrichlorid in Abscesse spritzt und das sich ausscheidende Serum als Heilmittel benutzt Nicht mit dem Vorgen zu verwechseln]

Jodantifebrin Para-Jodacetanilid $C_6H_4J(1)NHCH_2CO(4)$ Darstellung a) Durch Einwirkung von Chlorjod auf eine eisessigsäure Lösung von Acetanilid, b) durch Erhitzen von p Jodanilin mit Eisessig $C_6H_4JNH_2 + CH_3CO_2H = H_2O + C_6H_4JNHCH_2CO$ Aus Wasser krystallisiert farblose, rhombische Tafeln, geruchlos, geschmacklos Wenig löslich in kaltem, ziemlich löslich in siedendem Wasser, sehr leicht löslich in Alkohol und in Eisessig (Schm P 181,5°) Scheint den Organismus unverändert zu verlassen

† **Diacetanilid** $C_6H_5N(CH_2CO)_2$ Durch Erhitzen von Monoacetanilid mit Eisessig auf 200—250° C zu erhalten Das Reaktionsprodukt wird mit heissem Petroläther ausgezogen, welcher das Monoacetanilid ungelöst lässt Aus der heissen Petroläther Lösung scheidet sich Diacetanilid in Blättchen aus Schm P 111° C Wirkt wie Monoacetanilid, aber stärker Aufbewahrung Vorsichtig

† **Formanilid** *Formanilidum*, Phenylformamid $C_6H_5NH(HCO)$ Darstellung a) Durch rasches Destilliren von 98 Th Anilin mit 126 Th krystallisirter oder 90 Th entwässert Oxalsäure $C_2O_4H_2 + C_6H_5NH_2 = H_2O + CO_2 + C_6H_5NH(HCO)$ b) Durch Erhitzen von Ameisensäure-Ester mit Anilin $HCOOC_2H_5 + C_6H_5NH_2 = C_2H_5OH + C_6H_5NH(HCO)$

Farblose, lange prismatische Krystalle, Schm P 46° In Wasser ziemlich, in Alkohol leicht löslich Löslich auch in Glycerin und in Oelen Zerfällt mit verdünnten Säuren in Anilin und Ameisensäure Aufbewahrung Vorsichtig

Ausserlich Blutstillend, auf Schleimhäuten anästhesirend Zu Einblasungen in den Kehlkopf mit gleichen Theilen Amylum oder Lycopodium Zu Pinselungen auf Schleimhäuten die 10—20proc Lösung, zu Einspritzungen in die Urethra und Blase die

2—3proc Lösung Innerlich 0,15—0,25 g dreimal täglich als Antipyreticum und Analgeticum, bei Rheumatismus, Malaria, Typhus Vorsicht wegen Cyanose!

† **Benzanilid** Benzoylanilid Benzoylanilin $C_6H_5NH(C_6H_5CO)$ Durch Einwirkung von Benzoylchlorid oder Benzoesäureanhydrid auf Anilin in gleicher Weise wie Acetanilid $C_6H_5NH_2 + C_6H_5COCl = HCl + C_6H_5NH(C_6H_5CO)$

Farblose, perlmutterglänzende Blättchen, in Wasser fast unlöslich, löslich in 58 Th kaltem oder 7 Th siedendem Alkohol Schm P 163° Aufbewahrung Vorsichtig

Als Antipyreticum in der Kinderpraxis Kinder von 1—3 Jahren = 0,1—0,2 g, von 4—8 Jahren 0,2—0,4 g, von 8 Jahren ab 0,4—0,6 g, Erwachsene 1—3 g

† **Salicylanilid** $C_6H_5NH(C_6H_4OH CO) = 213$ Durch Erwärmen einer Mischung von 50 Th Salicylsäure und 84 Th Anilin mit 20 Th Phosphortrichlorid darzustellen. Man wäscht das Reaktionsprodukt mit Wasser, löst es in verdünnter, kalter Natronlauge und fällt es aus dieser Lösung durch Salzsäure, worauf man den Niederschlag aus verdünntem Alkohol umkristallisiert. Farblose Prismen oder Blättchen, Schm P 184—185°. Leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, schwer löslich in Schwefelkohlenstoff und heissem Wasser. Die alkoholische Lösung wird durch Ferrichlorid violett gefärbt. Wenig wirksame Aufbewahrung Vorsichtig

Salicylhydrin-BARLAUER Fälschlich „Salicylanilid“ genannt. Angeblich ein Kondensationsprodukt aus Acetanilid und Salicylsäure, ist in der That aber eine mechanische (event durch Schmelzen bereitete) Mischung von Acetanilid und Salicylsäure

† **Gallussäureanilid** Gallanilid Gallanolin $(Gallmol)$ $C_6H_5NH CO C_6H_2(OH)_3 + 2H_2O$ Man erhitzt Gallussäure oder Tannin mit einem Ueberschuss von Anilin 1 Stunde lang auf 150°, entfernt durch Ausziehen mit salzsäurehaltigem Wasser das überschüssige Anilin und kristallisiert den Rückstand wiederholt aus siedendem Wasser um

Farblose, bei 100° wasserfrei werdende Krystalle. Wenig löslich in kaltem, leicht löslich in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Durch Alkalien wird es unter Braunfärbung gelöst. Die wässrige Lösung färbt sich mit Eisenchlorid blau. Die wasserfreie Verbindung schmilzt bei 205°. Aufbewahrung Vorsicht, vor Licht geschützt

Wirkung reduciend und antiseptisch. An Stelle des Pyrogallols bei Hautkrankheiten (Ekzem, Psoriasis) in Substanz, in Mischungen mit Taleum, in Salben 1:80 bis 1:4. Angeblich ungiftig, nicht reizend

† **Methylacetanilid** Exalgine (Gall) $C_6H_5N(CH_3)(CH_3CO)$ Man lässt zu 216 Th Monomethylanilin (unter Rückflusskühlung) allmählich und unter Umschwenken 80 Th Acetylchlorid zutropfen. Unter freiwilliger Erhitzung vollzieht sich die Reaktion $2C_6H_5NHCH_3 + CH_3COCl = C_6H_5N(CH_3)CH_3CO + C_6H_5NEHCH_3 + HCl$. Man trägt den noch warmen Kolbeninhalt in siedendes Wasser ein und sammelt die nach dem Erkalten sich ausscheidenden Krystallnadeln, welche aus siedendem Wasser oder verdünntem Alkohol umkristallisiert werden

Da nur die Hälfte des Monomethylanilins umgewandelt wird, der Rest als salzsaures Salz in der Mutterlauge gelöst ist, so dampft man diese nach Zusatz von wenig Salzsäure etwas ein und gewinnt das Monomethylanilin wieder durch Destillation der mit Natronlauge stark alkalisch gemachten Flüssigkeit im Wasserdampfstrom

Farblose, lange prismatische Krystallnadeln, in 60 Th kaltem, oder in 2 Th siedendem Wasser, sehr leicht in Alkohol löslich. Schm P 102°, Siedep gegen 245°. Schmilzt unter siedendem Wasser. Durch Erhitzen mit Natronlauge oder konc Salzsäure wird es in Essigsäure und Monomethylanilin gespalten. Die im letzteren Falle erhaltene salzsaure Lösung darf, nach dem Uebersättigen mit Ammoniak, auf Zusatz von Chloralkalilösung nicht violett gefärbt werden (Anilin) Gall Aufbewahrung Vorsichtig

Anwendung Als Antineuralgicum in Gaben von 0,2—0,4—0,8 g bis zu 1,5 g täglich

Jatrol angeblich Oxyjodomethylanilid. Als Jodoformersatz (Trockenantisepticum, geruchloses, farbloses Pulver) empfohlen. Formel? Zweifelhafte Präparat

Acetonum.

I. Acetonum. (Ergänzb) Dimethylketon. Aceton. Propanon. Spiritus pyroaceticus. Mesitylalkohol. $CH_3 CO CH_3 = 58$. Spurenweise im normalen Harn und im Blut enthalten, bei hohem Fieber und bei Diabetes in grösserer Menge im Harn auftretend. Entsteht bei der trockenen Destillation des Holzes, beim Erhitzen von Zucker oder Gummi mit Kalk

Bereitung. Baryumacetat wird der trockenen Destillation unterworfen. Das Destillat wird mit Natriumkarbonat entsäuert und über geschmolzenem Calciumchlorid

rektifiziert — Ganz reine Präparate werden auf dem Umwege über das Aceton Natriumbisulfit dargestellt. Man lässt das Aceton mit Natriumbisulfit krystallisiren, destillirt die Bisulfit-Verbindung mit Säuren oder Alkalien und rektifiziert das Destillat über Calciumchlorid — Die Handelswaare wird bei der trockenen Destillation des Holzes gewonnen (= Alcohol methylicus)

Eigenschaften. Klare, farblose, leicht bewegliche, neutrale Flüssigkeit, leicht entzündlich und mit leuchtender Flamme verbrennend, ätherisch und pfefferminzartig riechend und schmeckend. Mit Wasser, Alkohol und Aether in jedem Verhältniss mischbar. Spec. Gew. 0,808 bei 15° C. Siedep. 56° C. Ausgezeichnetes Lösungsmittel für Fette, Harze, Kautschuk, Kampfer, Celluloid etc. Das *Acetonum purum* der Preislisten enthält stets etwas Methylalkohol. Es siedet bei 56—58° C. Das spec. Gew. ist 0,80—0,81 (Ergänzb.), doch genügt dieses Präparat für alle pharmaceutische Zwecke. Völlig rein ist nur das aus der Bisulfitverbindung dargestellte Aceton.

Reaktionen. 1) Beim Versetzen mit Kalilauge und Jod entsteht Jodoform. Ist auf Gegenwart von Alkohol Rücksicht zu nehmen, so fügt man eine Lösung von Jod in Ammoniumjodid und an Stelle von Kalilauge Ammoniak hinzu (Gunning). 2) Fügt man zu einer Acetonlösung einige Tropfen frischbereiteter Natriumnitroprussidlösung und etwas Kalilauge, so tritt rothbraune Färbung auf. Nach dem Ansäuern mit Essigsäure geht sie in Purpur- oder Violettfärbung (Loeagar) über.

Prüfung. 1) In Betracht kommen Reaktion, spec. Gew. und Siedepunkt. 2) Trockenes Kaliumcarbonat oder Calciumchlorid, in das Aceton gebracht, darf nicht zerfließen (Wasser). 3) Mit Wasser sei es klar mischbar (Trübung = Emphysema, auch Kohlenwasserstoffe). 4) Schüttelt man 10 ccm Aceton mit 10 ccm Liquor Kali acetici, so darf die wässrige Schicht nicht mehr als 11 ccm betragen, Wasser, Methylalkohol, Aethylalkohol. Ueber die Bestimmung s. unter *Alcohol methylicus*.

Anwendung. Früher innerlich gegen Tuberkulose, Gicht, Rheumatismus, auch als Wurmmittel. Einzelgabe 0,3—0,6, Tagesgabe 3,0 g. Aeusserlich zu reizenden Einreibungen. Löst Schiessbaumwolle zu Aceton-Kolloidum auf. Technisch zu Lacken, zur Darstellung von Jodoform und Sulfonal.

II. Hypnonum. Acetophenon. Phenyl-Methylacetone. Phenyl-Methylketon. $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_3$. Durch trockene Destillation gleicher Molekulargewichte Calciumbenzoat und Calciumacetat oder durch Kochen von Benzol mit Acetylchlorid und Aluminiumchlorid. Die zwischen 190—205° siedenden Antheile werden rektifiziert, die bei 195—200° übergehende Fraktion wird abgekühlt. Die durch Absaugen gereinigten Krystalle sind erstarrtes Acetophenon.

Farblose oder gelbliche, ölarartige Flüssigkeit nach Bittermandelöl und Jasmin riechend. Siedep. 210°. Erstarrt bei -4° zu Krystallblättern, die bei 20° schmelzen. Spec. Gew. = 1,035. Fast unlöslich in Wasser, sehr leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und fetten Ölen, auch in 60 Th. Glycerin.

Zu 0,05—0,15 g pro dosi in fettem Öl gelöst als Schlafmittel, meist in Kapseln.

III. Salacetolum. Acetosalicylsäure-Ester. $C_6H_4(OH)CO_2CH_3COCH_3$. Vom Aceton leitet sich ein „Acetol“ genannter Alkohol CH_3COCH_2OH ab, dessen Salicylsäure-Ester das Salacetol ist. Nicht zu verwechseln mit „Salactol“, s. Hydrogenium peroxydatum.

Darstellung. Monochloracetone wird mit Natriumacetylats erhitzt.



Eigenschaften. Farblose, schwach bitterschmeckende Nadeln oder Schuppen, löslich in 2200 Th. Wasser oder 15 Th. Alkohol, 25 Th. Ricinusöl, 30 Th. Mandelöl. Schmelzp. 71°. Wird es mit Wasser geschüttelt, so giebt das Filtrat mit Eisenchlorid die Reaction der Salicylsäure (Violettfärbung). Durch 1procentige Natronlauge wird es beim Schütteln (unter Verseifung) gelöst. Beim Ansäuern dieser Lösung fällt Salicylsäure aus.

Anwendung. In Tagesgaben von 2—4 g an Stelle des Natriumacetylats bei Gelenkrheumatismus, in Ricinusöl gelöst bei Sommerdiarrhöen.

Acidum aceticum.

Essigsäure wird in der Pharmacie in folgenden Formen angewendet. I. Als konc Essigsäure, II verdünnte Essigsäure, III Essig, IV Holzeßig, V Weinsteingeist

I Konc Essigsäure Acidum aceticum (Helv, Germ) Acidum aceticum concentratum (Austr) Acidum aceticum glaciale (Brit, U-St) Acide acétique cristallisable (Gall) Acetum glaciale. Essigsäure. Essigsäurehydrat. Eisessig $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} = 60$ Die 100procentige Säure ist eine klare, farblose, stechend sauer riechende und ätzend sauer schmeckende Flüssigkeit, unter 16°C zu farblosen rhombischen Tafeln erstarrend, welche bei $16,7^\circ$ wieder schmelzen Siedep 118° Die Dämpfe sind leicht entzündlich und brennen mit bläulicher Flamme Spec Gewicht 1.0558 bei 15°C Mit Wasser, Alkohol, Aether, Glycerin in jedem Verhältniss mischbar Beim Verdünnen der Säure mit Wasser steigt das spec Gewicht zunächst in Folge Bildung von Hydraten, dann fällt es wieder Das spec Gewicht von 1,066 entspricht z B einer Säure von 95, aber auch einer solchen von 56 Proc Daher giebt das spec Gewicht keinen sicheren Anhalt über den Säuregehalt Die Essigsäure der Pharmakopöen und des Handels enthält 96—99 Proc $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ und 4—1 Proc Wasser

	Austr	Brit	Gall.	Germ	Helvet.	U-St
Spec Gew	1,060	1,063	1,063	1,064	1,064	1,068
Essigsäuregehalt %	>98	ca 99	99	98	96	99
Siedepunkt	116—117°	—	120°	ca 117°	ca 117°	117—118°

Gutes Lösungsmittel für Harze, äther Oele, Horn u dgl, besonders in der Wärme

Darstellung. Fabrikmäßig durch Destillation von 100 Th völlig (!) entwässertem Natriumacetat mit 80 Th englischer und 30 Th rauchender Schwefelsäure Das Destillat wird zur Oxydation der schwefligen Säure und Zerstörung der organischen Substanz sowie Bindung etwaiger Chlorwasserstoffsäure mit 1 Th gepulvertem Kaliumdichromat, 4 Th entwässertem Natriumacetat 48 Stunden macerirt, dann decantirt und rektifizirt Die zuerst übergelassenen wasserhaltigen Portionen (5 Th) werden gesondert aufgefangen Ausbeute etwa 70 Th $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NaHSO}_4 + \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$

Aufbewahrung. Nur die Austr. schreibt die Aufbewahrung unter den Separaten vor

Abgabe. Da Eisessig nur zu wenigen technischen Zwecken (Photographie, Chemie) verwendet wird, so überzeuge man sich, dass der Käufer auch wirklich „Eisessig“ haben will Wenn im Handverkauf schlechthin „Essigsäure“ als Arzneimittel verlangt wird, so gebe man *Acidum aceticum dilutum*

Prüfung. 1) Vollige Flüchtigkeit beim Erhitzen von 3—5 ccm der Säure im Platinschälchen Man beachte hierbei, dass die Dämpfe entzündlich sind und die Schleimhäute stark reizen 2) Die mit dem 10fachen Volumen Wasser verdünnte Säure werde weder durch Silbernitrat (Chlor) noch durch Baryumnitrat (Schwefelsäure) getrübt. 3) Mit Kaliumpermanganat bis zur deutlichen Rothfärbung versetzt, entfärbe sie dieses innerhalb 5 Minuten nicht (Empyreuma und Aldehyde z B Furfurol) 4) Sie sei indifferent gegen Schwefelwasserstoff (Metalle, besonders Blei, Kupfer, Zink) 5) Mit Baryumchlorid entstehe weder direkt (Schwefelsäure) noch nach Zusatz von Chlorwasser (schweflige Säure) ein Niederschlag 6) Die mit gleichem Vol konc Schwefelsäure gemischte Essigsäure entfärbe Indigolösung nicht (Salpetersäure) Gehaltsbestimmung durch Titiren gewogener Mengen von Säure mit Normalnatronlauge oder Kalilauge und Phenolphthaleïn $1 \text{ ccm } \frac{\text{NaOH}}{n} = 0,06 \text{ g}$ Essigsäure $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$.

Reaktionen. 1) Beim Erwärmen von Essigsäure mit Alkohol und konc Schwefelsäure tritt der Geruch des Essigäthers auf 2) Beim starken Glühen der innigen Mischung eines essigsauren Alkalisalzes (Na) mit gepulverter arseniger Säure tritt der widerliche Kakodylgeruch auf

Anwendung. Wirkt im konc Zustande auf Schleimhaut und Haut ätzend, in verdünntem reizend Innerlich wird die concentrirte Säure kaum angewendet, die innere

Anwendung der Essigsäure erfolgt lediglich in Form von *Acetum* oder *Acidum aceticum dilutum*. Ausserordentlich selten als Aetzmittel bei Warzen und Hühneraugen, gegen Wunden, die mit Leuchtgift infiziert sind. Bisweilen als blasenziehendes Mittel und als Riechmittel. Technisch in der Photographie und Chemie.

Vésicatoire de Beauvoisin. Fliesspapier, Leinen oder Charpie wird, mit Eisessig getränkt, auf die Haut gelegt. Ein starkes Hautreizmittel.

Flacons de poche, *Flacons de sel anglais* (franz. Specialität) sind Riechflaschen mit kleinen Natriumsulfatkrystallen gefüllt und mit *Vinaigre anglais* (*Acetum britannicum*), S. 10, aromatisirt.

II Verdünnte Essigsäure. Fabrikmassig dargestellt durch Destillation von krystallisirtem Natriumacetat mit engl. Schwefelsäure, auch durch Verdünnung des Vorlaufes von der Destillation des Eisessigs. In den einzelnen Pharmacopöen von verschiedener Stärke.

Acidum aceticum dilutum (Aust., Germ. III, Helv.) *Acidum aceticum* (Brit., U-St.) *Acide acétique du commerce à 1,060* (Gall.) *Acetum concentratum* *Acide pyroligneux purifié*

	Austr.	Brit.	Gall.	Helv.	Germ.	U-St.
Gehalt an $C_2H_4O_2$	20,4	88	48	30	30	36
Specificches Gewicht	1,029	1,044	1,060	1,041	1,041	1,048

Man beachte, dass Brit. und U-St. unter „*Acidum aceticum*“ eine verdünnte Essigsäure verstehen.

Die verdünnte Essigsäure verhält sich in allen Punkten wie eine wässrige Lösung der conc. Essigsäure. Sie ist also in der nämlichen Weise zu prüfen wie die conc. Essigsäure. Auch die Bestimmung des Essigsäure-Gehaltes erfolgt durch Titriren gewogener Mengen mit Normalnatronlauge und Phenolphthalein.

Volumgewicht der Essigsäure

bei $+15^\circ$ (Oudemans)

Vol.-Gew.	Proc.	Vol.-Gew.	Proc.	Vol.-Gew.	Proc.	Vol. Gew.	Proc.	Vol.-Gew.	Proc.
0 9992	0	1 0298	21	1 0543	42	1 0702	63	1 0741	84
1 0007	1	1 0311	22	1 0552	43	1 0707	64	1 0789	85
1 0022	2	1 0324	23	1 0562	44	1 0712	65	1 0786	86
1 0037	3	1 0337	24	1 0571	45	1 0717	66	1 0781	87
1 0052	4	1 0350	25	1 0580	46	1 0721	67	1 0728	88
1 0067	5	1 0363	26	1 0589	47	1 0725	68	1 0720	89
1 0083	6	1 0375	27	1 0598	48	1 0729	69	1 0713	90
1 0098	7	1 0388	28	1 0607	49	1 0733	70	1 0705	91
1 0113	8	1 0400	29	1 0615	50	1 0737	71	1 0696	92
1 0127	9	1 0412	30	1 0623	51	1 0740	72	1 0688	93
1 0142	10	1 0424	31	1 0631	52	1 0742	73	1 0674	94
1 0157	11	1 0436	32	1 0638	53	1 0744	74	1 0660	95
1 0171	12	1 0447	33	1 0646	54	1 0746	75	1 0644	96
1 0185	13	1 0459	34	1 0653	55	1 0747	76	1 0625	97
1 0200	14	1 0470	35	1 0660	56	1 0748	77	1 0604	98
1 0214	15	1 0481	36	1 0666	57	1 0748	78	1 0580	99
1 0228	16	1 0492	37	1 0673	58	1 0748	79	1 0553	100
1 0242	17	1 0502	38	1 0679	59	1 0748	80		
1 0256	18	1 0513	39	1 0684	60	1 0747	81		
1 0270	19	1 0523	40	1 0691	61	1 0746	82		
1 0284	20	1 0533	41	1 0697	62	1 0744	83		

Anmerkung. Die Volum Gewichte über 1 0553 entsprechen zwei Lösungen von sehr verschiedenem Gehalt. Um zu wissen, ob man eine Säure vor sich hat, deren Gehalt an $C_2H_4O_2$ das Dichtigkeitsmaximum (78 Proc.) übertrifft, braucht man nur etwas Wasser zuzusetzen. Nimmt das Volum-Gewicht zu, so war die Säure stärker als 78procentig, im entgegengesetzten Falle war sie schwächer.

Anwendung. In kleinen Gaben innerlich zu 0,5–1,0 g stark verdünnt, regt sie Appetit und Verdauung an, in grösseren Gaben und häufiger genommen, erzeugt sie Verdauungsstörungen, Abmagerung, Blutarmuth. Aeusserlich Zu reizenden Einreibungen, Waschungen, als Riechmittel. Technisch und pharmaceutisch vielfach verwendet. Ist im Handverkauf abzugeben, wenn zu Arzneizwecken „Essigsäure“ verlangt wird.

Vinaigre de toilette (MALLARD)

Tincturae Benzoes	
„ Balsami toluani	33
Aquae Coloniae moschatae	80,0
Mixturae oleosae balsamicae	20,0
Acidi acetic diluti (80%)	80,0
Radix Ratanhiae	0 35

Kosmetischer Zusatz zum Waschwasser

Pasta contra comedones (UNNA)

Acidi acetic diluti (80%)	3,0
Glycerini	3,0
Boli albi	4,0

Fiat pasta Gegen „Mitesser“ Abends aufzulegen

Vinaigre phéniqué (Gall)

Acidi carbonici	10,0
Acidi acetic diluti (48%)	300,0
Aquae destillatae	790,0

Acidum aceticum carbolicum (Diet M.)

Acidi carbolic	10,0
Acidi acetic diluti (80%)	85,0
Olei Eucalypti	5,0

Zum Räuchern in Krankenzimmern

Acidum aceticum camphoratum

Camphorae	1,0
Spiritus	3,0
Acidi acetic diluti (80%)	7,0

Vinaigre radical, Esprit de Venus (Acetum radicale) der früheren Ph Gall war ein Destillat aus Kupferacetat. Es war im wesentlichen Essessig mit einem kleinen Gehalt an Aceton, welches den Geruch modificirte.

Vinaigre anglais

Acetum britannicum (Gall)

Acidi acetic glac	100,0
Camphorae	10,0
Olei Cinnam Ceyl	
„ Caryophyllor	33 0,2
„ Lavandulae	0,1

Zur Füllung der *Flacons de poche*

Vinaigre de Bully

Tincturae Benzoes	1,0
Acidi acetic	5,0
Aquae Coloniae	100,0

Acid acetic aromaticum (Ph Germ I.).

Acidi acetic glac	100,0
Olei Cinnam Cassiae	4,0
„ Thymi	
„ Bergamottae	33 12,0
„ Caryophyllor	80,0
„ Citri	
„ Lavandulae	33 24,0

Zur Füllung von Riechfläschchen (Stöcke von Kaliumsulfat), zu reizenden Einreibungen

Acetine Hühneraugenmittel. Verdünnte Essigsäure (80–50 Proc) mit Fuchsin roth oder (HOCHSTÄTTENS Acetine) mit Indigocarmin blau gefärbt.

Acetidux (Dr OELFERS) gegen Hühneraugen, Warzen etc. Nach SCHÄNDLER: Lösung von 5 g Chromsäure in 15 g Wasser, nach Anderen gefärbte verdünnte Essigsäure.

Essigessenzen, zur Herstellung von Speise-Essig im Haushalt durch Verdünnen mit Wasser bestehen aus etwa 80procentiger Essigsäure. Diese Essenzen kommen auch gewürzt, z. B. zur Herstellung von Esdragon-Essig, Kräuter-Essig etc. vor.

III Essig. Acetum. Vinaigre. Vinegar Nach den einzelnen Pharmakopöen entweder durch Verdünnen von Essigsäure oder durch Gährung darzustellen.

A) Reiner, gemischter Essig. *Acetum purum, Acetum destillatum* Helv. *Acetum purum* mit 5% Essigsäure. U-St. *Acidum aceticum dilutum* mit 6%, Brit. desgl. mit 4,27% Essigsäure. Alle farblos, auf Reinheit wie die reine Essigsäure zu prüfen.

B) Schnelllessig, Brantweinessig. Essig. Austr. und Germ. III. *Acetum* mit 6% Essigsäure. Spec. Gew. etwa 1,008. Als officinell sind die fast farblosen, durch das sog. Schnelllessigverfahren aus verdünntem Wingeiste erzeugten Sorten aufzufassen. Der von den Fabriken gelieferte Essigsprit enthält etwa 10% Essigsäure. Er ist also mit der nöthigen Menge Wasser zu verdünnen. Nicht zu grosse Vorräthe bereiten!

Prüfung Verdampfungsrückstand etwa 1 Proc. Derselbe riecht nicht nach Gewürzen und schmeckt nicht scharf (Gewürze, Pfeffer). Die Asche reagirt alkalisch. Freie Salzsäure. Man destillirt den Essig ab und fällt das Destillat mit Silbernitrat. Spuren von Chlor sind zulässig, weil Magnesiumchlorid enthaltendes Wasser beim Destilliren Salzsäure abgibt. Freie Schwefelsäure. Verdampfen von 5 ccm Essig im Wasserbade mit einigen Körnchen Zucker, wobei Verkohlungen nicht erfolgen darf. Metalle. Durch Ein-

leiten von Schwefelwasserstoff Arsen 5 cem Essig, 2 cem verdünnte Schwefelsäure und 1 Stück reines Zink Das entwickelte Gas darf Silbernitratlösung (1 + 1) nicht gelb färben — Der Essig darf keine Essigsäulen enthalten

Gehaltsbestimmung 10 g Essig bedürfen zur Neutralisation bei Anwendung von Phenolphthalein als Indikator nach Austr, Germ, U St = 10 cem Normal Kalilauge Helvet = 8,88 cem Brit = 7,1 cem Normal-Kalilauge

Getreide-Essig. Durch Essigsäure Gährung aus einer Mischung von gemalztem und ungemalztem Getreide zu erhalten, war früher von Brit als Acetum (Vinegar) aufgenommen Braunkliche Flüssigkeit, spec Gew 1,017—1,019 Essigsäuregehalt = 5,41 Proc

Weinessig. Acetum Vin. Durch Essigsäure Gährung von Wein oder Most erhalten Gall *Vinagre blanc* mit 7—8 Proc Essigsäure In Norddeutschland wird der gewöhnliche Schnellsegg häufig falschlich als „Weinessig“ bezeichnet

Weinessig hat das spec Gew 1,0116—1,0147, angenehm weinigen Geruch und Geschmack, enthält nur Spuren von Alkohol und Glycerin, 0,85—1,5 Proc weinig riechendes Extrakt, 0,15—0,25 Proc Asche, in welcher Phosphorsäure enthalten ist Der Gehalt an Essigsäure ist 6—8 Proc Wesentlich ist das Vorhandensein von Weinstein, zu dessen Nachweis 1 Liter abzukochen ist, s unter Vinum Weinessig soll unter Benutzung von mindestens 20 Proc Wein hergestellt werden Er soll mindestens 0,4 Proc Extrakt und 0,003 Proc Phosphorsäure enthalten

Anwendung. Innerlich in Verdünnung zu kühlenden Getränken (Oxyerata), Limonaden, Saturasionen Als Antidot bei Vergiftungen mit kautistischen Alkalien, Aetzalkali Aeusserlich wirkt er adstringierend und (durch Koagulation) blutstillend Verdünnt mit 5 Th Wasser zu Waschungen, Umschlägen, mit 3—6 Th zu Klystieren mit 3—8 Th zu Mund- und Gurgelwässern Desinfizierende Räucherungen nicht als zweckmässig zu bezeichnen

Essigsprit des Handels enthält 8—10 Proc Essigsäure, hält sich deshalb frei von Essig-Aalen Aufbewahrung in Lagerfässern in trockenem kühlen Keller! Zu Küchenzwecken giebt man zweckmässig 6procentigen Essig ab, welcher event schwach aromatisirt werden kann

Essig Aroma.

Weinbeeröl	3,0
Essigäther	50,0
Birnenäther	50,0
Spiritus (90%)	887,0

Acetum Dracunculi

Esdragon-Essig (Diet M)

Herbae Dracunculi recentis	100,0
Aceti	1000,0
Acidi salicylici	1,0

6 Tage maceriren, pressen Colatur auf fast 100° erhitzen, in geschlossener Flasche mehrere Tage absetzen lassen, filtriren und auf Flaschen abfüllen

Kräuter Essig

Herbae Dracunculi recentis	200,0
Fructuum Anethi recentium	200,0
Herbae Achillae moschatae	25,0
Foliorum Lauri	25,0

Mit Spiritus dilutus durchsäuert, 24 Stunden stehen lassen, sodann mit 50 Liter Essigsprit maceriren

Sirup de Vinalgre (Gall)

Aceti Vini (7—8%)	100,0
Sacchari	175,0

Durch mässiges Erwärmen im geschlossenen Gefässe einen Sirup zu bereiten. Es ist hier in der That Wein essig anzuwenden.

Acetogen. Natriumsalz-Mischung für die Fabrikation des Essigs nach PASTEUR Calcium phosphoricum 15,0, Natrium phosphoricum 45,0, Ammonium phosphoricum 40,0

Sterilisator. Ein aromatischer Essig mit freier Salzsäure, Weinsäure und Citronensäure

IV. Holzessig. Acetum (Acidum) pyrolignosum. Acetum lignicum. Acide pyroligneux. Vinalgre de bois. Pyroligneous acid. Vinegar from wood.

A) Rohes Holzessig. *Acetum pyrolignosum* (Helv) *Acetum pyrolignosum crudum* (Germ III) Braune Flüssigkeit, 5—7% (Helv 5%, Germ III 6%) Essigsäure, etwas Methylalkohol und Aceton, sowie 6—10% Holztheer gelöst enthaltend, welcher sich im Verlauf der Aufbewahrung zum Theil absetzt

B) *Acetum pyrolignosum rectificatum*, Gereinigter Holzessig (Germ III) Man destillirt den rohen Holzessig so lange, als das Destillat noch schwach gelblich gefärbt ist (etwa 80%) Klare, gelbliche, später bräunliche Flüssigkeit von 5% Essigsäuregehalt

Eine Mischung aus 1 cem gereinigtem Holzessig, 9 cem Wasser und 80 cem verdünnter Schwefelsäure muss eine Lösung von 0,02 g Kaliumpermanganat in 20 cem Wasser innerhalb 5 Minuten völlig entfärben (Richtiger Gehalt an Theerstoffen)

Anwendung Beide Präparate werden wegen ihres Gehaltes an Essigsäure und an Theerbestandtheilen (Phenolen) äusserlich als adstringendes und desinfizirendes Mittel verwendet. Zu Waschungen und Umschlägen, als Mund- und Gargelwasser, zu Einspritzungen in die Scheide 1—5,0 100,0 Wasser, zum Verbinden janchiger Wunden 10—20,0 100,0 Wasser. Das ungerainigte Präparat ist das wirksamere, auch in der Veterinär-Praxis bei Klauensenke, Manfäule, Räude allein gebrauchte. Technisch der rohe Holzessig besonders zum Rauchern des Fleisches.

Innerlich nur der gereinigte Holzessig zu 0,5—1,0 g in starker Verdünnung bei Wangenbrand (Noma). Vorsicht wegen Intoxikationen.

Aufbewahrung des gereinigten Holzessigs. An kühlem Ort, in gut geschlossenen, möglichst gefüllten Gefässen vor Sonnenlicht geschützt. Nach langer Aufbewahrung wird er besonders bei Einwirkung von Licht und Luft dunkelbraun und ist dann zu verwerfen.

Acetum vulnearium in usum veterinarium

Aluminis pulverati	5,0
Aquae communis	100,0
Aceti pyrolignosi (ord.)	150,0
Spiritus diluti	20,0

Zum Verbands eiternder Wunden und zu Einspritzungen

Unimentum Wilkinson

Aceti pyrolignosi (crudi)	50,0
Ammonii carbonici q. s. ad neutralisationem	
D. ad vitrum nigrum	

Zum Bepinseln und Waschen syphilitischer Wucherungen

V Weinsteingeist Liqueur pyro-tartaricus. Spiritus Tartari (empyreumaticus)

Darstellung Eine eiserne Retorte wird zu $\frac{1}{2}$ mit grobgepulvertem, rohem Weinstein angefüllt und über freiem Feuer allmählich bis zum Glühen erhitzt. Das Destillat sammelt man in einer geräumigen, gut abgekühlten Vorlage (man gebe den reichlich auftretenden Gasen Gelegenheit zu entweichen) und befreie es durch wiederholte Filtration von dem nicht gelösten brenzlichen Oel.

Eigenschaften. Gelbbraunliche, klare Flüssigkeit von brenzlich-säuerlichem Geruch und Geschmack, welche beim Abdunsten in Wasser leicht lösliche Krystalle von Brenzweinsäure abscheidet. Spec. Gew. 0,995—1,005. Enthält viele Bestandtheile des Holzessigs, ausserdem noch Brenzweinsäure.

Anwendung. Früher als anregendes, schweis- und harntreibendes Mittel viel benutzt, jetzt obsolet. Dosis 1—2—3 g in Verdünnung. Bestandtheil der in manchen Gegenden als schweisstreibendes Mittel beliebten *Mixtura pyro tartarica*.

Mixtura pyro tartarica	Mixtura simplex	Mixtura bezardiana	Mixtura de tribus s. diatrion
Simplextropfen in loco	Mixturae pyro tartaricae camphoratae		

Spiritus Angelicae compositi	120,0
Liquoris pyro-tartarici	80,0
Acidi sulfurici concentrati	5,0

Alle 2—3 Stunden einen Theelöffel voll in heissem Fliederthee

Erkennung und Bestimmung. Nicht zu stark verdünnte Essigsäure erkennt man am Geruche. Ist die Lösung sehr verdünnt, so neutralisirt man sie mit Natriumcarbonat, dampft zur Trockne und stellt mit dem Rückstand folgende Reaction an: 1) Fügt man das Acetat zu einer Mischung aus 2 Th. cone. Schwefelsäure und 1 Th. Alkohol, so tritt beim Erwärmen Geruch nach Essigäther auf. 2) Versetzt man die klare Lösung eines neutralen Acetats mit Ferrichloridlösung, so entsteht eine blutrothe Lösung von Ferriacetat. Beim Aufkochen scheidet sich ein Niederschlag von basischem Ferriacetat ab. 3) Mischt man eine kleine Menge eines Acetates innig mit Arsensäure-Anhydrid und erhitzt die Mischung stark in einem Glührohr, so erfolgt die Bildung widerlich riechenden Kakadyl-oxides (Alkarsin, Camer'sche Flüssigkeit) $As_2O(CH_3)_4$.

Die Bestimmung der Essigsäure erfolgt, falls diese in freiem Zustande vorhanden ist und andere freie Säuren abwesend sind, durch Titration einer gewogenen Menge mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator. 1 cem Normal-Kali-

laue ist = 0,06 g Essigsäure $C_2H_4O_2$ (In der Praxis wendet man auch Normal-Ammoniak mit Lackmus an)

Liegen essigsaure Salze zur Bestimmung vor, so destillirt man diese zunächst mit verdünnter Schwefelsäure oder mit Phosphorsäure am besten im Wasserdampfströme so lange, bis das Destillat neutral übergeht und tritt alsdann das Gesamtdestillat oder einen aliquoten Theil wie angegeben mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein

Otto's Acetometer. Ein in den Essigfabriken gebräuchlicher Apparat zur Feststellung der Stärke des Essigs besteht aus einem 38 cm langen und 2 cm weitem Glaszylinder mit zwei verschiedenen Theilungen. Bis zur Marke *a* fasst der Cylinder = 1 cem. Der Raum zwischen *a* und *b* ist = 10 cem. In dem darüber befindlichen Theile entspricht der Raum zwischen zwei ganzen Zahlen = 2,08 cem (diese 2,08 cem entsprechen = 2,07 g (l) Ammoniakflüssigkeit von 1,869% NH_3) — Zum Gebrauche wird der Cylinder bis zur Marke *a* mit Lackmuskur geteilt gefüllt. Dann fügt man bis zur Marke *b* von dem zu untersuchenden Essig hinzu, mischt durch sanftes Schwenken und lässt alsdann von der ammoniakalischen Probestlüssigkeit unter sanftem Bewegen so lange zufließen, bis eben deutliche Blaufärbung auftritt. Der Gehalt des Essigs an Essigsäure ($C_2H_4O_2$) kann alsdann direkt an der Graduierung abgelesen werden. Schneidet z. B. die blaue Flüssigkeit bei dem Theilstrich 6,5 ab, so enthält der Essig in 100 cem = 6,5 g Essigsäure.

Die ammoniakalische Probestlüssigkeit zu diesem Acetometer wird gemischt aus

188 g Ammoniakflüssigkeit von 0,959 spec. Gew bei 17,5° C und 864 g Wasser oder
140 g „ „ 0,960 „ „ „ 860 g „

† **Essigsäure-Anhydrid** $(CH_3CO)_2O$ *Acidum aceticum anhydricum*. Nicht zu verwechseln mit wasserfreier Essigsäure! s. S. 8. Wird u. a. durch Einwirkung von Phosphoroxchlorid oder von Chlorkohlenoxyd (Phosgen) auf wasserfreies Natriumacetat dargestellt: $4CH_3CO_2Na + POCl_3 = 2[(CH_3CO)_2O] + Na_3PO_4 + 3NaCl$. Farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit von sehr stechendem Geruch (Vorsicht!) Spec. Gew. 1,080, Siedep. 187°. Geht beim Kochen mit Wasser in Essigsäure über. Als Reagens zum Nachweis des Cholesterins, in der organischen Chemie zum „Acetyliren“ Arzneilich nicht verwendet. Aufbewahrung in Flaschen mit Glasstopfen (Vorsichtig!).

† **Acetylchlorid** Essigsäurechlorid *Acetylum chloratum* CH_3COCl . Darstellung durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf wasserfreie Essigsäure: $CH_3CO_2H + POCl_3 = HCl + POCl_2 + CH_3COCl$. Farblose, an der Luft rauchende, stechend riechende Flüssigkeit. Siedepunkt 58°. Giebt mit Wasser = Essigsäure + Chlorwasserstoff, mit Alkohol = Essigsäureäthylather + Chlorwasserstoff. Anwendung in der organischen Synthese. Aufbewahrung in Flaschen mit Glasstopfen (Vorsichtig!).

† **Monochloressigsäure**, *Acidum monochloro aceticum* *Acide monochloracétique* *Monochloroacetic acid* CH_2ClCO_2H .

Darstellung. In wasserfreie Essigsäure, welche bis nahe zum Sieden erhitzt ist, wird — unter dem Einfluss des Sonnenlichtes oder bei Gegenwart von Jod — trockenes Chlor eingeleitet (10–20 Stunden), bis das Gewicht der Essigsäure um mehr als die Hälfte zu genommen hat: $CH_3CO_2H + Cl_2 = HCl + CH_2ClCO_2H$. Das Reaktionsprodukt wird erhitzt und wiederholt fraktionirt. Die bei 180–188° übergelenden Antheile erstarrten beim Abkühlen zu Krystallen, welche aus siedendem Benzol umkrystallisirt werden können.

Eigenschaften. Farblose Nadeln oder rhombische Tafeln. In der Kälte geruchlos, in der Wärme erstickend riechend. Schmp. 62–63° C. Siedep. 185–187° C. Hygroskopisch. In Wasser, Alkohol oder Aether leicht löslich. — Die 5proc. mit Salpetersäure angesäuerte wässrige Lösung wird durch Silbernitratlösung nicht sofort getrübt (Vorsichtig aufbewahren!).

Anwendung. In Substanz oder konc. Lösung als Aetzmittel bei Warzen, Hautverdickungen.

† **Dichloressigsäure** *Acidum dichloroaceticum* $CHCl_2CO_2H$. Durch weitergehende Chlorirung der Essigsäure (s. Monochloressigsäure) zu erhalten: $CH_3CO_2H + 2Cl_2 = 2HCl + CHCl_2CO_2H$. Bei 0° C. noch flüssig, bei starker Abkühlung erstarrend. Farblose Flüssigkeit, spec. Gew. 1,52 bei 15° C. Siedepunkt 190° (Vorsichtig aufzubewahren!). Nur selten als Aetzmittel gebraucht.

† **Trichloressigsäure** *Acidum trichloroaceticum* (Germ.) *Acide trichloracétique* *Tri-*




Fig. 2 Otto's Acetometer

chloroacetic acid $\text{CO}_2\text{CO}_2\text{H}$ Am vorteilhaftesten durch Oxydation von Chloralhydrat mittels rother rauchender Salpetersäure darzustellen $\text{CCl}_3\text{CHO} + \text{O} = \text{COCl}_2\text{CO}_2\text{H}$

Farblose, rhomboedrische Krystalle von schwachstechendem Geruche, an der Luft zerflüchtig, in Wasser, Alkohol und Aether löslich. Schmelzp. 55° , bei etwa 195° siedend. Die wässrige Lösung scheidet beim Erhitzen mit überschüssigem Natriumkarbonat Chloroform ab. Die wässrige, mit Salpetersäure angesäuerte Lösung werde durch Silbernitrat sogleich nur opalisirend getrübt. Aufbewahrung in Gefässen mit Glasstopfen, vorsichtig.

Anwendung Aeusserlich. In Substanz oder konc. Lösung als Aetzmittel zur Entfernung derber, widerstandsfähiger Wucherungen (Condylom, Papillom, Leichdornen), die 3proc. Lösung auf Tampons bei Nasenbluten. Wegen der Eigenschaft, Erweise zu fällen als Reagens auf Erweise, s. Urina.

† **Acidum trichloroaceticum liquefactum** 10 Th. Acidum trichloroaceticum und 1 Th. Wasser geben ein flüssig bleibendes Liquidum. Receptur-Erläuterung.

† **Acetocautin** wird eine 50procentige Auflösung der Trichloroessigsäure genannt.

Thioessigsäure, **Acidum thioaceticum** CH_3COSH Thioacetsäure. Aethanthioisäure. Durch Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf wasserfreie Essigsäure zu erhalten. $5\text{CH}_3\text{COOH} + \text{P}_2\text{S}_5 = \text{P}_2\text{O}_5 + 5\text{CH}_3\text{COSH}$

Schwach gelbliche Flüssigkeit, zugleich nach Essigsäure und nach Schwefelwasserstoff riechend. Siedepunkt 93° . Spec. Gew. bei $10^\circ = 1,074$. In 16 Th. Wasser, leicht in Alkohol löslich. Zerfällt beim Erhitzen mit verdünnten Säuren in Essigsäure und Schwefelwasserstoff. $\text{CH}_3\text{COSH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{S}$

Die 6procentige wässrige Lösung dient als Ersatz des Schwefelwasserstoffes in der Analyse (Scheff).

Ammonium thioaceticum $\text{CH}_3\text{COS}(\text{NH}_4)$ Thioessigsäures Ammonium. Man übersättigt 30 cm der reinen Säure mit Ammoniakflüssigkeit und füllt die Mischung auf 100 cm auf. Diese Lösung dient als Ersatz des Schwefelwasserstoffes in der Analyse (Scheff). Auf 1–2 g Substanz in salzsaurer Flüssigkeit wendet man 2–3 cm der 90procentigen Lösung an. Man bereite die Lösung des Ammoniumthioacetates nicht für zu lange Zeit hinaus, da sie sich unter Tribung zersetzt.

Amidoessigsäure $\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{CO}_2\text{H}$ **Glycocolum** Glycin. Leimzuckersäure, Leimzucker. Aminoäthansäure. Tritt als Zersetzungsprodukt vieler therischer Stoffe beim Behandeln derselben mit Mineralsäuren oder atzenden Alkalien auf, entsteht in dieser Weise aus dem Knochenleim. Als Benzoylglykokoll (Hippursäure) kommt sie im Harn der Pflanzenfresser vor.

Darstellung Man kocht 1 Th. Hippursäure 10–12 Stunden lang am Rückflusskühler mit 4 Th. konc. Salzsäure, wodurch die Hippursäure in Benzoesäure und salzsaures Glykokoll gespalten wird. $\text{CH}_2\text{NH}_2(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O} + \text{HCl} = \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H} + \text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{CO}_2\text{H}$. HCl. Man konzentriert die Lösung, scheidet die Benzoesäure mechanisch ab und dampft die Lösung zur Trockne. Den Rückstand nimmt man mit Wasser auf, kocht die Lösung mit einem Ueberschuss Bleiglätte und fällt das Filtrat mit Schwefelwasserstoff. Die vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit hinterlässt beim Verdampfen das Glykokoll. — Synthetisch aus Monochloressigsäure und Ammoniak.

Grosse, farblose, süssschmeckende Prismen. In Wasser leicht löslich, in Alkohol und Aether unlöslich. Schmilzt bei 236° unter Bräunung. Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid blutrothe, mit Kupfersulfat tiefblaue Färbung. — Glykokoll vereinigt sich sowohl mit Säuren als auch mit Basen zu Salzen, z. B. $\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{CO}_2\text{H}$ HCl, ferner $(\text{CH}_2\text{NH}_2\text{CO}_2)_2\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$.

†† **Hydrargyrum glycocollicum**, Glykokoll-Quecksilber $(\text{CH}_2\text{NH}_2\text{CO}_2)_2\text{Hg}$. Man löst 2 g Glykokoll in 20 cm Wasser, fügt 1 g gefälltes Quecksilberoxyd hinzu, schüttelt bis zur Auflösung und füllt mit Wasser bis zu 100 cm auf. 1 cm der Lösung ist = 0,01 g HgO . Zu subkutanen Injektionen. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

Acidum anisicum.

I. Anissäure. **Acidum anisicum** $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OCH}_3)\text{CO}_2\text{H}$. **Methylparaoxybenzoesäure.** **Oxybenzoesäuremethyläthersäure** (identisch mit der Dragonsäure von Laurent und der „Umbellsäure“ und Badiansäure von Persoz).

Darstellung Man giesst 1 Th. Anissl in eine auf 50° erwärmte Lösung von 5 Th. Kaliumdichromat, 20 Th. Wasser und 10 Th. konc. Schwefelsäure. Wenn die Reaktion nach einigen Minuten beendet ist, lässt man erkalten, filtrirt die Anissäure ab und

reinigt sie durch Auflösen in Ammoniak und Fällen mit Salzsäure. Schliesslich krystallisiert man sie aus siedendem Wasser um.

Eigenschaften. Farblose, in reinem Zustande geruchlose, monokline Nadeln oder Prismen. Schmelzp 184° (corr.), Siedep $275-280^{\circ}$. Löslich in 2500 Th Wasser von 18° , leicht löslich in siedendem Wasser, auch in Alkohol und in Aether. Die wässrige Lösung reagiert sauer und giebt mit Ferrichlorid keine Violettfärbung. Sie entfärbt Kaliumpermanganat nicht. — 1 g Anissäure wird neutralisiert (Phenolphthalein als Indikator) durch 0,868 g Kalihydrat = 65,7 cem $\frac{1}{10}$ -Normal-Kalilauge. Mol-Gew = 152. Aufbewahrung unter den indifferenten Arzneimitteln, nicht lichtempfindlich.

Prüfung. Anissäure sei farblos und rieche nur schwach nach Anisöl. 0,5 g verbrennen ohne einen Rückstand zu hinterlassen. Die wässrige Lösung reagiere sauer, werde durch Eisenchlorid nicht violett gefärbt (Salicylsäure) und entfärbe nur massige Mengen von Kaliumpermanganat. — Sie schmelze nicht unter 180° .

Anwendung. Sie wirkt antiseptisch, antithermisch und antirheumatisch wie Salicylsäure, aber ohne zu ätzen. Innerlich (meist als Na Salz oder Phenylester) 0,3–1,0 g als Antipyreticum (beeinflusst die Herzthätigkeit nicht). Aeusserlich in der Wundbehandlung in der nämlichen Weise und den gleichen Dosen wie Salicylsäure, also in Salben, spirituöser Lösung etc., 1:100 bis 1:10.

II Natriumanisat. Natrium anisicum. $C_6H_4(OCH_3)CO_2Na + \frac{1}{2}H_2O$. Anissaures Natrium. Mol-Gew = 188.

Darstellung. Man stösst 10 Th Anissäure und 5,5 Th Natriumbikarbonat mit Wasser zu einer Pasta an und krystallisiert das Salz, dessen wässrige Lösung noch schwach sauer reagieren muss, aus 90 proc Alkohol unter Erwärmen um.

Eigenschaften. Farblose Blättchen mit $\frac{1}{2}$ Mol Krystallwasser, oder ein farbloses feinkrystallinisches Pulver, welches fast wasserfrei ist. Leicht löslich in Wasser. Die wässrige Lösung reagiert schwach sauer, sie giebt mit Ferrichlorid gelben Niederschlag von Ferrisanisat, durch Mineralsäuren wird Anissäure in Krystallen abgeschieden. Aus der wässrigen Lösung krystallisiert ein Salz $C_6H_4(OCH_3)CO_2Na + 5H_2O$ in dicken Säulen. Aufbewahrung wie Anissäure.

Anwendung. An Stelle des Natriumsalicylates zu 0,3–1,0 g mehrmals täglich bei Ischias und Rheumatismus. Stört die Herzthätigkeit nicht.

III. Anissäure-Phenylester. $C_6H_4(OCH_3)CO_2C_6H_5$. Phenylum anisatum. Mol-Gew = 228. (Fälschlich auch *Acidum anisophenylicum*, s. Minors.) Die dem Salol entsprechende Verbindung der Anissäure. Wird dargestellt durch Einwirkung von Phosphor pentachlorid auf eine Mischung von Anissäure und Phenol, s. Salolol.

Farblose, bei $75-76^{\circ}$ schmelzende Krystalle, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Chloroform. Durch Natronlauge wird es schon in der Kälte gelöst unter Spaltung in Anissäure und in Phenol. Aufbewahrung wie Anissäure.

Anwendung. Zu 0,5–1,0 g mehrmals bei Rheumatismus und Neuralgien wie das Salol.

Acidum benzoicum.

Von den Pharmakopöen schreiben Austr., Gall., Germ., Helv. die durch Sublimation von Benzoeharz gewonnene Benzoesäure vor. Gall. hat ausserdem noch die auf nassem Wege aus Harz bereitete aufgenommen. U-St. und Brit. lassen die aus Harz sublimierte und die aus Toluol gewonnene Benzoesäure zu.

I. Reine oder künstliche Benzoesäure. Acidum benzoicum (Brit., U-St.) Acidum benzoicum artificiale (s. Toluolo, seu crystallisatum) $C_6H_5CO_2H$. Mol-Gew = 122.


Darstellung. Toluol $C_6H_5 \cdot CH_3$ wird durch Chlorieren zunächst in Benzotrichlorid $C_6H_5 \cdot CCl_3$ verwandelt und dieses durch Erhitzen mit Wasser auf 150° in Benzoesäure übergeführt $C_6H_5 \cdot CCl_3 + 2 H_2O = 3 HCl + C_6H_5 \cdot CO_2H$ ●

Eigenschaften. Farblose, glänzende Nadeln oder Blätter, in reinem Zustande geruchlos Schmelzp $120-121^\circ$, Siedep $249-250^\circ$ Sublimiert schon bei 150° Mit Wasserdämpfen flüchtig Die Dämpfe der Benzoesäure reizen die Schleimhäute heftig Löslich in 15 Th siedendem oder 380 Th kaltem Wasser, ferner in 2 Th Alkohol oder 8 Th Aether Leicht löslich in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fetten und ätherischen Ölen

Dieses Präparat kann als reine Benzoesäure angesehen werden Es ist in der Regel nur durch Spuren von Benzaldehyd und durch kleine Mengen gechlorter Benzoesäuren verunreinigt Die U-St und Brit lassen es als officinelles Präparat zu, ausserdem wird es in ausgedehntem Umfange in der organischen Technik, z B zur Herstellung von Anilinsblau, verwendet

II Harn-Benzoesäure Acidum benzoicum ex urina Der Harn der Pflanzefresser enthält Hippursäure (Benzoyl Glycocoll) $CH_2NH(C_6H_5 \cdot CO)CO_2H$, welche durch Einwirkung von Säuren oder Basen in Glycocoll und Benzoesäure gespalten wird

Man lässt Harn von Pferden oder Rindern durch mehrtägiges Stehen in Gruben faulen (Bildung von NH_3 !), klärt ihn dann in Bottichen mit Kalkmilch, dampft die klare Flüssigkeit auf ein kleines Volumen ein und scheidet die Benzoesäure durch Ansäuern der filtrirten Flüssigkeit mit Salzsäure ab



Die so hergestellte Benzoesäure enthält stets geringe Mengen von Mineralstoffen (Asche), meist Kalksalze, und besitzt in der Regel schwach unisösem Geruch Sie wird kaum noch angewendet Sie ist in keiner Pharmakopöe mehr officinell

III Benzoesäure aus Harz a) Auf nassem Wege *Acide benzoique par voie humide* (Gall) Man mischt 1000 g gepulvertes (zimmtsäurefreies) Benzoharz mit 300 g Aetzkalk, die vorher durch Besprengen mit Wasser in staubiges Calciumhydrat verwandelt sind, vertheilt das Gemisch in 6 Liter Wasser, digerirt zunächst einige Zeit und kocht alsdann unter Umrühren und Ersatz des verdampften Wassers eine Stunde Die Flüssigkeit wird kolirt, der Rückstand noch 1—2 Mal mit je 4 Liter Wasser ausgekocht

Die vereinigten, Calciumbenzoat enthaltenden Flüssigkeiten werden filtrirt, auf etwa 3 Liter eingedampft und mit reiner Salzsäure bis zur stark sauren Reaction versetzt Nach dem Erkalten sammelt man die Krystalle und krystallisirt sie unter Zusatz von etwas Thierkohle aus 20 Th siedendem Wasser um

Man kann auf diese Weise die gesammte Benzoesäure aus dem Harz gewinnen, aber diese ist nahezu frei von mecheden Stoffen, dafür aber enthält sie in der Regel noch etwas Mineralstoffe (Kalksalze)

b) Durch Sublimation *Acidum benzoicum* (Austr, Brit, Germ, Halv, U-St) *Acide benzoique par sublimation* (Gall) *Benzole acide. Flores Benzoës. Fleurs de Benjoin*

Zur Darstellung eignen sich nur zimmtsäurefreie Benzoesorten (Palmbang Benzöl, nicht aber die zimmtsäurehaltige Penang-Benzöl)

Ehe man zur Sublimation schreitet, muss man sich also vergewissern, dass das zu verarbeitende Benzoharz auch wirklich zimmtsäurefrei ist Zu diesem Zwecke digerirt man 5 g eines guten Durchschnittsmusters des gepulverten Benzoharzes mit einer heissen Lösung von 1,3 g kryst Natriumkarbonat in 15 g Wasser eine Stunde lang, filtrirt nach dem Erkalten und fällt aus dem Filtrat die Benzoesäure durch Zusatz von verdünnter Schwefelsäure Die ausgewaschenen Krystalle werden alsdann in einem Probirrohre mit concentrirter Kaliumpermanganatlösung übergossen und das lose verschlossene Rohr in ein erwärmtes Wasserbad eingesetzt Es darf der Geruch nach Bittermandelöl nicht auftreten

Das Harz wird gepulvert und zwar entweder unvermischt oder — wie Gall vor-

schreibt — nach dem Vermischen mit dem gleichen Gewicht Sand der Sublimation unterworfen

Das stellung Um kleinere Mengen der officinellen Benzoesäure darzustellen, bringt man in einen 4—5 cm hohen und etwa 20 cm weiten Tiegel (a) aus Gusseisen oder Schwarzblech getrocknetes, grobgepulvertes Benzoeharz in etwa 2—3 cm hoher Schicht, bedeckt den Tiegel mit einer Scheibe (o) lockeren Filtrpapieres, welche mit vielen Nadel




Fig 9 Kleiner Apparat z. Benzoesäuresublimation

stichen durchbohrt und an den Rand des Tiegels mit Stärkekleister festgeklebt ist. Ueber die Papierscheibe setzt man einen aus starkem Papier geklebten Hut (c) in Hutform, welcher (bei d) durch Bindfaden befestigt ist. Diese Vorrichtung setzt man auf ein geheiztes Sandbad, z B auf eine mit nicht zu dicker Schicht Sand bedeckte hohle Heerdplatte. Um den Tiegel herum schichtet man den Sand etwas in die Höhe, auch kann man zweckmässig in die Sandschicht einen Thermometer einsetzen. Man leitet die Erwärmung der Sandschicht so, dass ihre Temperatur zwischen 160—180° bleibt. Steigt die Temperatur erheblich über 180° hinaus, so fällt die Benzoesäure sehr stark gefärbt und bräunlich riechend aus. Nach 5 bis 6 Stunden ist die Sublimation beendet, man nimmt alsdann den Apparat vorsichtig auseinander und sammelt die in dem Papierhute befindlichen Benzoesäurekrystalle. Die über den Tiegel angebrachte Scheibe von durchlöchertertem Papier (das sog Diaphragma) hat den Zweck, das Zurückfallen von Benzoesäure-

krystallen in den Tiegel zu verhindern, andererseits aber zeigt sie den Nachtheil, dass erhebliche Mengen Benzoesäure in Dampfform oder in geschmolzenem Zustande in diese Scheibe eindringen, wodurch die Ausbeute natürlich verringert wird.

Gleichfalls für Darstellung im kleineren Massstabe empfiehlt STARTING (Arch Pharm 1889, S 410) nachstehende Anordnung. Ein Kasten von 86 cm Länge, 81 cm Breite und 31 cm Tiefe wird, wenn die Innenflächen nicht glatt gehobelt sind, mit weissem Glanzpapier ausgeklebt, Deckel und Fugen werden von aussen zugeklebt. In die Längsseite des Kastens schneidet man ein dem Sublimiergefäss genau entsprechendes, rundes Loch ein. Als Sublimiergefäss dient ein halbkugelförmiges Gefäss aus getriebenem Schwarzblech, Messing oder Kupfer von 8 cm Durchmesser und 5 cm Höhe (eine alte Waageschale). Man beschneidet dasselbe mit etwa 40 g gepulvertem und vorher getrocknetem Benzoeharz und dreht es nun etwa 1,5 cm tief in den Kasten ein. 5—8 cm über dem Sublimiergefäss ist ein auf Leisten ruhender Rahmen mit durchlöcherter Filtrpapier angebracht, um das Zurückfallen der Benzoesäure zu verhindern. Das Sublimiergefäss wird nun mittelst einer kleinen Spiritusflamme erwärmt. Nach 4—5 Stunden lässt man erkalten, entfernt das Sublimiergefäss vorsichtig, kratzt den Harzrückstand heraus und beschneidet das Gefäss mit einer neuen Menge Benzoeharz. Der Kasten wird zur Entnahme der Benzoesäure nach einer Reihe (12—15) hintereinander ausgeführter Sublimationen geöffnet. Die Ausbeute soll bis zu 25 Proc betragen. Wesentlich für die Erzielung guter Ausbeute ist, dass das Aufnahmegefäss im Verhältnisse zum Sublimiergefäss entsprechend geräumig ist.

Die von verschiedenen Operationen stammende Benzoesäure ist stets sorgfältig zu mischen, weil die einzelnen Particeen in der Regel etwas verschieden ausfallen.

Für die Herstellung grösserer Mengen von Benzoesäure sind besondere Apparate konstruirt worden (Komment HAGER FISCHER HARTWICH II Aufl Bd I, S 49), indessen benutzen auch Fabriken einfache Vorrichtungen, z B Holztonnen von 1 Meter Höhe, welche mit Papier ausgeklebt und im übrigen in ähnlicher Weise hergerichtet sind, wie dies von STARTING oben angegeben ist.

Die Rückstände von der Sublimation kann man entweder zur Gewinnung von Benzoesäure auf nassem Wege oder zur Herstellung von Räucheressenzen etc verwerten.

Eigenschaften. Die sublimirte Benzoesäure ist reine Benzoesäure, welche mit riechenden Stoffen beladen ist. Von diesen sind nachgewiesen worden Benzoesäuremethylester $C_6H_5 \cdot CO_2CH_3$, Benzoesäure-Benzylester $C_6H_5 \cdot CO_2 \cdot C_6H_5$, Vanillin $C_8H_8O_3$, Guajacol $C_6H_4(OH)OCH_3$, Brenzcatechin $C_6H_4(OH)_2$, Acetylguajacol $C_6H_4(OH)O \cdot C_2H_5O$, Benzoylguajacol $C_6H_4(OH)OC_6H_5O$ und Benzophenon $(C_6H_5)_2CO$. Sie bildet farblose bis gelbliche oder bräunlich-gelb gefärbte Nadeln oder Blättchen von angenehmem, nicht bran-

digem Geruch und aromatischem, stark kratzendem Geschmack. Wegen des Gehaltes an ätherischem Oel schmilzt das Präparat schon unter siedendem Wasser.

Prüfung. 1) Sie schmilzt auf dem Platinbleche unter Ausstossung stechend riechender Dämpfe und verbrennt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen (Ein solcher würde bestehen aus unorganischer Verunreinigung, z. B. Borsäure). Starke Verkohlung beim Erhitzen weist auf Zucker oder Weinsäure hin. — 2) In 10 Th. Chloroform sei sie löslich. Ein Rückstand konnte aus Oxalsäure, Weinsäure, Zucker, Borsäure bestehen. — 3) Man erwärmt 0,25 g Benzoesäure mit 2,5 ccm Wasser und 0,25 g Kaliumpermanganat durch Einstellen in heisses Wasser 10—15 Minuten lang. Es darf der Geruch nach Bittermandelbl. nicht auftreten, andernfalls ist Zimmtsäure zugegen. — 4) Die kalt gesättigte wässrige Lösung werde durch Eisenchlorid nicht violett gefärbt (Salicylsäure). — 5) Ob die Benzoesäure lediglich aus Harz dargestellt wurde, lässt sich nicht zweifellos feststellen. Kennzeichen für ein solches gutes Präparat sind: a) In Ammoniak löst sie sich unter Trübung und gelblicher bis bräunlicher Färbung auf. b) Schüttelt man 0,1 g Benzoesäure mit 2 ccm verdünnter Schwefelsäure an und fügt 5 ccm Kaliumpermanganatlösung (1:1000) hinzu, so muss die Flüssigkeit nach 8 Stunden entfärbt sein. c) Man übergiesst 1 g Benzoesäure mit 50 ccm Wasser und 1 ccm Normalkalilauge und lässt unter öfterem Umschütteln 15 Minuten stehen. Im Filtrat entsteht auf Zusatz eines Tropfens Ferrichloridlösung ein rosafarbiger Niederschlag, auch die über diesem stehende Flüssigkeit ist in der Regel roth gefärbt.

Aufbewahrung. Bezüglich der reinen Sorten (I—IIIa) ist nichts zu bemerken, die aus Harz sublimirte Benzoesäure IIIb werde vor Licht und ammoniakalischer Luft geschützt in gut geschlossenen Gefässen aufbewahrt.

Analyse. Man erkennt die Benzoesäure an ihren physikalischen Eigenschaften und an folgenden Reaktionen. 1) Beim Glühen mit Aetzkalk liefert sie Benzol C_6H_6 , welches durch Überföhren in Nitrobenzol gekennzeichnet werden kann. 2) Die wässrige Lösung giebt mit neutralem Ferrichlorid einen bräunlichen Niederschlag von Ferribenzoat. Durch Salzsäure wird dieser unter Abscheidung freier Benzoesäure gespalten.

Aus der wässrigen Lösung kann man die freie Benzoesäure durch Chloroform ausschütteln. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels kann die Menge der Benzoesäure durch Titriren mit Normal-Kalilauge und Phenolphthaleïn als Indikator bestimmt werden. 1 ccm Normal-Kalilauge = 0,122 g Benzoesäure.

Anwendung. Wirkt gährungs- und fäulniswidrig (bakterientödtend), auch temperaturherabsetzend. Aeusserlich wird meist Toluol-Benzoesäure verwendet und zwar in der Wundbehandlung wie Karbolsäure und Salicylsäure in 1 proc. alkoholisch-wässriger Lösung, ferner in Salben 1:10—20, in Form von Verbandstoffen. Innerlich als erregendes oder expektorirendes Mittel zu 0,1—0,5 g in Pulvern oder subkutanen Injektionen. Die Ausscheidung der Benzoesäure erfolgt durch den Urin als Hippursäure.

Die Toluol-Benzoesäure wird ähnlich wie die Salicylsäure wegen des schwierigeren Nachweises zur Konservirung von Nahrungsmitteln etc. (Bier 0,05—0,1:1000, süsse Früchte 0,5:1000,0) verwendet, doch ist die Verwendung z. B. in Frankreich untersagt.

Liquor injectorius exaltans — Rohde

Acidi benzoici	
Camphorae	5,0
Spiritus	10,0
Zur subkutanen Injektion	

Liniamentum antipsoeicum

Acidi benzoici	3,0
Benzoli	57,0
Spiritus absoluti	35,0
Glycerini	5,0

Zweimal täglich auf die Krätze-Pusteln aufzu-
pinseln. Cave Feuergefahr!

Mixtura lithentriptica — Urs

Acidi benzoici	2,0
Natrii bicarbonici	5,0
Natrii phosphorici	10,0
Aquae Cinnamonii	200,0
Tinctura Hyoscyami	10,0

Dreimal täglich einen Esslöffel bei Lithiasis,
Harngries

Pulvis pectoralis — WENDT		Trochiscus cum Acido benzoico	
Wendtsches Brustpulver		Acidi benzoici	5,0
Radices Liquiritiae	10,0	Fructus Anisi vulgaris	10,0
Rhizomatis Indis	2,0	Succa Liquiritiae pulv	20,0
Sulfuris depurati	5,0	Trigonanthae pulv	5,0
Acidi benzoici	0,5	Glycerini	
Sacchari pulverati	20,0	Aquae Rosae	aa 10,0
Olei Foeniculi		Vanillae saccharatae	0,5
Olei Anisi	aa gtt 1	Radices Liquiritiae q s	
Täglich drei- bis viermal einen Theelöffel. In		Für 100 Pastillen, die mit <i>Loganum santalinum</i>	
Älteren Vorschriften steht an Stelle der Benzoesäure <i>Resinae Benzoes</i> 2,0—3,0		rubrum zu bestreuen sind. Bei Herseizkeit (für	
		ledner und Sänger) mehrmals täglich 1—2 Stück	
		zu nehmen	
Linctura dentifricia — MILLER		Unguentum antiherpeticum acre	
Thymoli	0,25	Balsami Peruviani	5,0
Acidi benzoici	3,0	Acidi carbolici	2,5
Lincturae Eucalypti	16,0	Acidi benzoici	1,0
Spiritus	100,0	Unguenti cerei	20,0
Olei Gaultheriae	gtt 25		
(vel Olei Menthae pip. gtt 20)		Gegen Kann- und Bartflechte, Gesichtsfunnen	
Auf ein Glas Wasser = ein Theelöffel voll		Unguentum antiherpeticum leniens	
		Balsami Peruviani	5,0
		Acidi benzoici	2,5
		Unguenti cerei	25,0
		Wie die vorige Salbe zu gebrauchen	

† **Jodosbenzoesäure** $C_6H_4(CO_2H)JO$ *Acidum jodoso benzoicum* Zur Darstellung wird o-Jodbenzoesäure $C_6H_4(JCO_2H)$ in rauchender Salpetersäure gelöst, die Lösung zum Sieden erhitzt und nach dem Abkühlen mit Wasser versetzt. Die ausgeschiedene Säure wird aus Wasser umkrystallisiert. D.R.P. 68574.

Schwach gelbliche Blättchen, bei 209° unter Zersetzung schmelzend. Durch angesäuerte Kaliumjodidlösung wird unter Rückbildung von Jodbenzoesäure freies Jod abgeschieden. $C_6H_4(CO_2H)JO + 2HJ = H_2O + 2J + C_6H_4(J)CO_2H$

Vorübergehend als Jodoform-Ersatz empfohlen. Vorsichtig aufzubewahren.

Benzoesäure-Verbandstoffe a) Benzoesäure-Gaze nach BRUNS 5 Proc. 1 kg entfetteter Gaze wird getränkt mit 2500 ccm einer Lösung aus Acidi benzoici 50,0 g, Olei Ricini 20,0 g (oder Olei Ricini und Colophoni aa 10,0 g) und 2480 ccm Spiritus von 90 Proc. b) Benzoesäure-Watte nach BRUNS 5 Proc. Man bereitet eine Lösung aus Acidi benzoici 50,0 g, Olei Ricini, Colophoni aa 10,0 g, Spiritus q s, dass die Lösung 4 l beträgt und trinkt damit 1 kg entfettete Watte.

Bestimmung der Benzoesäure in Verbandstoffen. Man extrahiert in einem kleinen aus einer Glasröhre hergestellten Exkollator 5 g einer Durchschnittsprobe des Verbandstoffes mit Alkohol bis zur Erschöpfung. Alsdann fugt man zu den vereinigten Auszügen einige Tropfen Phenolphthaleinlösung und titriert mit $\frac{1}{10}$ -Normal-Kalklösung bis zur Rothfärbung. 1 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Kalklösung entspricht = 0,0123 g Benzoesäure.

Acidum boricum.

Acidum boricum (Austri Brit Germ Helv U-St) *Acide borique* (Gall) *Bor-säure*. **Acidum boracicum** *Sal sedativum* (seu narcoticum) *Homburgi*. *Acor boracicus* *Borix* (*Boracie*) *acid*. *Fleus de borax* $B(OH)_3$. Mol Gew = 62. Das officinelle Präparat wird aus dem Borax abgeschieden, die Darstellung durch Reinigung der rohen Bor-säure des Handels kann nicht empfohlen werden.

Darstellung Eine filtrirte Lösung von 10 Th Borax in 80 Th siedendem Wasser vermischt man mit 11 Th 30proc reiner Salpetersäure (spec Gew 1,185). Nach längerem Stehen der Mischung an einem kühlen Orte sammelt man die ausgeschiedenen Krystalle, wäscht sie mit eiskaltem Wasser und krystallisiert sie aus der 4fachen Menge siedendem Wasser um. — Die Mutterlauge kann nach dem Neutralisiren mit Natriumcarbonat auf rohes Natriumborat verarbeitet werden.

Eigenschaften Farblose, geruchlose, glänzende, schuppenartige, sechseckige Krystalle von schwach saurem Geschmack, welche fettig anzufühlen sind. Spec Gew = 1,48

Sie lösen sich in 25—30 Th kaltem oder 3—4 Th siedendem Wasser, auch in 20 Th Alkohol (von 90 Vol Proc) oder 5 Th Glycerin, wenig in Aether. Mit Wasserdämpfen sind sie flüchtig. Beim starken Erhitzen blähen sie sich stark auf, geben 48.65 Proc Wasser ab und schmelzen zu einem Glasfluss = Borsäureanhydrid B_2O_3 , welcher in der Hitze nicht mehr flüchtig ist. Die wässrige Lösung röthet den Lackmusfarbstoff nur un deutlich. Der saure Charakter der Borsäure tritt namentlich nach Zusatz von grösseren Mengen Glycerin in die Erscheinung, s w u, Mischungen von Borsäure mit Salicylsäure schmecken stark bitter.

Prüfung 1) 2 g Borsäure lösen sich klar in 60 ccm Wasser. 2) Diese Lösung werde durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert (Metalle, z B Blei, Kupfer), durch Ammoniak nicht blau gefärbt (Kupfer). Nach dem Ansäuern mit Salzsäure werde sie durch Ferricyankalium nicht blau und durch Rhodankalium nicht roth gefärbt (Eisen). 3) Nach dem Ansäuern mit Salpetersäure werde sie weder durch Silbernitrat (Chlor) noch durch Baryumchlorid (Schwefelsäure) getrübt. 4) Man löse 0,05 g Diphenylamin in 5 ccm konc Schwefelsäure und schütte die obige Borsäurelösung darauf. In kurzer Zeit ein tretende Blaufärbung zeigt Salpetersäure an.

Erkennung, Bestimmung. Die wässrige Lösung der freien Borsäure färbt Lackmus weinroth. Bringt man sie auf Curcumapapier, so entsteht auf diesem — selbst wenn die Lösung mit Salzsäure angesäuert war — beim Abdunsten oder Eintrocknen ein braunrother Fleck, der beim Betupfen mit Ammoniak in Schwarzblau übergeht (Charakteristisch!). Freie Borsäure färbt die nicht leuchtende Flamme grün, Borate müssen zur Erzielung dieser Flammenfärbung mit Schwefelsäure (nicht Salzsäure) befeuchtet werden. Die Lösungen der freien Borsäure in Alkohol oder Glycerin (bei Boraten ist ausserdem Zusatz von Schwefelsäure erforderlich!) brennen mit grüneskämter Flamme.

Die Bestimmung der Borsäure, wenn sie in freiem Zustande vorhanden ist, kann gewichtsanalytisch oder maassanalytisch erfolgen.

a) **Gewichtsanalytisch.** Hat man in einer Lösung nur freie Borsäure, so versetzt man diese mit einer genau gewogenen genügenden Menge geglähten Natriumcarbonats Na_2CO_3 , dampft zur Trockne und glüht den Rückstand. Das Gewicht desselben ist gleich der Menge des zugesetzten Natriumcarbonats plus dem vorhandenen Borsäureanhydrid minus der durch die Borsäure ausgetriebenen Kohlensäure. Man bestimmt alsdann die Menge der in dem Rückstande noch vorhandenen Kohlensäure, berechnet, wie viel Natriumoxyd in dem angewendeten Natriumcarbonat enthalten ist. Man addirt Gesamt-Natriumoxyd $\frac{1}{2}$ im Rückstand gefundene Kohlensäure und zieht die Summe von der zugesetzten Menge Natriumcarbonat ab. Die Differenz entspricht dem im Rückstand vorhandenen Borsäureanhydrid, B_2O_3 , welches auf Borsäure $B(OH)_3$ umzurechnen ist. Vergl. FRESSENIUS, Quant. Analyse I und II.

b) **Maassanalytisch.** Man löst etwa 0,2—0,8 g Borsäure in Wasser, fügt 40 bis 60 ccm Glycerin hinzu und titirt nach Zusatz einiger Tropfen Phenolphthalein mit $\frac{1}{10}$ Normal Natronlauge (frei von CO_2), besser noch mit $\frac{1}{10}$ -Barytlauge, bis roth. Durch weiteren Zusatz von Glycerin darf die Flüssigkeit nicht entfärbt werden s w u. 1 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal Lauge entspricht = 0,0062 g Borsäure BO_2H_3 .

Bestimmung in Verbandstoffen. 5 g Borsäure Watte oder -Gaze werden zer schnitten und in einem 500 ccm Kolben durch häufiges Umschütteln mit einer Mischung von 1 Th Glycerin und 19 Th Wasser ausgezogen und später mit der gleichen Mischung bis zur Marke aufgefüllt. 100 ccm der klar abgehobenen Lösung werden mit 40 ccm Glycerin gemischt und unter Zusatz von Phenolphthalein mit möglichst kohlenstoffreicher ($\frac{1}{10}$ -Normal Natronlauge titirt. Die Anzahl der verbrauchten Kubikcentimeter $\frac{1}{10}$ -Normal Natronlauge, mit 0,0062 multiplicirt, ergibt die Menge der in 1 g Borwatte etc. enthaltenen Borsäure $B(OH)_3$. Nach Beendigung der Titration muss auf erneuten Zusatz von Glycerin die rothe Färbung der Lösung bestehen bleiben. Verschwindet sie, so ist dies ein Anzeichen dafür, dass es bei der Titration an Glycerin fehlte. Es muss alsdann ein neuer Versuch mit grösserem Glycerin-Zusatz ausgeführt werden.

Anwendung. Borsäure wirkt stark faulniswidrig, antiseptisch, verhindert aber die Schimmelbildung nicht. Aeusserlich als Antisepticum und Desinficiens in der Wundbehandlung und Behandlung von Schleimhäuten in wässriger Lösung 2,0 — 4,0 100,0 in Salben 1,0 — 2,0 10,0, zu Einblasungen unverdünnt als Pulver. In Form von Verbandstoffen innerlich zu 0,3—1,0 g bei falschen Gährungen im Magen und einigen Infektionskrankheiten versucht. Intoxikationen können nach starken innerlichen Gaben, aber auch bei ausserlicher Anwendung durch Resorption eintreten.

Technisch. Zur Konservierung von Nahrungsmitteln, Bier, Milch, Fleisch, Fische, (auf 1 kg = 0,5—1,0 g), nicht ganz unbedenklich (s. o.) Zur Herstellung von Glasuren, Emailleflüssen, bei der Flintglasbereitung, zum Färben des Goldes, in der Galvanoplastik und Photographie, zum Tünchen der Dochte der Stearinkerzen.

ABSCHLIMMANS Schnupfpulver gegen Nasenkatarrh. Acidi borici, Naphthalin aa 25,0, Camphorae 1,0, parfümirt mit Rosen- oder Patschuli Oel.

Antibacterin, ein Einathmungs-Antisepticum. Nach AUFRECHT Acidi borici 6,25, Liquoris Ferri sesquichlorati 1,5, Spiritus Aetharis chlorati q s ad 100,0.

Antifungin (OPPFMANN), Specificum bei Diphtherie. Magnesiae ustae 1,0, Acidi borici 15,5, Aquae destillatae 75,0 [F. SCHOLZ].

Boroglycerinum, Boroglycerid, BARRÉ's preserving compound. $C_3H_5BO_2$. 62 Th Borsäure werden unter Erwärmen in 92 Th Glycerin gelöst. Durchsichtige, hygroskopische, feste Masse. Die 5procentige Lösung in der Wundbehandlung.

Vorschrift des Ergänzb. Borsäure Pulver 62 Th, Glycerin 104 Th werden verrieben und im Sandbade unter Umrühren so lange auf 150° erhitzt, bis das Gewicht = 100 Th beträgt. Die heisse Masse wird auf Glasplatten gegossen und nach dem Erkalten abgestossen.

Glyceritum Boroglycerini [U-St], 310 g Borsäure mit 460 g Glycerin in tarirter Porzellanschale nicht über 150° erhitzen, bis die Mischung 500 g wiegt, dann 500 g Glycerin zuzumischen. Die 10procentige Lösung zur Wundbehandlung.

Borol, Konservierungsmittel und Antisepticum. Geschmolzenes Gemisch von Borsäure und Natriumbisulfat (WAURIOL).

Borsalyl, Antisepticum. Gemenge von 25 g Borsäure und 32 g Natriumstearolat (WAURIOL).

Cinol. Ein Haarspiritus, nach AUFRECHT Spiritus 35,0, Glycerin 5,0, Borsäure 0,5, Wasser 60,0, Parfum ad libitum.

Glacialin, Konservierungsmittel für Fleisch und Milch. Lösung von 9 Th Borax, 18 Th Borsäure, 6 Th Zucker, 9 Th Glycerin und 400 Th Wasser.

Listerine (amark-engl. Desinf.-Mittel). Ol Eucalypti, Ol Wintergreen, Menthol, Thymol aa 0,5 g, Acidi borici 15,0, Spiritus 135,0 Aquae q s ad 1 Liter. Tscheppo, Pharm. Ztg 1894, 118).

Listerine-LAMBERT. Acidi borici 20 (solve in aqua), Acidi benzoici 15,0, Thymol 5,0, Eucalyptoli gtt 5, Olei Gaultheriae gtt 5, Olei Menthae gtt 3, Ol Thymi gtt 1, Alcohol 100, Aquae q s ad 500 g (Pharm. Ztg 1895, 621).

WICKERSHEIM'S Konservierungsflüssigkeit für Nahrungsmittel. Borsäure 50 g, Kochsalz 20 g, Salicylsäure 7,5 g, Glycerin 250 g, Wasser q s ad 1 Liter.

Glybolid. Eine Pasta aus 2 Th Glycerin, 1 Th Borsäure, 1 Th Acetanilid hergestellt. Bei Pusteln, Abscessen etc.

Borolid. Mischung aus gleichen Theilen Borsäure und Acetanilid. Bei Eczemen. **Konserve-Salz.** Kochsalz 5 Th, Kalisalpeter 3 Th, Borsäure 2 Th. Auf 1 kg Fleisch = 1 g der Mischung.

Borsäure	Watte	5%	10%	20%
Rp Acidi borici		75,0	150,0	300,0
Aquae fervidae		2850,0	2850,0	2700,0
Gossypii depurati		1000,0	1000,0	1000,0
Fuchsin		—	—	0,2

Man presst bei jeder Vorschrift bis auf 3000 g ab,
s. Ligamenta

Borsäure	Lint	5%
Rp Acidi borici		50,0
Aquae fervidae		1000,0
Spiritus (90%)		500,0
Lint		1000,0

Ohne abzupressen trocknen

Unguentum Acidi borici LISTERI (Original-Vorschrift)

Rp Acidi borici	
Cerae albae	aa 5,0
Olei Amygdalarum	
Paraffini solidi	aa 10,0

Unguentum Acidi borici LISTERI. (Badische Taxe)

I p Acidi borici plur.	
Olei Amygdalarum	
Cerae albae	aa 10,0
Lanolini	30,0

Lanolinum boricum in bacillis		Gaze borique 10% (Gall)	
Rp	Sebi benzoinati 80,0	Rp	Acidi borici plv 1000,0
	Lanolini 60,0		Tirobinthi venetus 100,0
	Acidi borici plv 10,0		Spiritus 90% 18,0 kg
In Stangen gießen und in Metallbüchsen mit verschiebbarem Boden abgeben		1 kg Gaze soll von dieser Lösung 2,4 kg auf nehmen also nach dem Abpressen 0,2 kg wiegen	
Lanolimentum Boroglycerini (Badische Taxe)		Pasta aseptica (Form Borol)	
Rp	Olei Olivarum 5,0	Rp	Acidi salicylici 0,5
	Lanolini 20,0		Acidi borici 5,0
	Ungt Paraffini 65,0		Zinci oxydati 10,0
	Boroglycerini 5,0		Vaseline american 81,5
	Glycerini 5,0		Vaseline boriqué (Gall)
Zu 50 g der schaumig geführten Salbe 1 Tropfen Rosenöl		Rp	Acidi borici 1,0
			Vaseline 9,0
Lanolimentum Boroglycerini Wollfett-Boroglycerin (Ligb)		Ungt acidi borici (Germ, U St)	
Rp	(1) Acidi borici 20,0	Unguentum boricum (Helv)	
	(2) Glycerini 100,0	Germ u Helv U St	
	(3) Aquae destillatae 50,0	Acidi borici	1 1
	(4) Adipis laeae anhydr 500,0	Ungt Paraffini	9 6
	(5) Olei Olivarum 130,0	Unguentum acidi borici extensum	
Es werden 1, 2 u 3 bis zur Lösung erwärmt und mit 4 u 5 zur weichen Salbe verarbeitet		Ber-Salbenmull (Diet M)	
		Rp	Sebi benzoinati 70,0
			Adipis benzoinati 20,0
			Acidi borici sub plv 10,0
Borsäure Gaze 10%		Unguentum contra combustiones	
Rp	Acidi borici 120,0	Prof Dr SCHWIMMER'S Brandsalbe	
	Aquae fervidae 1880,0	Rp	Acidi borici 5,0
	Gaze hydrophila (22—25 m) 1000,0		Zinci oxydati 10,0
Tränken und auf 2250,0 abpressen			Adipis 85,0

Acidum camphoricum.

Acidum camphoricum Kampfersäure (Germ). Rechts-Kampfersäure. Gewöhnliche Kampfersäure. Kamphylsäure. Acide camphorique. Camphoric acid. $C_{10}H_{10}O_4$. Mol Gew = 200 Zweibasische Säure = $C_6H_4(CO_2H)_2$

Darstellung Man wählt Stehkolben oder Rundkolben mit engem Halse von etwa 4 Liter Fassungsraum aus und bringt in jeden derselben 150 g Kampher sowie 2 Liter Salpetersäure von 1,27 spec Gewicht. In den Hals eines jeden Kolbens kittet man mit Hilfe von Gips bei C ein Glasrohr ein von 1,6 bis 2 m Länge und etwa 0,75 bis 1 cm lichter Weite¹⁾ Das obere Ende des Rohres wird rechtwinklig umgebogen, um es bei D direkt in einen Abzug, bez ins Freie einmünden zu lassen.

Den so vorbereiteten Kolben B bringt man auf ein Wasserbad A und erhält dieses in lebhaftem Sieden. Die Einwirkung der Salpetersäure auf den geschmolzenen Kampher zeigt sich in reichlicher Entwicklung von braunen Dämpfen (Untersalpetersäure, Stickstoffdioxid NO_2), welche durch den Rauchfang bez ins Freie entweichen, während die gleich zeitig verdampfende Salpetersäure in dem als Luftkühler bez Rückflusskühler wirkenden Glasrohr verdichtet wird und wieder in den Kolben zurückfließt. — Sobald die Dämpfe in dem Kühlrohr nur noch wenig gefärbt sind, kann man das Erhitzen einstellen. Für die oben angegebenen Gewichtsmengen ist etwa 50ständiges Erhitzen erforderlich.

Nach völligem Erkalten sammelt man die in der Salpetersäure ausgeschiedenen Krystalle von Kampfersäure, indem man die Flüssigkeit durch einen Trichter giesst, in dessen Grund ein Bäusch'sches Asbest oder Glaswolle gedrückt ist. [Das Filtrat destilliert man bis auf etwa $\frac{1}{3}$ ab. Scheiden sich aus demselben nach dem Erkalten noch Krystalle ab, so vereint man diese mit der ersten Ausscheidung. Die überdestillierte Salpetersäure kann zu technischen Zwecken verwendet werden.]

¹⁾ Noch zweckmäßiger ist es, entsprechende Kühlröhren an Kolben anschleifen zu lassen (s. Fig. 4)

Die gewonnenen Krystalle übergießt man mit der 5fachen Menge Wasser, erhitzt und fügt soviel Natriumcarbonat hinzu, dass Auflösung erfolgt, und die Flüssigkeit schwach alkalisch reagiert. Man filtrirt und lässt krystallisiren. Die erhaltenen Krystalle von Kampfersaurem Natrium löst man in der 10fachen Menge Wasser auf, zersetzt durch einen Ueberschuss von Salzsäure, lässt krystallisiren und reingt die erhaltenen Krystalle durch Umkrystallisiren, wenn nöthig unter Zusatz von Thierkohle.

Eigenschaften Farb und geruchlose Krystallblättchen oder ein krystallinisches Pulver, beim Kauen zwischen den Zähnen knirschend, von säuerlichem, hinten nach bitterlichem Geschmack. Die reine Säure schmilzt bei $186-187^{\circ}$, Garm giebt als Schmelz-P $178-180^{\circ}$ an. Verflüchtigt sich beim weiteren Erhitzen unter Spaltung in Kampfersäure Anhydrid und Wasser. Löslich in 140 Th Wasser von 15° oder in 8 Th siedendem Wasser, feiner in 1,3 Th Weingeist, in 1,8 Th Aether oder in 1000 Th Chloroform. Die wässrige Lösung rüthet Lackmusfarbstoff. Von kohlensauren und atzenden Basen wird die übrigens zweibasische Kampfersäure reichlich aufgenommen unter Bildung der entsprechenden Salze, welche „Kampferate“ heissen. 1 cem Normal Kalilauge sättigt $= 0,1$ g Kampfersäure. An charakteristischen Reaktionen ist die Kampfersäure arm. Die mit Natriumcarbonat bis zur schwachsauren Reaktion abgestumpfte wässrige Lösung giebt 1) mit Calciumchlorid, Bariumchlorid oder Quecksilberchlorid keine Fällung. 2) Mit Silbernitrat in hinreichend concentrirter Flüssigkeit einen weissen, körnigen Niederschlag, in viel Wasser, auch in Ammoniak löslich. 3) Mit Ferrichlorid einen lehmfarbigen Niederschlag. 4) Mit Kupfersulfat auch in starker Verdünnung hellblauen, gallertartigen Niederschlag.


Prüfung. 1) Sie sei geruchlos, rieche also nicht nach Kampher. 2) Der Schmelzpunkt, welcher bei Gegenwart von Kampferonsäure herabgedrückt wird, liege nicht unter 180° . 3) Die kaltgesättigte Lösung werde weder durch Bariumnitrat noch durch Silbernitrat getrübt (Schwefelsäure, Salzsäure). 4) Mischt man 2 cem der kaltgesättigten Lösung mit 2 cem concentrirter Schwefelsäure und schichtet darauf 1 cem Ferrisulfatlösung, so darf eine braune Zone nicht auftreten (Salpetersäure). 5) 1 g Kampfersäure soll 10 cem Normal Kalilauge sättigen.

Aufbewahrung In gut geschlossenen Gefäßen.

Anwendung Aeusserlich als mildes, leicht exsiccirendes und desinfectirendes Adstringens bei Entzündungen des Pharynx, Larynx und der Nase, bei Geschwüren, Pusteln und chronischer Urticaria, bei pathologischen Schweissen. Man wendet bei akuten Affektionen Lösungen von 0,5–2 Proc, bei chronischen von 8–15 Proc an. Wenn es nöthig ist, bereitet man die Lösungen unter Zusatz von Weingeist. Für je 1 Proc Kampfersäure lässt man 11 Proc Weingeist (90 Vol Proc) zusetzen. Innerlich zu 1–3–5 g in Obalatempulvern gegen die nächtlichen Schweisse der Phthisiker. Man giebt das Mittel etwa 2 Stunden, bevor der Schweiß gewöhnlich zum Ausbruch kommt.

Acidum camphoricum anhydricum Kampfersäure-Anhydrid, $C_{10}H_{14} < \begin{smallmatrix} CO \\ CO \end{smallmatrix} > O$ $= 182$, wird erhalten, wenn man Kampfersäure der Sublimation unterwirft. Farblose Krystallnadeln, Schmelzpunkt $216-217^{\circ}$, Siedepunkt oberhalb 270° . Wird von siedendem Wasser langsam wieder in Kampfersäure verwandelt.

Kallium camphoricum Kaliumkampferat. Kampfersaures Kalium $C_{10}H_{14}O_4K$ $= 276$. Wird durch Neutralisiren einer alkoholischen Lösung von 20 Th Kampfersäure



mit einer alkoholischen Lösung von 11,2 Th Kalumhydroxyd und Eindampfen bis zur Trockne erhalten. In trockenem Zustande eine farblose, krystallinische Masse, gewöhnlich in Folge Anziehung von Wasser ein dicker Syrup. In Wasser leicht löslich, aus diesem Grunde bisweilen an Stelle der schwer löslichen Kampfersäure verwendet.

† **Anilinum camphoricum** Kampfersaures Anilin $C_6H_5O_4(C_6H_5NH_2)_2 = 386$
Zur Darstellung trägt man in 46,5 Th Anilin (für Blau), welche im Wasserbade erhitzt sind, 50 Th Campfersäure ein. Sobald Auflösung der letzteren erfolgt ist, giesst man die Mischung in flache Gefässe und setzt sie in dünner Schicht niedriger Temperatur aus, worauf Krystallisation erfolgt.

Krystallinische Massen, in 30 Th Wasser löslich, leicht löslich in Alkohol und in Aether, löslich auch in 10 Th Glycerin, diese Lösung kann mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt werden, ohne dass Ausscheidung oder Zersetzung erfolgt. Chloroform und Schwefelkohlenstoff lösen nur das Anilin heraus, während krystallinische Kampfersäure zurückbleibt. — Vor Licht geschützt vorsichtig aufzubewahren.

In Gaben von 0,1–0,2 g als Antispasmodicum. Als *dosis maxima pro die* würden 1,0 g anzunehmen sein.


Acidum carbolicum.

I † **Acidum carbolicum** (Austr. Brit. Germ. U-St.) **Phénol** (Gall.), **Phenolum** (Helv.) **Phenylsäure**, **Phenylalkohol**, **Steinkohlen Kreosot**, **Acide phénique**, **Phenic acid**, **Carbolic acid**, **Salicon**, **Salicol** C_6H_5OH . Mol. Gew. = 94.

Die Preislisten der Drogisten führen folgende wichtigeren Sorten auf: 1) *Acidum carbolicum cryst.* Schm.-P. 35–37 2) *Acidum carbolicum cryst.* Schm.-P. 40–41°, dieses Präparat heisst *Phenolum absolutum*, falls es in lose Krystalle gebracht ist. 3) *Acidum carbolicum cryst.* Ph. G. III Schm.-P. 40–42° 4) *Acidum carbolicum synthet.* Schm.-P. 40 bis 42°. Ausserdem noch 10the Karbolsäure.

Darstellung. Die Karbolsäure oder das „Phenol par excellence“ bildet neben höheren Phenolen (Kresolen, Xylenolen etc.) den Hauptbestandtheil der zwischen 140 und 220° siedenden Fraktion des Steinkohlentheers. Zur Abscheidung der Karbolsäure wird diese Fraktion mit Natronlauge behandelt, wodurch die Phenole in Lösung übergeführt werden, während die Kohlenwasserstoffe ungelöst bleiben. Aus der alkalischen Lösung werden die Phenole durch Ansäuern mit Salzsäure abgeschieden.¹⁾ Von den homologen Phenolen trennt man sie dadurch, dass das Phenolgemisch mit zur völligen Auflösung unzureichenden Mengen von Natronlauge behandelt wird. Unter diesen Umständen verbindet sich zuerst das Phenol (als stärkere Säure) mit dem Natronhydrat, die Kresole und Xylenole bleiben ungelöst. Die weitere Reinigung des aus der alkalischen Lösung durch Säuren abgeschiedenen Phenolgemisches erfolgt durch wiederholte fraktionirte Destillation, durch Krystallisation mit nachfolgendem Abschleudern oder Abpressen der Krystalle.

Die synthetische Karbolsäure wird in der Weise dargestellt, dass Benzol durch Einwirkung von Schwefelsäure zunächst in Benzolsulfosäure, und diese durch Schmelzen mit Kalihydrat in Phenolkalium




übergeführt wird, aus der Lösung des letzteren wird auf Zusatz von Säuren Karbolsäure ausgefällt.

Eigenschaften. Die reinste Karbolsäure ist die synthetisch gewonnene. Sie stellt farblose, eigenartig riechende Krystalle dar, schmilzt, völlig über Schwefelsäure getrocknet, bei 42° C und siedet bei 182–183°, die Dämpfe sind leicht entzündlich. Das spec. Gew. ist bei 15° C = 1,066. Sie löst sich bei 15° C in 15 Th Wasser, sie löst sich ferner leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Glycerin, fetten und ätherischen Ölen. In Petroläther ist sie in der Kälte fast unlöslich, in der Wärme leichter

¹⁾ Die in diesem oder in einem späteren Stadium gewonnene Säure wurde früher als „Rohe Karbolsäure“ bezeichnet.

löslich In Substanz oder konc Lösung ätzt sie Haut und Schleimhäute Unter dem Einfluss von Luft und Licht nimmt sie leicht röthliche Färbung an

Manche Pharmakopöen schreiben nicht völlig reine Karbolsäure vor, sondern lassen mehr oder weniger kresolhaltige Präparate zu Je mehr Kresole eine Karbolsäure enthält, desto mehr wird ihr Schmelzpunkt erniedrigt, der Siedepunkt aber erhöht, und desto mehr sinkt die Löslichkeit in Wasser Dies Verhalten giebt Aufschluss darüber, welche Präparate die einzelnen Pharmakopöen verlangen Es schreiben vor Brit Schm-P nicht unter 18,8° U-St Schm-P nicht unter 35°, löslich in etwa 15 Th Wasser Anstr Schm-P 37—40°, löslich in etwa 15 Th Wasser Germ Schm-P 40—42° Gall u Helv Schm-P 42° Die Karbolsäure hat die Formel C_6H_5OH Mol-Gew = 94



Karbolsäure (Phenol)

Durch Aetzkalk (KOH, NaOH), auch durch Ammoniak, wird Karbolsäure unter Bildung von „Phenolaten“ gelöst Metallen gegenüber spielt die Karbolsäure die Rolle einer schwachen einbasischen Säure Die von ihr sich ableitenden Salze heissen „Phenolate“ und haben die Formel C_6H_5OM — Roth gewordene Karbolsäure tauscht man entweder beim Drogeristen um oder reinigt sie durch Destillation aus Glasgefäßen Löst man roth gewordene Karbolsäure in Wasser, so lässt sich durch Filtration, welche den in Wasser unlöslichen Farbstoff zurückhält, eine farblose Lösung erzielen

Prüfung. Diese kann sich beschränken auf die Prüfung des äusseren Aussehens (Farblosigkeit), Abwesenheit unangenehmen Geruches, die Feststellung des Schmelzpunktes, wobei die Substanz vorher über Schwefelsäure zu trocknen ist, des Siedepunktes und der Löslichkeit in Wasser unter genauer Einhaltung der vorgeschriebenen Temperatur Allenfalls wäre noch die völlige Flüchtigkeit beim Verhiessen nachzuweisen

Erkennung und Bestimmung. Die wässrige Lösung zeigt folgende Reaktionen 1) Mit wenig (1) Eisenchloridlösung versetzt nimmt sie blauviolette Färbung an, die durch Salzsäure in Gelb übergeht (in der alkoholischen Lösung tritt die Violettfärbung erst nach dem Verdünnen mit Wasser auf) 2) Lässt man zu der ammoniakalischen Lösung unter Umschütteln Bromdampf zufließen, so nimmt sie lasurblaue Färbung an (LIEBERMANN) 3) Auf Zusatz von MILLON'S Reagens entsteht (in verdünnten Lösungen beim Erwärmen) kirschrothe Färbung 4) Durch Zusatz von Bromwasser im Ueberschuss entsteht krystallinischer Niederschlag von Tribromphenol $C_6H_2Br_3OH$

Die Bestimmung kann a) gewichtsanalytisch, b) maassanalytisch ausgeführt werden

A) Gewichts-analytisch Man versetzt die 0,1—0,2 Phenol enthaltende wässrige Lösung unter Umrühren mit frisch bereitetem Bromwasser bis zur deutlichen Gelbfärbung und lässt 4—5 Stunden zum Absetzen an einem kühlen Orte stehen Dann filtrirt man durch ein gewogenes Filter, wäscht bis zur Neutralität mit Wasser und trocknet bei 80° C Das erhaltene Gewicht giebt mit 0,2889 multipliziert die vorhandene Karbolsäure an Das Resultat fällt ein wenig zu hoch aus, weil mit dem Tribromphenol stets etwas Tribromphenolbrom $C_6H_2Br_3OBr$ ausfällt Dieser Fehler kann jedoch in den meisten Fällen vernachlässigt werden

B) Maass-analytisch Man bedarf folgender Lösungen a) 6,0 g reines getrocknetes Kaliumbromid (KBr) werden in Wasser zu 1 Liter gelöst b) 1,67 g reines getrocknetes Kaliumbromat ($KBrO_3$) werden in Wasser zu 1 Liter gelöst Mischt man von beiden Lösungen je 50 ccm und säuert mit 5 ccm conc Schwefelsäure an, so werden nach der Gleichung $5KBr + KBrO_3 + 3H_2SO_4 = 3H_2O + 3K_2SO_4 + 3Br_2$ = 0,240 g Brom in Freiheit gesetzt, welche nach der Gleichung $C_6H_5OH + 3Br_2 = 3HBr + C_6H_2Br_3OH$ die Menge von 0,047 g Phenol zu binden vermögen

Man stellt zunächst den Wirkungswerth der Titrlösungen fest, indem man 50 ccm Kaliumbromidlösung, 50 ccm Kaliumbromatlösung und 2 g reines Kaliumjodid vermischt, die Lösung mit 5 ccm conc Schwefelsäure ansäuert und das ausgeschiedene Jod unter Zusatz von Stärkelösung mit $\frac{1}{10}$ Natriumthiosulfatlösung titrirt 1 ccm $\frac{1}{10}$ Natriumthiosulfatlösung entspricht = 0,0127 g Jod oder 0,008 g Brom Man wird daher für obige Mengen (50 ccm KBr Lösung und 50 ccm $KBrO_3$ -Lösung) = 80 ccm $\frac{1}{10}$ Natriumthiosulfatlösung verbräuchen

Zur Ausführung der Bestimmung stellt man sich eine Lösung dar, welche im Liter etwa 1 g des zu untersuchenden Phenols enthält Hiervon bringt man 30—50 ccm in eine

etwa 250 ccm fassende Flasche mit Glasstopfen, lässt 50 ccm Kalumbromidlösung, 50 ccm Kalumbromatlösung zufließen, mischt, giebt 5 ccm conc Schwefelsäure zu und mischt wiederum nach Ansetzen des Glasstopfens. Nach 15 Minuten fügt man 2 g Kalumjodid hinzu und titirt das ausgeschiedene Jod unter Zusatz von Stärkelösung mit $\frac{1}{10}$ Normal Natriumthiosulfatlösung. Dieser Methode hatet die Fehlerquelle in Folge Bildung von Tribromphenolbrom nicht an. [Beckurts]

Beispiel. Die Natriumthiosulfatlösung ist $\frac{1}{10}$ -normal 1 ccm derselben, entspricht daher 0,008 g Brom oder — da 6 Mol Brom (480) von 1 Mol Phenol (94) beansprucht werden — = 0,00156 g Phenol. 50 ccm Kalumbromidlösung + 50 ccm Kalumbromatlösung + 2 g Kalumjodid + 5 ccm conc Schwefelsäure brauchen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods = 80 ccm $\frac{n}{10}$ Natriumthiosulfatlösung, d. h. 80 ccm $\frac{n}{10}$ Natriumthiosulfatlösung binden 0,240 g Brom, welche mit 0,047 g Phenol in Reaktion zu treten vermögen.

Angenommen, man hätte 50 ccm der vorbereiteten Phenollösung 1:1000 (s. oben) mit 50 ccm Kalumbromidlösung, 50 ccm Kalumbromatlösung gemischt und 2 g Kalumjodid hinzugefügt und mit 5 ccm conc Schwefelsäure angestaut. Nach Zusatz von etwa Stärkelösung sollen 7,5 ccm $\frac{n}{10}$ -Natriumthiosulfat bis zur eintretenden Farblosigkeit verbraucht werden. Es ist also eine der 7,5 ccm $\frac{n}{10}$ Natriumthiosulfat entsprechende Menge

Brom nicht an Phenol gebunden worden. Ware genau alles Brom verbraucht worden, so würde dies eine absolute Menge von 0,047 g Phenol anzeigen. Den 7,5 ccm $\frac{n}{10}$ Natriumthiosulfatlösung entsprechen aber 0,06 g Brom oder $(7,5 \times 0,00156 \text{ g}) = 0,0117 \text{ g}$ Phenol. Die zur Bestimmung benutzten 50 ccm Phenollösung enthalten daher 0,047 g minus 0,0117 g = 0,0353 g Phenol. In dem ganzen Liter Phenollösung wurden daher $20 \times 0,0353 = 0,706 \text{ g}$ Phenol enthalten sein, und da 1 g des Phenolpräparats zu 1000 ccm aufgelöst worden war, so enthält das ursprüngliche Phenolpräparat 70,6 Proc Phenol.

Karbonsäure-Bestimmung in Verbandstoffen. Man bringt 10 g einer Durchschnittsprobe in einen $\frac{1}{2}$ -Liter-Kolben, übergiesst mit 400 ccm heissem destillirtem Wasser, extrahirt durch häufiges Umschütteln und füllt nach dem Erkalten auf 500 ccm auf. Von dieser Lösung bringt man bei 5 proc Verbandstoff = 50 ccm, bei 10 proc = 25 ccm in ein Glasstopfen Gefäss von $\frac{1}{4}$ l, fügt je 50 ccm Kalumbromid- und Kalumbromatlösung, sowie 5 ccm conc Schwefelsäure hinzu und lässt die Mischung nach dem Umschwenken 15 Minuten verschlossen stehen. Hierauf setzt man 10 ccm Kalumjodidlösung 1:10 hinzu und titirt das ausgeschiedene Jod mit $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung. — Zieht man für jeden verbrauchten ccm $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung 0,00156 g von 0,047 g ab, so bedeutet der verbleibende Rest die Menge Phenol, welche in den angewendeten ccm Phenollösung vorhanden ist.

Zum Nachweis des Phenol in Leichentheilen, Harn etc. destillirt man diese nach dem Ansäuern mit Weinsäure im Wasserdampfstrom ab. Das Destillat wird mit Aether ausgeschüttelt, das nach dem freiwilligen Verdunsten des letzteren hinterbleibende Phenol wird über Schwefelsäure getrocknet und gewogen. Oder man bestimmt, falls Fäulnissbasen ausgeschlossen sind, das Phenol im Destillate maassanalytisch nach B. Findet man in Leichentheilen Karbonsäure in geringen Mengen, so darf man nicht ansetzen, dass Phenole sich stets bei der Fäulniss von Erweiss (Fleisch) bilden, dass also diese geringen Mengen ebensogut lediglich durch Fäulniss entstanden sein können.

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, vorsichtig. (Aust. Germ. Helv.)

Anwendung. Karbonsäure wirkt faulnisswidrig, gährungshemmend. In Substanz oder conc Lösung ätzt sie Haut und Schleimhäute stark. Die betroffenen Partheen werden weiss, unempfindlich und stossen sich später wie Brandsohle ab. Innerlich bei abnormen Gährungserscheinungen im Magen und Darm, bei Diabetes in Lösung oder Pillen. (Einsige Einzelgabe 0,1 g, grösste Tagesgabe 0,5 g. (Aust. Germ. Helv.) Ausserlich in den mannigfachsten Formen bei der Wundbehandlung. Als Verbandwasser die 3 procentige, zur Desinfektion der Hände und Instrumente 5 procentige wässrige Lösung. Lösungen in Oel sind wenig wirksam. — Ist zufällig conc Karbonsäure auf die Haut gelangt, so wäscht man sie zunächst mit einem Stück Filtrirpapier oder dergl. trocken weg, und wäscht als dann die Stelle mit Alkohol nach.

Karbonsäure ist innerlich genommen ein heftiges Gift, wirkt auf das Centralnervensystem und tötet durch Respirationslähmung Intoxikationen können auch durch Resorption von Wundflächen oder Schleimhäuten aus erfolgen Die Ausscheidung erfolgt zumeist als Phenylschwefelsäure $C_6H_5SO_3H$ Der Harn nimmt tintenartige Färbung an Gegenmittel bei Karbonsäurevergiftung sind Zuckerkalk oder Natriumsulfat

Technisch. Bei der Fabrikation der Damsaiten, des Lemes, der Salicylsäure, vieler Farbstoffe und anderer organischen Präparate (Pikrinsäure) benutzt

II † Acidum carbolicum liquefactum (Austri Brit Germ) **Phenolum liquefactum** (Helv) Verflüssigte oder zerflossene Karbonsäure Eine Recepturerleichterung, welche durch Vermischen von geschmolzener Karbonsäure mit etwa 10 Proc Wasser dargestellt wird Es schreiben vor 1 Th Wasser auf 10 Th Karbonsäure Austri Germ Brit 1 Th Wasser auf 9 Th Karbonsäure Helv Farblose oder gelblich-rothliche Flüssigkeit Spec Gew 1,064—1,067 (Brit) bez 1,068—1,069 (Germ) Feststellung des Gehaltes an Phenol kann gewichts oder maassanalytisch erfolgen s oben Empirisch in folgender Weise 10 cem dürfen, nach Zusatz von 2,8 cem Wasser, nicht bleibend getrübt werden, sollen aber nach weiterem Zusatz von 8—10 Tropfen Wasser, eine trübe Mischung geben, welche mit nicht weniger als 185 und mit nicht mehr als 140 cem Wasser eine klare Flüssigkeit geben muss Die zu verwendenden Flüssigkeiten müssen durchweg eine Temperatur von 15° C haben (Zeigt an, dass der Phenolgehalt des Präparates richtig und dass das zur Herstellung benutzte Phenol nicht kresolhaltig ist)

Die Verflüssigung bez das Flüssigbleiben beruht auf der Bildung eines Hydrates $C_6H_5OH + \frac{1}{2}H_2O$ Vorsichtig aufzubewahren (Austri Germ Helv) Unter 10° kann theilweises Erstarren der Flüssigkeit erfolgen

III † Acidum carbolicum crudum Rohe Karbonsäure Da die unter diesem Namen im Handel befindlichen Rohprodukte zur Zeit nicht Phenol, sondern Kresol als wirksamen Bestandtheil enthalten, so vergl man hierüber unter Kresolum

IV. Karbolwasser Zum Desinfectiren der Instrumente etc benutzt man 5 procentige, zur Desinfection von Wunden bez als Verbandwasser 3 procentige Lösungen Das Karbolwasser der Pharmakopöen ist von verschiedener Stärke Austri u Germ *Aqua carbolisata* = 3 Proc Helv *Aqua phenolata* = 5 Proc Gall *Soluté d'acide phénique* a) zum innerlichen Gebrauch 0,1 Proc, b) zum äusserlichen Gebrauch = 2 Proc

Antisepticum universale, MÜLLER's Karbonsäure 3 Tropfen, Essigäther 10 Tropfen, Wasser 180,0 (HAGER)

Carbolised resin FLEISCHER (zahnärztl Specialität), 100 Kopallack mit 30 Karbonsäure **Karbonsäure-Pastillen**, RADLMANN's D R P 44528 Kryet Karbonsäure 9 Th, Borsäure 1 Th werden zu Pastillen verarbeitet Nach einem neueren Patent sollen Carbol säuredämpfe über erwärmte Borsäure geleitet werden Die verdichteten Dämpfe werden zu Pastillen verarbeitet

Karbonsäure Pastillen, SALZMANN's Man schmilzt 95 Th Karbonsäure, mischt 5 Th gepulverte Stearinsäure darunter, rührt bis zum Erkalten und formt die Masse in Pastillen

Phenolsalyli-Christus Karbonsäure 9,0, Salicylsäure 1,0, Milchsäure 2,0, Menthol 0,1 Die zusammengeschmolzene Masse löst sich in 25 Th Wasser, leichter in Glycerin

Vulnical GRUNDMANN (Vorschrift des Fabrikanten) Tinct Benzoes comp Tinct Myrrhae aa 75,0, Ungt Paraffini, Ungt Vaselin comp aa 300,0, Cerati Cetacei, Lanolin aa 100,0, Acidi borici, Zinci oxydati aa 40,0, Acidi carbolici 12,5, Liq Aluminii acetici, Camphorae aa 7,5, Adipis 360,0

Acetum carbolisatum	
Karbol-Blucheressig	
Rp Acidi carbolici	5,0
Aquae Coliculae	5,0
Aceti 3%	90,0

20—30 g werden auf Tellern durch schwaches Erwärmen verdunstet

Acetum carbolisatum (Lrx, Ansb)	
Rp Acidi carbolici	4,0
Aceti	96,0

Acetum hygienicum	
Antiseptischer Gesundheitessig von Apotheker Dr Kopp Strassburg	
Rp Acidi carbolici puri	10,0
Acidi salicylici	2,0
Acidi aceticii glacialis	6,0
Vinagre de Bully	100,0
Menthol	1,0

Nach Karlsruher Ortsgesundheitsrath einen 3 procentige Lösung von Thymol in Alkohol und verdünnter Essigsäure

Acidum carbolicum camphoratum

Rp Acidi carbolici 10,0
Camphorae 30,0

Unter schwachem Erwärmen zusammenzureiben
Durchsichtige, farblose, später rüthliche Masse,
sp G 0,90 Gegen Wundrose [SCHNEELOW]

Acidum acetium carbolisatum

Karbol-Essigsäure

Rp Acidi carbolici 10,0
Acidi acetici diluti (30%) 85,0
Olei Eucalypti 5,0

Zum Räuchern in Krankenzimmern

Aether carbolisatus

Rp Acidi carbolici 0,5
Aetheris 50,0

Zum Einblasen bei Katarrh der Tuba Eustachii

Aqua dentifricia carbolikata

Rp Acidi carbolici 2,0
Tincturae Quillajae 20,0
Olei Menthae pip gtt VIII
Aqua destillatae 180,0

Karbol-Mundwasser, gegen Caries

Bacilli Acidi carbolici (Nasenbougies)

Rp Acidi carbolici 2,0
Glycerini 80,
Massae Gelatinae albae 55,0
Aqua 5,0

sant bacilli No 15

Balsamum otalgicum

Ohren-Balsam

Rp Acidi carbolici liquefacti gtt X
Olei Succini rectificati gtt V
Olei Hyoscyami 5,0
Olei Olivarum 80,0

Bei Ohrenzwang, Ohrengeschwür täglich 1—2 mal
3—4 Tropfen in den Gehörgang zu träufeln

Candelae carbolisatae

Karbol-Kerzen

Rp Carbonis Thilae 830,0
Solutionis Kali nitrici 50,0 1000,0
Tragacanthae pulveratae 20,0
Acidi carbolici 100,0
Olei Wintergreen 1,0

Die mit der Salpeterlösung getränkte Kohle wird
getrocknet, darauf mit den übrigen Substanzen
gemischt und die Mischung mit Tragant schleim,
der 2 Proc Kalisalpeter enthält, zur Masse an-
gestossen. [Diet M]

Collemplastrum carbolisatum (Diet M)

Rp Massae Collemplastri 800,0
Rhizom Iridis plv M/50 80,0
Sandalac. plv 20,0
Acidi carbolici 88,0
Olei resinae 15,0
Aether 150,0

Bereitung s Collemplastrum

Colloidum Acidi carbolici

Rp Acidi carbolici cryst
Colloidi aa 5,0

Sehr ätzende Masse, auf Baumwolle in den schmer-
zenden carösen Zahn zu bringen

Emplastrum carbolisatum

[PINTSCHOVICUS]

Rp Ceres albae 4,0
Colophoni
Olei Olivarum aa 2,0
Acidi carbolici 5,0

Auf Leinwand gestrichen bei Lupus

Gelatina carbolisata. [Diet M]

Rp Gelatinae albae 80,0
Aqua 64,0

Quellen lassen, im Dampfbade erhitzen, einsetzen
Glycerini 5,0
Acidi carbolici 1,0

Glyceritum Acidi carbolici (U St)

Rp Acidi carbolici 30,0
Glycerini 80,0

Glycerinum Acidi carbolici (Brit)

besteht aus 1 Gew Th Carbonsäure u 4 Vol Glycerin

Linalmentum carbolisatum

Rp Acidi carbolici 1—2,0
Olei Olivarum
Aqua calca aa 50,0

Gegen Wundsein der Kinder

Liquor antipityriasis LEMAIR

Rp Acidi carbolici 5,0
Acidi acetici diluti 300,0

Damit getränkte Kompressen auf die Kopfgrund-
stellen auflegen

Liquor injectorius LIGER

Rp Acidi carbolici 5,0
Aqua destillatae 100,0

Zum Ausspritzen von Wunden

Liquor antisepticus MARIETTA

Rp Acidi carbolici puri 5,0
Acidi acetici diluti 100,0
Camphorae 40,0
Spiritus Vini 500,0

Liquor antisepticus PERKINS

Rp Acidi carbolici puri 10,0
Aqua destillatae 300,0
Bromi 5,0

Wird äußerlich angewendet gegen Biss und Stich
giftiger Thiere, gegen Leichengift Innerlich
gibt man die Flüssigkeit mit Catechusirup
gegen Cholera

Rp Liquoris antiseptici Pennessi 25,0
Tincturae Catechu 15,0
Sirupi simplici 150,0

1/2 stündlich einen halben Esslöffel

Liquor inhalatorius carbolisatus ROBIN

Rp Acidi carbolici
Spiritus diluti aa 1,0
Tincturae Jodi 0,5
Glycerini
Aqua destillatae aa 2,5

25—30 Tropfen auf 1—2 Esslöffel voll Wasser zum
Zerathuben bez Inhaliren

Lotio carbolica [HUTCHINSON]

Rp Acidi carbolici 2,0
Glycerini
Spiritus aa 15,0
Aqua 170,0

Mixtura Acidi carbolici.

Rp Acidi carbolici puri 1,0 (i)
Aqua destillatae 200,0
Mucilaginis Gummi Arabici 50,0

Zwölftündlich einen Esslöffel bei massenhafter An-
wendung von Aqua phenylata (bei dem Pocken
vom Eruptionsstadium an)

Mixtura antidiabetica — EBERSTEIN

Rp Acidi carbolici 5,0
Aquae destillatae 150,0
Aquae Menthae pip 50,0

Bei Diabetes 2—4 mal täglich 1 Theelöffel

Oleum crinale (LASSAR)

LASSAR's Karbol-Haaröl

Rp Acidi carbolici 1,5
Olei Olivarum 100,0
Olei Bergamottae gtt XXX

Bei Ptyriasis capitis und Kopfkezem

Olfactorium antikatarrholicum HAGER

Rp Acidi carbolici puri
Spiritus Vini 5ā 10,0
Liquoris Ammonii caustici 12,0
Aquae destillatae 20,0

50 Gramm - Flaschen mit weiter Öffnung werden zu $\frac{1}{2}$ mit vorstehender Mischung beschnickt und dann mit einem solchen Bausche Baumwolle gefüllt, dass dieser die Flüssigkeit gerade aufsaugt. Bei beginnendem Schnupfen, Stockschnupfen, chronischem Katarrh und anderen katarrhalischen Leiden häufig zu riechen

Pasta carbolica LISTER

Acidi carbolici 5,0
Olei Olivarum 50,0
Cretae praeparatae q s

fiat pasta mollis Zwischen Calico auf Wunden zu legen

Pillulae Acidi carbolici

Rp Acidi carbolici puri 5,0
Unguenti Glycerini 10,0
Rhizomatis Calami 5,0
Radici Althaeae q s

M f pilulae 800

S Täglich viermal eine (später zwei bis drei II) Pillen (bei verschiedenen Hautkrankheiten, Pruritus universalis und pudendi) Jede Pille enthält 0,025 g Karbolsäure

Pillulae contra pruritum HARTEL

Rp Acidi carbolici 5,0
Unguenti Glycerini
Pulveris Radicis Althaeae 5ā q s

f pilulae 100

S Dreimal täglich anfangs zwei, später drei Pillen (wirksam) Jede Pille enthält 0,06 g Karbolsäure

Pulvis dentifricius carbolisatus**Karbol-Zahnpulver**

Rp Acidi carbolici 2,0
Ossis Sepiae pulv
Rhiz Iridis Florentinae 5ā 7,50
Olei Caryophyllorum gtt III
Calcii carbonici 85,0

Pulvis desinfectorius MAC DOUGALL

Rp Acidi carbolici 10,0
Calcarinae hydratae pulverisae
Magnesiae sulfurosa 5ā 150,0

Zum Verbinden und Einstreuen schlecht eiternder Wunden, zur Desinfektion der Nachtschühle

Pulvis divinus parvus MAGNANT PERE

Rp Gypsi usi
Calcarinae hydratae 5ā 50,0
Aluminis pulverati 25,0
Acidi carbolici 2,5

Zum Verbands und Einstreuen in brandige, profuse eiternde, cancröse Wunden, mit Wasser gemischt zum Bestreichen der Hautausschläge, Froststellen etc

Pulvis Talei cum Acido carbolico (LASSAR)

Talei veneti 50,0
Acidi carbolici 2,0

Sapo carbolisatus (Karbol-Seife)

Rp a) Saponis steaurici ply 75,0
Acidi carbolici 25,0

Mischen und in Formen pressen (Diet. M.) Zum Waschen der Hände für Ärzte 26procentig!

Rp b) Saponis medicati 100,0
Acidi carbolici 5,0—10,0

Mischen und in Formen pressen. 5—10procentig!

Sapo carbolisatus mollis 5 Proc**Karbol-Kaliseife**

Rp Saponis kalini 85,0
Acidi carbolici 15,0
Olei Bergamottae 3,0
Olei Citronellae 0,5

Sebum carbolisatum 2 Proc.**Karbol-Talg 2 Proc**

Rp Sobi benzoinati 88,0
Acidi carbolici 2,0

Spiritus carbolisatus desinfectorius

Rp Acidi carbolici 20,0
Olei Citronellae
Olei Sassafras 5ā 1,0
Spiritus diluti 980,0

Spiritus phenylatus contra tineas**Mottenspiritus**

Rp Acidi carbolici 10,0
Olei Caryophyllorum
Olei Olivi
Camphorae 5ā 5,0
Spiritus (90 Proc) 500,0

Suppositoria Acidi carbolici (BUTT)

Rp Acidi carbolici 0,8
Cerae albae 1,6
Olei Cacao 10,0

fiat suppositoria No 12

Unguentum Acidi carbolici

Rp Acidi carbolici 1,0
Unguenti cerei 25,0

Unguentum carbolisatum (Ergänzb)**Karbol-Salbe**

Rp Acidi carbolici 5,0
Adipis sulci 25,0

Unter Erwärmen aufzutragen

Unguentum contra perniones (LASSAR)

Acidi carbolici 0,5
Vasellini
Unguenti Plumbi 5ā 10,0
Olei Amygdalarum 5,0

Auf offene Frostbeulen aufzulegen

Unguentum contra perniones — ROTH

Rp Acidi carbolici 1,0
Tincturae Jodi
Acidi tannici 5ā 2,0
Unguenti cerei 30,0

Unguentum diachylon carbolisatum — LASSAR

Rp Emplastri Lithargyri simpl.
Vasellini flavi 5ā 50,0
Acidi carbolici 2,0

Bei juckender brennender Haut, Pruritus varicosus

Vinaigre phénique (Gall.)	
Acidi carbolici	10,0
Acidi acetici dil (30%)	338,0
Aquae	657,0

Linimentum contra scabiem bestiarum

Vet I	
Rp	
Acidi carbolici	10,0
Olei Rapaeum	150,0
Petrolei	50,0
Tinctura Aloës	20,0

Täglich werden die rindigen Hautstellen einmal sanft eingerieben. Bei Schafen und Jagdhunden wendet man eine wässrige Flüssigkeit an.

Vet II	
Rp	
Boracis	50,0
Saponis domestici	100,0
Aquae	5000,0
Acidi carbolici	100,0
Olei Terebinthinae	50,0
Spiritus Vini	200,0

Mit der gut durchgeschüttelten Flüssigkeit werden die rindigen Stellen täglich einmal mit Hilfe einer Bürste berieben oder benetzt.

Liquor antiparonychiens

Vet. Maukewasser	
Rp	
Aquae vulnerariae vinosae	
Tincturae Benzoes	
Tincturae Aloës	
Tincturae Arnicae	50,0
Acidi carbolici	5,0

Von dieser Flüssigkeit wird den Leinmehlumschlägen bei bösariger Mauke beigemischt. Bei gutartiger Mauke macht man aus Mehl einen dünnflüssigen Brei, versetzt diesen mit $\frac{1}{2}$ Volum des Maukewassers und wendet das Gemisch als Pinselung an.

Vet Oleum carbolisatum	
Rp	
Acidi carbolici	5,0
Olei Linl	100,0

Zum Bestreichen offener Stellen und eiternder Wunden.

Vet Pockenlecke für Schweine	
Rp	
Natri nitrici crudi	
Natri sulfurici	33 100,0
Fructus Anisi	
Radix Liquiritiae	33 25,0
Fennae secalinae	100,0
Acidi carbolici	8,0
Spiritus Vini	15,0

8 Täglich dreimal einen Esslöffel voll zu geben. Bösarige Pocken sind mit folgendem Liniment zu bepinseln.

Vet Pockenliniment für Schweine	
Rp	
Olei Tauri	60,0
Vitellum ovorum duorum	
Acidi carbolici	2,0

Fiat emulso.

Vet Unguentum contra scabiem bestiarum	
Rp	
Sabl taurini	
Adipis suilli	
Colophonii	50,0
Acidi carbolici	5,0
Petrolei Italici	20,0

WALZ'sche concentrirte Lauge gegen Raude der Schafe

Vet	
Rp	
Natri carbonici crudi	500,0
Aquae calidae	1000,0
Acidi carbolici	200,0
Olei animalis aetherel	50,0
Glycerini	250,0
Ammonii chlorati	100,0
Aquae q s	ad 3 Liter

Zum Gebrauch wird diese Mischung mit 50 Liter warmem Wasser verdünnt und auf die rindigen Stellen alle 3 Tage eingebrästet. Sollen Böder angewendet werden, so werden 8 Liter der concentrirten WALZ'schen Lauge mit 100–120 Liter Wasser verdünnt und die Schafe darin jeden fünften Tag gebadet. Man hüte sich, dass von der Flüssigkeit den Thieren in die Augen komme.

Waschung bei Klauenseuche der Wiederkäuer

Vet I	
Rp	
Aluminis crudi	50,0
Aquae calidae	1000,0
Acidi carbolici	10,0
Aceti pyrolignosi crudi	500,0

Anfangs wird diese Flüssigkeit mit einem gleichen Volum Wasser verdünnt, später unverdünnt angewendet.

Vet II	
R	
Cupri sulfurici crudi	25,0
Forri sulfurici crudi	20,0
Galliarum subtile pulveratarum	15,0
Aquae	1000,0
Acidi carbolici	10,0

Vet III	
Rp	
Acidi nitrici crudi	20,0
Acidi pyrolignosi crudi	500,0
Acidi carbolici	15,0
Aquae communis	1500,0

Vet Kufschniero	
Rp	
Lapellni	
Olei Rapae	
Sabl	50,0
Acidi carbolici	5,0

V Karbolsäure-Verbandstoffe Die Vorschriften zur Herstellung von Karbolsäure-Verbandstoffen sind außerordentlich zahlreich. Im Nachstehenden geben wir lediglich die wichtigeren wieder.

Gossypium carbolisatum Karbol-Watte a) Ergänzb. Verflüssigte Karbolsäure (von 90 Proc.) 60 Th, Weingeist (90 Proc.) 1800 Th. Mit dieser Lösung tränkt man 1000 Th entfettete Baumwolle. Nachdem man durch Druck die gleichmässige Vertheilung der Flüssigkeit in der Baumwolle bewirkt hat, lässt man diese 24 Stunden in einem bedeckten Gefässe stehen und trocknet endlich bei Zimmertemperatur. Enthält etwa 5 Proc. Karbolsäure.

b) Gall. Man bereitet eine Lösung aus Karbolsäure 1 kg, Weingeist 18,5 kg, Larchentarpenzin 500 g. Mit dieser Lösung tränkt man entfettete Watte und presst diese

soweit ab, dass 1 kg Watte = 1,65 kg Flüssigkeit zurückhält, also im Ganzen 2,65 kg wiegt Enthält etwa 10 Proc Karbolsäure

Tela carbolicata Karbol-Mull Karbol Gaze a) Ergänzb Mit einer Lösung von 120 Th verflüssigter Karbolsäure (90 Proc) in 1000 Th Weingeist tränkt man 1000 Th entfetteten Mull oder entfettete Gaze — Nachdem durch Druck die gleichmässige Vertheilung der Flüssigkeit in dem Gewebe bewirkt ist, wird dieses bei Zimmertemperatur getrocknet Enthält etwa 10 Proc Karbolsäure

b) Gall Wird in genau der nämlichen Weise bereitet wie die vorstehend behandelte Karbolsäure-Watte der Gall

c) Nach Lister 1 Th Karbolsäure wird mit 5 Th Haiz und 7 Th Paraffin zusammengeschmolzen, in die heisse Mischung wird Gaze getaucht, welche darauf zwischen zwei erwärmten Metallplatten hindurchgepresst wird Enthält etwa 6—7 Proc Karbolsäure

d) Nach Brown In 2500 cem einer Lösung von 100,0 g Karbolsäure, 400,0 g Kolo-phonium, 40,0 g Ricinusöl in 2000 cem Weingeist wird 1 kg (ca 35 m) Mull oder Gaze eingetaucht, mit den Händen gleichmässig durchgearbeitet und schliesslich horizontal zum Trocknen ausgespannt

Karbol-Jute a) Unfixirt (10proc) Karbolsäure 150,0, Weingeist 1000,0, destillirtes Wasser 350,0, gebleichte Jute 1 kg b) Fixirt (10proc) Karbolsäure 100,0, Kolo-phonium 200, Weingeist 1100,0, Glycerin 500 c) Nasse Jute Durch Einlegen von Jute in eine 5proc ölige Karbolsäurelösung und darauffolgendes Abpressen

Catgut nach Lister In eine Mischung von 1 Th Chromsäure, 4000 Th Wasser und 200 Th Karbolsäure wird unmittelbar nach der Bereitung so viel Catgut gelegt, als Karbolsäure in der Mischung vorhanden ist, nach 48 Stunden wird es herausgenommen Nach dem Trocknen wird es entweder auf eine Spule straff aufgewickelt, oder in einer 20proc öligen Karbolsäurelösung aufbewahrt

Antiseptische Seide zum Nähen wird durch einstündiges Kochen in einer 5proc wässrigen Lösung von Karbolsäure dargestellt

† **Kaliumphenylat**, *Kalium phenylicum* seu *carbolicum* $C_6H_5OK = 132$ In trockenem Zustande zu erhalten durch Eintragen von 39 Th metall Kalium in 94 Th Phenol in einer Wasserstoffatmosphäre unter Erwärmen Farblose krystallinische (faserige) Stücke, welche bald oberflächlich roth werden Hygroskopisch Vorsichtig, vor Licht geschützt, aufbewahren Eine wässrige Lösung, welche rund 50% C_6H_5OK enthält, wird erhalten durch Auflösen 100 Th Phenol in 175 Th Kalilauge von 1,33—1,334 spec Gew

† **Natriumphenylat** *Natrium phenylicum* seu *carbolicum* $C_6H_5ONa = 116$ Wie das vorige durch Einwirkung von 23 Th metall Natrium auf 94 Th Karbolsäure Eine Auflösung von 100 Th Phenol in 180 Th Natronlauge von 1,33—1,334 spec Gew + 14 Th Wasser enthält rund 50 Proc C_6H_5ONa

† **Phénol sodé dissous** (Gall) Acid carbolic 70,0 g, Liq Natru caustica (1,332 spec Gew) 100,0 g, Aquae q s ad 1 Liter Enthält rund 10 Proc Natriumphenylat

† **Ammonium phenylat**, $C_6H_5ONH_4$ Durch Einleiten von trockenem Ammoniak in Phenol zu erhalten. Weisses, sublimirbares Pulver Eine Lösung von 100 Th Phenol in 180 Th Ammoniakflüssigkeit (0,960) enthält rund 40 Proc $C_6H_5ONH_4$

Acidum carbonicum

I. Acidum carbonicum Kohlensäure(anhydrid) Kohlendioxyd Acide carbonique Carbonic acid $CO_2 = 44$ Farbloses, nicht brennbares, Verbrennung und Athmung nicht unterhaltendes Gas von säuerlich-stechemdem Geruch und Geschmack Rothet in feuchtem Zustande vorübergehend Lackmus Es ist 1,52mal schwerer als Luft Bei 0° C und 760 mm B wiegen 1000 cem = 19781 g oder 1 g ist = 505 52 cem In Wasser ist es ziemlich löslich 1 Vol Wasser löst unter gewöhnlichem Druck bei 0° = 1796 Vol, bei 5° = 1,45 Vol, bei 10° = 1,18 Vol, bei 15° = 1 002 Vol, bei 20° = 0 901 Vol Kohlen-säure Durch Kochen kann die gesammte Kohlensäure aus der wässrigen Lösung vertrieben werden In Alkohol, ferner in Benzin und anderen Kohlenwasserstoffen ist die Kohlensäure wesentlich leichter löslich als in Wasser

Bei 0° kann sie durch einen Druck von 30 Atmosphären zu flüssiger Kohlensäure kondensirt werden Diese siedet bei —78° und erzeugt beim freiwilligen Verdunsten so intensive Kälte, dass ein Theil zu fester Kohlensäure, schneeartigen Massen erstarrt

Darstellung a) der gasförmigen Kohlensäure Die für analytische und andere ähnlichen Zwecke erforderlichen kleineren Mengen Kohlensäure erzeugt man durch Ein-

wirkung von verdünnten Säuren auf Karbonate in einem Kipp'schen oder diesem ähnlichen Apparate (s. Acidum sulfhydricum). Am zweckmässigsten verwendet man weissen Marmor (100 Th.) und 15procentige Salzsäure (500 Th.). Das entwickelte Gas wird zu seiner Reinigung durch Wasser oder dünne Sodälösung geleitet, soll es getrocknet werden, so kann dies durch Calciumchlorid, conc. Schwefelsäure oder glasige Phosphorsäure geschehen. Grauer und schwarzer Marmor, sowie Kreide, liefern beim Zersetzen mit Säuren ein übel riechendes Kohlensäuregas. Benutzt man Kombinationen von Kreide oder Magnesi oder Dolomit mit verdünnter Schwefelsäure, so ist die Zersetzung der Karbonate durch häufiges Umschütteln der Mischung zu befördern. Ueber Reinigung der Kohlensäure s. bei Aquae minerales.

b) Von flüssiger Kohlensäure. Die gegenwärtig in Deutschland von rund 80 Fabriken geübte Fabrikation bezweckt die Verwerthung der dem Erdboden freiwillig entströmenden, ferner derjenigen Kohlensäure, welche in Heizgasen, in den Gasen der Kalköfen etc. enthalten ist.

Da, wo dem Erdboden reine Kohlensäure freiwillig entströmt (Mofetten), fängt man sie in Gasometern auf und führt sie durch Komprimiren in den flüssigen Zustand über. Aus Heizgasen u. dergl. gewinnt man sie wie folgt.

Die kohlensäurehaltigen Gase werden zunächst durch Wasser gewaschen, alsdann in den unteren Theil eines Thurmes eingeleitet, wo ihnen von oben — durch Cascade-Einrichtung vertheilt — Natriumkarbonatlösung entgegenrieselt. Diese bindet die Kohlensäure zu Natriumbikarbonat. Hat die Lauge genügend Kohlensäure aufgenommen, so scheidet man entweder das Natriumbikarbonat in festem Zustande ab und treibt die Hälfte der Kohlensäure durch Gluhen aus, $2\text{NaHCO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2$, oder — neuerdings — man erhitzt die Bikarbonat-Laugen, wobei gleichfalls Rückbildung von Natriumkarbonat und Abspaltung von Kohlensäure erfolgt. Das regenerierte Natriumkarbonat geht in den Betrieb zurück, die entwickelte Kohlensäure aber wird durch Filter von Kohle und Watte filtrirt, durch Calciumchlorid entwässert und schliesslich in Cylinder aus Eisen bzw. Stahl gepumpt, in denen durch einen Druck von 80 Atmosphären bei 0° die Verflüssigung erfolgt.

c) Von fester Kohlensäure. Um aus flüssiger Kohlensäure feste darzustellen, legt man eine völlig gefüllte Kohlensäure-Flasche horizontal auf einen Bock, eine nicht völlig gefüllte Flasche bringt man — die Öffnung nach unten — in so stark geneigte Lage, dass die Flüssigkeit im Innern der Flasche über dem Ausflusssventil steht. Als dann bindet man einen Beutel von lockerem Wollgewebe vor das Ausflusssventil und öffnet dieses für kurze Zeit. Es wird nun aus der Flasche ein dünner Strahl flüssiger Kohlensäure in den Beutel getrieben, ein Theil derselben vergast und verwandelt den übrigen Theil in feste Kohlensäure.

Wurde man die Flasche aufrecht stehen lassen, so würde beim Öffnen des Hahnes die Kohlensäure lediglich in Gasform austreten. Es würde — da unter diesen Umständen flüssige Kohlensäure nicht die Flasche verlässt — auch feste Kohlensäure nicht entstehen. Hatte man richtig operirt, so findet sich in dem Beutel ein lockerer Schnee von fester Kohlensäure, welcher an der Luft, ohne zu schmelzen, allmählich vergast. Bringt man diesen Schnee durch Pressen in kompakte Stücke, so kann man diese, besonders wenn sie in wollene Tücher eingeschlagen werden, mehrere Stunden konserviren.

Flüssige Kohlensäure ist eine fast farblose Flüssigkeit, welche bei -78° siedet, bei -58° aber fest wird. Der kritische Punkt für die Verflüssigung ist $+31^\circ$, d. h. oberhalb dieser Temperatur ist selbst bei noch so grosser Steigerung des Druckes eine Verflüssigung nicht möglich. — Der Druck, welchen die flüssige Kohlensäure ausübt, ist bis 31° (d. h. bis zum kritischen Punkte) lediglich abhängig von der Temperatur. Er beträgt bei $+5^\circ = 40,5$, bei $+20^\circ = 58,5$, bei $+30^\circ = 78$ Atmosphären. Ueber 31° hinaus ist der Druck sowohl von der Temperatur, wie von dem Grade der Füllung abhängig. Bei einer bestimmten, gleichbleibenden Füllung betrug er z. B. bei $105^\circ = 775$, bei $143,5^\circ = 985$ und bei $161^\circ = 1100$ Atmosphären. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass es gefährlich ist, Flaschen mit flüssiger Kohlensäure über $+31^\circ$ hinaus zu erwärmen, dass man vielmehr dafür Sorge zu tragen hat, dass die Temperatur der Flaschen die mittlere Wärme von $15-20^\circ$ nicht überschreitet.

Die Versendung der flüssigen Kohlensäure erfolgt in Flaschen aus Eisen (Stahl), welche amtlich auf einen Druck von 250 Atmosphären geprüft worden sind, diese Prüfung ist alle 3 Jahre zu wiederholen. Für die Lagerung etc. solcher Flaschen existiren besondere Verordnungen, mit denen man sich genau vertraut zu machen hat. Vergl. Pharm. Kalender, 1896. Jahrbuch S. LXXXVI.

In den letzten Jahren sind wiederholt Explosionen solcher Flaschen erfolgt. In einigen Fällen wurde festgestellt, dass die Flaschen in Folge mangelhaften Ausglühens nicht zäh genug waren, in anderen Fällen scheint die Ursache darin bestanden zu haben, dass die Wandungen der Flaschen durch die Kohlensäure (bei Gegenwart von Wasser und Glycerin) angegriffen wurden. Sehr bequem für den Gebrauch der flüssigen Kohlensäure ist die Einrichtung der Reducirventile, welche es ermöglichen, dass man die Kohlensäure mit einem verminderten, beliebig abzustufenden Drucke ausströmen lassen kann. Vergl. auch unter *Aquae minerales*.

Feste Kohlensäure in Schneeform hat ein geringeres spec. Gewicht als Wasser, durch Komprimiren kann das spec. Gewicht bis auf 1,5 erhöht werden. — Will man die feste Kohlensäure zur Kälteerzeugung benutzen, so bringt man sie im schneeförmigen Zustande in eine Porzellanschale, feuchtet sie mit Aether an, bringt in diese Mischung die abzukühlenden Gefässe und deckt das Ganze mit wollenen Tüchern zu. Die Temperatur sinkt bis auf -80° .

Analyse. Man erkennt die Kohlensäure in freiem Zustande daran, dass sie beim Einleiten in klares Kalkwasser oder Barytwasser weisse Niederschläge von Calciumcarbonat bezw. Baryumcarbonat erzeugt, welche sich in verdünnten Säuren (HCl) unter Aufbläusen lösen. Die Salze der Kohlensäure brausen beim Uebergossen mit verdünnten Mineralsäuren (HCl) auf, das entweichende Gas wird auf sein Verhalten gegen Kalk- und Barytwasser geprüft.

Die Bestimmung der Kohlensäure erfolgt je nach den näheren Bedingungen 1) gewichts-analytisch, 2) gas analytisch, 3) maass-analytisch.

1 Gewichts-analytisch. Diese Bestimmung kann nach zwei Verfahren angeführt werden: a) durch indirekte Wägung. Man kann sich des bestehenden einfachen Apparates von FERNSTEDT bedienen. A und B sind zwei leichte Kolben von etwa 100 ccm Fassungsraum. Die zu analysirende Substanz wird in B eingewogen und mit etwas Wasser übergossen. A wird zu etwa $\frac{1}{2}$ mit conc. Schwefelsäure beschickt. Bei C ist der Apparat mit einem Glasstäbchen luftdicht verschlossen. Der so vorbereitete Apparat wird gewogen. Alsdann saugt man bei D vorsichtig an, verschliesst den Schlauch bei D durch Zusammendrücken und lüftet hierauf den Schlauch vorsichtig. Durch das Saugen war in A sowie in B ein luftverdünnter Raum entstanden. Beim Lüften des Schlauches wird durch den Druck der äusseren Luft etwas Schwefelsäure von A nach B gepresst. Hierdurch erfolgt in B Entwicklung der Kohlensäure, welche nach A entweicht und an die dort vorgeschlagene Schwefelsäure den beigemengten Wasserdampf abgibt. Ist die Zersetzung beendet, so saugt man schwach an D, lüftet alsdann den Verschluss C und saugt noch so lange (5 Min.) Luft durch den Apparat, bis man sicher ist, dass alle Kohlensäure aus dem Apparat entfernt ist. Alsdann setzt man den Verschluss bei C wieder auf und wägt den Apparat nach dem Erkalten. Die Differenz zwischen beiden Wägungen ergibt die vorher vorhandene gewesene Kohlensäure.

Man benutzt diese Methode zur Bestimmung der Kohlensäure in solchen Salzen, welche durch Schwefelsäure ohne Bildung von Niederschlägen leicht zersetzt werden, also z. B. den Carbonaten bezw. Bicarbonaten von K, Na, NH_4 , Mg, nicht aber von Ca, Ba, Sr. An Stelle des beschriebenen Apparates sind andere, noch handlichere im Gebrauch, z. B. die von BUNSEN, GRISLER, MOHR u. a. Von der zu analysirenden Substanz wägt man sowohl ein (0,5—1,0—2,0 g), dass etwa 0,2—0,3 g Kohlensäure zu erwarten sind.

β) Durch direkte Wägung. In bestehender Figur 6 ist A eine mit Kalklauge beschickte Vorlage, welche auch durch eine Waschflasche ersetzt werden kann. a ein Kugel-




Fig. 6

trichter, *B* der Zersetzungskolben, *C* ist ein mit wenig Calciumchlorid gefülltes Rohr. *D* ist mit Calciumchlorid völlig gefüllt, *E* enthält mit Kupfersulfat getränkte und wieder getrocknete Bimssteinstücke, *F* ist wiederum mit Calciumchlorid völlig gefüllt. *G* ist ein mit 33proc. Kalilauge beschickter Kali-Apparat, *g* ist ein mit Natronkalk, *h* ein mit Calciumchlorid gefülltes gerades Rohr, *H* ist eine mit Schwefelsäure beschickte Waschflasche. Man prüft zunächst den Apparat auf seine Dichtigkeit, indem man den Schlauch vor *A* abklemmt, den Hahn des Kugeltrockners öffnet und nun bei *H* mässig ansaugt. Es muss nun, wenn man mit dem Saugen aufhört, die Kalilauge in *G* deutlich zurücksteigen und ihren Stand mindestens 5 Minuten lang behalten.

Ist der Apparat dicht, so wägt man *G + g* genau und schaltet sie wieder ein. In den Zersetzungskolben *B* wägt oder misst man die zu untersuchende Substanz genau ein, setzt den Hahntrichter auf, schliesst den Hahn und füllt den Trichter ganz oder zum Theil mit 10proc. Salzsäure (nicht concentrirter!). Jetzt klemmt man den Schlauch zwischen *A* und *a* ab, und lässt durch den Tropftrichter langsam die Säure zufließen (event. unter Ansaugen bei *H*). Der Zufluss wird so geregelt, dass ein ruhiges Passiren der Gasblasen bei *G* zu beobachten ist. Wenn alle Säure zugeflossen ist und der Durchtritt von Gas-




Fig. 6.

blasen bei *G* aufhört, so erwärmt man den Kolben *B* langsam bis gerade zum beginnenden Sieden. Hierauf schliesst man bei *H* einen Aspirator an, setzt diesen in Thätigkeit, öffnet alsdann den Verschluss zwischen *A* und *a* und leitet einen ruhigen Luftstrom durch den Apparat, bis alle Kohlensäure aus demselben entfernt ist. Die Dauer richtet sich nach dem Volumen des Apparates und beträgt $\frac{1}{4}$ –2 Stunden. Nach $\frac{1}{4}$ ständigem Erkalten werden *G + g* gewogen. Das Mehrgewicht ist die bei der Bestimmung erhaltene Kohlensäure. Bedingung ist, dass die Calciumchlorid-Röhren neutrales Calciumchlorid enthalten. Die mit gewöhnlichem Calciumchlorid gefüllten Röhren sind daher vor der Ingebrauchnahme mit Salzsäure oder Kohlensäure zu sättigen und von dem Ueberschuss dieser Gase durch Ueberleiten trockner Luft zu befreien. An Stelle des Calciumchlorids kann zweckmässig auch glaue Phosphorsäure treten. — Die Einwage von Substanz beträgt so viel, dass schliesslich 0,3–0,4 g Kohlensäure zur Wägung gelangen.

Mit Hilfe dieses Verfahrens lässt sich die Kohlensäure bestimmen in allen kohlensauen Salzen, welche mit Salzsäure keine in der Wärme unlöslichen Verbindungen geben, also in allen Karbonaten und Bikarbonaten mit Ausnahme derjenigen von Silber und Quecksilber. Natürlich kann man an Stelle der festen Salze auch Lösungen untersuchen. Das




Fig. 7. Kali-Apparat nach LIEBIG.




Fig. 8. Kali-Apparat nach GEISSLER.

gleiche Verfahren würde unter Hinweglassung der Säure auch geeignet sein, um die in Wasser gelöste Kohlensäure zu bestimmen, ferner unter Hinweglassung des Zersetzungskolbens zur Bestimmung der Kohlensäure in Luft und anderen Gasen. An Stelle des in der Figur gezeichneten Kaliapparates nach LIEBIG kann natürlich auch ein anderer, z. B. der nach GEISSLER treten.

Ueber die gasanalytische Bestimmung vergl. BUNSEN: Gasometrische Methoden, und HEMPEL, Gasanalyse. Die maassanalytische Bestimmung wird bei Luft und Wasser behandelt werden s. Aër und Aqua.

Anwendung. Reine gasförmige Kohlensäure findet gelegentlich Verwendung zu Rektal-Injektionen bei Phthisikern. Der Arzt benutzt alsdann eine kleine Flasche flüssiger Kohlensäure mit Reducir-Ventil und führt dem Patienten in einer Sitzung unter etwa $\frac{1}{2}$ —1 Atmosphäre Druck 2—4 Liter Gas ein. Technisch findet die flüssige Kohlensäure beim Bierausschank, zur Fabrikation von Mineralwässern, für Feuerlösch-Zwecke (Gasapritze), zum Heben von Schiffen, als Kraftquelle etc. ausgedehnte Anwendung.

Die Anwendung kohlensäurehaltiger Wässer zum inneren und äusseren Gebrauch beruht darauf, dass die Kohlensäure die Haut und die Schleimhäute reizt und daher die Circulation und die Verdauung anregt.

Vergiftung. Kohlensäure unterhält weder die Verbrennung noch die Athmung. In reiner Kohlensäure erlöschen Licht und Feuer, Thiere ersticken. Daher können Menschen zu Schaden kommen, wenn sie Räume betreten (Gährräume, Brunnen, Gruben etc.), in denen Ansammlungen von Kohlensäure vorhanden sind. Man prüft die Luft in solchen Räumen durch Hineinbringen eines brennenden Lichtes. Brennt dieses hell weiter, so nimmt man an, dass auch ein Mensch in dieser Luft leben kann. Verlöscht das Licht jedoch, oder brennt es trübe, so ist die Luft als verdächtig anzusehen.

Menschen, die durch Einathmen von Kohlensäure bewusstlos geworden sind, bringt man sofort in frische Luft. Nach dem Öffnen der Kleider leitet man künstliche Athmung ein und sucht zugleich durch Hautreize (Auflegen von Senfteig) Athmung und Herzthätigkeit wieder in Gang zu setzen.

Limonaden-Bonbons. Zucker 800,0, Natriumbicarbonat 100,0, Weinsäure 100,0 werden feingepulvert, gemischt und mit einer Mischung von Citronenöl 5 Tropfen und Spiritus 200,0 angetosson, worauf die noch feuchte Masse in Formen von Weissblech eingedrückt wird, die vorher mit Cacaoöl ausgepolirt sind. Verpackung in Stanniol.

Limonaden-Pastillen. Citronensäure 50,0, Arabisches Gummi 100,0, Zucker 850,0 feingepulvert, mit 5 Tropfen Citronenöl mischen, mit Spiritus von 70 % anstossen und Pastillen von 1 g Schwere formen. Beide Vorschriften lassen sich in Bezug auf Farbe und Aroma modificiren.

Stollwercks Brause-Limonaden-Bonbons bestehen aus viereckigen Kästchen von leicht lösholher aromatisirter Zuckermasse, die mit Kügelchen aus Natriumbicarbonat und Weinsäure gefüllt sind.

Pastilli aërophori

Pastilli (Trochisci) Selters, Dragées minerales de Mège

Rp Natrii bicarbonici plv 100,0
Acidi tartarici plv 90,0

Durch Komprimiren mit Hilfe von Spiritus 100
Pastillen zu formen

Potio effervescent (Gall. Helv.)

Potion gazeuse Potion antivomitiv
de Rivière

No I Potion alcaline

	Gall. Helv.	
Rp Kalii bicarbonici	2,0	—
Natrii carbonici	—	9,0
Aquae	50,0	81,0
Sirupi Sacchari	15,0	10,0

No II Potio acida

Acidi citrici	2,0	4,0
Aquae	50,0	85,0
Sirupi Citri	15,0	10,0

Zum Gebrauche mischt man in einem Wasserglase gleiche Raumtheile beider Lösungen. Auch kann man den Kranken je einen Esslöffel von beiden Lösungen einnehmen lassen, und zwar ist alsdann No I zuerst zu nehmen.

Potio Riveri (Ph. Germ. III)

Mixtura salina Riveri Potio Citri Ex-
surationis citricae Rivier'scher Trank

Rp Acidi citrici 4,0
Aquae 190,0
Natrii carbonici crist. 9,0

Das Natriumcarbonat wird der Citronensäurelösung in kleinen Krystallen zugefügt, diese durch mässiges Umschwenken langsam gelöst und die Flasche verschlossen. Nur zum Gebrauche zu bereiten.

Pulvis aërophorus (Germ. III)

Pulvis effervescent (Helv.)

	Germ.	Helv.
Rp Natrii bicarbonici	10,0	30,0
Acidi tartarici	8,0	27,0
Sacchari	19,0	43,0

Für den Handverkauf empfiehlt es sich, diesem Pulver etwa 1 g Magnesium carbonicum zuzusetzen.

Pulvis aërophorus anglicus (Germ. III)

Pulvis aërophorus anglicus (Aust.)

Pulvis effervescent anglicus (Helv.) Poudre
gazogène alcaline (Gall.)

		Poudre gazogène neutre (Gall.)
Rp Acidi tartarici plv	1,5	2,0
Natrii bicarbonici	2,0	2,0

Die Weinsäure ist in eine weisse, das Natriumcarbonat in eine blaue oder rothe Kapsel einzufüllen.

Pulvis aerophorus Carolinensis
Karlsbader Brausepulver
 I Natrii sulfurei sicca plv 1,75
 Natrii chlorati plv 0,72
 Acidi tartarici 0,72
 In eine weisse Kapsel
 II Natrii bicarbonici 2,4
 Kalii sulfurici 0,08
 In eine blaue oder rote Kapsel

Pulvis aerophorus Hufelandi (Ph. paup.)
Plv aerophorus c. Gremore Tartari
 Rp Magnesii carbonici 10,0
 Tartari depurati 20,0

Pulvis aerophorus granulatus
Granuliertes Brausepulver
 Rp Natrii bicarbonici plv 85,0
 Acidi tartarici plv 40,0
 Acidi citrici plv 80,0
 Man erwärmt die Mischung in einer Porzellanschale gelinde im Wasserbade und arbeitet sie mit 80,0 Spiritus durch. Die noch feuchte Masse reibt man durch ein passendes Haarsieb oder ein Sieb von verzinntem Eisenblech und trocknet sogleich im Trockenschrank. Gleichheit der Körner wird durch Absieben erzielt. Eisenern Geräte sind zu vermeiden!

Pulvis aerophorus SMON
 Rp Acidi tartarici plv 4,0
 Sacchari plv 4,0
 Natrii bicarbonici plv 4,0
 Magnesii carbonici 1,0

Pulvis aerophorus citratus
 Rp Pulveris aerophori 50,0
 Olei Citri gtt 5
Pulvis aerophorus cum Magnesia
Magnesia-Brausepulver (Ergänzb.)

Rp Acidi tartarici 1,0
 Diacetyli Citri 2,0
 Sacchari pulv 8,0
 Magnesii carbonici 4,0

Pulvis aerophorus menthatus
 Rp Pulveris aerophori 50,0
 Olei Menthae pip gtt 5

Pulvis aerophorus zingiberatus
 Rp Pulveris aerophori 100,
 Olei Zingiberis gtt 1

Pulvis pistorius
Backpulver Hefepulver (amerikanisches)
 Tartari depurati plv 11,0
 Calci carbonici praec. 4,0
 Auf 500 g Mehl = 15–20 g

Deutsches Backpulver
 Acidi tartarici 15,0
 Natrii bicarbonici 80,0
 Amyli Oryzae 85,0
 Auf 500 g Mehl = 30–40 g

Saturatio simplex (Form Berol.)
 Liqueoris Kali carbon 15,0
 Aceti 80,0
 Sirupi Saccharis 15,0
 Aquae ad 200,0

II Phosgen Kohlenäurechlorid. Kohlenoxychlorid. Carbonylchlorid. COCl₂
 (Mol.-Gew. = 99) Entsteht durch direkte Verainigung von Kohlenoxyd mit Chlor CO + Cl₂ = COCl₂. Ferner durch Zersetzung des Chloroforms durch Luft und Licht. Technisch dargestellt nach PATENNO, indem man ein Gemisch von Kohlenoxyd und Chlor über glühende Knochenkohle leitet. Farbloses, erstickend riechendes Gas, durch Druck und Kalte zu einer Flüssigkeit kondensierbar, welche bei +8° siedet. Von erstickendem Geruche, eingeathmet giftig.

Im Handel ist es erhältlich in Toluol-Lösung (mit 20% COCl₂) und als flüssiges Phosgen in Glasröhren eingeschlossen. Verwendet wird es in der chemischen Synthese z. B. zur Darstellung der Salole und von Theerfarbstoffen.

Acidum chinicum.

I. Acidum chinicum. Chinasäure C₇H₁₁O₄ ist in den echten Chinarinden zu 5–8 Proc. an Kalk und an die Alkaloide gebunden vorhanden. Ausserdem in den Blättern von *Vaccinium Myrtillus*, im Kraut von *Galium Mollugo*, in den Kaffeebohnen, im Wiesenheu.

Darstellung. Man behandelt gepulverte Chinarinde 2–3 Tage mit kaltem Wasser, versetzt den Auszug mit wenig Kalkmilch, um Chinagerbsäure und kleine Mengen von Alkaloiden zu fällen, und dampft das Filtrat zum Sirup ein. Nach mehrwöchentlichem Stehen am kühlen Orte krystallisiert Calciumchinat (chinasaurer Kalk) aus. Man reinigt es durch Umkrystallisiren und zerlegt es durch Schwefelsäure oder Oxalsäure.

Eigenschaften. Chinasäure bildet wasserhelle rhombische Prismen von rein und starksaurem (nicht bitterem) Geschmack, löslich in 2 Th. Wasser, weniger löslich in Alkohol, fast unlöslich in Aether. Schm.-P. 162°. Die wässrige Lösung ist linksdrehend.

II Calcium chinicum Chinasaurer Kalk. Calciumehinat ($C_6H_{11}O_6$)₂Ca + 10 H₂O, durch Neutralisiren der wässerigen Lösung der Chinasaure mit Calciumcarbonat zu erhalten. Seidenglänzende, rhombische Blättchen, in 5–6 Th Wasser löslich, in absolutem Alkohol unlöslich.

III Aether chinicus a) das reine Aethylchinat, der Chinasäure-Aethyläther $C_6H_7(OH)_4CO_2$ C₂H₅ wird durch Einwirkung von Aethyljodid auf das Silberchinat erhalten $C_6H_7(OH)_4CO_2Ag + JC_2H_5 = AgJ + C_6H_7(OH)_4CO_2$ C₂H₅. Haase giebt folgende Vorschrift. Man mischt 100 Th Weingeist (95 Proc) mit 100 Th cone Schwefelsäure und lässt die Mischung in gut verschlossener Flasche zur möglichsten Bildung von Aethylschwefelsäure mehrere Tage an einem lauwarmen Orte stehen. Dann bringt man unter Umschütteln in kleinen Portionen 400 Th gepulvertes und entwässertes Calciumchinat hinzu und lässt unter öfterem Umschütteln nochmals eine Woche in wohlverschlossener Flasche stehen. Dann fügt man 100 Th absoluten Weingeist hinzu, mischt, lässt einen Tag absetzen und filtrirt. Das Filtrat wird mit 10 Th Natriumbicarbonat und etwas Thierkohle digerirt und nach 24 Stunden nochmals filtrirt. Das Filtrat wird nun aus dem Wasserbade der Destillation unterworfen. Alkohol destillirt über, der Chinasäure Aether verbleibt im Rückstande.

Eigenschaften. Eine dickflüssige klare, farblose oder blassgelbliche, brennend und bitter schmeckende, in Wasser und Weingeist leicht, in Aether weniger lösliche Flüssigkeit. Der Siedepunkt liegt über 200°, doch findet schon bei gewöhnlicher Temperatur geringe Verdunstung statt. In wässriger Lösung zersetzt sich der Aether leicht unter Spaltung in Aethylalkohol und freie Chinasäure.

Aufbewahrung und Anwendung. Aufbewahrung in kleinen, möglichst gefüllten Glasern, vor Licht geschützt. — Anwendung innerlich zu 1,0–2,0 g in wässriger Lösung, besonders aber in Inhalationen gegen Intermittens. 2–3,0 g des Aethers werden auf eine Kompressе gegossen und eingeathmet.

b) Chinaäther von Gron & Wuzian. Diese beschrieben ein Präparat, welches sie durch Destillation von chinasauerm Kalk mit Alkohol und Schwefelsäure dargestellt hatten und zwar verwendeten sie das Destillat. Dieses Präparat ist keine einheitliche chemische Verbindung, sondern eine Mischung verschiedenartiger Substanzen, im wesentlichen Alkohol, Aethyläther und wenig Chinaäther enthaltend.

Acidum chromicum.

† Acidum chromicum (Anstr. Brit. Germ. Helv. U-St.) Acide chromique cristallisée (Gall.) Chromsäure (Anhydrid). Chromtrioxyd. Chromic acid. Chromic Anhydride. CrO₃ = 100. Das in Frage stehende Präparat ist wissenschaftlich nicht als „Chromsäure“, sondern als „Chromsaure-Anhydrid oder Chromtrioxyd“ zu bezeichnen.

Darstellung. 300 Th Kaliumdichromat, 500 Th Wasser und 775 Th cone Schwefelsäure werden bis zur vollständigen Lösung erhitzt und 12 Stunden stehen gelassen, um das Kaliumbisulfat auskristallisiren zu lassen. Die Mutterlauge wird auf 80–90° erhitzt und zunächst mit 275 Th cone Schwefelsäure (unter Umrühren in kleinen Portionen) und so viel Wasser versetzt, dass die zunächst ausgeschiedene Chromsäure sich gerade wieder löst. — Nach 12 Stunden des Stehens an einem kühlen Orte giesst man die Flüssigkeit von den Krystallen ab und erhält durch Eindampfen der Lauge weitere Krystalle. Man lässt die Krystalle in einem bedeckten Trichter abtropfen, trocknet sie auf einer porösen Thonplatte, wäscht sie nach und nach mit wenig Salpetersäure, trocknet sie wieder auf einer neuen Thonplatte und entfernt die Salpetersäure durch Erhitzen auf 60–80° (Ph. Helv.). Die Darstellung ist materiell nicht gewinnbringend. $K_2Cr_2O_7 + 2H_2SO_4 = 2KHSO_4 + 2CrO_3 + H_2O$. Die Schwierigkeit bei der Darstellung liegt namentlich in der Gewinnung eines schwefelsäurefreien Präparates.

Eigenschaften. Die reine (schwefelsäurefreie) Chromsäure bildet dunkelbraun rothe, massig hygroskopische Nadeln bez. rhombische Prismen, welche in weniger als dem gleichen Gewichte Wasser löslich sind. Schwefelsäurehaltige Chromsäure stellt scharlach rothe Krystalle dar und ist stark hygroskopisch. In der Hitze (bei etwa 200°) schmelzen die Krystalle zu einer fast schwarzen Flüssigkeit, die bei etwa 800° in grünes Chromoxyd und Sauerstoff zerfällt $2\text{CrO}_3 = 3\text{O} + \text{Cr}_2\text{O}_3$. Beim Erwärmen der Chromsäure mit Schwefelsäure wird Sauerstoff, beim Erwärmen mit Salzsäure Chlor in Freiheit gesetzt. Zahlreiche leicht oxydierbare unorganische und organische Substanzen (SO_2 , H_2S , CO , Alkohol, Glycerin, Oxalsäure, Weinsäure) reduciren die Chromsäure zu Chromoxyd. Die Reaktion ist oft sehr heftig, so dass z. B. beim Zusammenbringen krystallisirter Chromsäure mit Alkohol, Glycerin, Zucker, Gerbsäure, Kork u. dergl. unter Umständen Entzündung eintreten kann. Werden Chromsäure oder ein chromsaures Salz der Destillation mit Kochsalz und Schwefelsäure unterworfen, so destillirt Chromoxydchlorid (Chromaeichlorid) CrO_2Cl_2 über, welches durch Wasser in Chromsäure und Salzsäure zerlegt wird. (Nachweis von Chlorwasserstoff neben Bromwasserstoff)

Von Salzen der Chromsäure sind besonders zwei Reihen bekannt. Die „Chromate“ oder neutralen Chromate leiten sich von dem Chromsäurehydrat CrO_3H_2 ab, sie sind meist gelb oder roth gefärbt, viele von ihnen sind unlöslich. Die früher „saure Chromate“ genannten (doppelt chromsauren) Salze werden gegenwärtig als Salze einer Pyro- oder Dichromsäure $\text{Cr}_2\text{O}_7\text{H}_2$ aufgefasst und dementsprechend „Pyrochromate“ oder „Dichromate“ genannt.

Analyse. Man erkennt die freie Chromsäure an ihrem Aussehen. Fügt man zu ihrer wässrigen Lösung etwas Wasserstoffsuperoxyd und schüttelt sofort mit Aether aus, so färbt sich die ätherische Schicht prachtvoll blau. — Die mit einem Alkali neutralisirte Lösung der Chromsäure giebt folgende Reactionen:

1) Baryumchlorid erzeugt citronengelben Niederschlag von Baryumchromat BaCrO_4 , der in Salzsäure und Salpetersäure löslich, in Essigsäure unlöslich ist. 2) Bleiacetat oder Bleinitrat fallen gelbes Bleichromat PbCrO_4 , unlöslich in Salpetersäure und Essigsäure, löslich in Natronlauge. 3) Silbernitrat erzeugt braunrothes Silberchromat Ag_2CrO_4 , welches in Salpetersäure, sowie in Ammoniak löslich ist.

Für die Bestimmung ist von Wichtigkeit, dass alle Verbindungen der Chromsäure durch Reduktionsmittel zu Verbindungen des Chromoxyds reducirt werden, während alle Derivate des Chroms (also auch das Chromoxyd) durch Schmelzen mit Soda (oder Potasche) und Salpeter oder Kaliumchlorat in Salze der Chromsäure übergeführt werden.

Bestimmung als Chromoxyd. Man versetzt die Lösung der Chromsäure oder eines löslichen Chromates mit einem kleinen Ueberschuss von Salzsäure, fügt Alkohol hinzu und lässt sie 12 Stunden an einem warmen Orte stehen. Die Chromsäure wird zu grünem Chromoxydsalz reducirt unter Entwicklung von Aldehyd. Man versetzt den Alkohol und den Aldehyd durch Erwärmen und fällt heiss mit Ammoniak. Das mit heissem Wasser ausgewaschene Chromhydroxyd wird getrocknet und durch Glühen in Chromoxyd verwandelt.

Multiplirt man die Menge des gefundenen Chromoxyds mit 1,8158, so erhält man die dem Chromoxyd entsprechende Menge Chromsäure ($152\text{CrO}_3 = 203(\text{CrO}_3)_2$). Bei dieser Bestimmung müssen organische Substanzen, welche auf Chromoxydhydrat lösend einwirken (z. B. Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure, Glycerin etc.) abwesend sein. Liegen unlösliche Chromate vor (z. B. BaCrO_4), so muss durch Schmelzen derselben mit Kaliumnatriumcarbonat die Chromsäure zunächst in eine lösliche Form gebracht werden. Ueber Bestimmung durch Maassanalyse s. später.

Bestimmung als Bleichromat. Man versetzt die zu bestimmende Lösung, falls sie neutral oder alkalisch reagiren sollte, mit Essigsäure bis zur deutlich sauren Reaction, fügt alsdann genügend Natriumacetat hinzu und fällt mit einem Ueberschuss von Bleiacetat. Man lässt absetzen, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wäscht mit schwach essigsaurem, schliesslich mit destillirtem Wasser aus, trocknet bei 100° und wägt. Das Gewicht des Bleichromates PbCrO_4 mit 0,8096 multiplicirt giebt das Gewicht der Chromsäure CrO_3 .

In analoger Weise kann man die Chromsäure mittelst Baryumacetates auch als Baryumchromat BaCrO_4 fällen. Das Baryumchromat mit 0,8952 multiplicirt, giebt die Menge der Chromsäure CrO_3 an.

Prüfung Nur die Germ verlangt ein schwefelsaurefreies Präparat. Die übrigen Ph lassen grössere oder kleinere Mengen Schwefelsäure zu 1) Die 1proc wässrige Lösung sei klar ($\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{BaCrO}_4, \text{BaSO}_4$ würden ungelöst bleiben) und werde nach Zusatz von 10 Tropfen Salzsäure durch Baryumnitrat nicht getrübt (Schwefelsäure) 2) Wird 0,1 g der Chromsäure in einem Porzellantiegel mässig erhitzt, so entweicht Sauerstoff, und es hinterbleibt grünes Chromoxyd Dieses Chromoxyd darf an Wasser nichts Lösliches (Kaliumchromat) abgeben, d. h. der wässrige Auszug muss farblos sein und ohne Rückstand verdampfen

Die geringeren Handelsorten der Chromsäure enthalten häufig freie Schwefelsäure, Kaliumsulfat und Kaliumdichromat

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Staub geschützt, in Gefässen mit gut schliessenden Glasstopfen Hals und Stopfen sind stets sauber ausgewischt zu halten, da die Chromsäure zum Verkiten der Gefässe neigt Das Abwiegen erfolgt in Wageschalen aus Porzellan, bei grosseren Mengen in Porzellanschalen

Anwendung Chromsäure findet ausschliesslich örtliche Anwendung als Aetzmittel Innerlich wirkt sie giftig Die Aetzwirkung beruht auf den Erweiss koagulierenden und oxydierenden Eigenschaften der Chromsäure In 1–2 Th Wasser gelöst, dient sie als Aetzmittel bei Leichdornen, Condylomen, Warzen und schwammigen Excreescenzen, neuerdings besonders bei Leucoplacia oris, in 4–6 Th Wasser gelöst, wirkt sie mehr austrocknend und adstringierend, indem sie nur eine Schrumpfung der tierischen Faser veranlasst Die mit der konzentrierten Säurelösung betupften Stellen färben sich dunkelbraun, später bildet sich ein blauschwarzer trockener Schorf, der nach Verlauf von 2–3 Tagen abfällt und eine in zwei Tagen in Granulation übergehende Wundfläche hinterlässt In circa 10–15 Th Wasser gelöst, fördert die Chromsäure besonders die Vernarbung Die örtliche Anwendung der Chromsäure kann, wenn Resorption eingetreten ist, Vergiftungssymptome verursachen und Erbrechen, Diarrhoe und Kollaps herbeiführen Als Gegengift der innerlich in die Verdauungswege eingeführten Chromsäure gelten Kalkwasser, Erweisslösung, Milch und Zucker

Da die Chromsäure Albumen koaguliert und verhartet, so dient die 5–10procentige Lösung zum Konservieren anatomischer Präparate bez als Hartungsmittel

Rosshändler benutzen die Chromsäure zum Färben der Haare der Pferde Auch wird sie zum Färben und Belzen des Holzes, der Gewebe und Gespinnsäte benutzt Letztere sind leicht entzündlich, so wie die mit Pikrinsäure tingierten Ein auffallender Funken genügt, sie schnell unter Verghimmen zu vernichten

Dispensation Die Abgabe wässriger Chromsäure Lösungen erfolgt in Gläsern mit Glasstopfen Zu Pinselungen verwendet man Pinsel aus Glaswolle oder Pfropfen aus Asbest

Antisudorin Von Dresden aus vertriebenes Mittel gegen Fusschweiss ist eine wässrige 9procentige Lösung von Chromsäure

Chromsäure gegen Fusschweiss. Man pinselt die 5procentige wässrige Lösung auf die vorher gewaschenen und abgetrockneten Fusssohlen auf Vorsicht bei Wunden Das Aufpinseln ist in 8–14tägigen Intervallen zu wiederholen

Solutio acidi chromici (Germ II) Soluté d'acide chromique (Gall)

Acid. chromic.

Aquae aa

Receptor-Erleichterung, in Flaschen mit Glasstopfen aufzubewahren.


Acidum chrysophanicum.

Chrysophansäure. Rhein Rheinsäure. Rhabarbergelb. Parietinsäure. Rumicin. Dioxymethylantrachinon. $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_4$ oder $\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)(\text{OH})\begin{smallmatrix} \text{CO} \\ \text{CO} \end{smallmatrix} \text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$. Mol Gew 254.

Chrysophansäure ist nicht in der Wandflechte (*Parmelia parietina*), wohl aber im echten Rhabarber, in *Rumex obtusifolius* sowie in den Senneblättern enthalten. Früher hielt man die Chrysophansäure für identisch mit Chrysarobin

Darstellung. a) Man extrahirt zerkleinerte, durch Ausziehen mit Wasser von den Extraktivstoffen möglichst befreite Rhabarberwurzel (Rückstände von Extr Rhei) mit verdünnter Kahlauge, sauert die filtrirte Flüssigkeit mit Essigsäure an, wäscht den Niederschlag mit Wasser und krystallisirt ihn nach dem Trocknen aus heissem Ligroin oder Benzol um

b) Man übergiesst in einem weiten Kolben Chrysarobin mit ziemlich viel verdünnter Kahlauge und schüttelt die Flüssigkeit unter Einleiten eines Luftstromes so lange, bis alles Chrysarobin gelöst ist, und die Lösung einen gleichmässig rothen Farbenton angenommen hat. Hierauf wird die filtrirte Lösung mit verdünnter Salzsäure angesäuert und der erhaltene Niederschlag wie unter a angegeben gereinigt



Eigenschaften Goldgelbe, klinorhombische Prismen, ohne Geschmack Unlöslich in Wasser, löslich in 224 Th siedendem Alkohol von 81 Proc — Essigsäure, Chloroform, Benzol und Benzin lösen sie gleichfalls auf Löslich in stehenden Alkalien (wenig in kohlensauren) mit rother Färbung, in conc Schwefelsäure mit tieferer Färbung (Chrysarobin wird durch Schwefelsäure mit gelber Färbung gelöst) Mit Kalhydrat giebt Chrysophansäure eine blaue (Chrysarobin eine braune) Schmelze Schm-P 162° C

Prüfung. Das Präparat zeige die vorerwähnten Eigenschaften, schmelze nicht unter 160° C und hinterlasse beim Verbrennen keinen Rückstand

Anwendung. Nur in beschränktem Umfange äusserlich in Salbenform (0,4 bis 1,0 10,0) bei Hauterkrankungen Gegenwärtig wird an Stelle von Chrysophansäure gewöhnlich das Chrysarobin angewendet s dieses

Rohe Chrysophansäure Acidum chrysophanicum erudum. Mit diesem unzutreffenden Namen wird der zur Trockne verdampfte Benzol-Auszug des Goa-Pulvers (Chrysarobina) bezeichnet

Bismuthum chrysophanicum. Dermal Das von Trommsdorff beschriebene chrysophansäure Wismuth sollte angeblich der Formel $\text{Bi}(\text{C}_{15}\text{H}_5\text{O}_4)_2 \cdot \text{Bi}_2\text{O}_3$ entsprechen Nach El Marok ist es ein Gemenge von ziemlich unreinem Chrysarobin und Wismuthhydroxyd

Acidum citricum.

I. Acidum citricum (Austri Brit Germ Helv U-St) Acide citrique (Gall) Citronensäure. Oxytricarballoylsäure. Citric acid. $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. 210.

Citronensäure ist im Pflanzenreiche sehr verbreitet und kommt theils frei, theils an Basen (K_2O , CaO , MgO) gebunden, meist mit Äpfelsäure, Weinsäure u a Säuren zusammen vor In grösster Menge ist sie in fast allen sauren Früchten, z B Citronen, Pomeranzen, den Früchten von *Prunus Padus*, *Vaccinium Vitis Idaea*, Tamarinden etc enthalten Nachgewiesen wurde sie ferner in den Kaffeebohnen, Eicheln, Runkelrüben, Topinambur, Zwiebeln, Walnusschalen, in vielen Kräutern (Tabak, Convallaria), einigen Pilzen, sogar in der Milch

Darstellung. Der aus unreifen bez unverkäuflichen Citronen durch Pressen erhaltene Saft enthält 6—8 Proc Citronensäure, ausserdem Zucker, Gummi, Schleim. Er geht beim Stehen in freiwillige Gährung über, wodurch 5—6 Proc Alkohol entstehen. Hierdurch wird die Hauptmenge der trübenden Bestandtheile (Schleim) niedergeschlagen Der so geklärte Saft wird noch aufgeköcht, wodurch die Eiweissstoffe abgeschieden und durch Colren bez Filtriren beseitigt worden

1000 Theile des so geklärten Saftes werden in Holzbottichen, die mit Blei ausgekleidet sind, durch Einleiten von Wasserdampf bis fast zum Sieden erhitzt, und unter Umrühren allmählich mit 68 Th Schlammkreide, welche mit Wasser zu einem Brei angerieben ist, versetzt, bis Entwicklung von Kohlensäure auf einen weiteren Zusatz nicht mehr stattfindet, nöthigenfalls führt man die Neutralisation durch Zugeben kleiner Mengen Kalkmilch zu Ende Man lässt das gebildete Calciumcitrat in der Wärme absetzen, zieht die überstehende Flüssigkeit ab und wäscht das Calciumcitrat mit heissem Wasser aus Man vertheilt das Calciumcitrat in 250 Th Wasser und versetzt es unter Umrühren

und Erwärmen mit einer 1 + 5 verdünnten Schwefelsäure (etwa 83 Th konc Schwefelsäure sind erforderlich), bis diese in sehr geringem Ueberschuss vorhanden ist. Das ausfallende Calciumsulfat (Gips) wird mit kaltem Wasser ausgesüsst, die Citronensäurelösung aber dampft man bis zur Krystallisation ein, gefärbte Lösungen können durch Thierkohle entfärbt werden.

Im Grossbetriebe werden die geschilderten Operationen in Holzbottichen ausgeführt, welche mit Blei ausgeschlagen sind. Das Krystallisiren der medicinalen „bleifreien“ Citronensäure muss aber unbedingt in Porzellangefässen erfolgen.

Die Gewinnung der Citronensäure aus Johannisbeeren oder Preiselbeeren, welche 1—1,3 Proc abgeben, ist nur unter besonderen örtlichen Verhältnissen lohnend. Auch hier unterwirft man den frischgepressten Saft zur Klärung zunächst der weingestigen Gähung, verfährt im Uebrigen wie oben.

Nach WEHMER kann man Citronensäure auch auf physiologischem Wege herstellen. Gewisse Pilze (*Citromyces glaber* und *C. Pfefferianus*) spalten Traubenzucker in Citronensäure, welche mit der natürlichen völlig identisch ist. Die Ausbeute beträgt etwa 55 Proc des Traubenzuckers. Das Verfahren soll bereits technisch ausgeführt werden.

Eigenschaften. Koncentrirt man die wässrige Lösung der Citronensäure durch Erhitzen, bis die Temperatur der Lösung 130° ist, so krystallisirt aus der heissen Lösung die Citronensäure wasserfrei. Aus erkalteten Lösungen dagegen krystallisirt sie stets mit Krystallwasser als $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$, Mol-Gew 210. Diese Krystallwasser enthaltende Citronensäure ist das Präparat des Handels und der

Officinen

Sie bildet farb- und geruchlose, sehr sauer schmeckende, an warmer Luft oberflächlich etwas verwitternde, rhombische Prismen mit trapezoidischen Endflächen, welche sich




Fig. 9 Krystalle der Citronensäure




Fig. 10 Krystalle der Weinsäure

wie bestehende Figur zeigt, von den Krystallen der Weinsäure gut unterscheiden. Beim Erhitzen schrumpfen sie unter Abgabe von Wasser bei 70—75° etwas zusammen und schmelzen dann je nach der Schnelligkeit des weiteren Erhitzens bei 135—152° unter Uebergehen in wasserfreie Citronensäure, welche bei 153° schmilzt.

Bei weiterem Erhitzen (175°) tritt tiefgreifende Zersetzung ein unter Abspaltung von Wasser, Kohlenoxyd, Kohlensäure, Aceton und Bildung von Akonitsäure und Itakon-säure. Geruch nach Caramel tritt hierbei nicht auf. Durch Oxydation mit Kaliumperman-ganat entsteht Oxalsäure.

Citronensäure löst sich in 0,75 Th Wasser, in 0,5 Th siedendem Wasser, ferner in 1 Theile Alkohol von 90 Proc, auch in 50 Th Aether. Sie ist optisch inaktiv. In der wässrigen Lösung entsteht durch Thätigkeit von Mikroorganismen Essigsäure.

Die Citronensäure ist eine dreibasische Säure, sie bildet drei Reihen von Salzen (Citrate), hat das Vermögen, zahlreiche Doppelsalze, ferner mit Alkoholen Ester zu bilden.

Analyse. Die Citronensäure ist arm an charakteristischen Reaktionen. Die Citrate der Alkalien wie der Schwermetalle sind in Wasser relativ leicht löslich. Nachfolgende Reaktionen sind hervorzuheben:

1) Die wässrige Lösung der Citronensäure ist optisch inaktiv, diejenige der Weinsäure des Handels ist rechtsdrehend.


2) Fügt man zu einer Lösung von Citronensäure Kalkwasser im Ueberschuss (letzterer ist nothwendig, um Alkalcitrate zu zersetzen!), so entsteht in der Kälte kein

Niederschlag. Erhitzt man aber die Lösung mit einem Ueberschuss heiss bereiteten Kalkwassers, so entsteht ein weisser Niederschlag von Calciumcitrat, welcher beim Erkalten zum grössten Theil wieder in Lösung geht. Der Niederschlag wird auch von Alkalicitraten gelöst. (Weinsäure giebt mit Kalkwasser in der Kälte einen Niederschlag, der beim Erwärmen in Lösung geht.)

3) Versetzt man eine Citronensäurelösung mit überschüssigem Barytwasser oder fügt man zu einer Lösung von Alkalicitrat Baryumacetat im Ueberschuss, so entsteht zunächst ein weisser Niederschlag von amorphem Baryumcitrat $\text{Ba}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 + 7 \text{H}_2\text{O}$. Erhitzt man die Flüssigkeit mit diesem Niederschlage zwei Stunden hindurch auf dem Wasserbade, so geht der amorphe Niederschlag in sehr charakteristische klinorhombische Säulen $\text{Ba}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 + 7 \text{H}_2\text{O}$ über, die bei 50facher Vergrösserung gut zu identificiren sind. Sehr verdünnte Lösungen sind durch Eindampfen zu concentriren.

4) Erhitzt man Citronensäure oder eines ihrer Salze im Wasserbade mit konc. Schwefelsäure, so entweichen Kohlenoxyd, Kohlensäure (Aceton), ohne dass die Flüssigkeit geschwärzt wird. Erst bei längerem und stärkerem Erhitzen erfolgt Dunkelfärbung unter Entweichen von schwefeliger Säure. (Weinsäure färbt die Schwefelsäure sehr schnell kaffeebraun.)

5) Schliesst man 0.01 g Citronensäure mit überschüssiger (3 cem) Ammoniakflüssigkeit in ein Glasrohr so ein, dass über der Flüssigkeit nur ein kleiner freier Raum bleibt, erhitzt 6 Stunden auf $110-120^\circ$ und lässt die Flüssigkeit in einem Porzellanschälchen an der Luft stehen, so erhält man ein intensiv blaues oder grünes Produkt. (Unterschied von Oxalsäure, Weinsäure, Apfelsäure).



B.c.

Fig. 11 Krystalle von Baryumcitrat aus heisser Lösung gefällt.

mit dem doppelten Volumen Alkohol von 95 Proc. Nach 2stündigem Stehen filtrirt man das ausgeschiedene Kaliumbitartrat ab und wäscht mit Alkohol von 65 Proc. nach. Das Filtrat fällt man mit Bleiacetat. Der entstandene Niederschlag wird mit Weingeist von 50 Proc. gewaschen, dann in Wasser vertheilt. Man zerlegt ihn durch Einleiten von Schwefelwasserstoff und titirt die in Freiheit gesetzte Citronensäure mit Normal-Kalilauge. — 1 cem Normal-Kalilauge entspricht = 0.07 g Citronensäure $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$.

Prüfung. 1) 1 g Citronensäure, in 2 cem Wasser gelöst, darf auf Zusatz von 10 Tropfen Kaliumacetatlösung und 5 cem Weingeist nicht getrübt werden, auch dürfen nach einigen Stunden sich krystallinische Abscheidungen nicht zeigen (Weinsäure, Oxalsäure). 2) 1 g Citronensäure mit 10 cem konc. Schwefelsäure angerichen, darf, im Wasserbade erwärmt, sich innerhalb einer Stunde nur gelb, nicht dunkelbraun färben (Weinsäure). 3) Die 10procentige wässerige Lösung darf weder durch Baryumchlorid (Schwefelsäure) noch durch Ammoniumoxalat (Kalksalze) getrübt werden. 4) 1.0 g Citronensäure muss ohne wägbaren Rückstand zu hinterlassen, verbrennen. Kalksalze, überhaupt feuerbeständige Verunreinigungen. 5) Stumpft man eine Lösung von 5 g Citronensäure in 50 cem Wasser mit soviel (11.5 cem 10procentigen Ammoniak) eisenfreier Ammoniakflüssigkeit ab, dass sie gerade noch schwach sauer reagirt, so darf auf Zusatz von 20 cem gesättigten

Bestimmung. Liegt lediglich Citronensäure vor, nicht eine Mischung mit anderen nicht flüchtigen Säuren (flüchtige Säuren, z. B. Essigsäure, wären durch Destillation im Wasserdampfstrom zunächst zu entfernen), so kann man die Bestimmung durch Titration (s. u.) mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator ausführen. Oder man neutralisirt die Lösung mit Alkali, füllt mit einem Ueberschuss von Baryumacetat, unter Zusatz des doppelten Volumens Alkohol von 95 Proc. Nach 2stündigem Stehen filtrirt man das ausgeschiedene Baryumcitrat ab, wäscht es mit Alkohol von 65 Proc. aus, zersetzt es mit Schwefelsäure und wägt als BaSO_4 . Das erhaltene Baryumsulfat, mit 0.601 multipliziert, giebt die Menge der Citronensäure $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$ an.

Ist eine Trennung von Weinsäure erforderlich, so versetzt man mit Kaliumacetat und dann

Schwefelstoffwassers Dunkelfärbung nicht eintreten (Blei) 6) 1 g Citronensäure erfordert zur Neutralisation nicht weniger als 14,2 ccm (theoret. 14,8) Normal Kalklauge

Aufbewahrung In nicht zu trockener aber ammoniakfreier Luft an einem kühlen Orte (in der Officin nicht in den obersten Fächern!) und in gut geschlossenen Gefässen

Wirkung und Anwendung. Citronensäure wirkt innerlich in verdünnter Lösung durstlöschend, kühlend, die Herzthätigkeit herabsetzend. Daher in Form von Limonaden (5 1000) bei Fieber, Diphtherie, Skorbut und rheumatischen Affektionen. 4 g kryst Citronensäure entsprechen etwa dem Saft einer grossen Citrone. Als Ersatz des Essigs wird sie von Anhängern der Naturheilkunde benutzt. Uebermässiger und allzulang fortgesetzter Gebrauch erzeugt Anämie. Grösster Verbrauch auf Schiffen gegen den Skorbut. Im Organismus wird die Citronensäure zu Kohlensäure verbrannt, die Alkalisate werden im Organismus zu Alkalikarbonaten verbrannt, machen daher das Blut alkalisch. Aeusserlich wirkt sie schwach antiseptisch. In wässriger Lösung (2,0 250,0) zu Gurgelungen bei Ziegenkrebs, (1,0 5,0—10,0) zu Pinselungen bei Diphtherie, (1,0 100,0) zu Injektionen gegen Gonorrhoe, (0,5—0,8 100,0) zu Ausspülungen der Blase. Technisch besonders in der Kattundruckerei, theils als Reserve, theils zur Belebung der Farben.

Essentia ad Limonadum

Limonenessenz

Rp 1 Sacchari albi	500,0
2 Aquae destillatae	400,0
3 Acidi citrici	40,0
4 Aquae florum Aurantii	100,0
5 Spiritus Vini	100,0
6 Essentiae corticis Citri	10,0

Man bereite aus 1 u 2 einen Sirup, füge die Lösung von 3 u 4 hinzu, filtrire u vermische mit 5 u 6

100,0 dieser Essenz geben mit 1 Liter Wasser oder kohlensaurem Wasser eine Limonade

Limnade citrique (Gall)

Potus citricus

Rp Sirupi Acidi citrici (Gall)	100,0
Aquae	900,0
Tincturae corticis Citri recentis	2,0

Pastilli Acidi citrici

Pastilles pour la soif

Rp 1 Acidi citrici	25,0
2 Sacchari albi	1000,0
3 Spiritus	10,0
4 Olei Citri	1,5
5 Tingacanthae	0,5

Man bereite aus 5 mit etwa 75 ccm Wasser einen Schleim. 1 u 2 werden gemischt, darauf mit der Lösung von 3 u 4 aromatisirt, worauf man mit Hilfe des Tragant schleimes eine dicke Masse bereitet, aus welcher Pastillen von 1 g Schwere bereitet werden.

Potio antiscorbutica citrata

Rp 1 Corticis Chinae	50,0
2 Acidi citrici	15,0
3 Aquae	q s
4 Tincturae Chinae compositae	
5 Tincturae Cannamomi aa	15,0
6 Sirupi Sacchari	50,0

Man bereite aus 1—3 ein Decoct von 500,0 Colatur und füge dieser 4—6 hinzu (Bei blutendem Zahnfleisch, Skorbut)

Pulvis refrigerans

Pulvis ad Limonadum (Germ I)

Rp Sacchari albi	120,0
Acidi citrici	10,0
Olei Citri	gtt 1

Non nisi ad dispensationem puretur

Sirup d'acide citrique (Gall)

Sirupus acidi citrici s Citri

Rp Acidi citrici	
Aquae destillatae aa	10,0
Sirupi Sacchari	980,0

Zum Aromatisiren kann man auf 1 kg = 20 g Tinct Citri corticis recentis zufügen. Dies ist alsdann der Sirup de Limon der Ph Gall

Succus Citri lactitius

a) in usum recepturae

Acidi citrici	7,2
Aquae destillatae	98,0

b) in usum mercatorium

Rp Acidi citrici	70,0
Tincturae Citri corticis recentis	1,0
Aquae destillatae	800,0
Spiritus	80,0

Nach stägiger Maceration filtriren

Sherry soda water sirup

Rp Succi Cerasorum fermentati et filtrati

Aquae communis	aa 1200,0
Sacchari	8000,0
Acidi citrici	35,0

Werden zu einem Sirup gekocht

II Kalium citricum. Kaliumcitrat Citronensaures Kali. Potassii Citras Citrate of Potassium (Brit, U-St.) Man neutralisirt eine concentrirte Lösung von 21 Th kryst Citronensäure durch eine Lösung von 30 Th Kaliumbikarbonat und dampft die Flüssigkeit zur Trockne, oder man krystallisirt den Trockenrückstand aus 60 proc Alkohol um. Entweder prismatische Krystalle $C_6H_5O_7K_2 + H_2O$ (U-St.) oder ein grobkörniges

Salzpulver $C_9H_7O_2K$ (Brit) In Wasser leicht löslich, neutral oder sehr schwach sauer, hygroskopisch, in Weingeist schwer löslich

Die 10proc wässrige Lösung werde weder durch Schwefelwasserstoff (Blei), noch durch Baryumnitratlösung (Schwefelsäure), noch durch Calciumchlorid in der Kälte (§ 8 42) verändert (Weinsäure, Oxalsäure), und nach dem Ansäuern durch Salpetersäure durch Silbernitrat nur schwach getrübt (Chlor)

Anwendung. Als schweisstreibendes und temperaturherabsetzendes Mittel bei Rheumatismus, Gicht, Malaria etc mehrmals täglich 1,0–2,0

Natrio-Kalium citricum Natrium-Kaliumcitrat Citronensaures Natrium-Kalium (oder Natron-Kali) Von Pusch als Ersatz des *Tartarus natronatus* in dem Sennirz'schen Brausepulver empfohlen Zur Darstellung sättigt man in wässriger Lösung 100 Th Citronensäure mit 108 Th Kaliumkarbonat und 221 Th kryst Natriumkarbonat, filtriert und bringt die Lösung durch Eindampfen zur Krystallisation

Acidum cinnamylicum.

1. Acidum cinnamylicum Zimmtsäure, β -Phenylacrylsäure. *Acide cinnamique*. Cinnamic acid. $C_9H_7O_2$ $CH=CH \cdot CO_2H$. Mol. Gew = 148

Im Handel unterscheidet man 1 *Acidum cinnamylicum medicinale* und 2 *Acidum cinnamylicum artificiale* Erstere wird aus natürlich vorkommenden Zimmtsäure Derivaten abgeschieden, letztere synthetisch gewonnen

Darstellung. 1) Man unterwirft Styrax der Destillation mit überschüssiger Natronlauge Hierbei gehen Styrol C_9H_8 und Zimmtalkohol C_9H_9O über, während zimmtsäures Natrium im Destillationsrückstande verbleibt Man verdünnt den letzteren mit Wasser, filtriert die Lösung und scheidet aus ihr die Zimmtsäure durch Zusatz von Salzsäure ab Die Krystalle werden mit Wasser gewaschen, in Ammoniumkarbonatlösung gelöst, die Lösung nochmals durch Salzsäure zersetzt und die Krystalle aus heissem Wasser, event unter Zusatz von Thierkohle, umkrystallisiert — In ähnlicher Weise lässt sie sich gewinnen aus dem Perubalsam und Tolubalsam, feiner durch Oxydation des Zimmtaldehydes (Zimmtöls) mit Salpetersäure 2) Synthetisch Benzaldehyd wird mit Acetylchlorid im geschlossenen Rohr erhitzt $C_6H_5CHO + CH_3COCl = HCl + C_6H_5CH=CH \cdot CO_2H$

Eigenschaften Zum Rezepturgebrauch wird die medicinale Zimmtsäure vorgezogen, zur Herstellung von Präparaten, Verbandstoffen u dergl wird die künstlich hergestellte verwendet

Farblose Krystallblättchen, ohne Geruch, zwischen den Zähnen knirschend, zunächst fast geschmacklos, dann von kratzendem Geschmack In kaltem Wasser schwer löslich (1:3500), leicht löslich in Alkohol und in fetten Ölen Schm-P 183°, S-P 300–304° Teilweise unzersezt sublimierbar, mit Wasser flüchtig Geht bei der Oxydation (z B mit Kaliumpermanganat) in Benzaldehyd über, durch Reduktion (mit Natrium-Amalgam oder Kaliumaufl) entsteht Hydrozimmtsäure = β Phenylpropionsäure $C_6H_5CH_2 \cdot CH_2 \cdot CO_2H$ In der wässrigen Lösung der Salze der Zimmtsäure erzeugt Manganchlorür sofort Fällung des Mangansalzes Zimmtsäure ist eine einbasische Säure, die Salze heissen „Cinnamate“

Die synthetische Säure des Handels riecht gewöhnlich schwach nach Benzaldehyd, sie schmilzt gegen 180° und siedet gegen 300°

Prüfung. Sie sei farblos (gefärbte Präparate sind zu verwerfen!), geruchlos, hinterlasse beim Verbrennen keinen Rückstand — Die mit Salpetersäure angesäuerte wässrige Lösung werde durch Silbernitrat nicht getrübt (Chlor) — 1 g Zimmtsäure erfordere zur Neutralisation 6,7 ccm Normalkalilauge (theoretisch = 6,75 ccm)

Aufbewahrung Vor Licht geschützt

Anwendung Neuerdings in Form intravenöser oder intramuskulärer Injektionen, auch zu Pinselungen gegen Tuberkulose empfohlen Bei Kehlkopftuberkulose werden

ausserdem Pinselungen der 5proc alkoholischen Lösung oder Verreibungen von 5—10 Zimmtsäure mit 95—100 Glycerin angewendet. In der Technik dient die Zimmtsäure als Ausgangsmaterial zur künstlichen Darstellung von Indigo

Rp	Acidi cinnamyliei	5,0	Rp	Acidi cinnamyliei	
	Ollei Amygdalarum dulcium	10,0		Coccalni hydrochlorici ss	1,0
	Vitellum ovi	No 1		Spiritus	18,0
	Solutionis Natrii chlorati (0,7%) q s			Zur Injection in Lupusknoten	Dosis 1—2 Tropfen
fiat emulsio	Vor dem Gebrauch ist die Emulsion mit Kalilauge schwach alkalisch zu machen				
	Dosis 0,1—1,00 ccm wöchentlich 2mal LERDNER				

Innerlich eingenommen, geht die Zimmtsäure in den Harn als Hippursäure über


II. Acidum phenilo-propionicum β -Phenyl-Propionsäure Hydro-Zimmtsäure $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CO}_2\text{H}$ Entsteht durch Reduktion der Zimmtsäure mittelst Natriumamalgam oder Jodwasserstoffsäure

Farblose Krystallnadeln von eigenthümlichem Bockgeruch Schm -P 47,5°, Siedep 280° Mit Wasserdämpfen flüchtig Löslich in 180 Th kaltem Wasser, leichter löslich in siedendem Wasser, leicht löslich in Alkohol

Innerlich bei Phthisis, dreimal täglich 10 Tropfen einer alkoholischen Lösung 1 + 5

Acidum cresotinicum.

Nachdem KOLBE und LAUTEMANN durch Ueberleiten von Kohlensäure über auf 180° erhitztes Phenolnatrium die Salicylsäure erhalten hatten, stellten sie unter den nämlichen Bedingungen (Ueberleiten von Kohlensäure über Kresolnatrium) aus Kresol die homologe Kresotinsäure dar. Vergl. unter Acidum salicylicum. Wegen ihrer Aehnlichkeit mit der Salicylsäure wurde die neue Säure auch „Homosalicylsäure“ genannt $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ Mol Gew = 152.



Als man dann erkannte, dass das Kresol des Steinkohlentheers aus drei isomeren Kresolen (o m p) bestehe, gelang es, auch aus dem für einheitlich gehaltenen Reaktionsprodukt der oben skizzirten Darstellung drei verschiedene Kresotinsäuren zu isoliren. In reinem Zustande können diese isomeren Kresotinsäuren erhalten werden, wenn man die entsprechenden reinen Kresole der oben angegebenen Reaktion unterwirft.


I Acidum cresotinicum (ortho) $\text{C}_8\text{H}_7(\text{CO}_2\text{H})(\text{OH})(\text{CH}_3)$ 1 2 3 Orthohomosalicylsäure. β Kresotinsäure γ -Orthooxymetatoluylsäure Entsteht durch Ueberleiten von Kohlensäure über erhitztes o Kresolnatrium

Krystallisirt aus siedendem Wasser in farblosen, langen, flachen Nadeln Schm P 163—164° Ist mit Wasserdämpfen flüchtig, in Wasser schwer löslich, in Alkohol leicht löslich. Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid violett gefärbt. Die Orthokresotinsäure wird wegen ihrer schon nach kleinen Gaben eintretenden lähmenden Wirkung auf den Herzmuskel therapeutisch nicht verwendet.

II Acidum cresotinicum (meta) $\text{C}_8\text{H}_7(\text{CO}_2\text{H})(\text{OH})(\text{CH}_3)$ 1 2 4 Metahomosalicylsäure γ -Kresotinsäure Orthooxyparatoluylsäure Entsteht durch Ueberleiten von Kohlensäure über erhitztes m-Kresolnatrium

Krystallisirt aus Wasser in farblosen Nadeln, aus Alkohol in monoklinen Prismen Schm -P 177° Mit Wasserdämpfen flüchtig. In Wasser schwer löslich, in Alkohol leichtlöslich. Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid violett gefärbt. Die Metakresotinsäure erwies sich therapeutisch als unwirksam.

III Acidum cresotinicum (para) $C_6H_4(CO_2H)(OH)(CH_3)$ 1 2 5. Parahomosalicylsäure. α Kresotinsäure α Orthooxymetatoluylsäure Entsteht durch Ueberleiten



von Kohlensäure über erhitztes *p* Kresolnatrium
Krystallisiert aus siedendem Wasser in sehr langen Nadeln oder rhombischen Prismen Mit Wasserdämpfen flüchtig Schm-P 151° Schwer löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid violett gefärbt Falls „Kresotinsäure“ schlechthin verordnet wird, ist diese Parakresotinsäure abzugeben

Prüfung Die Kresotinsäuren sind vollständige Analoga der Salicylsäure, ihre Prüfung schliesst sich daher derjenigen der Salicylsäure eng an 1) Sie seien in Äther klar löslich 2) Die über Schwefelsäure getrockneten Säuren müssen im Capillarrohre die oben angegebenen Schmelzpunkte zeigen (Salicylsäure drückt die Schmelzpunkte herab) 3) Je 1 g der über Schwefelsäure getrockneten Säuren erfordert zur Sättigung 0,368 g Kalihydrat oder 55,7 ccm $\frac{1}{10}$ Normalkalilauge Ueber die Aufbewahrung ist nichts Besonderes zu bemerken

Anwendung. Die Parakresotinsäure bildet ein völliges Analogon der Salicylsäure Sie wird wie diese als Antisepticum, Antirheumaticum und Antipyreticum, und auch in den gleichen Dosen wie diese gegeben Vor der Salicylsäure soll sie den Vorzug geringerer Nebenwirkungen haben Die Ausscheidung erfolgt durch den Harn als Glucuronverbindung, zum geringeren Theil als Kresotinsäure

IV Acidum cresotinicum crudum Rohe Kresotinsäure Zum grossen Theile aus der Paraverbindung bestehend, daneben kleine Mengen *o* und *m*-Kresotinsäure enthaltend Die wässrige Lösung 2 1000 wird als Desinfektionsflüssigkeit zum Waschen der Thiere verwendet

V Natrium (para) cresotinicum. Parakresotinsaures Natrium. $C_6H_4(CH_3)OH(CO_2Na)$. Farbloses, geruchloses, fein krystallinisches Pulver von deutlich bitterem, aber nicht widerlichem Geschmack Löslich in 24 Th erwärmtem Wasser, ohne sich spalten wieder abzuschcheiden Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid violett gefärbt

Dieses Salz ist die Form, in welcher die *p*-Kresotinsäure am häufigsten innerlich verwendet wird Man giebt es unter den gleichen Indikationen und in den gleichen Gaben wie Natriumsalicylat Die Nebenwirkungen sollen erheblich geringer sein wie bei Natrium salicylat

Acidum asepticum Aseptinsäure Borkresolwasserstoffsuperoxyd. Eine Lösung von 3 g Salicylsäure (neuerdings Kresotinsäure) und 5 g Borsäure in 1000 g Wasserstoffsuperoxyd von circa 1,5 Proc H_2O_2 -Gehalt Farblose Flüssigkeit als Antisepticum und Blutstillungsmittel angewendet

Kresin ist eine Auflösung von Phenolen in kresoxylensaurem Natrium mit einem Gehalt von 25 Proc Kresolen Dient als Desinficiens

Calcium cresotinicum Unter diesem unzutreffenden Namen wird der von Fodor zur Desinfektion empfohlene Kresolkalk beschrieben Vergl Calcium cresylicum unter Kresol.

Acidum cubebicum.

Acidum cubebicum. Cubebensäure. Acide cubebique. Cubebic acid.

Resina Cubebiarum acida. $C_{12}H_{14}O_8$ (?) Mol. Gew. = 282.

Darstellung Grob gepulverte Cubeben werden mit Wasser übergossen und durch Destillation mit Wasserdampf vom ätherischen Oele so viel als möglich befreit Dann bringt man den Destillationsrückstand zur Extraktstärke und extrahirt ihn wiederholt mit Alkohol Man destillirt von den alkoholischen Auszügen den Alkohol ab Bei Behandlung des Rückstandes mit kaltem Wasser hinterbleibt eine braungüne klebrige Masse, welche durch Destillation mit Wasserdampf vom flüchtigen Oel befreit wird Man löst sie alsdann in 60proc Alkohol auf, worauf sich beigemengtes fettes Oel abscheidet Die filtrirte

weingeistige Lösung hinterlässt beim Verdunsten eine harzige Masse, welche aus Cubebin, Cubebensäure und indifferentem Harz besteht. Man digerirt sie mehrmals bei 50° mit starker Kalilauge und sauert die filtrirten Auszüge mit Salzsäure an. Der jetzt entstehende Niederschlag besteht aus Cubebensäure und indifferentem Harz. Man löst ihn in dem doppelten Gewicht Weingeist auf, fügt Calciumchlorid und soviel Ammoniak hinzu, dass die Lösung eben trübe wird. Innerhalb einiger Tage scheidet sich cubebensaurer Kalk ab. Man wäscht diesen mit Wasser, reibt ihn mit Wasser an, und zerlegt ihn durch Zusatz von Salzsäure. Die ausgeschiedenen Flocken werden gesammelt, gewaschen und im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet.

Eigenschaften. Eine weisse, harz- oder wachsartige Masse, unter den Fingern erweichend, färbt sich an der Luft allmählich braun. Schmp 56°. Fast geschmacklos, reagirt nur schwach sauer. In Wasser unlöslich, leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, sowie beim Erwärmen in concentrirtem wässrigem Ammoniak und in ätzenden Alkalien. Von concentrirter Schwefelsäure wird die Säure mit purpurvioletter bez. carminrother Färbung gelöst, die auf Zusatz von wenig Wasser kirschroth wird und durch viel Wasser verschwindet.

Aufbewahrung. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt.

Anwendung. Cubebensäure galt früher als der wirksame Bestandtheil der Cubeben, sie wird in Gaben von 0,2–1,0 g mehrmals täglich in Pillen oder Bissen bei Gonorrhoe und anderen catarrhalschen Leiden (Cystitis) gegeben. Die Ausscheidung erfolgt als Cubebensäure durch den Urin.


Acidum formicicum.

Acidum formicicum (Germ. Helv.) **Acidum formicum** **Acide formique.** **Formic acid.** **Formylsäure.** **Ameisensäure.** **Hydrocarbonsäure** $\text{H CO}_2\text{H}$. **Mol. Gew. = 46.**

Handelssorten. Ameisensäure kommt im Handel vor 1) Als reine concentrirte Ameisensäure, 99–100% CO_2H_2 enthaltend. 2) Als officinelle Ameisensäure mit einem Gehalt von rund 25 Proc CO_2H_2 , letztere ist das Präparat der genannten Pharmakopöen.

Darstellung. In eine etwa $\frac{3}{4}$ Liter fassende tabulirte Retorte, welche mit einem Liebig'schen Kühler verbunden und in ein Sandbad eingesetzt ist, bringe man 150 g Glycerin und 150 g kaufliche krystallisirte Oxalsäure, welche grob gepulvert ist. Das Sandbad wird allmählich angeheizt. Bei 75° beginnt eine Kohlensäureentwicklung, welche bei 90° und darüber in vollem Gange ist. In die Vorlage destillirt wässrige Ameisensäure über, die in der Regel durch etwas Oxalsäure verunreinigt ist, welche durch die entweichende Kohlensäure mechanisch mitgerissen wurde. Wenn die Kohlensäureentwicklung nachlässt, mässe man das Erhitzen dadurch, dass man einen Theil des Sandes von der Retorte entfernt, um der Bildung von Akrolein und Allylalkohol vorzubeugen. Zu dem Destillationsrückstand kann man auf's Neue 150 g Oxalsäure zufügen und ebenso wie vorher verfahren. Diesen Zusatz von Oxalsäure kann man noch mehrmals wiederholen, ja den Destillationsrückstand schliesslich aufbewahren, um ihn bei einer späteren Darstellung an Stelle des Glycerins wieder zu benutzen. Das Destillat enthält neben etwas Oxalsäure etwa 50–54 Proc Ameisensäure. Man reinigt es durch nochmalige Destillation und bringt es alsdann auf das vorgeschriebene spec. Gewicht.


Hierbei bildet sich aus Glycerin und Oxalsäure zunächst Ameisensäure Glycerinäther (Glycerinmonoformiat)



welches bei weiterer Einwirkung von Wasser in Glycerin und Ameisensäure zerfällt



Um aus einer wässrigen Lösung der Ameisensäure die wasserfreie Ameisensäure zu gewinnen, sättigt man die Lösung mit Bleikarbonat, scheidet das gut krystallisierende und in kaltem Wasser ziemlich schwer lösliche Bleiformiat ab, und zersetzt es, nachdem es getrocknet ist, durch Ueberleiten von trockenem Schwefelwasserstoffgas im Oelbade bei 130° Schwefelblei bleibt zurück und wasserfreie Ameisensäure geht über. Um sie von absorbiertem Schwefelwasserstoff zu befreien, wird sie über trockenem Bleiformiat digerirt und dann nochmals rektifizirt.



Eigenschaften. a) der wasserfreien Ameisensäure Farblose, völlig flüchtige, schwach rauchende, stechend sauer riechende Flüssigkeit, spec Gew bei 15° = 1,2256. Erstarrt bei 0° krystallinisch und schmilzt dann bei + 8,5°. Siedep 99°. Bei 107° destillirt konstant eine wässrige Säure mit 72 Proc Ameisensäure, entsprechend der Formel $\text{HCO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O}$. b) der officinellen Ameisensäure Diese ist eine wässrige Auflösung von Ameisensäure und enthält rund 25 Proc HCO_2H . Klare, farblose, stechend riechende, völlig flüchtige, sehr saure Flüssigkeit, mit Wasser und Alkohol in allen Verhältnissen mischbar. Das spec Gewicht ist 1,060—1,063 (Germ. Helv.)

Tabelle über den Gehalt der wässrigen Ameisensäure von CH_2O_2 bei 15° C

Proc	Spec Gew	Proc	Spec Gew	Proc	Spec Gew	Proc	Spec Gew
40	1 1004	32	1 0764	24	1 0592	16	1 0392
39	1 0963	31	1 0786	23	1 0570	15	1 0366
38	1 0934	30	1 0710	22	1 0548	14	1 0342
37	1 0902	29	1 0689	21	1 0524	13	1 0319
36	1 0871	28	1 0670	20	1 0500	12	1 0297
35	1 0849	27	1 0650	19	1 0471	11	1 0275
34	1 0820	26	1 0630	18	1 0445	10	1 0258
33	1 0792	25	1 0612	17	1 0419		

Die Ameisensäure ist eine einbasische Säure, ihre Salze heissen „Formiate“. Sie hat die Neigung, in Kohlenoxyd und Wasser zu zerfallen, und wirkt deshalb als „Reduktionsmittel“.

Analyse. a) Qualitativ 1) Erwärmt man freie Ameisensäure oder ein Alkalisalz derselben mit Silbernitrat, so erfolgt Ausscheidung von dunklem metallischen, pulverförmigen Silber. 2) Erwärmt man freie Ameisensäure mit Quecksilberoxyd, so erfolgt Ausscheidung von metallischem Quecksilber. 3) Erwärmt man wässrige Ameisensäure oder ein Alkalisalz derselben mit Mercurchlorid, so erfolgt Ausscheidung von Mercurchlorid (Calomel). 4) Versetzt man ein Alkalisalz der Ameisensäure mit Eisenchlorid, so entsteht eine rothbraune Lösung, aus welcher sich beim Kochen ein rostfarbiger Niederschlag abscheidet. 5) Erwärmt man Ameisensäure (oder deren Salze) mit cone Schwefelsäure, so wird Kohlenoxyd gebildet, welches mit bläulicher Flamme verbrennt.

b) Quantitativ. Liegt lediglich freie Ameisensäure vor, so kann man diese mit Normal-Natronlauge und Phenolphthaleïn titriren. 1 ccm Normal-Natronlauge ist = 0,046 g Ameisensäure. Aus Mischungen mit nicht flüchtigen Säuren kann man die Ameisensäure durch Destillation mit Wasserdampf abscheiden und dann durch Titriren bestimmen. Liegt eine Mischung mehrerer flüchtiger Säuren vor, so ist die Bestimmung so erschwert, dass ihre Beschreibung über den Rahmen dieses Buches hinausgeht.

Prüfung. 1) Sie verbrenne, entzündet, mit blauer Flamme und ohne Rückstand. 2) Mit Bleiessig versetzt gebe sie ein Krystallmagma von Bleiformiat (Identität). 3) Mit Kalilauge neutralisirt rieche sie weder nach Akrolein noch nach Allylalkohol (s. Darstellung).

4) Die mit 5 Th Wasser verdünnte Säure werde durch Silbernitrat nicht sofort getrübt (Chlor) und nach dem Neutralisiren mit Ammoniak durch Calciumchlorid nicht getrübt (Oxalsäure) 5) 5 g Ameisensäure erfordern zur Neutralisation 27,1 cem Normal-Kalilauge (Phenolphthalein als Indikator) Wird die Säure mit Bleioxyd digerirt, filtrirt und das Filtrat zur Trockne verdampft, so darf letzteres keinen Rückstand hinterlassen, welcher beim Erhitzen Acetongeruch verbreitet (Essigsäure).

Aufbewahrung Es empfiehlt sich, die Ameisensäure vorsichtig aufzubewahren, obgleich die Germ und Helv dies nicht vorschreiben


Anwendung. Ameisensäure besitzt antiseptische Eigenschaften (die Bienen konserviren den Honig durch Zufügung von Ameisensäure), doch sind diese arzneilich noch nicht ausgenutzt Innerlich wird sie kaum gegeben, erzeugt übrigens heftige Magenentzündung, Nierenhyperämie, Blutharnen Aeusserlich lediglich in Form von Spiritus Formicarum und Tinctura Formicarum als hautreizendes Mittel bei Neuralgien, Rheumatismus etc

Spiritus Formicarum (Germ III)
Ameisenspiritus (sp G 0,894—0,898)
Rp Acidi formici (1060) 2,0
Spiritus (90 Vol Proc) 25,0
Aque destillatae 18,0

Tinctura Formicarum composita
Loco Tincturae Formicarum
Rp Acidi formici (1060) 10,0
Tincturae aromaticae 20,0
Olei Lavandulae 1,0
Spiritus diluti (0,892) 70,0

Formamidum. Formamid HCONH_2 ist Ameisensäure, in welcher die OH Gruppe durch den Amid-Rest- NH_2 ersetzt ist Mol-Gew = 45

Darstellung Man erhitzt 2 Th Ammoniumformiat mit 1 Theil Harnstoff



so lange auf 140° , als noch Ammoniumcarbonat entweicht, und destillirt alsdann im Vacuum ab

Eigenschaften Farblose oder schwach gelbliche, sirupöse, geruchlose Flüssigkeit, mit Wasser und Weingeist in jedem Verhältnisse mischbar Gegen Lackmuspapier von sehr schwach saurer Reaktion Destillirt im Vacuum unzersetzt bei 150° , unter gewöhnlichem Druck siedet es bei $192\text{--}195^\circ$, dabei zum Theil in Ammoniak und Kohlensäure zerfallend

Entwickelt mit konc Kalilauge schon in der Kälte Ammoniak Es löst Quecksilber oxyd auf Es sei beim Erhitzen völlig flüchtig, mit 10 Th Wasser verdünnt rüthe es blaues Lackmuspapier nur ganz schwach

†† **Hydrargyrum formamidatum solutum** Quecksilberformamidlösung

Darstellung. Man löst 10 g Mercurchlorid in Wasser und fällt aus dieser Lösung durch Zusatz überschüssiger Natronlauge Quecksilberoxyd Dieses wird unter Vermeidung von Verlusten so lange ausgewaschen, bis es vollkommen frei von Chlor ist, dann noch im feuchten Zustande in der gerade hinreichenden Menge Formamid unter Erwärmen auf $80\text{--}100^\circ$ gelöst, die Lösung verdünnt, filtrirt und auf 1 Liter aufgefüllt

Eigenschaften Farblose, schwach alkalische Flüssigkeit von wenig metallischem Geschmack Wird in der Kälte durch ätzende Alkalien nicht verändert, beim Erwärmen dagegen erfolgt Reduktion zu metallischem Quecksilber Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium scheiden schwarzes Mercurisulfid aus Erweisslösung wird nicht gefällt Die Lösung enthält das Salz $(\text{HCONH})_2\text{Hg}$ neben freiem Formamid

Prüfung Die Lösung reagire nicht sauer Auf vorsichtigen Zusatz von Kaliumjodid entstehe wohl Gelbfärbung, aber kein Niederschlag

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, sehr vorsichtig

Anwendung Zu subkutanen Injektionen bei Syphilis 1 cem der Lösung enthält die 0,01 g Mercurchlorid entsprechende Menge Quecksilber

Acidum gallicum.

Acidum gallicum (Brit Helv U-St Ergänzb) **Acide gallique** (Gall) **Gallussäure.** Sal essentielle Gallarum. Trioxybenzoesäure. Gallic acid. $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 188. In vielen Pflanzenstoffen, z B Galläpfeln, Sumach, Dividivi, Bärentraubenblättern und im chinesischen Thee, meist mit Gerbsäure zusammen, vorkommend.

Darstellung 10 Th Gallusgerbsäure (Tannin) werden in einem Kasserol aus Porzellan mit 10 Th Wasser und 50 Th verdünnter Schwefelsäure (oder mit 80 Th Wasser

und 80 Th Salzsäure von 1,123 spec Gew) $\frac{1}{4}$ Stunde lang gekocht und alsdann 1—2 Tage an einem kühlen Ort gelassen. Die ausgeschiedenen Krystalle werden in der 6fachen Menge destillirtem Wasser unter Erwärmen gelöst, diese Lösung mit etwas Thierkohle erhitzt, heiss filtrirt und zum Krystallisiren an einen kühlen Ort gebracht. Nöthigenfalls ist das Umkrystallisiren und die Behandlung mit Thierkohle zu wiederholen. Eisen ist bei der Darstellung sorgfältig fern zu halten.

Eigenschaften. Farblose oder schwachgelbliche, seideglänzende, geruchlose Nadeln oder trikline Prismen, von zusammenziehendem, sauerlichem Geschmack. Löslich in 125 Th kaltem, 8 Th siedendem Wasser, in 5 Th kaltem oder 1 Th siedendem Alkohol, in 40 Th Aether oder in 12 Th Glycerin, wenig löslich in Chloroform, Benzol oder Benzin. Sie enthalten rund 9,6 Proc Krystallwasser, welches bei 100° abgegeben wird. — Die Gallussäure beginnt bei 220° C zu schmelzen, und zerfällt bei weiterem Erhitzen in Kohlensäure und Pyrogallol. Lösungen der Gallussäure in überschüssigem Alkali nehmen aus der Luft rasch Sauerstoff auf und färben sich roth bis braun, bis schwarz. Tropft man eine Gallussäurelösung zu Kalkwasser, so entsteht eine Trübung, welche nach kurzer Zeit grau, grün und dunkler wird. Die wässrige Lösung reducirt Silbernitrat, dagegen nicht die Fehling'sche Lösung. Fügt man sie zu Ferrichloridlösung, so erfolgt theilweise Reduktion zu Ferrochlorid, und es entsteht ein schwarzblauer Niederschlag, der von überschüssigem Ferrichlorid mit grünlicher Farbe gelöst wird. Eine Lösung von oxydfreiem Ferrosulfat wird durch Gallussäure nicht verändert, an der Luft wird die Mischung (in Folge Oxydation) lasurblau, worauf schwarzblauer Niederschlag entsteht ohne Entfärbung der Flüssigkeit.

Gallussäure erzeugt in Lösungen von Alkaloiden, Eiweiss, Leim, Brechweinstein keine Niederschläge (Unterschied von Gerbsäure).

Ihrer Konstitution nach charakterisirt sie sich als „Trioxybenzoesäure“, ihre nähere

Formel ist daher $\text{C}_6\text{H}_2 \begin{matrix} \text{OH} \\ \text{OH} \\ \text{OH} \end{matrix}$ Sie ist eine einbasische Säure, ihre Salze heissen „Gallate“
 CO_2H

Nur die Salze der Alkalien sind in Wasser löslich.

Prüfung. 1) 1 g hinterlasse beim Verbrennen keinen Rückstand. 2) Die mit heissem Wasser bereitete Lösung 1/20 sei klar und fast farblos, sie werde durch Baryumchlorid nicht getrübt (Schwefelsäure) und durch Leimlösung nicht gefällt (Gerbsäure).

Aufbewahrung. Lichtschutz ist vom Ergänz. vorgeschrieben, aber nicht unbedingt erforderlich. Man schütze sie vor ammoniakalischen Dämpfen.

Anwendung. Gallussäure wirkt örtlich adstringirend, aber, weil sie Eiweiss nicht fällt, weniger energisch als Gerbsäure, sie wird auch aus dem gleichen Grunde besser und länger vertragen wie diese. Die entfernte Wirkung ist die gleiche wie die der Gerbsäure, weil letztere im Organismus zu Gallussäure umgewandelt wird. Man giebt sie innerlich 2—3 mal täglich zu 0,1—0,6 g in Pulvern oder Pillen bei Diabetes, Albuminurie, Lungenblutungen. Aeusserlich bei aphthösen Geschwüren (1:50), Blutungen. Bei Alkaloidvergiftungen kann sie die Gerbsäure nicht ersetzen. Technisch in der Photographie als Entwickler und in der Tintenfabrikation.

Glycerinum Acid. gallici (U-St.)
 Glycerine of Gallic acid
 Rp Acid. gallici 1,0
 Glycerini 5,0

Mixtura contra albuminuriam. GAILLOIS

Rp Acid. gallici 0,5
 Aquae destillatae 70,0
 Symp. Sacchari 30,0

Theelöffelweise in 1 Tage zu verbrauchen

† **Gallanolum.** $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3\text{CONHOC}_6\text{H}_5 + 2\text{H}_2\text{O}$ Gallanol (Gallinol korrumpt!) Gallussäureanilid. Gallanilid. Mol Gew = 281. Zur Darstellung erhitzt man 10 Th Gallussäure mit 8—10 Th Anilin (Anilin für Blau) eine Stunde lang (im Oelbade!) bei 150° C. Man kocht alsdann die Reaktionsmasse mit stark verdünnter Salzsäure, um das überschüssige Anilin herauszulösen, mehrmals aus. (Salzsaures Anilin bleibt in Lösung!) Die beim Erkalten sich abscheidenden Krystalle werden gesammelt und mehrmals aus siedendem Wasser umkrystallisirt.

Farblose Krystalle, in kaltem Wasser fast unlöslich, sehr leicht löslich in Alkohol und Aether sowie in heissem Wasser. Aus Wasser krystallisirt die Verbindung mit 2 Mol

Krystallwasser Sie schmilzt im wasserfreien Zustande bei 205°C Die wässrige Lösung färbt sich mit Eisenchlorid blauschwarz In ätzenden Alkalien ist Gallanol leicht löslich unter Spaltung in Anilin und gallussaures Alkali Daher erfolgt bald Braun- und Schwarzfärbung der Lösung Die Lösung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig rothe Färbung an

Anwendung Als Ersatz des Pyrogallols bei Hautkrankheiten (Psoriasis, Favus, Prurigo), da es weniger reizt und auch wenig giftig ist Auf Wunden reizt es Die alkoholische Lösung zur Desinfektion der Hände der Operateure Vorsichtig aufzubewahren

Gallieinum Gallussäuremethylether $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3\text{CO}_2\text{CH}_3$ Mol Gew = 184 Zur Darstellung sättigt man eine Lösung von 1 Th Gallussäure (oder Gerbsäure) in 8—4 Th Methylalkohol mit trockenem Salzsäuregas Nach mehrtägigem Stehen verdampft man die Lösung bis zur Syrupkonsistenz Den Rückstand mischt man mit kalkfreiem Baryumcarbonat und zieht alsdann das Gemisch mit Methylalkohol aus

Aus Methylalkohol krystallhart, farblose, wasserfreie Prismen, aus Wasser feine, verfilzte Nadeln Löslich in heissem Wasser, in Alkohol und in Aether Wird durch ätzende Alkalien unter Bräunung zerlegt Schm P 202° Die Lösung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig rothe Färbung an

Als Antiseptikum bei Augenkrankheiten, wie Conjunctivitis Das specifisch leichte Pulver wird mit dem Pinsel direkt aufgestäubt

Gallobromolum Dibromgallussäure $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 346 Zur Darstellung reibt man 1 Th Gallussäure mit 2,5 Th Brom zusammen und krystallisiert das Reaktionsprodukt aus siedendem Wasser um

Farblose Nadeln oder prismatische Blätter, welche bei 120° wasserfrei werden und bei 150° schmelzen Löslich in etwa 8 Th Wasser von 15° , leicht löslich in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid schön violett gefärbt Die Lösung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig-rothe Färbung an Innerlich als Ersatz der Alkalibromide in Tagesgaben von 2—3 g in wässriger Lösung mit einem säuerlichen Sirup Ausserlich die 1—2proc Lösung zu Einspritzungen bei Gonorrhoe und Umschlägen bei Eczema madidum Vor Licht geschützt aufzubewahren

Acidum hydrobromicum.

I † Acidum hydrobromicum Bromwasserstoffsäure (Germ Brit Helv U-St), Acide bromhydrique (Gall) Bromhydric acid Hydrobromsäure. HBr. Mol. Gew. = 81. Die wasserfreie Bromwasserstoffsäure ist gasförmig (officiell in Gall) und findet als solche keine medicinische Verwendung Als „Bromwasserstoffsäure“ im Sinne der Pharmacie und Therapie sind wässrige Lösungen des Bromwasserstoffgases zu verstehen Diese sind aufgenommen von Brit Gall Germ Helv U-St, aber in den einzelnen Pharmacopöen von verschiedenem Gehalt an HBr

Darstellung. I Von gasförmigem Bromwasserstoff

In ein mit einem Kugeltrichter B versehenes Kölbchen A (Fig 12) bringt man 1 Th amorphen Phosphor sowie 2 Th Wasser Den Kugeltrichter beschickt man mit 10 Th Brom und lässt dieses nun langsam tropfenweise (I) in den Kolben einfließen Jeder einfallende Tropfen verursacht im Anfang eine von Lichterscheinung begleitete

Verpuffung Sobald erst eine gewisse Menge Bromwasserstoff gebildet ist, löst sich das weiter zufließende Brom ruhig auf und Bromwasserstoff entweicht Man leitet diesen, um Bromdämpfe zurückzuhalten, durch eine mit feuchten Glasscherben und gelbem Phosphor gefüllte U-Röhre C und kann den so gereinigten Bromwasserstoff über Quecksilber auffangen,




Fig 12

natürlich auch in Wasser einleiten. Das Trocknen erfolgt durch Schwefelsäure oder glasige Phosphorsäure



II. Von wässriger Bromwasserstoffsäure

a) Man löst 50 Th krystall Baryumbromid ($\text{BaBr}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$) in 100 Th Wasser und versetzt diese Lösung unter kräftigem Umrühren mit einer Mischung aus 15 Th konc Schwefelsäure und 30 Th Wasser. Der entstandene Niederschlag wird abfiltrirt und mit 30 Th Wasser gewaschen. Die gesammelten und gemischten Filtrate destillirt man aus einem Kolben oder einer Retorte. Bis 120°C destillirt eine sehr dünne, oberhalb 120°C eine konzentrierte Säure,



welche durch Verdünnen mit Wasser oder mit dem ersten Destillat (bis 120°C) auf das geforderte spec Gewicht eingestellt wird

b) Man übergiesst 60 Th grob gepulvertes Kalumbromid mit einer Mischung von 50 Th konc Schwefelsäure und 25 Th Wasser, fügt 2 Th amorphen Phosphor hinzu und destillirt ab. Das Destillat wird zur Oxydation der mit übergangenen schwefligen Säure vorsichtig bis zur eben bleibenden Gelbfärbung mit Bromwasser versetzt, alsdann fällt man die Schwefelsäure aus durch Zusatz von wenig Baryumkarbonat oder Baryumbromid. Die nach dem Absetzen klar abgessene Säure wird rektifizirt. Man erhält etwa 150 Th 25 proc reiner Säure.

Die Darstellung im pharmaceutischen Laboratorium ist materiell nicht lehnend. Die Technik erhält grosse Mengen Bromwasserstoff als Nebenprodukt bei Bromirungen. Sie führt diesen in Baryumbromid über und gewinnt daraus nach IIa wässrige Bromwasserstoffsäure.

Eigenschaften a) der gasförmigen Bromwasserstoffsäure. Farbloses, wie Chlorwasserstoff riechendes Gas, an der Luft Nebel bildend. Wird bei -78°C zu einer farblosen Flüssigkeit verdichtet, welche bei -87°C erstarrt. In Wasser sehr leicht löslich. Das spec Gewicht des Gases ist = 2,9703, 1 Liter wiegt bei 0°C und 760 mm Barometerstand = 3,6167 g. Die Gall beschreibt das Gas als „Acide bromhydrique gazeuse“.

b) Wässrige Bromwasserstoffsäure. Der Gehalt der Bromwasserstoffsäure ist nach den verschiedenen Pharmakopöen verschieden. *Acidum hydrobromicum* (Germ.) enthält 25 Proc HBr, spec. Gew. = 1,208. *Acidum hydrobromicum dilutum* (bromhydric acid) (Brit. Helv. U-St.), *Acide bromhydrique dissous* (Gall.) enthalten 10 Proc HBr, spec. Gewicht 1,077. Von dem spec Gewicht und dem verschiedenen Gehalt an Bromwasserstoff abgesehen, haben die genannten Präparate gleiche Eigenschaften.

Farblose, sehr sauer schmeckende Flüssigkeit, welche blaues Lackmuspapier röthet, mit Ammoniakdämpfen dicke weisse Nebel bildet. Destillirt man dünne wässrige Lösungen von Bromwasserstoff, so geht zunächst eine sehr verdünnte Säure über, der Siedepunkt steigt allmählich, bei 127°C geht eine Säure über ($\text{HBr} \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$), welche konstant 47,5 Proc HBr enthält. Wird eine sehr konzentrierte Lösung von Bromwasserstoff destillirt, so entweicht zunächst gasförmiger Bromwasserstoff HBr, bis die Säure nur noch die Koncentration von 47,5 Proc. HBr hat, und dann destillirt dieses Hydrat über. Durch Luft und Licht wird die Bromwasserstoffsäure unter Gelbfärbung und Auftreten von freiem Brom zersetzt. Bromwasserstoffsäure ist eine einbasische Säure, ihre Salze heissen „Bromide“. Man beachte, dass die pharmaceutische Nomenklatur der Salze von der chemischen abweicht.

Es benennen die Salze

der Chemiker
der Pharmaceut

KBr

Kalumbromid
Kalium bromatum

KBrO_3

Kalumbromat
Kalium bromicum

Volumgewicht und Gehalt der Bromwasserstoffsäure

bei 15° C Nach J. BIEL

Proc	Spec Gew	Proc	Spec Gew	Proc	Spec Gew	Proc	Spec Gew
1	1 0082	13	1 102	25	1 209	37	1 338
2	1 0155	14	1 110	26	1 219	38	1 350
3	1 0230	15	1 119	27	1 229	39	1 362
4	1 0305	16	1 127	28	1 239	40	1 375
5	1 038	17	1 136	29	1 249	41	1 388
6	1 046	18	1 145	30	1 260	42	1 401
7	1 053	19	1 154	31	1 270	43	1 415
8	1 061	20	1 163	32	1 281	44	1 429
9	1 069	21	1 172	33	1 292	45	1 444
10	1 077	22	1 181	34	1 303	46	1 459
11	1 085	23	1 190	35	1 314	47	1 474
12	1 093	24	1 200	36	1 326	48	1 490

Analyse a) Erkennung Man erkennt die Bromwasserstoffsäure an folgenden Reaktionen

1) Erwärmt man die freie Säure mit etwas Braunstein oder Salpetersäure oder fügt man Chlorwasser zu, so wird Brom in Freiheit gesetzt, welches von Chloroform mit rothbrauner Farbe gelöst wird (Fornichlorid setzt kein Brom in Freiheit!) 2) Auf Zusatz von Silbernitrat entsteht ein gelblichweisser, käsiger Niederschlag von Silberbromid AgBr, unlöslich in Salpetersäure, schwerlöslich in Ammoniak, lichtempfindlich

b) Bestimmung Ist die Säure rein und in freiem Zustande vorhanden, so titirt man mit Normal Kali und Phenolphthalein 1 cem Normal-Kalilauge zeigt 0,081 g Bromwasserstoff an Man kann auch mit überschüssiger Silbernitratlösung unter Erwärmen und Zusatz von wenig Salpetersäure fällen und das ausgewaschene Silberbromid wägen (Auch für die löslichen Bromide zu verwenden) Das erhaltene AgBr mit 0,4308 multipliziert giebt die Menge der vorhandenen Bromwasserstoffsäure, HBr, an

Aufbewahrung In Gefässen mit Glasstopfen, vor Licht und ammoniakalischer Luft geschützt Vorsichtig! In einer ammoniakhaltigen Atmosphäre setzt sich an Hals und Stopfen Ammoniumbromid an

Prüfung 1) Sie sei ohne Rückstand flüchtig Ein hinterbleibender wagbarer Rückstand wäre zu prüfen, ob er glühbeständig ist oder nicht In letzterem Falle könnte er aus Ammoniumbromid bestehen, welches in Folge Einwirkung ammoniakalischer Luft entstanden war 2) Die bis auf einen Gehalt von 5 Proc HBr verdünnte Säure werde durch Schwefelwasserstoff weder sofort (Metalle, Arsen) noch nach Uebersättigung mit Ammoniak (Eisen, Zink) verändert, auch durch Baryumnitrat nicht getrübt (Schwefelsäure) 3) Schüttelt man 5 cem der unverdünnten Säure mit Chloroform, so darf sich dieses nicht violett färben, auch nicht nach Zusatz von einem Tropfen Fornichloridlösung (Jod) 4) Verdünnt man 6—12 Tropfen der Säure mit 2 cem Wasser, fällt mit Silbernitrat vollständig aus, giebt 7—10 cem Ammoniumkarbonatlösung hinzu und schüttelt kräftig, so darf die nach 5 Minuten abfiltrirte Flüssigkeit nach dem Uebersättigen mit Salpetersäure nicht bis zur Undurchsichtigkeit getrübt werden (Chlorwasserstoff)

10,0 g der 10procentigen Bromwasserstoffsäure sättigen 12,35 cem Normal-Kalilauge
10,0 g der 25procentigen Bromwasserstoffsäure sättigen 30,86 cem Normal-Kalilauge

Gelbgewordene Bromwasserstoffsäure. Ist die Gelbfärbung durch freies Brom bedingt, so lässt sie sich durch blosse Destillation nicht beseitigen In diesem Falle fügt man tropfenweise vorsichtig so viel einer sehr verdünnten Lösung von schwefliger Säure zu, bis die Säure eben farblos geworden ist Dann destillirt man ab und verwirft das Destillat solange, als es, mit Bromwasser bis zur Gelbfärbung versetzt, durch Baryumchlorid beim Aufkochen noch getrübt wird, also noch schweflige Säure enthält Ist dieses nicht

mehr der Fall, so fangt man die nunmehr übergehenden Antheile gesondert auf und verdünnt sie bis zum geforderten spec Gewicht. Den Vorlauf kann man mit Bromwasser versetzen und durch Neutralisiren mit Baryumkarbonat auf Baryumbromid verarbeiten.

Dispensation. Beim Mischen mit anderen Flüssigkeiten ist die Bromwasserstoffsäure stets als letzter Bestandtheil zuzugeben, weil sonst die nach der Bromwasserstoffsäure benutzten Gefässe durch Bromwasserstoff verunreinigt werden. Man beachte, dass nur die Germ eine 25procentige Bromwasserstoffsäure vorschreibt, dass Brit, Gall, Helv, U-St nur die verdünnte Bromwasserstoffsäure mit 10 Proc HBr aufgenommen haben.

Anwendung. Die unverdünnte (25 proc) Säure wirkt auf Haut und Schleimhäute ätzend, man benutzt sie daher bisweilen unverdünnt als Aetzmittel bei Mercurial-Stomatitis. Zu Aetzungen bei Diphtherie 1:10 verdünnt. Innerlich als Ersatz des Bromkaliums, wenn man dessen Nebenwirkungen und die Kalhwirkung vermeiden will, 8—6mal täglich 8—12—15 Tropfen der 25procentigen Säure (oder die $2\frac{1}{2}$ -fache Menge der 10procentigen) in starker Verdünnung mit Zuckerwasser etc. bei Epilepsie, Nervosität, Neurasthenie, Chorea. Helv giebt als höchste Gaben für die 10procentige Säure 1,5 g pro dosi und 5,0 g pro die an.

II Acidum hydrobromicum Fothergill, eine aus Kalumbromid und Weinsäure „ex tempore“ herzustellende Bromwasserstoffsäure, welche noch Kalumbitartrat gelöst enthält. Man vermischt eine Lösung von 10 Th Kalumbromid in 30 Th Wasser mit einer Lösung von 12 Th Weinsäure in 30 Th Wasser, lässt das Gemisch mindestens 24 Stunden an einem kühlen Orte stehen und filtrirt vom ausgeschiedenen Weinstein aus. Das Präparat enthält annähernd 10 Proc Bromwasserstoff, HBr, ausserdem noch Kalumbitartrat.

Pharmacopoeia hydrobromicae

Kali bromat	5,0
Acidi hydrobromici (85%)	10,0
Glycerini	6,0
Boli albae	6,0
Fulvis radices Liquiritiae	
Fulvis succi Liquiritiae R. G.	

Quant. p. l. 240, dispensatur ad vitrum

Acidum hydrochloricum.

Die Salzsäure des Handels stellt Lösungen des Chlorwasserstoffgases in Wasser dar. Man unterscheidet 1) reine Salzsäure, 2) rohe Salzsäure. Ausserdem werden die einzelnen Sorten nach dem Procentgehalt an Chlorwasserstoff HCl, bez. nach dem spec Gewichte bezeichnet.

I Acidum hydrochloricum gasiforme. Gasförmige Salzsäure. HCl. Mol. Gew. = 36,5. Wird in der Regel durch Erhitzen von Natriumchlorid (Kochsalz) mit einer mässig verdünnten Schwefelsäure dargestellt. Als Apparat kann man den zur Bereitung des Spiritus Dzondi abgebildeten, s. Ammonium, benutzen. Geeignete Mischungen sind 1) Kochsalz in groben Krystallen (I) 10 Th, konc Schwefelsäure 18 Th, Wasser 4 Th. 2) 15 Th Kochsalz, 25 Th konc Schwefelsäure und 8 Th Wasser. 3) 4 Th Kochsalz, 5 Th, konc Schwefelsäure, 4 Th Wasser. Das entwickelte Gas ist unter allen Umständen durch Einleiten in wenig Wasser zu waschen. Zum Zwecke des Trocknens leitet man es gewöhnlich durch konc Schwefelsäure, seltener über Calciumchlorid.

Zur Herstellung kleiner Mengen Salzsäuregas kann man sich folgenden stationären Apparates bedienen. Man füllt den Kolben a etwa zur Hälfte mit rauchender Salzsäure an. Den Tropftrichter b beschickt man mit concentrirter Schwefelsäure. Lässt man letztere tropfenweise zu der rauchenden Salzsäure zufließen, so erhält man einen ausgiebigen Strom von Salzsäuregas. Der Apparat kann längere Zeit stationär gehalten werden. Figur 18.

Farbloses, an der Luft Nebel bildendes Gas von stechend saurem Geruch und Geschmack, in Wasser sehr leicht und reichlich löslich 1 Liter Wasser löst bei 20° C = 460 Liter Chlorwasserstoffgas 1 Liter Chlorwasserstoff wiegt bei 0° C und 760 mm B = 1 6352 g Es kann bei -4° C durch einen Druck von 25 Atmosphären oder bei +10° C durch 40 Atmosphären zu einer Flüssigkeit kondensiert werden 1500 g Kochsalz geben 986 g oder 572 Liter gasförmigen Chlorwasserstoff Diese Menge würde hinreichen, um mit 2,808 Liter Wasser eine 25procentige Salzsäure zu liefern

II. † Wasserige Salzsäure Lösungen des Chlorwasserstoffs in Wasser **Acidum hydrochloricum** (Brit Germ Helv U-St) **Acidum hydrochloricum concentratum** (Austri) **Acide chlorhydrique officinale** (Gall) **Acidum hydrochloratum**. **Acidum muriaticum**. **Hydrochlorsäure**. **Chlorwasserstoffsäure**. **Salzsäure**

Die von den einzelnen Pharmakopöen recipirte Säure ist von verschiedener Stärke Es schreiben vor

	Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U St
Spec. Gewicht	1,120	1,160	1,171	1,124	1,184	1,168
Procentgehalt HCl	23,86	31,79	34,4	25,0	26,0	31,9

Eine klare, farblose, und wenn die Säure mehr als 28 Proc Chlorwasserstoff enthält, an feuchter Luft rauchende Flüssigkeit von ätzend saurem Geschmack und saurem Geruch Unterwirft man wässerige Lösungen des Chlorwasserstoffes von weniger als 20 Proc Gehalt an HCl der Destillation, so destillirt zunächst eine sehr dünne Salzsäure über Bei 110° C destillirt konstant eine Salzsäure mit einem Gehalt von 20,17 Proc Chlorwasserstoff (HCl) über Unterwirft man umgekehrt Salzsäure von einer höheren Konzentration als 20 Proc der Destillation, so entweicht zunächst gasförmiger Chlorwasserstoff, bis die rückständige Säure nur noch 20,17 Proc HCl enthält, dann destillirt die vorerwähnte Säure mit einem Gehalte von 20,17 Proc HCl über — Diese bei 110° C konstant destillirende (d h bei 760 mm B) Salzsäure hat das spez Gew 1,104 und entspricht dem Hydrat $\text{HCl} + 8\text{H}_2\text{O}$




Fig 13

Prüfung. Die mit dem 5—10fachen Volumen Wasser verdünnte Säure darf 1) durch Zinkjodidstärkelösung nicht gebläut werden (Chlor) 2) Durch Schwefelwasserstoff nicht verändert werden (Metalle, z B Cu, Pb, As) 3) Durch Baryumnitratlösung auch nach Zusatz von Jodlösung bis zur schwach gelben Färbung nicht getrübt werden (Schwefelsäure, schweflige Säure) 4) Durch Kaliumferrocyanidlösung nicht verändert werden (Eisen) 5) 10 cem der Säure dürfen beim Abdampfen in einer Platinschale einen wägbaren glühbeständigen Rückstand nicht hinterlassen (unorganische Verunreinigungen) 6) Prüfung auf Arsen a) Wird 1 cem Salzsäure mit 3 cem Zinnchlorürlösung versetzt, so darf innerhalb einer Stunde eine Färbung nicht eintreten b) Handelt es sich um eine einwandfreie Prüfung auf Arsen, so bringt man 100—200 cem mit absolut arsenfreiem Zink in einen ordnungsmässigen Manss'schen Apparat und prüft in diesem Wenn sich nach 6—10stündigem Erhitzen des Glührohrs ein Arsenspiegel nicht abgeschieden hat, kann die Säure praktisch als arsenfrei angesehen werden 8) unter Arsenum 7) Gehaltsbestimmung Man titirt mit Normal-Kohlauge und Phenolphthalein als Indikator 1 cem Normal-Kohlauge sättigt 0 0365 g HCl, 5 g Salzsäure verbrauchen demnach

bei einem Gehalt von Proc HCl	25	23,86	31 9	31 79	34 4
ccm Normal-KOH	34 24	32 68	43,7	43 55	47 1

Aufbewahrung. Man bewahrt die Salzsäure an einem kühlen Orte vorsichtig, grössere Vorräthe, namentlich der mehr als 25 Proc HCl enthaltenden, auch zweckmässig vor Licht geschützt auf. Werden grössere Vorräthe im Ballon bezogen, so empfiehlt es sich, den Inhalt desselben sogleich nach der Ankunft in mehrere grössere Flaschen zu vertheilen. Die Aufbewahrungsgefässe müssen Glasstopfen haben und sollten zweckmässig aus einem widerstandsfähigen (Kali-)Glase bestehen. In der Officin bewahrt man die Salzsäure in einem besonderen Säureschränken auf. Die Schilder der Aufbewahrungsgefässe sind zweckmässig in radirter Schrift herzustellen. Man beachte, dass Salzsäuredämpfe die Emaille, namentlich auch die rothe Schrift der Emaille Schilder stark angreifen. Man hüte sich auch, Salzsäure und Ammoniak in räumlicher Nähe zusammen aufzustellen. In diesem Falle nämlich bildet sich sehr bald an dem Halse des Salzsäuregefässes eine Krystallisation von Salmiak, die für gewisse Zwecke störend ist.

Anwendung. Unverdünnte Salzsäure wirkt auf Haut und Schleimhaut ätzend und bringt, in den Magen gebracht, heftige Magenentzündung hervor. Gegenmittel: Erweiss, Milch, Seife, Magnesia, weniger zweckmässig Alkalikarbonate. In starker Verdünnung wirkt sie kontrahirend auf die Gewebe, gährungs- und fäulnisswidrig. Man verwendet sie Aeusserlich als Aetzmittel fast nicht mehr, nur noch selten in Pinselsäften bei entzündlichen Processen des Zahnfleisches (Stomatitis), als Zusatz zu reizenden Fussbädern. Innerlich in starker Verdünnung (0,5 — 1,0 200) als ein die Verdauung beförderndes und den Darm desinfectirendes Mittel bei ausserordentlich zahlreichen Krankheiten.

Dispensation. Ist Salzsäure als Bestandtheil von Mixturen etc. verordnet, so soll sie stets der sonst fertigen Mixtur etc. als letzter Bestandtheil zugesetzt werden s. S. 54.

Volumgewicht der Salzsäure bei 15°

nach LUNGE und MARCHLEWSKI

Spec. Gew. bei 15°	Procente HCl	Spec. Gew. bei 15°	Procente HCl	Spec. Gew. bei 15°	Procente HCl	Spec. Gew. bei 15°	Procente HCl
1 000	0 16	1 060	12 19	1 115	22 86	1 160	31 52
1 005	1 15	1 065	13 19	1 120	23 82	1 168	32 10
1 010	2 14	1 070	14 17	1 125	24 78	1 165	32 49
1 015	3 12	1 075	15 16	1 130	25 75	1 170	33 46
1 020	4 13	1 080	16 15	1 135	26 70	1 171	33 65
1 025	5 15	1 085	17 13	1 140	27 66	1 175	34 42
1 030	6 15	1 090	18 11	1 1425	28 14	1 180	35 39
1 035	7 15	1 095	19 08	1 145	28 61	1 185	36 31
1 040	8 16	1 100	20 01	1 150	29 57	1 190	37 23
1 045	9 16	1 105	20 97	1 152	29 95	1 195	38 16
1 050	10 17	1 110	21 92	1 155	30 55	1 200	39 11
1 055	11 18						

III. Acidum hydrochloricum dilutum (Austr., Brit., Belg., Germ., U. St.) Verdünnte Salzsäure. Eine durch Verdünnung der concentrirten Säure mit Wasser herzustellende klare, farblose Flüssigkeit. Die einzelnen Pharmacopöen schreiben verschiedenen Gehalt an Chlorwasserstoff vor:

	Austr.	Brit.	Germ.	Belg.	U.-St.
Spec. Gew. bei 15° C.	1,062	1,062	1,061	1,048	1,050
Procentgehalt an HCl	12,4	10,58	12,5	10,0	10,0

IV. † Acidum hydrochloricum fumans Reine rauchende Salzsäure. Mit diesem Namen wird im Handel eine Salzsäure vom spec. Gewicht 1,195 mit 33,2 Proc. Gehalt an Chlorwasserstoff bezeichnet. Eine farblose, an der Luft stark rauchende Flüssigkeit. Sie findet Verwendung in der analytischen sowie synthetischen Chemie (Inversion nach CHABREY), ferner zur Darstellung gasförmiger und absolut arsenfreier Salzsäure. Die Dämpfe dieser Säure sind ein schlimmer Feind der Emailleschrift.

V † Absolut arsenfreie Salzsäure Zur toxikologischen Analyse bedarf man einer von Arsen absolut freien Salzsäure. Wir empfehlen, diese wie folgt darzustellen.

In einen Destillationskolben mit Glasstopfen bringt man 1 Liter reine rauchende Salzsäure (1,195 spec Gew.) sowie 80 g trockenes Ferrochlorid. Man erhitzt die Säure und leitet die zunächst entweichenden Dämpfe, mit welchen sich alles vorhandene Arsen als Arsentrichlorid $AsCl_3$ verflüchtigt, zur Absorption in eiskaltes Wasser. Die so erhaltene Säure kann man zur Füllung von Schwefelwasserstoff- oder Kohlensäure Apparaten u. dergl. verwenden. Wenn kein Gas mehr entweicht, sondern wässrige Salzsäure übergeht, lässt man (um den Apparat durchzuspülen) die Destillation kurze Zeit gehen, wechselt alsdann die Vorlage und fängt das Destillat auf, bis im Kolben ein Rückstand von 100–150 cm übrig bleibt, welchen man verwirft.

Die so gewonnene Salzsäure enthält etwa 20 Proc HCl . Sie ist absolut arsenfrei, dagegen enthält sie eine Spur Ferrichlorid, welche aber beim Arsennachweis nicht stört.

Es empfiehlt sich, diese Säure nicht allzu lange aufzubewahren, da sie schliesslich aus den Aufbewahrungsgefassen doch wieder Spuren von Arsen aufnimmt. Wir bereiten sie etwa alle Monate einmal frisch. Ueber die Prüfung auf Arsen s. S. 55 u. unter Arsenum.

VI † Acidum hydrochloricum crudum (Ergänz.) **Rohe Salzsäure.** *Acide chlorhydrique du commerce* (Gall.) *Crude hydrochloric acid.* *Spiritus Salis*. Die rohe Salzsäure des Handels, meist ein Nebenprodukt der chemischen Grossindustrie, z. B. des Sodaprocesses nach *LEBLANC*.

Eine klare, mehr oder weniger gelbe, an der Luft rauchende Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,16–1,17, entsprechend 80–88 Proc HCl . Die Verunreinigungen bestehen in Eisen, Thonerde, Schwefelsäure, Schwefligsäure, Chlorarsen. Wird 1 ccm der Säure mit 3 ccm Zinnchlorürlösung versetzt, so darf nicht sofort Braunfärbung eintreten, sonst wäre der Arsengehalt zu hoch. Kleine Mengen von Arsen enthält jede Salzsäure des Handels, obgleich es eine Kleinigkeit wäre, das Arsen der Hauptsache nach auch aus dieser Sorte abzuscheiden.

Dispensation. Rohe Salzsäure wird zu vielen technischen und häuslichen Verrichtungen im Handverkaufe gefordert. — Man gebe sie in diesen Fällen niemals in Gefässen ab, welche im gewöhnlichen Leben bestimmungsgemäss zur Aufnahme von Nahrungsmitteln etc. dienen, also niemals in Tassenköpfen, Schnaps- oder Trinkgläsern, sondern lediglich in Flaschen aus starkem Glase, welche mit der Aufschrift „Salzsäure, Gift“ signirt werden.

Erkennung und Bestimmung. Man erkennt die freie Salzsäure an der sauren Reaction, an ihrer Eigenschaft, bei Annäherung von Ammoniakdampf weisse Nebel zu bilden, ferner (in einiger Concentration) mit Braunstein erwärmt Chlor zu entwickeln. Sie ist flüchtig und kann durch Destillation von anderen, nicht flüchtigen Säuren getrennt werden. Die wichtigste Reaction ist die, dass Salzsäure im freien sowie im gebundenen Zustande mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag von Chlorsilber giebt, welcher in stark verdünnter Salpetersäure unlöslich, in Ammoniak aber leicht löslich ist. — Das Chlorsilber schmilzt beim Erhitzen, ohne seine Zusammensetzung zu ändern, zu farblosem Hornsilber, während Cyansilber dabei in metallisches Silber und Cyan zerfällt.

Die Bestimmung der freien Salzsäure erfolgt in der Regel massanalytisch durch Titiren mit Normalkalilauge und Phenolphthalein als Indikator. 1 ccm Normalkalilauge neutralisirt = 0,0865 g Chlorwasserstoff, s. S. 55. Die Bestimmung der Salzsäure im freien und gebundenen Zustande erfolgt durch Fällung mit Silbernitrat in folgender Weise.

Die klare wässrige Lösung, welche nicht mehr als etwa 0,15 g Cl enthalten sollte, wird in der Kälte (!) mit einer durch Salpetersäure angesäuerten Lösung von Silbernitrat in mässigem Ueberschuss versetzt. Man erwärmt alsdann auf dem Wasserbade (nicht über 60°) und rührt dabei mit einem dünnen Glasstabe so lange um, bis das Chlorsilber sich völlig zusammengeballt hat, und die darüber stehende Flüssigkeit klar ist. Hierauf lässt man an einem dunklen Orte erkalten, filtrirt das Chlorsilber ab, wäscht es zunächst mit Salpetersäure enthaltendem, schliesslich mit reinem Wasser aus, bis das Filtrat durch eine Spur Salzsäure nicht mehr getrübt wird, und trocknet es.

Die Bestimmung der Menge des Chlorsilbers kann geschehen Gewichtsanalytisch

a) Durch Wägung auf gewogenem Filter oder im Gooch'schen Tiegel

b) Durch Wägung des geschmolzenen Chlorsilbers im Porzellantiegel In diesem Falle bringt man die Hauptmenge des getrockneten Chlorsilbers auf ein Uhrglas und verbrennt das Filter vollständig (l) in einem gewogenen Porzellantiegel Nach dem Erkalten tropft man auf den Rückstand etwas Salpetersäure, bringt nach der erfolgten Auflösung des Silbers Salzsäure in einem Ueberschuss hinzu und dampft zur Trockne Hierauf bringt man die Hauptmenge des Chlorsilbers von dem Uhrglas in den Tiegel, und erhitzt über mässiger Flamme bis zum beginnenden (l) Schmelzen $\text{AgCl} \times 0,25435 = \text{HCl}$ oder $\text{AgCl} \times 0,24788 = \text{Cl}$

c) Man kann auch das vom Chlorsilber möglichst befreite Filter in einem Rose'schen Tiegel völlig (l) verbrennen, alsdann das Chlorsilber dazu bringen und nun das gesammte Chlorsilber im Wasserstoffstrom zu metallischem Silber reduciren $\text{Ag} \times 0,89796\% = \text{HCl}$ oder $\text{Ag} \times 0,828708 = \text{Cl}$

Massanalytisch können Chlorwasserstoffsäure und Chloride nach MOHR und nach VOLHARD bestimmt werden

a) Nach MOHR Voraussetzung ist hierbei, dass die zu bestimmende Lösung völlig neutral ist und ausser Chlor keinen anderen Bestandtheil enthält, welcher mit Silbernitrat eine unlösliche Verbindung eingeht Ebenso müssen Substanzen abwesend sein, welche etwa Chlorsilber in Lösung überführen Dies vorausgesetzt ist wie folgt zu verfahren Man bringt eine gemessene oder gewogene Menge der zu prüfenden Lösung in ein (ERLENMEYER-)Kölbehen, fügt 3–4 Tropfen Kaliumchromatlösung hinzu und lässt unter Umschwenken so lange von einer $\frac{1}{10}$ -Normal-Silbernitratlösung zufließen, bis die ursprünglich immer wieder verschwindende rothe Färbung des entstehenden Silberchromates eben gerade bestehen bleibt 1 cem $\frac{1}{10}$ -Normal-Silbernitratlösung zeigt 0,00865 g HCl oder 0,00855 g NaCl oder 0,00855 g Cl an

b) Nach VOLHARD Diese Bestimmungsart des Chlors hat vor der vorigen den Vortheil, dass sie in salpetersaurer Lösung ausgeführt wird Man bedarf dazu

1 Silbernitratlösung $\frac{1}{10}$ -Normal, 17 g Silbernitrat in 1 Liter enthaltend

2 Ammoniumrhodanatlösung $\frac{1}{10}$ -Normal Man löst 7,5–8,0 g Ammoniumrhodanat zu 1 Liter auf und stellt die Lösung so ein, dass, wenn man 10 cem der $\frac{1}{10}$ -Normal-Silbernitratlösung mit einigen Tropfen Eisenaunlösung versetzt, genau 10 cem der Ammoniumrhodanatlösung erforderlich sind, um Rothfärbung hervorzubringen

3 Eisenaunlösung, d. i. eine bei gewöhnlicher Temperatur gesättigte Lösung von Ferriammoniumsulfat, welches chlorfrei sein muss

Zur Ausführung der Bestimmung lässt man zu der zu untersuchenden Lösung, welche mit einer chlorfreien Salpetersäure angesäuert ist, eine gemessene und zwar überschüssige Menge der Silberlösung zufließen, schwenkt um, fügt 1–2 cem der Eisenaunlösung hinzu und lässt nun solange von der Rhodammoniumlösung unter Umschwenken zulaufen, bis eine schwache Rothfärbung der Lösung bestehen bleibt Die Differenz zwischen der zugesetzten Silbernitratlösung und der verbrauchten Ammoniumrhodanatlösung ist auf Chlor zu berechnen 1 cem $\frac{1}{10}$ -Silbernitratlösung oder $\frac{1}{10}$ -Ammoniumrhodanatlösung ist = 0,00865 HCl oder 0,00855 Cl

Beispiel Es wurden 40 cem Silbernitratlösung zufließen gelassen, alsdann wurden zum Zurücktitriren 13,7 cem Ammoniumrhodanatlösung verbraucht Mithin sind von dem vorhandenen Chlor (40 minus 13,7) 26,3 cem Silberlösung verbraucht worden. Der Gehalt der Lösung an Cl beträgt $26,3 \times 0,00855 \text{ g} = 0,0224865 \text{ g Cl}$, an HCl demnach $26,3 \times 0,00865 = 0,0227295 \text{ g HCl}$

Toxikologisches. Tödliche Vergiftungen durch Salzsäure in Folge Verwechslung oder Selbstmord werden häufig beobachtet In der Regel ist der Verlauf nicht so rasch, dass nicht Gegenmittel angewendet werden könnten Ist dieses geschehen, also z. B. der Magen ausgepumpt worden, oder hat man zur Abstumpfung der Säure Alkalien (MgO) gereicht, so ist der Versuch, in den Leichentheilen freie Salzsäure nachzuweisen, einfach aussichtslos In diesem Falle wird man sich darauf beschränken müssen, wenn es verlangt werden sollte, den Gesamtgehalt an Chloriden nach S 57 u 58 festzustellen

In Erbrochenem, Speiseresten, Magenflüssigkeit dagegen wird man mit dem Nachweis der Salzsäure Erfolg haben können Man kann a) direkt mit Normalkalklauge und Methylorange als Indikator titriren oder b) einen Theil der Organeile mit Wasser destilliren und in dem Destillat die freie Salzsäure mit Kalklauge und Methylorange oder mit Silbernitrat nach VOLHARD titriren, oder c) die Objekte mit Alkohol in der Kälte ausziehen oder mit Wasser dialysiren und in aliquoten Theilen des Auszuges oder Dialysates die vorhandene freie Säure acidimetrisch bestimmen

Indessen sei man in den Schlussfolgerungen, welche man aus den erhaltenen Resultaten zieht, sehr vorsichtig

Gargarisma hydrochloricum RICORD
 Rp Acidi hydrochlorici (25%) 2,0
 Mellis rosati 50,0
 Aquae destillatae 200,0
 Bei Stomatitis aphthosa und mercurialis

Limonade chlorhydrique (Gall)
 Rp Acidi hydrochlorici (25%) 8,0
 Aquae destillatae 895,0
 Sirupi Sacchari 125,0

Mixtura Acidi hydrochlorici (Form Berol)
 Rp Acidi hydrochlorici (25%) 1,0
 Tincturae Aurantii 5,0
 Sirupi Sacchari 20,0
 Aquae destillatae q. n. ad 300,0
Pediluvium hydrochloricum
 Rp Acidi hydrochlorici crudi 50,0
 Aquae tepidae 5 Liter

In Gefäßen aus Holz oder Steingut anzuwenden
 Das Fußbad darf nicht über die Kniehöf. reichen

Tinctura amara acida (Form Berol)
 Rp Acidi hydrochlorici 5,0
 Tincturae amarae 25,0

Liquor antihydrocricus Brandau. Gegen Fusseschwanz. Angebl. aus gechlorten Äthern bestehend, enthält Salzsäure (von 25,0 Proc) 75 Th, Alkohol 25 Th, Glycerin 1 Th, Chloralhydrat 1 Th Mit Lackmus tingirt

Unguentum contra perlonos KAPLER.
 Rp Ol. Amygdalarum 30,0
 Ceræ flavae 2,0
 Cetacei 4,0
 Balsami Peruviani 2,0
 Acidi hydrochlorici (25%) 6,0

8 Frostsalbe

Vet Liquor ad potum antisepticum
 Rp Acidi hydrochlorici (25%) 500,0
 Limaturae ferri 5,0
 Aquae 1000,0
 Salls culinariae 25,0

Bei Maulfäule oder Maulseuche des Rindviehes
 1 Tassenkopf zu 8 Liter Wasser zumischen,
 oder soviel, dass dies nur schwach säuerlich
 schmeckt

Vet Loto muratica
 Rp Ammonii chlorati 20,0
 Acidi hydrochlorici 10,0
 Aquae 600,0

Zu Waschungen auf Steingallen der Pferde

Acidum hydrocyanicum.

†† **Acidum hydrocyanicum** (Ergänzb) Blausäure. Cyanwasserstoff(säure)
Acidum hydrocyanicum dilutum (Brit U-St) Acide cyanhydrique au 100e (Gall)
Hydrocyanic acid. **Acidum Borussicum.** **Acidum zoticum.** Preussische Säure. HCN
 (HCy) Mol. Gew. = 27.

Wässrige Lösungen der Blausäure waren früher auch in den verschiedenen deutschen Ländern officinell, jetzt werden sie in Deutschland kaum noch angewendet. Das Ergänzb., die Brit und U-St führen unter obigem Namen eine 2procentige, die Gall eine 1procentige Blausäure auf.

Darstellung In ein Destillationskölbchen von etwa 200 cem Fassungsraum, welches einerseits gasdicht an einen LIEBIG'schen Kühler angeschlossen, und in welches ausserdem





Fig 14

noch ein Tropftrichter eingesetzt ist, bringt man 20 g grob zerriebenes Kaliumferrocyanid sowie 40 g Wasser. Dann legt man eine 60 g destilliertes Wasser enthaltende Vorlage so

vor, dass der Schnabel des Abzugsrohres in das vorgelegte Wasser eben eintaucht, schliesst den Kühler dicht an das Destillationskölbchen an, schliesst den Hahn des Tropftrichters und giesst in den letzteren eine Mischung von 10 g reine Schwefelsäure und ebenso viel Wasser. Nachdem man sich nochmals überzeugt hat, dass der ganze Apparat ordnungsmässig zusammengesetzt ist und die Kühlung gut funktioniert, lässt man die Säuremischung durch den Tropftrichter zufließen und schliesst den Hahn sofort wieder.

Man sorgt dann durch vorsichtiges Bewegen des Destillationskolbens für gute Vertheilung des Inhaltes und setzt alsdann die Destillation durch Erhitzen in Gang. Man destillirt so lange, bis der Rückstand in dem Kolben noch feucht ist.

Nach beendigter Destillation wird das Destillat sorgfältig gemischt, dann bestimmt man in einem kleinen Theile desselben den Blausäuregehalt in der unter Aqua Amygdalarum amararum angegebenen Weise und stellt das Destillat auf den beabsichtigten Blausäuregehalt (von 1% oder 2% s. oben) ein. Nachdem dies geschehen, füllt man das Präparat sofort in mehrere kleine braune Gläser ein, die im Keller wohlverschlossen bez. in einem Giftschrank aufbewahrt werden.



Die ganze Operation muss unter einem gut wirkenden Abzuge (oder im Freien) ausgeführt werden. Man hüte sich, Blausäuredämpfe, etwa durch Hineinriechen in den Kolben, einzuathmen.

Darstellung 2procentiger Blausäure extempore. a) Man löse 1,5 (ein und ein halbes) Gramm reines Kaliumcyanid in 31,0 (einhundertsechzig) Gramm verdünntem Weingeist und füge der Lösung 3,5 g gepulverte Weinsäure hinzu. Nach gutem Umschütteln stelle man 2 Stunden zum Absetzen an einen kalten Ort und filtrire. Das Filtrat enthält 2 Proc HCN und bedarf einer Blausäurebestimmung nicht. b) Man mische 7,4 g Salzsäure (25 Proc) mit 52,6 g destillirtem Wasser, setze 6 g Silbercyanid hinzu, schüttle etwa 10 Minuten gut durch und filtrire. Auch dieses Präparat bedarf einer Feststellung des Blausäuregehaltes nicht.

Eigenschaften. Die reine wasserfreie Blausäure ist eine farblose, bewegliche Flüssigkeit von betäubendem, bittermandelblartigem Geruch, welche schon in Spuren eigenthümlich ein eigenthümliches Kratzen im Schlunde erzeugt. Spec. Gew. 0,6969 bei 18°, Siedep. = 26,5° C. Erstarrt bei -15° C zu farblosen, federförmigen Krystallen. Diese Säure ist nicht Gegenstand des pharmaceutischen Verkehrs. Sie ist eins der furchtbarsten Gifte.

Die medicinische Blausäure der Pharmakopöen ist eine klare, farblose, in der Wärme völlig flüchtige, Lackmus schwach und vorübergehend röthende Flüssigkeit von eigenthümlich bittermandelblartigem, etwas kratzendem Geruch. Ihr Gehalt an Cyanwasserstoff schwankt je nach den einzelnen Pharmakopöen zwischen 1 und 2 Procent. — Das spec. Gewicht der 2procentigen Säure ist = 0,997.

Anwendung. In Deutschland wird Blausäure nur selten medicinisch verwendet. Gelegentlich wird sie einmal zur Vergiftung von Warmblüthern gefordert, hier aber zweckmässig durch Kaliumcyanid ersetzt. Ihr therapeutischer Werth beruht auf der beruhigenden Wirkung auf das Nervensystem. Man giebt die 2procentige Säure innerlich zu 1/4—1 Tropfen — aber stets in gehöriger Verdünnung! — bei Erkrankung des Darmkanals, der Athmungswerkzeuge, des Herzens, bei Nervenleiden, Krebschmerzen. Aeusserlich in wässriger Lösung 1:20 als Waschwasser bei Krebsgeschwüren, bei juckenden Hautkrankheiten, als Augenwasser. Als höchste Gaben nehme man von der 2proc. Blausäure 0,05 g pro dosi und 0,20 g pro die an.


Gegengift. Blausäure wirkt als heftiges Gift. Die Wirkung erfolgt nicht bloss nach Aufnahme durch den Magen, sondern auch nach dem Einathmen der Blausäure und von der Blutbahn aus. Man hüte sich also Blausäure in offene Wunden gerathen zu lassen. Auch von Schleimhäuten aus erfolgt Resorption. Der Tod erfolgt gewöhnlich so schnell, dass Gegenmittel zu spät kommen. Als Gegenmittel werden angeführt: 1) Chlorwasser. 2) Chlorkalklösung 4:0 200:0 mit einigen Tropfen Salzsäure versetzt. 3) Wasserstoff-superoxyd. 4) Begrossung des Körpers mit kaltem Wasser, innerlich Excitantien wie

starker Kaffee, ferner Opium, Morphinum, äusserlich Senfpflaster Der Tod kann blitzartig schnell, aber auch erst nach $\frac{1}{2}$ —1 Stunde und längerer Zeit eintreten

Aufbewahrung. Blausäure zersetzt sich insbesondere unter dem Einfluss von Luft und Licht — um so leichter, je concentrirter sie ist — unter Bildung von Ammoniumformiat, Cyansäure, Kohlensäure Sie trübt sich dabei, und es entstehen braune Abscheidungen Man bewahrt sie daher in kleinen Flaschen (von 5—10 cem Fassungsraum) vor Licht geschützt und ausserdem unter den direkten Giften auf Bei der Dispensation belfeissige man sich, genau zu wägen, wenn nothig stelle man Verdünnungen her, auf der anderen Seite verwalde man für jede Verordnung ein frisches Glaschen des Vorathes Die Recepte sind als Giftschein zurückzuhalten Eine Reiteration darf ohne neue Verordnung des Arztes nicht stattfinden Im Handverkaufe darf die Säure nicht abgegeben werden, bez nur für technische Zwecke an zuverlässige Personen gegen ordnungsmässigen Giftschein

Analyse. a) Erkennung Man erkennt die Blausäure an folgenden Reaktionen

1) Silbernitrat erzeugt in den Lösungen der freien Blausäure (und ihrer Alkalisalze) weisse käsige Niederschläge von Silbercyanid AgCN , die in kalter verdünnter Salpetersäure unlöslich sind, von Ammoniakflüssigkeit schwierig, von Kaliumcyanid leicht gelöst werden Das Silbercyanid färbt sich am Lichte nicht und zerfällt beim Glühen in Cyan $[(\text{CN})_2]$ und metallisches Silber (Unterschied vom Silberchlorid) Kocht man Silbercyanid mit 25 proc Salpetersäure, so löst es sich und krystallisiert aus der erkaltenden Lösung in Prismen (Fig 15 2) Fügt man zu einer Lösung von freier Blausäure etwas Ferrosulfatlösung, welcher ein Tropfen Ferrichloridlösung zugesetzt ist, so entsteht keine Veränderung Setzt man hierzu Natronlauge, so entsteht ein missfarbiger Niederschlag Giebt man nach einigen Minuten Salzsäure bis zur stark sauren Reaktion zu, so lösen sich die Eisenhydroxyde auf und es scheidet sich entweder sogleich oder nach einiger Zeit Beihnerblau ab 3) Vermischt man eine Blausäure oder eine Cyanalkali enthaltende Lösung — bei Anwesenheit freier Blausäure nach Zusatz eines Tropfens schwacher Kali- oder Natronlauge — mit soviel gelbem Schwefelammonium, dass die Flüssigkeit gelblich erscheint, erwärmt im Wasserbade und dampft zur Trockne, so hat sich nunmehr ein Rhodan(Schwefelcyan)-Salz gebildet Löst man den Rückstand in wenig Wasser, säuert mit Salzsäure schwach an, filtrirt und fugt etwas Ferrichlorid hinzu, so färbt sich die Lösung blutroth (durch Ferrirhodan)



Ag Cy

Fig 15

b) Quantitativ Man fällt die Blausäure durch einen Ueberschuss von Silbernitrat unter Zusatz von etwas Salpetersäure als Silbercyanid, wäscht dieses aus und wägt es nach dem Trocknen bei 100° auf gewogenem Filter oder im Gooch'schen Tiegel ($\text{Ag ON} \times 0.2015 = \text{HCN}$) oder man führt es durch Glühen im Porzellantiegel in metallisches Silber über ($\text{Ag} \times 0.25 = \text{HCN}$)

Ueber die maassanalytische Bestimmung der Blausäure s bei *Aqua Amygdalarum amararum*

Behufs Trennung der Cyanwasserstoffsäure von Chlorwasserstoff, fällt man beide zunächst gemeinschaftlich mit Silbernitrat, trocknet den Silberniederschlag bei 100° und wägt Alsdann erlützt man einen aliquoten Theil des Silberniederschlags im Porzellantiegel zum Schmelzen, fügt nach dem Erkalten verdünnte Schwefelsäure und Zink zu, filtrirt die Flüssigkeit ab und bestimmt im Filtrat das Chlor durch Fällung mit Silbernitrat als Silberchlorid Die Differenz der beiden Silberniederschläge ist = dem vorhandenen Silbercyanid.

Toxikologisches. Der Nachweis der Blausäure in Organtheilen oder Objekten lässt sich nur eine beschränkte Zeit lang führen, daher ist die Untersuchung, wenn sie gefordert werden sollte, mit thunlichster Beschleunigung auszuführen

Vorprüfung (Schonbein's Probe) Man bringt das zerkleinerte Objekt in ein Becherglas oder ein weithalsiges Gefäss, säuert es mit Weinsäure an, hängt in das später zu verschliessende Gefäss ein angefeuchtetes Stück Guajak-Kupfer-Papier und stellt das Ganze an einen warmen Ort Wenn nach mehrstündigem Stehen das Papier keine Blaufärbung aufweist, so ist weder freie Blausäure noch ein Cyanid (ausgenommen Merkuri-

cyand) anwesend Ist dagegen Blaufärbung eingetreten, so ist möglicherweise Blausäure zugegen Indessen kann die Blaufärbung auch durch andere Stoffe, wie Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, Chlor, salpetrige Säure bedingt worden sein

Das Guajak-Kupfer-Papier wird bereitet, indem man Filterpapier mit einer frisch bereiteten alkoholischen Lösung von Guajakharz (1 100) tränkt, bei Lichtabschluss trocknet und kurz vor dem Gebrauch mit einer wässrigen Kupfersulfatlösung 1 10000 befeuchtet

Haupt-Nachweis Bevor man zum Nachweis der Blausäure durch Destillation schreitet, hat man sich zu vergewissern, dass ungufige Cyanverbindungen, welche beim Destilliren mit Sauren Cyanwasserstoff liefern, wie gelbes und rothes Blutlaugensalz, nicht zugegen sind Man bereitet also einen wässrigen Auszug des Objektes, säuert ihn mit Salzsäure an und versetzt einen Theil mit Ferrosulfat, einen anderen mit Ferrichloridlösung Entsteht durch keines dieser Reagentien Blaufärbung oder blauer Niederschlag, so sind Blutlaugensalze nicht zugegen Endlich vergewässert man sich durch Versetzen des Auszuges mit etwas gelbem Schwefelammonium, dass Nitroprussidials nicht zugegen ist Bei Abwesenheit desselben tritt Violettfärbung nicht ein

Man säuert alsdann das Objekt mit Weinsäure an und destillirt unter guter Kühlung im Wasserdampfströme ab, indem man das Ablaufrohr in einige cem sehr stark verdünnte Kalilauge eintauchen lässt Da die Hauptmenge der Blausäure in die ersten Antheile des Destillates übergeht, so fängt man das Destillat fraktionirt auf, sammelt und prüft z B die zuerst übergelenden 3 cem besonders — Man stellt zweckmässig die Rhodan- und die Berlinerblau-Reaktion an Tritt die letztere sogleich oder nach einiger Zeit ein, so ist die Anwesenheit von Blausäure in dem Destillat erwiesen

Ist durch die Vorprüfung die Anwesenheit von Ferrocyaniden oder Ferriocyaniden festgestellt worden und handelt es sich darum, neben diesen noch freie Blausäure oder leicht lösliche giftige Cyanide nachzuweisen, so verfährt man zweckmässig nach JACQUEMIN Die zu untersuchenden Massen werden zerkleinert und mit Wasser angerührt Alsdann fugt man Natriumbikarbonat in starkem Ueberschuss hinzu und erhitzt in einem Rundkolben über freiem Feuer bis zur beginnenden Destillation Findet sich nach längerem Erhitzen in der Vorlage Blausäure, so ist erwiesen, dass neben Ferrio- und Ferriocyaniden auch noch Blausäure oder giftige Cyanide zugegen sind

Cyanquecksilber geht bei der Destillation mit stark verdünnten Säuren keine Blausäure Ist also auf dieses Rücksicht zu nehmen, so versagen die bis jetzt angegebenen Methoden Man erhält aber auch aus dem Cyanquecksilber die Blausäure in freiem Zustande, wenn man nach JACQUEMIN mit folgender Abwechslung arbeitet Man rührt das Objekt mit Wasser und reichlichen Mengen Natriumbikarbonat an, fügt 5–10 cem gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser hinzu und destillirt Die Blausäure des Cyanquecksilbers geht in das Destillat

Bestimmung Soll die Blausäure bestimmt werden, so scheidet man sie nach einer der im Vorstehenden angegebenen Methoden durch Destillation ab und fängt das Destillat in Kaliumsulfidlösung auf, so dass die Blausäure in Schwefelcyankalium verwandelt wird Nach beendigter Destillation entfernt man das überschüssige Kaliumsulfid durch Schütteln mit Bleiglätte, filtrirt vom Schwefelblei ab, wäscht das Filter sorgfältig nach, füllt zu einem bestimmten Volumen auf und bestimmt in einem aliquoten Theil der Lösung die vorhandene Rhodanwasserstoffsäure nach VOLHARD, d h man säuert mit Salpetersäure an, lässt einen Ueberschuss $\frac{1}{10}$ -Normal Silbernitratlösung zufließen, fügt Eisensalanilösung hinzu und titirt nun mit $\frac{1}{10}$ -Rhodanammoniumlösung bis zur eben bleibenden Rothfärbung Die Anzahl der Kubikcentimeter der zugesetzten Silbernitratlösung minus der Anzahl der Kubikcentimeter der verbrauchten Rhodanammoniumlösung $\times 0,0027$ g giebt die Menge der in dem Versuch gefundenen Blausäure an [MAISEL]

Vapor Acidii hydrocyanici

(Brit 1885)

Inhalation of Hydrocyanic acid

Rp Acidii hydrocyanici (2%) 0,6–0,9
Aqueae destillatae 4,0

Zur Füllung des Inhalationsapparates

Tinctura Chloroformi et Morphinæ composita

(Brit)

Compound Tincture of Chloroform and Morphine

Rp Chloroformii 75,0 cem
Morphini hydrochloridi 10,0 g
Acidii hydrocyanici diluti (2%) 50,0 cem
Tincturae Capsici 25,0 cem
Tincturae Cannabæ indicæ 100,0 cem
Olei Menthae piperitæ 1,5 cem
Glycerini 250,0 cem
Spiritus (spec Gew 0,84) q s ad 1 Liter

Acidum hydrofluoricum.

I. † Acidum hydrofluoricum (seu hydrofluoratum). *Acide hydrofluorique. Hydrofluoric acid. Flusssäure Fluorwasserstoff(säure).* HFl oder HF . Mol. Gew. = 20.

Die wasserfreie Fluorwasserstoffsäure HF ist ein farbloses Gas, welches, mit der Haut in Berührung gebracht, höchst schmerzhaft Wunden verursacht. Das Einathmen des Dampfes ist tödtlich. Dieses Gas wird wohl in der reinen Chemie dargestellt und angewendet, ist aber nicht Gegenstand des Handelsverkehrs. Unter „Fluorwasserstoffsäure oder Flusssäure“ schlechthin, wird die wässrige Auflösung dieses Gases verstanden.

Im Handel unterscheidet man *Acidum hydrofluoricum medicinale* mit 80 Proc HF , *Acidum hydrofluoricum fumans* mit 40 Proc HF und *Acidum hydrofl. concentratissimum* mit 55 Proc HF .

Darstellung. In der bleiernen Retorte *a*, auf welche ein Blei-Helm *bb'* aufgekittet ist, wird Calciumfluorid (Flussspath) mit einem Ueberschuss von conc. Schwefelsäure erhitzt $\text{CaF}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CaSO}_4 + 2\text{HF}$. Die entweichenden Dämpfe von Fluorwasserstoff gehen in die Vorlage *def*. Diese ist gleichfalls aus Blei hergestellt. In ihr befindet sich — etwas seitlich von der Mündung der Röhre aufgestellt, damit die Säure nicht bleihaltig wird — eine mit Wasser gefüllte Platinschale. Das Wasser absorbiert die Fluorwasserstoffdämpfe, die Luft entweicht durch das Rohr *g*. Zur Reinigung destillirt man die so gewonnene Säure aus Platin-Retorten. Bei 120° geht konstant eine Säure mit 86 bis 88 Proc HF über, spec. Gewicht derselben 1,15.




Fig. 18

Eigenschaften. Eine farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit, welche etwa 80 Proc HF enthält. Die Säure greift Glas und Porzellan stark an, indem sie die Kieselsäure in Siliciumfluorid verwandelt. Sie ist eine einbasische Säure, die Salze heissen „Fluoride“. Das spec. Gewicht dieser 80 procentigen Säure, welche auch als „medicinale“ Sorte anzusehen ist, beträgt 1,115.

Prüfung. 1) Sie sei in 1–2 cm dicker Schicht farblos. 2) 10 cem sollen beim Verdampfen in einer Platinschale weniger als 0,001 g Rückstand hinterlassen. 3) Die mit der 25fachen Menge Wasser verdünnte und mit Salzsäure versetzte Fluorwasserstoffsäure darf innerhalb 5 Minuten durch Baryumchloridlösung nicht getrübt werden (Schwefelsäure). 4) Die mit der 5fachen Menge Wasser verdünnte Säure werde weder durch Schwefelwasserstoff (Arsen, Blei), noch nach Neutralisation mittels Ammoniak durch Ammoniumsulfid (Eisen, Zink) oder Natriumphosphat (Magnesium, Aluminium) verändert. Die Gehaltsbestimmung kann durch Tituliren mit Normal-Lauge und Phenolphthalein geschehen. Und zwar benutzt man als Titrirgefäße Bechergläser, welche mit festem Paraffin ausgegossen sind, und zum Rühren Stäbe aus Hartgummi. 1 cem Normal-Kallauge zeigt 0,02 g Fluorwasserstoff HF an.

Aufbewahrung. Diese erfolgt (ebenso die Versendung) in Flaschen aus Hartgummi mit aufschraubbarem Deckel an einem kühlen Orte, aber nicht auf werthvollem Glas- oder Porzellanmaterial, weil die Hartgummi-Flaschen bisweilen undicht werden. Zweck mässig werden sie in einen grösseren irdenen Topf eingesetzt, welcher mit feuchtem Sand gefüllt ist.

Anwendung. Therapeutisch ist die Fluorwasserstoffsäure in stark verdünntem Zustande (1:5000 bis 6000) in besonderen Räumen zu Inhalationen gegen Diphtherie und Tuberkulose empfohlen worden. Technisch, besonders im Dampfzustande zum Ätzen von Glas, ferner in der analytischen Chemie zum Aufschliessen der Silikate. In der Spiritus brennerei als Zusatz zur gährenden Maische, um Milchsäurebildung zu verhindern.

Glasätzfarbe. I Ammonii hydrofluorici 80,0, Aquae 15,0, Acidi sulfurici conc 6,0 werden in einem Bleiflaschchen gemischt und auf 40° (nicht höher) erwärmt. Nach dem Abkühlen fügt man hinzu Acidi hydrofluorici fumantis 6,0 und Mucilaginis Gummi arabici q s.

II Ammonii hydrofluorici, Baryi sulfurici ää 10,0 im Porzellanmörser innig verreiben, dann in einer Platinschale (oder Gummischale oder Bleischale) mit soviel Acidi hydrofluorici vermischen, dass zum Schreiben geeigneter Brei entsteht (Diat M). Man schreibt mit jeder dieser Tinten mittelst Gänse- oder Stahlfeder, lässt 1–2 Minuten einwirken, spült mit Wasser ab und reibt mit Druckerschwärze ein.

Analyse. 1) Freie Fluorwasserstoffsäure hat die Eigenschaft, Kieselsäure aufzulösen, sowie Silikate zu zersetzen. 2) Baryumchlorid erzeugt in den Lösungen der Säure (oder der Fluoride) einen voluminösen, weissen Niederschlag von Baryumfluorid BaF_2 , unlöslich in Ammoniak, löslich in viel Salzsäure oder Salpetersäure. 3) Calciumchlorid fällt aus den Lösungen der Säure (oder der Fluoride) gelatinösen Niederschlag von Calciumfluorid CaF_2 , unlöslich in Ammoniak, löslich in viel heisser Salzsäure. 4) Alle Fluoride geben beim Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure gasförmigen Fluorwasserstoff, welcher Glas ätzt. Diese Eigenschaft lässt sich am elegantesten zeigen, wenn man das Fluorid in einer Platinschale mit concentrirter Schwefelsäure übergiesst, schwach erwärmt und nun über die Schale eine mit Wachs überzogene Glasplatte legt, in deren Wachüberzug Schriftzüge eingeritzt sind. 5) Mischt man ein durch Schwefelsäure zerlegbares Fluorid mit viel Kieselsäure und erwärmt die Mischung mit concentrirter Schwefelsäure, so entwickelt Siliciumfluorwasserstoff SiF_4 als farbloses, an der Luft Nebel bildendes Gas. Hält man in dieses Gas einen an einem Glasstabe hangenden Tropfen Wasser, so erstarrt dieser gallertartig durch ausgeschiedenes Kieselsäurehydrat.

Specifisches Gewicht und Procentgehalt der wässerigen Fluorwasserstoffsäure an Fluorwasserstoff (HF) nach ECKELT

Spec Gew	Proc HF	Spec Gew	Proc HF	Spec Gew	Proc HF	Spec Gew	Proc HF
1 0069	2 32	1 0983	24 42	1 2080	53 72	1 3421	79 51
1 0139	4 04	1 1067	27 20	1 2182	55 87	1 3546	81 66
1 0211	5 76	1 1152	29 98	1 2285	58 02	1 3674	83 81
1 0288	7 48	1 1239	32 78	1 2390	60 17	1 3804	85 96
1 0356	9 20	1 1326	35 15	1 2497	62 32	1 3937	88 10
1 0431	10 92	1 1415	37 53	1 2605	64 47	1 4072	90 24
1 0506	12 48	1 1506	39 91	1 2716	66 61	1 4211	92 39
1 0588	14 04	1 1598	42 29	1 2828	68 76	1 4350	94 54
1 0661	15 59	1 1691	44 67	1 2943	70 91	1 4493	96 69
1 0740	17 15	1 1786	47 04	1 3059	73 06		
1 0820	18 86	1 1883	49 42	1 3177	75 21		
1 0901	21 64	1 1981	51 57	1 3298	77 36		

II † Ammonium hydrofluoricum (sen fluoratum). Fluorwasserstoffsäures Ammon. Fluorammonium. NH_4F Mol Gew. = 37. Die Darstellung erfolgt entweder durch Sublimation eines innigen Gemisches von Natriumfluorid mit Ammoniumchlorid bei etwas über 100° oder durch Sättigen von Fluorwasserstoffsäure mit Ammoniak.

Farblos, in Wasser leicht lösliche Krystalle, in Folge Gehaltes an saurem Ammoniumfluorid ($\text{NH}_4\text{F} \cdot \text{HF}$) in der Regel sauer reagirend. Greift in Substanz und auch in wässriger Lösung Glas an, daher Aufbewahrung in Hartgummiflaschen. Es sei beim Erhitzen in einer Platinschale flüchtig, 1 g hinterlasse nur unwägbaren glühbeständigen Rückstand. Verunreinigung sind meist Blei und Schwefelsäure. Prüfung s. bei Acidum hydrofluoricum.

Anwendung. Bei Hypertrophie der Milz und gegen Kropf. Dosis 0,3–1,25 cem einer 0,75proc Lösung. Technisch in der analytischen Chemie an Stelle der Fluorwasserstoffsäure zum Aufschliessen von Silikaten, ferner zum Glasätzen.

III. † Natrium hydrofluoricum (sen fluoratum). Fluorwasserstoffsäures Natrium. Fluornatrium. Fluorol. Man unterscheidet Natrium hydrofluoricum medicinale (purum) und Natrium hydrofluoricum technicum. NaF . Mol. Gew. = 42.

Darstellung. a) Durch Sättigen von Fluorwasserstoffsäure mit Aetznatron oder Natriumkarbonat und Eindampfen der Lösung b) Technisch Durch Schmelzen von 100 Th Kieselfluornatrium (SiF_6Na_4) und 112 Th Natriumkarbonat, Auslaugen und Eindampfen, oder durch Kochen von geschlämmtem Kryolith mit Natronlauge, wobei sich Natriumfluorid als Krystallmehl abscheidet

Glänzende, wasserfreie Würfel, in 25 Th Wasser löslich, die Lösung reagirt alkalisch Die Krystalle verknistern beim Erhitzen Giebt beim Erhitzen mit konc Schwefelsäure Dämpfe (HF), welche Glas ätzen Das Salz greift auch in Substanz schon Glas an, daher Aufbewahrung in Flaschen aus Hartgummi Anwendung Innerlich in Gaben von 0,005—0,01 g bei Epilepsie, Malaria, Hautkrankheiten, Tuberkulose Aeusserlich in wässriger Lösung von 0,5—10,0 1000,0 g zu Wundverbanden Zu Injektionen bei Vaginitis 0,5—1,0 100,0 Technisch in Spiritusbrennereien, um Milch- und Buttersäuregährung der Maische zu verhindern Auf 1 Hektoliter Maische = 10,0—15,0 NaF zuzusetzen Es wirkt namentlich gegenüber den Fäulnisserregern antiseptisch

IV Calcium fluoricum (seu fluoratum). Fluorcalcium. Flussspat. Fluorit. Spatium fluoricum. CaF_2 Mol Gew = 78.

Kommt natürlich als Flussspat vor Die reinen Sorten werden gepulvert und gelangen als weisses oder gelbliches Pulver in den Handel Sehr schwer löslich in Wasser (1 26000) und in verdünnten Säuren Spec Gew 3 18 Leuchtet beim Erwärmen (daher der Name „Fluorescein“) und schmilzt bei heller Rothgluth Durch konc Schwefelsäure wird es beim Erwärmen in Calciumsulfat verwandelt unter Freiwerden von Fluorwasserstoff Technisch zur Darstellung von Fluorwasserstoffsäure und als Flussmittel Künstlich kann es erhalten werden durch Umsetzen der Lösungen von Calciumchlorid mit Natriumfluorid

Acidum hydrojodicum.

† **Acidum hydrojodicum** (hydrojodatum) Jodwasserstoffsäure. Hydrojodsäure. Acide jodhydrique. Hydrojodic acid. HJ Mol. Gew. = 128. Die wasserfreie Säure wird zu chemischen und analytischen Zwecken benutzt In der Therapie verwendet man unter dem obigen Namen eine 10procentige wässrige Jodwasserstoffsäure

Darstellung. Man giebt zu 100 Th Wasser zunächst 1 Th fein zerriebenes Jod und leitet unter gelegentlichem Umrühren Schwefelwasserstoff ein Unter Bildung von Jodwasserstoff $\text{H}_2\text{S} + \text{J}_2 = 2\text{HJ} + \text{S}$ scheidet sich Schwefel ab Sobald das Jod aufgebraucht ist, fügt man eine neue Menge Jod hinzu, welches sich in der vorhandenen Jodwasserstoffsäure leicht auflöst, und leitet wiederum Schwefelwasserstoff ein Dieses Zusetzen von Jod und Einleiten von Schwefelwasserstoff wird wiederholt, bis 12 Th Jod verbraucht sind, und die Flüssigkeit völlig entfärbt ist — Man filtrirt von dem ausgeschiedenen Schwefel ab, verdrängt den Schwefelwasserstoff durch Erhitzen und bringt die filtrirte Flüssigkeit auf das verlangte spec Gew, oder zweckmässiger, man verjagt den Schwefelwasserstoff durch Erhitzen, destillirt die Säure und bringt das Destillat auf das spec Gew 1 091

Ex tempore Man löst einerseits 17 Th gut getrocknetes Kaliumjodid in 58 Th destillirtem Wasser, andererseits 15 Th Weinsäure in 59 Th destillirtem Wasser Beide Lösungen werden vermischt, die Mischung wird einige Zeit an einen kühlen Ort (Eisschrank) gebracht, schliesslich beseitigt man das ausgeschiedene Kalumbitartrat durch Filtration über Glaswolle Diese Lösung enthält 10 Proc Jodwasserstoff, ausserdem wechselnde Mengen von Kalumbitartrat und ist als BUCHANAN's Jodwasserstoffsäure bekannt

Eigenschaften. Die 10procentige Jodwasserstoffsäure ist eine farblose, saure Flüssigkeit, welche sich unter der Einwirkung von Luft und Licht in Folge Ausscheidung von Jod gelb bis braun färbt Das spec Gew ist = 1 091 Destillirt man die Säure, so geht zunächst eine sehr verdünnte Säure über, bei 127° aber destillirt konstant eine Säure mit 57,5 Proc HJ Jodwasserstoffsäure ist eine einbasische Säure, die Salze heissen „Jodide“.

Jodwasserstoffsäure giebt mit Silbernitrat einen gelben Niederschlag von Silberjodid AgJ , welches sowohl in Salpetersäure als auch in Ammoniak so gut wie unlöslich ist.

Versetzt man sie mit etwas Ferrichloridlösung, so erfolgt Ausscheidung von Jod, welches von Chloroform mit violetter Farbe gelöst wird. Die Bestimmung der freien Säure erfolgt acidimetrisch durch Titriren mit Normal-Kalilauge und Phenolphthaleïn. 1 cem Normal-Kalilauge ist $= 0,128$ g Jodwasserstoffsäure. Gewichtsanalytisch erfolgt die Bestimmung durch Fällung als Silberjodid in der nämlichen Weise wie dies für das Silberchlorid beschrieben ist. Das erhaltene $\text{AgJ} < 0,5447$ giebt die Menge des vorhandenen Jodwasserstoffs an.

Prüfung. 1) Jodwasserstoffsäure sei beim Erhitzen völlig flüchtig. 2) Die mit 5 Th. Wasser verdünnte Säure werde durch Baryumchlorid nicht getrübt (Schwefelsäure). 3) 10 g der 10procentigen Säure erfordern 7,81 cem Normal-Lauge zur Neutralisation.

Aufbewahrung. Vorsichtig, in mehreren kleinen Flaschen mit Glasstopfen, vor Licht geschützt. Zusatz von etwas Silberblech oder -draht verhindert die Jodausscheidung für einige Zeit.

Anwendung. Man giebt Jodwasserstoffsäure als mildes Jodpräparat. Sie reizt nicht wie das Jod, ihr fehlen theilweise die Nebenwirkungen des Kaliumjodids, doch wirkt sie nach der Resorption wie das letztere. Dosis 0,5—2,0 in starker Verdünnung. Unzweckmässiges Präparat wegen der leichten Zersetzlichkeit.

Volumgewicht der Jodwasserstoffsäure bei 15° C (Warenz).

Vol.-Gew.	Proc. HJ	Vol.-Gew.	Proc. HJ	Vol.-Gew.	Proc. HJ
1.000	0	1.187	20	1.438	40
1.045	5	1.289	25	1.533	45
1.091	10	1.296	30	1.650	50
1.188	15	1.361	35	1.700	52

Unter dem Namen Jodwasserstoffsäure versteht der Chemiker das bei 127° C. siedende Hydrat $\text{JH} + 5\text{H}_2\text{O}$, welches das spec. Gew. 1,87 hat und 57,5 Proc. Jodwasserstoff enthält.

Acidum hydro-silicio-fluoricum.




Fig. 17.

Acidum hydro-silicio-fluoricum. **Acidum silicio-hydro-fluoricum.** Kieselfluorwasserstoffsäure. Kieselflussssäure. SiF_4H_2 . Mol. Gew. $= 144$. Wird in wässriger Lösung in der chemischen Analyse gebraucht und zwar besonders zur Trennung des Strontiums vom Baryum, da es mit Baryum eine schwerlösliche Verbindung eingeht.

Darstellung. In einen passenden Kolben A, welcher mit einem zweifach rechtwinkelig gebogenen Gasabzugsrohr versehen ist, bringt man eine Mischung von 10 Th. gepulvertem Calciumfluorid (Fluasspath) und 8 Th. Glaspulver oder Quarzsand, sowie 60 Th. konc. Schwefelsäure und mischt durch Umschwenken. Das Gasabzugsrohr führt

man in eine Vorlage (Flasche oder Cylinder *B*), deren Boden mit einer 1–2 cm hohen Schicht Quecksilber *C* bedeckt ist, so ein, dass das Rohr unter dem Quecksilber mündet. Dann giesst man in die Vorlage (auf das Quecksilber) 40–50 Th Wasser und erhitzt den Kolbeninhalt. Zunächst entweicht Siliciumfluorid SiF_4 , gasförmig $2\text{CaF}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SiO}_2 = \text{SiF}_4 + 2\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Wenn dieses mit Wasser in Berührung kommt, so zerlegt es sich in Kieselfluorwasserstoffsäure und Kieselsäure



Die Kieselfluorwasserstoffsäure löst sich in dem Wasser, die Kieselsäure scheidet sich gallertartig ab. Man muss daher, um diese zu zertheilen, von Zeit zu Zeit umrühren. Ist die Gasentwicklung beendet, so kocht man die Flüssigkeit durch Leinwand, presst die Kieselsäure ab und filtrirt schliesslich die Lösung durch Papier. Die so gewonnene Fluorwasserstoffsäure hat das spec. Gewicht von etwa 1,060–1,065 und enthält rund 6 Proc SiF_2H_2 .

Eigenschaften. Farblose Flüssigkeit, welche, in Plattingefässen erhitzt, ohne Rückstand verdampft. Sie greift Glasgefässe zwar nur mässig, aber immerhin merklich an, verdampft daher in Glas oder Porzellangefässen nicht ohne Rückstand.

Proc SiF_2H_2	0,5	1,0	1,5	2,0	5,0	10,0
Spec. Gew.	1,0040	1,0080	1,0120	1,0161	1,0407	1,0834

Sie ist eine zweibasische Säure, die Salze heissen „Silicofluoride“. Durch Baryumchlorid entsteht in der wässrigen Lösung der Säure ein Niederschlag von Kieselfluor Baryum SiF_2Ba . Werden die Silico-Fluoride der Alkalimetalle erhitzt, so entweicht Siliciumfluorid und es hinterbleiben Alkalifluoride.

Aufbewahrung. In Glasflaschen mit Gummiastopfen, da Glasstopfen eingekittet werden.

Anwendung. Als Reagens in der chemischen Analyse.

Salzer. Unter diesem Namen wurde von England aus (1890) eine 0,6procentige wässrige Auflösung von Natriumsilicofluorid SiF_2Na_2 als ungiftiges Antisepticum an gepriesen. Nach ROHMERS ist es schon in Lösungen 0,2–100,0 wirksam, ohne zu ätzen, solche Lösungen werden zum Auspülen und Ausspritzen von Körperhöhlen empfohlen.

Acidum jodicum.

1. † Acidum jodicum Jodsaure Acide jodique. Jodic acid. $\text{JO}_3\text{H} = 176$.

Nicht zu verwechseln mit dem gleichfalls zu besprechenden Jodsaureanhydrid J_2O_5 .

Darstellung. Man übergiesst in einem geräumigen, langhalsigen Glaskolben oder in einer Retorte 10 Th resublimirtes Jod mit 50 Th reine Salpetersäure von 1,5 spec. Gew. (unter einem Abzuge oder im Freien!) und erwärmt, bis alles Jod in Lösung gegangen ist, und rothe Dämpfe von Stickstoffoxyden nicht mehr entweichen. Man bringt das Reaktionsprodukt, welches aus Jodsaure und einer Lösung derselben in Salpetersäure besteht, in eine Porzellanschale und dampft im Sandbade bei 120–180° zur Trockne. Um jede Spur Salpetersäure zu entfernen, erhitzt man den Rückstand alsdann etwa $\frac{1}{2}$ –1 Stunde auf 200°, löst ihn hierauf — um etwa entstandenes Jodsaureanhydrid in das Hydrat umzuwandeln — in Wasser auf und bringt die Lösung auf dem Wasserbade zur Trockne.

Eigenschaften. Farblose rhombische Krystalle, bez. ein weisses krystallinisches Pulver, in Wasser leicht (1+1), in Alkohol schwieriger löslich. Bei 170° zerfällt die Jodsäure in Wasser und Jodsaureanhydrid; letzteres zerfällt bei 300° in Jod und Sauerstoff.


Die wässrige Lösung röthet blaues Lackmuspapier zunächst und bleicht es dann. Durch Zusatz von Reduktionsmitteln, z. B. schwefliger Säure, Schwefelwasserstoff, Jodwasserstoff, Zinnchlorür, Morphium n. s. w., wird aus der wässrigen Lösung Jod abgeschieden. — Bringt man Jodsäure oder ihr Anhydrid in trockner Form mit brennbaren Substanzen (Phosphor, Schwefel, Kohle, organische Stoffe) zusammen, so erfolgt Entzündung unter Verpuffung.

Sie ist eine einbasische Säure. Ihre Salze heissen „Jodate“ (man achte auf die Abweichung von der pharmaceutischen Nomenklatur!) Ausser den neutralen Salzen bildet sie durch Anlagerung von freier Säure an diese auch noch saure Salze, z. B. Kalumbijodat $KJO_3 + HJO_3$.

Anwendung In der chemischen Analyse besonders zum Nachweis des Morphins. Häufig durch eine Kombination von Kalumjodat (KJO_3) mit Schwefelsäure ersetzt. Therapeutisch als Ersatz des Kalumjodids (Jodkaliums) innerlich in Gaben von 0,1–0,3–0,5 g mehrmals täglich in starker Verdünnung, äusserlich in Salben und Limenten, in Substanz oder 10 proc. Lösung als Aetzmittel.

† **Kalum jodicum** Jodsaures Kalium. Kalumjodat $KJO_3 = 214$. Man beachte die Verschiedenheit der chemischen und pharmaceutischen Nomenklatur! Wird durch Neutralisiren von 176 Th. Jodsäure (JO_3H) mit 69 Th. Kalumkarbonat erhalten. Es krystallisirt aus der wässrigen Lösung in harten, glänzenden, tesseralen Krystallen $JO_3K + \frac{1}{2}H_2O$, letzteres entweicht bei 105° . Löslich in 13 Th. kaltem oder in 8 Th. siedendem Wasser. Wird in der nämlichen Weise angewendet wie das Kalumjodid (KJ) und wie das Kalumchlorat, ist auch therapeutisch mit der gleichen Vorsicht wie letzteres zu behandeln. Dosis 0,2–0,5 g mehrmals täglich.

† **Kalum bijodicum**. Kalumbijodat. Einfachsaures Kalumjodat HJO_3 , $HJO_3 = 300$. Dieses Salz scheidet sich aus, wenn man zu einer heissgesättigten Lösung von 214 Th. Kalumjodat (KJO_3) 176 Th. Jodsäure (JO_3H) fügt. Glänzende, farblose, in Wasser schwer lösliche, rhombische oder monokline Krystalle. Ist von MENCKE in Mischungen mit Kalumjodid (KJ) als Urmaass für Jodometrie empfohlen worden. Die Reaktion verläuft nach der Gleichung:



† **Natrium jodicum**. Jodsaures Natrium. Natriumjodat $NaJO_3 = 199$. Wird wie das vorige durch Neutralisation von 176 Th. Jodsäure mit 59 Th. wasserfreiem Natriumkarbonat dargestellt. Weisses krystallinisches, in 20 Th. Wasser lösliches Pulver. Innerlich als Ersatz des Jodkalis bei Bronchialasthma, Drüsenanschwellungen, neuralgischen Affektionen und Blutungen des Magens. Dosis 1 g pro die. Äusserlich an Stelle von Jodoform und Kalumchlorat.

II † **Acidum jodicum anhydricum** Jodsäure-Anhydrid. Jodpentoxyd $J_2O_5 = 334$. Erhitzt man das Jodsäurehydrat JO_3H auf 200° , so geht es in das Anhydrid J_2O_5 über. Farbloses krystallinisches Pulver, in Wasser löslich unter Uebergehen in das Hydrat JO_3H , unlöslich in absolutem Alkohol, Aether, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Spec. Gew. 4,47. Zersetzt bei 300° in Jod und Sauerstoff. Gibt seinen Sauerstoff an brennbare Körper leicht ab, verpufft daher mit den unter Jodsäure aufgeführten Substanzen. Daher Vorsicht, Jodsäure ist in dieser Hinsicht wie Chlorsäure zu behandeln.

Jodogen. Zur Desinfektion von Wohnräumen etc. bestimmte Räucherkerzen, bestehen aus Kalumjodat (JO_3K) und Kohle und sollen beim Verbrennen Joddämpfe erzeugen.

Acidum lacticum.

Acidum lacticum (Austr. Brit. Germ. Helv. U.-St.) Acide lactique (Gall.) (Gährungs-)Milchsäure. Lactic acid. Aethyliden-Milchsäure. α-Oxy-Propionsäure. $C_3H_5O_3$. Mol. Gew. = 90. Die von den genannten Pharmakopöen aufgenommene Milchsäure ist durchweg von der gleichen Beschaffenheit. Sie soll 75 Proc. reine Milchsäure und 25 Proc. Wasser enthalten.

Darstellung Man löst 3 kg Zucker (*Saccharum album*) und 15 g Weinsäure in 17 Litern warmen Wassers auf und lässt diese Lösung 2 Tage an einem warmen Orte stehen, damit der Rohrzucker invertirt, d. h. in ein Gemenge von Dextrose und Lävulose (In-

vertzucker) umgewandelt werden kann. Alsdann fügt man 100 g alten Käse sowie 1200 g kühliches Zinkoxyd hinzu, welche in 4 Litern saurer Milch vertheilt sind, und lässt das Ganze unter öfterem Umrühren 8–10 Tage bei 30–40° C. stehen. Die Gährung gilt als beendet, wenn die ursprünglich dünnflüssige Masse sich in einen steifen Brei verwandelt. Derselbe besteht aus Krystallen von milchsaurem Zink (Zinklaktat), welchen etwas Mannit beigemischt ist. Man bringt die Masse durch Erhitzen bez. Aufkochen wieder in Lösung, filtrirt und dampft das Filtrat zur Krystallisation ein. Die erhaltenen Krystalle werden durch Umkrystallisiren gereinigt, dann in Wasser gelöst, und die wässrige Lösung nun mit gewaschenem Schwefelwasserstoffgase gesättigt:



Es fällt weisses Zinksulfid (Schwefelzink) aus, die vorher an Zink gebundene Milchsäure wird in Freiheit gesetzt und ist jetzt in wässriger Auflösung vorhanden. Man lässt absetzen, filtrirt vom Zinksulfid ab und dampft die wässrige Milchsäurelösung bis zur Konsistenz eines dünnen Sirups ab. Da der letztere in der Regel noch etwas Mannit und Zinklaktat enthält, so löst man ihn nach dem Erkalten in Aether auf, wobei Zinklaktat und Mannit ungelöst zurückbleiben. Man entfernt darauf den Aether durch Destillation und bringt die ätherfreie Milchsäure durch Eindampfen auf ein spec. Gew. von etwa 1,24, worauf man sie nach dem Erkalten auf das geforderte spec. Gew. von 1,21 bis 1,22 einstellt. (LAUTMANN.)




Fig. 18. a. *Bacillus acidilactici*. b. *Bacillus butyricus*. c. Derselbe in Spindel- und Kaulquappenform. d. Sporen in Keimung begriffen. 1000fache lineare Vergrößerung.




Fig. 19. *Oidium lactis* bei 200facher linearer Vergrößerung.

Nach GADAMER entsteht bei dieser Art der Darstellung neben inaktiver Milchsäure auch rechtsdrehende.

Die Bildung der Milchsäure aus Kohlehydraten ist ein physiologischer Vorgang. Eine Anzahl von Mikroorganismen haben die Fähigkeit, gewisse Kohlehydrate (Milchzucker, Traubenzucker, Rohrzucker, Mannit, Sorbit, Inosit) in Milchsäure zu verwandeln. Diese Umwandlung der Glukose z. B. pflegt man durch die einfache Gleichung: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 2\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ auszudrücken. Zu den erwähnten Organismen gehören sämtliche Eiterpilze, besonders die Staphylokokken, ferner *Bacillus oxytocus perniciosus*, *Bacterium coli commune*, *Bact. lactis aërogenes*, *Bacillus prodigiosus*. Als Milchsäureferment hat *isoxyr* aber gilt der von HUEFFER beschriebene *Bacillus acidilactici* HUEFFER. Dieser bildet kurze, dicke Zellen, welche mindestens $\frac{1}{2}$ mal länger als breit sind und meist zu zwei, seltener zu vier aneinanderhängen. Sie haben keine Eigenbewegung, erzeugen aber Sporen und sind Aëroben, d. h. sie bedürfen zu ihrer Entwicklung Sauerstoff.

Wesentlich für den Eintritt der Milchsäuregährung ist also, dass ein Kohlehydrat (Traubenzucker, Invertzucker) vorhanden ist, welches gespalten werden kann, ferner Milchsäureferment, welches die Spaltung bewirkt. Das Ferment bedarf zu seiner Entwicklung Erweissstoffe, die ihm in Form von Milch dargeboten werden. Ferner ist seine Thätigkeit an eine gewisse Temperatur gebunden. Das Optimum liegt bei 35—42° Oberhalb 45° hört die Gährung auf. Endlich muss die gebildete Milchsäure durch eine Base (ZnO , CaCO_3 , BaCO_3 , NaHCO_3), welche das Ferment nicht tötet oder schwächt, von Zeit zu Zeit neutralisirt werden, da die Gährung sonst stillsteht. Sobald die Milchsäuregährung abgelaufen ist, muss die Flüssigkeit verarbeitet werden, da sonst die gebildete Milchsäure in Buttersäure umgewandelt wird.

Früher wurde die in saurer Milch stets vorkommende „Sprosshefe oder Milchhefe“ (*Oidium lactis* FRANKLIN) als Träger der Milchsäuregährung angesehen, indessen ist diese an der Milchsäuregährung nachweislich unbetheiligt.

Eigenschaften Die officinale Milchsäure enthält neben rund 75 Proc. Milchsäure noch 25 Proc. Wasser. Die in ihr enthaltene Milchsäure ist vorzugsweise die Äthyliden-Milchsäure oder α -Oxypropionsäure $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CO}_2\text{H}$.

Die officinelle Milchsäure ist eine farblose oder schwach gelbliche, rein sauer schmeckende, etwas hygroscopische Flüssigkeit, leicht löslich in Wasser, Alkohol und Aether, nicht löslich in Benzol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Sie ist in der Regel optisch inaktiv, bisweilen auch rechtsdrehend. Auf dem Platinblech erhitzt, verbrennt sie mit bläulicher Flamme, ohne zu verkohlen. Wird sie über die Konzentration von 75% hinaus eingedampft, so entsteht Milchsäureanhydrid $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$, bei 160° geht sie in das Anhydrid (Laktid $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_4$) über, welches destillirt. Sie wird durch Bioacetat nicht gefällt (Unterschied von Äpfelsäure), auch nicht nach Zusatz von Ammoniak (Unterschied von Glykolsäure), durch Kaliumpermanganat wird sie unter Auftreten von Acetaldehyd oxydirt. Kalische Kupferlösung reduziert sie nicht. Sie ist eine einbasische Säure, ihre Salze heißen „Laktate“.

Folgende Reaktion: „Vermischt man 10 ccm einer 4 proc. Karbolsäurelösung mit 20 ccm Wasser und einigen Tropfen Ferrichlorid, so entsteht blauviolette Färbung, welche durch geringe Mengen von Milchsäure in Gelb übergeht,“ wird als charakteristisch für Milchsäure angegeben, entbehrt aber so ziemlich jeder Eigenart, wie denn die Milchsäure überhaupt eine reaktionsarme Säure ist.

Der exakte Nachweis und die Bestimmung der Milchsäure erfolgt am zweckmässigsten durch die Darstellung und Analyse des Zinksalzes. Dieses hat die Zusammensetzung $(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2\text{Zn} + 3\text{H}_2\text{O}$, enthält 27,27 Proc. ZnO und 18,18 Proc. H_2O , und ist löslich in 52 Th. Wasser, unlöslich in Alkohol.

Prüfung 1) Klare Auflösung in einem Gemisch aus gleichen Volumen Weingeist und Aether (Laktate, Mannit, Zucker, Gummi). 2) Mit Zinkoxyd im Ueberschuss versetzt und erwärmt, dann mit absolutem Weingeist extrahirt, darf das abgedampfte Filtrat keinen stüssigen Rückstand hinterlassen (Glycerin). 3) Nach der Uebersättigung mit Kalkwasser darf keine Trübung entstehen (Weinsäure, Phosphorsäure, Oxalsäure), auch nicht beim Erhitzen bis zum Aufkochen (Citronensäure). 4) Völlige Indifferenz gegen Schwefelwasserstoffwasser, auch nach dem Uebersättigen mit Aetzammon (Metalle).

2 g Milchsäure (von 75 Proc. Gehalt) bedürfen zur Neutralisation (Phenolphthaleïn als Indikator) = 16,66 ccm Normal-Kalklauge.

Aufbewahrung. In Flaschen mit Glasstopfen, vor ammoniakalischer Luft geschützt.

Wirkung und Anwendung. Die Milchsäure zeigt die Wirkung der Säuren im allgemeinen. In concentrirtem Zustande wirkt sie auf Schleimhäute ätzend. Man benutzt sie daher äusserlich als Aetzmittel und in Form von Inhalationen bei verschiedenartigen Affektionen der Rachen- und Nasenhöhle (Leukoplakie), auch zum Auflösen diphtherischer Membranen. Gelegentlich dient sie auch einmal zum Entfernen des Weinstains von den Zähnen. Innerlich in sehr starker Verdünnung (1:100 bis 1:150) gilt sie als ein die Verdauung unterstützendes Mittel, doch wird sie verhältnissmässig selten verordnet, sondern viel häufiger in Form von Molken, saurer Milch oder Buttermilch gebraucht. Uebrigens gehört die Milchsäure zu denjenigen organischen Säuren, welche längere Zeit hindurch auch

in grösseren Gaben gut vertragen werden. Milchsäure wird im Organismus zu Kohlensäure verbraunt, daher haben milchsäure Alkalien die Eigenschaft, das Blut alkalisch zu machen. Im allgemeinen tritt die innerliche Anwendung gegenüber der ausserlichen sehr weit zurück, wenn man den Verbrauch von Milchsäure in den Genuss- und Nahrungsmitteln (Gurken, Sauerkraut, saure Milch etc.) bei dieser Betrachtung ausser Acht lässt.

Technisch, mit Salzsäure gemischt, als Lösungsmittel für die Eiweissstoffe bei der Fettbestimmung der Milch mit dem Laktokrit. In 1procentiger oder concentrirterer Lösung als Enthalkungsmittel beim Mikroskopiren.

Rechts Milchsäure Para-Milchsäure Fleisch Milchsäure Aktive Milchsäure. Dieses physikalische Isomere der Gährungsmilchsäure ist in der Fleischflüssigkeit (daher auch im Fleischextrakt) enthalten. Die freie Säure ist rechtsdrehend. Das Zinksalz $(C_4H_5O_6)_2Zn + 2H_2O$ krystallirt nur mit 2 Mol. Wasser, löst sich in 17,5 Th. Wasser oder in 1110 Th. Alkohol und ist rechtsdrehend. — Diese Säure kann künstlich auch durch einen besonderen Mikroorganismus, den „*Micrococcus acidi paralactici*“ auf dem Wege der Gährung erhalten werden.

Wurzenmittel. Salicylsäure 1,0, Milchsäure 1,0, Kollodium 8,0. Täglich 2—3 mal die Wurzeln oder Hühneraugen zu pinseln.

Laktokrit-Säure, d. i. Säuremischung für den Laktokrit von LAVAL, besteht aus 95 Vol. Milchsäure und 5 Vol. Salzsäure von 25 Proc.

Limonada Acidi lactici
Rp. Acidi lactici 5,0
Sirupi Sacchari 50,0
Aquae 1000,0
Täglich mehrmals ein halbes Weinglas voll

Pastilli Acidi lactici
Rp. Acidi lactici 10,0
Sacchari pulverati 88,0
Vanillae saccharatae 2,0
Tragacanthae pulveratae 0,1

Plant. pastilli 50 Vor jeder Mahlzeit 2—3 Pastillen

Pulvis dentifricus cum Acido lactico

Rp. Acidi lactici 8 0
Talc. veneti 30,0
Olei Menthae pip. gtt. 8

Zur Beuhigung der Zähne von Weinstein.

Acidum metatartaricum.

Acidum metatartaricum. Metaweinsäure. Metaweinsteinsäure. $C_4H_4O_6 = 150$. Diese Säure ist als eine amorphe Modifikation der gewöhnlichen oder Rechts-Weinsäure aufzufassen. Sie entsteht aus der letzteren durch Erhitzen bis zum Schmelzen.

Darstellung Man bringe eine angemessene Menge grob gepulverter Weinsäure in ein Kasserol aus Porcellan und erhitze im Sandbade bis zum Schmelzen, rühre die geschmolzene Masse einige Male mit einem erwärmten dicken Glasstabe um und lasse sie in Tropfen auf eine kalte Glas- oder Porcellanplatte fallen. Sobald die Tropfen erstarrt sind, stosse man sie mit einem scharfen Messer ab und bringe sie in gut zu verschliessende Gefässe.

Eigenschaften Klare, durchsichtige, schwach gelblich gefärbte Kugelsegmente, aus Metaweinsäure bestehend. Sie sind hygroskopisch und schmelzen bei 120° (krystallisirte Weinsäure schmilzt erst bei 170°). Die wässrige Lösung ist rechtsdrehend und verwandelt sich bald in eine solche von Rechts-Weinsäure. Die Salze der Metaweinsäure — „Metatartarate“ — sind leichter löslich als diejenigen der gewöhnlichen Rechts-Weinsäure. In wässriger Lösung gehen sie allmählich, rascher beim Erhitzen, in die Salze der gewöhnlichen Rechts-Weinsäure über.

Anwendung Metaweinsäure ist früher als Surrogat für Citronensäure empfohlen worden, hat sich aber nicht einführen können, da sie in wässriger Auflösung eben wieder in Weinsäure übergeht. Ausserdem hat man mit ihrer Hülfe ein leicht lösliches Magnesium-Salz dargestellt.

Magnesium metatartaricum Magnesiummetatartarat $C_4H_4O_6Mg = 172$. Zur Bereitung rührt man 11,0 Magnesiumsubcarbonat mit 300 kaltem Wasser an und fügt allmählich

eine kalt bereitete Lösung von 17,5 Metaweinsäure in 42,0 destillirtem Wasser hinzu. Nach beendigter Neutralisation wird filtrirt und das Filter mit Wasser nachgewaschen, bis das Filtrat 100,0 beträgt. Die Lösung enthält 20 Proc. Magnesiummetatartrat. Doss 1—2 stündlich einen Esslöffel. Das Salz kann nur in Lösung bereitet werden und geht in dieser allmählich in gewöhnliches Magnesiumtartrat über.

Acidum molybdaenicum.

Acidum molybdaenicum. Molybdänsäure. Molybdäntrioxyd. Acide molybdaénique. Molybdic acid. MoO_3 . Mol. Gew. = 144. Unter dem Namen „Molybdänsäure“ ist das Molybdänsäureanhydrid MoO_3 zu verstehen. Dasselbe wird in der Regel entweder aus dem Molybdänglanz MoS_2 oder aus dem Gelbbleierz PbMoO_4 bereitet.

Darstellung. 1) Im Kleinen erhitzt man Molybdänglanz in einer Verbrennungsröhre und leitet Luft darüber, bis alles oxydirt und das Molybdäntrioxyd sublimirt ist. 2) In grösseren Mengen stellt man es her, indem man den gepulverten Molybdänglanz, mit dem gleichen Raumtheil reinem Quarzsand innig gemischt, auf einer flachen Eisenschale röstet. Das Röstprodukt wird mit verdünntem Ammoniak ausgezogen, die Lösung mit Ammoniumsulfid, um Kupfer zu fällen, versetzt, filtrirt, zur Trockne verdampft und der Rückstand wieder in verdünntem Ammoniak gelöst. Durch Verdampfen der filtrirten Lösung erhält man Krystalle von Ammoniummolybdaenat. Man dampft diese mit Salpetersäure ein und laugt den Rückstand mit Wasser aus, wodurch Ammoniumnitrat gelöst wird, während das in Wasser fast unlösliche Molybdäntrioxyd zurückbleibt. 3) Aus Gelbbleierz erhält man es, indem man dieses mit gleichen Theilen wasserfreiem Natriumkarbonat schmilzt. Die erkaltete Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt, wodurch das entstandene Natriummolybdaenat in Lösung übergeht. Man zersetzt die Lösung durch Salpetersäure in geringem Ueberschuss, das Ganze wird zur Trockne eingedampft und mit Wasser ausgewaschen. Die zurückbleibende Molybdänsäure wird durch verdünntes Ammoniak in Ammoniummolybdaenat übergeführt und aus diesem wie sub 2 abgeschieden.

Eigenschaften. Im Handel unterscheidet man ein *Acidum molybdaenicum purissimum*, frei von Natrium, Ammonium und Salpetersäure, und ein *Acidum molybdaenicum purum*, welches erhebliche Mengen von Natriummolybdaenat, Ammoniummolybdaenat sowie Salpetersäure und in der Regel nur etwa 85 Proc. freie Molybdänsäure enthält.

Die Molybdänsäure bildet eine weisse oder sehr schwach gelbliche, lockere pulverige Masse von schwach metallischem Geschmack, welche sich in Wasser, ohne damit ein Hydrat zu bilden, zu kleinen krystallinischen seidenglänzenden Nadeln oder Blättchen zertheilen lässt und sich darin 1:800 auflöst. Beim Erhitzen wird sie gelb, erkaltet wieder weiss. In der Rothglühhitze schmilzt sie zu einer gelben krystallinischen Masse. In geschlossenem Gefäss lässt sie sich erhitzen, ohne sich zu verflüchtigen, im Luftstrome sublimirt sie aber in krystallinischen Blättchen. Sie ist unlöslich in Weingeist, leicht löslich in Ammoniakflüssigkeit.

Mineralsäuren lösen die Molybdänsäure, nicht aber die geglähten, welche jedoch von Kaliumbitartrat gelöst wird.

Mit den Basen bildet die Molybdänsäure neutrale und mehrfach saure Salze vom Typus MoO_4M_n , die Salze heissen „Molybdaenate“. Die Alkalmimolybdaenate sind in Wasser löslich, die anderen Molybdaenate darin unlöslich. Bei der Reduktion der Molybdänsäure treten verschiedene (meist blaue) Färbungen auf, welche als Reaktionen Verwendung finden.

Schwefelwasserstoff fällt aus der sauren Lösung, diese anfangs blau färbend, braunes, in erwärmtem Schwefelammonium lösliches Molybdänsulfid, und die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit erscheint blau.

Wird eine Flüssigkeit, welche ein Phosphat enthält, mit einem starken Ueberschuss Ammoniummolybdaenat und einer reichlichen Menge Salpetersäure versetzt und erwärmt oder längere Zeit an einem warmen Orte stehen gelassen, so färbt sich die Flüssig-

keit gelb, und es scheidet sich ein gelber Niederschlag ab, welcher die gesammte Phosphorsäure als Molybdänphosphorsaures Ammonium $22 \text{ MoO}_3 + 2(\text{NH}_4)_3 \text{PO}_4 + 12 \text{H}_2\text{O}$ enthält. Dieser Niederschlag ist unlöslich in einer genügend concentrirten Lösung von Salpetersäure oder Molybdän-Salpetersäure, dagegen löslich in Ammoniakflüssigkeit. Sein Entstehen gilt als Reaktion für Phosphorsäure, doch ist zu beachten, dass auch Arsensäure unter den gleichen Bedingungen unlösliche gelbe Niederschläge giebt.

Wird eine mit wenig Salzsäure angesäuerte Ammonmolybdänatlösung zu einer Flüssigkeit, welche Zucker enthält, zugesetzt und gekocht, so färbt sich die Flüssigkeit blau (Reaktion auf Molybdänsäure wie auf Zucker). Wird in vorstehender Probe mit vieler Salzsäure sauer gemacht und gekocht, und dann die gelbe Flüssigkeit mit Rhodankalium versetzt, so erfolgt eine karminrothe Farbenreaktion. Die karminrothfärbende Substanz, Molybdän-sesquihodamid, ist in Aether löslich.

Gallusgerbsäure erzeugt in einer Molybdänatlösung eine blutrothe, Ferrosalze, auch metallisches Zink, erzeugen in der salzsauren Lösung eine blaue Färbung.

Anwendung. Die Molybdänsäure wird nur zur Darstellung mehrerer Molybdänate, welche man als Reagentien in der Analyse benutzt, verwendet. Das Ammonmolybdänat ist das gebräuchlichste Salz. Vgl. Alkaloidia.

Acidum nitricum.

Acidum nitricum. Acidum azoticum. Salpetersäure. Acide azotique. Nitric acid. Als „Salpetersäure“ bezeichnet man Lösungen des Salpetersäurehydrates in Wasser. Je nach der Concentration und der Reinheit unterscheidet man 1) Rohe Salpetersäure und zwar a) als doppeltes Scheidewasser, b) einfaches Scheidewasser, II) reine Salpetersäure, III) rauchende Salpetersäure HNO_3 . Mol. Gew. = 63.

I † **Acidum nitricum crudum. Rohe Salpetersäure.** a) Doppeltes Scheidewasser. Ist eine Salpetersäure von 40° B oder dem spec Gewicht 1,38—1,39 mit einem Gehalt von 60—64 Proc Salpetersäurehydrat HNO_3 (oder 52—55 Proc Salpetersäureanhydrid N_2O_5). Gall. *Acide azotique du commerce* Spec Gew 1,39. Germ. **Acidum nitricum crudum.** Spec Gew 1,38—1,40 mit mindestens 61 Proc HNO_3 . Diese Säure findet Verwendung in der Technik, ferner im pharmaceutischen Laboratorium zur Darstellung chemischer Präparate.

b) Einfaches Scheidewasser, früher als **Acidum nitricum crudum, Spiritus Nitri, Aqua fortis** bezeichnet, hat das spec Gew von 1,320—1,330 mit einem Gehalte von 50—53 Proc Salpetersäurehydrat (oder 43—45 Proc Salpetersäureanhydrid N_2O_5). Zur Herstellung desselben wird das doppelte Scheidewasser mit Wasser verdünnt und zwar 100 Gewichtstheile doppeltes Scheidewasser mit 20 Gewichtstheilen Wasser oder 100 Volume doppeltes Scheidewasser mit 28 Volumen Wasser.

Die rohe Salpetersäure ist eine farblose, oder gelbliche, stark saure, ätzende, an der Luft schwach rauchende, beim Erhitzen in einer Platinschale bis auf einen sehr geringen Rückstand flüchtige Flüssigkeit, welche ausser Salpetersäure als Verunreinigungen enthält: Stickstoffdioxid NO_2 (sog. Untersalpetersäure), Chlor, Jod, Schwefelsäure, Calcium-, Natrium- und Eisensalze. Als Verfälschung können ihr (zur Erhöhung des spec Gewichtes) Natriumsulfat, besonders aber Natriumnitrat zugesetzt sein.

Aufbewahrung. In Flaschen mit Glasstopfen (Korkstopfen werden rasch zerstört) mit übergestülpter Glasglocke, an einem kühlen, dunklen Orte, vorsichtig. Als Signatur eignen sich besonders radirte Schilder. Unter dem Einfluss des Lichtes erfahren die concentrirteren Sorten Zersetzung unter Gelbfärbung. Das Gleiche geschieht beim Einfallen von Holz, Stroh, Papier u dgl. Beim Umgießen benutze man stets einen Trichter und hüte sich vor dem Einathmen der Dämpfe. Größere Vorräthe lasse man nicht in den Ballons, sondern fülle sie in Standflaschen von 5—8 Litern um verschüttete Säure wird

durch Aufschütten von Sand (nicht Sgospähnel) und Aufnahme mit viel Wasser unschädlich gemacht. Vorsicht wegen des Einathmens von Dämpfen!

Anwendung und Abgabe. Therapeutisch wird das doppelte Scheidewasser bis weilen als Zusatz zu Fussbädern verordnet, ausserdem dient es (auch in der Thermieheun) zum Aetzen von Warzen und Wunden. Im pharmaceutischen und chemischen Laboratorium gebraucht man es zur Darstellung der Schuessbaumwolle, des Colloxylin, Nitroglycerins, Nitrobenzols, Kupfernitrates u. a. Präparate. In den Gewerben findet es zahlreiche Verwendung.

Es unterliegt keinem Bedenken, das Scheidewasser an zuverlässige, bezw. bekannte Personen abzugeben. Dabei befolge man indessen folgende Grundsätze: 1) Man fülle es niemals in Flaschen oder Gefässe, welche der üblichen Meinung nach für Getränke bestimmt sind. 2) Man signire die Gefässe ordnungsgemäss mit den Etiketten „Vorsicht“, „Aeusserlich“, „Gift“. 3) Man verweigere die Abgabe an Unerwachsene. 4) Man stelle in allen Fällen fest, wozu das Scheidewasser gebraucht wird. 5) Im Zweifel gebe man das einfache Scheidewasser ab, das doppelte nur dann, wenn der beabsichtigte Zweck ausser stark concentrirte Salpetersäure erfordert.

Werden Quecksilber und Scheidewasser zu gleicher Zeit gefordert, so verweigere man die Abgabe, falls diese Ingredienzien zur Herstellung eines Krätzemittels dienen sollen. Die unverständige Anwendung Merkur- (oder Merkur-)nitrathaltiger Krätzemittel kann in hohem Grade gesundheitsgefährlich werden.

Für den Transport des doppelten Scheidewassers beachte man Folgendes: die Ballons dürfen niemals zu mehr als $\frac{1}{10}$ des Fassungsraumes angefüllt werden. Sie sind nur mit dem Feuerzuge versendbar und dürfen niemals so verfrachtet werden, dass sie den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. Belichtung kann zur theilweisen Zersetzung der Salpetersäure führen. In Folge der Entwicklung von Stickoxyden treten Dampfepannungen in den Ballons auf, welche Zerkümmerung der letzteren veranlassen können. Ergoesst sich aber Salpetersäure von dieser Concentration auf Holz, Stroh, Papier und dergl. andere brennbare Substanzen, so kann der Ausbruch verheerender Schaden, Feuer die Folge sein.

Das Einathmen der aus Salpetersäure entwickelten Dämpfe (Salpetersäure, Stickoxyde) vermeide man thunlichst. Sie pflegen zunächst nicht lästig zu fallen. Nach mehreren Stunden anscheinend guten Befindens aber treten schwere Vergiftungsercheinungen auf, und nicht selten erfolgt plötzlicher Tod durch Herzschlag.

II † Acidum nitricum purum. Reine Salpetersäure. Ist in allen hier berücksichtigten Pharmakopöen enthalten, aber von sehr verschiedener Concentration. Als Acidum nitricum führen sie auf Brit. Germ. Hely. U-St. Als Acidum nitricum concentratum: Austr. Als Acide azotique officinale. Gall.

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Hely.	U-St.
Bezeichnung	Acid. nit. conc.	Acid. nit.	Acide azotique offic.	Acid. nit.	Acid. nit.	Acid. nit.
Spec. Gew. bei 15°	1,309	1,420	1,300	1,150	1,158	1,414
Procente HNO ₃	47,45	70,0	83,60	25,0	26,0	68,0

Darstellung. Dieselbe erfolgt durch Rectifikation von roher Salpetersäure (doppeltem Scheidewasser) in nachstehender Weise.

Manne in ein Sandbad *a* gesetzte Retorte *b* füllt man etwas über $\frac{1}{2}$ ihres Rauminhaltes mit doppeltem Scheidewasser an, nachdem man vorher ca. 3 g gepulverten reinen Kalsalpetes auf ein Luer der Säure in die Retorte eingeschüttet hat, legt einen Kolben *c* an, wie in der Abbildung auf S. 75 angegeben ist, und erhitzt bis zum gelinden Aufkochen. Da hier eine viel Wasser enthaltende Säure destillirt, so ist die anhaltende Abkühlung der Vorlage unerlässlich. Sobald der Retorteninhalt heiss wird, sammelt sich über demselben ein braunrother Dampf, aus Chlor und Untersalpetersäure bestehend, welcher bei weiterer Erhitzung in die Vorlage mit Salpetersäuredämpfen abfließt und sich hier zum Theil verdichtet. Wenn die Temperatur der kochenden Säure bis auf ca. 120° gestiegen ist, ist auch die ganze Menge Chlor und Untersalpetersäure angetrieben, der Dampf in der Retorte erscheint nach und nach weniger gefärbt und wird zuletzt ganz farblos. Wenn dieser Zeitpunkt heranrückt, nimmt man den Kolben ab und ersetzt ihn durch einen anderen, indem man zugleich einige Tropfen der überdestillirten Säure in einem etwas weiten Reagircylinder auffängt, in welchem sich einige Tropfen Silbernitratlösung, mit ca. 5 ccm destillirtem Wasser verdünnt, befinden. Im Falle das Destillat noch eine geringe Trübung erzeugt, destillirt man ca. 10 Minuten weiter und prüft nochmals. Erweist sich das Abtropfende endlich frei von Chlor, so legt man einen anderen reinen

Kolben vor und destillirt bei guter Abkühlung desselben so lange, bis der Rückstand in der Retorte noch ca. $\frac{1}{6}$ der eingegossenen Säure beträgt. Auf diese Weise erlangt man mehr als $\frac{2}{3}$ einer reinen Säure von ungefähr 1,38 spec. Gew. und das zuerst überdestillirende und das zurückbleibende Sechstel lassen sich wieder als rohe Säure verwenden.

Die überdestillirte Säure ist in der Regel gelblich gefärbt durch gelbste Stickstoffoxyde. Will man eine Säure von so hoher Concentration darstellen, wie Brit. und U-St. sie vorschreiben, so muss man sich darauf beschränken, die Hauptmenge der Stickstoffoxyde durch Einblasen eines Luftstromes wegzuschaffen. Will man dagegen eine weniger concentrirte Säure bereiten, so verdünnt man das Destillat mit Wasser bis zu dem geforderten spec. Gew. und erhitzt die so verdünnte Säure im Sandbade (in einem schräg gestellten Kolben) so lange auf 110° , bis die mit dem vierfachen Volumen Wasser verdünnte Säure Kaliumpermanganat nicht mehr reducirt.




Fig. 20.

Eigenschaften. Die konc. Säuren sind gelblich gefärbt und rauchen stark an der Luft, zersetzen sich auch im Sonnenlicht ziemlich rasch. Die verdünnteren Säuren sind farblos, zersetzen sich weniger leicht. Beim Erhitzen sind sie sämmtlich völlig flüchtig. Unterwirft man verdünnte Lösungen von Salpetersäure der Destillation, so geht zunächst eine sehr dünne Säure über; bei 123° destillirt konstant ein etwa 70 Proc. HNO_3 enthaltendes Hydrat: $2\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$. Wird Salpetersäure von grösserer Concentration als 70 Proc. destillirt, so geht zunächst unter theilweiser Zersetzung in Stickoxyd und Sauerstoff wasserfreie Salpetersäure über, bis der Kolbeninhalt die Concentration von 70 Proc. HNO_3 hat, worauf dann dieses Hydrat konstant überdestillirt.

Aufbewahrung. In Glasflaschen, vor Sonnenlicht geschützt. Vorsichtig.

Prüfung. 1) Salpetersäure mit einem Gehalt von 25—40 Proc. HNO_3 sei farblos, die ca. 70procentige nur gelblich gefärbt. 2) In Platingefässen erhitzt sei sie ohne Rückstand flüchtig. 3) Die mit dem 4—10fachen Volumen Wasser verdünnte Säure werde weder durch Baryumnitrat (Schwefelsäure), noch durch Silbernitrat (Chlor) getrübt, noch durch Kaliumferrocyanid gebläut (Eisen). 4) Wird die mit 2 Raumtheilen Wasser verdünnte Säure mit wenig Chloroform geschüttelt, so darf dieses, auch nach Zusatz eines in die Säureschicht hineinragenden Zinkstückchens, nicht violett gefärbt werden (Jod, Jodsäure).

Anwendung. Auch in starker Verdünnung (1 Th. der 25proc. Säure: 200 Th.) nur selten innerlich bei Leberaffektionen, Gelbsucht, Bright'scher Krankheit. Aeusser-

lich in konz. Zustande stark ätzend, erzeugt gelbgefärbte Schorfa. Man benutzt die 25 proc. Säure als Antzmittel, mit Wasser verdünnt (80—50 g auf ein Fussbad) zu Fussbädern, zum Bepinseln (1:10) von Frostbeulen, wenn offene Stellen nicht vorhanden sind. In starker Verdünnung (1,0—2,0:100,0) als Verbandwasser gegen Hospitalbrand.

Technisch namentlich als Reagens in der chemischen Analyse. Antidot: Ist Salpetersäure verschluckt worden, so reiche man Milch, Eiweiss, Wasser, gebrannte Magnesia, Seifenlösung. Kohlensäure Alkalien sind wegen der Kohlensäure-Entwickelung unzweckmässig.

III. † **Acidum nitricum dilutum.** Verdünnte Salpetersäure. Diluted nitric acid. Durch Verdünnen der konzentrierten Säure dargestellt und von Austr. Brit. Helv. und U-St. aufgenommen, ist in den einzelnen Pharmakopöen von verschiedenem Gehalt.

	Austr.	Brit.	Helv.	U-St.
Spec. Gew.	1,139	1,101	1,056	1,057
Procente HNO_3	21,42	17,44	10,0	10,0

Die Helv. führt als Höchstgaben der verdünnten Säure an: 1,0 g pro dosi, und 3,0 g pro die.

IV. † **Acidum nitricum fumans** (Germ. Helv.). **Acidum nitrico-nitrosum** (Austr.). **Spiritus Nitri fumans.** Rötliche rauchende Salpetersäure. Ist fast wasserfreies Salpetersäurehydrat HNO_3 , welches mit Stickstoffdioxid NO_2 (Untersalpetersäure) gesättigt ist. Hat im konzentriertesten Zustande das spec. Gew. 1,505—1,510. Die genannten Pharmakopöen schreiben übereinstimmend als spec. Gew. 1,45—1,50 vor. Das Präparat wird nur ausnahmsweise im pharmaceutischen Laboratorium dargestellt. Rothbraune Dämpfe austossende, sehr saure, stark ätzende Flüssigkeit.

Darstellung. In eine in ein Sandbad einzusetzende Retorte mit Tubus *a*, an welche eine Vorlage *b* mit dem Tubus *c* und Glasrohr *d* angeschlossen ist, giebt man 10 Th. grob-




Fig. 81.

gepulverten, gut getrockneten Kalisalpeter, übergiesst denselben mit einem Gemisch aus 6 Th. englischer und 3 Th. rauchender Schwefelsäure und leitet ab, indem man zugleich die Vorlage *b* gut kühlt. Die durch *d* entweichenden Dämpfe werden in Natronlauge oder ins Freie geleitet. Sobald die Farbe des Dampfes in der Retorte über das Dunkelrotte über-

gelb geworden ist, wechselt man die Vorlage und fängt die nunmehr übergehende (chlorfreie) Salpetersäure gesondert auf. Man setzt die Destillation wie bei der Salpetersäure fort, nur wirft man alle $\frac{1}{2}$ Stunden durch den Tubus der Retorte ein bohnengrosses Stückchen Holzkohle in die Destillationsmasse. Ausbeute an rauchender Salpetersäure 5 Th. Die mit dem 15fachen Vol. Wasser verdünnte Säure werde weder durch Silbernitrat (Chlor), noch durch Baryumnitrat (Schwefelsäure) getrübt.

Aufbewahrung. Für die rothe rauchende Salpetersäure gilt in dieser Hinsicht das Nähmliche, aber in noch verstärktem Maasse, wie es S. 73 für das doppelte Scheidewasser auseinander gesetzt wurde. Man halte die Säure in der Officin gar nicht vorrätig, da ihre Dämpfe die rothe Emailleschrift zerstören.

Anwendung. Rauchende Salpetersäure findet nur selten äusserlich Anwendung zum Aetzen von Warzen, syphilitischen Geschwüren. Man gebe sie aber zu diesem Zwecke im Handverkauf nicht ab. Der Abgabe zu gewerblichen Zwecken (an Chemiker, Metallarbeiter) steht unter Beachtung der nothwendigen Vorsichtsmaassregeln nichts im Wege. Wird „rauchende Salpetersäure“ zu Heilzwecken gefordert, so gebe man doppeltes Scheidewasser (*Acidum nitricum crudum*) dafür ab.

V † Weisse rauchende Salpetersäure. Unter diesem Namen versteht man eine Salpetersäure von rund 70 Proc. HNO_3 -Gehalt mit einem specifischen Gewicht von 1,400—1,450. Wird hawelen von Chemikern gefordert. Sie darf, mit 10 Th. Wasser verdünnt, weder durch Silbernitrat noch durch Baryumchlorid getrübt werden.

VI † Acidum chloro-nitrosum (Ergänz.) Acidum nitro-hydrochloricum (U-St.) Eau régale (Gall.). Salpetersalzsäure Königswasser. Die Vorschriften variiren.

Ergänz. ApV schreibt vor 1 Th. Salpetersäure (25 Proc.) mit 3 Th. Salzsäure (25 Proc.) vor der Abgabe zu mischen. Diese Vorschrift ist in Deutschland zum Arzneigebrauch einzuhalten. Wenn nicht anderes verordnet, sind die reinen Säuren anzuwenden. Die Mischung ist in Gläsern mit Glasstopfen abzugeben.

U-St. lässt 180 cem Salpetersäure von 68 Proc. ($\text{Sp. G.} = 1,41$) mit 820 cem Salzsäure von 31,9 Proc. ($\text{Sp. G.} = 1,168$) mischen. Gall. schreibt vor eine Mischung von 80 Gew.-Th. Salpetersäure von 1,39 spec. Gew., 20 Th. Wasser und 300 Th. Salzsäure von 1,17 spec. Gew.

Das Königswasser wird in der Arzneikunde gelegentlich einmal zu reizenden Fussbädern verordnet. Auf ein Fussbad, welches in Gefassen von Holz zu nehmen ist, rechnet man 80—50 g Königswasser. Innerlich höchst selten bei Gelbsucht 0,1—0,2 in starker Verdünnung mit Wasser. Technisch zur Auflösung von Gold und Platin.

Acidum nitro hydrochloricum dilutum U-St. Eine Mischung von 40 cem Salpetersäure (68 Proc., $\text{Sp. G.} = 1,41$) mit 180 cem Salzsäure von 31,9 Proc. ($\text{Sp. G.} = 1,168$) und 780 cem Wasser. Alle diese Mischungen sind erst unmittelbar vor der Abgabe zu bereiten.

Analyse. Man erkennt die Salpetersäure an folgenden Reactionen.

A. Nachweis. 1) Setzt man zu einer Auflösung von etwas Brucin in concentrirter Schwefelsäure einige Tropfen einer Salpetersäure enthaltenden Lösung, so entsteht eine deutlich rosenrothe Färbung (Reichardt). Empfindlichkeit 1:100 000. Eine ähnliche, aber weniger empfindliche Reaction giebt Morphin. 2) Löst man ein Körnchen Diphenylamin in concentrirter Schwefelsäure und lässt hierzu eine sehr verdünnte wässrige Lösung von Salpetersäure fliessen, so entsteht prachtvoll kornblumenblaue Färbung (Wird auch von anderen oxydierenden Agentien hervorgebracht). 3) Vermischt man Indigolösung mit viel concentrirter Schwefelsäure und fugt etwas von einer Salpetersäure enthaltenden Lösung hinzu, so wird beim Erhitzen die Indigolösung entfärbt, bez. geht sie in Gelb (in Folge Bildung von Isatin) über. Wird auch von anderen Oxydationsmitteln, z. B. Chlor, unterchloriger Säure und zwar schon in der Kälte bewirkt. 4) Ist die Salpetersäure nicht zu verdünnt, so kann man sie dadurch erkennen, dass sie beim Erhitzen mit blankem Kupfer an der Luft das Kupfer zu einer blauen Flüssigkeit löst, während gelbbraune Dämpfe von Stickstoffdioxid NO_2 entweichen. Bei Abschluss von Luft entsteht zunächst farbloses Stickoxyd NO , welches durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in braunes Stickstoffdioxid NO_2 ($=$ Untersalpetersäure N_2O_4) übergeht $\text{NO} + \text{O} = \text{NO}_2$. Diese Reaction ist die wichtigste und allein beweisende für Salpetersäure. Wir kennen keine andere Säure (mit Ausnahme der salpetrigen Säure), welche beim Erhitzen mit blankem Kupfer ein farbloses Gas liefert, das bei Berührung mit Luft oder Sauerstoff gelbbraune Dämpfe bildet. Kleine

Mengen von Salpetersäure lassen sich in dieser Weise noch sehr gut erkennen, wenn man die Salpetersäure bei Luftabschluss durch Kochen mit Salzsäure und Eisenchlorür in Stickoxyd überführt, dieses über Natronlauge auffängt und nun Luft oder Sauerstoff zutreten lässt, wobei dann das farblose Gas braune Dämpfe geben muss. 5) Mischt man in einem Probirrohr etwas von einer Salpetersäure enthaltenden Flüssigkeit mit 2–3 cem Ferrosulfatlösung (s. Reagentien) und lässt mit Hilfe einer bis an den Boden des Probirrohrs eingesenkten Pipette etwa ein doppeltes Volumen konzentrierter Schwefelsäure so zufließen, dass sich zwei Schichten bilden, so entsteht an der Berührungsstelle der beiden Schichten ein brauner Ring. Die Braunfärbung rührt her von einer Verbindung des Ferrosulfats mit Stickoxyd ($\text{FeSO}_4 + \text{NO}$). Das Stickoxyd entstammt der Salpetersäure und wurde durch die Einwirkung des Ferrosulfates, welches dabei zum Theil zu Ferrisulfat oxydirt wurde, auf die Salpetersäure gebildet.



6) Kaliumpermanganat wird durch Salpetersäure nicht reducirt. Unterschied von der salpetrigen Säure, welche Kaliumpermanganat schon in der Kälte sofort reducirt.

B Bestimmung. Liegt die Salpetersäure in freiem Zustande vor, so kann sie nach gehöriger Verdünnung mit Wasser durch Normal-Lauge (Phenolphthalein als Indikator) maassanalytisch bestimmt werden. 1 cem Normal-Lauge neutralisirt 0,063 g LiNO_3 .

Ueber die Bestimmung der Salpetersäure in Nitraten vgl. unter Nitrogenium, im Wasser unter Aqua etc.

Volumgewicht und Gehalt der Salpetersäure

bei 15° C

Nach Lange und Ray

Spec Gw bei 15°	Procente HNO_3	Spec Gw bei 15°	Procente HNO_3	Spec Gw bei 15°	Procente HNO_3	Spec Gw bei 15°	Procente HNO_3
1,010	1,90	1,160	28,36	1,310	49,07	1,460	79,98
1,020	3,70	1,170	27,88	1,320	50,71	1,470	82,90
1,030	5,50	1,180	29,38	1,330	52,37	1,480	86,05
1,040	7,26	1,190	30,88	1,340	54,07	1,490	89,60
1,050	8,99	1,200	32,36	1,350	55,79	1,500	94,09
1,060	10,83	1,210	33,82	1,360	57,57	1,502	95,08
1,070	12,33	1,220	35,28	1,370	59,39	1,504	96,00
1,080	13,95	1,230	36,78	1,380	61,27	1,506	96,78
1,090	15,53	1,240	38,29	1,390	63,23	1,508	97,50
1,100	17,11	1,250	39,82	1,400	65,30	1,510	98,10
1,110	18,67	1,260	41,34	1,410	67,50	1,512	98,58
1,120	20,23	1,270	42,87	1,420	69,80	1,514	98,90
1,130	21,77	1,280	44,41	1,430	72,17	1,516	99,21
1,140	23,31	1,290	45,95	1,440	74,68	1,518	99,46
1,150	24,84	1,300	47,49	1,450	77,28	1,520	99,67

Toxicologisches Erfolgt der Tod durch Einathmen der Dämpfe oder durch Einnehmen stark verdünnter Salpetersäure, so pflügt eine ziemliche Zeit bis zum Eintritt des Exitus zu verstreichen, die Salpetersäure kann alsdann ganz oder zum Theil bereits ausgeschieden sein, und die Möglichkeit des chemischen Nachweises wird höchst fraglich. Ist der Genuss von concentrirter Salpetersäure die Todesursache gewesen, so wird die Sektion ganz charakteristische gelbe Verätzungen an Haut und Schleimhaut ergeben, die von der Umwandlung der Eiweissstoffe in Xanthoproteinsäure herrühren. In solchen Fällen ist die Möglichkeit vorhanden, die Salpetersäure nachzuweisen.

1) Das Blut ist unter allen Umständen auf seine Reaktion und auf das Vorhandensein von Methämoglobin oder Hämatin zu prüfen, s. Sanguis.

2) Die Objekte (Erbrochenes, Leichentheile) sind auf die Reaktion zu prüfen, dann unter Vermeidung von Erwärmen mit absolutem Alkohol zu extrahiren. Von den alkoholischen Auszügen kann man einen Theil auf den Säuregehalt titriren. Den Rest macht man mit Kalilauge schwach alkalisch, dampft ein und bestimmt in dem Rückstande die Salpetersäure nach Uison, s. Nitrogenium.

Acide azotique alcoolisé (Gall) *Espirit de nitre dulcifié in loco Spiritus Nitri dulcis* Man verdünnt 78,0 g Salpetersäure von 1,39 spec Gew mit 22 g Wasser und fugt in kleinen Antheilen 800,0 g Alkohol von 90 Vol Proc hinzu Während der nächsten 2—3 Tage lüftet man gelegentlich den Stopfen, um die entwickelten Gase austreten zu lassen

Acidum compositum REITZ

(contra scirrhum)

Ein äusserliches und innerliches Mittel gegen Krebs

Die Bereitung ist folgende

Acidi nitrici (25%) 250,0
Acidi hydrochlorici
Aetheris aa 15,0
Boracis pulverati 11,0

werden in eine Literflasche gegossen und nach dichtem Verschluss etwa zwei Tage bei Seite gestellt, bis sich in der Mischung die chemische Einwirkung vollendet hat Dann giesst man das Gemisch in kleinere Flaschen mit Glasstopfen, so dass die Flaschen nur halb gefüllt sind Nach Reitz werden die oberen und unteren Extremitäten anfangs alle 8—14 Tage und der Umriss des Carcinoms täglich mit folgendem Liniment eingerieben

Linimentum acidum REITZ

Rp Acidi compositi Reitz 4,0
Olei Hyoscyami
Olei Olivarii aa 50,0

Misce 8 Zum Einreiben

Guttæ acidæ REITZ

Rp Acidi compositi Reitz 2,5
Spiritus aetherei 10,0

M D S Jeden Tag einmal 10 Tropfen in Zuckerwasser

Injectio acida REITZ

Rp Acidi compositi Reitz 2,0
Aque destillatæ 400,0
Tincturæ Opii simplicis 2,0

M D S Zu Einspritzungen
Bei Carcinoma uteri wöchentlich 2male einzuspritzen**Acidum nitricum solidificatum. RIVALLI****Solidificata Salpetersäure**

Von RIVALLI gegen Krebsgeschwüre empfohlen Zu ihrer Bereitung, welche stets unmittelbar vor der Anwendung geschehen muss, giebt man an einem zugigen Orte einige Charpiebündelchen in einen durch heisses Wasser zuvor erwärmten Porcellanmörser und bohrt die Charpie unter Drücken mit dem warmen Pistill mit einer Salpetersäure von ca. 1,85 spec Gewicht, also doppelt so Scheidewasser, bis eine gallertartige Masse entstanden ist Diese Masse wird in Minuten lang auf dem von einem nassen Tuche eingefassten Krebsgeschwür liegen gelassen, und nach ihrer Beseitigung wird die Wunde mit gesättigter Alaunlösung gewaschen

Aqua cosmetica GREEN

Rp Acidi hydrochlorici diluti
Acidi nitrici diluti (10%) aa 2,0
Aque Rosæ 200,0

M D S Waschwasser

Zum Bestreichen und Waschen des Kielenusschlags und der Leberflecke (besonders bei Schwangeren)

Aqua oxygenata ALYON

Rp Acidi nitrici puri (25%) 2,0
Aque communis 1000,0

M S Täglich 8—4mal ein Weinglas voll Bei Syphilis, Flechten, Zuckerharnruhr

Aqua contra perniones HERRA**HERRA'sches Frostwasser**

Rp Acidi nitrici (25%) 15,0
Aque destillatæ 100,0

M D S Zum Umschlagen auf Frostbeulen

Aqua contra perniones RUST**RUST'sches Frostwasser**

Rp Acidi nitrici diluti (10%)
Aque Cinnamomi simplicis ana 25,0

M D S Täglich zweimal die Frostbeulen zu bestreichen

Limonade nitrique (Gall)**Potus nitricus Potus cantorum Limonade azotique**

Rp Acidi nitrici diluti (5,5%) 20,0
Aque 875,0
Sirupi Sacchari 125,0

Massa chartacea caustica

Rp Acidi nitrici fumantis 10,0
Acidi nitrici crudi 5,0

Bringt man in eine Porcellankrücke und arbeitet mit Hilfe eines Glasstabes so viel Schnittel von

Filtrirpapier q s

darunter, dass eine Paste entsteht
S Zum Cauterisiren**Mixtura antileucæria FERRICH**

Rp Acidi nitrici (25%) 1,0
Acidi hydrochlorici 2,0
Aque destillatæ 150,0
Sirupi simplicis 25,0

M D S 3—4mal täglich 1 Esslöffel Bei chronischer Gelbsucht

Pedilivium nitricum SCHOENLIN

Rp Acidi nitrici crudi
Acidi hydrochlorici crudi ana 50,0

M D S Detur ad lagenam epistomia vitreo munitam S Zu einem Fussbade
Bei chronischer Leberentzündung, krankhafter Menstruation**Potus antidysentericus HORN**

Rp Acidi nitrici (25%) 5,0
Aque Menthae pipentis 500,0
Tincturæ Opii simplicis Guttas 50

M D S Alle drei Stunden soviel wie zwei Esslöffel voll zu nehmen

Species fumigatoriae Summ
Fumigatio nitrica Smithiana

1
Rp Acidi sulfurici crudi 100,0
caute diluta
Aque communis 50,0
dentur ad vitrum S Säure

2
Rp Kali nitrici crudi pulverat 100,0
D ad chartam S Pulver

3 Der in einem irdenen Tiegel erhitzten Säure wird in dem zu destillierenden Raume nach und nach ein Theelöffel voll Pulver eingetragen Vor dem Einströmen des Dampfes hüte man sich und trage das Kaliumnitratpulver mit einem Löffel ein, dessen Stiel durch einen Stab genügend verlängert ist.

Unguentum oxygenatum (Germ S)

Unguentum nitricum ALVON'S Salbe

Rp Adipis 50,0
Acid. nitrici (35%) 3,6

Man schmilzt das Schweineeschmalz in einem Porzellangefässe, mischt die Salpetersäure hinzu und erhitzt bei gelinder Wärme unter beständigem Umrühren so lange, bis die Masse blaues Lackpapier nicht mehr röthet. Alsdann in Papierkapseln ausgepresst und die entstandenen Tafeln in verschlossenen Gefässe aufbewahren. Gelbliches Cerat, von gleichsam ranzigem Geruch. Früher gegen Scabies und chronische Exantheme gebraucht, jetzt obsolet.

Acidum oleicum.

Acidum oleicum (Ergänzb) Acidum oleicum (U-St) Acidum elainicum
Oelsäure. Elainsäure. Oele acid. $C_{18}H_{34}O_2$. Mol. Gew. = 282.

In den Lehrbüchern wird eine reine Oelsäure aufgeführt. Diese ist nicht Gegenstand des Handels. Die in der Pharmacie und den Gewerben zumeist benutzte Oelsäure ist die rohe Oelsäure der Preislisten.

I. Acidum oleicum purum. Reine Oelsäure. Wird durch Verseifen von Mandelöl und Zersetzung der Seifenlösung mittels verdünnter Schwefelsäure, Waschen und Trocknen der Fettsäuren dargestellt. Ein farbloses und geruchloses Öl, welches bei $+4^\circ C$ erstarrt und alsdann erst bei $+14^\circ C$ wieder schmilzt. Spec. Gew. 0,898 bei 14° oder 0,876 bei $100^\circ C$. Soll in reinem Zustande Lackmusfarbstoff nicht röthen. Dagegen kann die Oelsäure in alkoholischer Lösung mit alkoholischer Kalilauge und Phenolphthaleïn als Indikator titirt werden. In Wasser ist sie unlöslich, leicht löslich schon in kaltem Alkohol, in Aether, Chloroform. Mischbar mit fetten und äthernischen Ölen. Sie ist eine ungesättigte, erbsenartige Säure, 1 Mol. addirt = 2 Atome Brom oder Jod. Ihre Salze heissen „Oleate“.

Jodzahl = 90,07, Säurezahl 198,9

Durch Einwirkung von salpetriger Säure geht die Oelsäure in die isomere feste Elainsäure über.

II Acidum oleicum (Ergänzb) Acidum oleicum U-St. Da die reine Oelsäure nicht Handelsprodukt ist, so wird unter „Oelsäure“ schlechthin stets die rohe Säure verstanden. Sie wird technisch in grossen Mengen als Nebenprodukt der Stearinkerzenfabrikation durch Verseifung besonders der animalischen Fette (Talg) gewonnen. Man erhält hierbei stets Gemenge von Oelsäure mit Palmitinsäure und Stearinsäure. Die letzteren beiden scheiden sich beim Abkühlen krystallinisch ab, die Oelsäure bleibt flüssig und wird durch Abpressen mechanisch getrennt. Die im Grosshandel als „Oelsäure“ bezeichnete Substanz ist ein Gemisch von Fettsäuren, welches zwar vorwiegend Oelsäure, daneben aber auch noch Palmitinsäure, Stearinsäure und andere Fettsäuren enthält.

U-St sagt, sie werde in genügender Reinheit aus dem Handelsprodukte erhalten, wenn man dieses auf $+5^\circ C$ abkühle und die flüssigen Antheile durch Koliren sammle. Es beschreibt die Oelsäure als eine gelbe oder braune ölige Flüssigkeit, welche unter dem Einflusse des Lichts und der Luft nachdunkelt. Spec. Gew. etwa 0,900.

Das Ergänzb. giebt an: „Farblose oder kaum gelbliche, ölige Flüssigkeit, nahezu geruchlos und geschmacklos, unter $15^\circ C$ dickflüssig werdend, bei $+4^\circ C$ erstarrend. Spec. Gew. 0,89—0,91.“ Ein solches Präparat wäre zweckmässig als Acid oleicum depuratum oder als Acid oleicum crudum album zu bezeichnen gewesen. Man kann es gewinnen, in dem man die bei $+5^\circ$ aus der Oelsäure des Handels abgeschiedenen flüssigen Antheile

1—2mal mit Thierkohle digerirt und filtrirt. Diese Oelsäure giebt folgende Konstanten: Säurezahl 185,9—202,8, Esterzahl 3,6—11,2, Jodzahl 72—82,3, Refraktion bei 25° = 48,1—50,1. Bei Luftzutritt nimmt die Oelsäure bald dunkle Farbe, ranzigen Geruch und saure Reaktion an.

Aufbewahrung. In möglichst gefüllten, gut verstopften Flaschen oder Steinkruken an einem dunklen und namentlich kühlen Ort, da die erstarrte Oelsäure Sauerstoff nicht aufnimmt.

Prüfung. Sie gebe mit einem gleichen Raumtheil Alkohol (90 Vol Proc) eine klar bleibende Mischung (Trübung = Fett), ferner, mit verdünnter Kaliumkarbonatlösung erwärmt, eine klare Flüssigkeit (Trübung = Mineralöl, bez. Kohlenwasserstoffe). Wird diese Lösung mit Essigsäure neutralisirt, so entsteht auf Zusatz von Bleiacetat ein weisser Niederschlag (Bleioleat), welcher nach dem Auswaschen durch Wasser in Aether nahezu völlig löslich ist (Bleistearinat und -Palmitat wurden in Aether nicht löslich sein). 1 g Oelsäure verbrenne ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Anwendung. Oelsäure dient zur Darstellung verschiedener Oleate, d. i. säurer Salze, z. B. des Quecksilbersalzes, ferner zur Bereitung von Pflastern und Seifen. Es ist voranzusehen, dass bei der Seifenbereitung in absehbarer Zeit die Fette und Öle überhaupt gänzlich durch die freien Fettsäuren einschl. der Oelsäure (wegen der Gewinnung des Glycerins) werden verdrängt werden — 100 Th Oelsäure bedürfen zur völligen Verseifung = 20 Th Kalihydrat KOH, oder 14,2 Th Natronhydrat NaOH.

Eunatrolum. Eunnatrol. Das unter diesem Namen in den Handel gelangende Präparat soll reines säures Natrium sein. Thatsächlich aber besteht es nach einer Untersuchung von B. FISCHER aus etwa 70 Proc Natrium-Oleat und 30 Proc freier Oelsäure. Man kann es darstellen, indem man 100 Th reiner Oelsäure mit 10 Th reinem trocknen Aetznatron in alkoholischer Lösung verseift und die entstandene Seife zur Trockne bringt.

Weissliche, weiche, seifenartige Masse, schwach nach Oelsäure riechend. Gegen Lackmus schwach alkalisch, in Wasser trübe löslich. Die konz. wässrige Lösung wird durch Phenolphthalein nicht oder kaum geröthet, erst nach dem Verdünnen mit viel Wasser erfolgt starke Röthung. Die Menge der vorhandenen freien Oelsäure wird festgestellt durch Titration der alkoholischen Lösung mittels Normal-Kalklauge und Phenolphthalein als Indikator.

Es wird zur Unterstützung der Gallenthätigkeit zweimal täglich zu je 1 g in Pillenform gegeben. Rp. Eunnatrol 25,0, Terrae siliceae, Glycerini q. s. Fiat pulvae 100 Morgens und Abends je 4 Pillen.

Emplastrum adhaesivum Germ. I. In 18 Th rohe Oelsäure giebt man in der Kälte unter beständigem Umrühren (!) allmählich 10 Th höchst feingepulverte Bleiglatte ein und erhält die homogene Mischung unter beständigem Umrühren (!), bis ein Pflaster geworden ist — Alsdann mischt man ein geschmolzenes Gemisch von 3 Th Kolophonium und 1 Th Talg hinzu — Dieses Pflaster entbehrt nach einiger Aufbewahrung der erforderlichen Klebkraft.

Spiritus Saponis, Seifengeist. 90 Th roher Oelsäure und 310 Th 90proc Weingeist werden in einen Kolben gegeben, im Wasserbade bis auf 50 bis 60° erwärmt und nach und nach mit 33 Th zerriebenem Natriumbikarbonat, zuletzt mit 200 Th Rosenwasser versetzt.

Sapo argentarius, Silberseife. Oelsäure 100 Th und Stearinsäure 300 Th werden durch Schmelzung verbunden, dann mit 100 Th Schlammkreide gemischt, und nach dem Erkalten gepulvert. Zum Putzen von Silberzeug.

Unguentum ad corium, Lederschniöre. Oelsäure, Harzöl und Thran ää.

Richter's Patent-Wellenöl zum Glätten der Wellen ist rohe Oelsäure mit 10 Proc Amylalkohol (Ph. Ztg. 1894 511).

Putzöl ist rohe Oelsäure, eventuell mit Zusatz von 30 Proc Mineralöl (Petroleum).

Putzpomade. Trippol 40 Th, English Roth 10 Th, Oelsäure 50 Th.

Ammoniumoleat als Reinigungsmittel für Glas, Porcellan, Gespinnste etc. Oelsäure 1 Th, Spiritus 2 Th, Ammoniakflüssigkeit 14 Th.

Acidum osmicum.

I † Acidum osmicum (Ergänzb.), seu hyperosmicum, seu osmicum. Osmiumtetroxyd Osmiumsäure. Ueberosmiumsäure. Perosmiumsäure. Acide osmique. Osmic acid. OsO_4 . Mol. Gew. = 254.

Darstellung. Sehr fein vertheiltes Osmium (etwa so fein wie Platinmohr oder -schwamm) wird unter Ueberleiten von Sauerstoff auf etwa 400° erhitzt. Es verbrennt dabei zu Osmiumtetroxyd, welches flüchtig ist und in abgekühlten Vorlagen gesammelt wird.

Eigenschaften. Farblose bis gelbliche, oder grünlich-graue, nadelförmige Krystalle oder krystallinische Stücke von stechendem, chlorartigem Geruche und sehr scharfem Geschmacke, welche aus der Luft Feuchtigkeit anziehen, Dämpfe ausströmen, beim Erhitzen schmelzen und ohne Rückstand flüchtig sind. Die wässrige Lösung (1 = 100) röthet blaues Lackmuspapier nicht, ist farblos, verursacht aber, besonders bei Lichtzutritt, Schwärzung der Gefäßwand. Sie färbt Kaliumjodidlösung gelb, wird durch Schwefelwasserstoff schwarzbraun gefällt, durch schweflige Säure zuerst gelb, dann braun und violett, durch Gerbsäurelösung dunkelblau gefärbt. Wird zu einer wässrigen Lösung Alkohol zugesetzt, so scheidet sich innerhalb 24 Stunden alles Osmium in Form eines schwarzen Niederschlages und zwar als Osmiumtetrahydroxyd Os(OH)_4 ab.

Die Dämpfe des Osmiumtetroxydes wirken auf die Schleimhäute stark reizend, besonders gefährlich ist die Einwirkung auf die Schleimhaut der Luftwege und der Augen! (Vorsicht!) Es kann Erblindung eintreten.

Prüfung. Osmiumsäure darf beim Erhitzen einen Rückstand nicht hinterlassen. Die Ausführung dieser Probe erfolge mit größter Vorsicht unter Anwendung geringer Mengen unter einem gut wirkenden Abzuge, da sonst schwere Entzündungen der Schleimhäute eintreten können.

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt. In den Handel gelangt die Osmiumsäure meist in Röhren eingeschlossen. Da der Inhalt dieser Röhren seinem Gewichte nach bekannt ist, so empfiehlt es sich, die geöffneten Röhren sogleich umgekehrt in Wasser zu stellen und von dem Inhalt eines Röhrens eine Lösung von bekanntem Gehalte herzustellen. Auch diese Lösungen sind vor Licht und Staub geschützt vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung. Innerlich in Gaben von 0,001–0,003 g mehrmals täglich in Pillen, am besten mit Bolus bereitet, bei gleichzeitigem Gebrauche von Kalumbromid gegen Neuralgien und Epilepsie. Subkutan $\frac{1}{2}$ –1 cm der 1procentigen wässrigen Lösung. Größte Gaben pro dosi 0,01, pro die 0,02 g. Die wässrige Lösung ist in dunklen Gläsern mit Glasstopfen zu dispensiren.

Technisch zum Härten von mikroskopischen Objekten.

II. † Kalium osmicum Kaliumosmat. Osmigsäures Kalium. $\text{OsO}_4\text{K}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 368.

Darstellung. Zu einer frisch bereiteten Lösung von Osmiumsäure in Alkohol setzt man Kalilauge hinzu. Die Flüssigkeit färbt sich schön roth, und falls sie hinreichend koncentrirt ist, wird das Kaliumosmat als Krystallpulver abgeschieden. Beim langsamen Verdünnen verdünnterer Lösungen erhält man granatrothe bis schwarzrothe Oktaëder. Braunrothes Krystallpulver oder rothe bis schwarzrothe Oktaëder, von stiellich adstringirendem Geschmacke, in Wasser leicht löslich. An trockener Luft haltbar, in feuchter Luft zerfließend und sich zersetzend. — Die Lösungen des Salzes zersetzen sich besonders auf Zusatz einer Säure unter Bildung von Osmiumtetroxyd und niederen Oxyden des Osmiums. Vorsichtig, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, aufzubewahren.

Anwendung. Innerlich in Gaben von 0,001–0,003, Subkutan $\frac{1}{2}$ –1,0 cm der einprocentigen Lösung wie Osmiumsäure, vor welcher es den Vorzug größerer Haltbarkeit hat. Größte Gaben pro dosi 0,2 g, pro die 0,5 g.

Acidum oxalicum.

Acidum oxalicum. Acide oxalique (Gall) Oxalic acid Oxalsäure. Kleesäure (hinsweilen auch *Acidum saccharinum*, Zuckersäure) $C_2H_2O_4 + 2 H_2O$ Mol Gew. = 126

Wird in chemischen Fabriken dargestellt a) durch Einwirkung von Salpetersäure auf Zucker (Tranbenzucker) oder Stärke, b) durch Verschmelzen von Cellulose (Sägemehl) mit einem Gemisch von korne Kali- und Natronlauge Die erhaltene Oxalsäure wird durch Umkrystallisiren gereinigt Man unterscheidet 1) eine technische und 2) eine reine Oxalsäure

I † Acidum oxalicum technicum (s. *depuratum, crystallisatum*) Entweder farblose, häufiger aber etwas grauweiße, prismatische Krystalle, nicht hygroskopisch Sie enthält als Verunreinigung in der Regel Schwefelsäure, Ammoniak und Salze des Kalium, Natrium, Calcium, Spuren Eisen 1 g darf beim mässigen Gluhen im bedeckten Platintiegel nicht mehr als 0,05 g Rückstand hinterlassen, anderenfalls ist auf absichtlichen Zusatz der verunreinigenden Salze zu schliessen Von diesen Verunreinigungen abgesehen, gleicht sie in ihren Eigenschaften der reinen Oxalsäure

II † Acidum oxalicum purissimum (Erghnzb.) Wird im Allgemeinen durch Umkrystallisiren der rohen Säure hergestellt Falls die letztere Kali oder Natron enthält, lassen sich die letzten Spuren der Verunreinigungen nur schwer beseitigen Man hat dafür empfohlen Umkrystallisiren aus Alkohol oder aus reiner 12proc Salzsäure Am zweckmässigsten jedoch ist die Reinigung durch Sublimation der entwässerten, rohen Oxalsäure auszuführen Man bringt letztere in einen Kolben, welcher in einem Paraffinbade steht und durch den mittels einer Saugpumpe ein Luftstrom hindurch geführt werden kann Als Vorlagen benutzt man zwei leere Kolben, durch welche der Luftstrom gleichfalls durchgelatet werden kann Man erhitzt nun die Oxalsäure und hält sie möglichst auf 157° C, während der Luftstrom durchgesaugt wird Dieser nimmt die sublimierende Oxalsäure in die vorgelegten Kolben mit, wo sie sich wasserfrei zu glänzenden Krystallen verdichtet, welche durch Auflösung in heissem Wasser wieder in wasserhaltige Oxalsäure $C_2O_4H_2 + 2 H_2O$ verwandelt werden

Eigenschaften. Reine Oxalsäure bildet farblose, geruchlose, stark sauer schmeckende, prismatische, nicht hygroskopische Krystalle $C_2H_2O_4 + 2 H_2O$ Ueber Schwefelsäure oder durch Erwärmen auf 70° C wird sie wasserfrei, schon bei 100° C sublimirt wasserfreie Oxalsäure, bei 150—157° C ist die Sublimation in vollem Gange Bei 160° C erfolgt Zersetzung, bei 180° C Schmelzen, bei 190° C Sieden der entwässerten Oxalsäure Die Dämpfe der entwässerten Oxalsäure reizen heftig zum Husten

Die krystallisierte (wasserhaltige) Säure löst sich in 10 Th Wasser von 15° C, oder in 3 Th siedendem Wasser, feiner in 2,5 kaltem oder in 1,8 Th siedendem Alkohol, wobei 2 Th Bildung von Oxalsäureäther erfolgt, schwer in Aether Mit Wasserdämpfen ist sie flüchtig Beim Erhitzen mit wasserentziehenden Mitteln, z B Schwefelsäure, zerfällt sie in Wasser, Kohlensäure und Kohlenoxyd Daher ist Oxalsäure ein Reduktionsmittel sie COOH entfarbt z B Kaliumpermanganat beim Erwärmen in schwefelsaurer Lösung und COOH | reduziert Goldsalze zu metallischem Gold Beim Erhitzen mit Glycerin entsteht Ameisensäure Oxalsäure ist eine zweibasische Säure, ihre Salze heissen „Oxalate“ Oxal- Säure Sie bildet neutrale, saure und übersaure Salze

Nachweis und Bestimmung. Man erkennt die Oxalsäure an folgenden Reaktionen

1) Fügt man zu freier Oxalsäure (oder löslichen Oxalaten) eine Lösung von Calciumacetat, so entsteht ein weisser Niederschlag von Calciumoxalat $C_2O_4Ca + H_2O$ Dieser ist unlöslich in Wasser, in Essigsäure und in Ammoniak, dagegen leicht löslich in Salzsäure und in Salpetersäure (ähnliche Niederschläge entstehen mit Strontium- und Baryumacetat) 2) Mit Bleiacetat entsteht in den Lösungen der Oxalsäure und der Oxalate schwer lösliches, weisses Bleioxalat C_2O_4Pb 3) Silbernitrat giebt mit Oxalaten weissen, in Salpetersäure löslichen Niederschlag 4) Liegen unlösliche Oxalate vor, so kocht man diese mit

Natriumkarbonatlösung aus. Das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat giebt auf Zusatz von Calciumacetat alsdann einen Niederschlag von Calciumoxalat.

Bestimmung. Freie Oxalsäure kann man a) mit Normalalkalilauge und Phenolphthalein titrieren. 1 ccm Normalalkalilauge ist = 0,063 g Oxalsäure $C_2O_4H_2 + 2H_2O$. b) Durch Kaliumpermanganat titrieren $2KMnO_4 + 5C_2H_2O_4 + 2H_2O + 3H_2SO_4 = 18H_2O + 10CO_2 + K_2SO_4 + 2MnSO_4$. Zu diesem Zwecke säuert man die Lösung, welche andere durch Kaliumpermanganat oxydierbare Bestandtheile nicht enthalten darf, mit verdünnter Schwefelsäure an, erhitzt bis fast zum Sieden und titrirt mit Kaliumpermanganat bis zur eben bleibenden Rothfärbung. 1 g $KMnO_4$ zengt 1,9736 g $C_2H_2O_4 + 2H_2O$ an. Das Verfahren ist auch für Oxalate anwendbar, falls sie nicht eine gleichfalls noch oxydierbare Base (z. B. Eisenoxydul) enthalten. Nur ist alsdann entsprechend mehr Schwefelsäure zuzufügen. c) Gewichtsanalytisch. Man fällt die Oxalsäure in der Siedehitze mit Calciumchlorid, oder man übersättigt sie mit Ammoniak und fällt in der Siedehitze mit Calciumchlorid. Das ausgewaschene Calciumoxalat kann nach b) titrirt werden oder man führt es durch vorsichtiges Glühen (zuletzt Befechtung mit Ammoniumcarbonat und Trocknen bei 150°) in Calciumcarbonat über. $1,0 CaCO_3 = 1,26 C_2H_2O_4 + 2H_2O$. Oder man verwandelt es durch Glühen vor dem Gebläse in CaO . $1,0 CaO = 2,25 C_2O_4H_2 + 2H_2O$.

Volumgewicht der Oxalsäurelösungen
und Gehalt an $C_2H_2O_4 + 2H_2O$ (Franz) bei 15°

Vol Gew	Proc $C_2H_2O_4 + 2H_2O$	Vol Gew	Proc $C_2H_2O_4 + 2H_2O$	Vol Gew	Proc $C_2H_2O_4 + 2H_2O$
1 0032	1	1 0182	6	1 0271	10
1 0064	2	1 0204	7	1 0289	11
1 0096	3	1 0226	8	1 0309	12
1 0128	4	1 0248	9	1 0320	12 2
1 0160	5				

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor ammoniakalischer Luft geschützt.

Prüfung. 1) 1 g hinterlasse beim Glühen im Platintiegel keinen wägbaren Rückstand (Kalium-, Natrium-Salze). 2) Die wässrige Lösung 1 : 20 werde a) nach dem Ansäuern mit Salpetersäure weder durch 5 Tropfen Baryumchloridlösung noch durch Silbernitratlösung getrübt (Schwefelsäure, Chlor). b) durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Kupfer, Blei) auch nicht nach Zusatz von Ammoniak (Eisen, Zink). 3) 3 g der Krystalle geben nach dem Übersättigen mit Natronlauge beim Erwärmen nicht den Geruch nach Ammoniak zu erkennen.

Anwendung. In Substanz oder concentr. Lösung wirkt Oxalsäure auf Schleimhäuten ätzend. Nach der Resorption wirken auch dünnere Lösungen der freien Säure, sowie der Oxalate, giftig auf das Herz- und Nervensystem. Symptome: Athemnoth, Ameisenkriechen, Rückenschmerzen, Krämpfe. Der Tod erfolgt entweder bald oder nach Tagen und Wochen. Dosis letalis wird zu 4,0–15,0 g angegeben. Gegengift: Kreide, Kalkwasser, Zuckerkalk, Calciumacetat. Therapeutisch kaum mehr verwendet.

Die Angabe, dass Oxalsäure nicht giftiger sei als Citronensäure und wie diese in Form von Limonaden gereicht werden könne, ist durchaus falsch und kann unter Umständen verhängnisvoll werden.

In der Analyse besonders als Reagens zur Erkennung und Bestimmung der alkalischen Erden. Technisch zur Herstellung von Tinte, von Beizen in der Kattendruckerel, zum Entfärben von Stroh, zum Entfernen von Restflecken.

Toxikologisches. Ist der Nachweis einer Vergiftung durch Oxalsäure zu führen, so ist zunächst die Schleimhaut von Magen und Darm mikroskopisch auf das Vorhandensein der charakteristischen Krystalle des Calciumoxalates zu untersuchen.

Alsdann kocht man die zerkleinerten und auf dem Wasserbade eingetrockneten Objekte mit 85 proc. Alkohol 2–3 Mal aus, filtrirt und zieht den Alkohol zum größten

Theil durch Destillation ab. Den Rückstand trocknet man ein, zieht ihn mit Wasser aus und filtrirt. Das Filtrat giebt beim Kochen mit Calciumacetat einen weissen Niederschlag von Calciumoxalat, falls freie Oxalsäure oder überoxalsaures Kalium zugegen war, da dieses letztere durch Alkohol in Kalumbioxalat und Oxalsäure zerlegt wird. Das erhaltene Calciumoxalat ist durch Specialreaktionen näher zu kennzeichnen. Die Bestimmung erfolgt in gleicher Weise, wie oben angegeben, nur ist eine gewogene Menge von Organtheilen in Arbeit zu nehmen, und das Gewicht des erhaltenen Calciumoxalates ist durch Uebersetzen des letzteren in Calciumkarbonat oder Calciumoxyd festzustellen.

Die beim Extrahiren mit Alkohol hinterbliebenen Organtheile werden mit Wasser ausgezogen. Das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat wird aufgekocht und durch Filtriren von etwa ausgeschiedenem Eiweiss befreit. Erhält man aus dem zum Sieden erhitzten Filtrat durch Calciumacetat nochmals einen Niederschlag von Calciumoxalat, so stammt dieses von löslichen oxalsäuren Salzen her, welche in den Organtheilen vorhanden gewesen sind. Bestimmung wie vorher.

Ueber den Nachweis der Oxalsäure im Harn s. Urina

Antifer, Tintenfleckenreiner. Eine Mischung von grobgepulverter Oxalsäure und grobgepulvertem Alaun wird bei 120° im Porcellankasserol geschmolzen und in Stangen gegossen, die man in Stanniol einhüllt.

Enerivore. Zum Vertilgen von Gallus-Tintenflecken, mittelst Haarpinsels aufzutragen. Oxalsäure 8,0, Wasser 20,0, Alkohol 50,0.

Robigin. Zum Entfernen von Rostflecken aus Wäsche etc. Salzsäure (25 Proc.) 4,0, Oxalsäure 4,0, Wasser 92,0. Die Lösung ist heiss anzuwenden.

Plus d'encre aux doigts, le nouveau nettoyeur, oder No more inkblots on the fingers; the new chemie patent cleaner. Runde, circa 5,0 cm lange, 0,9—1,0 cm dicke, von buntem Stanniol umhüllte Stäbe, dargestellt aus geschmolzener Oxalsäure mit einer kleinen Menge Cochenillpulver. *Signature Mouillez la tache d'encre, frottez la avec le nettoyeur chimique, elle disparaîtra immédiatement.*

Cosmeticon oxalicum

Rp	Acidi oxalici	5,0
	Boracis	10,0
	Aquae Rosae	133,0
	Glycerini puri	50,0

M D S Zum Waschen fleckiger Hautstellen

Mixtura oxalica martiata GAMBENI

Rp	Ferri sulfurici crystallisati	0,5
	Acidi oxalici	0,25
	Aquae destillatae	130,0
	Sirupi Sacchari	50,0

M D S Esslöfelfweise in der Pyrexie (bei Intermittens)

III † Ammonium oxalicum (Ergänzb.), Ammoniumoxalat. Oxalate d'Ammoniaque. Oxalate of Ammonia $C_2O_4(NH_4)_2 \cdot H_2O$. Mol. Gew. = 142. Darzustellen durch Neutralisiren von 10 Th kryst. Oxalsäure mit 27 Th Ammoniak (10 Proc.) und Eindampfen der Lösung bis zur Krystallisation. Farblose, in Wasser klar lösliche Krystalle. Löslich in 20 Th Wasser, die Lösung ist neutral. 2 g sollen ohne Rückstand verbrennen, essigfrei von Schwefelsäure und von Metallsalzen. Prüfung wie Acidum oxalicum. Die Lösung 1:20 dient als Reagens in der Analyse. Man stellt sie ex tempore dar aus kryst. Oxalsäure 10,0, Ammoniakflüssigkeit (10 Proc.) 27,0, Wasser 163,0. Vorsichtig aufzubewahren.

IV † Kalium bioxalicum (Ergänzb.) Saures Kaliumoxalat $C_2O_4HK \cdot H_2O$. Mol. Gew. = 146. Oxalate acide de potasse (Gall.) Bioxalate de potasse. Sel d'oseille. Bi-oxalate of potassium. Wird in chemischen Fabriken dargestellt. Man kann es im kleinen erhalten, indem man die wässrige Lösung von 10 Th Kaliumkarbonat mit etwa 9,1 Th kryst. Oxalsäure neutralisirt, alsdann nochmals die gleiche Menge Oxalsäure als zur Neutralisation verbraucht war (9,1 Th), hinzufügt und zur Krystallisation eindampft. — Farblose, luftbeständige, sauer und bitter schmeckende, sauer reagirende monokline Krystalle, in 40 Th kaltem oder 6 Th siedendem Wasser löslich, unlöslich in Alkohol. Aufbewahrung Vorsichtig.

V † Kalium tetraoxalicum Uebersaures Kaliumoxalat $C_2O_4HK + C_2O_4H_2 + 2H_2O$. Mol. Gew. = 254. Man neutralisirt die wässrige Lösung von 10 Th Kaliumkarbonat mit (9,1 Th) kryst. Oxalsäure, fügt zu der Lösung die dreifache Menge (27,3 Th) der vorher zum Neutralisiren verbrauchten Oxalsäure und dampft zur Krystallisation ein. Farblose, sauer reagirende, trikline Krystalle, in 50 Th Wasser löslich. Spec. Gew. 1,765. Findet

¹⁾ Das Ergänzb. führt das Kleesalz nicht ganz zutreffend als „Kalumbioxalicum“ auf, s. unter Oxalium.

Verwendung bei der Prüfung des Chinas (Tetraoxalat-Probe) und als Urmaass in der Maassanalyse Aufbewahrung Vorsichtig Durch Alkohol wird dem Salze freie Oxalsäure entzogen, während Kalumbioxalat hinterbleibt

VI † Oxalum Kleesalz. Sauerkleeasalz (bisweilen Bitterkleeasalz, aber nicht mit Bittersalz zu verwechseln!) Sal Acetosellae. (Kalium bioxalicum des Eigénz)

Wird fabrikmässig hergestellt und ist gewöhnlich ein Gemenge von Kalumbioxalat mit Kaliumtetraoxalat und löst sich in etwa 40 Th Wasser Verfälscht wird es bisweilen durch Krystalle von Kaliumsulfat Anwendung meist zur Entfernung von Rost- und Tinten flecken, da es mit Eisensalzen bez mit Eisenoxyd und -hydroxyd das in Wasser lösliche Doppelsalz Eisen-Kalumoxalat bildet Aufbewahrung Vorsichtig! Giftig!

Ueber die Abgabe des Kleesalzes existiren besondere medicinalpolizeiliche Vorschriften

Kleesalz-Surrogat für Entfernung von Eisenflecken Weinstainpulver 100, Alaunpulver 50,0

Eau écarlate, Scharlachwasser, zur Reinigung von Tüchern und Wollstoffen, besonders rothgefärbter, wird bereitet aus 25,0 Oxalum, 15,0 krystallisiertem Natriumkarbonat, 5,0 Kaliumkarbonat, 1000,0 Wasser mit Cochenille mässig tingirt.

Reinigungssalz, zum Reinigen penséefarbener und rother Zeugstoffe, ist ein pulvriges Gemisch aus 50,0 Oxalum, 25 krystallisiertem Natriumkarbonat, 7,0 Kaliumkarbonat und 3,0 Cochenillepulver

VII † Kalium oxalicum neutrale Neutrales Kaliumoxalat. Oxalate neutre de potasse Oxalate of potassium $C_2O_4K_2 \cdot H_2O$. Mol. Gew = 184. Wird durch Neutralisiren von 10 Th Kaliumkarbonat mit (9,1 Th) kryst Oxalsäure und Eindampfen bis zur Krystallbildung dargestellt Farblose, neutrale Krystalle, in der Wärme verwitternd Löslich in 3 Th Wasser Wird in der Analyse und in der Photographie (s. d.) zur Herstellung des Eisenoxalat Entwicklers verwendet

Acidum phenylosulfuricum.

Unter der Bezeichnung Phenolschwefelsäure und Phenylschwefelsäure werden zwei Verbindungsklassen gewöhnlich durcheinander geworfen, welche streng zu trennen sind, nämlich 1) die sulfonirten Phenole und 2) die ätherartigen Derivate der Phenole mit der Schwefelsäure

Phenolsulfosäuren. Mischt man reines Phenol (Karbolsäure) mit konz Schwefelsäure, so entsteht in der Kälte Orthophenolsulfosäure, in der Wärme dagegen Para phenolsulfosäure Man trennt die beiden Säuren, indem man sie in die Kaliumsalze verwandelt und deren Lösung zur Krystallisation eindampft Es krystallisirt alsdann zu erst das schwerlösliche Salz der Para Säure $C_6H_4(OH)SO_3K$ (1·4) und erst später dasjenige der Ortho Säure $C_6H_4(OH)SO_3K + 2H_2O$ aus Man verwandelt diese Salze durch Fällen mit basischem Bleiacetat in die schwerlöslichen Bleisalze, zerlegt diese durch Schwefelwasserstoff und erhält nun durch Abdunsten der Lösungen beide Säuren krystallisirt

I. † Ortho-Phenolsulfosäure Wird als solche nicht, wohl aber als wässrige Lösung therapeutisch verwendet Unter „Aseptol“ oder Sozolsäure versteht man eine wässrige 33 $\frac{1}{3}$ proc Lösung der Ortho Phenolsulfosäure

Acidum sozollum. (Ergänzb) Sozolsäure. Aseptolum. Zur Darstellung mischt man gleiche Theile reine Karbolsäure und reine konz Schwefelsäure unter Vermeidung jeder Temperatur-Erhöhung und lässt das Gemisch unter gutem Verschluss und gelegentlichem Umschütteln etwa 8 Tage lang stehen Als dann giesst man es unter Umrühren in Eiswasser und neutralisirt mit Baryumkarbonat Die freie Schwefelsäure wird als Baryumsulfat abgeschieden, Orthophenolsulfosäure geht als Baryumsalz in Lösung Man bestimmt in einer Probe des Filtrates die vorhandene Menge Baryum und fällt alsdann in der Gesamtflüssigkeit das Baryum durch eine berechnete Menge Schwefelsäure Das Filtrat wird durch Eindunsten auf das spec Gew 1,155 gebracht.

Eigenschaften. Farblose, fast geruchlose, bez nur schwach phenolartig riechende, und schwach sauer reagirende, zunächst farblose, später gelbliche oder schwach röthliche Flüssigkeit, welche sich im Lichte bald dunkler färbt. Mit Wasser, Weingeist und Glycerin in jedem Verhältnisse mischbar. Enthält in 100 Th. = 33,3 Th Orthophenolsulfosaure

Prüfung. Die wässrige Lösung 1 = 10 werde durch Baryumnitratlösung nicht verändert. Werden 2 ccm auf dem Platinblech eingedampft und der Rückstand gegläht, so soll kein unverbrennlicher Rückstand hinterbleiben.

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt.

Anwendung. An Stelle der Karbolsäure und Salicylsäure als Antisepticum in der Wundbehandlung. Nach HUYERH soll die 10 procentige wässrige Lösung sicher antiseptisch wirken. Lösungen in Glycerin, Oel und Alkohol sind unwirksam. Innerlich in gleichen Mengen wie Salicylsäure als Antiformentativum bei Magen- und Darmkatarrhen.

In wässriger Lösung geht die Orthophenolsulfosaure nach längerem Stehen freiwillig in die Para-Phenolsulfosaure über.

Aseptol Präparate, im Jahre 1886 von der Firma Dunkel & Co zu Berlin in den Handel gebracht, haben mit dem vorstehend beschriebenen Aseptol nichts gemein, sie bestanden aus Mischungen von terpenhaltigen Oelen.

Acidum aseptinicum. Aseptinsäure. Wasserstoffsäure. Auflösung von 5 Th Borsäure in 100 Th Wasserstoffsuperoxyd (2 Proc) mit oder ohne Zusatz von 8 Th Salicylsäure oder Kresotinsäure.

II Para-Phenolsulfosaure ist diejenige Säure, welche schlechthin als „Karbolschwefelsäure“ oder „Karbolsulfo(n)säure“ bezeichnet wird. Die reine Säure wird medicinisch nicht, dagegen werden einige ihrer Salze verwendet.

‡ **Zincum sulfocarbolicum.** (Erganzb) **Zincum sulfophenolicum** (Helv) **Sulfophénolate de zinc. Phenolsulfosaures Zink. Sulfokarbolsaures Zink.** $[C_6H_4(OH)SO_3]_2Zn + 7H_2O$. Mol. Gew. = 537.

Darstellung 100 Th Karbolsäure werden in einem Kolben mit 120 Th conc Schwefelsäure gemischt und der Kolben locker verschlossen etwa 8 Tage an einem warmen Ort (60°) gestellt. Nach dieser Zeit wird die Mischung in 2500 Th Wasser gegossen, gemischt und mit 245 Th oder so viel Baryumkarbonat erhöht, als zur Neutralisation der Säure erforderlich ist. — Der filtrirten Flüssigkeit wird eine Lösung von 170 Th kryst Zinksulfat in 240 Th Wasser oder soviel von dieser Lösung hinzugefügt, als zum völligen Ausfällen des Baryumsulfates nothwendig ist. Nach eintägigem Stehen wird abfiltrirt, der Filterinhalt mit Wasser nachgewaschen, das Filtrat abgedampft und zur Krystallisation gestellt. NB. Bei dem Umsetzen des Baryumsulfophenolates stelle man $\frac{1}{30}$ des Filtrates in Reserve, um etwa zu viel zugegebenes Zinksulfat ausfällen zu können.

Eigenschaften Farblose oder sehr schwach röthliche, geruchlose oder nur sehr schwach nach Karbolsäure riechende rhombische Krystalle von saurer Reaktion, an der Luft etwas verwitternd. Löslich in 2 Th Wasser oder in 5 Th Weingeist. Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid violett gefärbt.

Prüfung. Die wässrige Lösung (1 = 10) werde durch Schwefelsäure nicht getrübt (Baryumsalze), auch dürfen Ammoniumoxalat sowie Baryumchlorid keine, oder doch nur eine äusserst geringe Trübung verursachen (Calciumsalze, Schwefelsäure). Ammoniumsulfid erzeuge einen weissen Niederschlag von Zinksulfid, das von diesem gewonnene Filtrat hinterlasse nach dem Abdampfen und Glühen keinen feuerbeständigen Rückstand.

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen, vorsichtig.

Anwendung. Das Präparat soll die desinficirenden Eigenschaften der Karbolsäure und die adstringirenden des Zinksulfates in sich vereinigen. Man benutzt es in der Wundbehandlung, zu Injektionen gegen Tripper (0,5–1,0–2,0 200) und in kosmetischen Zubereitungen.

Aqua antiphotholica.
 Rp Zinci sulfocarbolici 2,0
 Glycerini 20,0
 Aquae Rosae 30,0
 Spiritus odoralis 5,0
 Zum öfteren Betupfen der Sommerprossen
 und anderer Hautflecken

Injectio mitis
 (Form mag Berol)
 Rp Zinci sulfocarbolici 0,5
 Aquae q s ad 200,0
 Einspritzung bei Gonorrhoe

Reverdin's chirurgische Seife Olei Amygdalarum 72,0, Liquoris Kali caustici (10 Proc) 12,0, Liquoris Natru caustici (10 Proc) 24,0, Zinci sulfocarbolici 2,0, Aquae Rosarum 10,0 Verseifen und in Formen gießen

† **Magnesium sulfocarboleum.** Karbolsulfosaures Magnesium $[C_6H_4(OH)SO_3]_2 Mg + 7H_2O = 496$ Wird in der nämlichen Weise hergestellt wie das vorher besprochene karbolsulfosaure Zinksalz. Nur nimmt man an Stelle von 170 Th kryst Zinksulfat zum Umsetzen der karbolsulfosauren Baryumlösung etwa 146 Th kryst Magnesiumsulfat. Farblose und geruchlose, bitterlich schmeckende Krystalle. Sollen wie Magnesiumsulfat wirken, aber den Darm weniger reizen als dieses. Vorsichtig aufzubewahren.

† **Calcium sulfocarboleum.** Karbolsulfosaures Calcium $[C_6H_4(OH)SO_3]_2 Ca + H_2O = 404$ Wird durch Sättigen der freien Para-Phenolsulfosäure mit Calciumkarbonat dargestellt — Farbloses, fast geruchloses, adstringierend bitter schmeckendes, in Wasser und in Weingeist leicht lösliches krystallinisches Pulver. Anwendung Als Antisepticum, Desinficiens und Adstringens. Bei hartnäckigen Brechdurchfällen in 1proc wässriger, versüßter Lösung. Vorsichtig aufzubewahren.

† **Aluminium-Kalium sulfophenoleum.** Para-Phenolsulfosaures Aluminium-Kalium $[C_6H_4(OH)SO_3]_2 AlK$ Wird durch Sättigen der freien Paraphenolsulfosäure mit einer Lösung von Kalium-Aluminat dargestellt — Farblose, in Wasser lösliche Krystalle. Wirkt antiseptisch und adstringierend. Ausserlich in 5—20proc Lösung bei Krebsegeschwüren, Knochenfisteln, sowie als Kollutorium bei ubelriechendem Athem.

† **Aluminium sulfocarboleum.** Sozial Karbolsulfosaures Aluminium $[C_6H_4(OH)SO_3]_2 Al = 546$ Wird dargestellt a) durch Sättigen der freien Paraphenolsulfosäure mit Aluminiumhydroxyd oder b) durch Umsetzen von Baryumsulfophenolat mit Aluminiumsulfat. In diesem Falle verfährt man genau wie bei der Darstellung des Zineum sulfocarboleum, nur nimmt man zur Zersetzung des Baryumsalzes an Stelle von 170 Th kryst Zinksulfat rund 132 Th kryst Aluminiumsulfat $[Al_2(SO_4)_3 + 18H_2O]$.

Eigenschaften. Krystallinische Körner, von schwachem Phenolgeruch und adstringierendem Geschmack. Leicht löslich in Wasser, Glycerin, auch in Alkohol. Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid violette Färbung, durch Ammoniak wird Aluminiumhydrat gefällt. Baryumchlorid erzeugt keine oder nur minimale Trübung. Beim Erhitzen auf dem Platinblech bläht es sich zunächst stark auf und verbrennt unter Hinterlassung von Aluminiumoxyd.

Anwendung. Als Antisepticum, etwa wie Aluminiumacetat, bei Eiterungen, tuberkulösen Geschwüren, cystischen Fällen. Bei letzteren als 1procentige Injektion, aber auch innerlich. Die wässrige Lösung fällt Eiweiss, aber der Niederschlag wird durch Ueberschuss von Eiweiss wieder gelöst.

LAPLACE's Karbol-Schwefelsäure Vgl unter Kresolum

III Phenyl-Schwefelsäure Schwefelsäure-Phenyl-Aether $HSO_4 \cdot C_6H_5$. Das Analogon der Aethylschwefelsäure, ist in freiem Zustande nicht bekannt. Die Salze können synthetisch dargestellt werden, auch kommen sie als sog Aetherschwefelsäuren oder gepaarte Schwefelsäure im Harn vor.

Acidum phosphoricum.

Acidum phosphoricum (orthophosphoricum). Phosphorsäure. Acide phosphorique. Phosphoric acid PO_4H_3 , Mol. Gew. = 98.

Die von den Pharmakopöen aufgenommene Phosphorsäure ist eine mehr oder weniger konzentrierte wässrige Lösung der „Orthophosphorsäure“ PO_4H_3 . Ausserdem sind unter diesem Kapitel noch zu berücksichtigen die glasige Phosphorsäure und das Phosphorsäure-Anhydrid.

I. Acidum phosphoricum (Austr, Brit, Germ, Hely, U-St.) Phosphorsäure. Acide phosphorique officinal (Gall) Phosphoric acid. Die genannten Pharmakopöen

föhren das Präparat zum Theil als *Acidum phosphoricum concentratum*, theils als *Acidum phosphoricum dilutum*, theils schlechthin als *Acidum phosphoricum* auf.

<i>Acidum phosphoricum.</i>		Austr.	Gall. ¹⁾	Germ.	U-St.
Spec. Gew.		1,004	1,35	1,154	1,710
Proc. H_3PO_4		16,66	50,0	25,0	85,0

<i>Acidum phosphoricum concentratum.</i>			<i>Acidum phosphoricum dilutum.</i>		
	Brit.		Brit.	Helv.	U-St.
Spec. Gew.	1,5		Spec. Gew.	1,08	1,056
Proc. H_3PO_4	66,8		Proc. H_3PO_4	18,8	10

Handelssorten. Die wichtigsten sind: *Acid. phosphor.* Ph. Germ. Spec. Gew. 1,154 = 25 Proc., *Acid. phosphor.* 1,35 = 50 Proc., *Acid. phosphor.* 1,71, sirups = 85 Proc. Ferner: *Acid. phosphor. glaciale* und *Acid. phosphor. anhydricum*, endlich *Acidum phosphoricum ex ossibus*.

Darstellung. Zur Darstellung kleiner Mengen von Phosphorsäure, z. B. im pharmaceutischen Laboratorium, verfährt man wie folgt:

In eine geräumige Tubulat-Retorte giebt man 170 Th. einer reinen Salpetersäure von 1,154 spec. Gew., dazu 10 Th. eines Phosphors, welcher frei von Schwefel ist und vorher mit einer Mischung von 1 Th. Salzsäure, 3 Th. Salpetersäure und 25 Th. Wasser 24 Stunden lang macerirt und alsdann mit kaltem Wasser abgewaschen worden war. Damit die Retorte durch die Phosphorstangen nicht zertrümmert werde, ist es unbedingt nothwendig, dass sie vorher mit einem Theile der Salpetersäure beschickt und mit dem Hals nach oben gerichtet, auf einen Strohkranz gelegt werde, bevor man die Phosphorstangen vorsichtig hineinschiebt. Die Retorte, welche nur bis zu $\frac{1}{2}$, höchstens bis zur Hälfte angefüllt sein darf, bettet man in ein Sandbad ein, legt ohne Lutum einen Kolben vor, welcher gekühlt werden kann, und beginnt anzuheizen, anfänglich nur auf 70–80°, später kann die Temperatur erhöht werden. Unter Entwicklung braunrother Dämpfe erfolgt die Oxydation des Phosphors, gleichzeitig destillirt eine wässrige Salpetersäure über, welche von Zeit zu Zeit in die Retorte zurückgegossen wird. Man setzt das Erhitzen fort, bis aller Phosphor in Lösung gegangen ist. Fig. 22. und 23.

Hierauf bringt man den Inhalt der Retorte in eine Porcellanschale und dampft ihn im Freien oder unter einem Abzuge bis auf 40 Th. bez. so lange ein, bis alle Salpetersäure verjagt ist.




Fig. 22.




Fig. 23.

Als dann prüft man, ob die Flüssigkeit noch phosphorige Säure oder arsenige Säure enthält: a) Verdünnt man 15 Tropfen der Säure mit 5 cem Wasser und fügt 5 Tropfen Kaliumpermanganatlösung (1:1000) hinzu, so darf innerhalb einer Minute nicht Entfärbung eintreten (phosphorige Säure). b) Versetzt man 10 Tropfen der Säure mit 5 cem Zinn-

¹⁾ Acide phosphorique officinal.

chlorurlösung und erwärmt schwach, so darf innerhalb 15 Minuten Braunfärbung nicht eintreten (Arsen)

Ist phosphorige Säure zugegen, so muss die Phosphorsäure mit 4–6 Th Salpetersäure auf's Neue erhitzt und eingedampft werden und zwar in der Weise, dass man die erhitzte Phosphorsäure so lange unter Umrühren Salpetersäure zutropfelt, bis gelbbraune Dämpfe nicht mehr aufsteigen. Dann erhitzt man weiter bis zur völligen Verjagung der überschüssig zugesetzten Salpetersäure.

Die zurückgebliebene Phosphorsäure wird nun mit destillirtem Wasser bis auf 150 Th verdünnt, erwärmt und in einer starken Flasche mit Schwefelwasserstoff völlig gesättigt. Das gut verstopfte Gefäss wird 24 Stunden an einen warmen Ort gestellt. Nach dieser Zeit wird die vom ausgeschiedenen Schwefelarsen abfiltrirte Säure nochmals erwärmt, wieder noch warm mit Schwefelwasserstoff gesättigt, 24 Stunden an einen warmen Ort gebracht. Man filtrirt sie nochmals, erhitzt sie in einer Porcellanschale, bis der Schwefelwasserstoff völlig verjagt ist (Prüfung durch Bleessigl), dampft auf etwa 120 Th¹⁾ ein und stellt die erkaltete Flüssigkeit auf das beabsichtigte spec Gewicht.

In der Technik stellt man Phosphorsäure in der Weise dar, dass man Phosphor entzündet und an der Luft zu Phosphorsäure-Anhydrid P_2O_5 verbrennt, dieses in Wasser löst und sozusagen einer „Nachoxydation“ mit Salpetersäure unterwirft.

Eigenschaften. Farblose, geruchlose, rein sauer schmeckende Flüssigkeit, je nach der Concentration von wässriger bis zu sirupöser Beschaffenheit. Dampft man sie zum spec Gew 1,75 ein, so schiessen in der Kälte rhombische Krystalle der Formel PO_4H_2 an, die bei 38,6°C schmelzen, übrigens an feuchter Luft rasch zerfließen. Durch Erhitzen bis auf etwa 150°C erhält man amorphe, glasartige Massen von Orthophosphorsäure PO_4H_2 , über 213°C hinaus geht diese in Pyrophosphorsäure $P_2O_5H_4$ und über 300°C hinaus in Metaphosphorsäure PO_3H über. Bei heller Rothgluth (in Plattingefässen) lässt sich Phosphorsäure ohne Rückstand verflüchtigen.

Acidum phosphoricum sirupös (1,75 spec Gew) ist noch etwas concentrirter als das Präparat der U St. Es stellt einen zähen Sirup dar, welcher sehr hygroskopisch ist. Angewendet zum Trocknen von Gasen, ferner bei der Bestimmung des Stickstoffs nach KJELDHAL.

Volumgewicht der Phosphorsäure

bei 15° und Gehalt derselben an H_3PO_4 , sowie an P_2O_5

Vol Gew	Procent H_3PO_4	Procent P_2O_5	Vol Gew	Procent H_3PO_4	Procent P_2O_5	Vol Gew	Procent H_3PO_4	Procent P_2O_5
1 0054	1	0 726	1 1262	21	15 246	1 2731	41	29 706
1 0109	2	1 452	1 1329	22	15 973	1 2811	42	30 492
1 0164	3	2 178	1 1397	23	16 698	1 2894	43	31 218
1 0220	4	2 904	1 1465	24	17 424	1 2976	44	31 944
1 0276	5	3 630	1 1534	25	18 150	1 3059	45	32 670
1 0333	6	4 356	1 1604	26	18 876	1 3143	46	33 496
1 0390	7	5 082	1 1674	27	19 602	1 3227	47	34 222
1 0449	8	5 808	1 1745	28	20 328	1 3313	48	34 948
1 0508	9	6 534	1 1817	29	21 054	1 3399	49	35 674
1 0567	10	7 260	1 1889	30	21 780	1 3486	50	36 400
1 0627	11	7 986	1 1962	31	22 506	1 3573	51	37 127
1 0688	12	8 712	1 2036	32	23 232	1 3661	52	37 852
1 0749	13	9 438	1 2111	33	23 958	1 3750	53	38 578
1 0811	14	10 164	1 2186	34	24 684	1 3850	54	39 304
1 0874	15	10 890	1 2262	35	25 410	1 3951	55	40 030
1 0937	16	11 616	1 2338	36	26 136	1 4022	56	40 756
1 1001	17	12 342	1 2415	37	26 862	1 4114	57	41 482
1 1065	18	13 068	1 2493	38	27 588	1 4207	58	42 208
1 1130	19	13 794	1 2572	39	28 314	1 4301	59	42 934
1 1196	20	14 520	1 2651	40	29 040	1 4390	60	43 660

¹⁾ Falls man eine 25procentige Säure darstellen will

Prüfung. Verunreinigungen der officinellen Phosphorsäure sind Die Säuren des Arsens, phosphorige Säure, Salpetersäure, Schwefelsäure, mehr als Spuren glühbestandiger Substanzen Man prüft wie folgt

1) 10 Tropfen der Säure werden in einem blanken Platinschälchen bei heller Rothgluth verdampft, es darf kein wahrnehmbarer Rückstand hinterbleiben (Alkalien, Erden) — 2) Wird 1 cem Phosphorsäure mit 3 cem Zinnchloridlösung versetzt, so darf innerhalb 1 Stunde keine (Braun-) Färbung eintreten (Arsen) — 3) Die mit 3 Raumtheilen Wasser verdünnte Säure werde a) durch Baryumchlorid nicht getrübt (Schwefelsäure), b) durch Silbernitrat auch beim Erwärmen nicht verändert (Chlor, phosphorige Säure), c) durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Arsen, Blei, Kupfer), d) nach dem Uebersättigen mit Ammoniak durch Ammoniumoxalat nicht getrübt (Calciumsalze) — 4) Mischt man 2 cem der unverdünnten Säure mit 2 cem cone Schwefelsäure, so darf beim Ueberschichten mit 1 cem Ferrosulfatlösung eine gefärbte Zone nicht auftreten (Salpetersäure)

Aufbewahrung. Vor ammoniakalischer Luft geschützt

Anwendung. Phosphorsäure ist die mildeste der Mineralsäuren und belastigt in gehöriger Verdünnung den Verdauungstraktus verhältnissmässig wenig, weil sie Eiweiss nicht coagulirt Hauptsächlich als Antipyreticum, der Nutzen bei Knochenleiden, Caries, Rhachitis, zur Lösung von Harnsteinen aus Calciumoxalat, bei Schwachezuständen etc ist zweifelhaft Bei Blutungen wirkt sie nicht anders wie andere Säuren In Lösungen von 0,1—1,0 100,0, ferner in Tropfen und Pillen

Acidum phosphoricum ex ossibus Acidum ossium. Knochensäure wird die aus Knochenasche hergestellte Phosphorsäure genannt Knochenasche besteht zu einem beträchtlichen Theile aus tertiärem Calciumphosphat Man zersetzt dieses mit Schwefelsäure, wobei unlöslicher Gips und lösliches primäres Calciumphosphat entstehen $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 = 2 \text{CaSO}_4 + \text{CaH}_2(\text{PO}_4)_2$ Letzteres wird durch Natriumkarbonat (unter Abscheidung von Calciumcarbonat) in Natriumphosphat umgewandelt Man führt dieses in Baryumphosphat über und gewinnt die Phosphorsäure durch Zerlegung dieses Salzes mit berechneten Mengen Schwefelsäure — Die Knochen-Phosphorsäure ist stets durch Calciumverbindungen, häufig auch durch Sulfate verunreinigt und kann wohl zu technischen, nicht aber zu therapeutischen Zwecken verwendet werden

Analyse. Man erkennt die (Ortho-)Phosphorsäure an folgenden Reaktionen

1) Freie Phosphorsäure wird durch Silbernitrat nicht verändert Neutralisirt man die Säure aber zuvor (mit Na_2CO_3 , NaOH etc), so erzeugt Silbernitrat gelbes Silberphosphat Ag_3PO_4 , welches sowohl in Salpetersäure als auch in Ammoniak löslich ist In gleicher Weise reagiren natürlich die Alkaliphosphate direkt 2) Wird eine Lösung von Phosphorsäure oder eines Phosphates mit einem Ueberschuss einer Lösung von Ammoniummolybdätnat in Salpetersäure schwach (1) erwärmt, so entsteht ein gelber Niederschlag von Ammoniumphosphomolybdätnat $22 \text{MoO}_3 + 2(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 + 12 \text{H}_2\text{O}$, der in Ammoniak löslich ist 3) Fügt man zu einer Lösung von Magnesiumchlorid oder -sulfat Ammoniak, so entsteht ein Niederschlag von Magnesiumhydroxyd, derselbe geht auf Zusatz einer genügenden Menge von Ammoniumchlorid in Lösung Die Lösung ist klar und wird auch durch weiteren Zusatz von Ammoniak nicht mehr getrübt Setzt man jetzt ein phosphorsaures Salz hinzu, so entsteht ein krystallinischer Niederschlag (Sargdeckelform!) von Ammoniummagnesiumphosphat $\text{PO}_4\text{Mg}(\text{NH}_4) + 6 \text{H}_2\text{O}$, der in Ammoniak unlöslich, in Mineralsäuren löslich ist 4) Uranylacetat erzeugt in neutralen oder essigsauren Lösungen der Phosphate einen apfelgrünen Niederschlag von Uranylphosphat $(\text{UO}_2)_2\text{HPO}_4 + 3 \text{H}_2\text{O}$

Bestimmung.

Gewichtsanalytisch als Magnesiumpyrophosphat Diese Bestimmung ist anwendbar, wenn freie Phosphorsäure oder eine phosphorsäurehaltige Substanz vorliegt, welche durch Ammoniak nicht gefällt wird Man wägt soviel Substanz ab, als etwa 0,1—0,2 g P_2O_5 entsprechen, neutralisirt mit Ammoniak und lässt tropfenweise unter beständigem Umrühren (aber ohne dass man mit dem Glasstabe die Gefässwandungen berührt) Magnesiainmixturen in einem Ueberschuss zufließen Der entstehende Niederschlag wird um so krystallinischer, je eifriger man rührt Nach beendigter Fällung lässt man $\frac{1}{5}$ Volum der vorhandenen Flüssigkeit an 10proc Ammoniak hinzu und lässt 12 Stunden absetzen Dann filtrirt man ab, wäscht den Niederschlag mit 2,5 proc Ammoniak (6—8mal) bis zur Chlorfreiheit aus, trocknet und führt ihn durch Glühen — zum Schluss vor dem Gebläse — in Magnesiumpyrophosphat über $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 \times 0,6897 = \text{P}_2\text{O}_5$
 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 \times 0,88288 = \text{H}_3\text{PO}_4$

Molybdän-Methode Lässt sich die vorstehende Methode nicht anwenden weil entweder die Substanz in Wasser unlöslich ist oder weil durch Zusatz von Ammoniak schon an sich ein Niederschlag gebildet wird, so stellt man durch Anwendung von Salpetersäure eine Lösung (entsprechend 0,1–0,2 g P_2O_5) her, versetzt diese mit einem bedeutenden Ueberschuss Molybdän-Salpetersäurelösung (200 ccm), erwärmt etwa 1 Stunde auf dem Wasserbade auf 50–60° und lässt 12 Stunden an einem warmen Orte stehen. Der ausgeschiedene Niederschlag wird abfiltrirt und mit verdünnter Molybdänlösung (1+1) gewaschen. Alsdann löst man ihn auf dem Filter in 5procentigem Ammoniak und wäscht das Filter völlig mit Wasser aus. Die ammoniakalische Lösung versetzt man tropfenweise mit soviel Salzsäure, dass gerade eine Trübung eintritt. Diese beseitigt man durch Zugabe von soviel Ammoniak, dass die Flüssigkeit schwach danach riecht. Alsdann fällt man, wie vorher angegeben, mit Magnesiamixtur, fügt $\frac{1}{2}$ Vol. Ammoniak (10 Proc.) zu und führt das ausgeschiedene Ammoniummagnesiumphosphat durch Glühen in Magnesiumpyrophosphat über.

Ueber die Citrat-Methode s. S. 569.

Maassanalytisch Die acidimetrische Bestimmung der Phosphorsäure ist mit gewissen Schwierigkeiten verknüpft, wegen des eigenthümlichen Verhaltens der primären, sekundären und tertiären Salze der Phosphorsäure gegenüber Indikatoren. Nach Gmiesing kann man freie Phosphorsäure direkt titiren mit Natronlauge und Phenolphthalein als Indikator ($H_3PO_4 + 2 NaOH = Na_2HPO_4 + 2 H_2O$). 1 ccm Normalnatronlauge zeigt 0,049 g PO_4H_3 an.

Uran-Titrirung Versetzt man eine Lösung von Orthophosphorsäure, welche ausser dieser keine andere freie Säure als Essigsäure enthält, mit Uranacetat, so entsteht ein apfelgrüner Niederschlag von Uranylphosphat UrO_4HPO_4 .



Bei Gegenwart von Ammoniumsalzen tritt noch Ammonium in den Niederschlag ein, ohne dass sich sonst etwas an den obigen Verhältnissen ändert. Das Ende der Fällung ist erreicht, wenn alle Phosphorsäure an Uran gebunden und etwas Uranlösung im Ueberschuss vorhanden ist. Dieser Ueberschuss an Uran wird angezeigt durch Ferrocyankalium, welches mit Uranacetat einen rothbraunen Niederschlag bildet, das gefällte Uranylphosphat aber nicht beeinflusst. Man bedarf folgender Lösungen:

- 1) **Uranlösung** 38 g krystallisiertes käufliches Uranacetat und 5 ccm Essigsäure werden in Wasser zu 1 Liter aufgelöst. Die Lösung wird so eingestellt, dass 1 ccm = 0,005 g P_2O_5 anzeigt.
- 2) **Natriumphosphatlösung** 29,41 g krystallisiertes Natriumammoniumphosphat $NaH(NH_4)PO_4 + 4 H_2O$ (Sal microcosmicum) werden in Wasser zu 1 Liter gelöst. 1 ccm der Lösung ist = 0,01 g P_2O_5 .
- 3) **Essigsäure-Natriumacetatlösung** 100 g Natriumacetat und 100 ccm Essigsäure von 30 Proc. werden mit Wasser zu 1 Liter gelöst.
- 4) **Kaliumferrocyanidlösung** Eine frisch bereitete wässrige Lösung 1:10. An ihrer Stelle kann auch gepulvertes Kaliumferrocyanid in Substanz benutzt werden.

Zur Titerstellung bringt man in ein BELENDEYER'sches Kochgefäss 25 ccm der Natriumphosphatlösung (Nr. 2) fügt 25 ccm Wasser, sowie 5 ccm Essigsäure Natriumacetatlösung (Nr. 3) hinzu, erhitzt auf etwa 30° und lässt zu der heissen Flüssigkeit solange Uranacetatlösung (Nr. 1) zufließen, als man noch eine Vermehrung des entstehenden Niederschlages wahrnehmen kann. Man erhitzt alsdann nochmals, bringt mittelst eines Glasstabes 1 Tropfen der Flüssigkeit auf eine weisse Porcellanplatte und fügt 1 Tropfen Kaliumferrocyanidlösung (oder etwa 0,01 g des gepulverten Salzes) hinzu. Entsteht eine braune¹⁾ Färbung, so ist alle Phosphorsäure bereits ausgefällt und Uranacetat im Ueberschuss vorhanden. Man notirt die Anzahl der verbrauchten Kubikcentimeter, setzt einen neuen Versuch an und sucht unter Anwendung von etwas weniger Uranacetatlösung als vorher den Punkt zu treffen, wo die Reaktionsflüssigkeit auf Zusatz von Kaliumferrocyanid eine grade wahrnehmbare schwache braune Färbung (wie ein photographischer Hauch) annimmt. Geben zwei mit gleicher Sorgfalt ausgeführte Versuche gleiches Resultat, so ist die erhaltene Zahl für die Verdünnung der Uranlösung maassgebend. Angenommen, man verbrauchte zur völligen Ausfällung der Phosphorsäure aus 25 ccm obiger Natriumphosphatlösung = 43,1 ccm Uranacetatlösung, so wären je 43,1 ccm der letzteren mit Wasser auf 50 ccm zu verdünnen.

Für genaue Versuche ist es nöthig, behufs Titerstellung den Phosphorsäuregehalt der Phosphatlösung (Nr. 2) gewichtsanalytisch festzustellen. Zum Zweck der Bestimmung der Phosphorsäure in Düngemitteln wird die Uranacetatlösung auf eine Lösung von Cal

¹⁾ Bleibt die Probe ungefärbt, so wird allmählich, zuletzt unter nochmaligem Erwärmen, soviel Uranacetat zulaufen gelassen, bis die Braunfärbung eben eintritt.

Orthophosphat eingestellt, deren Gehalt gewichtsanalytisch ermittelt worden ist. Zur Herstellung dieser Lösung löst man 5,5 g trocknes neutrales Calciumphosphat in möglichst wenig Salpetersäure und füllt die Lösung mit Wasser zu 1 Liter auf. Die maassanalytische Bestimmung der Lösungen von Phosphorsäure oder von Phosphaten unbekannter Konzentration erfolgt genau wie bei der Titerstellung, indem man eine gemessene Menge mit Natriumacetat-Essigsäure versetzt, erhitzt, Uranacetatlösung zufließen lässt und durch mehrere Versuche den Punkt zu treffen sucht, wo auf Zusatz von Kaliumferrocyanid die schon erwähnte hauchartige Braunfärbung eintritt.

Pyrophosphorsäure und Metaphosphorsäure verhalten sich analytisch ähnlich wie Orthophosphorsäure. Sie gehen sogar durch Kochen der wässrigen Lösung, namentlich bei Gegenwart von Salpetersäure, in Orthophosphorsäure über. Indessen ist der Uebergang hinsichtlich seiner Beendigung zu unsicher, als dass man diese Säuren quantitativ dadurch bestimmen könnte, dass man sie durch Kochen mit Salpetersäure in Orthophosphorsäure überführt und als solche bestimmt. Dagegen gelingt die Ueberführung sicher durch Schmelzen dieser Säuren bez. ihrer Salze mit einem Ueberschuss von Natriumkarbonat oder Natriumhydrat. Qualitativ unterscheiden sich beide Säuren von der Orthophosphorsäure durch folgende Reaktionen.

Pyrophosphorsäure $P_2O_5 \cdot H_2O$. Die neutralisierte Lösung giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag $P_2O_5 \cdot Ag_2$. Die freie Säure fällt Erweiss nicht.

Metaphosphorsäure $PO_3 \cdot H_2O$. Die neutralisierte Säure giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag $PO_3 \cdot Ag$. Die freie Säure fällt Erweiss.

Explementum dentarium OSTERMAYER

Zahnfüllung

Rp Acidi phosphorici glacialis 8,0
Calcariae ustae 8,25

In einem erwärmten Mörser zu pulvern und zu mischen. In wohlverstopften Gefässen aufzubewahren. Das Pulver wird in die gereinigte und desinfizierte Zahnhöhle eingedrückt und angefeuchtet, worauf die Masse fest wird.

Injectione antiferriosa WENDT

Rp Summitatum Millefolii 50,0
Foliorum Salviae 50,0
coque cum aqua ad colaturam 300,0
Acidi phosphorici (25%) 10,0
Tincturae Myrrhae 5,0

S Ungeschüttelt zum Einspritzen

Liquore phosphorico (Gall.)

Rp Acidi phosphorici (25%) 5,0
Aqua 875,0
Sirupi Sacchari 125,0

Mixtura antithaenoptysica HOFFMANN

Rp Acidi phosphorici (25%) 5,0
Sirupi Rubi Idaei 50,0
Aqua 150,0

S Stündlich einen Esslöffel voll

Pilulae contra cariem RUSE

Rp Acidi phosphorici glacialis 50,0
Asae foetidae 50,0
Rhizomatis Calami pulverati q. s.
Fiant pilulae ponderis 0,12 g

S Dreimal täglich 5–10 Pillen

Pilulae antispermatorrhoeae WUTZER

Rp Acidi phosphorici glacialis 10,0
Camphorae tritae 2,5
Corticis Chinae 10,0

Extracti Cassiae q. s.

Fiant pilulae ponderis 0,12 g

S Dreimal täglich 4–5 Pillen

Sirapsus Acidi phosphorici

Rp Acidi phosphorici (25%) 10,0
Sirupi Sacchari 90,0

Acidum pyrophosphoricum Pyrophosphorsäure b -Phosphorsäure **Acide pyrophosphorique** Pyrophosphoric acid $P_2O_5 \cdot H_2O = 178$. Zur Darstellung wird aruphische Phosphorsäure in einer Platinschale so lange auf $280-250^\circ$ erhitzt, bis eine Probe — in Wasser gelöst und mit Ammoniak neutralisirt — mit Silbernitrat nicht mehr einen gelblichen, sondern einen rein weissen Niederschlag giebt. Dann giesst man den Fluss in einen kalten Porcellan-Mörser aus.

Weiches Glas oder undurchsichtige, undeutliche Krystalle. Die wässrige Lösung bleibt etwa 1 Jahr lang unverändert, beim Erhitzen geht sie in gewöhnliche (Ortho-) Phosphorsäure über. Sehr hygroskopisch.

Acidum metaphosphoricum Metaphosphorsäure a -Phosphorsäure **Acide metaphosphorique** Metaphosphoric acid $HPO_3 = 80$. Zur Darstellung erhitzt man aruphische Phosphorsäure in einer Platinschale so lange auf über 300° , bis Wasser nicht mehr entweicht, bis also eine darüber gehaltene kalte Glasscheibe nicht mehr beschlägt. Alsdann giesst man den Fluss in einen kalten Porcellan-Mörser aus.

Weiche, glasige, klebrige Masse, leicht löslich in Wasser. Die Lösung geht allmählich, schneller durch Erhitzen mit Salpetersäure, in Orthophosphorsäure über. Sehr hygroskopisch.

Acidum phosphoricum glaciale (siccum) Eis-Phosphorsäure. Kommt in den Handel meist als durchsichtige Stangen, welche hart und spröde sind. Dieses Präparat ist ein Gemisch von Pyrophosphorsäure und Metaphosphorsäure in wechselnden Verhältnissen und enthält ausserdem in der Regel noch erhebliche Mengen (bis zu 15%) Natriumpyrophosphat, ein Zusatz, welcher gemacht wird, um den Stangen die gewünschte Härte

zu geben. Wurde früher in Pillen verordnet, gegenwärtig zum Trocknen von Gasen angewendet. Löst man natronhaltige Säure in rauchender Salzsäure, so scheidet sich die Hauptmenge des Natrons als Natriumchlorid aus.

Wird diese Säure zu Pillen verordnet, so kann man an ihrer Stelle den Rückstand verwenden, welcher erhalten wird, wenn man 100 Th Phosphorsäure in einer Platinschale auf so viel Theile abdampft, als der Procentgehalt der Phosphorsäure beträgt, wenn man also 100 Th der 25proc Säure auf 25 Th, oder 100 Th der 10proc Säure auf 10 Th verdampft.

Acidum phosphoricum anhydricum Phosphorsäure-Anhydrid **Phosphor-pentoxyd** *Acide phosphorique anhydrique* **Anhydrous phosphoric acid** $P_2O_5=142$ Wird durch Verbrennen von Phosphor im Sauerstoffstrom erhalten. Amorphe, weisse Flocken oder (nach dem Schmelzen) durchsichtige, glasige Massen. Lösen sich in Wasser unter zischendem Geräusch zu Metaphosphorsäure. Sehr hygroskopisch. Anwendung zum Trocknen von Gasen. Enthält bisweilen noch unverbrannten Phosphor, der beim Auflösen in Wasser zurückbleibt.

Acidum hypophosphoricum Unterphosphorsäure $P_2O_5H_4$ Unterwirft man Phosphor der Oxydation an feuchter Luft, so erhält man eine saure Flüssigkeit (**Acidum phosphoricum per deliquium**), welche etwa 7% Unterphosphorsäure enthält. Durch Zusatz einer konc. Lösung von Natriumacetat scheidet sich das saure Natriumsalz dieser Säure aus. Man stellt aus diesem durch Umsetzen mit Bleiacetat das Bleisalz dar und zerlegt dieses — in Wasser vertheilt — durch Schwefelwasserstoff. Die wässrige Lösung wird durch Eindampfen bei 30° C zur Sirupkonsistenz gebracht. Mit Wasser verbindet sich die Säure zu dem krystallisierenden Hydrat $P_2O_5H_4 + H_2O$ — Die wässrige Lösung ist haltbar, zerfällt aber beim Erhitzen in Phosphorsäure und phosphorige Säure. Die wässrige Lösung reducirt Kaliumpermanganat, giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag und wird durch Ammoniummolybdat erst nach dem Erhitzen mit Salpetersäure gefällt. [SALZER]

II. Acidum phosphorosum. Phosphorige Säure. *Acide phosphoreux*. **Phosphorous acid** PO_3H_2 . Mol. Gew. = 82. In keiner Pharmakopöe.

Darstellung. Man trägt in Wasser, welches sich in einem Glaskolben befindet, eine kleine Menge Phosphortrichlorid ein $PCl_3 + 3H_2O = 3HCl + PO_3H_2$. Wenn die Reaktion, welche durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser gemildert werden kann, beendigt ist, so trägt man weitere Mengen Phosphortrichlorid ein — Die schliesslich erhaltene Flüssigkeit wird zur Entfernung der Salzsäure im Wasserbade eingedampft, der alsdann erhaltene Rückstand im Sandbade bis auf 180° erhitzt, in Wasser gelöst und auf das geforderte spec. Gewicht gebracht.


In wasserfreiem Zustande eine farblose, krystallinische Masse, welche bei 74° C schmilzt und über 180° C erhitzt in Phosphorwasserstoff und Phosphorsäure zerfällt $4H_2PO_3 = PH_4 + 3H_2PO_4$. Reducirt Kaliumpermanganat, Silbersalze zu Silber, Goldsalze zu Gold, Mercurchlorid zu Mercurchlorid.

Zweibasische Säure, die Salze heissen „Phosphite“. Nasirender Wasserstoff reducirt sie zu Phosphorwasserstoff.

In den Handel gelangt meist die wässrige Lösung mit einem spec. Gewicht von 1,12 entsprechend einem Gehalte von 20 Proc PO_3H_2 . Diese Lösung dient besonders in der Analyse zur Bestimmung des Quecksilbers als Mercurchlorid.

III Acidum hypophosphorosum Unterphosphorige Säure. *Acide hypophosphorique* **Hypophosphorous acid**, PO_2H_2 . Mol. Gew. = 66. Von den berücksichtigten Pharmakopöen hat nur die U. S. T. ein *Acidum hypophosphorosum dilutum*, *Diluted hypophosphorous acid* mit einem Gehalte von 10 Proc PO_2H_2 aufgenommen.

Darstellung. Man kocht Phosphor mit einer wässrigen Lösung von Barythydrat, bis er — unter Entwicklung von selbstentzündlichem Phosphorwasserstoff — sich gelöst hat und Gas nicht mehr entweicht.



Die Lösung des entstandenen Baryumhypophosphits wird abfiltrirt und durch Einleiten von Kohlensäure von dem überschüssigen Barythydrat befreit. Durch Eindampfen des Filtrates erhält man Krystalle von Baryumhypophosphit $Ba(PH_2O_2)_2 + H_2O$.

285 g dieser Krystalle werden in 5 Liter Wasser gelöst, zu der Lösung giebt man 98 g cone Schwefelsäure (in 300 ccm Wasser gelöst) oder soviel, dass das Baryum genau ausgefällt wird. Man lässt absetzen, filtrirt vom Baryumsulfat ab und bringt die Lösung durch Eindampfen auf das spec Gewicht 1,046 bei 15°. Unterphosphorige Säure ist einbasisch, ihre Salze heissen „Hypophosphite“

Eigenschaften. Die 10procentige Säure ist eine farblose, geruchlose Flüssigkeit von saurem Geschmack und saurer Reaktion. Spec Gew = 1,046. Beim Erhitzen entweicht zunächst vorwiegend Wasser und die Säure wird concentrirter. Bei stärkerem Erhitzen zerfällt sie in Phosphorwasserstoff und Phosphorsäure $2H_3PO_3 \rightleftharpoons PH_3 + PO_4H_3$. Sie ist ein Reduktionsmittel, scheidet aus Silbernitratlösung metallisches Silber ab, reducirt Kaliumpermanganat und bringt in kaltscher Kupferlösung eine gelbe Ausscheidung von Cuprohydroxyd ($Cu_2(OH)_2$) hervor. Mercurchlorid reducirt sie successive zu Mercurchlorid und metallischem Quecksilber.

Prüfung 1) Die Säure werde durch Schwefelwasserstoff (auch nicht nach dem Uebersättigen mit Ammoniak) gefärbt oder gefällt (Metalle) — 2) Nach dem Uebersättigen mit Ammoniak werde sie durch Ammoniumoxalat nicht getrübt (Baryum-, Calciumsalze) — 3) Nach dem Verdünnen mit 3 Th Wasser und Ansäuern durch Salzsäure bringe Baryumchlorid nur sehr schwache Trübung hervor (Spuren von Schwefelsäure)

Gehaltsbestimmung a) Mischt man 0,5 g der Säure mit 7 ccm cone Schwefelsäure und 35 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Kaliumpermanganatlösung und kocht 15 Minuten, so müssen ungefähr 4,7 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Oxalsäurelösung zur eben eintretenden Entfärbung erforderlich sein — b) Zur Neutralisation von 10 g der Säure müssen (Phenolphthalein als Indikator) 15,15 ccm Normal-Kalklauge erforderlich sein

Anwendung In Gaben von 2–10 Tropfen in starker Verdünnung mehrmals täglich als Stimulans und Tonicum bei nervösen Krankheiten

Acidum glycerino - phosphoricum.


Acidum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsäure. Saurer Phosphorsäure Glycerinester. $C_6H_5(OH)_2 - O - PO(OH)_2$. Mol. Gew = 172.

Die Glycerinphosphorsäure $PO(OH)_2O - C_6H_5(OH)_2$ ist in freiem Zustande sehr unbeständig und nur in Form der wässrigen Lösung bekannt. Bei dem Versuche, diese zu concentriren, tritt Zersetzung ein in Glycerin und Phosphorsäure. Sie bildet sich beim Mischen von Phosphorsäureanhydrid mit Glycerin, kommt natürlich vor im Blut, Fleisch, Gehirn, in den Nerven und entsteht neben Cholin bei der Spaltung des Lecithins

I Acidum glycerino-phosphoricum Glycerinphosphorsäure 20 Proc. Im Handel kommt unter diesem Namen die 20procentige wässrige Lösung der Glycerinphosphorsäure vor. Diese ist abzugeben, wenn das Präparat unter obigem Namen schlechthin verschrieben werden sollte, was indessen kaum der Fall sein wird, da gegenwärtig fast ausschließlich die Salze dieser Säure Verwendung finden.

Man gewinnt diese wässrige Lösung der Säure, indem man das glycerinphosphorsäure Baryumsalz (10 Th) in Wasser löst und das Baryum mit eben hinreichenden Mengen verdünnter Schwefelsäure (8–3,2 Th H_2SO_4) ausfällt.

Eigenschaften. Fusch bereitet eine klare, farblose Flüssigkeit vom spec Gewichte 1,125. Bei längerem Aufbewahren zersetzt sie sich allmählich — beim Erwärmen rascher — unter Gelbfärbung in Glycerin und gewöhnliche Phosphorsäure



Die Glycerinphosphorsäure ist eine zweibasische Säure und bildet daher zwei Reihen von Salzen (Glycerophosphate). Die neutralen Salze sind in Wasser löslich, unlöslich in Alkohol, und reagiren meist alkalisch.

In der wässrigen Lösung derselben entsteht durch Bleiacetat ein Niederschlag von glycerinphosphorsäurem Blei, der schwer in Essigsäure, leicht in Salpetersäure löslich ist. Reagentien, die zum Nachweis von Phosphaten dienen, wie Magnesiamixtur, molybdan-

saures Ammonium, essigsäures Uran, gehen mit glycerinphosphorsauren Salzen in der Kälte keine Fällung. Einige der neutralen Salze finden medicinische Anwendung.

II Calcium glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaures Calcium. $\text{PO}_4 \cdot \text{Ca} \cdot \text{OC}_2\text{H}_5(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O}.$

Darstellung. In 1 Th Glycerin, spec Gew 1,25, wird unter Erwärmen nach und nach 1 Th Acid phosphoricum glaciale gelöst und die Lösung im Paraffinbade einige Stunden auf $100-110^\circ$ erwärmt. Man giesst dann die zähe, noch warme Masse unter Umrühren in Wasser und neutralisirt mit Kalkmilch. Es scheidet sich phosphorsaures Calcium aus, während glycerinphosphorsaures Calcium in Lösung bleibt. Die von erstem durch Filtration getrennte Flüssigkeit wird im Vacuum concentrirt, mit Alkohol gefüllt und das ausgeschiedene glycerinphosphorsaure Calcium durch Waschen mit Alkohol von anhängendem Glycerin befreit. Zur Reinigung löst man das getrocknete Salz nochmals zu einer concentrirten Lösung in Wasser, filtrirt, füllt mit Alkohol und trocknet bei gelinder Wärme.

Das glycerinphosphorsaure Calcium bildet ein weisses Krystallpulver, welches sich in ca. 20 Th Wasser von gewöhnlicher Temperatur löst. Aus dieser Lösung scheidet es sich beim Erwärmen krystallinisch aus, da es in heissem Wasser weit schwerer löslich ist als in kaltem, unlöslich ist dasselbe in Alkohol. Gegen Lackmus reagirt das Salz neutral, das Handelspräparat besitzt jedoch häufig deutlich saure Reaction infolge eines Gehaltes an saurem glycerinphosphorsauren Calcium. Das bei 100° getrocknete Salz verliert das Krystallwasser erst bei 130° .

III Baryum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaures Baryum. $\text{PO}_4 \cdot \text{Ba} \cdot \text{OC}_2\text{H}_5(\text{OH})_2$.

erhält man analog dem Calciumsalz, wenn man an Stelle von Kalkmilch Barythydratlösung verwendet.

Die übrigen Salze der Glycerinphosphorsäure werden dargestellt durch Wechselsersetzung des Calcium- oder Baryumsalzes mit Carbonaten oder Sulfaten.

IV Kalium- und Natrium glycerino-phosphoricum. $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_4 \cdot \text{PO}_4\text{K}_2$, und $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_4 \cdot \text{PO}_4\text{Na}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

sind ausserst hygroskopische Salze von alkalischer Reaction, sie werden erst bei längerem Erhitzen auf $140-150^\circ \text{C}$ fest. In Wasser sind dieselben in jedem Verhältnisse löslich und kommen auch in 50 Proc wässriger Lösung in den Handel.

V Lithium glycerino-phosphoricum, $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_4 \cdot \text{PO}_4\text{Li}$,

bildet ein weisses Krystallpulver, löslich in drei Theilen Wasser, gegen Lackmus alkalisch reagirend.

VI. Ferrum glycerino-phosphoricum.

Das Handelsprodukt besteht aus dem Oxyd Salz der Glycerinphosphorsäure $(\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_4)_2\text{Fe}_2$. Es wird erhalten, indem man frischgefülltes Eisenoxydhydrat in wässriger Glycerinphosphorsäure löst, die Lösung im Vacuum bis zur Sirupsdicke eindampft, alsdann auf Glasplatten streicht und dann bei gelinder Wärme trocknet. Man erhält es so in gelben Lamellen, die sich in Wasser und verdünntem Weingeist lösen.

Prüfung. Die Salze der Glycerinphosphorsäure müssen frei sein von gewöhnlicher Phosphorsäure, die wässrige Lösung darf auch nach längerer Zeit durch einen Ueberschuss von molybdänsaurem Ammon nicht gefällt werden. Erwärmen ist bei Ausführung der Reaction zu vermeiden, da hierbei Zersetzung der Glycerinphosphorsäure eintritt. Anhängendes Glycerin löst sich beim Schütteln der Salze mit absolutem Alkohol und bleibt beim Verdunsten desselben zurück.

Kalium-, Natrium-, Lithium- und Calcium glycerino-phosphoricum müssen frei sein von Schwermetallen, Schwefelsäure und Chlor, die wässrige Lösung darf also durch Schwefelwasserstoff und Baryumnitrat nicht verändert, durch Silbernitrat nicht mehr als opalescend getrübt werden.

Kalium-, Natrium- und Lithiumglycerinaosphat sind ausserdem auf einen Gehalt an Baryum zu prüfen, es darf in der wässrigen Lösung durch verdünnte Schwefelsäure keine Fällung entstehen.

Anwendung. Nach DE PASQUALE, BÜLOW und ROBIN sind sowohl die Glycerinphosphorsäure als auch die glycerinphosphorsauren Salze ausgezeichnete, direkt assimilirbare

nerve Tonica. Die glycerinphosphorsäuren Salze besitzen eine vorzügliche Wirkung auf die Nervenernährung und stellen jene Form dar, in welcher der Phosphor in den Organismus aufgenommen wird. Die Glycerinphosphorsäure wird zumeist in der Form ihres Calcium-, Eisen- und Natriumsalzes therapeutisch angewandt.

Das Calciumglycerino-phosphat dient als Ersatzmittel für sämtliche bisher gebrauchlichen Phosphate und für das Hypophosphit.

Das Ferrum glycerino-phosphoricum ist ein ausgezeichnetes Eisenmittel, das zugleich die trefflichen Eigenschaften der Glycerinphosphorsäure besitzt.

Das Natriumsalz wird in Folge seiner leichten Löslichkeit besonders in der Form subkutaner Injektionen angewendet und hat sich namentlich bei Ischias, Rekonvaleszenz von Infektionskrankheiten und nervösen Asthenien bewährt.

Das Lithium glycerino-phosphoricum wird gegen uratische Diathese gegeben und ist in allen Fällen indiziert, in denen neben der Lithiumwirkung auch von der tonisierenden Wirkung der Glycerinphosphorsäure Gebrauch gemacht werden soll.

Für die praktische Verwendung der glycerinphosphorsäuren Salze empfehlen sich folgende Formeln:

Rp Calci glycerino phosphoricum 10,0
Acidi citrici 1,0
Sacchari albi 810,0
Aquae destillatae 810,0

Durch Schütteln unter Ausschluss von Wärme zu lösen.

S Dreimal täglich einen Esslöffel voll zu nehmen (Rachitis, Skrophulose, Dentio difficilis, Osteomalacie, Phosphaturie).

Rp Ferri glycerino phosphoricum 10,0
Mucosae tucido cum

Glycerini purissimi 40—50,0

Wohl

Vini hyspanici albi 1000,0

S Ein Likörgläschen vor jeder Mahlzeit zu nehmen, (Chlorose, Anaemia, Neurasthenie).

Rp Natrii glycerino phosphoricum 1,0

Natrii chloridi 0,01

Aquae destillatae 5,0

S 1—2—3—4—5—6 Pravazspritzen voll, allmählich steigend, zu injiciren (Lumbago, Ischias, Morbus Basedowii).

Rp Lithii glycerino phosphoricum 0,5

Dentur tales doses No X ad capsulas ceratas.

S 1—2 Pulver täglich in kohlensaurem Wasser zu nehmen (Uratische Diathese).



Acidum picrinicum.

! † Acidum picrinicum (Ergänzb.) Acidum picronitricum. Acidum picricum. Acidum carbazoticum. Acidum nitroxanthicum. Pikrinsäure. Pikrinsalpetersäure. Kohlenstickstoffsäure. Trinitrophenol. Acide picrique (Gall.) Picric acid. $C_6H_2(NO_2)_3 \cdot OH$. Mol Gew = 229

Darstellung. Diese geht von der Erfahrung aus, dass die Nitrierung des Phenols ganz besonders leicht gelingt, wenn man dasselbe als Phenolsulfosaure anwendet. In einer Porzellanschale erwärmt man 50 g Phenol (absolut) mit 50 g konc Schwefelsäure (1,84 spec Gew) auf dem Wasserbade bis zur völligen Lösung, verdünnt nach dem Erkalten mit 160 cem Wasser und lässt diese Lösung aus einem Hahntrichter unter Umschütteln allmählich in sehr kleinen Antheilen zu 250 g Salpetersäure von 1,4 spec Gew, die sich in einem Rundkolben von etwa $\frac{3}{4}$ Liter Fassungsvermögen befindet, hinzulieffen. Bei jedem Zusatz der Phenolsulfosaure erfolgt eine lebhaft, mit Wärmeentwicklung verbundene Reaktion, und unter Entwicklung reichlicher Mengen von rothbraunen Dämpfen nimmt die Flüssigkeit eine tiefrothe Farbe an. Ist alle Phenolsulfosaure hinzugefügt, so erwärmt man noch einige Zeit auf dem Wasserbade, bis die Farbe der Flüssigkeit in Gelb umgeschlagen ist. Beim Erkalten scheidet sich die Pikrinsäure als gelbe krystallinische Masse aus, welche man durch Absaugen, Abwaschen mit wenig kaltem Wasser und Abpressen zwischen Filtrirpapier von der Mutterlauge befreit.

Zur Reindarstellung führt man die rohe Säure durch verdünnte Kalilauge (auf 10 Th Pikrinsäure = 2,5 Th KOH) in das in kaltem Wasser schwer lösliche Kaliumsalz

haben, krystallisiert dieses mehrmals aus siedendem Wasser um und zersetzt es dann mit verdünnter Schwefelsäure. Beim Erkalten der schwefelsauren Lösung scheidet sich die Säure in gelben Krystallen aus, welche durch nochmaliges Umkrystallisiren aus heissem Wasser frei von Kaliumsulfat sind.



Eigenschaften. Blassgelbe Prismen oder Blätter, in reinem Zustande geruchlos, gewöhnlich schwach nach Nitrobenzol riechend, von intensiv bitterem Geschmack. Schmp -P 122,5. Beim vorsichtigen Erhitzen sublimierbar, beim raschen Erhitzen explodierend. Löst sich in etwa 90 Th kaltem oder 30 Th siedendem Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether, löslich in 10 Th Benzol, auch in Benzin. Die Lösung in Benzin oder Benzol ist nur schwach gelblich gefärbt.

Die wässrige Lösung ist gelb gefärbt, färbt selbst Seide und Wolle (Baumwolle nicht) gelb und reagirt sauer, die Pikrinsäure kann ihr durch Ausschütteln mit Aether oder Benzol entzogen werden. Die Pikrinsäure neutralisirt kohlensaure und ätzende Basen, indem sie mit ihnen Salze bildet. Sie verhält sich dabei wie eine einbasische Säure. Die Salze heissen „Pikrate“ oder „Pikrinate“. Sie fällt in saurer Lösung Erweiss, s. *Urina*.

Reaktionen. Man erkennt die Pikrinsäure 1) An der gelben Farbe und dem intensiv bitteren Geschmack der wässrigen Lösung. 2) Cyankaliumlösung (1+2) erzeugt in der mit etwas Alkalihydroxyd (KOH) versetzten Pikrinsäurelösung eine blutrothe Färbung (Bildung von isopurpursaurem oder Pikrocyanamsaurem Alkali), welche besonders rasch beim Erwärmen eintritt. 3) Kocht man Pikrinsäure mit Chlorkalklösung, so entweicht Chlorpikrin (Nitrochloroform = CCl_2NO_2), das an seinem eigenthümlich stechenden Geruch zu erkennen ist.

Prüfung. Pikrinsäure kann verunreinigt sein durch harzige Substanzen und verfälscht durch einige Salze, besonders Salpeter, ferner Natriumpicrat, Oxalsäure, Borshure. 1) Man löst 1 Th Pikrinsäure in 100 Th Wasser, fügt 5 Tropfen verdünnte Schwefelsäure hinzu und filtrirt nach mehrstündigem Stehen in der Kälte. Auf dem Filter bleibt Harz zurück. 2) 1 Th Pikrinsäure muss sich in 30 Th Benzol klar auflösen, die oben genannten Substanzen werden ungelöst zurückbleiben.

Anwendung. Pikrinsäure ist für niedere Thiere und Eingeweidewürmer ein heftiges Gift, bewirkt beim Menschen Uebelfkeit, Erbrechen etc. und eine eigenthümliche Veränderung der Blutkörperchen, bei innerer Darreichung Gelbfärbung sämtlicher Gewebe. Aeusserlich in wässriger Lösung als Desinficiens. Die konc wässrige Lösung soll bei Verbrennungen schmerzstillend wirken. Innerlich in Gaben von 0,1—0,3 g in Pulver oder Lösung bei Febris intermittens, Keuchhusten, Rheumatismus, Neuralgien, gegen Eingeweidewürmer, dos max pro die 0,5 g! In der Analyse besonders zur Fällung der Alkaloide. Technisch in der Fabrikation und zur Herstellung des rauchschwachen Schiesspulvers.

Die Angabe, dass Pikrinsäure als Hopfenersatz in der Bierbrauerei verwendet wird, muss als Fabel bezeichnet werden. Zum Nachweis wurde in solchen Fällen eine Flüssigkeit, nachdem sie mit Natriumkarbonat neutralisirt ist, durch Eindampfen zu concentriren sein. Die concentrirte Lösung wurde man mit Schwefelsäure deutlich anfärben und alsdann mit Aether ausschütteln. Die nach dem Verdunsten des mit Wasser gewaschenen Aetherausguges hinterbliebene Pikrinsäure würde wie oben angegeben zu prüfen sein.

Konsistentere Objekte würde man zunächst trocknen, alsdann mit salzsäurehaltigem Alkohol ausziehen. Nach dem Verdunsten des Alkohols würde die Pikrinsäure krystallinisch hinterbleiben.

Aufbewahrung. An einem kühlen, feuersicheren Orte, vorsichtig. Für die Lagerung grosserer Vorräthe würden die bestehenden Gesetze bez. Polizei-Verordnungen zu beachten sein.

Vinum picrinicum. Vinum picrique. Ist Weisswein, welcher 0,1 Proc Pikrinsäure gelöst enthält.

II. † Ammonium picricum (picromerium). Ammoniumpikrat. Pikrinsaures Ammonium. $C_6H_2(NO_2)_3ONH_4 = 246$ Zur Darstellung löst man 1 Th Pikrinsäure in 8 Th siedendem Wasser unter Zusatz von 1 Th Ammoniakflüssigkeit (10 Proc) Die nach dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle werden zwischen Filtrirpapier getrocknet

Gelbe, glänzende, geruchlose, nadelförmige Krystalle von sehr bitterem Geschmack, in Wasser und in Weingeist löslich Sie neigen infolge Ueberhitzung oder durch Druck und Schlag noch mehr zur Explosion wie die freie Pikrinsäure Ueberhaupt sind die Salze der Pikrinsäure leichter explosibar als die freie Säure Aufbewahrung Vorsichtig

Anwendung. Als Chinnerersatz bei Malaria und Febris intermittens in Gaben von 0,01 g — 0,05 g Dos max pro die 0,5! Grössere Gaben wirken als Herzgift

Acidum chinopiericum Von HENRI, ALFROY DUGUET und PERRET als Fiebermittel und Chinnerersatz empfohlen, wurde hergestellt, indem man Chinarinden-Auszug mit Pikrinsäure fällt und den wesentlich aus Chinupikrat und Chinonpikrat bestehenden Niederschlag trocknete Bei Anwendung des Mittels ist Vorsicht geboten

Acidum salicylicum.

Acidum salicylicum (Austr, Brit, Germ, Helv, U-St) *Acide salicylique* (Gall) **Acidum spiricum. Salicylsäure. Spiersäure Spiroylsäure Salicylsäure. o Oxybenzoesäure Salicylic acid.** $C_6H_4(OH)CO_2H$ (1 2) Mol Gew. = 138


Im ätherischen Oele der Blüthen von *Spinaea Ulmaria* L als Salicylsäure-Methylester vorkommend, früher aus diesem, sowie durch Oxydation von Salicylaldehyd und Salicin gewonnen

Darstellung Gegenwärtig synthetisch durch Einwirkung von Kohlensäure auf Phenol nach verschiedenen Verfahren dargestellt, von denen das nachfolgende (KOLBE'sche) das älteste und einfachste ist


Man sättigt Phenol mit Natronlauge, so dass Phenolnatrium C_6H_5ONa entsteht, und dampft die Lösung zu einem trocknen Pulver an Dieses wird in eine metallene Retorte eingeführt und im Oelbade zunächst auf $100^\circ C$ erhitzt, worauf man unter allmählicher Steigerung der Temperatur trockne Kohlensäure überleitet Wenn der Retorteneinhalt auf $170-180^\circ C$ erhitzt ist, beginnt Phenol fiberzudesillren, und zwar geht allmählich die Hälfte des angewendeten Phenols über Man steigert unter fortgesetztem Ueberleiten von Kohlensäure die Temperatur bis auf etwa $220^\circ C$ und unterbricht die Operation, wenn Phenol nicht mehr übergeht

Der aus Dinatriumsalicylat bestehende Retorteneinhalt wird in Wasser gelöst und die Lösung mit Salzsäure zersetzt, worauf sich die Salicylsäure ausscheidet Man reinigt sie, indem man sie durch Neutralsalzen mit Calciumcarbonat in das Calciumsalz überführt und dieses wiederum mit Salzsäure zersetzt oder man destillirt die Salicylsäure mit überhitztem Wasserdampf über oder man unterwirft ihre mit verdünntem Weingeist hergestellte Lösung der Drylyse


Der obige Process verläuft in zwei Phasen durch Einwirkung der Kohlensäure auf das Phenolnatrium entsteht zunächst phenylkohlensaures Natrium,



welches sich beim raschen Erhitzen in Natriumsalicylat umlagert



Eigenschaften Farblose und geruchlose, specifisch leichte, nadelförmige Krystalle, von süsslich saurem, zusammenziehendem Geschmack Beim Verstauben reizen sie die Nasenschleimhaut zu heftigem Niesen 1 Th Salicylsäure löst sich in etwa 500 Th Wasser von $15^\circ C$, oder 15 Th siedendem Wasser, ferner in 2,5 Th Weingeist von 90 Proc, in 2 Th Aether, in 80 Th kaltem Chloroform, in 3,5 Th Amylalkohol, in 60 Th Glycerin, in 80 Th Benzol und in 60—70 Th fettem Oel Bei Gegenwart von Natriumphosphat, Borax, Ammoniumacetat und Ammoniumcitrat wird die Auflöslichkeit der Salicylsäure in Wasser bedeutend erhöht, doch schmecken



Nach dem Erkalten wird die noch mit etwas Wasser verdünnte Mutterlauge in ein weites Reagensglas abgegossen, in diesem bis auf etwa 1 cm eingekocht und durch Reiben mit einem Glasstabe zur Krystallisation gebracht. Man verdünnt mit 1 cm Wasser, giesst die Mutterlauge durch ein mit loser Watte verstopftes Trichterchen in ein Reagensglas ab. Aus dem nochmals auf etwa 1 cm eingekochten Filtrate fällt beim Versetzen mit Salzsäure bei einem Kresotinsäuregehalte der ursprünglichen Säure von 3–5 Proc ein Säuregemisch in relativ grosser Menge aus, welches unter heissem Wasser schmilzt und als dicker Öeltropfen am Boden des Reagensglases sich ansammelt. Säuren von 0,5–1,0 Proc Kresotinsäuregehalt zeigen diese Erscheinung nicht, die bei ihnen durch Salzsäure ausgeschiedene Säuremenge ist gering und schmilzt beim Erwärmen des Wassers bis zum Sieden nicht.

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen. Lichtschutz ist bei reinen Präparaten nicht erforderlich.

Anwendung. Salicylsäure wirkt faulniswidrig und geformten Fermenten gegenüber (nicht ungeformten) gährungswidrig; daher zur Konservierung von Früchten etc. benutzt. In Substanz und keine Lösung ätzend. Innerlich als Antipyreticum bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten, ferner als Specificum gegen Gelenkrheumatismus, in- dess wegen der den Magen reizenden Eigenschaften meist als Natriumsalicylat, nur bei abnormen Gährungen im Magen die freie Säure, weil das Na-Salz nicht antifermentativ wirkt. Aeusserlich in wässriger und spirituöser Lösung (in öliger Lösung wenig wirksam) als Antisepticum und Desinficiens in der Wundbehandlung. Als Streupulver auf Wunden und Hautausschläge, als Munddesinficiens in Zahnpulvern und -Wässern etc. In keine Form als Pflaster und Tinktur (Kollodium) zur Zerstörung von verdickter Haut (Hühneraugen!).

Grosse Gaben können Intoxikationserscheinungen: Uebelkeit, Collaps, Albuminurie, Oedeme, verursachen. Gegenmittel ist Zuckerkalk, Alcoholica.

In den Harn geht sie zum Theil als Salicylsäure, zum Theil als Aetherschwefelsäure, als Glucuronverbindung und Salicylsäure über. Nachweis: Ausschütteln des mit verdünnter Schwefelsäure angesäuerten Harns mit Aether Petroläther, Verdunsten des Auszuges und Nachweis mit Eisenchlorid.

Technisch als Konservierungsmittel bei der Fabrikation von Leim, Eiweiss, Seiden, zur Darstellung von Chrysamin-Farbstoffen, zur Konservierung von Nahrungsmitteln. Man setzt gewöhnlich folgende Mengen zu: Wein pro Hektoliter 2–4 g, Bier pro Hektoliter 1–6 g, eingemachte Früchte etc. pro 1 kg = 0,5 g.

Ceratum salicylatum flavum SCHREIBER	
Rp	1 Acidi salicylici 2,0
	2 Olei Amygdalarum 5,0
	3 Olei Amygdalarum 52,0
	4 Cerae flavae 31,0
	5 Olei Citri
	6 Olei Bergamotinae aa 0,5

1 set mit 2 feinzureiben. Dann schmilzt man 3 und 4 und rührt beim beginnenden Erstarran. 1 und 2 sowie 5 und 6 darunter.

Collodium salicylatum (Wien Spec)	
Rp	Acidi salicylici 10,0
	Collodii 90,0
	Chlorophylli 0,5

Collodium salicylatum (Ergänzb)	
Rp	Extracti Cannabis indicae 1,0
	Acidi salicylici 10,0
	Cerebintinae 5,0
	Collodii 82,0
	Acidi acetic! glacialis 2,0

Gelatina salicylata SCHWIMMER	
Rp	Glycerini
	Acidi salicylici aa 10,0
	Gelatinae albae 30,0
	Aquae destillatae 50,0

Gegen Eczema vesiculosum

Lanolinum salicylicum	
Rp	Cerae flavae 30,0
	Lanolini anhydrici 70,0
	Acidi salicylici 1,0
	Olei Gaultheriae gtt X

In Stangen ausgepresst

Oleum crinale LASSAR	
Rp	Acidi salicylici 2,0
	Tincturae Benzoei 8,0
	Olei Amygdalarum 95,0

Zur LASSAR'schen Linatur

Pasta antipsoriatica LASSAR	
Rp	Acidi salicylici 2,0
	Sulfuris praecipitatu 10,0
	Vasellini americani 30,0
	Zinci oxydata 19,0
	Amyli 78

Pasta salicylica LASSAR
LASSAR's weisse Paste (Form mag Benz, Ergänzb)

Rp	Acidi salicylici 3,0
	Zinci oxydati crudi 24,0
	Amyli Tridici 24,0
	Vasellini americani 50,0

Gegen Eczeme aller Art

Pasta odontalgica salicylata
 Rp Acidi salicylici 0,5
 Rhizomatis Indis pulv 5,0
 Symplicis medicati pulv 20,0
 Calci carbonatis pulv 10,0
 Solutionis Phloxini in Glycerino q. s.
 Olei Gerani
 Olei Menthae pip aa gtt 26
 Man stosse die Masse lediglich mit Glycerin an und vermeide Zusatz von Wasser oder Alkohol

Pulvis dentifidus salicylatus
 Rp Acidi salicylici 0,5
 Sacchari Lactis 100,0
 Olei Gerani
 Olei Menthae pip aa gtt X
 Solutionis Phloxini spirit q. s.

Pulvis salicylicus cum Calce (Germ. III)
Salicylstreupulver Fusschweisspulver
 Rp Acidi salicylici pulverati 3,0
 Amyli Tritici pulverati 10,0
 Talci veneti pulverati 87,0

Sebum salicylatum 5 Proc
 Rp Acidi salicylici 5,0
 Sebi 95,0
 Olei Gaultheriae gtt 10
 Die Salicylsäure ist in dem geschmolzenen Talg zu lösen

Spiritus citrinalis cum Acido salicylico
Salicyl-Kopfwaschwasser gegen Schuppen

Lp Acidi salicylici 20,0
 Glycerini 50,0
 Spiritus Colomensis 50,0
 Spiritus diluti (60%) 880,0

Mit 5 Theilen lauwarmem Wasser verdünnt zum Waschen des Kopfes

Tinctura dentifrida salicylata

Rp Acidi salicylici 1,0
 Spiritus diluti (70%) 100,0
 Tincturae Cocconellae 5,0
 Olei Menthae pip
 Olei Gerani aa 1,0

Auf ein Weinglas Wasser 16–20 Tropfen

Unguentum Acidi salicylici cum Kleosoto UNNA

Rp Acidi salicylici 4,0
 Kleosoti 8,0
 Unguenti simplici 4–6,0
 Ceræ flavae 8–14,0

Unguentum Acidi salicylici (Bnd Taxe)

Rp Acidi salicylici 1,0
 Unguenta Paraffini 9,0

Vasellinum benzoico salicylatum
 LASSAR'S Benzoe-Salicyl-Vaselin
 Pp Acidi salicylici 1,0
 Tinctura Benzoea 2,0
 Vaselini americani 47,0

Acidum borosalicylicum Borsalicylsäure 1 Th Borsäure wird in 5 Th heissem Wasser gelöst und mit einer Lösung von 2 Th Salicylsäure in 10 Th Weingeist (90 Proc) versetzt, hierauf das Ganze im Wasserbade zur Trockne verdampft und nachgetrocknet — Farbloses krystallinisches Pulver von bitterem Geschmack, angeblich eine chemische Verbindung der Komponenten darstellend. Antisepticum, in Form von Waschungen und von Salben gegen Krätze und gegen die Räude der Haustiere empfohlen

Borsalicylat BERNEGAU 676,0 Natriumsalicylat und 124,0 Borsäure Die höchst feingepulverten Substanzen werden mit etwas Wasser innig verrieben Die bald hart werdende Masse wird getrocknet, dann fein gepulvert

Borsalicyl Crème-BERNEGAU. 20,0 Borsalicylat, 40,0 Arnikaglycerin, 18,0 Lanolin, 22,0 amerik Vaseline

Borsalicyl-Gaze, 10proc. BERNEGAU 150,0 Borsalicylat, 1500,0 heisses Wasser, 0,75 Glycerin, 1000,0 hydrophile Gaze Man lässt $\frac{1}{4}$ Stunde einwirken, presst langsam aus und trocknet auf Holzstäben.

Borsalicyl-Glycerin. 10,0 Borsäure, 10,0 Salicylsäure, 10,0 Wasser, 40,0 Glycerin werden zum Sieden gebracht, dann fagt man 1 Th gebrannte Magnesia hinzu, dampft auf 50 Th ein und lässt erkalten. Antisepticum, mit Wasser in allen Verhältnissen mischbar

Gossypium salicylatum. Salicylwatte 5proc Mit einer Lösung von 55 Th Salicylsäure in 700 Th Weingeist (90proc), 700 Th Wasser und 100 Th Glycerin tränkt man 1000 Th entfettete Baumwolle und trocknet bei mässiger Wärme Zur Gehaltsbestimmung werden 5 g Salicylwatte in einem Stöpselglase mit 100 ccm Weingeist durch kräftiges Schütteln ausgezogen 50 ccm der filtrirten Lösung werden mit Normal-Natronlauge (und Phenolphthalein) titirt Die Anzahl der verbrauchten ccm Normal-Natronlauge, mit 0,552 multiplicirt, zeigt den Gehalt von 100 Th Salicylwatte an Salicylsäure an Vor Licht und Luft geschützt aufzubewahren (Organz Buch)

Collemplastrum salicylatum. 1) a 5 Proc Kautschukpflasterkörper 800,0, Veilchenwurzel 75,0, Sandarakpulver 20,0, Salicylsäure gepulvert 17,0, Harzöl 25,0, Petroleumäther 170,0 2) a 10 Proc Kautschukpflasterkörper 800,0, Veilchenwurzelpulver 70,0, Salicylsäure 24,0, Harzöl 22,0, Petroleumäther 185,0 3) a 20 Proc. Kautschukpflasterkörper 800,0, Veilchenwurzelpulver 60,0, Salicylsäure 68,0, Harzöl 20,0, Petroleumäther 200,0 [E DIETZICH]

Corneide, amerikan Hühneraugenmittel Extr Cannabis 1,0, Acidi salicylici 10,0, Olei Terebinthinae 5,0, Collodii 82,0, Acidi acetici glac 1,0

Coruillin, Hühneraugenmittel Ein Guttaperchapflaster-Müll, welcher Salicylsäure und Cannabisextrakt enthält

GERLACH'S Präservativ-Crème Mit Zinkoxyd verriebene Seife, gemischt mit Salicylsäure, Kampheröl und Karbolöl

Eucalyptol-Dr. SCHMIDTZ, Antisepticum und Jodoform Ersatz Acidum salicylicum 6,0, Acidum carbolici, Oleum Eucalypti aa 1,0

Asepticum von Busse in Linden-Hannover Antisepticum Gelblich gefärbte, wässrige Lösung von 3,0 Borsaure, 0,25 Salicylsäure in 100,0 Wasser nebst einigen Tropfen Salzsaure 500 g = M 3,00 [Anal Dr. DAMKOWITZ]

Mundwasser-Tabletten nach Bernegau Heliotropin 0,01 g, Saccharum 0,01 g, Acidum salicylicum 0,1 g, Menthol 1,0 g, Saccharum Lactis 5,0 g, Spiritus Rosae q s fiant 100 Pastillen

Acidum salicylicum Derivata

Ammonium salicylicum Ammoniumsalicylat Salicylsaures Ammonium $C_6H_5(OH)CO_2NH_4$ Zur Darstellung löst man 10 Th Salicylsäure in 12 Th Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc und dunstet die Lösung, welche unbedingt schwach sauer, keineswegs alkalisch reagiren soll, zur Trockne ein — Farbloses Krystallpulver oder seidenglanzende nadelförmige Krystalle, in Wasser leicht, weniger leicht in Weingeist löslich Als Antipyreticum, Antirheumaticum, Expectorans bei fieberhaften Krankheiten empfohlen, aber durch das Natriumsalicylat verdrängt Dosis 0,2—1,0 g

Kalium salicylicum Kaliumsalicylat Salicylsaures Kalium $C_6H_5(OH)CO_2K$ Man übergiesst 10 Th Salicylsäure mit 10 Th Wasser und giebt unter Erwärmen soviel Kaliumbikarbonat hinzu (7,2 Th), dass die Lösung gerade noch schwach sauer reagirt und dampft zur Trockne ein — Farbloses Krystallpulver, in Wasser und in Weingeist leicht löslich Anwendung in Gaben von 0,4—1,0 g, wie Natriumsalicylat, aber durch dieses verdrängt

Calcium salicylicum Calciumsalicylat Salicylsaures Calcium $[C_6H_5(OH)CO_2]_2Ca + 2H_2O$ Zur Darstellung übergiesst man 10 Th Salicylsäure mit 100 Th heissem destillirten Wasser, fügt 3,62 Th eisentrees Calciumcarbonat hinzu, erwärmt bis zum Aufhören der Kohlensäure-Entwicklung, filtrirt und dampft die Lösung zur Krystallisation ein — Farbloses Krystallpulver oder oktaedrische Krystalle, in kaltem Wasser schwer löslich, leichter löslich in siedendem Wasser

Anwendung entweder für sich oder mit Wismutsalicylat kombiniert als desinficirendes Mittel bei Magen und Darmkatarrhen Dosis 0,5—1,5 g

Saluminium insolubile Aluminiumsalicylicum Aluminiumsalicylat $[C_6H_5(OH)CO_2]_3Al_2 + 3H_2O$ Mol-Gew = 930 Zur Darstellung löst man 100 Th Natriumsalicylat in 500 Th Wasser, andererseits 66 Th Aluminiumsulfat $[Al_2(SO_4)_3 + 18 aqua]$ in 500 Th Wasser und filtrirt beide Lösungen Die Aluminiumsulfatlösung wird unter Umrühren in die Natriumsalicylatlösung eingegossen, worauf sich ein dicker krystallinischer Niederschlag abscheidet Man lässt 8—4 Stunden an einem kühlen Orte stehen, filtrirt vor der Stahl-Pumpe ab, wäscht mit eiskaltem Wasser, bis das Filtrat nach dem Anäuern mit Salpetersäure durch Baryumchlorid nicht mehr getrübt wird und trocknet rasch auf porösen Tellern

Farbloses oder schwach röthliches Krystallpulver, in Wasser schwer löslich, durch heisses Wasser wird es in freie Salicylsäure und basisches Salz zerlegt Hinterlässt beim Glühen 10,96% Al_2O_3

Ausserlich als Streupulver bei katarrhalschen Affektionen der Nase und des Kehlkopfes, besonders bei Ozaena Aufbewahrung Vor Licht geschützt

Saluminium solubile Aluminium-Ammonio salicylicum Aluminium-Ammoniumsalicylat $[C_6H_5(OH)CO_2]_3Al_2 + 2H_2O$ Mol-Gew = 1014 Man übergiesst 10 Th des unlöslichen Salumins (Aluminiumsalicylat s v) mit 10 Th Ammoniak (10 Proc), wartet ab, bis Lösung erfolgt ist und bringt diese durch Verdunsten zur Trockne — Farbloses oder schwach röthliches Pulver, in Wasser löslich Hinterlässt beim Glühen 10 Proc Al_2O_3 Anwendung wie Saluminium insolubile

Alkalal Aluminium-Kaliumsalicylat Angeblich ein Doppelsalz von Aluminiumsalicylat mit Kaliumsalicylat, soll nach D R P 78 903 durch Einwirkung von Kaliumacetat auf Aluminiumsalicylat in der Wärme entstehen Nähere Bereitung sowie Zusammensetzung unbekannt

Methylum salicylatum Salicylsäuremethylester Methylsalicylat $C_6H_5(OH)CO_2CH_3$ Mol-Gew = 152 Bildet den Hauptbestandtheil des Wintergreenöls oder Gaultheriaöls (von *Gaultheria procumbens* L), welches aus etwa 10 Proc Terpen (Gaultherien) und 90 Proc Salicylsäuremethylester besteht

Darstellung Man löst 2 Th Salicylsäure in 2 Th absolutem Methylalkohol, vor mischt die Lösung nach und nach mit 1 Th concentrirter Schwefelsäure und erhitzt die Mischung etwa 24 Stunden lang unter Rückflusskühlung auf dem Wasserbade Hierauf destillirt man im Wasserdampfstrom ab Die sich abscheidende Oelschicht wird sehr sorgfältig mit Wasser gewaschen, hierauf trocknet man sie durch Schütteln mit entwässertem Natriumsulfat und filtrirt — Destillation über freiem Feuer liefert ein weniger gut riechendes Produkt

Eigenschaften Farblose Flüssigkeit von angenehmem Geruch. Spec. Gew. 1,1810 bei 16° C. Siedep. 220°. In Wasser sehr schwer löslich, leicht löslich in Alkohol und Aether, mischbar mit fetten und ätherischen Ölen. Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid violett gefärbt. Mit starken Basen (KOH, NaOH) entstehen leicht zersetzbare salzartige Verbindungen vom Typus $C_6H_4(OH)CO_2CH_3$, beim Erhitzen mit ätzenden Basen oder mit konz. Salzsäure erfolgt Spaltung in Salicylsäure und Methylalkohol, bez. Methylchlorid. Durch Einwirkung von starkem wässrigem Ammoniak entsteht Salicylamid.

Anwendung Wird in Gaben von 1–2 g täglich 3–4 mal besonders gegen Rheumatismus angewendet. In Amerika namentlich in der Form des natürlichen Wintergreenöls. Technisch zu Zwecken der Parfümerie und der Kosmetik.

Dijodsalicylsäuremethylester (aether) Sanoform $C_6H_4J_2(OH)CO_2CH_3$ Mol.-Gew. = 404. Entsteht durch Einwirkung von Jod auf Salicylsäuremethylester. Farblose Nadeln, ohne Geruch und Geschmack, löslich in 10 Th. heissem Alkohol, sehr leicht löslich in Aether, schwer löslich in Wasser und in Glycerin. Enthalten 62,8 Proc. Jod. Schmelzp. 110°. Durch Erhitzen mit konz. Salpetersäure oder konz. Schwefelsäure wird Jod abgespalten. Ferrichlorid färbt die wässrige Lösung violett. Durch Natronlauge wird die Verbindung beim Erhitzen verseift, beim Erkalten kristallisiert das Natriumsalz der Dijodsalicylsäure in glänzenden Nadeln aus.

Bei weichen Schanker und als Austrocknungsmittel bei frischen und eiterigen Wunden, ferner in der Augenheilkunde.

Salicylamidum Salicylamid Salicylsäureamid $C_6H_4OHCONH_2$ Mol.-Gew. = 137. Zur Darstellung behandelt man Salicylsäuremethylester entweder mit trockenem Ammoniakgas oder mit konz. wässrigem Ammoniak. Das entstandene Salicylamid wird entweder aus siedendem Wasser oder aus heissem verdünnten Alkohol umkristallisiert.

Farbloses oder gelblichweisses, leichtes Krystallpulver, geschmacklos, in Wasser etwas leichter löslich als Salicylsäure. Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid violett gefärbt. Schmelzp. 135°. Durch Erhitzen mit Natronlauge wird es in Natrium salicylat übergeführt unter Freiwerden von Ammoniak.

Salicylamid wirkt wie Natrium salicylat, aber stärker analgetisch. Dosis mehrmals täglich 0,2–0,3 g.

Acidum sulfosalicylicum Sulfosalicylsäure Salicylsulfonsäure $C_6H_4(SO_3H)OH$ CO_2H Mol. Gew. = 218. Nicht zu verwechseln mit Salicylschwefelsäure $C_6H_4(SO_3H)CO_2H$.

Zur Darstellung erhitzt man 1 Th. Salicylsäure mit 2–3 Th. konz. Schwefelsäure einige Stunden auf 160°. Man giest alsdann das Reaktionsprodukt in viel Wasser, digeriert mit einem Ueberschuss von Baryumcarbonat und scheidet durch Verdampfen des Filtrates zunächst das Baryumsalz $Ba(C_6H_4SO_3) + 4H_2O$ ab. Man löst dieses in Wasser, versetzt die Lösung mit berechneter Menge Schwefelsäure und dunstet das Filtrat ein.

Farblose, lange, dünne Nadeln, in Wasser und in Alkohol sehr leicht löslich. Schmelzp. 120°. Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid burgunderrothe Färbung. Fällt Erweiss, die 20procentige Lösung dient (Rosen'sches Reagens) zum Nachweis von Erweiss im Harn.

Natrium sulfosalicylicum Saures salicylsulfosaures Natrium $C_6H_4(OH)CO_2H \cdot SO_3Na$ Mol. Gew. = 240. Zur Darstellung werden 218 Th. Salicylsäure in wässriger Lösung mit 84 Th. reinem Natriumbicarbonat theilweise neutralisirt und durch Eindampfen zur Krystallisation gebracht.

Farblose Krystalle oder weisses krystallinisches Pulver, in 25–30 Th. Wasser löslich, fast unlöslich in Alkohol und in Aether. Die wässrige Lösung röthet Lackmus und wird durch Ferrichlorid burgunderroth gefärbt, verdünnte Schwefelsäure heilt diese Färbung auf. Durch Baryumchlorid entsteht kein Niederschlag. Durch Bleisulfid entsteht nach einiger Zeit ein Krystallmagma des schwerlöslichen Bleisalzes. Giebt mit Erweiss einen in Natriumchlorid unlöslichen Niederschlag.

Als Ersatz des Natrium salicylates gegen Gelenkrheumatismus. Besitzt nicht den unangenehmen Geschmack und zeigt nicht die Nebenwirkungen des vorigen, wirkt aber schwächer. Dosis 0,5–1,0 g mehrmals täglich. Ferner als Erweissreagens.

Acidum diiodosalicylicum Dijodsalicylsäure $C_6H_4J_2OHCO_2H$ Mol.-Gew. = 390. Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung berechneter Mengen von Jod und Jodsäure auf Salicylsäure in alkoholischer Lösung. Zur Reinigung führt man die Säure durch Kochen mit Natriumcarbonat in das schwerlösliche Natriumsalz über und gewinnt die freie Säure durch Zerlegen desselben mit Salzsäure.

Farbloses, mikrokrySTALLINISCHES Pulver in 1500 Th. kaltem oder 660 Th. siedendem Wasser löslich, leicht löslich in Alkohol und in Aether, von süßlichem Geschmack, nicht ätzend. Die wässrige Lösung reagirt sauer, wird durch Ferrichlorid violett gefärbt, rauchende Salpetersäure spaltet Jod ab.

Wirk analgetisch, antithermisch, antiseptisch und die Herzthätigkeit hemmend, bei Rheumatismus etc wie Salicylsäure zu 1,5—4,0 g pro die Meist als Natriumsalz angewendet

Natrium diiodosalicylicum Diiodosalicylsäures Natrium $C_6H_4J_2(OH)CO Na + 2\frac{1}{2}H_2O$ Mol-Gew = 457 Wird durch Neutralisation von 390 Th Diiodosalicylsäure mit 53 Th wasserfreiem Natriumkarbonat (Na_2CO_3) in wässriger Lösung erhalten

Farblose Blättchen oder lange platte Nadeln, in 50 Th Wasser von 20° löslich Reaktionen und Anwendung wie die freie Säure

Acidum dithiosalicylicum Dithiosalicylsäure $[S-C_6H_4-OH-CO-H]_2$ Mol Gew = 338

Darstellung Man erhitzt 2 Mol Salicylsäure mit 1 Mol Chlorschwefel S_2Cl_2 lange Zeit auf 120—150° wobei lebhaft Reaktion unter Entwicklung von Chlorwasserstoff eintritt $2C_6H_4(OH)CO_2H + S_2Cl_2 = 2HCl + [S-C_6H_4(OH)CO_2H]_2$ Man löst die harzartige, gelbe Reaktionsmasse in Natriumkarbonatlösung (wobei Schwefel ungelöst zurückbleibt) und fällt aus dieser Lösung die freie Säure durch Zusatz von Salzsäure Das Reaktionsprodukt ist ein Gemenge zweier isomerer Säuren, deren Natriumsalze man trennen kann Zu diesem Zwecke wird die Lösung der Natriumsalze mit Natriumchlorid (Kochsalz) versetzt, wodurch sich nur das Salz Nr I = $CO_2Na-OH-OS = 1-2-3$ unlöslich abscheidet, während das Salz Nr II = $CO_2Na-OH-OS = 1-2-5$ in Lösung bleibt Aus den so getrennten Salzen werden die freien Säuren durch Zusatz von Salzsäure in Freiheit gesetzt und durch Sättigen mit Natriumkarbonat wieder in die Natriumsalze übergeführt

Natrium dithiosalicylicum I Dithion I Dithiosalicylsäures Natrium I $[S-C_6H_4(OH)CO_2Na]_2$ Mol-Gew = 382 Entspricht dem durch Kochsalz unlöslich abgeschiedenen Natriumdithiosalicylat — Gelbliches, amorphes, etwas hygroskopisches Pulver von alkalischer Reaktion Die wässrige Lösung ist bräunlich und wird durch Ferrichlorid violett gefärbt Säuren verursachen milchige Trübung, die sich zu einem gelbbraunlichen Harz zusammenballt Durch Bleiacetat entsteht ein gelblicher Niederschlag, welcher beim Erhitzen mit Natronlauge in schwarzes Bleisulfid übergeht

Natrium dithiosalicylicum II Dithion II Dithiosalicylsäures Natrium II $[S-C_6H_4(OH)CO_2Na]_2$ Mol-Gew = 382 Entspricht dem durch Kochsalz nicht unlöslich abgeschiedenen Natriumdithiosalicylat Graues, hygroskopisches, in Wasser lösliches amorphes Pulver Die wässrige Lösung ist braunschwarz, Säuren erzeugen in ihr schmutzig-weiße Fällung, die sich zu einem dunklen Harze zusammenballt Das sonstige Verhalten wie Dithion I

Dithion schlechthin heisst das nicht getrennte Gemenge der beiden eben beschriebenen Salze

Die vorstehend beschriebenen Salze (Dithion, Dithion I und Dithion II) wirken antiseptisch und antipyretisch wie Salicylsäure bez Natriumsalicylat, aber erheblich stärker, angeblich ohne störende Nebenwirkungen Gebraucht wird zur Zeit besonders Nr II bei Gelenkrheumatismus in Gaben von 2—4 g pro die


Bismutum dithiosalicylicum Thioform Dithiosalicylsäures Wismut Formel angeblich $[S-C_6H_4(OH)CO_2-BiO]_2 + Bi_2O_3 + 2H_2O$, aber zweifelhaft Wird erhalten, wenn die Lösung von 1 Mol des dithiosalicylsäuren Natriums I oder II oder des Gemenges beider mit 4 Mol neutralen Wismutnitrates bei Gegenwart von Natronlauge digerirt wird

Gelbbraunes, geruchloses, in Wasser unlösliches Pulver Aeusserlich als geruchloses und ungiftiges Antisepticum bez als Jodoformersatz empfohlen Innerlich bei Magen- und Darmkatarh in Gaben von 0,2—0,5 g


Acidum tetrathiodichlorosalicylicum Tetrathiodichlorsalicylsäure $[S_2-C_6H_4(OH)CO_2H]_2$ Mol-Gew = 469 Zur Darstellung werden 2 Mol Salicylsäure mit 2 Mol Chlorschwefel ($2S_2Cl_2$) langsam auf 120—140° erhitzt bis Chlorwasserstoff nicht mehr entweicht (= Acidum dithiosalicylicum) Das Reaktionsprodukt wird mit Natriumkarbonat + Wasser in Lösung gebracht und die freie Säure durch Salzsäure ausgefällt

Rothgelbes Pulver, bei 150° erweichend, bei 160° schmelzend, in Wasser unlöslich Wird äusserlich als Antisepticum in Form von Streupulvern angewendet

Acidum phenilo salicylicum o-Oxydiphenylkarbonsäure $C_6H_5-C_6H_4-OH-CO_2H$ Mol-Gew = 214



Bei der trockenen Destillation eines Gemisches gleicher Moleküle Calciumbenzoat und Calciumsalicylat entsteht „Oxydiphenylketon“, welches durch Schmelzen mit Kaliumhydroxyd die o-Oxydiphenylkarbonsäure liefert Weisses Pulver, in Wasser schwer löslich, leichter löslich in Alkohol, Aether und Glycerin Als Wundantisepticum, besonders als Streupulver empfohlen



Dieses innere Anhydrid der Salicylsäure entsteht durch Erwärmen von Salicylsäure mit Phosphoroxychlorid. Krystallisiert aus Alkohol in farblosen, glänzenden Nadeln. Schmelzp. 281—282°. Verbindet sich leicht mit Chloroform, dient daher zur Darstellung des sog. Salicylid-Chloroforms, s. d.

Salicylsäure *Salicylglycol* $\text{CH}_2\text{—NH}(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2)\text{CO}_2\text{H}$ Diejenige Verbindung, als welche ein Theil der in den Organismus eingeführten Salicylsäure durch den Harn ausgeschieden wird. — Der mit Phosphorsäure schwach angesäuerte Harn wird mit Aether ausgeschüttelt. Der nach dem Verdunsten der Aetherlösung hinterbleibende Rückstand wird zur Vertreibung beigemengter Salicylsäure im Luftstrome auf 140—150° erwärmt, dann aus Wasser umkrystallisiert. In kaltem Wasser schwer lösliche, farblose Nadeln. Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid violett gefärbt.

Acidum salicylosum.

Acidum salicylosum Salicylige Säure Salicylwasserstoff. Sprige Säure. **Salicylaldehyd** o Oxybenzaldehyd. $\text{C}_6\text{H}_4\text{OH CHO}$ (1 2). Mol Gew. = 122

Kommt fertig gebildet vor in dem ätherischen Oele der Blüthen verschiedener Spiraea-Arten, z. B. *Spiraea ulmaria* L. Wurde früher gewonnen durch Oxydation des zugehörigen Alkohols, d. i. des Saligenins $\text{C}_6\text{H}_4\text{OH CH}_2\text{OH}$. Gegenwärtig synthetisch nach der **REIMER-LEIMANN'schen** Reaction dargestellt.

Darstellung In einem mit Rückflusskühler verbundenen Kolben von 1 l Fassungsraum erwärmt man eine Lösung von 50 g Phenol (absolut) in 450 g Natronlauge (aus 150 g NaOH und 300 g Wasser) auf 50—60° und lässt durch die Kühlröhre unter öfterem Umschütteln in kleinen Portionen 75 g Chloroform aufkochen. Es erfolgt Temperaturerhöhung, die Flüssigkeit färbt sich vorübergehend violett, zuletzt orangeroth. Nachdem alles Chloroform zugegeben, erhält man die Flüssigkeit noch 1—2 Stunden im Sieden, destillirt alsdann noch vorhandenes Chloroform im Wasserbade ab und lässt die Reaktionsflüssigkeit einkalten. Hierauf sauert man mit verdünnter Schwefelsäure an und unterwirft die saure Lösung der Destillation mit Wasserdampf. In das Destillat gehen über o Oxybenzaldehyd (d. i. Salicylaldehyd) und Phenol. Man schüttelt das Destillat mit Aether aus, bringt die ätherische Lösung durch Abdunsten auf ein kleines Volumen und schüttelt sie mit saurem Natriumsulfit, welches mit dem Salicylaldehyd, nicht aber mit dem Phenol, eine krystallisierende Verbindung eingeht. Man reinigt die Krystalle durch Absaugen und Waschen mit Alkohol, zersetzt sie durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure, schüttelt den Salicylaldehyd mit Aether aus, lässt diesen verdunsten und reinigt den hinterbleibenden Salicylaldehyd durch Destillation über freier Flamme.



Eigenschaften Farblose, angenehm bittermandelölig riechende, brennend schmeckende Flüssigkeit von öligem Beschaffenheit und schwach saurer Reaction. An der Luft nimmt sie bald röthliche Färbung an, auch bildet sich in ihr Salicylsäure. Sie erstarrt bei —20° C zu grossen durchsichtigen Krystallen und siedet bei 196° C. Das spec. Gew. ist bei 15° C = 1,1725. In Wasser wenig löslich, leicht löslich in Alkohol und in Aether. Mit Wasserdämpfen flüchtig (p Oxybenzaldehyd ist mit Wasserdämpfen nicht flüchtig!) giebt mit saurem Natriumsulfit eine krystallisierende Verbindung.

Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid intensiv violett gefärbt. Der Salicylaldehyd verhält sich wie ein einwerthiges Phenol. Das H-Atom der OH-Gruppe ist durch Metalle vertretbar, z. B. $\text{C}_6\text{H}_4\text{CHO ONa}$. Diese salzartigen Verbindungen wurden früher „Salicylite“ genannt.

Aufbewahrung Vor Licht geschützt, in kleinen, durch Kork wohlverschlossenen Gefässen.

Anwendung Salicylaldehyd wirkt desinficierend und antiseptisch, innerlich angeblich auch diuretisch. Man hat ihn zu 0,2—0,3 g 3—4mal täglich gegen Wassersucht gegeben. Stört leicht die Verdauung, Gaben von 5 g sollen Intoxikation bewirken. Ausscheidung durch den Urin, angeblich unverändert.

Potio salicylosa HANNON
 Rp Tincturae salicylosae 2,0
 Sirupi Sacchari 90,0
 Aquae destillatae 170,0
 S 2—3 stündlich einen Esslöffel

Sirupus salicylosus HANNON
 Rp Acidi salicylosi guttas 10
 Spiritus Vini guttas 80
 Sirupi Sacchari 60,0

Tinctura salicylosa
 Rp Acidi salicylosi 1,0
 Spiritus diluti (0,882) 9,0
 Dosis = 20 Tropfen

Acidum silicicum.

Die verschiedenen Formen, in welchen uns die natürlich vorkommende oder kunstlich hergestellte Kieselsäure entgegentritt, lassen sich auf zwei Modifikationen, die kristalline und amorphe Kieselsäure, zurückführen.

I Terra silicea praeparata Silicea Kieselerde Quarzpulver Terra vitrescibilis $\text{SiO}_2 = 60$ Ist natürlich vorkommendes kristallisiertes Kieselsäureanhydrid SiO_2 , wird durch Mahlen möglichst eisenfreien Quarzes dargestellt und zweckmässig von Porcellanfabriken oder Glasfabriken bezogen — Es ist unlöslich in allen Säuren — mit Ausnahme der Fluorwasserstoffsäure — wird auch durch Kochen mit wässrigen Lösungen der kohlensauen oder atzenden Alkalien unter gewöhnlichem Druck nicht merklich angegriffen, dagegen durch Schmelzen mit kohlensauen oder atzenden Alkalien (K_2CO_3 , Na_2CO_3 , KOH , NaOH) in lösliche Alkalisilikate verwandelt, die aufgeschlossen. Durch Erhitzen mit Fluorwasserstoffsäure wird es vollständig als Siliciumfluorid SiF_4 verflüchtigt.

Es wurde vorübergehend in Gaben von 2—4 g 3—4mal täglich gegen habituelle Verstopfung angewendet und hat hier wohl durch mechanische Reizung der Darmschleimhaut gewirkt — In der chemischen Praxis kann man es zum Filtrieren der starken Säuren und der Laugen (ähnlich wie Asbest und Glaswolle) benutzen.

II Acidum silicicum amorphum Silicea praecipitata Amorphe Kieselsäure Zur Darstellung fügt man zu einer mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnten Lösung von Kali- oder Natron-Wasserglas so lange Salzsäure, bis eine Probe der Fällungsflüssigkeit mit Methylorange deutlich rothe Färbung giebt. Man dampft die Flüssigkeit auf dem Wasserbade zur Trockne und wäscht den hinterbleibenden Rückstand mit warmem Wasser aus, bis das ablaufende nicht mehr sauer reagiert. Man presst das Wasser ab, zerkleinert den Presskuchen, trocknet ihn und verwandelt ihn in ein Pulver.

Die im Wasserbade ausgetrocknete Kieselsäure hat die Formel SiO_2H , Mol.-Gew. = 78. Sie ist ein zartes, weisses, sehr leichtes Pulver, ist in Wasser unlöslich, in heisser Aetzkali- oder Aetznatronlauge leicht löslich.

Man giebt sie innerlich zu 0,06 g täglich 2 mal in Tabletten und zwar in Verbindung mit Calciumphosphat zur Unterstützung retardirter Knochenbildung. Ob an Stelle gefällter Kieselsäure etwa Kieselguhr untergeschoben ist, lässt sich durch das Mikroskop leicht erkennen.

III Acidum silicicum puliforme Silicad. Breiformige Kieselsäure. Man erhält diese, wenn man die sub II gefällte und ausgewaschene Kieselsäure in einem leinenen Kolatorium abtropfen lässt, aber nicht austrocknet. Zusammensetzung $\text{SiO}_2\text{H}_2 + x \text{ aqua}$.

Man verwendet sie unter dem Namen „Silicad“ als Excipiens für Arzneistoffe so zu sagen als Salbengrundlage.

IV Terra infusoriarum Infusorienerde Kieselguhl. Findet sich in grossen Lagern, vermuthlich den ausgetrockneten Becken früherer Teiche und Seen in der Lunburger Heide, in der Nähe von Berlin, in Böhmen bei Böh u a O und besteht aus den Kieselpanzern abgestorbener Diatomeen, im gegluhten Zustande aus Kieselsäureanhydrid SiO_2 . Das Naturprodukt wird zur Zerstörung hängengelegter organischer Substanz calcinirt, dann gemahlen und geschlämmt und kommt je nach der Reinheit als weisses bis rothliches (wegen Eisengehalt) Pulver in den Handel. Für pharmacoutische Zwecke zu empfehlen ist die Sorte *Terra silicea calcinata precipitata*.

Sie wird angewendet zur Herstellung der Unna'schen Specialitäten, als Konstituens für Pillen, ferner zur Aufnahme von Brom und Formaldehyd und zu Aetzpasten, z B mit Milchsäure, zu Zahnpulvern und Zahnpasten.

Technisch zur Fabrikation von Dynamit, als Wärmeschutzmasse in Geldschranken und für Bekleidungen von Dampfbojen, zur Herstellung von Wasserglas, zu Kitten und vielen anderen Zwecken, z B als Verpackungsmaterial für Säuren u dergl.

Infusorienerde ist sehr leicht durch das Mikroskop nachzuweisen. Bei 100—300facher Vergrösserung erkennt man auf den ersten Blick die charakteristischen Formen der Diatomeen.

V Tabashir nennt man Konkretionen, die im Bambusrohr (*Bambusa arundinacea L.*) vorkommen. Eibsen- bis nussgrosse Stücke, aus fast reiner amorpher Kieselsäure bestehend. In der Hindu-Medicin als Tonicum, Aphrodisiacum und Lungenmittel benutzt.

Schmilzt man amorphe oder krystalline Kieselsäure mit kohlensauren oder lithion Alkalien, so erhält man Alkalisalze der Kieselsäure in Form wasserlöslicher Glasilasse. Die chemische Zusammensetzung derselben ist je nach dem Verhältnisse, in welchem Kieselsäure und Alkali angewendet werden, verschieden.

VI Liquor Kali silicici Kalium silicium solutum (Helv.) Kaliwasserglas. Silicate de potasse dissous (Gall.) Liqueur des cailloux. Eine farblose oder gelbliche, geruchlose, sirupdicke, stark alkalische Flüssigkeit. Spec Gew 1,30—1,35 (Helv.), 1,282 (Gall.), 1,24—1,25 (Eiganzb.)

Darstellung 150 Th feiner Quarzsand (oder Quarzpulver oder Infusorienerde), 100 Th Pottasche und 10 Th Holzkohlenpulver werden im Glühfeuer geschmolzen und 5—6 Stunden im Schmelzen erhalten. Man lässt die Schmelze in kaltes Wasser laufen, in welchem sie in kleine Stücke zerfällt. Man bringt diese durch Kochen mit Wasser in Dampföpfen unter gesteigertem Druck in Lösung und stellt die geklärte Lösung durch Eindampfen auf das geforderte spec Gew. Enthält die Lösung Kaliumsilid, so muss dieses durch Erwärmen mit Kupferfeilpulver zersetzt und beseitigt werden. Das Kaliwasserglas ist eine Mischung von Kaliumtrisilikat $\text{Si}_2\text{O}_7\text{K}_2$ mit Kalumtetrasilikat $\text{Si}_4\text{O}_{10}\text{K}_4$.

VII Kalium silicium purum Reines Kaliumsilikat oder Kieselsaures Kalium $\text{K}_2\text{SiO}_3 = 154$. Zur Herstellung dieses in der Mineralwasserfabrikation gebrauchten Salzes schmilzt man eine sorgfältig hergestellte Mischung von 100 Th frischgeglühten reinem Kaliumkarbonat mit 43,5 Th feingepulvertem Quarz, bis die Masse eine Kohlen-säure-Entwicklung ruhig fliesst. — Man gießt den Fluss in einen Porcellanmörser, bringt ihn in die Form erbsengrosser Stücke und bewahrt diese ihrer hygroskopischen Eigenschaften wegen in möglichst dicht geschlossenen Gefässen auf.

VIII Liquor Natru silicici (Form III) Natrium silicium liquidum. Natriumwasserglas. Silicate de soude liquide. Wird in gleicher Weise hergestellt wie das Kaliwasserglas, nur werden auf 100 Th Quarzpulver 52 Th calcinirtes Natriumkarbonat und 6 Th Holzkohlenpulver angewendet. — Spec Gew 1,30—1,40 (Form III) Alkalisch reagirende, sirupöse Flüssigkeit.

Vorreibt man gleiche Gewichtstheile Wasserglaslösung und Weingeist (90 %), so muss sich ein kräftiges, nicht breiartiges oder schmieriges Salz in reichlicher Menge ausscheiden. Die abfiltrirte Flüssigkeit darf rothes Lackmuspapier nicht blau färben, andernfalls ist das Präparat zu stark alkalisch, bezw natronlaugehaltig. S w u

IX. Natrium silicicum purum Reines Natriumsilikat. Reines kieselbares Natrium $\text{Na}_2\text{SiO}_3 = 122$ Wird in der nämlichen Weise bereitet, aufbewahrt und angewendet wie Kalium silicicum purum, nur verwendet man ein manges Gemisch von 100 Th. frisch calcinirtem Natriumkarbonat mit 56,6 Th. Quarzpulver

Doppelwasserglas, Vitrum solutum duplicatum, nennt man in der Technik ein Gemisch aus 3 Th. Kaliwasserglas mit 2 Th. Natriumwasserglas

Aufbewahrung Die Aufbewahrung der Wasserglaslösungen erfolgt in Gefäßen mit Gummistopfen (oder Korkstopfen). Glasstopfen werden bald derartig eingekittet, dass die Öffnung der Flaschen ohne deren Zerkümmerung unmöglich wird

Anwendung Zum Gebrauch für die Mineralwasserfabrikation dienen die reinen Präparate. Diese werden auch abgegeben, wenn *Kalium-* bezw. *Natrium silicicum* für den inneren Gebrauch verordnet werden sollten. Verordnet der Arzt *Liquor Kali* oder *Natri silicici*, so sind 33 1/3 procentige Lösungen dieser Salze zu dispensiren. Man schreibt diesen Silikaten, in Gaben von 0,3—1,0 g 3—4 mal, täglich mit viel Wasser verdünnt, eine auflösende Wirkung gegenüber harnsauren Konkretionen zu, verordnet sie daher bei Gicht

Außerordentlich dienen Wasserglaslösungen, indem man mit ihnen Pappe, Leinwand, Gaze tränkt, zur Herstellung der „Wasserglasverbande“. Hierbei ist Rücksicht darauf zu nehmen, dass die betr. Lösungen nicht zu stark alkalisch sind. Wenn man eine kleine Stelle des Handrucksens mit Wasserglas bestreicht, so darf nach 1/4—1/2 Stunde Aetzung der Haut nicht wahrzunehmen sein. — Man hute sich auch, dass nicht für Wasserglas die diesem ähnliche Kali- oder Natronlauge bezogen oder abgegeben wird! Man unterlasse die angegebene Prüfung mit Weingeist niemals. Grobe Verwechslungen mit Natronlauge sind wie folgt zu erkennen: 1) Fügt man zu 10 cem Wasserglaslösung 3—4 Tropfen Mercurchloridlösung, so darf nicht sofort Ausscheidung von gelbem Mercurioxyd erfolgen, die Flüssigkeit muss vielmehr zunächst einige Zeit klar bleiben. 2) Versetzt man 5 cem Wasserglaslösung mit 5 cem Kalosol, so erfolgt Ausscheidung von Kieselsäure. Liegt Natronlauge vor, so bleibt die Flüssigkeit klar.

Die Anwendung in der Technik beruht darauf, dass aus den Alkalisilikaten schon durch Einwirkung der Luft-Kohlensäure allmählich Kieselsäure abgeschieden wird. Da ferner beide Arten von Wasserglaslösung mehr Kieselsäure gelöst enthalten als den normalen Silikaten entsprechen würde, so sind sie im Stande, weitere Mengen von Basen aufzunehmen. Auf diesen beiden Ursachen beruht die Verwendung des Wasserglases zu Kitten. Außerdem wird es benutzt zum Weichmachen des Wassers, als Zusatz zur Stärke zum Steifen der Wasche, als Zusatz zur Soda (angeblich zur Verbesserung), zum Füllen der Seife, Unverbrenlichmachen der Gewebe und anderen Zwecken mehr.

Cyanit Einzig wahre feuerfeste, flüssige Anstrichfarbe ist eine Lösung von technischem Wasserglas.

Henckel's Bleichsoda ist zur Trockne verdampfte Mischung von etwa 2 Th. Soda mit 1 Th. Natriumwasserglas. Das Präparat soll (!) besser bleichend wirken als reine Soda.

Ausfallender gefärbter Kitt für Lecher, Blase
Springe in Eisen, Kupfer, Messing, Stein

A

Rp. Bol. rubras
Cacina laevigatae
Vitri pulverati
(vel Terrae Infusoriae) $\text{R} \text{ 20,0}$
Pulveris vel Limaturae Ferri
Lithargyri praeparati
Graphitis pulveratae $\text{R} \text{ 10,0}$
Calcarinae in aëre dilapae $\text{R} \text{ 60,0}$

Alle Bestandtheile werden zu einem feinen Pulver innig gemischt, darauf unmittelbar vor dem Gebrauch mit Leinölflüssigkeit zu einer weichen Pasta angestossen.

Mit viel Wasserglas verdünnt, kann dieser Kitt auch als Retortenbeschlag verwendet werden.

B

Rp. Zinc oxydati venalis
Manganii hyperoxydati $\text{R} \text{ 100,0}$
Vitri vel Terrae Infusoriae $\text{R} \text{ 50,0}$
Graphitis $\text{R} \text{ 15,0}$

Die Mischung der innig feinen Pulver wird mit kaltem oder Natronwasserglas zu einer weichen Paste angeführt, welche sogleich zu verbrauchen ist.

Wasserglaskitt und Füllkitt
für Eisen, Zink, Stein etc.

A

Rp. Ferri limati vel pulverati q. v.

Vitri soluti duplicati q. s.
M. Wird grauschwarz.

B

Rp. Antimoni crudi pulv. q. v.

Vitri soluti duplicati q. s.
M. Wird grauschwarz und politurfähig.

C

Rp Zinci metalbei pulveris q v
Vitri soluti duplicati q s
M Wird grau, dient auch als Kitt für Zink.

Kitt zum Ausfüllen
der Risse und Spalten in Holz

Rp Ferruginis lignae subtilioris
(feine Stigespäne)
Cretae laevigatae 15
Liquoris Natri silicii q s
ut fiat pasta mollior Recens paratur
Zum Fest- und Einkitten eiserner Stäbe, Klammern,
Haspen etc in Mauer oder Stein
Rp Arenae siliceae subtilioris 100,0
Cretae laevigatae 20,0
Bolus albae 10,0

Die Mischung der innig feinen Pulver wird mit
Calcariae ustae hydratae 15,0
Liquoris Natri silicii q s
zu einem Brei verarbeitet, welcher bald zu ver-
brauchen ist. — Diese Mischung in Teigform
kann auch als Ausfüllkitt für Stein gebraucht
werden

Ofenkitt, weisser

Rp Argillae albae 20,0
Barytae sulfatae 50,0
Vitri vel Terrae infusoriae 80,0
Calcariae subcarbonatae
vel Calcariae ustae in aëre
dilapsae 20,0

Die Mischung der sehr feinen Pulver wird mit
Kalkwasserglas zu einer weichen Paste verarbeitet,
welche sogleich zu verbrauchen ist
Zur Darstellung eines feurigen Ofenkittes wird in
Stelle des Barytsulfats wasser oder rother
Bolus oder die gewünschte Farbe (Beigblau,
Zinnober, Graphit etc.) genommen

Retorten und Kolbenbeschlag

Beschlag für gläserne Retorten und Kolben

Rp Spati fluorici 100,0
Vitri vel Terrae infusoriae 200,0
Liquoris Kali silicii et
Liquoris Natri silicii aa q s

Die höchst feinen Pulver werden gemischt und mit
dem Wasserglas zu einem dünnen Brei angerührt,
mit welchem die betreffenden Geräte zweimal
überstrichen werden. Man trocknet zunächst an
der Luft, dann bei gesteigerter Temperatur

Ein anderer und guter Kitt ist ein Gemisch aus
Graphit, Lehm und etwas Borax oder aus Glas-
pulver (Infusorienerde) und Chamottmehl ann
10 Th und 2 Th Boraxpulver

Steinkitt, säurebeständiger

A.

Asbesti pulverati 20,0
Baryl sulfurici 10,0
Liquoris Natri silicii (50°B) 20,0

B

Arcuae subtilissime pulveratae 10,0
Asbesti pulverati 10,0
Liquoris Natri silicii (50°B) 20,0

Der als B aufgeführte Kitt ist noch fester als A.

Steinkitt zum Kitt

von Stein, Holz, Stein und Metall etc.

Rp Terrae infusoriae
Lithargyri praeparati aa 10,0
Calcariae hydratae 5,0

mischt man

Olea Lini q s

so dass ein dicker Brei entsteht, welcher stets frisch
zu bereiten ist

Steinkitt und Füllkitt

für Thon-, Stein-, Cement Festkitt

Rp Calcariae hydratae 50,0
Cretae laevigatae 100,0
Argillae albae 10,0
Liquoris Natri silicii q s

Man stelle einen Brei dar, welcher sogleich zu
brauchen ist

Färbung wird der Mischung durch rothen Bolus,
Terra de Siena (gebrannte und ungebrannte),
grüne Erde, Ocker, Beigblau etc gegeben

Steinkitt, weisser

zum Kittan von Marmor, Alabaster etc.

Rp Zinci oxydati 100,0
Calci carbonici 10,0
Calci phosphorici 10,0
Magnesi carbonici 5,0
Magnesi phosphorici 5,0
Liquoris Natri silicii q s

Man reibt die Mischung der feinen Pulver zu
einem Brei an Man streicht letzteren auf die
etwas angewärmten Bruchstücke, presst diese zu-
sammen und überlässt dem Gegenstand einige
Tage der Ruhe

Mastic Cement

Ein Gemisch von Sand, Kalkstein, Bleiglätte und
Leinöl (HERRN, Analyt)

Paget's Mastic

Rp Arenae subtilioris 100,0
Cretae laevigatae 80,0
Cerussae plumbicae 7,0
Lithargyri 8,0

Die Mischung der feinen Pulver wird mit gestig-
ter Bleiweißlösung zu einer dicken Paste an-
gestossen, welcher man zuzügt
Olea Lini vel Papaveris 8,0

Porcellankitt

Rp Caseini recentis e lacte
praecipitati q v
Liquoris Natri silicii q s

ut fiat pulvis acquabilis

Künstliche Meerschaummasse.

Rp Caseini recentis e lacte praecipitati q v
Liquoris Kali silicii
Liquoris Natri silicii aa

Misce, ut fiat massa fluida, quae immiscendo
Magnesia ustae (vel Dolomitis ustae) q s.
in massam plasticam redigatur

Metallputz/pasta

Rp Terrae infusoriae 50,0
Cretae laevigatae 50,0
Lapidis Stralidis laevigati 25,0
Petrolei 5,0
Vasellini crudi 200,0

Syndetikon (flüssiger Leim)

Rp Liquoris Natri silicii 100,0
Gummi arabici 10,0
Sacchari albi 80,0

Holz, Pappe, Leinwand, mit Wasserglas bestreichen, verbrennen nicht mit Flamme, man benutzt es daher zum Unverbrenlichmachen von Geweben etc. Ferner ist Wasserglas ein vortreffliches Bindemittel verschiedener mineralischer Farben zum Anstrich auf Holz, Stein und Mauerputz, Zink (nicht Eisen) Gut vertragen sich damit Zinkoxyd, Barytsulfat, Kieide (nicht Elerweiss). Die Mischung (etwa zu gleichen Theilen) ist stets frisch zu machen, da sie schnell eihartet.

Die Abgabe von Wasserglas in Trinkgefassen sollte nie stattfinden.


Wasserglaskomposition, fettfreie Seife, ein mit Mirbol parfumirtes schmieriges salbenartiges Gemisch aus 20 Th Seife, 5 Th Glycerin und 75 Th Nationwasserglas. Wird zum Waschen der Wasche gebraucht.

Acidum sozojodolicum.

Unter diesem gemeinsamen Namen sollen die als „Sozojodol-Präparate“ in die Therapie eingeführten Salze der „Dijod-paraphenolsulfosaure“ zusammengefasst werden.

I Acidum sozojodolicum Sozojodolsaure Dijodparaphenolsulfosaure.
 $C_6H_3J_2(OH)SO_3H + 3 H_2O$ Mol.-Gew. = 480

Darstellung Man lost 1 Mol paraphenolsulfosaures Kalium in überschüssiger, etwas verdünnter Salzsäure und fugt zu dieser Lösung unter Umrühren eine im Verhältniss 5 KJ KJO_3 bereitete Lösung von Kaliumjodid und Kaliumjodat. Das zunächst sich ausscheidende Jod verschwindet schliesslich, und die Flüssigkeit gesteht zu einem Krystallbrei, welcher das saure dijodparaphenolsulfosaure Kaliumsalz darstellt. Durch Umsetzen der wässrigen Lösung dieses Salzes mit Baryumchlorid erhält man das Baryumsalz, aus welchem die freie Dijodparaphenolsulfosaure durch Zerlegen mit verdünnter Schwefelsäure abgeschieden wird.



Nadelförmige Prismen, die über Schwefelsäure wasserfrei werden. Leicht löslich in Wasser, in Alkohol und in Glycerin. In der Wundbehandlung die 2—3 procentige wässrige Lösung als geruchloses, ungiftiges Antisepticum.

II Kalium sozojodolicum (Ergänz.) Sozojodol-Kalium. Sozojodol schwerlöslich. $C_6H_3J_2(OH)SO_3K + 2 H_2O = 500$. Bei der oben angegebenen Darstellung erhalten und durch Krystallisation rein dargestellt.

Farblose, gut ausgebildete Prismen, in 70 Th Wasser löslich. Die wässrige Lösung reagirt sauer und wird durch Ferrichlorid violettblau gefärbt, durch rauchende Salpetersäure wird unter Gelbfärbung (Bildung von Pikrinsäure!) Jod ausgeschieden. Mit Baryumchlorid entsteht krystallinische, in der Siedehitze lösliche Fällung.

Wird sekretionsbeschränkend und austrocknend. Mit 1—5 Th Talcum venetum gemischt als Trocken-Antisepticum bei Ekzemen, feiner als Brandsalbe.

III Natrium sozojodolicum (Ergänz.) Sozojodol-Natrium. Sozojodol leichtlöslich. $C_6H_3J_2(OH)SO_3Na + 2 H_2O = 484$. Durch Neutralisiren der freien Säure mit Natriumcarbonat und Eindampfen der Lösung herzustellen.

Farblose Krystalle, in 12 Th Wasser oder Glycerin löslich, von saurer Reaktion, dem Kaliumsalz ähnlich. Die Lösung in Glycerin bleibt im Lichte unverändert, diejenige in Wasser färbt sich allmählich dunkler.

Wird stets da benutzt, wo Lösungen angewendet werden sollen. In der Wundbehandlung die 2—3proc wässrige Lösung.

IV †† Hydrargyrum sozojodolicum (Ergänz.) Sozojodol-Quecksilber. $C_6H_3J_2SO_3 \cdot OHg = 624$. Wird durch Fällung concentrirter Lösungen von Sozojodolnatrium und Mercurinitrat erhalten. Pomeranzengelbes, feines Pulver, in 500 Th Wasser, sehr leicht in Kochsalzlösung löslich. Enthält 32,05 Proc Hg. Concentrirte wässrige Lösungen werden

unter Zusatz von Kochsalz oder anderen Halogenalkalisalzen hergestellt. Bei Lues und als Antiparasiticum. Die 10proc. Lösung wirkt atzend, die 2,5 proc. tötet die Räude milde schon nach 20—30 Minuten. Subkutan 0,05—0,08 g in Kaliumjodidlösung.

0,5 g Sozodolquecksilber müssen sich auf Zusatz von 1,5 g Kochsalz in 30 ccm Wasser mit nur schwacher Trübung auflösen. Eine Lösung von 0,1 des Präparates in 1 ccm Salpetersäure und 9 ccm Wasser werde durch Silbernitrat nur schwach getrübt (Chlor). Eine Lösung von 0,2 g des Präparates in 20 ccm Wasser, mit Hülfe von Salzsäure bereitete, werde weder durch Baryumnitrat (Schwefelsäure) noch durch verdünnte Schwefelsäure (Barytverbindungen) getrübt. In der Wärme völlig flüchtig. Sehr vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren.

Ammonium sozodolicum Sozodol-Ammonium $C_6H_5J_2(OH)SO_3NH_4 = 44$; Farblose Krystalle, löslich in 30 Th. Wasser.

Lithium sozodolicum Sozodol-Lithium $C_6H_5J_2(OH)SO_3Li = 432$. Farblose, nadelförmige Prismen, in 30 Th. Wasser löslich. Zu 1—3 g pro die bei Licht, Gelenkrheumatismus.

Sozodol-Magnesium $[C_6H_5J_2(OH)SO_3]_2Mg + 8H_2O = 1018$. Farblose dünne Nadeln, in 16 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht löslich.

† **Sozodol-Zink** $[C_6H_5J_2(OH)SO_3]_2Zn + 6H_2O = 1023$. Farblose Nadeln, in 20 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht löslich. Anwendung bei diversen katarthalschen Affektionen der Nase etc., mit 10—15 Th. Talcum venetum vermischt oder in 3—5 proc. wässriger Lösung (bei Tripper). Vorsichtig aufzubewahren.

† **Sozodol-Blei** $[C_6H_5J_2(OH)SO_3]_2Pb + H_2O = 1075$. Feine verfilzte, ursprünglich weisse, bald gelblich werdende Krystallnadeln, in 200 Th. Wasser löslich. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren.

† **Sozodol-Silber** $C_6H_5J_2(OH)SO_3Ag = 593$. Schwach gelblich-weißes, am Lichte sich bald violett rötlich färbendes Pulver, in kaltem Wasser schwer (1:350) löslich. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren.

Sozodol-Aluminium $[C_6H_5J_2(OH)SO_3]_3Al + 3H_2O = 1856$. Lockere, nadelförmige Krystalle, in 3 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht löslich. Wirkt adstringierend.

Anwendung. Die Sozodolpräparate werden auf Grund ihres hohen Gehaltes an desinficirenden Substanzen (Phenol, Jod und Schwefel) als Antiseptica, namentlich als Ersatz des Jodoforms empfohlen. Man giebt sie in Form ihrer wässrigen Lösungen, ferner als Streupulver mit Talcum, Milchzucker, in Form von Salben mit Adeps, Lanolin etc. Gute Erfolge sind erzielt bei Hautkrankheiten (Myosen), ferner bei Geschwüren jeder Art. Vor dem Jodoform haben sie unbedingt den Vorzug absoluter Geruchlosigkeit und, soweit bis jetzt bekannt, auch den des Fehlens toxischer Erscheinungen. Bisher wurden sie besonders in der rhino- und laryngologischen Praxis mit gutem Erfolge angewendet.

Rp Natrii sozodolici 1—2,0	Infusio Hydrargyri sozodolici.
Lycopodii 5—20,0	Rp Hydrargyri sozodolici 0,8
Streupulver für offene Bubenae (SCHWIMMER)	Kali jodati 1,8
	Aqua destillatae 10,0
	Zur subkutanen Injektion
Rp Kali sozodolici 2,0	Sozodol Wundsalbe
Vasolini 10—20,0	Rp Kali sozodolici 10,0
Sozodol-Biendsalbe	Adipis Lanae 80,0
	Vasolini 10,0
Rp Zinci sozodolici 1,0	Sozodol Wundstreupulver.
Aqua destillatae	Rp Kali sozodolici 10,0
Glycerini 10,0	Talc veneti 90,0
Zum Einpinseln der Nasenschleimhaut bei katarthalschen Affektionen	(vel Sacchari Lactis 90,0)
Rp Hydrargyri sozodolici 1,0	Sozodol Schnupfepulver
Amyli pulverati 10—20,0	Rp Zinci sozodolici 7,0
Bai Heilosen und syphilitischen Geschwüren	Sacchari Lactis 93,0
[SCHWIMMER.]	Menthol 0,3

Acidum stearinicum.

I. Acidum stearicum (Ergänzb.) **Acidum stearicum** (U-St) **Stearinsäure.**
Talgssäure. (Stearin des Handels) $C_{18}H_{36}O_2$. Mol Gew = 284

Darstellung Die Stearinsäure ist eines der Produkte, welche bei der Verarbeitung der Fette im Grossen gewonnen werden. Geeignete Fette (Talg, Schweinefett, Kokosfett, Palmöl) werden entweder mit Kalk oder mit Schwefelsäure oder mit überhitztem Wasserdampf unter gesteigertem Druck verseift. Im ersten Falle erhält man eine Seife, aus welcher durch Zersetzen mit Salzsäure die Fettsäuren in Freiheit gesetzt werden, in den beiden letzten Fällen die freien Fettsäuren selbst. Die so erhaltenen Fettsäuren bestehen aus festen und flüssigen Antheilen. Man scheidet die letzteren ab, indem man das Fettsäuregemisch bei gewöhnlicher oder etwas erhöhter Temperatur einem starken Druck unterwirft. Die flüssigen Fettsäuren (Oelsäure) fliessen alsdann ab, die festen Fettsäuren (Stearinsäure, Palmitinsäure) verbleiben als Pressrückstand. Schmelzpunkt und Zusammensetzung des Produktes hängen von dem Rohmaterial, sowie von der eingehaltenen Temperatur und dem angewendeten Druck beim Pressen ab.

Eigenschaften. Die Stearinsäure des Handels ist nicht reine Stearinsäure, sondern enthält neben Stearinsäure noch Palmitinsäure und ähnliche feste Fettsäuren, z. B. Oxy-stearinsäure. Sie bildet weisse, harte, geruch- und geschmacklose, auf dem Bruche körnig-krySTALLINISCHE, fettig anzufühlende Massen, unlöslich in Wasser, löslich in etwa 50 Th Alkohol (90%), reichlicher in siedendem Alkohol, ferner in Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff. Es verlangen U-St Schmelzpunkt nicht unter 56°, Erstarrungspunkt nicht unter 54°, Ergänzb. Schmelzpunkt 60–65°. Erwärmt man die Stearinsäure mit Alkalikarbonaten, so bildet sie unter Entweichen von Kohlensäure Salze, atzende Alkalien wirken noch energischer und ohne Entwicklung von Kohlensäure ein. Die entstandenen Salze (Stearinseifen), sind verhältnissmässig harte Seifen. Beim Auflösen der neutralen Stearate in viel Wasser resultiren trübe Flüssigkeiten, weil diese Seifen in saure Stearate und in freies Alkali zerlegt werden. Solche Lösungen geben alsdann mit Phenolphthalein Rothfärbung.

Prüfung Anorganische Verfälschungen und Verunreinigungen erkennt man daran, dass beim Verbrennen ein feuerbeständiger Rückstand hinterbleibt. Paraffin, welches bisweilen als Verfälschungsmittel zugesetzt wird, ist durch folgende Vorprüfung zu erkennen. Man übergiesst 5 g Stearinsäure mit 30–40 cem Alkohol, verseift durch Zusatz von etwa 1 g festem Natriumhydroxyd (nicht Kalium-h.) und dampft die gebildete Seifenlösung unter Zusatz von etwa 20 g trockenem Seesand, welcher durch Ausziehen mit Salzsäure gereinigt worden ist(!), zur Trockne. Den völlig trockenen Rückstand zieht man mit frisch destillirtem Petroleumäther aus. Derselbe darf keinen oder nur einen ausserst geringen Rückstand hinterlassen.

Sehr wichtigen Aufschluss über Anwesenheit von Verunreinigungen giebt die Bestimmung von Säurezahl, Esterzahl und Verseifungszahl. Als normal sind für technische Stearinsäure folgende Werthe beobachtet worden: Säurezahl 200–210, Esterzahl 0–10, Verseifungszahl 200–220. Sinkt die Säurezahl erheblich unter 200, so weist dies auf Vorhandensein neutraler Bestandtheile (Paraffin) hin, ist gleichzeitig eine hohe Verseifungszahl zu beobachten, so kann der fremde Bestandtheil auch ein Fett oder Wachs sein.

Davon abgesehen ist für den Werth einer technischen Stearinsäure massgebend Farblosigkeit, ferner der Schmelzpunkt und der Erstarrungspunkt.

Aufbewahrung. An einem kühlen, vor Licht geschützten Orte hält sie sich ohne besondere Vorsichtsmassregeln recht gut, sie nimmt alsdann auch keinen ranzigen Geruch an.

Pulverung Man schmilzt 2 Th Stearinsäure mit 1 Th absolutem Weingeist zusammen und rührt bis zum Erkalten. Die pulverige Masse lässt man an der Luft abtrocknen.

Anwendung. Die Stearinsäure des Handels wird an Stelle des weissen Waxes für Salben und Ceratmischungen angewendet. Man hat es auch versucht, sie mit Chinabasen zu vereinigen, weil diese Alkaloidstearate nur wenig bitter schmecken. Technisch als Zusatz zu heissem Starkeschleim, um der Wasche Steifigkeit und Glanz zu geben (auf 500 g Stärke = 25–30 g Stearin). Auf einem Reibstein geriebenes Stearin wird auf Tanzböden gestreut, um diese glatter zu machen. Zur Herstellung von „Stearinkörnern“ macht man der Stearinsäure einen Zusatz von 2–5 Proc Paraffin oder weissem Wachs, um das Krystallisiren zu unterdrücken.

II Acidum stearicum purum Reine Stearinsäure $C_{18}H_{36}O_2$. Wird durch wiederholtes Umkrystallisiren der technischen Stearinsäure aus heissem Alkohol erhalten. Weiss glänzende Blättchen, Schm-P 69,2° Spec Gew bei 11° = 1,00, bei 69,2° = 0,8454.

Linimentum saponato-camphoratum ex acido stearico paratum In einem Kolben erwärmt man auf dem Wasserbade 100,0 kalkfreie Stearinsäure, 53,0 zerriebenes kryst Natriumkarbonat, 200,0 Weingeist (90 Proc) unter öfterem Umschwenken (ca $\frac{1}{2}$ Stunde), bis die Entwicklung von Kohlensäure aufgehört hat und völlige Auflösung erfolgt ist. Hierauf setzt man 60,0 Kampher, 2300,0 Weingeist (90 Proc) zu, digerirt bis zur Lösung der Seife, filtrirt durch Baumwolle und fugt zum Filtrat 7,5 Thymianöl, 15,0 Rosmarinöl und 120,0 Ammoniakflüssigkeit (10 Proc).

Enthält die verwendete Stearinsäure Calciumstearat, so scheidet sich dieses später in Form sternförmiger Krystalle aus, welche beim Einreiben die Haut irzen. Uebrigens lässt sich dieser Opodeldok auch nicht so leicht völlig auf der Haut verreiben, als der aus weichen Seifen bereitete.

Sapo stearicus Stearinseife. In eine im Dampfbade eingelegte Lösung von 53 Th kryst Natriumkarbonat in 300 Th Wasser giesst man unter Umrühren allmählich 100 Th geschmolzene Stearinsäure und erhitzt unter weiterem Umrühren $\frac{1}{2}$ Stunde lang. Dann fugt man 10 Th Weingeist (90 Proc) hinzu und erhitzt weiter, bis sich ein durchsichtiger, in warmem Wasser völlig löslicher Seifenleim gebildet hat. Hierauf setzt man eine filtrirte Auflösung von 25 Th Kochsalz und 3 Th kryst Soda in 80 Th Wasser und erhitzt unter Umrühren, bis sich die ganze Seife unlöslich abgeschieden hat. Nach dem Erkalten wäscht man die von der Mutterlauge getrennte Seife mehrmals mit geringen Mengen Wasser, presst sie zwischen Leinwand stark aus, schneidet sie in Spähne, trocknet und pulvert diese. — Feines weisses Pulver, in Wasser und in Weingeist klar löslich (Ergänzb).

Will man die in jeder Stearinseife enthaltenen Salze entfernen, so fällt man den nicht ausgesalzenen Seifenleim in Pergamentpapierdarme und dialysirt durch Euhängen in warmes Wasser.

Huf-Futter für Pferde Man schmilzt 50–80 Th Stearin-Pech, 0,8–1,0 Th Schwefel und rührt 7,5–25,0 Th Cement, 6–8,0 Th Sagomehl und 6–8,0 Th Weiz darunter. Die erstarrte Masse wird in siedendem Wasser erwacht und zum Ausfällen des Hufes verwendet. (Stearin-Pech sind Abfälle von der Stearinsäure-Fabrikation).

Modellirwachs für Zahnärzte Stearinsäure 25,0, Kopfnussöl leichtes 25,0, Talkpulver 50,0 mit Kaolin schwach roth gefärbt und mit Rosenöl parfümirt.

Stearum, Ersatz für Leder und Linoleum. Bei in den Stearinfabriken abfallende Theer wird mit Korkpulver gemischt und gewalzt.

Acidum succinicum.

Acidum succinicum Bernstein säure (Ergänzb). **Sal volatile succini.** Flüch-
tiges Bernsteinsalz. **Succinylsäure.** **Acide succinique** (Karabique). **Acide ou sel**
d'ambie **Succinic acid** $C_4H_4O_4$. Mol Gew. = 118.

Zum pharmaceutischen Gebrauche wird nicht die völlig reine, sondern eine flüchtiges Bernsteinöl enthaltende Säure verwendet.

Darstellung. Bei der trockenen Destillation des Bernsteins zum Zwecke der Gewinnung des „Bernstein-Kolophonums“ erhält man ein flüchtiges Öl, aus welchem sich allmählich Krystalle von Bernsteinsäure abscheiden. Die durch Absaugen von dem flüchtigen Öle der Hauptsache nach befreiten Krystalle werden durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser gereinigt. Ist die rohe Säure sehr dunkel gefärbt, so nimmt man das

Umkrystallisiren unter Zusatz von Thierkohle vor Bisweilen erfolgt die Reinigung von beigemengtem flüchtigen Oel auch durch Erwärmen mit Salpetersäure

Eigenschaften. Gelbliche, saulenförmige oder in Krusten zusammenhängende, schwach nach Bernsteinöl riechende Krystalle. Sie schmelzen bei 180° und verflüchtigen sich bei 235° unter Entwicklung zum Husten reizender Dämpfe ohne zu verkohlen. Löslich in 20 Th kaltem oder 2,2 Th siedendem Wasser, auch in 10 Th Weingeist (90 Proc), in 80 Th Aether, unlöslich in Terpentinöl. Die wässrige Lösung ist gelblich gefärbt, reagirt und schmeckt sauer. Neutralisirt man sie mit Ammoniak, so entsteht durch Ferrichlorid in der neutralen Lösung ein zinnthronner Niederschlag von Feinsuccinat (Mangansalze werden nicht gefällt), der in Salzsäure völlig löslich ist. Bernsteinsäure ist eine zweibasische Säure, die Salze heissen „Succinate“. Diejenigen der Alkalien und des Magnesiums sind in Wasser leicht löslich. Bernsteinsäure wird durch mässig concentrirte Salpetersäure, ebenso durch Chromsäure nicht weiter oxydirt.

Prüfung. Diese ist nicht überflüssig, da Bernsteinsäure auch heute noch gelegentlich durch Kaliumsulfat, Alaun, Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure u dergl. verfälscht wird. 1) Man erhitzt etwa 0,2 g auf Platinblech. Sie muss ohne zu verkohlen und ohne Rückstand flüchtig sein (Abwesenheit verkohlender und feuerbeständiger Beimengungen). 2) Man erwärmt 0,8 g mit 10 cem Weingeist (90 Proc). Die Lösung darf etwas gelblich, muss aber klar sein. Man theilt sie nach dem Abkühlen in zwei Theile. Der eine Theil wird mit gleichem Volumen Chloroform, der andere mit Ammoniakflüssigkeit übersättigt. In allen drei Fällen muss eine klare Lösung erzielt werden, bez. die Lösung muss klar bleiben. Erfolgt eine unvollständige Lösung oder scheiden sich erhebliche Bodensätze ab, so ist eben ugend eine ungebührliche Beimengung s o zugegen. 3) Die wässrige Lösung 1:30 gebe mit Kaliumacetatlösung keinen krystallinischen Niederschlag (Weinsäure), sie werde weder durch Bariumnitrat noch durch Silbernitrat mehr als opalisirend getrübt und durch Calciumchloridlösung (Oxalsäure), sowie durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert. 4) Mischt man 2 cem der wässrigen Lösung mit 2 cem konc. Schwefelsäure und schichtet darüber 1 cem Ferrosulfatlösung, so darf eine braune Zwischenzone nicht auftreten (Salpetersäure). Mit Natronlauge erwärmt darf die Säure Ammoniak nicht entwickeln. 5) 1 g getrocknete Bernsteinsäure verbraucht zur Neutralisation 16,95 cem Normalkalklauge (Phenolphthalein als Indikator).

Anwendung. Gegenwärtig nur selten, früher als Expectorans, als krampfstillendes, harn- und schweisstreibendes Mittel häufig verordnet. Die Wirkung dürfte im wesentlichen auf das beigemengte flüchtige Oel zurückzuführen sein. Daher ist zum medicinalen Gebrauch die chemisch reine Bernsteinsäure nicht zu verwenden. Dosis 0,5–1,0 g mehrmals täglich in Pulvern, Pillen und wässriger Lösung. In der chemischen Analyse zur Trennung des Eisens und der Thonerde einerseits von Mangan und Zink andererseits, ferner in der Photographie.

Liquor Ammonia succinici. Ammoniumsuccinatlösung. Spiritus Cornu Cervi succinatus. Liquor Salis Cornu Cervi succinati. Bernsteinsäures Ammon (Germ I). Acid. succinici 1 Th wird in Aquae destillatae 8 Th gelöst und mit Ammonii carbonici pyrooleos q s (1 Th) neutralisirt. Man stellt die Flüssigkeit 24 Stunden zur Seite und filtrirt. Klar, neutrale, bräunliche, später braun werdende Flüssigkeit. Spec. Gew. 1,050–1,054. Enthält rund 12,5 Proc Ammoniumsuccinat. Vor Licht geschützt aufzubewahren (Germ I, Ergänzb.). Als krampfstillendes Mittel in Gaben von 5 bis 30 Tropfen.

Succinimidum crystallisatum. Succinimid. Bernsteinsäureimid $C_4H_4(CO)_2NH$ = 97. Wird durch rasche Destillation des Ammoniumsuccinates dargestellt. Farblose Krystallnadeln, in Wasser, Alkohol und Aether leicht löslich. Schmelzp. $125–126^{\circ}$. Siedep. $287–288^{\circ}$. Die wässrige Lösung löst gelbes Quecksilberoxyd auf.

† **Hydrargyrum imido-succinicum.** Succinimid-Quecksilber $[C_4H_4(CO)_2N]_2Hg$ = 592.

Darstellung. 1 Th frisch gefälltes Quecksilberoxyd wird mit 15–20 Th Wasser angerührt und unter Zugabe von 1 Th Succinimid in einem Glaskolben so lange nahe zum Sieden erhitzt, bis alles Quecksilberoxyd bis auf Spuren gelöst ist. Man filtrirt und dampft die Lösung zur Krystallisation ein.

Eigenschaften Weisses, seidenartig glänzendes, neutrales Krystallpulver, in 25 Th Wasser oder 800 Th Alkohol (90 Proc) klar löslich. Die wässrige Lösung wird durch Schwefelwasserstoff und durch Schwefelammonium gefärbt. Durch Natronlauge entsteht allmählich gelbliche, durch Ammoniak weisse Fällung, durch Kaliumjodid rother Niederschlag. Erweiss wird nicht gefärbt. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung Zur subkutanen Injektion gegen Syphilis. Dosis 0,013 g

Guttale ELLEN	Liquor antarthriticus SAINTE MARIE
Guttas antispasmodicae ELLEN	Rp Liquoris Ammonii succinici
Liquor antarthriticus ELLEN	Liquoris Ammonii succinici
antispassicus (ELLEN)	Tincturae Opi crocatae
Rp Liquoris Ammonii succinici	Tincturae Ipecacuanhae
Spiritus aetherei EL 10,0	Aetheris EL 5,0
M D S Drei- bis viermal täglich 20–40 Tropfen	M D S (Umgeschüttelt!) Dreimal täglich 20–30 Tropfen
in etwas Zuckerwasser (Bei Krampf, gleichischen und rheumatischen Schmerzen.)	
Linsamentum contra anginam FRINGLE	Mixtura tonica novina STARR
Rp Liquoris Ammonii succinici 20,0	Rp Tincturae kaliniae 10,0
Olei camphorati 50,0	Liquoris Ammonii succinici 5,0
M Ein Stück Pannell wird damit durchtränkt und auf den vorderen Theil des Halses gelegt	M D S Dreimal täglich 10–20 Tropfen
Spiritus bezoardicus BUSSIER	
Spiritus Russii	
Rp Liquoris Ammonii succinici	
Spiritus Ammonii caustici EL 20,0	
Olei Citri Guttas 5,0	
Misce conguassando	
S 20–30 Tropfen mit Wasser zu nehmen	

Acidum succinicum purissimum Reine Bernsteinsäure. Diese wird durch wiederholte Krystallisation aus der medicinale Säure oder durch Gährung von Chokma malat (apfelsaurem Kalk) gewonnen. Sie bildet farblose, völlig geruchlose Krystalle. Schmelz-p 180° Siedep 235°

Acidum sulfanilicum.

! Acidum sulfanilicum (para) Sulfanilsäure *Acide sulfanilique. Sulphanillo acid.* $C_6H_4NH_2 \cdot SO_3H + H_2O$. Mol Gew = 191.

Darstellung. In 75 g konc Schwefelsäure (Sp G = 1,896), die sich in einem Rundkolben von ca $\frac{1}{4}$ l Inhalt befinden, trägt man nach und nach unter Umschwenken in kleinen Antheilen 25 g farbloses Anilin an und erwärmt darauf die Mischung im Oelbade auf 180–190° C so lange (ca 3 Stunden), bis aus einer in Wasser eingetragenen Probe durch Zusatz von überschüssiger Natronlauge Anilin nicht mehr abgeschieden wird, was man am Geruch und an der Trübung erkennt. Wenn dies der Fall ist, so gießt man das braungefärbte, sirupdicke Reaktionsprodukt in etwa $\frac{1}{4}$ l kaltes Wasser, worin sich die Sulfanilsäure als grau gefärbtes, krystallinisches Pulver abscheidet. Man saugt dasselbe auf porösen Tellern ab und reinigt es durch wiederholtes Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle.

Eigenschaften. Mit 1 Mol Wasser bildet die Sulfanilsäure rhombische Krystalle, welche an trockener Luft verwittern und undurchsichtig werden. Löslich in 115 Th Wasser von 15° C, leichter löslich in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether so gut wie unlöslich. Die befeuchteten Krystalle sowie die wässrige Lösung reagieren sauer, durch Ammoniak und ätzende Alkalien werden die meist gut löslichen Salze der Sulfanilsäure gebildet. Durch Einwirkung von salpetriger Säure in der Kälte entsteht Diazobenzolsulfosäure $C_6H_4SO_3H \cdot NH_2 + NOOH = H_2O + C_6H_4SO_3H \cdot N=N-OH$. Letztere bildet mit zahlreichen Phenolen Farbstoffe (Azofarbstoffe). Diese Reaktion ist für die praktische Anwendung der Sulfanilsäure von Wichtigkeit.

Prüfung 1) Sie bilde farblose Krystalle. 2) Die wässrige Lösung werde weder durch Schwefelwasserstoff noch durch Baryumchlorid verändert. 3) Sulfanilsäure verbrenne auf dem Platinteller ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen, an einem kühlen Orte, weil die krystallisierte Säure leicht verwittert

Anwendung Durch die Einführung der Sulfo-Gruppe hat das Anilin viel von seinen giftigen Eigenschaften verloren. Die Sulfanilsäure gilt als Specificum gegen Iodismus. Beim Gebrauch von Alkalijodiden kommt es zu entzündlichen Processen in der Nasenschleimhaut, welche durch freies Jod bedingt werden. EHRLICH nimmt an, dass das Jod aus den Alkalijodiden in Freiheit gesetzt werde durch die in der Nasenschleimhaut enthaltene freie salpetrige Säure und salpetrigsauren Salze.

Die salpetrige Säure soll durch Zufuhr von Sulfanilsäure unschädlich gemacht werden, indem beide (s. vorher) unter Bildung von Diazobenzolsulfosaure auf einander einwirken. EHRICH giebt bei akutem Iodismus 4,5–6 g Sulfanilsäure, welche durch Zusatz von 3 bis 4 g Natriumkarbonat in 150,0 g Wasser gelöst werden. Er empfiehlt, prophylaktisch alle zwei Tage 3–4 g Sulfanilsäure zu geben und akute Erscheinungen mit grosseren Gaben, z. B. 6–7 g, zu bekämpfen. Ferner wird das Mittel gegeben bei akutem Katarrh der Nase (Schnupfen, Koryza) und des Kehlkopfs.

Rp	Acidi sulfanilici	5,0	Rp	Acidi sulfanilici	10,0
	Natrii bicarbonici	2,5		Natrii bicarbonici	8,5
	Aquae destillatae	200,0		Aquae destillatae	200,0
Bei akutem Iodismus auf einmal zu verbrauchen, eventuell zweistündlich einen Esslöffel			Bei akutem Katarrh der Nase und des Kehlkopfs täglich den $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{6}$ Theil dieser Lösung in zwei Gaben zu verbrauchen		

Ueber EHRLICH'S Diazo-Reaktion s. unter Urima

II Natrium sulfanilicum Sulfanilsaures Natrium $C_6H_4NH_2 \cdot SO_3Na + 2H_2O$.
Mol. Gew. = 281. Wird durch Neutralisiren von 10 Th nicht verwitterter Sulfanilsäure mit 7,5 Th kryst. Natriumkarbonat in wässriger Flüssigkeit und Eindampfen der Lösung zur Krystallisation erhalten. Farblose, glänzende Blättchen, in Wasser leicht löslich. In gleichen Gaben wie Sulfanilsäure und zu gleichen Zwecken angewendet.

III Cosaprinum Acetyl-sulfanilsaures Natrium $C_6H_4NHCH_3CO \cdot SO_3Na$ (1.4).
Mol. Gew. = 237. Acetanilid-sulfosaures Natrium (1.4).

Das Präparat wird durch Kochen von sulfanilsaurem Natrium mit Essigsäureanhydrid dargestellt. Grauweisses, krystallinisches Pulver von mildsalzigem Geschmack, in Wasser leicht löslich, schwerlöslich in Alkohol, fast unlöslich in Aether. Als Antipyreticum und zwar als Ersatz des Acetanilids, vor welchem es den Vorzug fast völliger Ungiftigkeit hat, in Gaben von 1–2–3 g.

Acidum sulphydricum.

I Acidum sulphydricum Acidum hydrosulfuricum. Acidum hydrothionicum. Schwefelwasserstoff(säure). Wasserstoffsulfid. H_2S . Mol. Gew. = 34.

Schwefelwasserstoff ist eins der wichtigsten Reagentien der chemischen Analyse. Der Chemiker zieht es im Allgemeinen vor, das Gas selbst anzuwenden, nur in besonderen Fällen (zum Auswaschen von Niederschlägen) bedient er sich einer wässrigen Auflösung des Gases, d. i. des Schwefelwasserstoffwassers. Das letztere wird dagegen von dem Apotheker sehr häufig zur Anstellung bestimmter Reaktionen benutzt. Die Darstellung des Schwefelwasserstoffs erfolgt in der Regel durch Zersetzung von Schwefelmetallen (Metallsulfiden) mittelst Säuren, und zwar wendet man gewöhnlich Schwefeleisen und verdünnte Salzsäure an. Schwefelsäure an Stelle der Salzsäure ist nicht zu empfehlen, weil das bei der Reaktion entstehende Ferrosulfat in der Kälte auskrystallisirt und häufig die Entwicklungsgefässe zertrennt.

Die zur Erzeugung von Schwefelwasserstoff empfohlenen Apparate sind sehr zahlreich, wir beschränken uns darauf, folgende vier Gattungen zu beschreiben, welche nicht allzu kostspielig sind und mit gutem Gewissen als zweckmässig empfohlen werden können.

1) Einfaches Entwicklungsgefäss. In der nebenstehenden Figur ist *A* ein Glaskolben, welcher auch durch eine geeignete Flasche ersetzt werden kann. Mithelst eines Gummistopfens ist in den Kolben ein Trichterrohr und ein Gasabzugsrohr eingesetzt;




Fig. 24.

letzteres mündet in die Waschflasche *B*, von wo aus das Gas in die Vorlage *C* geleitet wird. Fig. 24.

Zum Gebrauche wird der Kolben *A* etwa zur Hälfte mit Schwefeleisen in haselnussgrossen Stücken beschickt, dann setzt man den Apparat ordnungsmässig zusammen, legt die Vorlage vor und giesst nun durch das Trichterrohr Salzsäure von 15 Proc. HCl. Es beginnt sogleich lebhafter Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Dieser wird zur Entfernung von beigemengter Salzsäure in *B* durch wenig Wasser gewaschen und dann nach *C* geleitet. — Lässt die Entwicklung nach, so kann sie durch Zusatz weiterer Mengen Salzsäure belebt werden. Nach Beendigung des Versuches ist der Apparat auseinander zu nehmen. Man giesst die Säure

weg, spült den Kolben mehrmals mit Wasser aus (ohne das Schwefeleisen fortzuschütten) und bewahrt ihn mit dem Schwefeleisen beschickt nach Aufsetzung eines Korkes zu späterem Gebrauch auf.

2) Der Kipp'sche Apparat. Der Untertheil besteht aus den Glaskugeln *a* und *b*, welche durch eine Einschnürung mit einander verbunden sind. In den Tubus *c* ist die lange Röhre der obersten Kugel *f* gasdicht eingeschliften. *d* ist ein Tubus zum Entleeren der Säure, *e* ein Tubus zum Ableiten des Gases. — Man füllt durch den Tubus *e* die mittlere Kugel *b* etwas über die Hälfte mit Schwefeleisen an und giesst bei geöffnetem Ableitungshahn (*e*) soviel 15proc. Salzsäure in die oberste Kugel, dass die Säure die unterste Kugel *a* bis zur Einschnürung bei *a* anfüllt. Dann schliesst man den Hahn bei *e* und giesst noch soviel Säure zu, dass diese 2—3 Finger breit hoch in der obersten Kugel steht, also eine drückende Säule vorhanden ist. Solange der Hahn bei *e* geschlossen bleibt, wird Schwefelwasserstoff nicht entwickelt, weil die Salzsäure, sowie sie an das Schwefeleisen gelangt von dem entwickelten Schwefelwasserstoff in die Höhe gedrückt wird. Oeffnet man den Hahn, so gelangt die Salzsäure zum Schwefeleisen, und lebhafter Entwicklung von Schwefelwasserstoff beginnt. Fig. 25.




Fig. 25.

Die Kipp'schen Apparate sind somit stationäre Apparate, welche, einmal gefüllt, längere Zeit beliebige Entnahme von Gas und beliebige Unterbrechung der Gasentwicklung ermöglichen.

Nothwendig ist es allerdings, dass die Apparate in gutem Zustande erhalten werden, dass insbesondere der Schliff bei *e* stets rein erhalten und gut eingefettet wird, und dass der Stopfen bei *e* gut schliesst. Sorgt man dafür, dass Schwefeleisen nicht in die unterste Kugel fallen kann, so werden die Apparate auch nicht durch Entwicklung von Schwefelwasserstoff während der Ruheperiode lästig. Den untersten Tubus-Stopfen bei *d* fixirt man zweckmässig mit einer Gummikappe und ausserdem stellt man den ganzen Apparat auf einen grossen Porcellanteller, damit etwa bei *d* ausfliessende Säure nicht Schaden anrichtet.

3) Der Wöhrler'sche Apparat besteht aus dem äusseren Cylinder *A*, in welchen ein innerer, erheblich schlankerer Cylinder derart eingefügt ist, dass ein in seinem oberen Theile angebrachter Wulst auf einer Holzfassung aufsitzt, welche ihrerseits durch Klemmschrauben *C* festgehalten wird. Nachdem der innere Cylinder *B* gefüllt ist, setzt

man den Gummistopfen mit dem Glashahn *D* ein, schliesst diesen und füllt nun 15 proc. Salzsäure in das äussere Gefäss. — Der ganze Apparat ist nach dem Princip der DÖBEREINER'schen Zündmaschine konstruirt und ohne weiteres verständlich. Bei ihm fallen die Schiffe des KIRP'schen Apparates weg. Fig. 26.

4) DEVILLE's Apparat besteht aus zwei tubulirten Flaschen *A* und *B*, welche durch den Schlauch *D* mit einander verbunden sind; bei *C* ist ein Glashahn gasdicht eingesetzt. Flasche *A* ist mit Schwefeleisen, *B* mit 15 proc. Salzsäure beschickt. Stellt man *A* höher als *B*, so fliesst alle Säure nach *B* zurück, die Entwicklung von Gas hört also auf. Stellt man dagegen *B* höher als *A*, so fliesst die Säure nach *A* über und es findet Gasentwicklung statt. Durch Veränderung der beiden Niveaus in den Flaschen kann man den Druck des austretenden Gases innerhalb gewisser Grenzen reguliren. Fig. 27.

Die aufgeführten Apparate dienen natürlich nicht nur zur Entwicklung von Schwefelwasserstoff, sondern auch zu derjenigen anderer Gase; wir werden daher im Folgenden wiederholt auf sie zurückzukommen haben. Mit Ausnahme des KIRP'schen Apparates lassen sich dieselben aus vorhandenen Beständen mit sehr geringen Kosten zusammenstellen.

Eigenschaften. Schwefelwasserstoff ist ein farbloses Gas von dem bekannten Geruch nach faulen Eiern und süsslichem Geschmack. Unter dem Druck von 17 Atmosphären verdichtet es sich zu einer Flüssigkeit, welche bei -62°C . siedet und bei -85°C . erstarrt. Das spec. Gewicht (Luft = 1) ist = 1,191. Wasser löst bei 0° = 4,37 und bei 15° 8,23 Raumtheile, Weingeist von 0° löst etwa 18 Volume des Gases auf, indessen entsteht in solcher Lösung allmählich Mercaptan. Entzündet, verbrennt Schwefelwasserstoff an der Luft mit bläulicher Flamme unter Bildung von Wasser und schwefliger Säure. Findet die Verbrennung bei Luftmangel statt, so verbrennt nur der Wasserstoff, der Schwefel dagegen scheidet sich als weissgelber Beschlag aus. Schwefelwasserstoff verbindet sich direkt mit den meisten Metallen, schwärzt z. B. Quecksilber und Silber, dagegen bleibt Gold in Schwefelwasserstoffatmosphäre blank. Beim Zusammentreffen von schwefliger Säure mit Schwefelwasserstoff wird fein vertheilter Schwefel abgeschieden. Will man Schwefelwasserstoff trocknen, so geschieht dies nicht durch Schwefelsäure, sondern durch Calciumchlorid. Chemisch ist der Schwefelwasserstoff als eine starke zweibasische Säure zu betrachten; er verdrängt die meisten anderen Säuren aus ihren Verbindungen mit Schwermetallen. Seine sauren Salze heissen „Sulfhydrate“, die neutralen: „Sulfide“.

II. Aqua sulphydrica. Aqua hydro-sulfurata seu hydrothionica. Schwefelwasserstoffwasser. *Acide sulphydrique dissous* (Gall.). Zur Darstellung sättigt man frisch ausgekochtes und unter Luftabschluss erkaltetes destillirtes Wasser durch Einleiten eines Stromes gewaschenen Schwefelwasserstoffgases bei mittlerer Temperatur. Dass die Lösung gesättigt ist, erkennt man daran, dass, wenn man die Flasche mit dem Daumen verschliesst und kräftig schüttelt, der Daumen nicht ange-

sogen sondern abgestossen wird. Mit der gesättigten wässrigen Lösung werden kleinere Flaschen (von etwa 100 ccm Fassungsraum) völlig angefüllt. Sie werden alsdann mit porenfreien Korken verschlossen, und diese durch Paraffinüberzug gedichtet. Die so vorgerichteten Flaschen stellt man mit dem Halse nach unten (also umgekehrt!) in einen mit




Fig. 26.




Fig. 27.

Wasser gefüllten Topf und diesen in den Keller an einen dunklen Ort. Der Schwefelwasserstoff wird nämlich durch den Luftsauerstoff unter Abscheidung von Schwefel zersetzt $\text{H}_2\text{S} + \text{O} = \text{H}_2\text{O} + \text{S}$. Verwendet man zur Darstellung nicht ausgekochtes Wasser oder sorgt man während der Aufbewahrung nicht für möglichen Luftabschluss, so tritt diese Zersetzung in ziemlich kurzer Zeit ein.

Die Gall schreibt zur Bereitung von 8 Litern Schwefelwasserstoffwasser vor, 100,0 g schwarzes Schwefelantimon mit 50 g Sand zu mischen und mit 400 g roher Salzsäure zu zersetzen. 1 Liter Wasser löst nach Gall bei $20^\circ = 2,9$ Liter Schwefelwasserstoffgas, welche 4,487 g wiegen.

Schwefelwasserstoffwasser muss fast klar sein, kräftig nach Schwefelwasserstoff riechen und beim Vermischen mit Ferrichlorid reichliche Ausscheidung von Schwefel geben. Es röthet den blauen Lackmusaufbauch.

Wirkung und Anwendung. Schwefelwasserstoff ist ein Stimulans und Altkans wie der Schwefel. In den Schwefelbädern lässt man ihn in geringen Mengen und in starker Verdünnung mit Luft einathmen. Im Uebrigen ist er giftig. Eingeathmet verbindet er sich mit dem Hämoglobin des Blutes zu „Sulphämoglobin“ (Lowry), ein graues, welches unfähig ist, Sauerstoff aufzunehmen, d. h. die Athmung zu unterhalten. In hohen Zustände und grösseren Mengen eingeathmet, kann er sofort tödtlich wirken, in starker Verdünnung mit Luft kann er Vergiftungserscheinungen (Uebelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz, Schwindel) hervorrufen. Bei einem Gehalt von 0,6 Volumprocente H_2S kann die Luft schon gesundheitsschädlich wirken.

Als Gegenmittel wendet man an Zufuhr frischer Luft, Rechen an Chlor, Eingeben von Chlorwasser (10,0 : 200,0), kalte Begiessungen, warme Bäder.

Schwefelwasserstoffwasser, welches vom Magen aus einoblich besser vertragen wird, kann zu 30–50 g pro die in starker Verdünnung ohne wahrnehmbaren Schaden genommen werden. Man trinkt es in Form von Schwefelwasser bei chronischen Katarrhen, Gicht, Rheumatismus, Hautkrankheiten. Das künstlich hergestellte Schwefelwasserstoffwasser giebt man bisweilen als Antidot bei Metallvergiftungen. Die Anwendung in der chemischen Analyse als Trennungsmittel für Metalle ist bekannt und kann hier nicht näher behandelt werden.

Analyse. Man erkennt den freien Schwefelwasserstoff schon in geringen Mengen am Geruche.

Chemisch erkennt man ihn daran, dass durch ihn mit Bleessig getränktes Papier gebräunt, mit Silbernitrat getränktes geschwärzt wird. Will man entscheiden, ob in einer Flüssigkeit diese auch den Schwefelalkalien zukommende Reaktion von freiem Schwefelwasserstoff oder von Schwefelalkalien herrührt, so fügt man etwas Nitroprussidnatriumlösung hinzu, welche mit Schwefelalkalien eine rothviolette, allmählich verschwindende Färbung giebt. Oxydationsmittel wirken versetzend auf Schwefelwasserstoff, indem sie entweder nur Schwefel abscheiden, wie Chlor, Brom und Jod (auch keine Schwefelsäure) oder Schwefel abscheiden und diesen zu Schwefelsäure oxydiren, wie Ferrisalze, Permanganate, Manganate, Molybdänsäure, Chromsäure, Chlorsäure, Bromsäure, Jodsäure, Salpetersäure, Salpétrisäure, Unterchlorigsäure u. a.

Behufs quantitativer Bestimmung des Schwefelwasserstoffgases in einer Flüssigkeit oder in einem Gasgemenge, z. B. der Luft, versetzt man die Flüssigkeit mit einer Auflösung von Silberchlorid in Ammoniak, oder man leitet einen Strom reinen Wasserstoffgases durch die erwärmte Flüssigkeit in diese Silberlösung, oder man leitet mit Hilfe eines Aspirators ein gewisses Kubikmaass der Luft durch die Silberlösung. Das abgeschiedene Schwefelsilber wird mit ammoniakalischem Wasser gewaschen, dann gelöst mit $\text{Ag}_2\text{S} < 0,1871 = \text{H}_2\text{S}$. Maassanalytisch bestimmt man mit Zehntel-Normaljodlösung die Schwefelwasserstoff enthaltende Flüssigkeit wird mit Wasser verdünnt, mit etwas Stärkelösung versetzt und dann mit der Jodlösung titirt. Da die Zersetzung nach der Gleichung $\text{H}_2\text{S} + 2\text{J} = 2\text{HJ} + \text{S}$ erfolgt, so ist $\text{J} < 0,19858 = \text{H}_2\text{S}$. Bei Gegenwart von Hyposulfit wird der Schwefelwasserstoff durch eine ammoniakalische Zinklösung ausgefällt.

III Arsenfreier Schwefelwasserstoff. Der aus Schwefeleisen und roher Salzsäure entwickelte Schwefelwasserstoff ist stets durch kleine Mengen von Arsenwasserstoff verunreinigt. Verwendet man reine Salzsäure, so lässt sich diese Verunreinigung nicht ganz

vermeiden, weil das Schwefeleisen gleichfalls kleine Mengen von Arsen enthält. Für die toxikologische Analyse bedarf man aber absolut arsenfreien Schwefelwasserstoff. Man hat vorgeschlagen, diesen aus Zinksulfid oder Baryumsulfid durch Zersetzung mit reiner Schwefelsäure oder Salzsäure zu bereiten. Ebenso zweckmässig ist es jedoch, den aus Schwefeleisen und reiner Salzsäure entwickelten Schwefelwasserstoff von seinem Arsengehalt wie folgt zu befreien:

Das Schwefelwasserstoffgas wird, nachdem es mittelst Calciumchlorid getrocknet ist, durch eine etwa 80 cm lange, ziemlich enge Glasröhre geleitet, in welcher sich schichtenweise zwischen Glaswolle vertheilt, 2—3 g grob zerriebenes lufttrockenes Jod befinden. Trockenes Jod wirkt auf trockenen Schwefelwasserstoff nicht ein, dagegen werden Arsen- und Antimonwasserstoff im Sinne der folgenden Gleichungen zersetzt $AsH_3 + 6J = AsJ_3 + 3HJ$ und $SbH_3 + 6J = SbJ_3 + 3HJ$. Zur Beseitigung des hierbei entstehenden Jodwasserstoffs ist der Schwefelwasserstoff durch eine Waschflasche mit Wasser zu leiten.

Acidum sulfuricum.

Man unterscheidet 1) rauchende Schwefelsäure, 2) Englische Schwefelsäure, 3) rektificirte oder reine Schwefelsäure, 4) verdünnte Schwefelsäure.

I † Acidum sulfuricum fumans (Eiganzb.) **Acidum sulfuricum Nordhousense.** **Oleum Vitrioli (fumans).** **Rauchende Schwefelsäure.** **Dischwefelsäure.** **Pyroschwefelsäure.** **Nordhouser Vitriolöl.** **Acide sulfurique fumant** (de Nordhouse ou de Saxe ou d'Allemagne). **Fuming sulfuric acid.** Diese Säure wurde früher in Nordhausen durch Destillation entwässerten Eisenvitriols aus thönernen Retorten und Anfangen der flüchtigen Produkte in cone Schwefelsäure dargestellt. Gegenwärtig gewinnt man sie durch Auflösen von Schwefelsäureanhydrid in cone Schwefelsäure, hauptsächlich aber in Böhmen durch Destillation von Vitriolschiefer.

Klare, selten fast farblose, meist braunliche, öldicke Flüssigkeit, welche an der Luft erstickende Dämpfe von Schwefelsäureanhydrid ausstösst, beim Abkühlen unter 0° krystallinisch erstarrt. Beim Erhitzen soll sie unter Verbreitung schwerer weisser Dämpfe von Schwefelsäureanhydrid und Schwefelsäure völlig flüchtig sein. Spec. Gew. 1,850—1,880. Analytisch lässt sich die rauchende Schwefelsäure von der gewöhnlichen Schwefelsäure nicht unterscheiden.

Diese Säure ist eine Auflösung von etwa 12—16 Proc Schwefelsäureanhydrid (SO_3) in 84—88 Proc Schwefelsäure (SO_4H_2). Das Schwefelsäureanhydrid ist in ihr mit dem Schwefelsäurehydrat zu „Dischwefelsäure oder Pyroschwefelsäure“ $S_2O_7H_2 = 178$ verbunden. Die Säure ist also ein Gemisch von Dischwefelsäure und Schwefelsäure. Zur Erhöhung des spec. Gew. werden in ihr gelegentlich Sulfate des Kaliums oder Natriums gelöst. Kleine Mengen von Fluorwasserstoff, welche diese Säure bisweilen enthält, schaden ihrer Verwendbarkeit in Pharmacie und Technik nicht, nur ätzt sie alsdenn das Standgefäss etwas an.

Prüfung. 1) 1 g der Säure sei, im Platengefäss erhitzt, völlig flüchtig. Nur im Freien oder unter gut wirkendem Abzuge anzuführen, da die Dämpfe die Schleimhäute stark reizen (Abwesenheit von Kalium- und Natriumsulfat). 2) Auf Arsen prüft man die im Verhältniss 1 + 5 mit Wasser vorsichtig verdünnte Säure im Marsh'schen Apparat oder durch Stannochloridlösung oder durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas S bei Acidum sulfuricum Anghoum.

Einkauf, Aufbewahrung und Behandlung. Da die rauchende Schwefelsäure unter 0° fest wird und dabei ihr Volumen beträchtlich vergrössert, da sie andererseits sich auch in der Wärme beträchtlich ausdehnt, so empfiehlt es sich, Vorräthe, welche während eines längeren Transportes niedriger oder relativ hoher Temperatur ausgesetzt sein können, wenn es zu vermeiden ist, nicht gerade während der Winterszeit oder im

Hochsommer anzuschaffen Ist dies nicht zu umgehen, so ist der Drogist anzuweisen, dass er das Transportgefäß zu nicht mehr als höchstens $\frac{1}{3}$ seines Fassungsraumes anfüllt Unterbleibt diese Vorsicht, so kann die Saure beim Krystallisiren oder durch Erwärmung sich soweit ausdehnen, dass sie das Gefäß zertrümmert Ist eine Sendung während des Winters angekommen, oder der Inhalt eines Gefäßes im Verlaufe der Aufbewahrung an Ort und Stelle durch irgend einen Zufall zum Krystallisiren gekommen, so lüftet man den Stopfen und stellt das Gefäß 2—3 Tage [krystallisirte Schwefelsäure leidet die Wärme schlecht und braucht lange Zeit zum Aufthauen] an einen auf 25—35° temperirten Ort, damit die Saurekrystalle wieder schmelzen Erst dann schenkt man zum Uingießen der Saure Dabei beachte man, dass unter allen Umständen ein genügend grosser Trichter zu benutzen, und dass in diesen stets nur soviel von der Säure einzugießen ist, als sogleich ablaufen kann, ohne dass eine Flüssigkeitssäule in dem Trichter stehen bleibt Fällt nämlich der Saurestahl in den gefüllten Trichter, so kommt es leicht zum Verspritzen von Säure Das Gleiche erfolgt, wenn bei allzu feststehendem Trichter die in das Gefäss eingeschlossene Luft durch eine im Trichter befindliche Flüssigkeitssäule hindurch sich Ausweg verschafft Die Aufbewahrung erfolgt in einem Raume, welcher hinreichend licht hat, und dessen Temperatur nicht unter 0° hinunter geht, also im Keller, vorzichtig Ist die Saure mit Wasser zu mischen, so giesse man die Saure in das Wasser, verfähre ja nicht umgekehrt Durch Aufnahme von Wasser geht die rauchende Schwefelsäure übrigens in die gewöhnliche Schwefelsäure über

Anwendung. Der Apotheker benutzt die rauchende Schwefelsäure bisweilen, um Englische Schwefelsäure, welche specifisch zu leicht geworden ist, auf das geforderte spec Gewicht zu bringen, also zu verstärken In der Technik benutzt man sie zum Auflösen des Indigo, zur Herstellung von Sulfosäuren überhaupt Wird im Handverkauf „Vitriolöl“ gefordert, ohne dass sich feststellen lässt, dass für den zu erreichenden Zweck unbedingt die rauchende Schwefelsäure erforderlich ist, so giebt man stets nur Englische Schwefelsäure ab

II † Acidum sulfuricum crudum (Germ III) Acidum sulfuricum Anglicum-Reihe oder Englische Schwefelsäure. Acide sulfurique du commerce (Gall) Vitriolic acid. Dieses Präparat ist die in kolossalen Mengen in den Schwefelsäure-Fabriken durch den sog „Bleikammerprocess“ dargestellte Schwefelsäure des Handels

Sie ist eine blaugraue, specifisch schwere, ursprünglich farblose, durch Ueimgelangen von Stroh, Staub und anderen organischen Partikeln (in Folge Verkohlung der letzteren) gewöhnlich bläulich bis braun gefärbte Flüssigkeit Das spec Gewicht der Handels säure ist gewöhnlich 1,830—1,840 Es verlangen

	Spec Gewicht	Procente H_2SO_4
Gall	1,840	fast 100
Germ III	1,830	91

Die aus den gewöhnlichen Schwefelkiesen dargestellte Schwefelsäure ist, wenn sie nicht einem Reinigungsverfahren unterworfen wurde, in der Regel arsenhaltig Die aus sibirischem Rehschwefel und aus gewissen Schwefelkiesen gewonnene dagegen enthält nur geringe Mengen Arsen Von der in den Apotheken verwendeten rohen Schwefelsäure sollte man verlangen, dass sie von Säuren des Arsens (arsenige Säure und Arsensäure) insgesamt nicht mehr als 0,1 Procent enthalten darf

Prüfung Verunreinigungen der rohen Schwefelsäure sind Säuren des Arsens (As_2O_3 und As_2O_5), Schwefligsäure, Antimonoxyd, Selen, Thalliumoxyd, Quecksilberoxyd (sämmtlich aus dem Schwefel bez den Schwefelkiesen stammend), Eisenoxyd, Thonerde, Calciumoxyd, Alkalien, Ammon, Salpetersäure, Salpetersäure, Salzsäure, Bleisulfat (aus den Bleikammern stammend) Durch Zusätze von Natriumsulfat oder Magnesiumsulfat soll man angeblich gelegentlich einmal das specifische Gewicht erhöhen

Die glühbeständigen Verunreinigungen der rohen Schwefelsäure sollten insgesamt nicht mehr als 0,3 Proc betragen Zur Prüfung auf Arsen verdünnt man 1 ccm der

Säure mit 2 cem Wasser und fügt 1 cem der erkalteten Mischung zu 8 cem Zinnchlorurlösung hinzu. Es soll innerhalb 20 Minuten eine braune Abscheidung sich nicht zeigen. Oder man prüft die 1+5 mit Wasser verdünnte Säure im Marsh'schen Apparate. Ist die Bestimmung des Arsens notwendig, so leitet man in die mit 10 Th Wasser verdünnte und erwärmte Säure Schwefelwasserstoff und bestimmt das ausgeschiedene Arsensulfid entweder als solches oder als Ammoniumpyroarsenat. Siehe Arsenum.

Aufbewahrung. Die Englische Schwefelsäure werde in starken Glasgefässen mit Glasstopfen vorsichtig aufbewahrt. Sie zieht aus der Luft energisch Wasser an, nimmt hierdurch an Volumen zu, wird aber spezifisch leichter. Aus diesem Grunde ist für guten Verschluss der Flaschen zu sorgen. Standgefässe für reine Schwefelsäure stellt man zweckmässig aus Untersätze aus Porcellan. Hals und Stopfen sind nach jedesmaligem Gebrauche des Gefässes trocken zu wischen, weil sich sonst zwischen Hals und Stopfen eine verdünnte Säure ansammelt.

Anwendung und Dispensation. Die Englische (Schwefelsäure findet im pharmaceutischen Laboratorium sehr häufig, in der Rezeptur nur selten (*Fumigatio Chlori*) Verwendung. Im Handverkauf wird sie sehr häufig verlangt. Ihre Abgabe kann an Erwachsene mit der nöthigen Vorrichtung unbedingt erfolgen. Dagegen gebe man sie niemals an Kinder ab, ferner verweigere man ihre Abgabe in Gefässen, welche nach ihrem bestimmungsmässigen Gebrauche als Ess- oder Trinkgeräthe dienen, wie Tassenköpfe, Bierflaschen, Mineralwasserflaschen u. dergl. Auch klebe man hinreichend grosse und auffallende Signaturen mit der Bezeichnung „Schwefelsäure, Gift, ††“, auf.

Die Viehknecht schreiben bisweilen Mischungen von Terpentinöl oder anderen flüchtigen Ölen mit reiner Schwefelsäure vor. In solchen Mischungen erfolgt lebhaftere Reaction unter Selbsterwärmung und Entwicklung von schwefliger Säure, im ungünstigsten Falle kann sogar Entzündung oder eine Art Explosion der Mischung erfolgen. Es empfiehlt sich daher, diese Mischungen im Freien und zwar in einem offenen Porcellangefäss in der Art auszuführen, dass man die Schwefelsäure zunächst mit dem gleichen Volumen Rüböl mischt, um erst nach dem Erkalten dieser Mischung das Terpentinöl in kleinen Antheilen hinzuzuführen.

Transport-Flaschen und Ballons für Schwefelsäure sollten niemals gar zu voll gefüllt werden, da die Säure sich durch Erwärmung ausdehnt, in Folge dessen die Gefässe zertrümmern und ausfliessen kann.

Die ausgeflossene Säure wirkt auf Holz, Sägespähne, Stroh verkohlend. Eine Entzündung tritt hierbei aber nur dann ein, wenn gleichzeitig Sauerstoff abgebende Substanzen wie Salpeter, Kaliumchlorat, Pikrinsäure, Zündhölzer u. dergl. mit der Säure in Berührung kommen.

III † Acidum sulfuricum (Brit Germ Helv U-St) Acidum sulfuricum concentratum (Austr) Acide sulfurique officinal (Gall) Reine Schwefelsäure. H_2SO_4 . Mol. Gew = 98

Die Darstellung der reinen Schwefelsäure erfolgt nicht mehr im pharmaceutischen Laboratorium, sondern in chemischen Fabriken dadurch, dass man die von Arsen befreite Englische Schwefelsäure der Destillation aus Gefässen von Glas oder Platin unterwirft.

Die reine Schwefelsäure bildet eine klare, farblose und geruchlose, wie Öl fließende Flüssigkeit, welche stark ätzend und hygroskopisch ist. Spec Gewicht und Gehalt an H_2SO_4 werden von den einzelnen Pharmacopöen wie folgt gefordert:

	Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U-St
Spec Gewicht bei 15°	1.82	1.843	1.843	1.836—1.810	1.836—1.840	> 1.835
Procento H_2SO_4	98	98	ca 100	91—93	94—98	> 92.5

Volumgewicht der Schwefelsäure bei 15°
nach LUNGE und ISLER

Spec Gewicht	Proc H_2SO_4	Spec Gewicht	Proc H_2SO_4	Spec Gewicht	Proc H_2SO_4	Spec Gewicht	Proc H_2SO_4
1,010	1,57	1,280	84,57	1,510	60,65	1,760	82,41
1,020	3,03	1,270	85,71	1,520	61,59	1,770	83,32
1,030	4,49	1,280	86,87	1,530	62,53	1,780	84,50
1,040	5,96	1,290	88,03	1,540	63,48	1,790	85,70
1,050	7,37	1,300	89,19	1,550	64,26	1,800	86,90
1,060	8,77	1,310	90,35	1,560	65,08	1,810	88,30
1,070	10,19	1,320	91,50	1,570	65,90	1,820	90,05
1,080	11,60	1,330	92,66	1,580	66,71	1,825	91,00
1,090	12,99	1,340	93,74	1,590	67,59	1,830	92,10
1,100	14,35	1,350	94,82	1,600	68,51	1,835	93,48
1,110	15,71	1,360	95,88	1,610	69,48	1,837	94,20
1,120	17,01	1,370	96,94	1,620	70,32	1,839	95,00
1,130	18,31	1,380	98,00	1,630	71,16	1,840	95,60
1,140	19,61	1,390	99,06	1,640	71,99	1,8405	95,95
1,150	20,91	1,400	50,11	1,650	72,82	1,841	97,00
1,160	22,19	1,410	51,15	1,660	73,64	1,8415	97,70
1,170	23,47	1,420	52,15	1,670	74,51	1,8410	98,20
1,180	24,78	1,430	53,11	1,680	75,42	1,8405	98,70
1,190	26,04	1,440	54,07	1,690	76,30	1,8400	99,20
1,200	27,32	1,450	55,03	1,700	77,17	1,8395	99,45
1,210	28,58	1,460	55,97	1,710	78,04	1,8390	99,70
1,220	29,84	1,470	56,90	1,720	78,92	1,8385	99,95
1,230	31,11	1,480	57,83	1,730	79,80		
1,240	32,28	1,490	58,74	1,740	80,68		
1,250	33,48	1,500	59,70	1,750	81,56		

Prüfung Diese hat sich vorzugsweise auf einen Gehalt der künstlichen reinen Schwefelsäure an Eisen, Schweflige Säure, Stickstoffsäuren und Blei zu richten 1) 2—3 g der Säure müssen beim Verdampfen in einem blanken Platinschälchen an einem zugigen Orte ohne Rückstand flüchtig sein. Ein Rückstand wäre näher zu untersuchen, z. B. in basisch weinsaurem Ammon zu lösen. Entsteht in dieser Lösung durch Schwefelwasserstoff ein schwarzer, in verdünnter Salzsäure unlöslicher Niederschlag, so ist Blei vorhanden 2) 50 cem der mit der 10fachen Menge Wasser verdünnten Säure werden mit 1 Tropfen Kaliumpermanganatlösung (1:1000) tingirt. Es darf innerhalb 20 Minuten keine Entfärbung eintreten (Salpetrige Säure, schweflige Säure) 3) Die mit der 10fachen Menge Wasser verdünnte Säure wird mit Indigolösung schwach blau gefärbt und erwärmt. Es darf innerhalb 5—10 Minuten nicht Entfärbung erfolgen (Salpetersäure) 4) Auf Arsen kann man die officinelle Säure wie folgt prüfen. 1 cem eines erkalteten Gemisches von 1 Vol Schwefelsäure und 2 Vol Wasser wird in 3 cem Zinnchlorür eingegossen. Innerhalb einer Stunde darf Bräunfärbung nicht eintreten. Hält eine Säure diese Prüfung, so ist sie zum pharmaceutischen Gebrauche hinreichend rein. Handelt es sich jedoch wie z. B. für die forensische Analyse darum, auch die letzten Spuren Arsen in einer Schwefelsäure nachzuweisen, so prüft man die mit 5 Th Wasser verdünnte Schwefelsäure nach dem Erkalten im Marsh'schen Apparate. Es darf alsdann nach 6stündigem Erhitzen des Glührohrs sich absolut kein dunkler Anflug eines Spiegels zeigen.

Aufbewahrung und Dispensation wie unter *Acidum sulfuricum crudum*. Ist die reine Schwefelsäure einmal durch Anziehung von Wasser specifisch zu leicht geworden, so versuche man nicht erst, sie durch Abdampfen in einer offenen Porzellanschale zu concentriren. Die Säure zieht dabei ungefähr wieder ebensoviel Wasser an als sie abgibt, auch färbt sie sich durch hineinfallenden Staub in kurzer Zeit dunkel. Diese Concentration gelingt dagegen sehr gut, wenn man das Abdampfen in einer kurz vorher mit heisser

kone Schwefelsäure gereinigten Retorte vornimmt, also einige Procent Wasser durch Abdestilliren entfernt. Sehr empfehlenswerth ist es auch, für solche Fälle etwas reines Schwefelsäureanhydrid vorrätig zu halten und die Erhöhung des spec Gewichtes durch Auflösen einer entsprechenden Menge Schwefelsäureanhydrid in der Schwefelsäure auszuführen.

Anwendung Die reine Schwefelsäure ist für den innerlichen und ausserlichen Arzneigebrauch bestimmt. Unverdünnt wird sie indessen lediglich als Aetzmittel angewendet. Innerlich wird sie stets nur in verdünntem Zustande als *Acidum sulfuricum dilutum*, als *Mistura sulfurica acida* verordnet. Dem Arzt ist der Unterschied zwischen der concentrirten und der verdünnten Schwefelsäure häufig nicht genügend bekannt. Verschreibt er daher in einer Mischung zu innerlichem Gebrauche z. B. 5 g Acidum sulfuricum schlechthin, so dispensire der Apotheker unter allen Umständen lediglich 5 g Acidum sulfuricum dilutum. In der Analyse sowie bei Herstellung von Präparaten ist die Schwefelsäure ein wichtiges chemisches Reagens.

IV Acidum sulfuricum dilutum (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.) **Spiritus Vi- trioli** Verdünnte Schwefelsäure. *Acide sulfurique diluée* (Gall.) *Diluted sulfuric acid*. Wird durch Verdünnung der kone. reinen Schwefelsäure mit Wasser dargestellt, und zwar trägt man die abgewogene Menge Schwefelsäure unter Umrühren in kleinen Theilen in die vorgeschriebene Menge Wasser ein. Diese Mischung ist zweckmässig in einer Porcellanschale (bei kleineren Mengen in einem Glaskolben) auszuführen, nicht aber in dem Standgefässe, weil dieses in Folge örtlicher Ueberhitzung der Wandungen häufig springt. Es schreiben vor

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U-St.
Spec. Gewicht bei 15°	1,120	1,094	—	1,110—1,114	1,060	1,070
Die Mischung enthält Proc. H ₂ SO	16,66	16,65	10 0	16,6—16,2	10,0	10,0

Klare farb- und geruchlose Flüssigkeit von stark saurem Geschmack und dem vorgeschriebenen spec. Gewichte. Aufbewahrung in Glasflaschen mit Glasstopfen.

Anwendung Die verdünnte Schwefelsäure wirkt äusserlich adstringirend und blutstillend, sie ist daher Bestandtheil mehrerer Wundwässer (Arquebusade). Innerlich werden ihr antipyretische und blutstillende Wirkung zugeschrieben. Man giebt sie in starker Verdünnung mit Wasser oder schleimigen Flüssigkeiten, auch gegen chronische Bleivergiftung. Der längere Gebrauch verursacht Verdauungsstörungen, grössere Gaben können zu Vergiftungen führen.

Dosis maxima nach Helv. 1,5 g pro dosi, 5,0 pro die von der 10proc. Säure. Wird verdünnte Schwefelsäure in Pillen verordnet, so sind diese im Porcellan-Mörser anzustossen.

V Acidum sulfuricum crudum dilutum Verdünnte rohe Schwefelsäure. **Putzwasser** Zum Putzen für Kupfer, Messing und Zink giebt man eine Mischung von 1 Th. 10her Schwefelsäure mit 4 Th. gewöhnlichem Wasser ab, welche nach einigem Stehen von dem abgesetzten Bleisulfat abfiltrirt wird. Die Mischung ist mit „Vorsichtig“ oder „Gift“ zu signiren und wie die Englische Schwefelsäure niemals in Trink- oder Kochgeschützen abzugeben. Auch würde es sich empfehlen, diese Mischung mit irgend einem Farbstoff zu färben, z. B. mit Methylorange.


Kupferglanzwasser *Poli cuivre* *Liquor acidus aluminatus*. Ist zu bereiten aus 10 Th. kryst. Alaun, 50 Th. Englischer Schwefelsäure und 200 Th. Wasser. Auch hier würde sich eine Färbung empfehlen.

Chemie und Analyse Kone Schwefelsäure wirkt verkohlend auf Kohlehydrate, indem sie diesen die Elemente des Wassers entzieht, zerstörend auf alle organischen Gebilde (Gewebeasern, Holz, Haare etc.), die Einwirkung erfolgt in der Wärme unter Entwicklung von schwefliger Säure. Das Einathmen dieser Dämpfe ist schädlich, da diese die Schleimhäute der Luftwege angreifen.

Freie Schwefelsäure reagirt sauer. Freie Schwefelsäure sowie gelöste schwefelsaure Salze geben mit Baryumsal-lösungen einen specifisch schweren, pulverigen, weissen

Niederschlag von Baryumsulfat BaSO_4 , welches in Säuren sowohl wie in Alkalien unlöslich ist

Zur Bestimmung der Schwefelsäure säuert man die wässrigen Lösungen der Sulfate — bei freier Schwefelsäure ist Ansäuern nicht nöthig — mit 10–20 Tropfen Salzsäure an, erhitzt zum Sieden und fügt nun unter beständigem Umrühren zu dem Sieden zu erhaltender Flüssigkeit tropfenweise heisse Baryumchloridlösung bis zu einem mässigen Ueberschusse der letzteren hinzu. Nach beendeter Fällung setzt man das Sieden noch einige Zeit fort und lässt alsdann die Flüssigkeit auf dem Wasserbade, zuletzt an einem warmen Orte, mindestens 12 Stunden lang absetzen, damit das Baryumsulfat krystallinische Beschaffenheit annimmt. Alsdann dekantirt man die Flüssigkeit durch ein Filter (Baryt-Filterpapier¹⁾), kocht den Niederschlag wiederum mit etwas salzsäurem Wasser, lässt erkalten, dekantirt und wiederholt dieses Auskochen noch zweimal. Schliesslich bringt man den gesamten Niederschlag auf das Filter, wäscht mit heissem Wasser bis zum Verschwinden der Chlorreaktion aus. Nach dem Trocknen verbrennt man zuerst das vom Niederschlage getrennte Filter in einem gewogenen Platintiegel, giebt den Niederschlag hinzu und glüht bei halb aufgelegtem Deckel 10–15 Minuten mittelst Bunsenbrenners. Das Abfiltriren, Waschen und Glühen kann mit Vortheil auch im Gooch'schen Tiegel erfolgen.



Enthält eine Flüssigkeit lediglich freie Schwefelsäure und keine andere Säure, so kann die freie Schwefelsäure auch maassanalytisch bestimmt werden. Man titirt alsdann mit Kal-, Natron- oder Barytlauge (Methylorange als Indikator). 1 ccm Normal Alkali zeigt in diesem Falle = 0,049 g H_2SO_4 oder 0,040 g SO_2 an.

Die maassanalytische Bestimmung der gebundenen Schwefelsäure ist zwar möglich, das Verfahren ist aber derartig complicirt, dass man in der Regel durch die gewichtsanalytische Bestimmung rascher zum Ziele kommt.

Toxicologisches. Vergiftungen durch conc. Schwefelsäure kommen ziemlich häufig vor. Die Hauptmengen der eingeführten Schwefelsäure sind gewöhnlich in den zuerst eingebrachten Massen vorhanden. Ist der Tod rasch erfolgt, was von der Concentration und Menge der genossenen Säure, sowie davon abhängt, ob das Gift in den gefüllten oder leeren Magen gelangte, so kann, vorausgesetzt dass die Entnahme der Organe theils bei der Section in sachgemässer Weise erfolgte, der Nachweis freier Schwefelsäure — und auf diesen hat die Untersuchung sich in erster Linie zu richten — auch noch in den ersten Wegen (Speiseröhre, Magen, Darm) gelingen. Ist der Vergiftete aber vor dem Tode ärztlich behandelt worden, oder ist bei der Entnahme der Organe nicht sachgemäss verfahren worden, indem z. B. die sagenden Aezte die innere Magenwandung sauber abspülten und das Spülwasser weggossen, so kann der Nachweis freier Schwefelsäure unmöglich sein. Ebenso ist freie Schwefelsäure wahrscheinlich dann nicht mehr nachzuweisen, wenn nach dem Einnehmen derselben längere Zeit 6–12–24 Stunden verstrichen ist, weil die Mineralsäuren verhältnissmässig rasch resorbirt werden. — Sei dem wie man wolle, der Untersucher verfährt zweckmässig wie folgt: 1) Es ist zunächst die Reaction der Organe theils (Auszug des Mageninhaltes) mittelst Lackmuspapier festzustellen. Wird dieses geröthet, so giebt man zu etwa 10 ccm Wasser 1 Tropfen Methylorange und setzt etwas von dem filtrirten wässrigen Auszuge des Objekts hinzu. Bei Gegenwart von freier Schwefelsäure geht die gelbe Färbung der Lösung in Kirschroth über, und es wird hierdurch bewiesen, dass eine freie Mineralsäure gegenwärtig ist. — Man kann die Menge derselben im wässrigen Auszuge mit Normalkalklauge (und Methylorange als Indikator) titiren. 2) Der wässrige Auszug giebt auch nach dem Ansäuern durch Salzsäure mit Baryumchlorid einen reichlichen weissen Niederschlag von Baryumsulfat. Es ist dessen Menge in einem aliquoten Theil des Objektes gewichtsanalytisch festzustellen. 3) Schleimige Objekte, welche sich mit Wasser nicht gut ausziehen lassen, übergiesst man mit dem 2–3fachen Volumen starken Alkohols (96 Proc.), in welchem soviel frischgefülltes Cinchonin aufgelöst ist, dass die Reaction der Flüssigkeit deutlich alkalisch bleibt. Man macerirt bei nicht über 30°, filtrirt und scheidet den Alkohol durch Destillation, schliesslich durch Verdampfen der Flüssigkeit auf dem Wasserbade ab.

Man nimmt den Rückstand mit Wasser auf und bestimmt in je einer Hälfte des Filtrates einerseits die vorhandene Schwefelsäure durch Füllen mit Baryumchlorid, anderseits das Cinchonin, indem man die zweite Hälfte der wässrigen Lösung mit Ammoniak übersättigt und die nach 24stündigem Stehen ausgeschiedenen Krystalle auf gewogenem Filter sammelt, mit Wasser wäscht, trocknet und wägt. Die beiden so erhaltenen Werthe müssen annähernd aufeinander stimmen.

Wenn es möglich ist, die Schwefelsäure in conc. Zustande darzustellen, so versucht man es zu thun. In einem Falle war ein Säugling in der Wiege durch Schwefelsäure vergiftet worden. Die Säure war zum Theil auf das Kopfkissen geflossen und in die Federn eingedrungen. Die Federn wurden mit Wasser ausgezogen, in wässrigen Auszuge

wurde die Schwefelsäure gewichtsanalytisch und massanalytisch bestimmt. Ausserdem aber wurde ein Theil des wässrigen Auszuges auf dem Wasserbade in einer Platinschale verdampft. Es hinterblieb ein öliger Rückstand, von welchem ein Tropfen eine Mischung von Kaliumchlorat, Zucker und Schwefel zur Entzündung brachte.

Ist es nicht mehr möglich freie Schwefelsäure nachzuweisen, so muss man sich damit begnügen, die Menge der gebundenen Schwefelsäure festzustellen, doch ist alsdann der Beweis einer Schwefelsäurevergiftung nicht mit Sicherheit erbracht.

Beschädigung von Kleidungsstücken etc. Konc. Schwefelsäure löst Wolle und Seide sehr rasch auf, so dass in diesen Stoffen Löcher entstehen. Pflanzliche Faserstoffe werden etwas weniger rasch zerstört, aber immerhin zerstört. Verdünnte Schwefelsäure, wie sie z. B. in einer Stärke von 15 Proc. als Putzwasser verwendet wird, verändert zunächst die Farbe der Gewebe, mit denen sie in Berührung kommt. In der Regel entstehen rothe Flecken. Hat die verdünnte Säure Zeit und Gelegenheit, durch Verdunsten des Wassers konzentrierter zu werden, so wirkt sie ähnlich wie konc. Schwefelsäure auf die Gewebe, die betroffenen Stellen werden morsch und es entstehen gleichfalls Löcher. Solange freie Schwefelsäure auf den Geweben ist, ist sie durch Methylorange und Titiren leicht nachzuweisen und zu bestimmen, nur achtet man darauf, dass die meisten Gewebe sauer reagieren. Im Verlaufe der Zeit geht aber die auf Gewebe aufgespritzte Schwefelsäure in saures und später in neutrales Ammoniumsulfat über. Ist sie erst einmal in letzteren Zustand eingetreten, so ist freie Schwefelsäure natürlich nicht mehr auffindbar, obgleich die Zerstörungen handgreiflich durch Schwefelsäure erfolgt sind. In solchen Fällen muss man gemessene oder gewogene Mengen a) des unverletzten, b) des beschädigten Stoffes mit heissem Wasser erschöpfen und in den Auszügen die Gesamtschwefelsäure bestimmen. Die Kontrolle durch a) ist nothwendig, weil die meisten gefärbten Stoffe an sich Sulfate enthalten.

Acidum sulfuricum aromaticum

a) Aromatic sulphuric acid (U. St.)

Rp	(1) Acidi sulfurici (92,5%)	100 ccm
	(2) Alkohol (94 Vol %)	700 "
	(3) Tincturae Zingiberis	50 "
	(4) Olei Cinnamomi	1 "
	(5) Alcohol (94%) q. s. ad 1000 "	

Man trägt vorsichtig 1 in 2 ein, nach dem Einleiten fügt man 3 und 4 hinzu und füllt mit 5 bis zu 1 Liter auf. Spec. Gew. ca. 0,930 bei 15°.

b) Aromatic sulfuric acid (Brit.)

Rp	Tincturae Zingiberis (1+8)	250,0 ccm
	Spiritus Cinnamomi	12,5 "
	(ex Oleo Cinnam. 1 Spiritus 49)	
	Spiritus (90 Vol %)	737,5 "
	Acidi sulfurici conc.	75 "

Aqua valueraria THEDENI

THEDENI's Wundwasser (Geim I. Ergänz.)

Rp	Aceti (8%)	6 Th
	Spiritus diluti (70 Vol %)	3 "
	Acidi sulfurici diluti (16%)	1 "
	Mellis depurati	4 "

Werden gemischt und nach einiger Zeit filtrirt klar, anfangs gelb, später bräunlich.

Balsamum adstringens RICHARD

Rp	(1) Acidi sulfurici (94—98%)	20,0
	(2) Spiritus (90 Vol %)	80,0
	(3) Olei Terebinthinae	20,0

Man mischt zunächst 2 mit 3, fügt zu dieser Mischung vorsichtig 1 hinzu und lässt zunächst einige Zeit in offenen Gefässe stehen, bevor man auf Flaschen füllt. In Gaben von 1,—2,—3 g mit schleimigen Getränken verdünnt bei Blutspeien und Nasenbluten.

Balsamum haemostaticum WARREN

WARREN's blutstillender Balsam

Rp	(1) Acidi sulfurici (94—98%)	25,0
	(2) Spiritus (90 Vol %)	10,0
	(3) Olei Terebinthinae	10,0

Man mischt 2 und 3 und fügt dann 1 hinzu. Im Uebrigen s. d. vorigen Balsam. Dosis 20—30 Tropfen.

Causticum crocatum RUST

Pasta caustica Aethiopica. Acidum sulfuricum solidificatum. Caustique sulfurique au safran. VETEAU.

Rp Croci pulv. 1,0
Acidi sulfurici 1,0—1,5

ut fiat pasta. D. ad vitrum.

Causticum sulf. carbonisatum RICORD

Enthält an Stelle von Sulm. Carbo. ligni pulv.

Causticum nigrum VETEAU ist ein Gemisch von konc. Schwefelsäure mit Süssholzpulver.

Mixtura sulfurica acida (Germ. Helv.)

Liquor acidus Halleri (Austri.) HALLER'sches Sauer.

Rp Acidi sulfurici (96—98%) 1 Th
Spiritus (90 Vol %) 3 "

Vorstehend. Vorschrift gleichlautend Austri., Germ., Helv., nur schreibt Helv. Spiritus von 95—96 Vol % vor. Das entsprechende Präparat der Gall. ist

Acide sulfurique alcoolisé Eau de RAFFL (Gall.)

Rp Acidi sulfurici (94—98%) 100,0
Spiritus (90 Vol %) 300,0
Florum Rhoeados 4,0

Die Blüthen werden mit der erkalteten Mischung 4 Tage macerirt, dann wird abfiltrirt.

Limonade sulfurique (Gall.)

Potus sulfuricus

Rp Acidi sulfurici diluti (10%) 20,0
Aqua 875,0
Sirupi Sacchari 125,0

Specifium bei Bleivergiftung und Bleikolik.

Potus sulfuricus GRONDIEN

Rp Acidi sulfurici diluti (10,0%) 5,0
Spiritus (90 Vol %) 50,0
Aqua 940,0
Elaeocochleari Chiri 5,0

Prophylaktisch gegen Bleivergiftung dreimal täglich ein kleines Weinglas voll.

Sirupus Acidi sulfurici		Vet	Causticum peracidum
Sirupus vitriolatus		Rp	Acidi sulfurici Anglici 30,0
Rp	Acidi sulfurici diluti (10,0%) 10,0		Acidi nitrici fumantis 10,0
Sirupi Sacchari		Zum Bestreichen alter schwammiger Tollhollen	
Sirupus acidus RABEL		Vorsicht!	
Rp	Aquae Rabelli 10,0	Vet	Electuarium adstringens
Sirupi Sacchari 90,0		Rp	Acidi sulfurici diluti (10,0%) 20,0
Bei Gonorrhoe dreimal täglich ¼ Esslöffel mit Wasser verdünnt			Rhizomatis Tormentillae 100,0
Unguentum sulfuricum ACHARD			Radici Angelicae 120,0
Sapo acidus Achard			Farinae secalinae 20,0
Rp	Adipis suilli 50,0	M f electuarium Grosse Hautbleien alle 5—4 Stunden den ¼ kleineren den ½ Theil zu geben	
Acidi sulfurici puri 5,0		Bei atonischem Durchfall, Bluthruen, Hämorrh.	
Misce exactissime Als ableitende Einreibung bei Augenentzündung, Lähmung (Unzweckmässig)			

Acidum sulfuricum anhydricum Schwefelsäure-Anhydrid Schwefeltrioxyd $\text{SO}_3 = 80$ Wird 1) durch Erhitzen von rauchender Schwefelsäure gewonnen, wobei das Anhydrid sich zuerst verflüchtigt 2) Durch Ueberleiten eines Gemisches von Schwefelsäure und Sauerstoff über glühenden Platinasbest 3) Nach WOLFF durch Glühen von Natriumpyrosulfat $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3$

Bei gewöhnlicher Temperatur seidenglanzende Nadeln, welche bei 15° schmelzen und bei $40\text{--}50^\circ$ sich verflüchtigen. Der Dampf ist an sich farblos, bildet aber an der Luft durch Wasseranziehung unter Uebergang in H_2SO_4 weisse Nebel. Anwendung in der wissenschaftlichen und technischen Chemie, ferner um zu leicht gewordene Schwefelsäure zu verstärken S S 125

Acidum persulfuricum Ueberschwefelsäure $\text{S}_2\text{O}_8\text{H}_2$ Scheidet sich an der Anode ab, wenn Schwefelsäure von 1,4 spec Gew bei einer Stromstärke von 2 Ampère elektrolytisch wird $2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}_2 + \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$. Zu Zeit nur in wässriger Lösung bekannt. Diese zerfällt unter Mitwirkung des Wassers in der Kälte allmählich in Schwefelsäure und Wasserstoffsuperoxyd $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2$, in der Wärme in Schwefelsäure und Sauerstoff $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}$. Reaktionen 1) In der Wärme wird Sauerstoff entwickelt 2) Indigolösung wird entfärbt 3) Aus Salzsäure oder Natriumchlorid wird Chlor, aus Kalumbromid = Brom, aus Kalumjodid = Jod abgeschieden.

Ammonium persulfuricum Ammoniumpersulfat Ueberschwefelsaures Ammonium $\text{S}_2\text{O}_8(\text{NH}_4)_2 = 228$ Wird durch Elektrolyse einer gesättigten Lösung von Ammoniumsulfat dargestellt $2[\text{SO}_4(\text{NH}_4)_2] = \text{H}_2 + 2\text{NH}_3 + \text{S}_2\text{O}_8(\text{NH}_4)_2$

Farblose Krystalle, in trockenem Zustande selbst bei 100° beständig, in feuchtem Zustande zersetzt es sich langsam schon bei Zimmerwärme unter Abgabe von stark oxisirtem Sauerstoff $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NH}_4\text{H SO}_4 + \text{O}$. Löslich in 2 Th Wasser. Kann aus Wasser von 60° umkrystallisirt werden.

Reaktionen 1) Mit einer Lösung von Ambersulfat erwärmt, entsteht Amberschwarz 2) Eine mit Natriumacetat versetzte Fuchsinlösung wird gebleicht 3) In einer Lösung von Mangansulfat entsteht Ausscheidung von Braunstein 4) Aus einer Lösung von Kaliumcarbonat wird ein krystallinischer Niederschlag von Kalumpersulfat gefällt.

Anwendung Die 0,5–2proc Lösung ist zu Mundwässern und zur Conservirung von Nahrungsmitteln empfohlen worden.

Natrium persulfuricum Natriumpersulfat Ueberschwefelsaures Natrium $\text{S}_2\text{O}_8\text{Na}_2 = 238$ Wird durch Elektrolyse einer gesättigten Lösung von Natriumsulfat oder durch Umsetzen einer Lösung von Ammoniumpersulfat mit einer Lösung von Natriumhydrat erhalten.

Farbloses, in Wasser leicht lösliches Salz.

Kalium persulfuricum Kalumpersulfat Ueberschwefelsaures Kalium Anthion $\text{S}_2\text{O}_8\text{K}_2 = 270$ Entsteht durch Elektrolyse einer Lösung von Kaliumsulfat bei 3,5 Ampère, oder durch Umsetzung von Ammoniumpersulfat mit Kaliumcarbonat. Farblose, säulenförmige Krystalle in 50 Th Wasser löslich. Oxydirt Natriumthiosulfat zu Natriumsulfat, daher Anwendung in der Photographie als Anthion S. Photographie.

Acidum sulfurosum.

Unter dem Namen „Schweflige Säure“ wird gewöhnlich das Schwefeldioxyd oder Schwefelsäure-Anhydrid SO_2 verstanden, die wahre schweflige Säure SO_3H_2 ist nicht als solche bekannt, aber wahrscheinlich in der wässrigen Lösung des Schwefligsäure Anhydrides enthalten

I Acidum sulfurosum anhydricum Schwefligsäure-Anhydrid Schwefeldioxyd. SO_2 Mol. Gew = 64 Wird durch Verbrennen von Schwefel an der Luft oder durch Erhitzen von konc Schwefelsäure mit Kohle, Kupfer oder Quecksilber gewonnen Farbloses Gas von erstickendem Geruch, feuchtes Lackmuspapier zunächst rötlich, dann bleichend 1 Liter des Gases wiegt bei 0° und 760 mm B = 2,862 g Es löst sich reichlich in Wasser, Alkohol und anderen Medien Kämpfer löst 308 Vol, Essessig = 318 Vol SO_2 Bei -10°C unter gewöhnlichem Druck oder unter etwa 6 Atmosphären Druck bei gewöhnlicher Temperatur wird das Gas zu „flüssigem Schwefeldioxyd“ verdichtet Dieses siedet bei -8°C unter Bindung von Wärme (Kälte-Erzeugung) und erstarrt bei -76°C zu weissen Flocken, welche bei etwa -75°C schmelzen Anwendung zur künstlichen Herstellung von Eis, als Desinfektionsmittel, Bleichmittel, zur Fabrikation der Sulfit-Cellulose u a m Flüssige schweflige Säure kann in druckfesten Eisenbehältern („Bomben“) bezogen werden

PICER's Flüssigkeit ist ein Gemisch von flüssiger schwefliger Säure und flüssiger Kohlensäure, in verschiedenen Verhältnissen, wie man es durch Erhitzen von konc Schwefelsäure mit Kohle erhält, z B 97 Proc SO_2 und 3 Proc CO_2

II † Acidum sulfurosum (solutum) Wässrige schweflige Säure (Ergänzb But U St) Acide sulfureux dissous Sulphurous acid $\text{H}_2\text{SO}_3 + x\text{H}_2\text{O}$.

Die von den angegebenen Pharmakopöen etc aufgenommenen Lösungen der schwefligen Säure sind von verschiedener Stärke Es verlangen

	Eigenth	Brit	U-St.
Spec Gewicht	1,052	1,085	> 1,035
Proc SO_2	10,0	5,0	> 6,4

Die Darstellung erfolgt, indem man konc oder nur wenig mit Wasser verdünnte Schwefelsäure mit Kupfer oder Kohle erhitzt, das entwickelte Gas in wenig Wasser wäscht, hierauf in Wasser leitet

Volumgewicht der wässrigen Lösung von schwefliger Säure und Gehalt an SO_2
bei 15° (SCOTT)

Vol Gew	Proc SO_2	Vol Gew	Proc SO_2	Vol Gew	Proc SO_2	Vol Gew	Proc SO_2
1,0028	0,5	1,0168	3,0	1,0302	5,5	1,0426	8,0
1,0056	1,0	1,0194	3,5	1,0328	6,0	1,0450	8,5
1,0085	1,5	1,0221	4,0	1,0353	6,5	1,0474	9,0
1,0113	2,0	1,0248	4,5	1,0377	7,0	1,0497	9,5
1,0141	2,5	1,0275	5,0	1,0401	7,5	1,0520	10,0

1 Vol Wasser löst bei 0°C = 80 Vol, bei 15°C = 43,5 Vol, bei 20°C = 39,4 Vol, bei 40°C = 18,8 Vol SO_2

Darstellung. In einen Kolben von etwa 750 cem Fassungsraum schüttet man 30 g Holzkohle in erbsengrossen Stücken, giesst auf diese 220 g konc reine Schwefelsäure und mischt durch Schwenken gut durch Den Kolben verbindet man mit einer etwa 50 cem Wasser enthaltenden Waschflasche und leitet das gewaschene Gas in eine $1\frac{1}{2}$ -Liter-Flasche, welche 1 Liter destillirtes Wasser enthält Durch Erhitzen des Zersetzungskolbens in einem Sandbade oder auf einem Drahtnetz erhält man einen ruhigen Strom Schwefligsäure Gas, welches in dem vorgelegten Wasser absorbiert wird Es empfiehlt sich,

die Vorlage durch Einstellen in kaltes Wasser kühl zu halten. Wenn die Gasentwicklung nachlässt, stellt man die Lösung auf das geforderte spec. Gewicht ein. Das nach dieser Vorschrift erhaltene Gas ist mit etwas Kohlensäure verunreinigt, was indessen für therapeutische Zwecke nicht schadet.

An Stelle der Kohle kann man in obiger Vorschrift auch auf 220 g. reine Schwefelsäure 70 g. Kupfer in Form von Spähnen oder von feinen Blechschnitzeln verwenden. Den Zersetzungsrückstand kann man zu Kupfersulfat verarbeiten.

Eigenschaften. Klare, farblose, in der Wärme völlig flüchtige Flüssigkeit von erstickendem Geruche, blaues Lackmuspapier zunächst röthend, dann bleichend. Sie greift direkt mit Baryumchlorid versetzt nur eine schwache Trübung. Fügt man aber ein Oxydationsmittel hinzu, z. B. Chlorwasser oder Jodlösung oder Chromsäure, so entsteht eine reichliche Ausscheidung von Baryumsulfat. Sie entfärbt Kaliumpermanganat und führt Chromsäure in (grünes) Chromoxyd über. Schweflige Säure ist eine zweibasische Säure, die Salze heissen „Sulfite“. Ausserdem ist sie in wässriger Lösung ein energisches Reduktionsmittel. Sie reducirt Merkurisalze zu Merkurosalzen, Chlor zu Chlorwasserstoff, Jod in wässriger Lösung zu Jodwasserstoff, Chromsäure zu Chromoxyd, Mangansäure und Uebermangansäure zu Manganoxydul u. dergl. mehr. Aus einer wässrigen Lösung von Jodsäure wird durch schweflige Säure Jod in Freiheit gesetzt, welches Starkelösung blau färbt.

Die wässrige Lösung der schwefligen Säure nimmt aus der Luft allmählich Sauerstoff auf und geht dabei in Schwefelsäure über.

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt in kleineren, möglichst gefüllten Gefässen, um der Oxydation durch den Luftsaurestoff nach Möglichkeit vorzubeugen.

Prüfung. 1) Sie verdampfe ohne einen Rückstand zu hinterlassen. 2) 5 ccm mit 3—4 Tropfen Salzsäure angesäuert, werden durch Baryumchloridlösung nur ganz schwach getrübt (geringer Gehalt an Schwefelsäure ist zuzulassen). 3) Nach dem Uebersättigen mit Ammoniak erscheine sie nicht blau gefärbt (Kupfer). 4) Gehaltsbestimmung. Man wägt 3,0 g. der Säure in ein 100 ccm-Kölbchen ab und füllt mit Wasser bis zur Marke auf 10 ccm der Mischung werden, nach Zusatz von 20—30 ccm Wasser und etwas Stärkelösung, mit $\frac{1}{10}$ Normal-Jodlösung (in 1 cc = 0,0127 g. Jod enthaltend, welche = 0,0032 g. SO_2 entsprechen) bis zur eben eintretenden Blaufärbung titirt. Hierbei sollen folgende Mengen Jodlösung verbraucht werden. Säure von 10 Proc. = 9,40 ccm, von 5 Proc. = 4,7 ccm, von 6,4 Proc. = 6 ccm $\frac{1}{10}$ -Jodlösung. Vergl. S. 132.

Anwendung. Schweflige Säure wirkt fäulnisswidrig und gährungswidrig, indem sie für Spaltpilze und Hefen ein tödtliches Gift ist. In geringen Mengen vom Menschen eingeathmet, reizt sie zum Husten, in grösseren Mengen kann sie den Tod durch Erstickten herbeiführen. In wässriger Lösung wendet man sie an. Aeusserlich bei parasitären Hautkrankungen, jauchigen und syphilitischen Geschwüren, zu Pinselungen und Inhalationen bei Aphthen, Diphtherie. Dosis 0,05—0,4 g. SO_2 mehrmals täglich in starker Verdünnung. Innerlich bei Gährungsprocessen im Magen, bei Infektionskrankheiten wie Typhus, Cholera. Technisch in Gasform (durch Verbrennen von Schwefel) zu desinficirenden Raucherungen, zum Bleichen, zur Herstellung von Sulfitecellulose u. a. m.

III Calcium sulfurosum. Calciumsulfid. Schwefligsaurer Kalk. In den Handel gelangt sowohl das neutrale als auch das saure Salz.

Calcium sulfurosum neutrale technicum. Neutrales Calciumsulfid. Neutrales schwefligsaurer Kalk. $\text{CaSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = 156$. Dieses Salz wird erhalten, indem man entweder (ähnlich wie bei der Bereitung des Chloralkalis) in geschlossenen Kammern schweflige Säure auf gelöschten Aetzkalk (aus 28 Th. Aetzkalk + 18 Th. Wasser) in Pulverform einwirken lässt, oder indem man Calciumcarbonat (Schlämmerde) in Wasser vertheilt, so lange schweflige Säure einleitet, bis Kohlensäure nicht mehr in Freiheit gesetzt wird, das in der Lösung befindliche Salzpulver abkocht und an der Luft trocknet. — Man weiss es bis gelbliches Pulver, löslich in 800 Th. Wasser, leichter löslich in verdünnter schwefliger Säure und kann aus dieser krystallisirt werden. Durch Säuren (HCl , H_2SO_4 , Essigsäure) wird aus dem Salz Schweflige Säure Anhydrid abgespalten. Man verwendet es

als Desinficiens in der Gährungsindustrie, auch als Zusatz zu Bier, welches die Neigung hat sauer zu werden

Calcium sulfurosum neutrale purum $\text{CaSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = 156$ Man vertheilt 50 Th. Calciumkarbonat in 150 Th. Wasser und leitet Schweflige Säure Anhydrid bis zur Auflösung an. Man filtrirt die Lösung (welche das saure Salz enthält) und lässt sie an der Luft stehen. Es scheidet sich alsdann in Folge Entweichens von Schweflige Säure das neutrale Salz in farblosen Krystallen ab. Zum innerlichen Arzneigebrauch, sowie zur Konservierung eingemachter Früchte verwendet.

Calcium bisulfurosum Calciumbisulfid. Doppelschweflige Säure Kalk. Die unter diesem Namen in den Handel gebrachten Präparate werden hergestellt, indem man 10–20 g Aetzkalk löscht, mit Wasser zu 1 Liter auffüllt und diese Flüssigkeit mit schwefeliger Säure sättigt. Man erhält so Lösungen von Calciumbisulfid in wässriger schwefeliger Säure, welche früher als „Real Anstrahan Meat Preserve“ in den Handel kamen, jetzt durch das Natriumsalz ziemlich verdrängt sind. Die Zusammensetzung solcher Präparate war

Spec. Gew.	Proc. CaO	Proc. SO_2	Spec. Gew.	Proc. CaO	Proc. SO_2
1) 1,0344	0,96	3,63	2) —	1,33	6,8
2) 1,0487	1,11	6,18	4) 1,0789	2,07	10,0

Farblose Flüssigkeit, stark nach schwefeliger Säure riechend. Bei längerem Stehen an der Luft scheidet sich neutrales $\text{CaSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ krystallin ab. Ein rohes Präparat wird namentlich als Desinficiens in der Gährungs-Industrie, z. B. zum Ausseuern der Gährbottiche, Tünchen der Wände (um wilde Hefen, Schimmel und Spaltpilze zu tödten), zur Desinfektion der Milkeller, Ställe, Krippen, Raufen (bei Maul- und Klauenseuche etc.), reine Präparate werden als Zusatz zu Nahrungsmitteln, früher wurden sie namentlich als Zusatz zum gehackten Fleisch verwendet, s. S. 132 und unter *Caro*.

Magnesium sulfurosum neutrale Neutrales Magnesiumsulfid. Schweflige saures Magnesium $\text{MgSO}_3 + 6\text{H}_2\text{O} = 212$. Wird wie das reine Calciumsulfid dargestellt, indem man in eine Anreicherung von 50 Th. basischem Magnesiumkarbonat mit 300 Th. Wasser Schweflige Säure-Anhydrid bis zum Aufhören der Kohlensäure-Entwicklung einleitet. Ein weißes, grob krystallines Pulver, in 80 Th. Wasser löslich. Aufbewahrung in dicht geschlossenen Gefäßen.

Anwendung Wurde als innerliches Antisepticum bei Diphtherie, Blutvergiftung, Rotzinfektion, Typhus, Puerperalfieber, Pyämie etc. empfohlen. Dosis 0,5–1,0 g drei- bis viermal täglich in Pulverform.

Natrium sulfurosum neutrale Neutrales Natriumsulfid. Schweflige-saures Natrium $\text{Na}_2\text{SO}_3 + 7\text{H}_2\text{O} = 252$. Man leitet in eine warme, filtrirte Lösung von 80 Th. conc. Natriumkarbonat in 160 Th. Wasser, welche durch Erwärmen auf dem Wasserbade auf 40–50° gehalten wird, Schweflige Säure-Anhydrid bis zur Sättigung ein, alsdann fügt man so lange warme conc. Natriumkarbonatlösung hinzu, bis die Flüssigkeit schwach alkalisch reagirt, und lässt in der Kälte krystallisiren. Die Mutterlaugen geben durch Einengen weitere Mengen von Krystallen.

Das technische Natriumsulfid wird bereitet, indem man feuchte Soda-Krystalle in Thürmen der Einwirkung von Schweflige Säure Anhydrid aussetzt, welches von unten einströmt.

Eigenschaften Farblose, prismatische, an der Luft verwitternde Krystalle, leicht löslich in Wasser. Das Salz geht in Substanz sowie in wässriger Lösung allmählich in Natriumsulfat über. Die Lösung schmeckt kühlend und reagirt schwach alkalisch.

Anwendung Wird innerlich und äußerlich in gleicher Weise wie das Calcium- und Magnesiumsalz angewendet. Dosis 0,5–1,0 g mehrmals täglich. Technisch unter verschiedenen Namen. Als „Antichlor“, um das Chlor in der Bleicherei unschädlich zu machen, als „Konservessalz“ zur Haltbarmachung von Fleisch und Fleischwaren. Technisch auch in der Photographie. Ueber die Zulässigkeit der Fleischkonservierung durch dieses Salz s. *Caro*.

Natrium bisulfurosum Natriumbisulfid. Doppelschweflige saures Natrium. Bisulfite de soude (Gall) $\text{NaHSO}_3 = 104$. Man sättigt eine warme Lösung von 80 Th. kryst. Natriumkarbonat in 160 Th. Wasser mit Schweflige Säure-Anhydrid. Beim Erkalten krystallisirt das Natriumbisulfid in kleinen glänzenden Prismen, welche sauer reagieren, nach Schweflige Säure riechen und an der Luft sich leicht zu Natriumsulfat oxydiren.

Man benutzt es zur Konservierung von Nahrungsmitteln, zur Entfernung der durch Kaliumpermanganat erzeugten Flecken auf Haut und Wäsche, unter dem Namen „Leukogen“ zum Bleichen der Wolle.

Natriumsulfid-Natriumkarbonat $2\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 21\text{H}_2\text{O}$, ein ziemlich beständiges Doppelsalz, welches in der Photographie Verwendung findet, wird hergestellt, indem

man 7 Th kryst Natriumsulfit und 4 Th kryst Natriumkarbonat in 12 Th Wasser löst und die Lösung zur Krystallisation eindampft

Askolin ist eine gesättigte Lösung von Schweflige-säure-Anhydrid in Glycerin

Fumigatio Acid sulfurosi Schweflige-säure Raucherung. Zur Zerstörung von Krankheitskeimen wird bisweilen eine Raucherung mit Schweflige-säure Anhydrid ausgeführt. Dies geschieht in der Weise, dass man in den betreffenden Räumen irdene Schalen (Blumentopf Untersätze) etwa $\frac{1}{3}$ —1 m über dem Erdboden aufstellt, in diese gewogene Mengen Schwefelfäden (mit Schwefel getränkten Baumwollendocht) bringt, diese entzündet und den Raum vollständig abschliesst. Nach Verlauf von einem Tage wird die Desinfektion wiederholt. Auf 10 cbm Luftraum rechnet man 20 g Schwefelfäden. — In der nämlichen Weise stellt man schweflige Säure zu gewissen technischen Zwecken und Bleichen von Strohhuten und Makart-Bouquets etc dar, nur findet alsdann das Abbrennen des Schwefels in kleinen geschlossenen Räumen statt.

Antiferacid, welches Chlor, freie Säuren und Eisen aus der Papiermasse entfernen soll, besteht aus Natriumsulfit und Natriumphosphat in verschiedenen Verhältnissen.

Fumigation à l'acide sulfureux. Fumigatio (Suffumigatio) sulfurosa (Gall). Man schüttet grob zerstoßenen Stängenschwefel in ein flaches, irdenes Gefäß, befeuchtet ihn mit etwas Alkohol und entzündet diesen. Der Alkohol überträgt die Verbrennung auf den Schwefel. Auf einen Luftraum von 100 cbm sind 3—4 kg Schwefel anzuwenden. Eine solche Menge ist natürlich auf mehrere Gefäße zu verteilen.

Leukogen heisst das saure Natriumsulfit NaHSO_3 wegen seiner Fähigkeit, Pflanzenfarbstoffe zu entfärben. Es dient unter diesem Namen unter anderem auch zur Entfernung von Obstflecken aus Wäsche.

Lignosulfit Dr. SODNITZKY. Ist ein bei der Sulfit-Cellulose-Fabrikation sich ergebendes Nebenprodukt. Ein wässriger Auszug von Hölzern, gesättigt mit den aromatischen Bestandtheilen der Hölzer und freie, sowie gebundene Schweflige-säure enthaltend. Innerhalb Desinficiens und Antisepticum, gegen Tuberculose und Diphtherie empfohlen.

Chemie und Analyse. Die freie schweflige Säure sowie die sauren Sulfitre erkennt man an dem besondern, stechenden Geruch.

Säuert man die schweflige-säuren Salze an, so tritt dieser Geruch sehr deutlich hervor. Man erkennt die schweflige Säure an den S 130 angegebenen Reaktionen, ausserdem noch an Folgendem: die mit Natriumkarbonat neutralisirte wässrige Lösung giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag, der sich beim Kochen unter Abscheidung von metallischem Silber schwärzt. Bringt man schweflige Säure oder ein Sulfit zu einer Mischung von Zink + Salzsäure, so wird Schwefelwasserstoff gebildet, welcher Bleiacetat-Papier schwärzt.

Um Schweflige-säure zu bestimmen, führt man sie durch geeignete Oxydationsmittel (Kaliumchlorat + Salzsäure oder Brom oder Jod, Kaliumpermanganat) in der mit Salzsäure angesäuerten Lösung in Schwefelsäure über und fällt diese mit Bariumchlorid als Bariumsulfat $\text{BaSO}_4 \times 0.27468 = \text{SO}_2$. Ueber die massenanalytische Bestimmung s S 130, doch sei hierbei betont, dass die zu bestimmende Lösung nicht mehr als 0,05 Proc Schweflige-säure, SO_2 , enthalten darf.

Toxicologisches. Nach neueren Arbeiten (von KRONKA) ist die schweflige Säure durchaus keine harmlose Substanz. Sie ist vielmehr ein Blutgift und verursacht, wenn in genommen, schwere Blutungen der feinsten Capillaren. Es ist daher bei ihrer Verwendung zum Zwecke der Konservirung von Nahrungsmitteln auf die zuzusetzenden Mengen sorgfältig zu achten (s. CABO).

Aqua sulfurea (diluta)

Acidum sulfurosum dilutum 10%

Rp Acid sulfurosi (10%) 10,0
Aqua destillata 90,0

Liquor antieryptogamicus, JENNER

Rp Natrii sulfurosi neutralis 5,0
Aqua destillata 90,0

Zum Mundspülwasser anzuwenden.

Glycerinum sulfurosum

Rp Glycerini (sp G 1,23) 100,0

werden mit gasförmiger Schweflige-säure völlig gesättigt, dann mit soviel Glycerin vermischt, dass der Gehalt der Mischung 10 Proc SO_2 beträgt. 1 g der Mischung (= 0,1 SO_2) muss 31,2 cem $\frac{1}{100}$ Normal Jodlösung entfärben.

Lotio contra perlonas FERDUS

Rp Acid sulfurosi (10%) 40,0
Glycerini 90,0

Zum Bestreichen der Frostschalen

Glycerolatum desinfectivum. GRIFT

Rp. Glyceroli simplicis 90,0
Natrii sulfurosi neutralis 10,0.

Zur Desinfektion von Wunden, Verminderung der Eiterung, Beförderung der Vernarbung.

Mixtura antidiphtherica. SCHOTTIN.

Rp. Magnesiae sulfurosa 5,0
Acidi sulfurosi (10%) 5,0—8,0
Aque destillatae 100,0—120,0.

S. $1\frac{1}{2}$ —2stündlich 1 Esslöffel (bez. Kinderlöffel).

Sulfur sulfurosatum.

Sulfazon CHANDLER ROBERTS.

Auf dem Boden einer grossen Holzkiste mit Deckel werden 2 kg gewöhnliche Schwefelblumen ausgebreitet, auf die Schwefelschicht ein Bretchen, auf letzteres ein russelerner Teller mit 20,0 g Schwefelblumen gesetzt, dieser letztere Schwefel angezündet und die Kiste geschlagen. Nach einem Tage wird dieses Abbrennen von 20,0 g Schwefel wiederholt. Die Schwefelblumen haben sich dann mit Schwefligsäure gesättigt.

Dieses Sulfazon ist als Desinficiens und als Vernichtungsmittel kleiner Parasiten empfohlen worden.

Acidum tannicum.

Acidum tannicum (Aust. Brit. Germ. Helv. U-St.). **Acidum gallotannicum.** **Acidum scytodephicum.** Gallusgerbsäure. Digallussäure. Gerbsäure. Tannin. **Acide tannique** (Gall.). **Tannic acid.** $C_{14}H_{10}O_6$. Mol. Gew. = 322.

Darstellung. Diese erfolgt aus den chinesischen, japanischen oder türkischen Galläpfeln. Welche Sorte man verwendet, hängt von dem augenblicklichen Preisstande der drei Sorten ab. Für die Darstellung sind folgende Punkte zu beachten: In absolutem Aether ist die Gerbsäure so gut wie unlöslich, in wasserhaltigem Aether schwer löslich, in Alkohol enthaltendem Aether ist sie leicht löslich. Der alkoholisch-ätherischen Lösung kann die Gerbsäure durch Schütteln mit Wasser völlig entzogen werden, während die meisten Verunreinigungen im Aether gelöst bleiben.

In einem Stechheber aus Glas, dessen verengte untere Öffnung durch einen Korkstopfen fest verschlossen ist, schiebe man zunächst einen Bausch entfettete Watte. Alsdann schüttet man in das Gefäss 8 Th. grob zerstoßene Galläpfel und übergiesst diese mit einer Mischung aus 12 Th. Aether und 3 Th. Weingeist (90 Vol. Proc.). Man verstopft nun auch die obere Öffnung mit einem Korkstopfen und lässt das Ganze zwei Tage lang unter öfterem Umschütteln stehen. Nach dieser Zeit lässt man den Auszug durch Lüftung des unteren sowie des oberen Stopfens in ein untergesetztes Gefäss ablaufen, und zieht den Rückstand noch zweimal mit je einem Gemisch aus 12 Th. Aether und 3 Th. Weingeist durch je zweitägiges Maceriren aus. Die vereinigten Auszüge werden filtrirt, mit $\frac{1}{3}$ Volumen Wasser tüchtig durchgeschüttelt und der Ruhe überlassen. Die sich absetzende ätherische Schicht wird abgetrennt und noch zweimal mit je $\frac{1}{3}$ Volumen Wasser ausgeschüttelt. Die vereinigten wässrigen, nöthigenfalls filtrirten Flüssigkeiten werden auf dem Wasserbade zur Sirupkonsistenz eingedampft. Den Rückstand löst man in der achtfachen Menge Wasser, erwärmt die Lösung, mischt sie mit etwas gewaschener Thierkohle und lässt sie damit etwa 3—4 Tage unter öfterem Umschütteln stehen. Nach dieser Zeit filtrirt man die Lösung ab, destillirt den Aether ab, dampft den Rückstand in einer Porcellanschale bis zur Extraktkonsistenz ein und zupft das Extrakt in dünne Lamellen, welche man im Trockenschraube auf Porcellantellern gut austrocknet und dann im Porcellanmörser pulvert. (Helv.).

Für Darstellung im Grossen kann man Perkolatoren aus Glas oder Steinzeug verwenden. Eiserne Gefässe sind bei der Darstellung streng entfernt zu halten.





Fig. 28. Stechheber zur Darstellung der Gerbsäure.

Handelssorten. Die wichtigsten sind 1) Acidum tannicum pulveritum, durch Pulvern des getrockneten Extraktes erhalten, ein gelblichweisses bis hellbraunliches Pulver 2) Acidum tannicum levissimum, Krystall-Tannin, durch Aufstreichen der konzentrierten Lösung auf Glasplatten in kleinen Schüppchen (Lamellen) erhalten, welche Krystalle vortauschen 3) Acidum tannicum in filis, Gerbsäure in dünnen Fäden, durch Pressen des erwärmten Extraktes aus dünnen Oeffnungen erzielt

Eigenschaften. Ein fast weisses oder gelbliches Pulver oder sehr leichte, bräunlich-gelbe, krystallähnliche Schüppchen, fast ohne Geruch, von sehr herbem, zusammenziehendem Geschmack. Das verstaubte Pulver reizt heftig zum Niesen. Sie löst sich in 1 Th Wasser oder 2 Th Weingeist (90 Vol %) zu einer bräunlichen bis braunen Flüssigkeit. Sie ist ferner löslich in 2 Th Glycerin, unlöslich dagegen in absolutem Aether, in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, in ätherischen (ausgenommen Benzaldehyd) und fetten Oelen. Aus der konz. wässrigen Lösung wird sie, ohne chemisch verändert zu werden, gefällt durch Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Natriumchlorid. Macht man Gerbsäurelösungen alkalisch (durch NaOH, Na₂CO₃, CaO u. dergl.), so nehmen sie begierig Sauerstoff aus der Luft auf und färben sich dunkel. Beim Erwärmen mit verdünnten Säuren, z. B. Salzsäure, Schwefelsäure, geht die Gerbsäure in Gallussäure über. Gallussäurebildung erfolgt auch, wenn Schimmelpilze sich in Gerbstümelösungen angesiedelt haben. Die Formel der Gerbsäure ist C₁₄H₁₀O₆, ihre Konstitution ist noch nicht ganz aufgeklärt, am häufigsten wird sie als „Digallussäure“, d. i. als ein extramolekulares Anhydrid der Gallussäure aufgefasst. Sie ist eine einbasische Säure, ihre Salze heissen Tannate. Diejenigen der Alkalien und der



alkalischen Erden sind in Wasser löslich, diejenigen der Schwermetalle in Wasser unlöslich. — Beim Erhitzen auf 150—160° C. färbt sich die Gerbsäure zunächst dunkler, bei 210—215° C. zerfällt sie zum grössten Theile in Pyrogallol und Kohlensäure. — Jod wird von Gerbsäurelösungen in beträchtlichen Mengen zu einer rothbraunen Flüssigkeit aufgenommen, welche organisch gebundenes Jod enthält, da das letztere durch Starklösung nicht nachgewiesen werden kann. — Die wässrige Lösung der Gerbsäure wird durch Eiweiss, Leim, Alkaloide und Brechweinstein gefällt (Unterschied von Gallussäure s. d.). — Reine, oxydfreie Eisenoxydsalze färbten Gerbsäurelösung zunächst nicht, infolge Oxydation des Eisensalzes durch die Luft tritt jedoch gewöhnlich alsbald violette Färbung auf, allmählich entsteht auch ein blauschwarzer, sehr fein vertheilter Niederschlag. Bei sehr grosser Verdünnung beider Lösungen entsteht klare blaue Flüssigkeit, welche sich allmählich unter Abscheidung dunkler Flocken und Bildung von Eisenoxydsalz grün färbt.

Prüfung. 1) Sie verbrenne beim Erhitzen, ohne einen wägbaren Rückstand zu unterlassen. 2) Sie löse sich in 2 Th Wasser zu einer bräunlichen klaren Flüssigkeit auf. Hierzu ist indess zu bemerken, dass Gerbsäure, welche zu lange getrocknet wurde, wahrscheinlich infolge Bildung von Anhydriden, sich in der Kälte sehr schwer, leicht dagegen beim schwachen Anwärmen auflöst. 3) 2 ccm der Lösung von 1 g Gerbsäure in 10 ccm Wasser werden durch Vermischen mit 5 ccm Weingeist von 90 Proc. innerhalb 1 Stunde nicht getrübt (Gummi, Dextrin), fügt man alsdann 5 ccm Aether hinzu, so darf auch jetzt eine Trübung nicht eintreten (Zucker, Salze). 4) Gerbsäure darf beim Trocknen im Wasserbadtrockenschranke nicht mehr als 12 Proc. Wasser verlieren (Gerbsäure kann, ohne ihr pulverförmiges Aussehen zu verlieren, bis zu 20 Proc. Wasser zurückhalten). — 5) Zur Prüfung auf Gallussäure, welche in den Handelspräparaten niemals fehlt, versetzt man die wässrige Auflösung mit Kaliumcyanidlösung. Bei Gegenwart von Gallussäure tritt Rothfärbung ein.

Erkennung und Bestimmung. Man erkennt die Gerbsäure an folgenden Reaktionen.

1) Mit oxydfreien Eisenoxydsalzlösungen giebt sie einen weissen, gallertartigen Niederschlag, der sich an der Luft rasch bläut. Durch Eisenoxydsalze, z. B. Ferrichlorid,

entsteht in der konc Lösung ein blauschwarzer Niederschlag von Ferritannat. Sind die Gerbsäurelösungen verdünnt, so entsteht durch Ferrichlorid nur eine blauschwarze, klare Flüssigkeit (Tinte), aus welcher sich beim Stochen dunkle Flocken anscheiden. Durch Zusatz verdünnter Schwefelsäure wird die Blau-Schwarzfärbung aufgehoben. 2) Unlösliche Verbindungen giebt die Gerbsäure mit den Salzen des Bleies, Kupfers, Quecksilbers, Antimons, Wismuts. Gold- und Silbersalze und alkalische Kupferlösungen werden durch Gerbsäure reducirt. 3) Eiweiss, Leim, Alkaloide und Brechweinstein werden durch Gerbsäure gefällt. Man kann einer Gerbsäure-Lösung durch thierische Haut (Hautpulver) die gesammte Gerbsäure entziehen.

Bestimmung. Eine völlig anwandtsfreie Bestimmung der Gerbsäure ist zur Zeit nicht bekannt. Die im Nachstehenden angeführten können als relativ brauchbar empfohlen werden.

Durch Wägung. a) Eine Gerbsäurelösung wird in zwei gleiche Theile getheilt. Der eine Theil wird direct verdampft, der Rückstand getrocknet und gewogen. Der andere Theil wird 24 Stunden lang mit einem Ueberschuss von Hautpulver behandelt, alsdann abfiltrirt und das Filtrat nebst Waschwässern wiederum eingedampft, der Rückstand getrocknet und gewogen. Die Differenz zwischen beiden Wägungen entspricht der vorher gelöst gewesenen Gerbsäure. Das Hautpulver darf an Wasser nichts Löschliches abgeben. Andernfalls ist dieser Betrag zu bestimmen und in Rechnung zu stellen.

b) Man bestimmt das spec Gew der Gerbsäurelösung. Hierauf behandelt man die Lösung im geschlossenen Gefässe mit einem Ueberschuss von gewaschenem und getrocknetem Hautpulver 24 Stunden hindurch, worauf man filtrirt und das spec Gew des Filtrates bestimmt. Die Differenz zwischen beiden spec Gew $\div 1,000$ wird in bestehender Tabelle aufgesucht. Man findet so den Procentgehalt der Lösung an Gerbsäure.

Beispiel. Eine Gerbsäure-Lösung hat bei 15°C das spec Gew 1,01, nach der Behandlung mit Hautpulver ist das spec Gew = 1,006. Differenz von 1,01 und 1,006 = 0,004, $1 \div 0,004 = 1,004$. Diesem spec Gew entspricht ein Gerbsäuregehalt von 1,00 Proc. Von dem Hautpulver ist die vierfache Menge des scheinbaren Gerbsäuregehaltes zuzufügen, welcher sich nach der ersten Bestimmung des spec Gew der Lösung aus der Tabelle ergibt. Bei dem hier angegebenen Beispiel (spec Gew 1,01 = 2,5 Proc Gerbsäure) wendet man also für 100 cem Flüssigkeit $4 \times 2,5$, d. i. 10 g Hautpulver an.

Proc Gerbsäure	Spec Gew bei 15°C	Proc Gerbsäure	Spec Gew bei 15°C	Proc Gerbsäure	Spec Gew bei 15°C
0 0	1 0000	1 8	1 0072	3 6	1 0144
0 2	1 0008	2 0	1 0080	3 8	1 0152
0 4	1 0016	2 2	1 0088	4 0	1 0160
0 6	1 0024	2 4	1 0096	4 2	1 0168
0 8	1 0032	2 6	1 0104	4 4	1 0176
1 0	1 0040	2 8	1 0112	4 6	1 0184
1 2	1 0048	3 0	1 0120	4 8	1 0192
1 4	1 0056	3 2	1 0128	5 0	1 0201
1 6	1 0064	3 4	1 0136		

Durch Titriren nach LOEWENTHAL v SCHROEDER. Als konventionelle Methode besonders in der Technik benutzt.

Diese beruht darauf, dass man das Reduktionsvermögen einer gerbsäurehaltigen Flüssigkeit gegenüber Kaliumpermanganat feststellt und zwar vor und nach der Behandlung mit Hautpulver. Die Differenz zwischen beiden Bestimmungen ist gleich dem Reduktionswerth der Gerbsäure. Als Endpunkt der Oxydation gilt der Moment, in welchem eine verhältnissmässig grosse Menge Indigolösung durch das Kaliumpermanganat oxydirt ist. Man nimmt an, dass in dem Augenblicke, in welchem die Indigolösung oxydirt ist, auch alle Gerbsäure mit Sicherheit in die beabsichtigte Oxydationsstufe übergeführt ist.

Zur Ausführung der LOEWENTHAL v SCHROEDER'schen Methode bedarf man

- 1) Kaliumpermanganatlösung. 10 g reines Kaliumpermanganat werden in destillirtem Wasser zu 6 Litern gelöst.
- 2) Indigolösung. 30 g festes indigowefelsaures Natrium werden lufttrocken in 3 Liter verdünnter Schwefelsäure (1 5 Vol) gebracht, dazu 3 Liter destill. Wasser gegeben und nach dem Auflösen filtrirt. Bei jeder Titration werden 20 cem dieser Indigolösung zu $\frac{1}{4}$ Liter Wasser zugefügt, diese Lösung reducirt dann etwa 10,7 cem der Kaliumpermanganatlösung.

- 8) Hautpulver muss weiss, fein wollig sein und darf an kaltes Wasser keine Bestandtheile abgeben, welche Kaliumpermanganat reduciren. Man führe einen blinden Versuch damit aus.
- 4) Reinstes Tannin

Titerstellung. Man löse 2 g des lufttrockenen Tannins zu 1 Liter und bestimme von 10 ccm dieser Lösung den gesammten Kaliumpermanganatverbrauch unter Zusatz von $\frac{1}{4}$ Liter Wasser und 20 ccm Indigolösung, deren Reduktionswerth abgezogen wird.

Ferner bestimme man den Kaliumpermanganatverbrauch der Tanninlösung nach dem Behandeln mit Hautpulver (50 ccm Tanninlösung werden in einer Glasstopfenflasche mit 3 g vorher eingeweichtem und wieder stark abgepresstem Hautpulver unter öfterem Umschütteln 18–20 Stunden behandelt, dann filtrire man und titire wieder 10 ccm).

Beträgt der Kaliumpermanganatverbrauch des Hautfiltrates nicht mehr als 10 Proc des Gesamtverbrauches an Kaliumpermanganat, so ist das Tannin zur Titerstellung hinreichend rein. Man bestimmt alsdann durch Trocknen bei 100° C den Wassergehalt und berechnet den Titer nach der Trockensubstanz des Tannins, die so gefundene Zahl giebt mit 1,05 multiplicirt den wahren¹⁾ Titer.

Die zu bestimmende Gerbstofflösung muss so viel Gerbsäure enthalten, dass 10 ccm nicht mehr und nicht weniger als 4,0–10 ccm Kaliumpermanganatlösung verbrauchen. Man bringt nun 10 ccm Gerbstofflösung in eine Porcellanschale, fügt 750 ccm destillirtes Wasser und 20 ccm Indigolösung hinzu und lässt alsdann aus einer Glashahn-burette so viel Kaliumpermanganatlösung unter starkem Umrühren aufliessen,²⁾ dass die gegen das Ende des Versuches grüne Flüssigkeit gerade goldgelb wird (Gesamtverbrauch an Kaliumpermanganat).

Dann digerirt man 50 ccm der zu untersuchenden Gerbstofflösung 18–20 Stunden mit 3 g Hautpulver, wie vorher angegeben, und titirt nun 10 ccm der filtrirten Lösung nach dem Verdünnen mit 750 ccm Wasser und dem Versetzen mit 20 ccm Indigolösung wiederum bis goldgelb.

Beispiel

Bei der Titerstellung wurden gefunden

1 ccm Kaliumpermanganat	=	0,00169 g Gerbsäure,
20 ccm Indigolösung	=	21,40 ccm KMnO_4 ,
3 g Hautpulver entfärbt	=	0,8 ccm KMnO_4

Versuch

Gesamtverbrauch an KMnO_4 vor dem Behandeln mit Hautpulver	33,8 ccm
Verbrauch an KMnO_4 nach dem Behandeln mit Hautpulver	24,5 "
	bleibt 8,8 ccm
davon ab für 3 g Hautpulver	0,8 "
bleibt für 10 ccm Gerbstofflösung	8,5 ccm

$$8,5 \times 0,00169 \text{ g Gerbsäure} = 0,014365 \text{ g Gerbsäure}$$

$$\text{Mithin enthalten 100 ccm Gerbstofflösung} = 0,14365 \text{ g Gerbsäure}$$

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefässen, grössere Vorräthe vor Licht geschützt.

Anwendung. Gerbsäure ist ein Adstringens, Tonicum und Stypticum (blutstillendes Mittel). In Substanz oder concentrirter Lösung wirkt sie korrodirend auf Schleimhäute und wird von diesen, sowie von der Haut resorbirt. Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als Gallussäure. Die blutstillende Eigenschaft ist durch die Koagulation des Eiweisses zu erklären, diese Eigenschaft kommt aber auch der resorbirten Gerbsäure als entferntere, mildere Wirkung zu. Ausserdem wirkt sie antiseptisch. Man wendet sie an Aeusserlich als blutstillendes Mittel bei Blutungen aller Art, bei eiternden Processen, Wunden, Erkrankungen des Zahnfleisches, Tripper, Diphtherie, gegen das Ausfallen der Haare u. s. w. Innerlich in Gaben von 0,05–0,5 g bei inneren Blutungen, Durchfällen, Ruhr, Morbus Brightii. Als Gegenmittel bei Vergiftungen durch Alkaloide und einige Metallsalze. — Technisch in der Färberei zur Annahmerung der Faser, zur Tintenfabrikation, als Klärmittel in der Bierbrauerei und anderen Gewerben.

¹⁾ Die Erhöhung wird vorgenommen, weil das als Maass benutzte Tannin nie ganz rein ist.

²⁾ Das Einfließen hat entweder durch Entropfen oder ccm für ccm zu geschehen und muss bei der Analyse genau so wie bei der Titerstellung vorgenommen werden.

Aqua adstringens ad inanimas

Rp Acidi tannici	1,0
Spiritus (90 Proc)	
Glycerini	ad 5,0
Aquae destillatae	50,0

Zum Bepinseln aufgesprungenen oder wunder
Brustwarzen

Aqua haemostatica Neapolitana**Haemostaticum Monterosiae**

Rp Aquae vulnerariae spirit	100,0
Spiritus Formicarum	
Aquae destillatae	ad 10,0
Acidi tannici	1,5

Bacilla tannica**Crayons de tannin (Gall)**

Rp Tannini	10,0
Gummi arabici pulv	0,5
Aquae destillatae	
Glycerini	ad q s

Man stosse mit möglichst wenig Flüssigkeit an.

Cereali tannico opii**SCHUSTER**

Rp Acidi tannici	4,0
Opil pulverati	0,25
Glycerini	q s

Bei Tripper angefeuchtet in die Harnröhre
einzuführen

Balneum Tannini

Rp Acidi tannici	50,0
Aquae destillatae	500,0

Für ein Vollbad

Colloidium haemostaticum**CARLO FAYET**

Rp Colloidi	50,0
Acidi carbonici	
Acidi tannici	ad 2,5
Acidi benzoici	1,5

Zum Stillen von Blutungen Das Original giebt
5,0 Carbolsäure an

Colloidium stypticum

Rp Acidi tannici	20,0
Spiritus (90 Proc)	5,0
Aethers	20,0
Colloidi	55,0

Bei starken Blutungen aus den Alveolen.

Colloidium stypticum RICHARDSON**Xylostyptic ether RICHARDSON**

Rp Acidi tannici	2,0
Spiritus (90 Proc)	5,0
Colloidi lentescens	20,0
Tincturae Benzoes	2,0

Collyrium tannicum DESMARRES

Rp Acidi tannici	0,5
Aquae Lamo-Cornal	10,0
Aquae destillatae	50,0

Augenwasser Zum Waschen und Eintupfen bei
katalinischer Konjunktivitis nach Ablauf des
Entzündungsstadiums

Essentia contra alopecia

Rp Acidi tannici	2,0
Spiritus diluti	150,0
Glycerini	50,0
Spiritus Colonienis	10,0

Gegen Schuppenbildung und Haarausfall täglich
einmal mit einem Schwämmchen den Haarboden
zu befeuchten

Essentia dentifricia BRESLAUER

Rp Rhizomatis Iridis	
Radialis Pyrethri	
Corticis Cinnamomi Cassiae	ad 10,0
Radialis Saponariae	100,0
Sacchari albi	40,0
Natrii carbonici cryst	2,0
Acidi benzoici	
Acidi tannici	ad 12,5
Olei Menthae pip	gtt X
Olei Rosae	gtt V
Spiritus diluti	750,0
Cocconellae	2,0

Acht Tage maceriren, dann filtriren

Glycerinum Acidi tannici**DEMARQUAY**

Rp Acidi tannici	1,0
Glycerini	9,0

Glycerolatum tannicum

Rp Acidi tannici	2,0
Unguenti Glycerini	10,0

Bei Leukorrhoe, Fissuren des Anus Im Verhält-
nis 1:10 zum Bestreichen schmerzhafter Häm-
orrhoidalknoten

Liquor adstringens vinosus**RICORD**

Rp Acidi tannici	1,0
Vini rubri	100,0

Zum Wundverbande, bei Leukorrhoe, veraltetem
Tripper

Liquor jodo tannicus**Jod-Tannin**

Rp Acidi tannici	10,0
Aquae destillatae	80,0
Spiritus (90 Proc)	8,0
Solutiofodi adde	
Jodi triti	2,0

Man macerire 24 Stunden und filtrire alsdann

Liquor stypticus RUSPINI

Rp Acidi tannici	5,0
Aquae Rosae	120,0
Spiritus diluti	10,0

8 Aeusserlich

Liquor tannicus jodoferratus**ZUCARELLO PATTI**

Rp Acidi tannici	6,0
Acidi citrici	9,0
Aquae Rosae	1200,0

Der filtrirten Lösung wird eine zweite filtrirte
Lösung zugemischt aus

Jodi	0,84
Ferri pulverati	0,5
Aquae	5,0

Die Mischung ist zu filtriren. Zu Einspritzungen
bei Blennorrhagien

Liquor tannicus MONSEL

Aqua haemostatica MONSEL	
Rp Aluminis (eisenfrei)	8,0
Aquae Rosae	100,0
Acidi tannici	1,5

Als blutstillendes Mittel Nicht zu verwechseln
mit dem Liquor haemostaticus MONSEL,
welcher eine Ferrisulfatlösung ist

Liquor inhalatorius tannicus

A Nach FIEBER

Rp Acidi tannici 1—5,0
Aquae destillatae 100,0

B Nach WALDENBURG

Rp Acidi tannici 5,0
Aquae Pici 100,0
Aquae destillatae 500,0

A Bei chronischem Luftröhren Katarrh

B Bei putrider Bronchitis

Mixtura contra albuminuriamRp Acidi tannici 5,0
Mucilaginis Gummi Arabici 50,0
Infusi folior Uvae Ursi 150,0
Sirupi Sacchari 50,0
Tincturae Opi crocatae 2,0

Drei- bis vierstündlich 1 Esslöffel, bei Albuminurie, chron. Blasenkatarrh

Pasta glycerino-tannicaRp Acidi tannici 20,0
Glycerini 60,0
Aquae Rosae 10,0

Man löse und mische hinzu

Tragacanthae pulv q s
dies eine Paste entsteht**Pasta Tannini glycerinata**

TORNOWITZ SCHUTTER

Rp Acidi tannici 20,0
Opi pulverati 0,3
Glycerini gtt 50—60

Man forme daraus Stübchen, welche bei Gonorrhöe in die Harnröhre eingeführt werden

Pastilli Acidi tannici

A Zu 0,025 Tannin

Rp Acidi tannici 10,0
Aquae glycerinatae 33,0
Sacchari 280,0

Man löse das Tannin im Glycerinwasser, stosse den Zucker zur Masse an und forme 400 Pastillen, die über Schwefelsäure (vor Ammoniak geschützt) zu trocknen sind

B Zu 0,06 g Tannin

Rp Acidi tannici 5,0
Sacchari 65,0
Tragacanthae pulv 2,0
Aquae Aurantii Florum duplicis q s

Hieraus 100 Pastillen zu formen

Pulvis antidiarrhoicus. OPOLZERRp Acidi tannici 0,06
Opi pulverati 0,02
Sacchari 0,5

Dosis 1 Bei profuser Diarrhöe zweistündlich 1 Pulver

Pilulae tannicae FREYCHSRp Acidi tannici 2,0
Extracti Aloes 1,0
Extracti Graminis q s

Pilulae 100 Dreimal täglich 4 Stück bei morbus Brichti

Pomata contra alopeciaRp Acidi tannici 3,0
Pomatae odoratae 100,0
[Tincturae Cantaridum 0,5]

Gegen Schuppenbildung und das Ausfallen der Haare

Pulvis erichinus contra coryzam

LÉCHELLES Schnupfpulver

Rp Acidi tannici 0,5
Sacchari pulv
Flor Rosae rubrae pulv 100,0**Pulvis dentifricius tannicus**

MIALHE

Rp Acidi tannici 1,5
Sacchari Lactis 100,0
Olei Menthae pip
Olei Geranii aa gtt X

Mit einer alkoholischen Lösung von „Phlo in“ roth zu färben

Spiritus contra pernionem

ANARBANSKY

Rp Acidi tannici 2,5
Spiritus camphorati 50,0

Zum Reinseln der Frostbeulen

Suppositoria Acidi tanniciRp Acidi tannici 2,0
Olei Cacao raspati 20,0

Für 10 Suppositorien Gegen Askariden

Suppositoria stypticaRp Acidi tannici 2,5
Olei Cacao raspati 10,0

Für 10 Suppositorien Zur Minderung der Hamorrhoidal Blutungen

Solutio Tannini (Form BEROL)Rp Acidi tannici 5,0
Aquae destillatae 25,0
Glycerini 20,0**Sirupus Acidi tannici**Rp Acidi tannici 2,0
Spiritus diluti 4,0
Sirupi Sacchari 94,0**Sirupus jodo tannicus**

FARRANS

Rp Acidi tannici 5,0
Spiritus diluti 20,0
Tincturae Jodi 11,0
Sirupi Sacchari 250,0

Die Mischung wird in einer Porzellanschale aufgekocht, dann kühlt. Mehrmals täglich 10—20 g bei Kropf, Skropheln, Leukorrhöe Sirupus jodo-tannicus GONLIERMANN ist anders zusammengesetzt Vergl. unter Jod

Tinctura jodo tannica BOINETRp Acidi tannici 5,0
Aquae destillatae 50,0
Tincturae Jodi 2,5

Verbandmittel für frische Wunden

Trochisci Viennenses.Rp Morphii hydrochlorici 0,03
Acidi tannici 1,25
Sacchari 100,0

Die Mischung wird mit einem zu Schavum geschlagenen Eiweiß angerührt, dann formt man mit einer Spritze oder Düse 100 Trochisken, welche auf Wachspapier gesetzt und im Trockenschrank getrocknet werden Bei chronischem Katarrh der Luftwege

Unguentum antiothiticum

Rorer

Rp Acid. tannici	5,0
Aquae Lauro-Cerasi	5,0
Sulfuris praecipitati	4,0
Unguenti lenientis	60,0

Bei Hautläsungen, Venenblüthen

Unguentum Plumbi tannici (Germ. III)

Rp Acid. tannici	1,0
Liquoris Plumbi subacetici	2,0

fein verreiben und mischen mit

Adipis suth	17,0
-------------	------

Unguentum Plumbi tannici (Germ. I)

Unguentum ad decubitus

Rp Cortinis Quercus conc	50,0
Aquae destillatae	250,0
Liquoris Plumbi subacetici	25,0
Unguenti Glycerini	16,0

Man kocht die Eichenrinde zwei Stunden lang mit dem Wasser aus, kühlt und filtrirt. Das erkaltete Filtrat wird unter Umrühren mit dem Bleiesig gefällt. Man sammelt den Niederschlag auf einem Filter, drückt ihn sanft aus, bis sein Gewicht noch = 25 Th ist, und vermischt ihn alsdann mit der Glycerinsalbe

Unguentum Tannici

Rp Acid. tannici	
Spiritus diluta aa	2 5
Unguenti cerei	20,0

Vinum aromatico adstringens

Ricord

Rp Acid. tannici	2,0
Vini aromatica	200,0

Täglich dreimal ein Esslöffel Bei veralteterm Trapper

Vet Electuarium stypticum.

Rp Acid. tannici	
Ostechu	aa 25,0
Radialis Laquirinae	
Fructus Anisi	
Farinae secalinae	aa 50,0
Aquae q s	

S Alle 2 Stunden den 5 Theil zu geben (Bei Diarrhöe, Blutharnen, Harnruhr der Pferde und Rinder)

Vet Pulvis antidiarrhoicus

Poudre contre la diarrhoe des veaux (Gall)

Rp Acid. tannici	
Acidi salicylici	aa 5,0

Gegen die Diarrhoe der Kälber

Tannosol von E. FEIGEL in Muhlhausen gegen Krankheiten des Athmungsorgans nach AURECHT Kreosot 1,2, Gerbsäure 0,8, Rohrzucker 18,6, Caramel 0,5, Wasser 78,9

Tannigenum Diacetyl-Tannin Acetyl-Tannin $C_{14}H_9(OOCH_3)_2O_6 = 406$ Soll durch Erhitzen von Tannin mit Essigsäureanhydrid, bei Gegenwart von Essigsäure oder Essigäther, am Rückflusskühler entstehen. Das Reaktionsprodukt wird in Wasser eingetragen und die ausgeschiedene Masse mit warmem Wasser ausgewaschen, sodann getrocknet und gepulvert D R-P 78879

Gelbblichgraues, geruch- und geschmackloses, kaum hygroskopisches Pulver, welches im trocknen Zustande ohne Veränderung auf $180^\circ C$ erhitzt (sterilisirt) werden kann, schmilzt unter Bräunung bei $187-190^\circ C$. Unter Wasser erweicht es schon bei $50^\circ C$ zu einer fadenziehenden, honiggelben Masse. In kaltem Wasser und in verdünnten Säuren ist es nicht merklich, in Aether und siedendem Wasser nur spurenweise löslich. Von kaltem Alkohol, von verdünnten Lösungen des Natriumphosphats, der Soda und des Borax, auch von Kalkwasser wird Tannigen mit gelbbrauner Farbe gelöst. Durch Kochen der alkalischen Lösungen erfolgt Versäuerung zu Gallussäure und Essigsäure, durch Ammoniak erfolgt Spaltung in Gerbsäure und Essigsäure. Der wässrige Auszug des Tannigens wird durch Ferrichlorid blauschwarz gefärbt.

Als Ersatz des Tannins bei chronischen Diarrhöen in Einzelgaben von 0,2–0,5 g bis zu 3,0 g täglich. Da es im Magensaft so gut wie unlöslich ist und erst durch die Darmverdauung gespalten wird, belästigt es den Magen nicht und entfaltet seine Wirkung erst im Darm. Zu 3 Proc in einer 5procentigen Natriumphosphatlösung gelöst, wird es bei chronischer Pharyngitis eingespielt.

Tannoformum Methylen-Ditanhin $CH_2 < \begin{smallmatrix} C_{14}H_9O_6 \\ C_{14}H_9O_6 \end{smallmatrix}$ Ein Kondensations-Produkt des Tannins mit Formaldehyd.

Zur Darstellung werden 5 Th Tannin in 15 Th heissem Wasser gelöst. Diese Lösung wird mit 8 Th Formaldehydlösung von 30 Proc und soviel concentrirter Salzsäure (12–15 Th) versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht. Dieser wird nach dem Auswaschen mit Wasser bei mässiger Wärme getrocknet D R-P 88082 u 88841.

Speziell leichtes, weissröthliches, bei etwa $230^\circ C$ unter Zersetzung schmelzendes Pulver, geruchlos und geschmacklos, in Wasser und den üblichen organischen Lösungsmitteln, mit Ausnahme von Alkohol, unlöslich. Von verdünntem Ammoniak wird es mit gelber, von Sodaauslösung oder Natronlauge mit braunrother Färbung aufgenommen und aus diesen Lösungen durch Säuren wieder abgeschieden. — 0,01 g Tannoformum löst sich in 2 ccm cone Schwefelsäure mit brauner Färbung, welche beim Erwärmen in Grün, später in Blau übergeht. Die grüne oder blaue Lösung giebt mit Alkohol eine prachtvoll blaue Färbung, die nach einiger Zeit ins Weinrothe umschlägt, mit verdünnter Natronlauge dagegen eine grasgrüne Färbung.

Es wirkt zugleich adstringierend und antiseptisch. Innerlich, da es den Magen nicht belästigt und erst im Darm wirkt, als Darmadstringens bei chronischem Darmkatarrh.

in Gaben von 0,5 g täglich drei- bis viermal Aeusserlich als stark sekretionsbeschränkendes, austrocknendes Streupulver gegen übermässige Schweissabsonderung (Schweissfuss), nässende Anschläge, übelriechende Wunden, überhaupt als Trockenantisepticum

Rp Tannoformi 3,0
Vasolini 10,0
Lanolini 20,0

Bei Haemorrhoiden, Woll-, wundgelaufenen Füssen

Rp Tannoformi 10,0
Talc. veneti 20,0
Gegen Schweissfuss

Rp Tannoformi 10,0
Amyli pulv 50,0
Zum Einpudern bei Ekzemen

Tannalbum Tannin-Eiweiss Gerbsäure-Eiweiss Eine Tannin-Eiweiss-Verbindung, welche durch besondere Verfahren in den Zustand relativer Unlöslichkeit gebracht ist

Man bereitet je eine 10procentige Lösung von Eiweiss und von Tannin und vermischt alsdann 10 Th der Eiweisslösung mit 6,5 Th der Tanninlösung. Der entstehende Niederschlag wird gesammelt, mit Wasser gewaschen, bis das Filtrat durch Ferrichlorid kaum noch blau gefärbt wird. Dann trocknet man auf porösen Unterlagen zunächst vollständig bei etwa 80°C. Der getrocknete Rückstand wird gepulvert und 6 Stunden auf 120°C erhitzt. D. R.-P. 88029 — Dieses Pulver hat den Zweck, das ursprünglich im Magensaft leicht lösliche Präparat darin schwerer auflöslich zu machen. Nach D. R. P. 90215 kann der gleiche Zweck erreicht werden, indem man den erhaltenen Niederschlag mit Alkohol oder einer grossen Menge Säure, z. B. Salzsäure behandelt.

Bräunliches, geruch- und geschmackloses Pulver, etwa 50 Proc. Gerbsäure enthaltend, in kaltem Wasser und in Alkohol nur spurenweise löslich. — Die Anschüttelung mit kaltem Wasser giebt nach dem Filtriren mit einem Tropfen Ferrichloridlösung die intensiv blaue Färbung der Gerbsäure. Die Auskochung mit Wasser 1 — 5 giebt nach dem Filtriren und Abkühlen mit Eiweisslösung eine Fällung. Beim Schütteln von Tannalbum mit Natronlauge gelatinirt die Mischung, beim nachfolgenden Erhitzen bis zum Sieden und Uebersättigen mit Salzsäure tritt der Geruch nach Schwefelwasserstoff auf, infolge Spaltung des Eiweisses.

2 g Tannalbum werden mit 100 ccm Wasser von 40°C, 20 Tropfen Salzsäure (spec. Gew. 1,124) und 0,25 g Pepsin gut durchgerührt und sodann 8 Stunden bei 40°C ohne zu rühren stehen gelassen. Hierauf wird der ungelöste Rückstand auf ein bei 100°C getrocknetes, gewogenes Filter gebracht, dreimal mit je 10 ccm kaltem Wasser gewaschen, im Filter bei 100°C getrocknet und gewogen. Sein Gewicht betrage nicht unter 1,0 g S. oben.

Anwendung als unschädliches Darmadstringens bei akuten und subakuten Dün- und Dickdarmkatarrhen viermal täglich 0,5—1,0 g, bei ungenügender Wirkung bis 2,5 g und Kindern 0,2—0,3—0,5 g. Gaben von 0,5—1,0 g beeinflussen die Diarrhöen der Phthisiker günstig. Gleiche Gaben bei Nierenleiden, wo es den Eiweisgehalt des Urins herabsetzt.

Acidum tartaricum.

Acidum tartaricum (Aust. Brit. Germ. Helv. U.-St.) **Acidum tartaricum**, **Sal. essentielle Tartari**, Weinsäure, Weinstelnsäure, **Acide tartrique** (Gall.) **Acide dextro-rotacémique**, **Tartaric acid**, $C_4H_4O_6$, Mol. Gew. = 150

Darstellung Diese erfolgt fabrikmässig aus dem rohen Weinstein. Kleinere Mengen kann man in folgender Weise bereiten. Man löst 100 Th. Weinstein in 600—700 Th. siedendem Wasser auf und fügt zu der kochenden Lösung in kleinen Antheilen allmählich unter Umrühren 28 Th. Calciumcarbonat (Schlammkreide) hinzu. Wenn die Entwicklung von Kohlensäure aufgehört hat, fügt man eine Lösung von 80 Th. Calciumchlorid ($CaCl_2 + 2H_2O$) in 90 Th. Wasser hinzu, rührt um und lässt den gebildeten Niederschlag von Calciumtartrat absetzen. Nach längerer Zeit der Ruhe zieht man die überstehende Flüssigkeit ab und wäscht den Niederschlag mit Wasser gut aus. Dann kocht man ihn mit einer Mischung von 67 Th. conc. Schwefelsäure und 150—300 Th. Wasser etwa $\frac{1}{2}$ Stunde unter fleissigem Umrühren, kehrt die noch heisse Flüssigkeit durch ein Leinentuch und dampft die Kolatur ein, bis sie in heissem Zustande das spec. Gewicht 1,21 hat. Dann lässt man abkühlen und einige Tage bei Seite stehen. Die ausgeschiedenen Gips-Krystalle werden beseitigt, die klar filtrirte Mutterlauge aber wird bis zur Salzhaul eingedampft. Die nach

dem Erkalten anschliessenden Krystalle bestehen aus Weinsäure. Man reinigt sie durch nochmaliges Auflösen, (event. unter Zusatz von kalkfreier, gewaschener Thierkohle), in Wasser, Abdampfen der Lösung und Krystallisieren wie vorher (Ital.) Diese Operationen gehen in der Technik in Bleigefässen vor sich.

Eigenschaften Farblose und geruchlose, von Krystallwasser freie, prismatische Krystalle, oder Krystallkrusten oder Krystallbruchstücke von sehr saurem Geschmack, beim Erhitzen unter Verbreitung von Caramelgeruch und unter Aufblähen verkohlend. Sie löst sich in 0,75—1,0 Th. Wasser von 15° C, noch leichter in heissem Wasser. Sie ist löslich in 8 Th. Weingeist (von 90 Vol. %), nicht löslich in Aether, Chloroform, Benzin, Benzol u. dgl. — Das spec. Gewicht der Krystalle ist 1,764. Sie schmelzen bei 170° C unter Uebergehen in die amorphe, aber im übrigen gleich zusammengesetzte Modifikation, die bei 120° C schmelzende Meta-Weinsäure s. diese S. 71. Konc. Schwefelsäure löst Weinsäure langsam auf, wirkt aber bei gewöhnlicher Temperatur nur wenig ein. Beim Erwärmen auf 50—60° C aber tritt Verkohlungs- und Entwicklung von Schwefligsäure, Kohlensäure und Kohlenoxyd ein, die Flüssigkeit färbt sich dabei braun bis schwarz. Die wässrige Lösung der gewöhnlichen Weinsäure lenkt die Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts ab (r^0).

100 Th. Wasser lösen nach LÉRON: an Weinsäure bei

0°	10°	20°	30°	40°	50°	75°	100° C
115	125,7	139,4	156,2	176	195	258	343 Theile

Volum.-Gewicht der Weinsäurelösungen

bei 15° C (GERLACH)

Vol. Gew.	Proc. $C_4H_6O_6$	Vol. Gew.	Proc. $C_4H_6O_6$	Vol.-Gew.	Proc. $C_4H_6O_6$	Vol. Gew.	Proc. $C_4H_6O_6$
1 0045	1	1 0761	16	1 1615	32	1 2568	48
1 0090	2	1 0865	18	1 1726	34	1 2696	50
1 0179	4	1 0939	20	1 1840	36	1 2823	52
1 0273	6	1 1072	22	1 1959	38	1 2961	54
1 0371	8	1 1175	24	1 2078	40	1 3093	56
1 0469	10	1 1282	26	1 2198	42	1 3220	57 9
1 0565	12	1 1393	28	1 2317	44		(a
1 0661	14	1 1505	30	1 2441	46		gesättigt)

Die Weinsäure ist eine zweibasische Säure, ihre Salze, von denen man saure und neutrale kennt (auch Doppelsalze), heissen „Tartrate“.

Erkennung und Bestimmung Man erkennt die Weinsäure an folgenden Reaktionen.

1) Versetzt man eine nicht zu verdünnte Lösung von Weinsäure (oder die mit Essigsäure angesäuerte Lösung eines Tartrates) mit der Lösung eines Kalumsalzes (KCl , KNO_3), am zweckmässigsten mit Kaliumacetatlösung, so entsteht sogleich oder nach einiger Zeit ein Niederschlag von saurem Kalumtartrat $C_4H_6KO_6$. Zusatz von Alkohol, kühle Temperatur, sowie Umrühren der Flüssigkeit beschleunigt die Bildung des Niederschlages. Durch Einwirkung ätzender oder kohlensaurer Alkalien wird der Niederschlag gelöst. 2) Freie Weinsäure wird durch Calciumchlorid- und Calciumsulfatlösung nicht gefällt. Wird die Lösung der Weinsäure dagegen neutralisirt, so entsteht durch Calciumchlorid oder Calciumsulfat (auch durch Neutralisation freier Weinsäure mit Kalkwasser) eine Fällung von krystallinisch werdendem Calciumtartrat. Dieses wird von Essigsäure, ferner von Ammoniumchlorid, sowie durch Kal- oder Natronlauge gelöst. Die Lösung in den (kohlensäurefreien) Alkalilösungen trübt sich beim Erhitzen gelatinös, beim Erkalten verschwindet die Trübung wieder. 3) Bleiacetat fällt aus Weinsäurelösung weisses Bleitartrat, welches in Salpetersäure, auch in Ammoniak löslich ist. 4) Bei Gegenwart genügender Mengen von Weinsäure wird die Fällung von Eisenoxyd, Aluminium und Kupfersalzen durch ätzende Alkalien verhindert. 5) Unterscheidung von Citronensäure ist durch

das Verhalten beim Erwärmen mit konz. Schwefelsäure, ferner durch die zu beobachtende Rechtsdrehung möglich

Bestimmung Liegt lediglich freie Weinsäure vor, so kann man diese mit Normalnatronlauge und Phenolphthalein als Indikator titrieren. 1 ccm Normal-NaOH zeigt 0,075 g Weinsäure $C_4H_6O_6$ an.

Ist die Bestimmung in Gemischen mit anderen Säuren oder in Tartraten auszuführen, so versetzt man die betreffenden Lösungen (die der Tartrate nach dem Ansäuern mit Essigsäure) mit einem Ueberschuss alkoholischer Kaliumacetatlösung, alsdann mit soviel Alkohol, dass der Alkoholgehalt der Flüssigkeit etwa 50 Proc beträgt, und lässt 12 Stunden an einem kühlen Orte stehen. Die nach dieser Zeit ausgeschiedenen Krystalle von Kalumbitartrat werden auf einem Filter mit Alkohol gewaschen, dann sammt dem Filter in ein Kolbchen gebracht und in heissem Wasser gelöst. Die Lösung titirt man mit (— Phenolphthalein als Indikator —) Normalkalilauge. 1 ccm Normal-KOH zeigt unter diesen Umständen 0,15 g Weinsäure $C_4H_6O_6$ an.

Prüfung. Durch zufällige Verwechslung kann gelegentlich einmal Oxalsäure in die Weinsäure gelangen. Man ziehe daher bei der Prüfung ein von zahlreichen Krystallen herrührendes Durchschnittsmuster. Von Verunreinigungen ist wesentlich auf Blei, Kalk und Schwefelsäure zu achten.

1) 1 g der von mehreren Krystallen herrührenden Probe löse sich langsam aber vollständig in 5 ccm Weingeist (96%) auf. Ungelöst würden die meisten, ihrer Natur nach hier nicht näher aufzuführenden Beimengungen bleiben. 2) Die wässrige Lösung 1:10 werde weder durch Baryumchlorid (Schwefelsäure), noch, nach dem Uebersättigen mit Ammoniak, durch Ammoniumoxalat (Kalk) getrübt und durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Metalle). 3) 1 g der Säure hinterlasse beim Verbrennen keinen wägbaren Rückstand. 4) Neutralisirt man 5 g Weinsäure mit Ammoniakflüssigkeit, macht alsdann mit Weinsäure wieder schwach aber deutlich sauer, so darf durch Einleiten von Schwefelwasserstoff keine dunkle Färbung entstehen (Spuren von Blei, welche sich dem Nachweis sub 2 entziehen). Das verwendete Ammoniak muss eisenfrei sein.

Völlig bleifreie Weinsäure kann nur durch Umkrystallisiren der bleifreien Weinsäure des Handels in Gefassen aus Porcellan gewonnen werden.

Pulverung. Man trocknet die Krystalle gut im Trockenschranke und stösst sie in einem erwärmten Mörser aus Stein oder Porcellan. Der Stösser hat sich bei dieser Arbeit Mund und Nase zu verbinden. Beim Stossen im Eisen-Mörser nimmt das Weinsäure-Pulver eine schmutzige Färbung an.

Anwendung. Weinsäure wirkt in kleinen Mengen und in starker Verdünnung innerlich kühlend, durstlöschend, ähnlich wie Citronensäure. Setzt die Pulsfrequenz herab. Stört bei längerem Gebrauche die Verdauung. Gaben von 30 g können tödlich wirken. Innerlich als durstlöschendes, kühlendes Mittel in Limonaden, Bestandtheil von Brausepulvern. Technisch in der Färberei und Kattundruckerei.

Limonada sicca

Limonade sèche Pulvis ad Limonadam

Rp Acidi tartarici 5,0
Elaeosacchari Citri 1,5
Sacchari albi 100,0

Limonade tartrique (Gall.)

Potus cum Acido tartarico Limonada tartarica.

Rp Sirupi Acidi tartarici (Gall.) 100,0
Aquae destillatae 900,0

Mixtura Acidi tartarici

Mixtura acida vegetabilis

Rp Acidi tartarici 2,5
Aquae destillatae 150,0
Sirupi Sacchari 50,0

Pastilli Acidi tartarici

Rp Acidi tartarici 5,0
Sacchari albi 100,0
Spiritus diluti q s ad pastill 100

Sirup d'Acide tartrique (Gall.)

Sirupus Acidi tartarici
Rp Acidi tartarici 10,0
Aquae destillatae 10,0
Sirupi Sacchari 980,0

Arcanum Anosmin Fusswasser des Apotheker Koch, gegen übelriechenden Fusschweiss, ist eine wässrige Lösung von Weinsäure.

Acidum uricum.

Acidum uricum (seu uranicum). Harnsäure. Acide urique. Acide lithique.
Uric acid. Urinsäure. Blasensteinsäure $C_5H_4N_4O_6$. Mol Gew = 168

Darstellung 1) Schlangensexkremente 5 Th werden in 100 Th siedende Kallauge (5 Proc KOH enthaltend) eingetragen, die Mischung wird unter Umrühren so lange gekocht, bis Ammoniak nicht mehr entweicht. Die heisse Lösung wird filtrirt, alsdann leitet man in das Filtrat so lange Kohlensäure ein, bis es kaum noch alkalisch reagirt. Der entstandene Niederschlag von saurem Kalium urat wird nach dem Erkalten abfiltrirt und mit kaltem Wasser gewaschen. Dann löst man ihn von Neuem unter Erwärmen in Kallauge und filtrirt die heisse Flüssigkeit in heisse Salzsäure, worauf die Harnsäure als farbloses, krystallinisches Pulver ausfällt. Man sammelt dieses auf dem Filter, wäscht mit kaltem Wasser aus und trocknet es.


2) Vogelexcremente (Peru-Guano) 10 Th werden getrocknet, gepulvert und alsdann in 15 Th conc Schwefelsäure eingetragen, welche bis auf etwa $100^{\circ}C$ erwärmt ist. Man erhält die Mischung bei dieser Temperatur, bis alle Salzsäure (auch HF) ausgetrieben ist. Nach dem Erkalten verdünnt man mit 150 Th Wasser und stellt 1—2 Tage bei Seite. Der gebildete Bodensatz wird gesammelt, gewaschen und in siedende Aetzkallauge von etwa 8 Proc KOH eingetragen. Die filtrirte alkalische Lösung wird mit Thierkohle digerirt, heiss filtrirt und in Salzsäure eingeleitet. Ist die sich ausscheidende Harnsäure noch gefärbt, so wird sie nochmals in heisser Kallauge gelöst, alsdann fügt man vorsichtig soviel Salzsäure hinzu, bis die in der Ruhe geklarte Flüssigkeit nur noch hellgelb erscheint, filtrirt und zersetzt nunmehr das Filtrat vollständig durch Zufügung eines Ueberschusses von Salzsäure. Im Uebrigen ist wie unter No 1 zu verfahren.

Eigenschaften Aus der alkalischen Lösung wird durch Samen zunächst wasserhaltige Harnsäure ($C_5H_4N_4O_6 + 2H_2O$) in Flocken abgeschieden, welche aber bald in die krystallinische, wasserfreie Harnsäure übergeht. Diese letztere ist ein weisses, körniges, mikrokrySTALLINISCHES Pulver, ohne Geruch und Geschmack. Löslich in etwa 15000 Th kaltem oder 2000 Th siedendem Wasser, unlöslich in Alkohol und in Aether. Durch ein gewisses Lösungsvermögen für Harnsäure sind ausgezeichnet Natriumbikarbonat, Lithiumbikarbonat, Piperazin, Lysin, Lycetol. In schwächerem Grade wirken Borsäure, phosphorsäure, milchsäure und essigsäure Alkalien. Harnsäure ist nicht ohne Zersetzung flüchtig. Beim Erhitzen wird sie zersetzt unter Abscheidung von Kohle (Geruch nach verengtem Horn) und Bildung von Cyanwasserstoff, Cyanursäure, Harnstoff und Ammoniak. Conc Schwefelsäure löst sie in der Kälte ohne Veränderung, beim Erhitzen tritt Zersetzung ein.

Die Harnsäure ist eine zweibasische Säure, die Salze heissen „Urate“. Die neutralen Urate der Alkalien sind wenig beständig, werden z. B. schon durch Einwirkung der Kohlensäure der Luft in saure Urate übergeführt. Von den Uraten sind nur die neutralen Urate der Alkalien in Wasser relativ leicht löslich, alle übrigen Urate, auch die sauren Urate der Alkalien, sind in Wasser schwer löslich bez. unlöslich.

Löst man etwas Harnsäure in Natronlauge und fügt einige Tropfen alkalische (Fehling'sche) Kupferlösung hinzu, so erfolgt in der Kälte langsam, beim Erhitzen rascher, Ausscheidung von weissem Cupro-urat (harnsaurem Kupferoxydul), durch Zusatz von etwas Natriumsulfit (Na_2SO_3) wird diese Ausscheidung beschleunigt. Versetzt man die alkalische Lösung der Harnsäure mit mehr Fehling'scher Lösung, so erfolgt beim Erhitzen Ausscheidung von gelbem oder rothem Kupferoxydul (daher ist die Verwechslung der Harnsäure mit Harnzucker bei der Untersuchung des Urins möglich, s. Urina). — Eine alkalische Lösung der Harnsäure reducirt Silbernitrat schon in der Kälte augenblicklich zu metallischem Silber. Betupft man Filterpapier mit Silbernitratlösung, und bringt auf diese

eine Lösung von Natriumkarbonat, so entsteht ein Fleck von Silberkarbonat. Bringt man auf diesen Harnsäure oder harnsaures Kalium, so erfolgt Schwarzfärbung.



kone Salpetersäure und verdampft auf dem Wasserbade zur Trockne. Bläst man auf den gelbrothlichen Rückstand etwas Ammoniak, so färbt er sich schön purpurroth, betupft man ihn mit Kalilauge, so entsteht prachtvoll blauviolette Färbung (Bildung von isopurpursaurem Kalium). Ähnliche Reaktionen geben Coffein, Theobromin und Xanthin.

Ueber Bestimmung der Harnsäure s. *Urina*.

Anwendung. Man hat vor etwa 20 Jahren versucht, die Harnsäure an Chinin zu binden und so ein wenig oder gar nicht bitter schmeckendes Chininsalz darzustellen. Auch das Ammoniumurat fand therapeutische Verwendung. Gegenwärtig kann die Harnsäure für die Therapie als obsolet gelten.

Noch im vorigen Jahrhundert führten einige Pharmakopöen die durch Harnsäure gehalt ausgezeichneten Exkremente einiger Vögel als *Stereus pavonis*, *gallinae* etc. auf. Für *Stereus caninum* (watten Entzian vom schwarzen Kötter) wird *Radix Gentianae albae pulverata* abgegeben.

Acidum valerianicum.

I. Acidum valerianicum (Ergänzb. Helv.) **Acidum valericum.** **Valeriansäure.** **Baldriansäure.** **Isovaleriansäure.** **Acide valérianique ordinaire ou officinal** (Gall.) **Acide valerique.** **Valerianic acid.** $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_3$. Mol. Gew. = 102. Im Handel unterscheidet man eine Baldriansäure aus Baldrianwurzel **Acidum valerianicum e radice**, welche von der Gall. aufgenommen ist, und eine Baldriansäure aus Amylalkohol, welche Ergänzb. und Helv. aufführen.

Darstellung. 1) Aus Baldrianwurzel (Nach Gall.) Man löst 600 g Kaliumdichromat in 10 Litern Wasser und fügt 1 Kilo. konc. Schwefelsäure hinzu. Diese Mischung, sowie weitere 40 Liter Wasser, giesst man auf 10 Kilo zerschnittene Baldrianwurzel und digerirt das Gemisch unter Umrühren 24 Stunden lang. Hierauf bringt man das Ganze in eine Blase und destillirt. Wenn etwa 10–12 Liter Destillat (welches das ätherische Oel enthält) übergegangen sind, giesst man das Destillat in die Blase zurück, beginnt die Destillation von neuem und setzt sie fort, bis das Uebergehende nicht mehr sauer reagirt. Man sättigt alsdann das Destillat mit Natriumkarbonat in geringem Ueberschuss und dampft die so erhaltene Lösung des Natriumvalerianates bis zur Sirupsconsistenz ein. Den Rückstand versetzt man mit verdünnter Schwefelsäure in leichtem Ueberschuss, trennt die hierdurch abgeschiedene Säureschicht nach dem Absetzen mit Hilfe eines Scheidetrichters und rektificirt sie aus einem Glaskolben.

2) Aus Amylalkohol. Zu einem Gemisch von 510 g fein gepulvertem Kaliumdichromat und 700 g Wasser, das sich in einem mit Rückflusskühler *B* verbundenen Rundkolben *A* von etwa 3 Liter Fassungsraum befindet, lässt man allmählich aus einem Hahntrichter *C* ein Gemisch von 100 g Gährungsamylalkohol (Siedep. 128–130°) und 390 g konc. Schwefelsäure hinzuströmen (Fig. 29). Sobald die schon bei gewöhnlicher Temperatur eintretende Reaktion vorüber ist, erhitzt man den Kolbeninhalt auf dem Sandbade zum Sieden. Wenn die im Kolbenhalse auftretenden öligen Streifen von Valeraldehyd $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ nicht mehr wahrnehmbar sind, und die Flüssigkeit eine rein dunkelgrüne Farbe angenommen hat, so ist die Oxydation als beendet anzusehen.

Man dreht alsdann den Kühler um und destillirt mit absteigendem Kühler, von Zeit zu Zeit das verdampfte Wasser ersetzend, solange, als das Uebergehende noch sauer reagirt.

Die in der Vorlage angesammelte Flüssigkeit besteht aus zwei Schichten, nämlich einer wässrigen Lösung von Valeriansäure und einer leichteren, gelb gefärbten ölartigen Schicht von Valeriansäure-Amylather. Das Gesamtdestillat wird jetzt mit Natriumkarbonat bis zur alkalischen Reaktion der unteren, wässrigen Salzlösung versetzt, letztere im Scheide-

trichter von dem aufschwimmenden Oele getrennt und dann auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft.¹⁾ — Das trockene, feingepulverte valeriansaure Natrium bringt man in einen engen Cylinder und zersetzt es durch $\frac{1}{2}$ seines Gewichtes conc. Schwefelsäure, die vorher mit der Hälfte ihres Gewichtes Wasser verdünnt worden war. Die Valeriansäure scheidet sich hierbei als Oel ab. Man hebt dieses ab, entwässert es durch Stehenlassen über geschmolzenem Calciumchlorid und destillirt mit eingesenktem Thermometer ab. Wenn die Siedetemperatur 170°C . erreicht hat, wechselt man die Vorlage und fängt das bis 178°C . Uebergehende gesondert auf. Durch nochmalige Rectifikation dieser Fraktion erhält man die Säure farblos und rein.

Eigenschaften. Klare, farblose, unangenehm baldrianartig riechende, flüchtige, sauer reagirende Flüssigkeit, in 26 Th. Wasser löslich, mit Weingeist, Aether und Chloroform in allen Verhältnissen mischbar. Das spec. Gewicht wird verschieden angegeben: Ergänzb. = 0,938 bei 15° , Helv. = 0,955 bei 15° , Gall. = 0,955 bei 0° . Siedepunkt etwa 175°C . Schüttelt man die Baldriansäure mit Wasser, so entsteht das Hydrat $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$.




Fig. 29.

dessen spec. Gewicht bei 15°C . = 0,955 ist. Daraus ergibt sich, dass Helv. und Gall. das Hydrat, das Ergänzb. dagegen die wasserfreie Säure verlangen. Fügt man zu der gesättigten wässrigen Lösung der Baldriansäure leicht lösliche Salze (NaCl , CaCl_2), so scheidet sie sich in Form öligler Tröpfchen aus.

Man erkennt die Valeriansäure am einfachsten und sichersten an ihrem durchdringenden Geruche. Erwärmt man sie oder eines ihrer Salze mit einer Mischung von 3 Th. conc. Schwefelsäure und 1 Th. Alkohol, so tritt ein angenehmer Fruchtäther-Geruch auf. Die Baldriansäure ist eine einbasische Säure; ihre Salze heißen „Valerianate“. Sie haben fettartigen Habitus, d. h. sie sind fettartig anzufühlen.

Prüfung. 1) Sie zeige das spec. Gew. 0,938 bei 15°C ., siede bei 175°C . und löse sich in nicht weniger als 26 Th. Wasser. — 2) Neutralisirt man Baldriansäure mit Ammoniak und fügt Eisenchlorid hinzu, so entsteht ein braunrother Niederschlag; die beim Schütteln über diesem sich sammelnde Flüssigkeit ist farblos (Rothfärbung = Ameisensäure oder Essigsäure). 3) Wird die wässrige Lösung der Baldriansäure mit Cupriacetat versetzt, so darf nicht sofort ein krystallinischer Niederschlag (Buttersäure) entstehen,

¹⁾ Aus dem abgehobenen öligen Liquidum lässt sich der Valeriansäureamyläther (Siedep. 190°C .) durch Destillation leicht rein erhalten.

es müssen sich vielmehr ölige Tropfen abscheiden, die erst nach einiger Zeit krystallinisch werden

4) 1 g wasserfreie Baldriansäure muss 9,8 cem Normal-Natronlange (Phenolphthalein als Indikator) sättigen 1 g des Hydrates $C_6H_{10}O_2 + H_2O$ sättigt = 8,83 cem Normal-Natronlange

Aufbewahrung. In Glasgefäßen mit Glasstopfen an einem kühlen Orte, von anderen Arzneimitteln möglichst getrennt, da diese nur zu leicht den Geruch der Säure annehmen

Anwendung. Baldriansäure wird nur selten in Substanz und alsdann in verdünnter Lösung zu 3—6—10 Tropfen bei Krampf, epileptischen Anfällen, Hysterie gegeben Hauptsächlich benutzt man sie zur Darstellung der valeriansäuren Salze

II Ammonium valerianicum (Hely U-St) Ammoniumvalerianat. Baldriansäures Ammon. Valerianate d'ammoniaque (Gall) Valerianate of ammonia $C_6H_9O_2NH_4$ Mol Gew. = 119.

Darstellung. Man giest wasserfreie Valeriansäure in dünner Schicht auf eine Unterfasse und stellt diese in einen mit Tubus versehenen Exsiccator In diesen leitet man alsdann einen Strom durch Aetzkalk getrocknetes Ammoniak ein, wodurch sich das neutrale Ammoniumvalerianat in Krystallen bildet

Eigenschaften Farblose, sehr hygroskopische Prismen von dem Geruch der Baldriansäure und etwas scharfem, zugleich etwas süßlichem Geschmack, meist von saurer Reaktion, da das Salz sehr bald Ammoniak verliert Sehr leicht löslich in Wasser und in Alkohol, löslich in Aether Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid einen braunen Niederschlag, die überstehende Flüssigkeit darf nicht rothgefärbt erscheinen (Ammoniumacetat oder -format)

Aufbewahrung. In kleinen Glasgefäßen mit paraffinirten Korken, um das Anziehen von Feuchtigkeit möglichst zu verhüten

Anwendung. Innerlich zu 0,05—0,2 g mehrmals täglich in Pillen oder Lösung bei Neuralgien, Hysterie, Epilepsie, Chorea, Singultus Im Klystier 0,1—0,2 200 Aqua

Solutio Ammonii valerianici, 20 Proc $C_6H_9O_2NH_4$ enthaltend Man neutralisirt 17,14 g wasserfreie Valeriansäure mit 28,6 g Ammoniakflüssigkeit (0,96 spec Gew) und füllt mit Wasser auf 100 g auf 5 Th dieser Lösung sind = 1 Th trockenem Ammoniumvalerianat Receptur-Erleichterung!

III Liquor Ammonii Pierlot. Ammonium valerianicum solutum (Hely) Acid: valerianici 3,0, Extracti Valerianae 2,0, Aquae destillatae 95,0, Ammonii carbonici q s ad neutralisationem Bei Hysterie, Epilepsie 6—30 Tropfen in Zuckerwasser

Elisir Valerianatis ammoniacali
GODDARD Arcanum

Rp Acidi valerianici	3,0
Ammonii carbonici	1,6
Aquae destillatae	40,0
Spiritus (90 Proc.)	85,0
Aquae Cerasorum	80,0
Tincturae Cinnamomi	15,0
Tincturae Aurantii corticis	5,0
Sirupi Sacchari	80,0

S. Dreistündlich einen halben Esselöffel voll

Liquor Ammonii valerianici

(Vorschrift der Pariser Hospital-Apotheke)

Rp Acidi valerianici	
Ammonii carbonici	
Extracti Valerianae	3,0
Aquae destillatae	100,0

In Stelle des Liquor Ammonii Pierlot

Acmella.

Spilanthes Acmella L. Compositae—Helianthaceae—Verbesininae. Heimisch in Ostindien Man verwendet die ganze blühende Pflanze (Abe-Kraut, Abecedaire, Indianisches Harnkraut), die von brennend scharfem Geschmack ist, als die Speichelsekretion beförderndes Mittel, gegen Skorbut etc Eine Anzahl anderer Arten, z B *Sp. oleracea* Jacq (Parakresse) in Südamerika, werden ähnlich verwendet (cf *Spilanthes*).

Acokanthera.

Gattung der Apocynaceae—Carisseae

Acokanthera Schimper Benth. et Hook., **A. Defflersii** Schweinf., **A. Ouabaro** Cathelineau (?), **A. venenata** G. Don und vielleicht noch andere Arten liefern in Ost- und Sudafrika in ihrem Holz und der Rinde ein Pfeilgift, das lähmend wirkt. Der wirksame Stoff scheint ein amorphes Glykosid, Ouabain zu sein, indessen steht nicht fest, ob derselbe in allen Arten identisch ist. Die kahlen **Strophanthussamen** von Gaboon (Str. **giatus** Franchet) sollen ebenfalls Ouabain enthalten. Es scheint, als ob auch zwischen dem Ouabain und dem Strophanthum der offiziellen Samen nahe Beziehungen bestehen.

Die Hoffnungen, die man darauf als theilweisen Ersatz der *Digitalis* und als lokales Anästhetikum gesetzt hat, scheinen sich nicht zu erfüllen.

†† *Tinctura Acokantherae*, aus einem Theile des zerkleinerten Wurzelholzes der *Ac. Schimper* und zehn Theilen verdünntem Weingeist bereitet, dürfte die geeignetste Form einer pharmaceutischen Zubereitung sein. Die Gabe derselben wäre auf 0,25–0,8 g, entsprechend einem Gehalte von 0,0001 Ouabain, zu bemessen.

Aufbewahrung in gelbgefärbten Flaschen unter den sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mitteln.

Aconitinum.

†† **Aconitinum** (Ergänz.) **Aconitina** (Brit.) **Akonitin** **Aconitine** (Gall.) **Aconitia**.

Allgemeines Die wirksamen Bestandtheile der Aconitarten bestehen nicht aus einheitlichen chemischen Individuen, sondern vielmehr aus Gemengen verschiedener Basen (Alkaloide). Die chemische Zusammensetzung der einzelnen Basen und die relativen Mengenverhältnisse, in denen diese Basen zu einander auftreten, sind abhängig von der Art der Pflanze und von ihrem Wachsthum (Standort), so dass das Vorwiegen bestimmten Basen für bestimmte Aconit-Arten eigenthümlich ist. Ausserdem ist zu beachten, dass die Aconit-Basen gegen Mineralsäuren, concentrirte organische Säuren, starke Alkalien und erhöhte Temperaturen sehr empfindlich sind. Es treten durch deren Einwirkung Spaltungsprodukte auf, welche das Endprodukt verunreinigen. Aus allen diesen Gründen liegt die chemische Kenntniss der Aconit-Alkaloide noch sehr im Argen. Im Nachfolgenden soll der gegenwärtige Standpunkt dieser Frage kurz skizzirt werden.

Die Stammpflanzen 1) *Aconitum Napellus* L. enthält als Haupt-Alkaloid das krystallisierende Aconitin, wahrscheinlich mit kleinen Mengen amorphen Pikro-Aconitins, neben wenig bekannten Basen (Napellin?).

2) *Aconitum ferox* Wall. Enthält nur geringe Mengen Aconitin, als Hauptbase dafür das krystallisierende Pseudo-Aconitin (ψ -Aconitin) neben kleinen Mengen amorpher, nicht näher bekannter Alkaloide, ferner ψ -Aconin und kleine Mengen Aconitin.

3) *Aconitum Lycoctonum* L. Enthält nach HUBSCHMANN zwei Aconyctin und Lycoctonin genannte Basen, nach WRIGHT dagegen ψ -Aconitin und wenig Aconitin.

4) *Aconitum heterophyllum* Wall. Enthält das amorphe, leicht giftige Atesin, ferner ein zweites amorphes und ungiftiges, nicht näher bekanntes Alkaloid.

5) *Japanische Aconitwurzel* von *Aconitum Fischeri* Rohrbch. enthält als Hauptbase das krystallisierende Japanaconitin, neben wenig bekannten, amorphen Alkaloiden.

Die Alkaloide. *Aconitin* Formel unbestimmt. WRIGHT und LUFF = $C_{33}H_{45}NO_{12}$, JURGENS = $C_{33}H_{45}NO_{12}$, EHRENBERG und PURFURST = $C_{32}H_{43}NO_{11}$, DUNSTAN = $C_{33}H_{45}NO_{12}$, FREUND = $C_{34}H_{47}NO_{11}$. Schmelzpunkte verschieden angegeben 184°, 194°, 197–198° C. Krystallform in sechsseitigen Tafeln. Durch hydrolytische Spaltung lässt sich dasselbe successive folgendermassen zerlegen ¹⁾



¹⁾ Wir folgen hier den Angaben von FREUND.

Demnach ist das Picro-Aconitin als Benzoyl Aconin und das Aconitin als Acetyl Benzoyl-Aconin aufzufassen

Picro-Aconitin (identisch mit dem Iso-Aconitin von Dunstan) $C_{18}H_{15}NO_{10}$ Weisses amorphes, sehr bitter schmeckendes Pulver, Schmelz P 125° C, ist Benzoyl-Aconin

Aconin $C_{18}H_{17}NO_5$ Amorphes, bitter schmeckende Base Spaltungsprodukt des vorigen, giebt ein gut kristallisirtes Chlorhydrat, $C_{18}H_{17}NO_5 \cdot HCl$, Schmelz P circa 175° C

apo-Aconitin (von Wright) ist wahrscheinlich identisch mit Aconitin

Napellin (Wagner), angeblich amorphes Alkaloid, aus Aconitum Napellus, ist wahr scheinlich ein Gemenge von Aconitin, Picro Aconitin und Aconin

Pseudo Aconitin ψ Aconitin $C_{18}H_{19}NO_{10}$ Dicke, sechseckige Tafeln Schmelz-Punkt 212–218° C Spaltet sich beim Kochen mit Wasser in Essigsäure und Picro ψ -Aconitin Ist als Acetyl-Veratryl- ψ -Aconin anzusehen

Picro ψ -Aconitin $C_{18}H_{17}NO_{11}$ Weisses, dicke Krystallsäulen Schmelz-P 210° C Spaltungsprodukt des vorigen, ist Veratryl ψ -Aconin und zerfällt beim Kochen mit Kalilauge in Veratrinensäure und ψ Aconin $C_{18}H_{17}NO_{11} + H_2O = C_{16}H_{16}O_4 + C_{12}H_{10}NO_6$

ψ Aconin $C_{15}H_{13}NO_5$ Spaltungsprodukt des vorigen Frömsartige, bitter schmeckende Masse, giebt mit Aconin eine gut kristallisierende Verbindung

Japacconitin $C_{18}H_{15}N_3O_{21}$ (?) bei $C_{18}H_{17}NO_5$ (?), nach Einigen mit Aconitin identisch Farblose, bei 181–183° C schmelzende Krystalle Werden durch Kalilauge in Benzoesäure und Japacconin $C_{16}H_{13}NO_{10}$ (?) gespalten

Handelssorten. Man unterschied früher und unterscheidet z Th auch noch heute je nach dem Ausgangsmaterial und der Bereitungsweise eine Anzahl verschiedener Aconitin-Sorten Die wichtigsten sind folgende

I. ψ -Aconitium germanicum. Deutsches Aconitin. Aus Aconitum Napellus bereitet

Darstellung 100 Th gröbgepulverte Aconitknollen werden bei 60° C zweimal mit je 500 Th Alkohol (80%) extrahirt Man filtrirt die Auszüge, destillirt den Alkohol aus dem Wasserbade ab, scheidet den Rückstand mit stark verdünnter Schwefelsäure mässig aber deutlich an, verdünnt mit Wasser und filtrirt — um Fett und Harz zu entfernen — durch ein gemesstes Filter ab Die saure Lösung wird zur Reinigung mit Aether oder Petroläther ausgeschüttelt, alsdann übersättigt man sie schwach mit Natriumkarbonat, wodurch die Basen ausfallen Diese werden nach 24stündigem Stehen gesammelt, mit wenig Wasser gewaschen, getrocknet und mit Aether aufgenommen Man filtrirt die ätherische Lösung, zieht den Aether durch Destillation ab und nimmt den Rückstand mit schwefelsäurehaltigem Wasser auf Die schwefelsaure Lösung wird durch Thierkohle entfärbt,¹⁾ alsdann fällt man aus ihr die Basen durch vorsichtigen, fraktionirten Zusatz von Ammoniak, d h die durch wenig Ammoniak zuerst ausfallenden (gefärbten) Antheile werden gesondert gesammelt, indem man die Flüssigkeit, sobald die Basen anfangen ungelöst auszufallen, filtrirt und in dem Filtrat die Fällung durch Ammoniak beendet Nach 24stündigem Stehen sammelt man die ausgeschiedenen Basen, wäscht sie mit wenig Wasser und trocknet bei niedriger Temperatur

Eigenschaften. Weisses oder gelblichweisses, geruchloses, amorphes, luftbeständiges Pulver von alkalischer Reaktion und bitterem, hintenach kratzendem Geschmack In kaltem Wasser wenig löslich, in siedendem Wasser zu einer knetbaren Masse zusammen backend Löslich in 4–5 Th Alkohol von 90 Proc, in 2–3 Th Aether oder in 3 Th Chloroform, ferner in Petroläther und Amylalkohol

Reaktionen. 1) Kone Schwefelsäure löst es mit gelber Färbung, welche nach 2–3 Stunden durch Gelbroth in Rothbraun und Braun, schliesslich in Violettoth übergeht 2) Löst man 0,01 g Aconitin in 8 cem Phosphorsäure (25 Proc) und dampft in einem Porzellanschälchen auf dem Wasserbade ab, so tritt bei einer gewissen Konzentration Violettfärbung auf, welche ziemlich lange beständig ist Delphinin und Digitalin verhalten sich ähnlich, Delphinin löst sich aber in kone Schwefelsäure hellbraun, und diese Lösung wird erst auf Zusatz von Bromwasser röthlich violett, und Digitalin löst sich in kone Schwefelsäure mit grüner Farbe — Gegen die allgemeinen Alkaloid-Reagentien verhält es sich ähnlich wie das reine kryst Aconitin, s dieses

¹⁾ Hier beginnt die Abweichung der französischen Vorschrift

Das deutsche Aconitin ist ein Gemisch der in den Aconit-Knollen enthaltenen Basen und ihrer Zersetzungsprodukte Aconitin, Pikro-Aconitin (= Iso Aconitin), Aconin u. a. Es galt früher für das mildeste Präparat

II †† Aconitinum gallicum (Aconitin Horrot & Lirgeois) Französisches Aconitin. (Amorphes) Wird aus den Knollen von Aconitum Napellus in ähnlicher Weise wie das deutsche Präparat dargestellt mit folgender Abweichung Die schwefelsaure Lösung der Basen wird ebenfalls mit Thierkohle entfärbt, aber vor der Fällung durch Ammoniak mit Magnesiumoxyd (MgO) in geringem Ueberschuss versetzt, worauf man mit Aether ausschüttelt Der nach dem Verdampfen des Aethers hinterbleibende Rückstand wird mit schwefelsaurehaltigem Wasser aufgenommen, die Lösung mit Thierkohle entfärbt und nunmehr die Fällung durch Ammoniak ausgeführt (Vgl die Fussnote auf S 148)

Amorphes weisses Pulver, in seinen physikalischen Eigenschaften, seiner Zusammensetzung und Wirkung dem vorigen (Aconitinum germanicum) etwa gleichstehend

III †† Aconitinum Duquesnel. Aconitine cristallisé ou pure kann als physiologisch reines Aconitin angesehen werden Darstellung und Eigenschaften s unter Aconitinum cristallissatum Aus Aconitum Napellus bereitet

IV. †† Aconitinum anglicum Aconitina-Morson. Morson's Napellin ¹⁾ Aconitine pure. Hübschmann's ψ Aconitin Flüchiger's Napellin. Wird aus den Knollen von Aconitinum ferox in ähnlicher Weise hergestellt, wie die oben beschriebenen deutschen und französischen Präparate Enthält als Hauptbase ψ Aconitin (60—70%), ferner 0,6—1,2% Aconitin, 25—30% ψ Aconin, ausserdem nicht näher bekannte amorphe Basen Fein vertheiltes, schmutzig weisses Pulver, von brennendem, nicht bitterem Geschmack, alkalischer Reaktion Löslich in 20 Th siedendem Weingeist und aus dieser Lösung beim Erkalten Krystalle abscheidend, ferner in 100 Th siedendem Aether, auch in 230 Th Chloroform Durch conc Schwefelsäure wird es nicht gefärbt Gegen Salpetersäure und schmelzendes Kali verhält es sich wie ψ Aconitin

V †† Japaconitin. Ist entweder eine Base sui generis oder mit Aconitin identisch

Diese Unterschiede sind gegenwärtig, wo das Bestreben dahin geht, unsichere Gemische vom Arzneigebrauch auszuschliessen, nicht mehr aufrecht zu erhalten Lediglich um das Verständnis für die historische Entwicklung der Aconitinfrage zu ermöglichen, mussten die einzelnen Präparate hier besprochen werden

Heute unterscheidet man zweckmässig

- | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1) Aconitin. | a) amorph, | 2) Pseudaconitin. | 3) Japaconitin. |
| | b) krystallisirt | | |

I †† Aconitinum amorphum Amorphes Aconitin. Aconitina (Brit von 1885) Wird aus den Knollen von A Napellus nach einer der schon angegebenen (deutschen und französischen) Vorschriften dargestellt Eigenschaften und Reaktionen bereits angegeben.

Darstellung nach Brit 1885 Die gepulverten Knollen werden mit der doppelten Menge Spiritus (90 Proc) bis zum beginnenden Sieden erwärmt, 4 Tage macerirt, alsdann bis zur Erschöpfung percolirt Der Alkohol wird aus dem Auszuge abdestillirt, der letzte Rest im Wasserbade entfernt Man nimmt alsdann den Rückstand mit dem doppelten Gewichte siedenden Wassers auf und filtrirt nach dem Erkalten Man fällt die filtrirte Lösung unter schwachem Erwärmen mit Ammoniak und extrahirt den getrockneten Niederschlag mit Aether Die ätherischen Auszüge werden abdestillirt, der Rückstand wird in schwefelsaurehaltigem Wasser gelöst und die filtrirte Lösung nochmals mit 2,5 proc Ammoniak gefällt. Der erhaltene Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser gewaschen, abgepresst und an der Luft getrocknet (Brit Pharm 1885)

¹⁾ Hierbei ist zu beachten, dass Pharm Brit von 1885 ein amorphes Aconitin aus den Knollen von A Napellus aufgenommen hatte, welches von diesem Präparat völlig verschieden ist

II †† Aconitum crystallisatum (Gall. Ergänzb.) Krystallisirtes Aconitin Aconitina (Brit.) $C_{34}H_{47}NO_{11}$ (?) Mol. Gew. = 645

Darstellung. Man extrahirt 1 kg grobgepulverte Aconitknollen (von A. Napellus) zweimal mit je 2,5 kg Alkohol von 90 Proc., in welchem je 10 g Weinsäure aufgelöst sind, bei einer Temperatur von 50–60° C und presst jedesmal schauf ab. Die Auszüge werden filtrirt, darauf destillirt man im Vacuum den Alkohol ab. Den Rückstand nimmt man mit etwa 500–700 cem Wasser auf und filtrirt nach 2–3 Tagen von Fett, Harz etc. ab. Die filtrirte weinsäure Lösung wird zur Entfernung von Farbstoffen etc. dreimal mit je 800 cem Aether ausgeschüttelt. Nachdem sie vom Aether getrennt ist, übersättigt man sie mit Natriumbikarbonat und schüttelt neuerdings dreimal mit je 800 cem Aether aus. Von den filtrirten atherischen Auszügen destillirt man im Wasserbade den Aether ab und nimmt den Destillationsrückstand mit weinsäurehaltigem Wasser auf. Die saure Lösung wird wiederum mit Aether ausgeschüttelt, und falls sie stark gefärbt sein sollte, durch Thierkohle entfärbt. Dann übersättigt man mit Natriumbikarbonat und schüttelt nochmals dreimal mit Aether aus. Die vereinigten atherischen Auszüge werden dreimal mit Wasser gewaschen, dann versetzt man sie mit dem gleichen Volumen Petroläther und überlässt sie der freiwilligen Verdunstung, worauf das Aconitin in Krystallen hinterbleibt (Gall.).

Die so erhaltenen Krystalle verwandelt man durch Neutralisiren mit Bromwasserstoffsäure in das bromwasserstoffsäure Salz, krystallisirt dieses aus Wasser um und gewinnt aus demselben die Base durch Uebersättigen mit Natriumbikarbonat und Ausschütteln mit Aether wieder.

Eigenschaften. Farblose, säulen- oder tafelförmige, gegen 188° C (Ergänzb.), 189–190° C (Brit.) schmelzende (Gall. Schm. P. = 188°) Krystalle. In Wasser und in Petroläther nur wenig löslich, dagegen löslich in 24 Th. Alkohol von 90 Proc., 70 Th. Aether, 6 Th. Benzol, 3 Th. Chloroform, die Lösung ist linksdrehend, die wässrige Lösung reagirt alkalisch, schmeckt scharf, anhaltend brennend und kratzend, aber nicht bitter. Von konc. Schwefelsäure und Salpetersäure wird es ohne Färbung gelöst, auch giebt es nicht die Reaktion mit Vanadin-Schwefelsäure, s. ψ -Aconitin. Wird das reine Aconitin mit Phosphorsäure eingedampft, so entsteht entweder keine oder nur sehr schwach röthliche Färbung (vgl. Aconitin german. S. 148). Von den allgemeinen Alkaloid-Reagentien erzeugen noch in verdünnten Lösungen Niederschläge: Phosphormolybdänsäure, Jod-Jodkalium, Kalium-Quecksilberjodid (weiss), Kalium-Wismutjodid, Gerbsäure (weiss) und Goldchlorid (gelb), dagegen erst in konzentrirteren Platinchlorid (gelb), Quecksilberchlorid (weiss) und Pikrinsäure (gelb).

Prüfung. 1) Es verbrenne, ohne einen wägbaren Rückstand zu hinterlassen. 2) Trocknet man 0,01 g Aconitin im Porcellanschälchen mit 5 Tropfen rauchender Salpetersäure auf dem Wasserbade ein, so hinterbleibt ein kaum gelblich gefärbter Rückstand, welcher erkaltet, durch Uebergießen mit alkoholischer Kalilauge (1=10) keine Violettflüßung annimmt (Pseudoaconitin, Veratrin, Atropin).

Essigsäure Base, die Salze krystallisiren gut und sind nicht hygroskopisch.

†† Aconitum nitricum crystallisatum Aconitin-nitrat. Azotate d'Aconitine (Gall.) $C_{34}H_{47}NO_{11} \cdot HNO_3$ Mol. Gew. = 708

10 Th. gepulvertes Aconitin werden mit 100 Th. Wasser übergossen, alsdann neutralisirt man genau mit etwa 10 proc. Salpetersäure (wozu 8,5–3,6 g Salpetersäure von 25 Proc. erforderlich sind). Man dampft die Lösung im Wasserbade ein, worauf unter dem Schwefelsäure-Exsiccator Krystallisation erfolgt. Grosse, farblose, prismatische Krystalle, in 10 Th. siedendem Wasser löslich. Enthalten 91,10 Proc. Aconitin.

III †† Pseudo-Aconitum ψ -Aconitin. Pseudo-Aconitin. Nepalin. Napellin. (Wiggers) Aeraconitin. Pure Aconitine-Morson. $C_{36}H_{49}NO_{12}$ Mol. Gew. = 687.

Wird aus den Knollen von Aconitum ferox in der nämlichen Weise dargestellt, wie das krystallisirte Aconitin. Nur verwandelt man das durch Verdunsten der ätherischen Lösung erhaltene Alkaloid in das salpetersäure Salz, krystallisirt dieses aus Wasser

um und gewinnt aus demselben durch Zersetzen mit Natriumbikarbonat und Ausschütteln mit Aether die freie Base wieder

Eigenschaften Scheidet sich aus einer Mischung von Aether-Petrolather bei langsamer Verdunstung in durchsichtigen Nadeln oder körnigen Krystallen aus, bei rascher Verdunstung hinterbleibt es als amorphe, sirupöse Masse Enthält lufttrocken 1 Mol Krystallwasser, welches bei 100°C entweicht In Wasser nur wenig löslich, die Lösungen reagieren alkalisch und schmecken sehr brennend, aber nicht bitter In Alkohol und Aether leichter löslich als Aconitin

Von den allgemeinen Alkaloidreagentien fallen die verdünnte Lösung Kalium-Quecksilberjodid, Jod-Jodkalium, Gerbsäure, Goldchlorid Nur die konc Lösung wird durch Platinchlorid gefällt Mit konc Schwefelsäure und Phosphorsäure entstehen charakteristische Färbungen nicht (= Aconitin)

Einsaurige Base, von den Salzen krystallisiert nur das salpetersaure gut

Reaktionen 1) Dampft man 0,01 g ψ -Aconitin mit 5 Tropfen rauchender Salpetersäure im Porzellanschälchen auf dem Wasserbade ein, so hinterbleibt ein gelber Rückstand, welcher beim Befeuchten mit alkoholischer Kalilauge purpurroth wird 2) Wird 0,01 g mit 10 Tropfen konc Schwefelsäure vorsichtig erwärmt, so entsteht auf Zusatz von 5 Tropfen Vanadin-Schwefelsäure violettrothe Färbung 3) Vermischt man im Silbertiegel 0,1 ψ -Aconitin mit 1 g gepulvertem Kalihydrat, verwandelt die Masse durch Zugabe von 2–3 Tropfen Wasser in eine Paste und erhitzt mit kleiner Flamme zum ruhigen Schmelzen, so enthält die Schmelze (aus der Veratrumsäure gebildete) Protocatechusaure Löst man sie in Wasser auf, filtrirt und säuert mit Salzsäure schwach an, so entsteht durch Zugabe von wenig Ferrichlorid blaugrüne Färbung, welche durch wenig Natriumkarbonat in blau, durch mehr Natriumkarbonat in roth übergeht

†† **Pseudo-Aconitinum nitricum** ψ -Aconitinnitrat. $C_{34}H_{46}NO_{11} \cdot HNO_3 + 3H_2O$.
Mol. Gew. = 804.

Wird wie das entsprechende Aconitinsalz durch Neutralisation von ψ Aconitin mit stark verdünnter Salpetersäure erhalten Farblose, dünne, langgestreckte Säulen oder sechseckige Plattchen Löslich in 25 Th Wasser Enthält 85,44 Proc ψ Aconitin

IV. †† Japaconitinum Aus japanischen Aconitknollen (von Aconitum Fischeri u a) können nach den im Vorhergehenden beschriebenen Verfahren amorphe und krystallisirte Präparate erhalten werden Die chemische Kenntniss desselben ist überaus dürftig, ausserdem haben diese Präparate therapeutisch für die Praxis noch kein Interesse

Einkauf. Es empfiehlt sich, die Aconitin-Präparate nicht lose vom Drogisten, sondern direkt vom Fabrikanten (z B Merck-Darmstadt) bez Präparate in Original Packung zu beziehen und sich genau angeben zu lassen, welcher Art das gelieferte Präparat ist, und wie seine medicinalen Höchstgaben sind

Aufbewahrung. Sammtliche Aconitin-Sorten sind unter den direkten Giften aufzubewahren Die Recepte sind zweckmässig als Giftscheine zurückzubehalten

Anwendung. Das Aconitin gehört zu den stärksten Pflanzengiften Aeusserlich auf die unverletzte Haut oder auf die Schleimhaut gebracht, erzeugt es Prickeln und Brennen, welchem später Gefühlosigkeit folgt Resorption erfolgt auch bei äusserer Anwendung durch Haut und Schleimhaut, besonders leicht, wenn Verletzungen vorhanden sind In Form von Salben und Linimenten bei Muskelrheumatismus und Neuralgien (besonders Trigeminus Neuralgie) 0,1–0,2 Aconitin 10,0 Fett Cave Hineingelangen in Wunden und auf die Schleimhaut des Auges Innerlich setzt es die Pulsfrequenz und die Temperatur herab unter Abnahme der Sensibilität und der Reflexerregbarkeit Grosse Gaben bewirken Erbrechen, Durchfall, Kriebeln auf der Haut, allgemeine Schwäche, Athemnoth Der Tod erfolgt durch Respirationslähmung oder Herzstillstand Innerlich als temperaturherabsetzendes Mittel bei Gelenkrheumatismus, Neuralgien, nervösem Kopfschmerz, Zahn-

schmerz, Ohrenschmerz Subkutane Injektionen sind sehr schmerzhaft, bei diesen zweckmassiger das Aconitumnitrat

Dosirung. Die amorphen Aconitine besitzen weniger starke Wirkung als die krystallisierten. Da indessen die Zusammensetzung der amorphen Präparate grossen Schwankungen unterliegen kann, so lassen sich für diese bindende Höchstgaben überhaupt nicht angeben. Es giebt amorphe Sorten, welche nur $\frac{1}{1000}$, aber auch solche, welche $\frac{1}{2}$ des Wirkungsweithes des krystallisierten Aconitins besitzen, ja neuerdings sollen amorphe Präparate erhalten sein, welche die krystallisierten an Giftigkeit angeblich übertreffen.

Will man daher Aconitin überhaupt mit einiger Sicherheit gegen Arznei Vergiftungen anwenden, so verordne man lediglich die krystallisierten Sorten, d. h. *Aconitum crystallisatum* und *ψ-Aconitum crystallisatum* bezw. deren Nitrate, für welche die gleiche Dosirung gilt.

Man sieht für einen Erwachsenen an als Höchstgaben ¹⁾

	pro dosi	pro die
Aconitum crystallisatum et nitricum	0,0003	0,0006
ψ Aconitum crystallisatum et nitricum		

Hierzu ist zu bemerken, dass ψ-Aconitin bei innerlicher Darreichung dem Aconitin etwa an Giftigkeit gleichsteht, während es bei äusserlicher Anwendung etwas künftiger wirkt.

Für die Verwendung des Japaconitins liegt keine Veranlassung vor. Es empfiehlt sich unter allen Umständen, dass der Apotheker mit dem Arzte sich darüber verständigt, welches Präparat dispensiert werden soll. Die vorstehenden Ausführungen geben dem Apotheker eine hinreichende Information über die Aconitinfrage.

Die Ausscheidung des Aconitins erfolgt durch Harn, Koth und Speichel in unverändertem Zustande.

Pulvis Aconitini dilutus. Poudre d'Aconitine au centième (Gall.) Aconitin-Verreibung 1:100. Aconitum cryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Gummi 2,5. Das Aconitin wird mit einem Theil des Milchsuckers verrieben, dann setzt man den Gummi zu, verreibt bis zur homogenen Mischung und fügt unter weiterem sorgfältigen Verreiben den Rest des Milchsuckers in kleinen Antheilen zu.

Pulvis Aconitini nitrici dilutus. Poudre d'azotate d'Aconitine (Gall.) au centième. Aconitini nitrici cryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Gummi 2,5. Im übrigen wie das Vorige.

Granules d'Aconitine crystallisée (Gall.) Aconitin-Verreibung (1:100) 1,0 g [oder an deren Stelle 0,01 g Aconitum crystall. 0,99 g Sacchari Lactis], Sacchari Lactis 8,0, Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. Für 100 granules, welche roth zu färben sind 1 Granule = 0,0001 g Aconitin.

Granules d'azotate d'Aconitine (Gall.) Aconitumnitrat-Verreibung (1:100) 1,0, Sacchari Lactis 8,0, Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. für 100 granules, welche roth zu färben sind 1 Granule = 0,0001 g Aconitumnitrat.

Unguentum Aconitini (1:50 bis 100)

Rp Aconitini cryst. 0,1–0,2
Spiritus q. s.
Adipis 10,0

D. sub sigillo veneni

Infectio Aconitini.

Rp Aconitini nitrici 0,001
Aqua destillata 10,0

§ Zur subkutanen Injektion, 1 Spritze = 0,0001 g Aconitumnitrat

Pillulae Aconitini à 0,0001 g

Rp Aconitini crystall. (vel nitrici) 0,005
Radix Liquiritiae
Succ. Liquiritiae sa 8,0

Fiant pilulae 50. § 2–5 Pillen täglich. Jede Pille enthält 0,0001 g Aconitin oder Aconitumnitrat.

Unguentum Aconitinæ (Brit.)

Rp Aconitini crystallisati 0,5
Acidi oleici 4,0
Adipis 20,5

¹⁾ Man beachte indess, dass auch die krystallisierten Sorten je nach der Provenienz noch verschiedene Giftigkeit besitzen. Der Arzt wird also gut thun, mit erheblich kleineren Dosen zu beginnen.

Aconitum.

Gattung der Ranunculaceae — Helloboreae.

I Aconitum Napellus L. Heimisch in Europa (Gebirgswälder Deutschlands, Alpen, Pyrenäen etc., England, Skandinavien), Asien (Sibirien, Himalaya), Nordamerika (Namen 1) von dem kappenförmig vergrösserten Kelchblatt Eisenhut, Sturmhut, Helmkraut, Mönchskappe etc. 2) von den zu Nektarien umgewandelten Kronblättern Taubele im Nest, Venuswagen, Taubenkutsche, blaue Elstern etc. 3) von der Giftigkeit Giftblume, Teufelswurz, Ziegentod etc.

Verwendung finden

† Der Knollen *Tuber Aconiti* (Germ. Helv.) *Radix Aconiti* (Austr. Brit.) *Radix Napelli*. *Radix Contrajervae germanicae* Apollonienwurzel. Blaue Wolfswurz. Fuchswurz. Giftwurzel. Mönchswurz. Teufelswurz. *Aconitum* (U-St.) *Racine d'Aconit* (Gall.) *Aconite Root*.

Die Droge besteht aus 2 (selten 3) rüben- oder knollenförmig angeschwollenen Wurzeln, die oben durch einen kurzen Quersatz verbunden sind. Sie sind getrocknet stark runzelig, dunkelgrau-braun und zeigen nur spärliche, am Grunde ebenfalls meist etwas angeschwollene Nebenwurzeln. Der eine (bei drei der mittlere) Knollen trägt den Stengel und ist bei der blühenden Pflanze schon stark geschrumpft. Er sollte vor der Verwendung entfernt werden, wenn schon es von den Pharmakopöen nicht ausdrücklich gefordert wird. Der andere, für das nächste Jahr bestimmte Knollen trägt an der Spitze eine starke Knospe. In der trockenen Droge sind beide Knollen meist auseinander gebrochen.

Der Querschnitt der Droge ist weiss, oder meist mehr oder weniger grau. Er lässt innerhalb der dicken Rinde das sternförmige Cambium erkennen, welches das Holz und das breite Mark umschliesst. Innerhalb der Spitzen des Cambialsteines liegen die kleinen, in einem Winkel angeordneten Holzbündel, in den Buchten dazwischen zuweilen ebenfalls kleine Bündel. In der Rinde ist das Phloem in zahlreiche kleine Bündel vertheilt. Die reichlich im Parenchym vorhandenen Stärkekörner sind bis 18μ gross, rundlich oder durch gegenseitigen Druck kantig.

Die Knollen schmecken anfangs süsslich, dann kratzend, den Hals zusammen schnürend und würgend schärf.

Man sammelt sie von der blühenden, wildwachsenden Pflanze, einmal, weil man annimmt, dass sie zu dieser Zeit am gehaltreichsten sind, dann aber auch, weil man sie dann am leichtesten von denen anderer Arten zu unterscheiden vermag. Das Trocknen muss an einem nicht über 80°C warmen Ort und schnell geschehen, um ein Verderben der saftreichen Knollen zu vermeiden. Sie kommen meist aus den Schweizer Alpen in den Handel. Als wichtigster Bestandtheil enthält die Droge einige Alkaloide, die zum Theil amorph, zum Theil krystallinisch erhalten werden. Der Gesamtgehalt beträgt nach KELLER 0,97%—1,23%, wovon etwa $\frac{5}{10}$ krystallinisch und $\frac{1}{10}$ amorph ist (Vgl. auch Aconitin).

Zur *Gehaltsbestimmung* werden nach KELLER 25,0 g der gepulverten Droge mit einem Gemenge von 100,0 g Aether und 25,0 g Chloroform in einem mit Korkstopfen verschlossenen Arzneiglase von etwa 300,0 g Inhalt 5—10 Minuten unter wiederholtem kräftigem Umschütteln macerirt, dann 10,0 g Ammoniak hinzugefügt, und sofort einige Minuten kräftig geschüttelt. Dann lässt man eine halbe Stunde unter wiederholtem Umschütteln stehen, fügt 80,0 g Wasser zu und schüttelt wieder einige Minuten kräftig. Das Pulver hat sich dann soweit zusammengeballt, dass man 100,0 g der Aether-Chloroformlösung abgossen kann, wenn nothig durch ein Wattebauschchen. Die Lösung bringt man in einen Scheidetrichter, schüttelt sie dreimal mit 25, 15 und 10 cem 1% Salzsäure aus und überzeugt sich bei einigen Tropfen der dritten Ausschüttelung, die man in einem Uhrgläschen anfängt, durch Zusatz eines Tropfens von MERRA's Reagens, dass alles Alkaloid ausgeschüttelt ist, indem keine Trübung mehr in der Flüssigkeit entsteht. Sollte das noch der Fall sein, so hat man das Ausschütteln mit 1% Salzsäure fortzusetzen, bis keine Trübung mehr erscheint. Die vereinigten wässrigen Lösungen bringt man wieder in einen Scheide-

trichter, macht mit Ammoniak alkalisch und schüttelt wiederholt mit kleinen Mengen Aether aus, so lange, bis einige Tropfen der wässrigen Lösung nach vorsichtigem Ansäuern mit MEYER's Reagens keine Trübung mehr geben, also alles Alkaloid in den Aether übergegangen ist

Von der ätherischen Lösung destillirt man den Aether aus einem tarirten Kolben ab und trocknet den Rückstand im Wasserbade oder im Trockenschrank bis zum konstanten Gewicht aus. Die gefundene Menge mit 5 multiplicirt, giebt den Procentgehalt an Alkaloid — Um den Alkaloidgehalt auch noch durch Titration festzustellen, löst man den Rückstand in 5—10 cem saurem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur beginnenden Trübung hinzu und titirt unter Benutzung von Hämatoxilin als Indikator mit $\frac{1}{10}$ -Normal-Salzsäure 1 cem $\frac{1}{10}$ -Normal HCl = 0,0647 g Aconitin (die Formel von DUNSTON und INCH $C_{33}H_{45}NO_{12}$ zu Grunde gelegt)

Verwechslungen Als Verwechslungen kommen die Knollen der anderen bei uns heimischen, blüthelnden Aconitumarten in Betracht

Aconitum Stoerkeanum Rehbch hat normal an jeder Seite des den Blüthenschaft tragenden Knollens einen Tochterknollen. Die Strahlen des Cambaumsternes sind etwas stumpfer

Aconitum variegatum L. hat kleinere, dickere Knollen

Durchgreifende anatomische Unterschiede zwischen diesen Arten und *Aconitum Napellus* existieren nicht

Aufbewahrung und Verarbeitug. Da die Aconitknollen den Nachstellungen von Insekten (*Tinea zaeae*) ausgesetzt sind, so ist es von Vortheil, sie nach sorgfältiger Säuberung für einige Stunden in ein Gefäss zu bringen, in welchem man Aether oder Chloroform verdunsten lässt und hierauf scharf nachzutrocknen. Man bewahrt sie in gut schliessenden Blechgefässen, das Pulver in Flaschen aus gelbem Glase, in einem trocknen Raume in der Reihe der starkwirkenden Mittel auf

Beim Pulvern der Knollen darf der Arbeiter die üblichen Vorsichtsmassregeln (Verbinden des Gesichts) nicht ausser Acht lassen

Anwendung Man verwendet die Knollen selten, sondern entweder die daraus dargestellten galeischen Präparate oder das Aconitin. Vorkommenden Falls giebt man sie im Infusum oder in Pillen oder Pulvern

Höchstgaben 0,1 pro dosi, 0,5 pro die (Austr., Germ., Helv.)

Ueber Wirkung etc. vgl. Aconitin

† Das Blatt. *Folium Aconiti* (Helv. Gall.) *Herba Aconiti caerulea*. *Herba Contrajervae germanicae*. *Herba Napelli*. Eisenhutkraut. Bohnenkraut.¹⁾ Hundstod. Teufelskraut. Würgling.

Die Blätter sind fast kahl, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, tief handförmig-5—7theilig, die mittleren, im Umrisse mehr oder weniger rautenförmigen Blättchen tief dreispaltig und ihr mittlerer Theil wieder dreispaltig, die seitlichen einfach oder zweispaltig, die Seitenblättchen weniger eingeschnitten, alle Zipfel lineal bis linearlanzettlich, oft schelförmig gebogen, ziemlich variabel. Die von der blühenden Pflanze gesammelten Blätter sollen nicht über ein Jahr aufbewahrt werden. 5 Theile frischer Blätter liefern einen Theil trockene

In Deutschland und Oesterreich ist *Folium Aconiti* längst veraltet, dagegen worden aus demselben in England, Frankreich und in Belgien noch jetzt Präparate hergestellt, welche etwa sechs Mal so schwach sind, als die aus den Knollen bereiteten, sodass bei ärztlichen Verordnungen aus jenen Ländern Vorsicht geboten ist. Dasselbe gilt für über 25 Jahre alte Recepte aus Deutschland

Höchstgabe 0,1 pro dosi, 0,5 pro die (Helv.)

Der Alkaloidgehalt der Blätter beträgt nach KELLER 0,18—0,21 Proc. Das Alkaloid soll mit dem der Knollen nicht identisch sein

¹⁾ Es ist sehr zu beachten, dass Bohnenkraut für Küchenszwecke *Satureja hortensis* L. ist

† *Extractum Aconiti radiceis* Ph Austr VII Sturmhutwurzel Extrakt 100 Theile Sturmhutwurzelpulver werden mit verdünntem Weingeist (68 Vol Proc) durchfeuchtet, nach einer Stunde in den Verdrängungsapparat gebracht und mit 200 Th verdünntem Weingeist übergossen, nach 48 Stunden lässt man abtropfeln, verdrängt mit 600 Theilen verdünntem Weingeist, destillirt den Weingeist ab und dampft zu einem dicken Extrakt ein — Die Ausbeute beträgt durchschnittlich 18,5 Proc

Grösste Einzelgabe 0,03 g, grösste Tagesgabe 0,12 g

Die Ph Hung lässt das dicke Extrakt mit Dextrin zur Trockene bringen

† *Extractum Aconiti* Ph Germ II Eisenhutextrakt 100 Th Knollen werden mit 200 Th Weingeist (90 Vol Proc) und 150 Th Wasser sechs Tage, nach dem Auspressen nochmals mit 100 Th Weingeist und 75 Th Wasser drei Tage kalt ausgezogen und die abgepressten Flüssigkeiten in ein dickes Extrakt verwandelt. — Ausbeute 18–20 Proc (nach Dittmar 30 Proc)

Grösste Einzelgabe 0,02 g, grösste Tagesgabe 0,1 g

† *Extractum Aconiti duplex* Ph Helv III 200 Th Eisenhutknollenpulver werden mit einer Lösung von 2 Th Weinsäure in 30 Th Weingeist und 60 Th Wasser befeuchtet und im Percolator mit einer Mischung von 2 Th Wasser und 1 Th Weingeist erschöpft Die zuerst abfließenden 160 Th werden für sich aufgefangen, die übrigen Auszüge auf 40 Th emgedampft und dem ersten zugemischt Das Gemisch wird allmählich und unter Schütteln mit 200 Th Weingeist gemischt und nach 48 Stunden vom Bodensatz klar abgegossen Der letztere wird unter gelindem Erwärmen in 20 Th Wasser gelöst und neuerdings mit 60 Th Weingeist ausgefällt Nach 24 Stunden wird filtrirt und das Filtrat mit dem zuerst Abgegossenen gemischt, der Gehalt an Trockensubstanz bestimmt und mit der nöthigen Menge Reisstärke zur Trockne gebracht, dass 100 Th trockenes Extrakt erhalten werden Höchstgaben pro dosi 0,005, pro die 0,015

† *Extractum Aconiti fluidum* Ph Helv III 100 Th Eisenhutknollenpulver werden mit einer Lösung von 1 Th Weinsäure in 10 Th Glycerin, 15 Th Weingeist und 20 Th Wasser gleichmässig befeuchtet und in einem Percolator mit einer Mischung von 2 Th Wasser und 1 Th Weingeist erschöpft Die Auszüge werden *lege artis* zu einem Fluid extrakt von 100 Th verarbeitet

Höchstgaben pro dosi 0,01, pro die 0,03

† *Extractum Aconiti* Ph of the U-St, Extract of Aconite, wird aus den gepulverten Knollen durch das Verdrängungsverfahren mittelst Weingeist von 94 Vol Proc gewonnen, es ist ein dickes Extrakt

Ausserdem führt diese Pharmakopoe ein

† *Extractum Aconiti fluidum*, welches durch Erschöpfen der Aconitknollen mittelst einer Mischung von Weingeist (94 Vol Proc) und Wasser im Verhältniss von 750 250 cem im Percolator hergestellt wird und in 1000 cem die löslichen Bestandtheile aus 1000 g der Knollen enthält

† *Extractum Aconiti siccum* lässt die Ph Austr durch Eintrocknen des dicken Extraktes mit einer gleichen Gewichtsmenge Milchzucker bei gelinder Wärme und Ersatz des Gewichtsverlustes durch Milchzucker herstellen Das Deutsche Arzneibuch schreibt vor 4 Th Extrakt mit 3 Th Süssholzpulver im Dampfbade völlig auszutrocknen und der zerriebenen Masse soviel Süssholzpulver zuzumischen, dass das Gesamtgewicht 8 Th beträgt

Die trockenen, narkotischen Extrakte gehören zu den Recepturenleichterungen, man bedient sich ihrer zu Pulvermischungen und verabfolgt diese in Stöpselgläsern, abgetheilte Pulver in Wackskapseln Das Präparat der Ph Austr hat den Vorzug, dass es infolge seiner Löslichkeit auch zu flüssigen Arzneien Verwendung finden kann

† *Tinctura Aconiti* D A III Aconittinktur Eisenhutinktur Teinture d'aconite Tincture of aconite Zu bereiten aus 10 Th grob gepulverten Aconitknollen, 100 Th verdünntem Weingeist (68 Vol Proc) Braungelbe Tinktur, Geschmack schwach bitter, dann nachhaltig brennend kratzend Spec Gew 0,907–0,910

Grösste Einzelgabe 0,5 g, grösste Tagesgabe 2,0 g

† *Tinctura Aconiti radiceis* Ph Austr Sturmhutwurzeltnktur Gepulverte Sturmhutwurzel 10 Th, verdünnter Weingeist (68 Vol Proc) 120 Th Man feuchtet das Pulver mit wenig Weingeist an, und übergiesst nach einer Stunde im Verdrängungsapparat mit verdünntem Weingeist, sodass die Masse bedeckt ist, nach 48 Stunden lässt man abtropfeln unter zeitweiligem Nachgessen des noch übrigen Weingeistes Das Gewicht der erhaltenen Tinktur soll 100 Th betragen.

Grösste Einzelgabe 0,5 g, grösste Tagesgabe 1,5 g

† *Tinctura Aconiti* Ph Hung Wird in dem Verhältniss 1 5 hergestellt

† *Tinctura Aconiti tuberos* Ph Helv III Aus 100 Th Eisenhutknollenpulver, 1 Th Weinsäure und Alkohol durch Percolation hergestellt Das Gewicht des Percolats betrage 1000 Th

Höchstgaben pro dosi 0,25, pro die 1,0

† *Tinctura Aconiti herbat recentis* Ph. Holv. III. Aus gleichen Theilen frischer zerstoßener Blätter und Weingeist durch achtstägige Maceration, Abpressen etc. hergestellt
Tinctur des Ergänz. Herba cum tubere 5 Alkohol 6

Höchstgaben pro dosi 1,0, pro die 3,0

† *Tinctura Aconiti* Ph. Brit. Aus Aconitknollen (Fuly 40) 50 g sind mit verdünntem Weingeist durch Verdrängung 1000 cem Tinktur zu bereiten

† *Tinctura Aconiti* Ph. of the U-St. Aus 350 g Aconitknollenpulver, das mit 200 cem einer Mischung von 700 cem Weingeist (94 Vol Proc) und 300 cem Wasser befeuchtet, 24 St stehen bleiben soll, werden im Verdünnungswege 1000 cem Tinktur bereitet

† *Tinctura Aconiti acida* Man mischt 20 Th Tinctura Aconiti mit 1 Th verdünnter Schwefelsäure

† *Tinctura Aconiti aetherea* stellt man durch achtstägiges Ausziehen von 1 Th Aconitknollen mittelst 8 Th Aetherweingeist, oder bei Bedarf durch Auflösen von 1,0 Extractura Aconiti in 5,0 verdünntem Weingeist, Hinzufügen von 45,0 Aetherweingeist und Filtriren her

In der Homöopathie ist Aconit wohl das wichtigste, am meisten gebrauchte Arzneimittel und wird hier besonders bei fieberhaften Erregungen angewendet, „bis man weiss, mit welcher Krankheit man es zu thun hat“ Im Gebiete des Deutschen Reichs darf es über die dritte Verdünnung hinaus in Handverkauf abgegeben werden

Linimentum Aconiti Ph. Brit. Liniment of Aconite 100,0 g grob gepulverte Aconitknollen zieht man drei Tage hindurch mit 100 cem Weingeist (90 Proc) aus, bringt in den Verdrängungsapparat, lässt in ein 5,0 g Kampfar enthaltendes Gefäss abtropfen und giesst solange Weingeist auf, bis man (einschliehlich Kampfar) 150 cem gesammelt hat

Guttas odontalgicae MAGNOT

Rp Tincturae Aconiti

Chloroformii 5,0

Tincturae Benzoes 5,0

Auf Watte in den hohlen Zahn einzuführen

Linimentum Aconiti et Chloroformi compositum (New-Yorker 1. ormel)

Rp Tincturae Aconiti 4,0 cem

Chloroformii 4,0 „

Spiritus camphorati 4,0 „

Oil Thymi 1,0 „

Linimenti saponati 64,0 „

Linimentum dialyticum aethereum.

BONJEAN

Rp Tincturae Aconiti 85,0

Tincturae Arnicae 5,0

Aetheris acetic 70,0

Zu Einreibungenen

Mixtura anaesthetica GUÉNEAU DE MUSSY

Rp Tincturae Aconiti 20,0

Mixturae oleoso-balsamicae 10,0

Chloroformii 5,0

Zum Einreiben des Zahneisens

Mixtura antigestralgia. FLEMING.

Rp Tincturae Aconiti 3,0

Natrii bicarbonici 5,0

Magnesi sulfurici 45,0

Aquae destillatae 160,0

Zweistündlich einen Esslöffel

Extrakt Radix, Zahnmittel von SCHOTT in Frankfurt a. M., ist ein weingeistiger Auszug aus Fol Aconiti und Fol Fardis

Mixtura anarthritica von ROLL in Amsterdam ist eine Abkochung von Specignor mit Tet Aconiti, Tet Valerianae und Tet Opi oroe

Neuraline, ein amerikanisches Mittel, enthält Aconit- und Opiumtinktur, Chloroform und Pfefferminzöl

Vin antarthritique d'ANDURAN ou de ROCHELLE ist Malagawein mit Vin Colechici, Tet Aconiti und Tet Digitalis

II. Aconitum ferox Wallich Heimisch im nördlichen Ostindien, in den Vorbergen und der subalpinen Region des Himalaya.

† Verwendung finden ebenfalls die Knollen (Gall), aus denen die Eingebornen ein Pfeilgift bereiten **Indian Aconit root. Bish.**¹⁾ Bikh, Ativisha. Bachnag Vashanavi. Die schwarz-

¹⁾ „Bish“ heisst „Gift“, unter diesem Namen gehen in Indien auch die Knollen anderer Arten und anderer Pflanzen, nach Europa gelangten nur die hier oben genannten Art.

Pilulae Aconiti DREYER

Rp Extracti Aconiti 0,5

Radices Gentianae 1,0

Conserva Rosarum q. s.

Für 20 Pillen Morgens und Abends je eine Pille

Pilulae dialyticae BONJEAN

Rp Natrii silicii alet 2,5

Extracti Colechici 1,5

Extracti Aconiti 1,0

Natrii benzoici 5,0

Saponis medicati 5,0

1 für 100 Pillen Täglich steigend 1—2—3—4 Pillen

Tinctura anticholerica FRANZOSCHI

Rp Tincturae Aloes 1,0

Tincturae Opi 8,0

Spiritus (70 Proc) 2,0

Tincturae Aconiti 4,0

Vierelbstündlich 15—20—30 Tropfen

Unguentum Aconiti TURNBULL

Rp Extracti Aconiti 2,0

Adipis 8,0

Zum Einreiben

Unguentum Aconiti ammoniacatum TURNBULL

Rp Extracti Aconiti 2,0

Adipis 12,0

Liquoris Ammonii caust. gr. XV.

Unguentum antilacuralgium. GRAY

Rp Tincturae Aconiti 1,5

Chloroformii 1,0

Adipis 5,0

braunen Knollen sind grösser und dicker als die der bei uns heimischen Arten, rübenförmig, unten gewöhnlich abgebrochen. Sie enthalten Nöpalin (Pseudaconitin) und andere amorphe Alkaloide. Man soll in England zuweilen aus ihnen Aconitin darstellen. Die Droge hat Aufnahme in die Ph. Gall. gefunden. 1866 ist eine Verwechslung der Droge mit *Stipites Jalapae* vorgekommen.

III Aconitum Fischeri Reichenbach. In Japan. Diese Art liefert, vermuthlich mit *Aconitum uncinatum* L. die kleinen japanischen Knollen (*Kusa-uzu*), die zuweilen nach Europa gelangen. Der Querschnitt ist einigermaßen charakteristisch durch die reichliche Ausbildung sekundärer Holzbündel. Sie enthalten Japaeconitin.

Adeps suillus.

Adeps suillus (Germ. Heiv.) **Adeps** (U. St.) **Adeps** (Brit.) **Axungia Porci** (Austr.) **Axunge** (Gall.) **Schmalz** **Schweinefett** **Grasse de porc** **Sain doux** **Lard** **Hogslard**

Allgemeines. Das Schwein, *Sus Scrofa*, var. domesticus U., sondert in seinem Organismus zwei Fettschichten ab. Die eine, direkt unter der Haut liegende (Speck oder Lardum) ist von weicherer Konsistenz, die andere, im Inneren der Bauchhöhle am Netz, an den Nieren und an anderen Organen dicke Schichten bildend [Lendenfett, Flomen, Flüssen, Linsen, Schmeer], ist von harterer Konsistenz. Nur dieses letztere Fett (sog. Nierenfett) soll pharmaceutische Verwendung finden. Zweckmässig bereitet der Apotheker seinen Bedarf an Fett für die Rezeptur selbst. Er kauft zu diesem Zwecke beim Schlächter das Nierenfett oder den Schmeer frisch geschlachteter, gesunder Schweine, welches übrigens nicht gesalzen sein darf.

Darstellung. Man entfernt von den möglichst frischen Fettmassen die blutigen Stellen und grösseren Haute, wäscht das Fett sorgfältig in kaltem Wasser, zerschneidet es in kleine Würfel [grössere Mengen lässt man durch eine Fleischhackmaschine gehen], die man durch Stossen im Mörser oder durch Zerhacken oder Zerreiben in eine breiartige Masse verwandelt, und erhitzt diese im Wasserbade und zwar in einem Gefasse aus Porcellan, Steingut, Zinn oder emailliertem Eisen. Nachdem das ausgeschmolzene Fett sich geklärt hat, kühlt man unter mässigem Druck und lässt unter Umrühren erkalten. Aus den Grieben kann man durch Erhitzen über freiem Feuer und heisse Pressung eine weitere Menge geringwerthigeren Fettes gewinnen. Die ausgepressten Grieben können dann in die Feuerung gothan werden.

Um das Wasser aus dem Fett möglichst vollständig zu entfernen, lässt man dieses 1—2 Tage gut bedeckt bei etwa 60° C. stehen, und giesst alsdann die klare Fettschicht von dem Wasser, welche sich nunmehr vollständig abgesetzt hat, vorsichtig ab. Das für die Rezeptur bestimmte Fett ist zweckmässig durch ein getrocknetes Filter zu filtriren.

Nimmt man das Ausschmelzen über freiem Feuer vor, so muss man der Fettmasse, damit das Fett einen Bratengeruch nicht annimmt, etwas Wasser zusetzen, auch während der ganzen Zeit des Erhitzens die Masse beständig umrühren.

Handelswaare. Das gewöhnliche Schweineschmalz des Handels kommt vorzugsweise aus Amerika und ist in der Regel nicht durch Schmelzen, sondern durch kalte Pressung dargestellt. Es ist ferner nicht bloss aus dem Nierenfett, sondern auch aus dem Speckfett gewonnen, und endlich ist es gerade gegenwärtig sehr häufig durch pflanzliche Zuthaten (Baumwollsamööl) verfälscht. Aus diesem Grunde ist die Selbstdarstellung dringend zu empfehlen.

Eigenschaften. Eine weisse, fast geruchlose, fettige Masse, welche, wenn sie geschmolzen wird, an der Oberfläche in eigenthümlichen Wulsten erstarrt. Im Sommer ist sie von musartiger, im Winter von festerer Konsistenz. Davon abgesehen hängt die Konsistenz des Fettes ab von der Rasse des Schweines, von der Jahreszeit und von dem

Gesundheitszustande. Der Schmelzpunkt kann von $36-42^{\circ}\text{C}$ wechseln, für gutes Fett liegt es gewöhnlich bei etwa 40°C . Das spec. Gewicht des Fettes ist bei $15^{\circ}\text{C} = 0,981-0,992$, bei $100^{\circ}\text{C} = 0,861-0,862$.

Schweineschmalz ist in Wasser unloslich, in Alkohol (90 Proc.) schwerloslich, dagegen wird es in der Warme leicht und klar gelöst von Aether, Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Amylalkohol.

Chemisch ist es ein Gemisch von Oelsäureglycerinather, Palmitinsäureglycerinather und Stearinsäureglycerinather. Die Jodzahl des selbst ausgelassenen Fettes ist 48-60, bei dem Handelsschmalz steigt sie gegenwärtig bis 66. Die Kottsonner'sche Verseifungszahl ist 196-198.

Prüfung. 1) Es rieche auch beim Ausstreichen einer Probe auf den Handrücken nicht ranzig und besitze auch keinen ranzigen Geschmack. 2) Wird eine grössere Probe geschmolzen, so soll ein klares, nur schwach gelbliches Liquidum sich ergeben. Wasser würde sich in Tropfen absetzen, mineralische Beimengungen würden als Niederschlag zu Boden sinken. 3) 10 g Schweineschmalz sollen zur Neutralisation der freien Fettsäuren nicht mehr als 4,46 cem $\frac{1}{10}$ -Normal-Kohlauge verbrauchen, d. h. der Säuregrad soll nicht höher als 2,5 sein (s. unter Olea).

Prüfung auf Baumwollsamendöl

a) Nach BROU 10 cem des filtrirten Schmalzes werden mit 5 cem Brou'scher Lösung¹⁾ vermischt und im Wasserbade $\frac{1}{4}$ Stunde lang unter öfterem Umrühren erhitzt. Eine eintretende rothe, braune oder schwarze Färbung weist auf Anwesenheit von Baumwollsamendöl hin. Reines Schweineschmalz bleibt unverändert. Durch Ueberhitzen verliert das Baumwollsamendöl die Eigenschaft, die Brou'sche Silberlösung zu reduzieren. Ueberhitztes Baumwollsamendöl wird demnach von Brou's Reagens nicht angezeigt.

b) Nach WILLMANN's. Man löse 1 g des geschmolzenen und filtrirten Fettes in 5 cem Chloroform, füge 2 cem einer Lösung von Phosphormolybdänsäure oder 2 cem einer Lösung von phosphormolybdänsaurem Natrium und einige Tropfen Salpetersäure hinzu, schüttle kräftig durch und lasse absetzen. Bei Anwesenheit von Baumwollsamendöl färben sich die oberen Schichten der Mischung — infolge Reduktion der Molybdänsäure — grün. Auf Zusatz von Ammoniak geht die grüne Färbung in Blau über. Die Reaktion zeigt auch überhitztes Baumwollsamendöl an, andererseits aber bewirken andere sehr geringe Verunreinigungen unorganischer und organischer Natur Färbung, so dass die Reaktion nicht als absolut zuverlässig gelten kann.

c) Das specifische Gewicht — mit der Kottsonner'schen Spindel bestimmt — sei bei 100°C nicht höher als 0,862. Bei Gegenwart im Baumwollsamendöl ist das spec. Gewicht beträchtlich erhöht (s. Olea).

d) Die Jodzahl nach HUGL (s. Olea) sei bei dem Schmalz der Officinen nicht höher als 60, bei dem Schmalz des Handels nicht höher als 66.

Aufbewahrung. Das für die Rezeptur bestimmte Schweineschmalz wird zweckmässig in saubere, trockne Flaschen bis zur gänzlichen Füllung filtrirt, worauf diese nach dem Erstarren des Fettes mit Kork dicht geschlossen werden. Grössere Vorräthe bewahrt man in Gefässen aus Porzellan auf. Gefässe aus Holz, Steinzeug und Thon sind unzuverlässig, weil sie sich mit Fett vollsaugen und den ganzen Vorrath zum Ranzigwerden disponiren.

Um das Fett vor dem Ranzigwerden möglichst lange zu bewahren muss es zunächst an sich frisch sein, bei der Benützung völlig wasserfrei gemacht und später in möglichst voll gefüllten Gefässen vor Licht und Luft geschützt an einem kühlen Orte aufbewahrt werden.

Anwendung. Schweineschmalz ist die Grundlage zahlreicher Salben und Pomaden, ferner die Grundlage von Seifen und Pflastern. Im nicht ranzigen Zustande wirkt es auf die Haut nicht reizend ein, ranziges Fett kann bei empfindlichen Personen schwere Hautentzündungen hervorrufen.

Mit Benzoesäure oder Benzoesäure präparirtes Schweineschmalz soll dem Ranzigwerden längere Zeit widerstehen, daher die Bereitung von benzoinirtem Schmalz.

¹⁾ Brou's Lösung 1,0 g Argenti nitrici, 200,0 g Spiritus (96 Proc.), 40,0 g Acetis, 0,1 g Acid. nitrici.

Adeps benzoatus (Brit, Germ) Benzoëschmalz A) Brit 100 Th frisches Schwansschmalz werden im Wasserbade mit 3 Th Benzoe (grobes Pulver) unter Umrühren 2 Stunden digerirt und kolirt B) Germ 1 Th sublimirte Benzoesäure wird in 99 Th Schweineschmalz unter Erwärmen auf dem Wasserbade gelöst

Adeps benzoïnatus (Helf U-St) 100 Th frisches Fett (oder 100 Th frisches Fettgewebe) werden im Wasserbade geschmolzen und unter Umrühren mit 2 Th grobgepulverter Benzoe, welche in ein Leinwand-Säckchen eingebunden ist (2 Stunden U-St) digerirt, dann kolirt

Axungia Porci benzoata (Austri) 100 Th Fett werden mit 4 Th grobgepulverter Benzoe unter Umrühren 2 Stunden lang digerirt, dann kolirt

Axonge benzoïnée (Gall) 1 kg geschmolzenes Fett, 5 g Benzoe-tinktur (1 + 5) bis zum Erkalten rühren

Adeps balsamicus (Diet M)

Rp Adipis suilli recentis 100,0

Balsami toltani 10,0

Aetheris 5,0

Natrii sulfurei sicc p 10,0

Wenn das geschmolzene Fett so weit abgekühlt ist, dass es sich trübt, fñgt man den in Aether gelösten Balsam und das Natriumsulfat hinzu, erwärmt, allmählich steigend, 1 Stunde im Wasserbade und filtrirt durch Filtrirpapier im Dampflichter

Adeps oleatus

Rp Olei Olivarum 50,0

Adipis suilli 200,0

Schmelzen, mischen und bis zum Erkalten rühren

Adeps viridis seu viridatus

Rp Adipis suilli 1000,0

Chlorophylli (Schütz) 2,0

Man löst letzteres in dem geschmolzenen Fett

Butyrum cacaïnium

Unguentum potabile Krebsbutter

Rp Sebi taurini 500

Adipis benzoati 150,0

Radici Alkannae 2,5

Im Dampf-bade 2 Stunden zu digeriren, dann zu koliren Oder

Alkannini 1,0

Adipis suilli 1000,0

durch Digeriren im Dampf-bade zu lösen

Adeps saponaceus

Steadina Steadine

Rp Adipis suilli 750,0

Liquoris Natrii caustici (1,17) 100,0

Aquae destillatae 100,0

Spiritus (90 Proc) 50,0

Man erwärmt das Fett bis zum beginnenden Schmelzen, rñhrt die Mischung aus Lauge und Wasser, zum Schluss den Alkohol hinzu und verrñhrt gut Eine in der Dermatologie gebrauchte Seifen-Salbe

Unguentum simplex (Austri)

Rp Adipis suilli 200,0

Cerae albae 50,0

Unguentum simplex UNNA

Rp Adipis benzoati 20,0

Olei benzoati 10,0

Nicht durch Schmelzen, sondern durch Reiben zu mischen

Unguentum refrigerans UNNA

Rp Unguenti simplicis UNNA 12,0

Aquae Rosae

Aquae Aurantii florum aa 2,0

Lauolini pauxillum

Lardöl Schmalzöl Specköl Huile de graisse Olenum Adipis (U St) Lard oil Das durch Pressen des Schweineschmalzes bei 0° erhaltene Öl, besteht vorwiegend aus Triolem Spec Gew 0,910—0,920 KORTSTORFF's Zahl 191—196° Dient als Speiseöl, Maschinenschmieröl, Brennöl, auch in der Wolleindustrie Prüfung auf Baumwollsaamenöl und Paraffin wie bei Adeps

Im Nachstehenden sollen noch einige dem Schweineschmalz ähnliche Fette aus dem Thierreiche besprochen werden Die angeführten Konstanten entstammen der Arbeit von AMTHOR und ZINK (FRESSE Ztschr anal Chem 1897, I u f) Wenn wir ferner Substitution für die aufgenommenen Fette angeführt haben, so erfolgte dies nicht, um diese Substitution zu empfehlen, vielmehr rathen wir, wenn solche Fette verlangt werden, den Versuch zu machen sie anzuschaffen oder aber den Verkauf abzulehnen

Adeps anserinus Gänsefett Gossfett a) Fett der Hausgans Blassegelbliches, körniges, ziemlich weiches Fett Spec Gew 0,9274 Schmelz-P 32—34° C Erstarrungs-P +18—20° C Jodzahl 64,7 WOLLNER's Zahl 2,00 HEHNER's Zahl 95,0 b) Fett der Wildgans Organgegelbes Öl Jodzahl 99,6 Substitut Adeps oleatus 600,0 Olei Macidis gut 4

Adeps anatinus Entenfett a) Fett der Hausente Hellgelbes, körniges, sehr weiches Fett Schmelz-P 36—39° C Erstarrungs-P +22—24° C Jodzahl 58,5 b) Der Wildente Organgegelbes Öl Erstarrungs-P. +15—20° C Jodzahl 84,6 KORTSTORFF's Zahl 198,5 WOLLNER's Zahl 2,6

Adeps Ardae Reiherfett Substitut Adeps suillus

Adeps caninus Hundefett Sehr weiches, weisses, körniges Fett, allmählich in einen festen und einen flüssigen Antheil sich sondernd Spec Gew 0,928 Schmelz-P

37—40° C. Erstarrungs-P + 20—21° C Jodzahl 58—59 KÖRSTORFER's Zahl 195,0 HEUNER's Zahl 95,6—95,7 WOLLNY's Zahl 1,0—1,2 Substitut Adeps oleatus

Adeps Castorei Axungia Castorei Bibergaifett Befindet sich in den dem Bibergaifol anhängenden Nebenbeuteln. Fisch weich und schmierig, später trockene, fettähnliche Masse. Das Publikum verlangt es in Form einer Salbe aus Adeps suillus, Sebum taurinum, Resina Pum aa 20,0, Castoreum canadense pulv 1,0 1 Stunde im Wasserbade zu digerieren, dann zu kolieren.

Adeps Catii Katzenfett Katerfett a) Fett der Hauskatze Weisses Fett mit einem Stich ins Graugelbliche. Weich, körnig Spec Gew 0,9304 Schmelz-P 39—40° C Erstarrungs-P + 24—26° C Jodzahl 54,5 KÖRSTORFER's Zahl 191 HEUNER's Zahl 96,0 WOLLNY's Zahl 1,8 b) Fett der Wildkatze Schmutzig gelbliches Fett, körnig, etwas fester wie Schweinefett Spec Gew 0,9304 Schmelz-P 37—38° C Erstarrungs-P + 26—27° C Jodzahl 57,8 KÖRSTORFER's Zahl 200,0 WOLLNY's Zahl 5,0 Substitut Adeps suillus

Adeps Cicomae Storchfett Hanotenfett Adebarrfett Substitut Adeps suillus

Adeps colli equini Kammfett Ist das aus dem Oberhalse des Pferdes gewonnene Fett. Es ist gelblich bis weiss, von der Konsistenz des Schweineschmalzes. Schmelz-P etwa 32° C Dient zur Herstellung von Veterinärsalben, zur Darstellung von Salbenerseife. Substitut Unguentum cereum.

Adeps gallinaceus Hühnerfett Hellcitronengelbes, köiniges, sehr weiches Fett Spec Gew 0,9241 Schmelz-P 38—40° C Erstarrungs-P + 21—27° C Jodzahl 66—77 KÖRSTORFER's Zahl 198,5 WOLLNY's Zahl 2,0

Adeps humanus s. Hominis Menschenfett Wenn dieses Fett gefordert wird, so frage man, welchem Zwecke es dienen solle. Häufig wird darunter *Unguentum Hydrargyri albi* als Mittel gegen Ungeziefer (Kratze, Läuse) verstanden.

Adeps leporinus Hasenfett Blassgelbes bis orangegelbes, sehr weiches Fett, beim Stehen in ein dickes, gelbes Öl und einen weissen, kristallinischen Bodensatz sich sondernd. Auch frisch von unangenehm ranzigem Geruch, besonders beim Erwärmen, verblasst im Lichte Spec Gew 0,9288—0,9397 Schmelz-P 35—40° C Erstarrungs-P + 17—23° C Jodzahl 81—120 KÖRSTORFER's Zahl 198—206 HEUNER's Zahl 95,2 WOLLNY's Zahl 1,5—3,0 Ein trocknendes Fett. Substitut Entweder ein *Unguentum basilicum* von heller Farbe oder Gemisch aus Oleum olivarium Prov 100, Adeps 80,0, Sebum taurinum 80,0, Cera flava 35,0

Adeps Lupi Wolfsfett Substitut Adeps suillus

Adeps Muris alpini Marmelthierfett Substitut Adeps suillus

Adeps Taxii Dachsfett Grävingsfett Hellcitronengelbes, sehr weiches Fett, mit der Zeit in einen festen und einen flüssigen Antheil sich sondernd Spec Gew 0,9226 Schmelz-P 30—35° C Erstarrungs-P + 17—19° C Jodzahl 71,3 KÖRSTORFER's Zahl 193 HEUNER's Zahl 96,0 WOLLNY's Zahl 0,8 Substitut Adeps oleatus

Adeps ursinus Bärenfett Substitut Adeps suillus

Adeps vulpinus Fuchsfett Vossfett Salbenartig weiches, körniges Fett, weiss mit schwachem Stich ins Rötliche Spec Gew 0,9412 Schmelz-P 35—40° C Erstarrungs-P + 24—26° C Jodzahl 75—84 KÖRSTORFER's Zahl 192 WOLLNY's Zahl 2,6 Substitut Adeps suillus

Adiantum.

I Adiantum Capillus Veneris L. Polypodiaceae-Pteridaceae. In wärmeren Gegenden sehr weit verbreitet. England, Spanien, Italien, Schweiz, Tirol, Istrien, Griechenland, Nordafrika, Cap, Südasien, Amerika etc. Rhizom kriechend, dicht mit schwärzlichen Spreuschuppen besetzt. Blattstiel rötlich schwarzbraun, glänzend, dreikantig, kahl. Spreite eiförmig oder langlich, unten 2—3fach, oben einfach gefiedert, die Fiedrchen aus schief keilförmiger Basis verkehrt eiförmig bis halbkreisförmig, am Rande gekerbt-lappig bis gezahnt. Die Fruchthäutchen unter den umgeschlagenen Lappen der Fiedrchen. Die Blätter riechen schwach gewürzhaft und schmecken süsslich bitterlich. Enthält Gerbstoff, Bitterstoff (?), ätherisches Öl (?), nicht genauer untersucht.

Herba und Folia Capilli Veneris (Ergänzb Austr Gall.) **Folium Adiantii** (Heilv). **Folia Linguae veris** Herba Adiantii Herba Adiantii magni s. nigri s. veri s. vulgaris. Herba Epenotrichi. Frauenhaar Jungfernhaar. Mädchenhaar. Steinrante Venushaar. Wiederkomm. Capillaire de Montpellier. Maiden-hair.

Im Juni-Juli sammeln 100 Th frisches Kraut geben 25 Th trockenes

Anwendung. Wird als reizmilderndes, die Absonderung der Schleimhäute beförderndes Mittel bei Leiden der Luftwege als Aufguss (1—5 100) gebraucht. Es ist ein Bestandtheil des *Brustthees* der *Pharm. Hdb. III*, der *Mistura Balsam Copavi Ph. ross* und dient zur Darstellung des *Capillarsaftes*.

Syrupus Capilli Veneris Ph. Austr., *Syrupus Adianti* — Capillarsaft, Feinsaft, Frauenhaarsnup, Liliensaft, Margarethensaft — *Snop de capillare* 10 Th zerschnittenes Frauenhaar übergossen man mit 120 Th heissem Wasser und lässt eine Stunde stehen. Von der abgeseihten Flüssigkeit¹⁾ sollen 100 Th mit 160 Th zerstoßnem Zucker zu Snup gekocht und diesem 2 Th Orangenbluthenwasser zugesetzt werden.

Pharm. Hungar. lässt 4 Th Frauenhaar mit 4 Th verdünntem Weingeist, Wasser q s zwei Stunden lang ausziehen, und 40 Th der Seihflüssigkeit¹⁾ mit 70 Th Zucker und 1 Th Orangenbluthenwasser zum Sirup verarbeiten.

Syrupus Adianti der *Ph. Helv. III* wird wie nach der *Austr.* hergestellt, doch gewinnt man auf 10 Th der Droge 36 Th Colatur, löst darin 60 Th Zucker, kocht auf, fügt 4 Th Pomeranzenbluthenwasser hinzu.

Die *Ph. Germ. II* liess den Capillarsnup durch Pomeranzenbluthensnup ersetzen. Von diesem unterscheidet sich ein aus dem Kraute bereiteter Saft natürlich durch die Farbe und deren Verhalten gegen alkalische Zusätze, z. B. *Liq. Ammonii anisatus*.

Syrupus Capilli Veneris compositus wird aus gleichen Theilen *Syrupus Capilli*, *Liquiritiae* und *Althaeae* gemischt.

SCHNEEBERG's Kräuter-Allop von BITTNER und WILHELM ist *Syrupus Capilli Veneris*.

II *Adiantum pedatum L.* Heimisch in Nord-Amerika, Nordost-Asien, Japan, Himalaya. Fast doppelt so gross wie die vorige Art, Spreite im Umriss nierenförmig, Fiedelchen fast dreiseitig sichelförmig.

(*Capillaire du Canada*, *Herba Adianti canadensis*) Starker aromatisch als vorige Art, an deren Stelle es häufig gebraucht wird, soll aber in concentrirter Abkochung emetisch wirken.

Kommt in zusammengepresstem Zustande nach Europa, häufig mit *Adiantum trapeziforme L.* vermengt. Letztere Art, sowie *A. cristatum L.* (Westindien), *A. villosum L.* (tropisches Amerika), *A. tenerum Sw.* (in Mexico), *A. aethiopicum L.* (Neu-Südwaes), werden wie die beiden genannten verwendet.

Adonis.

I *Adonis vernalis L.* *Ranunculaceae-Anemoneae.* Ackerroschen. Boh nisches Christwurz/kraut. Falsches Nieswurzkraut. Frühlingsadonis. Teufelsauge. Ziegenblume. Heimisch in Ost- und Sudemopa, geht bis Norddeutschland.

Verwendung finden das ganze Kraut oder die Blätter (Ergänz.) Blätter doppelt bis dreifach gefiedert, mit linealischen, ganzen oder zwei- bis dreispaltigen Zipfeln. Blüthe glanzend hellgelb. Fruchtknoten behaart, stehenbleibende Griffel hakenförmig zurückgekrümmt.

Einsammlung und Aufbewahrung. Die im April und Mai blühende Pflanze wird nahe der Wurzel abgeschnitten, getrocknet, fein geschnitten und in der Reihe der abgesondert zu haltenden Mittel aufbewahrt.

Bestandtheile. Als wirksamer Bestandtheil ist ein Glukosid *Adonidin* ermittelt. Dasselbe ist nach PODWISSOTZKY ein Gemenge, daraus isolirte er das amorphe, in Wasser, Alkohol und Aether leicht lösliche Pikroadonidin.

Anwendung. *Adonis* ist ein altes Volksmittel, war aber in Vergessenheit gerathen und wurde wohl nur noch in Russland in grösserem Umfange angewendet. Von dort ist (etwa seit 1880) der neue Anstoss gegeben, das Mittel wieder zu verwenden. Es wird bei Herzkrankheiten gegeben, wo *Digitalis* nicht anwendbar ist, vor der es in manchen Fällen den Vorzug verdient, weil es keine kumulative Wirkung zeigt. Erzeugt leicht Uebelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Man giebt das Kraut als Infusum 4—8,0 200,0

¹⁾ Es empfiehlt sich, dieselbe zuvor mit etwas Talk zu schütteln und zu filtriren.
Handb. d. pharm. Praxis I 11

Grösste Einzelgabe 2,0 g, grösste Tagesgabe 8,0 g

Extractum Adonidis fluidum (DIETERICH) wird aus dem fein gepulverten Kraut mit verdünntem Weingeist (88 Vol Proc) im Verdrängungsverfahren bereitet

Tinctura Adonidis (DIETERICH) 10 Th zerschnittenes Adoniskraut, 100 Th verdünnter Weingeist Man lässt acht Tage stehen, presst ab und filtrirt

II Adonis aestivalis L. enthält ein Glukosid der Zusammensetzung $C_{28}H_{40}O_{10}$, das vielleicht mit dem Adonin von *A. amurensis* identisch ist Die Wirkung der Pflanze ist analog der von *A. vernalis*, aber schwächer

III Adonis cupaniana Gussone (Fiore di marzo, Fiore di San Giuseppe) in Sibirien, enthält ein vielleicht mit dem oben genannten identisches Glukosid

IV Adonis amurensis Regel et Radde in Japan, enthält ein Glukosid Adonin $C_{28}H_{40}O_{10}$, was ähnlich aber schwächer wirkt wie Adonidin

†† **Adonidinum** Adonidin (Ergänzb) Eine aus dem Kraut und den Wurzeln von *Adonis vernalis L.* durch CERVELLO abgeschiedene glukosidische Substanz

Darstellung. Das Kraut von *Adonis vernalis* wird mit 50proc Alkohol extrahirt, das Filtrat mit basischem Bleiacetat (Bleissig) ausgefällt Die vom Niederschlage getrennte, stark bitter schmeckende Flüssigkeit wird durch Natriumsulfat oder verdünnte Schwefelsäure entbleit, auf dem Wasserbade zur Sirupsdicke eingedampft, alsdann durch vorsichtigen Zusatz von Ammoniak neutralisirt und mit konc Gerbsäurelösung gefällt Der gesammelte Niederschlag wird mit Wasser gewaschen, noch etwas feucht mit Zinkoxyd gemischt und mit heissem, starkem Alkohol am Rückflusskühler erhitzt Beim Verdunsten des Alkohols hinterbleibt das rohe Adonidin, welches durch wiederholtes Auflösen in starkem Alkohol und Fällen mit Aether zu reinigen ist

Eigenschaften. Gelbliches oder gelblichbraunes, geruchloses Pulver von stark bitterem Geschmack, sehr hygroskopisch Sehr leicht löslich in Wasser und in Weingeist, nur wenig löslich in Aether und in Chloroform — Die wässrige Lösung wird durch Gerbsäure und durch basisches Bleiacetat, nicht aber durch neutrales Bleiacetat gefällt, auch durch Ferrichlorid nicht verändert Erhitzt man sie mit einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure, neutralisirt mit Kalklauge und versetzt mit alkalischer Kupferertraktlösung, so wird beim erneuten Erwärmen ein rother Niederschlag ausgeschieden

Die Zusammensetzung des Adonidins ist zur Zeit noch nicht bekannt, es soll frei von Stickstoff sein

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig

Anwendung. Als Ersatz der Digitalis bez deren Präparate, und zwar als Herztonicum und schwaches Diureticum empfohlen Es soll frei sein von der cumulativen Wirkung der Digitalis Man giebt es viermal täglich zu 0,01—0,025 g in Pulver, oder mit Chloroformwasser Höchste Gaben 0,08 g pro dos und 0,1 g pro die (Ergänzb) Die 3—4proc Lösung soll, äusserlich verwendet, Anästhesie des Auges bewirken, ohne es zu reizen oder die Pupille zu erweitern

Adonin. $C_{28}H_{40}O_{10}$ Ein von TAHARA aus *Adonis amurensis* gewonnenes Glukosid, welches dem Adonidin ähnlich ist

Aër.

Aër. Luft. Atmosphère, Air (französisch) **Aer** (englisch).

Unter „Luft“ versteht man die unseren Planeten umgebende Gashölle, deren Mächtigkeit auf 75—90 km von der Erdoberfläche geschätzt wird Sie ist ein Gemenge folgender wesentlicher Bestandtheile

	100 Liter Luft enthalten	100 Kilo Luft enthalten:
Stickstoff	78,40 Liter	78,95 Kilo
Sauerstoff	20,94 „	23,10 „
Argon etc	0,68 „	0,90 „
Kohlensäure	0,08 „	0,06 „

Ausserdem enthält sie als „zufällige“ Bestandtheile bez Verunreinigung Wasserdampf, Ammoniak, salpetrige Säure, Salpetersäure, Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, organischen und organischen Staub, in Industrie-Gegenden auch Schwefelsäure, Salzsäure Ausser dem Argon ist als zweites neues Element auch das Helium gefunden worden Die neuerdings aufgefundenen weiteren neuen Elemente müssen vorläufig unberücksichtigt bleiben

Durch einen Druck von 81,5 Atmosphären kann die Luft bei einer Temperatur von $-144,5^{\circ}\text{C}$ zu einer bläulichen Flüssigkeit condensirt werden (LINDE'sche Gegenstrom-Maschine) Sie siedet dann bei $-191,2^{\circ}\text{C}$ und erzeugt dabei so grosse Temperatur-Erniedrigung, dass Alkohol und Aether zum Krystallisiren gebracht werden Beim Verdunsten von flüssiger Luft entweicht zuerst vorwiegend Stickstoff, so dass ein vorwiegend aus flüssigem Sauerstoff bestehender Rest hinterbleibt Bei der Verdunstung im Vakuum erstarrt die flüssige Luft zu einer eisartigen, festen Masse

1 l von Wasserdampf und Kohlensäure befeuchte Luft wiegt bei 0°C und 760 mm B = 1,293187 g [REGNAULT]

Feuchtigkeitsgehalt Luft ist im Stande Wasserdampf aufzunehmen, gleichsam aufzulösen Die Menge des aufgenommenen Wasserdampfes ist abhängig von der Temperatur Diese Beziehungen, welche zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur herrschen, kommen in einer besonderen Nomenklatur zum Ausdruck

Maximale Feuchtigkeit Hierunter versteht man diejenige Menge Wasserdampf, welche die Luft bei einer gegebenen Temperatur überhaupt aufzunehmen vermag (Siehe Tabelle)

Diese maximale Feuchtigkeit wird ausgedrückt entweder durch das Gewicht des in der Volumen-Einheit enthaltenen Wasserdampfes oder durch die Tension, d. h. den Druck, welchen der Wasserdampf auf eine Quecksilbersäule ausübt

Man bestimmt diesen Druck (die Tension), indem man in das Vakuum einer Barometer-Röhre etwas Wasser bringt Letzteres vergast, und der leere Raum wird mit Wasserdampf gefüllt, dessen Menge für jede Temperatur einen bestimmten Betrag erreicht Dieser Wasserdampf übt auf die Quecksilbersäule einen gewissen Druck aus Der Betrag, um den das Quecksilber hierdurch in der Barometer-Röhre sinkt, heisst die „Tension“ des Wasserdampfes Aus der in Millimetern Quecksilber ausgedruckten Tension des Wasserdampfes lässt sich das Gewicht p des in einem Volumen mit Feuchtigkeit gesättigter Luft enthaltenen Wasserdampfes nach folgender Formel ableiten

$$p = \frac{1,2932 \cdot 0,623}{760(1 + \alpha t)} \times T,$$

wobei T die Tension des Wasserdampfes bei der Temperatur t, α den Ausdehnungs-Koeffizienten der Gase ($\frac{1}{273} = 0,003667$) repräsentirt Die Zahl 1,2932 ist das absolute Gewicht der Volumen-Einheit Luft, 0,623 die Dichte des Wasserdampfes

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, beträgt der maximale Wassergehalt eines Kubikmeters Luft für jede Temperatur annähernd ebensoviel Gramm, als die Tension des Quecksilbers in Millimetern ist

Höchst möglicher (maximaler) Wassergehalt in 1 Kubikmeter (=1000 l) Luft in Grammen und Tension des Wasserdampfes in Millimetern Quecksilber bei verschiedenen Temperaturen

Temp $^{\circ}\text{C}$	Tension mm	Wasser- gehalt in 1 cbm = gr	Temp $^{\circ}\text{C}$	Tension mm	Wasser- gehalt in 1 cbm = gr	Temp $^{\circ}\text{C}$	Tension mm	Wasser- gehalt in 1 cbm = gr
-20	0,927	1,0604	9	8,574	8,7988	22	19,659	19,6490
-15	1,400	1,5704	10	9,165	9,8717	23	20,888	20,4215
-10	2,098	2,8022	11	9,792	9,9782	24	22,184	21,6148
-5	3,118	3,8615	12	10,457	10,6181	25	23,550	22,8700
+	4,600	4,8763	13	11,162	11,2950	26	24,988	24,1846
+	5,217	5,2175	14	11,908	12,0074	27	26,505	25,5666
1	5,302	5,5798	15	12,699	12,7601	28	28,101	27,0150
2	5,637	5,9631	16	13,536	13,5549	29	29,782	28,5378
3	6,097	6,3696	17	14,421	14,3578	30	31,548	30,1233
4	6,584	6,8021	18	15,357	15,2523	31	33,405	31,8114
5	6,998	7,2587	19	16,346	16,2008	32	35,359	33,5482
6	7,432	7,7431	20	17,391	17,1768	33	37,410	35,3771
7	8,017	8,2567	21	18,495	18,2048	34	39,565	37,2919

Absolute Feuchtigkeit Hierunter versteht man diejenige Wassermenge, welche die Luft in einem bestimmten Falle in Form von Wasserdampf gerade enthält

Man bestimmt die absolute Feuchtigkeit, indem man ein bekanntes Volumen Luft von bekannter Temperatur über gewogene Absorptionsröhren leitet, welche Phosphorsäure Anhydrid oder mit konc. Schwefelsäure befeuchtete Bimsteinstücke enthalten. Die Gewichtszunahme dieser Röhren ist = dem aufgenommenen Wasserdampf

Relative Feuchtigkeit Als relative Feuchtigkeit r bezeichnet man das Verhältniss zwischen absoluter Feuchtigkeit a und maximaler Feuchtigkeit m ($m = 100$ angenommen) r ist demnach $\frac{a}{m} \cdot 100$

Beispiel Bei 20°C vermag 1 Kubikmeter Luft in maximo = 17,1768 g Wasserdampf aufzunehmen. Enthält eine Luft von 20°C in 1 cbm z. B. nur 12,0238 g Wasserdampf, so beträgt ihre relative Feuchtigkeit nach vorstehender Formel (oder der Gleichung $17,1768 \cdot 100 = 12,0238 \cdot x$) = 70 Proc

Man kann, wie aus diesem Beispiel ersichtlich ist, die relative Feuchtigkeit rechnerisch finden, nachdem man vorher die absolute Feuchtigkeit experimentell bestimmt hatte

Einfacher lässt sich die relative Feuchtigkeit der Luft durch besonders konstruirte Apparate feststellen, welche Hygrometer heissen. Die von LAMBRIZ, Füss u. A. konstruirten Hygrometer für relative Luftfeuchtigkeit zeigen direkt den Procentgehalt der Luft an relativer Feuchtigkeit an. Aus diesen Angaben lässt sich die absolute Feuchtigkeit leicht berechnen

Um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, finden wir z. B. durch das Hygrometer bei 20°C eine relative Feuchtigkeit von 70 Proc. Wir sehen aus der obigen Tabelle, dass 1 cbm Luft bei 20°C eine Maximal-Feuchtigkeit von 17,1768 g Wasser besitzt. Nach der Gleichung $100 : 17,1768 = 70 : x$, $x = 12,02376$ finden wir als Zahl für die absolute Feuchtigkeit pro Kubikmeter = 12,02376. Vgl. oben

Sättigungsdeficit Hierunter wird die Differenz zwischen maximaler und relativer Feuchtigkeit verstanden. Angenommen, die relative Feuchtigkeit beträgt 70 (Proc.), so ist das Sättigungsdeficit = 30, d. h. der Luft fehlen noch 30%, der bereits vorhandenen Feuchtigkeit, um völlig gesättigt zu sein

Thaupunkt Unter Taupunkt versteht man diejenige Temperatur, bei welcher die Luft die grösste Sättigung mit Feuchtigkeit aufweist. Wird die Luft auch nur ganz wenig unter diese Temperatur abgekühlt, so schlägt sich ein Theil des Wasserdampfes tropfbar flüssig als „Thau“ nieder. Kennt man die absolute Feuchtigkeit der Luft, so lässt sich der Taupunkt leicht aus der Tabelle ansehen. In unserem obigen Beispiel enthält die Luft pro Kubikmeter = 12,0238 g Wasserdampf. Wir sehen aus der Tabelle, dass die maximale Sättigung und damit der Taupunkt zwischen 14 und 15°C liegt. Durch Interpolation lässt sich leicht finden, dass die genaue Zahl $14,02^\circ \text{C}$ ist

Da wir aus der relativen Feuchtigkeit leicht die absolute Feuchtigkeit berechnen können, so ist es klar, dass wir mit Hilfe der Hygrometer für relative Feuchtigkeit auch in einfacher Weise den Taupunkt feststellen können. Hierauf beruht die Anwendung dieser Instrumente für die Wetterprognose

Zur experimentellen Bestimmung des Taupunktes dienen besonders, ziemlich einfach zu handhabende Instrumente die Hygrometer von DANIELL und AUGUST, von denen das letztere für das zuverlässigste gilt

Mit Hilfe des experimentell gefundenen Taupunktes können wir ohne weiteres leicht die absolute und relative Feuchtigkeit erschliessen. Um bei unserem Beispiel zu bleiben. Wir finden durch das Hygrometer einen Taupunkt von 14°C . Bei dieser Temperatur enthält 1 cbm Luft = 12,0074 g Wasserdampf. Wir haben damit die absolute Feuchtigkeit. Nun ist aber die Lufttemperatur 20°C . Bei dieser Temperatur ist die maximale Sättigung = 17,1768 g. Hieraus berechnet sich nach der Gleichung $\frac{12,0074 \cdot 100}{17,1768}$ die relative Feuchtigkeit zu rund 70 Proc

Es ist aus diesen Ausführungen ersichtlich, dass der Zusammenhang dieser drei Funktionen unter einander bei etwas Nachdenken leicht zu erschliessen ist

Ausdehnung durch die Wärme. Innerhalb der Temperatur von $0 \sim 100^\circ \text{C}$ ist bei gleichem Drucke das Volumen der Luft in sehr regelmässiger Weise abhängig von


der Temperatur Durch Steigerung der Temperatur um je 1°C wird das Volumen der Luft (wie jedes anderen Gases) um je $\frac{1}{273}$ (oder um 0,003667) vergrössert gegenüber dem Volumen, welches sie bei 0°C einnahm

Um mit diesen Verhältnissen leicht rechnen zu können, braucht man blos den Kunstgriff einzuhalten, die Einheit des Volumens bei 0° als $\frac{273}{273}$ in Rechnung zu stellen, mit anderen Worten anzunehmen, dass das Volumen der Luft bei $0^{\circ} = \frac{273}{273}$ Volume ist und dann für jeden Grad Temperaturerhöhung $\frac{1}{273}$ zuzuzahlen, für jeden Grad Temperaturerniedrigung aber $\frac{1}{273}$ abzunehmen

Beispiel A Bei 0° sei das Volumen der Luft = 800 ccm Wie viel beträgt es bei $+15^{\circ}\text{C}$? Bei 0° ist das Volumen $\frac{273}{273}$, bei $+15^{\circ}$ ist es $\frac{273+15}{273}$ also $\frac{288}{273}$ Mithin nehmen 800 ccm Luft von 0°C ($273 : 288 = 800 \cdot x, x = 843,7$) bei $15^{\circ}\text{C} = 843,7$ ccm ein

Beispiel B. Bei $+25^{\circ}\text{C}$ sei das Volumen = 720 ccm Wie viel beträgt es bei 0°C ? Bei $+25^{\circ}\text{C}$ ist das Volumen $\frac{273+25}{273} = \frac{298}{273}$ mithin bei 0° ($298 : 273 = 720 \cdot x, x = 659,6$) = 659,6 ccm

Atmosphären-Druck. Dem Drucke, welchen die Luft auf die irdischen Körper ausübt, wird das Gleichgewicht gehalten durch eine Quecksilbersäule von 760 mm Höhe (nämlich am Spiegel der Ostsee) Dieser Druck kann daher gleich dem Luftdruck gesetzt werden und wird als 1 Atmosphäre bezeichnet Um zu berechnen, wie gross der Druck, den 1 Atmosphäre auf die Flächeneinheit, z. B. auf 1 $\square\text{cm}$, in absolutem Gewicht ist, muss man folgendes überlegen Auf 1 $\square\text{cm}$ Grundfläche denke man sich eine Säule reinen Quecksilbers (0°C) von 76 cm (= 760 mm) Höhe aufgesetzt Es ist klar, dass diese Säule 76 Wüfel von je 1 $\square\text{cm}$ Grundfläche enthalten muss, mit anderen Worten der Volum-Inhalt dieser Säule beträgt 76 ccm Ware die Säule aus Wasser hergestellt, so würde sie 76 g wiegen Da sie aber aus Quecksilber hergestellt ist, so wird das Gewicht dieser Säule $76 \times 13,5959 \text{ g}$ [das spec Gewicht des Quecksilbers bei 0°C ist = 13,5959] also 1033,2884 g wiegen Dies ist in absolutem Gewicht der Druck, den 1 Atmosphäre auf 1 $\square\text{cm}$ Fläche ausübt Der 2 Atmosphären Druck auf 1 $\square\text{cm}$ Fläche entsprechende Druck (man muss sich zwei solcher Säulen aufeinander gesetzt denken) beträgt $2 \times 1033,2884 \text{ g}$, also 2066,5768 g u s w Andersseits beträgt der Druck, den 1 Atmosphäre auf 2 $\square\text{cm}$ Grundfläche ausübt (man muss sich zwei solcher Säulen nebeneinander gestellt denken) ebenfalls $2 \times 1033,2884 = 2066,5768 \text{ g u s w}$



Gegenwärtig wird auf Manometern und ähnlichen Messvorrichtungen angegeben, wie viel Kilogramm der Druck auf 1 qcm Grundfläche beträgt Nach dem Gesagten ist leicht zu berechnen, dass ein Druck von 1 kg auf 1 $\square\text{cm} = \left(\frac{1000}{1033,2884} \right) = 0,9678$ Atmosphären ist

Physiologisches Ein Erwachsener athmet während 24 Stunden etwa 9 cbm oder 11,6 kg Luft ein Die ausgeathmete Luft besteht aus Sauerstoff 15,4 Proc, Stickstoff (einschliesslich Argon) 79,2 Proc, Kohlensäure 4,4 Proc Ausserdem ist sie noch für eine Temperatur von etwa 34°C (s Tabelle) mit Wasserdampf gesättigt

Die Beschaffenheit der Luft wird demnach durch den Athmungsprocess verschlechtert, ebenso durch das Brennen von Flammen in geschlossenen Räumen Es steht fest, dass die Luft in einem geschlossenen Raume, in welchem zahlreiche Menschen sich aufhalten, allmählich immer untauglicher für die Athmung wird Ob der Grund hierfür lediglich darin zu finden ist, dass die Expirations-Luft ärmer an Sauerstoff und reicher an Kohlensäure ist als reine Luft, oder ob, wie von Klingen angenommen wird, die Expirationsluft direct giftige Substanzen enthält, kann dahin gestellt bleiben

Als Massstab für eine stattgehabte Verschlechterung der Luft in bewohnten Räumen gilt zur Zeit der Gehalt an Kohlensäure. Im Freien beträgt der Gehalt reiner Luft an Kohlensäure in 1000 Volumen etwa 0,3—0,4 Volume. Man bezeichnet in Wohnräumen die Luft als schlecht, wenn ihr Kohlensäure-Gehalt in 1000 Volumen mehr als 2 Volumen beträgt. (PETTENKOFER). Vorausgesetzt wird hierbei, dass diese Erhöhung im wesentlichen auf den Athmungsprocess zurückzuführen ist. Wird die Erhöhung dem Hauptwerthe nach durch das Brennen von Flammen verursacht, so gilt eine mässige Ueberschreitung des angeführten Grenzwertes als unbedenklich. Die Verbesserung einer über das Zulässige hinaus verunreinigten Luft ist durch genügende Zufuhr reiner Luft (Ventilation) zu erstreben.

Bestimmung der Kohlensäure. a) Minimetrisch nach LUNGE und ZUCKERDORF. Von einer $\frac{1}{10}$ -Normal-Sodalösung (welche im Liter 5,3 g Na_2CO_3 oder 14,3 g $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ enthält), welche pro Liter durch Zusatz von 0,1 g Phenolphthalein roth gefärbt ist, setze man 2 ccm zu 100 ccm ausgekochtem, destillirtem Wasser. Von dieser Lösung benutzt man stets 10 ccm zu dem nachstehend beschriebenen Versuche. Fig. 31.




Fig. 31.

Der Apparat besteht aus einem Glase von 100 ccm Fassungsraum, welches in durch die Figur erläuteter Weise mit einem Handgebläse verbunden ist, welches ein Rückschlagsventil enthält. Man füllt die Flasche zunächst mit der zu untersuchenden Luft, indem man mehrere Füllungen des Handgebläses hindurchtreibt. Dann öffnet man die Flasche, lässt, indem man die Pipette bis dicht an den Boden einsenkt, 10 ccm des obigen Reagens zufließen und setzt alsdann den Stopfen fest auf. Nun presst man den ganzen Inhalt der Kautschukbirne unter 1 minutenlangem Schütteln langsam, Blase für Blase, in die Flasche ein und schüttelt hierauf tüchtig. Alsdann wird eine weitere Füllung eingeblasen und wiederum tüchtig geschüttelt. Man setzt das Einblasen der Füllungen (wobei jedesmal geschüttelt werden muss) fort, bis das Reagens entfärbt oder nur noch sehr schwach rötlich ist. Alsdann ist der Versuch beendet. Die eingeblasenen Füllungen werden gezählt.

Jedem Apparat wird eine Gebrauchsanweisung beigegeben, aus welcher ersichtlich ist, welcher Kohlensäure-Gehalt der verschiedenen Anzahl von Füllungen entspricht. Bei reiner Waldluft werden z. B. = 40 Füllungen, bei noch guter Zimmerluft = 25 Füllungen verbraucht.

Tabelle für den Kohlensäuregehalt in 100 000 Th. Luft bei einem Fassungsraum des Ballons von 70 ccm.

Ballonfüllungen	CO_2 -Gehalt in 100 000 Th. Luft	Ballonfüllungen	CO_2 -Gehalt in 100 000 Th. Luft
2	25	7	11
3	21	8	10
4	18	10	8
5	15		
6	12		

b) Massanalytische Methode nach PETTENKOFER. Man bedarf hierzu folgender Reagentien etc.

1) Oxalsäurelösung. 1,405 g reine krystall. Oxalsäure in Wasser zu 1 l. gelöst. 1 ccm dieser Lösung = 0,0004906 g CO_2 = 0,25 ccm CO_2 bei 0° und 760 B.

2) Barytwasser. 8,5 g reines, alkalifreies Baryhydrat in Wasser zu 1 l. gelöst. Etwa vorhandenes Baryumsulfat lässt man absetzen. Man prüft diese Lauge in folgender Weise auf Verunreinigung durch Aetzkalkalien: Man titrirt die völlig klare Barytlauge mit Oxalsäure. Dann setzt man einer neuen Probe etwas gefälltes, reines, trockenes Baryumcarbonat hinzu, lässt absetzen und titrirt wieder. Braucht man zur letzten

Probe mehr Oxalsäure wie bei der ersten, so enthält das Barythydrat Alkali. Vor Kohlensäure geschützt aufzubewahren (Natronkalkrohr!) Man stellt den Wirkungswerth der Barytlauge gegenüber der Oxalsäure fest.

3) 1 Th Rosolsäure wird in 500 Th Alkohol von 80 Proc gelöst und mit soviel Barytwasser versetzt, dass die Lösung eben anfangt röthlich zu werden.

Die Ausführung der Bestimmung geschieht wie folgt.

Eine Flasche von bekanntem bez. ausgemessenem Fassungsraum (von 5—6 l) wird im Laboratorium durch Abspülen mit Wasser, Alkohol und Aether und darauffolgendes gründliches Ausblasen sauber und trocken gemacht. Diese Flasche wird, mit einer gut passenden Kautschukklappe verschlossen, an Ort und Stelle gebracht. Hier füllt man die Flasche mit der zu untersuchenden Luft, indem man mit Hilfe eines Blasebalges etwa 10 Minuten Luft in die Flasche einblasst. Der Blasebalg ist durch ein Stück Gummischlauch soweit verlängert, dass die Luft dicht über dem Boden der Flasche eintreten kann. Man notirt nun Lufttemperatur und Barometerstand und giebt in die Flasche 100 cem obiger Barytlösung und zwar so, dass man die Pipette möglichst dicht über dem Boden der Flasche auslaufen lässt. Man schliesst nun die Flasche sogleich durch Ueberziehen der Kautschukklappe und lässt nun die Absorption der Kohlensäure durch die Barytlösung dadurch vor sich gehen, dass man die Lauge an den Wandungen der Flasche vertheilt und diese sanft schwenkt. Nach 15—25 Minuten kann man sicher sein, dass die Absorption vollständig erfolgt ist. Nach Verlauf dieser Zeit gießt man die Barytlösung in ein wenig mehr als 100 cem fassendes Gefäss (100 cem Kolbehen), verkoarkt dieses luftdicht und lässt es (3—6 Stunden) stehen, bis das ausgeschiedene Baryumcarbonat sich völlig abgesetzt hat, und die Flüssigkeit absolut klar geworden ist. Man entnimmt von der klaren Flüssigkeit 25 cem, fügt einige Tropfen Rosolsäure hinzu und trübt mit der Oxalsäure Lösung auf Gelb.

Man berechnet das erhaltene Resultat auf die gesammte Menge (von 100 cem) der Barytlauge und weiss nun, wie viel Kohlensäure in dem Luftvolumen, welches dem Inhalt der Flasche entspricht, abzüglich 100 cem (für die zugegossene Barytlauge) enthalten ist.

Das Resultat des Versuches wird in der Regel in Volumenprocenten bei 0° C und 760 mm Barometerstand angegeben. Für die Umrechnung der Gewichtsmengen Kohlensäure in Volumina hat man nur nöthig, die Zahl der gefundenen Milligramme CO₂ mit 0,506 zu multiplizieren. Man erhält alsdann die diesen Milligrammen entsprechende Anzahl cem CO₂ bei 0° und 760 B. s. S. 31.

Die Reduktion des gemessenen Luftvolumens erfolgt nach der Gleichung

$$V = \frac{V_1 \cdot B}{(1 + 0,003667 \cdot t) \cdot 760}$$

In dieser Gleichung bedeutet V das gesuchte Volumen, V₁ das gemessene Volumen minus 100 cem, B den beobachteten Barometerstand, t die Temperatur.

Nachweis von Kohlenoxyd. Eine Flasche von etwa 5 Liter Fassungsraum füllt man durch einen Blasebalg, an dessen unteres Ende ein bis zum Boden der Flasche reichender Gummischlauch angebracht ist, mit Luft des zu untersuchenden Raumes an. Alsdann schüttet man in die Flasche 50—100 cem einer verdünnten, filantien Blutlösung (10 Th frisches Blut und 40 Th reines Wasser), verschliesst die Flasche mit einer Gummikappe und absorbt durch 15—20 Minuten andauerndes, leichtes Schütteln das vorhandene Kohlenoxyd in der Blutlösung. Von dieser Blutlösung werden 10 Tropfen mit 20 cem Wasser verdünnt und mittelst eines Spektroskopes vor und nach der Behandlung mit gelbem Schwefelammonium auf das Vorhandensein von Kohlenoxyd-Hämoglobin geprüft. — Daneben sind stets Vergleichsversuche mit demselben reinen Blute und zwar gleichfalls vor und nach der Behandlung mit gelbem Schwefelammonium anzustellen.

Argon und Helium. Um die einzelnen Bestandtheile der Luft nachzuweisen und zu bestimmen, kann man in folgender Weise verfahren. Man leitet ein bestimmtes Volumen Luft über Chlorcalcium oder durch conc. Schwefelsäure oder über glasige Phosphorsäure

und bestimmt hierdurch die Feuchtigkeit. Alsdann führt man sie durch kono Kahlauge und hierauf über neutrales Calciumchlorid. Die Gewichtszunahme in diesen beiden Apparaten giebt die Menge der vorhandenen Kohlensäure an. Den nunmehr noch vorhandenen Gasrest leitet man über glühendes Kupfer oder lässt ihn auf gelben Phosphor einwirken. Das glühende Kupfer oder der Phosphor entziehen dem Gasgemenge den Sauerstoff, und es hinterbleibt schliesslich ein Gasrest, welcher bisher für Stickstoff gehalten wurde. Es hat sich indessen herausgestellt, dass auch dieser Gasrest noch ein Gemenge und zwar von Stickstoff und Argon ist. Leitet man das Gemenge mehrmals über glühendes Magnesium, so absorbiert dieses den Stickstoff unter Bildung von Stickstoff-Magnesium (Magnesiumnitrid), und es hinterbleibt schliesslich reines Argon, welches nicht mehr das Funkenspektrum des Stickstoffs, sondern ein von dem verschiedenes Funkenspektrum giebt.

Argon. $Ar = 39,9$ Mol. Gew. $= 39,9$ (von α priv und β priv, d. i. ohne Wirkung). Zu 0,9 Vol. Proc. in der Luft enthalten, auch in den Quellgasen der Geysir-Quellen von Reykjavik (Island) in den Quellgasen von Wildbad und zahlreicher Pyrenäen-Quellen nachgewiesen.

Ueber die Darstellung s. kurz vorher. Farbloses, dem Stickstoff in allen physikalischen Eigenschaften sehr ähnliches Gas. Das spec. Gew. ($H = 1$) ist $= 19,85$ (Atom- und Molekulargewicht sind $= 39,9$). Demnach besteht das Molekül nur aus einem Atom. Das Gas kann verflüssigt werden. Der Siedepunkt des flüssigen Argons liegt bei $-185^{\circ}C$. Bei $-200^{\circ}C$ erstarrt das flüssige Argon zu einer eisartigen Masse, die bei $-189,5^{\circ}C$ schmilzt. Giebt ein von demjenigen des Stickstoffes abweichendes Funkenspektrum. Zeichnet sich durch sehr geringe Verbindungsfähigkeit aus. Verbindungen mit anderen Elementen sind nicht mit Sicherheit bekannt.

Helium. $He = 4,0$ Mol.-Gew. $= 4,0$ (von η priv, Sonne). Zuerst 1868 von Lockyer in der Sonnenatmosphäre nachgewiesen, 1895 auch als irdisches Element erkannt und in einigen Mineralen z. B. dem Cleveit aufgefunden, wo es in eigenthümlicher lockerer Bindung vorkommt. In sehr geringer Menge auch in unserer Luft enthalten.

Zur Darstellung werden die Mineralen zuerst im Vakuum erhitzt, um Wasserdampf, Kohlensäure, sowie Luft zu entfernen. Das jetzt entweichende Gas ist Helium — ein dem Stickstoff physikalisch sehr ähnliches Gas, welches bei $-268^{\circ}C$ noch nicht verflüssigt ist. Spec. Gew. ($H = 1$) ist $= 4$. 100 ccm des Gases wiegen 0,018 g. Die Werthigkeit ist unbekannt.

Aether.

I Aether (Austr. Brit. Germ. Helv. U.-St.) **Aether sulfuricus.** **Ether** (Gall.) **Naphtha Vitrioli.** **Schwefeläther.** **Aethyläther.** **Ether.** $(C_2H_5)_2O$. Mol.-Gew. $= 74$.

Darstellung. Diese erfolgt in chemischen Fabriken, in pharmaceutischen Laboratorien wird Aether nur gelegentlich einmal als Übungspräparat dargestellt. Hierüber sind eingehende Angaben in dem Kommentar von Hager-Fischer-Hartwich gemacht worden.

Handelssorten. Die Preislisten der Drogisten führen mehrere Sorten Aether auf, welche vorzugsweise durch das spezifische Gewicht charakterisirt sind. 1) *Aether*, Ph. Germ. III, spec. Gew. 0,720, ein reiner, praktisch von Wasser und Alkohol freier Aether. Als „Aether“ aufgenommen von Germ. und Helv., von Brit. als „Aether purificatus“, von Gall. als „Ether officinal“. 2) *Aether rectificatus*, spec. Gew. 0,725–0,730, aufgenommen von Austr. und U.-St. als „Aether“, von Gall. als „Ether rectifié du commerce“. 3) *Aether rectificatus*, spec. Gew. 0,735, aufgenommen von Brit. als „Aether“. 4) *Aether über Natrium rectificatus*, ein von Wasser und Alkohol völlig freies Präparat, besonders zu Extraktionen in der chemischen Analyse verwendet. 5) *Aether pro narcosis*, in der Regel nur in Originalflaschen abgegeben, ein mit besonderer Sorgfalt hergestelltes und dispensirtes, alkohol- und wasserfreies Präparat.

Eigenschaften des Aethers Ph. G. III. Spec. Gew. 0,720. Seitdem durch die Ph. G. III. die Ansprüche an den Aether — welchen die Fabrikanten ohne weiteres nachzukommen vermögen — erhöht worden sind, kann diese Sorte als die gebräuchlichste des Handels angesehen werden. Klare, farblose, dünne und bewegliche Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruch und brennendem Geschmack, sehr leicht flüchtig und sehr leicht ent-

rundlich Spec Gewicht 0,720 Siedepunkt 35–36°C Erstarrt bei –129°C zu farblosen Kristallnadeln, die bei –117°C schmelzen Ist schon weit unter seinem Siedepunkte leicht flüchtig und entzieht beim Verdunsten seiner Umgebung Wärme, erzeugt also Kalte Aetherdampf ist 2,57 mal specifisch schwerer als Luft, sinkt also zu Boden Entzündet, verbrennt der Aether mit leuchtender, russender Flamme Aetherdämpfe sind leicht und noch auf grosse Entfernung entzündlich, mit Luft gemischt geben sie explosive Gemenge

Mit Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fetten und aetherischen Oelen ist er in jedem Verhältniss mischbar 1 Th Aether wird bei 15°C von 13 Th Wasser, anderseits 1 Th Wasser von 35 Th Aether gelöst

Man beachte, dass Aether hygroskopisch ist und dass er, selbst wenn er ursprünglich das spec Gewicht 0,720 hatte, doch in Folge öfteren Umgießens etc, ein etwas höheres spec Gewicht, z B 0,722 annehmen kann

Aether ist ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für zahlreiche organische Stoffe Fett, Harz, Paraffin, Alkaloide Von anorganischen Substanzen werden gelöst Jod, Schwefel, Phosphor, Ferrichlorid, Quecksilberchlorid, Goldchlorid

Absolut reiner Aether blaut feuchtes rothes Lackmuspapier (GUNTHER)

Durch den Sauerstoff der Luft wird reiner Aether namentlich bei gleichzeitiger Einwirkung des Lichtes allmählich verändert Es treten in ihm eine Anzahl von Oxydationsprodukten auf, unter denen mit Sicherheit nachgewiesen sind Acetaldehyd, Essigsäure, Vinylalkohol, ferner Wasserstoffsuperoxyd Beim Rektificiren von Aether, welcher längere Zeit aufbewahrt worden war, hinterbleibt bisweilen ein bei 100°C noch nicht flüchtiger Rückstand, welcher durch Berühren und Ueberhitzen schon mehrfach zu Explosionen Veranlassung gegeben hat Man nimmt an, dass ein Gehalt an Wasserstoffsuperoxyd bez Äthylperoxyd die Ursache für diese Erscheinung ist Um einen solchen Aether wieder brauchbar zu machen, lässt man ihn zur Zerstörung des Wasserstoffsuperoxydes zunächst einige Stunden unter öfterem Umschütteln mit wässriger, schwefliger Säure in Berührung, alsdann wird die Aetherschicht abgehoben und zur Entsauerung mit Kalkmilch, geschüttelt Die abgetrennte Aetherschicht wird durch Maceriren über geschmolzenem Calciumchlorid entwässert Hierauf giesst man den Aether ab und rektificirt ihn unter Zusatz von 1 g Phenylhydrazin pro 1 kg Aether (welches den Vinylalkohol bindet) aus dem Wasserbade

Prüfung 1) Der Aether sei farblos, klar, siede bei 35–36°C und habe bei 15°C das spec Gewicht 0,720 Alsdann kann er wesentliche Mengen Alkohol oder Wasser kaum noch enthalten 2) 20 ccm Aether sollen beim Abdunsten einen nicht sauer reagirenden feuchten Beschlag hinterlassen, der auf dem Wasserbade völlig flüchtig ist Lässt man 10 ccm Aether auf gutem Filterpapier abdunsten, so darf dieses später keinen fuselartigen Geruch erkennen lassen (Weinöl, Fuselöl) 3) Schüttelt man 5 ccm Aether mit 5 Tropfen verdünnter Schwefelsäure und 2 Tropfen Kaliumdichromatlosung, so darf Blaufärbung nicht eintreten (Wasserstoffsuperoxyd) 4) Lässt man Aether in einem völlig angefüllten Glasstopfenglas unter öfterem Umschütteln und zwar im zerstreuten Tageslichte über einigen Stücken trocknen Actzkalks stehen, so darf dieses im Verlaufe einer Stunde keine gelbe Färbung (bez gelbe harige Ablagerungen) zeigen (Aldchyd) 5) Bringt man in ein Glasstopfenglas von 15 ccm Fassungsraum 1 ccm jodshurefreie Kaliumjodidlösung, füllt das Glas völlig mit Aether an, setzt den Stopfen auf und lässt das Glas unter öfterem Umschütteln im zerstreuten Tageslicht stehen, so darf innerhalb 1 Stunde Gelbfärbung nicht eintreten (Wasserstoffsuperoxyd) 6) Schüttelt man 10 ccm Aether mit 10 ccm Wasser, so darf die wässrige Schicht nach dem Absetzen höchstens 11 ccm, die Aetherschicht muss mindestens 9 ccm betragen, anderenfalls liegt ein ungewöhnlicher Alkoholgehalt vor Diese Prüfung ist zweckmässig in einem „Aether-Probeglas“ auszuführen Indessen ist ein abnormer Alkoholgehalt bei einem Aether von 0,720 spec Gew kaum zu besorgen



Fig 32
Aether-
probier-
cylinder

Aether, spec Gewicht 0,725 (Aether der Austr und U-St, Éther rectifié du commerce (Gall), enthält etwa 97 Proc Aether, 3 Proc Alkohol und Spuren Wasser)

Aether, spec Gewicht 0,735 (Aether der Brit) Enthält (mindestens) 92 Proc Aether, und etwa 5–6 Proc Alkohol, sowie 2–3 Proc Wasser

Aether, wasserfrei, über Natrium destillirt Zur Herstellung trägt man in den Aether, welcher sich in einem mit Rückflusskühler verbundenen Kolben befindet, allmählich soviel Natrium ein, dass einige Stücke im Ueberschuss vorhanden sind, und lässt unter Chlorcalciumverschluss des Kühlers so lange stehen, bis alle Gasentwicklung aufgehört hat. Dann destillirt man den Aether aus dem Wasserbade ab und schützt dabei die Vorlage durch einen Chlorcalcium-Verschluss vor dem Zutritt von Feuchtigkeit.

Trägt man in 15 cem Aether, welche sich in einem absolut trockenen, völlig angefüllten Gläschen befinden, ein erbsengrosses Stückchen blankes Natrium ein, so darf keine oder nur eine sehr unbedeutende Gasentwicklung stattfinden und das Natrium muss etwa 6 Stunden blank bleiben.

Um für analytische Extraktionsarbeiten jederzeit wasserfreien Aether zur Hand zu haben, bewahrt man einen Aether von 0,720 über scharf geglühtem Kaliumcarbonat auf und filtrirt im Bedarfsfalle ein Quantum ab.

	Name	Spec Gew	Siedep		Name	Spec Gew	Siedep
Austr	Aether	0,725	35–36°	Gall	Éther officinal	0,720	31,5°
Brit	Aether	0,735	40,5°	Geru	Aether	0,720	35,0°
	Aether purus	0,720		Helv	Aether	0,730–0,723	35°
Gall	Éther rectifié du commerce	0,724		U St	Aether	0,725–0,723	37°

Aufbewahrung Wegen der leichten Flüchtigkeit des Aethers stelle man auch die Aetherflasche der Officin nicht in die oberen Fächer der Regale, wo unter Umständen eine Wärme von 30° C und mehr herrschen kann, sondern bringe sie möglichst nach dem Fussboden zu unter. Die grosseren Vorräthe bewahre man in einem kühlen Räume, also im Keller. Als Aufbewahrungsgefässe wähle man Glasflaschen mit gut eingeschliffenen Glasstopfen, oder weniger gut mit sehr guten porcellänen Korken, welche mit Leder überbunden werden. Die Flaschen wähle man nicht zu gross, also zweckmässig nicht über 1–2 l Fassungsraum und fülle sie, weil der Aether durch Erwärmung beträchtliche Ausdehnung erfährt, nicht ganzlich voll, sondern höchstens zu $\frac{3}{4}$ an.

Zum Umfüllen von Aether aus einem Gefässe in das andere benutze man stets einen Trichter und wenn es sich vermeiden lässt, so unterlasse man das Umfüllen bei brennendem Lichte, namentlich im Keller. Daher lässt man die Aetherflasche der Officin niemals ganz leer werden, sondern füllt sie lieber am Tage, auch wenn sie noch halb voll sein sollte. Wird aber des Abends Aether dringend gebraucht, so hole man eine der Vorrathsflaschen aus dem Keller in die Officin oder in einen Nebenraum und nehme hier das Umfüllen vor. Muss mit Licht geleuchtet werden, so soll dieses (eine Laterne) mehrere Schritte von dem Aether entfernt in die Höhe gehalten werden, weil die Aetherdämpfe in Folge ihrer specifischen Schwere zu Boden sinken.

Grossere Mengen Aether bezieht man zweckmässig während des Winters, dabei giebt man dem Lieferanten die Anweisung, dass er die Transportgefässe nur zu $\frac{1}{4}$ anfüllen soll. Andersseits müssen die mit niedriger Temperatur ankommenden Aethergefässe, wenn sie in einem wärmeren Raum gelagert werden, zunächst geöffnet und unter lockerem Verschluss des Stopfens stehen gelassen werden, bis sie die Temperatur des betr. Raumes angenommen haben, denn 1000 Volume Aether von 5° C dehnen sich soweit aus, dass sie bei 20° C = 1020 Volume einnehmen. Andersseits entspricht die Tension des Aetherdampfes bei 0° C einer Quecksilbersäule von 133 mm, bei 10° C von 236 mm, bei 20° C von 433 mm.

Ueber die Lagerung grösserer Mengen Aether existiren besondere lokale Verordnungen, welche auch von Seiten des Apothekers zu beachten sind.

Kommt eine grössere Aethermenge (z. B. einige kg) zur Entzündung, so ist der ganze Verlauf der Verbrennung ein so rapider und die Hitze-Entwicklung eine so starke, dass in der Nähe der Unfallstelle sich aufhaltende Personen und befindliche Sachen auf das dringendste gefährdet sind. Gelangen Gemische von Luft und Aetherdampf zur Entzündung, so können Explosionen von furchtbarer Gewalt eintreten. Grosse

Aethermengen soll man überhaupt nur bei Tageslicht, im Freien, fern von jedem Feuer (Cigarret) abfüllen

Um Flammen in einer Aetheratmosphäre gefahrlos brennen zu können, umgibt man sie mit einem engmaschigen Drahtnetz. Die eigens hierfür konstruierten Brenner heissen „Bunsenbrenner mit Sicherheitskorb“

Anwendung Ausselich auf die Haut gebracht, erzeugt Aether Kalte. Daher benutzt man ihn in der Form der Aufstaubung, um lokale Anästhesie zu erzeugen (Cave Galvanokauter, Feuer, Licht). Um diesen Zweck gut zu erreichen, muss der Aether frei von Wasser und Alkohol sein. Auftraufungen von Aether wendet man an als schmerzstillendes Mittel bei Neuralgien, z. B. Migräne. Innerlich genommen als starkes Erregungsmittel, daher in Gaben von 5—10—20 Tropfen unvermischt oder mit alkoholischen Flüssigkeiten kombiniert bei Ohnmachten, Kollaps, ferner bei krampfhaften Zuständen, Hysterie, Kolik. Subkutan als starkes Exzitans bei plötzlich eintretenden Kollaps und Schwächerzuständen.

Eingethmet bewirkt Aether nach einem kurzen Erregungsstadium vollständige Bewusst- und Gefühllosigkeit. Die Gefahr einer Respirations- oder Herzlähmung ist geringer als beim Chloroform, daher unvermischt oder in bestimmten Mischungen dem Chloroform neuerdings vielfach für die Narkose vorgezogen.

Gewohnheitsmässiger Genuss (auch Einathmen) von Aether führt zu gleichen gesundheitlichen Störungen wie derjenige des Alkohols.

II Spiritus aethereus Aetherweingeist. **Liquor anodynus Hoffmanni** Hoffmannstropfen (Gem. Helv.) Mischung aus 1 Th. Aether und 3 Th. Weingeist. **Spiritus Aetheris Austr.** 1 Th. Aether und 3 Th. Weingeist. **Brit.** 300 cem Aether, 480 cem Weingeist. **U-St.** 325 cem Aether, 675 cem Weingeist. **Ether à 0,758 Gall.** 7 Th. Aether (von 0,724), 3 Th. Weingeist. **Ether officinal alcoolisé (Gall.)** 1 Th. Aether (0,720), 1 Th. Weingeist.

Als Krampfmittel in Gaben von 10—50 Tropfen auf Zucker oder mit Wasser verdünnt. Unter dem Namen „Liquor“ von Mitgliedern der Massigkeitsvereine als Alcoholicum genossen.

III Oleum aethereum Ethereal oil (U-St.) Man mischt 1000 cem Alkohol (95 Proc.) mit 1000 cem konz. Schwefelsäure (Vorsicht!) und lässt die Mischung stehen (24 Stunden), bis sie sich geklärt hat. Dann destillirt man aus einer in ein Sandbad eingesetzten Retorte (ein in die Flüssigkeit eingesenktes Thermometer zeige 150—160°C), bis 80 Tropfen nicht mehr übergehen, bez. bis der Retorteninhalt sich stark zu schwärzen beginnt. Man trennt die gelbe ölige Schicht von dem überstehenden Wasser, lässt sie 24 Stunden an der Luft stehen, schüttelt sie nochmals mit 25 cem Wasser aus, scheidet sie wieder, filtrirt durch ein trocknes Filter und vermischt sie mit einem gleichen Volumen Aether. Das Präparat ist eine Mischung gleicher Volume schweren Weindls und Aether. Spec. Gew. = 0,910.

IV Spiritus Aetheris compositus Compound Spirit of Ether. (Hoffmanns Anodyne nach Brit. und U-St.) U-St. Olei aetheri (U-St.) 25 cem, Spiritus (94 Vol. Proc.) 650 cem, Aether 650 cem.

Brit. Man mischt allmählich 900 cem konz. Schwefelsäure zu 1000 cem Alkohol (90 Proc.) und lässt die Mischung 24 Stunden lang stehen, dann destillirt man, bis ein eingetauchtes Thermometer 171,8°C anzeigt. Man lässt das Destillat in einem Scheidetrichter absetzen, zieht die untere (wässrige) Schicht ab und wäscht die zurückbleibende leichtere zunächst mit etwa 80 cem Wasser, und trägt hierauf Natriumbicarbonat ein bis zur Neutralität. Dann hebt man die ätherische Schicht ab, und vermischt sie mit 187,5 cem Aether und 950 cem Weingeist von 90 Proc. Farblose Flüssigkeit, spec. Gew. 0,808—0,812.

Aether pro narcosi ist wasserfreier absoluter Aether, welchem zum Zwecke der Haltbarkeit 2 Proc. absoluten Alkohols zugesetzt sind.

Gasäther, früher zu Beleuchtungszwecken benutzt. Spiritus (95 Proc.) 80,0, Terpentanol 15,0, Aether 5,0.

Englischer Aether für die Narkose ist ein Gemisch von Methyläther und Äthyläther, welches allerdings frei von Wasser ist. Spec. Gewicht 0,715—0,717.

Aether anaestheticus König Nach SCHNEIDER eine Mischung aus 4 Vol Aether Petrolei (Rhgolen) und 1 Vol Aether, beide Bestandtheile völlig wasserfrei

Aether perlatus Perles d'éther Aether-Kapseln Sind kugelförmige Gelatine-Kapseln mit Aether gefüllt Jede Kapsel enthält etwa 5 Tropfen Aether Die Darstellung erfolgt fabrikmässig

RICHARDSON's Aethermischung zur lokalen Anästhesie Aether 75,0, Karbolsäure 0,8
Methylated ether. Ist ein in England als Kälte-Anästhetikum viel benutztes Präparat Es ist aus Methylalkohol enthaltendem Äthylalkohol (behufs Denaturierung) hergestellt, aber völlig frei von Alkohol und Wasser Besteht aus einem Gemisch von Methyläther mit Äthyläther Siedet zwischen 24 und 34° C Das spec Gew ist bei 15° C etwa = 0,716

Aether chloroformatus WEIGEL

Rp Chloroformi 5,0
 Aethers 15,0

Aether gelatinosus

Rp Albumen ovi unius
 Aethers 50,0

Werden in einer weithalsigen Flasche kräftig geschüttelt, bis eine gelatinöse Masse entstanden ist Zum Bestreichen schmerzhafter Stellen, auf eingeklemmte Brüche etc

Aqua aetherea

Rp Aetheris 10,0
 Aquae destillatae 100,0

Man schüttelt in einer Flasche kräftig zusammen und zieht die wässrige Flüssigkeit mit Hilfe eines Scheidetrichters vom nicht gelösten Aether ab

Aqua aetherea camphorata

Rp Aetheris camphorati 10,0
 Aquae destillatae 200,0

Man schüttelt kräftig zusammen und filtrirt ab

Liquor inhalatorius contra tussim convulsivam WID

Rp Chloroformi 15,0
 Aetheris 30,0
 Oel Terbinthinace 5,0

Man giesst 1 Löffel der Mischung auf ein Tuch und athmet die Dämpfe ein, bis der Anfall vorüber ist

Sirupus Aetheris BREXIAUER Sirup d'Ether Gall

	Bad T	Gall
Rp Sirupi Sacchari	90,0	70,0
Spiritus (90 Proc)	5,0	5,0
Aetheris	5,0	2,0
Aquae	—	25,0

Hiev Aetheris, Spiritus 22,0 Aquae 80,0 Sacchari 55, werden in einer Flasche häufig geschüttelt und nach der Auflösung filtrirt

Aether methylco aethyllous Methyläthyläther $\text{CH}_3\text{—O—C}_2\text{H}_5 = 60$ Wird in chemischen Fabriken durch Einwirkung von Jodäthyl auf Natriummethylat dargestellt
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{J} + \text{CH}_3\text{ONa} = \text{NaJ} + \text{CH}_3\text{—O—C}_2\text{H}_5$

Farblose, ätherisch riechende Flüssigkeit, leicht entzündlich, bei -11°C siedend, also schon bei mittleren Temperatur gasförmig Nur in druckfesten Gefässen zu versenden Ersatz des Chloroforms, soll wie dieses anästhesierend wirken, ohne die üblen Nebenwirkungen zu zeigen

Aether aceticus.

I Aether aceticus (Anstr Brit Germ Hely U St) Éther acétique (Gall) Essigäther. Essigester. Äthylacetat. Essig-Naphtha. Acetic ether. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$. Mol.-Gew. = 88.

Darstellung Diese erfolgt im Grossen in chemischen Fabriken. Indessen ist die Selbstdarstellung im pharm Laboratorium doch zu empfehlen, weil sie ein bei weitem besser riechendes Produkt liefert

6 Th krystallisiertes Natriumacetat werden in einer blanken eisernen Pfanne auf freiem Feuer allmählich so lange erhitzt, bis die flüssig gewordene Masse wieder fest und hierauf — bei weiterem Erhitzen — abermals flüssig wird (s Natrium aceticum) Man lässt erkalten, pulverisirt und schlägt durch einen groben Durchschlag

4 Th entwässertes Natriumacetat werden in einen Destillationskolben gegeben, in welchem sich ein erkaltetes Gemisch von 8 Th Weingeist (95 Vol Proc) + 5 Th konz Schwefelsäure befindet Der Destillationskolben ist an einen gut wirkenden LIEBIG'schen Kühler angeschlossen Man lässt die Mischung unter gelegentlichem Umschwenken 12 Stunden lang stehen, alsdann destillirt man unter guter Kühlung 4 Th aus dem Wasserbade ab Das Destillat (4 Th) wird mit 4 Th Wasser und soviel Magnesiumkarbonat geschüttelt, dass die saure Reaktion aufgehoben ist Dann fügt man 2 Th Kochsalz hinzu, schüttelt durch und lässt absetzen Man trennt die oben aufschwimmende, ätherische Schicht mittels eines Scheidetrichters ab, bringt sie in eine Flasche und trägt

so lange geschmolzenes Calciumchlorid ein, bis dieses nicht mehr feucht wird. Nun lässt man unter öfterem Umschütteln einen Tag lang in gut verstopfter Flasche stehen, alsdann giesst man den Aether ab und rektifiziert ihn durch Destillation aus dem Wasserbade (Helv)

Wegen der leichten Entzündlichkeit des Essigäthers ist bei der Darstellung die erforderliche Vorsicht zu beobachten

Eigenschaften Klasse, farblose, neutrale, leicht flüchtige, angenehm erfrischend riechende und schmeckende Flüssigkeit. Sie ist leicht entzündlich, ihr Dampf giebt, mit Luft gemengt, explosive Gemische. Ihrer chemischen Zusammensetzung nach besteht sie hauptsächlich und zwar bis zu etwa 98 Proc aus Aethylacetat, daneben enthält sie etwa 2 Proc Alkohol und kleine Mengen Wasser. Durch Variation der Darstellung kann in dessen das Verhältniss zwischen Alkohol und Aethylacetat verschoben werden, ja es scheint, als ob unter Umständen durch Nebenreaktionen gleichzeitig auch noch andere Aether entstehen, welche sich durch abweichenden Geruch erkennbar machen. Hiervon kommt es, dass spec Gewicht, Siedepunkt und Löslichkeit in Wasser von den verschiedenen Pharmakopöen verschieden angegeben werden.

	Austr	Brit	Gall	Germa	Helv	U-St.
Spec Gew bei 15°	0,900	0,900—0,905	0,915	0,900—0,904	0,901	0,899—0,895
Siede Temperatur	74—76°	73,9—77,8°	73,3°	74—76°	76°	ca. 76°
1 Th löst sich in ? Th Wasser	—	10 Th	12 Th	—	15 Th	8 Th

Das absolut reine Aethylacetat hat das spec Gew 0,899 bei 15° C, es siedet bei 72,8° C und ist löslich in 18 Th Wasser von 15° C, andererseits lösen 28 Th Essigäther = 1 Th Wasser auf. Hieraus ergibt sich, dass die Angaben der Germa und Helv auf ein reines Aethylacetat zutreffen, welches etwa 1 Proc Aethylalkohol und kleine Mengen Wasser enthält.

Entzündet verbrennt der Essigäther mit blaugelber, russender Flamme, unter Verbreitung eines sauren Geruches und Hinterlassung eines sauren flüssigen Rückstandes. Mit Alkohol, Aether, Chloroform, fetten und ätherischen Oelen ist der Essigäther in allen Verhältnissen mischbar. Als Lösungsmittel verhält er sich dem Aether ziemlich ähnlich, in der organischen Chemie ist er ein beliebtes Lösungs- und Krystallisationsmittel (Löst z B Morphin und Cantharidin auf).

Mit der Luft in Berührung, nimmt der Essigäther, namentlich bei gleichzeitiger Gegenwart von Feuchtigkeit, saure Reaktion an, indem er in Essigsäure und Aethylalkohol gespalten wird. (Reinigung durch Schütteln mit Magnesiumcarbonat + Wasser s bei Darstellung). Aetzende Alkalien zersetzen den Essigäther, besonders bei Digestionswärme, sehr leicht. Aus der Menge des durch die Essigsäure gesättigten Alkalis, lässt sich die Menge des Essigäthers quantitativ bestimmen. Behufs Trennung aus Gemischen mit Chloroform, Petroläther, Benzin, Schwefelkohlenstoff, schüttelt man den Essigäther mit Wasser aus.

Prüfung 1) Man bestimmt das spec Gewicht, ferner die Siedetemperatur, ausserdem stellt man fest, wie der Geruch ist. Manche Handelsorten riechen nicht wie Essigäther, sondern mehr wie Bienenäther. Tränkt man gutes Filterpapier mit etwa 10 cem Essigäther, so darf das Papier gegen Ende der freiwilligen Verdunstung des Aethers Geruch nach fremden Aetherarten nicht zeigen. 2) Taucht man in den Aether einen Streifen blaues Lackmuspapier, so darf dieses unmittelbar nach dem Eintauchen sich nicht rothen (reine Essigsäure). Beim Abdunsten des Aethers wird das Lackmuspapier auch von nicht saurem Essigäther roth gefärbt. Diese Rothfärbung verschwindet nach 1—2stündigem Liegen des Papiers an der Luft, wenn nur Essigsäure die Ursache ist, bleibt sie bestehen, so sind noch andere Säuren zugegen. 3) Schüttelt man in einem Aether-Probir-Rohr 10 cem Essigäther mit 10 cem Wasser, so darf das Volumen der wässrigen Schicht allerhöchstens auf 11 cem anwachsen, anderenfalls liegt grobe Verfälschung durch Alkohol vor. Es ist wichtig, diese Probe auszuführen, da das spec Gewicht des Essigäthers auch Mischungen von Aether und Alkohol gegeben werden kann. 4) Schichtet man 1 cem Essigäther auf 1 cem concentrirte Schwefelsäure, so darf eine gefärbte Zone nicht auftreten, anderenfalls liegen Verunreinigungen vor, z B durch Amylverbindungen oder andere organische Stoffe.

Aufbewahrung An einem kühlen, schattigen Orte unter den gleichen Vorsichtsmaassregeln wie der gewöhnliche Aether. Ist er im Verlaufe der Aufbewahrung sauer geworden, so wird er durch Schütteln mit Wasser + Magnesiumcarbonat entsäuert, darauf durch Calciumchlorid entwässert und durch Rectifikation aus dem Wasserbade vollkommen wieder hergestellt. Den zum Handverkaufe bestimmten Essigäther kann man über einigen Kaliumtartrat-Krystallen (*Kalium tartaricum neutrale*) aufbewahren. Je weniger Feuchtigkeit der Essigäther enthält, desto weniger neigt er zum Sauerwerden, Lichtschutz halt die Zersetzung gleichfalls zurück.

Anwendung. Die Wirkung ist äusserlich wie innerlich etwa die gleiche wie die des Aethers. Man benutzt ihn am häufigsten als Reuchmittel bei Ohnmachten und krampfartigen Zuständen, als Einreibung gegen rheumatische und neuralgische Schmerzen, seltener innerlich an Stelle des Aethers, bei den dort angegebenen Krankheitszuständen. Dosis 5–20 Tropfen unvermischt auf Zucker oder in Gelatinekapseln oder in alkoholischer Lösung oder mit Wasser verdünnt mehrmals täglich.

Spiritus aceticus-aethereus Spiritus Aetheris aceticus Spiritus anodynus vegetabilis Gemisch aus Aether aceticus 1 Th und Spiritus (90 Vol Proc) 8 Th Zweckmässig über einigen Kaliumtartrat Krystallen aufzubewahren.

Balsamum aceticum camphoratum
Opodeldocum Aethere aceticum

Rp Saponis steariniel dialysati 10,0
Aetheris aceticus 60,0
Spiritus (90 Vol Proc) 50,0
Camphorae 5,0
Oleum Thymol 2,0

Man löst die kleingeschnittene Seife in dem Gemisch von Essigäther und Spiritus unter Erwärmen auf 50° C auf, fügt den Kampher und das Thymanol zu, filtrirt und lässt in geeigneten Gefässen erstarren.

Balsamum antarthriticum SANCERUS

Rp Saponis steariniel dialysati 5,0
Camphorae 2,5
Mixture oleosae balsamici
Spiritus (90 Vol Proc) aa 25,0
Aetheris aceticus 90,0

Der Essigäther wird zugegeben, nachdem alle anderen Bestandtheile in Lösung gegangen sind, im Ubrigen wird wie bei dem vorigen verfahren.

Strupus Aetheris aceticus


Rp Aetheris aceticus 5,0
Sirupi Sacchari 95,0

Luftäther von AUG. SCHÖNE in Berlin gegen Kopfschmerzen ist eine Mischung von Essigäther, alkoholischer Ammoniakflüssigkeit und Pfefferminzöl (BISONOW).


Salinum. Schwedische Patent-Medicin. Aceti aceticus 2,0, Aetheris aetheris 25,0, Spiritus (90 Vol Proc) 50,0, Aqua 23,0 Antiseptisch und blutstillend. Mit Wasser verdünnt bei Quetschungen, Insektenstichen, Zahnschmerzen, Rheumatismus.

II Aether diaceticus Aether aceticus-aceticus. Acetessigäther (ester) Diacetäther $\text{CH}_3\text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_2\text{H}_5$. Mol. Gew. = 130.

Zur Darstellung löst man in 200 g Essigäther 20 g metallisches Natrium unter Rückflusskühlung auf, wobei sich zunächst Natriacetessigäther bildet.



Man destillirt den überschüssigen Essigäther ab und fügt zu dem Rückstand zunächst 110 g Essigsäure (von 50 Proc) und nach dem Erkalten noch 100 g Wasser.



Der sich über der wässrigen Flüssigkeit abscheidende Acetessigester wird rectificirt, die bei 175–185° C. übergelenden Antheile sind Acetessigester.

Farblose, obstartig riechende Flüssigkeit, Siedepunkt 182° C, spec Gewicht 1,03 bei 50° C. In Wasser wenig löslich. Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid rothviolett gefärbt. Vergl. auch Urina.

Wird zur Synthese organischer Verbindungen, z. B. zur Darstellung des Antipyrins verwendet.

Aether anaestheticus.

Unter diesem Namen fanden um das Jahr 1850 herum zwei Präparate Verwendung, welche Gemische von Chlor Substitutionsprodukten des Äthylchlorids waren und welche man als **ARANS Aether** und als **WIGGERS Aether** bezeichnete. Heute haben diese Präparate nur noch historisches Interesse.

† **Aether hydrochloricus chloratus** Aether anaestheticus ARAN Aether anaestheticus WIGGERS Aether chloratus ARAN Chloro-Äthylchlorid Ether chlorhydrique chloré.

Darstellung. Setzt man ein Gemenge von trockenem Äthylchlorid C_2H_5Cl mit trockenem Chlorgas dem Sonnenlichte aus, so erfolgt Chlorirung unter Explosion. Lässt man jedoch das Sonnenlicht nur einen Augenblick einwirken, so unterbleibt die Explosion, dagegen setzt sich nunmehr die Chlorirung auch im zerstreuten Tageslichte weiter fort. Aus C_2H_5Cl entstehen nacheinander $C_2H_4Cl_2$, $C_2H_3Cl_3$, $C_2H_2Cl_4$, C_2HCl_5 , C_2Cl_6 .

WIGGERS lässt das Äthylchlorid aus 10 Th 95proc Weingeist, 20 Th englischer Schwefelsäure und 12 Th trockenem, fein zerriebenem Kochsalz erzeugen. Das Gemisch von Schwefelsäure und Weingeist soll, ehe es auf das Chlornatrium gegossen wird, eine Woche hindurch gestanden haben. Das bei gelinder Erwärmung entwickelte Äthylchlorid wird in eine chlorentwickelnde Mischung aus 22 Th Chlornatrium, 18 Th grobem Braunsteinpulver, 50 Th englischer Schwefelsäure und 25 Th Wasser geleitet. Es ist rathsam, die Chlormischung auf zwei Gefässe zu theilen, so dass der etwa in dem ersten Gefässe nicht chlorirte Äthylchloriddampf in dem zweiten Chlorgefäss chlorirt wird. Das zweite Chlorgefäss verbindet man mit einer dünnen Kalkmilch, um etwaig entweichendes Chlorgas aufzufangen und unschädlich zu machen. Lässt gegen das Ende der Operation (ehe die Äthylchloriddampfbildung aufhört) die Chlorentwicklung nach, so kann ihr durch gelinde Erwärmung mittels einer Flamme etwas nachgeholfen werden, die Erwärmung darf jedoch $50^{\circ}C$ nicht übersteigen. Nach beendeter Operation (wenn die Äthylchloriddampfbildung aufhört) lässt man erkalten, setzt die beiden Kolben mit den Chlormischungen in ein Sandbad, verbindet mittels eines gläsernen Dampfrohres mit LILBRE'schem Kühler und Vorlage und destillirt, so lange noch Flüssigkeit übergeht. In dem Destillat findet sich als untere Schicht das Chloro Äthylchlorid, welches mit Wasser gewaschen nun in Aether anaestheticus verwandelt wird.

Man giebt das Chloro Äthylchlorid in eine hohe enge cylindrische Flasche, so dass es circa eine 6—10 cm dicke und eine 20—30 cm hohe Schicht bildet, bedeckt diese mit einer 3—5 cm hohen Schicht Wasser und leitet bis auf den Grund der Chloro Äthylchloridschicht nun langsam Chlorgas ein. Letzteres wird aus einem Kolben entwickelt, welcher mit Sicherheitsrohr versehen ist, und zwar so lange, als Chlor von der Flüssigkeit in der Vorlage absorbt wird. Die Absorption unterstützt man übrigens durch häufiges Umschütteln. Helles Tageslicht kann man die erste Stunde der Operation, welche mehrere Tage dauert, einwirken lassen, später darf man nur im Schatten arbeiten. Endlich wird die Flüssigkeit in der Vorlage mit Wasser, Natriumkarbonatlösung und wiederum mit Wasser gewaschen, bis dieses sich frei von Chlor erweist. Durch Kühlung in Eis bewirkt man eine krystallinische Abscheidung etwa entstandenen Aenderhalb-Chlorkohlenstoffs (C_2Cl_3) und filtrirt durch Baumwolle.

Eigenschaften des Aether anaestheticus. Dieser bildet eine farblose, klare, dem Chloroform in Geschmack und Geruch nicht unähnliche Flüssigkeit, welche zwischen 110 bis $140^{\circ}C$ siedet und ein spezifisches Gewicht von $1,55$ — $1,60$ aufweist. Luft und Sonnenlicht wirken zersetzend unter theilweiser Bildung von Chlorwasserstoff.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es ein Gemenge verschiedener Chlor substituitionsprodukte des Äthylchlorids, unter denen das Tetrachlor-Äthylchlorid C_2HCl_4 vorwiegt.

Aufbewahrung. Neben Chloroform, also mit Vorsicht und unter Abschluss des Tageslichtes. Hat das Präparat saure Reaktion, so muss diese durch Waschen mit kaltem Wasser beseitigt werden. Ein Zusatz von 3 Proc absolutem Weingeist hält die Zersetzung einige Zeit zurück.

Anwendung. Der Aether anaestheticus ist ein lokales Anästhetikum. Er wirkt örtlich reizend und anästhesirend und wird daher ausserlich gegen Rheumatismus angewendet, wo er übrigens durch Chloroform völlig ersetzt werden kann.

Linimentum anaestheticum.

Rp. Aetheris anaesthetici

Chloroformii

Spiritus (90%) R_ä 10,0.

Zum Bepinseln (bei rheumatischen Schmerzen, Kopfschmerz etc.).

Linimentum antirheumaticum. LEBERT.

Rp. Aetheris Arani

5,0

Olei Amygdalarum

25,0

Olei Menthae piperitae

0,5.

Zum Einreiben (bei chronischem Gelenkrheumatismus).

Man verwechselte dieses Präparat übrigens nicht mit Aether anaestheticus KÖNIG. S. über diesen bei Aether.

Aether butyricus.

I. Aether butyricus. Buttersäure-Aethyläther (oder -ester). Aethylbutyrat. Ananasäther. Ether butyrique. $C_4H_7O_2 \cdot C_2H_5 = \text{Mol.-Gew. 116}$.

Darstellung. Dieser von der normalen oder Gährungsbuttersäure sich ableitende Aether kann nach zwei Methoden dargestellt werden.




Fig. 33. Apparat zur Darstellung des Buttersäure-Äthers.

A. Chlorwasserstoffgasentwickler. B. Woulfe'sche Flasche mit konzentrierter Schwefelsäure zum Trocknen des Chlorwasserstoffs. C. Gefäß, die Lösung der Säure in Weingeist enthaltend. D. Gefäß mit Wasser zum Auffangen des überschüssigen Chlorwasserstoffgases.

Buttersäure und 60 Th. 95proc. Weingeist leitet man einen anhaltenden Strom trocknen Chlorwasserstoff bis zum Ueberschuss, stellt einen Tag hindurch an einem lauwarmen Orte bei Seite, durchschüttelt dann die Flüssigkeit mit Wasser und Natriumkarbonatlösung, lässt den Aether absetzen, wäscht ihn mit Wasser, entwässert ihn durch Calciumchlorid und rectificirt ihn durch einmalige Destillation. 100 Th. Buttersäure geben 120—130 Th. Buttersäureäther.

Eigenschaften. Der reine Buttersäure-Aether bildet eine farblose, leicht bewegliche, brennend schmeckende, in Wasser wenig lösliche, mit Weingeist in allen Verhältnissen mischbare, leicht entzündliche Flüssigkeit, in verdünntem Zustande von ananasartigem Geruche. Spec. Gew. bei 15° C. = 0,900, Siedepunkt 121° C. Verschieden von diesem Buttersäure-Aether ist der „Butteräther des Handels“ s. w. u.

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt an einem kühlen Orte, wie Essigäther. Der Aether ist entzündlich!

Anwendung. Mit der 8—10fachen Menge Weingeist verdünnt als Ananasessenz zum Aromatisiren von Konfituren und zur Herstellung von Fruchtessenzen, auch von künstlichem Rum.

II. Aether butyrinus. Butteräther des Handels. Ist ein billigerer Ersatz des Buttersäureäthers.

1) Man mischt 100 Th. reine Buttersäure mit 100 Th. Alkohol (95 Proc.) und 50 Th. konc. Schwefelsäure. Man erhitzt die Mischung auf 80° C., erhält sie einige Stunden bei dieser Temperatur und lässt alsdann noch 1 Tag in der Kälte stehen. Nach dieser Zeit giesst man die Flüssigkeit in das 2fache Volumen kaltes Wasser, worauf sich der Aether als ölige Schicht absetzt. Man hebt diese ab, wäscht sie zunächst mit einer dünnen Natriumkarbonatlösung, sodann mit Wasser, entwässert den Aether darauf mit geschmolzenem Calciumchlorid, giesst ihn nach 1—2tägigem Stehen ab und rectificirt.

2) In ein auf 30—40° C. warmgehaltenes Gemisch aus 100 Th.

Darstellung 1 kg trockene, kleingeschnittene Butterseife wird in einer Retorte mit 1 kg 90 procentigem Weingeist übergossen und so lange digerirt, bis Lösung erfolgt. Nachdem das etwa hierbei Ueberschüssige in die Retorte zurückgegossen ist, setzt man ein Gemisch aus 1 kg englischer Schwefelsäure und 2 kg Weingeist hinzu und destillirt 3 kg oder soviel ab, bis das Destillat anfängt durch Schweflige Säure verunreinigt zu werden. Das Destillat versetzt man unter Umschütteln mit 20,0 g Natriumkarbonat und 20,0 g Bleisuperoxyd, stellt es einen Tag bei Seite, filtrirt und rektificirt es in einer Retorte aus dem Sandbade.

Dieses Präparat ist eine alkoholische Auflösung der Aethyläther verschiedener Fettsäuren. Neben Buttersäureäthyläther sind noch vorhanden die Aether der Capron-, Caprin- und Caprylsäure, welche in alkoholischer Lösung gleichfalls ananasartigen Geruch und Geschmack haben und die Eigenschaften des Buttersäureäthyläthers eher verbessern, nicht verschlechtern. Die im Destillations-Rückstande verbleibenden Fettsäuren werden durch Waschen mit Wasser von Schwefelsäure und den Salzen befreit, darauf durch Behandeln mit Natriumkarbonatlösung in Seife übergeführt.

Pine-apple ale der Engländer ist eine mit Ananas-Essenz aromatisirte Citronensäure-Limonade.

Essentia ananatica	
Ananas Essenz I. Pine-apple-oil	
Rp Aetheris butyrici	10,0
Spiritus (90 Vol Proc)	100,0
Tincturae Citri e cortice recentis	
Tinct. Aurantii e cortice recentis	aa 1,0
Aquae Rosae	20,0

Für 1 Liter Limonade genügen 15–20 Tropfen.
Die Limonade soll nur einige Tage aufbewahrt werden.

Ananas Essenz II.	
Rp Aetheris butyrici	15,0
Spiritus (90 Vol Proc)	100,0
Tincturae Citri e cortice recentis	
Tinct. Aurantii e cortice recentis	aa 1,0
Aquae Aurantii florum	
Aquae Rosae	aa 25,0

III Fenchel Ananas Essenz

Rp Aetheris butyrici	100,0
Spiritus (90 Vol Proc)	
Aquae destillatae	aa 450,0

Ueber die Zusammensetzung der Fruchtarome s. Aether valerianicus

Aether cocoinus.

Aether cocoinus. Aether coccineus. Cognacäther. Cocosäther. Kokosäther.
Wird als Aroma des künstlichen Cognacs gebraucht.

Unter „Cognac-Essenz“ versteht man eigentlich die alkoholische Lösung des Weinhefe-Oels (Drusenöls), welches Aethyläther und Isoamyläther der Caprinsäure (auch geringere Mengen des gleichen Aethers der Caprylsäure und Buttersäure) enthält. Ein ähnliches Aroma geben in stark verdünnter alkoholischer Lösung die Aethyläther der im Kokosfett enthaltenen Fettsäuren.

Darstellung 1 kg Kokosnussöl (Kokosbutter, das fette Oel des Nusskernes der *Cocos nucifera* Linn.) wird mit 650,0 g Aetznatronlauge von 1,14 spec Gew im Wasserbade digerirt, bis völlige Verseifung eingetreten ist. Die noch warme Masse wird nach dem Verdünnen mit einem fünffachen Volum warmen Wassers unter Umrühren mit soviel roher Salzsäure (230,0–250,0 g) versetzt, als zur völligen Abscheidung der Fettsäuren erforderlich ist. Die auf der Oberfläche angesammelten Fettsäuren werden gesammelt, bei gelinder Wärme in der Hälfte ihres Gewichts 95–98proc Weingeist gelöst und wie bei Darstellung des Buttersäureäthers durch die 30–40° C warme Lösung ein Strom trockner Chlorwasserstoff geleitet, bis die Flüssigkeit mit diesem Gase gesättigt ist. Dann läßt man im wohl verstopften Gefasse einen Tag an einem lauwarmen Orte stehen, gießt ein gleiches Volum Wasser dazu, hebt die olartige Schicht ab, schüttelt sie zunächst mit verdünnter Natriumkarbonatlösung, dann einige Male mit Wasser aus, sondert sie sorgfältig vom Wasser, vermischt sie mit $\frac{1}{6}$ ihres Volums Weingeist und bewahrt sie in gut verkorkten Flaschen auf.

Man kann den Kokosäther auch in ähnlicher Weise wie den Aether butyrinus (S. 177) bereiten.

Essentia Cognacensis. Cognac-Essenz. Zur Darstellung eines cognacähnlichen Getränkes: Aether cocotinus 100,0, Aether aceticus 100,0, Tinctura Vanillae 1,0, Tinctura Gallarum 15,0, Aqua florum Aurantii 250,0, Spiritus (90 Vol. Proe.) 2000,0.

Aether formicicus.

Aether formicicus. Aether formicus. Ameisensäure-Aethyläther. Aethylformiat. Ameisenäther. Rumäther. Zuckeräther. $\text{HCO}_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_5$. Mol. Gew. = 74.

Man unterscheidet im Handel ein technisches Produkt, welches meist als Rumäther bezeichnet wird, und das reine Präparat, welches als reiner Ameisensäure-Aethyläther bezeichnet wird.

Darstellung. a) Des reinen Aethylformiates. 1) Bei der Darstellung des Chloro-




Fig. 84. A. Chlorwasserstoffentwickler. B. Schwefelsäuregefäß zum Trocknen des Chlorwasserstoffs. C. Weingeistige Fäulungslösung. D. Wassergefäß.

forms durch Einwirkung von Natronlauge auf Chloralhydrat erhält man als Nebenprodukt Natriumformiat. Dieses wird im Wasserbade entwässert. — 100 Th. des entwässerten Natriumformiates werden in einer Retorte mit einem kalten Gemisch aus 85 Th. Weingeist (90 Vol. Proe.) und 150 Th. konc. Schwefelsäure übergossen und die Mischung nach guter Vertheilung aus einem zinktest auf etwa 60°C., gegen das Ende der Destillation auf etwa 75°C. gehelzten Wasserbade bei sehr guter Kühlung abdestillirt. Das Destillat, dessen Menge etwa 115 Th. beträgt, wird durch Schütteln mit Magnesiumkarbonat entsäuert, alsdann filtrirt, durch geschmolzenes Calciumchlorid von Alkohol und Wasser befreit, schliess-

lich aus dem Wasserbade rektifizirt. 2) In einen geräumigen Kolben, welcher mit einem Rückflusskühler verbunden ist, bringt man 4 Th. gährungsreiches Glycerin, 1 Th. krystallisierte Oxalsäure und 1 Th. Weingeist von 95 Vol. Proe. Bei gelindem Erwärmen tritt lebhaft Gasentwicklung ein, die Oxalsäure spaltet sich in Kohlensäure und Ameisensäure. Das Glycerin wird dabei nicht verändert. Die gebildete Ameisensäure verbindet sich mit den vorhandenen Aethylalkohol zu Aethylformiat. — Wenn bei anhaltendem Erwärmen die Entwicklung der Kohlensäure nachlässt, so fügt man wiederum 1 Th. kryst. Oxalsäure und 1 Th. Weingeist hinzu, erwärmt von Neuem bis die Entwicklung der Kohlensäure wieder nachlässt. Man setzt nun noch zweimal je 1 Th. Oxalsäure und Weingeist hinzu, bis also auf 4 Th. Glycerin je 4 Th. kryst. Oxalsäure und Weingeist verbraucht worden sind. Nach beendeter Kohlensäure-Entwicklung kehrt man den Kühler um und destillirt das gebildete Aethylformiat ab. Das Destillat wird wie sub. 1 durch Magnesiumkarbonat entsäuert, alsdann durch Calciumchlorid von Wasser und Alkohol befreit, schliesslich aus dem Wasserbade bei etwa 60°C. rektifizirt.

b) Des technischen Rum-Aethers. Nach Wöhler.

In eine sehr geräumige kupferne (oder bleierne) Destillirblase, welche mindestens 10 Mal mehr Rauminhalt hat, als das Volum der einzutragenden Substanzen beträgt, werden 110 Th. grobgepulverter Braunstein, 45 Th. kaltes Wasser und 90 Th. Kartoffelstärke eingebracht und durch Umrühren gemischt. Nach dem Aufsetzen des Helms und Verbindung desselben mit guter Kühlvorrichtung und Vorlage, und nach

sorgfältiger Lötung der Fugen giesst man durch den Tubus der Destillirblase ein kaltes Gemisch aus 90 Th englischer Schwefelsäure und 55 Th 90proc Weingeist. Es wird nun nach dem Verschluss des Tubus geheizt, unter nur allmählich vermehrter Feuerung, bis die Destillation beginnt, dann wird aber sofort die Feuerung beseitigt oder auf ein Minimum beschränkt, indem die in der Blase eintretende Reaktion soviel Wärme erzeugt, als zunächst zur Destillation erforderlich ist. Später, wenn die Destillation nachlässt, wird sie wieder durch Heizung befördert. Die Heizung mit Wasserdampf lässt sich natürlich bequem regeln. Es werden 60—62 Th Destillat im ganzen gesammelt, jedoch ist es zweckmässig, die ersten übergehenden 2—3 Th für sich aufzufangen, da sie oft mehr Weingeist als Ameisensäure-Aether enthalten, ebenso die zuletzt übergehenden 6 Th für sich zu sammeln, insofern sie nämlich sehr wasserreich sind. Durch Rektifikation kann man aus diesen Destillatsfraktionen den Aether sammeln. Die in der Mitte der Destillationsoperation gesammelten 51—53 Th bilden den Rumather des Handels. Reagirt der Aether sauer, so entsäuert man mit Magnesiumkarbonat, lässt absetzen, dekantirt oder filtrirt. Magnesiumformiat ist in Weingeist oder Ameisenäther nicht löslich.

Eigenschaften des reinen Aethylformiats. Farblose, leicht flüchtige und leicht entzündliche, nach Arak riechende, neutrale, bei 54—55°C siedende Flüssigkeit in ca 10 Th Wasser löslich. Spec Gew = 0,937. Mit Weingeist und Aether in jedem Verhältniss mischbar. Gegen ammoniakalische Silbernitratlösung verhält es sich wie Ameisensäure. — Hat der Aether saure Reaktion angenommen, die aber seine Verwendung als Rum-Aroma nicht hindert, so kann er durch Magnesiumkarbonat entsäuert werden.

Aufbewahrung. Unter den nämlichen Vorsichtsmassregeln wie Aether.

Anwendung. Der reine Ameisensaure Aethyläther hindert in Dampfform die Entwicklung von Bakterienkulturen, weil er in Verdünnung mit feuchter Luft in Ameisensäure und Aethylalkohol gespalten wird. Er verursacht beim Einathmen keinerlei Unbequemlichkeiten, vielmehr sollen Kehlkopfkatarrhe und Rachenkatarrhe auffallend günstig beeinflusst werden. Ausserlich als reizende Einreibung. Der Aether bildet sich übrigens stets im Spiritus Formicarum. — In der synthetischen Chemie viel gebrauchtes Reagens. — Das technische Präparat zur Herstellung von künstlichen Arak- und Rum-Essenzen.

Arakessenz		Rumessenz	
Rp	Vanillae condensae 2,0	Rp	Vanillae condensae 2,5
	Herbae Thymae Pecco 50,0		Olei Rosae 10,0
	Catechu pulverati 10,0		Radialis Tormentillae condensae 20,0
	Olei Florum Aurantii Guttas 2		Florum Cassiae contusorum 2,5
	Acidi pyrolignosi rectificati 50,0		Fuliginis splendens pulveratae 15,0
	Aetheris formici 100,0		Salis culinais 25,0
	Spiritus Aetheris nitrosi crudi 10,0		Aetheris formici 100,0
	Spiritus (90 %) 30,0		Spiritus Aetheris nitrosi 15,0
8 Tage lang zu maceriren, dann zu koliren und zu filtriren. 80,0—25,0 zu einem Liter 55procentigem Weingeist geben künstlichen Arak (Spiritus Oryzae).			Spiritus (90 %) 500,0
			Tincturae Sacchari tosti 50,0
		8 Tage lang zu maceriren, dann zu filtriren. 15,0—20,0 geben mit 1 Liter 55 bis 55proc Weingeist künstlichen Rum.	

Aether fumaricus.

I. Aether fumaricus. Fumarsäure-Aethyläther. Fumaräther. $C_4H_2O_4(C_2H_5)_2$. Mol. Gew = 172.

Darstellung. Man löst 10 Th Fumarsäure in 15 Th Weingeist von 96—98 Proc und leitet in die auf 40—50°C erwärmte Lösung trockenes Salzsäuregas bis zur Sättigung ein. Nach 24stündigem Stehen schüttelt man die Flüssigkeit mit dem gleichen Volumen Wasser durch, trennt die sich absetzende Aetherschicht (welche specifisch schwerer ist als Wasser) ab, schüttelt diese mit Natriumkarbonatlösung, hernach nochmals mit Wasser und rektifizirt den Aether durch Destillation. Man fängt die bei 200—220°C siedenden Antheile auf.

Angenehm ätherartig riechende Flüssigkeit, Siedep 218°C, welche künstlichen Fruchtessenzen in geringer Menge zugesetzt wird.

II. Acidum fumaricum Fumarsäure. $C_4H_4O_4$. Mol. Gew. = 116. Im islandischen Moose, in verschiedenen Schwämmen (*Agaricus piperatus*, *Boletus pseudo ignarius* u a.), im Kraute von *Glaucium luteum*, *Corydalis bulbosa* und *Fumaria officinalis* enthalten


Zur Darstellung fällt man aus dem Saft oder dem wässrigen Auszuge des Krautes von *Fumaria officinalis* die Säure durch Zugabe von Bleiacetat als fumarsaures Blei, welches durch Krystallisation aus siedendem Wasser gereinigt wird. Man vertheilt es alsdann in Wasser, zersetzt es unter Erwärmen durch Einleiten von Schwefelwasserstoff, filtrirt und dampft das Filtrat zur Krystallisation ein. Künstlich kann die Fumarsäure erhalten werden durch Erhitzen der Äpfelsäure auf $150^{\circ}C$.

Farblose Prismen, Nadeln oder Blätter, bei $200^{\circ}C$ ohne zu schmelzen, fast unzersezt sublimirend.

Aether nitrosus.

Unter „Aether nitrosus“ ist das Aethylnitrit, $C_2H_5NO_2$, d. i. der Salpetrigsäure-Aethylester zu verstehen. Dieser findet in reinem Zustande therapeutische Verwendung nicht, dagegen werden alkoholische Präparate medicinisch verwendet, welche mehr oder weniger Aethylnitrat gelöst enthalten.

I. † Aethylum nitrosum Aether nitrosus Aethylnitrit. Salpetrigsäure Aethyläther (ester). $NO_2C_2H_5$. Mol. Gew. = 75. Wird in reinem Zustande durch Destillation einer Lösung von Natriumnitrit mit Alkohol und passend verdünnter Schwefelsäure in den weiter unten von der U-St angegebenen Verhältnissen erhalten. Farblose, bei $16^{\circ}C$ siedende Flüssigkeit von apfelartigem Geruch, in 50 Th. Wasser löslich. Spec. Gew. 0,947. Wird als solches medicinisch nicht verwendet, indessen besteht der im englischen und amerikanischen Handel vorkommende *Spiritus Aetheris nitrosi concentratus* oder *Concentrated sweet spirit of nitre* ungefähr aus reinem Aethylnitrit. — In saurer Lösung reagirt es auf Eisenoxydsalze und aromatische Amine wie salpetrige Säure (erzeugt z. B. Diazoverbindungen). Durch Jodwasserstoff in saurer Lösung wird es zu Stickoxyd reducirt.



Die als *Spiritus Aetheris nitrosi* von den Pharmakopöen aufgenommenen Präparate werden meist durch Destillation von Weingeist mit Salpetersäure dargestellt. Sie stellen im wesentlichen alkoholische Lösungen von Aethylnitrit dar, enthalten aber ausserdem noch Oxydationsprodukte des Alkohols. Ihre nähere Zusammensetzung ist je nach der vorgeschriebenen Bereitungsweise verschieden.

II. Spiritus Aetheris nitrosi (Brit. Germ. Helv. U-St.) Spiritus nitricus aethereus. Spiritus Nitri dulcis. Salpeterätherweingeist. Versüsseter Salpetergeist. Spirit of Nitrous Ether.

A. Germ. Man schüttet 5 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,862) in einem offenen Cylinders vornehmlich über 3 Th. Salpetersäure (Spec. Gew. 1,153) und stellt das lose bedeckte Gefäss zwei Tage an einem kühlen Orte bei Seite. Nach dieser Zeit ist in gelinder Weise Mischung beider Flüssigkeiten erfolgt und auch schon ein kleiner Theil des Alkohols zu Aldehyd oxydirt. — Man bringt die Mischung in eine Glasretorte und destillirt aus dem Wasserbade mit angeschlossener Linné'schen Kühle unter sorgfältiger Kühlung in eine Vorlage, welche 5 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,882) enthält. Man destillirt, so lange noch etwas übergeht, bricht die Destillation aber ab, sobald braune Dämpfe in der Retorte auftreten. — Das Destillat wird mit soviel gebrannter Magnesia (MgO) versetzt, bis es blaues Lackmuspapier nicht mehr röthet, 24 Stunden lang unter gelegentlichem Umschütteln über dieser stehen gelassen, dann filtrirt man es und rectificirt es aus dem Wasserbade unter anfänglich mässiger Erwärmung aber guter Kühlung. Es werden 8 Th. abdestillirt.

Die Destillation führt man zweckmässig nicht aus dem Dampfapparate selbst aus, weil dieser beim Springen der Retorte durch die ausfließende Salpetersäure beschädigt werden würde, sondern man benutzt zweckmässig eine aus verzinntem Eisen oder Kupferblech hergestellte Wasserkapelle oder man extemporiert im Wasserbad aus einem grösseren Topfe z. B. aus Gusseisen. (S. Fig. 35–37.)

Klare, farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit von ätherischem, apfelartigem Geruch, mit Wasser klar mischbar. Spec. Gew. 0,840—0,850. Beim Vermischen mit einer konc. Lösung von Ferrosulfat in Salzsäure erfolgt Braunfärbung der Flüssigkeit. Im Verlaufe der Aufbewahrung nimmt sie saure Reaktion an; man entsäuert sie alsdann durch gebrannte Magnesia und rektificirt sie nochmals. Germ. begrenzt den Säuregehalt: 100 cem dürfen nach Zusatz von drei Tropfen Normal-Kalilauge nicht mehr sauer reagiren. — Das Präparat ist im wesentlichen eine alkoholische Auflösung von Aethylnitrit, daneben enthält es Aldehyd und Aethylacetat.

B. Helv. 12 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,812—0,816) werden mit 8 Th. roher Salpetersäure¹⁾ (Vorsicht beim Mischen!) aus einer Retorte im Wasserbade destillirt, bis




Fig. 35. Aussenansicht einer Wasserkapelle. $\frac{1}{10}$ Grösse d. Durchmessers.




Fig. 36. Wasserkapelle mit Retorte und Wasser im Durchschnitt. $\frac{1}{10}$ Grösse des Durchmessers.

10 Th. überdestillirt sind. Das Destillat wird mit Magnesiumkarbonat entsäuert, dann abgessogen oder abfiltrirt und aus dem Wasserbade rektificirt.

Farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit, ursprünglich von neutraler Reaktion. Spec. Gew. 0,845—0,855. Begrenzung des Säuregehaltes wie bei Germ. Bestandtheile wie bei Germ., aber in anderen Verhältnissen.

C. Brit. Zu 1000 cem Weingeist (Spec. Gew. 0,834) mischt man allmählich 100 cem konc. Schwefelsäure, alsdann noch vorsichtig 125 cem Salpetersäure (Spec. Gew. 1,42); diese Mischung gießt man in eine tubulirte Retorte, welche 100 g dünnen Kupferdraht enthält, setzt in den Tubus ein Thermometer ein und verbindet die Retorte mit einem Linné'schen Kühler, kühlt auch die Vorlage durch Eis gut ab. Man legt 1000 cem Alkohol (90 Proc.) vor und destillirt 600 cem aus dem Wasserbade ab mit der Vorsicht, dass die Temperatur nicht über 82,2° C. hinausgeht. Hierauf lässt man den Retorteninhalt erkalten, und wenn dies geschehen ist, gießt man in die Retorte nochmals 25 cem Salpetersäure und destillirt nochmals 100 cem ab, so dass der Gesamtinhalt der Vorlage = 1700 cem beträgt. Man mischt dieses Destillat mit 1000 cem Weingeist (Spec. Gew. 0,834) oder soviel, dass die Mischung den vorgeschriebenen Gehalt an Aethylnitrit hat, 2,0 Proc. Entsäuerung findet nicht statt. — Farblose oder gelbliche Flüssigkeit. Spec. Gew. 0,838—0,842.

D. U-St. Man bringt eine Lösung von 770 g Natriumnitrit in 1000 cem Wasser in einen passenden Destillationskolben, welcher mit einem Linné'schen Kühler verbunden ist, fügt 550 cem Weingeist (Spec. Gew. 0,816) hinzu, mischt und lässt mittels eines in den Destillationskolben gasdicht eingesetzten Hahntrichters eine Mischung aus 520 g konc. Schwefelsäure und 1000 cem Wasser zufließen. Die Destillation beginnt schon ohne besondere Erwärmung und wird unter mässiger Heizung aus dem Wasserbade zu Ende geführt. Der Kühler ist mit eiskaltem Wasser, die Vorlage durch eine Mischung von grob zerstoßenem Eis und Kochsalz zu kühlen. Man wäscht das ätherische Destillat zunächst mit 100 cem eiskaltem Wasser, dann hebt man die Aetherschicht ab und wäscht sie mit 100 cem eiskaltem Wasser, in welchem 10 g kryst. Natriumkarbonat gelöst sind. Man trennt die Aetherschicht sorgfältig vom Wasser, entwässert sie durch Maceration in geschlossener Flasche mit 80 g scharfgeglühtem Kaliumkarbonat und filtrirt sie alsdann durch einen Wattebausch in eine Flasche, welche 2000 cem Weingeist (Spec. Gew. 0,816)




Fig. 37. Manchette der Wasserkapelle.

¹⁾ Helv. hat im Text rohe Salpetersäure nicht aufgenommen. Es wird indessen eine solche von 1,88—1,40 Spec. Gew. anzuwenden sein.

enthält und deren Gewicht (Flasche und Weingeist) vorher festgestellt worden ist. Man erfährt nach der Filtration durch nochmalige Wägung das Gewicht des im Alkohol gelösten Aethylnitrits und giebt hierauf noch soviel Weingeist zu, dass das Gesamtgewicht der Flüssigkeit das 22fache des gelösten Aethylnitrits beträgt.

Farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit Spec Gew ca 0,820

Prüfung. Nur die Brit. und U-St. lassen eine Bestimmung des Aethylnitritgehaltes vornehmen und zwar durch Einwirkung von Kaliumjodid und Schwefelsäure im Azetometer. 1 Mol NO entspricht = 1 Mol $C_2H_5NO_2$. 1 cm NO wiegt bei 0° T und 760 mm B = 0,0018426 g und entspricht = 0,0038565 g $C_2H_5NO_2$.

Brit. verlangt 5 cm des frischbereiteten Präparates sollen bei 15,5° C und 760 mm B 31,25–35,0 cm Stickoxyd geben. Längere Zeit aufbewahrte Präparate sollen noch 25 cm Stickoxyd geben. Dies entspricht einem Gehalt von 2,5 bez. 1,85 Proc Aethylnitrit. **U St** verlangt 5 cm des Präparates sollen bei mittlerer Temperatur (25° C) nicht weniger als 55 cm Stickoxyd geben, was rund einem Gehalt von 4 Proc Aethylnitrit entspricht.

Aufbewahrung. In kleinen, völlig gefüllten Gefässen, zweckmässig vor Licht geschützt. Im Verlaufe der Aufbewahrung nimmt das Präparat stets saure Reaktion an. Man kann die Säuerung verhindern, indem man es über Magnesiumkarbonat oder besser über einigen Krystallen von neutralem Kaliumtartrat aufbewahrt. Stark saure Präparate sind durch gebrannte oder kohlensäure Magnesia zu entsäuern und nochmals zu rektifizieren.

Anwendung. Der versüßte Salpetergeist wird gelegentlich als Geschmackskorrigens zu Mixturen und Tropfen zugesetzt. Man hält ihn für ein Diureticum und setzt ihn besonders Mischungen des Copaivabalsams zu, wo es zugleich als Diureticum und als Geschmackskorrigens dient. Aeusserlich in Gurgelwässern bei aphthösen und anginischen Affektionen. Technisch als Bestandtheil von Essenzen für Fabrikation von Spirituosen.

Der Arzt vermeide es, den versüßten Salpetergeist mit Antipyrin, Kaliumjodid, Kalumbromid (überhaupt mit Jodiden oder Bromiden), sowie mit Kalomel zugleich zu verordnen.

III Spiritus Aetheris nitrosi crudus Spiritus Nitri dulcis crudus. Roher versüßter Salpetergeist. Dient als Aroma zur Darstellung von Rum, Nordhäuser, Korn und Franzbranntwein. Die Bereitung ist dieselbe, wie sie vom Spiritus Aetheris nitrosi angegeben ist, nur fällt eine Entsäuerung und Rektifikation des Destillates fort.

Der rohe versüßte Salpetergeist ist von saurer Reaktion, nach einiger Zeit der Aufbewahrung gelblich und enthält Blausäure. Er wird nur in kleinen Mengen als Aroma verwendet.

Franzbranntwein Essenz

I	
Rp Aetheris acetic	
Spiritus Aetheris nitrosi crud	aa 100,0
Aceti pyro-lignosi rectificati	10,0
Spiritus (90 %)	40,0
10,0 g auf 8 Liter 55–60procentigen Weingeist	
geben Franzbranntwein	

II.

Rp Spiritus Aetheris nitrosi crud	100,0
Tincturae aromaticae	50,0
Aetheris acetic	10,0
Acidi tannic	15,0
Spiritus (90 %)	50,0
10,0 g auf circa 2,5 Liter 55–60proc reinen	
Weingeist geben Franzbranntwein. Diese Mi-	
schung ist der vorigen vorzuziehen.	

Nordhäuser Korn Esenz

Rp Aetheris acetic	500,0
Spiritus Aetheris nitrosi crud	200,0
Spiritus (90 %)	150,0
Olei Juniperi fructus	2,0
1 1/2 Theile der Esenz mit 1000 Theilen 40proc	
reinem Weingeist gemischt geben Nordhäuser-	
Korn-Branntwein	

Rum Esenz

Rp Spiritus Aetheris nitrosi crud	100,0
Tincturae Vanillae	10,0
Tincturae Galiani	50,0
Aceti pyrolignosi rectificati	50,0
Tincturae Sacchari tost	
Spiritus Vini	aa 150,0
Circa 10,0 g auf 1 Liter 50proc Weingeist.	

Aether pelargonicus.

Aether pelargonicus Pelargonsäure-Aether Pelargonsäure-Aethyläther (-ester). Weindäther $C_8H_{17}CO_2 C_2H_5$ Mol. Gew. = 186

Die zur Darstellung dieses Aethers erforderliche Pelargonsäure gewinnt man durch Oxydation des Rautenöles (von *Ruta graveolens* L.) mittelst Salpetersäure. Das Rautenöl enthält als Hauptbestandtheil Methylnonylketon $CO \begin{smallmatrix} CH_3 \\ \diagup \\ C_8H_{17} \end{smallmatrix}$, aus welchem durch Oxydation mit Salpetersäure Essigsäure und Pelargonsäure entstehen $CH_3 CO C_8H_{17} + 8O = C_2H_4O_2 + C_9H_{17}CO_2H$

Darstellung. In einem mit Rückflusskühler verbundenen Kolben kocht man 10 Th Rautenöl mit 80 Th 6—7 proc Salpetersäure (Spec Gew = 1,035—1,040). Sobald die Einwirkung zu stürmisch wird, entfernt man die Flamme, setzt aber die Wärmezufuhr fort, wenn die Einwirkung trager wird. Dies Erhitzen setzt man fort, bis eine Einwirkung der Salpetersäure nicht mehr stattfindet. Man lässt erkalten, hebt die obige Schicht ab, wäscht sie zunächst in Wasser, und durchschüttelt sie alsdann mit Kalilauge im Ueberschuss. Man verdünnt mit etwas Wasser, filtrirt durch ein genässtes Filter und zersetzt das Filtrat mit verdünnter Salzsäure. Die vorher an das Kali gebunden gewesene Pelargonsäure scheidet sich zuletzt als obige Schicht ab, welche durch Waschen mit Wasser gereinigt wird.

100 Th dieser Pelargonsäure werden in 33 Th absolutem Alkohol unter Erwärmen gelöst, alsdann leitet man in die auf 50—60°C zu haltende Lösung durch Schwefelsäure getrocknetes Chlorwasserstoffgas bis zur Sättigung ein und lässt einige Tage gut verschlossen stehen. Man schüttelt alsdann die freie Salzsäure mit Wasser aus, beendet die Entsäuerung durch Ausschütteln mit Sodaauslösung. Man wäscht nochmals mit Wasser, trennt im Scheidetrichter, beseitigt die letzten Spuren Wasser durch Eintragen von geschmolzenem Calciumchlorid und filtrirt, oder man reinigt (den Aether durch Destillation (am besten im luftverdünnten Raume).

Statt des Rautenöles kann man auch reine Oelsäure in gleicher Weise mit Salpetersäure oxydiren und wie angegeben weiter behandeln, man erhält dann einen ähnlich riechenden Aether, weil die Aether der höheren Fettsäuren und Oelsäuren einander im Geruche sehr ähnlich sind.

Eigenschaften. Farblose, angenehm nach Quitten und Cognac riechende Flüssigkeit. Spec Gew 0,86 Siedep 227—228°C

Der Pelargonsäure Aether des Handels wird mit $\frac{1}{6}$ Gewicht absolutem Weingeist vermischt vorrätig gehalten.

Quittenessenz. Cognac-Essenz Pelargonsäure Aethyläther 1 Th., Weingeist 20 Th

Aether valerianicus.

I. Aethylum valerianicum Aether valerianicus. Valeriansäure-Aethyläther. Aethylvalerianat Baldrianäther Obstäther. $C_8H_{15}O_2 C_2H_5$ Mol. Gew. = 180

Darstellung. Man entwässert valeriansaures Natrium zunächst durch Austrocknen bei 30—40°C, später vollständig im Wasserbade bez Luftbade und zerreibt es zu grobem Pulver.

100 Th. dieses entwässerten Natriumvalerianates werden in einen Destillirkolben oder in eine Retorte gebracht und mit einer erkalteten Mischung aus 85 Th kono Schwefelsäure und 50 Th Weingeist (Spec Gew = 0,817) übergossen. Man destillirt aus einem Sandbade mit vorgelegtem Kühler. Das Destillat wird mit einem gleichen Volumen Wasser, welchem etwas Natriumbikarbonat zugesetzt ist, hierauf nochmals mit Wasser gewaschen. Man entwässert durch Eintragen von geschmolzenem Calciumchlorid und rektifizirt am besten durch Destillation unter vermindertem Drucke.

In den Handel kommt der mit $\frac{1}{6}$ seines Gewichtes absolutem Weingeist versetzte reine Aether

Eigenschaften Farblose, im unverdünnten Zustande nicht besonders angenehm, im verdünnten Zustande angenehm apfelartig riechende und schneckende Flüssigkeit Spec Gew 0,872 Siedep 185°C

Aufbewahrung. Wie Essigäther, s diesen Auch dieser Aether unterliegt im Verlaufe der Aufbewahrung einer Zersetzung, in deren Verfolg freie Valeriansäure auftritt, welche den Geruch begreiflicherweise stark beeinträchtigt Man kann einen solchen Aether verbessern, wenn man ihn mit Natriumbicarbonat durchschüttelt und filtrirt, event alsdann aus dem Sandbade rectificirt Auch empfiehlt sich Aufbewahrung über Magnesiumcarbonat, welches in Form von comprimierten Stücken (Pastillen) eingetragen wird

Anwendung In weingeistiger Lösung als Aroma für Konfituren und Getränke

II Amylum valerianicum Valeriansäure-Amyläther (-ester). Amylvalerianat. $\text{C}_6\text{H}_9\text{O}_2\text{C}_5\text{H}_{11}$ Mol. Gew = 172 Wird genau wie der vorge dargestellt, indem man 124 Th trockenes Natriumvalerianat mit einer erkalteten Mischung von 105 Th kono Schwefelsäure und 88 Th Amylalkohol destillirt, im übrigen genau wie vorher verfährt

Farblose Flüssigkeit, in verdünntem Zustande apfelartig riechend Spec Gew 0,880, Siedep $188-190^{\circ}\text{C}$

III Fruchtesenzen, wie sie bei der Darstellung der Zuckerwaaren, der Limonaden und ähnlicher Genussmittel verwendet werden, sind aus dem im Vorstehenden besprochenen Aetherarten zusammengesetzt Für die wichtigeren geben wir die folgenden Vorschriften:

Ananas-Essenz Chloroform 10,0, Acetaldehyd 10,0, Buttersäure-Aethyläther 50,0, Buttersäure-Amyläther 100,0, Glycerin 80,0, Spiritus¹⁾ (90 Vol Proc) 1 l

Apfel-Essenz. Chloroform 10,0, Salpeteräther²⁾ 10,0, Aldehyd 20,0, Essigäther 10,0, Valeriansäure Amyläther 100,0, Oxalsäure³⁾ 10,0, Glycerin 40,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Aprikosen-Essenz. Chloroform 10,0, Buttersäure Aethyläther 100,0, Valeriansäure Aethyläther 50,0, Persicoöl 10,0, Amylalkohol 20,0, Buttersäure-Amyläther 10,0, Weinsäure³⁾ 10,0, Glycerin 40,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Citronen-Essenz Chloroform 10,0, Salpeteräther²⁾ 10,0, Aldehyd 20,0, Essigäther 100,0, Citronenöl 100,0, Weinsäure³⁾ 100,0, Bernsteinsäure³⁾ 100,0, Glycerin 50,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Birnen-Essenz. Essigäther 50,0, Essigsäure-Amyläther 10,0, Glycerin 100,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Erdbeeren-Essenz Salpeteräther²⁾ 10,0, Essigäther 50,0, Ameisensäure Aethyläther 10,0, Buttersäure Aethyläther 50,0, Wintergrünöl 10,0, Essigsäure Amyläther 80,0, Buttersäure-Amyläther 20,0, Glycerin 20,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Himbeeren-Essenz. Salpeteräther 10,0, Aldehyd 10,0, Essigäther 50,0, Ameisensäure-Aethyläther 10,0, Buttersäure Aethyläther 10,0, Benzoesäure-Aethyläther 10,0, Weindl 10,0, Wintergrünöl 10,0, Essigsäure Amyläther 10,0, Buttersäure-Amyläther 10,0, Weinsäure³⁾ 50,0, Bernsteinsäure³⁾ 10,0, Glycerin 40,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Johannisbeeren-Essenz Aldehyd 10,0, Essigäther 50,0, Benzoesäure-Aethyläther 10,0, Weindl 10,0, Weinsäure³⁾ 50,0, Bernsteinsäure³⁾ 10,0, Benzoesäure³⁾ 10,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Kirschen-Essenz Essigäther 50,0, Benzoesäure-Aethyläther 50,0, Persicoöl 10,0, Benzoesäure³⁾ 10,0, Glycerin 80,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Pflsich-Essenz. Aldehyd 20,0, Essigäther 50,0, Ameisensäure-Aethyläther 50,0, Buttersäure-Aethyläther 50,0, Valeriansäure Aethyläther 50,0, Persicoöl 50,0, Amylalkohol 20,0, Glycerin 50,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Pflaumen-Essenz Aldehyd 50,0, Essigäther 50,0, Ameisensäure-Aethyläther 10,0, Buttersäure-Aethyläther 20,0, Persicoöl 40,0, Glycerin 80,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Reinotten-Essenz Valeriansäure Amyläther 100,0, Essigäther 10,0, Valeriansäure Aethyläther 80,0, Weingeist¹⁾ 1 l

Alle diese Essenzen, welche übrigens im Handel in vorzüglichster Beschaffenheit zu beziehen sind, dürfen nur in den möglichst kleinsten Mengen angewendet werden Ein „Zu viel“ beeinträchtigt den Geschmack und Geruch ganz erheblich

¹⁾ Unter Weingeist ist in diesen Vorschriften stets solcher von 90 Vol Proc zu verstehen — ²⁾ Unter Salpeteräther ist Spiritus Aetheris nitrosi gemeint

³⁾ Die Angaben für die freien Säuren beziehen sich auf Kubikcentimeter der mit Weingeist von 90 Vol Proc bereiteten kalt gesättigten Lösungen

Aethyleni Praeparata.

Unter dieser gemeinsamen Ueberschrift sollen hier das Aethylenchlorid und das Aethylenbromid behandelt werden. Die Darstellung beider erfolgt in der Weise, dass man zunächst durch Einwirkung von konc. Schwefelsäure auf Alkohol in der Wärme Aethylen erzeugt und dieses durch Addition von Chlor bzw. Brom in Aethylenchlorid bzw. Aethylenbromid verwandelt.

I. † Aethylenum bromatum. Aethylenbromid. Bromäthylen. β -Dibrom-Äthan. $C_2H_4Br_2$. Mol. Gew. = 188.

Darstellung. In einem etwa 2 Liter fassenden Rundkolben *A* erhitzt man ein Gemisch von 25 g Alkohol und 150 g roher konc. Schwefelsäure auf flachem Sandbade, bis die Gasentwicklung in vollem Gange ist, und lässt dann aus einem Tropftrichter *B* ein Gemisch aus 1 Th. Alkohol und 2 Th. roher Schwefelsäure in dem Maasse nachfließen, dass bei gleichmässiger, ziemlich lebhafter Gasentwicklung kein Schäumen des Kolbeninhaltes stattfindet. Das sich entwickelnde Gas leitet man, um es von Alkohol, Aether, schwefliger Säure und Kohlensäure zu reinigen, durch drei, Sicherheitsröhren tragende Waschflaschen, von denen die erste *I* mit konc. Schwefelsäure, die beiden anderen




Fig. 18.

II und *III* mit roher Natronlauge beschickt sind. Das so gereinigte Aethylen gas gelangt in zwei Wouner'sche Flaschen *C* und *D*, die durch Eiswasser gekühlt werden und unter Wasser befindliches Brom enthalten. In der ersten Flasche befinden sich 150 g Brom und eine 1 cm hohe Wasserschicht, in der zweiten Flasche 50 g Brom und die gleiche Quantität Wasser. Man setzt das Einleiten des Aethylens unter guter Kühlung so lange fort, bis die Bromschichten in beiden Vorlagen fast farblos geworden, bzw. nur noch schwach gelb gefärbt sind.

Man mischt alsdann das erhaltene Rohprodukt mit verdünnter Natronlauge, alsdann mit Wasser, trennt es mittels Scheidetrichters, lässt es 24 Stunden über geschmolzenem Calciumchlorid stehen und rektifiziert es durch Destillation.

Eigenschaften. Farblose, stark lichtbrechende, neutrale Flüssigkeit von chloroformartigem Geruch und brennendem Geschmack, ziemlich leicht flüchtig. In Wasser unlöslich, löslich in Alkohol und in Aether. Spec. Gewicht 2,170 bei 20° C., Siedepunkt 129° C.

Beim Kochen mit alkoholischer Kalilauge werden Wasser, Vinylalkohol und Kaliumbromid gebildet.

Prüfung. 1) Es sei farblos; gefärbte Präparate sind zu verwerfen bzw. zu reinigen (s. Darstellung). 2) Mit dem gleichen Volumen Aethylenbromid geschütteltes Wasser rüthe blaues Lackmuspapier nicht und werde durch Silbernitrat nicht sofort getrübt. 3) Spec. Gew. und Siedetemp. soll sich in den angegebenen Grenzen halten. 4) Löst man 10 Tropfen Aethylenbromid in 5 cm weingeistiger Kalilauge und fügt 2–3 Tropfen Anilin zu, so darf beim Erwärmen der Geruch nach Isonitril nicht auftreten (Chloroform).

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt

Anwendung. Bromäthylen wurde gegen Epilepsie empfohlen. Man giebt es Erwachsenen dreimal täglich zu 0,1—0,2 g in Oel-Emulsionen oder, mit Mandelöl gemischt, in Gelatine-Kapseln. Aethylenbromid ist erheblich toxischer als Aethylbromid (s. d.); der Apotheker hüte sich, fälschlich das Aethylenbromid an Stelle von Aethylbromid abzugeben.

II. † Aethylenum (bi-)chloratum (Ergänzb.). *Elaylum chloratum. Aetherium chloratum. Oleum Chemicorum Hollandicorum. Liquor hollandicus.* Schwerer Salzäther. Aethylenchlorid. β -Dichlor-Aethan. Elaylchlorid. Elaylchlorür. Dutch Liquid. Chlor-Ethylene. $C_2H_4Cl_2$. Mol. Gew. = 99.




Fig. 89

Darstellung. Man leitet gleiche Volume Aethylen (welches in der Seite 185 angegebenen Weise zu entwickeln ist) und Chlorgas — beide durch Schwefelsäure getrocknet — in einen tubulirten gläsernen Spitzballon A so ein, dass das Aethylen von der einen, das Chlorgas von der anderen Seite eintritt. Beide Gase vereinigen sich unter Selbsterwärmung zu Aethylenchlorid, welches sich an den Wandungen des Ballons A verdichtet und im flüssigen Zustande nach dem darunter befindlichen Gefässe B abtropft. Dieses Gefäß ist durch Einstellen in Eisstücke gut kühl zu halten. Gas, welches etwa der Reaktion entgangen sein sollte, kann durch das Rohr C entweichen.

Die so erhaltene Flüssigkeit wird zunächst durch Schütteln mit Sodälösung (1:10) entsäuert, dann mit Wasser gewaschen, hierauf so oft mit $\frac{1}{3}$ Vol. konc. Schwefelsäure durchgeschüttelt, bis diese sich nicht mehr dunkel färbt. Alsdann wäscht man mit Wasser, hierauf mit Sodälösung, und alsdann wiederum mit Wasser. Das Präparat wird schliesslich durch geschmolzenes Calciumchlorid entwässert und unter guter Kühlung aus einer Retorte mit eingestelltem Thermometer rektifizirt. Man sammelt die von 84—86° C. übergehenden Antheile.

Eigenschaften. Farblose, chloroformähnlich riechende, brennend-süsslich schmeckende, leicht flüchtige Flüssigkeit. Spec. Gew. 1,280 bei 0° C., bei 15° C. = 1,2545. Siedep. 85° C. Es verbrennt mit russender, grüngelber Flamme unter Bildung von Salzsäuredämpfen, ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether, mischbar mit fetten und ätherischen Oelen. Durch Schütteln mit konc. Schwefelsäure wird es nicht verändert, bezw. gefärbt. Durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge entsteht ein knoblauchartig riechendes Gas, das Vinylchlorid $CH_2=CHCl$. Durch Erhitzen mit Anilin und alkoholischer Kalilauge tritt nicht der widerliche Isonitril-Geruch auf.

Prüfung. 1) Es sei farblos; das spec. Gewicht sei nicht unter 1,2580,¹⁾ der Siedepunkt liege bei 84—86° C. 2) Es färbe beim Schütteln mit konc. Schwefelsäure diese innerhalb einer Stunde nicht dunkel (andere organische Chlor-Derivate). 3) Mit dem gleichen Baumtheile Aethylenchlorid geschütteltes Wasser färbe blaues Lackmuspapier nicht roth und werde durch Silbernitrat nicht getrübt (freie Salzsäure in zersetzten Präparaten). 4) Erwärmt man 10 Tropfen Aethylenchlorid mit 5 Tropfen Anilin und 3 cem alkoholischer Kalilauge, so trete der widerliche Isonitrilgeruch nicht auf (Chloroform).

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, vorsichtig. Der besseren Haltbarkeit wegen wird dem reinen Präparat ein Zusatz von 1—2 Proc. absolutem Alkohol gemacht.

Anwendung. Aeusserlich für sich allein oder in Aether, oder fetten Oelen (1+5) gelöst bezw. mit Fetten gemischt zu reizenden und schmerzstillenden Einreibungen, bei rheumatischen Schmerzen, Neuralgien. Innerlich 5—10—20 Tropfen drei bis viermal täglich in Alkohol, Aether, fetten Oelen gelöst wie Chloroform. Als Inhalations-

¹⁾ Das Ergänzb. schreibt das spec. Gewicht 1,270 bei 15° C. vor.

Anästheticum früher vorübergehend an Stelle des Chloroforms angewendet, jetzt nur noch selten angewendet. Es steht mit Unrecht in dem Rufe, weniger gefährlich zu sein wie Chloroform.

Aethyli Praeparata.

Unter der vorstehenden Ueberschrift sollen die Monohalogenderivate des Aethans, Aethylchlorid, -bromid und -jodid zusammengefasst werden, da ihre gemeinsame Behandlung manche Vortheile bietet.

I. † Aethylum bromatum. Aethyle bromata. Aether bromatus (Germ. Helv.). Monobromäthan. Bromwasserstoff-Aether. Ether bromhydrique (Gall.). Ethyl-Bromide. C_2H_5Br . Mol. Gew. = 109.

Darstellung. Das in der organischen Synthese verwendete Bromäthyl wird gewöhnlich durch Einwirkung von Bromphosphor auf Aethylalkohol dargestellt. Solche Präparate dürfen, weil sie häufig durch organische Arsen- und Schwefelverbindungen verunreinigt sind und daher schädlich wirken können, in der Therapie nicht verwendet werden. Zum medicinischen Gebrauch ist vielmehr lediglich das nach folgender Vorschrift dargestellte Bromäthyl zulässig:

Man bereite sich zunächst eine Mischung von 240 g Schwefelsäure und 140 g Weingeist von 0,816 sp. G. (95 Vol. Proc.). Diese Mischung bewerkstelligt man mit Vorsicht, indem man die Schwefelsäure unter Umrühren langsam in den Weingeist einträgt, nicht umgekehrt! Wenn die Mischung sich auf Lufttemperatur abgekühlt hat, so bringt man sie in einen Rundkolben von etwa 1 Liter Fassungsvermögen und setzt unter Umschütteln





Fig. 40.

nach und nach 240 g grobgepulvertes Kaliumbromid hinzu, wobei besondere Vorsichtsmaassregeln nicht zu beobachten sind. Den Kolben setzt man in ein mit trockenem und gesiebttem Sande gefülltes Sandbad ein, schliesst ihn mit einem Kork, der ein gebogenes Abzugsrohr enthält und verbindet das letztere mit einem Linné'schen Kühler. Als Vorlage benutzt man ein Kölbchen, welches in eine mit Eisstücken gefüllte Schale eingebettet wird. Hat man ein genügend langes Thermometer zur Verfügung, so kann man dasselbe in den Kork einsetzen, doch muss das Quecksilbergefass etwa 2 cm tief in die Flüssigkeit eintauchen. Im anderen Falle kann man auch ein Thermometer in das Sandbad einstellen. Ist der Apparat ordnungsmässig zusammengestellt, so beginnt man das Sandbad anzuheizen. Wenn das innere Thermometer $100^{\circ}C$. anzeigt (Th. im Sandbade etwa $130^{\circ}C$.), beginnen sich einige Gasblasen zu entwickeln, bei etwa $180^{\circ}C$. (Th. im Sandbade etwa $180^{\circ}C$.), ist die Destillation unter lebhafter Entwicklung feiner Gasbläschen in vollem Gange. Man leitet den Gang der Destillation so, dass das innere Thermometer keinesfalls über $140^{\circ}C$. kommt. Allmählich beginnt der Inhalt des Kolbens zu schäumen, und gegen das Ende, wenn nur noch wenig Destillat übergeht, zeigt er Neigung zum Uebersteigen. Tritt dieser Zufall ein, so hebe man den Kolben sofort aus dem Sandbade heraus, die Abkühlung durch

die Luft genügt meist, das Uebersteigen zu verhindern. Das Destillat ist in der Regel etwas trübe und schwach gelblich gefärbt. Es enthält ausser Aethylbromid noch Wasser, kleine Mengen von Alkohol (durch Einwirkung von gebildetem Wasser auf die Aethylschwefelsäure entstanden) und Aethyläther (durch Einwirkung von Alkohol auf die Aethylschwefelsäure gebildet), ferner Bromwasserstoffsäure und, wenn die Destillation mangelhaft geleitet wurde, auch noch Schwefeldioxyd. — Man schüttelt das Destillat, um die Bromwasserstoffsäure zu binden, mit soviel (30–40 ccm) 5 procentiger Kaliumkarbonatlösung, dass deutlich alkalische Reaktion eintritt, trennt die beiden Flüssigkeitsschichten und schüttelt die aus Aethylbromid bestehende spec. schwerere noch viermal mit je einem gleichen Raumtheile Wasser aus, um den Ueberschuss an Alkal., das gebildete Kalumbromid,¹⁾ ferner Alkohol und Aether nach Möglichkeit zu entfernen. (Gänzlich entfernen kann man den Aether durch Schütteln des Bromäthyls mit einem gleichen Vol. Schwefelsäure von 60° B.)

Das so gewaschene Aethylbromid scheidet man mittelst eines Scheidetrichters sorgfältig vom Wasser, bringt es in eine Flasche und trägt in diese einige Stücke geschmolzenen Chloreacums ein. Nach eintägigem Stehen über Calciumchlorid, während dessen man bisweilen umschüttelt, giesst man das Aethylbromid in einen entsprechend grossen Fraktionskolben ab und rektifiziert aus dem Wasserbade. Die ersten, trübe übergahenden Antheile verwirft man und fängt die Hauptfraktion, welche zwischen 38 und 40° C übergeht, auf.



Eigenschaften. Farblose, lichtbrechende, leicht bewegliche, specifisch schwere Flüssigkeit, von chloroformähnlichem Geruche und brennendem Geschmacke. Nur die Gall hat ein fast reines Aethylbromid, die Germ u. Helv haben der besseren Haltbarkeit wegen ein geringe Mengen Alkohol enthaltendes Präparat aufgenommen. Leicht flüchtig, nicht leicht entzündlich, aber die Dämpfe verbrennen mit grünllicher Färbung unter Bildung von Bromwasserstoff.

Reines Aethylbromid hat das spec. Gewicht 1,4735 bei 15° C und siedet zwischen 38 und 39° C.

Für die medicinalen Sorten schreiben die Pharmakopoen folgende Constanten vor:

	Gall	Germ	Helv
Spec. Gewicht	1,178	1,453–1,457	1,415–1,450
Siedetemperatur	38,5° C	38–40° C	33–40° C
Gehalt an Alkohol von 38,5 %	Spur	1 %	1–1,5 %

Prüfung. 1) Es sei farblos, völlig flüchtig, rieche nicht unangenehm mercaptanartig. Spec. Gewicht und Siedetemperatur sollen sich in den vorgeschriebenen Grenzen bewegen. 2) Schüttelt man gleiche Vol. Aethylbromid mit conc. Schwefelsäure zusammen, so darf sich die Säure binnen einer Stunde nicht gelb färben (organische Schwefelverbindungen, Aethylen- und Amylverbindungen). 3) Nach dem Schütteln gleicher Vol. Aethylbromid und Wasser darf keine Volumänderung sich zeigen (Alkohol, der aber schon durch das spec. Gewicht erkannt worden wäre). Das abgetrennte Wasser darf nicht sauer reagiren und durch Zusatz einiger Tropfen Silbernitratlösung nicht sofort getrübt werden (freie Bromwasserstoffsäure, Bromide). 4) Beim Erwärmen von 1 ccm Aethylbromid mit 8 Tropfen Anilin und 2 ccm alkoholischer Kalilauge darf der widerliche Geruch nach Carbylamin nicht auftreten (Chloroform).

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, an einem kühlen Orte, in Gefässen mit gut schliessenden Glasstopfen, welche mit Leder zu überbinden sind. Die Helv schreibt sehr zweckmässig vorsichtige Aufbewahrung vor.

Anwendung. Aethylbromid ist ein Narcoticum. In Dampfform eingeathmet, bewirkt es Anästhesie wie Aether. Die Anästhesie tritt schneller ein wie beim Chloroform, geht aber auch schneller vorüber. Das Bewusstsein ist nicht völlig aufgehoben, aber Schmerzempfinden werden wenig empfunden. Die Muskelspannung bleibt während der Narchose erhalten. — Man benutzt es daher als Inhalations-Anästheticum bei kleineren, nicht

¹⁾ Die alkalische Waschflüssigkeit kann man mit Bromwasserstoffsäure neutralisiren und erhält alsdann durch Eindampfen der filtrirten Lösung Kalumbromid.

länger als 10—15 Minuten dauernden Operationen, bei welchen Komplikationen und grössere Blutungen nicht zu erwarten sind. Uebrigens beachte man, dass auch das Aethylbromid keineswegs absolut gefahrlos ist; vielmehr sind schon eine ganze Reihe ziemlich unerklärter Todesfälle bei seiner Anwendung vorgekommen.

Innerlich zu 5—10 Tropfen auf Zucker oder mit Spiritus verdünnt oder in Gelatinekapseln.

Cave: Der Arzt hüte sich, das Aethylbromid mit dem viel giftiger wirkenden Aethylenbromid (*Aethylenum bromatum*) zu verwechseln, der Apotheker hüte sich, dieses letztere auf ein mangelhaft verschriebenes Recept hin abzugeben.

II. † Aethylum chloratum. Aethylchlorid. Aether chloratus (hydrochloricus seu muriaticus). Chloräthyl. Monochloräthan. Leichter Salzsäther. Ether chlorhydrique. Ethyl-Chloride. C_2H_5Cl . Mol. Gew. = 64,5. (Syn. Chelen, Kelen.)

Darstellung. Dieselbe erfolgt heute in chemischen Fabriken. Aethylalkohol und möglichst konc. wässrige Salzsäure werden unter 40 Atmosphären Druck längere Zeit auf $150^\circ C$. erhitzt. $C_2H_5 \cdot OH + HCl = H_2O + C_2H_5Cl$. Das Reaktionsprodukt wird destillirt. Die Aethylchloriddämpfe werden zunächst durch Wasser von $25^\circ C$. geleitet, dann durch Calciumchlorid getrocknet, schliesslich in Gefässen, welche unter $0^\circ C$. abgekühlt sind, kondensirt. Wegen der grossen Flüchtigkeit des Aethylchlorids muss die Kühlung durch stark abgekühlte Salzlösungen erfolgen.

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit von eigenthümlichem, angenehmem Geruche und brennend süssem Geschmacke. Es erstarrt noch nicht bei $-29^\circ C$. und siedet bei $+12,5^\circ C$. Bei $0^\circ C$. hat es das spec. Gewicht 0,921. In Wasser wenig löslich, in Weingeist oder Aether leicht löslich. In den Handel gelangt das Aethylchlorid seiner physikalischen Eigenschaften wegen in druckfesten Glasröhren mit gasdichtem Schraubenverschluss oder mit Kapillaren s. Fig. 41.

Die oben angeführten Namen „Chelen“ und „Kelen“ sind in Frankreich und Belgien gebräuchlich.

Prüfung. Es verflüchtigt sich schon bei mittlerer Temperatur ohne Rückstand. Leitet man seinen Dampf in Wasser, so darf dieses weder blaues Lackmuspapier röthen, noch nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitratlösung sofort getrübt werden.

Aufbewahrung. An einem kühlen Orte, vor Licht geschützt. Vorsichtig.

Anwendung. Aethylchlorid kommt zur Zeit in Glasröhren von 10 und 30 g Inhalt mit gerader oder winkelliger Kapillare in den Handel. Bequemer für den Arzt ist die Packung in Glasröhren mit Schraubenverschluss. Fig. 41. Man benutzt es als lokales Kälte-Anästheticum, bei kleineren Operationen (Incisionen etc.), indem man das Glas — die geöffnete Kapillare nach unten — gegen den betreffenden Körperteil richtet. Durch die Verdunstung des austretenden flüssigen Aethylchlorids kann eine Körperstelle bis auf $-35^\circ C$. abgekühlt werden.

Man beachte, dass die Dämpfe des Aethylchlorids brennbar sind.

Anestyle-Benzol, Methäthyl-Hexan, Anäthyl und Coryl sind Mischungen unseres Aethylchlorids mit Methylechlorid, gleichfalls als Kälte-Anästhetica verwendet.

Spiritus Aetheris chlorati (Ergänzb.). Veräussertes Salzgeist. Spiritus muratico-aethereus. Spiritus Salis dulcis. Weingeisthaltiger schwerer Salzäther. 25 Th. rohe Salzsäure (spec. Gew. = 1,16) werden mit 100 Th. Weingeist gemischt und in einen Kolben von 500 Th. Rauminhalt gegossen, der mit haselnussgrossen Stücken Braunstein vollständig gefüllt ist. Alsdann wird die Mischung der Destillation im Wasserbade unterworfen, bis 100 Th. übergegangen sind. Falls das Destillat sauer ist, wird es




Fig. 41. In aufrechter Stellung giebt die links befindliche Oeffnung — nach Abnahme der Verschraubung — einen nach oben gerichteten Strahl. Wendet man das Gefäss um, so giebt die rechts befindliche Oeffnung einen nach unten gerichteten Strahl von Aethylchlorid.

mit gebrannter Magnesia neutralisirt und aus dem Wasserbade rektificirt. Klare, farblose, neutrale Flüssigkeit, spec. Gew. = 0,838—0,842.

Das Präparat ist keine einheitliche chemische Verbindung, sondern besteht im wesentlichen aus Aethylalkohol, welcher kleine Mengen von Chlorsubstitutionsprodukten und Oxydationsprodukten des Aethylalkohols (Chloral, Acetal, Aldehyd, Aethylacetat) gelöst enthält.

III. † Aethylum iodatum. Aethyljodid. Jodäthyl. Monojodäthan. Aether iodatus (Ergänzb.) seu hydrojodicus. Jodwasserstoffäther. Jodäther. Ether jodhydrique (Gall.). Ethyl-Jodide. C_2H_5J . Mol. Gew. = 156.

Darstellung. In eine tubulirte Retorte, welche mit einem LIEBIG'schen Kühler verbunden und in ein Sandbad eingebettet ist, giebt man 60 Th. Alkohol von 95 Vol. Proc. (spec. Gew. = 0,817), sowie 5 Th. rothen (amorphen) Phosphor. Hierzu bringt man unter mässigem Bewegen in kleinen Quantitäten allmählich 40 g resublimirtes Jod und überlässt das Ganze während 24 Stunden sich selbst. Alsdann destillirt man ab und erhitzt so, dass die Destillation schliesslich bei $80^{\circ} C$. zu Ende geführt wird.




Fig. 42.

Das gelb gefärbte Destillat wird mit einer verdünnten Lösung von Natriumbisulfit geschüttelt, dann wäscht man die abgesetzte Aetherschicht zweimal mit dem doppelten Volumen Wasser. Man scheidet sie sorgfältig vom Wasser, lässt behufs Trocknung 24 St. über geschmolzenem Calciumchlorid stehen, rektificirt aus dem Wasserbade und füllt mit dem Destillat sofort nicht zu grosse, braune Flaschen möglichst voll und bewahrt diese an einem vor Licht geschützten Orte auf.

Eigenschaften. Farblose, ätherisch riechende, neutrale Flüssigkeit, in Wasser unlöslich, in Alkohol oder in Aether sehr leicht löslich. Spec. Gewicht 1,944 bei $15^{\circ} C$. Siedepunkt $71-72^{\circ} C$.

Der Luft ausgesetzt, wird das Aethyljodid, schneller im direkten Sonnenlicht, langsamer, aber immerhin noch schnell genug, im zerstreuten Licht, unter Abscheidung von Jod und dadurch bedingter Braunfärbung zersetzt. Man reinigt solche Präparate, indem man sie mit einer Lösung von Natriumbisulfit schüttelt, darauf wie unter Darstellung angegeben weiter behandelt.

Prüfung. Schüttelt man 2 ccm Aethyljodid mit 2 ccm Wasser und 1 ccm rauchender Salpetersäure, so entsteht alsbald rothe Färbung durch Ausscheidung von Jod. Identität, die sich übrigens schon aus dem spec. Gewicht ergibt. Mit dem gleichen Volumen Aethyljodid geschütteltes Wasser darf durch Silbernitratlösung nicht sofort getrübt werden (Jodwasserstoff).

Das Ergänzungsbuch giebt als spec Gewicht 1,980—1,940 an, woraus sich ein Gehalt von etwa 1 Proc absolutem Alkohol ergibt

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt, in kleinen, völlig gefüllten Flaschen mit gut schliessenden Glasstopfen, welche mit Leder zu tektiren sind, in einem kühlen Orte

Ergänzb schreibt vor Gelblich oder röthlich gefarbte Präparate sind durch Schütteln mit feingepulvertem Natriumthiosulfat zu entfärben, worauf man filtrirt und das so entfärbte Präparat ohne weiteres abgießt Roth oder braun gefarbte Präparate aber sind zu verwerfen, d h wie unter Eigenschaften angegeben, zu reinigen

Anwendung. Jodäthyl wirkt örtlich und allgemein anästhesirend, ausserdem erzeugt es, innerlich genommen oder eingeathmet, entfernte Jodwirkung, indem es im Organismus zerlegt und als Jodalkali ausgeschieden wird Man wendet es in Form von Inhalationen bei Lungenleiden und Asthma an, indem man den Dampf aus einem Weinglase, wo es von einer dünnen Wasserschicht bedeckt ist, einathmen läßt Schon nach wenigen Minuten soll sich im Urin Jod nachweisen lassen Unangenehme Nebenwirkungen wie bei anderen Jodpräparaten sollen sich nicht einstellen Dosis 5—10 Tropfen mehrmals täglich — Technisch in der organischen Chemie zum „Aethyliren“

Jodäthylum camphoratum Von VILGUTH zur subkutanen Anwendung bei Cholera empfohlen, ist eine Auflösung von Kamphor in Jodäthyl in nicht näher angegebenen Gewichtsverhältnissen

Aethylidenum bichloratum

† Aethylidenum bichloratum. Aethylidenum chloratum. (Ergänzb) Aethylidenchlorid α -Dichloräthan Chloräthyliden. $\text{CH}_3\text{—CHCl}_2$ Mol. Gew. = 99. Dem Aethylenchlorid isomer

Darstellung. In einen trockenen Kolben, welcher mit einem Rückflusskühler verbunden ist und durch Eiswasser gekühlt wird, bringt man 100 Th Phosphorpentachlorid und lässt nach und nach in kleinen Portionen 22—23 Th reinen Paraldehyd unter Umschwenken zufließen Nachdem alles Aldehyd zugefügt und das Phosphorpentachlorid gelöst bezw zersetzt ist, verbindet man den Kolben mit einem absteigenden Kühler und destillirt aus dem Wasserbade bei 60—80° C nicht übersteigender Temperatur (Das bei 110° C siedende Phosphoroxychlorid sowie das bei 147° C siedende, als Nebenprodukt gebildete Tetrachloräthan sollen zurückgehalten werden)



Das erhaltene Destillat wird mit verdünnter Sodaaesung (1:100) entsäuert, mit Wasser gewaschen, durch geschmolzenes Calciumchlorid entwässert, darauf aus dem Wasserbade rectificirt Nur die bei 58—59° C übergehenden Antheile sind zu sammeln

Grosse Mengen Aethylidenchlorid werden bei der Fabrikation des Chloralhydrates als Nebenprodukt gewonnen

Eigenschaften Farblose, chloroformartig riechende, süsslich schmeckende, neutrale, leicht flüchtige Flüssigkeit, welche bei 58,5° C siedet Spec Gewicht bei 15° C = 1,181—1,182 Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether Nicht leicht entzündlich, aber die Dämpfe verbrennen mit grüngesamter, russender Flamme

Kon. Schwefelsäure wird durch Aethylidenchlorid schon in der Kälte gebräunt, Fehling'sche Lösung wird auch in der Hitze nicht reducirt

Prüfung. Es habe das angegebene spec Gewicht und die Siedetemperatur Das mit einem gleichen Volumen Aethylidenchlorid geschüttelte Wasser reagire nicht sauer und werde durch Silbernitrat nicht sofort getrübt (Salzsäure) — Löst man 10 Tropfen Aethylidenchlorid in 5 ccm alkoholischer Kalilauge (1:10), fügt 3—4 Tropfen Anilin hinzu und erwärmt, so trete der widerliche Isomitrilgeruch nicht auf (Chloroform)

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt

Anwendung. Von LIEBRICH als Inhalations-Anästheticum an Stelle des Chloroforms empfohlen. Es soll vor letzterem den Vorzug haben, dass die Narkose sofort aufhört, sobald man mit der Inhalation nachlässt, auch sollen üble Nachwirkungen fehlen. Indessen hat sich das Mittel nicht recht eingebürgert.

Agar-Agar.

Mit diesem Namen bezeichnet man verschiedene, aus Ost und Südostasien stammende Algen aus der Abtheilung der Floridaceae, die unverändert (d. h. einfach getrocknet), oder in besonderer Weise verarbeitet, in den Handel gelangen.

1) Einfach getrocknet sind die folgenden

Agar-Agar von Ceylon (*Alga ceylanica* Ceylonmoos Mousse de Jaffna *Fucus amylaceus* Mousse de Ceylon Ceylon Moss) ist der an der Sonne getrocknete und gebleichte Thallus von **Gracilaria lichenoides Ag** (Sphaerococcaceae), heimisch an den Küsten der indisch-chinesischen Gewässer. Der Thallus ist 6–12 cm lang, weich, etwas zah, wiederholt gabelig getheilt, Aeste allmählich dünner werdend. Giebt mit 50 Th Wasser eine durchsichtige, geschmacklose Gallerte. Seit etwa 60 Jahren in Europa bekannt.

Agar-Agar von Macassar und von Java (Ostindisches Carrageen *Alga spinosa*) ist der getrocknete Thallus von **Eucheuma spinosum (L.) Ag** (Rhodophyllidaceae), heimisch im indischen Ocean und bei Mauritius. Bildet 3–4 cm lange, 2–3 mm dicke, unregelmäßig verzweigte Stütze mit senkrecht abstehenden Cystocarpien. Farbe bräunlich-gelb oder rötlich, oft mit einem Anflug eingetrockneter Salze bedeckt. Giebt mit 17 Th Wasser eine Gallerte.

Unter dem Namen **Japanisches Moos** wurde als Ersatz für Agar-Agar die Alge **Gloeopeltis coliformis Harv** (Gloeosiphoniaceae) importirt. Sie liefert aber mit Wasser keine Gelatine, sondern nur einen zähen Schleim.

2) Agar-Agar im engeren Sinne (vegetabilischer Fischleim Japanische oder ostindische Hausenblase *Phycocolla*, Isinglass¹⁾ Tientjan Tientjow Lo thà-ho Hai-thao) wird von einer ganzen Anzahl in Ostasien heimischer Meeresalgen erzeugt, indem man aus den Algen eine Gelatine macht, diese gefrieren lässt, wobei Wasser austritt, dann in Streifen schneidet und trocknet. Als Algen, die Agar-Agar liefern, werden hauptsächlich genannt **Gelidium- u. Gloeopeltis-Arten**; indessen kommen auch wohl noch andere Arten in Betracht.

Kommt in mehreren Formen in den Handel: 1) in Form strohhalm-dicker, bis 50 cm langer, farbloser Stücke, die durch das Trocknen stark verschrumpft sind (Ergänz.), 2) in bis 30 cm langen, etwa 3 cm breiten Platten (Brit.), und 3) in bis 20 cm langen, 3–4 cm im Querschnitt messenden, vierkantigen Stücken (Ergänz.).

Wenn es sich darum handelt, Agar-Agar in Gemischen nachzuweisen, so ist das Objekt in einen möglichst dünnen Schleim zu verwandeln, in dem sich nach einiger Zeit feste Bestandtheile absetzen, die man mikroskopisch untersucht, man hat dann auf Nadeln von Spongien und auf Diatomeen (besonders die zierlichen runden Formen von *Arachnoidiscus ornatus* Ehrenb.) zu achten.

Enthält reichliche Mengen Gelose (= Pararabin $[C_6H_{10}O_5]_x$), die beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure Galaktose $C_6H_{12}O_6$ liefert.

Anwendung. Als Arzneimittel wird Agar-Agar nicht gebraucht, da es dem Carrageen gegenüber keine Vorzüge besitzt. Eine für Vaginalkugeln geeignete Gallerte erhält man aus 10 Theilen nothigenfalls zuvor mit kaltem Wasser abgewaschenem Agar-Agar mit 100 Theilen Glycerin und 200 Theilen Wasser unter Erwärmen (Gerbsäure ist

¹⁾ U-St hat unter diesem Namen *Ichthyocolla*.

mit dieser Masse unverträglich) Im Haushalt dient Agar-Agar bisweilen als Ersatz der Gelatine

Der Mikroskopiker benutzt sie als Fixierungsmittel In neuerer Zeit findet Agar-Agar ausgedehnte Verwendung in der Bakteriologie zur Bereitung von durchsichtigen, bis zu 40° C noch fest bleibenden Nährböden für Reinkulturen

Agar-Agar - Nahr-Gelatine 1 (im Sommer bis 2) Th zerkleinertes Agar Agar lässt man in 100 Th Fleischwasser aufquellen, fügt 0,5 Th Kochsalz, 1 Th Pepton und 2 Th weisse Gelatine zu, neutralisirt, lässt im Wasserbade lösen, bringt für einige Stunden in den Siedehaunungsapparat und giesst klar ab oder filtrirt im Heisswassertrichter in sterilisirte Gläsern oder lässt absetzen

Randelline DIETERICH		Ölel Rosae	
Rp	Agar Agar	2,0	Ölel Aurantii florum
	Aquae	700,0	Fructus Moschi R. gtt 9
	Glycerini	300,0	Essentiae Jasmini 10,0

man erwärmt bis zur Lösung und fügt hinzu

Zum Befestigen der Haare

In jüngster Zeit wird Agar empfohlen als Grundlage für Stuhlzapfen, Medicinalstäbchen und Vaginalkugeln, da es (nach LEWIN und LEBENBAUM) der Kakaobutter und der Glyceringelatine gegenüber den Vorzug besitzt, dass es die aufgenommenen Arzneistoffe in gleichmässiger Vertheilung enthält und sich leicht sterilisiren lässt Man verwendet das pulverförmige Agar Agar des Handels und setzt diesem, da es sauer reagirt, auf 10,0 g 0,1 g Natriumbicarbonat zu 1 Th neutralisirtes Agarpulver wird mit dem in Wasser löslichen Arzneimittel und 20 Theilen Wasser in einer Arzneiflasche angeschüttelt und diese dann mit festgebundenem Kork auf 5—10 Minuten in siedendes Wasser gestellt In ein kreisförmiges, mit Oeffnungen versehenes Holzgestell, welches auf einer gemauerten Waage steht, steckt man kleine Spitzdüsen aus Paraffinpapier, giesst in diese die heisse Agar-masse aus und greift sie auch darin ab Unlösliche Mittel, wie Bismutum subnitricum, Unguentum Hydrargyri emereum, reibt man mit der fertigen Masse an, Tannin wird mit Agarpulver und Wasser (1 Th Tannin, 2 Th Agar, 7 Th Wasser) angestossen, ausgerollt und geformt

Da diese Agar-masse erst weit über Körperwärme (bei 80° C etwa) schmilzt, so sind ihrer Verwendung zu den gedachten Arzneiformen enge Schranken gezogen

Dauernde Stempelpressenmasse DIETERICH	
Agar-Agar	85,0
Wasser	8000,0

Kocht man unter beständigem Umrühren bis zur völligen Lösung, giesst kochend heiss durch Flanell, mischt mit

Glycerin	600,0
----------	-------

und dampft das Ganze auf 1000,0 ein

Fabrike Stempelpressen erhält man aus dieser Masse, indem man sie im Dampfbade schmilzt, unter Um-

rühren Anilinfarbstoffe darin löst und in flache Blech-kästchen ausgiesst, nach dem Erkalten überzieht man die Oberfläche mit einem Staufen Mull oder gewaschenem Shirting Auf 1 Kilo Masse sind erforderlich für Violett 60 g Methylviolett, „ Blau 80 g Phenolblau, „ Roth 80 g Eosin, „ Schwarz 100 g Nigrosin.

Wird ein solches Kissen einmal zu trocknen, so feuchtet man es mit wenig Glycerin an


Agaricinum.

† Agaricinum Agaricin (Germ) Agaricinsäure. Agaricoussäure Acide agarique Agaric acid $C_{12}H_{20}O_6 + H_2O$. Mol Gew = 320 Eine aus den Fruchtkörpern des Lärchenschwammes (*Polyporus officinalis* Fries, *Agaricus albus*, *Boletus Laricis*) abgeschiedene Harzsaure

Darstellung. Wird der gepulverte Lärchenschwamm mit Alkohol bis zur Erschöpfung extrahirt, so gehen eine Anzahl (4) von Harzen in Lösung Koncentrirt man die alkoholischen Auszüge, so scheiden sich beim Erkalten weisse Harze aus, während rothe Harze in Lösung bleiben Die weisse Harz-masse enthält das Agaricin, welches durch Behandeln derselben mit 60procentigem, warmem Alkohol in ziemlich reinem Zustande ausgezogen werden kann Um es vollkommen zu reinigen, wird es durch Erwärmen in heissem Alkohol gelöst und mit einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol versetzt Das α -Harz bildet nun ein in Alkohol lösliches Kalisalz, das γ Harz bildet gar kein Salz, das Kalisalz des β -Harzes dagegen ist in absolutem Alkohol vollkommen unlöslich — Man filtrirt also nach einiger Zeit ab, wobei das α Harz in das Filtrat geht, löst den Rückstand in Wasser und filtrirt wiederum, wobei das γ -Harz zurückbleibt, und versetzt das Filtrat

mit Baryumchlorid. Es bildet sich nun das unlösliche Baryumsalz (der Agaricussäure), welches mit 30procentigem Alkohol erhitzt und in siedend-heisser Lösung mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt wird. Das Filtrat scheidet noch heiss die gutkrystallisirte Verbindung aus, welche durch Umkrystallisiren aus 30procentigem Alkohol ganz rein erhalten wird.

Eigenschaften. In reinem Zustande ein rein weisses, seidenglanzendes Krystallmehl, aus mikroskopischen, vierseitigen Blättchen bestehend. Es schmilzt bei etwa 140° C, bei stärkerem Erhitzen verflüchtigt es sich unter Bildung weisslicher, sauer reagirender Dämpfe und Verbreitung des Geruches nach angebranntem Fett. Verbrennt mit leuchtender Flamme. In kaltem Wasser nur wenig löslich, aber diesem saure Reaktion ertheilend. In heissem Wasser quillt es auf, in siedendem Wasser ist es zu einer klaren, schäumenden Flüssigkeit auflöslich. Löslich in 130 Th kaltem oder 10 Th siedendem Weingeist, noch leichter in heisser Essigsäure, wenig löslich in Aether, kaum löslich in Chloroform. Aetzende Alkalien (KOH, NaOH) lösen es zu einer beim Schütteln stark schäumenden Flüssigkeit. Zweibasische Harzsäure, 1 Mol Krystallwasser enthaltend, welches schon bei 80° C abgespalten wird. Bei höherer Temperatur entsteht das



Anhydrid $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_4$

Von den Salzen charakterisirt sich das Kaliumsalz durch vollkommene Unlöslichkeit in absolutem Alkohol.

Prüfung. Es sei ungefärbt, fast ohne Geruch und Geschmack, löse sich in siedendem Wasser unter vorherigem Aufquellen zu einer klaren Flüssigkeit und schmelze gegen 140° C.

Aufbewahrung. Vorsichtig.

Anwendung. Als schweissbeschränkendes Mittel, namentlich gegen die profusen Schweisse der Phthisiker und gegen die durch gewisse Medicamente, z. B. Antipyrin erzeugten Schweisse, in Gaben von 0,005—0,01. Die Wirkung tritt etwa nach 5—6 Stunden ein. Subkutane Injektionen sind schmerzhaft. Grösste Einzelgabe (Germ) = 0,1 g.

Agaricum.

Polyporus officinalis Fries Polyporaceae. Hemisph. überall, wo die „Lärche“ (*Larix decidua* Miller), auf der er wächst, vorkommt. Geringe Mengen der Droge liefern der Kanton Wallis (Schweiz) und Frankreich. Die grösste Menge kommt aus Russland (Archangel) und Sibirien, wo der Pilz auf *Larix sibirica* Ledebour, die von manchen nur für eine Varietät unserer Lärche gehalten wird, reichlich vorkommt.

Namen. Agaricus albus (Helv.) Boletus Laricis. Boletus purgans. Fungus Laricis (Erganzb.) Polyporus Laricis. — Agarik. Lärchenschwamm. Löcherchwamm. Magenschwamm. Purgirschwamm. — Agarika. — Agaric blanc. Polypore de Mélèze (Gall.) Larch agaric.

Die Droge ist der Fruchtkörper des Pilzes, dessen Mycelium im Holz der genannten Bäume lebt. Er ist seitlich angewachsen, huförmig, halbkugelförmig oder von unregelmässiger Gestalt. Kann bis 7 kg wiegen. Farbe gelb bis braun, gestreift, innen gelblich-weiss. Auf der Unterseite das Hymenium, in welchem die Röhren, die die sporentragenden Basidien enthalten, als feine Punkte zu erkennen sind.

Verwendung findet der getrocknete Fruchtkörper nach Entfernung der dunkeln Rindenschicht und des Hymeniums. Besteht aus langen, durcheinander gewirten fadenförmigen Zellen (Hyphen), zwischen denselben zahlreiche, nicht gut ausgebildete Krystalle von Kalkoxalat.

Geruch dampfig, Geschmack anfangs stüsslich, dann stark bitter.

Bestandtheile. 10—30 Proc Pilzcellulose, organische Säuren, 0,64 Proc Asche. Der wichtigste Bestandtheil ist ein Gemenge verschiedener harzartiger Körper, das 50 bis

80 Proc vom Gewicht des Pilzes beträgt. Es entsteht durch Metamorphose der Membran der Hyphen. Das in Alkohol lösliche Harz besteht aus 4 Harzen, α , β , γ , δ . Das β -Harz ist das wichtigste, es enthält das Agaricin, von dem in der Droge 14—16 Proc enthalten sind (s. besonderen Artikel). Mit Petroläther werden der Droge entzogen 1) in geringer Menge ein Weichharz $C_{16}H_{30}O_4$ und 2) zu 4—6 Proc eine fettartige Substanz. Dieselbe enthält Agaricol $C_{10}H_{16}O$, Cetylalkohol $C_{18}H_{34}O$, einen flüssigen aromatischen Alkohol $C_9H_{16}O$, Phytosterin, eine Fettsäure $C_{14}H_{24}O_4$, Ricinölsäure $C_{18}H_{34}O_2$ und 2 Kohlenwasserstoffe $C_{22}H_{40}$ und $C_{26}H_{54}$.

Zubereitung. Der Schwamm wird in eine mittelfeine Species verwandelt, auch kommt derselbe bereits geschnitten in der gefälligen, besonders für Theegemische zu empfehlenden Form kleiner Würfel in den Handel. Das Pulver wird, seit der wirksame Bestandtheil in reinem Zustande zur Verfügung steht, von Aerzten kaum noch verordnet. Der geschnittene Lärchenschwamm dagegen bildet einen wesentlichen Bestandtheil der Species Hierae Pierae und ähnlicher zur Anfertigung von abführenden Bitterschnäpsen dienender Kräutermischungen, auch ist derselbe enthalten in der Tinct Aloes comp Ph. Belg., dem Elixir ad longam vitam, dem Theriak Cod. med. etc.

Der Lärchenschwamm wurde früher viel mehr wie jetzt als drastisches Abführmittel benutzt, gegenwärtig wird er wie das aus ihm dargestellte Agaricin als Adstringens und Tonicum gegen die Nachtschweisse der Phthisiker benutzt.

Electarium febrifugum		Pilulae nobiles Jesuitarum		Species Hierae Pierae	
SNAAC		Pragensium		Heiligenbitter Hierapiori	
Rp	Chinarinde 20,0	Rp	Boleti Loricis	Rp	Radialis Helenii
	Aromatisches Pulver 5,0		Aloes		Radialis Galangae 50,0
	Ammoniumchlorid 2,5		Corticis Cinnamomi		Boleti Loricis
	Lärchenschwamm 2,5		Folior Sennae		Myrrhae
	Glycerin 15,0		Rhizom Rhei		Radialis Angelicae
	Zuckersirup q. s.		Pulv. aromatis. 10,0		Radialis Gentianae
			Caryophyllorum		Rhizom Rhei
			Masticis		Rhizom Zedoariae 100,0
			Myrrhae 5,0		Aloes 800,0
			Extracti Trifolii 10,0		
			zu 1500 Pillen 2—4 Pillen zu nehmen		werden gleichmässig zerkleinert und gemischt

Seehofer Balsam ohne Aloe. Turpetharz 100,0, Lärchenschwamm, Enzian, Myrrhe, Theriak je 15,0, Galgant 20,0, Angelica 80,0, Anis, Safran je 5,0, Rhabarber Essigäther, Aetherweingeist je 10,0, Zucker 100,0, Weingeist (70 Proc.) 1800,0.

Agrimonia.

Agrimonia Eupatoria L. Rosaceae — Sanguisorbaceae. Heimisch durch Europa Nordasien, Nordamerika. Verwendung findet als Volksmittel bei Leberleiden, Lungenleiden, Diarrhoe etc. das blühende Kraut, das man im Juli oder August sammelt. 7 Th. frisches Kraut geben 2 Th. trockenes.

Namen. Herba Agrimoniae. Hb. Absellae, s. Asellae. Hb. Concordiae. Hb. Eupatoriae. Hb. Lappulae hepaticae. Hb. Marmoreellae — Ackerkraut. Ackermünze. Beerkraut. Bruchkraut. Fünfblatt. Fünffingerkraut. Fünfmannsthee. Franzkraut. Gatterkraut. Griechisches Leberkraut. Hagamundskraut. Heil aller Welt. Königskraut. Leberklette. Menig. Odermennig. Steinkraut. Stabkraut. — Algremonoie (Gall).

Die Pflanze ist eine Staude mit unterbrochen gefiederten Blättern und gelben Blüten in aufrechten, ährenförmigen Blütenständen. Die Droge ist von schwachem, aber annehmendem Geruch und schwach adstringierend-bitterlichem Geschmack.

Die in Südeuropa heimische **Agrimonia odorata Ait.** wird ähnlich verwendet. Odermennig wird, da es an wirksameren Bittermitteln nicht mangelt, nur noch hier und dort im Handverkauf verlangt.

Agropyrum.

Agropyrum repens Beauv (syn *Triticum repens* L.) Gramineae — Hordeaceae. Die „Quecke“. Gemein durch Europa, Asien, auch in Nord- und Südamerika. Ein auf Aekern sehr lastiges Unkraut, welches infolge der weithin kriechenden Ausläufer schwer auszurotten ist. Die letzteren liefern *Rhizoma Graminis* (Ergänzb. Helv. Austr.) *Radix Agropyri* R. *Cynagrostis*. R. *Graminis albi* s. *arvensis* s. *canini* s. *officinorum* s. *repentis* s. *vulgaris*. *Radix Triticis repentis*. *Rhizoma Agropyri*. *Stolones Graminis*. — Ackergraswurzel. Ackermannswurzel. Apothekergraswurzel. Bagerwurzel. Fegwurzel. Graswurzel. Hundsgraswurzel. Hundsrlücken. Knotengras. Kriechweizen. Landdreck. Paden. Peyer. Queckenwurzel. Schnürligraswurzel. Spulwurz. Türkisches Gras. Weisswurz. Wurmgras. — *Racine de chiendent*.¹⁾ *Chiendent officinal* (Gall.) — Quitch-root. Quitch grass-root. Couch-Grass (U-St.)

Beschreibung. Die Stücke der Droge sind glänzend, graugelb, vielskantig, mit grosser Hohlung. Die einzelnen Glieder des Rhizoms sind etwa 5 cm lang, 3—4 mm dick, an den Knoten sind noch Reste der vertrockneten Blattscheiden zu sehen.

Auf dem Querschnitt erkennt man bei schwacher Vergrösserung um die centrale Hohlung einen hellen, dichten Ring, den Leitbündelcylinder, und in demselben Punkte, die Leitbündel. Dieser Cylinder ist von der Rinde durch die Endodermis, deren Zellen nach innen stark verdickt sind, getrennt. In der Rinde finden sich ebenfalls kleine Leitbündel. Die centrale Hohlung ist durch Zerreißen des ursprünglich vorhanden gewesenen Parenchyms entstanden. Für die Erkennung einigermaassen von Bedeutung sind die Zellen der Epidermis, die den charakteristischen Bau der Gramineenepidermis zeigen, sie bestehen aus grossen rechteckigen Zellen mit geschlangelten Wänden und mit ihnen abwechselnden kleinen runden Zellen, die zuweilen zu Haaren ausgewachsen sind.

Bestandtheile. Die Droge enthält zu etwa 5 Proc. ein Kohlehydrat *Triticum* $6(C_6H_{10}O_5) + H_2O$, welches vielleicht mit dem *Inulin* und *Gramin* identisch ist, ferner *Inosit*, Zucker 2—3 Proc. (wahrscheinlich *Laevulose*) und *Mannit* (vielleicht nicht ursprünglich vorhanden).

Verwechslung. Als *Rhizoma Graminis italici* gehen die dickeren Ausläufer von *Cynodon Dactylon Pers*. Sie enthalten Stärke.

Einsammlung und Aufbewahrung. Im Frühling vor Entwicklung des Halmes (Austr.) zu sammeln, mit kaltem Wasser abzuwaschen, von Wurzeln und Blattresten zu befreien. 5 Th. frischer Quecke liefern 2 Th. trockene.

Anwendung. In geschnittenem Zustande bisweilen noch als lösendes und blutreinigendes Mittel zu Theemischungen, das Extrakt in Pillen und flüssigen Arzneien verordnet. In Pulverform soll sie in der Bäckerei als Zusatz zum Mehl, in der Brauerei als Malzersatz Verwendung finden.

Extractum Graminis (Austr.) Queckenwurzelextrakt. 50 Theile zerschnittene Queckenwurzel werden mit 300 und 100 Theilen kaltem Wasser jedesmal 24 Stunden ausgezogen, die durch Absetzen geklärten Auszüge zum Sieden erhitzt, durchgeseiht und im Wasserbade zu einem dünnen Extrakt abgedampft. Die Ausbeute beträgt etwa 25 Proc.

Pharm. Germ. ed. II liess 2 Theile Queckenwurzel mit 10 Theilen kochendem Wasser übergossen, 6 Stunden lang in der Wärme ausziehen, die Kolatur auf 3 Theile einkochen, filtriren und zu einem dicken Extrakt eindampfen. Ausbeute 26—30 Proc.

Pharm. Helvet. II schrieb einstündiges Auskochen der Wurzel mit Wasser und Eindampfen zu einem dicken Extrakt vor.

In Wasser klar flüssiges, rothbraunes Extrakt von fadem, süßem Geschmack.

Dreierich empfiehlt zur Erzielung eines klar löslichen Extrakts Ausziehen der geschnittenen und gequetschten Queckenwurzel mit 4 Theilen, dann nochmals mit 3 Theilen kochendem, destillirtem Wasser, Einkochen der vereinigten Presssaftigkeiten auf 1 Theil, 24 stündiges Absetzenlassen, Filtriren und Eindampfen.

¹⁾ Unter diesem Namen versteht man genau genommen das dickere Rhizom von *Cynodon Dactylon Pers*.

Extractum Graminis fluidum (Dilution) 100 Th höchst fein geschnitten Queckenwurzel werden mit heissem destillirtem Wasser befeuchtet, man verdrängt in siedendem Wasser, indem man im dünnen Strahl ablaufen lässt, dampft auf 80 Th ein, vermischt mit 20 Vol Weingeist (90 Proc), stellt zum Absetzen bei Seite, filtrirt und bringt mit verdünntem Weingeist (68 Proc) auf 100 Th

Extractum Graminis liquidum, Mellago Graminis Ph Boruss VI — Queckensaf Queckenhonig — wurde aus 3 Th Extractum Graminis und 1 Th Aqua destillata bereitet. Bei dem hohen Zuckergehalt der Wurzel gebührt derjenigen Vorschrift zur Extraktbereitung der Vorzug, welche auf dem kürzesten Wege zum Ziele führt

Extractum Tritici fluidum (U St) **Fluid Extract of Triticum**. Man erschöpft 1000 g feingeschnittene Queckenwurzel in einem Perkolator, verdunstet die Auszüge bis auf 750 cem und mischt 250 cem Alkohol (von 94 Vol Proc) hinzu. Nach 48stündigem Absetzen filtrirt man und füllt das Filtrat mit einer Mischung von 1 Vol Alkohol (von 94 Vol Proc) und 8 Vol Wasser zu 1000 cem auf

Flores Graminis, Heublumen, welche Pfaffen Kneipp als Zusatz zu Bädern verordnet, werden nicht von einer bestimmten Gegend gesammelt

Albumen.

Albumen Ovi siccum **Trockenes Hühnereiweiss**. (Germ) **Eiweiss**. **Eiweißalbumin** **Albumine** **Veigl** auch **Ovum**

Von den Pharmakopöen hat die Germ das trockene Hühnereiweiss als „Albumen Ovi siccum“ aufgenommen, und zwar zur Herstellung des Eisenalbuminates

Darstellung Man öffnet frische Hühnereier vorsichtig und trennt sorgfältig die Dotter von dem Eiweiss, so dass der sogen Hahnentritt zu dem letzteren kommt. Zi Abscheidung der Haut lässt man das Eiweiss nun durch ein feines Seidensieb laufen, was man durch Rühren mit einem feinem Pinsel befördern kann. Doch muss man sich hüten, zu stark zu reiben, um Schaumbildung zu vermeiden — Oder man lässt das Eiweiss 24—30 Stunden an einem kühlen Orte stehen, damit sich die Haut absetzen

Die durch Absetzen geklärte Eiweisslösung wird alsdann auf flache Porcellanteller in nicht zu dicker Schicht gegossen und in gut ventilirten Trockenräumen bei einer 55° nicht übersteigenden Temperatur eingetrocknet. Das Eintrocknen ist zu beschleunigen um Fäulniss zu verhindern. Die trockene Masse wird von den Tellern abgestossen und alsdann bei Zimmertemperatur nachgetrocknet. Bei dem Eintrocknen kann man selbstverständlich auch Vacuumapparate benutzen

Technisches Eiweiss (Patent-Albumin) Zur Entfernung kleiner Mengen beigemengten Dotters bringt man in Fabriken das Eiweiss in einen hölzernen Kübel von 150 Liter Inhalt, welcher am Boden ein Zapfloch hat. Auf 100 Liter Eiweiss fügt man 250 g Essigsäure von 1,04 spec Gewicht und 250 g Terpentinöl, rührt das Ganze gut durch und lässt es 24—36 Stunden ruhig stehen. Das Terpentinöl nimmt die Dotterantheile auf und steigt in die Höhe, mechanische Verunreinigungen setzen sich zu Boden. Durch vorsichtiges Öffnen des Hahnes kann man eine völlig klare Flüssigkeit erzielen, welche zu Pflanzwärme verarbeitet wird, während die hinterbleibenden, nicht ganz klaren Reste eine Secundaware liefern. Die essigsäure Lösung wird mit Ammoniak schwach neutralisirt und dann, wie vorher angegeben, zur Trockne gebracht. Doch sollte zum pharmaceutischen Gebrauche ein solches gekünsteltes Präparat, das sich für technische Zwecke ganz gut eignet, nicht verwendet werden

Für 1 kg trockenes Eiweiss sind etwa 250—300 Eier erforderlich

Die bei der Darstellung des Eiweisses abfallenden Eidotter werden, mit Kochsalz konservirt, in der Weingeisterei verwendet

Eigenschaften Gelbliche, amorphe, durchscheinende, dem arabischen Gummi ähnliche Massen oder ebensolche Lamellen, oder ein gelbliches, grobes Pulver. Ohne besonderen Geruch, von fadem Geschmack. Mit Wasser giebt es eine trübe, neutrale Lösung, welche durch Filtriren geklärt werden kann. In Weingeist oder in Aether ist es nicht löslich. Um eine wässrige Lösung herzustellen, übergiesst man das grobgepulverte Eiweiss mit Wasser von 40° C (durch ein Thermometer genau kontrollirt), schüttelt bis zu völligen Vertheilung kräftig durch, so dass sich Klumpen nicht bilden können, und

lasst nun unter öfterem Umschütteln an einem 30—40° C warmen Orte stehen. Die trübenden Bestandtheile der Lösung rühren von den Eihäuten und von kleinen Mengen unlöslichen Eiweisses her. 1 Th trockenes Eiweiss entspricht 7—8 Th flüssigem Hühner-Eiweiss.

Das Präparat ist seiner chemischen Zusammensetzung nach im wesentlichen Eieralbumin, seine wässrige Lösung giebt daher die für das Eieralbumin bekannten chemischen Reaktionen. Die wässrige Lösung wird 1) bei 70—75° C coagulirt 2) Bleiacetat (neutrales sowie basisches), Mercurinitrat, Mercurichlorid,¹⁾ Trichloressigsäure, Silbernitrat, Kupfersulfat, Ferrichlorid, Pikrinsäure, Karbolsäure, Salcylsulfosäure, β -Naphtholsulfosäure (Asaprol), Chloralhydrat, conc Mineralsäuren (namentlich Salpetersäure und Metaphosphorsäure), Ferrocyanwasserstoffsäure + Essigsäure und Ferrocyannwasserstoffsäure + Essigsäure, erzeugen Niederschläge 3) Conc Mineralsäuren wandeln es in Acidalbumin, conc ätzende Alkalien in Alkalalbuminat um.

Eine Formel lässt sich zur Zeit noch nicht angeben, die mittlere Zusammensetzung ist

Kohlenstoff 50—55 %	Stickstoff 15,2—18,2 %	Sauerstoff 22,8—24,1 %
Wasserstoff 6,8—7,3 „	Schwefel 0,4—0,6 „	

Das Hühner-Eiweiss besteht im wesentlichen aus Natriumalbuminat. Wird die wässrige Lösung desselben ohne besondere Vorsichtsmassregeln sich selbst überlassen, so tritt Faulniss ein unter Bildung von Schwefelwasserstoff und Ammoniak und zahlreichen anderen Spaltungsprodukten, unter denen sich auch die giftigen „Toxalbumine“ befinden können.

Prüfung. 1) Es sei nur schwach gelblich gefärbt, fast geschmacklos und geruchlos, jedenfalls achte man darauf, dass es nicht faulig rieche. 2) Es löse sich in 20 Th Wasser zu einer nur wenig trüben Flüssigkeit auf, viel unlösliche Antheile enthaltende Präparate wären zurückzuweisen. 3) Die wässrige Lösung sei neutral, fast geruchlos und geschmacklos, saure oder alkalische Reaction weisen auf konservirende Zusätze hin. 4) Mischt man 10 cem der 1procentigen Lösung mit 5 cem Karbolsäurelösung (1:20) sowie mit 5 Tropfen Salpetersäure (sp G = 1,153), schüttelt durch und filtrirt, so wird alles Eiweiss gefällt und das Filtrat meist klar sein. Ist es trübe oder schlemmig, so ist wahrscheinlich Gummi oder Dextrin zugegen. In diesem Falle tritt, wenn man auf 5 cem des Filtrates 5 cem Weingeist schichtet, an der Berührungsstelle beider Schichten Trübung ein — 5 cem des Filtrates dürfen sich auf Zusatz von 1 cem Jodlösung nur gelb, nicht aber roth färben (Dextrin). 5) 1 g Eiweiss darf nicht mehr als 0,05 g Asche hinterlassen.

Die Werthbestimmung des Eiweisses erfolgt in der Regel durch Bestimmung des Stickstoffgehaltes nach KJELDAHL's Nitrogenium. Durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffs mit 6,25 wird die Menge des vorhandenen Eiweisses gefunden.

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen aus Glas oder Blech an einem trockenen, luftigen, nicht modrigen Orte. Vor dem Einfüllen in die Gefässe empfiehlt es sich, das Eiweiss über Kalk oder bei einer 50° C nicht überschreitenden Temperatur nachzutrocknen.

Anwendung. Zur Herstellung des Eisenalbuminates und des Quecksilberalbuminates, als Reagens. Technisch in der Zengdruckerei, zum Klären trüber Flüssigkeiten, zur Herstellung photographischer Papiere, ferner von Kitten. Doch wird für diese Zwecke zum Theil auch nur das flüssige Eiweiss verwendet.

Solutio Albuminis. Eiweiss-Lösung. Als Reagens für physiologische Zwecke mischt man frisches Hühner-Eiweiss mit dem gleichen Volumen Wasser, oder man löst 1 Th trockenes Hühner-Eiweiss in 20 Th Wasser und filtrirt die eine wie die andere dieser Lösungen. Sie sind nur von beschränkter Haltbarkeit und täglich frisch zu bereiten.

II. Blutalbumin. Serumalbumin. Serin. Bevor man gelernt hatte, das Eiweiß zu konserviren und dadurch transportfähig zu machen, hatte das Eieralbumin einen hohen Preis, so dass die Technik sich nach einem Ersatz des Eieralbumins umsehen musste. Einen solchen fand sie in dem Blutalbumin. Heute kann dieses letztere nur schwer mit dem ersteren in Wettbewerb treten (s. Sangus).

¹⁾ Der Niederschlag ist in Natriumchloridlösung löslich.

Darstellung Man fängt bei dem Schlachten der Thiere das Blut, unmittelbar nachdem es die Ader der Thiere verlassen hat, in flachen runden Zinkwannen von 38 cm Durchmesser und 10 cm Höhe auf. Sobald eine solche Schüssel gefüllt ist, wird sie (noch im Schlachthof) an einen nahe befindlichen Ort gestellt und dort so lange belassen, bis die Gerinnung des Blutes, d. h. die Scheidung in das Blutserum und in den Blutkuchen erfolgt ist. Erst wenn dies geschehen ist, werden die Gefässe in das Fabrikationslokal geschafft. Hier werden die Blutkuchen durch sanftes Neigen der Schalen auf geeignete Metallsiebe übergeführt und man lässt das Serum abtropfen. Um möglichst gute Ausbeute zu erzielen, wird der Blutkuchen mit scharfen Messern in Würfel von etwa 2 cm Grösse zerschnitten. Das zuerst freiwillig abfliessende Serum ist fast ungefärbt und klar und liefert das beste Eiweiss. Durch Ausziehen des zurückbleibenden Blutkuchens mit Wasser gewinnt man geringere Sorten. Der angelangte zurückbleibende Blutkuchen wird entweder auf Düngemittel verarbeitet oder als Schweinefutter verworfen.

Die erhaltenen Lösungen des Serum-Eiweisses werden entweder direkt (Natur-Albumin) oder nach vorausgegangener Klärung mit Essigsäure und Terpentinöl (Patent-Albumin) wie das Hühner-Eiweiss eingetrocknet.

Man erhält etwa die Hälfte des Blutes als Serum, und aus diesem ungefähr 9 Proc Eiweiss.

Dieses Bluteiweiss ist gewöhnlich bräunlich bis braun gefärbt und findet namentlich in der Technik (Zeugdruckerei) Verwendung.

Tata-Eiweiss. Im Weissen der Eier der Nesthooker (Uferschwalben, Staar etc.) und des Kiebits scheint ein besonderes Eiweiss enthalten zu sein. Dasselbe giebt beim Kochen ein durchsichtiges Coagulum. Ein Präparat mit ähnlichen Eigenschaften beschreibt TAROKANOFF als „Tata-Eiweiss“. Darstellung: Rohe Hühnereier werden mehrere Tage mit einer 40–50° C heissen, 2–20 procentigen Kali- oder Natronlauge behandelt, alsdann in Wasser hart gekocht. Das Eiweiss ist jetzt gallertartig und durchscheinend. Nach dem Auslaugen mit kaltem Wasser quillt es, bez. löst es sich in siedendem Wasser leicht auf. — Durch Trocknen kann es in Pulverform gebracht werden. Von Pepsin + Salzsäure soll es 10–12 Mal rascher gelöst werden wie gewöhnliches coaguliertes Hühner-Eiweiss. Es wird zum Verproviantiren von Truppen und als Krankenkost in Aussicht genommen.

Pexin wird geronnenes Eiweiss genannt.

Alexine ist die zusammenfassende Bezeichnung für die im Organismus freiwillig oder infolge einer besonderen Behandlung auftretenden „schützenden Eiweisstoffe“. Zum Theil werden die Alexine aus dem Organismus abgeschieden und als Heilmittel verwendet, z. B. „Tuberculoicin KLENS“.

Toxalbumine werden die von pathogenen Mikroorganismen erzeugten giftigen Umwandlungsprodukte (Stoffwechselprodukte) des Eiweisses genannt, z. B. Toxalbumin des Milzbrandes und des Wundstarrkrampfes. Die meisten derselben werden durch genügend hohe Hitze coaguliert, d. h. unschädlich gemacht.

III Tropon. Ein auf chemischem Wege aus billigen Ausgangsmaterialien hergestelltes, in Wasser unlösliches Eiweiss. Ueber die Darstellung ist bisher nur bekannt, dass es aus entfettetem Fischfleisch, Blut, Vegetabilien (Leguminosen Samen) gewonnen und schliesslich mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt wird, wodurch Färbung und Geruch verschwinden.

Weissliches, geruch- und geschmackloses Pulver, frei von Leimsstoffen und Nukleinen. In Wasser ist es unlöslich, von Pepsin-Salzsäure wird es langsam, aber vollständig peptonisirt. Der Gehalt an Mineralstoffen beträgt etwa 1 Proc., der Gehalt an reinem Eiweiss etwa 90 Proc. Die Bestimmung erfolgt wie bei Albumen.

Es soll als wohlfleisches Eiweiss-Präparat in der Krankenkost, zur Verproviantierung von Schiffen, Expeditionen etc. Verwendung finden. Man giebt 20 g in $\frac{1}{2}$ Liter Suppe, bez. 30 g in $\frac{1}{2}$ Liter Milch oder Kakao verrührt mehrmals täglich. Ferner wird es in Form von Zwieback, Suppentafeln und Chokolade in den Handel gebracht.

Alcohol amylicus.

Alcohol amylicus (Ergänzb, Brit) **Amyloxydum hydratum. Amylalkohol** Sekundärer oder Gährungsamylalkohol **Fuselöl Alcool amylique Huile de grain. Amylic Alcohol** $C_5H_{12}O$ Mol. Gew. = 88. Bei der Fabrikation des Alkohols aus Kartoffeln werden neben Aethylalkohol — wahrscheinlich durch bestimmte Heferassen — auch noch höhere Alkohole gebildet. Diese aus verschiedenen höheren Alkoholen, unter denen aber der sekundäre Amylalkohol überwiegt, sich zusammensetzende Nebenprodukt wird als „rohes Fuselöl“ an die chemischen Fabriken abgegeben. Diese scheiden aus dem Fuselöl die einzelnen reinen Bestandtheile ab. Das rohe Fuselöl wird in Kolonnen-Apparaten fraktionirt destillirt. Die unter $180^{\circ} C$ übergehenden Antheile enthalten hauptsächlich Aethylalkohol, Propylalkohol, Butylalkohol und Wasser, während die bei 180 — $185^{\circ} C$ übergehende Fraktion vorwiegend aus Amylalkohol besteht. Im Destillationsrückstand verbleiben Aether des Amylalkohols. Diese werden durch Aetzkali zerlegt, worauf man durch Destillation weitere Mengen Amylalkohol gewinnt.

Handelssorten. Man unterscheidet 1) *Alcohol amylicus crudus*, rohes Fuselöl 2) *Alcohol amylicus purus* 3) *Alcohol amylicus purissimus* synthetisch dargestellt

† I **Alcohol amylicus crudus** Rohes Fuselöl. Meist eine gelbe Flüssigkeit. Spec. Gew. etwa 0,810. Siedepunkt 120 — $180^{\circ} C$. Das nach dem Steuergesetz frei in den Verkehr übergehende Fuselöl soll mindestens 75 Proc. höhere Alkohole enthalten. Steueramtliche Prüfung 1) Schüttelt man 10 ccm Fuselöl mit 80 ccm Calciumchloridlösung, spec. Gew. 1,225, kräftig durch, so soll die Amylalkohol-Schicht nach dem Absetzen noch mindestens 7,5 ccm betragen. 2) Schüttelt man 100 ccm Fuselöl mit 5 ccm destillirtem Wasser, so soll sich eine trübe Mischung ergeben. Dieses Produkt enthält neben Aethylalkohol die oben erwähnten höheren Alkohole, ausserdem aber noch Pyridin und Furfural. Es unterscheidet sich von dem reineren durch die abweichende Siedetemperatur und durch das spec. Gew. Es wird als Lösungsmittel und als Mittel gegen Ungeziefer verwendet.

† II **Alcohol amylicus purus** *Alcohol amylicus* (Ergänzb). Das unter diesem Namen gewöhnlich von den Preislisten aufgeführte Präparat wird aus dem rohen Fuselöl dargestellt, indem man dieses mit Calciumchloridlösung wäscht, alsdann der Destillation unterwirft und nur die bei 128 — $132^{\circ} C$ übergehenden Antheile auffängt.

Es ist frisch bezogen eine wasserhelle Flüssigkeit, wesentlich reiner als die vorige, aber immer noch durch Furfural und Pyridin verunreinigt. Dieses Präparat ist für die meisten technischen Zwecke ausreichend rein. Das Ergänzb. hatte augenscheinlich die Absicht diese Sorte aufzunehmen.

Eigenschaften. Wasserhelle, lichtbrechende Flüssigkeit von durchdringendem Geruch und brennendem Geschmack, in Wasser wenig löslich (1:40), mit Alkohol, Aether, Benzin, Essigsäure, fetten und ätherischen Ölen klar mischbar. Spec. Gew. 0,814—0,816. Siedep. 129 — $131^{\circ} C$. Gutes Lösungsmittel, namentlich für Alkaloide (Morphin).

Prüfung. 1) 2—3 ccm müssen auf dem Wasserbade ohne Rückstand verdunsten. 2) Mischt man 5 ccm Amylalkohol mit 5 ccm cone. Schwefelsäure, so darf nur schwach gelbliche oder rüthliche Färbung auftreten. 3) Schüttelt man 5 ccm Amylalkohol mit 5 ccm Kalilauge, so darf der Amylalkohol sich nicht färben (Furfural).

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt. Das Ergänzungsbuch auch Vorsichtig.

Anwendung. Als Lösungsmittel in der analytischen und synthetischen Chemie, namentlich in der toxiologischen Chemie zur Ausschüttelung von Alkaloiden.

† III **Alcohol amylicus purus pro analysi.** Man erhitzt käuflichen Amylalkohol im Dampfbade 8 Stunden lang mit dem gleichen Volumen cone. Schwefelsäure. Dann hebt man den Amylalkohol ab, neutralisirt ihn mit Calciumcarbonat und destillirt ihn im Wasserdampfströmte ab. Nach 4—5maliger Wiederholung dieser Operation wird er durch Calciumchlorid entwässert, darauf destillirt, wobei man die bei 129 — $131^{\circ} C$ übergehenden Antheile sammelt. Ist zur Zeit nicht Gegenstand des Handels, sondern der Selbstaustellung.

‡ IV Alcohol amylicus per synthesim Völlig frei von Furfurel kann der Amylalkohol nur durch Zersetzen des reinen amylschwefelsauren Kaliums mit Schwefelsäure gewonnen werden. Man kocht amylschwefelsaures Kalium mit 10proc Schwefelsäure 5 Stunden lang am Rückflusskühler, alsdann neutralisirt man mit Natriumkarbonat, destillirt im Dampfstrom ab und verfährt weiter wie vorher angegeben.

Ein solches Präparat wurde nur für rein wissenschaftliche Zwecke in Betracht kommen. Uebrigens sind auch die reinsten Sorten Amylalkohol immer noch Gemische isomerer Alkohole.

Amylocambol. Zum Vertreiben der Flöhe bei Hunden und anderen Thieren. Kiesel 9,0, Saponis viridis 150,0, Alcoholis amylici crudi 160,0, Aquae q s ad 1 Liter.

Knodalin des Prof. MURIELLE in Aarau. Zur Vertreibung des Ungeziefers auf Pflanzen. Nitrobenzol 3,0, Kali xanthogenicum 10,0, Saponis kalini (von 60 Proc Wassergehalt) 400,0, Alcoholis amylici crudi 600,0.

Nissler's Mittel gegen die Blutlaus. Saponis viridis 50,0, Alcoholis amylici crudi 100,0, Spiritus denaturati 200,0, Aquae q s ad 1 Liter.

Alcohol methylicus.

Alcohol methylicus. Methylalkohol. Alcohol ligni. Spiritus ligni. Holzgeist. Carbinol. Alcool methylique. Esprit de bois. Methylic Alcohol. CH_3OH . Mol. Gew. = 32.

Gewinnung. Bei der trockenen Destillation des Holzes erhält man u a ein flüssiges Product, welches „Holzessig“ genannt wird und im wesentlichen eine wässrige Auflösung von Essigsäure, Methylalkohol und Aceton neben theerigen Beimengungen darstellt. Man neutralisirt diese Flüssigkeit mit Aetzkalk und destillirt die leicht flüchtigen Theile fraktionirt ab. Das so erhaltene erste Zehntel wird roher Holzgeist genannt und besteht hauptsächlich aus Methylalkohol und Aceton. Man entwässert es durch Destillation über Aetzkalk und trägt nun wasserfreies Calciumchlorid ein. Mit diesem geht nur der Methylalkohol (nicht aber das Aceton) eine krystallisirende Verbindung ($\text{CaCl}_2 + 4\text{CH}_3\text{OH}$) ein. Man trennt diese Krystalle vom Aceton, löst sie in Wasser und unterwirft die Lösung der Destillation. Der übergegangene Methylalkohol wird alsdann durch Destillation über Aetzkalk entwässert und in Kolonnen-Apparaten rektificirt.

Handelssorten. Man unterscheidet 1) *Alcohol methylicus crudus*, den rohen Holzgeist, welcher namentlich als Denaturierungsmittel verwendet wird. 2) *Alcohol methylicus purus*, reinen Holzgeist, reiner, aber immer noch etwa 1 Proc Aceton enthaltend, die in der Pharmacie zu verwendende Sorte. 3) *Alcohol methylicus, acetonfrei*, aus dem Oxalsäure-Methyläther dargestellt, vorzugsweise in der organischen Synthese verwendet.

Eigenschaften. A. des absolut reinen Methylalkohols. Farblose, leicht bewegliche, weingeistig riechende, brennend, aber nicht angenehm schmeckende Flüssigkeit. Leicht entzündlich, mit bläulicher Flamme verbrennend. Die Dämpfe geben mit Luft explosive Gemenge. Mit Wasser, Alkohol, Aether, fetten und ätherischen Oelen in jedem Verhältniss mischbar. Gutes Lösungsmittel für Harze. Verbindet sich mit wasserfreiem Calciumchlorid zu der krystallisirenden Verbindung $\text{CaCl}_2 + 4\text{CH}_3\text{OH}$. Wird durch Oxydationsmittel in Formaldehyd und Ameisensäure verwandelt. Spec. Gew. = 0,7997 bei 15° C, Siedep. = 66° C. Reiner Methylalkohol bildet mit Jod + Alkalien kein Jodoform. Wenn Bildung desselben eintritt, so ist dies auf die Gegenwart von Aceton (oder Aethylalkohol) zurückzuführen.

B. des reinen Methylalkohols. Farblose Flüssigkeit wie die vorige, Siedepunkt etwa 64–70° C, Spec. Gew. ca 0,810. Enthält in der Regel etwa noch 1 Proc Aceton.

C. Holzgeist, roher Methylalkohol. Gelbliche Flüssigkeit von weingeistigem, zugleich brenzlichem Geruche. Spec. Gew. nicht über 0,810. Besteht im wesentlichen aus

Holzgeist, Aceton, Essigsäure-Methyläther, Allylalkohol und bräunlichen Produkten Enthält in der Regel etwa 90 Proc Holzgeist

Prüfung. Für die reinen Präparate sind spec Gewicht und Siedepunkt, völlige Flüchtigkeit, ferner die Abwesenheit, bez die Menge des vorhandenen Acetons massgebend

Aceton-Bestimmung nach Missinger. Man bringt 20 ccm (bei Methylalkohol von höherem Acetongehalt 30 ccm) Normal-Kalklauge [genau gemessen!] und 1—2 ccm des zu untersuchenden Methylalkohols (bei reiner Handelswaare können 10—15 ccm Methylalkohol angewendet werden) in eine Stöpselflasche und schüttelt tüchtig um. Dann lässt man aus einer Burette eine bestimmte Menge, z. B. 20—30 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Jodlösung hinzutropfen und schüttelt $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Minute, bis die Lösung klar erscheint. Dann säuert man mit Salzsäure von 1,025 spec Gew an und zwar giebt man die gleiche Anzahl ccm Salzsäure hinzu als man vorher Kalklauge angewendet, lässt $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfat im Ueberschuss hinzu, versetzt mit Stärke und titirt mit $\frac{1}{10}$ -Jodlösung bis zur Bläuung.

Da 1 Mol Aceton zur Jodoformbildung = 6 Atome Jod verbraucht, so entsprechen 762 Th verbrauchtes Jod = 58 Th Aceton

Steueramtliche Prüfung des zur Denaturierung des Alkohols dienenden rohen Holzgeistes. 1) Er sei farblos oder schwach gelblich. Die Farbe sei nicht dunkler als die einer Auflösung von 2 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Jodlösung in 1 Liter Wasser. 2) Bei der Destillation sollen bei 75° C mindestens 60 Vol übergehen. 3) 20 ccm Holzgeist sollen mit 40 ccm Wasser eine klare oder nur schwach opalisirende Mischung geben. 4) Beim Durchschütteln von 20 ccm Holzgeist mit 40 ccm Natronlauge von 1,8 spec Gew sollen nach $\frac{1}{2}$ Stunde mindestens 5 ccm des Holzgeistes abgeschieden sein. 5) Acetonbestimmung. 1 ccm einer Mischung von 10 ccm Holzgeist mit 90 ccm Wasser wird in einem engen Mischcylinder mit 10 ccm Doppelt-Normal-Natronlauge (80 g NaOH im Liter) durchgeschüttelt. Darauf werden 5 ccm Doppelt-Normal-Jodlösung (254 g Jod im Liter) unter einigem Schütteln hinzugefügt. Das sich ausscheidende Jodoform wird mit 10 ccm Aether unter kräftigem Schütteln aufgenommen. Von der nach kurzer Ruhe sich abscheidenden Aetherschicht werden 5 ccm mittels Pipette auf ein gewogenes Uhrglas gebracht und auf demselben langsam verdunstet. Dann wird das Uhrglas 2 Stunden über Schwefelsäure gestellt, hernauf gewogen. Die Menge des Jodoforms soll nicht weniger als 0,07 g betragen.

Aufnahmefähigkeit für Brom. 100 ccm der unten angegebenen Kalumbromatbromidlösung werden mit 20 ccm der unten angegebenen verdünnten Schwefelsäure versetzt. Zu diesem Gemisch, welches eine Auflösung von 0,703 g Brom darstellt, wird aus einer Burette tropfenweise unter Umrühren so lange Holzgeist hinzugesetzt, bis dauernde Entfärbung eintritt. Hierzu sollen nicht mehr als 30 ccm und nicht weniger als 20 ccm Holzgeist erforderlich sein. Diese Prüfung ist stets bei vollem Tageslichte auszuführen.

1) **Kalumbromatbromidlösung.** 3,719 g Kalumbromid (KBr) und 2,447 g Kalumbromat (KBrO₃) werden in Wasser zu 1 Liter gelöst. Die Salze müssen rein und schneefestgetrocknet sein.

2) **Verdünnte Schwefelsäure.** 1 Vol conc Schwefelsäure wird mit 6 Vol Wasser verdünnt.

Aufbewahrung. An einem kühlen Orte, wie der gewöhnliche Alkohol. Auch mit den nämlichen Vorsichtsmaassregeln betreffend die Feuergefährlichkeit. Für die Lagerung grösserer Mengen sind etwa bestehende Polizei-Verordnungen zu beachten.

Anwendung. Der rohe Holzgeist dient in den grössten Mengen zum Denaturiren des Weingeistes, ferner zur Herstellung von Lacken, Firnissen, Polituren. Das reinere Produkt zur Fabrication des Formaldehyds, in der Analyse zum Nachweise der Salicylsäure und der Borsäure, zum Reduciren von Kupferspiralen, ferner zur Darstellung reinen Traubenzuckers. Grosse Mengen verbraucht auch die Theerfarbenindustrie, welche Gewicht auf ein möglichst acetonfreies Produkt legt. — Der absolut acetonfreie, aus Oxalsäure-Methyläther hergestellte Methylalkohol wird vorzugsweise in der chemischen Synthese verwendet. Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei hohen Spirituspreisen die Verwendung eines reinen Methylalkohols zu Schnapsen etc nicht ganz ausgeschlossen erscheint.

Methylated spirit wird in England ein für technische Zwecke mittels rohem Holzgeist denaturirter, Steuer-Ermässigung genossender Aethylalkohol genannt.

Konservierungs-Flüssigkeit für gefärbte animalische Organe von FARN. Domagala. Stärke-Sirup verdünnt 1 kg, Glycerin 100,0 g, Methylalkohol 200,0 g, einige Stückchen Campher, soviel als zur Sättigung der Lösung genügt.

Alkaloidea.

Der Begriff „Alkaloide“ ist nicht streng umgrenzt, im allgemeinen versteht man darunter die aus Pflanzen gewonnenen oder doch zuerst aus Pflanzen dargestellten organischen Basen. Die aus thierischen Substanzen abgeschiedenen organischen Basen werden „Ptomaine“ oder „Ptomatine“ genannt. Von den Glukosiden unterscheiden sich die Alkaloide dadurch, dass bei ihrer Behandlung mit verdünnten Säuren Zucker nicht abgespalten wird. Alle Alkaloide enthalten Stickstoff und bilden mit Säuren Salze. Von den natürlich vorkommenden sind nur wenige sauerstofffrei, die meisten enthalten Sauerstoff. Im freien Zustande sind die meisten Alkaloide in Wasser schwer löslich, dagegen löslich in bestimmten Lösungsmitteln, z. B. Alkohol, Aether, Chloroform, Amylalkohol, Essigäther, einzu u. s. w.

In freiem Zustande reagieren die meisten Alkaloide gegen Lackmus alkalisch, die meisten von ihnen schmecken bitter, sind optisch aktiv und zwar linksdrehend. — In den Pflanzen sind sie in der Regel als Salze vorhanden, und zwar an Aepfelsäure, Citronensäure, Milchsäure, bisweilen aber auch an Säuren, welche den betreffenden Pflanzen eigen thümlich sind, gebunden, z. B. Melkensäure, Aconitsäure, Veratrumsäure, Chelidonsäure.

Je nachdem 1 Mol. eines Alkaloides mit 1, 2 oder 3 Äquivalenten einer Säure neutrale Salze bildet, unterscheidet man sie als 1, 2, 3saure Basen, doch ist die Basenität nicht von der Anzahl der vorhandenen Stickstoff-Atome abhängig. — Praktisch theilt man sie gewöhnlich ein in 1) solche, die mit Wasserdämpfen flüchtig, und 2) solche, die mit diesen nicht flüchtig sind, oder aber in sauerstoffhaltige und sauerstofffreie, oder in flüssige und feste.

Darstellung. Diese richtet sich im einzelnen Falle nach der Natur des in Frage kommenden Alkaloids. Immerhin lassen sich die üblichen Darstellungsmethoden unter folgende allgemeine Gesichtspunkte bringen.

A. Flüchtige Alkaloide. Die zerkleinerten und mit Wasser aufgeweichten Pflanzentheile werden unter Zusatz starkerer Basen ($\text{Ca}[\text{OH}]_2$, NaOH , Na_2CO_3) der Destillation mit Wasserdämpfen unterworfen. Das Destillat wird mit Salzsäure oder Schwefelsäure neutralisirt. Man dampft zur Trockne und entzieht dem Salzrückstand das Alkaloidsalz mit Aether-Weingeist. Das so isolirte Alkaloidsalz wird in Wasser gelöst. Man zersetzt die Lösung durch Zusatz von Kalihydrat und schüttelt das freie Alkaloid durch Aether oder ein anderes geeignetes Lösungsmittel aus. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels hinterbleibt das freie Alkaloid und kann durch Rectifikation (im luftverdünnten Raume bez. im Wasserstoffstrom) völlig rein erhalten werden.

B. Nicht flüchtige Alkaloide. 1) Die zerkleinerten Pflanzenstoffe werden mit angesäuertem Wasser ausgekocht, der Auszug wird — um die Basen aus den Salzen in Freiheit zu setzen — mit stärkeren Basen z. B. CaO , MgO , KOH , NaOH , Na_2CO_3 , NaHCO_3 , NH_3 versetzt, worauf man die Flüssigkeit mit Lösungsmitteln (Aether, Chloroform, Benzol, Benzin, Petroläther, Amylalkohol u. dergl.) ausschüttelt. Die Ausschüttelungen hinterlassen nach dem Verdampfen des Lösungsmittels die Basen in unreinem Zustande. Man nimmt sie mit stark verdünnten Säuren auf, filtrirt, und entfernt das Filtrat durch Thierkohle. Das entfärbte Filtrat wird nun mit Kalilauge versetzt und nun das Alkaloid entweder durch Ausschütteln mit Lösungsmitteln oder, wenn es fest ist, durch mechanische Trennung gewonnen.

2) Bisweilen empfiehlt es sich, die Pflanzenstoffe direkt mit Alkalien (z. B. Cocablätter mit Sodablösung) zu tranken, hierauf zu trocknen und alsdann mit Lösungsmitteln zu extrahiren. Man erhält so die freien Basen ohne weitere vorbereitende Operation.

3) Sind die freien Alkaloide in Wasser so leicht löslich (z. B. Colchicin, Ouarin), dass sie aus wässriger Lösung in Ausschüttelungsmittel nur wenig übergehen, so fällt man sie aus der wässrigen Ansätze durch Fällungsmittel als schwerlösliche Niederschläge (Phosphorwolframsäure oder Phosphormolybdänsäure). Die noch feuchten Niederschläge werden alsdann mit Calciumcarbonat oder Baryumcarbonat gemischt, eingetrocknet, schliesslich die freien Basen durch Auskochen mit Alkohol oder anderen Lösungsmitteln gewonnen.

4) Bisweilen empfiehlt es sich, die Alkaloide aus den Pflanzenansätzen durch Gerbsäure zu fällen. Man vermischt alsdann die noch feuchten Niederschläge mit Bleioxyd oder Bleihydroxyd oder Zinkoxyd, trocknet ein und extrahirt mit Alkohol etc.

In jedem einzelnen Falle muss das geeignetste dieser Verfahren ausgewählt werden. Ferner ist Sorge dafür zu tragen, dass leicht veränderliche Alkaloide, wie z. B. die Alka-

lorde des Aconits, des Mutterkorns, durch die Bereitungsweise möglichst wenig versetzt werden. Man wendet, um dies zu vermeiden, häufig das Vacuum an, arbeitet bei möglichst wenig hoher Temperatur und in indifferenten Gasen (Wasserstoff, Kohlensäure, Leuchtgas) und wählt möglichst milde Basen, z. B. Natriumbicarbonat oder Kaliumbicarbonat. Auch empfiehlt es sich unter allen Umständen, die Darstellung so rasch wie möglich auszuführen, nicht etwa die einzelnen Operationen ungebührlich lange auszudehnen und zwischen mehreren Operationen unnötige Pausen einzuschoben.

Prüfung eines Pflanzenstoffes auf Alkaloide. Man reibt den betreffenden Pflanzenstoff 2—8 Mal mit Wasser oder Weingeist aus, welchen 1—2 Proc. Schwefelsäure oder Weinsäure zugesetzt wurden. Die Auszüge werden bei mässiger Wärme zur Syrupkonsistenz eingedunstet, der Rückstand mit dem 3—4fachen Volumen 96proc. Weingeistes angerührt. Nach erfolgter Klärung filtrirt man ab und wiederholt die Fällung mit Alkohol und das Eindampfen so oft, bis durch Zusatz von Alkohol eine Fällung nicht mehr stattfindet. Man verjagt nunmehr den Alkohol vollständig, löst den Rückstand in Wasser und filtrirt durch ein mit Wasser genässtes Filter. Diese Lösung, welche die Salze der Alkaloide enthält und deutlich sauer reagiren muss, kann verschieden behandelt werden.

a) Man schüttelt sie, um Fett und Fettsäuren zu entfernen, mit Aether aus. Dann macht man sie mit Natronlauge alkalisch und schüttelt mehrere Male mit Aether aus. Die hinterbleibende alkalisch-wässrige Flüssigkeit wird mit Ammoniumchlorid bis zur völligen Bindung des Natronhydrates versetzt, schwach erwärmt und nun wiederholt mit Lösungsmitteln, z. B. Aether, Chloroform, Amylalkohol ausgeschüttelt. Die Ausschüttelungen reinnigt man durch mehrmaliges Schütteln mit kleinen Mengen Wasser von Verunreinigungen (Alkali, Salzen) und überlässt sie bei mässiger Wärme der Verdunstung. Es hinterbleiben alsdann die Alkaloide in mehr oder weniger reinem Zustande und sind dann durch Auflösen in Säure, Behandlung der sauren Lösung mit Thierkohle etc. nach B 1 weiter zu reinigen (s. S. 203).

b) Die schwach saure Flüssigkeit wird mit Bleiacetat oder Bleisug (man prüft in einer Probe, welches der beiden Reagentien Niederschlag erzeugt) versetzt. Entsteht ein Niederschlag, so wird so lange von dem Bleisalz zugelegt (Prüfung durch Abfiltriren kleiner Proben und erneuten Zusatz von Bleisalz zum Filtrat), bis ein Niederschlag nicht mehr erfolgt. Man filtrirt ab, füllt aus dem Filtrat alles Blei durch Schwefelwasserstoff, konzentriert die Flüssigkeit durch Eindampfen und unterzieht sie jetzt dem Ausschüttelungsverfahren nach a. — Man hat indessen zu berücksichtigen, dass in dem durch basisches Bleiacetat erzeugten Niederschlage unter Umständen Alkaloide enthalten sein können. Man vertheilt diesen Niederschlag daher in Wasser, fügt eine kleine Menge Salzsäure hinzu, setzt mit Schwefelwasserstoff, filtrirt vom Schwefelblei ab, konzentriert das Filtrat durch Eindampfen und prüft nun die konc. Lösung auf die Gegenwart eines Alkaloides.

Reaktionen der Alkaloide. 1) Nachweis des Stickstoffs. Alle Alkaloide sind Derivate des Ammoniaks, enthalten also Stickstoff. Um diesen nachzuweisen, bringt man eine kleine Menge der Substanz in ein enges Probirrohr, fügt ein linsengrosses Stück blankes metallisches Kalium oder Natrium hinzu und erhitzt (die Mündung des Rohres von Personen abgewendet!) über kleiner Flamme bis zum Verglühen des Metalls. Nach dem Erkalten wird das Glas zertrümmert, man trägt den die Schmelze enthaltenden Theil vorsichtig (Vorsicht wegen des in der Regel noch vorhandenen Kalium- oder Natrium-Metalls!) in 10—20 ccm kaltes Wasser ein und filtrirt. Fügt man zum Filtrat nun je einen Tropfen Eisenchlorur- und Eisenchloridlösung, erwärmt schwach und säuert dann mit Salzsäure an, so entsteht Blaufärbung oder blauer Niederschlag, falls die Substanz Stickstoff enthält.

2) Nachweis der basischen Eigenschaften. Eine Substanz, welche man nach der Art ihrer Gewinnung für eine Base halten muss, wird in der Regel gegen feuchtes rothes Lackmuspapier alkalisch reagiren, auch wenn sie nicht wahrnehmbar löslich in Wasser ist. Ist die Substanz in Wasser unlöslich, wird sie aber durch Salzsäure in Lösung gebracht und aus dieser konc. Lösung durch stärkere Basen (NaOH , NH_3) wieder abgeschieden, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine organische Base vorliegt, vermehrt. Man versucht in diesem Falle, gut charakterisire Salze darzustellen. — Ferner sucht man durch Zusatz von Platinchlorid bez. Goldchlorid zu der nicht allzu verdünnten salzsauren Lösung die Platin- bez. Gold-Doppelsalze darzustellen, welche in der Regel schwer löslich

in Wasser sind, häufig aber gut krystallin erhalten werden können. Endlich stellt man das Verhalten der fraglichen Substanz gegen die sog. allgemeinen Alkaloid-Reagentien fest.

Allgemeine Alkaloid-Reagentien. Eine Reihe von Reagentien giebt erfahrungsgemäss mit allen oder doch den meisten Alkaloiden bez. Alkaloidsalzen eigenthümliche Erscheinungen, welche man als „allgemeine Alkaloid Reaktionen“ bezeichnet. Diese bestehen in der Bildung von Niederschlägen von bestimmten Eigenschaften, ferner in dem Auftreten bestimmter Färbungen. Man darf nun nicht etwa annehmen, dass jede Substanz, welche mit einem dieser Reagentien eine beschriebene Erscheinung entstehen lässt, zweifellos auch ein Alkaloid ist, vielmehr treten diese Erscheinungen auch mit Substanzen ein, welche nicht als Alkaloide aufgefasst werden können. Man hat sich also einer unbekannten Substanz gegenüber zunächst die Ueberzeugung zu verschaffen, dass in der That überhaupt ein Alkaloid vorliegt.

1) **Jod-Jodkalium.** *Liquor Kali jodo-jodati.* Nach BOUCHARDET eine Lösung von 5 Th Jod und 10 Th Kaliumjodid in 100 Th Wasser. Giebt mit wässrigen Lösungen der Alkaloidsalze hellbraune bis kermesfarbige Niederschläge, welche Additionsprodukte der Alkaloidjodide mit Jod darstellen. — Mit Theobromin entsteht in saurer Lösung nur schwache Trübung, Solanin in saurer Lösung wird nicht gefällt. — Die alkoholische Lösung der Alkaloide wird durch alkoholische Jodlösung meist nicht gefällt, das Berberin indessen giebt unter diesen Umständen sogleich gelblich braunen, krystallinischen Niederschlag.

2) **Kaliumdichromat.** *Solutio Kali dichromici.* Eine Lösung von 1 Th Kaliumdichromat in 10 Th Wasser. Giebt mit nicht zu stark verdünnten Salzlösungen der meisten Alkaloide sogleich oder nach einiger Zeit gelbe Niederschläge (das neutrale Kaliumchromat giebt nicht in allen Fällen den gleichen Effekt). Man vermeide, einen zu grossen Ueberschuss des Reagens anzuwenden, da dieses lösend auf die Niederschläge einwirkt. Man vermeide aber ebenso, die Reaktion bei Gegenwart von allzuviel Säure auszuführen, da sonst leicht Oxydationswirkungen auftreten können.

Nicht gefällt werden Coffein, Solanin.

3) **Gerbsäure.** *Solutio Acidi tannici.* Eine frisch bereitete Lösung von 1 Th Gallusgerbsäure in 9 Th Wasser. Sie giebt mit den meisten Alkaloidsalzen sowohl in neutraler als auch in schwach saurer Lösung weissliche bis gelbliche Niederschläge, auf welche Weingeist, Essigsäure und Ammonsalze lösend einwirken.

Ueber die Abscheidung der freien Basen aus dem Alkaloid Tannat mittels Bleioxyd s. unter Darstellung. — Man beachte, dass durch Gerbsäure auch den Alkaloiden verwandte Stoffe, z. B. Glukoside, ferner Eiweissstoffe, gefällt werden.

4) **Pikrinsäure.** *Solutio Acidi picrici.* Eine Lösung von 1 Th Pikrinsäure in 100 Th Wasser. Sie fällt die meisten Alkaloide aus ihren Salzlösungen quantitativ als Pikrate in Form gelber, amorpher oder krystallinischer oder krystallinisch werdender Niederschläge, selbst bei Gegenwart freier Schwefelsäure.

Aus der verdünnten schwefelsauren Lösung werden vollständig gefällt

Berberin	Cinchonidin	Delphinin	Papaverin
Berberin	Cinchonin	Emetin	Strychnin
Brucin	Codcin	Narcotin	Thebain
Chinidin	Colchicin	Narcotin	Veratrin
Chinin			

Nur in concentrirter Lösung werden zum Theil gefällt

Aconitin	Atropin	Cocain	Hyoscyamin
----------	---------	--------	------------

In neutraler Lösung geben Trübungen bez. Niederschläge

Atropin	Morphin	Nicotin
---------	---------	---------

Nicht gefällt werden in saurer schwefelsaurer Lösung. Alle Bitterstoffe und Glukoside, ferner

Caffein	Morphin	Theobromin
Coniin	Solanin	

5) **Kalium-Quecksilberjodid.** *Liquor Hydrargyri-Kali jodati.* MAYER'S oder VALSER'S Reagens. Man löst einerseits 18,546 g Mercurjodid, andererseits 49,8 g Kaliumjodid in Wasser, mischt beide Lösungen und füllt zu 1 Liter auf. Dieses Reagens giebt mit den meisten Alkaloiden in neutraler oder schwach salzsaurer Lösung weissliche bis gelbliche Niederschläge, welche zunächst amorph sind und zum Theil allmählich krystallinisch werden. Diese auch als $\frac{1}{10}$ -Normal bezeichnete Lösung kann auch

ur maassanalytischen Bestimmung der Alkaloide benutzt werden. Man führt die Titration weckmässig in der schwach schwefelsauren Lösung aus, deren Alkaloidgehalt etwa 0,5 Proc beträgt. Zu einem abgemessenen Quantum der Alkaloidlösung lässt man unter Umrühren so lange aus einer Burette von obiger Lösung zufließen, bis eine Fällung nicht mehr erfolgt. Das Ende der Fällung wird daran erkannt, dass ein mittels eines vorher stark eriebenen Glasstabes (um Anhaften des Niederschlags zu vermeiden) auf eine schwarze Hasplatte gesetzter klarer Tropfen der Flüssigkeit auf Zusatz einer stark verdünnten Alkaloidlösung eine schwache Trübung annimmt, zum Zeichen, dass das Quecksilber-Reagens bereits in geringem Ueberschusse vorhanden ist. Gegenwart von Alkohol, Essigsäure, Ammoniak oder zu viel freier Schwefelsäure in der zu bestimmenden Alkaloidlösung ist zu vermeiden.

1 cem der oben angegebenen Lösung fällt folgende Alkaloidmengen in Gramm aus

Akonitin	0,0268	Chinidin	0,0120	Narkotin	0,02180
Atropin	0,0145	Cinchonin	0,0102	Nikotin	0,00405
Brucein	0,0238	Conin	0,00416	Strychnin	0,01670
Chinin	0,0108	Morphin	0,0200	Veratrin	0,02690

Nicht gefällt werden

Caffein (Digitalin) Colchicin Solanin

Die mit Conin und Nikotin entstehenden Niederschläge sind zuerst weiss, dann werden sie harzig und verwandeln sich schliesslich in makroskopisch sichtbare Nadeln.

6) **Kalium-Cadmiumjodid**, Liquor Cadmio-Kalii jodati. Marmé's Reagens. Lösung von 10 Th Cadmiumjodid und 20 Th Kaliumjodid in 70–80 Th destillirtem Wasser. Giebt mit Alkaloiden amorphe, häufig krystallinisch werdende Niederschläge, welche zu Anfang ungefärbt sind, später gelb werden. Berberin fällt sogleich gelb, Sanguinarin roth aus. Nur aus concentrirter Lösung werden gefällt Atropin, Narcein und Veratrin, Colchicin, Solanin und Theobromin. Ueberhaupt nicht gefällt werden die Glukoside und Caffein. Die Empfindlichkeitsgrenze liegt für die Mehrzahl der Alkaloide bei einer Concentration von 1:10000.

7) **Natriumphosphormolybdänat** $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 11\text{MoO}_3 + \text{aqua}$ und **Phosphor-Molybdänlösung** $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 11\text{MoO}_3$, SONNENSCHNITZ's, bez DE VIL's Reagens.

a) **Natriumphosphormolybdänatlösung**, Liquor Natrii phospho-molybdaenici. Zu einer Lösung von 10 Th Ammoniummolybdänat in 100 Th destillirtem Wasser giebt man 60 Th der reinen Salpetersäure von 1,153 spec Gew, digerirt mehrere Stunden im Wasserbade und versetzt dann die erkaltete Lösung mit soviel Natriumphosphat, gelöst in der 4fachen Menge destillirtem Wasser, als ein Niederschlag dadurch erzeugt wird. Diesen Niederschlag sammelt man in einem Filter, wäscht ihn aus und versetzt ihn in der Wärme des Wasserbades mit soviel Natriumcarbonat, als zu seiner Lösung erforderlich ist. Diese Lösung dampft man zur Trockene ein und glüht bis zur Verjagung allen Ammons. Den Glührückstand befeuchtet man mit etwas Salpetersäure, erlutet nochmals bis zum schwachen Glühen, löst ihn dann in der zehnfachen Menge destillirtem Wasser und versetzt mit soviel Salpetersäure, dass der ursprünglich entstehende Niederschlag wieder in Lösung geht und die Flüssigkeit gelb gefärbt erscheint. Nachdem man einen Tag bei Seite gestellt hat, wird filtrirt und das gelbe Filtrat vor Ammoniakdämpfen geschützt in gut verstopften Flaschen aufbewahrt.

b) **Phosphormolybdänsäure**, Acidum phospho-molybdaenicum, wird in der nämlichen Weise bereitet wie das vorige Reagens, nur wird nicht mit Natriumphosphat, sondern mit Phosphorsäure gefällt. Der Ammonphosphormolybdänat-Niederschlag wird nach dem Auswaschen in einem Glaskolben mit Königswasser übergossen und gekocht, bis alles Ammon zersetzt ist. Dann wird die Flüssigkeit zur Trockne abgedampft und der Rückstand in 8–10procentiger Salpetersäure gelöst. Die gelbe Flüssigkeit wird unter denselben Verhältnissen aufbewahrt wie die vorhergehende. Aus der Lösung kann durch Abdampfen und Beisetzstellen ein wasserhaltiges Salz in schönen gelben Prismen erlangt werden.

Die beiden oben angeführten Reagentien können *promiscue* benutzt werden. Sie erzeugen schon in stark verdünnten neutralen oder sauren Lösungen der Alkaloidsalze Niederschläge und gehören zu den schärfsten der allgemeinen Alkaloid-Reagentien. Die Niederschläge sind hell- bis braungelb gefärbt und nehmen häufig infolge eintretender Reduktion der Molybdänlösung blaue oder grüne Färbung an. Einige dieser Niederschläge lösen sich auch in Ammoniak, zuweilen mit charakteristischer, z. B. blauer Färbung. Blaue Lösung entsteht z. B. bei Gegenwart von Bebeerin, Berberin und Conin, grüne Färbung bei Gegenwart von Brucein und Codem.

Zu beachten ist indessen, dass auch viele nicht alkaloidische Stoffe, z. B. Glukoside, wie Digitalin, ferner die Eiweisstoffe und Peptone, durch Phosphormolybdänlösung gefällt werden.

8) **Ammoniumsulfomolybdänat.** *Ammonium sulfomolybdaenicum* Molybdänschwefelsäure. Man stellt es dar durch Anreiben von 0,5 g Ammoniummolybdat mit 195 g reiner konz. Schwefelsäure und Erwärmen der milchigen Flüssigkeit bis zum Klarwerden (Букингем). Dieses Reagens giebt nach längerer Einwirkung mit allen Alkaloiden und vielen anderen organischen Stoffen Färbungen. Es ist also wichtig, auf die sofort eintretenden Veränderungen zu achten.

Die Lösung ist ohne Einwirkung auf Asparagin, Atropin, Chinidin, Chinin, Cinchonin, Caffein, Strychnin. Dagegen giebt sie mit einigen Alkaloiden des Opiums, namentlich mit Morphin, violette bis blaue Färbung.

Fröder's Reagens, eine Auflösung von 0,5 g Natriummolybdat in 100 cem konz. reiner Schwefelsäure, verhält sich wie das vorige.

9) **Platinchlorid.** *Solutio Platini chlorati.* Eine Lösung von 1 Th. Platinchlorwasserstoff $PtCl_4H_2$ in 9 Th. Wasser. Das Reagens giebt mit den salzsauren Salzen der meisten Alkaloide schwerlösliche, weissliche bis gelbe bis rothbraune Doppelsalze der allgemeinen Formel $PtCl_4Alk_2$, wenn Alk. ein einwerthiges Alkaloid bedeutet, zum Theil enthalten sie übrigens Krystallwasser. Diese Verbindungen krystallisiren zum Theil gut, auch kennzeichnen sie sich durch einen bestimmten Platinegehalt, welcher ermittelt wird, indem man 0,2–0,5 g des betreffenden trockenen Salzes im Porcellan- oder Platintiegel bis zur Gewichtskonstanz glüht, bisweilen auch durch bestimmten Schmelzpunkt. — Die Bildung dieser Platinsalze eignet sich weniger dazu, um geringe Alkaloidmengen, wie sie bei der toxikologischen Analyse erhalten werden, zu identificiren, dagegen kann sie zur Reinigung solcher Alkaloide benutzt werden, und sie dient zur Abscheidung und Charakterisirung der Alkaloide bei präparativen Arbeiten.

10) **Natrium-Platinchlorid.** *Solutio Platino-Natrii bichlorati.* Man löst 10 Th. trockenes Platinchlorid und 3 Th. trockenes, reines Natriumchlorid in destillirtem Wasser und dampft die filtrirte Lösung zur Krystallisation ein. Die Krystalle ($Na_2PtCl_6 + 6H_2O$) werden in 20 Th. Wasser gelöst. Von diesem Reagens gilt das nämliche wie von dem vorigen.

11) **Goldchlorid.** *Solutio Auri chlorati.* Eine Lösung von 1 Th. Goldchlorid chlorwasserstoff in 10 Th. Wasser. Giebt mit den meisten Alkaloiden — zweckmässig sind diese als salzsaure Salze anzuwenden — Niederschläge von Alkaloid chloroauraten. Diese sind weisslich bis goldgelb, amorph oder krystallhart, wasserfrei oder krystallwasserhaltig. Sie charakterisiren sich durch einen bestimmten Goldgehalt, der durch Glühen der betreffenden Salze im Porcellantiegel ermittelt wird, und haben die allgemeine Formel $AuCl_3Alk$, wenn Alk. eine einstufige Base bedeutet. Manche Chloraurate der Alkaloide charakterisiren sich auch durch das äussere Aussehen und durch den Schmelzpunkt. Beispielsweise ist dies ein wichtiger Unterschied zwischen Atropin und Hyoscyamin. Bezüglich der diagnostischen Verwerthung der Reactionen mit Goldchlorid gilt das nämliche wie für das Platinchlorid.

12) **Phosphorantimonsäure.** *Acidum phosphoro-antimonium.* Ein Gemenge von circa 4 Th. einer bei mittlerer Temperatur gesättigten wässrigen Lösung des Natriumphosphats mit 1 Th. Antimonchlorid, erzeugt in der wässrigen schwefelsauren Alkaloidlösung weisse Niederschläge (SCHULTZE).

13) **Kaliumwismuthjodid.** *Liquor Bismutho-Kalii jodati.* Wismuthjodid wird in einer genügenden Menge warmer konz. Jodkaliumlösung gelöst und dann noch mit einer gleichen Menge konz. Jodkaliumlösung verdünnt (DRAGENDORFF). Dies Reagens giebt in den mit Schwefelsäure angesäuerten Lösungen der Alkaloide amorphe orangefarbene Niederschläge (in Theobrominlösung einen krystallinischen). Die Abwesenheit von Aether und Amylalkohol ist gefordert.

14) **Quecksilberchlorid.** *Mercurichlorid.* *Liquor Hydrargyri bichlorati.* Eine Lösung von 1 Th. Mercurichlorid in 20 Th. destillirtem Wasser, giebt mit den meisten Alkaloidsalzen — zweckmässig sind diese als salzsaure Salze anzuwenden — Niederschläge von Chloromercuraten. Diese sind meist weiss, krystallisiren oft gut. Die Zusammensetzung derselben ist konstant, man kann sie durch die allgemeine Formel $HgCl_2Alk$ ausdrücken, wenn Alk. eine einstufige Base ist. Bezüglich der Diagnostik s. Platinchlorid und Goldchlorid.

15) **Ceroxyduloxyd.** Ein von SONNENSCHNEIN empfohlenes Reagens, stellt man dar durch Einleiten von Chlorgas in Aetzkalklösung, in welcher Ceroxydulhydrat vertheilt ist, bis zur Ueberführung in das braungelbe Ceroxyduloxyd. Dieses wird in einem Filter gesammelt, ausgewaschen und getrocknet.

Das Reagens wird in der Art angewendet, dass man das Alkaloid in konz. Schwefelsäure löst und mit einer Spur Ceroxyduloxyds versetzt. Es erfolgen dann (nach SONNENSCHNEIN) folgende Reactionen:

Atropin, missfarbig gelblich braun,
Brucin, anfangs orange, dann erblassend,
Caffein, bleibt farblos,

Chinin, strohgelb,
Cinchonin, bleibt farblos,
Codem, olivengrün,

Colchicin, grün, dann schmutzig braun,
 Coniin, blassgelb,
 Emetin, braun,
 Morphin, olivenbraun,
 Narkotin, erst braun, dann kirschroth,

Pipern, schwarzbraun,
 Solanin, gelb, dann bräunlich,
 Strychnin, blau, dann violett und kirsch-
 roth,
 Veratrin, röthlich braun

16) **ERDMANN's Alkaloidreagens.** Eine Salpetersäure enthaltende kono Schwefelsäure. Man verdünnt 10 Tropfen Salpetersäure von 1,158 spec Gew mit 20 cem destillirtem Wasser und giebt von dieser Flüssigkeit 20 Tropfen zu 40 cem reiner kono Schwefelsäure. Auf 1—2 mg trockenes Alkaloid in einem Uhrgläschen, auf weissem Papier stehend, oder in einem weissen porcellanen Schälchen gießt man 1 cem des Reagens und wartet 15—30 Minuten auf die Reaction. Temperatur 18—22° C.

17) **Koncentrirte reine Schwefelsäure.** Auf 1 mg Alkaloid, in einem auf weisses Papier gestellten Uhrgläschen oder einem weissen Porcellanschälchen 10—12 Tropfen Säure.

18) **Koncentrirte reine Salpetersäure** von 1,35—1,4 spec Gew. Wie vorstehend anzuwenden.

19) **Phospho-Wolframsäure.** Solutio Acidi phospho-wolframi (SCHNEIDER's Reagens). Löst man gewöhnliches (nicht das saure) Natriumwolframat in siedendem Wasser, welches mit der Hälfte seines Gewichtes Phosphorsäure von 1,18 spec Gewicht versetzt ist, so erhält man nach dem Verdunsten der Phospho-Wolframsäure H_2PO_4 $12WO_3 + aqua$. Die wässrige Lösung derselben 1 : 10 hat die Eigenschaft, alle Alkaloide (aber auch Albumosen und Peptone) zu fällen. Die anfangs voluminösen Niederschläge werden später körnig und lassen sich mit angesäuertem Wasser auswaschen. Um aus den Niederschlägen die Basen in Freiheit zu setzen, werden sie mit Barythydrat oder Kalkhydrat behandelt.

20) **Vanadinschwefelsäure.** MANDLIN's Reagens. Eine Auflösung von 1 g Ammoniumvanadat in 200 g kono Schwefelsäure, sie giebt mit Alkaloiden braune, rothe oder grüne Färbungen.

21) **Ueberchlorsäure.** FRANK's Reagens. Eine wässrige Ueberchlorsäure vom spec Gew 1,13—1,14. Erwärmt man eine kleine Menge Alkaloid mit 1—2 cem des Reagens, so entstehen Färbungen. Aspidospermin roth, Strychnin röthlich gelb, Brucin dunkel maderafarbig.

22) **Furfur-Schwefelsäure** (UDRANSKY und MYLUS). Mischung von 5 Tropfen Furfur und 10 cem kono Schwefelsäure. Dunkelbraune, haltbare Flüssigkeit, giebt namentlich mit Veratrin und Sabadillin charakteristische Färbungen.

23) **WENZEL's Reagens.** 200 Th kono Schwefelsäure und 1 Th Kaliumpermanganat. Auf 1 cem Alkaloid Lösung wendet man 1—2 Tropfen des Reagens an.

24) **LICHNER's Reagens.** Schwefelsäure, welche in der Siedhitze mit Kaliumdichromat gesättigt worden ist.

25) **GRANDET's Reagens** (bez. Reaction). Man löst das Alkaloid in kono Schwefelsäure und rührt die Lösung mit einem in Bromwasser getauchten Glasstabe um. Dagegen wird hellpurpur, Morphin roth gefärbt.

Reaktionen der wichtigsten Alkaloide.

Alkaloid	Reine koncentrirte Schwefelsäure	ERDMANN's Alkaloidreagens	FRANK's Alkaloidreagens	Koncentrirte Salpetersäure von 1,35 bis 1,4 spec Gew
Akonitin	gelbbraun, nach 24 St braunroth (mit einem Stoch ins Violette), nach 48 St farblos	hell-gelbbraun, beim Erwärmen braunroth	gelbbraun, später farblos	gelblich
Atropin	farblos (zuweilen braunlich)	farblos	farblos	Alkaloid wird braun, löst sich aber farblos
Boheerin	olivengrün	olivengrün	braungrün, später gelblich	braun
Berberin	schmutzig olivengrün	olivengrün	braungrün, dann braun	dunkel braunroth
Brucin	blass rosa	roth, dann gelb	roth, später gelb, nach 24 St farblos	scharlachroth bis blutroth, dann orange
Caffein	farblos	farblos	farblos	farblos

Alkaloid	Reine konzentrierte Schwefelsäure	ERDMANN's Alkaloid-reagens	FRÖHDE's Alkaloid-reagens	Konzentrierte Salpetersäure von 1,3 bis 1,4 spec Gew
Chinin	farblos	fast farblos	farbloße oder grunliche Lösung, später grünlich	farblos
Chinidin	fast farblos	fast farblos	ebenso	farblos
Cinchonin	farblos	farblos	farblos	farblos
Cocain	farblos	farblos	farblos	farblos
Codein	farblos, nach 8 Tagen blau	farblos, bald blau	schmutzig grün, bald blau, nach 24 St blassgelb	rothlich gelb dann gelb
Colchicin	intensiv gelb	gelb	gelb, dann gelbgrünlich, endlich gelb	violett, später braungrün, endlich gelb
Coniin	farblos	farblos	strohgelb	farblos oder gelblich bis gelb, endlich farblos
Delphinin	bräunlich oder hellbraun, auf Zusatz von einigen Tropfen Bromwasser röthlich violett	bräunlich	rothbraun, später schmutzigh Braun	gelblich
(Digitalin)	braun, rothbraun, zuletzt kirschroth	rothbraun, später roth, nach 10—15 St kirschroth	dunkelorange, dann bald kirschroth, nach 30 Min braunschwarz, nach 24 St grüngelb mit schwarz Flocken	hellbraun
Emetin	bräunlich	grünlichbrunlich, grün, zuletzt rothlichgelb		orange gelb
Morphin	farblos, massig erhitzt erst roth, dann violett, zuletzt schmutzig grün	röthlich, später braungrün. Zusatz von Braunstein zu frischen Mischung allmählich braun	violett, dann grün, braungrün, gelb, nach 24 St blauviolett	löst mit roth gelber Farbe, dann gelblich
Narcotin	braun, dann gelb	gelb, später braun gelb	gelbbraun, dann gelblich, zuletzt farblos	gelb
Narkotin	blassgelb, dann röthlich gelb, nach 80 St himbeergefarben	gelblich, röthlichgelb. Auf Zusatz von etwas Braunstein zu frischen Mischung gelbroth bis blutroth	grün, dann braungrün, gelb, röthlich	anfangs gelb dann farblos
Nikotin	farblos	farblos	gelblich, später rothlich	gelb, bei grösseren Mengen Nicotin violett-bis blutroth, endlich farblos
Papaverin	violett, dann blau	violett, dann blau	violett, bald blau, dann gelblich, zuletzt farblos	orange gelb
Physostigmin	gelb, dann olivengrün			
Piperin	blutroth, dann gelb roth	blassgelb, braun	gelb, später braun bis schwarzbraun. Nach 24 Stunden bräunlich mit schwarzen Flocken	orange gelbes Harz, durch Kahlauge blut roth werdend

Alkaloid	Reine koncentrirte Schwefelsäure	ERDMANN's Alkaloid-reagens	SACHSE's Alkaloid-reagens	Koncentrirte Salpetersäure von 1,05 bis 1,4 spec. Gew.
Solanin	röthlich-gelb, nach 20 St. braun	blassgelb	kirschroth, braun-roth, braun, gelb, zuletzt graugelb	die anfangs farblose Lösung später am Rande blau gelb
Strychnin	farblos. Auf Zusatz eines Staubchens Kaliumdichromat violette Färbung	farblos. Auf Zusatz von wenig Braunstein violettroth, dann dunkel zwiebelroth	farblos	
Thebain	blutroth, später gelbroth	blutroth, später gelbroth	roth, dann rothgelb, zuletzt farblos	gelb
Theobromin	farblos	farblos	farblos	farblos
Veratrin	orange, dann blutroth, nach 30 Minuten karminroth. Die frische Lösung mit Bromwasser versetzt purpurfarben	orange, dann roth bis karminroth, auf ein paar Tropfen Wasser kirschroth	hochgelb, später kirschroth	gelblich.

Untersuchung auf Alkaloide. Liegt ein Alkaloid als solches, oder ein Alkaloidsalz im reinen Zustande vor, so ist die Identifizierung nicht allzu schwer. Man stellt alsdann die in vorstehender Tabelle angegebenen allgemeinen Reaktionen an, erhält dadurch einen Fingerzeig, in welche Gruppe das Alkaloid gehört und vervollständigt die Untersuchung hierauf durch Vornehmen von Special-Reaktionen, deren Ausfall man mit reinem Material kontrollirt.

Liegt ein völlig unbekanntes Objekt vor, d. h. weiss man nicht, ob ein Alkaloid überhaupt, und bejahenden Falles, welches Alkaloid zugegen ist, so ist man genöthigt, einen systematischen Untersuchungsgang einzuschlagen. Ein solcher Gang beruht auf folgenden Thatsachen: die sauren weinsauren Salze der Alkaloide sind erfahrungsgemäss sämmtlich in Alkohol von 80—90 Proc. löslich. Man kann also durch Alkohol die sauren weinsauren Alkaloide aus den betreffenden Objekten ausziehen. Sind letztere Leichentheile, so gehen in die alkoholische Lösung ausserdem auch noch andere Extraktivstoffe über, wie Fette und Fettsäuren, Leim, Pepton und dergl. Man reinigt die alkoholisch weinsaure Alkaloidlösung dadurch, dass man sie zur Sirupskonsistenz eindunstet, darauf mit Wasser aufnimmt und die Lösung filtrirt, wodurch das Fett der Hauptsache nach abgeschieden wird. Dampft man nun das wässrige Filtrat zur Sirupskonsistenz ab und rührt den sirupösen Rückstand mit dem mehrfachen Volumen starken Alkohols an, so werden die peptonartigen und Leimsubstanzen der Hauptsache nach ausgefällt. Dadurch, dass man die beschriebenen Operationen mehrfach wiederholt, werden die störenden Verunreinigungen der Hauptsache nach beseitigt. Die hinterbleibende Lösung wird nun unter bestimmten Bedingungen mit Lösungsmitteln angesüßelt. Im einzelnen wird zweckmässig, wie folgt, verfahren.

Verfahren nach STAS-OTTO. Das Untersuchungsobjekt wird zerkleinert, in einen Kolben gebracht, und wenn es alkalisch reagirt, mit Weinsäure deutlich angesäuert. Reagirt es sauer, so übersättigt man zunächst schwach mit Natriumkarbonat und macht alsdann mit Weinsäure wieder deutlich sauer. Hierauf übergiesst man die angesäuerte Masse mit dem 2—3fachen Volumen 96proc. Alkohols. Man setzt ein genügend langes Glasrohr als Rückflusskühler auf, erwärmt etwa 6 Stunden im Wasserbade auf 60—70°C und lässt erkalten. Ist die Reaktion der Lösung nicht deutlich sauer, so muss Weinsäure zugegeben und wiederum erwärmt werden. Hierauf giesst man die Extraktionsflüssigkeit ab, übergiesst den Rückstand im Kolben nochmals mit dem 2fachen Volum weinsäurehaltigen Alkohols und extrahirt in der eben beschriebenen Weise ein zweites Mal. Wenn es nöthig erscheint, wird die Extraktion noch ein drittes Mal wiederholt.

Man vereinigt die Extraktionsflüssigkeiten, filtrirt sie, wobei man eine etwa sich absondernde Fettschicht möglichst entfernt, und dampft sie in einer kugelförmigen Porzellanschale von etwa 12—15 cm Durchmesser bei einer 60°C nicht übersteigenden Wärme

bis zur Sirupkonsistenz ein. Nach dem Erkalten rührt man den Rückstand mit Wasser gut an und filtrirt die Flüssigkeit durch ein mit Wasser genässtes Filter. Das Filtrat wird durch Eindampfen wiederum zur Sirupkonsistenz gebracht, darauf erkalten gelassen und alsdann mit dem 3–4fachen Volumen 96 proc. Alkohols, welchen man in kleinen Portionen zugiebt, gut verrührt. Man spült die Flüssigkeit in einem Erlenmeyer-Kolben, lässt über Nacht absetzen und filtrirt von den Ausscheidungen (Leim, Pepton) durch ein mit Alkohol befeuchtetes Filter ab. Das alkoholische Filtrat lässt man wiederum bis zur Sirupkonsistenz abdunsten, rührt den Rückstand nunmehr mit Wasser an und filtrirt nach dem Absetzen durch ein mit Wasser genässtes Filter. Das wässrige Filtrat wird abermals zur Sirupkonsistenz abgedunstet, der Rückstand wiederum mit dem mehrfachen Volumen Alkohol verrührt, die Flüssigkeit nach dem Absetzen filtrirt und das Filtrat eingedampft. Diese Reinigung des Extractes durch abwechselndes Behandeln mit Wasser und mit Alkohol wird so oft wiederholt (in den meisten Fällen ist namentlich die Alkoholfällung wiederholt auszuführen, während 2–3malige Behandlung mit Wasser genügt), bis der erhaltene Verdampfungsrückstand schliesslich sowohl in Wasser als in Alkohol klar löslich ist. Man verdunstet nun etwa vorhandenen Alkohol auf dem Wasserbade vollständig, löst den Rückstand in etwa 100–150 ccm Wasser, filtrirt die Lösung durch ein mit Wasser genässtes Filter und überzeugt sich davon, dass sie deutlich sauer reagirt.




Fig. 48. Glasgefässe mit senkrechter Wandung zum Abdunsten von Aether, Benzol und Petroläther.

A. Ausschüttelung der sauren Flüssigkeit mit Aether. Man schüttelt die deutlich sauer reagirende Lösung mit etwa dem gleichen Volumen reinen Aethers 10–15 Minuten aus, lässt absetzen und trennt beide Schichten mit Hilfe des Scheide-trichters. Man wiederholt das Ausschütteln noch zweimal mit neuen Mengen Aether, nöthigenfalls so oft, bis der Aether färbende Theile nicht mehr aufnimmt.

In die ätherische Lösung gehen über: Fett und Fettsäuren, Harze, Farbstoffe, aber auch in kleinen Mengen einige Alkaloide schwach basischer Natur, wie Colchicin, Coffein [Digitalin], ferner Spuren von Atropin und Veratrin. Ist der Auszug röthlich oder violett gefärbt, so kann er auch Apomorphin enthalten. In die ätherische Lösung geht aus saurer Flüssigkeit auch etwa vorhandenes Pikrotoxin und Cantharidin über.

Man verdunstet den Aether oder destillirt ihn ab und erhält nun einen Rückstand, der vorzugsweise aus Fetten und Fettsäuren besteht. Man zieht diesen unter Erwärmen mit kleinen Mengen Wasser aus, filtrirt die Lösung durch ein mit Wasser genässtes Filter und prüft die Lösung durch den Geschmack, ob sie bitter ist, ferner durch die allgemeinen Alkaloid-Reagentien (Phosphor-Molybdänsäure oder Phosphor-Wolframsäure) darauf, ob überhaupt ein Alkaloid zugegen ist. Sollte dies der Fall sein, so muss die Natur des vorhandenen Alkaloids durch Special-Reaktionen festgestellt werden. Zum Abdunsten von Aether oder Petroläther benutzt man sog. Aetherschalen mit senkrechten Wandungen.

B. Ausschüttelung der alkalischen Flüssigkeit mit Aether. Die bei der vorigen Ausschüttelung mit Aether hinterbliebene saure Flüssigkeit wird alsdann durch Zufügung von Natronlauge in einigem Ueberschuss (letzterer ist nothwendig, um Morphin in Lösung zu halten) versetzt und nun wiederum drei oder mehrmals mit Aether ausgeschüttelt. Man vermeide hierbei heftiges Schütteln, da sonst häufig Emulgirung eintritt, welche man übrigens durch Zufügung einiger Tropfen starken Alkohols zu beseitigen versuchen kann. Man vereinigt die Aetherschichten und schüttelt sie etwa dreimal je mit kleinen Mengen Wasser aus. Alsdann lässt man die Aetherschicht gut absetzen, scheidet sie von dem abgetrennten Wasser und filtrirt sie durch ein trockenes Filter. Die ätherische Lösung kann enthalten: Aconitin, Atropin, Brucin, Chelidonia, Chinin, Cocain, Codorn, Coniin, Delphinin, Emetin, Hyoscyamin, Narkotin, Nikotin,

Papaverin, Physostigmin, Pilocarpin, Solanidin, Strychnin, Thebain, Vetrin. Ferner Reste von Colchicin und Coffein, von Bitterstoffen Digitalin.

Man entzieht der Aether-Lösung nunmehr die Alkaloide durch mehrmaliges Ausschütteln mit schwefelsaurem Wasser. Alsdann prüft man die schwefelsaure Lösung, ob sie bitter schmeckt, macht sie wieder mit Natronlauge deutlich alkalisch und schüttelt sie wiederum mehrmals mit reinem Aether aus. Die vereinigten ätherischen Auszüge werden zunächst dreimal mit je kleinen Mengen Wasser gewaschen, alsdann der freiwilligen Verdunstung überlassen. Es hinterbleiben in flüssiger Form Coniin und Nikotin, die übrigen der oben angeführten Alkaloide werden allmählich fest, bleiben aber gewöhnlich amorph. Strychnin geht bald in den krystallinischen Zustand über.

Erscheint das hinterbleibende Alkaloid noch nicht rein genug, so kann man es in salzsauere oder schwefelsaurem Wasser lösen und diese Lösung mit Thierkohle behandeln. Das Filtrat ist alsdann wieder mit Natronlauge alkalisch zu machen und mit Aether auszuschütteln. In diesem Falle ist jedoch die benutzte Thierkohle hinterher mit Alkohol einige Male auszukochen, da sie möglicherweise Alkaloidsalze auf sich niedergeschlagen hat.

Die Identifizierung des Alkaloides erfolgt in der Weise, dass man auf kleine Mengen des freien Alkaloides nach einander konc. Schwefelsäure, Froehde's Reagens, Harmann's Reagens und konc. Salpetersäure einwirken lässt und im Anschluss hieran Special-Reaktionen ausführt. Man nimmt diese Reaktionen auf Uhrgläsern vor, auf welchen man vorher je einige Tropfen der ätherischen Alkaloidlösung hatte verdunsten lassen.

C Ausschüttelung mit Aether aus ammoniakalischer Flüssigkeit. Die bei voriger Ausschüttelung zurückgebliebene, überschüssige Natronlauge enthaltende Flüssigkeit versetzt man mit soviel Ammoniumchlorid, dass alles Natronhydrat sicher umgesetzt wird, und schüttelt 2—3 Mal mit kleinen Mengen Aether aus. Bei Anwesenheit von Apomorphin hinterlässt der durch Schütteln mit Wasser gereinigte Aetherauszug beim freiwilligen Verdunsten einen grünen, krystallinischen Rückstand, in der Regel treten beim Bindunsten infolge Zersetzung des Apomorphins rothe, blaue grüne Farbenscheinungen auf.

D Ausschüttelung mit Amylalkohol aus ammoniakalischer Lösung. Die bei der vorigen Ausschüttelung hintergebliebene ammoniakalische Flüssigkeit wird zunächst mit Salzsäure deutlich aber schwach angesäuert, dann erwärmt, bis aller Aether verdunstet ist. Man übersättigt alsdann mit Ammoniak und schüttelt mit heissem Amylalkohol aus. Das Absetzen der leicht emulgirenden Flüssigkeit befördert man durch Placiren des Gefässes an einen warmen Ort. Bevor man zum zweiten und dritten Male mit heissem Amylalkohol ausschüttelt, macht man die Flüssigkeit jedesmal mit Salzsäure sauer und alsdann mit Ammoniak wieder alkalisch, weil das Morphin nur in seiner amorphen Form relativ gut in Amylalkohol löslich ist. — Die vereinigten Amylalkohol-Auszüge reinigt man zunächst durch Ausschütteln mit heissem Wasser, dann entzieht man ihnen das Morphin durch Schütteln mit schwefelsaurem Wasser und prüft die Lösung, ob sie Jodsäure reduziert. Ist dies der Fall, so macht man wieder ammoniakalisch und schüttelt von neuem mit Amylalkohol aus. Der durch Waschen mit Wasser gereinigte Amylalkohol wird unter vermindertem Druck zum grössten Theile abdestillirt, den Rest der Lösung lässt man auf dem Wasserbade abdunsten, worauf das Morphin als solches hinterbleibt. Man prüft Geschmack, ferner Verhalten gegen Special-Reagentien Salpetersäure, Froehde's Reagens, Ferroryankalum Ferrichlorid, neutrales Ferrichlorid. Dem Morphin kann etwas Narcein beigemischt sein.

E Extraktion des Verdampfungsrückstandes mit Alkohol. Die bei der letzten Extraktion hintergebliebene Flüssigkeit wird mit Kohlensäure übersättigt, unter Zusatz von reinem Sande zur Trockne verdampft und der zerriebene Rückstand mit absolutem Alkohol in der Wärme extrahirt. Man verdampft den Alkohol, behandelt den Rückstand mit warmem Wasser, filtrirt, dunstet das Filtrat ein, nimmt den Rückstand mit absolutem Alkohol auf und überlässt die Lösung der freiwilligen Verdunstung. Das hintergebliebene Alkaloid kann Narcein und Curarin sein. Ferner würden an dieser Stelle auch Herberin und Cytisin gefunden werden.

Verfahren nach DRAGENDORFF. Das zerklümmte Objekt wird bei 50—60° C mit schwefelsaurem Wasser (auf 100 g breiförmiges Objekt = 5 g Schwefelsäure von 20 Proc.) einige Stunden lang macerirt. Dann wird kolirt und das Ausziehen wiederholt. Die Kolaturen dunstet man zur Sirupkonsistenz (nicht zur Trockne) ein und vermischt diesen sirupösen Rückstand mit dem 4—5fachen Volumen starken Alkohols. Man prüft jetzt, ob die Flüssigkeit deutlich sauer ist, andernfalls muss noch verdünnte Schwefelsäure zugegeben werden. Nach 24 stündigem Absetzen wird filtrirt. Das Filtrat wird durch Eindunsten (oder Abdestilliren im luftverdünnten Raume) vom Alkohol befreit. Den Rückstand nimmt man mit einer passenden Menge Wasser (100—300 ccm) auf, filtrirt durch ein mit Wasser befeuchtetes Filter und unterwirft die durch Anwesenheit von schwefelsäure deutlich saure Flüssigkeit nachstehendem systematischen Ausschüttelungsverfahren.

1) Man schüttelt mit Petroleumbenzin aus, welches frisch destillirt wurde und von welchem die bei 40—70° C übergehenden Antheile zu verwenden sind

Die Petroläther Lösung kann enthalten Piperin (Pikrinsäure, Salicylsäure, Benzoesäure, Kampher, Oele, Cardol, Capsicin, gewisse Bestandtheile von Aconit und Helleborus, Ester der Salicylsäure, Benzoesäure und Zimmtsäure mit Kresol, Guajacol, Naphthol)

2) Man schüttelt nunmehr mit Benzol aus. Von diesem können gelöst werden Coffein, Geissospermin, Spuren Veratrin, Delphinoidin, Hydrastin, Piperin (Cantharidin, Anemonin, Santonin, Caryophyllin, Cubebin, Aloetin, Elaterin, Colocynthin, Populin, Digitalin, Strophanthin, Gracolin, Pikrinsäure, Chrysaminsäure, Benzoesäure, Salicylsäure, Spuren von Hydrochinon, Bronzkatechin, Resorcin, Salophen, Neurodin, Malekin, Thermodin, einige Bitterstoffe, wie Absynthin, Quassin, Menyanthin, Ericolin, Onicin)

3) Man schüttelt nunmehr mit Chloroform aus. In dieses gehen über Spuren der sub 2 genannten Substanzen, ferner Spuren von Brucin, Narkotin, Physostyginin, Veratrin, Delphinoidin, Berberin, Oxyacanthin. Ganz besonders aber sind in der Chloroformausschüttelung zu erwarten Theobromin, Colchicin, Papaverin, Narcein, Hydrastin, Chelidonin, Cinchonin, Cinchonidin, Cinchotenin, Cinchotenidin, Jervin, Lycacotin, Myocotonin, Quebrachamin, Hypoquebrachin, Aspidospermum, Quebrachin, Pereirin, Solanidin, Cryptopin, Antifebrin, Digitalin, Convallamarin, Saponartige Körper, Helleborein, Adonidin, Syringin, Picrotoxin, Colocynthin, Aesculin, Gelseminsäure, Analgin

4) Die saure Flüssigkeit kann jetzt mit Amylalkohol ausgeschüttelt werden. Dies ist indessen nur dann notwendig, wenn vorher (sub 3) Aloetin gefunden worden ist. In den Amylalkohol geht über Aloin

Man entzieht alsdann das in der sauren Flüssigkeit gelöste Chloroform oder den Amylalkohol durch Schütteln mit wenig Petroläther, übersättigt die Flüssigkeit mit Ammoniak bis zur deutlich alkalischen Reaction und unterwirft die alkalische Flüssigkeit folgenden Ausschüttelungen

5) Man schüttelt mit Petroläther aus. In diesen gehen über Coniin, Nikotin, Spartein, Lobelin, Piperidin, Pyridin, Picolin, Chinolin, Anilin, o- u p-Toluidin, Kurin, Thallin, Phenocoll, Antipyrin. Ferner Conydrin, Aconitin, Delphinin, geringe Mengen Brucin und Strychnin, Quebracho- und Geissospermum-Alkaloide, Gelsemin, Emotin, Veratrin, Chinin, Hydrochinin, Chinamin, Oxyacanthin — Endlich Zersetzungsprodukte des Erweisses Mono-, Di-, Trimethylamin (ferner die narkotischen Aethyl-, Propyl- und Amyl-Derivate)

6) Man schüttelt mit Benzol aus. Dieses nimmt ausser den sub 5 aufgeführten Alkaloiden auf Methyl- und Aethylstrychnin, Conchinin, Cinchonamin, Cocain, Atropin, Hyoscyamin, Physostyginin, Escridin, Pilocarpin, Jaborin, Pilocarpidin, Sabadillin, Delphinoidin, Alkaloide von Aconitum Lycocotum, Narkotin, Codein, Thebain, Apomorphin, Taxin, Antipyrin, Thallin, Ephedrin, Pseudophedrin, Tolypyrin

7) Man schüttelt jetzt mit Chloroform aus. In dieses gehen über Reste des Cinchonins, Papaverins, Narceins, ferner Cinchonidin, Berberin, kleine Mengen Morphin, Analgin

8) Man schüttelt jetzt mit heissem Amylalkohol aus. Dieser löst Morphin, Solanin, Salicin, ferner Reste des Convallamarins, Saponins, Senegins, Narcein, Cytisin, Cholin, Urethan, Gallanin

9) Die rückständige wässrige Flüssigkeit wird mit Glaspulver eingedampft und der eingetrocknete und zerriebene Rückstand mit Chloroform extrahirt. In dieses kann Curarin übergehen

Alkanna.

Radix Alkannae. Radix Alkannae rubrae. Radix Anchusae rubrae s. tinctoriae. Radix Buglossae rubrae s. arvensis. — Alkannawurzel. Blutwurzel. Färberkrautwurzel. Mahagoniwurzel. Orcanette. Potagenwurzel. Rothfärberwurzel. Rothe Ochsenzungenwurzel. Schminkwurzel. Türkische Röthe. — Racine d'orcanette (Gall) — Alkanna root —

Mit diesen Namen bezeichnet man rothfärbende Wurzeln und zwar ursprünglich die Wurzel der zu den *Lythraceen* gehörigen *Lawsonia alba* Lam, deren Blätter noch jetzt unter dem Namen *Hennah* zum Färben der Fingernägel und anderer Körpertheile im Orient Verwendung finden, auch sonst zum Färben benutzt werden

Jetzt versteht man unter diesem Namen die Wurzel der **Borraginaceae Alkanna tinctoria L.**, die um das Mittelmeer heimisch ist und reichlich in Ungarn vorkommt, wo man sie für den Handel sammelt. Die Wurzel ist bis 20 cm lang, oben 1 cm dick, der Holzkörper oben in 4–6 Th. gespalten, die um einander gedreht sind. Die Rinde ist in den äussersten Theilen blättrig. Nur die Mittelrinde und die äussersten Theile des Bastes sind Sitz des Farbstoffes. Statt dieser echten Wurzel gelangen nicht selten in den Handel Wurzeln anderer Borragineen, die ebenfalls eine farbstoffführende Rinde haben, oder die man mit Fernambuk nachgefärbt hat. Im letztern Falle zeigt sich auch der Holzkörper gefärbt. Dahin gehören die Wurzeln von *Onosma echinoides L.* (*Radix Anchusae luteae* aus der Provence), dicker wie die echte Wurzel, *Onosma Emodi Wall.* (in Nepal), *Alkanna Matthioli Tausch*, *Anchusa officinalis L.*, *Arnebia*-Arten.

Die echte Droge enthält in der Rinde einen Farbstoff **Alkannin** (**Alkannaroth**, **Anchusin**, **Anchusäure**) $C_{15}H_{14}O_4$ zu 5–6 Proc., der in den meisten Lösungsmitteln sich leicht löst, aber in Wasser unlöslich ist. S. weiter unten.

Einkauf. Da der werthvolle Bestandtheil sich nur in den Rindenschichten findet, giebt man einer Wurzel mit möglichst wenig abgeblätterter Rinde den Vorzug.

Anwendung. Wird nur des Alkannins wegen angewendet.

Alkannapapier. Durch Tränken von schwedischem Fliesspapier mit einem weingeistigen Alkannauszug erhält man rothes Regenspapier, aus diesem durch Sodaauszug (1:100) blaues — beide mit den Eigenschaften der entsprechenden Lackmuspapiere.

Aqua dentifricia GENTHE

Rp	Tincturae Alkannae (1:10)	200,0
	Spiritus Mellissae	70,0
	Spiritus (90%)	800,0
	Olei Rosae	8,0
	Ol. Mentii pip.	9,0

Oleum Hyperici

Johannis-Oel

Rp Oei Rapae q s

wird mit Oei Alkannae q s gefärbt.

Oleum Macassar DISTENHOF

Rp	Olei Amygdalarum (vel Oilyarum, Anisidiae)	1000,0
	Olei Bergamotiae	8,0
	Olei Citri	1,0
	Cumarini	0,05
	Olei Alkannae q s	

Strapus caeruleus

Rp	Sirupi Aurantii florum	40,0
	Sirupi Ipecacuanhae	10,0
	Sirupi Sacchari	100,0
	Tincturae Alkannae alkalinae q s	

ad colorem satia caeruleum. An Stelle des „Blau-
Färbensalzes“ für den Handverkauf.

Tinctura Alkannae acida

Rp	Radice Alkannae	10,0
	Alkohol absolut	100,0
	Acid. acetic. (88%)	1,0

Zum Rothfärben weingeladiger Flüssigkeiten

Tinctura Alkannae alkalina

Rp	Radice Alkannae	10,0
	Natrii carbonici crystall.	10,0
	Aquae destillatae	65,0
	Spiritus (90%)	35,0

Zum Blaufärben wässriger Flüssigkeiten

Unguentum potabile rubrum.

Arbeitsweise:

Rp	Adipis suilli	200,0
	Radice Alkannae	5,0

Wird 1–2 Stunden im Wasserbade digerirt, dann
kolirt oder filtrirt. In manchen Gegenden be-
liebtes Volksheilmittel. Für Küchenszwecke
nimmt man an Stelle von Schweinechmalz
frisches Butterfett.

Mahagoni Beize für Holz.

Rp	Radice Alkannae	35,0
	Ligni Aloes	80,0
	Sanguinis Draconis	30,0
	Spiritus (95%)	100,0

Das mit Salpetersäure vorgebeizte Holz wird nach
dem Trocknen mehrmals bestrichen, dann geölt
und polirt.

Alkanninum Alkannaroth. Anchusin. Anchusäure Pseudalkannin.

$C_{15}H_{14}O_4$. Mol. Gew. = 258. Man unterscheidet zwei Sorten, von denen die technische für den Pharmarceuten die wichtigere ist.

A. Reines Alkannin. Man zieht die getrocknete und gepulverte Wurzel mit Petroleumäther aus und verdunstet den Auszug. Der Rückstand wird in 3–5 procentiger Kalilauge gelöst, die indigoblaue Lösung filtrirt und nun mit Aether ausgeschüttelt, welcher eine ziegelrothe Substanz aufnimmt. Durch Anstuern der alkalischen Lösung fällt das Alkannin in braunrothen Flocken aus. Man sammelt diese, wäscht und trocknet sie, löst sie in Aether und lässt die Lösung abdunsten. Das Alkannin hinterbleibt als dunkelbraunrothe Masse von Metallglanz, welche schon unterhalb 100° C erweicht. Unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, Chloroform, Eisessig, auch in Fetten und fetten sowie ätherischen Oelen. In alkoholischer Lösung wird es durch längeres Erhitzen in „Alkannagrün“ umgewandelt. Durch Ammoniak geht die rothe Färbung des Alkannins in indigoblaue Färbung über.

B Technisches Alkannin (*Alcanninum Ergänzb*) Das käufliche Produkt wird erhalten, indem man die getrocknete und gepulverte Wurzel mit Petroleumäther erschöpft und den filtrirten Auszug durch Abdestilliren des Lösungsmittels zur Extraktstärke bringt. Eine harz- oder salbenartige, fast schwarze Masse mit grünlichem Reflex, in den oben angegebenen Lösungsmitteln mit schön rother Farbe löslich. Es empfiehlt sich, aus diesem durch Anreiben mit möglichst wenig Mandelöl ein *Oleum Alkannae concentratum* zu bereiten, und dieses zum Färben der Oele, Salben etc zu benutzen.

Beide Präparate dienen an Stelle der Alkanna-Wurzel zum Rothfärben von Fetten oder Tincturen. Ob eine Färbung durch Alkanna vorliegt, erkennt man an der Blaufärbung durch Ammoniak. Im Zweifelsfalle giebt die spektroskopische Betrachtung der neutralen, bezw. alkalisch gemachten spirituellen Auszüge einwandfreie Auskunft. Wie das Spektrum des Alkannins beschaffen ist, leitet man an Vergleichs-Präparaten kennen.

Alkekengi.

Physalis Alkekengi L. Solanaceae—Solanaceae. Heimisch in Europa und Asien, in Nordamerika eingeschleppt. Verwendung finden die Beeren.

Fructus Alkekengi. **Baccae Alkekengi.** **Baccae Halicababi.** **Fructus Solani vesicarii.** Blasen-Kirschen. Blasenpuppen. Boberellen. Erdkirschen. Hirschweischel. Judas- oder Judenkirschen. Mönchspuppen. Rothschlötten. Saltrian. Schlotten. Steinkirschen. Teufelskirschen. Winterkirschen. Alkékonge Coqueret (Gall) —

Die Beeren sind von der Grösse einer kleinen Kirsche, glänzend roth, zwelfacherig mit zahlreichen Samen, von sauerlich süßem Geschmack, vom aufgeblasenen, scharlach-rothen Kelch umhüllt. Letzterer ist von bitterem Geschmack und vor der Verwendung der Beeren zu entfernen.

Trocken sind sie zusammengeschrumpft, braunroth. Sie gelten als diuretisches Mittel, das aber nur noch im Handverkauf verlangt wird. Man verwendet entweder einen Aufguss der trockenen, oder den Saft der frischen Früchte. In Essig eingelegt, werden sie auch gegessen, sowie die einiger anderer Arten, *Ph. peruviana* L. (Strawberry Tomato, Cape Gooseberry, Brazil Cherry, Ananaskirsche), *Ph. philadelphica* Lam u. a. Die Wurzel der letztgenannten Art wird auch als Diureticum verwendet. In Mittel- und Südamerika gilt *Ph. angulata* L. als tonisches Arzneimittel.

Der Kelch enthält einen Bitterstoff **Physalin** $C_{14}H_{16}O_8$.

Geheimmittel. LAVILLE's Gicht- und Rheumatismusmittel, hierzu gehören:

1) Gichtpillen, *Pilules preventives de la goutte*. Sie bestehen aus dem weinigen Extrakt der Judenkirschen, aus Natronwasserglas und Eibispulver.

2) Gichtwein, *Liqueur antigoutteuse*. Dieser enthält Chinin, Cinchonin, Chinoidin, Colchicin, Chlorcalcium, Koloquintenextrakt, gelöst in verdünntem Weingeist und spanischem Wein.

Allium.

Die Zwiebeln zahlreicher Arten der Gattung **Allium** (*Alliaceae—Allioideae—Allieae*) dienen wegen ihres scharfen Geschmackes und Geruches, die sie schwefelhaltigen Oelen verdanken, arzneilichen Zwecken, bei uns meist nur noch in der Volkmedizin.

Zu erwähnen sind die folgenden:

I. Allium sativum L. Heimisch in der Songarei, vielfach kultivirt in 2 Varietäten: a) **vulgare** Böll (Knoblauch) mit eiförmigen Neben-Zwiebeln. b) **Ophioscorodon** Don (Perlzwiebel, Rocambole) mit rundlich eiförmigen Nebenzwiebeln.

Die Zwiebeln der ersten Varietät finden hier und da noch Verwendung als **Bulbus Allii sativi**, **Radix Allii sativi**. — Garten-Knoblauch; Knoblauch, Lauch. — **Tête d'ail** (Gall) — **Garlic** (U-St.)

Die Nebenzwiebeln (Knoblauchzehen) sind länglich eiförmig bis lanzettlich, oelig, gebogen. Von bekanntem, scharfen Geschmack und Geruch. Sie enthalten 0,9 Proc eines ätherischen Oeles.

Der Knoblauch wird in der Regel vom Gärtner geholt, bisweilen aber auch in der Apotheke, dann am besten im Keller mit Sand bedeckt vorräthig gehalten. Einstmals innerlich und ausserlich, sogar als Schutz gegen ansteckende Krankheiten viel benutzt, ist er heute als Arzneimittel veraltet, selten dient er noch, mit Milch oder Wasser abgekocht, zum Klystier gegen Madenwürmer.

Im Trank des Ungarn Kovacz gegen Wasserscheu ist Knoblauch der Hauptbestandtheil.

Sirupus Allii. Syrup of Garlic (U-St.) Frischen Knoblauch, geschnitten und gequetscht 200 g, Essig (6proc) 800 cem lässt man 4 Tage lang stehen, presst ab, zieht nochmals mit 200 cem Essig aus, vereinigt die Pressflüssigkeiten, filtrirt, löst darin 800 g Zucker und bringt mit Essig auf 1000 cem.

Oleum Allii sativi. Knoblauchöl. Essence d'Ail. Oil of Garlic. Ist das Destillat des Krautes und der Zwiebeln der Knoblauchpflanze, *Allium sativum* L. Es hat gelbe Farbe und unangenehmen, höchst penetranten Knoblauchgeruch. Spec Gew 1,046 bis 1,057. Optisch ist es inactiv.

Knoblauchöl enthält verschiedene Sulfide, besonders $C_6H_9S_2$, ausserdem $C_6H_{11}S_2$, $C_6H_{10}S_2$ etc., aber kein Allylsulfid. Es wird zum Aromatisiren von Knoblauchwürsten verwendet.

II Allium Cepa L. (Sommerzwiebel ¹⁾ Vaterland nicht sicher bekannt, vielleicht Palästina, Turkestan etc., seit langer Zeit in Kultur. Die Zwiebeln.

Bulbus Cepae. Die frische Zwiebel. Bulbe. Zipolle. — Oignon (Gall.) — ist rundlich, etwas platt gedrückt mit scheibenförmiger Achse (Zwiebelkuchen) und etwa 10–12 spiralig daran angeordneten, zusammenschliessenden Niederblättern (Schalen), von denen die äusseren papierdünn und trocken, die inneren fleischig sind. Geruch und Geschmack bekannt. Enthält 0,05 Proc eines linksdrehenden Oeles.

Sie wird hängend an einem kühlen Orte aufbewahrt. Aus der geriebenen Zwiebel (15 Th, Wasser 60 Th, Weingeist 15 Th, Zucker 150 Th²⁾) kocht man einen Sirupus Cepae, ihr Saft ist ein Bestandtheil der Zwiebelbonbons und dient in der Theilheilkunde bisweilen in Pulvermischungen zur Unterstützung der Wirkung der Asa fœtida.

Pulvis liquorum viridis

Rp	Asae foetidae	5,0	Camphorae	1,0
	Seminis Foenugraeci	40,0	Fructuum Lauri	10,0
	Fructuum Coriandoli	5,0	Capitis mortui	5,0
	Salis culinaris	40,0	Kali nitrici	10,0
	Pulveris herbarum	80,0	Seminis Nigellae	10,0
			Fructuum Juniperi	10,0

werden mit 20,0 grob gereibener Zwiebel gemischt und durch ein grobes Sieb geschlagen.

Oleum Allii Cepae. Zwiebelöl. Essence d'Oignon. Oil of Onion. Zwiebelöl. Wird durch Destillation der ganzen Zwiebelpflanze *Allium Cepa* L. gewonnen. Dunkelbraunes, dünnflüssiges Öl von scharfem, anhaftendem Zwiebelgeruch. Spec Gew ca 1,03. Drehungswinkel (100 mm — Rohr) = —5°. Zwiebelöl besteht hauptsächlich aus einem Disulfid $C_6H_{10}S_2$ und anderen schwefelhaltigen Körpern. Allylsulfid (C_3H_5)₂S, das nach dem Öle seinen Namen erhielt, ist nach neueren Untersuchungen kein Bestandtheil des Zwiebelöls.

Oleum Allii ursini. Bärlauchöl. Ist durch Destillation der ganzen Bärlauchpflanze *Allium ursinum* L. (*Liliaceae*) erhalten worden. Dunkelbraunes nach Knoblauch riechendes Öl vom spec Gew 1,01, besteht fast ausschliesslich aus Vinylsulfid (C_3H_5)₂S.

III Allium Victorialis L. Heimisch auf den Gebirgen Mitteleuropas, durch das nordl. Asien bis Kamtschatka, China, Japan und im westl. Nordamerika. Länglich rund bis fast cylindrisch, gebogen, die äusseren Schuppen netzfaserig.

Bulbus Victorialis longus. Allermannsharnisch. Lange Siegwurz. Wilder Allraun. Alpenknoblauch. Damit häufig zusammengefordert werden in der Apotheke die runden, ebenfalls netzfaserigen Zwiebeln von *Gladiolus communis* L. „*Bulbus Victorialis rotundus*“.

¹⁾ Die Winterzwiebel stammt von *Allium fistulosum* L., ursprünglich heimisch in Sibirien, deren Zwiebeln früher als *Radix Cepae oblongae* Verwendung fanden.

American Consumption Cure, Schwindsuchtmittel von ZUNLER in Berlin, ist Zuckersnup mit Zwiebelsaft, dergleichen

American Coughing Cure des Farmers GRAUDINZ

G. A. W. MAYR's weisser Brustsirup ist weisser Sirup mit einer Spur Zwiebel- oder Rettigsaft

MYNI MAURICI's Huile acoustique, sowie

FAVOR's Ohrenbalsam sind mit Alkanna gefärbtes Mandelöl mit Zwiebelsaft

PIDYRIT's Salbe ist ein Gemisch aus Honig, Zwiebelmus, Wachs, Fichtenharz und schwarzer Seife — Unter „Wanzenot“ wird zum Vertilgen der Wanzen in Zeitungen heisser Zwiebelsaft empfohlen

Aloë.

Aloë (Germ. Helv. Anst.) Aloë capensis Aloë lucida. Succus Aloes inspissatus. Succus Sedi amari. — Bittergalle Halbschleber Südwel. — Aloës du Cap (Gall.) —

Aloe africana Miller A vera L. (syn. A. vulgaris Lamarck) **A. spicata Haworth A. ferox Miller** (zweifelhaft) **Liliaceae—Asphodeloideae—Aloinae.**

Vorkommen der Aloe Die genannten Arten und wohl noch andere liefern aus ihren Blättern die Aloe. Dieselbe bildet in der Pflanze einen dünnen Harzsaft, der in grossen Zellen enthalten ist, welche die Phloemtheile der Gefässbündel auf der Aussenseite in einem Halbkreis umgeben. Manche Arten, die keine Aloe führen, haben an Stelle dieser Zellen dickwandige Bastfasern.

Gewinnung der Aloe Man schneidet die Blätter ab und lässt den Aloesaft in Gefässe ausfliessen, worauf er, gewöhnlich über Feuer, selten in der Sonne, eingedickt wird. Die Art und Weise des Concentrirens ist von grosser Wichtigkeit für die Beschaffenheit der Droge.

Sorten der Droge. Man unterscheidet von den verschiedenen Sorten zwei Typen, erstens den der **glänzenden Aloe** (Aloë lucida), zweitens den der **matten Aloe** (Aloë hepatica). Beide sind zunächst nur dadurch unterschieden, dass die Sorten des ersten Typus das Aloin (s. unten) in amorpher Form, die des zweiten in krystallinischer Form enthalten. Der erste Typus entsteht, wenn der Aloesaft beim Eindicken stark erhitzt wird (anscheinend schon, wenn die Temperatur über 50°C steigt). Daher kann man aus einer matten Aloe durch Eindampfen bei starker Wärme eine Aloe lucida machen.

Typus 1, der glänzenden Aloe

Dahin gehört als Hauptsorte die officinelle **Cap-Aloe**. Sie bildet glänzende, zuweilen brünnlich-bestaubte Massen von grünlich schwarzer Farbe, in kleinern Splittern mit brauner Farbe durchscheinend, von grossmuschligem Bruch. Geruch unangenehm, charakteristisch, Geschmack sehr bitter.

Sie liefert ein Pulver von röthlichbrauner Farbe mit grünlichem Stich. Unter dem Mikroskop ist sie amorph, lässt nur selten kleine Kryställchen erkennen. Hat im Sommer zuweilen Neigung, auseinanderzufließen, wenn sie nicht völlig trocken ist. Wird seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Kaplande gewonnen und über Algoabay und Mosselbay eingeführt. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass in den deutschen afrikanischen Kolonien die Gewinnung der Aloë mit gutem Erfolge könnte betrieben werden.

Diesem Typus gehört noch die aus Ostindien stammende, **glänzende Jaffarabad-Aloë** an.

Typus 2, der matten Aloe.

Alle diese Sorten sind nicht durchscheinend, von heller oder dunkler leberbrauner Farbe. Unter dem Mikroskope bestehen sie zum grossen Theil aus Krystallen.

Barbados-Aloe Aloe Barbadosis (Brit. U-St.) Aloës des Barbades (Gall.) Auf dieser Insel von der Aloe vera L., die man sorgfältig kultivirt, gewonnen. Von tiefbrauner Farbe, nicht glänzend, dünne Splittchen, zuweilen an den Rändern schwach

durchschimmernd Harter wie die Kap Aloe Wird in England fast ausschliesslich angewendet

Von geringer Bedeutung für Europa sind die weiteren Sorten von Westindien **Curaçao**, **Bonaire**, **Aruba**, ferner die von Socotra (**Aloë socotrina** (Brit. U. St.) auch als **Zanzibar-Aloe** oder **indische Aloe** bezeichnet), **Natal-Aloe**, **matte Jaffarabad-Aloe** etc

Eigenschaften und Bestandtheile Aloe ist löslich in der fünffachen Menge Alkohol, Kalilauge, Ammoniak, Essigsäure Die doppelte Menge kochenden Wassers löst ebenfalls, lässt aber beim Erkalten einen namhaften Theil wieder ausfallen Unlöslich ist sie in Chloroform, in Aether, Benzol, Petroläther und Schwefelkohlenstoff fast unlöslich

Sie enthält Spuren ätherischen Oeles, etwa 12,2 Proc Barbaloin, 12,7 Proc Harz [Zimmtsäureester des Aloresinotannols $C_{32}H_{46}O_{11}$], 1,75 Proc Asche, 0,15 Proc Emodin $C_{15}H_{10}O_5$, 10,5 Proc Wasser, 62,7 Proc amorphe, wasserlösliche Bestandtheile Ueber die verschiedenen Aloes s. S. 229 Der Gehalt der verschiedenen Sorten an Aloin schwankt zwischen 10–20 Proc Vgl. **POISSON** Archiv Pharm. 1898 200 — Das Harz der Kap Aloe ist ein Ester der Paracumarsäure und des Aloresinotannols

Nachweis der Aloe. 1) nach **KLUGER** Eine wässrige, fast bis zur Farblosigkeit verdünnte Aloelösung wird mit einigen Tropfen Kupfersulfatlösung versetzt, die Farbe wird dann gelblich, setzt man nun etwas Chlorantrium hinzu und erwärmt gelinde, so geht die Farbe in Rosa oder Roth über — Die Probe lässt, wenn es sich um den Nachweis von Aloë in Gemischen handelt, häufig im Stich

2) Zum Nachweis der Aloe in Liqueuren etc soll man die betreffende Flüssigkeit mit Benzin ausschütteln und den Benzinauszug mit einigen Tropfen Ammoniak unter Schütteln gelind erwärmen, färbt sich die Ammoniakflüssigkeit dann nicht violettroth, so ist keine Aloe vorhanden, anderenfalls kann die Färbung auch durch Cort Frangulas, Folia Sennae, Rhiz Rhei, Fucus Rhamni catharticae hervorgerufen werden

3) Um Aloë in Bier etc nachzuweisen, soll man nach **DRAGENDORFF** folgender massen verfahren 2 Liter werden im Wasserbade auf die Hälfte eingedampft, noch heiss mit soviel neutralem Bleiacetat versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht und der letztere rasch abfiltrirt, aber nicht ausgewaschen Das Filtrat wird mit Schwefelsäure entbleit und von dem abgesetzten Bleisulfat abfiltrirt, das Filtrat wird hierauf mit soviel Ammoniak versetzt, dass alle Schwefelsäure und ein Theil der Essigsäure neutralisirt sind (Methyl-anilinviollettlösung darf durch einige Tropfen nicht mehr blau gefärbt werden), und auf 250–300 ccm eingedunstet Der Rückstand wird, um Dextrin etc zu fällen, mit 4 Vol absoluten Alkohols gemischt, die Mischung gut durchgeschüttelt und nach 24stündigem Stehen im Keller filtrirt Nachdem der grösste Theil des Alkohols abdestillirt ist, schüttelt man mit Amylalkohol aus Nach dem Verdunsten der Amylalkohol-Auszüge bleibt ein Rückstand, der den charakteristischen Aloëgeschmack hat, mit Brom-Bromkalium, Bleiessig und Mercuronitrat Niederschläge liefert, sowie alkalische Kupferlösung und Goldlösung reducirt Durch Gerbsäure wird die wässrige Lösung des Rückstandes gefällt, der Niederschlag aber durch einen Ueberschuss theilweise wieder gelöst

Es empfiehlt sich, mit diesem Rückstand auch die **DEMLINGER'sche** Aloëreaction anzustellen Dampft man eine Spur davon mit 4 Tropfen rauchender Salpetersäure ein und nimmt den Rückstand mit einem Tropfen Alkohol auf, so geht die hierbei entstandene rothe Farbe bei Zusatz von wenig alkoholischer Cyankaliumlösung in Rosa über Diese Reaction soll bei 0,0005 g Aloin noch deutlich sein

Verfälschungen der Aloe werden gegenwärtig kaum beobachtet Eine Verfälschung mit Gummi, Dextrin oder mit unorganischen Stoffen würde beim Lösen in Alkohol erkannt werden (s. o.) Der Aschegehalt beträgt 1–1,5 Proc Die Abwesenheit von Harzen, wie Kolophonium, erkennt man beim Auflösen in siedendem Wasser (s. o.)

Am häufigsten ist ein zu grosser Wassergehalt, infolgedessen die Aloe im Sommer etwas auseinanderflusst Im Wasserbade verliert Aloe etwa 8–5 Proc., bei 100° C getrocknet etwa 7–8 Proc Wasser

Pulverung Die Aloe wird zunächst in der Wärme, dann, in kleinere Stücke zerstoßen, über Aetzkalk völlig ausgetrocknet und bei möglichst trockener Witterung je nach Bedarf in ein feines Pulver für die Rezeptur, oder in ein grobes Pulver für Therapeutische Zwecke verwandelt Ohne diese Vorbereitung tackt das Pulver später zusammen Die im Vacuum getrocknete Aloe, welche von manchen Drogenhäusern angeboten wird, dürfte ohne weiteres zur Bereitung eines haltbaren Pulvers geeignet sein, ihr Preis ist indessen recht hoch

Aufbewahrung Aloe in Stücken wird am besten in Holzkästen mit Weissblechensätzen aufbewahrt Wenn die Stücke zusammenfliessen sollten, so stellt man diese

Einsätze in die Wärme, die Masse erweicht in kurzer Zeit und lässt sich mit Leichtigkeit herausnehmen

Als Vorrathsgefässe für Aloëpulver sind Blechbüchsen zu empfehlen, deren Deckel man am Rande mit Papierstreifen überklebt, oder Glashafen mit gut schliessenden Stopfen

Das Deutsche Arzneibuch, ebenso die Pharm. Helv. III, giebt keine Vorschriften hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe der Aloe, ebensowenig ist dieselbe dem freien Verkehr entzogen. Nach der Ph. Austr. darf sie zwar in der Reihe der harmlosen Mittel stehen, doch nur gegen ärztliche Verschreibung verahndelt werden. Ph. Norw. und Hung. schreiben „vorsichtige Aufbewahrung“ vor.

Anwendung. Aloë gilt in Gaben von 0,05—0,1 als appetitanregendes Bittermittel, in grösseren Gaben (0,2—1,0) wirkt sie stark abführend ohne nachfolgende Neigung zu Obstipation. Man reicht sie, stets in Pillenform, bei Hartleibigkeit, Stuhlverhaltung, Blutandrang nach Gehirn, Herz und Lunge.

Bedenklich ist ihr Gebrauch bei bestehender Menstruation, Schwangerschaft, blutenden Hämorrhoiden, Frauen und Kinder vermeiden ihre Anwendung am besten gänzlich. Zu Klystieren, Augenpulvern und -salben wird Aloë nur noch selten verordnet.

Da häufiger und andauernder Gebrauch der Aloe der Gesundheit schädlich ist, so sollte sie im Handverkauf mit Vorsicht und nur in kleinen Mengen abgegeben werden.

In der Therapie ist die Aloë ein vielgebrachtes Abführmittel, doch giebt man dem Extrakt häufig den Vorzug. Die Tinktur dient als Wundmittel.

Aloë purificata, Purified Aloë (U. St.). Gereinigte Aloë. 1000 Theile Aloë socotrina schmilzt man im Wasserbade, mischt 200 Th. Spiritus (94 Vol. Proc.) hinzu, seigt durch ein in kochendem Wasser gewärmtes Sieb No. 80 (= No. 5 Germ.) und dampft im Wasserbade ein, bis eine erkaltete Probe sich als leicht zerbrechlich erweist.

Diese gereinigte Aloe dient in den Vereinigten Staaten zur Bereitung verschiedener Aloëpillen und -tincturen.

Extractum Aloës, *Extractum Aloës aquosum*, Aloë depurata. — Aloëextrakt — *Extrait d'aloës* — *Extract of aloës*

Die Vorschriften der Arzneibücher stimmen darin überein, nur den in Wasser löslichen Antheil zu gewinnen, weichen indessen hinsichtlich der Temperatur und Menge des zu verwendenden Wassers von einander ab.

Ph. Germ.	{	lassen 1 Th. gepulverte Aloë in 5 Th. siedendem Wasser lösen und
Ph. Austr.		2 Tage absetzen
Ph. U. St.	{	lassen 1 Th. Aloë in 10 Th. siedendem Wasser lösen und 12 Stunden
Ph. Brit.		absetzen

Ph. Hung. lässt 1 Th. Aloë mit 10 Th. kaltem Wasser behandeln.

Ph. Helvet. lässt 1 Th. Aloë mit 5 Th. siedendem Wasser behandeln.

In jedem Falle wird die durch Absetzenlassen geklarte Flüssigkeit im Wasserbade eingedampft, bis der Rückstand sich zu dünnen Banden ausziehen lässt. Das bei gelinder Wärme, zuletzt über Aetzkalk getrocknete Extrakt wird zu Pulver zerrieben und in dicht verschlossenen Hafengläsern vor Licht geschützt aufbewahrt. Die Ausbeute beträgt 50—68,4 Proc. Anwendung wie Aloë, doch innerlich nur in halb so grossen Gaben.

Ph. Austr. gestattet die Abgabe von Aloëextrakt nur gegen ärztliche Verschreibung. *Extractum Aloës acido sulphurico correctum*, Ph. Germ. I. Mit Schwefelsäure versetztes Aloëextrakt. 8 Th. Aloëextrakt werden in 32 Th. destillirtem Wasser gelöst, 1 Th. reine Schwefelsäure tropfenweise zugemischt und in einem Porcellangefäss zur Trockne gebracht.

Man kann dieses Extrakt auch unmittelbar aus der Aloë herstellen, 16 Th. werden in 80 Th. heissem Wasser gelöst, nach 2 Tagen vom Bodensatz getrennt und die Lösung mit 1 Th. reiner Schwefelsäure eingetrocknet. Ausbeute etwa 10 Proc. Ein schwarzbraunes, in Wasser trübe lösliches Pulver.

Der Zusatz der Schwefelsäure ist keine „Verbesserung“, das Extrakt wird vielmehr (man vergleiche die Ausbeute!) beim Eindampfen theilweise zerstört und dadurch minderwerthig. Bei seiner Verordnung, die nur noch selten vorkommt, ist ein Zusatz von Sapo zu vermeiden.

Pyroleum Aloës wird durch trockene Destillation der Aloë gewonnen.

Tinctura Aloës Aloëtinktur, volkethümlich Aalensenz, Hufbalsam, Strahl-tinktur. Durch Auflösen von 1 Th. Aloë in 5 Th. Weingest (90 Vol.-Proc.) Spec. Gew. 0,884—0,894.

Tinctura Aloës, *Tincture of Aloës* (U. St.). Gereinigte Aloë 100,0, Süssholzpulver 200,0, verdünnter Weingest (48,6 Vol.-Proc.) q. s.

Die Pulver werden gemischt, mit 80 cem verdünntem Weingeist befeuchtet, nach 24 Stunden in einen Verdünnungsapparat gebracht und mit verdünntem Weingeist 1000 cem Tinktur hergestellt

Tinctura Aloë composita (Germ.) Elixir ad longam vitam Elixir amarum Hjaerner's El antipestilentielle El polychrestum Lentih's El Spina El succium Tinctura sacra — Allgemeine Flusstropfen Alter Schwede Augsburg's oder Kienow's Lebensessenz Augsburg's, Ballhausens, Jenaer, Mariaeller, Salzbunger, Schwarzwälder, Schwedische, Sulzbacher (Magen-) Tropfen Blutreinigungstropfen Goldaderlanktur Eljærner's, Jemitz' Schwedisches, Werner's Lebenselixir Kriegshabererbalsam Quamtropfen Schwedentrank — Teinture d'aloë composée Elixir de longue vie — Compound tincture of aloë Elixir of long life — 30 Th grob gepulverte Aloë, je 5 Th mittelfein geschnittener Rhabarber, Enzianwurzel, Zitwerwurzel und Safran, 1000 Th verdünnter Weingeist (68 Vol Proc) Spec Gew 0,905—0,915

Aloe cu grumeaux Raspall ist beste Aloë, welche in kleine wurfelförmige Stückchen zerkleinert, gesiebt und über Aetzkalk getrocknet ist

Altonaer Kronessenz	
Rp Aloë	80,0
Campthorae	4,0
Radici Angelicae	4,0
Radici Galangae	4,0
Elect Theriak	4,0
Herbae Cardui benedicti	10,0
Bileti Lencis	3,0
Rhiz Rhei	4,0
Radici Gentianae	4,0
Rhiz Zedoariae	4,0
Myrrhae	5,0
Succi Liquiritiae	20,0
Spiritus (80 %)	q s

dass nach dem Pressen 1 kg Flüssigkeit erhalten wird, die zu fäulen ist mit

Tincturae Sacchari tosti q s
Balsamum salutaris WERNER
WERNER's Ges und heils- Elixir

Rp Balsami peruvian	8,0
Styracis liquidi	2,0
Olibani	2,0
Croci	2,0
Corticis Cinnamomi	3,0
Maccidis	3,0
Myrrhae	1,0
Mastiche	0,25
Ammuniaci	5,0
Aloë	5,0
Rhizom Galangae	5,0
Radici Angelicae	5,0
Radici Alkannae	5,0
Foliorum Rosmarini	1,0
Herb Majoranae	1,0
Florum Lavandulae	1,0
Kali carbonici	1,5
Moschi	0,10
Ambræ	0,10
Spiritus netheri	80,0
Spiritus	100,0

Man presst nach zweitägigem Stehen ab

Clyma vomifugum Gallois

Rp Aloë Barbadi	2,5
Solutionis Kali carbonici	8,0
Decoch Amyli	800,0

Klystier gegen Idenwürmer

Decoctum Aloë compositum (Brit)

Rp Extracti Aloë	8,0
Myrrhae grosso modo pulverat	4,0
Kali carbonici	4,0
Succi Liquiritiae	32,0
Aquae destillatae	1000,0
Man kocht 8 Minuten, fñgt dann	
Croci	4,0

hinzu, lässt erkalten, setzt zu

Tincturae Cinnamon compositae 800,0

lässt 2 Stunden stehen, seigt durch und fñllt auf 1000,0 auf Dosis 15—60 g

Electuarium Hiera piera.

Electuarium Aloë compositum

Rp Aloë	80,0
Croci	5,0
Corticis Cinnamomi	5,0
Maccidis	5,0
Radici Asiri	5,0
Mastiche	5,0
gepulvert und mit	
Mellis depurati	250,0
Glycerini	100,0
in Wasserbade zur Latwerge verarbeit	
Dosis 10—15 g zu Klystieren gegen Madenwürmer	

Elixir aperitivum CLAUDE

CLAUDE's eröffnendes Elixir Elixir proprietatis aquosum

Rp Myrrhae pulveratae	5,0
Aloë	5,0
Croci	2,5
Kali carbonici	10,0
Aquae Sambuci	70,0
Spiritus	10,0
2 Tage in der Wärme digerhen, abkñhlen, filtriren	
Dosis 3,0—4,0 g	

Elixir cholagogum universale

Droge amaro Gallenelixir

Fransmannstropfen

Rp Aloë	100,0
Myrrhae	50,0
Extracti Gentianae	50,0
Extracti Absinthii	50,0
Tincturae nucis vomicae	50,0
Elacosacchari Anisi	20,0
Vini generosi albi	1000,0
Spiritus	1000,0
nach 8 tñgigem Stehen filtriren. Dosis: 2—5 Theel-	
löffel pro die bei Verstopfung und Verdauungs-	
schwäche	

Elixir Proprietatis

Elixir Proprietatis sine acido s dulce

Elixir aperitivum Tinctura Aloë cro-

cata Tinctura Aloë cum Myrrha.

Rp Tincturae Aloë	80,0
Tincturae Myrrhae	80,0
Tincturae Croci	10,0

Dosis 2—4 g

Elixir Proprietatis alkalinum.

Tinctura aloëtica alkalina.

Rp Aloë pulv	10,0
Myrrhae pulv	10,0
Croci pulv	5,0
Solutionis Kali carbonici	15,0
Spiritus	150,0

Einem Tag digeriren, nach dem Absetzen filtriren
Dosis 1—2 Theelöffel bei Verschleimung der
Verdauungsweg

Elisir Proprietatis cum Rheo**Tinctura aloëtica rhabarbarina**

Rp Aloë	10,0
Myrrhae	10,0
Croc.	5,0
Rhei	15,0
Acidi hydrochlorici	10,0
Vini Xerensis	200,0

Fünfte Tage digeriren Dosis 50--80 Tropfen ein-
bis zweimal pro die

Elisir Proprietatis Paracelsi
**Elisir Proprietatis cum acido Tinctura
aloëtica acida Saures Aloë-Elisir
(Germ I)**

Rp Aloë grosso modo pulverat	30,0
Myrrhae	20,0
Croc.	10,0
Spiritus	240,0
Acidi sulfurici diluti	20,0

8 Tage maceriren, dann filtriren Dosis 2--3 Thee-
löffel pro die Mittel gegen Wurm, Magen-
mittel zur Beförderung der Regel

Elisir Proprietatis salinum**Elisir Proprietatis BOERHAAVE**

Rp Aloë pulverat	10,0
Myrrhae	10,0
Croc.	5,0
Kali tartarici	20,0
Aquae destillatae	80,0
Spiritus	120,0

Digaliren, dann filtriren. Dosis 1--2 g pro die

Enema Aloë (Brit)

Rp Aloë	2,6
Kali carbonici	1,0
Muellag Amyli	285,0

Injectio antigonorrhoeae GAMBERINI

Rp Tincturae Aloë	15,0
Aquae destillatae	120,0

Injectio antigonorrhoeae GAUW

Rp Aloë	0,5
Mellis rosati	30,0
Ammonii hydrochlorici	0,2
Aquae Rosae	200,0

Massa pilularum RUFFI**RUFF'sche Pillenmasse (Aust)**

Rp Aloë pulverat	60,0
Myrrhae	30,0
Croc.	10,0

M. f. pulvis Gut verschlossen aufzubewahren.

Mixtura cathartica PRASLER

Rp Extracti Aloë	10,0
Extracti Iamxaci	15,0
Foliorum Sennae	20,0
Rhizom Rhei	15,0
Nucis vomicae grosso modo pulverat	2,5
Aquae fervidae	850,0

Man lässt 1 Stunde im Wasserbade stehen, seihet
durch, löst in 800,0 g der Flüssigkeit

Magnesi sulfurici 50,0

und fügt zu

Spiritus Juniperi	70,0
Sirupi Sacchari	50,0

Dosis Dreistündlich einen Esslöffel bei Leber-
verstopfung

Pastilli masticatois Indici

Cachonde	Cachonde
Rp Pulv aromatica	150,0
Moschi	0,10
Aloë	10,0
Magnesi carbonica	10,0
Catechu	10,0
Ligni Santalin rubra	800,0
Boli armeni	100,0
Sacchari	1500,0

Daraus 2000 Pastillen Verdauung anregendes Kau-
mittel

Pilulae Aloë CRATON

Rp Aloë pulverat	7,5
Succini	5,0
Mastiche	5,0
Boleti Iarici	2,0
Olei Succini rectif	1,0

Daraus 100 Pillen

Pilulae Aloë (U-St.)**Pills of Aloë**

Rp Aloë purific	13,0
Saponis medicati	13,0

Aquae q s ut fiant pil No 100

Pilulae Aloë Barbadosens (Brit.)**Pills of Barbados Aloë**

Rp Aloë Barbadosens	40,0
Sapon medicat	20,0
Oli Civi	2,5 oca
Confect Rosarum	20,0

f pilul dos 0,26--0,5

Pilulae Aloë crocatae RICHEN.

Rp Aloë	4,0
Myrrhae	4,0
Croc.	4,0

Extracti Aurantii q s ut fiant pil No 120 Mit
Pulvis Croci zu bestreuen Dosis Zur Be-
förderung der Regel morgens und abends 6--8
Pillen

Pilulae Aloë cum Gutti (Gall)**Pilulae ANDERSON Pilulae Ecosassae**

Rp Aloë Barbados	5,0
Gutti	5,0
Olei Anisi	0,25
Mellis	2,0

M. fiant pilulae No 60 Dosis 2--3--5 Stück pro
die

Pilulae Aloë et Asae foetidae**Pills of Aloë and Asa foetida (U-St.)**

Rp Pulvis Aloë depmat	9,0
Asae foetidae	9,0
Saponis medicati	9,0

Aquae q s ut fiant pil No 100 Brit Mast mit
Confect Rosae zur Masse formen

Pilulae Aloë et Ferri I**Pills of Aloë and Iron (U-St.)**

Rp Aloë purificat	7,0
Ferri sulfurici sicc	7,0
Pulv aromati	7,0

Conserve Rosarum q s ut fiant pil No 100

Pilulae Aloë et Ferri II**Pills of Aloë et Iron (Brit)**

Rp Aloë Barbados	40,0
Ferr sulf sicc	20,0
Piv Cinnam comp	80,0
Sirup Glucosi	60,0

f pilul dos 0,26--0,5

Pilulae Aloë et Mastiche.**Pills of Aloë and Mastic (U-St.)**

Rp Aloë purif	13,0
Mastiche	4,0
Florum Rosarum	2,0

Aquae q s ut fiant pil No 100

Pilulae Aloës et Myrrhae I
Pills of Aloes and Myrrh (U-St.)

Rp Aloës purificat 18,0
Myrrhæ 6,0
Pulv aromatizati 4,0
Sirupl simpli q s ut fiant pil No 100

Pilulae Aloës et Myrrhae II
Pills of Aloes and Myrrh (Brit.)

Rp Aloës Socotrin. 40,0
Myrrhæ 20,0
Croci 10,0
Sirupi Glucosæ 80,0
M ut fiant pil dosis 0,25—0,5 g

Pilulae Aloës gelatinatae.

Rp Aloë wird im Wasserbade erweicht und in
Pillen à 0,15 g geformt, die mit feinem Leim
überzogen werden

In Berliner Apotheken vorrätig

Pilulae Aloës rosatae

Pilules de Famille.

Rp Aloës pulv 10,0
Flor Rosarum 2,5

Aquæ Rosarum q s ut fiant pilul No 100

Pilulae Aloës saponatae
Pilulae cum Aloë et Sapone (Gall)

Rp Aloës 5,0
Saponis medicati 5,0
fiant pil No 50
Dosis 2—4—6 Stück

Pilulae Aloës saponatae BURDAUGH

Rp Aloës 1,0
Hydargyri chlorati mitis 1,0
Saponis medicati 1,0
fiant pil No 20
Dosis Morgens 2—4 Stück

Pilulae Aloës saponatae GRAEFFE.

Rp Aloës 4,0
Saponis medicati 2,0
fiant pilul No 50
Mit Zimmtpulver zu bestreuen.

Pilulae Aloës simpliciores (Gall)

Rp Aloës 30,0
Conserv Rosarum 15,0
M. ut fiant pilul 800, obducat argenteo

Pilulae Aloës socotrinae

Pills of Socotrine Aloes (Brit.)

Rp Aloës socotrin 40,0
Sapon medicat 20,0
Ol Myrsidæ æsth. 2,5
Confect. Rosar 20,0
t. pil. dosis 0,25—0,5

Pilulae aloëticae (Form Berolin.)

Rp Aloës 8,0
Saponis jalapin 2,0
Spiritus q s ut fiant pil No 80
Dosis 2—6 Stück pro die

Pilulae aloëticae DIXTERICH.

Rp Extracti Aloës 15,0
Spiritus saponati q s
M fiant pil No 100
Mit Pulvis Liquiritiæ zu bestreuen.

Pilulae aloëticae (Holv.)

Aloëpillen Pilules d'aloës.

Rp Aloës 10,0
Sapon medicat. 1,0
Glycerini gtt. X
pil No 100

Pilulae aloëticae ferratae (Germ III)

Pilulae Italicae nigrae Rothebacken-
pillen Eisenhaltige Aloëpillen Italic-
nische Pillen **Pilules d'Aloës et de fer**
Pills of Aloës and Iron

Rp Ferri sulfurici sicc
Aloës pulv æq 5,0

Spiritus saponati q s ut fiant pilulae No 100
Durch Uebersehen mit Aloëktinktur glänzend zu
machen Die Masse wird am besten in einem
gehind erwärmten Mörser in nicht zu grosser
Menge angestossen und der Zusatz von heifen-
spiritus recht sparsam bemessen, da sonst die
ferrigen Pillen leicht eckig werden Vor dem
Behandeln mit Aloëktinktur trocknet man die
Pillen mehrere Tage bei Zimmerwärme Dosis
3—8 Stück

Pilulae aloëticae ferratae (Holv.)

Rp Aloës 5,0
Ferr sulf sicc 5,0
Sapon medicat 1,0
Glycerini gtt. XV
t pil No 100

Pilulae anethinae
des Münchener Apothekervereins

Rp Aloës 5,0
Fructus Colocynthis 5,0
Resinae Scammon 5,0
Resinae Jalapæ 8,75
Extracti Verat. 2,5
Mucilaginis Gummi q s ut fiant pil No 180

Pilulae antasthmaticae HENR

Rp Rad Ipecacuanhæ pulv. 0,06
Extracti Aloës Acidisulfurici correct 4,0
Olei Menthae pipertinae gtt. VII M fiant pil
No 30
Mit Pulvis Liquiritiæ zu bestreuen und in Gläsern
zu dispensiren Dosis Frñh und abends 11 Kille

Pilulae ante cibum (Gall)

Pilulae longae vitae **Pilulae vitae** Bolzer
Leib- und Magenpillen Suppenpillen,
Lebenspillen Vatikanpillen **Pilulae**
gourmandes **Grains de vie (MUSARD)**

Rp Aloës 10,0
Extracti Chinae 5,0
Corticis Cinnamomi 2,0
Sirupi corticis Aurantii 5,0
M fiant pilul No 100

Dosis I 1—2 Pillen Dosis II als Abführmittel.
3—5—8 Pillen.

Pilulae anthypochondriacae HOMOLLE

Rp Extracti Aloës 2,0
Chini sulfurici 2,0
Extracti Valerianæ q s ut fiant pil No 40
Dosis 1—4 Stück pro die.

Pilulae antichloroticae MARSHALL HALL.

Rp Ferri sulfurici cryst 5,0
Aloës 5,0
M t pil No 50
Dosis 2—3 Stück vor der Mittags- und Abend-
mahlzeit.

Pilulae antidiabeticæ HUCHAN

Pilulae de tribus
Rp Aloës 5,0
Rhizom Rhei 5,0
Saponis mediant 5,0
Spiritus saponati q s
M fiant pil No 100
Dosis 5—8 Stück pro die.

Pilulae aperitivae STRAUß
Pilulae aperitivae STRAUß'sche Pillen
 Rp Extract Aloë 6,0
 Extract Rhei compositi 3,5
 Extracti Colocythidis compositi 1,5
 Ferri pulv 1,5

M fiant pil No 100
 Dosis 1—3 Pillen Es ist zweckmäßig, die angestossene Masse vor dem Ausrollen bei Seite zu stellen

Pilulae Angustini
 Rp Aloë 35,0
 Rhizom Rhei 3,0
 Resinae Scammoniae 1,0
 Colocythidis praeparat 1,0
 Tubera Jalapae 1,0
 Myrrhae 1,0

M fiant pilulae No 800
 Nicht zu bestreuen, sondern mit Aether zu befeuchten Dosis Bei hartnäckiger Verstopfung 1—4 Stück

Pilulae balsamicae WOLFF
 Rp Saponis medicati 6,0
 Torbenthinae coctae 8,0
 Resinae Jalapae 2,5
 Extracti Aloë 2,5
 Extracti Centaurii 2,5
 Extracti Gentianae 2,5

M fiant pil No 150
 Dosis 8—10 Stück 3 Mal pro die

Pilulae benedictae FULLER
 Rp Aloë 10,0
 Asae foetidae 7,5
 Ferri sulfurici crast 15,0
 Croci 1,25
 Mucidis 1,25
 Olei Sacchi resicla 1,5

Sirapi simplicis q s ut fiant pilul No 800
 Dosis Abends 4—8 Stück

Pilulae Bremaenses TOMLINSON
 Rp Kali sulfurat 0,3
 Sacci Simarubae 5,0
 Extr Aloë alkali 2,5
 Extr Angostur 2,0
 Saponis 0,5
 Rhizom Rhei q s
 ut f pil pond 0,12

Bei Hämorrhoidaliden

Pilulae carminativae BARTHES
 Rp Asae foetidae 2,5
 Aloë 1,5
 Ferri sulfurici crast 1,5
 Rhizom Zingiberis 1,5

Eluxir Proprietatis q s ut fiant pilul No 60

Pilulae contra obstructions STRAUß
STRAUß'sche Hauspillen

Diese Pillen werden in 6 verschiedenen Zusammensetzungen angefertigt, die Stärke steigt mit der No

Rp	No	0	I	II	III	IV
Extracti Colocythidis	—	—	—	—	0,8	2,5
Extracti Aloë	—	4,0	2,0	5,0	2,5	—
Resinae Scammoniae	—	—	—	—	—	2,0
Extracti Rhei	6,0	2,5	4,0	—	—	—
Saponis medicati	6,0	—	—	—	—	—
Rhizom Rhei	6,0	4,0	—	5,0	2,0	—
Extracti Rhei compositi	—	8,0	8,0	10,0	5,0	—
Foliorum Sennae pulv	—	—	4,0	—	—	—
Bismuthi subnitrici	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	—
Rad Ipecac pulv	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	—

In jedem Falle werden 120 Pillen geformt und mit Veilchenwurzpulver bestreut

Besondere Verschrift des Münchener Apotheker-Vereins für STRAUß'sche Hauspillen

Rp Extract Rhei compositi 7,5
 Extracti Aloë 4,0
 Extracti nucis vomicae 0,5
 Rhizom Rhei 4,0
 M fiant pilul No 120

Pilulae digestivae URBANUS
URBANUS-Pillen

Rp Aloë 15,0
 Fungi Larinae 0,05
 Rhizom Rhei 4,5
 Foliorum Sennae pulverat 2,5
 Fructus Cardamomi pulv 0,1
 Croci 0,1
 Fructus Cubebae 0,1
 Cortex Cinnamon 0,1
 Fructus Pimentae 0,1
 Mastiches 0,1
 Myrrae 0,1
 Nucis moschatae 0,1
 Mannae calabriniae 2,5

M fiant pilul No 100

Pilulae drasticae PETEL
PETEL-Pillen

Rp Aloë 1,0
 Tubera Jalapae 1,0
 Resinae Scammoniae 1,0
 Quili 1,0
 Hydragrysi chlorati 0,5
 M fiant pilul No 25

Pilulae cocoprotivae PIESCHAST

Rp Extracti Aloë 1,5
 Chinini sulfurici 1,5
 M fiant pilul No 25

Dosis 2—4 Pillen bei mangelhafter Gallenthätigkeit

Pilulae emmenagogae WALDENBURG und SIMON

Rp Extracti Aloë 2,5
 Aramoni chlorati ferrati 2,5
 Summitat Sabinae 2,5
 Extracti Senogae 4,0

M fiant pilul No 80

Dosis 3 Mal täglich 2—5 Stück

Pilulae emmenagogae BOUCHARDAT

Rp Massae pilularum ante cibum 10,0
 Massae pilularum Valerit 10,0

M fiant pilulae No 100

Dosis Täglich 2—10 Pillen

Pilulae emmenagogae EIGHTON

Rp Aloë 5,0
 Myrrae 5,0
 Croci 5,0

Extracti Aurantii q s ut fiant pilulae No 150
 Mit Pulvis Croci zu bestreuen Dosis Morgens und Abends 5—10 Stück

Pilulae imperiales DISTENFON
Kaiserpillen

Rp Resinae Jalapae 4,0
 Aloë 4,0
 Hydragrysi chlorati 3,0
 Extracti Colocythidis 1,0
 Saponis medicati 2,0
 Extracti Gentianae 1,0
 M fiant pilulae No 100

Pilulae laxativae DAVIS

Rp Extracti Aloë 5,0
 Ferri sulfurici crast 2,0
 Extracti Hyoscyami 5,0
 Extracti nucis vomicae spirituos 0,5

M fiant pilul No 100

Dosis Morgens und Abends 1 Pille

Pilulae laxantes

Abführpillen, Blutreinigungspillen, Hämorrhoidalpillen, Hauspillen, Kapuzinerpillen, Klosterpillen, Laxirpillen, Lebenspillen, Milchpillen, Mutterpillen, Purgirpillen, Universalpillen *Pilules purgatives*

I Vorschrift nach der Pharm. Austriac und dem Codex medicinal Hamburgens

Rp Aloë pulverat 40,0
Tubera Jalapae 60,0
Saponis medicati 80,0
Fructus Anisi pulv 10,0

M fiant pil No 650

Mit Zinnober bestreut sind obige Pillen die TITTMANN'schen Purgirpillen

II Vorschrift nach HUSEMANN

Rp Aloë 1,2
Rhizom Rhei 2,0
Saponis medicati 2,0

Extracti Taraxaci q s ut fiant pilulae No 80
ConspERGE pulv Rhizom Lidis

III Formulae magistr Berol

Rp Aloë 5,0
Tuber Jalap 2,5
Spiritus saponat q s
ut f pil No 50

Pilulae laxantes fortes (Form Berol)

Rp Extracti Colocyntidis 0,25
Extracti Aloë 2,5
Saponis jalapini 2,5
Spiritus q s, ut fiant pilulae No 50

Pilulae laxantes Kneippi

Pfarrer KNEIPP'sche Abführpillen

Rp Extracti Aloë 4,0
Rhizom Rhei 4,0
Extracti Rhei 1,0
Saponis medicati 1,0
Fructus Juniperi pulv 0,3
Seminis Foenugraeci pulv 0,3
Radix Ebuli 0,3
Fructus Foeniculi pulv 0,3
M fiant pilulae No 60

Pilulae laxantes Helvetiae R BRANDT

RICHARD BRANDT'sche Schweizerpillen.

Rp Extracti Aloë 1,0
Extracti Trifoli 1,0
Extracti Solani palustris 1,5
Extracti Gentianae 1,0
Extracti Achillae moschatae 1,0
Extracti Absinthii 1,0

Pulveris Gentianae et Trifolij q s ut fiant pilulae No 50
So die Original-Vorschrift! Die Untersuchung ergab nur Aloë und Radix Gentianae neben Linctum Trifoli und Extractum Absinthii

Pilulae laxantes majores

Grosse Laxirpillen

Rp Aloë 10,0
Resinae Jalapae 5,0
Tuber Jalapae 5,0
Rhizom Rhei 2,5

Aquae et Glycerini q s ut fiant pilulae No 80

Pilulae laxantes martinae

Pilulae aperientes LEONHARD

Rp Extracti Aloë 5,0
Extracti Myrrhae 2,5
Extracti Rhei compositi 2,5
Ferm oxydati 2,5

M fiant pilulae No 100

Dosis Morgens 1—2 Pillen

Pilulae laxantes MORISON

MORISON'sche Pillen

	schwächere	stärkere
Rp Aloë	5,0	5,0
Resinae Jalapae	5,0	—
Fructus Colocyntidis	5,0	5,0
Tartari depurati	5,0	5,0
Extracti Scillae	—	5,0
Guttl	—	5,0

Tincturae Aloë q s ut fiant pilulae pond 0,25
ConspERGE pulvere Liquiritiae

Pilulae laxantes ROBINSON

Rp Extracti Aloë 5,0
Resinae Scammoniae 1,0
Balsami peruviani 0,5
Olei Carvi 1,0
M fiant pilulae No 26

Pilulae purgativae BOURG

Rp Aloë 1,5
Extracti Rhei 1,5
Extracti nucis vomicae aquosi 1,0
M fiant pilulae No 40

Dosis Abends 1 Pille

Pilulae purgantes HIRM

HIRM'sche Abführpillen

Rp Extracti Aloë acido sulfurico corr 1,0
Tuber Jalapae 1,0
M fiant pilulae No 40

In Gläsern zu dispensiren Dosis Abends 1—2 Pillen

Pilulae purgatives RION

Rp Aloë 5,0
Resinae Jalapae 7,0
Resinae Scammoniae 8,75
Guttl 2,5
Extracti Colocyntidis compositi 2,5
Tartari stibiati 0,3
Saponis medicati 7,5
M fiant pilulae No 260

Pilulae resolventes GAUB

Rp Ammoniaci 10,0
Aloë 5,0
Lauri pulverati 5,0

Sirupi Balsami peruviani q s ut fiant pilulae No 160 Dosis 3 Mal täglich 2—3 Stück

Pilulae sanitatis

Pilulae balsamicae STAHN **Pilulae polychrestae balsamicae** **Pilulae ophthalmicae** **Balsamische Pillen IMMANUEL's Pillen** **FRANK's Pillen** **Grains de santé**

Rp Aloë 15,0
Myrrhae 15,0
Rhizom Rhei 10,0
Pulveris aromatici 5,0

Extracti Absinthii q s ut fiant pilulae à 0,125, obduco argento

Dosis 2—5 Pillen am Vormittag

Pilulae solventes.

Frankfurter Pillen. **Pilulae angélique** **Pilulae de Francfort**

Rp Aloë 5,0
Rhizom Rhei 2,5
Boleti Iarici 1,25
Extracti Fumarinae 2,5
Extracti Miliofolij 2,5

Pulveris foliorum Rosae q s ut fiant pilulae à 0,1, obduco argento Dosis 3 Mal täglich 2—4 Pillen

Pilulae tartareae SCHRÖDER
 Rp Aloë 10,0
 Ammoniac 4,0
 Croci 2,0
 Ferri sulfurici crystall 1,5
 Natrii acetici 3,0
 Extracti Gentianae 2,0
 Tincturae Ferri tartar q s ut fiant pilul. à 0,25
 Dosis 6—10 Pillen pro die bei Verstopfung, Gelbsucht oder Wechseljieber

Pilulae stomachicae
 Silberpillen, Balsamische Magenpillen
 Rp Aloë 10,0
 Extracti Myrrhae 5,0
 Extracti Absinthii 5,0
 Saponis medicati 2,5
 Spiritus saponati gttis X

Rhizom Rhei pulverat q s ut fiant pilul. à 0,125
 obduca argento
 Dosis Mehrmals täglich 2—3 Stöck

Pilulae tonicae DAVID BELL
 Rp Aloë 2,5
 Extracti Hyoscyami 2,5
 Olibani sulfurici 1,25
 Ferri sulfurici crystall 1,0
 M fiant pilul No 60

Dosis Morgens und Abends 1 Pille

Pilulae tonicae
 Appetit- und Magenpillen.

Rp Aloë 5,0
 Chinoidini 15,0
 Acidi tartarici 5,0
 Rhizom Rhei 2,5
 Pulveris aromatici 2,5
 Glycerini q s ut fiant pilulae No 300
 Dosis 2 Mal täglich 3—3—4 Pillen

Pilulae tonicae WYATT
 Rp Ferri chlorati 5,0
 Extracti Mentholi vulg 5,0
 Aloë 5,0
 Asae foetidae 15,0
 M fiant pilul No 250

Pulvis albiticus inspersorius VOOR
 Rp Aloë pulverat 5,0
 Myrrhae pulverat. 5,0
 Carbonis ligni pulv 50,0

Zum Einstreuen in schlaffe, überreichende Wunden und Geschwüre

Species ad longam vitam JERNSE
 JERNSE's oder JERNSE's Testament
 Rp Aloë 120,0
 Radicis Gentianae 120,0
 Rhizom Zingiberis 20,0
 Myrrhae 20,0
 Natrii carbonici alci 50,0
 Pullginis 30,0

Die fein gepulverten oder geschnittenen Bestandteile werden nach dem Mischen mit Spiritus bepresst und nochmals gemischt

Species laxantes KNEIPP
 Pfarrer KNEIPP's Wühlhuberthee I. u. II
 I Rp Aloë 8,0
 Seminis Faenugraeci 8,0
 Fructus Foeniculi 25,0
 Fructus Juniperi 25,0

II Rp Aloë 8,0
 Seminis Faenugraeci 8,0
 Fructus Foeniculi 12,0
 Fructus Juniperi 18,0
 Radicis Ebuli 18,0

Fein gepulvert und zu Pillen à 0,1 g geformt, liefern obige Mischungen die KNEIPP's Wühlhuber-Pillen

Handb d pharm Praxis I

Species Hierae pierae Rhasis

Heiligenbitter

Rp Aloë pulverat 45,0
 Rhizom Zedoariae 3,0
 Radicis Asari 3,0
 Corticis Cinnamomi 3,0
 Florum Lavandulae 3,0
 Mastichos 3,0
 Macidis 3,0
 Croci 3,0
 Fructus Cubebae 3,0
 Florum Rosae 3,0

M ut fiat species

Wird auch viel zum Ansetzen von Magenbitter benutzt

Heiligenbitter (Form Hannover)

Rp Sulfuris depurat 20,0
 Aloë 15,0
 Myrrhae 15,0
 Croci 0,5

Species Madagascarienses

Rp Rad Angelicae 30,0
 Radicis Gentianae 30,0
 Rhizom Calami 30,0
 Rhizom Zingiberis 30,0
 Corticis Aurantii 30,0
 Herbae Cardui benedicti 60,0
 Herbae Absinthii 60,0
 Foliorum Menthae crispae 60,0
 Florum Tanacetuli vulg 60,0
 Asae foetidae 15,0
 Jernse Testament (vide dieses) 15,0
 Camphorae 10,0
 Aloë 30,0
 Kalii carbonici 30,0
 Bulbi Allii Cepae 5,0

Gepulvert oder zerschnitten zur Species

Spiritus Gari

Alcoolas de Garus
 Rp Aloë 5,0
 Myrrhae 2,0
 Caryophylli 5,0
 Sem Myristic 10,0
 Cort Cinnam Ceyl 20,0
 Croci 5,0
 Alcohol (20%) 500,0

Macera per 4 dies, filtra, adde Aq 1000,0 et destilla ex balneo aquae 4,5 kg

Suppositorium Aloë

Rp Aloë sub pulv 0,5
 Butyri Cacao 4,5

Lanolin, q s ut fiat suppositorium No I

Tinctura Aloë dulcificata

Tinctura Aloë cum Liquiritia Versüßte Blutreinigungstropfen

Rp Aloë 15,0
 Succ Liquiritiae depurat 30,0
 Aquae destillatae 250,0
 Spiritus 100,0

Einige Tage digeriren, filtriren Dosis 1—2 Mal täglich 2 Theelöffel

Tinctura Aloë mastichinata.

Salezar-Balsam

Rp Aloë 3,0
 Olibani 5,0
 Mastichos 8,0
 Colophonii 1,5
 Spiritus 180,0

Nach der Lösung zu filtriren Bei eiternden Wunden

Tinctura Aloës et Myrrhae (U-St)
Tincture of Aloes and Myrrh

Rp Aloës purif.	100,0
Myrrhae pulverat.	100,0
Rad. Liquiritiae pulv.	100,0
Spiritus (94%)	750 com
Aquae	250 com

Im Verdünnungsapparat behandelt, so dass 1000 com Tinctur resultiren

Tinctura antifebrilis WARBURG
Warburg's Fiebertropfen DIERCKHOFF

Rp Aloës pulv.	50,0
Rhizom Zedoariae	30,0
Radix Angelicae	2,5
Croc.	2,5
Camphorae	0,8
Spiritus (90%)	1000,0

8 Tage maceriren, dann filtriren und zusetzen
 Chinin sulfurici 1,5

Tinctura laxativa venalis
Laxirtropfen, Schwarze Blutreinigungstropfen

Rp Aloës	60,0
Succi Liquiritiae	10,0
Natrii carbonici cryst.	10,0
Syrupi communis	100,0
Aquae fervidae	300,0

Nach der Lösung fügt man folgende Mischung zu

Olel Anisi	2,0
Olel Carvi	2,0
Tincturae aromaticae	2,0
Spiritus	1000,0

Dosis Morgens 15—20,0 g zu nehmen

Unguentum vermifugum
Wurmsalbe

Aloës	5,0
Fellis taurinis spissat	5,0
Spiritus diluti	5,0

werden nach der Lösung verrieben mit

Adipsi sulci	45,0
Olel Petrae	5,0

Wird um die Nabelgegend eingerieben.

Vinum Aloës

Rp Extracti Aloës	10,0
Vini Xerensis	375,0
Tincturae aromaticae	20,0

Vinum Aloës compositum BEAULX

Rp Aloës	1,5
Myrrhae	1,5
Croc.	1,5
Kali carbonici	1,5
Ammonii chlorati	1,2

werden als Pulver mit:

Vini albi	100,0
-----------	-------

8 Tage macerirt, dann filtrirt. Dosis: Morgens einen Theelöffel voll

Vet. Bolus aloëticus
Aloëpille, Kollipille, Physics

Rp Aloës grosso modo pulverat	30—40 g
Saponis viridis q s	

Dosis Auf einmal zu geben.

Vet. Boll contra vermes

Wurmpillen (nach DIERCKHOFF)

Rp Olel animal foetid	50,0
Olel Terebinthinae	50,0
Aloës grosso modo pulverat	30,0
Saponis domestici	20,0
Farinae Secalis q s	
ut fiant boli No IV	

Dosis 2 Tage nacheinander morgens und abends eine Pille

Vet. Bolus laxativus foetilis

Rp Aloës	30,0
Ferri sulfurici cryst	5,0
Olel Ciconiae	gts 2
Farinae Secalis	5,0

Syrupi communis q s ut fiat bolus No I
 Starke Abführpille für ein grosses Pferd

Vet. Bolus laxativus major

Laxirpille für Pferde und Rinder

Rp Aloës	30,0
Ferri sulfurici cryst	3,0
Radix Liquiritiae pulverat	3,0
Tragacanthae	3,0

Glycerini q s

Dosis Mit Oleum Lini bestrichen auf einmal zu geben

Vet. Bolus laxativus minor

Kleine Laxirpille für jüngere Pferde und Rinder

Rp Aloës	20,0
Ferri sulfurici cryst	2,0
Radix Liquiritiae pulverat	2,0
Tragacanthae	2,0

Glycerini q s

Dosis Auf einmal mit Oleum Lini bestrichen zu geben

Vet. Plectanum anticolicum

Koliklatwerge (nach DIERCKHOFF)

a) bei Wind- oder Krampfcolik

Rp Camphorae tinctae	10,0
Aloës pulverat	20,0
Fructus Carvi	50,0
Amygdalarum amararum	30,0
Fructus Juniperi	50,0
Saponis domestici	20,0
Natrii sulfurici cristall	300,0
Aquae q s ut fiat electuarium	

Dosis Stündlich ein Drittel

b) bei Krampfcolik

Rp Aloës pulverat	20,0
Asae foetidae	20,0
Amygdalarum amararum	30,0
Florum Chamomillae	50,0
Magnesi sulfurici cryst	300,0
Farinae Secalis	50,0
Aquae q s ut fiat electuarium	

Dosis Auf einmal zu geben

Vet. Electuarium derivativum

Für Pferde und Rinder

Rp Natrii nitrid	100,0
Natrii sulfurici	250,0
Aloës	30,0
Fructus Foeniculi	50,0
Farinae Secalis	50,0
Aquae q s ut fiat electuarium	

Vet. Electuarium purgativum

Abführende Latwerge (nach DIERCKHOFF)

Rp Aloës	20,0
Natrii sulfurici sicc	100,0
Seminis Lini pulverat	50,0
Saponis viridis	20,0
Syrupi communis q s	

Dosis: 2stündlich die Hälfte zu geben

Vet. Electuarium stomachicum

für Rinder und Pferde

Rp Aloës	30,0
Ferri sulfurici cryst	10,0
Natrii nitrid	100,0
Rhizom Calami	100,0
Fructus Foeniculi	100,0
Farinae Secalis	50,0
Aquae q s ut fiat electuarium	

Dosis 4stündlich hüferröthig zu geben bei schlechter Verdauung, Colik u s w

Vet Flvir anticellulom Lædas

Rp Tincturæ Aloës	100,0
Tincturæ Opii	20,0
Tincturæ corticis Aurantii	50,0
Tincturæ Gentianæ	50,0
Tincturæ Itheriacæ	50,0
Spiritus (80 Proo)	100,0
Aquæ	500,0

Man digerirt einen Tag, filtrirt und fügt dann zu
Aetheris 50,0

Dosis 100—120 g mit Wasser oder Bier bei Kolik
des Pferde, auch zur Beförderung der Geburt
und Nachgeburt bei Fäuden und Rindern

Latwörze gegen Kreuzkähme der Rinder

Vet Rp Aloës	40,0
Morum Arnicæ	50,0
Rhizom Aulicæ	50,0
Rhizom Tormentillæ	50,0
Nucis vomica	15,0
Radix Althææ	20,0
Aquæ q s ut fiat electuarium	

Dosis Täglich 3mal halbeaueigross einzugeben, da-
neben sind Fimichungen mit Kampferpulment
und Serpentinöl vorzunehmen

**Vet Linimentum contra pestem exungulantem
Klauenseuche-Liniment.**

Rp Aloës	500,0
Aquæ	450,0

werden im Wasserbade gelöst, dazu
Spiritus 550,0

und hierzu unter beständigem Umrühren
Acid sulfuricæ aniglei 300,0

Zum Bepinseln der wunden Stellen bei Klauen-
suche

**Vet Pillule laxantes pro canibus
Hundepillen (nach DIERICH)**

a) Rp Natii sulfurici stiel	20,0
Saponis domestici	10,0
Aloës	10,0

Succ Junip iness q s ut fiat pilul No X
Dosis 3—5 Tage lang täglich eine Pille

b) Rp Aloës	4,0
Gummi arabic	4,0
Natii nitrici	1,0

Saponis viridis q s ut fiat pilulæ No VIII
Dosis Täglich 3 Pillen, bei Staupen

c) Rp Aloës 4,0

Saponis viridis q s ut fiat pilulæ No I

Dosis 1 Pille 2 Stunden vor und nach dem Futter,
bei Verstopfung

Vet Potus purgativus

Purgitränk für Pferde und Rinder

Rp Aloës pulv	50,0
Magnesi sulfurici	50,0
Fructus Anisi	20,0
Aquæ fervidae	300,0

Dosis Auf einmal einzugliessen

**Vet Potus antilepticus
(nach DIERICH)**

Tränk gegen Gelbsucht der Rinder

Rp Aloës grosso modo pulverat.	50,0
Rhizom Kbel	50,0
Tartari crudi	100,0
Rhizom Calami	100,0
Natrii sulfurici	100,0

Dosis 3 mal täglich einen Esslöffel voll in einem
Liter Wachholderbeerenaufguss zu geben

Vet Pulveres laxantes

Pulver gegen Verstopfung der Rinder

a) Rp Stibii sulfurici nigri	12,0
Tartari crudi	25,0
Aloës	30,0
Natrii sulfurici	500,0

Dosis 3stündlich den vierten Teil in Kamillenthee

b) Rp Aloës	50,0
Placent seminis Lini pulverat	70,0
Natrii sulfurici	750,0

Dosis In 1 Liter heissem Wasser zu lösen und
kalt einzugliessen

c) Rp Aloës pulverat	20,0
Olei Lini	500,0

Dosis: Erwärmt auf einmal einzugliessen

d) für ein Kalb

Rp Aloës pulverat	10,0
Tartari natronati	50,0
Placent sem Lini pulv	10,0

Dosis In einem Viertel Liter warmen Wassers auf
einmal einzugeben

Geheimmittel.

Abolitionstropfen von ALBIN ESRA, gegen Magenkrampf, enthält Lebenselixir,
Pomegranzenkinktur, Mynsachts-Elixir, Opiumkinktur

Alpenkräuter-Magenbitter von HAUER Ein Gemisch von Anisöl, Nelkenöl,
Aloë, Weingeist, Wasser

Alpenkräuter-Tränk von N K BACKE Tinktur aus Aloë, Rhabarber, Enzian
und Gewürznelken

Arndts Kolikmittel für Pferde a) Pillen aus Aloë und Schmierseife b) Mix-
tur aus Chloralhydrat 50,0, Wasser 100,0, Aetherweingeist 20,0 mit Chlorophyll gefärbt

AUDIN-ROUVIERE'S Tonipurgatif Tinktur aus Aloë, Jalapenknollen, Rhabarber,
Wermuth

Augenwasser von BRUN Eine Auflösung von Aloë in Weisswein und Rosen-
wasser, mit Safran gefärbt

Blutreinigungspillen, BURKESPAHN'S, bestehen aus Aloë, Rhabarber und Enzian-
extrakt

Blutreinigungspillen, MAAS' Muskauer, enthalten Aloë, Senna, Enzian,
Stärke und Bindemittel

Brama-Livs-Elixir (Gesundheitsstafelbitter) aus Kopenhagen, soll aus Aloë und
Weingeist bestehen

Coelestiner Tropfen von BRADY in Gruttau Tinktur aus Aloë, Ingwer, Rha-
barber, Eisen, Zucker

Constitution-Balls, vegetabilische, von BOLDT, harte Stücke, aus Aloë und
Enzian zusammengesetzt

DEHAUT's Pillen Pilules de DEHAUT, mit Süssholz bestreute Pillen aus Aloë, Gutta, Jalapenknollen, Löwenzahnextrakt — Nach HAHN und HOLFERT aus Aloë, Koloquinten, Scammonum, Nelkenöl, Honig Diese Pillen sind mit Zucker überzogen und mit dem Namen des Verfertigers bedruckt

Dixon's gallabführende Pillen Aloë, Scammonum, Rhabarber, Brechweinstein, Enzianextrakt

Dog-Balls, Hundepillen von BOLDT, bestehen aus Aloë und Enzian

Elixir of life bitter von JACOB WOLFF Ein Branntwein, der aus Aloë, Zimmt, Kalmus, Angelikawurzel, Safran, Zuckerfarbe und Glycerin bereitet ist

Englische Pferdepillen (Physics), bestehen aus Barbados-Aloë, Seife, Ingwer und Kümmelöl Eine andere Vorschrift für Physics balls lautet Barbados Aloë, Glycerin, Ricinusöl, Ingwer

Essig-Bitter (Nordamerika), eine weingeistige Tinktur, welche Aloë, Glaubersalz, Gummi, Guajak, Essigsäure, Kohlensäure, Anisöl enthält

Female pills, HOOPER'S Enthalten Aloëharz, Eisenvitriol, Myrrhe, Nieswurzel-extrakt, Seife, weissen Zimmt

Flusstinktur, SULZBERGER's allgemeine, enthält Aloë mit bitteren und gewürzigen Stoffen

Gesundheits-Liqueur, von PAVEL & Co in Berlin, enthält die Bestandtheile der Tinct Aloë comp, statt Aloë aber Rhabarber nebst Zucker

Grains de santé, FRANK, sind versilberte Pillen aus Aloë und Lakritzen

Hämorrhoidentod (Alpenkrauter Liqueur), von Dr FARTZ, enthält Gutta, Aloë, Rhabarber, Enzian, Zimmt, Zucker

Hamburger Tropfen, ein Theil der Dr KÖNIG'schen Familien-Medicinen, ist eine verstärkte Tinctura Aloë composita

Holländisches Wurmol, wird durch trockene Destillation aus Aloë, Myrrhe, Weihrauch und Olivöl hergestellt

Kaisertropfen, von HERZIG, weingeistige Tinktur aus Aloë, Safran, Galgant u s w Kalwe ist die volksthümliche Bezeichnung für eine Mischung von Aloë und Kalmus zu gleichen Theilen

Kräutermittel, LE ROR's oder LEBROR's, von GERMANN in Braunschweig I Kräuterpulver Mit Fuchsin gefärbtes Natriumbikarbonat — II Kräuterthee Eine Mischung aus Schafgarbenblüthen, Sennesblätter, Faulbaumrinde, Huflattig, Stiefmütterchen, Wallnussblätter, Eibischwurzel, Quecken, Süssholz, Tausendguldentrunk, Klatschrosen, Wollblumen — III Kräuterpillen Enthalten Aloë, Enzianextrakt, Rhabarber, Sennesblätter

Krauter-Liqueur von DAUBITZ in Berlin Ein verdünntes, mit Zucker versetztes Lebenselixir, das noch Essigäther, aromatische Tinktur und das Lösliehe aus Anis, Fenchel, Pfefferminze, Faulbaumrinde enthält

Kräuter-Magenbitter-Elixir von KRAUZE Enthält Anisöl, Aloë, Rhabarber, 11 verdünntem Weingeist

Lebensbalsam, Dr ROSA's aus Prag,

Lebensbitter, von HELLMICH,

Lebensessenz, von KIESOW,

Lebensessenz, Schwedische,

Lebensessenz, TREFFENSCHWEDT's, sind sämmtlich dem Elixir ad longam vitam ähnliche Zubereitungen

Lebensessenz, Dr FERNST's, von C Lück in Kolberg, wird aus Aloë 75,0, Rhabarber 120,0, Wurzelsamen 75,0, Ammoniacum 65,0, Lärchenschwamm 65,0, Theriak 80,0, Enzian 85,0, Safran 7,5 durch Ausziehen mit 1500,0 Weingeist bereitet, die Schlußsageit dann mit Wasser auf 30 Vol-Proc Weingeist verdünnt

Lebensessenz der Königsseeer Oeltäthändler wird in 3 Arten bereitet I Gewöhnliche Lebensessenz entspricht der Tinctura Aloë composita, versetzt mit weissen Sirup — II Lebensessenz mit Kampher — III Feine Lebensessenz enthält neben Rum die Bestandtheile von I in anderen Verhältnissen

Magen- und Lebensessenz von SACHS in Magdeburg enthält 10 Th. Aloë in 100 Theilen

Magentropfen, Mariazeller von CARL BRADY in Kremsier. Die angegebene Urvorschrift lautet Königsseeharinde 15,0, Zimmt, Pimpinellrinde, Weidenrinde, Fenchel, Myrrhe, rothes Sandelholz, Kalmus, Zitwerwurzel, Enzian, Rhabarber, von jedem 1,75, Weingeist von 60 Proc 750,0

Vorschrift der Budapester Apotheker Aloë 5,0, Benzöl 8,0, Kalmus 10,0, Enzian 10,0, Rhabarber 10,0, Zitwerwurzel 10,0, Anis 10,0, Fenchel 10,0, Weingeist (60proc) 600,0

Menschenfreund, Magenelixir von SROUGHTON Besteht aus einem weingeistigen Auszuge aus Wermuth, Pomeranzenschalen, Enzian, Rhabarber, Kascarrillrinde und Aloë.

Miraculo-Pillen des Dr MÜLLER, sind Pillen aus Aloë und Enzianwurzel.

MORISON's Limonadenpulver zur Unterhaltung der Pillenwirkung (vgl. S. 224)
Weinstein 30,0, Weinsäure 3,0, Zimmt 0,75, Ingwer 0,25, Zucker 100,0

Pillen, analeptische, von R. JAMES, enthalten Aloë, Safran, Myrrhe, Ammoniacum u. s. w.

Pillen, blutreinigende, von MÖNNICK, bestehen aus Leberaloe, Calomel, Guttä, Scammonium, Jalapenharz, Safran, Koloquintenextrakt

Pillen von HOLLOWAY Die Bestandtheile sind Aloë, Rhabarber, Zimmt, Kardamomen, Ingwer, Safran, Glaubersalz, Kaliumsulfat und Rosenkonserve

Pillen des Apothekers SCHRADER in Feuerbach bestehen aus Aloë und Seife

Pilules de BARRIER — Grains de vie OLÉRAMBOURG — Pilules de M^{re} DE CHESIGNY — Pilules vespérales indiennes stomachiques DE DELAOROIX — Pilules DE DUCHESNE, sind französ. Geheimmittel, welche mit den Pilulas ante cibum übereinstimmen

Pilulae Halenses contra obstructiones, Hallische Obstructionspillen, bestehen aus Aloë 2 Th, Eisenpulver 1 Th und zusammengesetztem Rhabarberextrakt 4 Th

RADOLFF's Elixir, ist ein weingeistiger Auszug aus Aloë, Rhabarber, Zimmt, Zitwer, Cochenille, Kreuzdornbeeren

Reinigungspillen, SEIFFERT's Die wesentlichen Bestandtheile sind Aloë, Fenchel und Lakritzen

RYMER's Cordialtinktur ist eine Tinktur aus Aloë, Rhabarber, Kardamomen, Kampher, spanischem Pfeffer, Biebergeil, verdünntem Weingeist und wenig Schwefelsäure
Schweizer Pillen, verbesserte von A. BRANDT, sollen enthalten Cascara Sagradaextrakt, Aloë, Enzian, Cocaextrakt, Faulbaumextrakt, medicinische Seife, Sandelöl

SHILLER's Heilmittel ist Aloë und wenige Rhabarbertinktur

Socotrin OTTO's, Tierheilmittel gegen Kolik, besteht aus Aloëtinktur und ätherischer Baldriantinktur

Urbanuspillen, bestehen aus Dill, Fiment, Anis, Zitwerwurzel, Macis, Muskatnuss, Nelken, Cubeben, Rhabarber, Aloë, Senna, Manna

WALKER's Safe Pills, sind Pillen aus Aloë, medicinischer Seife, Eibisch und Lakritzen

WEIKARD'sche Pillen sind zusammengesetzt aus Aloe, Eisenpulver, Calomel, Goldschwefel und Sadebaumöl

WEROHAU'sche Pillen sind übersilberte Pillen aus Aloë, Mastix und Lärchenschwamm

Wiener Balsam, LEBETVET's Lebensbalsam, ist ein Elixir ad longam vitam mit Myrrhen- und Guajakalktur versetzt

Wiener Balsam, der Königsberger Oelthändler Myrrhe 200,0, Rhabarber 300,0, Benzoe und Leberaloe je 125,0, Lakritzensaft und Weihrauch je 60,0, Socotra-Aloë 15,0 werden mit 4 Liter Weingeist ausgezogen und filtrirt

WUNDERM'sche Kräuter (aus Braunschweig), sind eine grobe Pulvermischung aus Aloë, Rhabarber, Bittersalz und Thymian

† **Aloinum. Aloin (U-St.)** Der krystallisirende Bitterstoff der Aloe Je nach der Aloësorte, aus welcher er gewonnen wird, und nach dem chemischen Verhalten unterscheidet man Barbaloïn, Socaloïn, Nataloïn, Capaloïn

Barbaloïn. $C_{10}H_{16}O_7 + 3H_2O$ Man löst 1 Th Barbados-Aloë in 10 Th siedenden Wassers, welches mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert ist. Die erkaltete Lösung wird filtrirt und auf 2 Th eingedampft. Die in der Kälte ausgeschiedenen Krystalle werden abgesaugt und aus heissem verdünntem Alkohol umkrystallirt — Gelbe bis braune, geruchlose Nadeln, von sehr bitterem Geschmack, löslich in 60 Th Wasser oder 20 Th Alkohol oder 470 Th Aether. Schmilzt wasserfrei bei 147° C. Ist wahrscheinlich identisch mit Curaçaloïn

Socaloïn (β -Barbaloïn) $C_{14}H_{22}O_{15} + 5H_2O$ Man zerreibt Zanzibar-Aloë wiederholt mit kaltem Alkohol von 0,960 spec Gew. Den unlöslichen Rückstand krystallisirt man aus siedendem Alkohol von 0,960 spec Gew. um. Gelbe Prismen, löslich in 90 Th Wasser, 80 Th absolutem Alkohol, 9 Th Essigäther oder 380 Th Aether. Ist identisch mit Zanzaloïn

Nataloïn $C_{10}H_{16}O_{15}$ Natal-Aloë wird mit 48° C warmem Alkohol von 0,820 spec Gew zerrieben. Der hinterbleibende, unlösliche Rückstand wird aus siedendem Alkohol umkrystallisirt.

Blassgelbe, rechtwinkelige Tafeln, löslich in 6 Th Spiritus (90 Vol-Proc), oder 280 Th absolutem Alkohol, oder 50 Th Essigäther oder 1250 Th Aether. In Natronlauge löslich. Schmelzp 210° C

Capaloïn. Ist noch nicht in reinem Zustande isolirt, aber dem Socaloïn am ähnlichsten. Für die gegenwärtig im Handel befindlichen und von den Pharmakopöen aufgenommenen Aloine werden folgende Reaktionen angegeben

Die alkoholische Lösung der drei Aloine wird durch Ferrichlorid schmutzig braungrün gefärbt. Ammoniak färbt die alkoholische Lösung des Nataloïns carminroth, diejenige

des Barbaloins und Socaloins braunroth Bringt man etwas Socaloin in einen Tropfen kalter Salpetersäure von 1,2 sp Gew, so findet kaum eine Veränderung statt Barbaloin und Nataloin geben carminrothe Färbung, die bei letzterem sehr beständig ist Löst man etwas Nataloin in konz. Schwefelsäure und führt über die Lösung einen mit rauchender Salpetersäure befeuchteten Glasstab, so färbt sich die Lösung blau Barbaloin und Socaloin verändern sich unter der gleichen Behandlung wenig U-St hat das Barbaloin und Socaloin, Brit nur das Barbaloin als officinell aufgenommen

Man giebt das Aloin zu 0,1—0,2 g als Purgans, zu 0,2—0,5 g als Drasticum Subkutan wird die Lösung in Glycerin (1 5 bis 8) als Purgans angewendet

Althaea.

Althaea officinalis L. Malvaceae — Malveae. Vorwiegend auf Salzboden in einem grossen Theil von Europa und Nord- u Westasien, zum arzneilichen Gebrauch kultiviert in Deutschland, Frankreich, Ungarn und Belgien Arzneiliche Verwendung finden die Wurzel, die Blätter und die Blüten

1) Die Wurzel **Radix Althaeae** (Germ Helv Austr U St) **Radix Bismalvae.** **Radix Hibisci.** **Radix Malvae visci.** — Altheewurzel Eibischwurzel Fliessskrawurzel Gilfwurz. Hellwurz Hilfswurzel. Sammpappelwurzel. Schleimthee Weisses Sussholz Wurzel. Wilde Malvenwurzel. — *Racine d'althée.* *Racine de guimauve* (Gall) — **Marshmallow root.**

Die Droge besteht aus den geschalteten Wurzelästen, die holzige Hauptwurzel wird entfernt Die Stücke sind bis 20 cm lang, bis 1,5 cm dick Der Bruch ist im Holz körnig, in der Rinde faserig Unter der Lupe erkennt man auf dem weissen Querschnitt die strahlige Rinde und das ebenfalls strahlige Holz, beide durch das Cambium von einander getrennt Das Mikroskop lässt in den Baststrahlen der Rinde Gruppen nicht sonderlich dickwandiger Bastfasern erkennen, deren Ende oft gabelig getheilt, deren Wand im Querschnitt meist etwas verbogen und bei denen nur die primäre Membran verholzt ist Das Holz enthält kleine Gruppen von Gefässen mit leiter- oder netzformig verdickten Wänden und Tracheiden Im Parenchym von Holz und Rinde finden sich Schleimzellen, deren Inhalt beim allmählichen Aufquellen in der Droge (in der frischen Wurzel ohne weiteres) deutlich geschichtet erscheint, ferner Zellen mit Calciumoxalat-Drusen und in den übrigen Zellen Stärke Die Stärkekörnchen erreichen eine Grösse von 25 μ , sie sind von ziemlich wechselnder Gestalt, doch walten ei- und nierenförmige oder wurstförmige Formen vor, die meisten haben einen kurzen Längsspalt Um Altheepulver in Gemengen mikroskopisch nachzuweisen, achte man auf diese Stärkekörnchen und auf die Bastfasern der Rinde Letztere sind 400—800 μ lang, 10—30 μ dick, getupfelt Ihre Wand ist, wie oben gesagt, meist unverholzt, doch ist darauf zu achten, dass die Zellen des Faserbündels, welches das Centrum der Wurzel einnimmt, verholzt sind.

Bestandtheile. 37 Proc Stärke, 35 Proc Schleim, der sich mit Jod und Schwefelsäure nur schwach gelb färbt und mit Salpetersäure Schleimsäure giebt, 2 Proc Asparagin (hier zuerst entdeckt und als Althaein bezeichnet), 4—5 Proc Asche

Als **Fermentationen und Verfälschungen** werden die Wurzeln einiger andern Malvaceen genannt, so der *Althaea Narbonensis* Cavanilles und *Althaea rosea* Cav., die holziger und im Querschnitt gelblich sind

Einsammlung und Bearbeitung Die Wurzel wird ausschliesslich von angebauten Pflanzen im Frühling oder im Herbst gegraben, von der holzigen Hauptwurzel, Wurzelfasern und äusseren Rindenschichten befreit, alsdann an der Luft oder bei sehr geringer Wärme getrocknet Aus 5 Theilen frischer Wurzel erhält man etwa 1 Theil geschälte und getrocknete

Zum Schneiden eignet sich besonders ihres hohen Schleimgehalts wegen die bairische, im Spätherbst gegrabene Wurzel Dieselbe wird, lufttrocken, geschnitten, scharf, doch

vorsichtig nachgetrocknet — bei höherer Temperatur tritt leicht gelbliche Färbung ein — und gelangt in fast würfelförmigen, sehr weissen Stücken in den Handel. Das ist die als „electa □ concisa albissima 00“ bezeichnete Waare. Minderwerthige Sorten werden bisweilen durch Bestauben mit Stärke, Kalk oder Gips in ihrem Aussehen aufgebessert, eine derartige unstatthafte Behandlung giebt sich beim Abwaschen der Wurzel leicht durch einen Bodensatz zu erkennen, welcher dann weiter untersucht werden kann mit dem Mikroskop (Stärke) oder durch Uebergossen mit Saure etc. Wurzeln, welche nach längerem Lagern geschnitten werden, liefern oft trübe, wenig schleimige Auszüge —

Die Verarbeitung der Wurzel zu Pulver ist mit etwa 10 Proc Verlust verbunden.

Aufbewahrung Die geschnittene und die grob gepulverte Wurzel wird in Holzkästen, die fein gepulverte in Glashafen aufbewahrt. In jedem Falle sind diese Zerkleinerungsformen vor dem Einfüllen gut nachzutrocknen, da sie sonst grosse Neigung zum Schimmeln oder Dampfigwerden besitzen. Es ist rathsam, in Räumen, die nicht vollständig trocken sind, die Kästen von Altheewurzeln mit Einsätzen aus Weissblech zu versehen.

Anwendung Wegen ihres reichen Schleimgehalts ist die Eibischwurzel als reizmilderndes Mittel sehr beliebt. Der Receptar benutzt Eibischpulver als Bindemittel beim Anstossen von Pillemassen, hierbei ist der Gummischleim durch Zuckersirup oder Glycerin zu ersetzen, wenn anders die Pillen nicht mit der Zeit steinhart und unverdaulich werden sollen. Die vom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene Mischung von Süssholz und Lakritz ist deshalb vorzuziehen.

Feingepulverte Altheewurzel, zu 7 Proc dem gebrannten Gypse zugesetzt, verhindert ein zu schnelles Erhärten des Gypsbreies.

Decoctum und Maceratio Althaeae Im Geltungsbereich des Ph Austr wird ein Decoctum Althaeae, da gegenwärtige Anweisungen fehlen, wie jede andere Abkochung durch halbstündiges Erhitzen im Wasserbade unter jeweiligem Umrühren im Verhältniss 1:20 angefertigt.

Germ bestimmt, dass Eibischwurzel-Abkochung durch halbstündiges Stehenlassen der Wurzel mit kaltem Wasser ohne Umrühren und durch leichtes Abpressen zu bereiten ist. Man pflegt, sobald dieses dem Ermessen des Apothekers anheimgestellt wird, aus 1 Th Rad Althaeae 20 Th Seihflüssigkeit herzustellen, wie es Ph Helvet III für alle schleimreichen Stoffe vorschreibt.

Eibischsauszüge sind nur kurze Zeit haltbar. Frisch bereitet dürfen sie Lackmuspapier nicht verändern.

Sirupus Althaeae (Germ Helv Austr U-St) Sirupus Radicis Althaeae. Altheasirup. Eibischsirup (vollständig auch Brustsaft, Hederichsaft, Huflattichsaft, Lindenblüthensaft, Leinsamensaft, Lochsam, Rangelrosensaft, Schneekensaft, Weisses Hustensaft, Weisses Lungenfuhl) — Sirup de guimauve (Gall) — Syrup of althaea. S of marsh mallow.

Vorschrift des Deutschen Arzneibuches: 2 Th grobgeschnittene Eibischwurzel werden mit Wasser abgewaschen und mit 1 Th Weingeist (90proc) und 50 Th Wasser 3 Stunden bei 15–20° C unter bisweiligem Umrühren stehen gelassen. Aus 40 Th der ohne Pressung erhaltenen Seihflüssigkeit und 60 Th Zucker werden ohne Verzug 100 Th Sirup bereitet. Ein klarer, gelblicher, sehr schleimiger Sirup.

Vorschrift der Pharm Austriaca: 20 Th zerschnittene Eibischwurzel, 300 Th kaltes destillirtes Wasser werden unter öfterem Umrühren zwei Stunden stehen gelassen, ohne auszupressen abgeseiht und in der Seihflüssigkeit von 250 Th 400 Th zerstoßener Zucker unter einmaligem Aufkochen gelöst.

Pharm Hungar lässt aus 16 Th Eibischwurzel, 16 Th verdünntem Weingeist und Wasser 200 Th Seihflüssigkeit herstellen und dieser 340 Th Zucker zusetzen.

Pharm Helvet III: 3 Th gewaschene Eibischwurzel, 1 Th Weingeist, 55 Th Wasser lässt man 2 Stunden stehen, klärt die Seihflüssigkeit durch Aufkochen mit Filtrirpapiermasse, filtrirt, bringt auf 40 Th und löst darin 60 Th Zucker. Der Sirup soll öfters erneuert werden.

Vorschrift der Ph of the U-St: 50 g geschnittene Eibischwurzel werden mit kaltem Wasser gewaschen, mit 400 ccm Wasser, 30 ccm Weingeist (94proc) 1 Stunde lang ausgezogen, in der Seihflüssigkeit werden 700 g Zucker gelöst, 100 ccm Glycerin zugefügt und das Ganze mit Wasser auf 1000 ccm gebracht.

Sirupus concentratus Durch einzelne Fabriken wird ein Sirupus Althaeae decemplex in den Handel gebracht, der durch Verdünnen von Zuckersirup die dem Arzneibuch entsprechende Form geben soll. Eine derartige Mischung ist aus nahelegenden Gründen nicht als vorschriftsmässige Zubereitung zu betrachten. Das gilt für sämtliche sogen „Zehnfachen Säfte“.

2) Die Blätter: Folia Althaeae (Germ Helv Austr) Herba Bismalvae. Hb. Hibisci. Hb. Malvae visci — Altheeblätter. Attigkraut. Elbischkraut Milfkraut. Kinderbettthee. Sammetpappel, Stockwurzkrant. Wildes Pappelkraut. — Feuilles de guimauve (Gall) — Marsh-mallow-leaves. Althaea-leaves.

Die Blätter werden im Sommer von der blühenden Pflanze gesammelt 8 Theile frische Blätter geben 1 Theil trockene Sie sind im Umriss elliptisch bis gerundet dreieckig, 3 bis 5 lappig, am Grunde herz- oder keilförmig, der Rand gekerbt Sie erreichen eine Länge von 12 cm, eine Breite von 10 cm Das Blatt ist durch Sternhaare, wie solche in der Familie der Malvaceen häufig vorkommen, weichfilzig und zwar wildgewachsene in höherem Maasse als kultivirte Das Gewebe des Blattes enthält Schleimzellen und Drüsen von Calerumoxalat Man verwendet meist die Blätter kultivirter Pflanzen Sie kommen aus Franken, Thüringen, auch aus Ungarn und werden vor der Blüthe gesammelt Sie enthalten reichlichen Schleim

3) Die Blüthen Flores Althaeae etc. Althaeablüthe. Fleurs de guimauve (Gall)

Cataplasma maturans (Gall)
Especies emollientes
Rp Foliorum Verbasci 20,0
Foliorum Althaeae 20,0
Foliorum Malvae 20,0
Herbae Parietariae 25,0
werden als grobe Pulver mit Wasser zu einem Brei angerührt, dem man zusetzt
Unguenti basilica 20,0

Liquor pectoralis (Form Beroi)

Rp Liquoris Ammonii anisati 5,0
Sirupi Althaeae 30,0
Aqua destillatae 165,0

Maceratio Althaeae (Form Beroi)

Rp Decocti Althaeae (e 15,0) 170,0
Acidi hydrochlorici (25 %) 1,0
Sirupi Sacchari 20,0

Mixtura Althaeae

Münchener Nosokomialvorschrift

Rp Dec Alth (e 10,0) 130,0
Sirup simpli 20,0

Mixtura Althaeae cum Morphio

Münchener Nosokomialvorschrift.

Rp Dec Alth (e 10,0) 130,0
Morph hydrochlr 0,02
Sirup simpli 20,0

Pasta pectoralis DIETICHON

Rp 1 Specierum pectoralium 20,0
2 Aquae 1500,0
3 Gummi arabica pulv 600,0
4 Albuminis siccl 3,0
5 Chartae bibulatae 5,0
6 Sacchari 400,0
7 Extracti Opil 0,5
8 Aquae Amygdalarum 20,0

Man löst 1 mit 2 während 12 Stunden stehen, prosst aus und löst ohne Erwärmen 3 und 4 darin, fügt 5 und 6 hinzu, kocht unter Absäumen, seigt durch Flaell und dampft bis auf 1800,0 ein, dann fügt man Lösung von 7 in 8 hinzu, dampft ohne Röhren auf 1800,0 ein und giesst in Kapseln aus

Pastilli Althaeae DIETICHON

Trochisci Althaeae Pastilles de guimauve

Rp Radicis Althaeae pulv 75,0
Sacchari pulverati 925,0
Olei Rosae gtt 2
Aqua Rosae q s

Mant pastilli 1000

Pulvis antieatarrhalis

Rp Sem Foenugraeci 25,0
Fruct Foeniculi an 25,0
Ammon chlorati 30,0
Radic Althaeae 100,0

Bei Bronchialkatarrh der Pferde auf weimal in den Kleientrank

Rotulae Althaeae DIETICHON

Rp Sacchari pulverati 95,0
Radicis Althaeae pulv 5,0

Man rührt mit Eibischsirup zum Brei an, fällt diesen in einen Pergament-Darm mit Federpose und formt durch Drücken Tropfen, welche auf Wachsapier gesetzt und in der Wärme ausgetrocknet werden

Sirupus Althaeae compositus

Sirup de Fennel

Rp Sirupi Althaeae
Sirupi Liquiritiae
Sirupi Papaveris 25

Sirupus pectoralis

Brustsaft

Rp Sirupi Liquiritiae 100,0
Sirupi Rhocados 50,0
Sirupi Althaeae 40,0
Sirupi Ipecacuanhae 20,0

Species Althaeae (Austr)

Rp Foliorum Althaeae 1000,0
Radicis Althaeae 500,0
Radicis Liquiritiae 250,0
Florum Malvae 100,0

Species Althaeae KERNEL

Rp Rhizomatis Gramulae
Seminis Melonis
Foliorum Althaeae 25 10,0
Radicis Althaeae
Radicis Liquiritiae 25 20,0
Foliorum Malvae 30,0

Species bechicae.

Husten-Thee

Rp Radicis Althaeae
Radicis Liquiritiae 25 40,0
Foliorum Fumariae
Fructuum Anisi contus 25 10,0

Species emollientes.

Erweichende Kräuter Especies emollientes Herbs of emollient cataplasma

I Germ III

Rp Foliorum Althaeae gr pulv
Foliorum Malvae
Herbae Mollid
Florum Chamomillae
Seminis Linl

II Austr

Rp	Foliorum Althaeae cona	
	Foliorum Malvae "	
	Herbae Meliloti "	aa 100,0
	Semina Lini contusi	200,0

Grob gepulvert giebt diese Mischung die Species emollientes pro cataplasmate

III Helv

Rp	Foliorum Althaeae gr	puly
	Florum Chamomillae "	"
	Foliorum Malvae "	aa 2,0
	Semina Lini contusi	4,0

Species ad Gargarisma

Rp	Foliorum Althaeae	
	Florum Malvae	
	Florum Sambuci	aa

Species pectorales

Species ad infusum pectorale Species Althaeae compositae Species demulcens Brustthee Augsburger Thee Thé pectoral Cough-species Pectoral tea

I Germ

Rp	Radix Althaeae	8,0
	Radix Liquiritiae	8,0
	Rhizomatis Iridis	1,0
	Foliorum Farfarae	4,0
	Florum Verbasci	2,0
	Fructus Anisi contusi	2,0

II Austr

Rp	Foliorum Althaeae	40,0
	Radix Liquiritiae	30,0
	Radix Althaeae	10,0
	Hordei excorticati	10,0
	Florum Verbasci	1,0
	Florum Malvae	1,0
	Florum Rhoeados	1,0
	Fructus Anisi stellati contusi	1,0

III. Helv

Rp	Fructus Foeniculi	5,0
	Florum Tillae	10,0
	Foliorum Malvae	10,0
	Florum Verbasci	10,0
	Radix Liquiritiae	25,0
	Radix Althaeae	10,0

Espèces pectorales avec les fleurs (Gall.)

Rp	Florum Verbasci	
	Florum Rhoeados	
	Florum Althaeae	
	Florum Malvae	
	Florum Guaphali	
	Florum Farfarae	
	Florum Violae odoratae	aa

Species pectorales cum fructibus

Brustthee mit Früchten

I Preussische Arznei-Taxe

Rp	Fructuum Ceratoniae	6,0
	Caricarium	3,0
	Hordei excorticati	4,0
	Specierum pectoralium	15,0

II Strassburger Apotheker-Verein 1854

Rp	Florum Malvae	125,0
	Florum Rhoeados	250,0
	Florum Verbasci	500,0
	Foliorum Melissae	250,0
	Herbae Asperulae	250,0
	Herbae Capuli Veneni	250,0
	Herbae Hederae terrestris	250,0
	Herbae Hyssopi	250,0
	Fructuum Jujubae	500,0
	Passularum majorum	750,0
	Passularum minorum	750,0
	Radix Althaeae	1200,0
	Radix Liquiritiae	1500,0
	Caricarium	2500,0
	Fructuum Ceratoniae	2500,0
	Hordei excorticati	3000,0

Species pectorales albae

Rp	Radix Althaeae	10,0
	Rhizomatis Iridis	5,0
	Fructuum Foeniculi	5,0
	Radix Liquiritiae	10,0

Species pro infantibus Viennenses

Kinderthee, Zweier-Thee DIERCKM.

Rp	Capitulum Papaveris immatur	30
	Radix Liquiritiae	12,0
	Rhizomatis Graminis	25,0
	Radix Althaeae	80,0

Tabulae Althaeae

Eibisch-Tüfelchen

Rp	Radix Althaeae	10,0
	Sacchari albi	90,0

Mit Orangenblüthenwasser zum Teig anrühren, dann ausrollen und in rautenförmige Stücke schneiden

Brustsaft von RUD BUTTNER, ist ein mit Zucker eingekochter Brusttheeaufguss

Brustpastillen von LEONHARD SPERNER, bestehen aus Eibisch und arabischem Gummi

Keuchhustensaft von Apotheker BRENNARD, ist Altheesirup mit einer Abkochung unschuldiger Pflanzenstoffe

Kräuter-Brustsirup von FRIEDR DRETZE Ein Eibischsaftguss, worin brauner Farinzucker gelöst ist

Pâte de guimauve soufflée der WITTE HENAU, ist Pasta gummosa Ph Germ Pâte pectorale balsamique de REGNAULT, wird aus einem Brusttheeaufguss, arabischem Gummi, Zucker, Tolubalsamanktur bereitet

Sirup antiphlogistique de BRIANT enthält einen Auszug aus Brustthee mit Früchten, arabischem Gummi, Leinsamenschleim und Zucker

Sirup pectoral de LAMOUROUX wird nach DORVAULT bereitet aus Kalbslunge, isländischem Moos, Jujuben, Datteln, Lackritz, Lungenmoos, Malvenblüthen, Altheeblüthen, Veilchenblüthen, Kletschrosen, Opiumextrakt, Zucker

Sternthee von PAUL WEIDHAAS in Dresden, ist dem Brustthee ähnlich zusammengesetzt (Karlsruher Ortsges-Rath)

Alumen.

I Alumen (Austr Brit Germ Helv U-St) **Alun de Potasse** (Gall) **Alumen crudum**. **Alaun** **Kali-Alaun** **Alun potassique**. **Potassium Alum**. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{K}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$
 Mol. Gew = 948

Eigenschaften Farblose Krystalle von oktaedrischer oder kubischer Form oder Krystallmassen, durchscheinend, hart, von muscheligem Bruche. In trockener Luft nur an der Oberfläche verwitternd und dann wie bestäubt aussehend (Das Bestäuben kann auch durch Aufnahme von Ammoniak aus der Luft verursacht werden). Geruchlos, der Geschmack ist zuerst süßlich, dann heftig zusammenziehend. Spec Gewicht 1,71. Löslich in 10,5 Th kaltem oder 0,75 Th siedendem Wasser, in Alkohol unlöslich. Die wässrige Lösung reagirt stark sauer. Er schmilzt bei 92° C in seinem Krystallwasser, beim Erhitzen auf 200° C giebt er sammtliches Krystallwasser ab, unter Uebergehen in eine voluminöse, leichte Masse. Bei Weissgluth wird die an Thonerde gebundene Schwefelsäure verflüchtigt, im Rückstande hinterbleiben Thonerde und Kaliumsulfat. Die Zusammensetzung des Alauns ist nach obiger Formel:



Fig. 44.

$\text{Al}_2\text{O}_3 = 10,76\%$, $\text{K}_2\text{O} = 9,92\%$, $\text{SO}_3 = 33,75\%$, $\text{H}_2\text{O} = 45,57\%$.

Handelsorten Die oben angeführten Pharmakopöen schreiben sämmtlich den Kali-Alaun vor. Dieser ist im Handel durchweg in genügender Reinheit anzutreffen. Es ist zweckmässig, für pharmaceutische Zwecke ausdrücklich „eisenfreien Kali-Alaun“ zu bestellen. Ueber andere Alaun-Sorten s. weiter unten.

Prüfung. Spuren von Ammoniak und Eisen wird man fast in jedem Alaun antreffen, nur sollen nicht zu grosse Mengen darin vorhanden sein. Zu prüfen ist ferner auf andere verunreinigende Metalle.

1) Versetzt man eine Lösung von 1 g Alaun in 20 cem Wasser mit einigen Tropfen Ferrocyankaliumlösung, so darf die Flüssigkeit sich innerhalb 5 Minuten nicht blau färben (Eisen). — 2) 10 cem der 5procentigen Lösung werden mit soviel Kali- oder Natronlauge versetzt, dass der entstehende Niederschlag sich völlig wieder auflöst. Es darf alsdann kein Geruch nach Ammoniak auftreten, andernfalls liegt möglicherweise nicht Kali-, sondern Ammoniakalaun vor. — 3) Die sub 2 erhaltene alkalische Lösung wird mit Schwefelammonium versetzt, wodurch sofort eine geringe braunliche Färbung, nicht aber ein Niederschlag entstehen darf, andernfalls sind mehr als Spuren von Eisen, Blei, Kupfer zugegen.

Einen Alaun, welcher erst in 18 Th kaltem Wasser löslich war, fand SALZER etwa 25 Proc Rubidiumalaun enthaltend.

Aufbewahrung, Pulverung Da der Alaun an trockener Luft verwittert, auch Ammoniak aus der Luft aufnimmt, so ist er in gut verschlossenen Glasgefässen aufzubewahren. Das Pulvern hat im Mörser aus Stein (nicht Eisen, Kupfer oder Messing) zu erfolgen. Das fertige Pulver ist kurze Zeit nachzutrocknen.

Anwendung Alaun verbindet sich mit Eiweiss, Leim, Schleim zu unlöslichen Verbindungen, er hebt daher die Fähigkeit dieser Stoffe zu faulen auf und wirkt aus dem gleichen Grunde desinficirend und leicht ätzend. Innerlich in Gaben von 0,05–0,5 g in Pulvern, Pillen oder schleimigen Lösungen (Molken) mehrmals täglich bei Diarrhöen, Dysenterie, Magen- und Darmblutungen. Grosse Gaben können schädlich, ja tödtlich wirken. Aeusserlich zum Aufstreuen auf Wunden, Einblasen in den Kehlkopf, Bestreuen von Tampons für die Vagina in Pulverform entweder unvermischt oder mit 1–2 Th Zucker vermischt. Zu adstringirenden Bädern. Zu Injektionen in die Urethra (1:100), und in die Vagina (1–4:100,0), zu Gurgelwassern (1:100), Inhalationen (0,5–2,0:100), zu Pinselsäften (1–2,0:25,0 Sirup oder Honig), zu Salben 1:10–30 Fett. Unverträglich mit Alaun sind alle Gerbstoff enthaltenden Substanzen (China-Dekokte), Salze des Quecksilbers, Blei's, Carbonate der Alkalien, Brechweinstein.

Technisch Alaun wird in grossen Mengen verwendet in der Weissgerberei, in der Färberei und Herstellung von Lackfarben, weil die Thonerde mit zahlreichen Farb-

stoffen unlösliche, schon gefärbte Verbindungen eingeht. Ferner zum Leimen des Papiere, zum Wasserdichtmachen von Geweben, Harten des Gipses, zur Reinigung von Wasser und Abwasser, als Zusatz zum Brot, um ausgewachsenes Getreide verbäckbar zu machen. Mit Alaunlösung getränkte Zeugstoffe sind schwer entzündbar und schwer verbrennlich.

Alumen neutrale Neutraler Alaun. Fügt man zu einer Lösung von Alaun soviel Alkali (KOH, NaOH oder K_2CO_3 , Na_2CO_3), dass der entstehende Niederschlag sich nicht mehr auflöst, sondern bestehen bleibt, so enthält die Lösung sog. neutralen Alaun, richtiger basisches Aluminiumsulfat $Al_2(SO_4)_3 \cdot Al_2(OH)_6$ neben Kaliumsulfat bez. Natriumsulfat. Eine solche Lösung kann durch Absetzen geklärt werden und ist alsdann eisenfrei. Aus diesem Grunde, und weil saure Alaunlösungen viele Farbennuancen stören, finden solche neutrale Lösungen vielfach Anwendung in der Färberei.

Alumen romanum, seu **cubicum** Römischer oder Würfel-Alaun. Eine Alaun-Lösung, welche nur wenig neutralen Alaun (s. vorher) enthält, giebt durch Verdunsten bei gewöhnlicher Temperatur kubische Krystalle von der namlichen Zusammensetzung wie der oktaëdrische Alaun. Wird die Lösung über $40^\circ C$ erhitzt, so bildet sich gewöhnlicher Alaun und ein Niederschlag $Al_2SO_4(OH)_4 + K_2SO_4$, welcher die Zusammensetzung des Alunits von Tolfa hat.

Alumen concentratum ist = **Aluminium sulfuricum**

II Alumen ustum (Austr. Germ. Helv.) **Alumen exsiccatum** (Brit. U-St.) **Alun desséché** (Gall.) Gebrannter oder entwässelter Alaun. **Alun calciné ou brûlé.** **Burnt Alum.** **Dried Alum.**

Darstellung. Gepulverter, möglichst eisenfreier Alaun wird bei $50^\circ C$ vorgeetrocknet, bis er etwa 80 Proc. Wasser verloren hat. Dann erhitzt man ihn unter Umrühren mit einem Porcellanspatel in einer Porcellanschale auf dem Sandbade, bis alles Krystallwasser entwichen ist. Man erhält alsdann weisse, specifisch leichte Massen, welche erforderlichenfalls zu pulvern sind. Die einzelnen Pharmakopöen schreiben vor:

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U-St.
Lithzung	$180^\circ >$	$204^\circ >$	$240^\circ >$	—	—	—
Wasserabgabe in Proc.	45	45—48	18	—	—	—

Germ. und Helv. geben überhaupt keine Vorschrift, U-St. schreibt keine bestimmte Temperatur vor.

Eigenschaften. Nach Gall. Schwammige weisse Masse, nach Austr. Brit. Germ. Helv. U-St. ein weisses körniges Pulver. Es soll nach allen Pharmakopöen klar in Wasser löslich sein. Als Löslichkeitsverhältniss geben an: U-St. = 1:20, Austr. = 1:25, Gall. = 1:25—30, Germ. und Helv. 1:30. Man beachte, dass es längere Zeit dauert, bis die Auflösung erfolgt. — Die wässrige Lösung reagirt sauer, sie verhält sich genau wie eine solche des gewöhnlichen Alauns.

Prüfung. Lost sich 1 g gebrannter Alaun nach 12—24 Stunden klar in 25—30 Th. Wasser zu einer sauer reagirenden Flüssigkeit auf, so erübrigt sich eine weitere Prüfung. Ist die Lösung neutral, so wurde wahrscheinlich Ammoniak-Alaun der Glüh-Operation unterworfen. Germ. und Helv. schreiben noch vor, dass das Präparat beim mässigen Glühen nicht mehr als 10 Proc. Feuchtigkeit abgeben soll. Auf die übrigen Verunreinigungen (Ammoniak, Eisen) ist wie bei Alumen angegeben zu prüfen.

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefässen (nicht Kasten), da er aus der Luft Feuchtigkeit und Ammoniak aufnimmt. Es empfiehlt sich, ihn in gepulvertem Zustande vorrätig zu halten.

Anwendung. Wegen seiner Eigenschaft, sich langsam in Wasser zu lösen, dient er als allmählich wirkendes styptisches Aetzmittel. In Form des feinen Pulvers bei Blutungen, wunden Brustwarzen, bei sog. wildem Fleisch, in Zahnpulvern, als Augenpulver, Schnupfpulver, zu Einblasungen in Rachen und Kehlkopf.

Gebrannter Alaun, technischer. Die Destillateure benutzen gebrannten Alaun zum Klären der Liqueure. Hierzu ist nicht das vorher beschriebene, sondern ein wirklich durch Brennen hergestelltes Präparat abzugeben. Dieses bildet gleichfalls lockere, poröse Massen (welche ungelöst abgegeben werden), welche sich aber nicht klar in Wasser lösen. Es charakterisirt sich durch einen Gehalt an Thonerde (Al_2O_3). Die klärende Wirkung ist auf den Gehalt an Thonerde, sowie auf die durch die poröse Beschaffenheit des Präparates bedingte Flächenanziehung zurückzuführen. Für gefärbte Flüssigkeiten eignet sich

der gebrannte Alaun wegen der Eigenschaft der Thonerde, sich mit Farbstoffen zu verbinden, nicht

III. Alumen plumosum Asbestos. Amianthus. Asbest. Amianth. Bergflachs. Bergwolle. Federalaun. Federweiss. Ein natürlich vorkommendes Mineral, im wesentlichen aus Magnesiumsilicat bestehend Gerade- oder krummfaserige Massen, welche aus feinen Fasern zusammengesetzt sind Je nach der Länge der Fasern unterscheidet man langfaserigen und kurzfaserigen Asbest Je weniger gefärbt, desto werthvoller sind die Sorten Er ist unschmelzbar in gewöhnlichen Gasflammen, unlöslich in Wasser, Säuren und Alkalien

Anwendung Arzneilich innerlich nur noch als Hausmittel in der Thierarzneipraxis und zwar in Gaben von 15–20 g gegen Satyrnias (Rauschen) der Mast Säue, wofür die kurzfasrige Sorte genügt Aeusserlich als Bausche, welche nach dem Befenchten mit Salpetersäure oder Chromsäure zu Ätzungen Verwendung finden

Die technische Verwendung ist gegenwärtig sehr ausgebreitet Zur Herstellung von Asbestpapier und Asbestpappe, unverbrennlichem Garn, desgl Geweben, als Filtrirmaterial für Säuren und Laugen, in der Analyse zum Füllen der ALAUN'schen Röhren und der Gooch'schen Tiegels Für diesen Zweck ist der Asbest zuvor durch aufeinanderfolgendes Kochen mit Natronlauge, Salpetersäure und Wasser von allen löslichen Bestandtheilen völlig zu befreien

Asbestpapier wird aus faserigem Asbest in der nämlichen Weise hergestellt wie gewöhnliches Papier aus Zellfasern Desgl Asbestpappe Die stärkeren Asbestpappen gewinnt man durch Zusammenpressen mehrerer Lagen Asbestpapier oder dünner Asbestpappe in feuchtem Zustande

Asbestkohle Eine Mischung von 1000 Th Holzkohle, 180 Th Asbest, 60 Th Aetzkalk, 55 Th Calcium- (oder Natrium-)nitrat und 1500 Th Wasser werden zu Briquettes geformt und getrocknet Feuerungsmaterial Die Zweckmässigkeit ist zweifelhaft

Acetum vulnerarium Romanum
Acetum pontificale Pfaffenbalsam
Rp Aluminis 10,0
Natrii chlorati 5,0
Aceti (6 Proce) 105,0
Aque aromatica 50,0
Tincturae Aloës
Tincturae Catechu
Tincturae Benzolis \mathfrak{R} 10,0
Alumen cum Catechu
Alumen catechusatum
Rp Aluminis
Catechu \mathfrak{R} partes
M f pulvis subtilis Aeusserlich bei Blutungen.
Alumen draconiatum
Alumen cum sanguine Draconis.
Rp Aluminis 10,0
Sanguinis Draconis 5,0
M f pulvis subtilis Aeusserlich bei Blutungen.
Alumen kinosatum
Alumen cum Kino
Rp Aluminis pulverati 10,0
Kino pulverati 5,0
M f pulvis subtilis Aeusserlich bei Blutungen.
Aqua aluminosa composita
Injectio adstringens PANOLM
Eau de Bate
Rp Aluminis usti
Zinci sulfurici \mathfrak{R} 1,5
Aque destillatae 100,0
Aeusserlich als Augewasser, Einspritzung bei
Leukorrhoe und Haemorrhagen
Cataplasma aluminatum
Cataplasma Aluminis seu aluminosum
ad decubitum
Rp Aluminis pulverati 4,0
Albumen ovorum duorum
Spiritus camphorati 2,0
Fiat Unimentum

Collutorium Aluminis
Collutoire à l'alun (Gall).
Rp Aluminis 5,0
Mellis rosati 20,0
Zum Pinseln bei Aphthen
Collyrium Aluminis.
Aqua ophthalmica aluminata.
Rp Aluminis 1,0
Aque Fontinali 100,0
Bei katarrhalischer Conjunctivitis mehrmals täglich
einzutropfen
Collyrium Loches
Rp Zinci sulfurici
Aluminis \mathfrak{R} 0,5
Tinctura Aloës Guttas X
Spiritus Vini (0,850) 8,0
Aque Rosae 100,0
Bei katarrhalischer Conjunctivitis mehrmals täglich
einzutropfen
Gargarisma adstringens
Gargarisme adstringent
Rp Infusi florum Rosae rubrae 10,0 250,0
Aluminis 5,0
Mellis rosati 50,0
Gargarisma aluminatum
Rp Aluminis 10,0
Aque 900,0
Mellis rosati 100,0
Glycerium Aluminis
Glycerin of Alum (U-St.)
Rp Glycerini 75,0
Aluminis 10,0
Injectio adstringens RICHARD
Rp Aluminis
Acidi tannici \mathfrak{R} 1,0
Vini rubri
Aque Rosae \mathfrak{R} 100,0
Dreimal täglich einzuspritzen bei Entzündung der
Harnröhre

Injectio Aluminis RICORDI

Rp Aluminis 15,—45,0
Aqua 1000,0

Zu Einspritzungen in die Vagina

Lapis miraculosus

Lapis medicamentosus SCHWETZ.
Wunderstein. Wunderstein.

Rp Aluminis 100,0
Ferri sulfatid 50,0
Cupri sulfurica 25,0
Ammonii hydrochlorici 5,0

Die gepulverte Mischung wird im Porcellankessel geschmolzen, auf einen Porcellanteller ausgegossen, nach dem Erkalten zerkleinert und in gut geschlossenen Gefässen aufbewahrt

Lapis stypticus HESSELBACH

Lapis vulnerarius HESSELBACH

Pulvis causticus AMMON

Rp Lapidis miraculosi 10,0
Aeruginis 0,5

M fiant pulvis subtilis

Liquor conservatorius ad pelles

Rp Gallarum contusarum
Aluminis 55 100,0

koeche man mit Wasser nur Kolatur 1600,0 und füge hinzu

Acidi carbolici 15,0
Spiritus (0,880) 50,0

Zum Beräuben und Bestreichen der Fleischseite der Felle auszustopfender Thiere

Mixtura styptica PLANCH

Rp Aluminis 5,0
Aqua Menthae piperitae 120,0
Tincturae Cinnamomi 20,0
Sirupi Papaveris 60,0

1—2stündlich $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Esslöffel bei Metrorrhagie und Ruhr

Pastilli aluminati

Alum.-Pastillen.

Rp Aluminis 5,0
Sacchari 100,0
Tragacanthae 0,1

fiant cum aqua glycerinata pastilli 100.

Pastilli soripari aluminati

Rp Aluminis
Sacchari Lactis 55 100,0
Tragacanthae 0,1

fiant cum aqua pastilli 300 Für $\frac{1}{10}$ Liter Milch
= 1—2 Pastillen. Nicht allzulange aufbewahren!

Pilulae adstringentes HUFELAND

Rp Aluminis
Catechu 55 5,0
Extracti Gentianae q s

fiant pilulae ponderis 0,12 Bei chronischen Blut- und Schleimflüssen dreistündlich 4 Pillen.

Pilulae adstringentes RECAMIER

Pilulae adstringentes CAPURON

Rp Catechu 10,0
Aluminis 5,0
Opil 2,0
Extracti Gentianae 7,5

fiant pilulae 300 Bei chronischer Diarrhoe, Nachschweis, täglich drei- bis viermal 2 Pillen.

Pilulae aluminosae HALVETUS

Pilulae aluminosae d'HELVETIUS (Gall)

Rp Aluminis 10,0
Sanguinis Draconis 5,0
Mellis q s

fiant pilulae 100 consperg sanguine Draconis

Potio aluminosa GOLDING BIRD

Rp Aluminis 2,0
Extracti Conii 0,8
Sirupi Rhoeados 15,0
Aquaes Foeniculi 120,0

In Londoner Kinderhospital gegen Keuchhusten
sechstündlich 1 Kinder- bis Esslöffel

Potio antidiysenterica GRASHVUS

Rp Aluminis
Gummi arabici
Extracti Cascariae 55 5,0
Aquaes Chamomillae 150,0
Sirupi Aurantii corticis 40,0

Zweistündlich einen Esslöffel (gegen Ruhr)

Pulvis adstringens OPPOLZER

Rp Aluminis 5,0
Morphini hydrochlorici 0,08
Sacchari albi 50

M f p divide in partes XV Bei Blutspucken
stündlich ein Pulver

Pulvis antisudarius

Pulver gegen itischen Fusschweiss

Rp Aluminis usti
Acidi borici 55 10,0
Amyli Tritici
Talcu veneti 55 10,0
Olei Wintergreen gtt 20

Pulvis pro pedibus (Helv)

Fusspulver der Schweizer Armeen

Rp Aluminis 15,0
Talcu veneti 85,0

Pulvis causticus VIDAL

Rp Aluminis usti 5,0
Summitatum Sabinae plv 15,0

Zum Bestreuen syphilitischer Vegetationen von
wildem Fleisch in Wunden

Pulvis causticus VILFRAU

Rp Aluminis usti 20,0
Summitatum Sabinae plv 10,0

Pulvis dentifricius ruber

Rp Rhizomatis Calami
Rhizomatis Iridis Florentinae 55 50,0
Laccas in globulis 20,0
Aluminis usti 10,0
Olei Gerani gtt 20
Olei Menthae piperitae gtt 15

Pulvis errhinus GRIFFITH

Rp Aluminis
Boli Armenae 55 5,0
Sanguinis Draconis 2,0
Ferri oxydati fusi 7,5

Schnupfpulver gegen Nasenbluten.

Pulvis errhinus VOGT

Rp Aluminis 0,8
Extracti Ratanhuae
Corticis Quercus 55 5,0

Schnupfpulver zur Stärkung der Nasenschleimhaut.

Pulvis haemostaticus externus.

Rp Aluminis
Aluminis usti
Gummi arabici
Colophonii 55 partes.

Zum Bestreuen blutender Wunden

Pulvis stypticus SKODA

Rp Aluminis
Sacchari albi 55 2,0
Pulveris Ipecacuanhae opisti 0,8

Divide in Partes X

Bei Bluthusten zweistündlich 1 Pulver

Saccharum aluminatum

Rp Aluminis

Sacchari aa partes

Pactur ex tempore!

Unter dem Namen Alumen saccharatum war vor Zeiten ein Präparat in Pachtellform gebräuchlich, welches aus 25 Alaun, 30 Bleiweiss, 10 Zinksulfat, 50 Zucker, einem Eiweiss und Essig bestand und zu Augenwässern und Coctivis gebraucht wurde

Serum Lactis aluminatum (Ergänzb.)

Alaun-Molken

Rp Lactis vaccini 1000,0

Aluminis 10,0

Man erhitzt das Milch mit dem Alaun zum Aufkochen, kocht das Molken ab und filtrirt die Molatur

Specificum pharyngicum ZONEI

Rp Aluminis

Tartari depurati

Kali nitrici

Natrii acidi aa 10,0

In 1 Liter Wasser gelöst zum Gurgeln als Prophylacticum gegen Diphtherie

Unguentum antihæmorrhoidale

SUNDALIN

Rp Aluminis pulverat 2,0

Butyri aceticis insula 25,0

Glycerini 2,0

Aque Rosae 1,0

Zum Bestreichen fließender Hämorrhoidalknoten

Unguentum contra perionies Rugi

Rp Aluminis pulverat 10,0

Camphora

Opi puri aa 2,0

Balsami Peruviani 8,0

Unguenti Plumbi 30,0

Zum Einreiben der erkrankten Stellen.

Vet. Collyrium stypticum

Rp Aluminis 20,0

Tincturae Opi crocatae 2,0

Aque 280,0

M. D. S. Augenwasser für Pferde (bei granuloer Entzündung der Conjunctiva)

Alaunstifte zum Aetzen. Werden erhalten durch Abschleifen ausgesucht schöner, grosser Alaunkrystalle oder durch Formen von Alaunpulver mit Bindemitteln

Anosmin-Fusspulver des Dr. OSCAR BERNAR in Wien, Mittel gegen Fusschweiss 60 g Alaunpulver, 3 g Maismehl, inkl Schachtel = 4 Mark (HAGER)

Antisudin. Mittel gegen Fusschweiss von A. MANDOWSKI in Annaberg bei Oderberg 1/2 Schl 250 g Alaunpulver = 2 Mark (HAGER)

Dermasot von Apotheker BARTSCHINGER in Baden (Schweiz), Fusschweissmittel Aluminiumacetat 7,5 g, Wasser 120,0 g, Buttersäureäther 2 Tropfen, mit Rosamin schwach roth gefärbt Preis 2 Mark (WEBER)

EBERMANNS Mundwasser. Corticis Auranti 100,0, Corticis Cinnamomi 50,0, Caryophyllorum 20,0, Fructuum Anisi stellati 60, Foliorum Salviae 50,0, Benzoes 35, Cocconellae 20, Aluminis 20,0, Olei Menthae piperitae 10,0, Olei Anisi 3,0, Spiritus (70 Vol-Proc) 1000,0

Mykothinnaton von VILAIN & Co in Berlin Zur Vertreibung von Holz-, Haus- und Mauersehwamm, auch Prophylacticum dagegen Farblose Flüssigkeit, Mischung aus Alaun, Kochsalz, Schwefelsäure und Eisen 1 Liter = 1,5 Mark (HAGER)

Putzpulver für Silbersachen. Alaunpulver, Weinstein, geschlämmte Kreide je gleiche Theile

THOMAS' Brandwundenwasser. Aluminis 2,0, Aquae destillatae 100,0, Mixture oleoso-balsamicae 1,0.

Vet. Lapis medicamentosus ferratus
Gelber Heilstein

Rp 1 Aluminis ussi in frustis 100,0

2 Liquoris Ferri sesquichloridi

3 Spiritus (90 Proc) aa 20,0

Man besprengt 1 mit der Mischung von 2 und 3 und lässt an der Luft trocknen
3 Ein Walnuss grosses Stück wird zerdrückt, mit einem Viertel-Liter Wasser geschüttelt und mit der Flüssigkeit Wunden und wund Hautstellen bestrichen

Vet. Lapis stypticus camphoratus

Rp Aluminis 100,0

Terri sulfurici crudi 50,0

Cupri sulfurici crudi 25,0

Man schmilzt das Pulvergemisch, mischt darunter

Camphora

Aluminis ussi aa 2,0

und giesst auf Porcellanteller aus
Zum Einstreuen oder, in Wasser gelöst, zu Einspritzungen, bei Hufkrebs

Vet. Pate caustique PRASSE (Gall)

Aetia-Pasta

Rp Aluminis ussi pulv 100

Acidi sulfurici conc 9

nt stat pasta

Vet. Pulvis antidiarrhoicus

Rp Aluminis pulv

Corticis Quercus pulv aa 25,0

Mit einer Flasche Leinöl-Abkochung für ein Rind mit Ruhr

Vet. Pulvis constipans

Rp Aluminis ussi 5,0

Radici Tormentillae 10,0

Corticis Quercus 15,0

Radici Liquiritiae 20,0

Dieses ist vorerstündlich einen Theelöffel voll (bei Diarrhoe der Schweine)

Vet. Pulvis stypticus vulnerarius.

Rp Aluminis ussi 20,0

Corticis Quercus 50,0

Zum Einstreuen in profuse eiternde und stinkende Wunden und Geschwüre

Vet. Heilwasser bei Klauensohle.

Rp Acidi mmiatit crudi 100,0

Aluminis 30,0

Acidi carbonici 5,0

Aque communis 5 Litras

Zum Baden, Waschen und Bepinseln der kranken Klauenstellen

WYLLIE'sche Lösung. Aluminis 7,5, Boroglycerini 80,0, Glycerini 70,0

Wiener Backpulver von KALL LANG in Berlin Alaun 40,0, Natriumbikarbonat 25,0, Kartoffelstärke 35,0 Auf 1 kg Mehl = 40 g (Anal B FISCHER)

Wasserdichtmachen von Wollgeweben Man zieht die Stoffe erst zweimal durch eine 70° C warme Oelsäureseifenlösung (aus 200 g Oelsäureseife und 18 Liter Wasser), und hierauf zweimal durch eine ebenso warme Alaunlösung (aus 200 g Alaun und 15 Liter Wasser)

Alumina.

Alumina. Aluminiumoxyd . Alaunerde. Thonerde. Al_2O_3 . Mol.-Gew. = 102.

I Alumina. Alumina hydrata (Ergänz. Helv.) Alumini Hydras (U-St).

Aluminiumhydroxyd. Aluminiumhydrat . Thonerdehydrat *Argilla pura seu hydrata.* Terra argillacea pura. Hydrate d'alumine. Aluminium Hydrate . $\text{Al}_2(\text{OH})_6$. Mol.-Gew. = 156.

Darstellung. In eine filtrirte Lösung von 10 Th Alaun in 100 Th Wasser giesst man unter Umrühren eine Mischung von 11 Th Ammoniakflüssigkeit mit 100 Th Wasser. Die Flüssigkeit muss nach Beendigung der Fällung deutlich alkalisch reagiren, sonst muss noch Ammoniakflüssigkeit zugegeben werden — Der entstandene Niederschlag wird mit warmem Wasser so lange gewaschen, bis das mit etwas Salpetersäure angesäuerte Filtrat durch Baryumchlorid nicht mehr getrübt wird, alsdann auf einem leinenen Kolatorium gesammelt, stark ausgepresst, bei 100° C getrocknet und zerrieben (Ergänz.)

U-St lässt eine Lösung von 100 Th Alaun in 1000 Th Wasser mit einer Lösung von 100 Th kryst Natriumkarbonat in 1000 Th Wasser fallen und den ausgewaschenen und ausgepressten Niederschlag bei einer 40° C nicht übersteigenden Temperatur trocknen

Eigenschaften Weisses, spezifisch-leichtes, amorphes, luftbeständiges Pulver, ohne Geruch und Geschmack, an der Zunge anhaftend. Unlöslich in Wasser und Wein-geist, löslich in verdünnten Säuren, sowie in Kali- oder in Natronlauge. Die Lösung in Kali- oder in Natronlauge wird durch Zusatz von überschüssigem Ammoniumchlorid in der Wärme gallertartig gefällt — 100 Th geben bei heller Rothgluth (vor dem Geblase) 84,6 Proc Wasser ab und hinterlassen 65,4 Proc wasserfreie Thonerde Al_2O_3 . (Nach Ergänz. sollen nur 58 Proc Glührückstand hinterbleiben, es ist also ein Präparat mit 90 Proc $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ und 10 Proc hygroskopischer Feuchtigkeit zugelassen) — Nach dem Befeuchten mit Kobaltnitratlösung färbt es sich beim Erhitzen in der äusseren Lothrohrflamme blau

Prüfung. 1) Man kocht 1 g des Präparates mit 80 ccm Wasser. Das Filtrat muss neutral sein und darf nur einen minimalen Verdampfungsrückstand hinterlassen. 2) In 30 Th verdünnter Salzsäure muss es sich klar auflösen. Diese Lösung darf durch Kaliumferriocyanid nicht sofort gebläut (Eisen), noch durch Baryumchlorid sofort getrübt werden (Schwefelsäure). 3) Es löse sich in 10 Th Natronlauge; diese Lösung darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert werden (Metalle, z B Zink). 4) Beim Befeuchten mit Silbernitratlösung oder Quecksilberchloridlösung muss es ungefärbt bleiben (Magnesiumoxyd).

Anwendung. Auf secernirenden Wundflächen wirkt es, äusserlich angewendet, austrocknend, daher als Streupulver bei nässenden Exanthenen und stark secernirenden Geschwürsflächen. Innerlich neutralisirt es die Magensäure und wirkt alsdann wie ein Thonerdesalz adstringirend und stopfend. In Gaben von 0,1—0,2—0,5—1,0 als Antacidum bei Diarrhöen, z B Cholera infantum, auch bei Cholera asiatica — Thonerdehydrat hat die Eigenschaft, durch Flächenanziehung viele Substanzen, z B Farbstoffe, auf sich niederzuschlagen, daher dient es als Klärmittel und zur Herstellung von Farbblacken.

Löwig's Patent-Thonerde. Ein feuchtes gallertartiges Thonerdehydrat mit etwa 10 Proc Aluminiumhydrat, bisweilen kleine Mengen Aetznatron oder Kalkhydrat, oder die Carbonate dieser enthaltend. Sie wird dargestellt durch Fällung von Aluminium-Natriumoxyd $\text{Al}_2(\text{ONa})_6$ mittels Aetzkalkes, Auflösen des Aluminium Calciumoxyds $\text{Al}_2\text{O}_3\text{Ca}_2$ in Salzsäure und Fällung dieser Lösung mit Aluminium-Calciumoxyd unter Ausschluss von

Wärme — Aufzubewahren in gut geschlossenen Gefässen an einem kühlen Orte. Nach längerer Aufbewahrung geht sie in krystallinischen Zustand über, wobei sie kiedriges Aussehen annimmt. Anwendung als Klärmittel, z. B. bei der Reinigung des Honigs. Nicht verwendbar bei sauren oder gefärbten Flüssigkeiten, z. B. Fruchtsäften. Ausserlich als aufsaugendes Mittel zur Bereitung von Umschlägen. Technisch zur Beseitigung von Fettflecken, ferner in Verbindung mit Kalkhydrat oder Wasserglas zur Bereitung von Kitten. Bezugsquelle Chem. Fabrik Goldschmieden in Schönen.

Liquor Aluminæ alkalinus Liquor antiarthriticus TURNOK TURNOK'S Waschungen gegen Gicht und Podagra. Sind Auflösungen von Thonerdehydrat in Kalilauge. TURNOK unterscheidet je nach der Stärke der von ihm verwendeten Kalilauge 6 Sorten.

I	beretret mit Kalilauge vom sp G	1,015	IV	beretret mit Kalilauge vom sp G	1,085
II	" " " " " "	1,081	V	" " " " " "	1,077
III	" " " " " "	1,048	VI	" " " " " "	1,094

Man bereitet diese Liqueure durch mehrtägiges Digeriren der vorgeschriebenen Kalilauge mit einem Ueberschuss von Thonerdehydrat (Alumina hydrata s. oben), so dass also keine freie Kalilauge, sondern vielmehr eine Lösung von Aluminium-Kaliumoxyd vorhanden ist.

In 2 kg der alkalischen Thonerdelösung, deren Stärke vom Arzte vorgeschrieben ist, löst man 30 g arabisches Gummi. Andererseits bereitet man eine Emulsion aus einem halben Eidotter, 40 g weissem Sirup, 40 g konc. wässriger Seifenlösung (oder 20 g Sapo medicatus plv.), 40 g Lärchenterpentin, 20 g Olivenöl und setzt dieser Emulsion nach und nach die alkalische Thonerdelösung unter Umrühren zu, worauf man noch 50 g gesättigten Kampheerspiritus (mit 80 proc. Weingeist bereitet) zuzugt. Mit der erwärmten Flüssigkeit wird der ganze Körper eingegeben.

Pulvis anticholericus Americanus Amerikanisches Cholerapulver	Vet	Pulvis contra haematuriam.
Rp Aluminae hydratae 1,2		Rp Natrii bicarbonat 200,0
Opii pulv 0,05		Alumina crud. pulv 100,0
Macidia		Bei Blutharnen der Hinder und Schafe
Gummi Arabici ad 0,6		Ein Rind 2stündlich $\frac{1}{4}$ Esslöffel in $\frac{1}{2}$ l Wasser
Tales doses quinque		Ein Schaf 2stündlich $\frac{1}{4}$ Theelöffel mit $\frac{1}{4}$ l Wasser
ein Pulver		

II. Bolus alba (Austr. Germ. Helv.) **Argilla. Weisses Thon. Bol blanc.**
White bole Ein natürlich vorkommendes, wasserhaltiges Thonerdesilikat (Thon), welches etwa 40—45 Proc. Kieselsäure, 80—85 Proc. Wasser, im ungerinigten Zustande auch etwas Calciumcarbonat und Sand enthält. Den für den pharm. Gebrauch bestimmten Bolus reinigt man vom Kalk durch Ausziehen mit 5 proc. Salzsäure und vom Sande durch einen Schlammprocess. Der gewaschene und geschlämte Bolus wird gesammelt, in grössere Stücke geformt, an der Luft einem Austrocknungsprocess unterworfen, schliesslich gepulvert. Früher brachte man ihn in die Form von Kugeln, welchen man ein Siegel aufdrückte. In dieser Form wurde er „Terra sigillata“ genannt.

Erdige, undurchsichtige, zerreibliche Masse, welche befeuchtet etwas zähe wird, in Wasser allmählich zerfällt, aber darin unlöslich ist. Soll mit Salzsäure übergossen wenig oder gar nicht aufbrausen (Calciumcarbonat), beim Abschlännen mit Wasser keinen Sand hinterlassen. Beim Erhitzen im Glasrohre verliert Bolus Wasser.

Anwendung Ausserlich als austrocknendes Mittel bei nässenden Wunden. Innerlich als Konstatuens für Pillen mit leicht zersetzlichen Substanzen, wie Silbernitrat, Kaliumpermanganat. Technisch zum Entfernen von Fettflecken aus Holz und Geweben, zur Bereitung einiger Kitten, zum Beschlagen von Retorten.

Pasta Boli albae, Bolus Pasta, ist Bolus alba mit Glycerin zur Pasta angerührt. An Stelle von Glycerin wird bisweilen auch Leinöl angewendet.

Das Beschlagen einer Retorte geschieht, indem man diese bis etwa gegen die Mitte des Schnabels an der äusseren Wandung mit einem frischberaiteten, sehr dünnen Brei aus Kreide und Wasserglas dünn überzieht. Wenn dieser Ueberzug an einem heissen Orte vollständig erhärtet ist und sich beim vorsichtigen Berühren mit einem Tuche an keiner Stelle eine Abblätterung einstellt, werden noch 3—4 Ueberzüge gemacht mit einer Mischung aus Wasserglas, Bolus (Thon) und etwas Kreide, und zwar wird je der folgende Ueberzug erst dann aufgetragen, wenn der vorhergehende vollständig erhärtet ist. Solche beschlagene Retorten lassen sich über freiem Feuer erhitzen, und auch sonst widerstandsfähig. — Blättert der erste Ueberzug an einigen Stellen ab, so muss man diese mit

Kreide trocken reiben und ausbessern Kiste zum Dichten von Destillir und Gasentwicklungsapparaten, a) plastischer Thon, b) Mischung von 3 Th gepulvertem Thon und 1 Th Getreidemehl, mit Wasser angerührt An Stelle von Bolus kann für alle genannten Zwecke Kaolin angewendet werden

III Terra porcellanea Argilla porcellanea. Porcellanerde. Porcellanthon. Kaolin. Argile China-Clay. Verwitterungsprodukt des Feldspathes, im wesentlichen aus Aluminiumsilikat bestehend Die zum pharm Gebrauche bestimmte Sorte wird durch Ausziehen mit 5proc Salzsäure vom Kalk und durch Schlammern mit Wasser vom beigemengten Sande befreit — Weisse erdige Masse oder ein weisses Pulver, welches wie Bolus zu prüfen ist S S 240

Anwendung. Aeusserlich als austrocknendes Mittel, innerlich als Konstituens für Pillen Technisch zum Klären von Wein, Bier, Honig, Zuckersäften Auf 1 Liter Flüssigkeit wendet man 5—10 g Porcellanerde an, welche mit kleinen Mengen der zu klarenden Flüssigkeit fein angerieben sind Man schüttelt während eines Tages häufig um, lässt alsdann absetzen und filtrirt die geklarte Flüssigkeit vom Bodensatz ab Grosse Mengen als Füllstoff für Papiermasse Porcellanerde kann in allen Fällen den „weissen Bolus“ (s vorher) ersetzen

IV. Bolus Armena Bolus orientalis. Argilla ferruginea rubra. Terra Lemnia Lemnische Siegeleide. Armenischer Bolus Bol d'Arménie (Gall) Argille ocreuse. Armenia bol. Ein natürlich vorkommendes, Eisenoxyd enthaltendes Thonerdesilikat, welches auch an einigen Stellen in Deutschland gegraben wird Der rothe Bolus kommt in lebhaft rothen, derben, zusammenhängenden Massen vor Er ist matt oder nur schwach schimmernd, im Bruche muschelrig und undurchsichtig Beim Ritzen mit einem harten Körper nimmt er fettartigen Glanz an Er ist fettig anzufühlen und bleibt an der feuchten Zunge hängen, er lässt sich leicht schaben und zerreiben In Wasser zerspringt er mit Knistern in kleine Stücke und zerfällt allmählich zu einer breiartigen Masse Auch im Munde zergeht er leicht. Spec Gew 1,9—2,0

In den Handel kommt er in natürlichen Stücken, aber auch geschlämmt als Pulver oder in Tischchen-Form Letztere waren früher gewöhnlich mit irgend einem Stempel versehen (*Terra sigillata rubra*) Die pharmaceutische Sorte ist die geschlämmte (*Bolus Armena praeparata*), sie darf beim Uebergiessen mit verdünnter Salzsäure nicht aufbrausen

Anwendung. Als Arznei kann noch angewendet, man setzt ihn Pulvern und Pillen als färbenden Bestandtheil zu, benutzt ihn auch zum Kongspergiren von Pillen Früher diente er ausserlich als Exsiccans, innerlich und ausserlich als Hamostaticum und Adstringens

Pilules arméniennes Comper		Emplâtre Cérebro (Gall)	
Bolus d'Arménie de Charles Albert		Emplastrum Cerebrum	
Rp Balsami Copalivi evaporati	82,0	Rp 1 Picis Burgundicae	400,0
Magnesia ustae	2,0	2 Picis nigrae	
Cubebaeum		3 Cerae flavae	aa 100,0
Boli Armenae	aa 10,0	4 Sebi ovilis	50,0
fiant pilulae ponderis 0,4 g		5 Boli Armenae	100,0
		6 Myrrhae	
		7 Olibani	
		8 Minii	aa 20,0
		5—8 werden gepulvert und in die halb erkaltete Mischung aus 1—4 eingebeut. Wird wie unser „Oxyroceum Pflaster“ gebraucht	

Bolus Armena artificialis. Argilla martiata Alumina ferrata. Eine wässrige Lösung von 10 Th Alaun und 8,8 Th kryst Ferrosulfat wird mit einer Lösung von 14 Th kryst Natriumkarbonat gefällt Der entstandene Niederschlag wird bis zum fast völligen Verschwinden der Schwefelsäure gewaschen und bei lauer Wärme getrocknet Obsoletees Arzneimittel, früher gegen Durchfall und Bleichsucht verwendet, Dosis 0,5—1,5 dreimal täglich

Bolus rubra. Rother Bolus Ist dem armenischen Bolus ähnlich, aber sandiger und meist etwas dunkler an Farbe Kommt ebenso wie der weisse Bolus geschlämmt (in cylindrischen Stücken) in den Verkehr Man benutzt ihn für Kiste, auch als Bestandtheil von Vieh-Arzneipulvern

V Rubrica fabrilis seu factitia Creta rubra. Rothe Kreide. Röthel.

Eine dem rothen Bolus ähnliche Erde, und zwar Eisenoxyd enthaltender Thonschiefer, in 1—2 fingerlange, verschieden dicke Stücke geformt Spec Gew 8,1—8,8 Wird bisweilen von Bauhandwerkern verlangt, welche sie zum Schreiben auf Holz und Mauerwerk gebrauchen, lediglich Handverkaufsartikel

VI Medulla saxorum Steinmark. Ein natürliches Thonerdesilikat von weisser, gelblicher, röthlicher, braunlicher Farbe Undurchsichtig, auf dem Bruche erdig, feinkörnig, zart, der feuchten Zunge anhaftend Spec Gew 2,2—2,5 Wird als Pulver vorrätzig gehalten und besonders als Putzmittel für Metallgeräthe verlangt Für diesen Zweck sollte lediglich die geschlämte Sorte abgegeben werden

Früher wurde es arzneilich verwendet, die bläuliche, aus Sachsen kommende Sorte, zu Sympathie Kuren verwendet, hatte den Namen „Wundererde, *Terra miraculosa*“

VII Lapis Smiridis Smirgel Schmirgel. Eine Varietät des Korunds Wird nur an wenigen Stellen auf der Erde gebrochen, z B am Kap Emeri auf Naxos, zu Nikoria auf Samos, in Spanien, Portugal, bei Schwarzenberg in Sachsen Ist ein Thonerdesilikat von solcher Härte, dass es nur dem Diamant nachsteht, meist dunkelbläulich und graukantendurchscheinend Kommt als Pulver von verschiedener Feinheit aus den Schmirgelwerken in den Handel und wird von Bildhauern, Metallarbeitern und Glasschleifern etc gebraucht No 0 ist grösster Schmirgel in kleinen braunen Körnern, No 9 grober, No 10 mittler, No 11 feiner, No 12 feinster Schmirgel Da er vielfach verfälscht wird, so muss man ihn aus zuverlässigen Drogen-Handlungen beziehen

Schmirgelpapier wird durch Aufstreichen von Schmirgelpulver auf mit Leim frisch bestrichenen Papier, Schmirgelleinen in gleicher Weise mit Benutzung von Shirting dargestellt Von beiden giebt es zahlreiche, dem Korn des Pulvers entsprechende Nummern

Pasta für Streichriemen Lapis Smiridis geschlämmt No 12, Graphites (Plumbago) aa 30,0, Pohn-Roth (Eisenoxyd) 15,0, Sebi, Cerae flavae aa 30,0

Erkennung und Bestimmung. Man erkennt die Thonerde in Lösungen (also die Aluminium Salze in Lösungen) an folgenden Reaktionen 1) Natriumkarbonat fällt aus Thonerdesalzlösungen unter Entweichen von Kohlensäure — Ammoniak und Ammoniumsulfid fallen ohne Entweichen von Kohlensäure — farbloses, gelatineses Aluminiumhydroxyd $Al_2(OH)_6$ Dieses ist unlöslich in Ammoniumchlorid, dagegen löslich in Kalt- oder Natronlauge Weinsäure, Citronensäure und andere nicht flüchtige organische Säuren verhindern, falls sie in erheblichen Mengen zugegen sind, die Ausfällung 2) Natriumphosphat fällt voluminöses, weisses Aluminiumphosphat $PO_4Al + 4H_2O$ Dieses ist leicht löslich in Kalt- oder Natronlauge (wird aber aus dieser Lösung durch Ammonsalze wieder gefällt), leicht löslich in Salzsäure oder Salpetersäure, nicht löslich in Essigsäure 3) Kalt- oder Natronlauge fallen bei vorsichtigem Zufügen zunächst farbloses Aluminiumhydroxyd $Al_2(OH)_6$, der Niederschlag ist in einem Ueberschuss von Kalt- oder Natronlauge löslich, wird aber durch Zusatz von Ammoniaksalzen wieder hervorgerufen 4) Glüht man Thonerde oder eine Verbindung derselben auf Kohle vor dem Löthrohr, befeuchtet alsdann mit etwas Kobaltnitratlösung und glüht wieder, so erhält man eine ungeschmolzene, himmelblaue Masse

Man bestimmt die Thonerde in der Regel, indem man sie als Aluminiumhydroxyd fällt und dieses durch Glühen in Aluminiumoxyd überführt

Man versetzt die heisse, mässig verdünnte Flüssigkeit mit Ammoniumchlorid, kocht auf mit Ammoniak in mässigem Ueberschusse, erhitzt zum Sieden und erwärmt so lange, bis die Flüssigkeit kaum noch nach Ammoniak riecht (Nicht länger!) Man filtrirt ab, wäscht mit heissem Wasser (nicht zu kleine Filter!) erst durch Dekantieren, dann auf dem Filter aus, trocknet gut aus und glüht im bedeckten Platintiegel zuerst über gewöhnlichem Brenner, schliesslich 10 Minuten über dem Gebläse Was man wägt, ist Aluminiumoxyd Al_2O_3 . Multiplicirt man dieses mit 0,5234, so erhält man die diesem entsprechende Menge von metallischem Aluminium — Enthält die Lösung nicht flüchtige Salze, so können kleine Mengen derselben in dem Niederschlage verbleiben Man löst in diesem Falle den ausgewaschenen Niederschlag (ohne zu glühen) nochmals in Salzsäure, fällt nochmals mit Ammoniak, wäscht aus, trocknet und glüht wie oben angegeben

Enthält die Substanz flüchtige organische Säuren, so beseitigt man diese zunächst durch Abkochen mit konz. Schwefelsäure. Sind nicht flüchtige organische Säuren zugegen, so schmilzt man die Substanz mit Kalium-Natriumkarbonat und etwas Salpeter, oder man zerstört die Säuren durch Erhitzen mit konz. Schwefelsäure nach dem KJELDHAL'schen Verfahren.

In Säuren nicht lösliche Thonerde-Verbindungen (Silikate) schliesst man durch Schmelzen mit Kalium-Natriumkarbonat auf. Die Lösung der Schmelze wird mit Salzsäure übersättigt, die Kieselsäure durch wiederholtes Eintrocknen mit Salzsäure in unlösliche Form gebracht und aus dem Filtrat die Thonerde durch Ammoniak gefällt. — Man kann die Kieselsäure aus den Thonerdesilikaten auch durch Eindampfen der Substanz mit Flusssäure im Plattingefässe verflüchtigen, das hinterbliebene Aluminiumfluorid durch Erwärmen mit konz. Schwefelsäure in das Sulfat überführen und dessen Lösung wie oben mit Ammoniak fallen.

Alumini Salia varia.

I Aluminium boricum Aluminiumborat $\text{Al}_2(\text{B}_4\text{O}_7)_2$. Mol. Gew. = 522

115 Th kryst. Borax werden in wässriger Lösung mit einer Auflösung von 67 Th kryst. Aluminiumsulfat gefällt, der entstehende Niederschlag wird eben bis zum Verschwinden der Schwefelsäure-Reaktion gewaschen, alsdann getrocknet.

II Aluminium boro-formicicum Bor-ameisensaures Aluminium

Darstellung. In ein Gemisch von 2 Th Ameisensäure und 1 Th Borsäure sowie 6—7 Th Wasser trägt man unter Erwärmen soviel frisch gefälltes und gut ausgewaschenes Aluminiumhydroxyd ein, als in der Wärme gelöst wird. Man lässt absetzen, filtriert und bringt die Lösung durch Abdampfen zur Krystallisation.

Perlmuttgeränzende, in Wasser und in Alkohol lösliche Schuppen, die wässrige Lösung reagiert sauer, schmeckt süsslich adstringierend, coaguliert Eiweiss nicht und wird durch Alkali nicht gefällt. Zusammensetzung Al_2O_3 33,5, H_2CO_3 14,9, BO_2H_3 19,68, H_2O 31,92 entsprechend etwa der Formel $\text{Al}_2\text{O}_3\text{BO}_2\text{H}_3\text{H}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Die 10proc. Lösung hat das spec. Gewicht 1,064, die 20proc. = 1,110. Als Desinficiens zur Behandlung von Kehlkopfkrankheiten.

III Aluminium boro-formicicum ammoniatum Eine wässrige Lösung des vorstehenden Salzes wird mit Ammoniak übersättigt und die klare Flüssigkeit eingedunstet. Konnte noch nicht krystallisiert erhalten werden.

IV. Aluminium borico-tannicum Bor-Gerbsaures Aluminium D.R.P. 77315

Catal. Eine Lösung von 1 Th Gerbsäure und 4 Th krystall. Borax in 80 Th Wasser wird unter Umrühren in eine Auflösung von 3 Th kryst. Aluminiumsulfat in 12 Th Wasser eingetragen. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, bei niedriger Temperatur auf Bisquit-Porcellan getrocknet und gepulvert. Hellbraunes, in Wasser unlösliches Pulver.

V Aluminium borico-tartaricum Bor-Weinsaures Aluminium D.R.P. 77315

Borax. 1 Th Aluminiumborat (s. vorher), 1 Th Weinsäure und 9 Th Wasser werden im Dampfbade bis zur Auflösung erwärmt, und die filtrirte Lösung zur Trockne gebracht. Farbloses, krystallinisches, in Wasser leicht lösliches Salz.

VI Aluminium borico-tannico-tartaricum 1 Th Bor-gerbsaures Aluminium wird mit 1,2 Th Weinsäure und 10 Th Wasser bis zur Auflösung im Wasserbade erwärmt und die filtrirte Auflösung eingetrocknet.

VII Gallalum Aluminiumgallat. Basisch gallussaures Aluminium $\text{Al}_2(\text{OH})_4(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_6)_2$ (?)

Man löst zunächst 67 Th krystall. Aluminiumsulfat in 500 Th Wasser, alsdann 29 Th Natriumbikarbonat (eisenfrei) in 500 Th Wasser in der Kälte auf, sättigt die Lösung mit 38 Th Gallussäure theilweise ab und trägt die Aluminiumsalzlösung unter Umrühren in die Natrium-Gallatlösung ein. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, gesammelt und bei Lichtabschluss getrocknet.

Braunliches, fast geschmackloses Pulver, wird von Ammoniak mit gelbbrauner, von Natronlauge mit rothlichbrauner Farbe gelöst. Salzsäure und verdünnte Schwefelsäure lösen es mit braunlicher Färbung. Hinterlässt beim Verbrennen rund 22—23 g Aluminiumoxyd, welches nur schwach alkalisch reagieren darf. — Als Desinficiens bei Ozeana empfohlen.

VIII Tannalum insolubile Aluminiumtannat. Basisch gerbsaures Aluminium. Wird durch Fällen einer Aluminiumsulfatlösung durch eine Gerbsäurelösung erhalten, welche mit Ammoniak annähernd neutral gemacht ist. $\text{Al}_2(\text{OH})_4 (\text{C}_{14}\text{H}_6\text{O}_6)_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ (?)

Braunliches Pulver, in Natronlauge beim Erwärmen mit brauner Farbe löslich, in Wasser unlöslich. Als Adstringens bei chronischen Katarhen der Athmungsorgane.

IX Tannalum solubile Aluminium tannico-tartaricum. Gerbsaures Aluminium. $\text{Al}_2(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_2 (\text{C}_{14}\text{H}_6\text{O}_6)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (?)

Wird durch Auflösen des Tannalum insolubile in Weinsäurelösung und Verdampfen der Lösung erhalten. In Wasser löslich.

Aluminium.

Aluminium. Aluminum. Al Atom-Gew = 27. (Amerikanische Abkürzungen Alum., Alum., Alm und Alm.)

Darstellung. Dieses Metall wird gegenwärtig in beträchtlichen Mengen durch elektrolytische Reduktion von Aluminiumoxyd bei Gegenwart von Kryolith als Flussmittel dargestellt. Zu Neuhausen in der Schweiz wird die Wasserkraft eines Thales des Rheinfalls zum Betriebe elektrischer Dynamo-Maschinen verwandt. Der erzeugte Strom dient vorzugsweise zur Herstellung von Aluminium. Als positive Elektrode dienen Bündel von Kohlestäben, als negative Elektrode geschmolzenes Aluminium, welches am Boden des bei der Reduktion benutzten Tiegels (Kohletiegel oder mit Kohleplatten gefütterter Eisentiegel) liegt. Der Betrieb ist kontinuierlich, das erzeugte Aluminium wird sogleich in Baaren ausgegossen.

Handelsorten. Man findet im Handel „Rein-Aluminium“ mit 98—99,75 Proc Al und „Aluminium“ mit 92—98 Proc Al. Von der Reinheit abgesehen, kommt es in Form von Baaren, Draht, Blech, Pulver, Spähnen im Handel vor.

Eigenschaften. Silberweisses, spezifisch leichtes Metall, welches polirtüchtig ist und seinen Glanz an der Luft gut behält. Spec Gewicht des gegossenen Aluminiums = 2,56, des gehämmerten = 2,67. Schm-P = 628° C. Es ist nur schwach magnetisch, dagegen leitet es die Elektrizität vorzüglich. Durch schwaches Anätzen mit verdünnter Natronlauge und nachheriges Abspülen mit Salpetersäure kann es „mattirt“ werden, doch erreicht man diesen Zweck noch schöner durch das Sandstrahlgebläse.

Wasser wirkt bei gewöhnlicher Temperatur und bei Siedehitze nur wenig auf Aluminium ein, kalte concentrirte Schwefelsäure und kalte verdünnte Schwefelsäure greifen es nur wenig an, dagegen lösen sie es beim Erwärmen. Salpetersäure wirkt sogar in ziemlicher Concentration nur wenig ein. Salzsäure löst es leicht unter Wasserstoffentwicklung, ebenso Kali- und Natronlauge. Von Essigsäure wird es gleichfalls gelöst. Von Phenol (*Acidum carbolicum liquefactum*) wird es unter stürmischer Wasserstoffentwicklung gelöst. — Reibt man metallisches Aluminium mit etwas Quecksilberchlorid, -sulfat oder einem ähnlichen Salze ein, so entsteht zunächst ein Aluminium-Amalgam, aus welchem infolge Oxydation durch den Luftsaauerstoff Thonerde in haarförmigen Gebilden sich erhebt.

Anwendung. Aluminium findet als solches wegen seines niedrigen specifischen Gewichtes, ferner wegen seines schönen Aussehens und wegen seiner Unveränderlichkeit Verwendung zur Herstellung zahlreicher Gebrauchsgegenstände, Schmucksachen etc. Insbesondere besitzen einige Legirungen des Aluminiums werthvolle Eigenschaften. In der Chemie benutzt man es als Reduktionsmittel, namentlich um in alkalischer Lösung Salpetersäure in Ammoniak überzuführen.

Werthbestimmung. Das in der Pharmacie oder Chemie benutzte Aluminium soll mindestens 99 Proc Al enthalten. Daneben enthält es als Verunreinigungen Silber, Eisen, Schwefel, Arsen. Man prüft wie folgt:

1) Silber. Man übergiesst 2–4 g Schnitzel in einer Platinschale mit reiner conc. Natronlauge (e. *Natro*). Nach erfolgter Auflösung sauert man mit Salzsäure an, dampft zur Trockne, erhitzt zwei Stunden auf 150°C , nimmt mit salzsäurehaltigem Wasser auf und filtrirt die Kieselsäure ab, welche gewaschen, getrocknet und geglüht wird.
 2) Eisen. Man löst 8 g Schnitzel in reiner Natronlauge auf, übersättigt die Lösung mit reiner verdünnter Schwefelsäure von 1,16 spec Gew und titirt mit Kaliumpermanganat bis zur bleibenden Röthung.
 3) Aluminium. Man löst 2 g Schnitzel in reiner Natronlauge auf, füllt 200 cem auf, lässt absetzen und entnimmt 50 cem der klaren Lösung. Man erhitzt diese in einer Platinschale mit einem Ueberschuss von Ammoniumnitrat, filtrirt ab, löst den Niederschlag nochmals in Säure, fällt nochmals und zwar mit Ammoniak, trocknet, glüht und wägt nach S 242.

Die übrigen verunreinigenden Metalle findet man in den sauren bez. alkalischen Filtraten von 1–3.

Aluminium-Stifte. Stifte aus reinem Aluminium kann man zum Schreiben bezw. Zeichnen auf Glas und Porcellan benutzen. Die Schrift ist metallglanzend weiss, anhaftend. Da die Stifte nur auf Glas, nicht aber auf natürlichen Edelsteinen z. B. den Diamanten schreiben, so lassen sich hierdurch Diamanten von werthlosen Imitationen unterscheiden.

Aluminium-Legirungen. 1) Aluminium + Kupfer. Die mehr als 80 Proc Kupfer enthaltenden Legirungen heissen „Aluminium Bronzen“. Sie zeichnen sich durch Gussfähigkeit, Härte, Hämmbarkeit, Polirfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse aus. a) 90 Cu + 10 Al hat die Farbe des hellen Goldes. b) 95 Cu + 5 Al hat die Farbe des rothen Goldes (rothe Karaturng). c) 98 Cu + 2 Al hat fast Kupferfarbe. Aluminium-Messing. Zink 83,3, Kupfer 68,4, Aluminium 3,3 ist durch Festigkeit und Elastizität ausgezeichnet.

2) Aluminium + Silber. a) Besonders wichtig ist eine mit 96 Proc Al und 4 Proc Ag. Sie ist hart wie Werksilber und sehr polirfähig. b) Tiers-argent, Drittel Silber, aus 1 Th Silber und 2 Th Aluminium, wird zu Geräthschaften wie Werksilber verwendet.

3) Aluminium + Gold. Zusatz von 1 Proc Aluminium macht das Gold sehr hart, ohne seine Dehnbarkeit zu beeinträchtigen.

4) Aluminium + Zink. Zusatz von 2–3 Proc Zink macht das Aluminium hart, zugleich dehnbar und polirfähig.

5) Aluminium + Eisen. Eine Legirung von 75 Proc Eisen mit 25 Proc Aluminium ist silberweiss und ausserordentlich hart, nicht rostend. Kleine Procentsätze von Aluminium verleihen dem Stahl sehr werthvolle Eigenschaften.

Aluminium-Amalgam, wie solches in chemischen Laboratorien als neutrales Reduktionsmittel angewendet wird, ist wie folgt zu bereiten. Entölte Aluminiumspähne werden mit Natronlauge bis zu starker Wasserstoff-Entwicklung angeätzt, dann mit Wasser einmal abgespült. Auf das noch mit der schwachen Lauge benetzte Metall lässt man eine 0,5proc Mercurchloridlösung 1–2 Minuten lang einwirken. Diese gesammten Operationen wiederholt man — um den zunächst auftretenden schwarzen Schlamm zu entfernen — nochmals, spült nach einander schnell mit Wasser, Alkohol und Aether ab und bewahrt unter leichtsiedendem Petroläther auf. Das Aluminium-Amalgam zersetzt schon bei gewöhnlicher Temperatur das Wasser sehr stürmisch.

Aluminium-Lothe. Das Löthen des Aluminiums bietet immer noch technische Schwierigkeiten. Als Lothe werden angegeben: 1) Kupfer 56, Zink 46, Zinn 2. Mit Borax zu löthen. 2) Aluminium 95, Kupfer 1, Zinn 4. 3) Aluminium 95, Kupfer 1, Wismuth 2, Zink 1, Zinn 1. 4) Aluminium 60, Kupfer 18, Wismuth 10, Antimon 15, Zinn 2. 5) Zinn 97, Wismuth 1, Kupfer 2. 6) Cadmium 50, Zink 20, Zinn 30.

Aluminium aceticum.

Aluminium aceticum Thonerdeacetat Essigsäure Thonerde. Verbindungen der Thonerde mit Essigsäure sind mehrere bekannt. Sie sind aber nur zum Theil in fester Form darstellbar, bez. pharmaceutisch wichtig.

1) Aluminium aceticum neutrale. Neutrales Thonerde-acetat $\text{Al}_2(\text{CH}_3\text{CO}_2)_6$ ist nur in wässriger Auflösung bekannt, in fester Form ist diese Verbindung noch nicht dargestellt worden. Sie findet auch pharmaceutisch keine Verwendung.

II. Aluminium aceticum basicum Aluminium subaceticum. Basisches Thonerdeacetat. $\frac{2}{3}$ -Essigsäure Thonerde. $Al_2(CH_3CO_2)_4(OH)_2$ Acétate d'Alumine Acetate of Aluminium

Diese oder eine ähnliche Verbindung ist von **ATHENSTADT** nach einem von diesem nicht publicirten Verfahren dargestellt worden. Das **ATHENSTADT'sche** Präparat bildet weisse, durchscheinende, krystallinische Krusten von kaum merklichem Geruche nach Essigsäure und schwach süsslich salzigem, etwas schrumpfendem Geschmack. Frisch bereitet, löst es sich in kaltem Wasser zu einer klaren Flüssigkeit, kann daher als Ausgangsmaterial zur Herstellung von **Liquor Aluminium acetici** verwendet werden, doch bösst es nach einiger Zeit der Aufbewahrung an seiner Löslichkeit ein. Die Lösungen dieses Thonerde $\frac{2}{3}$ Acetates sind die arzneilich verwendeten Aluminiumacetatlösungen.

Liquor Aluminium acetici (Germ.) **Aluminium aceticum solutum** (Austri. Helv.) **Aluminiumacetatlösung** **Essigsäure Aluminiumlösung** **Thonerdeacetatlösung** **Solution d'acétate d'Aluminium** **Solution of Acetate of Aluminium**. Die Austr. und Germ. geben genau die nämliche Vorschrift, wenn die Verhältnisse (wegen der verschiedenen Stärke der Essigsäure) auch scheinbar abweichen.

	Austr.	Germ.	Helv. ¹⁾
Aluminiumsulfat, kryst.	300,0	300,0	222,0
Essigsäure, verdünnt	540,0 (20,4 %)	860,0 (80 %)	300,0
Wasser	620,0	300,0	480,0

In diese Lösung wird allmählich unter Umrühren eingetragen eine Anreihung von

	Austr.	Germ.	Helv.
Calciumkarbonat mit	130,0	130,0	100,0
Wasser	200,0	200,0	140,0

Austr. und Germ. lassen 24 Stunden lang unter bisweiligem Umrühren stehen, dann ohne Nachwaschen kochen und abpressen, schliesslich die Flüssigkeit filtriren. Helv. dagegen lässt nach 24stündigem Stehen filtriren und das Filtrat durch Nachwaschen mit Wasser auf 1000 Th. bringen.

	Austr.	Germ.	Helv.
Spec. Gewicht	1,014—1,046	1,014—1,046	1,058
Gehalt an Aluminiumsubacetat	8 %	7,5—8 %	10 %
Gehalt an Aluminiumoxyd	2,5—3,0 %	2,5—3,0 %	2,5—3,3 %

Bedingung für die Erzielung eines klaren Präparates ist der möglichste Ausschluss von Erwärmung bei der Darstellung und die Anwendung eines Aluminiumsulfates, welches von verunreinigenden Salzen möglichst frei ist.

Eigenschaften. Farblose, klare oder opalsirende Flüssigkeit, schwach nach Essigsäure riechend. Beim Vermischen mit dem doppelten Volumen Weingeist darf wohl Opalsiren, nicht aber sofortige Fällung (Gips) entstehen. Schwefelwasserstoffwasser bewirke keine Fällung oder Färbung (Blei, Kupfer, Zink). Werden 10 g der Lösung mit 0,2 g Kaliumsulfat im Wasserbade erwärmt, so tritt Gelatiniren ein, beim Erkalten wird die Flüssigkeit wieder klar. — Beim Aufkochen im Reagensglase trübt sich die Lösung unter Bildung noch basischerer Aluminiumacetate. Aufbewahrung. An einem kühlen Orte in gut verschlossenen Gefässen. Glasstopfen werden leicht eingekittet.

Anwendung. Wirkt antiseptisch und adstringirend. Daher äusserlich zum Verbandschlechte eiternder Wunden (1:5—20 Aqua), bei Gonorrhoe und anderen Ausflüssen, bei Fussgeschwämmen, als Mundwasser (1:80). Technisch zum Konserviren von Leichentheilen, ein rohes Präparat als Beize beim Färben und zum Wasserdichtmachen der Gewebe. Innerlich nur selten und dann in Dosen von 5—10 Tropfen mehrmals täglich, am besten in Syrup.

Liquor Aluminium acetici crudus [Burrow] **Liquor Burrowi**. Rohes Aluminiumacetatlösung. 95 Th. Kali Alaun werden in 700 Th. Wasser gelöst. In die völlig

¹⁾ In der Helv. findet sich hier augenscheinlich ein störender Druckfehler. Es sind 300 g Essigsäure vorgeschrieben, während augenscheinlich verdünnte Essigsäure von 30 Proc. gemeint ist.

erkaltete Lösung trägt man unter Umrühren 154 Th feingepulvertes, rohes Bleiacetat ein. Die Mischung wird unter häufigem Umrühren an einen möglichst kühlen Ort gestellt und nach dem Absetzen filtrirt. Man leitet in das Filtrat Schwefelwasserstoff, filtrirt und lässt die Lösung an einem kühlen Orte in flachen Schalen stehen, bis sich der Geruch nach Schwefelwasserstoff verloren hat (Ergänzb.)

Klare farblose Flüssigkeit, in 100 Th etwa 5 Th Aluminiumacetat neben Kaliumacetat enthaltend. Mit der fünffachen Raummenge Wasser verdünnt, werde sie durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Blei). — 10 g sollen nach Fällung mit Ammoniak etwa 0,125 g Aluminiumoxyd geben.

Anwendung. Zum äußerlichen Gebrauche wie diejenige des inneren Präparates (s. vorher) namentlich auch in der Thierarzneikunde. Man hüte sich bleihaltige Präparate abzugeben!

Collutorium adstringens
Scheiblers Mundwasser
Rp Aluminium sulfuri 10,0
Natrii acetici 12,5
Aqua destillatae 150,0
lasse man unter öftem Umschütteln 18 Stunden lang stehen. Alsdann füge man hinzu
Spiritus 50,0
Olei Menthae piperitae
Olei Salviae $\overline{\text{M}}$ gtt 2
Man mische gut durch, lasse eine Nacht an einem kühlen Orte absetzen, filtrire und mische hinzu
Aqua destillatae 100,0
S Einen Eßlöffel voll auf 1 Glas Wasser zum Ausspülen des Mundes

Unguentum Aluminium acetici
Rp Liquoris Aluminium acetici 40,0
Adipis Lanae 20,0
Unguenti cerei 10,0

Collemplastrum Aluminium acetici
Essigsäure Thonerde—Kautschukpflaster (Dittmar)

Rp Kautschukpflasterkörper 800,0
Rhizomatis Iridis pulv 65,0
Sandaracus 20,0
Aluminium acetici 17,0
Olei resinae 35,0
Aethers 150,0

Bereitung wie Collemplastrum adhaesivum

Injectio adstringens REFORM
Rp Plumbi acetici
Aluminis $\overline{\text{M}}$ 1,0
Aqua destillatae 180,0

Bei Gonorrhoe und anderen entzündlichen Ausflüssen. Die Lösung wird sowohl filtrirt wie unfiltrirt verwendet.

Ein dem Liquor Aluminium acetici (Austr. und Germ.) gleichwerthiges Präparat erhält man *ex tempore* wie folgt. Aluminium subacetici (ATHENSTADT) 150,0 Aqua destillatae 810,0 Acidi acetici diluti (30 Proc) 40,0. In der Kalte unter Umschütteln aufzulösen und nach dem Absetzen zu filtriren. Zur Bereitung des Schweizer Präparates wären 200 g Aluminiumsubacetat anzuwenden.

III Aluminium acetico-tartaricum (Ergänzb.) Essig-weinsäure Thonerde. Also!-ATHENSTADT 100 Th frischbereitete Aluminiumacetatlösung (Germ. III) werden mit 2,5 Th Weinsäure auf dem Wasserbade unter Umrühren eingedampft, bis sich eine Salzkruste bildet. Dann wird die Lösung in dünner Schicht auf Glasplatten gestrichen und bei nicht über 30° C ausgetrocknet.

Farblose, amorphe, durchscheinende, schwach nach Essigsäure riechende, säuerlich adstringierend schmeckende Lamellen, in gleichen Theilen Wasser löslich, unlöslich in Alkohol. Die wässrige Lösung reagirt sauer.

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung 1:2 werde beim Erhitzen nicht gallertartig und scheide basisches Salz nicht aus. 2) Die wässrige Lösung 1:10 werde durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert (Pb, Cu, Zn.) 3) Wird 1 g des Salzes in 20 ccm Wasser gelöst und mit einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt, so sollen zur Röthung nicht weniger als 5 und nicht mehr als 7,5 ccm Normal Kalilauge erforderlich sein.

Anwendung. Wie Aluminiumacetatlösung, vor welcher sie den Vorzug besitzt, dass ihre Lösung basisches Salz nicht abscheidet. Für Mund- und Gurgelwasser = 1—2 100,0, für die Wundbehandlung 1—3 100,0 Wasser, gegen Frostbeulen ist die 50procentige Lösung empfohlen worden.

Aluminium acetico tartaricum solutum. Essigweinsäure Thonerdelösung (Helv.) Durch gelindes Erwärmen werden 3 Th Weinsäure in 74 Th Aluminiumacetatlösung (Helv. spec. Gew. 1,058) gelöst und durch Zusatz von Wasser auf 100 Th gebracht. Diese Lösung enthält 10 Proc. essigweinsäure Thonerde. Spec. Gew. = 1,047. Das gleiche Präparat erhält man durch Auflösen von 3,5 Th Weinsäure in 100 Th Aluminiumacetatlösung. Austr. und Germ.

Aluminium-Kalium aceticum, Alkali-ATHENSTADT, Aluminium-Kaliumacetat $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2\text{K}$ DRP 94851 Diese von ATHENSTADT als Doppelsalze angesehenen Verbindungen sollen entstehen, wenn man die 25 procentige Lösung des basischen Aluminium($\frac{2}{3}$)acetats im Verhältnis $\text{Al}_2(\text{OH})_6(\text{CH}_3\text{CO}_2)_4$ $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{M}$ mit Alkalacetaten zusammenbringt Die Salze sollen auch kristallisiert erhalten werden können und sollen auch bei 105°C keine Essigsäure abgeben

Eine fast genau 10 Proc des obigen Kalisalzes enthaltende Lösung erhält durch Auflösen von 98 Th trockenem Kaliumacetat in 4050 Th des Liquor Aluminii acethici Germ III

Acetonalum, Aluminium-Natriumacetat-ATHENSTADT $\text{Al}_2(\text{OH})_6(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2\text{Na}$ Zur Darstellung der 10 procentigen Lösung des Natrium-Doppelsalzes löst man 82 Th entwässertes Natriumacetat in 4050 Th Liquor Aluminii acethici Germ III

Aluminium chloratum.

I. Aluminium chloratum Aluminiumchlorid Chloraluminium. Salzsäure Thonerde Chlorure d'Alumine Chloride of Aluminium. Al_2Cl_6 Mol Gew = 267

Das reine Präparat wird durch Ueberleiten von trockenem Chlorgas über eine rothglühende Mischung von Aluminiumoxyd und Kohle erhalten

Farblose kristallinische Massen, an der Luft Dämpfe von Salzsäure ausstossend und Wasser anziehend Das technische Präparat stellt ein kristallinisches, meist durch Eisenchlorid etwas gelb gefaßtes Pulver dar Beide werden pharmaceutisch nicht verwendet, dagegen — namentlich das letztere — in der organischen Synthese als Kondensationsmittel nach der FRIEDL-CRAFTS'schen Reaktion Es wird meist in verlötheten Blechbüchsen in den Handel gebracht und wird vor Feuchtigkeit gut geschützt aufbewahrt Die 8 procentige Lösung ist als Desinfektionsmittel für Latrinen, Stallungen und Schiffe von GANZEN empfohlen worden

Die Erwähnung an dieser Stelle geschieht lediglich aus dem Grunde, weil gewisse Chloraluminium enthaltende Roh-Präparate von England und Amerika aus als Desinfektionsmittel empfohlen werden

II Liquor Aluminii chlorati Chloraluminiumlösung Flüssige salzsäure Thonerde Chlor-Alumlösung Diese Lösung wird von einigen Aerzten als Zusatz zu Verbandwassern verordnet

Bereitung. Man löse 100 Th rohes Aluminiumsulfat in 150 Th warmem destillirten Wasser und versetze diese Lösung mit einer gleichfalls heissen Lösung von 100 Th technischem Baryumchlorid in 200 Th destillirtem Wasser Man läßt absetzen, filtrirt und wäscht nach, bis das Filtrat 400 Th beträgt

Diese Lösung enthält rund 10 Proc wasserfreies Aluminiumchlorid und wird in Verdünnungen von 15—30,0 1 Liter Wasser als Verbandwasser benutzt

Chlor-Alum Chloralum(?) Nicht zu verwechseln mit Chloral! Präparat der Chlor-Alum Co in England zur groben Desinfection von Schlachthäusern, Latrinen, Ställen, Eisenbahnwagen, Schiffen, ist eine durch Blei, Kupfer, Eisen, Kalk verunreinigte Auflösung von 20 Th Aluminiumchlorid in 80 Th Wasser und kann durch Auflösen unreiner Thonerde in rauchender Salzsäure oder durch Umsetzen von rohem Aluminiumsulfat mit Calciumchlorid gewonnen werden

Chlor-Alumpulver. Chloralum-Powder der Chlor Alum Co in England, ist ein zur groben Desinfection (s vorher) bestimmtes Pulver, welches durch Einwirkung von rauchender Salzsäure auf Thon hergestellt worden ist

Aluminium oleincum.

Aluminium oleincum Alumina oleinica. Thonerdesoife. Alaunerdesoife. 28,4 g gepulverte, trockene, spanische Seife wird mit 150 g destillirtem Wasser zu einem gleichmässigen Brei angerührt, dann erwärmt man mit mehr Wasser bis zur völligen Auf

lösung und bringt die erkaltete Flüssigkeit auf 500 cem Diese Lösung vermischt man mit einer Auflösung von 15,6 g Kali-Alaun in 1000 cem Wasser, erwärmt die Mischung, bis sich das Aluminiumsulfat ausscheidet, giesst die wässrige Flüssigkeit ab und wäscht das Aluminiumsulfat zweimal mit je 1000 cem warmem destillirtem Wasser Ausbeute 25,9 g

Helle, transparente, firnissartige Masse, in Terpentinöl löslich Diese Lösung soll besonders zum Ueberziehen metallener Gegenstände dienen Zeugstoffe, welche man zuerst mit Aluminiumsulfatlösung tränkt und dann durch ein Seifenbad gehen lässt, werden infolge Bildung von Thonerdesoife wasserdicht

Aluminium sulfuricum.

Aluminium sulfuricum (Austr Germ Helv) **Sulfate d'alumine** (Gall) **Alumini Sulphas** (U-St) **Alumina sulfurica**. **Aluminiumsulfat**. **Thonerdesulfat**. Schwefelsaure Thonerde $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 18\text{H}_2\text{O}$.¹⁾ Mol. Gew. = 666

I Aluminium sulfuricum crudum **Alumina sulfurica cruda**. **Rohes Aluminiumsulfat** oder **Thonerdesulfat** **Konzentrirter Alaun**. **Alaun concentratum**. Wird in den Preislisten der Drogisten gewöhnlich als „*Aluminium sulfuricum*“ schlechthin aufgeführt Weisse oder gelblichweisse krystallinische Massen, in der Regel 2 cm dicke Platten In 1,5—2 Th Wasser zu einer sauer reagirenden Flüssigkeit löslich Wird im Grossen meist aus Kiyolith-Thonerde dargestellt In der Veterinärpraxis, zu Baden und Thonerde-Präparaten häufig dem Alaun vorgezogen 75 Th entsprechen = 100 Th Alaun

Prüfung Dieses Rohprodukt enthält durchschnittlich 50 Proc wasserfreies Aluminiumsulfat oder 14—15 Proc Aluminiumoxyd, 33—36 Proc Schwefelsäure, 1—4 Proc Kalium oder Natriumsulfat Für gewisse Verwendungen in der Technik soll es keine freie Schwefelsäure enthalten (Färberei, Papierfabrikation) Man prüft auf diese wie folgt 1) Man löst 10 g des Salzes in 40 cem Wasser, fügt 0,05 g Ultramarin hinzu und schüttelt gut durch Ist nach $\frac{1}{2}$ Stunde Entfärbung des Ultramarins nicht eingetreten, so ist freie Säure abwesend Oder 2) man versetzt die 5procentige Lösung mit einigen Tropfen Blauholztinktur oder Hämatoxyllösung Es soll nach einigen Minuten eine violettrothe, nicht aber eine braunlich gelbe Färbung auftreten Oder 3) man schüttelt das gepulverte Salz mit absolutem Alkohol, welcher nur die freie Säure aufnimmt — Das für pharmaceutische Präparate benutzte Präparat soll völlig frei von Eisen sein Man prüft auf dieses a) durch Versetzen der wässrigen Lösung mit Gallapfeltinktur, welche keine schwarzblaue Färbung erzeugen soll b) Durch Versetzen der mit Salzsäure angesäuerten Lösung einerseits mit Ferrocyankalium, andererseits mit Ferricyankalium Keins dieser Reagentien darf Blaufärbung verursachen

Das von den Pharmakopoen aufgenommene Aluminiumsulfat ist eine eisenfreie, raffinierte, technische Sorte

II Aluminium sulfuricum purum **Reine krystallisirte schwefelsaure Thonerde**. In den Preislisten der Drogisten als „*Aluminium sulfuricum purissimum levissimum*“ notirt, wird durch Umkrystallisiren des technischen Präparates aus siedendem Wasser dargestellt

Eigenschaften Weisse, atlastglänzende, spec leichte, kleine, locker übereinander liegende schuppen- oder lamellenformige, nicht hygroskopische Kryställchen, bisweilen auch ein leichtes krystallinisches Pulver Löslich in 1,5 Th Wasser zu einer sauer reagirenden, anfangs stichlich, später stark styptisch schmeckenden Flüssigkeit Die wässrige Lösung ist wegen Anwesenheit kleiner Mengen basischen Sulfates in der Regel nicht ganz klar

Prüfung 1) Auf freie Schwefelsäure und auf Eisen wie das vorige Auf Metalle (Blei, Kupfer, Zink) in der sauren und in der mit Kalilauge im Ueberschuss ver-

¹⁾ Die U St Pharmakopöa führt als Formel $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 16\text{H}_2\text{O}$ an

setzen alkalischen Lösung durch Schwefelwasserstoff 2) Auf Alkalisulfate Man löst 2 g des Salzes in 120 ccm Wasser, fällt in der Wärme mit Ammoniak, erwärmt, bis die Flüssigkeit nicht mehr nach diesem riecht und filtriert Das Filtrat wird in einer Platinschale verdampft und der Rückstand gegluht Es darf nur ein höchst unbedeutender (0,01 g = 0,5 Proc nicht übersteigender) feuerbeständiger Rückstand hinterbleiben

Anwendung. Es hat die nämlichen antiseptischen Wirkungen wie Alaun (s diesen). Aeusserlich zum Verbandschlechte eiternder Wunden (1 20—100,0), gegen Gonorrhoe, Vaginalausfluss (1,0 100,0) Innerlich mehrmals täglich 0,02—0,2 g in schleimigen Getränken

Die technische Anwendung (des rohen Präparates) ist eine sehr ausgedehnte, z B wird es benutzt zum Leimen des Papiers, zur Herstellung von Thonerdeboizen in der Farberei und Druckerei, als Ausgangsmaterial für Thonerde-Fillparate Die wässrige Lösung dient (als Injektion) zur Konservierung von Leichen In kleinen Mengen, allein oder mit Karbolsäure kombiniert, dem Kleister (oder der Schlichte) zugesetzt, verhindert es Schimmelbildung und Faulniss Zur Reinigung von Abwässern benutzt man 0,5—1,0 g pro 1 Liter Wasser mit oder ohne Zusatz von Aetzkalk

Putzmittel für vergoldete Bronze Eine Lösung von 10 g Aluminiumsulfat in 50,0 roher Salpetersäure (1,2 spec Gew) und 250 g Wasser

III Liquor Aluminii sulfurici basici (subsulfurici) Alumina sulfurica basica soluta. Thonerdesubsulfatlösung. Solution de Sulfate d'Alumine bibasique.

Darstellung 100 Th rohes, aber eisenfreies Aluminiumsulfat werden in 2000 Th destillierten Wassers gelöst und mit einem geringen Ueberschuss (etwa 180 Th) Ammoniakflüssigkeit (0,96) versetzt Der Niederschlag wird nach eintägigem Stehen in einem Colatorium gesammelt, nochmals mit viel Wasser angerührt, wiederum auf ein Colatorium gebracht, mit destilliertem Wasser ausgewaschen und noch feucht in eine Porzellanschale gebracht Man giebt 150 Th reines krystallisiertes Aluminiumsulfat dazu und dunstet im Wasserbade so lange ein, bis das Gesamtgewicht = 1500 Th entspricht

Eigenschaften. Weisslich-trübe, sauer reagirende, stark styptische Flüssigkeit, welche in der Ruhe Thonerdehydrat absetzt, daher vor dem Gebrauche umzuschütteln ist Man nimmt an, dass die Lösung das basische Aluminiumsulfat $3\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{Al}_2(\text{OH})_6$ enthält

Anwendung. Antisepticum und Adstringens wie das Aluminiumsulfat und der Alaun, aber milder als diese wirkend Zum Gebrauche mit der 10fachen Menge Wasser zu verdünnen

Liquor aluminosus benzoicus MENTEL Soluté alumineux benzoiné MENTEL MENTEL'sche Lösung Die mit Benzoeharz behandelte Lösung des basischen Aluminiumsulfates sub III

Darstellung Man mischt 10 Th gepulverte Benzoe mit 10 Th Weingeist, digerirt $\frac{1}{2}$ —1 Stunde Dann setzt man 60 Th siedendes Wasser hinzu, digerirt $\frac{1}{2}$ Stunde im Wasserbade und vermischt die erkaltete Masse unter Zerreiben in einem Möser mit 1500 Th basischer Aluminiumsulfatlösung (sub III) Man lässt einige Stunden stehen und filtrirt alsdann

Anwendung Als desinfectirendes und blutstillendes Mittel mit der 10—20fachen Menge Wasser verdünnt wie das Aluminiumsulfat

Liquor aluminosus benzoico-carbolicatus BRUNNEN Eine Mischung von 100 Th Liquor aluminosus benzoicus MENTEL mit 3 Th reiner Karbolsäure Mit 10—20 Th Wasser verdünnt wie die vorigen als Adstringens und Desinfectans

Aqua aluminosa

Rp Aluminii sulfurici 1,0
Aque desstillatae 100,0
Zu Injektionen, Augenwässern, Waschungen
wunder Hautstellen.

Aqua styptica WEBER

Rp Aluminii sulfurici
Ferr sulfurici cryst. aa 10,0
Aque desstillatae 100,0
Acidi sulfurici diluti (1,118) 1,0
Zum Stillen des Blutes von Wunden

Collyrium aluminoso-plumbicum

Eau de la Duchesse de Lamballe.
Rp Aluminii sulfurici 1,0
Plumbi acetici 0,6
Aque Rosae 250,0

§ Augenwasser, vor dem Gebrauche umzuschütteln

Collyrium aluminosum.

Rp Aluminii sulfurici 1,0
Aque Rosae 100,0

Gargarisma adstringens BENNATI**Gargarisma aluminosum**

Rp Aluminii sulfurici 10—15,0

Decocti Hordei perlati 500,0

Sirupi Papaveils 50,0

Zum Gurgeln bei Heisigkeit, Stimmlosigkeit.

Infectio aluminosa RIGORI

Rp Aluminii sulfurici 15,0—50,0

Aque communis 1000,0

Bei Uterinblorrhagien, Vaginitis

Liquor Chlorali aluminosus BOUCHERON

Rp Aluminii sulfurici 5,0

Chlorali hydrati 3,0

Aque destillatae 100,0

Bei Otorrhoe fünfmal täglich in das Ohr einzutropfen

Solutio Aluminis et Zinci sulfurici**Solutio de Sulfate d'Alumine et de Zinc**

Rp Aluminii sulfurici 60,0

Aque destillatae 40,0

Zinci oxydati 6,0

Man löst durch Digiren und filtrirt Sp G = 1,85

Wird wie die METZNIsche Lösung, aber auch zur

Konservierung von Leichen verwendet.

Antibacterin des Ingenieurs STIER in Zwickau, ist eine Mischung von Aluminiumsulfat mit Russ

LENK & LEUNIG'sches Desinfektionsmittel ist eine Lösung von Aluminiumsulfat und Alaun, mit kleinen Mengen Zinkchlorid, Soda und Ferrichlorid

PLATT'S Chloroides, ein in Amerika viel gebrauchtes Desinfektionsmittel Aluminiumsulfat 170, Zinkchlorid 40,0, Natriumchlorid 55,0, Calciumchlorid 85,0, gelöst in 1000,0 Wasser

Ambra.

Ambra (Eigänz.) **Ambra grisea** **Ambarum**. **Ambra ambrosiaca**. **A. olivacea**. **A. maritima**. **A. vera**. — **Amber**. **Ambergries** **Graue Ambra** **Waldfischdreck**. — **Ambre gris** — **Amber gris**.

Ambra ist eine thierische Substanz, deren Entstehung nicht ganz sicher ist, die aber sicher vom Potwal **Physeter macrocephalus L** stammt. Man findet sie in Klumpen bis zu 10 kg Gewicht zwischen den Wendekreisen auf dem Meere schwimmend oder am Strande, oder im Darm getödteter Wale. Man nimmt an, dass es verhärtete, unvollkommen verdaute Speisereste sind, die vorwiegend von Cephalopoden, die dem Wal zur Nahrung dienten, stammen. Für diesen Ursprung sprechen die gewöhnlich darin vorhandenen hornartigen, papageischnabelartigen Kiefer dieser Thiere, deren Vorhandensein für ein Zeichen der Echtheit der Droge gehalten wird.

Ambra bildet graue, concentrisch geschichtete Massen von zäher, wachsartiger Konsistenz, die nach längerer Zeit in der Hand erweichen, in kochendem Wasser schmelzen und mit heller Flamme unter Hinterlassung einer geringen Menge Asche verbrennen. Spec Gew um 0,9. Geruch schwer zu beschreiben, entfernt an Moschus erinnernd.

Bestandtheile. Besteht zum grössten Theile (bis 85 Proc) aus **Ambrain**, **Ambrafett**, einer in Alkohol und Aether löslichen, in zarten weissen Nadeln krystallisirenden, bei 36° C schmelzenden Substanz, die dem Cholesterin ähnlich ist.

Fand früher Verwendung als Stimulans und Aphrodisiacum, wird gegenwärtig fast nur noch in der Parfümerie verwendet.

Einkauf, Aufbewahrung. Bei dem hohen Preise des Ambers — im Jahre 1888 kostete (nach SCHIMMEL's Bericht) das Kilogramm 3800 Mark — ist derselbe manchen Verfälschungen ausgesetzt. Man kaufe ihn deshalb nur von zuverlässigen Geschäftshäusern und bewahre den Vorrath in wohlverschlossenen Gefässen an einem kühlen, aber trockenen Orte auf.

Amber lässt sich schwer pulvern, zur Bereitung von Tinkturen zerschneidet man ihn in kleine Stücke und verreibt ihn dann mit einer gleichen Gewichtsmenge Milchzucker. Die Auszüge gewinnen durchs Alter, es empfiehlt sich daher, sie für Parfümeriezwecke erst nach 1—2 Jahren in Gebrauch zu nehmen.

Tinctura Ambrae
 Ambra-Tinktur Teinture d'ambre
 Tincture of amber
 Rp Ambrae 3,0
 Sacchari Lactis 2,0
 Spiritus aetherei 100,0

Tinctura Ambrae cum Moscho
 Tinctura Ambrae moschata Moschus-
 Ambra-Tinktur
 Rp Ambrae 3,0
 Moschi 1,0
 Sacchari Lactis 3,0
 Spiritus aetherei 150,0

Beide Tinkturen durch ständige Maceration zu bereiten. Aus den Rückständen gewinnt man mit Spiritus (90 Proc.) Auszüge, welche als Zusatz zu Spiritus Coloniensis verwendet werden.

Ambra Essenz DIETERICH
 Rp Ambrae 0,5
 Moschi 0,02
 Vanillin 0,1
 Cumarini 0,05
 Olei Iridis gtt 1
 Olei Rosae 0,5
 Essentiae Jasmini tripl. 50,0
 Spiritus 150,0

Ambra und Moschus werden mit etwas Wasser verrieben, bevor der Spiritus zugefügt wird.

Bouquet d'Ambre ASKINSON
 Rp Ambrae 15,0
 Moschi 2,0
 Essentiae Rosae 250,0
 Tincturae Vanilla 60,0
 Spiritus 675,0

Bouquet d'Ambre DIETRICH
 Rp Ambrae
 Olei Rosae aa 2,5
 Vanillin 0,5
 Essentiae Jasmini 250,0
 Moschi 0,1
 Olei Iridis gtt 5
 Cumarini 0,25
 Spiritus 750,0

Eau de Lavande ambrée BUCHHEISSER
 Rp Olei Lavandulae 80,0
 Spiritus (90 Proc.) 810,0
 Tincturae Ambrae 60,0
 Aquae destillatae 100,0

Guttae antemeticae WALTZ

Rp Tincturae Ambrae 5,0
 Tincturae aromaticae acidae 10,0
 Mehrmals täglich 20–30 Tropfen mit Ikkör

Linctus antispasmodicus SCHNEIDER

Rp Tincturae Ambrae cum Moscho 2,0
 Aquae Aurantii Florum 35,0
 Sirupi Papaveris 12,0

3. Pastilli Ambrae Mundpastillen

Rp Ambrae 0,5
 Moschi 0,05
 Styriaci 1,0
 Corticis Cinnamomi 1,5
 Seminis Cardamomi 0,5
 Rhizomatis Zingiberis 1,0
 Olei Aurantii Florum 0,1
 Tiagacanthae 0,02
 Sacchari 50,0

Mit Hilfe von Glycerin Pastillen von je 0,5 g schwere zu formen. Zum Wohlriechendmachen des Athems.

Riechklassen (Sachets)

Rp Rhizomatis Iridis
 Florum Rosae aa 250,0
 Florum Lavandulae
 Kirsch Scirpili
 Corticis Cinnamomi
 Benzoes aa 50,0
 Caryophyllorum 5,0
 Albedinis fruct Aurantii 800,0

Mit Parabouquet, Millefleurs etc zu parfümieren.

Tinctura Ambrae kalina HOFFMANN

Rp Ambrae
 Kali carbonici aa 1,0
 Spiritus diluti (68 Proc.) 10,0
 Olei Rosae gtt 1

Tinctura Ambrae MINDEN

Rp Ambrae 1,5
 Moschi 0,15
 Aquae Amygdalinum amari
 Tincturae aromaticae aa 30,0

Diabolus stimulans
 in französischen Vorschriften sind Pastillen aus Ambra, Moschus und Gewürzen mit Zucker.

Ammoniacum.

Ammoniacum (Germ. *Helv. Austr. Brit. U. St.*) **Gummi** s. **Gummi-resina Ammoniacum**. **Gutta ammoniaca**. **Ammoniacum thymianum**. **Lacrimae Ammoniaci**. **Phryama**. **Thraustum**. — **Ammoniakgummi**. **Armenisches G.** **Assach.** **Osbac.** — **Gomme ammoniacque** (Gall.) **Gomme-résine Ammoniacque.** — **Ammoniac.**

Ammoniacum wird gewonnen von **Dorema Ammoniacum** Don, (**Umbelliferae** — **Pencedaneae**), einer bis 2,5 m hohen Staude, heimisch in den vorderasiatischen Steppen, zwischen den westasiatischen Salzseen und Vorderindien. Es scheint, als ob eine absichtliche Verletzung der Pflanze durch Ausschneiden zum Gewinn der Droge nicht stattfindet, sondern man sammelt die ganzen Pflanzen zur Zeit der Fruchtreife und löst das freiwillig ausgetretene Gummiharz ab.

Die Droge kommt meist über Indien (Bombay) nach London.

Sorten. 1) **Ammoniacum in Thriden oder Körnern** (**Ammoniacum in lacrymis seu granis**) Bildet bis nussgroße Körner, die aussen gelblichweiss bis bräunlich, innen

bläulichweiss, in dünnen Splittern etwas durchscheinend sind. In der Kälte spröde, erweichen sie in der Hand wie Wachs.

2) *Ammoniacum amygdaloides* besteht aus mit einander verklebten oder zusammengeflochtenen Körnern. Das zuweilen erwähnte „Lump-Ammoniacum“ ist hiervon nicht verschieden.

3) *Ammoniacum in Kuchen* (*Ammoniacum in massis seu placentis*) Bildet bis 600,0 g schwere Klumpen von dunkler, meist brauner Farbe. Schlägt man ein solches Stück auf, so sieht man, dass in eine dunkle, weiche, mit Pflanzenresten und Erde verunreinigte Grundmasse Körner der Sorte 1 eingebacken sind. Den Anforderungen der Arzneibücher entsprechen nur die beiden ersten Sorten.

Bestandtheile. Die Droge enthält sehr wechselnde Mengen ätherisches Oel, Harz und Gummi. Harz 40–88 Proc, ätherisches Oel 0,25–0,4 Proc, Gummi 12–60 Proc, Asche, rohes A 1,0–10,0 Proc, gereinigtes A 1,0–2,7 Proc. Das Harz enthält den Salicylsäureester eines Resinotannols $C_{18}H_{28}O_2(OH)$. Das ätherische Oel hat das spec Gew 0,891 und siedet zwischen 250 und 290° C. Das Gummi enthält circa 3,5 Proc Asche, es ist wahrscheinlich saures Calciumarabinat. Aether, Amylalkohol, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff lösen nur wenige Procente, mit Wasser zerreiben giebt das Ammoniacum eine weisse Emulsion.

Findet zu pharmaceutischen Zwecken fast nur in gereinigtem Zustande Verwendung.

Ammoniacum depuratum Darstellung. 1) auf trockenem Wege. Durch Pulvern und Sieben bei Winterkälte (Austr.), oder nach vorherigem Trocknen bei höchstens 30° C (Germ.) oder über gebranntem Kalk (Helvet.), hierbei geht ein grosser Theil der Verunreinigungen mit durchs Sieb. 2) auf nassem Wege (wobei das ätherische Oel sich theilweise verflüchtigt). Man erweicht (Gall.) das Gummiharz mit $\frac{2}{3}$ seines Gewichts heissem Wasser, setzt soviel Weingeist zu, dass derselbe mit dem vorhandenen Wasser ein spec Gew von 0,914 ergeben würde, sieht nach dem Absetzen durch und dampft ein, bis die halb erkaltete Masse nicht mehr an den Fingern klebt. — Nach E. DIETRICH werden 1000 Th grob gepulvertes Gummiharz (in Thünnen) mit 250 Th Weingeist von 90 Proc durchgeknetet, nach 12 Stunden auf 50° C erhitzt, mehrere Stunden tüchtig durchgearbeitet, 500 Th Weingeist zugefügt und durch ein feines Messingsieb getrieben, den Rückstand knetet man nochmals bei 90° C, setzt 250 Th Weingeist (bei altem Gummiharz 200 Th) von 68 Proc zu und reibt durch das Sieb. Nach 24 Stunden gresst man die durchgetriebene Masse vom Bodensatz ab und erhitzt im Wasserbade, bis eine Probe sich nach dem Erkalten zerreiben lässt. Ausbeute 70–80 Proc.

Prüfung. Für die Beurtheilung kommt in Betracht

1) Die Bestimmung des Aschengehaltes, der 5 Proc (Ph. helv.) nicht übersteigen soll.
2) Die Bestimmung der alkohollöslichen Bestandtheile, mindestens 70 Proc, da der Werth der Droge durch das Harz und das ätherische Oel, nicht aber durch das unlösliche Gummi bedingt wird. Den in Alkohol unlöslichen Antheil kann man event unter dem Mikroskop auf Stärke prüfen. Geringe Mengen sind, als aus der Mutterpflanze herrührend, nicht zu beanstanden.

3) Für die Beurtheilung des Werthes ist wiederholt versucht worden, die Säure und Verseifungszahl zu benutzen, indessen haben die bisherigen Resultate wenig Uebereinstimmendes.

a Die Säurezahl. Nach DIETRICH übergiesst man in einem Kolben 0,5 g Ammoniacum mit etwas Wasser und leitet Wasserdämpfe durch, wobei durch Erhitzung des Kolbens Sorge getragen wird, dass sich nicht zu viel Wasser condensirt. Die Vorlage enthält 40 ccm $\frac{1}{2}$ N Kalilauge, das aus dem Kühler kommende Rohr taucht in sie ein. Man destillirt 500 ccm über und titrirt den Inhalt der Vorlage unter Verwendung von Phenolphthalein mit Säure zurück. Die Menge der gebundenen Kubikcentimeter KOH werden mit 28 multiplicirt und ergeben so die Säurezahl. DIETRICH erhielt 150–200.

b Harz- und Verseifungszahl. Zweimal je 1 g Ammoniacum zerreibt man und übergiesst mit je 50 ccm Petrolbenzin (spec Gew 0,7), fügt je 25 ccm $\frac{1}{2}$ N alkohol Kal-

lauge zu und lässt unter öfterem Umschütteln in 1 Literflaschen 24 Stunden stehen. Dann fugt man der einen Probe 500 cem Wasser zu und titirt mit $\frac{1}{10}$ N-Schwefelsäure und Phenolphthalein zurück. Die gebundenen Kubikcentimeter KOH mit 28 multiplicirt geben die Harzzahl. DIETTERICH erhielt 99,4—155,4.

Der zweiten Probe setzt man noch 25 cem $\frac{1}{10}$ N wasserige Kalilauge und 75 cem Wasser zu, lässt unter Umschütteln noch 24 Stunden stehen, verdünnt dann mit 500 cem Wasser und titirt wie oben zurück. Die gebundenen Kubikcentimeter KOH mit 28 multiplicirt geben die Verseifungszahl. DIETTERICH erhielt 145,6—162,4. Die Differenz beider Zahlen bezeichnet DIETTERICH als Gummizahl.

4) Da Ammoniacum mit Galbanum vermischt vorkommen soll, so ist darauf zu prüfen, frisch durchgeschlagene Körner sollen sich mit Salzsäure und Salpetersäure nicht roth oder violett färben, auch nicht beim Kochen. Filtrirt man dann die Salzsäure ab und übersättigt mit Ammoniak, so darf keine Fluorescenz von Umbelliferon, die auf Galbanum deutet, eintreten.

Dagegen färbt Ammoniacum concentrirte Schwefelsäure blutroth, und gesättigte Chlorkalklösung orangeroth.

Anwendung. Innerlich als Expectorans bei chronischen Bronchialkatarrhen, wenn kein Fieber vorhanden, ferner als Emmenagogum. Aeusserlich zu reizenden, zertheilenden, maturirenden Pflastern bei Abscessen, Drüsenanschwellungen etc.

Aufbewahrung. Das gereinigte Ammoniacum wird an einem kühlen, trockenen Orte in Pergamentpapier oder Pappkastchen, am besten über Aetzkalk, aufbewahrt, um das Zusammenbacken zu verhüten, dieses ist übrigens seiner Verwendung zu Pflastermassen keineswegs hinderlich.

Emplastrum Ammoniaci (Germ. I)
 Rp (1) Ammoniaci depur 8,0
 (2) Galbani depur 2,0
 (3) Terebinthinae 4,0
 (4) Cerae flavae 4,0
 (5) Resinae Pini Burgund 4,0
 1—5 werden im Dampfbade geschmolzen und halberkaltet einer halberkalteten Mischung aus 4 und 5 zugesetzt.

Emplastrum Ammoniaci camphoratum
 Braunes Milchertheilungspflaster.

Rp Emplastri Plumbi comp 100,0
 Emplastri oxycroci 50,0
 Cerati Resinae Pini 10,0
 Aloë pulveratae 5,0
 Camphorae 5,0

Emplastrum Ammoniaci EYER
 EYER'sche Pflastermasse.

Rp Ammoniaci depurati 200,0
 Aceti Scillae q s

Man bereite im Dampfbade eine weiche, pflasterartige Masse.

Mixtura Ammoniaci (Brit)
 Ammoniacum Mixture

Rp Ammoniaci 5,0 g
 Sir bals toluian 10,0 cem
 Aquae 150,0 cem

Emulsio (seu Lac) Ammoniaci
 Rp Ammoniaci via humida dep 10,0
 Gummi arabici 5,0
 Aquae 10,0
 Aquae 75,0

Mixtura antasthmatica BRUNER

Rp Ammoniaci 10,0
 Vinz albi 75,0
 Aquae Tillae 150,0

Pilulae antasthmaticae QUERN
 Rp Ammoniaci 10,0
 Sulfuris depurati 5,0
 Opii pulverati 0,25
 Extracti Dulcamarae q s
 fiant pilulae 200

Pilulae balsamicae Augustinorum
 Rp Ammoniaci 8,0
 Extracti Myrrhae 4,5
 Extracti Marrubii 1,5
 Succl Liquiritiae q s
 fiant pilulae 100

Sirupus Ammoniaci
 Rp Ammoniaci depurati 5,0
 Sacchari 50,0
 Spiritus diluti 7,5
 Aquae 25,0
 Im Wasserbade erwärmen, absetzen lassen, kochen.

Tinctura Ammoniaci DIETTERICH
 Rp Ammoniaci 1,0
 Spiritus (30%) 5,0

Vet. Lutum ad ungulam equi
 II. Kitt.

I Rp Ammoniaci
 Guttae-Peachae RÄ
 II, Rp (1) Guttae-Peachae 100,0
 (2) Fuliginis 4,0
 (3) Carbonis sulfurati
 (4) Olei Terebinthinae RÄ 5,0
 (5) Ammoniaci pulv 60,0

Man erwärmt 1 in heissem Wasser, mischt im erwärmten Mörtel 2—4 und reibet 5 zu.

III Rp Emplastri Plumbi comp 100,0
 Cerae flavae 20,0
 Terebinthinae 10,0
 Ammoniaci 50,0
 Carbonis ossium 5,—10,0

Stratena-Kitt (Armenscher Kitt) besteht aus Ammoniacum, Hausenblase u Alkohol.
Amerikanische Asthma-Pillen sind vergoldete Pillen aus Ammoniacum.

Ammonium.

Ammonium. Ammonum. Ammoniacum. Flüchtiges Alkal. Ammoniak.
Ammon. Ammoniaque. Ammonia. NH_3 . Mol. Gew. = 17.

Gewinnung. Die Hauptquelle der Gewinnung des Ammoniaks sind zur Zeit die Steinkohlen, welche etwa 1 Proc. Stickstoff enthalten. Bei der trockenen Destillation der Steinkohlen (in Gasanstalten und Kokereien) erhält man als Nebenprodukt das sog. „Ammoniakwasser“, welches 1–1,5 Proc. Ammoniak enthält. Durch Destillation dieses Ammoniakwassers mit Aetzkalk wird das Ammoniak ausgetrieben und entweder in flüssiges Ammoniak verwandelt, oder durch Auflösen in Wasser gesammelt oder durch vorgelegte Schwefelsäure in Ammoniumsulfat umgewandelt.

I. Gasförmiges bez. flüssiges Ammoniak. Farbloses, stechend riechendes Gas. Spec. Gewicht ($H=1$) ist = 8,5. Ein Liter Ammoniak wiegt bei 0°C . und 760 mm B = 0,7616 g. Wird unter einem Druck von 8,5 Atmosphären bei 10°C . oder unter Normaldruck bei -40°C . zu einer farblosen Flüssigkeit vom spec. Gewicht 0,618 verdichtet, welche bei -75°C . zu einer farblosen Krystallmasse erstarrt. Das flüssige Ammoniak absorbiert beim Verdampfen viel Wärme, erzeugt also Kälte und wird deshalb zur Eisfabrikation nach CLARRÉ angewendet. Das flüssige Ammoniak kann in druckfesten Gefässen (Bomben) zu wohlfeilem Preise durch den Handel bezogen werden. 1 Vol. Wasser löst bei 0°C . = 1050 Vol. NH_3 , bei 15°C . = 727 Vol., bei 20°C . = 554 Vol. NH_3 . Ammoniak-Gas ist auch in Alkohol und in Aether löslich.

II. Wässrige Ammoniakflüssigkeit. Dieselbe wird gegenwärtig ausschliesslich durch Fabriken bereitet. Muss man sie gelegentlich einmal selbst herstellen, so verwandelt man 12 Th. Aetzkalk durch Ablöschen mit 4 Th. Wasser in ein staubiges Pulver und mischt dieses mit 10 Th. Ammoniumchlorid grob durch. Diese Mischung rührt man mit (20 Th.) Wasser zu einem dünnen Brei an und erhitzt diesen in einem geeigneten Entwicklungsgefäss. Das entwickelte Ammoniak wäscht man in wenig Wasser und leitet es schliesslich zur Absorption in kalt zu haltendes Wasser, wobei die Abzugsröhre bis auf den Boden des Gefässes reichen muss. Infolge der Absorption des Gases findet Volumvermehrung der Flüssigkeit statt.

Als Entwicklungsgefäss kann man für kleinere Mengen einen Glaskolben benutzen, für grössere Mengen verwendet man zweckmässig einen PAPIN'schen Topf. Man entfernt aus dessen Deckel das Ventil und setzt in die so geschaffene Oeffnung einen doppelt durchbohrten Kautschukstopfen ein, welcher Sicherheitsrohr und Gasabzugsrohr aufnimmt.

Handelssorten. Die verschiedenen Sorten Ammoniak werden nach dem Gehalt bez. nach dem spec. Gewichte gehandelt. Die wichtigsten sind: 1) *Liquor Ammonii caustici* 0,960 = 10 Proc. NH_3 . 2) *Liquor Ammonii caustici duplex* 0,925 = 20 Proc. NH_3 . 3) *Liquor Ammonii caustici* 0,910 = 25 Proc. NH_3 . 4) *Liquor Ammonii caustici* 0,890 = 32 Proc. NH_3 . Die concentrirten Sorten werden der Frachtersparniss wegen bezogen und durch Verdünnen mit Wasser auf den gewünschten Gehalt gebracht.

Liquor Ammonii caustici (Germ.). *Ammonia* (Aust.). *Ammonium hydricum solutum* (Hely.). *Liquor Ammoniae* (Brit.). *Aqua Ammoniae* (U-St.). Ammoniakflüssigkeit. Ammoniak. Aetzammon. Salmiakgeist. Hirschhorngeist. Ammo-




Fig. 45. PAPIN'scher Topf, in ein Ammoniak-Entwicklungsgefäss umgewandelt.

maque. Ammonia-water Die oben angeführten Pharmakopoen haben durchweg eine Ammoniaklösung von 10 Proc NH_3 aufgenommen, deren spec Gew zu 1,059 bez 1,060 angegeben wird — Farblose, stechend riechende, beim Erwärmen ohne Rückstand flüchtige Flüssigkeit. Aus der Luft zieht sie Kohlensäure an, durch Erwärmen kann der ganze Ammoniakgehalt ausgetrieben werden.

Aufbewahrung Wegen der Möglichkeit der Aufnahme von Kohlensäure aus der Luft in gut verschlossenen Gefässen, und, da Korkstopfen zerstört werden, wobei Braunfärbung der Ammoniakflüssigkeit erfolgt, in Gefässen mit Glasstopfen. Namentlich die konzentrierten Sorten bewahrt man an einem kühlen Orte auf. Grössere Vorräthe thut man bald in Glasstopfen Flaschen von 5—6 Liter ab. Vorsichtige Aufbewahrung wird zwar nicht vorgeschrieben, doch sei man in dieser Beziehung auch nicht fahrlässig! Im Handverkauf werde sie mit einem „Aeusserlich“ signirt abgegeben.

Prüfung. 1) Klare, farblose Flüssigkeit. 20 cem dünnen beim Verdampfen in einer Platinschale von glühbeständigem Rückstand nur eine Spur zeigen, welche meist aus den Aufbewahrungsgefässen stammt. 2) Mischt man 5 cem Ammoniakflüssigkeit mit einer Mischung von 10 cem klarem Kalkwasser und 10 cem kohlensäurefreiem destillirtem Wasser, so darf die Mischung sich auch beim Erwärmen nicht trüben (Ammonkarbonat, Ammonkarbammat). 3) Durch Schwefelwasserstoff werde sie nicht verändert (Blei, Kupfer, Eisen, Zink). 4) Uebersättigt man 5 cem stark mit konc Salpetersäure und dampft im Wasserbade ein, so muss ein weisser Salzrückstand hinterbleiben (Theerbestandtheile wie Anilin, Pyridin, Pyrrol). 5) 5 cem sollen zur Neutralisation (Congo als Indikator) 28,0—28,2 cem Normal-Salzsäure verbrauchen.

Das *Ammoniaque liquide du commerce* und *Ammoniaque liquide officinale* der Gall. enthalten 20 Proc NH_3 und haben das spec Gewicht 0,925.

Liquor Ammoniae fortior der Brit. hat das spec Gew 0,891 = 32,5 Proc NH_3 .
Aqua Ammoniae fortior der U-St. hat das spec Gew 0,901 = 28 Proc NH_3 .

Specifische Gewichte von Ammoniaklösungen bei 15° C.

Nach LUNGE und WIERNIK

Spec Gew bei 16°	Proc NH_3	Spec Gew bei 15°	Proc NH_3	Spec Gew bei 15°	Proc NH_3	Spec Gew bei 15°	Proc NH_3
1,000	0,00	0,970	7,81	0,940	15,63	0,910	24,99
0,998	0,45	0,968	7,82	0,938	16,22	0,908	25,65
0,996	0,91	0,966	8,33	0,936	16,82	0,906	26,31
0,994	1,37	0,964	8,84	0,934	17,42	0,904	26,98
0,992	1,84	0,962	9,35	0,932	18,03	0,902	27,65
0,990	2,31	0,960	9,91	0,930	18,64	0,900	28,33
0,988	2,80	0,958	10,47	0,928	19,25	0,898	29,01
0,986	3,30	0,956	11,08	0,926	19,87	0,896	29,69
0,984	3,80	0,954	11,60	0,924	20,49	0,894	30,37
0,982	4,30	0,952	12,17	0,922	21,12	0,892	31,05
0,980	4,80	0,950	12,74	0,920	21,75	0,890	31,75
0,978	5,30	0,948	13,31	0,918	22,39	0,888	32,50
0,976	5,80	0,946	13,88	0,916	23,03	0,886	33,25
0,974	6,30	0,944	14,46	0,914	23,68	0,884	34,10
0,972	6,80	0,942	15,04	0,912	24,33	0,882	34,95

Anwendung. Innerlich wirkt sie in konc Form ätzend, selbst tödtlich. In starker Verdünnung und in kleinen Gaben wirkt sie excitirend, erregt namentlich das Athemcentrum und vermehrt die Schweisssekretion und die Expektoration. Aeusserlich auf die Haut gebracht wirkt sie reizend, daher in vielen Fällen zu reizenden Einreibungen verwendet. Gegen Insektenstiche, bei denen sie die Säure abstumpft. Als Exortans bei Ohnmächten zum Riechen! Die technische Anwendung ist eine sehr verbreitete. Obgleich allgemein bekannte *Cave*: Das Zusammenbringen von Jod mit Ammoniak wegen der möglichen Bildung des explosiven Jodstickstoff, ferner das Einleiten von Chlor in Ammoniak wegen der möglichen Bildung des explosiven Chlorstickstoff.

III. Liquor Ammonii caustici spirituosus. (Ergänzb.) **Spiritus Ammoniae** (U-St.). **Spiritus Ammonii caustici Dzondii.** **Spiritus Dzondii.** **Dzondischer Salmiakgeist.** Ist ein soweit mit Ammoniak gesättigter Alkohol von etwa 90 Vol-Proc., dass der Gehalt an $\text{NH}_3 = 10$ Proc. ist. Nur von U-St. rezipirt.

Darstellung. Man bringt in einen Glaskolben 1000 Th. doppelten Salmiakgeist (event. die entsprechende Menge einer noch stärkeren Sorte), legt zunächst eine leere Waschflasche vor und schliesst an diese eine Vorlage an, welche 450 Th. Weingeist von 0,820 spec. Gew. enthält. Das Gasabzugsrohr muss bis an den Boden der Vorlage reichen; auch ist es zweckmässig, die Flüssigkeit zu kühlen. Man erwärmt nun den den Salmiakgeist enthaltenden Kolben vorsichtig und geht — um die Verdampfung von Wasser zu




Fig. 45.

vermeiden — nicht über 50° – 60° C. hinaus. Man leitet solange ein, bis das Volum der Flüssigkeit etwa 620 cem beträgt. Dann stellt man das spec. Gewicht sowie den Ammoniakgehalt durch Titriren mit Normal-Säure fest und stellt auf einen Ammoniakgehalt von 10 Proc. entweder durch Verdünnen mit Alkohol von 0,820 oder durch fortgesetztes Einleiten von Ammoniak ein.

Eigenschaften. Der Dzond'sche Salmiakgeist gleicht in seinen Eigenschaften der wässrigen Ammoniakflüssigkeit, nur ist er noch flüchtiger und wirkt stärker reizend. Das spec. Gewicht ist nach U-St. = 0,810. Gehaltsbestimmung: 5 g sollen nach dem Verdünnen mit Wasser bei Benutzung von Rosolsäure als Indikator, 29,4 cem Normal-Salzsäure zur Neutralisation erfordern. Auf Verunreinigung ist wie bei der wässrigen Ammoniakflüssigkeit zu prüfen.

Aufbewahrung. In Glasgefäßen mit Glasstopfen, an einem kühlen Orte. Anwendung äusserlich zu reizenden Einreibungen.

IV. Liquor Ammonii vinosus. Spiritus Salis ammoniaci vinosus der älteren Pharmakopöen war eine Mischung aus 1 Th. Liquor Ammonii caustici (0,960) mit 2 Th. Spiritus (0,829). Er wird heute kaum noch verordnet.

Chemie und Analyse. A. Nachweis. Ammoniak in freiem Zustande erkennt man am stechenden Geruche und daran, dass es bei Annäherung eines mit Salzsäure befeuchteten Glasstabes Nebel bildet, ferner, dass es feuchtes rothes Lackmuspapier bläut. Indessen kommen alle drei Reaktionen auch anderen flüchtigen (organischen) Basen zu. Weiterhin: Feuchtes Mercurnitratpapier wird geschwärzt, feuchtes Kupfersulfatpapier wird gebläut. Nessler'sches Reagens giebt sowohl mit freiem als auch mit gebundenem Ammoniak einen braunrothen Niederschlag. Liegt das Ammoniak im gebundenen Zustande,

also als Salz vor, so kann man es durch Erhitzen der wässrigen Lösung mit stärkeren Basen (Kali- oder Natronlauge, Kalkmilch, frisch geprühlter Magnesia) antreiben und alsdenn als freies Ammoniak (s. vorher) nachweisen. Ferner kann man in der wässrigen Lösung den Nachweis direkt mit Nessler'schem Reagens führen.

B. Bestimmung Liegt das Ammoniak im freien Zustande vor und sind andere Basen nicht zugegen (wie z. B. bei der Gehaltsbestimmung des Salmiakgeistes), so kann man direkt mit Normal-Schwefelsäure oder Normal-Schwefelsäure titrieren. 1 cem Normal-Säure entspricht = 0,017 g NH_3 . Als Indikator benutzt man Rosolsäure, Methylorange, am zweckmässigsten Congo, nicht aber Phenolphthalein. — Liegt dagegen das Ammoniak in gebundenem Zustande vor, so bringt man eine gewogene oder gemessene Menge in einen




Fig. 47. Destillationsapparat zur Bestimmung des Ammoniaks.

Destillirkolben, fügt eine hinreichende Menge Wasser sowie einen Ueberschuss einer stärkeren Base, z. B. frisch ausgeglühte Magnesia, hinzu, legt eine überschüssige, gemessene Menge Normal-Schwefelsäure vor und destillirt nunmehr $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ der Flüssigkeit ab. Als Apparat kann man den hier skizzirten benutzen. Kühlung durch die Luft genügt. Wesentlich ist aber, dass die benutzten Glasröhren kein Alkali an Wasserdampf abgeben. Nach beendeter Destillation spritzt man das Destillationsrohr ab, wäscht es mit etwas Wasser nach und titrirt den Ueberschuss der Schwefelsäure mit Normal-Natronlauge oder mit Normal-Ammoniak zurück. Natürlich muss zum Einstellen und zum Titrieren der gleiche Indikator verwendet werden (s. vorher).

In beifolgender Figur ist A der Zersetzungskolben. An diesen schließt sich der Destillationsaufsatz B an, welcher mit dem zweimal gebogenen Glasrohr CD von 0,7 cmichter Weite verbunden ist, welches bei C absichtlich schräg nach aufwärts gebogen ist. E ist eine kugelförmige Erweiterung des Abzugesrohres, um das Zurücksteigen der Flüssigkeit nach A zu verhindern. Das Ende F ist entweder schräg abgeschnitten oder wie angedeutet mit Buchungen versehen. Es braucht übrigens eben nur in die vorgelagte Flüssigkeit einzutauchen.

Man kann auch das entwickelte Ammoniak in vorgelegter Salzsäure auffangen, die Lösung mit Platinehlorid eindampfen und das sich ergebende Ammoniumplatinehlorid oder das durch Glühen desselben hinterbleibende Platin wägen $\text{PtCl}_5(\text{NH}_4)_2 > 0,07657 = \text{NH}_3$ und $\text{Pt} < 0,17436 = \text{NH}_3$. Vergl. unten Kalium und unter Platin.

Balsamum Billinger. Gegen Rheumatismus und Gicht 25 g Sapo viridis, 40 g Aqua, 10 g Spiritus, 10 g Spiritus camphoratus, 20 g Liquor Ammonii caustici, 5 g Tinctura Capsici.

Idiaton. Mittel gegen Schmerz äußerer Zähne Von Dr. Breslauer Mastix, Oleum Terebinthinae, Spiritus Dzondi aa 2,0, Chloroform 15,0.

Restitutionsfluid der Gebr. ENGELS, Berlin und Wriezen a/O Tinct Capsici 50,0, Spiritus camphoratus, Liquor Ammonii caust (0,96), Spiritus aethereus, Spiritus je 115,0, gemischt mit einer Lösung von 85,0 Kochsalz in 500,0 Wasser.

SEPR'S Ammoniakflüssigkeit gegen Blähsucht der Rinder und Schafe Liquor Ammonii caustici 85,0, Aqua 1400,0 Rindern auf einmal, Schafen den $\frac{1}{4}$ Theil.

Tympanit Essenz von SIMONS-GRUVEN Liquor Ammonii caustici (0,96) 40,0, Liquor Ammonii anisatus 15,0, Tinctura Aloës 15,0, Spiritus 50,0 Mit $\frac{1}{4}$ Liter Wasser den $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Theil einzugrößen.

Aqua cosmetica LUCÉ

Eau cosmétique de LUCÉ

Rp Mixturae oleosae balsamicae

Liquoris Ammonii caustici

Spiritus odorati aa 100,0

Filtrirt als Zusatz zum Waschwasser Auch gegen Insektenstiche

Aqua anodyna Pragensis.

Rp Liquoris Ammonii caustici spiritusosi 150,0

Tincturae Croci 80,0

Olei Lavandulae 2,0

Spiritus Lavandulae 100,0

Zum Einreiben bei chronischem Rheumatismus

Aqua sedativa RASPAI (Helv, Ergänzb)

Eru sédative (Gall) Lotion ammoniacale

camphrée RASPAI's beruhigendes Wasser

E B Helv Gall

Rp Natrii chlorati 60,0 60,0 60,0

Aquae 1000,0 880,0 940,0

Spiritus camphorati 10,0 10,0 10,0

Liquoris Ammonii

caustici (0,96) 60,0 100,0 120,0

Vor dem Gebrauche umzuschütteln, damit befeuchtete Kompressen bei Kopfschmerz, Rheumatismus aufzulegen

Balsamum ammoniacatum camphoratum

RASPAI

Rp Liquoris Ammonii caustici 400,0

Spiritus camphorati (Germ) 100,0

Spiritus (0,83) 200,0

Salis culinaria 2000,0

Das mit der Flüssigkeit gemischte Salz wird einem Vollbade zugesetzt Bei Rheumatismus, Paralyse

Linimentum ammoniatum Linimentum Ammoniae Liniment volatile.

	Anstr	Helv	Germ	Gall	Brit	U-St
Rp Olei Olivarum	4,0	8,0	3,0	—	8,0	—
Liq Ammonii caust. (0,98)	1,	1,0	1,0	1,0 (20 %)	1,0	8,5
Olei Papaveris	—	—	1,0	—	—	—
Olei Amygdalarum	—	—	—	9,0	—	—
Olei Gossypii	—	—	—	—	—	6,0
Spiritus	—	—	—	—	—	0,5

Linimentum antirheumaticum Americanum

Mustang Liniment

Rp Liquoris Ammonii caustici (10 Proc)

Spiritus (90 Proc) aa 200,0

Petrolei 25,0

Zum Einreiben bei Rheumatismus etc

Liquor Ammonii anisatus

	Anstr	Germ	Helv
Rp Olei Anisi	1,0	8,0	—
Spiritus (90 Proc.)	24,0	77,0	—
Liq Ammonii caustici (0,98)	5,0	20,0	—

Emplastrum PAVOR LARONET

Rp Liquoris Ammonii caustici (0,925) 5,0

Camphorae 10,0

Opii puri 7,5

Croci

Gummi Ammoniaci aa 5,0

Emplastri gummosi 10,0

In dicker Schicht auf Leinwand gestrichen zum Auflegen auf Leichdornen

Essentia volatilis

Essence of smelling-bottles Anglorum.

Englischer Riechfläschchen-Geist.

Rp Olei Lavandulae 10,0

Olei Bergamottae 20,0

Olei Caryophyllorum

Olei Cassiae Cinnamomi

Tincturae Moschi aa 5,0

Olei Rosae gtt 10

Spiritus Dzondii

Liquoris Ammonii caustici (0,925) aa 250,0

Gaseolum Guérol

Rp Liquoris Ammonii caustici (0,925) 1000,0

Acetoni

Benzoni Nithanthracini aa 10,0

Naphthalini 1,0

Petis liquidae Nithanthracinae 100,0

Acidi carbonici 10,0

Unter Umschütteln digeriren, nach 8 Tagen abgessen In flachen Gefäßen im Wohnzimmer der an Keuchhusten Leidenden aufzustellen Dr. MAHLBAUM und BURIN DU BUISSEON

Liquor Ammonii aromaticus (Hamb Vorschr)

Liquor oleosus SYLVII Sal volatile

oleosum SYLVII

Rp Olei Citri

Olei Caryophyllorum

Olei Majoranae

Olei Macidis aa 1,0

Liq Ammon caust 66,0

Spiritus (90 Proc) 180,0

Fünfzehn bis dreissig Tropfen in schleimigem Getränk als Antispasmodicum und Carminativum

Liquor Ammonii foeniculatus

Rp	Olei Foeniculi	1,0
	Spiritus (90 Proc)	25,0
	Liquoris Ammonii caustici	5,0

Wie der Liquor Ammonii anisatus

Luft der Leuchtgas Reinigungsmassen

Die Luft der Räume, in welchen die aufgebrauchte Reinigungsmasse aufbewahrt wird, soll gegen Keuchhusten heilsam sein. ADRIAN und DES CHAMPS lassen ein Gemisch folgender Substanzen als Ersatz in den Zimmern ausbreiten: Aetzkalk 100,0, Wasser 300,0, Sand 2000,0, Steinkohlentheer 150,0, Ammoniumchlorid 100,0

Mixtura Ludgumensis**Potion de Lyon**

Rp	Extracti Belladonnae	0,3
	Sirupi Papaveris	20,0
	Aquae Aurantii florum	15,0
	Aquae destillatae	150,0
	Liquoris Ammonii caustici	1,0

Bei Keuchhusten! Vierstündlich $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ Esslöffel**Essentia aromatica ammoniacalis**

Alcoolat aromatique ammoniacal (Gall)

Esprit volatil ammoniacal huileux

de SYLVES

Rp	1 Corticis Aurantii recentis	
	2 Corticis Citri recentis	aa 100,0
	3 Vanillae	80,0
	4 Cort. Cinnamomi Ceylanici	15,0
	5 Caryophyllorum	10,0
	6 Ammonii chlorati	500,0
	7 Kali carbonici	500,0
	8 Aquae Cinnamomi	500,0
	9 Spiritus (0,888)	500,0

Man macerirt 1—3 mit 8 und 9 3—4 Tage lang, bringt dann 7 hinzu und destillirt 500 g ab. Das Destillat färbt sich sehr bald etwas dunkel und ist vor Licht geschützt aufzubewahren.

Liquor pectoralis (Form Berol)

Rp	Liquoris Ammonii anisati	5,0
	Sirupi Althaeae	80,0
	Aquae destillatae	200,0

Spiritus Ammonii succinatus.

Aqua Luciae Eau de Luce Bienenwasser

Rp	Liquoris Ammonii caustici	
	Spiritus (90 Proc.)	
	Mixtura oleosa balsamica	aa 10,0
	Olei Succini rectificati guttam unam.	

Zu Waschungen bez Umschlägen bei Insektenstich

Spiritus anticephalgicus.

Migrainegeist Kopikrampfschmerzmittel

Rp	Spiritus Serpylli	
	Spiritus Mellisae	
	Spiritus camphorati	aa 20,0
	Liquoris Ammonii caustici (0,96)	
	Aetheris acetic	aa 10,0

Zum Auflegen von Compressen und zum Riechen

Spiritus caeruleus (Ergänzb)

Rp	Liquoris Ammonii caustici (0,96)	50,0
	Spiritus Lavandulae	
	Spiritus Rosmarini	aa 70,0
	Aeruginis pulverati	1,0

Digeriren, dann filtriren Zum Einreiben bei Quetschungen

Sirupus ammoniacalis

Rp	Liquoris Ammonii caustici	2,0
	Sirupi simplicis	100,0

Unguentum ammoniacale

Pommade ammoniacale ou de GONDRET

Rp	Schl ovilis	
	Adipis suilli	aa 10,0
	Liquoris Ammonii caustici (20 Proc)	20,0

Man schüttet die geschmolzene Fettmischung in ein Glas. Wenn sie zu erstarren beginnt fügt man die Ammoniakflüssigkeit hinzu und schüttelt um, indem man das Glas bisweilen in kaltes Wasser taucht.

Unguentum dedermaticum TROUSSEAU

Rp	Adipis suilli	10,0
	Schl taurini	1,0
	Liquoris Ammonii caustici (20 Proc)	10,0

Bereitung wie vorher

Vesicatorium ammoniacale DESCHAMPS

Rp	Adipis benzoinati	15,0
	Olei Amygdalarum	5,0
	Liquoris Ammonii caustici (20 Proc)	10,0

Zur Salbe zu mischen

Vet Fomentum stimulant BRACY CLARKE

Rp	Olei Olivarum communis	100,0
	Camphorae	
	Olei Terobinthinae	aa 2,0
	Liquoris Ammonii caustici (0,96)	25,0

Mit 2 Liter Wasser durchgeschüttelt, zu Umschlägen auf Druckstellen, Kontusionen

Vet Liquor restaurans HERRING

HERRING'S Restitutions-Fluid

Rp	Liquoris Ammonii caustici (0,96)	
	Ammonii chlorati	aa 50,0
	Calcis ustae plv	
	Spiritus camphorati	aa 25,0
	Aquae	500,0

Zum Befeuhen und Waschen bei Versäuerungen, Sehnenaußdehnung, Lähmungen

Vet Linimentum volatile

I Rp	Olei Rapae	800,0
	Liquor Ammonii caustici (0,96)	100,0

Vet. Liquor resorbens contra tympanitum Frommelsucht-Essenz

Rp	Liquoris Ammonii caustici (0,96)	100,0
	Tincturae Colubici	10,0
	Liquoris Ammonii anisati	20,0

Ein Esslöffel der Essenz mit $\frac{1}{2}$ Liter Wasser verdünnt für Rinder, Schafen die halbe Dosis

II Rp	Liquoris Ammonii caustici	100,0
	Spiritus aetherol	20,0
	Liquoris Ammonii anisati	10,0

Gebrauch wie vorher

III Rp	Liquoris Ammonii anisati	12,0
	Tincturae Capsici	7,5
	Tincturae Zingiberis	30,0

Aqua q s ad 2 Liter Rindern auf einmal zu geben

Ammonium aceticum.

I Ammonium aceticum crystallisatum Ammoniumacetat. Essigsäures Ammonium. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$ Mol Gew. = 77. Dieses Salz kann nicht durch Abdampfen der wässrigen Lösung erhalten werden, da es sich mit den Wasserdämpfen verflüchtigt bez in saure Salze spaltet. Man stellt es dar durch Sättigen möglichst wasserfreier Essigsäure mit getrocknetem Ammoniakgas. Farblose, aus Nadeln bestehende Krystallmasse. Schmilzt bei 89°C und geht beim raschen Erhitzen auf über 160°C in Acetamid über. Sehr leicht löslich in Wasser, auch in Alkohol. Wegen der hygroskopischen Eigenschaften in Gläsern mit paraffinirten Korken aufzubewahren.

II. Liquor Ammonii aceticum (Germ.) **Ammonium aceticum solutum** (Anstr. Holv.) **Liquor Ammonii Acetatis** (Brit. U-St.) **Acétate d'Ammoniaque liquide** (Gall.) **Liquor Mindereri. Spiritus Mindereri. Ammoniumacetatlösung.** Minderer's Geist.

Darstellung. 1) 100 Th Ammoniakflüssigkeit werden mit 115 Th (oder soviel) verdünnter Essigsäure (80 Proc.) versetzt, dass die Flüssigkeit gegen Lackmus neutral bez sehr schwach sauer ist, worauf man auf das geforderte spec Gewicht einstellt. 2) Man kann die Essigsäure auch mit Ammoniumkarbonat neutralisiren, und dies empfiehlt sich, wenn man ein zerfallenes Salz besitzt, welches sonst keine Verwendung finden kann. Für 100 Th verdünnte Essigsäure (80 Proc.) bedarf man etwa 80 Th Ammoniumkarbonat.

Eigenschaften. Farblose, neutrale oder sehr schwach saure Flüssigkeit, von salzigem Geschmack, im Wasserbade völlig flüchtig. Beim Erwärmen mit Kalilauge Ammoniak, mit Schwefelsäure Essigsäure entwickelnd. Das Gehalt der Lösung an kryst. Ammoniumacetat wird von den einzelnen Pharmacopöen wie folgt angegeben:

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Holv.	U-St.
Spec Gewicht	1,08	1,022	1,036	1,032—1,034	1,32	—
Gehalt an $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{NH}_4$	15%	—	18,5%	15%	15%	7%

Volumgewicht der Ammoniumacetatlösungen bei 16°C .

$\% \text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{NH}_4$	Spec Gew	$\% \text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{NH}_4$	Spec Gew	$\% \text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{NH}_4$	Spec Gew	$\% \text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2\text{NH}_4$	Spec Gew
46	1,0860	34	1,0681	22	1,046	10	1,022
44	1,0880	32	1,0651	20	1,042	8	1,018
42	1,0800	30	1,062	18	1,038	6	1,014
40	1,0770	28	1,058	16	1,034	4	1,010
38	1,0740	26	1,054	14	1,030	3	1,008
36	1,0710	24	1,050	12	1,026		

Prüfung. 1) Man stellt die Reaktion fest durch Prüfung mit rothem und blauem Lackmuspapier, die Flüssigkeit muss neutral sein oder nur ganz schwach sauer reagiren. Lässt man die Probe auf blauem Lackmuspapier antrocknen, so erfolgt auch bei einem neutralen Liquor schwache Rothfärbung, weil Ammoniak sich verflüchtigt unter Hinterlassung eines sauren Salzes. 2) Empyreumatische Bestandtheile werden durch Geruch und Geschmack erkannt. Sie sind die Ursache dafür, dass das Präparat sich nach einiger Zeit gelb färbt. 3) Auf Metalle wird durch Schwefelwasserstoffwasser und durch Schwefelammonium geprüft. 4) Auf Chlor durch Silbernitrat in der mit Salpetersäure angesäuerten Flüssigkeit.

Anwendung. Aeusserlich zu Umschlägen unverdünnt bei Quetschungen, Drüsen geschwülsten, Mumps, in Verdünnung mit Wasser (1:10) bei chronischen Augenentzündungen, als Gurgelwasser bei Anginen. Innerlich regt es die Schweisssekretion an, daher in Gaben von 5—10 g mehrmals täglich, in Mixturen bei fieberhaften Katarrhen, Neuralgien, Rheumatismus. Als Schwitzmittel 20—80 g in getheilter Dosis, aber rasch hintereinander mit heissem Fliederthee im warmen Bett zu trinken. Es wird im Organismus zu Ammoniumkarbonat verbrannt. Krystallisirtes Ammoniumacetat. Eine concentrirte Lösung eines sauren Salzes ist zur Konservirung von Fleisch, Gemüse und Früchten vorgeschlagen worden, aber nicht zu empfehlen.

Fomentum ammoniacatum NEUMANN
 Rp Infusi Florum Arnicae 20,0 250,0
 Aceti (8 Proc.) 280,0
 Ammonii carbonici 10,0
 Aeusserlich, bei Oedem des Scrotum

Mixtura anticephalgica WRIGHT
 Rp Liquoris Ammonii acetici
 Tincturae Aurantii corticis
 Sirupi Ammonii corticis aa 20,0
 Aquae destillatae 500,0
 Stündlich 1—2 Esslöffel gegen Kopfschmerz nach
 Alkoholgenuss

Mixtura diaphoretica BRENA
 Rp Liquoris Ammonii acetici 50,0
 Camphorae 0,5
 Sphitis q s ad solutionem
 Sirupi Sacchari 200,0
 Stündlich einen Esslöffel

Mixtura contra ebrietatem GALLIUS
 Rp Liquoris Ammonii acetici 15,0
 Salis culinaris 5,0
 Infusi Coffeae concentrati 75,0
 Sirupi Sacchari 80,0
 Alle $\frac{1}{4}$ Stunden den $\frac{1}{4}$ l. hell.

Potio diaphoretica. BOUGHARDAT
 Rp Liquoris Ammonii acetici 15,0
 Aquae Cinnamomi
 Aquae Menthae piperitae
 Sirupi Sacchari aa 50,0.
 Stündlich einen Esslöffel voll.

Ammonium benzoicum.

Ammonium benzoicum (Ergänzb. Helv.) **Ammonii Benzoas** (Brit. U-St.) **Benzoate d'Ammoniaque** (Gall.) **Ammoniumbenzoat**. Benzoësaures Ammon. $C_6H_5O_2NH_4$. Mol. Gew. = 139

I. Ammonium benzoicum ist als krystallisiertes Salz von Ergänzb., Brit. Gall. Helv. und U-St. aufgenommen

Darstellung. Man übergiesst in einem Becherglase 100 g Benzoesäure (o Toluol) mit 80 g Ammoniakflüssigkeit von 20 Proc. (0,925 spec. Gew.) und erwärmt unter Umschwenken, bis vollständige Auflösung erfolgt. Beim Erkalten scheidet sich das Salz in Blättchen aus, welche auf Filtrirpapier an der Luft getrocknet und in gut zu verschliessenden Gefässen aufbewahrt werden.

Eigenschaften. In 5 Th. Wasser oder in 28 Th. Weingeist lösliche, hygroskopische, farblose tafelförmige Krystalle oder ein krystallinisches Pulver, ohne Geruch, von salzig bitterlichem, hintennach etwas scharfem Geschmack. Schmp. $190^\circ C$. An der Luft verlieren sie allmählich Ammoniak unter Hinterlassung eines sauer reagirenden Salzes. Die wässrige Lösung giebt, mit Salzsäure angesäuert, Ausscheidung von Benzoesäure, mit Bleiacetat weissen krystallinischen, mit Ferrichlorid rothbraunen, mit Silbernitrat weissen, beim Erwärmen löslichen Niederschlag.

Prüfung. 1) Auf dem Platinblech ohne Rückstand flüchtig. 2) Die wässrige Lösung 1:10 werde weder durch Ammoniumsulfid (Metalle) noch durch Baryumchlorid (Schwefelsäure) gefällt.

II. Liquor Ammonii benzoici. Ammoniumbenzoat-Lösung 20 Proc. Diese Lösung wird als Receptur-Erleichterung vorrätzig gehalten, falls Ammoniumbenzoat in Mixturen öfter verordnet wird.


Darstellung. Man verdünnt 40 Th. Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc. (0,960) mit 100 Th. destillirtem Wasser und löst darin 85 Th. Benzoesäure (o Toluol) auf. Die Lösung wird mit Lackmuspapier geprüft und entweder mit Ammoniak oder mit Benzoesäure so eingestellt, dass sie ganz schwach sauer reagirt. Alsdann ergänzt man sie mit destillirtem Wasser auf das Gewicht von 200 g. — Im Zweifelsfalle ist die Lösung so weit mit Wasser zu verdünnen, dass das Gesamtgewicht das 5,7fache der verbrauchten Benzoesäure beträgt.

Anwendung. In Gaben von 0,5—1,0 g mehrmals täglich als Expectorans bei Catarrhen älterer Leute, bei Asthma, als Antispasmodicum, Diaphoreticum.

Ammonium bromatum.

Ammonium bromatum (Austr., Germ., Helv.). **Ammonil Bromidum** (Brit. U-St.). **Bromhydrate d'Ammoniaque** (Gall.). **Ammonium hydrobromicum**. **Ammoniumbromid**. **Bromammonium** NH_4Br . Mol. Gew. = 98.

Darstellung. In den Kolben a, welcher mit einer etwas Wasser enthaltenden Waschflasche verbunden ist, bringt man 520–530 Th. Ammoniak von 20 Proc. (0,925) und stellt ihn, um die Reaktion zu mässigen in kaltes Wasser. In den Hahntrichter b bringt man 350 Th. Brom und lässt dieses tropfenweise in das Ammoniak einfliessen. Jeder einfallende Tropfen erzeugt ein zischendes Geräusch, der gebildete Stickstoff entweicht durch die Waschflasche, in welcher auch die mitgerissenen Ammoniumbromid-Dämpfe zurückgehalten werden. — Ist sämtliches Brom eingetragen und der Kolbeninhalt erkaltet, so giesst man den Inhalt der Waschflasche d durch den Hahntrichter in den Kolben a, fügt, wenn erforderlich, noch soviel Ammoniakflüssigkeit hinzu, dass der farblose Kolbeninhalt deutlich darnach riecht, und stellt 2–3 Tage zur Seite. Sollten sich während dieser Zeit Krystalle ausscheiden, so sind diese durch Zusatz von Wasser in Lösung zu bringen. — Wenn nach 3 Tagen eine Probe der Lösung beim Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure sich nicht mehr gelb färbt, so wird die Lösung filtrirt und im Wasserbade zur Trockne verdampft.



Eigenschaften. Prismatische Krystalle oder farbloses Krystallpulver, ohne Geruch, von salzigem Geschmack. Löslich in 1,5 Th. kaltem oder 0,7 Th. siedendem Wasser, auch in 150 Th. kaltem oder 15 Th. siedendem Weingeist. Die wässrige Lösung röthet blaues Lackmuspapier.

Beim Erhitzen völlig flüchtig. Das reine Salz ist lichtbeständig. Die wässrige Lösung giebt beim Erwärmen mit Natronlauge freies Ammoniak; versetzt man sie mit wenig Chlorwasser und ölmigen oder Chloroform, so wird letzteres vom ausgeschiedenen Brom gelbbraun gefärbt.

Prüfung. 1) Das Salz färbt sich beim Befuchten mit verdünnter Schwefelsäure nicht sogleich gelb (Ammoniumbromat NH_4BrO_2). 2) 5 cem der wässrigen Lösung (1:10) mit einem Tropfen Ferrichloridlösung und etwas Chloroform geschüttelt, sollen diesem keine violette Färbung erteilen (Ammoniumjodid). 3) Auf Metalle ist mit Schwefelwasserstoff bzw. Schwefelammonium, speziell auf Eisen mit Kaliumferrocyanid in der mit Salpetersäure oxydirten Lösung zu prüfen. 4) Prüfung auf Ammoniumchlorid. Sämtliche Pharmakopöen mit Ausnahme der Gallica lassen einen Gehalt an Chlorammonium durch Titration mit Silbernitrat feststellen. 0,8 g des scharfgetrockneten Salzes werden in 30 cem Wasser gelöst, mit 3–4 Tropfen neutraler Kaliumchromatlösung versetzt und nun mit $\frac{1}{10}$ Silbernitratlösung bis etwa zum Eintritt bleibender Rötung titirt. Für 0,8 g sollen hierzu erforderlich sein: Nach Austr. 30–31,5 cem, Germ. und U-St. höchstens 30,9 cem, Helv. 30,6 cem, Brit. 30,5–30,9 cem $\frac{1}{10}$ Silbernitratlösung; dem entsprechend lassen einen Gehalt an Ammoniumchlorid zu: Helv. = Spar; Brit., Germ. u. U-St. = 1,3 Proc., Austr. = 2,5 Proc., wobei aber zu bemerken ist, dass Helv. nicht ausdrücklich die Untersuchung des scharf getrockneten Salzes vorschreibt.

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefässen. Reine Präparate bedürfen des Lichtschutzes nicht. Gelb werdende sind gewöhnlich durch Eisen verunreinigt. Gelbge-




Fig. 43.

verordnetes Ammoniumbromid löst man in Wasser, fügt etwas Ammoniak hinzu, lässt einige Tage stehen und bringt alsdann die filtrirte Lösung zur Trockne

Anwendung. Die therapeutische Wirkung ist gleich der des Kaliumbromids, doch wird es von vielen Personen besser vertragen als dieses. In Gaben von 0,3–0,8 g (für Kinder 0,1–0,3) mehrmals täglich bis zu 10 g pro die gegen nervöse Störungen, Epilepsie, Delirium tremens, bei Keuchhusten Bestandtheil des Erlinmayer'schen Bromwassers. Es empfiehlt sich überhaupt, das Salz in kohlensaurem Wasser zu nehmen.

Spezifisches Gewicht und Procentgehalt der Ammoniumbromidlösungen bei 15° C

Proc NH ₄ Br	Spec Gew	Proc NH ₄ Br	Spec Gew	Proc NH ₄ Br	Spec Gew
5	1,0326	15	1,0960	30	1,1921
10	1,0652	20	1,1285	40	1,2920

Ammonium bromatum ex tempore. Kleinere Mengen Ammoniumbromid kann man auch durch Neutralisation der officinellen 25 proc Bromwasserstoffsäure mit 10 proc Ammoniaklösung darstellen. Neutralisirt man 324 Th Bromwasserstoffsäure (25 Proc) mit 170 Th Ammoniaklösung (10 Proc), so erhält man 494 Th einer fast genau 20 Proc Ammoniumbromid enthaltenden Lösung. Verdampft man diese, nachdem man noch etwas Ammoniak zugefügt hat, so erhält man 93 Th festes Ammoniumbromid.

Ammonium carbonicum.

I Ammonium carbonicum (Austr Germ Helv) **Ammonii Carbonas** (Brit U-St) **Carbonate (sesqui-) d'Ammoniaque** (Gall) **Ammonium sesquicarbonicum.** **Sal volatile Ammoniaci.** **Sal volatile siccum.** **Ammoniumkarbonat.** **Ammonium sesquicarbonat.** Reines Hirschhornsalz. Englisches (flüchtiges) Salz. Flüchtliges Laugensalz. Kohlensaures Ammon. Durchschnittlich von der Zusammensetzung $\text{CO}_2\text{NH}_4\text{NH}_4 + \text{HCO}_2\text{NH}_4$. Mol. Gew. = 157.

Handelsorten. Das Ammoniumkarbonat kommt im Handel in zwei verschiedenen Formen vor. 1) Als etwa 2 cm dicke, schwach kugelig gebogene Platten von faseriger Struktur, auf dem Bruche durchscheinend. Die Fasern stehen senkrecht zu den halbkugelförmigen Aussenseiten. Die Stücke lassen sich besonders leicht in der Richtung dieser Strahlen zerklüffern bez spalten. 2) Als grosse, unregelmässig gestaltete Massen ohne faserige Struktur, nicht nach einer bestimmten Richtung am besten spaltbar, beim Daranfehlen in unregelmässige Stücke von körnig krystallinischem Bruch zerfallend. Beide Sorten, von denen die zu zweit angeführte zur Zeit die verbreitetere ist, dürften nicht die gleiche Zusammensetzung haben.

Darstellung. Dieselbe erfolgt fabrikmässig, indem man ein Gemisch von 4 Th Ammoniumchlorid mit 4 Th Calciumkarbonat und 1 Th Holzkohlepulver in eisernen Retorten bis auf Rothgluth erhitzt. Die entweichenden Gase, Ammoniak und Kohlensäure, werden in Kammer geleitet, in denen sie sich zu Ammoniumkarbonat verdichten.

Eigenschaften. Das äussere Aussehen ist schon unter „Handelsorten“ beschrieben, es mag hinzugefügt werden, dass das Salz stechend nach Ammoniak riecht. Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das frisch sublimirte Ammoniumkarbonat ein Gemenge von 1 Mol saurem Ammoniumkarbonat HCO_2NH_4 mit 1 Mol Ammoniumkarbaminat $\text{CO}_2(\text{NH}_4)\text{NH}_4$. Diese Formel nimmt auch die U-St an. Dagegen beschreibt es Gall als eine Mischung bez Verbindung von 1 Mol neutralem Ammoniumkarbonat mit 2 Mol saurem Ammoniumkarbonat, also als $\text{CO}_2(\text{NH}_4)_2 + 2[\text{HCO}_2\text{NH}_4]$, was nach den heutigen Ansichten nicht ganz zutreffend ist.

Es löst sich in 3–4 Th kaltem Wasser langsam, aber vollständig, durch heisses Wasser wird es versetzt, beim Erhitzen ist es vollständig flüchtig ohne zu schmelzen.

Von Wichtigkeit ist das Verhalten des Salzes an der Luft. Wird es an der Luft sich selbst überlassen, so verflüchtigt sich in erster Linie [schon bei gewöhnlicher Tem

peintur, reichlich in mässiger Wärme] das Ammoniumkarbonat. Findet diese Verflüchtigung in geschlossenen Gefässe statt, so setzt sich das Ammoniumkarbonat in den oberen Theilen des Gefässes wieder als Sublimat ab. Infolge dieser Verflüchtigung des Ammoniumkarbonates zerfällt das Salz zu einem weissen Pulver, welches aus dem erst über 60°C flüchtigen bez. in Kohlensäure, Wasser und Ammoniak zerfallenden sauren Ammoniumkarbonat HCO_3NH_4 besteht. Dieses letztere ist auch in Wasser schwerer löslich. Es löst sich erst in 15 Th. Wasser. Dieses saure Ammoniumkarbonat bleibt immer in den Gefässen zurück, wenn das Hirschhornsalz (wie wir es hier nennen wollen) nicht genügend dicht verschlossen aufbewahrt wird.

Therapeutisch sind zwar diese verschiedenen Salze des Ammoniaks und der Kohlensäure wohl ziemlich gleichwerthig, als Lockerungsmittel für Backzwecke, aber sollte nur das nicht zerfallene Hirschhornsalz abgegeben werden, weil es leichter und in zwei Phasen flüchtig ist. Die zerfallenen Bestände kann man zur Herstellung von Ammoniumsalzen (*Ammonium acetum, A. nitrum, A. phosphoricum, A. sulfuricum* etc.) verwerten.

Prüfung. 1) Es bilde strahlig-kristallinische, farblose Massen, die beim Erwärmen völlig flüchtig sind. 2) Die wässrige, mit Essigsäure übersättigte Lösung werde weder durch Schwefelwasserstoff (Blei, Zink), noch durch Baryumnitrat- (*Ammoniumsulfat*), oder Ammoniumoxalatlösung (Kalk, Baryt) verändert. 3) Wird die wässrige Lösung (1 = 20) mit Silbernitratlösung im Ueberschuss und hierauf mit Salpetersäure versetzt, so darf sie sich weder bräunen (*Ammoniumthiosulfat*), noch innerhalb 2 Minuten mehr als opalisierend getrübt werden (Chlor). 4) Wird 1 g des Salzes mit Salpetersäure stark übersättigt und die Lösung im Wasserbade eingetrocknet, so muss ein farbloser, beim Erhitzen vollständig flüchtiger Salzrückstand hinterbleiben (*emphysematische, d. h. dem Theer entstammende Stoffe*).

Aufbewahrung. Man bestelle beim Drogisten ausdrücklich hartes, nicht verwittertes Ammoniumkarbonat und bewahre dieses in Gefässen aus Glas oder Kransen aus Steinzeug auf.

Diese Gefässe sind mit Korkstopfen zu verschliessen, welche mehrmals in heisses festes Paraffin getaucht worden sind. Bei grösseren Vorräthen verschlosst man die Gefässöffnungen nach dem Aufsetzen des Korken auch noch mit einer Paraffinschicht. Die so vorbereiteten Gefässe sind an einem trockenen, kühlen Orte aufzubewahren.

Das Zerkleinern der Stöcke erfolgt in der Weise, wie man Zucker klein schlägt, d. h. mittels eines Hammers und eines stumpfen Messers. Das Salz wird meist unter dem Namen „Hirschhornsalz“ im Handverkaufe verlangt und zum Backen des Gebäcks verwendet. Hierzu eignet sich nur das nicht verwitterte und zwar am besten die strahlig-kristallinische Sorte.

Anwendung. Verhältnissmässig selten therapeutisch angewendet. Innerlich in Gaben von 0,2–0,8 g in Lösung, seltener in Pulverform, als Stimulus bei Collaps im Verlauf verschiedener Krankheiten wie Typhus, Scharlach, asthenischen Pneumonien, Alkoholrausch, auch als Antidot bei Schlangenbissen, aber hier unzweckmässig. Ferner als Dia-phoreticum und Expectorans. Aeusserlich namentlich als Riechmittel in verschiedenen Formen. Technisch namentlich zu Backzwecken. In der Analyse zur Ueberführung saurer Alkalisulfate in neutrale Sulfate, auch hier ist die ohne Verspritzen verdampfende strahlige Sorte der anderen vorzuziehen. Das Pulvern des Salzes soll nie in Mörsern aus Kupfer oder Messing erfolgen.

Liquor Ammonii carbonici (Ergänzb.) Ammoniumkarbonatflüssigkeit, therapeutische. 1 Th. Ammoniumkarbonat wird ohne Anwendung von Wärme in 5 Th. destillirtem Wasser gelöst und filtrirt. Klare, farblose Flüssigkeit, spec. Gew. 1,070–1,074. Receptum-Erleichterung. Nicht zu verwechseln mit der als Reagens benutzten Ammoniumkarbonatlösung. S. w. unten, S. 286.

Aqua aerophora ammoniacata
Aqua Ammonii bicarbonici Ammonium-
 bicarbonat-Blauewasser
 Rp. Ammonii carbonici 0,5
 Aquae Acide carbonicae supergraviatae 500,0
 In Flaschen von 250 ccm abzufüllen

Liquor Ammonii carbonici salicylatus
 Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,98) 20,0
 Liquoris Ammonii carbonici 15,0
 Acidi salicylici 2,5
 Spiritus 25,0
 Aquae destillatae 100,0
 Gegen Schlangenbiss. Aeusserlich zum Waschen,
 innerlich alle 15 Minuten 30 Tropfen mit Wasser
 Unwirksam.

Lotio contra alopeciam

Rp	Ammonii carbonici	3,5
	Aquae Aurantii florum	15,0
	Glycerini	80,0
	Tructurae Cantharidum	0,5
	Mixturae oleosae balsamicae	50,0
	Spiritus Aluta (0,895)	100,0

Die kahlen Stellen täglich einmal damit zu bestreichen

Mixtura diaphoretica Americana

Pp	Ammonii carbonici	2,5
	Tructurae Opil camphoratae	5,0
	Vini Ipecacuanhae	7,5
	Aquae destillatae	150,0

4—5stündlich einen Esslöffel in Wasser, welches mit 1 Theelöffel Citronensaft versetzt ist. Bei Eintritt des Scharlachs

Olfactoria Anglorum

Riechfläschchen der Engländer

A. PRESTON'S salt. Sel de PRESTON

Man füllt Gläser von 25—30 cm Fassungsraum mit erbsengrossen Stücken des nicht zerfallenen Ammoniumcarbonats und befeuchtet sie mit folgender Mischung

Rp	Spiritus (90 Proc)	250,0
	Olei Lavandulae	
	Olei Bergamottae	aa 10,0
	Olei Caryophyllorum	
	Olei Cinnamomi	aa 5,0
	Olei Aurantii florum	1,0
	Tincturae Moschi	5,0
	Liq Ammonii caustici duplicis (0,925)	250,0

Das vornehmste Salz dieser Art wird erhalten wenn man das Ammoniumcarbonat mit einer Mischung aus Orangenblüthenöl 1 Th, Spiritus 10 Th und 80proc Ammoniakflüssigkeit 10 Th befeuchtet

B. SMELLING salt Sel volatil Anglais

Wird seltener gebraucht und ist durch das vorige fast verdrängt. Es stellt eine oberflächliche Mischung gleicher Volume von Ammoniumcarbonat und gebranntem Marmor dar, befeuchtet mit der obenstehenden Mischung ätherischer Oele

Olfactorium anglicum Smelling salt (Hamburg Verschiff)

Kali carbonici, Ammonii chlorati aa 40,5
Liquoris Ammonii aromatici (S 259) 1,0

Pulveres anticholericæ ALBERS

Rp	Ammonii carbonici	0,5
	Camphorae	0,1
	Sacchari	1,0

Doses tales. X Halbstündlich ein Pulver bei Cholera

Sirapus depurativus PSYLLUM

Rp	Ammonii carbonici	1,0
	Sirupi Sennae	250,0

Sechstündlich ein halbes Weinglas; bei Syphilis

Sirapus diaphoreticus OZZENAVE

Rp	Ammonii carbonici	5,0
	Sirupi Sarsaparillae compositi	150,0

Morgens, Mittags und Abends je einen Löffel bei Syphilis, Hautleiden, wie Psoriasis. Gebrauch einzustellen, sobald Appetitmangel eintritt.

Unguentum ammoniacale ROCOUX.

Rp	Ammonii carbonici sub pty	10,0
	Unguenti cerei	80,0

Bei Croup jedesmal 4,0 g einzureiben

II Ammonium bicarbonicum

Ossa Helmonti. Ammoniumbikarbonat.

Doppeltkohlensaures Ammon. HCO_3NH_4 . Mol. Gew. = 79.

Darstellung. Entweder man legt zerfallenes Ammoniumcarbonat, in einer Papierkapsel ausgebreitet, in eine Waime von 30—40° C, bis der Geruch nach Ammoniak völlig verschwunden ist, oder man versetzt eine konc wässrige Lösung von Ammoniumcarbonat mit dem doppelten Volumen Weingeist, sammelt den Niederschlag und trocknet ihn zwischen Filtrirpapier bei 20—30° C

Eigenschaften. Weisses, mehliges Pulver oder rhombische Krystalle, in 15 Th Wasser löslich, nicht nach Ammoniak riechend, von kühlend-salzigem Geschmack. Zerfällt bei 60° C in Kohlensäure, Ammoniak und Wasser. Unlöslich in starkem Alk.

Anwendung. An Stelle des gewöhnlichen Ammoniumcarbonates in Pulvermischungen, Pastillen etc.

III Ammonium carbonicum neutrale

Neutrales Ammoniumcarbonat.

$\text{CO}_3(\text{NH}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 114

Darstellung Man benetzt das gewöhnliche Ammoniumcarbonat mit stärkster Ammoniakflüssigkeit (0,895 = 80 Proc) und lässt 2—3 Stunden bei 12° C stehen. Das zurückbleibende Pulver wird rasch zwischen Filtrirpapier getrocknet. Zerfällt an der Luft in Wasser, Ammoniak und Ammoniumbikarbonat. Dieses Salz ist das zum Füllen der Riechfläschchen zu verwendende

Ammoniumcarbonatlösung, analytische Nicht zu verwechseln mit dem therapeutisch gebrauchten Liquor Ammonii carbonici. 1 Th gewöhnliches Ammoniumcarbonat (reines Hirschhornsalz) wird in einer Mischung aus 8 Th Wasser und 1 Th Ammoniakflüssigkeit (0,960) gelöst. Diese Lösung enthält neben einem Ueberschuss von Ammoniak das neutrale Ammoniumcarbonat, in welches das Ammoniumkarbammat in wässriger Lösung ohne weiteres, das Ammoniumbikarbonat aber durch den Zusatz des Ammoniaks übergeht. Zur Fällung der alkalischen Erden, zum Auflösen des Schwefelarsens

IV. Ammonium carbonicum pyro-oleosum (Ergänz.) Sal volatile Cornus Ceryi. Sal Cornus Ceryi. Brenzlich-kohlensaures Ammon Brenzlich-oliges Ammonkarbonat. Rohes Hirschhornsalz.

War früher ein mit thierischem Brandöl durchtranktes Ammoniumkarbonat, wie es bei der trockenen Destillation thierischer Substanzen erhalten wurde Jetzt 32 Th mittelfein zermiebenes Ammoniumkarbonat werden mit 1 Th ätherischem Thieröl gemischt (Ergänz. Ap V) Weissliches, mit der Zeit gelblich werdendes Pulver vom Geruch seiner Bestandtheile Vor Licht geschützt aufzubewahren

Liquor Ammonii carbonici pyro oleosi (Ergänz.) Brenzliche Ammoniumkarbonatlösung 1 Th Ammonium carbonicum pyro oleosum wird unter Ausschluss von Wärme in 5 Th destillirtem Wasser gelöst, die Lösung einige Tage bei Seite gestellt, dann filtrirt Klare, anfangs gelbliche, später blasser werdende, in der Wärme vollkommen flüchtige Flüssigkeit, spec Gew 1,070—1,074 Vor Licht geschützt aufzubewahren

Beide Präparate werden als Exerians bei adynamischen Fiebern, Trunkenheit, Ohnmacht, Pneumonie der Säuger angewendet Dosis 0,2—0,4 des trockenen Präparates, 1,0—2,0 der Lösung mehrmals täglich

Linctus antispasmodicus WENDT
Ep Liquoris Ammonii carbonici pyro-oleosi 2,5
Aque Chamomillae
Syrupi Aurantii florum 33 60,0
Zwei bis dreistündlichen Theelöffel Bei Krämpfen
kleiner Kinder

Spiritus Lumbricorum
Regenwurm-Spiritus
Rp Liquoris Ammonii carbonici pyro-oleosi 3,0
Spiritus diluti (0,885) 97,0
Wird meist ex tempore gemischt

Ammonium chloratum.

Ammonium chloratum (Austr Germ Helv) **Ammonii Chloridum (Brit U-St)** Chlorhydrate d'Ammoniaque (Gall) **Ammonium hydrochloricum seu muriaticum.** Sal ammoniacum. Ammoniumchlorid Chlorammonium. Salmiak. NH_4Cl . Mol. Gew. = 53,5.

Handelssorten. Im Handel kommen folgende Sorten des Salmiaks vor 1) Krystallisirter Salmiak, *Ammonium chloratum crystallisatum* Und zwar kommt diese Sorte entweder als weisses Krystallmehl oder in lockeren Salzmassen von der Form der Zuckerhüte *Ammon chlorat crist „in metis“* vor Sie ist verhältnissmässig unrein 2) Sublimirter oder raffinirter Salmiak, „*Ammonium chloratum sublimatum*“, und zwar entweder als weisses, schneeartiges Krystallmehl oder in Form durchsichtiger, eisglänzender, specifisch schwerer, konkav-konvexer Kuchen mit faserig-strahligem Gefüge Die für den pharmaceutischen Gebrauch dienende Sorte ist der raffinirte oder sublimirte Salmiak in Pulverform Die in Massen sublimirte Sorte wird im wesentlichen für technische Zwecke gebraucht

Reinigung des Salmiaks Bisweilen enthält der sublimirte Salmiak Schmutz sowie Ferro und Ferrverbindungen Um ihn zu reinigen, löst man ihn im zweifachen Gewicht Wasser unter Erwärmen auf, zur Oxydation des vorhandenen Eisenoxyduls mischt man für je 1 Kilo Salmiak 30—50—100 g starkes Chlorwasser, bez soviel zu, dass die Lösung deutlich danach riecht, und erhitzt zum Aufkochen. Alsdann setzt man unter Umrühren in kleinen Mengen Ammoniakflüssigkeit hinzu bis zur schwach alkalischen Reaktion, filtrirt im Heisswassertrichter durch Filtrirpapier und rührt das Filtrat um, damit möglichst kleine Krystalle erzielt werden Man trennt diese von der Mutterlauge und trocknet sie durch Erwärmen in einer Porzellanschale im Wasserbade unter Umrühren aus Die Mutterlauge wird unter Umrühren in einer Porzellanschale gleichfalls eingetrocknet Man verbraucht beide Produkte als reinen Salmiak Bei der ganzen Reinigung muss die Verwendung metallischer Geräthe ausgeschlossen werden

Vom Geldpunkte aus bietet die Reinigung des Salniaks im Laboratorium keinen Vortheil, es ist vielmehr zu empfehlen, eine solche Sorte anzuschaffen, welche keiner Reinigung bedarf

Pulverung Das Pulvern des sublimirten Salniaks ist nicht ganz leicht, weil die einzelnen Krystallfasern elastisch sind und dem Zerdücken infolgedessen einen gewissen Widerstand entgegensetzen. Am besten gelingt es durch Stossen im erwärmten Mörser von Stein oder Eisen und Durchschlagen durch ein erwärmtes Sieb. Man umgeht es, wenn man das durch rasche Abkühlung der Salniakdämpfe erhaltene feine Krystallmehl anschafft.

Eigenschaften Farbloses und geruchloses, krystallinches Pulver von salzigem Geschmack. Es ist an der Luft beständig (nicht hygroskopisch) und verflüchtigt sich beim stärkeren Erhitzen ohne vorher zu schmelzen als dichter wasser Dampf. Auf glühende Kohlen gestreut färbt Salniak die Flammen blaugrün. Löslich in 2,7 Th kaltem oder in 1 Th siedendem Wasser, in Alkohol fast unlöslich. Beim Auflösen in Wasser erfolgt Temperatur-Ernedrigung. Aus der heissgesättigten Lösung rasch abgeschieden, bildet er lange, biegsame, prismatisch dreiseitige, nadelförmige Krystalle, welche in Gestalt eines Federbartes zusammenhängen. Durch langsame Krystallisation erhält man ihn in langlichen oktaedrischen und tetraëdrischen Krystallen des regulären Systems. Salniaklösungen haben die Neigung, beim Verdunsten „anzublitzen“, d. h. über die Gefässwandungen hinwegzusteigen. Die Auflösung in destillirtem Wasser ist haltbar, ursprünglich neutral, beim Erhitzen verflüchtigt sich etwas Ammoniak und die Lösung nimmt infolgedessen schwach saure Reaktionen an.

Prüfung 1) Salniak sei farblos. Gelbliche Färbung kann von einem Eisengehalt herrühren. Röthliche bis rothe Färbung kann durch Theerfarbstoffe bedingt sein, in diesem Falle ist auch die filtrirte wässrige Lösung, bez. der alkoholische Auszug röthlich gefärbt. Giebt ein röthlich gefärbter Salniak eine wässrige Lösung, die im filtrirten Zustande farblos ist, so wird die Färbung möglicherweise durch Mikro Organismen (*Ordnium aurantiacum*) verursacht. Einfaches Austrocknen genügt, um diesen Pilz zu zerstören. 2) Er sei frei von glühbeständigen Verunreinigungen, man weist diese durch Erhitzen von 1 g Salniak im Platin- bez. Porcellantiegel nach (Gefunden wurde gelegentlich Baryum sulfat). 3) Die wässrige Lösung 1:10 werde durch Baryumchlorid nicht getrübt (Schwefelsäure) und durch Schwefelwasserstoffwasser auch nach Zusatz von Ammoniak nicht gefärbt oder getrübt (Metalle). 4) Wird die mit 2 Tropfen Salzsäure angesäuerte Lösung mit Kaliumferrocyanid versetzt, so darf nicht sogleich Blaufärbung eintreten. 5) Wird 1 g des Salzes mit conc. Salpetersäure (1,158) im Wasserbade zur Trockne verdampft, so darf Färbung nicht auftreten (theerartige Bestandtheile, z. B. Anilin).

Volumgewicht und Gehalt von Chlorammoniumlösungen bei + 15° C.

Vol Gew	Proc. NH ₄ Cl	Vol Gew	Proc. NH ₄ Cl	Vol Gew	Proc. NH ₄ Cl	Vol Gew	Proc. NH ₄ Cl	Vol Gew	Proc. NH ₄ Cl
1,00816	1	1,02180	7	1,03947	13	1,05648	19	1,07304	25
1,00832	2	1,02481	8	1,04325	14	1,05929	20	1,07575	26
1,00948	3	1,02781	9	1,04524	15	1,06204	21	1,07658	26,297
1,01264	4	1,03081	10	1,04805	16	1,06479	22		
1,01580	5	1,03370	11	1,05086	17	1,06754	23		
1,01880	6	1,03658	12	1,05367	18	1,07029	24		

Aufbewahrung In gut verschlossenen Gefässen aus Glas und Steinzeug, weniger gut in Kasten und Tonnen.

Anwendung Wirkt örtlich auf Schleimhäuten reizend. Innerlich sind grosse Gaben giftig, selbst tödtlich, kleine Gaben wirken sekretionsbefördernd, doch wird bei dauerndem Gebrauch kleiner Mengen der Appetit gestört. Aeusserlich in wässriger Lösung zu Umschlägen bei Entzündungen 1:10–20, namentlich aber zu Inhalationen 1:100. Mit gleichen Theilen Kalisalpeter in Form von Kälte Mischungen. Innerlich in Gaben von 0,2–0,5 g als ein den Auswurf beförderndes Mittel (Expektorans), wenn kein

oder nur geringes Fieber vorhanden ist In der Volksmedizin eine grosse Rolle spielend — Der auf silbernen Löffeln durch Salmiak-Mixturen entstandene schwarze Ueberzug ist ein basisches Silberchlorid und kann leicht mit Ammoniakflüssigkeit abgewaschen werden Technisch zum Löthen und Verzinnen, in der Färberei, zum Füllen der Leclanché Elemente, in der Analyse und zu vielen anderen Zwecken

Salmiak in festen Stücken Ammonium chloratum in massis Wird durch langsame Abkühlung der bei der Sublimation auftretenden Salmiakdämpfe erhalten, so dass die sich bildenden Krystalle theilweise schmelzen und zusammensintern Esähnliche konkav konvexe Massen von etwa 10 cm Dicke und faseriger Struktur Wird ganz besonders zum Löthen gebraucht und zwar, um dem Löthkolben eine metallische Löffelfläche zu verleihen Nach W. HIRNDEL kann man ähnliche Massen auch durch starke Pressung von erwärmtem Salmiakpulver erzeugen

Solutio Ammonii chlorati Salmiaklösung 1 Th eisenfreier Salmiak wird in der Kälte in 4 Th, destillirtem Wasser gelöst und die Lösung nach mehrtägigem Absetzen filtrirt Receptur-Erleichterung und chemisches Reagens

Embrocatio salina BRASLEY

Rp Ammonii chlorati 30,0
Aceti (6 Proc) 100,0
Spiritus (0,83) aa 50,0
Aquae destillatae 500,0

Zu Umschlägen bei Anschwellungen und Kontusionen ohne Hautverletzung

Emplastrum saponatum ammoniatum

Emplastrum volatile KIRKLAND.

Rp Emplastri Ichthyargyri simplicis 40,0
Sponsae oleaceae pulverati 20,0
Ammonii chlorati pulverati 5,0

Bei subkutanen Verhärtungen, Rheumatismus

Fomentum frigidum SCHMUCKER

Emmentatio refrigerans SCHMUCKER'S

Kälte-Umschlag

Rp Ammonii chlorati
Kalii nitrici aa 50,0

Zum Gebrauch zwischen Kompressen zu schichten und diese wiederholt zu befeuchten mit einer Mischung von

Aquae communis 350,0
Aceti (6 Proc) 150,0

Die Temperatur der Kompressen geht um etwa 10° C herab Bei Mangel an Eis

Liquor haerescopius

Flüssigkeit zum chemischen Wetterglas

Rp Ammonii chlorati
Kali nitrici aa 20,0
Camphorae 10,0
Spiritus (0,83) 50,0
Aquae destillatae 100,0

Man lässt 2 Tage an einem warmen Orte (30—40° C) unter Umrühren stehen und filtrirt alsdann

Mixtura solvens

a) Ergänz

Rp Ammonii chlorati
Succi Liquiritiae depurati aa 5,0
Aquae destillatae 100,0

b) Form magist. Berol

Rp Ammonii chlorati 5,0
Succi Liquiritiae depurati 2,0
Aquae destillatae 100,0

Mixtura solvens atibata (Form mag. Berol)

Rp Tartari sublimati 0,05
Ammonii chlorati 5,0
Succi Liquiritiae depurati 2,0
Aquae destillatae q s ad 200,0

Mixtura antitaxrhalis OPPENZER

Rp Infusi radialis Althaeae 7,5 150,0
Ammonii chlorati 1,2
Tincturae Opi simplicis 0,5
Sirupi Senegae 15,0

Zweistündlich einen Esslöffel, bei akutem Bronchial-Katarrh

Oxyeratum compositum

Rp Ammonii chlorati 20,0
Spiritus camphorati 60,0
Aceti (6 Proc) 100,0
Aquae fontanae aa 500,0

Zu Umschlägen bei Anschwellungen, Rheumatismus, Fäulnis

Oxyeratum simplex

Rp Ammonii chlorati 20,0
Aceti (6 Proc) 100,0
Aquae fontanae aa 500,0

Zu Umschlägen gegen Anschwellungen, Kontusionen bei unverletzter Haut

Pastilli Ammonii chlorati (Hely)

Rp Ammonii chlorati 5,0
Tragacanthae 1,0
Radialis Liquiritiae 4,0
Succi Liquiritiae 20,0
Sacchari albi 70,0

fiunt pastilli ponderis 1,0

Trochisel Ammonii chlorati (U St)

Rp Ammonii chlorati 10,0
Extracti Liquiritiae 25,0
Tragacanthae 2,0
Sacchari 50,0
Sirupi tolutani q s

fiunt trochisci 100

Unguentum discutiens GUÉNEAU DE MUSSY

Rp Ammonii chlorati 1,5
Adipis sulfi 25,0
Camphorae 0,15

Zum Einreiben geschwollener Nackendrüsen

Unguentum resolvens GUÉNEAU DE MUSSY

Rp Ammonii chlorati 2,0
Camphorae 1,0
Adipis 80,0

Zum Einreiben bei skrophulösen Drüsenanschwellungen Die GUÉNEAU'sche Salbe enthält für obige Mengen 5 g Salmiak

Vet.	Electuarium antiphlogisticum
Rp	Ammonii chlorati 10,0
	Natri nitrici 30,0
	Acidi tartarici 1,0
	Rhizomatis Calami
	Radici Gentianae \overline{R} 5,0
	Radici Althaeae 10,0
	Aquae communis q s
ut fiat electuarium	Dreistündlich eine taubenei-
	grosse Menge für Schweine und grössere Hunde
	bei Gastricismus, Mangel an Pfiesslust,

Vet.	Electuarium expectorans
Rp	Ammonii chlorati
	Fructus Foeniculi
	Fructus Anisi
	Radici Althaeae
	Radici Liquiritiae \overline{R} 50,0
fiat electuarium	Dreistündlich zwei Esslöffel voll
	für Pferde bei Druse nachdem die entzündlichen
	Erscheinungen gehoben sind

IsaLLEB's Katarrrhbröthen besteht aus mit Anisöl parfümtem Zucker mit etwas Salmiak

Ammonium citricum.

I. Ammonium citricum. Ammoniumcitrat. Citronensaures Ammon. Citrate d'Ammoniaque. Citras Ammonii $C_6H_5O_3(NH_4)_3$. Mol. Gew. = 243.

Das neutrale trockene Salz obiger Zusammensetzung ist kaum bekannt, bez es lässt sich durch Eindampfen der wässrigen Lösung nicht herstellen. Man benutzt daher zum Recepturgebrauche eine wässrige Auflösung desselben.

II Liquor Ammonii citrici Ammoniumcitratlösung 20 Proc. 34,3 g krystallisierte Citronensäure werden in 80 g destillirtem Wasser gelöst und der Lösung 84 g Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc (0,96 spec Gew) bez soviel hinzugefügt, dass eine neutrale oder sehr schwach saure Flüssigkeit entsteht, welche man mit destillirtem Wasser auf das Gesamtgewicht von 200 g bringt.

Die Lösung enthält 20 Proc Ammoniumcitrat $C_6H_5O_3(NH_4)_3$ und kann etwa 1 Woche hindurch aufbewahrt werden.

Bisweilen wird das Ammoniumcitrat als neutrale oder schwach säuerliche Saturation verwendet. Man braucht alsdann für

trocknes Ammonicitrat	Citronensäure	Ammoniakcarbonat	trocknes Ammonicitrat	Citronensäure	Ammoniakcarbonat
10,0	=	8,0 und 7,0	25,0	=	20,0 und 17,5
15,0		12,0 10,5	30,0		24,0 21,0
20,0		16,0 14,0	50,0		40,0 35,0

Das Ammoniumcitrat wird in Gaben von 1—2—3 g mehrmals täglich bei verschiedenen Leiden der Harnblase empfohlen. Im Organismus wird es zu Ammoniumcarbonat verbrannt.

Ammonium jodatum.

† **Ammonium jodatum** (Ergänz Hely) Ammonii Jodidum (U-St.). Jodhydrate d'Ammoniaque (Gall.) Ammonium hydrojodatum. Ammoniumjodid. Jodammonium. NH_4J Mol. Gew. = 145.

Darstellung. 1) Die in chemischen Laboratorien gebräuchlichste Vorschrift ist folgende. Man übergiesst 1 Th Eisenpulver mit 10 Th destillirtem Wasser und fügt allmählich, nöthigenfalls unter Abkühlen, 4 Th Jod zu. Nach beendeter Bildung des Ferrojodids filtrirt man durch Glaswolle, wäscht mit Wasser nach und löst in dem grünen Filtrate nochmals 2 Th Jod auf. Man verdünnt diese Lösung alsdann mit dem gleichen Volumen heissen Wassers, fällt sie mit einem Ueberschuss concentrirter Ammoniakflüssigkeit, erwärmt noch bis zum Dichtwerden des Fern-Ferrohydroxydes, filtrirt und dampft das Filtrat — zuletzt unter Zusatz von etwas Ammoniak — im Wasserbade, schliesslich im Sandbade bei 110° C zur Trockne. Die etwas einfachere Vorschrift von JACOBSEN giebt die Hely. 2) Hely. Eine Lösung von 6 Th Kaliumjodid in 6 Th destillirtem Wasser mischt man mit einer Lösung von 4 Th Ammoniumsulfat in 6 Th Wasser und fügt 2 Th Wein-

geist unter Vermischen hinzu Nach 12stündigem Stehen wird von der ausgeschiedenen Salzmasse abfiltrirt und das Filtrat zur Krystallisation abgedampft

Eigenschaften. Trockenes, weisses, an der Luft zerfließendes und allmählich gelb werdendes, aus Würfeln bestehendes krystallinisches Pulver, von scharf-salzigem Geschmack, nicht nach Jod riechend Es verdunstet sich beim Erhitzen ohne zu schmelzen und ist in 1 Th Wasser oder in 9 Th Weingeist löslich Die wässrige Lösung entwickelt mit Natronlauge den Geruch nach Ammoniak, durch Silbernitrat wird sie gelb gefällt Schüttelt man sie mit einem Tropfen Ferrichlorid und etwas Chloroform, so nimmt letzteres violette Färbung an Aufbewahrung Wegen der hygroskopischen Eigenschaften in gut geschlossenen, kleineren Gefässen, vor Licht geschützt, vorsichtig Ist es gelb geworden, so wird es mit weingeistiger Ammoniaklösung befeuchtet und wieder zur Trockne gebracht

Prüfung. 1) Es darf weder deutlich gelb sein, noch deutlich nach Jod riechen (schwache Gelbfärbung und schwacher Jodgeruch sind nicht zu vermeiden) 2) Die wässrige Lösung 1 20 darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert (Metalle) und durch Baryumnitratlösung nur schwach opalisirend getrübt werden (Schwefelsäure) 20 ccm derselben dürfen nach Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlösung nicht blau gefärbt werden (Eisen) 3) Werden 0,2 g getrocknetes Ammoniumjodid in 2 ccm Ammoniaklösung gelöst und mit 15 ccm $\frac{1}{10}$ -Silbernitratlösung unter Umschütteln vermischt, darauf filtrirt, so darf das Filtrat, nach Übersättigung mit Salpetersäure innerhalb 10 Minuten weder bis zur Undurchsichtigkeit getrübt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefärbt (Thiosulfat) erscheinen

Anwendung. Als schnell wirkendes Jodpräparat, namentlich als Antisymphiliticum und Antirheumaticum empfohlen, die Wirkung soll sicherer wie beim Jodkalium sein Innerlich in Gaben von 0,1—0,5 mehrmals täglich in Mixturen, der Zersetzlichkeit wegen mit Liquor Ammonii anisatus kombiniert Aeusserlich in Linimenten und Salben 1 20—80,0 Mischungen von Kaliumjodid und Ammoniumchlorid werden in Säckchen auf Geschwülste gelegt, das durch Umsetzung entstehende Ammoniumjodid soll zertheilend wirken **BRESLAU**

Candelae Ammonii jodati
Ammoniumjodid-Kerzen (Diet M.)

Rp	1 Carbonis Tillae pulv	825,0
	2 Ammonii jodati	100,0
	3 Kali nitrici	50,0
	4 Sacchari	5,0
	5 Cumarini	0,2
	6 Aquae	1000,0
	7 Tragacanthae pulv	20,0
	8 Olei Rosae	gtt X
	9 Balsami Peruviani	gtt XX

Man trinkt 1 mit der Lösung von 2—6, mischt 7—9 darunter und stösst mit Traganteschleim, welcher 2% Salpeter enthält, zur bildsamen Masse an Die Kerzen werden mit Zinnbronze beplustert

Linimentum antisymphiliticum GAMBERINI

Rp	Ammonii jodati	0,15
	Olei Olivarum	25,0

Misce conterendo Zum Einreiben bei nächtlichem (syphilitischen) Muskel- und Gelenkschmerz

Lotio contra perlonies

Rp	Ammonii jodati	5,0
	Aquae Rosae	50,0
	Aquae Coloniensis	5,0

Täglich abends die Frostbeulen damit zu bestreichen

Linimentum jodatum

Jod-Opodeldoes (Ergänz Bad Tuxen)

Rp	Ammonii jodati	10,0
	Linimenti saponali camphorati	80,0

Mixtura Ammonii jodati WALDENBURG

Rp	Ammonii jodati	5,0
	Aquae destillatae	100,0
	Liquoris Ammonii anisati	0,25
	Sirupi Sacchari	50,0

Dreistündlich einen Esslöffel

Sacculus ad strumam BRESLAU

Rp	Kali jodati	60,0
	Ammonii chlorati	80,0

Die getrocknete Pulvermischung wird in ein Mousselin-Säckchen gebracht, so dass das Pulver in 0,5 cm dicker Schicht vertheilt ist, das Säckchen verschlossen und durchgesteppt Zum Auflegen auf Kropf- und Drüsenanschwellungen

Sacculus contra tumores mammae

TANIGOU

Rp	Kali jodati	5,0
	Spongiae ustae	10,0
	Ammonii chlorati	40,0
	Salis olinaris	10,0

Säckchen wie vorher zu bereiten

Unguentum Ammonii jodati

	Ammonii jodati	1,0
	Aquae destillatae	gtt X
	Adipis suilli	20,0

Zum Einreiben der Frostbeulen, des Kropfes

Ammonium molybdaenicum.

I. Ammonium molybdaenicum. Ammoniummolybdaenat. Molybdaensaures Ammon. $\text{Mo}_2\text{O}_4(\text{NH}_4)_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 1236.

Darstellung. Man löst Molybdänsäure (s. S. 72) unter Erwärmen in 20procentigem Ammoniak und dampft die Lösung bis zum Salzhäutchen ein, indem man durch gelegentlichen Zusatz kleiner Mengen von Ammoniak dafür Sorge trägt, dass die Lösung bis zum Schluss alkalisch bleibt — Im Handel ist das Salz in grosser Reinheit erhältlich

Eigenschaften. Weisse Krystallmassen aus glänzenden, harten, prismatischen Krystallen bestehend. Es löst sich in Wasser klar auf. Giesst man diese Lösung in einen Ueberschuss von Salpetersäure, so erfolgt zuerst weisse Ausscheidung von Molybdänsäure, welche sich aber im Ueberschuss von Salpetersäure wieder auflöst. (Bleibt eine Trübung, so deutet diese auf Verunreinigung durch Phosphorsäure)

Prüfung. 1) 10 g des Salzes geben mit 25 ccm Wasser und 15 ccm Ammoniak flüssigkeit von 0,910 eine klare Lösung. Giesst man diese in 150 g Salpetersäure von 1,2 spec Gew., so darf die gemischte Flüssigkeit auch nach 2ständigem Stehen in gelinder (!) Wärme keine gelbe Ausscheidung zeigen (Phosphorsäure). 2) Die Lösung in Ammoniak flüssigkeit (1:10) werde durch Schwefelammonium nicht verändert (Metalle). 3) Die mit Salpetersäure angesauerte wässrige, wenn nöthig filtrirte Lösung werde durch Silbernitrat und Baryumnitrat höchstens sehr schwach getrübt.

Anwendung. Als Reagens zum Nachweis und zur Bestimmung der Phosphorsäure. Eine Lösung von Ammoniummolybdat in Salpetersäure giebt mit Phosphorsäure beim Stehen in der Wärme einen gelben Niederschlag von molybdän-phosphorsaurem Ammon. $22\text{MoO}_3 + 2(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$. Dieses ist in verdünnter Salpetersäure, in Ammoniumnitratlösung und in salpetersaurer Ammonmolybdänatlösung unlöslich. Löslich dagegen in Ammoniak. Aus dieser letzteren Lösung wird die Phosphorsäure durch Magnesiaamixtur als Ammonium-Magnesiumphosphat quantitativ gefällt.

II. Ammoniummolybdänatlösung mit Salpetersäure. Reagens zur Bestimmung der Phosphorsäure. 1) Nach P. WAGNER. Man löst 150,0 g Ammoniummolybdänat in 500 ccm Wasser, fügt 400,0 g Ammoniumnitrat hinzu und füllt mit Wasser bis zu 1 Liter auf. Diese Lösung giesst man in 1 Liter Salpetersäure von 1,2 spec Gew. (nicht umgekehrt), lässt die Mischung 24 Stunden an einem warmen Orte stehen und filtrirt. 100 ccm dieser Lösung entsprechen = 0,1 g P_2O_5 . 2) Nach O. MEINCKE. Man löst 150 g Ammoniummolybdänat in 150 ccm Ammoniakflüssigkeit von 0,91 spec Gew. und 850 ccm Wasser und giesst diese Lösung unter Umrühren in 1 Liter Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. Man erhitzt die Mischung 10 Minuten lang auf 90° C. Die durch Dekanthiren und Filtriren von der reichlich ausgeschiedenen Molybdänsäure getrennte Flüssigkeit, hält sich, vor Licht geschützt aufbewahrt, lange Zeit klar. 100 ccm der Lösung entsprechen = 0,1 g P_2O_5 .

Die im Laufe längerer Aufbewahrung in diesen Lösungen sich ausscheidenden weissen Krystalle sind Molybdänsäure. Die nach längerer Zeit entstehenden gelben Ausscheidungen sind nicht Phosphor-Molybdänsäure, sondern eine gelbe Modifikation der Molybdänsäure.

Aufarbeitung der Molybdänrückstände. Nach P. WAGNER. Die bei der Bestimmung der Phosphorsäure hinterbliebenen sauren Molybdänflüssigkeiten werden in einer etwa 10 Liter fassenden Flasche A, die ammoniakalischen Filtrate in einer eben solchen Flasche B gesammelt. Sind die Flaschen gefüllt, so wird ein Windofen an einem zugigen Orte aufgestellt und geheizt. Auf denselben setzt man einen mit Wasser gefüllten (als Wasserbad dienenden) kleinen Kessel¹⁾ und in diesen eine etwa 5 Liter fassende Porzellanschale ein. Der Inhalt von A wird klar abgehebert, in die Porzellanschale gegeben und allmählich bis auf 1,5 Liter verdampft. Fast die ganze, vorher gelöste Molybdänsäure hat sich als Kruste an die Schale angesetzt. Man lässt die Schale erkalten, bespritzt die Mutterlauge, spült die Molybdänsäurekruste mit etwas Wasser ab, das man wieder in

¹⁾ Wird die Porzellanschale direkt auf den Windofen gesetzt, so springt sie regelmässig infolge Bildung von Molybdänsäurekrusten.

Flasche A zurückgiebt. Nun bringt man die Schale wieder auf das Wasserbad und fügt die aus der Flasche B inzwischen abgehaberte ammoniakalische Flüssigkeit hinzu, in welcher sich die Molybdänsäurekruste bald auflöst. Man lässt abdampfen, bis schliesslich die gesamte Flüssigkeit aus B in die Schale gebracht ist, und das Gesamtvolumen noch 1,5 Liter beträgt. Hierauf filtriert man noch heiss in eine andere Schale und lässt einige Tage in der Kälte stehen.

Das auskristallisierte Ammoniummolybdäat wird von der Mutterlauge getrennt, mit etwas Wasser, das man der Mutterlauge zufügt, abgespült, alsdann durch Umkristallisieren gereinigt und zur Bereitung der Molybdänlösung verwendet.

Die Mutterlauge engt man auf etwa $\frac{1}{2}$ Liter ein, lässt auskristallisieren, giesst die zweite Mutterlauge fort, lässt die abgeschiedene Krystallmasse trocknen und löst sie bei der nächsten Vorarbeitung der Molybdänrückstände in der Krystallisationslauge wieder auf.

Ammonium nitricum.

Ammonium nitricum (Ergänzb.) Ammonii Nitras (Brit. U-St.) Nitrum flammans. Ammoniumnitrat. Salpetersaures Ammon. Ammonsalpeter. Azotate ou Nitrate d'Ammoniaque. NH_4NO_3 . Mol. Gew. = 80.

Darstellung. Man neutralisirt 100 Th reiner Salpetersäure (von 1,153 spec Gew. = 25% NO_3H) mit 68 Th Ammoniakflüssigkeit (0,96 spec Gew.) und bringt die Lösung durch Eindampfen zur Krystallisation. Kleinere Mengen kann man direkt zur Trockne eindampfen. — Man kann die Neutralisirung der Salpetersäure auch mit Ammoniumkarbonat ausführen. In diesem Falle bedarf man für 100 Th Salpetersäure obiger Stärke (1,153 spec Gew.) etwa 21 Th Ammoniumkarbonat.

Eigenschaften. Farblose und geruchlose, rhombische Prismen von kühlend salzigem Geschmack, in 0,5 Th Wasser oder in 20 Th Weingeist zu sauer reagierenden Flüssigkeiten löslich. Vorsichtig erhitzt, schmilzt es bei 165°C , bei höherem Erhitzen (230 — 250°C) verflüchtigt es sich unter Zersetzung in Stickoxydul und Wasser. Auf glühende Kohlen geworfen, verursacht es Funkensprünge. Beim Auflösen in Wasser erzeugt es Temperatur Erniedrigung. Die wässrige Lösung entwickelt, mit Natronlauge erwärmt, Ammoniak. Mischt man 2 ccm derselben mit 2 ccm Ferrosulfatlösung und schichtet diese Lösung auf cone Schwefelsäure, so entsteht eine braunschwarze Zonenfärbung.

Prüfung. Die wässrige Lösung 1) 20 werde 1) durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert (Metalle). 2) Sie werde nach Zusatz von Ammoniak weder durch Ammoniumsulfat (Kalk) noch durch Natriumphosphatlösung (Magnesia) getrübt. 3) Silbernitrat und Baryumnitratlösung dürfen sie innerhalb 5 Minuten nicht verändern (Chlor, Schwefelsäure). 4) 20 ccm der Lösung dürfen durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlösung nicht gebläut werden. 5) 1 g des Salzes verflüchtige sich beim Erhitzen, ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Anwendung. Man hat es in Gaben von 0,5—1,0—1,5 g drei bis viermal täglich als Diaphoreticum und Diureticum bei Fiebern, Katarrhen, aber ohne rechten Erfolg gegeben. Man beachte, dass grosse Dosen toxisch, ja tödtlich wirken können, da Ammoniumnitrat ein Blutgift ist und wie Kalium chloricum Methämoglobin bildet. — Es diert ferner zur Darstellung des Stickoxyduls (Lachgases). In der Analyse bedient man sich des Salzes, um die Verbrennung organischer Substanzen zu befördern, z. B. verbrennt ein mit Ammoniumnitratlösung getränktes und hierauf getrocknetes Filter sehr rasch. Man beachte aber, dass Ammoniumnitrat beim Erhitzen mit leicht entzündlichen bez. leicht oxydabaren Substanzen (Phosphor, Kohle, organische Stoffe) die Einhaltung der gleichen Vorsicht erfordert wie z. B. Kaliumnitrat. Man verwendet es ferner zum Auswaschen von Niederschlägen, welche sonst leicht durch das Filter gehen (Zinnsturehydrat), bei der Abscheidung der Phosphorsäure nach der Molybdänmethode. — Zu den bisher angeführten Verwendungen bedarf man des als Ammonium nitricum purissimum in den Preislisten aufgeführten Präparates.

Dagegen kann man für Kälte Lösungen oder Mischungen ein weniger reines Salz verwenden.

Ammonium phosphoricum.

I Ammonium phosphoricum (Erganz.) **Ammonii Phosphas** (Brit.) **Ammoniumphosphat**. Phosphorsaures Ammonium. Di-Ammonium-Phosphat. $\text{PO}_4\text{H}(\text{NH}_4)_2$. Mol. Gew. = 132

Darstellung. Man dampft in einer Porcellanschale 100 Th. Phosphorsäure (25 Proc.) etwa bis zur Hälfte ab, giebt alsdann soviel 20procentige Ammoniakflüssigkeit (0,925 spec. Gew.) hinzu (60—70 Th.), dass die Flüssigkeit stark alkalisch reagirt, und dampft zur Krystallisation weiter ein, indem man durch gelegentliche Zugabe kleiner Mengen starken Ammoniaks dafür sorgt, dass die Reaction bis zum Schluss alkalisch bleibt. Die in der Kälte ausgeschiedenen Krystalle werden auf Filtrirpapier, bez. porösen Scheiben an der Luft rasch getrocknet.

Eigenschaften. Farblose, säulenförmige Krystalle oder ein weisses Krystallpulver, geruchlos, von kühlend salzigem Geschmack. Löslich in 4 Th. kaltem oder 0,5 Th. siedendem Wasser, unlöslich in Alkohol. Die wässrige Lösung ist neutral oder schwach-sauer. An der Luft verliert das Salz allmählich Ammoniak und nimmt dann saure Reaction an. Auf dem Platinblech erhitzt, schmilzt es, Ammoniak und Wasser entweichen, als Rückstand hinterbleibt Metaphosphorsäure. Die wässrige Lösung giebt mit Silbernitrat einen gelben, beim Erwärmen sich leicht bräunenden (phosphorige Säure) Niederschlag, der sowohl in Salpetersäure als auch in Ammoniak löslich ist. Beim Erwärmen mit Natron-lauge entwickelt die Lösung Ammoniak.

Prüfung. 1) Wird 1 g. des zernerbten Salzes mit 8 ccm. Zinnchloridlösung geschüttelt, so darf im Verlaufe einer Stunde Braunfärbung nicht eintreten (Arsen). 2) Die wässrige Lösung (1:20) sei neutral, event. werde sie durch Ammoniakzusatz neutralisirt. 3) Sie brause beim Ansäuern mit Salpetersäure nicht auf (Ammoniumcarbonat) und werde alsdann durch Baryumnitrat nicht getrübt. 4) Sie werde durch Schwefelwasserstoffwasser weder direkt noch nach vorherigem Zusatz von Ammoniak verändert (Metalle wie Blei, Kupfer, Zink).

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen an einem kühlen Orte.

Anwendung. Die Wirkung gleicht im ganzen der anderer Ammonsalze. Es ist in Gaben von 0,5—1,0—2,0 g. bei chronischen Krankheiten empfohlen worden, denen harnsaure Diathese zu Grunde liegt wie Rheumatismus, Gicht, indessen wenig eingeführt. Technisch als Zusatz (5 Proc.) zur Appretur (Stärke), um Gewebe schwieriger entzündlich zu machen. In der Analyse zum Nachweis und zur Bestimmung der Magnesia.

HENSEL's Nervensalz ist Ammoniumphosphat. Uebrigens nicht zu verwechseln mit HENSEL's physiologischem Salz.

Pflanzen-Dünger nach Prof. WAGNER (Für Garten und Topfpflanzen.) Ammonium phosphoricum 30,0, Natrium nitricum 25,0, Kalium nitricum 25,0, Ammonium sulfuricum 20,0. In verdünnter Lösung, nicht über 1:1000, zu verwenden.

Mistura antarthritica BUCKLEN		Mistura Ammonii phosphorici,	
Rp	Ammonii phosphoricum 25,0	Rp	Ammonii phosphoricum 5,0—20,0
	Aquae destillatae 150,0		Aquae destillatae 1000,0
	Syrupi Althaeae 35,0		Mucosae Sacchari Citri 4,0
			Aciduli tartarici 1,0
			Sacchari 50,0
Dreimal täglich einen Esslöffel, bei Gicht, Rheumatismus aus Harnsäure-Diathese		In 1—2 Tagen zu verbrauchen; bei Gicht, Rheumatismus	

II Ammonium-Natrium phosphoricum. Sal fusibile urinae. Sal microcosmicum. Phosphorsalz. Natrium-Ammoniumphosphat. Phosphate de Soude et d'Ammoniaque. Phosphas ammoniaco-sodiens. $\text{NaNH}_4\text{PO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 200.

Darstellung. 500 Th. Phosphorsäure (1,154 spec. Gew. = 25 Proc.) werden in einem Kasserol aus Porcellan erhitzt, allmählich mit 69 Th. geglühtem, reinem Natriumcarbonat versetzt und auf die Hälfte eingedampft. Alsdann setzt man 225 Th. Ammoniakflüssigkeit (0,960) hinzu, filtrirt heiss und dampft die Lösung entweder bis zum Salzrückstand ein und lässt in der Kälte krystallisiren, oder man fällt das Salz aus der erkalteten kon-

centrirten Lösung durch Zumischen des gleichen Volumens Alkohol. Man trocknet das Salz zwischen Fliesspapier bei einer 25–80° C nicht übersteigenden Wärme. Ausbeute 250 Th.

Farblose Krystalle, in 5 Th. Wasser von gewöhnlicher Temperatur löslich. Beim Erhitzen verliert es Ammoniak und Wasser und hinterlässt Natriummetaphosphat PO_3Na als einen farblosen Glasfluss. Dieser hat die Eigenschaft, Metalloxyde aufzulösen und damit Doppelsalze der Orthophosphorsäure zu geben, z. B. $\text{PO}_3\text{Na} + \text{CuO} = \text{PO}_4\text{CuNa}$. Da einige dieser Glasflüsse charakteristisch gefärbt sind, so dient das Salz unter dem Namen „Phosphorsalz“ in der „Analyse auf trockenem Wege“ zur Herstellung der sog. Phosphorsalzpfeilen. Bisweilen auch als Fällungsmittel zur Bestimmung der Magnesia.

Das verwittrte Phosphorsalz ist als Schweisspulver für Kupfer empfohlen worden.

Ammonium sulfuratum.

Ammonium sulfuratum. Ammonium hydrosulfuratum. Ammonium hydrothioncum. Ammoniumsulfid. Schwefelammonium. Ammoniumsulfuret. Sulfure d'Ammonium. Ammonium-Sulphide.

Unter dem Namen „Schwefelammonium“ werden eine Anzahl verschiedener Substanzen zusammengeworfen, welche gleichwohl streng unterschieden werden müssen.

I. Ammonium sulfhydricum. Ammoniumsulfhydrat. Saures Ammoniumsulfid. NH_4SH . Nur in Lösung bekannt.

Darstellung. Man stellt einen Apparat zusammen, welcher einen ausgiebigen Strom von Schwefelwasserstoff liefert, wäscht diesen — um mechanisch mitgerissene Eisenverbindungen abzufangen — in einer Waschflasche mit etwas Wasser und leitet alsdann dieses gewaschene Gas in eine, 10procentige Ammoniakflüssigkeit enthaltende Vorlage. Das Gasleitungsrohr braucht nur etwa halb in das Ammoniak einzutauchen. Man leitet nun einen langsamen Strom Schwefelwasserstoff unter gelegentlichen Umschwenken ein, bis das Gas nicht mehr absorbiert wird, also ein Ueberschuss desselben vorhanden ist.

Magnesiumsulfatlösung darf alsdann durch diese Schwefelammoniumlösung weder in der Kälte noch in der Wärme gefällt werden.


Die erhaltene Lösung ist farblos und erhält das saure Salz Ammoniumsulfhydrat NH_4SH . Durch die Einwirkung der Luft wird die Lösung gelb gefärbt.

II. Ammonium sulfuratum neutrale. Neutrales, farbloses Schwefelammonium. Einfach-Schwefelammonium $(\text{NH}_4)_2\text{S}$. Hatte man, wie sub I angegeben, z. B. 300 cem Ammoniakflüssigkeit (10procentig) vorgelegt und mit Schwefelwasserstoff vollständig gesättigt, so könnte man rechnungsmässig durch Zugabe von nochmals 300 cem der nämlichen Ammoniakflüssigkeit aus dem sauren Sulfid das neutrale herstellen.

Da aber während des Einleitens Verluste von Ammoniak nicht zu vermeiden sind, so zieht man es in der Praxis vor, die Neutralisation mit etwas weniger Ammoniak auszuführen. Man legt also 3 Th. Ammoniakflüssigkeit vor, sättigt diese vollständig mit Schwefelwasserstoff und mischt alsdann nur 2 Th. der nämlichen Ammoniakflüssigkeit hinzu. Das Präparat enthält alsdann vorwiegend neutrales Ammoniumsulfid $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ und ausserdem kleine Mengen Ammoniumsulfhydrat NH_4SH , aber kein freies Ammoniak, und auf die Abwesenheit des letzteren wird besonders Werth gelegt, während die Anwesenheit des Sulfhydrates gleichgültig ist.

Frisch bereitet eine farblose Flüssigkeit, welche stark nach Ammoniak und Schwefelwasserstoff riecht, mit Säuren versetzt, reichliche Mengen von Schwefelwasserstoff abgibt, aber ursprünglich keinen Schwefel ausscheidet. Es bringt in Magnesiumsulfatlösung keinen Niederschlag hervor.

Der Luft ausgesetzt färbt es sich gelb, es enthält alsdann neben Einfach-Schwefel ammonium auch noch Zweifach-Ammonium $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2$ und nach längerer Zeit entsteht durch weitere Einwirkung des Luftsauerstoffes auch noch Ammoniumthiosulfat



Jedes gelb gewordene Schwefelammonium scheidet auf Zusatz von Säuren ausser Schwefelwasserstoff auch noch Schwefel als weisse, milchige Trübung aus

III Ammonium polysulfuratum Poly-Schwefelammonium. Gelbes Schwefelammonium $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$ bez. S_x .

Lässt man das Einfach-Schwefelammonium an der Luft stehen, so färbt es sich gelb, indem zunächst Ammoniumdisulfid, später -Trisulfid etc entstehen Für viele Zwecke kann man solches durch mässige Luftteinwirkung gelb gewordenen Ammoniumsulfid verwenden Rascher erhält man das gelbe Schwefelammonium, wenn man das Einfach Schwefelammonium (sub II) mit etwas Schwefelpulver (10 g pro 1 Liter) digerirt und dann filtrirt

Es unterscheidet sich von den vorigen sub I und II dadurch, dass es beim Versetzen mit Säuren ausser Schwefelwasserstoff auch noch Schwefel abscheidet

Prüfung. 1) Beim Eindampfen und Erhitzen in einer Porzellanschale sollen 10 cem keinen wagbaren Rückstand hinterlassen 2) Mit Salzsäure bis zur sauren Reaktion versetzt, sollen reichliche Mengen Schwefelwasserstoff und ein reinweisser (nicht gefärbter) Niederschlag von Schwefel auftreten (Arsen, Antimon, Zinn) 3) Es bringe weder in Calciumchloridlösung (Ammonkarbonat) noch in Magnesiumsulfatlösung (feines Ammoniak) einen Niederschlag hervor

Anwendung. Schwefelammonium ist ein wichtiges Gruppen-Reagens in der analytischen Chemie Für diesen Zweck wird sowohl das einfache wie das gelbe Schwefelammonium je mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt Man kann im allgemeinen beide promiscue gebrauchen, doch ist zu beachten, dass nur von gelbem Schwefel ammonium das braune Stannosulfid SnS in Lösung gebracht, von farblosem Schwefelammonium aber nicht gelöst wird Technisch von Silberarbeitern zur Herstellung von sog oxydtem Silber (Altsilber) verwendet

Aufbewahrung. In nicht zu grossen, fast völlig gefüllten Flaschen mit Glas stopfen Man verkittet diese mit etwas Baumwachs und bewahrt sie an einem kühlen Orte, am besten unter Wasser getaucht, auf

† **Spiritus Sulfuris Beguin** Liquor fumans Boyle Liquor Ammonii quinquesulfurati Hepar Sulfuris volatile Beguin'scher Schwefelgeist War ursprünglich ein Destillat aus einem Gemisch von 1 Schwefel, 2 Kalkhydrat und 2 Salmiak (Ammoniumchlorid) Jetzt bereitet man das Präparat, indem man 1 Th gereinigtes Schwefelblumen mit 6—8 Th Ammoniakflüssigkeit von 20 Proc (spec Gew = 0,925) übergiesst und in die Mischung solange gewaschenen Schwefelwasserstoff einleitet, bis der Schwefel gelöst ist

Anwendung Man hat dieses Medikament früher gegen solche Krankheiten verwendet, bei denen man den Schwefel für specifisch heilkräftig ansah, also bei Syphilis, Rheumatismus, Podagra Dosis drei- bis viermal 8—4 Tropfen mit viel Wasser oder Milch verdünnt Nach und nach um einen Tropfen steigend, Maximaldosis 10 Tropfen

Der Beguin'sche Schwefelgeist kann sehr wohl durch gelbes Schwefelammonium ersetzt werden Da dieses wesentlich schwächer ist, so nimmt man das Doppelte der als Beguin'scher Schwefelgeist verordneten Menge

Mixtura hydrosulfurata LATZ

Rp Liquoris Ammonii hydrosulfurati 5,0
Aquae destillatae 250,0
Zweistündlich einen Esslöffel gegen carcinomatöse Dyskrasie

Tinctura Sulfuris volatilis.

Liquor antipodagricus HOFFMANN
Rp Spiritus Sulfuris Beguin 5,0
Spiritus Vini 15,0

Ammonium sulfuricum.

Ammonium sulfuricum (Hely Ergänz.) **Sal ammoniacum secretum** Glanber. **Ammoniumsulfat** Schwefelsaures Ammon. **Sulfate d'Ammoniaque.** **Sulfas Ammonii.** $\text{SO}_4(\text{NH}_4)_2$. Mol. Gew. = 132 Das rohe Salz wird in Kokereien durch Sättigung roher Schwefelsäure mit Ammoniakdämpfen, in chemischen Fabriken durch Verarbeitung des Ammoniakwassers der Gasanstalten dargestellt Ausserdem ist noch ein reines Ammoniumsulfat im Handel, das wie folgt bereitet wird

Darstellung Man mischt 100 Th reiner konz Schwefelsäure mit 200 Th destillirtem Wasser und neutralisirt diese Lösung mit 20procentigem Ammoniak (0,925), wozu etwa 170 Th erforderlich sein werden Man filtrirt die Lösung, wenn es erforderlich sein sollte, und dampft sie bis zum Krystallhauchten ab Ausbeute etwa 125 Th

Eigenschaften Farblose, rhombische Prismen, oder ein farbloses Krystallmehl, an der Luft unveränderlich, geruchlos, von scharf salzigem Geschmack Löslich in 2 Th kaltem oder 1 Th siedendem Wasser, in Alkohol unlöslich Die wässrige Lösung ist neutral, sie giebt mit Baryumchlorid einen weissen Niederschlag, beim Erwärmen mit Natronlauge entwickelt sie Ammoniak Beim Gluhen zerfällt das Salz in Ammoniak und Schwefelsäure. Letztere kann unter Umständen in den Glühgefassen hinterbleiben

Prüfung Die wässrige Lösung 1 10 werde 1) nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nicht getrübt (Chlor) 2) durch Schwefelwasserstoff weder direkt noch nach Zusatz von Ammoniak verändert (Metalle) 3) Nach Zusatz von 2 Tropfen Salzsäure durch eine geringe Menge Eisenchlorid nicht geröthet (Rhodanammonium) 4) Auf Eisen speziell wäre im Marsh'schen Apparate zu prüfen 5) 1 g verdunstet sich beim Erhitzen auf Platinblech ohne Rückstand

Das Ammoniumsulfat galt eine Zeit lang für ein gelindes Abführmittel, man gab es zweistündlich in Mengen von 1—2 g Heute ist es verlassen Technisch dient es hauptsächlich zur Darstellung einiger Ammoniapräparate, z B des Ferrum sulfuricum ammoniacum In der Analyse zur Fällung der Albuminosen und Trennung derselben nach Kühne und Cirtenden, auch zur Kontrolirung des Stickstoff- bez Saure-Titers

Das rohe Ammoniumsulfat (s o) wird hauptsächlich als Düngemittel verbraucht Es ist häufig so stark arsenhaltig (As_2S_3), dass es schon ausserlich gelb gefärbt erscheint Es ist ferner immer mehr oder weniger rhodanhaltig, eine sehr schädliche Verunreinigung, die seinen Düngewerth erheblich herabsetzt — Zur annähernden Bestimmung dieser Verunreinigung mischt man eine filtrirte Lösung von 10 g Ammoniumsulfat mit einer Lösung von 2 g kryst Kupfersulfat und 3 g kryst Ferrosulfat in 15 g destillirtem Wasser, macht mit verdünnter Schwefelsäure stark sauer, sammelt nach $\frac{1}{2}$ Stunde den Niederschlag auf gewogenem Filter, wäscht erst mit verdünnter Schwefelsäure, dann mit Wasser aus und trocknet und wägt Beträgt das Gewicht des Cuprorhodanids $\text{Cu}(\text{SCN})$ mehr als 0,5 g, so wäre das Ammoniumsulfat als Düngemittel zurückzuweisen — Die Werthbestimmung des Ammoniumsulfats erfolgt durch Bestimmung des Ammoniakgehaltes in der S 258 beschriebenen Weise Der Gehalt des reinen Salzes an Ammoniak (NH_3) beträgt 25,757 Proc, im rohen Salze erreicht er durchschnittlich 20 Proc — Technisch verwendet man 5proc Lösungen des rohen Salzes zum Unverbrenlichmachen der Gewebe, z B der Theater-Coulissen, Prospekte etc

Für leichte Gewebe
Rp Ammonii sulfurici 5,0 kg
Ammonii carbonici 2,5 "
Boracis 2,0 "
Acidi borici 3,0 "
Amyli 2,0 "
(od 0,4 kg Dextrin bez Gelatine)
Aquaes 100 "
Die Gewebe sind mit der auf
80° C erwärmten Flüssigkeit zu
imprägniren, dann zu trocknen
und zu plätten

Für Couissen, Holz, Möbel
Rp Ammonii sulfurici 15 kg
In 100 kg Wasser zu lösen Zum
Konsistentmachen ist etwas Leim
und Schlemmkreide zuzusetzen
Für Holz, Tauwerk, Stroh
Rp Ammonii sulfurici 15 kg
Acidi borici 6 "
Boracis 8 "
Aquaes 100 "
In die auf 100° C erhitze Flüssig-
keit eintauchen, auspressen und
trocknen

Papier bedruckt und unbedruckt.
Rp Ammonii sulfurici 8 kg
Acidi borici 8 "
Boracis 2 "
Aquaes 100 "
Mit der auf 50° C erhitzten Flüssig-
keit bestreichen, dann trocknen.

Ammonium uricum.

Ammonium uricum seu **uricum** **Ammoniumurac.** Harnsaures Ammonium **Urate d'Ammoniaque. Urate of Ammonia.** $C_4H_8N_4O_6 \cdot NH_3$. Mol. Gew. = 185.

Darstellung Man übergiesst 10,0 Harnsäure mit 20,0 destillirtem Wasser, erwärmt im Wasserbade und fügt allmählich soviel 10proc Aetzkalllauge hinzu, bis Auflösung erfolgt ist. Die filtrirte warme Lösung versetzt man mit einem Ueberschuss von Ammoniumchlorid und lässt einige Zeit in mässiger Wärme, dann einen Tag in der Kälte stehen. Der ausgeschiedene Niederschlag wird gesammelt, gewaschen und bei mässiger Wärme getrocknet. Ausbeute ca 11,0

Eigenschaften Das so dargestellte Präparat ist das saure Ammoniumurat. Ein körnig krystallinisches, weisses Pulver, geruchlos, fast geschmacklos, in etwa 1600 Th kaltem Wasser löslich. Beim Kochen mit Wasser verliert es seinen Ammoniakgehalt unter Hinterlassung von Harnsäure — Dampft man eine Spur des Salzes mit Salpetersäure auf dem Wasserbade zur Trockne, so nimmt der gelbe Rückstand auf Annäherung von Ammoniak rothe Färbung an, beim Befeuhen mit Kalllauge tritt prächtige blauviolette Färbung an (Murexid-Reaktion) S S 144

Anwendung. Innerlich gelegentlich einmal gegen katarrhalische Affektionen der Athmungsorgane angewendet. Dosis für Kinder 0,03 g, für Erwachsene 0,06 g mehrmals täglich. Aeusserlich in Salben (1:25—20,0) gegen Ekzema und Impetigo. Hat sich indessen nicht eingeführt.

Amygdalus.

Prunus Amygdalus Stokes (*Amygdalus communis* L.). Rosaceae—Prunoidene. Heimisch in Turkestan und Mittelasien, kultivirt im Orient, Nordafrika, Südeuropa bis nach England, des Samens wegen. Die Frucht ist eine bis 4 cm lange, zunächst fleischige, später lederige Steinfrucht, die aufreisst und den Samen mit der Steinschale entlässt. Kommt mit süssen und bitteren Samen vor. *Amygdalae dulces* und *Amygdalae amarae* der Pharmacee.

I. Amygdalae dulces (Germ Austr) *Amygdala dulcis* (Helv. Brit USt) Samen *Amygdali dulcis*. Süsses Mandeln. *Amandes douces* (Gall) Sweet almonds.

Beschreibung Bis 4,0 cm lang, bis 1,5 cm breit, eiförmig, an den Seiten abgeplattet, mit der braunen schieferigen Samenschale bedeckt, die am breiten Ende die grosse Obalaza erkennen lässt, von der aus sich die Gefässbündel durch die ganze Samenschale verzweigen. Innerhalb der Samenschale ein ganz dünnes Endosperm und der Embryo mit zwei dicken Kotyledonen, die die kurze Radicula am spitzen Ende des Samens und die Plumula umschliessen.

Die schieferige Beschaffenheit der Samenschale wird durch die grossen, verholzten, porösen Zellen der Epidermis bedingt, die recht charakteristisch sind und auf die man achtet, wenn es sich darum handelt, Mandeln, natürlich ungeschälte, in einem Gemenge nachzuweisen (Fig 49a). In den Zellen des Embryo ist Plasma, fettes Oel, Aleuron, aber keine Stärke, aufzufinden.

Bestandtheile. 48—56 Proc fettes Oel, 8 Proc gummiartiger Stoff, 6—10 Proc Zucker, 20—25 Proc Proteinkörper, 3—5 Proc Asche, 6,0 Proc Wasser.

Sorten. Als beste gelten die schlanken, bis 4 cm langen Malaga- oder Jordanmandeln, ihnen wohl gleichwertig sind die spanischen Valence- und Alicantomandeln, dann folgen die italienischen Florentiner, Puglieser und Communmandeln, sowie die südfrenchischen, die alle kürzer und dicker sind. Wenig geschätzt werden die kleinen afrikanischen „berberischen“ Mandeln.

II. Amygdalae amarae (Germ. Austr.). *Amygdala amara* (Helv. Brit. U-St.). **Semen Amygdali amarum. Bittere Mandeln.** — *Amandes amères* (Gall.). — **Bitter almonds.**

Im Allgemeinen etwas kleiner wie die vorigen.

Bestandtheile. 33–50 Proc. fettes Oel, 2–3 Proc. gummiartiger Stoff, 5 Proc. Zucker, 25–35 Proc. Proteinkörper, 1,75–3,3 Proc. Amygdalin, 3,2 Proc. Asche, 5,5 Proc. Wasser. Das Amygdalin ist ein Glukosid, es zerfällt beim Zerreiben mit Wasser unter der Einwirkung des ebenfalls in den Mandeln (auch in den süßen) enthaltenen Fermentes: Emulsin, unter Aufnahme von Wasser, am besten bei 10–25° C. in Cyanwasserstoff, Benzaldehyd und Zucker.



Verfälschungen und Substitutionen: Den bitteren Mandeln werden häufig die aus Südrussland und Ungarn stammenden Samen von *Prunus nana* Jess., sowie Pflirsich- und Aprikosensamen substituiert (cf. Ol. Amygdalarum).

Künstliche Mandeln hat man in Amerika hergestellt; aus Runkelrüben geformt, mit Leim überzogen und geröstet, sollen sie echten Mandeln äusserlich sehr ähnlich sein.




Fig. 49. Gewebe der Mandel. E Endosperm. ep Epithel der Samenhaut. a Epidermis der Samenschale. C Parenchym der Cotyledonen. Ca Epidermis derselben (nach MOELLER).

Aufbewahrung. Bruchstücke und beschädigte Samen werden durch Auslesen entfernt, dann die Samen mittelst eines feinen Drahtsiebes vom Staube befreit. Kleinere Vorräthe bringt man in Hafengläser, grössere in Holzkästen auf die Materialkammer, beseitigt dieselben öfter und entfernt von Insekten zerstörte oder verdächtige Samen, die weich, biegsam und im Innern nicht rein weiss sind.

Amygdalae decorticae. Nach kürzerem Einweichen in heissem, oder längerem in kaltem Wasser lässt sich die braune Samenschale mit dem Endosperm leicht entfernen. Geschälte Mandeln hält man nicht, oder nur in geringer Menge vorrätig.

Anwendung. Die süßen Mandeln dienen zur Herstellung der Emulsio Amygdalarum, deren Geschmack man zuweilen durch Zusatz einiger bitterer Mandeln verbessert, ferner, wie die bitteren, zur Gewinnung des Oleum Amygdalarum. Aus den danach zurückbleibenden Presskuchen von bitteren gewinnt man Aq. Amygdal. am., aus denen der süßen, die man pulvert, Mandelkleie. Zur Versüssung der Emulsion wählt man passend Sir. simpl., also keine Fruchtsäfte; Austr. lässt von vornherein Zucker zusetzen.

III. Oleum Amygdalae (Helv.) O. A. expressum (U-St.). **Oleum Amygdalarum** (Austr. Germ.). **Oleum Amygdalarum dulcium s. expressum, s. frigide paratum.** — Mandelöl. Süßmandelöl. — *Hulle d'Amande douce* (Gall.). — **Expressed oil of Almond.**

Nach Austr. das aus süßen, nach Germ. Helvet. U-St. auch das aus bitteren Mandeln gepresste fette Oel, in letzterem Falle meistens gelegentlich der Bereitung von Bitter-

mandelwasser Die Samen werden, nach Entfernung der weichen und zerbrochenen, grob gestossen oder gerieben, in einen dicken Pressbeutel, kleinere Mengen wohl auch in eine doppelte Lage Fließpapier eingeschlagen und unter ganz allmählich gesteigertem Druck ausgepresst. Man verlegt die Arbeit möglichst in die warme Jahreszeit, in der kälteren erwärmt man die Pressplatten gelinde (aber nicht über 80°C). Da das Oel nur unvollkommen ausgepresst wird, so pulvert man die Presskuchen und presst noch einmal. Das nach mehrtägigem Absetzen klar filtrirte Oel füllt man in trockene, braune Flaschen, verschlieset mit neuen Korken und bewahrt es in einem kühlen Raume auf. Ausbeute aus süßen Mandeln 40–45 Proc, aus bitteren 30–36 Proc.

Werden die Pressrückstände als Zusatz zu Verschönerungsmitteln verwendet, so sollten die Mandeln zuvor geschält werden.

Eigenschaften. Das Mandelöl ist nicht austrocknend, klar, dünnflüssig, gelblich, fast geruchlos, von mildem Geschmack. Spec. Gew. bei 15°C 0,915–0,920. Es erstarrt erst bei -20°C . Löst sich bei 15°C in über 60 Th. absolutem Alkohol.

Bestandtheile. Vorwiegend Oelsäureglycerinäther $(\text{C}_{18}\text{H}_{33}\text{O}_2)_3$, C_8H_7 , ferner Linolsäureglycerinäther $(\text{C}_{18}\text{H}_{31}\text{O}_2)_3$, C_8H_5 und in geringer Menge freie Fettsäuren.

Prüfung. Da ein grosser Theil des im Handel befindlichen Mandelöses gar nicht aus solchem, sondern aus Pfirsichkern- und Aprikosenkernöl (*Ol. Amygdal. gallic.*) besteht, oder auch mit diesen, sowie mit Mohnöl, Nussöl und Sesamöl verfälscht wird, so ist dasselbe beim Einkauf zu untersuchen.

1) Die meisten Verfälschungen erhöhen das spec. Gew. 2) 1 ccm Acid. nitric. fum., 1 ccm Wasser und 2 ccm des Oeles werden kräftig geschüttelt, nach einiger Zeit (10 bis 15 Stunden) ist die obere, die Oelschicht, fest geworden, sie muss von weisser Farbe sein, die Flüssigkeit darunter farblos. Die meisten Verfälschungen geben der Oelschicht eine röthlichgelbe bis bräunliche Farbe. Findet das Erstarren nicht statt, so sind auch folgende 2 Proben anzustellen. a) In ein Probirrohr werden 10 ccm 25proc. Salpetersäure und einige Kupferblechschmitzel gebracht und 2–3 ccm Oel darauf geschichtet. Dieses muss bei etwa 10°C nach 6–10 Stunden fest werden. b) Man bringt ebenso 20 ccm Salpetersäure, 1 g Quecksilber und 2–3 ccm Oel zusammen. Auch hier soll es bei etwa 10°C nach 6–10 Stunden fest werden. Die feste Oelschicht ist weiss. 3) 10 ccm Oel, 15 ccm Natronlauge und 10 ccm Alkohol werden in einem 150 ccm Kolben unter öfterem Umschwenken auf dem Wasserbade bei 30 – 40°C erwärmt, bis die Mischung klar ist. Dann bringt man 100 ccm warmes destillirtes Wasser zu, wobei die Lösung klar bleiben muss. Durch Ansäuern mit Salzsäure werden die Oelsäuren abgeschieden, die man in einen zweiten Kolben abgiesst, mit warmem Wasser wäscht und durch Zusatz von warmem Wasser in den Hals des Kolbens steigen lässt. Ist die Schicht der Oelsäuren klar geworden, so giesst man sie ab und lässt erkalten. Bei 15°C muss sie noch klar sein und sich erst bei 13 – 14°C trüben. 1 ccm davon soll mit 1 ccm Alkohol eine klare Mischung geben, aus der sich bei 15°C nichts abscheidet, die sich auch nicht trübt, wenn man von neuem 2 ccm Alkohol zugeht. 4) In zweifelhaften Fällen ist es notwendig, die Kottstoffsche'sche Verseifungszahl (für Mandelöl 187–195) und die Hüfner'sche Jodzahl (93,8–98,4), sowie die Refraktometerzahl (64,6 bei 25°C , 56,2 bei 40°C , 50,6 bei 50°C) festzustellen.

Anwendung. Innerlich meist als Emulsion oder reizmilderndes Mittel, äusserlich zu Salben und Einreibungen.

Oleum Amygdalarum gallicum des Handels wird aus Pfirsichkernen gepresst, es entspricht nicht den Anforderungen der Arzneibücher, das aus Mandeln gewonnene geht im Handel als *Ol. Amygdalarum anglicum*.

IV Aqua Amygdalarum amararum. Aqua Amygdalae. Bittermandelwasser. Mandelwasser. — *Eau d'amandes amères.* — *Bitter almond water.*

Wird fast überall durch Destillation bitterer Mandeln, die durch Pressen vom fetten Oel befreit sind, mit Wasserdämpfen bereitet. Der Gehalt an Amygdalin beträgt in den entölten Mandeln 3–6 Proc. Die im Handel vorkommenden *Placenta Amygdalarum amararum* bestehen gewöhnlich aus ausgepressten Pfirsichkernen. 3 Th. derselben entsprechen ungefähr 4 Th. Mandeln.

(Germ.) Bittere Mandeln 12 Th., vom fetten Oele durch Pressen befreit, als mittelfeines Pulver mit 20 Th. Wasser gemischt lässt man in dem Einsatz einer Destillirblase über Nacht

gut bedeckt stehen. Man rührt dann die Masse nochmals gehörig durch, lässt Wasserdämpfe hindurchstreichen und destillirt unter sorgfältiger Kühlung 9 Th in eine 3 Th Weingeist enthaltende Vorlage ab.

Aqua Amygdalium amararum concentrata. Austr 800 g bittere Mandeln werden zerstoßen und durch wiederholtes Pressen vom fetten Oele befreit. Den Presskuchen pulvert man, trägt $\frac{1}{12}$ davon allmählich in 6000 g siedendes, in einer Destillirblase befindliches Wasser, hält einige Minuten im Kochen und entfernt das Feuer. Nach völliger Abkühlung setzt man das zurückgehaltene $\frac{1}{12}$ zu und lässt über Nacht stehen. Dann destillirt man 1000 g oder soviel ab, dass 1000 Th des Destillates 1,0 Th Blausäure enthalten.

Aqua Amygdalae. Helvet 100 Th bei gelinder Wärme getrocknete, gepulverte (Sieb IV) und durch Pressen vom Oele befreite bittere Mandeln werden mit Wasser übergossen und mittelst Dampf 80 Th in eine 20 Th Weingeist enthaltende Vorlage abdestillirt.

Diese Vorschriften geben zu folgenden Bemerkungen Veranlassung. 1) Es ist nothwendig, die Destillation nach dem Anrühren der Mandeln mit Wasser nicht sofort vorzunehmen, sondern das Gemenge etwa 12 Stunden gut bedeckt stehen zu lassen, da eine längere Zeit für die Zersetzung des Amygdalins durch das Emulsin erforderlich ist. Letzteres verliert über 60° C die Fähigkeit, als Ferment zu wirken. Die Menge des gewonnenen Cyanwasserstoffs kann nach 12stündiger Maceration dreimal so gross sein, als wenn man sofort destillirt. 2) Da der Cyanwasserstoff flüchtig ist, ist es nothwendig, das aus dem Kühler kommende Rohr so zu verlängern, dass es direkt in die Flüssigkeit der Vorlage taucht, um Verluste zu vermeiden. 3) Man wird finden, dass, nachdem die vorgeschriebene Menge Destillat übergelassen ist, der Nachlauf noch reichliche Mengen Cyanwasserstoff enthält, den wir man gesondert auffangen und in den meisten Fällen verwenden, um das zuerst Uebergezogene auf den vorgeschriebenen Gehalt zu bringen. Wo die Herstellung des Bittermandelwassers eine häufig wiederkehrende Operation ist, kann man diese Nachläufe sammeln und aus ihnen durch Dampfdestillation direkt ein vorschriftsmässiges Wasser gewinnen. Man bestimmt in den gemischten Nachläufen den Cyanwasserstoffgehalt, und berechnet daraus den vorzulegenden Alkohol, indem man aber nur $\frac{1}{6}$ des vorhandenen Cyanwasserstoffs in Rechnung stellt, da etwa $\frac{1}{6}$ bei der Destillation verloren geht.

Eigenschaften. 1) Das Präparat soll stark nach Cyanwasserstoff riechen und dieser Geruch auch nach dem Ausfällen desselben mit Silbernitrat bleiben, da Benzaldehyd und Benzaldehydcyanhydrin (Verbindung beider, nämlich $C_6H_5CHO + HCN = C_6H_5C \begin{smallmatrix} H \\ \diagup \\ CN \end{smallmatrix}$)

dabei nicht gefällt werden. Ein durch einfaches Zusammenmischen von Blausäure, Wasser und Alkohol hergestelltes Bittermandelwasser würde hierbei den Geruch verlieren. 2) Es reagirt neutral oder höchstens ganz schwach sauer und zeigt je nach der Menge des darin enthaltenen Alkohols eine stärkere oder geringere Trübung. 3) Spec Gew nach Germ bereitet 0,978—0,977. Dasselbe ist festzustellen, da es einmal über die Menge des darin enthaltenen Alkohols Aufschluss giebt, andererseits bei der Feststellung des Blausäuregehaltes berücksichtigt werden muss. 4) Beim Abdampfen darf ein wagbarer Rückstand nicht hinterbleiben. Ist ein solcher vorhanden und giebt er nach dem Eindampfen mit Salzsäure würfelförmige Krystalle von Kalium- oder Natriumchlorid, so liegt der Verdacht auf Zusatz von Cyankalium resp Cyannatrium zum Präparat vor.

Feststellung des Blausäuregehaltes und Stellung des Destillats auf denselben. Der Gehalt wird übereinstimmend auf 0,1 Proc HCN normirt.

Zu seiner Bestimmung werden 10 ccm des Präparates mit 90 ccm Wasser verdünnt, mit 5 Tropfen Kalilauge und einer Spur Natriumchlorid versetzt und unter Umrühren solange $\frac{1}{10}$ N Silberlösung zugegeben, bis eine bleibende Trübung entsteht. Dazu sollen 1,8—2,0 ccm der Silberlösung verbraucht werden.

Der Zusatz der Kalilauge hat den Zweck, das Benzaldehydcyanhydrin zu zerlegen unter Bildung von Benzaldehyd und Cyankalium. — Lässt man nun Silberlösung zufließen, so entsteht nicht unlösliches Silbercyanid, sondern leicht lösliches Kalium Silbercyanid. — Erst wenn alles Cyan in diese lösliche Doppelverbindung übergeführt ist, und ein weiterer Tropfen Silberlösung zufließt, entsteht unlösliches Chlorsilber.

1 ccm der $\frac{1}{10}$ N Silberlösung enthält 0,017 AgNO₃ und zeigt 0,0054 HCN an, also 1,8 ccm 0,00972 HCN und 2,0 ccm 0,0108 HCN.

Das spec Gew des Präparates liegt wegen des Alkoholgehalts unter 1,0, nach Germ bei 0,958—0,957, also im Mittel 0,955, es ermittelt sich daher der Gehalt des Präparates an HCN nach folgender Gleichung

$$\begin{array}{rcl} 955 \text{ } 0,972 = 1000 \text{ } x & & x = 1,017 \\ 955 \text{ } 1,08 = 1000 \text{ } x & & x = 1,18 \end{array}$$

1000 Th enthalten also 1,017—1,18 HCN = 0,1017—0,118 Proc

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung des Cyanwasserstoffes versetzt man 50,0 des Präparates mit soviel Ammoniakflüssigkeit, dass es deutlich danach riecht, säuert mit Salpetersäure an und fällt mit Silbernitrat aus. Den entstandenen Niederschlag von Silbercyanid sammelt man auf einem Filter, trocknet und glüht in einem Porcellantiegel.

Es resultirt metallisches Silber, das man wagt 4 Th Ag = 1 Th HCN

Nach der Darstellung des Präparates wird man den Gehalt an HCN zu hoch finden und hat dasselbe nun entsprechend mit einer Mischung von 3 Th Wasser und 1 Th Weingeist zu verdünnen nach der Gleichung

$$0,1 \text{ } a = b \text{ } x$$

wobei a den proc HCNgehalt des unverdünnten Bittermandelwassers und b die Menge des Destillates bezeichnet $x = \frac{a \cdot b}{0,1}$ giebt dann dasjenige Gewicht an, auf welches das Destillat zu verdünnen ist

Da, wie oben angeführt, nach dem Ueberdestilliren der vorgeschriebenen Menge noch ein blausäurehaltiges, wenn auch schwächeres Destillat gewonnen wird, so kann man diesen „Nachlauf“, nachdem man ihn mit $\frac{1}{8}$ Weingeist versetzt hat, zum Verdünnen des ersten, zu starken Destillates verwenden. Man bestimmt in dem so verdünnten Nachlauf den Gehalt an HCN und berechnet die dem ersten Destillat zuzufügende Menge nach folgender Gleichung

$$a \cdot b = c \cdot x$$

a ist die Differenz des HCNgehaltes des verdünnten Nachlaufes vom vorgeschriebenen — b die Differenz des HCNgehaltes der ersten Destillation vom vorgeschriebenen. — c die Menge des ersten Destillates

Anwendung. Innerlich als die Sensibilität und Reflexthätigkeit herabsetzendes Mittel bei starkem Hustenreiz, Bronchitis, Pneumonie, Keuchhusten, Gastralgie, Angina pectoris, auch bei Verstopfung

Aqua Amygdalae amarae U-St ist eine durch Schütteln und Filtriren erhaltene Auflösung von 1 cem blausäurehaltigen Bittermandelöles in 999 cem Wasser

Aufbewahrung in kleineren, gelben oder geschwärzten, ganz gefüllten und gut verschlossenen Gläsern an einem kühlen Orte. Vorsichtig Abgabe Als Heilmittel nur gegen ärztliche Verordnung. Höchste Einzelgabe nach Austr 1,5 g, nach Germ. und Helvet 2,0 g, höchste Tagesgabe nach Austr 5,0 g, nach Germ und Helvet 8,0 g Bittermandelwasser darf nach Germ statt Aqua Laurocerasi abgegeben werden

Aqua Amygdalarum amararum diluta. **Aqua Cerasorum.** **Aqua Cerasorum amygdalata.** — Kirschwasser. Verdünntes Mandelwasser. Pfirsichblüthenwasser. Nach Austr und Germ 1 eine Mischung aus 1 Th Bittermandelwasser und 19 Th Wasser, enthält also 0,005 g HCN in 100 g. Die Abgabe im Handverkauf für Küchenszwecke ist gesetzlich nicht beschränkt

Sirupus Aquae Amygdalarum amararum, **Sirupus Acidi hydrocyanici** Bittermandelwasser 10 Th, wasser Sirup 90 Th.

V †† Oleum Amygdalarum (amararum) aethereum. Oil of Bitter Almond (U-St.) **Essence d'Amande amere** (Gall.) **Hulle volatile d'amandes amères.**

Gewinnung. Die durch Auspressen von bitteren Mandeln oder Aprikosenkernen erhaltenen Presskuchen werden gepulvert, gesiebt, mit 6—8 Th lauwarmem Wasser (50—60° C) angerührt und nach zwölfstündigem Stehen von dem inzwischen gebildeten ätherischen Oele durch Destillation getrennt. Nach einer Vorschrift von Pettenkofer werden 12 Th entölte und gepulverte Mandeln unter Umrühren in 100—120 Th Wasser eingebracht. Nachdem der Brei $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde bei Siedehitze gestanden hat, lässt man erkalten, mischt 1 Th frisches, mit 6—7 Th Wasser angerührtes Mandelpulver hinzu und lässt 12 Stunden stehen. Das heisse Wasser löst das Amygdalin besser als kaltes, zerstört aber das Emulsion. Um die Spaltung einzuleiten, muss also frisches — nicht erhitztes — Mandelpulver hinzugefügt werden. Das in einem Gewichtshölle Mandeln enthaltene Emulsion reicht zur Zersetzung des Amygdalins von 12 Th aus. Das fertige Bittermandelöl wird aus dem Brei durch eingeleiteten Wasserdampf abgetrieben. Die Destillation über freiem Feuer ist nicht zu empfehlen, da die Masse leicht überschäumt oder anbrennt. Wegen der giftigen Blausäuredämpfe muss bei der Destillation stark gekühlt werden. Den Kühler verbindet man luftdicht durch Schwansblase mit der Florenthner Flasche, von deren Halse aus man durch ein Glasrohr die überschüssige Blausäure in Wasser oder ins Freie leitet. Das Oel sammelt sich in der Vorlage am Boden. Das abfließende Wasser enthält

sehr viel Oel gelöst, das man durch Cohobation gewinnt. Hierzu bringt man das gesammelte Wasser in eine Blase, die man durch indukten Dampf heizt. Das im Wasser gelöste Oel geht mit den ersten Antheilen über. Sobald reines Wasser kommt, unterbricht man die Destillation. Die Ausbeute aus bitteren Mandeln beträgt 0,5–0,7 Proc., aus Aprikosenkernen 0,6–1,0 Proc. Legt man die Berechnung der Presskuchen zu Grunde, so ist die Ausbeute knapp doppelt so gross.

Blausäurefreies Bittermandelöl. Zur Darstellung schüttelt man 10 Th des Oeles, wie es durch Destillation gewonnen wurde, mit 6 Th gelöschem Kalk, 3 Th rohem Eisenvitriol und der entsprechenden Menge Wasser kraftig durch, und destillirt das nunmehr entblausäuerte Oel mit Wasserdampf ab. Man überzeugt sich durch die unter „Prüfung“ angegebene Reaction, ob alle Blausäure entfernt ist.

Eigenschaften. Das blausäurehaltige Bittermandelöl ist eine farblose, im Alter gelbe, stark lichtbrechende Flüssigkeit von blausäureähnlichem, aromatischem Geruche (Vorsicht!) und stark brennendem, etwas bitterem Geschmacke. Das spec Gew des normalen Oels liegt zwischen 1,045 und 1,06 (1,060–1,070 U-St). Es ist jedoch höher, bis 1,1, wenn das Oel sehr viel Benzaldehydcyanhydrin enthält. Optisch ist es inaktiv. Frisch bereitet ist es neutral, reagirt aber später wegen der durch Oxydation gebildeten Benzoesäure, die sich mitunter sogar in Krystallen abscheidet, sauer. Bittermandelöl löst sich ziemlich leicht in Wasser, nach Fluckigern im Verhältniss von 1:300. Die Gegenwart von Blausäure erhöht die Löslichkeit beträchtlich. Von Spiritus dilutus ist 1 Theil zur klaren Lösung von 1 Th Oel erforderlich. Salpetersäure löst Bittermandelöl ohne Entwicklung von Stickoxyddämpfen. Der Blausäuregehalt beträgt in der Regel 1,5–5,0 Proc., ist aber manchmal bedeutend höher. Blausäurefreies Bittermandelöl hat die Eigenschaften des reinen Benzaldehyds. Spec Gew 1,053. Es löst sich in 1–2 Th Spiritus dilutus klar auf.

Prüfung. Auf Alkohol prüft man, indem man einige Tropfen des Oeles in Wasser fallen lässt, die sofort untersinkenden Tropfen sind bei Gegenwart von Alkohol weiss und undurchsichtig, bei reinem Oel hingegen klar.

Fremde ätherische Oele oder Nitrobenzol werden auf folgende Weise nachgewiesen. Man schüttelt 1 ccm des Oeles in einem Reagircylinder mit 10 ccm einer kalt gesättigten Natriumbisulfitlösung durch und erwärmt das Gemisch wenige Minuten lang auf dem Wasserbade. Bei reinem Oele verschwindet der Geruch vollständig und es entsteht eine fast klare Lösung. Fremde Oele scheiden sich als Oeltropfen an der Oberfläche der Flüssigkeit ab (U-St).

Das häufigste Verfälschungsmittel für Bittermandelöl ist der künstliche Benzaldehyd. Da er von seiner Darstellung (siehe diese) her meist Chlor enthält, so kann man ihn leicht nachweisen. Man bringt ein Stück fächerartig zusammengefaltetes, mit einigen Tropfen des zu untersuchenden Oels getränktes Papier in einen kleinen Porcellantiegel, der in einer grösseren Porcellanschale steht, und zündet das mit Oel getränkte Papier an. Dann wird ein bereit gehaltenes etwa zwei Liter fassendes, innen mit destillirtem Wasser benetztes Becherglas schnell darüber gestürzt. Die Verbrennungsgase schlagen sich an den feuchten Wänden nieder, die inneren Wandungen des Glases werden alsdann mit etwas destillirtem Wasser auf ein kleines Filter abgespült. Das Filtrat darf mit Silbernitratlösung keine Trübung, noch viel weniger aber einen Niederschlag von Chlorsilber geben. Aechtes Oel giebt niemals eine Chlorreaction. Da neuerdings aber auch chlorfreier Benzaldehyd in den Handel gebracht wird, so borgt das Ausbleiben der Chlorreaction nicht immer für die Reinheit des Oeles.

Auf Blausäure prüft man qualitativ, indem man 10 Tropfen des Oeles in etwas Alkohol löst, mit einigen Tropfen Natronlauge versetzt und gut umschüttelt, dann fügt man eine kleine Menge einer eisenoxydhaltigen Ferrosulfatlösung (oder Ferrosulfatlösung und 1 Tropfen Ferrichlorid) hinzu, und versetzt mit Salzsäure im Ueberschuss. Ein tief blauer Niederschlag von Berlinerblau zeigt die Gegenwart von Blausäure an. Sind nur Spuren von Blausäure zugegen, z. B. bei einem schlecht entblausäurten Oele, so tritt nur eine blaue oder blaugrüne Färbung ein. Da der Blausäuregehalt beim Bittermandelöl sehr stark

wechselt, so wie zum medizinischen Gebrauch die Anwendung von Bittermandelöl mit einem bestimmten Gehalt an Blausäure wünschenswerth


Die quantitative Bestimmung der Blausäure kann auf gewichtsanalytischen oder auf massanalytischen Wege geschehen

1) **Gewichtsanalytisch** Man wägt ungefähr 1 g des Oeles in einem Boehrerglase genau ab, löst es in der 10–20fachen Menge Spiritus und fügt 10 g (eigentlich) alkoholischer Ammoniaklösung hinzu. Nach kurzem Stehen wird 1 g Silbernitrat (in Wasser gelöst) dazu gethan, und das Ganze mit Salpetersäure angesäuert. Ist die Flüssigkeit klar geworden, so bringt man das ausgeschiedene Cyansilber auf ein getrocknetes und gewogenes Filter, wäscht sorgfältig mit Wasser aus und trocknet bis zum konstanten Gewicht bei 100° C. Die Behandlung mit Ammoniak ist nothwendig, um das im Oele enthaltene Benzaldehydcyanhydrin aufzuschliessen. — Gefundenes $\text{AgON} \times 0,2015$ ist $= \text{HON}$

2) **Massanalytisch** Nach **VIELMEYER** Die Methode ist zwar bequemer, aber weniger genau als die vorige, da die Endreaktion nur schwer zu erkennen ist.

Man wägt genau 1 g Bittermandelöl in ein Kölbchen, gibt 10 ccm in Wasser aufgeschwemmtes Magnesiumhydroxyd sowie einige Tropfen Kaliumchromatlösung hinzu und titirt unter fortwährendem Umschütteln langsam mit $\frac{1}{10}$ Normal Silberlösung, bis die rothe Farbe von Silberchromat das Ende der Reaktion anzeigt. Durch Multiplikation der verbrauchten ccm Silberlösung mit 0,0037 erhält man die in 1 g Oel enthaltene Menge Blausäure.

Bestandtheile. Bittermandelöl ist ein Gemisch von Benzaldehyd, Blausäure und Benzaldehydcyanhydrin (Mandelsäurenitril, Phenylacetonitril). Der zuletzt genannte Körper entsteht durch direkte Vereinigung der beiden ersten



Da das Nitril leicht zersetzlich ist und bei der Wasserdampfdestillation zerfällt, so kann es erst nach der Destillation im Oele entstanden sein. Es bildet sich besonders reichlich bei der längeren Berührung von Benzaldehyd mit blausäurehaltigem Wasser. Je mehr ein Oel von dem Nitril enthält, desto höher ist sein spec Gew. (Spec Gew des reinen Mandelsäurenitrils 1,124) und desto cyanwasserstoffreicher ist es. Oele mit höherem spec Gew als 1,055 sollten deshalb wegen des zu hohen Blausäuregehaltes zu medizinischen Zwecken nicht verwendet werden. Der Gehalt an Blausäure beträgt bei Oelen von den normalen spec Gew 1,045–1,60 = 1,5–5 Proc — 2 Oele vom spec Gew 1,056 und 1,056 enthielten 9 und 11,4 Proc Blausäure (**SCHIMMEL**).

Aufbewahrung Das blausäurehaltige Bittermandelöl wird in kleinen, möglichst gefüllten, gut verstopften Flaschen im Dunkeln in der Reihe der direkten Gifte aufbewahrt.

Anwendung. Wegen des schwankenden Gehaltes an Blausäure wird das Bittermandelöl nur selten noch als Arzneimittel angewendet. Dosis $\frac{1}{2}$ –1 Tropfen in schwach wässriger Lösung. Gegengifte sind Chlorwasser, verdünnte Chloralkalösungen, Opium, Morphinum, sowie Begriessungen mit kaltem Wasser. Die grösste Menge des blausäurehaltigen Bittermandelöls wird in der Liqueurfabrikation sowie bei der Herstellung feiner Toilettenseifen verbraucht.

Magenmorsellen, Morsuli aromatica Weissen Zucker kocht man mit $\frac{1}{4}$ seines Gewichtes Wasser ohne Umrühren (1) bis zur Federprobe (Eckenbildung einer abge schleuderten Probe), fügt zerschnittene Mandeln und Gewürze hinzu, rührt um, gisst so gleich in zerlegbare, mittelst eines Schwammes angefeuchtete Formen aus Eichenholz, verthaut die Masse durch Aufstossen auf den Tisch gleichmässig und zerschnidet sie halbkugelförmig mit einem dünnen, scharfen Messer in schmale Stücken. Die Mandeln sind vorher geschält, in Längsstreifen geschnitten und verschiedenartig gefärbt worden.

Farbstoffe Kurkumalaktur, ammoniakalische Karminlösung, Chlorophyll in Aether weingeist gelöst, Indigokarmin, Citronat und Pomeranzenschalenkonfekt in Würfeln, die Gewürze als staubfreies, grobes Pulver beige mischt.

Species ad morsulos, Morsellengewürz. Nach **HAESR** Zimmt 17,5, Kardamomen 7,5, Ingwer 7,5, Galgant 2,5, Muskatnuss 2,5, Gewürznelken 2,5. Nach **DIETZEN** Zimmt 40, Kardamomen 20, Ingwer 10, Galgant 5, Muskatnuss 5, Gewürznelken 20 Th.

Morsuli aromatica Dietzenii Zucker 1000, Wasser 250, Gewürz 25, Citronat, kandirte Pomeranzenschalen, gefärbte und ungefarbte Mandeln, Pistazien je 40 Th. — Durch geringe Aenderungen der Verhältnisse und entsprechende Zusätze giebt diese Masse mit 10 Citronensäure und einer fein gewiegten Citronenschale die Morsuli Citri, mit 10 Vanillenzucker (10 proc) und 30 gebrannten, grob gemahlenen, mit 20 Cognak gekauten Kaffeebohnen die Morsuli Coffeae, mit 50 Ingwer die Morsuli Zingiberis, Morsuli Cacao kocht man aus Zucker 1000, Wasser 250, ungefarbten Mandeln 150, Vanillinzucker 10, harter

Vanillechokolade in erbsengrossen Stücken 200, Morsuli mannati aus Zucker 500, Wasser 125, Kalumpatriumlatiat 100, Sussholzpulver 100, Manna 500, Citronenöl 5 Tropfen

Aqua cosmetica orientalis, HEBRA'S orientalisches Wasser Bittermandel-Emulsion 95,0, Quecksilberchlorid 0,015, Benzoeöl 1,0

Confectio s. Conserva Amygdalae Geschälte Mandeln 8, Gummi arabicum 1, Zucker 4 Th stösst man zu einem Teig an

Emulsio Amygdalarum Germ Süsse Mandeln 1 Th, Wasser q s zu 10 Th Seih flüssigkeit Form mag Berol Mandelmilch Mandelemulsion 18 180 g, weisser Sirup 20 g

Emulsio Amygdalarum composita. Ergänzt Süsse Mandeln 4, Bilsenkrantsamen 1 werden mit verdünntem (I) Bittermandelwasser 64 zur Emulsion angestossen, durchgeseiht und Zucker 6, gebrannte Magnesia 1 zugefügt

Emulsio Amygdalarum cum Morphino (Munchener Nosokomial-Vorschrift) Mandelmilch 180,0, Morph hydrochlorici 0,02, Weisser Sirup 20,0

Emulsio Amygdalarum gummosa (Ph bavar) Süsse Mandeln 10,0, Wasser 90,0, Gummi 10,0

Emulsio Amygdalarum pro potu (Munchener Nosokomial-Vorschrift) Süsse Mandeln 25,0, Wasser 500,0, Weisser Sirup 20,0

Emulsio amygdalina Austr Geschälte süsse Mandeln 25, Zucker 15, Wasser q s zu 250 g Seihflüssigkeit

Emulsio gummosa. Mandelemulsion 90, Gummischleim 10 Th

Emulsio laxativa Viennensis DEWEECH Manna 25,0 löst man in Mandelemulsion 75,0, seht durch, fügt 5,0 Zimmtwasser und Wasser q s zu 100,0 hinzu

Emulsio oleosa, **Mixtura oleosa**, — Oelemulsion

	Austr	Germ, Helvet	Hung
Mandelöl	10	20	8
Arabisches Gummi (pulv)	5	10	4
Wasser	175	170	180
Zucker Sirup	10	—	8

Emulsio oleosa cum Morphino (Munchener Nosokomial-Vorschrift) Mandelöl 10,0, Gummi 5,0, Wasser 85,0, Morph hydrochlorici 0,02, Weisser Sirup 20,0

Emulsion d'amande (Gall) **Lait d'amande**. **Emulsion simple**. Rp Amygdalarum dulcium, Sacchari albi, Aquae destillatae 1000,0

Emulsum Amygdalae U-St — **Mistura Amygdalae**, Milk of Almond — Süsse Mandeln 60 g, Gummi arabicum 10 g, Zucker 80 g, Wasser q s zu 1000 ccm Emulsion

Farina Amygdalarum. **Furfur Amygdalarum**. — **Mandelkleie**. — **Son d'aman** des — Brane of almonds — Nach DEWEECH Kakaöl 50,0 geschmolzen, verrührt man mit Talkpulver 100,0, fügt Bohnenmehl 500,0, Mandelkleie 250,0 hinzu, alsdann Glycerin 50,0, Kölnisch Wasser 50,0, Kummern 0,1, Aethersches Bittermandelöl 20 Tropfen, Ambratinktur 5 Tropfen

Nach PASCHKIS Mandelmehl 700, Reisstärke 160, Veilchenwurzel 70, Seife 60, Bittermandelöl 1 Th

Nach Stdd Ap-Ztg Mandelöl (aus Pfirsichkernen) 60 g, entwässerte Soda 120 g, Weizenmehl 2000 g, Aethersches Bittermandelöl, Santöl, Ylang-Ylangöl je 60 Tropfen Weizenmehl 240, Borax 100, Lavendelöl 2, Mandelmehl 240, Portugalöl 5, Bittermandelöl 0,5, Veilchenwurzel 50, Glycerin 100, Talcum 20, Infusorenerde 250 Th

Glycerin-Cold-Cream. **Crème céleste** (Diet) Mandelöl 600, Walrat, weisses Wachs je 80, schmilzt man, setzt Borax 5, in Glycerin und Wasser je 120 gelöst, zu, ruht schaumig und fügt Rosenöl 1, Bergamottöl, Neroliöl je 0,5, einige Tropfen Ambratinktur hinzu

Honig-Mandelpasta (BUCHHIMSTEN) Bittere Mandeln, geschält und gestossen 210, Mandelöl 420, Bergamottöl 6, Honig 420, Eidotter 186, Citronenöl und Nelkenöl je 4 Th

Kampher-Cold-Cream. Kampher 50, Mandelöl 500, Wasser 270, Moschustinktur 10 Tropfen, sonst wie vorige

Kiambambuli. Bittere Mandeln gestossen 0,5 kg, Wasser 1 kg, man stellt einen Tag bei Seite, fügt hinzu Zimmt 80 g, Nelken 80 g, Pomeranzenschale 120 g, Ingwer 60 g, Spiritus (75 proc) 20 l, Cochenille 8 g, Weinstein 2 g, presst nach 8 Tagen, dazu Zucker 4 kg, Wasser 20 l (Pharm Ztg)

Looch album oleosum (Helvet) **Linctus demulcens** Weisser Looch — **Looch pectoral s huileux** — Mandelöl 10, Arabisches Gummi 10, Pomeranzenblütenwasser 15, Wasser 40, Mandelwasser 1, Gummisirup 24

Mandel-Crème, **Mandel-Cold Cream** (Diet) Weisses Wachs, Walrat je 80, Mandelöl 560, Wasser 280, Borax 5, Bergamottöl 2, Rosenöl 0,5, Bittermandelöl 10 Tropfen Bereitung wie Glycerin Cold-Cream

Mandel-Orgeade, **Organt** Geschälte süsse Mandeln 100, bittere Mandeln 10, Pomeranzenblütenwasser 50, Zucker 100 Th, zu einem zarten Brei zerstoßen

Mandelseife. Talgkernseife 750, venetian Seife 125, Kokosseife 125, schmilzt man vorsichtig, setzt 10, künstliches, chlorfreies Bittermandelöl zu und griesst in Formen aus

Pasta cosmetica manualis. Handpasta (Diet) Süss Mandeln, geschält 300, bitter 200, stösst man mit Rosenwasser 10, Borax 30, zur gleichmässigen Masse an, setzt Wulrat 50, mit Kampheröl 50 geschmolzen, hierauf Kartoffelmehl 200, Talk 100, mit Rosenwasser 200 angerührt, zu, arbeitet die Masse durch und parfümirt sie

Nach FASCHUIS Süss Mandeln 600, bittere 200, Honig 100, Perubalsam 100

Persiko. Bittermandelöl, blausaurefrei, 4 g, Neröl 2 Tropfen, Kardamomend Citronenöl je 5 Tropfen, Spiritus 4 l, Zucker 2,5 kg, Wasser q s zu 10 l

Pomade divine Walrat 80, Schweinefett 170, Mandelöl 250, Muskatnuss 15 Storax 20, Zibeth 2,5, Benzoe 20, Nelken 15, Veilchenwurzel 20, erwärmt man längere Zeit im Wasserbade, giesst klar ab und fügt allmählich Orangenblüthenwasser 500, hinzu

Pomaden-Grundlage (Diet) Mandelöl, Walrat je 100, Schweinefett 800 Man schmilzt und rührt bis zum Erkalten

Pulvis cosmeticus. Pulvis manualis. Hand-Waschpulver (Diet) Stearinsäure Haussäure je 150, Veilchenwurzel, Talk je 100, Mandelkiese, Bohnenmehl je 200, Borax 20 Kölnisch-Wasser 50, Moschustinktur, Bittermandelöl je 5 Tropfen, vorher mit Glycerin 50 gemischt

Salicyl-Crème. Wie Glycerin Cold Cream, nur werden statt Borax im Glycerin Salicylsäure 10 fein vertheilt

Schönheitskugeln (BUCHHEISTER) Mandelkiese, Seife, Kartoffelmehl je 235, Veilchenwurzel 145, man mischt, stösst mit Benzoeöl zu einem Teig an und formt Kugeln daraus

Amandine (Buchh) Weiche Kahseife 20, Zucker 20, löst man in Wasser 50, und rührt allmählich zu Mandelöl 900, Bergamottöl 5, Citronenöl, Bittermandelöl, Nelkenöl je 2 Weisse, nicht durchscheinende Salbe (nöthigenfalls mehr Seife)

Sirupus Amygdalarum. Sir. amygdalinus s. emulsivus. — Mandelsirup. Mandelsaft — Sirap d'orgeat. — Syrup of Almond

Anstr. Geschälte süss Mandeln 80 Th, bittere 20 Th, gepulverter Zucker 120 Th, man stösst mit Wasser 200 Th zur Emulsion an, seigt durch, presst aus und löst unter Umrühren gepulverten Zucker 200 Th

U-St giebt ähnliche Verhältnisse, ausserdem einen Zusatz von Orangenblüthenwasser
Germ. Süss Mandeln 15 Th, bittere 3 Th werden geschält, mit Wasser 40 Th zur Emulsion angestossen, die Sehflüssigkeit soll mit Zucker 60 Th durch ein mäßiges Aufkochen 100 Th Sirup ergeben

Ein Zusatz von 5 Th arabischem Gummi liefert (Diet) einen haltbaren, sich nicht entmischenden Sirup Aufbewahrung In kleinen, ganz gefüllten Flaschen im Keller Vor dem Gebrauch kräftig umzuschütteln

Linctus leniens. Mandelsirup, Arabischsirup je 20 Th, Brechwurzelsirup 10 Th

ALBIN DEFLOIS tablettes pectorales sind Tabletten aus Mandeln, Zucker, Morphin und Ipecacuanha

Cataplasma leniens Raven ist Mandelkuchenbrei

Christoffa. Ein Magenwein aus Zimmt, Nelken, bitteren Mandeln, Zucker, Wein und Weingeist

Spiritus Amygdalae amarae U-St Spirit of Bitter Almond. Bittermandelöl 10 cem, Weingeist (91 Gew Proc) 800 cem, Wasser q s zu 1000 cem

Uhrmacheröl Süssmandelöl 100, dickflüssiges Paraffinöl 5, Klauenfett 10, gepulvertes Natriumbicarbonat 10, werden unter öfterem Schütteln 2—3 Wochen bei Seite gestellt, dann filtrirt Für grössere Uhren Mandelöl 60, Provençeröl 50, Klauenfett, dickes Paraffinöl je 10, Natr bicarbon 15

Unguentum Aquae Rosae (U-St), Ungt. emolliens (Anstr), Ungt. leniens (Germ), Ungt. refrigerans (Helvet) Erweichende Salbe — Cold-Cream. Crème céleste. — Ointment of Rose Water.

	Anstr	Helvet	nach UNNA (Kühlsalbe)
Weisses Wachs	10	5	5
Walrat	20	10	5
Mandelöl	80	60	50
Rosenwasser	20	25	50

Germ Weisses Wachs 4, Walrat 5, Mandelöl 82, Wasser 16, Rosenöl 1 Tropfen auf je 50 g

U-St Walrat 125 g, Weisses Wachs 120 g, Mandelöl 600 cem, dreifaches Rosenwasser 190 cem, Borax 5 g

Antidiabetin ist eine Mischung aus Mandelöl und Saccharin (cf. Manna)

CHENOUD'S Zahntinktur ist ein weingeistiger Auszug aus Brasilienholz, Fichtensprossen, Veilchenwurzel, Cochenille mit einem Zusatz von Bittermandelwasser und Löfelkrautspiritus

Loech solide De GALLIOT ist Mandel-Organole

Mandelbrot, Pavv's, für Diabetiker, wird aus theilweise entöhlten, süßen Mandeln unter Zusatz von Eiern, Pulvis aromaticus etc. gebacken

Pulvis Amygdalae compositus Compound Powder of Almonds (Brit.) Besteht aus süßen Mandeln 200 Th., Zucker 100 Th., arabischem Gummi 25 Th. — 20 g dieser Mischung geben mit Wasser 160 g die *Mistura Amygdalae*, Almond Mixture

Mandelmilchextrakt von Jul. Unban in Dresden ist ein sehr dicker Mandelsirup. **Nectarsirup** der engl. Sodawasserfabrikanten enthält Vanille-, Rosen- und Citronenextrakt, Mandelemulsion und Zucker

Besorbin ist eine Salbengrundlage aus Mandelöl, Wachs und Wasser, gebunden durch wenig Leim und Seife

Seulein von A. Wasmuth, gegen Ratten und Mäuse, enthält als wirksamen Bestand theil bittere Mandeln

VI †† Amygdalinum Amygdalin. Amygdalina Das Glukosid der bitteren Mandeln $C_{20}H_{27}NO_{11} + 3H_2O$ Mol Gew. = 511.

Darstellung Gepulverte, vom fetten Oele möglichst befreite Presskuchen der bitteren Mandeln oder Pfirsichkerne werden mit der 2–3fachen Menge 95proc. Alkohol einige Stunden am Rückflusskühler ausgekocht. Man trennt den alkoholischen Auszug ab und wiederholt das Auskochen mit frischem Alkohol nochmals. Die alkoholischen Auszüge werden nach dem Absetzen filtrirt, darauf destillirt man $\frac{3}{4}$ des Alkohols ab und vermischt die rückständige Lösung mit $\frac{1}{2}$ Volumen Aether. Die in der Kälte ausgeschiedenen Krystalle werden mit Aether gewaschen und aus siedendem 90procentigem Alkohol umkrystallisirt.

Eigenschaften Krystallisirt aus Wasser oder wasserhaltigem Alkohol in durchsichtigen, prismatischen Krystallen mit 3 Mol H_2O , aus starkem Alkohol wasserfrei in weissen, glänzenden Blattchen. — Ohne Geruch, von schwach bitterem Geschmack, von neutraler Reaktion. Löslich in 12 Th. kaltem und in jedem Verhältniss in siedendem Wasser, ferner in 900 Th. kaltem oder 11 Th. siedendem Alkohol von 95 Proc., in Aether unlöslich. Die Lösungen polarisiren links. Es wird bei 110–120° C. wasserfrei, bei 160° C. bräunlich und schmilzt unter Zersetzung gegen 200° C. Bei Gegenwart von Wasser wird es durch Emulsin (z. B. durch Emulsion aus süßen Mandeln) in Glukose, Benzaldehyd und Cyanwasserstoffsäure (bez. in Benzaldehyd-Cyanhydrin s. S. 279) zerlegt. Ähnliche Spaltungen erfolgen mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure $C_{20}H_{27}NO_{11} + 2H_2O = C_6H_5O + HCN + 2C_6H_5O_6$. Von konc. Schwefelsäure wird es mit bläulichvioletter Farbe gelöst. Beim Eindampfen mit konc. Salzsäure entstehen Mandelsäure und braun gefärbte Humuskörper, letztere aus der Glukose.

Aufbewahrung Obgleich Amygdalin an sich — d. h. im nicht gespaltenen Zustande — ungiftig sein soll, so ist es doch unter Berücksichtigung der leichten Abspaltbarkeit von Blausäure sehr vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung Amygdalin wird nur selten als Blausäure-Quelle angewendet. 1,7 g trockenes Amygdalin giebt mit einer Emulsion aus süßen Mandeln 0,1 g Cyanwasserstoff und 0,8 g Bittermandelöl. Eine Mixtur aus 1,7 g Amygdalin und 100 g Emulsion aus süßen Mandeln entspricht demnach im Blausäure-Gehalt dem Bittermandelwasser der Germ III.

Amydalinum amorphum, Laurocerasin, sind die aus gewissen Pflanzentheilen z. B. aus den Kernen von *Prunus avium*, den Blättern von *Prunus Lauro Cerasus* etc. abgeschiedenen, bisher noch nicht krystallisirt erhaltenen Amygdaline. Gummartige, amorphe Massen.

Amylaether aceticus.

Amylaether aceticus Amylium aceticum Amyloxydum aceticum. Amylacetat. Essigsäure(Iso)-Amylätber oder -ester $C_5H_{11}O_2 \cdot C_2H_3O_2$. Mol Gew. = 130.

Darstellung Man mischt in einem Kolben 130 Th. konc. Schwefelsäure mit 105 Th. technisch reinem Amylalkohol und lässt diese Mischung, gut verkorkt, an einem warmen Orte 2–3 Tage lang stehen. Hierauf bringt man in eine Tubulat Retorte, welche mit einer guten Kühlvorrichtung verbunden ist, 100 Th. frisch entwässertes und grob ge-

pulvertes Natriumacetat, übergiesst und durchmischt dasselbe mit der obigen Schwefelsäure-Amylalkohol Lösung und destillirt nach 12stündigem Stehen aus dem Sandbade unter guter Kühlung 180 Th ab

Das Destillat wird mit 50 Th destillirtem Wasser und 10 Th Natriumbikarbonat gut durchgeschüttelt. Alsdann hebt man die Aetherschicht ab, durchschüttelt sie nochmals mit 15—20 Th Wasser, hebt sie wiederum ab, entwässert sie durch Maceration mit geschmolzenem Calciumchlorid und rektifizirt aus dem Sandbade

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche, neutrale, entzündliche, durchdringend nach Birnen (Fruchtbons) riechende Flüssigkeit. Spec Gew bei 15° C = 0,875. Siedepunkt = 138° C. Wenig löslich in Wasser, in allen Verhältnissen mischbar mit Alkohol, Aether und Essigäther. Nach längerer Aufbewahrung nimmt der Aether saure Reaktion an, was jedoch seine Verwendung als Fruchtaether nicht beeinträchtigt. Nöthigenfalls kann er mit Natriumbikarbonat entsäuert und nochmals rektifizirt werden.

Aufbewahrung. In nicht zu grossen Flaschen, unter Korkverschluss, an einem kühlen Orte. Man beachte die Feuergefährlichkeit!

Anwendung. Nicht als Medikament, aber zur Bereitung von Fruchtessenzen.

Das völlig reine Präparat dient zur Herstellung des Flammenmaasses (Hefner-Atzenrooks Amylacetat-Lampe) in der Photometrie.

Birnenessenz. Pear-oil ist ein Gemisch aus 10 Amylacetat, 1 Essigäther, 90 verdünntem Weingeist (0,895).

Reinnettenessenz. Ist eine Mischung aus 10 Amylacetat, 2,0 Valeriansäure Äthyläther, 1,0 Essigäther, 90 verdünntem Weingeist (0,895).

Das in der Technik angewendete Amylacetat wird häufig in der Weise bereitet, dass man die oben angegebene Mischung nicht destillirt, sondern nur einige Zeit erhitzt. Alsdann scheidet man den gebildeten Aether durch Zusatz von viel Wasser ab, entsäuert, trocknet und rektifizirt ihn.

Amylaether nitrosus.

Amyllum nitrosum (Aust. Germ.) Amylum nitrosum (Helv.). Amyl Nitris (Brit. U-St.) Ether amylnitrox (Gall.) Amyle nitrosum. Amyloxydum nitrosum. Amylnitrit. Salpetersäure-Amyläther. $C_5H_{11}NO_2$. Mol. Gew. = 117.

Darstellung. In den Kolben A bringt man 100 g Amylalkohol (SP. 180° C) in den Kolben B, welcher mindestens 1 l fassen muss, bringt man 20 g Stärke. Man erhitzt nun zunächst den Amylalkohol im Kolben A bis auf 100° C, was sich leicht feststellen lässt, da ein Thermometer in die Flüssigkeit eingesetzt ist. Sobald dies der Fall ist, entfernt man die Flamme unter A und giesst in B mittels des Trichterrohres 250 g Salpetersäure von 1,20 spec. Gew. Man erwärmt Kolben B vorsichtig so weit, dass ein ruhiger Strom von salpetriger Säure bez. Untersalpetersäure durch A hindurch geht. Die jetzt in A eintretende Reaktion hält den Inhalt von A in leichtem Sieden. Es destillirt Amylnitrit über, welches durch den Liebig'schen Kühler kondensirt und in der durch Eis kühl gehaltenen Vorlage aufgefangen wird. Gegen das Ende der Operation erwärmt man den Kolben A soweit, dass das eingesetzte Thermometer auf 100° C stehen bleibt. Destillat bei dieser Temperatur nichts mehr über, so unterbricht man das Einleiten von salpetriger Säure und lässt erkalten. Vorsicht! Man hute sich, den Dampf des Amylnitrits einzuathmen.

Das Destillat wird zuerst nach und nach mit kleinen Mengen zerriebenen Natriumbikarbonat versetzt und durchgeschüttelt, darauf nach Abstumpfung der freien Säure mit einem gleichen Volumen kalten Wassers durchgeschüttelt und zum Absetzen gebracht. Die abgehobene Amylnitritschicht wird nochmals mit $\frac{1}{2}$ Volumen Wasser durchgeschüttelt, abgehoben, mit geschmolzenem Calciumchlorid entwässert, darauf aus dem Sandbade rektifizirt. Das bis 90° C Uebergehende wird verworfen, die von 96—100° C Uebergehenden Theile werden als Amylnitrit gesammelt. (Hlasek.)

Eigenschaften. In reinem Zustande eine blassgelbliche, klare, leichtbewegliche Flüssigkeit von gewürzhaftem Geschmacke und fruchtartigem Geruche, neutral oder schwach sauer. Spec. Gew. 0,877 bei 15° C. Siedepunkt 97—99° C. Entzündet mit gelber, leuch-

tender Flamme verbrennend. Seiner chemischen Zusammensetzung nach Salpetrigsäure-Iso-Amyläther $(CH_3)_2 = CH - CH - CH_2 - ONO$. In Wasser nicht löslich; leicht mischbar mit Weingeist, Aether, Chloroform, Benzin, Petroläther. Luft, Licht und Wasser wirken zersetzend, der ursprünglich neutrale Aether nimmt saure Reaktion an.

Die einzelnen Pharmakopöen stellen verschiedene Ansprüche auf das von ihnen aufgenommene Amylnitrit.

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U-St.
Spec. Gewicht	0,902	0,880	0,877	0,87—0,88	0,87—0,90	0,87—0,88
Siedetemperatur	95—93°	90—100°	95°	97—99°	ca. 99°	96—99°

Schon aus diesen Angaben ist zu entnehmen, dass einige Pharmakopöen (Austr. Brit.) nicht absolut reines Amylnitrit vorschreiben. Brit. schätzt, dass das Präparat etwa 70, U-St., dass es etwa 80 Proc. Amylnitrit neben nicht näher anzugebenden Beimengungen enthält.




Fig. 50.

Schichtet man über eine Lösung von Ferrosulfat etwas Amylnitrit, so entsteht an der Berührungsfläche eine braune Zone, infolge Oxydation des Eisensalzes durch die salpetrige Säure. — Im Verlaufe der Aufbewahrung nimmt das Amylnitrit durch freiwillige Zersetzung bald saure Reaktion an.

Prüfung. 1) Schüttelt man 5 cem Amylnitrit mit 2 cem Wasser sowie 0,1 cem Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc.) unter Zufügung von 1—2 Tropfen Lackmustinktur, so darf die Flüssigkeit noch nicht roth gefärbt erscheinen. Da ein völlig neutrales Präparat nicht verlangt werden kann, so soll der zulässige Säuregehalt wenigstens begrenzt werden. Die obige Vorschrift lässt in 100 cem Amylnitrit = 0,428 g salpetrige Säure N_2O_3 zu. 2) Versetzt man 1 cem Amylnitrit mit einer Mischung aus 1,5 cem Silbernitratlösung und 1,5 cem absolutem Alkohol, sowie soviel Ammoniakflüssigkeit, dass der sich bildende Niederschlag gerade wieder gelöst wird, so darf beim gelinden Erwärmen weder Bräunung noch Schwärzung eintreten (Aldehyd, besonders Valeraldehyd). 3) Auf 0° C. abgekühlt, darf Amylnitrit sich nicht trüben, sonst ist es wasserhaltig.

Zur Bestimmung des Gehaltes an salpetriger Säure kann nur die gasometrische Methode im Azotometer (Nitrometer) empfohlen werden.

LUNGS Nitrometer. Ein in $\frac{1}{2}$ ocm getheiltes Rohr *a* endigt oben in einem Trichter *c*. Der Trichter besitzt einen „Dreiwegehahn“, Fig. 51, welcher gestattet, das Messrohr nach Belieben mit der äusseren Luft oder mit dem Trichter *c* in Verbindung zu bringen. Ueber den Hahnschlüssel des Dreiwegehahnes lässt sich ein Kautschukschlauch ziehen, welcher

mit einem Quetschhahn und einem kurzen Glasrohr versehen ist. Die Theilung des Messrohres beginnt vom Hahne an und geht von oben nach unten. Das Messrohr *a* ist mittels eines starkwandigen Schlauches mit dem nicht kalibrierten Niveau-Rohr *b* verbunden. Beide





Fig. 51

Röhren lassen sich leicht verschieben, bezw. aus den Klammern nehmen. Der Dreiweghahn ist luftdicht bezw. eingefettet. Man stellt nun das Rohr *b* so hoch, dass dessen unteres Ende etwas höher ist als der Dreiweghahn und giesst dann bei offenem Hahn durch *b* soviel gesättigte Kochsalzlösung ein, dass sie oben in den Trichter *c* eindringt. Man schliesst alsdann den Hahn und lässt durch die seitliche Bohrung die in dem Trichter *c* stehende Kochsalzlösung abfließen. Alsdann stellt man den Dreiweghahn tot, d. h. so, dass er weder mit dem Trichter noch mit der ausseren Luft kommuniziert und hierauf das Niveaurohr *b* tief, so wie es in der Zeichnung angegeben ist. Nunmehr lässt man eine Lösung von 0,26 g Amylnitrit in 5 ccm Alkohol in den Glasbecher *c* einfließen und lässt diese durch vorsichtiges Öffnen des Hahnes in die Burette *a* so eintreten, dass keine Luft mit hinein gelangt (!). Hierauf bringt man 10 ccm Kaliumjodidlösung (1+5) in den Glasbecher *c*, lässt diese eintreten und giebt schliesslich noch 10 ccm verdünnte Schwefelsäure (1+9) in den Becher und lässt diese gleichfalls eintreten. Luft darf bei keiner dieser Operationen eingetreten sein. Dann mischt man die eingesaugenen Flüssigkeiten, welche auf der Kochsalzlösung schwimmen, durch vorsichtiges Bewegen und wartet ab, bis die Reaktion beendet ist. Sobald dies der Fall ist, bringt man das Rohr *b* in eine solche Stellung, dass die Flüssigkeitssäulen in *a* und *b* im gleichen Niveau liegen, heisst die Kubikcentimeter des gebildeten Stickstoffoxyds ab und notirt Temperatur und Luftdruck. Die Reaktion verläuft nach folgender Gleichung



1 ccm Stickstoffoxyd wiegt bei 0° C = 0,0018423 g, bei 25° = 0,0012297 g unter normalem Druck. Die Reduktion des gefundenen Volumens auf 0° und 760 B erfolgt nach der

Formel $V_0 = \frac{V_a \cdot B}{760(1 + 0,00366t)}$ Hierbei bedeuten V_0 = das gesuchte Volumen, V_a das abgelesene Volumen, B der abgelesene Barometerstand, t die beobachtete Temperatur. Vgl. S. 167.




Fig. 52 Lunge's Nitrometer

Für die Praxis ist es ausreichend anzunehmen, dass unter Zugrundelegung obiger Gewichtsverhältnisse (d. h. bei Anwendung von 0,26 g Amylnitrit) jeder Cubikcentimeter Stickoxydgas bei Zimmertemperatur = 2 Proc. Amylnitrit anzeigt. Bei reinem Amylnitrit müssen also 50 ccm Stickoxydgas, bei 80 proc = 40 ccm erhalten werden.

Aufbewahrung. Wie schon bemerkt wurde, setzt sich das Amylnitrit im Verlaufe der Aufbewahrung, indem es saure Reaktion annimmt. Man bewahrt es in nicht zu grossen, völlig trocknen Flaschen, vor Licht geschützt, vorsichtig auf. Der Vorschlag, es über einigen Krystallen von Kaliumtartrat aufzubewahren, hat sich nicht bewahrt. Mehr zu empfehlen ist die Aufbewahrung über etwas gebrannter Magnesia. Im Bedarfsfalle giesst oder filtrirt man das erforderliche Quantum ab.

Anwendung. Amylnitrit bewirkt Pulsbeschleunigung und Erniedrigung des Blutdruckes. Man lässt 1–5 Tropfen einathmen bei halbseitigem Kopfschmerz, Epilepsie, Angina pectoris und Asthma. Innerlich 1 bis 2 Tropfen mehrmals täglich gegen intermittierende Fieber der Tropen. Man hüte sich, an Amylnitrit unvorsichtig zu rechnen! Höchstgaben pro

dos. ad inhalationem 0,25 g = gtt. V, *pro die* = 1,0 g = gtt. XX (Helv.)

Amylnitrit tertiäres $(\text{CH}_3)_3\text{C} \cdot \text{ONO}$. Ist dem vorigen isomer und wird aus Amylenhydrat (dem tertiären Amylalkohol) durch Einwirkung von salpetriger Säure analog dem Amylum nitrosum bereitet. Soll, wie das Amylnitrit, die arterielle Spannung vermindern, aber nicht so giftig sein wie dieses. Ebenso soll es auch weniger zersetzlich sein. Dosis 5 Tropfen auf Zucker oder in Gelatine-Kapseln.

Amylenum.

Von den fünf theoretisch möglichen Kohlenwasserstoffen der Formel C_5H_{10} haben das sog Iso-Amylen und des Pental eine solche Verwendung als Anästhetica gefunden

I † Iso-Amylenum. Iso-Amylen Valeren Fuselöl-Amylen C_5H_{10} . Mol Gew = 70 Unter dem Namen „Amylen“ schlechthin versteht man ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen C_5H_{10} , welches durch Wasserabspaltung aus dem Gährungsamylalkohol dargestellt wird

Darstellung. Ein Gemisch gleicher Theile sorgfältig gereinigten und entwässerten Gährungsamylalkohols (S P 180° C) und geschmolzenen, hierauf wieder zerkleinerten Zinkchlorids werden in einer geräumigen Retorte, welche mit Kühlvorrichtung und Vorlage versehen ist, einige Tage sich selbst überlassen, darauf aus dem Sandbade der Destillation unterworfen. Das unter sorgfältiger Abkühlung gesammelte Destillat wird mit geschmolzenem Calciumchlorid entwässert, darauf im Wasserbade aus einer Retorte mit ein gesetztem Thermometer rektifiziert, wobei man nur die zwischen 80 und 40° C übergehenden Anteile auffängt

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche, eigenthümlich ätherartig riechende, süsslich schmeckende, neutrale Flüssigkeit, mit leuchtender Flamme brennend, leicht entzündlich Spec Gew 0,660—0,670 bei 15° C, Siedetemperatur 80—40° C Enthält vorzugsweise Trimethyläthylen $(CH_3)_3C=CH-CH_3$, daneben Isopropyläthylen und Methyläthyläthylen. Polymerisirt sich schon beim blossen Stehen in hoher siedende Kohlenwasserstoffe wie Diisomaylen (S P 156° C), Trisoamylen (S P 246° C)

Prüfung 1) Es ist Rücksicht zu nehmen auf das spec Gewicht, ferner die Siedetemperatur 2) Wird Amylen mit dem gleichen Volumen Wasser geschüttelt, so darf dieses blaues Lackmuspapier nicht rothen

Anwendung Als Inhalations Anästheticum wie das folgende Präparat „Pental“

II † Amylenum (des Ergänz b Ap V) Pentalum Trimethyläthylenum
Reines Amylen Pental Trimethyläthylen. C_5H_{10} Mol Gew = 70

Darstellung. In ein mit guter Kühlvorrichtung versehenes Destillirgefäß bringt man 3 Th krystallisirte Oxalsäure, erwärmt im Wasserbade auf 60—90° C und lässt alsdann durch einen Scheidetrichter einen dünnen, regelmässigen Strahl von reinem tertiären Amylalkohol (reinem Amylenhydrat) zufließen. Letzteres spaltet sich sofort in Trimethyläthylen und Wasser $C_5H_{11}OH = H_2O + C_5H_{10}$. Nachdem 80 Th Amylenhydrat gespalten sind, empfiehlt es sich, die Oxalsäure zu erneuern — Man trennt das überdestillirte Trimethyläthylen vom übergegangenen Wasser, entwässert es durch geschmolzenes Calciumchlorid und rektifiziert aus dem Wasserbade

Eigenschaften Farblose, leicht bewegliche, leicht flüchtige, leicht entzündliche, mit leuchtender Flamme verbrennende Flüssigkeit, im Geruche dem Benzin ähnlich, aber etwas stechend, an Senföl erinnernd Spec Gew 0,667 bei 15° C Siedepunkt 37—38° C [Ergänz Spec Gew = 0,69, Siedep 39° C >] In Wasser unlöslich, leicht löslich in Chloroform, Aether, Weingeist von 90 Proc (nicht mit solchem unter 80 Proc) Löst Jod mit himbeerrother Farbe auf Wird durch Einwirkung von salpetriger Säure in das krystallisierende Amylnitrit verwandelt Besteht aus reinem Trimethyläthylen $(CH_3)_3C=CH-CH_3$

Prüfung. 1) Man beachte das spezifische Gewicht, besonders den Siedepunkt 2) Das mit dem gleichen Volumen Pental geschüttelte Wasser darf blaues Lackmuspapier nicht rothen


Anwendung Durch v MERING als Inhalations-Anästheticum empfohlen Für einen Erwachsenen werden 15—20 cem verabreicht Die Narkose tritt in etwa 60 Sekunden ein und soll nicht von üblen bez drohenden Erscheinungen begleitet sein Doch sind schon Todesfälle beobachtet worden, also Vorsicht Der Arzt beachte auch die Feuergefahrlichkeit des Präparates

Aufbewahrung In Gläsern von 80 cem Fassungsraum, die mit guten Korken verschlossen sind, an einem möglichst kühlen Orte vorsichtig. Die verschlossenen Flaschen sind mit einem Gelatine Überzug zu versehen. Der Apotheker muss seinen Vorrath häufig, damit er nicht, wenn Pental verordnet wird, leere Gefässe vorfindet.

Amylenum hydratum.

† **Amylenum hydratum** (Germ.) **Amylenhydrat. Tertiärer Amylalkohol. Dimethyläthylkarbinol Amylène Hydrate.** $C_6H_{11} OH$. Mol Gew = 88

Darstellung Man führt 300 cem Amylen durch Schütteln mit 600 cem abgekühlter Schwefelsäure (aus 1 Vol konz Schwefelsäure und 1 Vol Wasser gemischt) unter Vermeidung jeder Erwärmung in Amylschwefelsäure über, trennt deren Lösung von beigemengten Kohlenwasserstoffen durch Scheidetrichter und Filtration und destillirt das Filtrat mit überschüssiger Natronlauge oder Kalkmilch. Das überdestillirte Amylenhydrat wird vom Wasser getrennt, mit frisch gegluhter Potasche entwässert, darauf rectificirt, wobei die zwischen 100 und 103° C übergehenden Antheile aufgefangen werden.



Eigenschaften Eine wasserklare, bläulich fließende, in der Wärme völlig flüchtige Flüssigkeit von durchdringendem Geruch, der zugleich an Kampher, Pfefferminzol und Paraldehyd erinnert. Spec Gew bei 15° C = 0,815 — 0,820. Siedep 102,5° C. In Folge Anziehung von Wasser aus der Luft kann der Siedepunkt etwas sinken. Germ normirt ihn von 99—103° C. Durch Abkühlung erstarrt es bei —12,5° C zu langen, nadelförmigen Krystallen, welche bei —12° C schmelzen. Löslich in etwa 8 Th Wasser von 15° C, die gesättigte Lösung trübt sich beim Erwärmen. Mit Alkohol, Aether, Chloroform, Benzin, Glycerin und fetten Oelen in jedem Verhältnisse mischbar. Ist hygroskopisch, d. h. es zieht aus der Luft Feuchtigkeit an, womit ein Sinken des Siedepunktes verknüpft ist. Seiner chemischen Beschaffenheit nach ist es reines Dimethyläthylkarbinol.

Prüfung. 1) Bestimmung des spec Gewichtes und des Siedepunktes. Erniedrigung des Siedepunktes weist auf unzulässigen Gehalt an Wasser hin, von welchem nur Spuren zulässig sind. Erhöhung des Siedepunktes kann durch Gehalt an Gährungs Amylalkohol bedingt sein, der bei 131° C siedet. 2) 1 Th löst sich in 8 Th Wasser von gewöhnlicher Temperatur klar. Nicht gelöste Antheile können aus Kohlenwasserstoffen (Amylen) bestehen. Die Lösung darf blaues Lackmuspapier nicht rothen. 3) Wird eine Lösung von 1 g Amylenhydrat in 20 cem Wasser mit 2 Tropfen Kaliumpermanganatlösung (1:1000) versetzt, so darf innerhalb 10 Minuten Entfärbung nicht eintreten (Aethylalkohol, Gährungs Amylalkohol und deren Aldehyde). 4) Wird die wässrige Lösung (1:20) mit ammoniakalischer Silbernitratlösung 10 Minuten im Wasserbade erwärmt, so darf Reduktion nicht eintreten (Aldehyde).

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, vorsichtig. In nicht zu grossen Gefässen. Wegen der hygroskopischen Eigenschaften sind gute Korkstopfen als Verschluss zu empfehlen.

Anwendung Vorzugsweise als Hypnoticum angewendet. Herzthätigkeit und Athmung sollen während der Hypnose nicht wesentlich beeinflusst werden. 2 g Amylenhydrat sollen die gleiche hypnotische Wirkung haben wie 1 g Chloralhydrat. Am zweckmässigsten innerlich in wässriger Lösung, bez. abends vor dem Schlafengehen mit Bier. — Ferner an Stelle von Bromkalium bei Epilepsie.

Grösste Einzelgabe 4,0, grösste Tagesgabe 8,0 (Germ.) Man beachte die Schwerlöslichkeit des Präparates und verwende stets so viel Wasser, dass völlige Auflösung eintritt. Es sind Fälle vorgekommen, in denen der Patient mit dem letzten Arzneireste zu viel Amylenhydrat, welches ungelöst war, auf einmal erhalten hat.

Amylum.

Stärkemehl Kraftmehl Satzmehl. Amidon. Fécule. Starch.

Die Stärke entsteht unter dem Einflusse des Lichtes aus Wasser und Kohlensäure der Luft in den Chlorophyllkörnern der Pflanzen $6\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + 12\text{O}$

Wenn auch sicher der Vorgang viel complicirter ist, so lässt sich die Entstehung der Stärke doch durch diese Gleichung veranschaulichen. Diese so gebildete Stärke (Assimilationsstärke) wandert zu den Oiten ihres Verbranches in der Pflanze und wird dabei zuweilen vorübergehend feinkörnig niedergeschlagen (transitoische oder Wanderstärke), oder sie wird in bestimmten Organen (Samen, Rhizomen, Stämmen, Wurzeln, Knollen etc.) für die neue Generation oder bei ausdauernden Pflanzen für das nächste Jahr aufgespeichert (Reservestärke) — Nur die letztere wird in so grosser Menge abgelagert, dass sie im Grossen gewonnen werden kann aus Samen (Weizen, Reis, Mais) oder Stämmen (Sago, Kartoffel)

Darstellung. Die Kartoffeln werden gewaschen, mittelst Maschinen zerkleinert und die Stärke in Trommeln ausgewaschen, geremigt und getrocknet, oder man schneidet die Kartoffeln in Scheiben, schüttet sie in Haufen, lässt gahren und wascht direkt aus. Das Reinigen der Stärke geschieht durch Absetzenlassen und Auswaschen oder durch Centrifugieren

Zur Gewinnung der Weizenstärke verwendet man das Mehl oder die ganzen Körner. Das erstere wird mit Wasser zu einem Teig geknetet, dieser in Sieben ausgewaschen, das abfliessende „Starkewasser“ in einem „Absussbottich“ absetzen gelassen, ein Rest noch in der Stärke vorhandenen Klebers etc. durch Gähnenlassen entfernt, von neuem ausgewaschen, absetzen gelassen und getrocknet. Verwendet man die ganzen Körner, so werden diese in Wasser eingeweicht, zwischen Walzen zerquetscht und mit Wasser zu einem dünnen Brei gemengt, den man gahren lässt. Durch Ausdrücken, Kneten und Waschen in Haarsieben sondert man dann die Stärke ab und reinigt sie.

Da beim Reis und auch beim Mais die einzelnen Stärkekörnchen sehr fest mit einander verkittet sind, so ist es notwendig, sie aufzulockern, was durch Behandeln mit Laugen oder mit Säuren geschieht.

Eigenschaften. Das Stärkemehl $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_x$ bildet mehr oder weniger rundliche, nur durch gegenseitigen Druck in der Zelle kantige Körner, die das Licht doppelt brechen und zwischen gekreuzten Nikols ein schwarzes Kreuz zeigen, dessen Arme sich im organischen Centrum des Kornes schneiden. Man nimmt an, dass das einzelne Korn nach Art der Sphärite aus schichtweise radial angeordneten, nadelförmigen, einzelnen Individuen besteht. Die um den Kern geordneten Schichten sind nicht gleichförmig, sondern es wechseln wasserärmere und wasserreichere Schichten mit einander ab, die aber unter dem Mikroskop nicht immer zu erkennen sind. Die Grosse ist sehr wechselnd (s. unten bei den einzelnen Arten).

Die Körner sind entweder einfach, dann mehr oder weniger rundlich (Weizen) oder zusammengesetzt (Reis), d. h. eine grössere oder geringere Anzahl Körner sind in einem Leukoplasten entstanden, oder es kommen einfache und zusammengesetzte neben einander vor (Kartoffel).

Trockne „Handelsstärke“ enthält 15—18 Proc. Wasser, sogen. „grüne Stärke“ durchschnittlich 45,5 Proc., indessen ist sie im Stande, bis 80 Proc. zurückzuhalten. Sie lässt sich dann nicht sieben, sondern ballt zusammen. Solche Stärke trocknet man, vollständig geht das Wasser erst bei 125—135° C. weg. Vollig trockne Stärke ist dann sehr hygroskopisch.

Durch warmes Wasser von 50—80° C. quillt die Stärke auf und bildet einen „Kleister“ ohne zunächst eine Lösung zu bilden. Diese entsteht erst bei längerem Kochen, oder Kochen unter Druck oder unter dem Einfluss von Quellungsmitteln (Chlorzink, Chlormagnesium, Jodkalium, Natron- und Kalihydrat etc.).

Als Reagens auf Stärke benutzt man Jod, womit die einzelnen Körnchen sich mehr oder weniger blau oder violett, in seltenen Fällen mehr rothbraun färben. Die Färbung verschwindet beim Erwärmen, tritt beim Erkalten wieder auf. Reducirende Substanzen und Alkalien zerstören die blaue Farbe. Als Reagens benutzt man Jodwasser oder Jodjod-

kalium (8 g KJ 1 g J 60 g H₂O) Nothwendig ist die Anwesenheit von Wasser und Jodwasserstoff, der im Reagens nie fehlt. Die Reaktion ist noch bei 1 J auf 500 000 Stärke deutlich. Stärke oder Starkelosung ist daher auch das beste Reagens auf Jod. Der entstehende blaue Körper ist Jodstärke (C₂₄H₄₀O₂₀J)H. Ueber das Verhalten der Stärke beim Erhitzen vgl. Dextrin.

Pharmaceutische Verwendung finden **Amylum Triticum** (Geim Brit Austr Gall Helv) **Amylum Oryzae** (Helv Enginzb Brit) **Amylum Zeae** (Brit U-St) **Amylum Solani** (Erganzb Gall) **Amylum Marantae** (Erganzb Gall Austr).

Amylum Triticum kommt in verschiedenen Formen in den Handel, als prismatische oder cylindrische bis fingerdicke Stäbchen (Tafel-, Strahlen-, Krystall- und Stengelstärke etc.), oder für Zwecke der Wasche mit verschiedenen Zusätzen (Ultramarin, Ocker, Borax, Stearin). Für den pharmaceutischen Gebrauch ist nur die in Form eines feinen Pulvers vorkommende reine Stärke zuzulassen.

Gute Weizenstärke besteht aus 82–85 Proc Stärkekörnchen, 14–18 Proc Wasser, 0,1–0,15 Proc Kleber, 1,0–1,5 Proc vegetabilischer Faser und 0,05–0,08 Proc Asche.

Amylum Oryzae kommt ebenfalls in kantig-prismatischen Stücken oder in Breckenform („Schafchen“) und als Pulver in den Handel. Hier gilt bezüglich der Verwendung dasselbe.

Arrow-Root Mit diesem Namen (engl. arrow root = Pfeilwurz, oder aus dem brasilianischen arraisa [Stärke aus der Maranta arundinacea]) bezeichnet man eine ganze Anzahl aus verschiedenen Pflanzen gewonnener Stärkemehle, die, medicinisch verwendet, als für Kinder leicht verdaulich und besonders nahrhaft eines unverdienten Rufes genießen (vgl. unten die Uebersicht der wichtigsten Sorten).

Sago ist das aus dem dünnwandigen Mark mancher Palmen (Metroxylon Rumphii Mart, M. laevis Mart und anderen Arten, ferner Arenga saccharifera Labill, Caryota urens L., Borassus flabelliformis L., Chamaerops-Arten) und einiger Cyadeen durch Auswaschen gewonnene Stärkemehl. Der bei uns verwendete Sago wird „geperlt“, indem man die nicht völlig trockne Stärke durch Siebe in Form kleiner Körnchen treibt und diese dann durch Rollen abrundet. Gewöhnlich werden die Körnchen dann noch durch Erhitzen auf Pfannen oberflächlich verkleistert. Solcher Palmensago ist bei uns selten im Handel, man verwendet dafür (unter dem Namen Sago) meist Tapioca (s. unten), oder macht Sago aus Kartoffel- oder Weizenstärke, auch Batatenstärke wird verwendet.

Uebersicht der wichtigsten Stärkesorten.

a) Stärke aus Gramineenfrüchten Getreidestärke

1) **Weizenstärke Amylum Triticum** (aus den Früchten von Triticum sativum Lam.) besteht aus zwei Formen von Körnern, die durch wenig Uebergänge verbunden sind:
a) Grosskörner, im Umriss rund, zuweilen schwach geschweift, dicklinsenförmig. Kern central. Schichten sehr selten andeutungsweise zu sehen. Auf der Seitenansicht wird




Fig 53 Amylum Triticum




Fig 54 Amylum Secalis


bei den meisten Körnern ein dunkler Spalt sichtbar. Grösse 30–45 μ (meist 30–40 μ).
b) Kleinkörner, rundlich oder oval, selten in ein Spitzchen verschmälert. Grösse 2–10 μ (meist 5–7 μ). Fig 53.

2) **Roggenstärke Amylum Secalis** (aus den Früchten von Secale cereale L.), der vorigen sehr ähnlich, aber Gross- und Kleinkörner durch viele Uebergänge verbunden,

Anmerkung Die Figuren 53–71 sind sämmtlich 850 Mal vergrössert



Schichtung bei den grossen Körnern bisweilen deutlich zu sehen, dieselben oft mit mehrstrahligem Spalt in der Mitte. Grosskörner $25-60\ \mu$ (auch $70\ \mu$) (meist $25-40\ \mu$) Mittlere Körner $10-25\ \mu$ Kleinkörner $3-10\ \mu$ Fig 54

3) Gerstenstarke *Amylum Hordei* (aus den Früchten von *Hordeum sativum* Jeason) Den vorigen ähnlich, wenig Zwischenformen zwischen Gross- und Kleinkörnern. Spalt im Centrum seltener und weniger deutlich wie beim Roggen, Schichtung häufig zu erkennen. Grösse der Grosskörner $15-30\ \mu$ (selten $40\ \mu$), meist $20-28\ \mu$ Kleinkörner wie beim Weizen. Charakteristisch sind zuweilen vorkommende nierenförmige Körner Fig 55

Fig 55 *Amylum Hordei*Fig 56 *Amylum Maydis*

4) Maisstarke *Amylum Maydis* (aus den Früchten von *Zea Mays* L.) Körner ziemlich gleichmässig, $10-15\ \mu$ (selten $30\ \mu$ und mehr) gross, meist durch gegenseitigen Druck mehr oder weniger kantig im Umriss, seltener rundlich, meist mit centralem Spalt oder kleiner centraler Höhlung, Schichtung sehr selten erkennbar. Wenige rundliche Kleinkörner Fig 56

5) Haferstarke *Amylum Avenae* (aus den Früchten von *Avena sativa* L.) Besteht ebenfalls vorwiegend aus kantigen Körnern, die aber durch den Zerfall grosser, zusammengesetzter Körner entstehen. Die einzelnen Körnchen sind $5-7$ (-12) μ gross. Daneben finden sich häufig noch nicht zerfallene, grosse, ovale, zusammengesetzte Körner. Ferner fallen einzelne Körner von Spindelform auf Fig 57

Fig 57 *Amylum Avenae*Fig 58 *Amylum Oryzae*

6) Reisstarke *Amylum Oryzae* (aus den Früchten von *Oryza sativa* L.) Der vorigen ähnlich, die Theilkörnchen der zerfallenen grossen Körner messen aber nur $2-10\ \mu$, meist $3-6\ \mu$. Daneben finden sich ebenfalls meist die grossen, nicht zerfallenen Körner, solche von spindelförmiger Gestalt fehlen Fig 58

b) Starke aus Leguminosensamen.

7) Bohnenstarke *Amylum Phaseoli* (aus den Samen von *Phaseolus vulgaris* L.) Besteht aus bohnenförmigen, eiförmigen oder etwas nierenförmigen Körnern, die einen grossen, astigen, schwanzigen Längsspalt haben. Schichtung deutlich. Länge der Körner $20-40$ (-50) μ . Breite $10-35\ \mu$. Daneben finden sich kleine, runde oder rundlich eiförmige Körner Fig 59

8) Erbsenstarke *Amylum Pisum* (aus den Samen von *Pisum sativum* L.) Form der Stärkekörner ziemlich wechselnd, eiförmig, nierenförmig, rundlich, oft seitwärts mit Auftreibungen. Schichtung meist deutlich. Der Spalt fehlt oder ist doch weniger deutlich wie bei der vorigen. Länge der Körner $30-60\ \mu$, meist $30-50\ \mu$. Breite $20-35\ \mu$ bei den mehr oder weniger gestreckten Körnern Fig 60

9) Linsenstarke *Amylum Lentis* (aus den Samen von *Lens esculenta* Minch.) Die Körner stehen der Form nach zwischen 7 und 8, es finden sich bohnenförmige mit

starkem Spalt und mehr rundliche ohne oder mit schwachem Spalt Länge 30–40 μ , Breite 12–30 μ Fig 61



Fig 59 Amylum Phaseoli




Fig 60 Amylum Pist

c) Stärke aus anderen Früchten

10) Bananenstärke Amylum Musae, Guyana Arrowroot (aus dem Fruchtfleisch von *Musa paradisiaca* L und *M. sapientum* L) Form der Körner recht unregelmässig und wechselnd, rundlich, eiförmig, rundlich eckig, keulenförmig, hornförmig gebogen etc. Besonders charakteristisch sind die in der Handelswaare aber meist auseinandergefallenen Doppelkörner, die aus zwei gekrümmten Theilkörnern bestehen. Schichtung meist zu erkennen. Korn excentrisch. Grösse 25–60 μ , meist 30–40 μ . Daneben kommen kleine rundliche Körner vor, die 4–10 μ gross sind. Fig 71

d) Stärke aus unterirdischen Pflanzentheilen

11) Kartoffelstärke Amylum Solani (aus den Knollen von *Solanum tuberosum* L.) Körner von wechselnder Gestalt und Grösse und doch sehr charakteristisch, sie sind rundlich, oval, eiförmig, abgerundet-eckig, fast lappig mit eingebogener Contour, Kern excentrisch und bei den nicht runden Körnern am schmalen Ende liegend. Spalt selten. Schichtung deutlich. Körner zuweilen auch zu 2 und 3 zusammengesetzt. Grösse von wenigen μ bis zu 100 μ und darüber. Fig 62




Fig 61 Amylum Lentis




Fig 62 Amylum Solani

12) Marantastärke Amylum Marantae, Arrowroot der Aizneibücher, Kraftmehl (unter diesem Namen jetzt auch oft die vorige), Westindisches, Jamaika-, Bermudas-, St Vincent-Arrowroot (aus den Rhizomen von *Maranta arundinacea* L und einiger anderer Arten) Form der Körner ähnlich wechselnd wie bei der vorigen. Kern viel weniger excentrisch wie bei 11, Spalt klein aber deutlich. Schichtung meist deutlich. Grösse 40–60 μ , zuweilen noch grösser, daneben vereinzelt viel kleinere Körner. Fig 63

13) Manihotstärke Amylum Manihot, Manioc, Cassava, Tapioca, Brasilianisches, Bahia-, Rio-, Para Arrowroot (aus den Wurzelknollen von *Manihot utilisissima* Pohl und einiger anderer Arten) Wird meist von aus 2 Theilkörnern bestehenden zusammengesetzten Körnern gebildet, die aber in der Handelswaare zerfallen sind. Die Körnchen sind daher von der Seite gesehen ungefähr halbkugelig (paukenförmig), von oben und unten rund. Meist ein centraler Spalt vorhanden, von dem gegen die Bruch-

flache sich oft ein paar divergierende Linsen ziehen. Schichten schwer und nicht immer zu sehen. $15-36\ \mu$. Ausserdem Kleinkörner, die $5-15\ \mu$ messen. — Fast aller Sago des Handels wird gegenwärtig von dieser Stärke geheftet. Fig 64 und 65



Fig 63 Amylum Marantae



Fig 64 Amylum Manihot



Fig 65 Amylum Manihot, halb gequollen

14) Curcumastärke Amylum Curcumae, Ostindisches Arrowroot, Tikmehl, Tikhu mehl, Bombay-, Malabar-, Tellichery-Arrowroot (aus den Rhizomen von *Curcuma angustifolia* Roxb und einiger verwandter Arten). Körner flach, von der breiten Fläche gesehen ungefähr eiförmig, die breite Seite oft etwas rundlich abgestutzt, die Spitze oft vorgezogen, in dieser den Nabel schichtartig, aber deutlich. Von der schmalen Seite gesehen sind die Körner fast stahlförmig, oft zu mehreren aneinander liegend. Die Körner sind $80-60\ \mu$ lang, $20-35\ \mu$ breit. Neben dieser charakteristischen Form finden sich kleine Körner von wenig konstanter Form. Fig 66.




Fig 66 Amylum Curcumae




Fig 67 Amylum Cannae


15) Cannastärke Amylum Cannae, Tolomanstärke, Queensland-Arrowroot, Neu Sudwales-Arrowroot (aus den Rhizomen von *Canna edulis* Edw., *Canna indica* L etc). Hat die grössten Körner und ist dadurch charakterisiert. Sie sind dicklinsenförmig, der Umriss ist rundlich, elliptisch, eiförmig, zuweilen etwas unregelmässig und sich den Formen von 14 nähernd. Der Kern am spitzen Ende. Schichtung deutlich. Sie erreichen eine Grösse von $100-180\ \mu$. Die kleinsten, meist ovalen Körner messen etwa $20\ \mu$. Fig 67

16) Batatenstärke Amylum Batatae, Brasilianisches Arrowroot (aus den Knollen von *Batatas edulis* Choisy). Körner denen der Manihotstärke ziemlich ähnlich, ebenfalls meist aus Doppel- oder Drillingskörnern zerfallen. Ein rundlicher Kern oder strahliger Spalt. Schichtung zart und nicht immer zu erkennen. Grösse $15-40\ \mu$, nur ausnahmsweise grösser, meist $20-30\ \mu$. Fig 68



17) Erythroniumstärke (Aus den Zwiebeln von *Erythronium dens canis* L., in Japan officinell). Die Körner dick linsenförmig, im Umriss rundlich, ausgebuchtet, an 11 erinnernd. Kern oft seitlich excentrisch, Spalt meist rundlich. Schichtung zart aber deutlich. Meist Einzelkörner, sehr selten aus wenigen zusammengesetzte Körner. Übergänge von den runden, nur wenige μ messenden Kleinkörnern zu den grossen, bis $70\ \mu$ messenden Körnern vorhanden. Fig 69

e) Stärke aus oberirdischen Achsen.

18) Sago. *Amylum Sago* (aus dem Grundparenchym des Stammes von *Metroxylon Rumphii* Mart. und *M. laeve* Mart.). Körner meist zusammengesetzt und zwar so, dass einem grossen Theilkorn ein oder mehrere, meist viel kleinere Theilkörner und

Fig. 69. *Amylum Batatas*.Fig. 69. *Amylum Erythronii*.

gewöhnlich an der dem Kern entgegengesetzten Seite ansitzen. Der Theil des Hauptkornes, dem das Theilkörnchen ansitzt, ist oft etwas vorgezogen. In der Handelswaare sind die kleinen Theilkörnchen gewöhnlich abgefallen und das Hauptkorn zeigt die Abbruchstellen. Das Hauptkorn von wechselnder Gestalt, aber wohl stets gestreckt. Kern am einen Ende. Schichtung meist deutlich. Daneben kommen einfache, eirunde oder ovale Körner vor. Grösse 30–60 μ , selten grösser. Fig. 70.

Fig. 70. *Amylum Metroxylis*.Fig. 71. *Amylum Musae*.

Prüfung. Die Prüfung erstreckt sich 1) auf die Bestimmung des Aschengehaltes. Man verbrennt etwa 10 g bei kleiner Flamme zu schwarzer Kohlenmasse, entfernt von der Flamme, zerdrückt die Kohle, lässt einige Stunden an der Luft stehen und führt die Veraschung bei stärkerer Flamme zu Ende, ev. mit etwas Ammoniumnitrat. Der Aschengehalt reiner Stärke beträgt nicht über 0,2%, die Arzneibücher lassen etwas höhere Zahlen zu (1%). Höherer Aschengehalt kann durch Unreinigkeiten (Staub) bedingt sein, aber auch durch Verfälschung mit Gips, Magnesit, verwittertem Natriumsulfat etc. 2) Auf die mikroskopische Untersuchung bei etwa 300 \times Vergrösserung. 3) Auf die Fähigkeit, einen neutralen Kleister zu bilden, doch ist zu bemerken, dass Weizen- und Kartoffelstärke häufig sauer, Reis- und Maistärke alkalisch reagieren infolge eines geringen Gehaltes an den bei der Fabrikation verwandten Säuren oder Laugen. Die Temperatur, bei der die einzelnen Sorten zu verkleistern beginnen und die Verkleisterung beendigt ist, ist verschieden:

nach LIPPMANN.

	Deutliches Aufquellen	Beginnende Verkleisterung	Vollkommene Verkleisterung		Deutliches Aufquellen	Beginnende Verkleisterung	Vollkommene Verkleisterung
	°C.				°C.		
Roggen	45	50	55	Mais	50	55	62,5
Reis	53,7	58,7	61,2	Weizen	50	65	67,5
Kartoffel	46,2	58,7	62,5	Maranta	66,2	66,2	70

4) Bestimmung des Wassergehaltes, die man durch Trocknen einer gewogenen Menge bei künstlicher Wärme vornimmt, wobei zu beachten ist, dass trockene Stärke rasch wieder Wasser annimmt. Bestimmung nach anderen, annähernden Methoden vergl. Haehn-Fischer-Hartwich, Kommentar I p 302. 5) Mit kaltem Wasser anreiben, darf das Filtrat sich mit Jod nicht bläuen, andernfalls ist der Stärke, um sie zu formen, Kleisterwasser zugesetzt.

Roggenmehl und Weizenmehl. Es wird häufig verlangt, von einem Mehle zu sagen, ob es Roggen- oder Weizenmehl oder ein Gemenge beider ist. Im ersteren Fall ist auf die oben angegebenen Unterschiede der Stärkekörner zu achten. Die Körner des Roggens werden etwas grösser, sie zeigen häufig einen strahligen Spalt, Schichtung oft deutlich, Gross- und Kleinkörner durch viele Uebergänge verbunden. Auch die Verkleisterungstemperatur (vgl. oben) ist festzustellen.

Viel schwieriger ist der zweite Fall und dabei das Hauptgewicht auf die Untersuchung der in keinem Mehle fehlenden Gewebeelemente der Getreidekörner zu legen. Man entfernt zunächst die störende Stärke, indem man 4 g des Mehles mit 200–300 cem 4proc Salzsäure (unter Zusatz des verdunstenden Wassers) eine Stunde lang kocht, dann 12 Stunden in einem Spitzglas absetzen lässt und nun sowohl den Schaum, wie den Bodensatz mikroskopisch prüft. Im Schaum findet man besonders die Haare des Bartes der Fruchtschale, die bei beiden einzellig, beim Weizen ungewöhnlich dickwandig, 500–700 μ lang, etwa 15 μ dick, die Wanddicke beträgt 3,5–9,5 μ , der Durchmesser des Lumens 1,5–3,5 μ , dasselbe ist also fast immer enger wie die Dicke der Wand. Beim Roggen sind die Haare 60–500 μ lang, 9–22 μ breit, die Wanddicke beträgt 3,5–4,5 μ , der Durchmesser des Lumens 3,7–7,5 μ , selten mehr, das Lumen ist also fast immer weiter wie die Dicke der Wand.




Fig 72 (Nach MOELLER)
Querzellenschicht des Weizens 300 Mal vergrössert

Ferner dient zur Unterscheidung die „Querzellenschicht“ der Fruchtschale. Ihre Zellen sind bei beiden Früchten in der Form gleich, aber beim Weizen stossen die Zellen lückenlos aneinander und die Wand an den kurzen Seiten ist dünner wie die an den langen, beim Roggen sind die Zellen an den Enden meist abgerundet, lassen also Interzellularräume zwischen sich, ferner sind diese abgerundeten kurzen Wände dicker wie die langen und selten getupfelt. Fig 72 und 73.




Fig 73 (Nach MOELLER)
Querzellenschicht des Roggens 300 Mal vergrössert

Zur Erkennung von Roggenmehl kann man ferner auch die Kleberzellen benutzen, die hier meist blau, beim Weizen farblos sind. Zur Erkennung schüttelt man das Mehl mit Chloroform und untersucht den Bodensatz, der bei Roggen mehr oder weniger grün ist.

Aufbewahrung. Stärke und stärkehaltige Gemische (Nahrmehle) müssen wegen ihrer Neigung, aus der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen, in wohlverschlossenen Gefässen an einem trockenen Orte aufbewahrt werden.

Anwendung. In Form eines flüssigen Kleisters (1:50) als reizmilderndes Mittel, in Klystieren bei Durchfall etc, als Antidot bei Jodvergiftung. — In Substanz als Exciens für starkwirkende Arzneimittel (z. B. Jodoform), zum Konspergiren von Pillen, als Staempulver auf nassende Flechten und bei Hautjucken. — Arrowroot gilt als besonders leicht verdauliches Nahrungsmittel bei Kindern und Rekonvaleszenten.

Amylum solubile, Lösliche Stärke, Amylogen. Man erhält es durch Behandeln von Stärke mit der 6–8fachen Gewichtsmenge 1proc Kalilauge in der Kälte, dann im Wasserbade bis zur Dünnfliessigkeit, zuletzt längeres Kochen, Filtriren, Neutralisiren mit Essigsäure und Ausfällen mit Alkohol. Durch wiederholtes Lösen in Wasser und Fallen mit Alkohol erzielt man ein wasserlösliches, weisses Pulver, welches mit Jod rein blaue Färbung giebt.

Glanztärke. 1) flüssige Borax, Gummi, Stearin je 2 Th, Glycerin 5 Th, Wasser 49 Th, setzt man umgeschüttelt der 8fachen Menge Stärke vor dem Kochen zu

2) Pulver Weizenstärke 2 Th werden in geschmolzene Stearinsäure 1 Th einge tragen, die erkaltete Masse gepulvert

3) Stearinsäure 800 Th werden auf einem Reibeisen zerrieben, mit Borax 100 Th, Kochsalz 10 Th, arabischem Gummi 50 Th, Weizenstärke 400 Th innig gemischt (Buchh)

Glyceritum Amyli U-St Glycerite of Starch. Maisstärke 10 g werden mit Wasser 10 cem angerieben, mit Glycerin 80 g vermischt und bei höchstens 144° C zu einer durchscheinenden Masse verarbeitet

Klebmittel für Photographien. 1) Stärke 8 Th, Zucker 1 Th vermischt man in einer Lösung von arabischem Gummi 4 Th in etwa der 10fachen Menge Wasser und erlutszt im Dampfbade bis zur völligen Verkleisterung

2) Collodine, Triticine, ist mittelst Alkalien löslich gemachter Stärkekleister (vergl Amylum solubile)

3) STAFFORD'S White Pasta ist Kleister aus Dextrin und Stärke mit Zusatz von Bor-säure, Glycerin und Thymol

Klebmittel für Schilder auf Glas, Metall etc. Zu einer erkalteten Lösung von 100 g Laugestein giebt man Roggenmehl 500 g, rührt mit Wasser q s zum Kleister und setzt erwärmten venet Terpentin 5 g und 1 Esslöffel Essigsäure zu (Pharm Ztg)

Mucilago Amyli, Decoctum Amyli Stärkekleister. Zu Stärke 1 Th mit Wasser 2 Th verrieben giesst man unter beständigem Rühren allmählich siedendes Wasser 97 Th

Pulvis exsiccans, Form mag Borol Stärke, Zinkoxyd je 25 g

Pulvis inspissorius HEBRA, HEBRA's Einstreupulver Talk, Veilchenwurzel je 5,0, Zinkoxyd 6,0, Weizenstärke 84,0

Reispuder, Poudre de Riz (Buchh) Reisstärke 750 Th, Veilchenwurzelpulver 250 Th, Rosengeraniumöl 2 Th. Ist ein Zusatz von Zinkweiss erwünscht, so verreibt man dieses — 100 Th — mit der Veilchenwurzel und schlägt das Ganze durch ein feines Sieb

Schweisspulver (Buchh) Alaun, Tannin je 115 Th, Borax 175 Th, Stärke 585 Th, Orangenschalenöl 10 Th

Stärkeglanz, flüssiger Walrat, Arabisches Gummi, Borax je 1 Th, Glycerin 2 1/2 Th, Wasser 24 1/2 Th 3 Theelöffel auf 1/4 Pfund Stärkekleister

Stärkekleister, Stärkekitt. 1) Stärke 10 Th, Wasser 10 Th versetzt man unter Umrühren mit siedendem Wasser 100—150 Th Vorheuzes Vermischen der Stärke mit 5—10 Proc Weizen- oder 15—20 Proc Roggenmehl erhöht die Klebkraft, ein geringer Zu-satz von Alaun, Borax oder Karbolsäure die Haltbarkeit

2) Eine siedend heisse Lösung von Leim 4 Th in Wasser 80 Th giesst man unter Umrühren in einen heissen Kleister aus Stärke 30 Th und Wasser 200 Th, kocht einige Minuten und fügt Karbolsäure 2 Th hinzu. Besonders für Papier, Pappe, Leder

Stärkelösung, haltbare, zur Analyse Stärke 5 g, Quacksilberjodid 0,01 g mit Wasser 80 cem verrieben, giesst man in 1 l siedendes Wasser, kocht 8 Minuten und lässt erkalten. Die Empfindlichkeit 1 : 500 000 soll sich jahrelang halten (MUTNANSKI)

Alcarnose Nährmittel aus Kohlehydraten, Fleisch- und Gemmealbuminosen und Fleischextraktivstoffen

Ambrosia Nährmittel aus Kastanien-, Kartoffel-, Linsen-, Bohnenmehl und Vanille

Apparatine, zum Appretiren, wird durch Eintragen von Pottaschelösung in er-wärmten Kleister gewonnen

Apparatine, GFRAED'S ist durch NaHO löslich gemachte Stärke

Glutinin ist eine wässrige Lösung des vorigen

Arrowroot-Biscuit von HUNTLEY & PALMER, enthält verdauliches Eiweiss, Fett, Kohlehydrate, Mineralstoffe (Phosphate)

Backpulver, GARDICKES, enthält saures Calcium- und Magnesiumphosphat, Natrium-bikarbonat, Kochsalz und Mehl

Backmehl, LIEBIG'S selbstthätigen, besteht aus Natriumbikarbonat 8,4 Th, Wein-stein 18,8 Th, Weizenmehl 1000 Th

Blutspitzen-Heilmittel, WORTMANN'S, eine Mischung mehrerer Mehle mit Zucker, Kochsalz, Kakao

Corn starch und Patent Corn-flour, ferner Maizena, Dureya's, ein Nährmittel, und Maisstärke, Mexikanisches Mehl von DR BENITO DEL RIO ebenfalls

Damenpulver (Gesichtspuder), von PAGENKOPF, besteht aus Stärke, kohlensaurer Magnesia, Borax

Entfuselungspulver von PLATTNER, enthält Stärke, Eiweiss und Milchzucker

Feuerschutzstärke, Apyrinstärke, zur Verminderung der Feuergefährlichkeit bei Damenkleidern u dgl, besteht aus einer Mischung von Ammonium Magnesiumphosphat 2 Th, wolframsaurem Natrium 1 Th, Weizenstärke 6 Th — Das demselben Zweck di-

nende PATTRA'sche Salz ist eine Mischung von Borax 4 Th und halberfallenen Bittersalz 3 Th

Gummirte Stärke ist Reissstärke

Hefenmehl, Berliner. Besteht aus gereinigtem Weinstein, Natriumbikarbonat und Mehl

Kindermehle sind im allgemeinen Gemische von eingedampfter Milch mit besonders präparierten, aufgeschlossenen Mehlen von Cerealien oder Leguminosen. Einige enthalten keine Milch, in anderen ist das Starkemehl unverändert, sie sind daher zum Gebrauch für Säuglinge völlig ungeeignet, was die mikroskopische Untersuchung nachweist

Das Aufschliessen geschieht durch Durchfeuchten mit verdünnten Säuren, die dann mit Calciumkarbonat oder Natriumbikarbonat wieder abgestumpft werden, oder durch Behandeln mit Malz

Im allgemeinen eignen sie sich wenig als Ersatz der Muttermilch, da sie meist zu wenig Stickstoffsubstanz enthalten. Sie verlieren ihre Bedeutung, seit die Sterilisierung der Kuhmilch so wenige Schwierigkeiten macht

Zusammensetzung einiger Kindermehle (nach König)

	Wasser	Stickstoff- substanz	Fett	Kohlenhydrate in kalt. Wass.		Holzfaser	Asche	Phosphor- säure	Kalk	In der Trocken- substanz			Stickstoff
				löslich	un- löslich					Stickstoff- substanz	Fett	löslich Kohle- hydrate	
Procent													
W. Nestlé in Vevey	8,15	9,91	4,16	42,87	35,04	0,89	1,71	0,59	0,32	10,55	1,75	45,15	1,89
Anglo Swiss & Co, Cham	5,38	11,23	5,06	47,01	26,30	0,5	1,87	0,75	—	11,39	6,37	50,26	1,92
Giffey, Schill & Co	5,37	11,71	4,29	47,11	29,75	—	0,77	—	—	12,37	4,53	49,78	—
Faust & Schuster, Göttingen	6,54	10,79	4,55	43,21	32,99	—	1,93	0,51	—	11,55	4,87	46,33	1,85
Dr. F. Frerichs & Co, Leipzig	3,42	11,96	6,02	28,75	44,48	—	2,36	0,52	—	12,81	6,43	30,75	2,05
Kufekes Kindermehl	8,78	12,51	1,81	21,03	52,22	0,65	2,11	0,63	0,11	13,71	1,97	24,09	3,19
Rademanns Kindermehl	1,54	13,62	5,37	15,78	55,51	0,82	4,00	1,78	1,01	14,81	5,83	16,53	2,29
Mellina Food	3,87	8,95	0,34	61,47	18,84	0,59	2,94	0,58	0,16	8,61	0,37	66,01	1,51
Milchzwieback v. Loeflund, Stuttgart	1,68	13,44	5,81	63,61	—	0,73	6,83	2,07	0,43	14,80	6,09	—	2,20

Kunstmehl, Kunstweiss von HERREMANN & Co, zum Beschweren des Backmehles, ist gemahlener Gips

Malerleim, chemischer, ist mit Aetzkalk aufgeschlossener Stärkekleister

Meen Tun, amerikanisches Verschönerungsmittel, besteht aus Talk, Kräide, Stärke

Mehl amerikanisches, wird durch Schaben, Bleichen und Mahlen weicher Hölzer bei New York massenhaft dargestellt und ist ausserlich von Weizenmehl nicht zu unterscheiden

Mondamin Corn Floor von BROWN & POLSON ist entöltes Maismehl

Nutrol, Nahrungsmittel, das aus verdauter Stärke mit wenig HCl und fleischverdauenden Fermenten besteht

Palmyrena Brustmittel aus mehreren Starkemehlarten, Kaffee, Kakao und Zucker

Patent Glanzstärke, von FRANZ CONLENZER, ist Reissstärke mit einem kleinen Zusatz von Borax und Silikaten

Pyroxam, Xylodin, UCHATTUS' Weisspulver, ist nitrirte Kartoffelstärke

Schlichte, von DUCANCEL & FORTIN. Stärke wird mit kalter Natronlauge behandelt, dann letztere durch Schwefelsäure neutralisirt

Schönheitscreme, Orientalsche Teig aus Mehl und Kleie

Stärke, lösliche, von Prof. DEBOVE, ist durch Erhitzen dextrinirte Stärke

Toilettenpulver, unsichtbarer, Invisible toilet powder besteht aus Stärke 20 Th, Talcum 50 Th, Zinkoxyd 30 Th

Toilettenpulver von RECAMIER, eine Mischung von Stärke und Zinkoxyd

Wundermittel, englisches, als Milchersatz für Kälber. Kartoffelstärke mit wenig Enzianwurzel.

Anacardium.

Pharmaceutische Bezeichnung für zwei verschiedene, der Familie der Anacardiaceen angehörige, medicinisch verwendete Früchte

1) *Anacardium orientale* (Fructus *Anacardii orientalis*, ostindische Elephantenläuse. Herzfrüchte) von *Semecarpus Anacardium* L. fil. (Ostindischer Tintenbaum, the Marking nut tree, Bhulawa), einem im nordwestlichen Indien heimischen

Baum. Die Früchte, die auf einem harten, runzligen Stiel (Fig. 75 b), der sich in der Droge häufig findet, aufsitzen, sind 2—3 cm lang, 2 cm breit, herzförmig, einfächerig, einsamig, schwarz-braun. (Fig. 75 a).

2) *Anacardia occidentalis* (Cassavium, Fructus cecatae, Nucces Acajou, Dintenüsse, Mahagoninüsse. Noix d'acajou, Castew-nut, westindische Elefantennüsse) von *Anacardium occidentale* L. (Nierenbaum, Acajou, Kaschubaum), heimisch in Westindien, durch die ganzen Tropen durch die Kultur verbreitet, da der dickfleischig verdickte Fruchtsattel (Fig. 74 b) als beliebtes Obst gilt. Die demselben aufsitzenden Steinfrüchte sind nierenförmig, wenig grösser wie die vorigen, braun. (Fig. 74 a).



Bestandtheile. Beide Arten enthalten in grossen Sekretbehältern der Fruchtschale Cardol (s. d.); das der ersten Art: Cardolum pruriens, gilt für schärfer als das Cardolum vesicans der zweiten Art. Ferner enthält die zweite Art die einbasische Anacardsäure $C_{22}H_{32}O_8$, Harzsäuren und mehrere Gerbstoffe. Das Ammoniumsalz der β - und δ -Harzsäure $C_{44}H_{62}O_7(NH_4)_2$ wird als Haarfärbemittel empfohlen. Die fettreichen Samen (ohne Schale) sind wohlschmeckend, eine Abkochung der Rinde gilt als Specificum gegen Diabetes, die adstringirenden Blätter verwendet man gegen Blutungen. Das Catechin enthaltende Holz ist als „weisses Mahagoni-

holz“ oder „Acajouholz“ im Handel. Aus dem Stamme tritt Gummi, welches gesammelt wird (Acajougummi, Gomme d'acajou), cf. Gummi. Auch andere Arten liefern Gummi: *A. humile* Mart. und *A. nanum* St. Hil.

Anwendung. Die Früchte beider Arten sind infolge des Cardolgehaltes ausserordentlich scharf und blasenziehend; die Wirkung ist etwas schwächer, aber anhaltender wie die der Kanthariden. Die Auszüge der Fruchtschale nehmen an der Luft eine tief-schwarze Farbe an und man verwendet solche mit Aether-Alkohol hergestellten Auszüge als „unlösliche Tinctur“. Da die damit gezeichneten Stellen von Wäsche auf der Haut Erkrankungen hervorrufen können, ist von dieser Verwendung abzusehen, theilweise (in Berlin) ist sie behördlich verboten.

Man verwendet die Früchte als Sympthiomittel gegen Zahnweh, indem man sie auf einen Faden zieht und auf der Haut trägt. Auch das ist zu verwerfen.

Die Früchte der zweiten Art werden häufig zu Spielereien (Affenköpfe) verwendet. Man hüte sich, Kindern solche in die Hände zu geben. **Aufbewahrung.** Vorsichtig.

† Cardolum. Cardoleum. Cardol. $C_{21}H_{30}O_2$ (nach STÄEDLER) oder $C_{22}H_{30}O_3 \cdot H_2O$ (nach SPIEGEL).

Darstellung. Das Fruchtfleisch der Acajou-Nüsse wird mit Aether extrahirt und der Auszug zum Extrakt abgedunstet, welches man zur Entfernung der Gerbsture mit Wasser wäscht. Den Rückstand löst man in 15 bis 20 Th. Weingeist (95 Proc.) und digerirt die Lösung so lange mit frischgefälltem Bleihydroxyd, bis alle Anacardsäure an Blei gebunden ist, die Lösung also nicht mehr sauer reagirt. Man filtrirt vom anacardsauren Blei ab und versetzt das Filtrat bis zur beginnenden Trübung mit Wasser, hierauf mit etwas Bleiacetat. Alsdann kocht man die Mischung auf, tröpfelt bis zur Entfärbung Bleiessig hinzu, filtrirt den klebrigen Niederschlag ab, entbleit das Filtrat durch Schwefelsäure, verdunstet das Filtrat und wäscht das zurückbleibende Cardol mit Wasser. (Vorsicht bei der Bereitung!)

Eigenschaften. Im reinen Zustande eine gelbliche, in dickeren Schichten schwach röthliche, ölige Flüssigkeit, spec. Gew. = 0,978 bei 23° C. Es besitzt schwachen, angenehmen, besonders beim Erwärmen hervortretenden Geruch. Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether. An der Luft nimmt es allmählich dunklere Färbung an. Es erstarrt noch nicht bei -20° C. Verbrennt entzündet mit leuchtender, russender Flamme, ist aber nicht ohne Zersetzung flüchtig. Auf die Haut gebracht, erzeugt es

Blasen und Entering Die als „Cardol“ im Handel vorkommenden Präparate (s weiter unten) sind in der Regel Gemenge von Cardol und Anacardsäure und erstarrten alsdann beim Abkühlen krystallinisch Meist enthalten sie auch von der Darstellung her Blei Nachweis des letzteren durch Veraschen Aufbewahrung Vorsichtig und vor Licht geschützt — Das reine Cardol wird kaum therapeutisch verwendet, wohl aber die in der Therapie als Cardol bezeichneten nachstehenden Extrakte

† **Cardolum (Cardoleum) vesicans** Das Alkohol-Aetherextrakt aus *Anacardium occidentale* Enthält im wesentlichen Anacardsäure und Cardol Braune, schmierige Masse, bisweilen als Vesicans an Stelle der Canthariden angewendet Nicht mit dem Folgenden zu verwechseln (!) Vorsicht beim Manipuliren (!)

† **Cardolum (Cardoleum) pruriens** Das Alkohol-Aetherextrakt aus *Anacardium orientale* Tiefschwarze, theerige Masse Erzeugt bei äusserer Anwendung nicht nur lokal Blasen, sondern weit über die Applikationsstelle hinausgehend rosenartige Entzündung Vorsicht beim Manipuliren (!)

Die beiden käuflichen Extrakte werden als Waschezeichentinten verwendet Man schreibt oder druckt damit auf Wäsche etc und befeuchtet die Stellen alsdann mit Kalkwasser, worauf sie tiefschwarz werden Vergl aber S 302

Ananas.

Gattung der Bromeliaceae — Bromeliaceae.

Ananas sativus Lindl Heimisch in Amerika, jetzt durch die Kultur weit verbreitet Alle beerenartigen Früchte eines Fruchtstandes verwachsen mit der fleischig werdenden Achse und den ebenfalls fleischig werdenden Deckblättern und stellen eine „Sammelfrucht“ dar, die von einem Blatterschopf gekrönt ist Kultivirt ohne Samen Die ganze Frucht ist grosswarzig (jede Warze entspricht einer Einzelfrucht), goldgelb bis braunlichgelb, in der Form und Grösse variirend, bis 4 Kilo schwer werdend Geruch und Geschmack angenehm aromatisch, säuerlich sauss

Die Frucht der wilden Form besitzt nicht unerhebliche Heilkräfte, man verwendet sie als Diureticum und Anthelminticum Der vergohrene, weinartige Saft der Kulturformen wird gegen Magenkatarrh, katarrhalische Affektionen der Schleimhäute (mit Wasser als Spray bei Nasenkatarrh) verwendet Ferner enthält die Frucht Eiweiss verdauende und Milch coagulirende Fermente

Bestandtheile Der Gehalt an freier Säure bei den kultivirten Formen ist 1,0—5,2 Proc, bei der wilden 8,6 Proc, der Zuckergehalt der kultivirten 58—66 Proc, der wilden 8,0 Proc

Die Verwendung der frischen oder in Zucker eingemachten Frucht zu Ananasbowle ist bekannt

Ananas-Essenz (Buchh) 1) Ananas 500 g wird zerkleinert mit Weingeist 8 Tage ausgezogen, abgepresst, filtrirt, mit einigen Gramm Vanilletinktur und soviel Weingeist versetzt, dass 1 kg Essenz erhalten wird (zu Punschextrakten) 2) Stärkere Essenz Butteräther 250 g, Ananasessenz 1 600 g, Chloroform 150 g, Vanilletinktur 5 g, Citronenöl 2 Tropfen

Ananassaft (Dist) Ananasessenz 1 30 g, Weinsäure 5 g, weisser Snaup 1000 g, Zuckertinktur q s

Pinapin ist vergohrener Ananassaft

Andropogon.

Gattung der Gramineae — Andropogoneae. Zahlreiche Arten liefern ätherische Oele (0,3—1,0 Proc)

Andropogon Nardus L Heimisch in Ostindien Liefert Citronelloöl Die Wurzel verwendet man gegen Magenkrankheiten und Fieber

Andropogon citratus D C In Ostindien Liefert Lemongrassöl, oder Verbena- oder Melissa indica-Oel

Andropogon Schoenanthus L In Sudasien und Afrika. Liefert das Palmarosa-Oel (Ingwergrass-Oel, Rusa Oel) Dieses Oel dient in Bulgarien ganz allgemein als Verfälschungsmittel des Rosenöles Die Pflanze gilt als Fiebermittel.

Andropogon squarrosus L fil (A muricatus Retz) In Indien Namen Khurkhur, Bena Franz Vétiver Liefert aus der Wurzel Vetiveröl Das aromatische Rhizom und die Wurzel (Radix Anatheri, Radix Vetiveriae, Raiz cheirosa) ist ein stammlühndes und antiseptisches Arzneimittel Man macht daraus die gegenwärtig häufig käuflichen orientalischen Fächer

Andropogon laniger Desf Von Indien bis Nordafrika Man verwendet die ganze Pflanze (Herba Schoenanthi und Herba Juncei odorati) als Aromaticum und Diureticum (Foenum camolorum), das ätherische Oel enthält Phellandren

Andropogon odoratus Lisboa In Ostindien Liefert ätherisches Oel Dreht — 22° bis 28°, spec Gew 0,945—0,950

Ferner liefert ätherisches Oel **Andropogon fragrans (?)** von Réunion (Huile essentielle de Pataque Malgache)

Medicinische Verwendung finden ferner wegen des aromatischen Geruches und Geschmacks **Andropogon densiflorus Steud**, **A ceriferus Hack** **A. bicornis L**, **A virginicus L** **A spathiflorus Kth** **A minorum Kth** **A arundinaceus Scop**

Andropogon annulatus, in Asien, Afrika und Australien, soll eine Manna liefern, die 75 Proc Mannit enthält

Oleum Andropogonis citrati Lemongrassöl. Citronengrassöl. Indisches Verbenaöl. Essence de Lemongrass. Essence de Vervaine des Indes. Oil of Lemongrass. *Andropogon citratus DC*

Eigenschaften. Eine gelbe bis rothbraune Flüssigkeit von starkem Citronen oder Verbenaogeruch Spec Gew 0,899—0,903 Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 1°25' bis —3°5' Es löst sich in 2 bis 3 Theilen Spiritus dilutus klar auf

Prüfung. Lemongrassöl wird mit Petroleum und fettem Oel verfälscht Da diese Zusätze die Löslichkeit in Spiritus dilutus vermindern oder aufheben, so sind alle Oele, die in dem angegebenen Verhältniss sich nicht klar lösen, zu beanstanden

Bestandtheile. Besteht zu 70—85 Proc aus Citral $C_{10}H_{16}O$, demselben Aldehyd, der auch dem Citronenöl seinen charakteristischen Geruch verleiht Weitere Bestandtheile sind Methylheptenon $C_8H_{14}O$ und Geraniol $C_{10}H_{18}O$

Anwendung. Zu Parfümieren und Toiletteseifen

Oleum Andropogonis squarrosi. Vetiveröl. Iwarancusaöl. Essence de Vétiver. Oil of Vetiver.

Die Wurzel der in Indien und Birma sehr verbreiteten und neuerdings auf Réunion kultivirten Graminee *Andropogon squarrosus L fil* giebt bei der Destillation mit Wasser dämpfen ein äusserst schwer flüchtiges, dickflüssiges braunes Oel, das „Vetiveröl“ des Handels Es hat einen penetrianten, anhaftenden, myrrhenähnlichen Geruch Das spec Gew des in Europa aus indischer Wurzel destillirten Oels liegt zwischen 1,015 und 1,030 bei 15°C, die auf Réunion gewonnenen Oele sind leichter, und haben das spec Gew 0,982—0,998 bei 30°C Der Drehungswinkel (100 mm Rohr) = +23 bis +36° Vetiveröl löst sich in 1½ bis 2 Theilen 80proc Alkohol klar auf, an dieser Eigenschaft können mit Fett verfälschte Oele, die sich in diesem Lösungsmittel in keinem Verhältniss klar lösen, leicht erkannt werden

Vetiveröl wird feinen Parfümieren zugesetzt, bei denen es zum Verbinden und Fixiren der einzelnen Gerüche dient

Oleum Andropogonis Nardi **Oleum Citronellae.** Citronellaöl. Ostindisches Melissenöl Essence de Citronelle. Citronella oil. Wird in Sud Ceylon, sowie auf der

Halbinsel Malacca durch Destillation der oberirdischen Theile des Citronellgrases, *Andropogon Nardus L.*, gewonnen

Eigenschaften. Eine gelbe bis gelbbraune, bisweilen auch durch Kupfer grün gefärbte Flüssigkeit von angenehmem, eigenthümlichem, etwas süßlichem Geruch. Spec. Gew. 0,886—0,920. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) $-0^{\circ}30'$ bis -21° . Es löst sich in 1—2 Th. 80proc. Alkohol klar auf, nach weiterem Zusatz des Lösungsmittels wird die Mischung meist schwach getrübt.

Prüfung. Bei der Untersuchung ist besonders auf die häufigen Verfälschungen mit Petroleum oder fettem Oel (Cocosfett) zu achten. Oele, die derartige Zusätze enthalten, geben mit 10 Th. 80proc. Alkohol trübe Mischungen, aus denen sich beim Stehen in einem zugestopften Cylinder ölige Tropfen entweder an der Oberfläche (Petroleum) oder am Grunde (fettes Oel) abscheiden. Bei Gegenwart von Cocosfett erstarrt das Oel ganz oder theilweise im Kältegemisch oder bei Wintertemperatur.

Bestandtheile. Es besteht in der Hauptsache aus Geraniol $C_{10}H_{18}O$ (50—80 Proc.), Citronellal $C_{10}H_{16}O$ (10—15 Proc.) und Links-Camphen $C_{10}H_{18}$ (5—20 Proc.). In geringer Menge sind anwesend Links-Borneol $C_{10}H_{18}O$, Methylheptenon $C_8H_{14}O$, Dipenten $C_{10}H_{16}$, Methyl Eugenol $C_8H_8-C_2H_5-(OCH_3)_2$ und endlich Essigsäure und Valeriansäure (als Ester).

Verwendung. Zum Parfümiren billiger Toiletteseifen, besonders der sogenannten Honigseifen.

Oleum Andropogonis Schoenanthi. Palmarosaöl. Türkisches oder Indisches Geraniumöl (Rosaöl). **Oleum Palmarosae.** **Oleum Gerani Indicum.** **Oleum Graminis Indici.** **Essence de Gèranium des Indes.** **Oil of Palmarosa.** **Oil of Geranium East Indian.**

Das Palmarosaöl wird fälschlich als „türkisches Geraniumöl“ bezeichnet, weil es früher über Constantinopel in den europäischen Handel kam und einen den Geraniumölen (Destillat der Blätter verschiedener Geranium- oder Pelargoniumarten) ähnlichen Geruch besitzt. Es wird in ziemlich beträchtlichen Quantitäten in Indien in der Präsidentschaft Bombay durch Destillation von *Andropogon Schoenanthus L.* gewonnen.

Eigenschaften. Eine fast farblose oder gelbliche Flüssigkeit von angenehmem, rosenähnlichem Geruche. Spec. Gew. 0,888—0,896 bei $15^{\circ}C$. Optisch schwach rechts oder linksdrehend, und zwar schwankt der Drehungswinkel (100 mm-Rohr) zwischen $+1^{\circ}40'$ und $-1^{\circ}55'$. Mit 3 Th. Spiritus dilutus giebt das Oel eine klare Lösung. Verseifungszahl 20—40.

Prüfung. Da das Palmarosaöl häufig mit fettem Oel (Cocosfett), Mineralöl oder Terpentinol verfälscht wird, so ist auf Löslichkeit in 3 Th. Spiritus dilutus, und auf das richtige spec. Gew. zu achten.

Bestandtheile. Palmarosaöl besteht der Hauptmenge nach aus Geraniol $C_{10}H_{18}O$, das zum größten Theil frei, zum kleineren Theil als Ester der Essigsäure und Capronsäure in dem Oele enthalten ist. Von Terpenen ist nur Dipenten in geringer Menge, etwa 1 Proc., anwesend.

Anwendung. Palmarosaöl findet in der Parfümerie bei der Herstellung von Rosenseifen ausgedehnte Verwendung. In Bulgarien dient es zum Verfälschen des Rosenöls.

Gingergrasöl (of oben). Eine geringe Sorte Palmarosaöl, über deren Herkunft man nicht ganz im klaren ist, kommt von Indien aus unter dem Namen „Gingergrasöl“ in den Handel. Das Oel enthält meistens grosse Mengen Mineralöl (bis 60 Proc.) oder Terpentinol beigemischt.

Anethum.

Gattung der Umbelliferae — Apiodeae — Seselinae.

I Anethum graveolens L Dill Gurkenkraut. Heimisch in Indien, Persien, vielleicht auch Kaukasus und Aegypten, durch die Kultur weit verbreitet

Verwendung finden die Früchte *Fructus Anethi* (Brit Erganzb) *Semen Anethi hortensis*. *Semen capilli cynocephali*. Dillsamen. Bergkummel. *Fruct d'Aneth*. Dill frucht

Beschreibung. Sie sind 4–5 mm lang, 3 mm breit, im Umriss eiförmig, vom Rücken bei stark zusammengedrückt, kahl und glatt, meist in die Theilfrüchtchen zerfallen, jedes mit 5 Rippen, von denen die Randrippen stark vorragen, in jedem Thälchen ein Oelgang, auf der Fugenfläche 2 Geschmack gewürzhaft, scharf, charakteristisch

Bestandtheile 3–4 Proc ätherisches Oel Spec Gew 0,895–0,915 Dreht +75 bis 80° Enthalt Limonen, Carvon, besonders englisches Oel auch Phellandren Das aus Früchten des indischen **A Sowa D C**, das mit *A graveolens* identisch sein soll, gewonnene Oel enthält Limonen, Carvon und Dill-Apiol, es dreht +40°

Anwendung In England vielfach statt des Fenchels als blähungtreibendes Mittel, im allgemeinen dienen Frucht und Kraut mehr zu Küchenzwecken, zum Einlegen der Gurken etc

Aqua Anethi Dillwasser Dill Water 1) Brit Dillsamen, gequetscht 10 Th, Wasser 200 Th, man destillirt 100 Th ab In den brit Kolonien darf das Dillwasser durch Verreiben des ätherischen Dillöls mit Calciumphosphat, Schütteln mit dest Wasser und Filtriren bereitet werden — 2) (n Diet) Dillöl 10 Tropfen schüttelt man mit heissem dest Wasser 1000 Th und filtrirt nach dem Erkalten

II Oleum Anethi Dillöl Essence d'Aneth Oil of Dill (Brit)

Die zerkleinerten Dillfrüchte geben bei der Wasserdampfdestillation 3–4 Proc ätherisches Oel

Ein farbloses, später gelb werdendes, ziemlich dünnflüssiges Oel Der Geruch ist dem des Kummels ähnlich, aber doch wieder deutlich davon verschieden Der Geschmack ist zuerst süsslich, später scharf und brennend Spec Gew 0,895–0,915 (Brit 0,905–0,920) — Drehungswinkel (100 mm Rohr) +75 bis +80° Das Oel löst sich in 5–8 Th 80proc Alkohols

Dillöl enthält 40–60 Proc Rechts Carvon $C_{10}H_{16}O$ (Carvol), 40–60 Proc Rechts-Limonen $C_{10}H_{16}$ und wechselnde Mengen Phellandrien $C_{10}H_{16}$ Dieses Terpen ist reichlicher im spanischen und englischen als im deutschen Dillöl vorhanden Anwendung In der Liqueurfabrikation

Ostindisches Dillöl. Der ostindische Dill, der von einigen Botanikern als besondere Species *Anethum Sowa D C* unterschieden wird, enthält ein von dem europäischen Dillöl verschiedenes Oel Sein spec Gew liegt zwischen 0,949 und 0,970, sein Drehungswinkel (100 mm Rohr) zwischen +41 und +43° Es enthält ausser Limonen und Carvon einen dem Apol aus Peterahöl isomeren Körper, das Dillapiol $C_{12}H_{14}O_4$ Dillapiol ist eine dicke ölige bei 285° C siedende Flüssigkeit

Angelica.

Gattung der Umbelliferae — Apiodeae — Angelicinae.

Angelica Archangelica L Heimisch in Nordeuropa und Sibirien Verwendung findet die Wurzel und die Früchte

1) Die Wurzel *Radix Angelicae* (Germ, Helv, Austr) *Radix Archangelicae*. *Radix Angelicae hortensis* Angelikawurzel Brustwurzel. Engelwurzel Heiligengeistwurzel Dieureinigkeitswurzel. Theriakwurzel Geilwurzel. Giftwurz. Gölk. Glickenwurzel. Luftwurzel. Racine d'angelique (Gall) Angelica root.

Beschreibung. Die Droge besteht aus dem kurzen, bis 5 cm dicken, von Blattnarben geringelten Wurzelstock, von dem zahlreiche, bis 1 cm dicke, bis 30 cm lange Wurzeln entspringen, die oft zopfartig zusammengedreht sind. Sie sind langsfurchtig, hockerig. Die Droge ist von rothbrauner bis graubrauner Farbe, sie schneidet sich weich und bricht, wenn trocken, glatt. Der Querschnitt ist unter der Lupe deutlich radial gestreift, er lässt den gelb oder graugefärbten Holzkörper erkennen, der in der Wurzel etwa so stark wie die Rinde, in dem Wurzelstock viel stärker ist. In der Rinde erkennt man schizogene Sekretbehälter mit gelbröthlichem Inhalt. Der Durchmesser derselben, der bis 200 μ beträgt, ist geeignet, die Droge auch in kleinen Bruchstücken von den Wurzeln anderer Umbelliferen (s. d.) zu unterscheiden. Geruch und Geschmack angenehm aromatisch.

Bestandtheile. 0,85—1,0 Proc (frische Wurzel 0,2—0,4 Proc) ätherisches Oel, ferner 6 Proc Harz, 0,5 Proc Angelicasäure, Hydrocarotin (Angelicin), Baldrian säure, Essigsäure etc.

Verwechslungen und Verfälschungen. Die Wurzeln der andern offic. Umbelliferen sind durch den abweichenden Geruch und Geschmack, sowie die Weite der Sekretbehälter (s. a. a. O.) leicht zu unterscheiden. — Die Wurzel der wilden *Angelica silvestris* L. (in Italien als Radice di Brocula gegen Kiatzo) ist kleiner, holziger und von weniger angenehmem Geruch und Geschmack. — Aehnlich verwendet man in Japan *Angelica anomala* A. Lall und *A. refracta* A. Schmidt, in Nordamerika *A. atropurpurea* L. und *A. lucida* L. (Belly-ach Root), in Unteritalien *A. nemorosa* Ten.

Einsammlung. Im Frühjahr von der 2jährigen Pflanze 5 Th frische Wurzel geben 1 Th trockene.

Aufbewahrung ¹⁾ Bei gelinder Wärme, besser über Aetzkalk, nachgetrocknet in dicht geschlossenen Blechbüchsen. Da die Angelikawurzel in ganz besonders hohem Maasse den Angriffen von Käfern und ihren Larven (*Ptinus*, *Anobium*, *Anthrenus*) ausgesetzt ist, so ist für sehr sorgfältiges Trocknen und Aufbewahrung in gut verschlossenen Gefäßen besondere Sorge zu tragen.

Anwendung. Aromatisches Stimulans und Stomachicum, selten zu Latwergen, Bädern, Kräuterkissen, häufiger als magenstärkendes Hausmittel. Wurzel, Blätter, Samen und Tinktur gehören mit zu den Heilmitteln Pfarrer Kneipps.

2) Die Frucht *Fructus Angelicae* Semen *Angelicae*. Fruit d'Angélique (Gall.)

Beschreibung. Eiförmig, vom Rücken zusammengepresst, mit dicken, stumpfen Rückenrippen, stark hervortretenden Randrippen, bei der Reife die äusseren Theile der Fruchtschale ohne die Oelströmen sich ablosend, so dass also diese mit der Samenschale veremigt bleiben (charakteristisch).

Bestandtheile. 1,0—1,2 Proc ätherisches Oel. Von noch angenehmerem Geruch wie das der Wurzel.

Spiritus Angelicae compositus (Germ.), *Sp. theriacalis*. Zusammengesetzter Engelwurzspritus, Angelikaspitus, Jerusalem Sp., Kräuterspritus, Theriakgeist. — *Alcoolat de theriac composé*, *Esprit theriacal*. — Spirit of treacle. — Angelikawurzel 16 Th, Baldrianwurzel 4 Th, beide mittelfein zerschnitten, Wacholderbeeren, gequetscht 4 Th lässt man mit Weingeist 75 Th, Wasser 125 Th 24 Stunden stehen, destillirt 100 Th ab und löst darin Kampher 2 Th klar, farblos, spec Gew 0,890—0,900. Trübt sich bisweilen in der Kälte. Ansetzen mit Weingeist und Uebertreiben mittels Dampf liefert ein kräftigeres Destillat.

Spiritus Angelicae compositus ex tempore paratus. Angelikawurzelöl 6 Tropfen, Wacholderbeeröl, Baldrianöl je 2 Tropfen, Kamphergeist 17,5 g, verdünnter Weingeist 82,5 g.

Tinctura Angelicae, wird aus fein zerschnittener Angelikawurzel 1 Th und verdünntem Weingeist 5 Th bereitet.

¹⁾ Zur Aufbewahrung riechender Pflanzenstoffe sind Riechkanister, auf die man über einer runden, etwa 15 cm weiten Oeffnung einen Rand mit dicht schliessendem Griffdeckel auflöthen lässt, die billigsten und zweckmässigsten Vorrathsgefässe.

Tinctura bezoardica, Ludwig's Bezoartropfen Opium, Safran je 5 Th, Myrrhe, Angelikawurzel, Eberwurzel, Alantwurzel, Diptamwurzel je 20 Th, verdünnter Weingeist 1000 Th

Tinctura alexipharmaca STAHL. Angelikawurzel, Meisterwurzel, Eberwurzel, Schwalbenwurzel, Bibernelnwurzel, Alantwurzel je 7,5 g, verdünnter Weingeist 210 g oder q s zu 200 g Tinktur

Rothlauffinktur HAUCK, ist ein weingeistiger Auszug aus Angelika- und Arnikawurzel

SCHAUER'scher Balsam ist ein Gemisch aus Spirit Angelicae comp und Spirit balsam Fioraventi

Balsamum divinum, B digestivum (Diet) Baume du chevalier Laborde, Baume Fourcroy Lärchenterpentin 200 g, Olivenöl 800 g mischt man unter Erwärmen, setzt hinzu Benzoe, Weihrauch, rohen Storax je 10 g, Safrantinktur 25 g, Aloetinktur 100 g, entwässertes Natriumsulfat 50 g, erwärmt 1 Stunde im Dampfbad unter Umrühren, lässt absetzen, seigt durch oder filtrirt und fügt hinzu Angelikaoöl 0,2 g, Wacholderbeeröl 0,5 g

Potsdamer Balsam, Parfum aromatique balsamique Eine Mischung aus Spirit Angelicae comp, Tinct Calami aa 5,0, Mixtura oleoso-balsam 70,0, Liq Ammon caust 3,0

Eau dentifrice de Prodhomme. Ein Destillat aus Angelika, Anis, Zimmt Muskat nuss, Nelken, Pfefferminzöl, mit Chinarinde, Ratanhia, Tolubalsam, Vanille und Cochenille zur Tinktur gemacht

Nervosin, versilberte Pillen, bestehend aus Extr Valerian, Angelic, Chenopod, Ol Angelic, Valerian, Fol Aurant

Alter-Schwede, Angelikalikör, Angelica-Ratafia sind aus Angelikakraut und Bitterstoffen bereite Lüköre

Liqueur de la Grande Chartreuse, Elixir végétal d 1 Gr Ch Ein Destillat aus Melisse, Pfefferminze, Angelika, Zimmt, Safran, Macis, Citrone und verd Weingeist, worin Zucker aufgelöst ist

Universal Kräuteressenz von Fr Dietze Ein bitterer Schnaps aus Angelika, Wermuth etc

Universal-Magenbitter von Dr ROBACK besteht hauptsächlich aus Angelika und Enzian

Vespetro, Rosolia d'Angelica, ein Lükör aus Angelika, Koriander, Anis, Fenchel

Oleum Angelicae radices Angelikawurzelöl. Essence de la racine d'Angelique. Oil of Angelica root

Trockne Angelikawurzel giebt bei der Destillation 0,35—1 Proc, frische Wurzel nur 0,2—0,4 Proc Oel Das Oel der frischen Wurzel gilt als das feinere

Das Oel ist eine anfangs farblose, später bräunlich werdende Flüssigkeit, von sehr aromatischem, pfefferähnlichem, etwas an Moschus erinnerndem Geruch, und gewürzhaftem Geschmack Specif Gew 0,857—0,910 (Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 16° bis + 32°

Das Angelikawurzelöl enthält Rechts-Phellandren und andere Terpene (vielleicht Pinen, sowie Cymol $C_{10}H_{14}$) und Sesquiterpene Die wichtigsten Bestandtheile sind Ester zweier Säuren, der als Methyläthyllessigsäure bekannten Valeriansäure, und der Oxypentadecylsäure $C_{15}H_{30}O_8$ Die alkoholischen Komponenten dieser Ester sind unbekannt

Oleum Angelicae fructus Angelikasamenöl. Essence de la semence d'Angelique. Oil of Angelica fruit

Ist in den Angelikafrüchten zu 1—1,2 Proc enthalten Das durch Wasserdampfdestillation gewonnene Oel ist in allen seinen Eigenschaften, besonders im Geruch und Geschmack, dem Wurzelöl sehr ähnlich Spec Gew 0,856—0,890 Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 11° bis + 12° Es enthält Phellandren und andere nicht näher definierte Terpene Von sauerstoffhaltigen Körpern sind Methyläthyllessigsäure und Oxymyristinsäure nachgewiesen worden

Das aus frischem Angelikakraut destillierte Oel ist von dem aus der Wurzel oder den Früchten gewonnenen kaum zu unterscheiden Spec Gew 0,870—0,890 Drehungswinkel (100 mm Rohr) + 8° bis + 21°

Alle drei Angelikable werden in der Liqueurfabrikation besonders zur Darstellung von Chartreuse verwendet.

Angostura.

Cortex Angosturae. Cortex Cuspariae (Brit) Quina de Caroni. Angostura-rinde Caroni-Rinde Angostura vine (Gall) Angostura bark Cascarilla de Angostura Ist die Rinde der zu den Rutaceae — Cuspariacee gehörigen *Cusparia trifoliata* H B, vielleicht auch der *Cusparia officinalis* Hancock in Venezuela

Beschreibung. Flache oder rinnenförmige, bis 2 mm dicke, harte und spröde Stücke, mit einem leicht abreibbaren, weichen, grünlichen oder gelbbraunen Kork bedeckt, an der Innenseite gelblich oder rötlich, Bruch aussen körnig, innen blätterig Querschnitt orangegelb oder bräunlich, die rotbraunen, nach aussen sich verschmälernden und mit den helleren Markstrahlen abwechselnden Baststrahlen, ausserdem helle Punkte erkennen lassend

Zellen des Korkes zartwandig, oder (nur an der Innenseite oder ganz) verdickt In der Mittelrinde in zahlreichen Zellen Bündel von Oxalatnadeln, ferner lysogene Harzräume Steinzellen spärlich In den äusseren Parthien des Bastes, selten in weiter nach innen gelegenen tangentialen Gruppen stark verdickter, knorriger Fasern Ferner im Bast dieselben Harzräume, Oxalatnadeln, aber ausserdem auch grosse prismatische Einzelkrystalle Markstrahlen 2-, selten 3reihig, zuweilen lokal erweitert und dann mit Harzräumen Von gewürzhaft bitterem Geschmack

Bestandtheile. 4 Alkaloide, zum grössten Theile im freien Zustand *Cusparin* $C_{20}H_{19}NO_3$, *Cusparidin* $C_{19}H_{17}NO_3$, *Gahpin* $C_{20}H_{21}NO_3$, *Gahpidin*, ferner ein Bitterstoff *Angosturin* ($C_{20}H_{19}O_6$) α , ein nicht genauer studirtes *Glykosid*, und $1\frac{1}{2}$ Proc ätherisches Oel

Anwendung Als bitter-aromatisches Mittel bei dyspeptischen Zuständen, Dysenterie, auch an Stelle der Chinarinde Grosse Dosen rufen Uebelkeit und Erbrechen hervor (Dosis 0,5—1,0 mehrmals täglich)

Verwechselungen und Verfälschungen Zu Anfang dieses Jahrhunderts kam an Stelle der Angostura die giftige Rinde von *Strychnos nux vomica* in den Handel, wodurch viele Vergiftungen hervorgerufen wurden Auch gegenwärtig befinden sich im Handel falsche Angosturarinden in reicher Menge Mindestens in einer derselben ist ein Alkaloid gefunden, das charakteristische Reaktionen ganz ähnlich dem Strychnin giebt Die ärztliche Verwendung der Droge ist unbedeutend, dagegen wird sie vielfach zur Herstellung bitterer Liqueure benutzt Es ist sehr sorgfältig darauf zu achten, dass nur Rinde verwendet wird, die den oben beschriebenen charakteristischen Bau zeigt, und da die letztgenannte Benutzung meist von Nichtsachverständigen geschieht, so sollte man von ihrer Verwendung lieber überhaupt Abstand nehmen, da an bitter-aromatischen Rinden kein Mangel ist

Tinctura Angosturae, Rinde 1 Th, verd Weingeist 5 Th

Sirupus Angosturae compositus Infusi Angosturae concentrati 50, Sacchar 90, Sirupi opiani 60

Electuarium antidyentericum WILKINSON Angosturarinde 30 Th, Zimmt 3 Th, Homg q s

Rothlaufftinktur, **LEBERRECHT**, von H MÜSCHKE, ist ein Auszug von Angosturarinde und Blauholz

Magenwein. (Buchh) Angosturaessenz 30 Th, Kirschenup 120 Th, Rothwein 850 Th

Angostura-Bitter. Angosturarinde 125 g, Chinarinde, Orangeschale je 60 g, Galgant, Zimmtblüthe, Sandelholz, Zimmt je 40 g, Kardamomen 15 g, Enzian 10 g, Nelken 3 g, zieht man mit Weingeist und Rum je $4\frac{1}{2}$ l aus, löst im Filtrat Zucker 1000 g und fügt hinzu Waldmeisteressenz 40 g

Angostura Essenz (Buchh) Aus Angosturarinde, Enzian je 50 g, Kardamomen 30 g, Macis, Nelken, Piment, Zimmt, rothem Sandelholz je 25 g und 50 proc Weingeist bereitet man 1 l

Oleum Angosturae. Angosturarindenöl Die Angosturarinde enthält 1,5 bis 1,9 Proc eines anfangs hellgelben, später nachdunkelnden Oels von aromatischem, wenig ausgesprochenem Geruch und Geschmack Spec Gew 0,93—0,96 Drehungswinkel (100 mm Rohr

—36 bis —50° Nach den Untersuchungen von Beckurts und Tropea enthält das Angosturarindenöl kleine Mengen eines von 155—162° C siedenden Terpens (wahrscheinlich Pinen). Ferner sind Cadinen $C_{15}H_{24}$ und noch ein zweites nicht schärf charakterisiertes Sesquiterpen, Galipen, sowie 13—14 Proc des Sesquiterpenalkohols Galipol $C_{15}H_{26}OH$ anwesend.

Praktische Verwendung hat das Angosturarindenöl bisher nicht gefunden.

Anhalonium.

Anhalonium Lewinii Hennings Cactaceae — Cereolideae Diese Art und noch einige andere dienen den Indianern Mexikos und der südlichen Vereinigten Staaten unter dem Namen Pellote als Berausungsmittel bei religiösen Festen, werden aber auch als Heilmittel verwendet.

Bestandtheile Enthält in einer Gesamtmenge von ungefähr 5 Proc folgende Alkaloide *Anhalonnin* $C_{12}H_{15}NO_3$, krystallinisch, Schmelzpunkt 85,5° C *Mescalin* $C_8H_9(OCH_3)_2NOH$, krystallinisch, Schmelzpunkt 151° C *Anhalonidin* $C_{10}H_9NO(OCH_3)_2$, isomer mit dem ersten, Schmelzpunkt 160° C *Lophophorin* $C_{13}H_{17}NO_3$.

Botanisch von der genannten Art nicht zu unterscheiden ist das **Anhalonium Williamsi Lem.**, das 0,9 Proc eines anderen Alkaloids, *Pellotnin* $C_{10}H_9(OCH_3)_2OH \cdot NOH$, enthält, welches schlafmachend wirkt.

Ferner sind von Hefter mehr oder weniger energisch wirkende Alkaloide aufgefunden in *A. fissuratum* Engelm., *A. prismaticum* Lem., *A. Jourdanianum* (wahrscheinlich nur Varietät von *A. Williamsi*), *A. Visnagra* (angeblich identisch mit *Mammillaria cirrhifera* Mart.) und in anderen Cactaceen. Ueber die medicinische Verwerthung dieser interessanten Entdeckungen herrscht noch wenig Sicherheit, jedenfalls ist aber die Thatsache ausserordentlich bemerkenswerth, dass die Cactaceen nicht, wie man bisher annahm, physiologisch indifferent sind, sondern stark giftige Pflanzen enthalten.

Anilinum.

I † Anilinum (Ergänzb.) Anilin. Phenylamin. Krystallin. $C_6H_5NH_2$. Mol. Gew. = 93. Wird in chemischen Fabriken (Farben-Fabriken) durch Reduktion von Nitrobenzol mittels nascenten Wasserstoffs (aus Eisen oder Zink und Salzsäure) gewonnen. Man erhält so zunächst das salzsaure Salz und scheidet aus diesem die freie Base durch Destillation mit Kalkmilch im Wasserdampfströme ab. Je nachdem das zur Herstellung des Nitrobenzols verwendete Benzol rein oder toluolhaltig war, ist das erzeugte Anilin rein oder es enthält (o- u p) Toluidin.

Handelssorten. Man unterscheidet im Handel folgende Sorten: 1) Völlig reines Anilin der Preislisten, die theuerste Sorte. 2) Anilin für Blau, aus fast reinem Anilin bestehend. 3) Anilin für Roth, Gemisch aus nahezu gleichen Theilen Anilin, Ortho-Toluidin und Para-Toluidin. 4) Anilin für Safranin ist ähnlich dem Anilin für Roth zusammengesetzt, doch enthält es mehr Ortho-Toluidin als dieses. 5) Flüssiges Toluidin, Gemisch von Ortho- und Para-Toluidin, enthält nur wenig Anilin. — Von diesen Sorten ist das völlig reine Anilin sub 1) natürlich für alle pharmaceutischen Zwecke verwendbar. Indessen ist man nicht an diese Sorte allein gebunden, es genügt vielmehr für alle in der Pharmacie in Betracht kommenden Zwecke das „Anilin für Blau“.

Es ist zu empfehlen, das Präparat, wie es aus den Farbenfabriken bezogen wird, zu rektifizieren.

Rektifikation Den Kolben *a*, welcher mit einem als Luftkühler dienenden Glasrohr von etwa 70 cm Länge und 1 cm lichter Weite verbunden ist, füllt man zu etwa $\frac{2}{3}$ seines

Fassungsraumes mit „Anilin für Blau“ an, und trägt — um das Stossen zu vermindern — eine Messerspitze „Talcum venetum“ ein. Als Vorlage legt man einen nicht zu dickwandigen Kolben vor, welcher auf einen Strohkrantz *c* gelegt wird. Man erhitzt nun (Flamme in der Hand halten! Unter den Kolben eine geräumige Porcellanschale stellen!) den Kolbeninhalt. Zunächst entweichen Wasserdämpfe, welche sich in dem Kolbenhalse condensiren und, wenn sie (unter knatterndem Geräusch) an der Glaswandung hinuntergleiten, ein Springen des Kolbens zur Folge haben können. Um das zu vermeiden, setzt man, sobald sich Wassertropfen zeigen, die Flamme zur Seite, lüftet den Stopfen und saugt mit einem Glasstabe, welcher mit Filtrirpapier umwickelt ist, diese Tropfen auf. Nachdem der Stopfen wieder aufgesetzt ist, wird weiter erhitzt und dieses Auswischen, wenn nöthig, wiederholt. Sobald das Wasser entfernt ist, kann alle Gefahr als beseitigt angesehen werden. Das Thermometer steigt nun bei weiterem Erhitzen sehr bald und bei 182° C. destillirt das Anilin über. Man destillirt in einem ruhigen Tempo (so dass nicht viele Anilin-Dämpfe unkondensirt entweichen) bis auf einen kleinen Rest ab. Das Thermometer zeigt gegen das Ende der Destillation in der Regel $184\text{--}185^{\circ}$ C. (Einige beseitigen das Wasser durch Maceration des Anilins mit metallischem Natrium, indessen wollen wir dieses nur dem empfehlen, der mit Natrium umzugehen versteht.) — Man füllt das Destillat sogleich in trockene, dunkle Flaschen ab.





Fig. 76.

Eigenschaften. Frisch destillirt eine farblose, stark lichtbrechende, ölige, eigenthümlich riechende, brennend schmeckende Flüssigkeit, welche sich durch Einwirkung von Luft und Licht bald braun färbt. Wird in einer Kältemischung fest und schmilzt dann bei -8° C. Siedepunkt 182° C.; mit Wasserdämpfen ziemlich leicht flüchtig. Spec. Gew. = 1,0265 bei 15° C. Löslich in 30 Th. Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether, Kohlenwasserstoffen. Selbst ein gutes Lösungsmittel für Indigoblau, Anilinblau, Kampfer, Kolophonum, Schwefel, Phosphor, nicht aber für Kautschuk und Kopal. Der Dampf ist entzündlich und verbrennt mit russender Flamme.



Chemisch ist es eine wohlcharakterisirte Base, bildet also mit Säuren Salze, doch bläut es an sich weder in Substanz, noch in wässriger Lösung den Lackmusfarbstoff, dagegen wandelt es den Dahliafarbstoff in Grün um. Es treibt in der Hitze das Ammoniak aus seinen Salzen aus, umgekehrt werden in der Kälte Anilinsalze durch Ammoniak zersetzt.

Reaktionen. Man erkennt das freie Anilin an seinem eigenthümlichen Geruche, am Siedepunkte und specifischen Gewichte, davon abgesehen an folgenden Reaktionen: 1) Giebt man zu 3ccm Anilin etwa 8g zerriebenes Mercurichlorid und erwärmt die Mischung unter gelegentlichem Umschütteln, so bildet sich ein rothvioletter Farbstoff (Violanilin), der in Weingeist löslich ist. 2) Die wässrige Lösung des Anilins wird durch vorsichtigen Zusatz von Chlorkalklösung violett gefärbt; die Färbung geht in schmutzig roth über. Noch erkennbar in Lösungen 1:250 000. 3) Die mit einem Ueberschuss von verdünnter Schwefelsäure bereitete wässrige Lösung giebt auf Zusatz von Kaliumdichromat zuerst einen dunkelgrünen Niederschlag, der auf weiteren Zusatz von Kaliumdichromat schwarz (Anilinschwarz) wird. 4) Die schwefelsaure Lösung färbt Holzstoff kanariengelb.

Prüfung. Für die Reinheit des Anilins ist besonders der Siedepunkt von Wichtigkeit. Ferner: 1) Es löse sich im 2fachen Volumen Salzsäure zu einer klaren Flüssigkeit.

sigkeit, welche auch nach dem Verdünnen mit dem gleichen Volumen Wasser und nach dem Erkalten nicht getruht erscheinen darf (Kohlenwasserstoffe, Nitrobenzol würden sich als Tropfchen abscheiden und konnten der sauren Lösung durch Ausschütteln mit Aether entzogen werden) 2) Eine etwaige Verunreinigung durch Toluol, welches gegen 200° C siedet, wird durch fraktionierte Destillation festgestellt

Aufbewahrung Vor Licht geschützt, vorsichtig, in möglichst angefüllten, nicht zu grossen Gefässen Wenn das Anilin durch Lichteinwirkung braun geworden ist, kann man es durch Rektifikation wieder in den farblosen Zustand zurück verwandeln

Anwendung Arzneilich findet es nicht Verwendung Die freie Base (auch als Dampf eingeathmet) wirkt giftig Leichte (chronische) Vergiftungen charakterisiren sich durch einen der Trunkenheit ähnlichen Zustand, Appetitlosigkeit, Cyanose Als Gegenmittel werden salinische Abführmittel, z B Bittersalz, Karlsbader Salz angewendet, nicht aber Alkohol Grössere Gaben von 10–20 g, innerlich genommen, führen zur akuten Vergiftung, welche häufig tödtlich verläuft In erster Linie wird das Athemcentrum beeinträchtigt Die Symptome weisen auf ein Nerven- und Blutgift hin In der Mikroskopie zum Aufhellen der Präparate, als Anilinwasser bei der Färbung von Bakterien benutzt In der organischen Chemie zur Herstellung zahlreicher Präparate, z B des Acetanilids und vieler sog „Anilinfarben“ Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als ein Salz der Paraamidophenylschwefelsäure Höchstgaben *pro dosi* 0,2 g, *pro die* 0,4 g (Ergänzb)

Anilinwasser a) Nach EHRLICH 5 ccm Anilin werden mit 100 ccm Wasser geschüttelt und die Flüssigkeit nach 5 Minuten langem Stehen durch ein angefeuchtetes Filter filtrirt b) Nach FRAENKEL Man löst 3 ccm Anilin in 7 ccm Weingeist und setzt 90 ccm destillirtes Wasser hinzu Zur Bakterien-Färbung

II † Anilinum hydrochloricum Anilinchlorhydrat Salzsäures Anilin. $C_6H_5NH_2 \cdot HCl$. Mol. Gew. = 129,5 Schlechthin „Anilinsalz“.

Zur Darstellung mischt man 100 Th frisch destillirtes (farbloses) Anilin mit 160 Th reiner Salzsäure (von 1,123 spec Gew d i 25 Proc) Die Lösung scheidet beim Erkalten Krystalle ab Man saugt diese ab und gewinnt weitere Mengen durch Eindampfen der Mutterlauge [Bei Verwendung chlorhaltiger Salzsäure entstehen schwarze Nebenprodukte durch Oxydation des Anilins]

Farblose oder schwach röthliche Nadeln oder Blättchen, in Wasser und in Alkohol leicht löslich, Schmelzp 192° C Aus der wässrigen Lösung wird durch Natronlauge freies Anilin abgeschieden Ausgangsmaterial für zahlreiche chemische Präparate, z B Anilin schwarz, Azo-Farbstoffe Vor Licht geschützt vorsichtig aufzubewahren!

Schwarze Stempelfarbe für Wäsche Man bereitet zwei Lösungen, welche getrennt in dunklen Gefässen aufbewahrt werden I Krystallinres Kupferchlorid 8,52, Chlorsäures Natrium (NaO_2Cl) 10,65, Ammoniumchlorid 5,85, Wasser 60,0 II Salzsäures Anilin 30,0, Wasser 30,0, Gummischleim 20,0, Glycerin 10,0 Man mischt je gleiche Theile von Lösung I und II kurz vor dem Gebrauche Die mit dieser Mischung hergestellten Schriftzeichen sind ursprünglich blassgrün, werden aber beim Liegen an der Luft, rascher beim Dämpfen (Ueberfahren mit einem warmen Bügeleisen) schwarz

III † Anilinum nitricum Anilinnitrat Salpetersäures Anilin. $C_6H_5NH_2 \cdot HNO_3$. Mol Gew. = 156.

Man vermischt 93 Th Anilin mit 252 Th reiner Salpetersäure von 25 Proc (spec Gew 1,153) Die nach dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle werden abgesaugt Die Mutterlauge liefert durch Eindunsten weitere Krystalle Farblose oder schwachröthliche, in Wasser lösliche Krystalle Vor Licht geschützt, vorsichtig aufzubewahren

IV † Anilinum sulfuricum (Ergänzb) Anilinsulfat. Schwefelsäures Anilin. $(C_6H_5NH_2)_2 \cdot H_2SO_4$. Mol Gew. = 284

Darstellung Eine Lösung von 100 Th farblosem Anilin in 600 Th Weingeist versetzt man unter Umrühren mit einem in der Kälte frisch bereiteten und völlig erkalteten Gemisch aus 55 Th reiner conc Schwefelsäure und 150 Th Weingeist Man stellt einige Stunden an einem dunklen Orte zur Seite und rührt zu der erkalteten Flüssigkeit 400 Th Aether Den ausgefallenen Krystallbrei sammelt man in einem Trichter,

verdrängt die Mutterlauge durch Aether und trocknet die Krystalle bei Lufttemperatur an einem dunklen Orte auf porösen Tellern Ausbeute etwa 140 Th Man benutze beim Filtriren nur holzstoffreies Filterpapier, andernfalls filtrire man durch Asbest oder Glaswolle

Eigenschaften Farblose, an der Luft rothlich werdende, geruchlose, brennend salzig schmeckende, glänzende Blättchen oder Nadeln, in Wasser und verdünntem Weingeist leicht, weniger in starkem Weingeist löslich, in Aether fast unlöslich

Die wässrige Lösung wird durch Chlorkalklösung violett, später schmutzgröth gefärbt Durch Natronlauge wird Anilin in öligen Tropfen abgeschieden, durch Baryumnitratlösung entsteht Fällung von Baryumsulfat Die wässrige Lösung färbt Holzstoff gelb Vor Licht geschützt, vorsichtig aufzubewahren

Anwendung. Früher in Gaben von 0,05–0,12 g zwei- bis dreimal täglich gegen Epilepsie und Chorea empfohlen, aber nicht bewährt Neuerdings von FAY als Krebsmittel ersten Ranges, als Analgeticum, welches Morphin und Opium übertrifft, sowie als Desodorans empfohlen Man beginnt mit 0,05 g zweimal täglich und steigt auf 0,4 g zweimal täglich In der Regel färben sich nach 2–3 Stunden Fingernagel und Lippen blau, auch tritt Athemnoth und Schwindel ein Höchstgaben *pro dosi* 0,2 g, *pro die* 0,4 g (Erganzb.)

Rp Anilini sulfurici 2,0, Saccharum 0,2, Spiritus 70,0, Aquae destillatae 80,0 Taglich einen Kaffeelöffel voll, allmählich steigend bis zu 3 Esslöffel FAY

† **Bromamidum** Bromamid Bromwasserstoffsäures Tribromanilin $C_6H_4Br_3NH_2$ HBr = 411 Zur Darstellung wird Nitro Tribrombenzol mit Zinn und Schwefelsäure reducirt, das Reduktionsprodukt durch Schwefelwasserstoff vom Zinn befreit und an Bromwasserstoff gebunden

Farblose, geruchlose und geschmacklose Nadeln, Schmelzp 117° C Unlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol Löslich in 16 Th siedendem Alkohol, leicht löslich in Aether und in Chloroform Vorsichtig aufzubewahren

Als Antineuralgicum und Analgeticum Dosis 0,75–1,00 für Erwachsene, 0,05–0,2 für Kinder

Anisum.

I Fructus Anisi (Germ Helv Austr Brit U-St) **Semen Anisi.** **Semen Anisi vulgaris** **Semen Absinthii dulcis** **Anis** **Brotsamen.** **Gemeiner Anis.** **Süsser Kummel.** **Anis vert** (Gall.) **Anise fruit**

Beschreibung Die Spaltfrucht der zu den Umbelliferae — Apioidae — Ammineae gehörigen **Pimpinella Anisum L.**, wild nicht mehr nachzuweisen, ursprünglich wahrscheinlich im östlichen Mittelmeergebiet heimisch, reichlich kultivirt

Die in der Droge fast immer noch zusammenhängenden Theilfrüchtchen sind verkehrt kugelförmig, von den Seiten wenig zusammengedrückt, oben mit dem Stempelpolster und den vertrockneten Griffeln versehen Länge 3–6 mm Deutscher und russischer Anis besteht aus kurzen, dunkelgefärbteren, italienischer aus längeren, schlankeren, helleren Früchten (Fig 77) Dicke durchschnittlich 2 mm Aussen mit kurzen, meist nur einzelligen, warzigen, gekrümmten Härchen bedeckt Rippen wenig hervortretend Im Querschnitt das Endosperm an der Fugenfläche eingebuchtet Oelgänge zahlreich, nicht auf die Theilchen und die Fugenfläche beschränkt (Fig 78) Die grosse Zahl (bis 80) denselben und die Haare (Fig 79) sind besonders charakteristisch für den Anis Letztere sind auch im feinen Pulver leicht aufzufinden In den Aleuronkornern des Endosperms wie auch sonst bei den Umbelliferen grosse Globoide und Oxalatdrüsen Geruch und Geschmack angenehm süss aromatisch

Bestandtheile. 1,5–6,0 Proc ätherisches Oel (s unten) (Deutscher 2,4 Proc, russischer 2,4–3,2 Proc, italienischer 2,7–3,5 Proc, syrischer 1,5–6,0 Proc) Ferner über 9 Proc Fett, 4,27 Proc Zucker, 5–6 Proc Asche




Fig 77

- 1 Italienischer od spanischer
- 2 Deutscher oder russischer Anis

Verfälschungen und Verunreinigungen. Der Anis ist meist mit Bruchstücken der Doldenstrahlen verunreinigt. Als Verfälschungen kommen häufig vor bis 30 Proc. thonhaltiger, von Regenwürmern herführender Erdklumpchen, die man in Mähren zu diesem Zweck sammeln soll. Die Bestimmung des Aschengehaltes giebt darüber Aufschluss. Man kann den Anis auch in Chloroform eintragen, wobei die erdigen Beimengungen zu Boden sinken. Ferner mengt man dem Anis solchen bei, dem das ätherische Oel entzogen, und der daher geschmacklos ist.




Fig. 78. Querschnitt durch Anis.

aus, macht die filtrirte wässrige Lösung alkalisch und schüttelt wieder mit Aether aus. Bei Anwesenheit von Coniin giebt der Verdunstungsrückstand des Aethers den charakteristischen Geruch nach Mäuse-Urin.

Anwendung. Als Stimulans und Carminativum bei Kolik, Blähungen, als Expectorans, als die Milchsekretion beförderndes Mittel, endlich als Geschmackskorrigens.

Aufbewahrung. Möglichst nicht über 1 Jahr; das feine Pulver (Sieb VI Helvet.) nur in kleinen Mengen.

Oleum Anisi (Germ. Helv. Austr. Brit.¹⁾ U-St.), **Anisöl.** Huile d'Anis vert (Gall.). **Essence d'Anis.** Oil of Anise.



Fig. 79. Maare der Anisfrucht.

Gewinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Anisfrüchte werden durchschnittlich 2,5–3 Proc. Anisöl erhalten; kleinere oder grössere Ausbeuten sind selten. Bei der Destillation darf nicht zu stark gekühlt werden, weil das Oel sonst im Kühler erstarrt und diesen verstopft.

Eigenschaften. Anisöl ist bei 20° C. eine farblose oder gelbliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit von Anisgeruch und intensiv süßem Geschmack. Das spezifische Gewicht des optisch schwach linksdrehenden Oeles liegt zwischen 0,980 und 0,990 bei 15° C. Anisöl löst sich in 1½–5 Vol. Spiritus. Diese Lösung wird durch Eisenchlorid nicht verändert. (Germ. Austr. Helv. U-St.) Anisöl erstarrt bei niedriger Temperatur — der Beginn des Erstarrens hängt von äusseren Umständen ab — und schmilzt alsdann zwischen 15 und 19° C. Je anetholreicher das Oel ist, desto höher liegt sein Erstarrungspunkt und desto werthvoller ist es. Geschmolzen lässt es sich bedeutend unter seinen Erstarrungspunkt abkühlen, ohne dass es fest wird. Durch Hinzufügen von etwas krystallisirtem Anethol oder durch Reiben mit einem Glasstabe erstarrt es plötzlich unter Wärmeentwicklung. Der Erstarrungspunkt, d. h. der höchste Punkt, den ein in das krystallisirende Oel

Häufig sind dem italienischen Anis die giftigen Früchte von *Conium maculatum* L. beige-mengt (—18 Proc.). Diese sind oval, —3 mm lang (also viel kürzer wie italien. Anis), hoch gewölbt mit stark hervortretenden Rippen. Die Kerbung der Rippen ist in der trockenen Frucht nicht sehr deutlich. Das Endosperm ist tief eingebuchtet, Oelgänge fehlen.

In Schierling enthaltendem Anis findet man immer die leicht kenntlichen Früchte der Borstenhirse (*Setaria glauca* Beauv.). Sie sind 3 mm lang, 2 mm breit, gelblich bis schwarzbraun, auf einer Seite hoch gewölbt, querverganzelt. Zum Nachweis dieser gefährlichen Verfälschung ist die Untersuchung einer nicht zu kleinen Probe (7 g), die man am besten dem Boden des Gefässes entnimmt (da die glatten und schweren Conium- und Setariafrüchte allmählich zu Boden sinken) allein sicher. Verdächtige Früchte sind im Querschnitt unter dem Mikroskop zu prüfen.

Zum chemischen Nachweis des Coniins extrahirt man ein Quantum der gepulverten Droge mit Aether, schüttelt diesen Auszug mit saurem Wasser

¹⁾ Brit. lässt neben dem ätherischen Oele von *Pimpinella Anisum* L. auch noch dasjenige von *Illicium anisatum* L. zu und bezeichnet mit Oil of Anise sowohl das gewöhnliche (Pimpinella) Anisöl wie auch Sternanisöl.

gestelltes Thermometer erreicht, ist als Werthmesser für die Qualität des Oeles anzusehen.

Beim Verdunsten des Anisöls in einem Schälchen auf dem Wasserbade bleibt ein verhältnissmässig grosser, dickflüssiger, geruchloser, nicht flüchtiger Rückstand (9—10 Proc.), der vermuthlich aus einer polymeren Modifikation des Anethols besteht, zurück.

Prüfung. Die Bestimmung des Erstarrungspunktes geschieht zweckmässig in dem von Schimmel & Co. (Bericht Oktober 1898, 49) angegebenen, nebenstehend abgebildeten Apparat.

Das Batterieglass *A* dient zur Aufnahme der Kühlflüssigkeit oder des Kältegemisches. Das in dem Metalldeckel hängende Glasrohr *B* bildet einen Luftmantel um das Gefrierrohr *C* und verhindert das vorzeitige Erstarren des zu prüfenden Oeles. Das Gefrierrohr *C* ist oben weiter und wird an der Stelle enger, wo es auf dem Rande des Rohres *B* aufliegt. Zur Fixirung von *C* sind im Rohre *B*, ca. 5 cm unter seinem oberen Ende, drei nach innen gerichtete Glaseinstülpungen angebracht. Das in halbe Grade eingetheilte Thermometer wird in einer Metallscheibe durch drei Federn, in denen es sich leicht verschieben lässt, festgehalten.

Zur Ausführung der Bestimmung füllt man bei Anis- und Sternanisöl das Batterieglass mit kaltem Wasser und Eisstücken, bei Fenchelöl aber mit einer aus Eis und Kochsalz hergestellten Kältemischung. Dann giesst man in das Gefrierrohr soviel von dem zu untersuchenden Oele, dass es etwa 5 cm hoch steht und bringt das Thermometer, das an keiner Stelle die Wand berühren darf, in die Flüssigkeit. Während des Abkühlens ist das überkaltete Oel vor Erschütterungen, die ein vorzeitiges Erstarren hervorbringen würden, zu schützen. (Ein zu frühes Erstarren findet auch statt, wenn das Oel nicht ganz klar filtrirt ist.) Ist das Thermometer etwa 10° C. unter den Erstarrungspunkt, also bei Anis- und Sternanisöl auf 6° C. bis 8° C., gesunken, so sucht man durch Reiben und Kratzen mit dem Thermometer an der Gefässwand die Krystallisation einzuleiten. Sollte das auf diese Weise nicht gelingen, so bringt man ein Kryställchen von erstarrtem Oel oder etwas festes Anethol in die Flüssigkeit, worauf das Erstarren unter starker Wärmeentwicklung vor sich geht. Das Festwerden beschleunigt man durch fortwährendes Rühren mit dem Thermometer, dessen Quecksilberfaden schnell steigt und endlich ein Maximum erreicht, das man den Erstarrungspunkt des Oeles nennt.

Steht ein derartiger Apparat nicht zur Verfügung, so kann man auch die Bestimmung unter den angegebenen Vorsichtsmassregeln bei Quantitäten von 100—200 g in einer gewöhnlichen Flasche ausführen. Bei der Probeentnahme ist darauf zu achten, dass die ganze Masse des Oels geschmolzen und gleichmässig gemischt ist.

Die häufigste Verfälschung geschieht durch Zumischen von Fenchelstearopten. Hierdurch wird das Anisöl rechtsdrehend, was bei der polarimetrischen Prüfung zu erkennen ist.

Auf Alkohol prüft man in der üblichen Weise, indem man einige Tropfen in Wasser fallen lässt. Eine Trübung würde Alkohol anzeigen, der gleichzeitig durch die Erniedrigung des spec. Gew. des Oels zu erkennen wäre. Von Sternanisöl ist Anisöl nur durch Geruch und Geschmack zu unterscheiden. Die zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Farbreactionen mit alkoholischer Salzsäure geben unzuverlässige Resultate.

Bestandtheile. Anisöl besteht in der Hauptsache aus Anethol, dem wenig von dem isomeren flüssigen Methylchavicol beigemischt ist.

Anethol, der Träger der charakteristischen Eigenschaften des Anisöls, ist der Methyläther des Parapropenylphenols $C_6H_4 - C_3H_5[1] - OCH_3[4]$. Es erstarrt zu weissen, krystallinischen Schuppen oder Blättchen, die bei 21,5—22° C. schmelzen. Geschmolzen bildet es eine sehr stark lichtbrechende, intensiv süss schmeckende Flüssigkeit vom spec. Gew. 0,984—0,986 bei 25° C. Anethol siedet bei 233—234° C. und ist optisch inaktiv.

Methylchavicol ist der Methyläther des Paraallylphenols. Es unterscheidet sich vom Anethol nur durch eine andere Lagerung der Atome in der C_3H_5 -Gruppe.




Fig. 60.
1/4 der wirklichen Grösse.

Es riecht anisartig, schmeckt jedoch nicht süß, siedet bei 216—217° C, ist optisch inaktiv und hat das spec Gew 0,972 bei 15° C

Aufbewahrung. Anisol muss in möglichst gefüllten, kleinen Flaschen an einem kühlen Orte aufbewahrt werden, da es besonders im geschmolzenen Zustande in nur theilweise gefüllten Flaschen sich schnell verändert und die Fähigkeit zu erstarren verliert

Anwendung. Siehe unter Sternanisöl S 317

Anis-Aldehyd (Anèpine) $C_6H_4(OCH_3)COH$ Neuerdings für Parfümeriezwecke empfohlen, von an blühenden Weissdorn erinnerndem Geruch Spec Gew 1,126 Siedep 245—246° C Erstarrt in der Kälte, schmilzt wieder bei —4° C Krystallisiertes Anèpine, ein weisses Pulver, ist anisaldehydschwefligsaures Natrium und Soda Liefert auf Wassergesatz 40 Proc Anisaldehyd

Aqua Anisi. Anise-Water 1) (Brit) Fruct Anis 500,0 g, Aq 10 Liter, die Hälfte überdestilliren 2) (U St) Ol Anisi 2,0 wird mit Calc phosph praecip 4,0 und mit 1000,0 Aq abgeseihen und filtrirt 3) (Gall) Fruct Anis 1000,0 g Mit hinreichendem Wasser 4000,0 destilliren

Spiritus Anisi. Anisgeist 1) Austr Zerstoßener Anis, 250 g, Weingeist 1000 g, Wasser 1500 g Nach 12ständiger Maceration sind abzuziehen 1500 g

2) Brit, U-St Anisöl 100 cem, Weingeist 900 cem

Sirapus Anisi Anis, zerquetscht 100 Th, mit Weingeist 50 Th angefeuchtet, lässt man mit Wasser 450 Th 24 Stunden stehen, in 350 Th Filtrat löst man unter Aufkochen Zucker 650 Th

Elaeosaccharum Anisi, Oleosaccharum cum Oleo Anisi. Ol Anisi 0,1, Sacchar 5,00

Claretum e sex seminibus. Aqua Vitae carminativa Rosolis s Claret des six grames (Vespetro) Anisol 5 Th, Sternanisöl, Kümmelöl je 2,5 Th, Fenchelöl 1 Th, Weingeist 1000 Th, Weisses Sirup 2000 Th

Pulvis carminativus, Windpulver für Erwachsene Anis, Zucker, aromat Pulver je 20 Th, Kümmel, Koriander, Fenchel, Natriumbikarbonat je 10 Th

Species carminativae, Semences carminatives, Blähung treibende Kräuter Anis, Kümmel, Koriander, Fenchel, Angelikawurzel, gleiche Theile

Pulvis carminativus infantum, Windpulver für Kinder Anis 15 Th, Fenchel 10 Th, gebrannte Magnesia 5 Th, Zucker 70 Th

Tinctura Proprietatis Mysiehi. Spiritus Anisi 50 Th Elixir Proprietatis Paracelsi 25 Th

Oleum Anisi sulfuratum, eine durch längeres Erwärmen bereitete Auflösung von Schwefel in Anisöl

Mannheimer Wasser ist ein Anis-Aquavit mit den flüchtigen Bestandtheilen von Koriander, Nelken, Zimmt

Dr BASTLERS Choleraertröpfchen, ein Gemisch aus Anis-, Wacholder- und Cayepul, verd Schwefelsäure, Aetherweingeist, Zimmttinktur

Bernhardiner Alpenkrauter Magenbitter von BERNHARD enthält reichlich aromatische Pflanzenstoffe, besonders Anis und Fenchel

Calming-Pastills, Dr ALEX's, bestehen aus Zucker, Anisöl und Lakritz

Manol, Dr RING's, soll ein Succus Anisi ozonisatus sein

ISSELEIN's Katarisbrüden sind Pastillen aus Anisöl, Salzwasser und Zucker

II Fructus Anisi stellati (Erganzb Helv Austr) Semen Anisi indiel seu sinensis. Semen Badiani. Sternanis. Anis étoilé. Badiane (Gall) Star-Anise (U St)

Der einachsige Fruchtstand des zu den Magnoliaceae — Illiciaceae gehörigen *Illicium anisatum* L (*Illicium verum* Hook f) Heimisch im nördlichen Anam und im südlichen China, auf den Philippinen und in Japan kultivirt

Beschreibung. Um die kurze Blüthenstandaxe befinden sich bis 8 in einen Kreis gestellte, kahnförmige, an der nach oben gekehrten Bauchnaht aufspringende Früchte von dunkelbrauner Farbe, aussen runzelig, mit je einem heller gefärbten, glänzendbraunen Samen

Bestandtheile 5 Proc Aetherisches Oel (auf trockene Früchte bezogen), 2,8 Proc fettes Oel, 10,7 Proc rothbraunes Harz, Gerbstoff, Zucker etc

Verwechslungen. An Stelle des Sternanis oder ihm beigemengt sind die Früchte des giftigen, in Japan heimischen *Illicium religiosum* SIEBOLD (Shikimfrüchte) nicht selten vorgekommen Sie enthalten das giftige Glykosid Shikamin, Shikampikrin, Shikaminsäure (der Chinasaure nahesteheend), im Oel Eugenol, Safrol und ein Terpen (Shikimon)

Sie sind im Ganzen kleiner, wie die echten Früchte, die Karpelle klaffen stärker, sind stark und spitz geschnäbelt, riechen scharf aromatisch, jedenfalls nicht nach Anis. Sind sie den echten Früchten beigemengt, so überwiegt der Geruch der letzteren, man muss dann Bruchstücke verdächtigter Früchte kauen. Dazu kommen folgende anatomische Unterschiede: die Palissadenzellen in der Fruchtschale der echten Droge sind im Durchschnitt 0,5 mm lang, bei der falschen 0,375 mm, die Aleuronkörner in dem Samen der echten Droge sind bis 22 μ gross, aussen rau, leppig, sie enthalten zuweilen ein grosses Krystalloid und stets zahlreiche Globoide, die der falschen Droge sind bis 15 μ gross, oval oder elliptisch, glatt, sie enthalten 2—3 Krystalloide und an einem Ende wenige Globoide.

Anwendung. Wie beim vorigen.

Anisette ist ein verdünntes weingeistiges Destillat aus Sternanis, Koriander und Fenchel oder ein Gemisch von Zuckersirup, Spiritus, Wasser und den ätherischen Ölen des Sternanis, Koriander und Fenchel.

Oleum Vitae, Balsamum vitae Asiaticum — Lebensöl, weisser Lebensbalsam. Eine Lösung von Sternanisöl, Nelkenöl, Orangenschalenöl je 20 Th, Pfeffermünzöl 2 Th in Weingeist 1000 Th.

Oleum Anisi stellati (Brit. Ergänzb.) **Sternanisöl. Oleum Badiani. Huile volatile de Badiane** (Gall.) **Oil of star Anise.**

Wird ausschliesslich in den südwestlichen chinesischen Provinzen Kwang-Tung und Kwang Si, sowie in Tonkin durch Destillation der noch frischen Sternanisfrüchte gewonnen. Ausbeute ungefähr 3 Proc. Das Öl wird in Blekanistern von 7,5 kg Inhalt, von denen je vier in eine Kiste verpackt werden, versandt.

Eigenschaften. Eine farblose oder gelbliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit von anisartigem Geruch und süßem Geschmack. Optisch schwach linksdrehend, spec. Gew. = 0,98—0,99. Der Erstarrungspunkt liegt zwischen +14 und +18° C. Das Öl ist in 3 Theilen Spiritus (90 Proc.) klar löslich.

Prüfung. Die Bestimmung des Erstarrungspunktes geschieht auf die bei Anisöl auf S. 315 beschriebene Weise. Die mehrfach beobachtete Verfälschung mit Petroleum wird an der unvollkommenen Löslichkeit des Oels in 3 Th. Spiritus erkannt. In Bezug auf den Verdampfungsrückstand gilt das bei Oleum Anisi Gesagte S. 315.

Bestandtheile. Wie beim Anisöl, so ist auch beim Sternanisöl der wichtigste Bestandtheil das Anethol $C_{10}H_{12}O$. Ob das Öl relativ reich an diesem Körper ist, wird durch die Bestimmung des Erstarrungspunktes erkannt. Von anderen Körpern sind im Sternanisöl aufgefunden Rechts-Pinen $C_{10}H_{18}$, Links-Phellandren $C_{10}H_{18}$, Methylchavicol $C_{10}H_{12}O$ (das isomere Anethol), Hydrochinonäthyläther $C_6H_4-OH-OC_2H_5$ und Safrol $C_{10}H_{10}O_2$. Dem Safrol wird der vom Anisöl abweichende Geschmack des Sternanisöls zugeschrieben.

Aufbewahrung. Sternanisöl wird unter den bei Anisöl besprochenen Vorsichtsmaßregeln aufbewahrt.

Anwendung. Anisöl und Sternanisöl werden in grossen Quantitäten zur Liqueurfabrikation gebraucht. Arzneilich dienen sie hauptsächlich als Geschmackskorrigens, seltener als Stomachicum oder Carminativum. Man giebt sie zu 2—6 Tropfen (0,1—0,25 g) entweder in Pulvern mit Zucker oder Magnesia verrieben, oder gelöst in Spiritus. Für den ausserlichen Gebrauch werden sie in fettem Öl gelöst (1:20—50) oder mit Fett (1:10) verrieben (Salbe gegen Filzläuse). Anisöl ist ein Lieblingsgeruch der Tauben.

Species Hackeri (Vorschrift d. Munch. Ap. Ver.) Sternanis, Pfefferminze, Krauseminze, entharzte Sennesblätter, gleiche Theile.

Hustenmittel des Grafen v. SCHLIEFFEN besteht aus Sternanis, Senna, Kandiszucker etc.

Spanischer Thee ist ein dem Brustthee mit Früchten ähnliches Gemisch.

Topique Indien von COLMET D'ANGE ist Sternanistinktur, enthält daneben gestossenen Pfeffer.

Universal-Lebensöl, Hamburgisches, Balsam Vitae Hamburgense, ein Gemisch aus Sternanis-, Nelken-, Pomeranzenschalenöl und Weingeist.

Eau dentifrice Mallard ist eine Tinktur aus Sternanis, Guajak, China, Zimmt, Nelken, Benzoe etc.

Eau dentifrice de Pierre ist eine Tinktur aus Sternanis mit Anis- und Pfeffermünzöl.


Essentia dentifricia (NAGEL) Sternanisöl 1,5 Th, Pfeffermünzöl 1 Th, China-, aromatische und Myrrhentinktur je 30 Th, Hoffmann's Lebensbalsam 20 Th, verd Wein-geist 900 Th, Cochenille 2,5 Th

Anthrarobinum.

Anthrarobinum (Ergänzb) **Dioxyanthranol Anthrarobina. Desoxy-Alizarin Leuko-Alizarin** $C_{14}H_{10}O_4$. Mol. Gew. = 220. Ein Reduktionsprodukt des käuflichen Alizarins

Darstellung Man löst käufliches Alizarin (Alizarin-Blaustich) in Ammoniakflüssigkeit, erwärmt die entstandene violette Lösung zum Sieden, trägt allmählich Zinkstaub ein und setzt das Erwärmen so lange fort, bis die violette Färbung in Gelb übergegangen ist. Man filtriert sogleich in ein Gefäß mit Wasser, welches genügend Salzsäure enthält, um die Reaktion der Flüssigkeit bis zum Ende der Filtration deutlich sauer zu halten. Der in der sauren Flüssigkeit abgeschiedene Niederschlag wird gesammelt, gewaschen und zuerst auf porösen Unterlagen, dann bei 100° C getrocknet.

Eigenschaften Gelbliches bis hellbräunliches, geruch- und fast geschmackloses Pulver, nur sehr schwer in kaltem, etwas leichter in heissem Wasser löslich, ferner löslich in 10 Th kaltem oder in 5 Th heissem Alkohol.



In der wässrigen Lösung erzeugt Bleiessig einen rothbraunen, Eisenchloridlösung einen braunvioletten Niederschlag. Die Lösung in Natronlauge ist rothbraun, nimmt aber durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft bald violette Färbung an. Da das käufliche Alizarin keine ganz einheitliche Substanz ist, so ist auch das Anthrarobin keine ganz einheitliche chemische Verbindung. Es besteht vorzugsweise aus dem Dioxyanthranol, enthält aber noch andere Reduktionsprodukte des Alizarins ähnlicher Zusammensetzung.

Prüfung 1) 0,1 g Anthrarobin lösen sich in 1 cem Natronlauge mit gelber Färbung klar auf, die Färbung gehe durch Einblasen von Luft in Violett über. 2) 1 g Anthrarobin hinterlasse beim Einäschern nicht mehr als 0,01—0,02 g feuerbestandigen Rückstand.


Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln, Lichtschutz nicht erforderlich.

Anwendung Aeusserlich bei Hautkrankheiten (Psoriasis, Herpes tonsurans, Erythrasma etc), bei denen gewöhnlich Chrysarobin angewendet wird. Es wirkt zwar etwas schwächer als dieses, reizt dafür aber auch nicht so heftig und kann z. B. im Gesichte und an den Genitalien angewendet werden. Nach Th. Weyl ist es auch bei innerer Anwendung ungiftig. Durch den Umn wird es als Anthrarobin, nicht als Alizarin ausgeschieden.

Antipyrinum.

I Antipyrinum (Aust. Germ. Helv.) **Analgesine** (Gall.) **Phenyldimethylpyrazolon** **Oxydimethylchinazin** **Pyrazolin**. (Anodynin. Metozin. Parodyn. Phenazon. Phenylon. Sedatin) $C_{11}H_{12}N_2O$ Mol. Gew. = 188.

Darstellung Durch Erhitzen von Phenylhydrazin mit Acetessigester entsteht Phenyldimethylpyrazolon. Wird dieses in methylalkoholischer Lösung mit Methyljodid behandelt, so wird letzteres addirt und jodwasserstoffsäures Antipyrin gebildet, aus welchem stärkere Basen Antipyrin in Freiheit setzen, welches z. B. durch Ausschütteln mit Aether abgeschieden werden kann.

Eigenschaften

Farbloses neutrales Krystallpulver, von kaum wahrnehmbarem Geruche und milde bitterem Geschmacke. Schmelzpunkt 118°C . Löslich in 1 Th. Wasser, in 1 Th. Alkohol, in 1 Th. Chloroform, in 50 Th. Aether. Die wässrige Lösung 1 = 100 giebt mit Gerbsäure eine weisse Fällung. Durch salpetrige Säure (Natriumnitrit + Essigsäure) entsteht in der verdünnten Lösung Grünfärbung, in der conc. Lösung Abscheidung grüner Krystalle von Isonitroso-Antipyrin (Reaktionsgrenze 1 : 10000). Durch Eisenchlorid wird die Lösung des Antipyrins blutroth gefärbt (Reaktionsgrenze 1 : 100 000).

Prüfung. 1) Das Antipyrin sei unifarbt und fast geruchlos, der Schmelzpunkt liege bei 118°C . 2) Die wässrige Lösung 1 + 1 sei farblos, neutral (Säuren, Alkalien, wurden saure, bez. alkalische Reaktion verursachen, harzige Verunreinigungen wurden Trübung verursachen). 3) 0,5 g Antipyrin hinterlassen beim Verbrennen auf dem Platinbleche keinen feuerbeständigen Rückstand (mineralische Verunreinigungen).

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln, grössere Vorräthe vor Licht geschützt. *Helv.* Vorsichtig.

Anwendung. Innerlich setzt Antipyrin die Temperatur des fiebernden Menschen herab, ferner wirkt es antineuralgisch und analgetisch. Man verwendet es daher als Antipyreticum bei verschiedenen fieberhaften Zuständen (Febris recurrens und intermittens), indessen ist es bei Malaria wirkungslos. Dosis täglich mehrmals 1–2 g. Bei Kindern dreimal täglich soviel Desigminum, als das Kind Jahre zählt. Man beachte, dass es nach Antipyringebrauch bisweilen zu ausgedehnten Exanthenen kommt. Die nach Antipyringebrauch auftretenden Schwellen können durch Aganion unterdrückt werden. Aeusserlich zeigt es faulnisshemmende (antiputride) und blutstillende (haemostatische) Eigenschaften. Subkutan als lokales Anästhetikum, auch in Gemeinschaft mit Cocain oder Atropin. Maximal-Dosis nach *Helv.* pro dosi 2,0, pro die 6,0.

Dispensation. Für die Verordnung und Dispensation des Antipyrins ist zu beachten, dass Antipyrin mit einer Reihe von vielbenutzten Arzneimitteln unerwartete Änderungen eingeht.

1) Antipyrin + salpetrige Säure. Man vermeide, das A. mit Arzneimitteln, welche salpetrige Säure enthalten oder entbinden können (z. B. *Amylnitrit*, *Spiritus Aethers nitrosi*) zusammen zu verordnen. Es kommt zur Bildung von grünem Isonitrosoantipyrin, welches nach Künig nicht ungiftig ist. Nach Anderen soll nebensbei Blausäure auftreten.

2) Antipyrin + Mercurchlorid (Calomel). In diesen Mischungen soll sich eine organische, sehr giftige Quecksilberverbindung bilden.

3) Antipyrin + Kohlensäure fallen schon in verdünnten wässrigen Lösungen gegenseitig als obige Masse aus.

4) Antipyrin + Natriumsalicylat geben, in Pulverform zusammengerieben, eine schmierige Masse. In Lösung scheinen sich beide nicht zu beeinflussen.

5) Antipyrin + β -Naphthol geben eine feuchte Mischung.

6) Antipyrin + Chloralhydrat geben beim Zusammenreiben ein Oel, welches die Reaktionen der Komponenten nicht mehr zeigt.

7) Gerbsäure fällt das Antipyrin als Tannat (s. oben) aus.

Dagegen erhöht das Antipyrin die Auflöslichkeit des Coffeins und der Chinasalze in Wasser.

Nachweis im Harn. In den Harn geht das Antipyrin als solches über. Zum Nachweise entfärbt man den Harn mit Thierkohle, schüttelt ihn mit Aether aus und prüft den Verdampfungsrückstand der ätherischen Lösung mit Eisenchlorid oder salpetriger Säure.

Obgleich ein Bedürfniss eigentlich nicht existirt, Salze des Antipyrins anzuwenden, so sind doch mehrere derselben praktisch gebraucht worden.

II Antipyrinum citricum. Wird bisweilen aus Missverständniss verordnet, man gebe Antipyrin ab und setze das „citricum“ in Klammern.

III. Antipyrinum salicylicum Antipyrinsalicylat. Salipyrin (Ergänzb.) Salicylate d'Analgesine (Gall.) Salazolon. Salipyrzolin. $C_{11}H_9N_2O \cdot C_7H_5O_2$. Mol Gew. = 326

Darstellung Man erwärmt eine Mischung von 57,7 Th Antipyrin und 42,3 Th Salicylsäure auf dem Dampfbade. Sie schmilzt zu einer öligen Flüssigkeit, welche nach dem Erkalten fest wird. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol erhält man das Salz in reinem Zustande.

Eigenschaften. Farbloses und geruchloses Krystallpulver von saurer Reaktion und dem herbstüsslichen Geschmack der Salicylsäure. Schmelzp. $92^\circ C$. Löslich in 200 Th kaltem oder 25 Th siedendem Wasser. Ziemlich leicht löslich in Alkohol und in Aether, leicht löslich in Chloroform, wenig löslich in Schwefelkohlenstoff. Beim Erwärmen mit Schwefelsäure wird die Salicylsäure, beim Erwärmen mit Natronlauge das Antipyrin in Freiheit gesetzt. Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid die violette Reaktion der Salicylsäure.

Prüfung Eine gewogene Menge Salipyrin (1 g) wird im Scheidetrichter in 40 cem heissem Wasser gelöst, die Lösung mit einer gemessenen Menge (5 cem) Doppelt-Normal-Natronlauge im Ueberschuss versetzt und das ausgeschiedene Antipyrin durch dreimal viertelmaliges Ausschütteln mit je 15 cem Chloroform entzogen. Man verdunstet die Chloroformauszüge im gewogenen Glasschälchen und bestimmt Gewicht und Schmelzpunkt ($113^\circ C$) des hinterbleibenden Antipyrins. — Die im Scheidetrichter zurückgebliebene Natriumsalicylatlösung wird mit Normal-Schwefelsäure (Phenolphthalein als Indikator) titirt, die Salicylsäure mit Anthon ausgeschiedelt und der Schmelzpunkt ($153^\circ C$) der nach dem Verdunsten des Aethersauszuges hinterbleibenden Salicylsäure bestimmt.

Anwendung Als Antipyreticum und Antineuralgicum, ferner bei akutem und chronischem Gelenkrheumatismus, Influenza. Die Dosis ist doppelt so gross wie die des Antipyrins. Man giebt Erwachsenen 1–2 g mehrmals täglich.

IV Antipyrinum amygdalicum (Ergänzb.) Mandelsaures Antipyrin. Tussol. $C_{11}H_9N_2O \cdot C_9H_9O_2$. Mol Gew. = 340.

Darstellung Man erhitzt eine Mischung aus 188 Th Antipyrin mit 152 Th Mandelsäure im Dampfbade zum Schmelzen, lässt erkalten und krystallisirt aus Alkohol um.

Eigenschaften. Farblose, bitter schmeckende, in Wasser und in Alkohol lösliche Krystalle. Sie schmelzen bei 52 – $53^\circ C$ und zersetzen sich bei höherer Temperatur unter Verbreitung bittermandeläthertartig riechender Dämpfe. — Die wässrige Lösung (1=20) wird durch einige Tropfen rauchender Salpetersäure blassgrün (Isomtrase-Antipyrin), durch einen Tropfen Ferrichlorid blutroth gefärbt. Gerbsäure erzeugt weissen, im Ueberschuss der Gerbsäure löslichen Niederschlag. Mit Milch gemischt, wird das Salz versetzt.

Prüfung. 1) Das Salz sei farblos und schmelze bei 52 – $53^\circ C$. 2) Die wässrige Lösung (1=200) werde durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Metalle, z. B. Blei). 3) Löst man 1 g des Salzes in 40 cem heissem Wasser, setzt 10 cem Normalalkalilauge zu und schüttelt nach dem Erkalten 3–4mal mit je 15 cem Chloroform aus, so muss letzteres nach dem Abdunsten mindestens 0,52 g Rückstand hinterlassen, welcher den Schmelzpunkt ($113^\circ C$) und die übrigen Eigenschaften des Antipyrins zeigt. 4) 0,5 g sollen beim Erhitzen ohne Rückstand verbrennen.

Anwendung Es besitzt ausser den antipyretischen auch noch narkotische Eigenschaften. Wird besonders gegen den Symptomen-Komplex bei Keuchhusten empfohlen. Dosis für Kinder bis 1 Jahr = 2 bis 3mal 0,05–0,1 g, von 1 Jahr = 3mal 0,1 g, von 2 bis 4 Jahren = 3–4mal 0,25–0,4 g, darüber 4mal täglich 0,5 g. Das Mittel soll nicht mit Milch zusammen oder in zeitlicher Nähe von Mahlzeiten gegeben werden. S. oben.

Antipyrinum Coffeino-chlorum Migränia. Man mischt 85 Th Antipyrin mit 9 Th Coffein und 6 Th Citronensäure, schmilzt die Mischung im Wasserbade, bricht die erstarrte Masse in Stücke, trocknet und pulvert diese.

Farbloses, hygrokopisches Pulver. Das durch einfaches Mischen der Bestandtheile erhaltene Pulver wird feucht! Als Antineuralgicum bei Migräne in Gaben von 1 g in Oblaten-Pulvern.

Jodopyrin Jodantipyrin $C_{11}H_{11}N_2O = 314$ Durch Einwirkung von Chloriod auf Antipyrin erhalten Glänzende, farblose, prismatische Nadeln, in kaltem Wasser schwer, leichter in siedendem Wasser löslich Schmelzp $160^{\circ}C$ Soll die kombinierte Wirkung des Antipyrins und eines Jodides haben Dosis 0,5–1,5 g

Anilipyrin 1) α -Anilipyrin Durch Zusammenschmelzen von 188 Th Antipyrin mit 135 Th Acetanilid Farbloses, krystallinisches Pulver, Schmelzp $75^{\circ}C$ 10 g lösen sich bei $15^{\circ}C$ in 4 g Wasser Beim Eindampfen der Lösung erfolgt Dissociation

2) β -Anilipyrin Durch Zusammenschmelzen von 876 Th Antipyrin mit 135 Th Acetanilid erhalten Farbloses Pulver, Schmelzp $105^{\circ}C$ 10 g lösen sich bei $15^{\circ}C$ in 2,3 g Wasser Dissociirt weniger leicht als das vorige Als Antipyreticum und Analgeticum 2–3 mal täglich 0,5–1,0 g

V. Chloral-Antipyrin Es sind drei verschiedene Verbindungen dargestellt worden

† I **Monochloral Antipyrin** Hypnal $C_{11}H_{11}N_2O \cdot COCl_2 \cdot CH(OH)_2$ Man reibt 188 Th Antipyrin mit 165,5 Th Chloralhydrat bis zur Verflüssigung zusammen, löst die ölige Masse in heissem Wasser und überlässt die Lösung an einem kalten Orte der Krystallisation Farblose Oktaeder, in 15 Th kaltem Wasser löslich, Schmelzp 67 – $68^{\circ}C$

Diese Verbindung ist abzugeben, wenn Hypnal verordnet wird

Als Hypnoticum an Stelle des Chloralhydrates empfohlen Höchste Gaben 3 g pro dosi, 6 g pro die

† II **Bichloral Antipyrin** $C_{11}H_{11}N_2O \cdot 2[COCl_2 \cdot CH(OH)_2]$ Man reibt 94 Th Antipyrin mit 165,5 Th Chloralhydrat bis zur Verflüssigung zusammen, verfährt im übrigen wie sub I Im Wasser lösliche Krystalle, Wirkung etwa wie Hypnal

† III **Dehydrotrichloraldehydphenyldimethylpyrazolon** $C_{11}H_{11}N_2O \cdot Cl_3$ Man erhitzt ein Gemisch von 188 Th Antipyrin und 165,5 Th Chloralhydrat einige Zeit auf 100 bis $110^{\circ}C$ Aus der erkalteten flüssigen Mischung entsteht allmählich (Einsäen einiger Krystalle) ein Krystallbrei, der aus Alkohol umkrystallisirt wird Farblose, bei 186 – $187^{\circ}C$ schmelzende, geschmacklose Krystalle, in Wasser unlöslich Wird wegen der Unlöslichkeit schwer resorbirt, wirkt im Falle der Resorption aber hypnotisch

† **Butylchloral-Antipyrin** $C_{11}H_{11}N_2O \cdot C_4H_9Cl_2O + H_2O$ Wird durch Zusammenreiben von 188 Th Antipyrin mit 198,5 Th Butylchloralhydrat in gleicher Weise wie das Hypnal, s. vorher sub I, hergestellt Farblose, bei $70^{\circ}C$ schmelzende Nadeln, in 30 Th Wasser löslich

Naphthopyrin $C_{11}H_{11}N_2O + C_{10}H_8O$ Wird durch Zusammenreiben von 188 Th Antipyrin mit 144 Th β -Naphthol als zähe Masse erhalten, welche bisweilen krystallinisch wird Unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether

Resopyrin $C_{11}H_{11}N_2O \cdot C_6H_4O_2$ (?) Bildet sich als krystallinischer Niederschlag, wenn konc Lösungen von 188 Th Antipyrin und 110 Th Resorcin gemischt werden Farblose, rhombische Krystalle, unlöslich in Wasser, löslich in 5 Th Alkohol oder 100 Th Aether

† **Phenopyrin** Verbindung von 188 Th Antipyrin mit 94 Th reiner Karbolsäure

† **Pikropyrin** Verbindung von 188 Th Antipyrin mit 229 Th Pikrinsäure

† **Pyrogallopyrin** Verbindung von 188 Th Antipyrin mit 126 Th Pyrogallol

Antihemicranin oder **Antimigranepulver** von Apotheker DEMELINNE in Maastricht Coffein 1,6 g, Antipyrin 3,2 g, Zucker 3,2 g In 8 Pulver zu theilen Preis 1,25 Gulden holländisch

Bromopyrin, ein gekühtes Blausepulver 1 Theelöffel enthält angeblich 0,06 g Coffeinbromhydrat, 0,18 g Antipyrin, 1,0 g Natriumbromid

Cerebrine. Alkoholsche Lösung von Antipyrin, Coffein und Cocain Genaue Vorschrift unbekannt Antineuralgicum

Migraine-Pastillen von Apotheker SENKENBERG Es werden verschiedene Vorschriften angegeben I) Antipyrin 0,8 g, Antifebrin 0,05 g, Rhabarber 0,05 g, Kalmus 0,02 g, Chinurinde 0,03 g II) Antipyrin 47,0, Antifebrin 26,0, Aloe 5,0, Zucker 8 g, Stärke 12,0 g für 25 Pastillen

Polagin, Mittel gegen die Seelkrankheit Ein ätherhaltiger Lktör, Antipyrin, Cocain und Coffein enthaltend

β -Resalgin Resorcylsaures Antipyrin $(C_{11}H_{11}N_2O)_2 \cdot C_7H_4O_4$ Scheidet sich als Oel aus beim Mischen konc Lösungen von 188 Th Antipyrin und 77 Th β -Resorcylsaure Nach dem Erstarren und Umkrystallisiren farblose, sauer reagirende Nadeln, löslich in 150 Th kaltem oder 20 Th siedendem Wasser Leicht löslich in Alkohol und in Essigäther, unlöslich in Aether Schmelzp $115^{\circ}C$

VI. Ferripyrium **Ferropyrium**. **Antipyrium cum Ferro**. $(C_{11}H_{11}N_2O)_2$

Fe_2Cl_6 Mol. Gew. = 889.

Handb d pharm Praxis I

Darstellung. Man löst 5 Th kristallisiertes Ferrichlorid $\text{FeCl}_3 + 6\text{H}_2\text{O}$ in 10 Th Alkohol von 90 Proc und trägt diese Lösung ein in eine Auflösung von 5 Th Antipyrin in 10 Th Alkohol und 50 Th Aether. Der sich ausscheidende orangefarbene Niederschlag wird auf dem Filter gesammelt, mit Aether gewaschen, auf porösen Unterlagen abgesaugt und bei 30–40° C getrocknet.

Sehr feines, orangefarbenes, luftbeständiges Pulver, welches 64 Proc Antipyrin, 12 Proc Eisen und 24 Proc Chlor enthält. Es löst sich in 5 Th kaltem, aber erst in 9 Th siedendem Wasser. Die kaltgesättigte Lösung scheidet beim Erhitzen die Verbindung in rubinrothen Blättchen aus, welche bei 220–225° C schmelzen. Die wässrige Lösung ist blutroth gefärbt. Wirft man geringe Mengen des Pulvers in viel Wasser, so tritt — wahrscheinlich infolge Dissoziation — fast farblose Lösung ein. Löslich in Alkohol und Benzol, aus Methylalkohol krystallisirbar, in Aether fast unlöslich. Schwach salzsaure Lösungen sind haltbar, durch Alkalien, selbst schon durch Bicarbonate, wird aus der wässrigen Lösung Eisenhydroxyd gefällt.

Prüfung. 1) Die Lösung von 1 g der Verbindung in 100 cem Wasser muss klar sein (ohne Anwesenheit von ungelöstem Ferrhydroxyd). Auf Zusatz von einigen Kubikcentimetern Ammoniak fällt das Eisen als Hydroxyd aus. 2) Dampft man Filtrat + Waschwasser (sub 1) auf 5 cem ein, versetzt mit 30 cem Natronlauge von 33 Proc und extrahirt dreimal warm mit je 10 cem Benzol, so muss dieses beim Verdunsten mindestens 0,5 g Antipyrin (Schmelzp 113° C) hinterlassen. **Aufbewahrung.** Vor Licht geschützt.

Anwendung. Innerlich als Eisenpräparat bei chlorotischen und anämischen Zuständen, welche mit Neuralgien etc einhergehen. Dosis: Drei bis viermal täglich 0,03 bis 0,05 g. Als Adstringens bei Darmkatarrhen und Magenblutungen zu 0,5 g. Aeusserlich: Als (nicht atzendes) Adstringens und blutstillendes Mittel gegen Blutungen aus Körperhöhlen in 10–20proc Lösung oder 18proc Watte und Gaze. Bei Gonorrhöe die 1,0 bis 1,5proc Lösung.

Gossypium Ferropyrin bzw **Ferropyrin**. Eine 18 Proc Ferropyrin enthaltende, an der Luft haltbare Watte, als blut- und schmerzstillender Verbandstoff benutzt.

VII † Tolypyrinum. Toly-Antipyrin. $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 202. Das höhere Homologe des Antipyrins. Wird genau wie Antipyrin dargestellt, nur wird zur Kondensation Acetessigester mit p-Tolyhydrazin (an Stelle von Phenylhydrazin) verwendet.

Eigenschaften. Farblose, bei 186–187° C schmelzende Krystalle von sehr bitterem Geschmack, löslich in 10 Th Wasser, leicht löslich in Alkohol, fast unlöslich in Aether. Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid blutroth, durch salpetrige Säure grün gefärbt. Erhitzt man Tolypyrin mit 25procentiger Salpetersäure, so färbt sich die Flüssigkeit weinroth, durch Zusatz von Ammoniak geht die Färbung in hellgelb über.



Als Ersatz des Antipyrins und zwar als Antipyreticum und Antineuralgicum mehrmals täglich 1 g. Vorsichtig aufzubewahren.

† Tolysalum. Tolypyrinum salicylicum. Tolypyrinsalicylat $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}$ $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ = 340. Man schmilzt ein Gemisch von 202 Th Tolypyrin und 188 Th Salicylsäure im Dampfbade, verfährt im übrigen genau wie bei Salipyrin (S 320) angegeben. Farblose oder schwach röthliche Krystalle, von herbbitterlichem Geschmack, in Wasser nur wenig, schwer in Aether, leicht in Alkohol und in Essigäther löslich. Schmelzp 101–102° C. In Tagesgaben von 1–3 g antineuralgisch, von 4–8 g antipyretisch.

VIII † Pyramidonum. Pyramidon. Dimethylamidophenyl dimethylpyrazolon. Dimethylamidoantipyrin. $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}$. Mol. Gew. = 217.

Darstellung. Man reducirt eine alkoholisch-essigsäure Lösung von Nitroso-Antipyrin zu Amidoantipyrin und führt dieses durch Behandlung mit Jodmethyl oder Chlormethyl in Pyramidon über. DRP 71261.

Eigenschaften. Gelblichweisses, krystallines, fast geschmackloses Pulver, Schmelzp 108° C. Löslich in etwa 10 Th Wasser. Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid blauviolett und durch



Natriumnitrit und verdünnte Schwefelsäure (auch durch rauch Salpetersäure) ebenso gefärbt, aber die Färbungen verbleichen und verschwinden sehr bald Aufbewahrung Vorsichtig

Als Antipyreticum bes als Nachfolger des Antipyrins Dosis Zweimal täglich 0,3 bis 0,5 g Nach Lärnz soll das Pyramidon nicht ganz ungiftig sein

Zum Nachweis im Harn überschießt man diesen mit einer auf das 10fache mit Wasser verdünnten alkoholischen 10proc Jodlösung Bei Gegenwart von Pyramidon tritt ein scharfer brauner Ring auf JOLLES

IX † Formopyrinum Methylendiantipyrin. Methylenbisantipyrin ($C_{11}H_{11}N_2O$)₂. CH_2 . Mol Gew = 388

Zur Darstellung erhitzt man 5 Th Antipyrin mit 4 Th Formaldehydlösung von 40 Proc 4—6 Stunden auf 120° C Nach dem Erkalten erhält man Krystalle, welche mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus Benzol umkrystallisiert werden

Krystallisiert mit 1 Mol H_2O und schmilzt alsdann bei 155—156° C, im wasserfreien Zustande bei 176—177° C Atlasglänzende Blättchen, in kaltem Wasser fast unlöslich, in heissem Wasser schwerlöslich, in Benzol leicht, in Alkohol sehr leicht löslich

† Salubrolum Tetrabrommethylen-diantipyrin $C_{10}H_{10}Br_4N_4O_2$ Wird durch Einwirkung von Brom auf Formopyrin dargestellt Fast geruchloses, gelbliches Pulver Anwendung als Antisepticum an Stelle des Jodoforms

Apomorphinum hydrochloricum.

† Apomorphinum hydrochloricum (Austr Germ Helv) Chlorhydrate d'Apomorphine (Gall) Apomorphinae Hydrochloras (Brit U-St) Apomorphinhydrochlorat oder-Chlorhydrat Salzsaures Apomorphin. $C_{17}H_{17}NO_2 \cdot HCl$. Mol Gew. = 303,5. Apomorphin entsteht aus dem Morphin durch Abspaltung von Wasser

Darstellung Man schliesst 1 Th Morphin mit 20 Th cone Salzsäure in ein Glasrohr oder einen Autoclaven ein, so dass die Füllung $\frac{1}{6}$ des Gefässes einnimmt, und erhitzt während 8 Stunden im Oelbade auf 140—150° C Nach dem Erkalten verdünnt man den Gefässinhalt mit luftfreiem destillirtem Wasser, übersättigt die Lösung mit Natriumbikarbonat, sondert einen etwa entstehenden Niederschlag ab und extrahirt diesen sowie die Lösung mit Aether oder Chloroform, welche nur das Apomorphin, nicht aber gleichzeitig anwesendes Morphin lösen — Leitet man in die Aetherlösung des Apomorphins gasförmige Salzsäure, so fällt das salzsaure Apomorphin in Kryställchen aus Bei der Darstellung ist schnell zu arbeiten, da die freie Apomorphinbase sich an der Luft leicht verändert

Eigenschaften. Weisse, weissliche oder grauweisse Kryställchen, löslich in 30 Th Wasser, 20 Th Weingeist, unlöslich in Aether, Chloroform, Benzol, fast unlöslich in Amylalkohol Im trockenen Zustande ziemlich unveränderlich, unterliegt es im feuchten Zustande der Zersetzung unter Annahme grüner Färbung

Löst man eine geringe Menge (0,05 g) in 1 Tropfen Wasser auf, so nimmt diese Lösung, der Luft und dem Licht ausgesetzt, Grünfärbung an Wird dieselbe Menge mit 2 Tropfen Salpetersäure verrührt, so entsteht blutrothe Färbung — Löst man (0,05 g) Apomorphin in 2,5 cem Natronlauge auf, so entsteht eine klare Lösung, welche an der Luft purpurfarben, zuletzt schwarz wird Uebergiesst man 0,05 g mit 3—4 cem Ammoniakflüssigkeit, so muss alsbald (namentlich beim Erwärmen sehr rasch) Purpurfärbung auftreten Tropft man in diese Lösung 2—3 Tropfen Silbernitratlösung, so erfolgt schwarze Ausscheidung von metallischem Silber — Löst man 0,05 g in 2—3 cem Wasser, übersättigt mit Natriumbikarbonat und schüttelt mit Luft durch, so erfolgt smaragdgrüne Färbung — Eisenchloridlösung färbt die wässrige Lösung amethystblau

Prüfung. 1) Apomorphinchlorhydrat sei fast farblos, bez nur grauweiss, nicht stark grün gefärbt, auch nicht feucht 2) Bei der mikroskopischen Betrachtung (50 bis 100fache Vergrösserung) erweise es sich durchweg aus säulenförmigen Krystallen be

stehend Ein im Handel vorkommendes amorphes Apomorphinhydrochlorid zeigt unter dem Mikroskope amorphe, gelbfarbige Massen Ein solches Präparat darf therapeutisch nicht verwendet werden 3) Das Salz verkohle beim Erhitzen und verbrenne bei Luft Zutritt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt nach Germ Vorsichtig, nach Hely Sehr vorsichtig Wichtig ist, dass das Apomorphinchlorhydrat völlig trocken in trockene Gefässe gefüllt wird Da es in der Regel in 1 g-Glasern von den Fabriken abgegeben wird, so stellt man diese auf einen Wattausch, welcher mit etwas Aether befeuchtet ist, in die Standgefässe Natürlich müssen die 1 g-Glaschen lediglich mit guten Korken, nicht aber mit Paraffin oder Siegelack verschlossen sein Unter solchen Masssiegeln hält sich das Präparat Jahr und Tag

Dispensation Die wässrige Lösung des Apomorphinhydrates nimmt nach Kuhlmann eine grüne Färbung an, weil die Aufbewahrungsgläser soviel Alkali an die Lösung abgeben, dass etwas freie Apomorphinbase in Freiheit gesetzt wird, welche dann in Berührung mit der Luft zu den grünen Umwandlungsprodukten oxydirt wird Man kann diese Färbung vermeiden, wenn man der frisch bereiteten Lösung sogleich eine kleine Menge (1—2 Tropfen) Salzsäure zusetzt, doch ist dieses Verfahren nur für die per os zu gebrauchenden Arzneien, nicht aber für subkutane Injektionen zulässig Die Abgabe der Lösungen erfolgt in braunen Gläsern

Anwendung Apomorphin wirkt nervenerregend, schliesslich lähmend auf das Gehirn und die Medulla oblongata Die Erregung kann durch geeignete Dosen bis zur sicheren Brechwirkung (auch bei subkutaner Einführung) gesteigert werden Man giebt es in Dosen von 0,005—0,1 g drei bis viermal täglich als Expektorans und den Husten mildern des Mittel Subkutan bewirkt es in Gaben von 0,005—0,05 g binnen 5—15 Minuten sicher eintretendes Erbrechen Höchstgaben (Germ u Hely) Innerlich pro dosi 0,02 g, pro die 0,1 g Zur Injektion nach Hely pro dosi 0,005 g, pro die 0,015 g

Mixtura Apomorphini
(München Nosokom Vorsch.)
Rp Apomorphini hydrochloridi
Morphini hydrochloridi ss 0,03
Acidi hydrochlorici diluti 1,0
Aquae destillatae 180,0
Sirupi Sacchari 20,0
Detur ad vitrum nigrum

Injectio Apomorphini
Bp Apomorphini hydrochloridi 0,1
Aquae destillatae 10,0
Bismittel für Erwachsene Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Spritze
Rp Apomorphini hydrochloridi 0,02
Aquae destillatae 10,0
Bismittel für Kinder Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Spritze

† **Apomorphinum** Apomorphine (Gall) $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO}_2 = 267$ Die freie Apomorphinbase kann aus den Salzen durch ätzende und kohlensäure Basen, auch schon durch lösliche Bikarbonate ausgeschieden werden Man kann also z B die Lösung des Apomorphinchlorhydrats mit Natriumbikarbonat übersättigen, das Apomorphin mit Aether ausschütteln, nach dessen Verdunsten es zurückbleibt

Frisch dargestellt eine weissliche, amorphe oder krystallinische Masse, die sich namentlich im feuchten Zustande an der Luft und am Lichte rasch grün färbt Sie ist etwas löslich in Wasser, ferner löslich in Weingeist, Aether, Chloroform, Benzol Die Lösungen des durch Oxydation veränderten Apomorphins in Wasser und Weingeist sind smaragdgrün, die in Aether und Benzol purpurviolett, die in Chloroform blauviolett gefärbt Freies Apomorphin muss in Wasser völlig löslich und ohne Rückstand verbrennbar sein

Aqua.

Aqua. Wasser. Eau. Water. H_2O . Mol. Gew = 18. Für den pharmaceutischen Bedarf kommen namentlich in Betracht 1) Gemeines Wasser und 2) Destillirtes Wasser

1 **Aqua fontana seu communis. Quellwasser. Brunnenwasser. Gemeines Wasser. Eau de fontaines. Fountain-water.** Unter diesen Namen versteht man in der Pharmacie zunächst dasjenige Wasser, welches zum Trinkgebrauch für Menschen dient, und zwar macht man die stillschweigende Voraussetzung, dass dieses Wasser möglichst

rein ist und nicht zu grosse Mengen gelöster Substanzen enthält. Die Pharmacie stellt in dieser Hinsicht etwa die gleichen Anforderungen wie die Mehrzahl der übrigen Gewerbe. Ist ein solches Wasser nicht zur Hand oder nur schwer zu beschaffen, so kann es durch Flusswasser (*Aqua fluviatilis*) oder durch Regenwasser (*Aqua pluviatilis*) ersetzt werden.

Das für den pharmaceutischen Gebrauch verwendete Wasser muss farblos, gänzlich oder fast geschmacklos, völlig klar sein und darf innerhalb 24 Stunden sich nicht merklich trüben oder einen Bodensatz abscheiden. Wenn das Wasser durch suspendirte Stoffe getrübt ist, so muss es filtrirt werden.

Filtration des Wassers. Für Wasser, welches keine riechen- oder schmeckenden Bestandtheile enthält, bei welchem also lediglich eine Abscheidung suspendirter Stoffe erforderlich ist, genügt eine einfache Filtration durch Filtrirpapier.

Hat man jedoch einen regelmässigen und grösseren Bedarf an solchem Wasser, so kommt diese Art der Filtration zu theuer, und es empfiehlt sich, an einem kühlen Orte einen Filtrir-Apparat dauernd in Thätigkeit zu halten. In den Gewerben benutzt man für diese und ähnliche Zwecke „Sandfilter“, und ein solches wird sich auch der Apotheker zweckmässig herstellen. — Als „Filtrirgefäss“ kann man ein konisches oder cylindrisches Gefäss aus Thon (glasirt) benutzen oder auch ein wasserdichtes Holzfass, bei grösserem Bedarf lässt man das Filtergefäss aus Mauerwerk herstellen und dies mit Cement wasserdicht abputzen. In Figur 81 ist zur Herstellung eines solchen Sandfilters ein konisches Thongefäss gewählt. Auf den Boden dieses Gefässes bringt man eine etwa 30 cm hohe Schicht gut abgewaschener, ca. faustgrosser Feldsteine oder Granitbruch. Auf diese schüttet man eine etwa 25 cm hohe Schicht von gewaschenen Steinen, die nur etwa $\frac{1}{3}$ so gross sind, dann folgt eine Schicht von etwa 20 cm Höhe von gewaschenem groben Kiese und hierauf folgt endlich eine Schicht von 40 cm gewaschenem Kiessand. Die unteren Schichten bilden lediglich die Träger für die auf sie folgenden oberen Schichten. Die eigentliche Filtrirschicht ist der zu oberst befindliche Kiessand und in diesem bildet wiederum die wirksame Filtrirmembran die oberste Schicht, in welcher die Zwischenräume zwischen den einzelnen Sandkörnchen sich mit den abzufiltrirenden schwebenden Verunreinigungen ausgefüllt haben. Daher arbeitet ein solches Filter auch dann am besten, wenn es eine gewisse Zeit in Thätigkeit ist. Auf das so vorbereitete Filter wird Wasser aufgegossen. Die Filtration beginnt sogleich, doch wird das filtrirte Wasser erst dann aufgefangen, wenn es völlig blank abzulaufen beginnt. Nach längerer oder kürzerer Zeit ist das Filter so weit verschmutzt, dass es einer Reinigung bedarf. Man entfernt dann die oberste Sandschicht, soweit sie verschmutzt ist (5–10 cm) und ersetzt diese Theile durch frisch gewaschenen Sand. Je öfter diese theilweise Reinigung ausgeführt wird, desto länger kann ein solches Filter benutzt werden, ohne dass es vollständig erneuert zu werden braucht.

Muss man gleichzeitig aus einem Wasser Riechstoffe oder färbende Substanzen entfernen, so schaltet man in das Filter noch eine Schicht Holzkohle in bohnen grossen Stücken ein. Und zwar bringt man diese alsdann zweckmässig in der aus grobem Kiese bestehenden Schicht unter. Das Filter hat alsdann folgende Anordnung:

A Steine faustgross 30 cm, B Steine eigross 25 cm, C Kies grob 10 cm, Holzkohle bohnen gross 20–30 cm, Kies grob 10 cm, D Kiessand 40 cm.

Ein solches mit Holzkohle beschicktes Filter eignet sich auch vorzüglich, um eisenhaltiges Wasser zu enteisen. s. S. 339.

Filter aus plastischer Kohle. Diese Filter waren eine gewisse Zeit lang recht beliebt. Es ist jedoch nachgewiesen worden, dass ein solches Filter in kurzer Zeit einen Heerd von Bakterienkeimen darstellt, so dass das durch ein solches Filter filtrirte Wasser schliesslich bakterienreicher ist als das nicht filtrirte. Aus diesem Grunde werden sie im allgemeinen in der Gegenwart nicht mehr empfohlen. Die Reinigung solcher Filter erfolgt, indem man sie in stark verdünnte Salzsäure einlegt, alsdann mit Sand vorsichtig abscheuert und auskocht.




Fig. 81. Sandfilter.




Fig. 82. BERKEFELD-Filter.

BERKEFELD-Filter. Diese Filter haben sich seit 1893 infolge der Furcht vor der Cholera eingebürgert und werden besonders im Anschluss an eine Wasserleitung mit 2—3 Atmosphären Druck angebracht. In beistehender Figur 82 ist *B* ein gusseisernes Gehäuse, welches bei *D* an die Hochdruckleitung angeschlossen und von dieser durch den Hahn *C* abgesperrt werden kann. *A* ist ein aus gebrannter Infusorienerde hergestellter hohler Cylinder. Soll das Filter funktionieren, so wird der Hahn *F* geschlossen, der Hahn *C* aber geöffnet. Das Wasser dringt alsdann in den Zwischenraum zwischen *B* und *A*, wird durch den Hohlzylinder aus Infusorienerde gepresst und fiesst bei *E* ab. Ein solches Filter liefert ein recht gut filtrirtes Wasser (die Anzahl der Bakterienkeime wird verringert), aber die Leistungsfähigkeit ist sehr gering. Diese beträgt im Anfange bei einem Druck von 3 Atmosphären etwa 2 Liter pro Minute, aber die Leistungsfähigkeit nimmt sehr rasch bedeutend ab. Dann muss das Filter auseinander genommen und der Filterkörper ausgekocht werden, kurz, auch die Wartung dieser Filter ist eine sehr umständliche.




Fig. 83. BERKEFELD-Filter-Batterie.

Filtrirmaterial. Das Filter besteht aus einem Behälter *d*, in welchem mit Asbestfilz überzogene, flache, poröswandige Hohlkörper *e* aufrecht stehend und in gewisser Anzahl derartig eingeschlossen sind, dass ihre Oberenden mit einem gemeinschaftlichen Entlüftungsröhrchen *f* und ihre Unterenden mit einem gemeinschaftlichen Abflussrohr *g* in Verbindung stehen. Der Behälter *d* kann sowohl mit einer Leitung für die zu filtrierende Flüssigkeit als auch mit einem Schlemmkanal und einem Behälter in Verbindung gesetzt werden, der eine Asbest-Emulsion enthält. Durch geeignete Vorrichtungen wird diese Emulsion auf die Hohlkörper *e* unter einem Drucke von 1,5 Atmosphären gepresst, sodass sich auf ihnen eine Asbestschicht ablagert. Nachdem die überschüssige Asbest-Emulsion abgelassen worden ist, wird die abgesetzte Schicht $\frac{1}{2}$ Stunde lang durch Luft von 150° C. sterilisirt und ist dann zum Gebrauche fertig. Fig. 84.




Fig. 84. BREYER's Mikromembran-Filter.

Die höchst feinen Asbestnadelchen, welche für dieses Filter gebraucht werden, nennt BREYER „Mikrolithen“. Das grösste Filter, welches *B.* fertigt, ist 2 m hoch, 1 m breit und liefert in der Stunde 250—500 l Wasser.

CHAMBERLAND's Filter (System PASTEUR) besteht aus einer 20 cm langen, 25 mm im Durchmesser haltenden, einseitig geschlossenen und am anderen Ende verjüngten Röhre aus gebranntem unglasirten Porcellan von 4—5 mm Wandstärke. Diese sog. „Filterkerzen“ werden einzeln oder zu Batterien vereinigt in einem Gehäuse *a* *f* untergebracht und bei *d* an die Wasserleitung angeschlossen. Das zu filtrierende Wasser wird von aussen in das Innere *c* der Filterkerze gedrückt und tritt von da durch *e* zu Tage. Eine Kerze kann täglich 40—50 l Wasser liefern, welches keimfrei ist. Das Reinigen der Filterkerzen geschieht durch Abbürsten der äusseren Flächen und durch Auskochen der ganzen Kerze. — Die quantitative Leistung des Filters ist gering, nach einigen Tagen erfolgt auch Durchwachsen der Bakterien. Fig. 85.

Die oben angeführten Filter nach BERKEFELD, BREYER und CHAMBERLAND verfolgen besonders das Ziel, Filtrate zu liefern, welche frei oder doch wenigstens arm an Mikroorganismen sind. Für die Filtration von Wasser in der Praxis kommen wohl die Filter von BERKEFELD und von BREYER in Betracht. Das von CHAMBERLAND dient vorzugsweise zur Gewinnung steriler Flüssigkeiten bei wissenschaftlichen, bakteriologischen Arbeiten.

Sand-Kohle-Filter. Ein für die meisten Zwecke sehr empfehlenswerther Apparat wird in folgender Abbildung Fig. 86 wiedergegeben:¹⁾

Er besteht aus 3 Töpfen (*ABC*) aus Steingut oder feuerfestem Thon, von welchen der erste *A* um $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mal grösser ist als die Töpfe *B* und *C*. Der Topf *A* hat über seinem Boden einen Tubus. Die nach innen gehende Oeffnung des Tubus wird mit einem Bausch Asbest lose bedeckt, darüber eine Schicht reiner gewaschener Granitsteine geschüttet, die Steinschicht dann mit einer Schicht grober Kohlenstücke bedeckt, die bis fast zur Mitte des Topfes reicht. Auf die Kohlschicht wird ein reines ausgewaschenes leinenes Tuch (oder eine Filzscheibe) gelegt und darüber noch eine 20 cm hohe Schicht Sand gegeben. Mittels Tubus und eines Glasrohres steht der Topf *A* mit dem Topfe *B* in Kommunikation. Dieser Topf *B* ist in ganz derselben Art und Weise mit Stein, Kohle und Kies, im ganzen jedoch nur bis zur Hälfte seiner Höhe beschickt und die oberste Sandschicht noch mit einer Schicht Fließpapier und einer eng anliegenden Filzscheibe bedeckt, welche mit einigen reinen Granitsteinen beschwert ist. Der Topf *B* communicirt mit einem leeren Topfe *C*, in welchem sich das filtrirte Wasser ansammelt. Wird der Topf *A* mit dem zu filtrirenden Wasser gefüllt, bis das Filtrat in den Topf *C* niederzurinnen beginnt, so fällt sich letzterer allmählich ungefähr zu $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$. Um ihn voll zu haben, müsste man also den Topf *A* noch 1 oder 2 mal nachfüllen. Der Topf *C* hat über seinem Boden einen zinnernen Hahn zum Abzapfen des filtrirten Wassers. Es kommt nun ganz auf die Beschaffenheit des Wassers an, wie lange ein solcher Apparat bis zu einer neuen Beschickung mit Kohle und Sand brauchbar ist. Ein Zeitraum von mehr als 4 Wochen dürfte in der wärmeren Jahreszeit wohl nicht zu überschreiten sein.




Fig. 85.
CHAMBERLAND-Filter.

Diese ohne besondere Unkosten von Jedermann leicht selbst zusammenzustellenden und zu reinigenden Apparate sind in jeder Beziehung zu empfehlen. Wenn irgendwo, so gilt gerade bei der Filtration von Wasser der Grundsatz: Das Einfachste ist das Beste.

II. Aqua destillata. Aqua stillatitia. Destillirtes Wasser. Eau distillée.

Distilled water. Ist ein von den gewöhnlichen Verunreinigungen praktisch vollständig befreites Wasser. Es soll frei sein von gelösten festen Substanzen, von Chlor, von Salpetersäure und salpetriger Säure, ausserdem Ammoniak und Kohlensäure nur in Spuren enthalten. — Auch das reinste destillirte Wasser ist nicht etwa lediglich die chemische Verbindung H_2O , vielmehr enthält es stets noch kleine Mengen von Verunreinigungen, doch sollen diese auf ein praktisch noch zulässiges Maass reducirt sein.

Für die Darstellung des destillirten Wassers ist zu beachten, dass das als Ausgangsmaterial dienende Brunnenwasser durchweg Magnesiumchlorid enthält. Dieses spaltet in der Siedehitze unter Uebergang in Magnesiumoxychlorid Salzsäure ab, wodurch das Destillat chlorhaltig wird. Jedes Brunnenwasser enthält ferner Kohlensäure, welche gleichfalls in das Destillat geht. Diese Verunreinigungen kann man in den meisten Fällen dadurch beseitigen, dass man die ersten Antheile des Destillates verwirft und das Destillat erst dann und nur so lange sammelt, als es sich als frei von Chlor und Kohlensäure erweist. — Enthält das Brunnenwasser aber — wie dies meist der Fall ist — Ammoniak,




Fig. 86. Wasserfiltrirapparat.

a Granitbruch. *b* Grobe Kohlenstücke. *g* Sandschicht, zur Hälfte aus groben, zur andern Hälfte aus feinem Kies bestehend.

durch beseitigen, dass man die ersten Antheile des Destillates verwirft und das Destillat erst dann und nur so lange sammelt, als es sich als frei von Chlor und Kohlensäure erweist. — Enthält das Brunnenwasser aber — wie dies meist der Fall ist — Ammoniak,

¹⁾ Diesen Filtrirapparat erhält man in der MARCH'schen Thonwaarenfabrik zu Charlottenburg, in der Niederlage pharm. Geräthschaften von WARMERUN, QUILITZ & Co. in Berlin etc.

so begleitet dieses fast das gesammte Destillat, wenn es nicht durch geeignete Chemikalien (Aluminiumsulfat) gebunden wird

Die relativ kleinen Mengen destillirten Wassers, welche in der Pharmacie verbraucht werden, kann man mit Hilfe des in jedem Apotheken Laboratorium vorhandenen Destillir Apparates gewinnen. Um ein tadelloses, haltbares Wasser zu erhalten, muss die (kupferne) Destillirblase sauber ausgescheuert werden. Helm und Kuhlischlange sollen aus Zinn, bezw. verzinkt sein. Als Auffanggefäss benutzt man eine Flasche, nicht einen Topf oder ähnliche Gefässe mit weiter Oeffnung.

Darstellung. Man füllt die saubere Destillirblase zu $\frac{3}{4}$ ihres Rauminhaltes mit gemeinem Wasser, fugt (um das Ammoniak zurückzuhalten) pro Liter 0,5–1,0 g kryst. Alaun hinzu und heizt an. Wenn die Dampfbildung beginnt, lässt man den Dampf zunächst einige (10) Minuten ohne zu kühlen durch die Kuhlischlange streichen. Diese wird hierdurch gereinigt, sozusagen sterilisirt. Alsdann lässt man das Kühlwasser zutreten. Man verwirft das jetzt übergehende Destillat so lange, als es noch durch Bleessig und durch Silbernitrat getrübt wird. Erst wenn beides nicht mehr der Fall ist, sammelt man die weiteren Theile des Destillates als reines destillirtes Wasser.

Im weiteren Verlaufe der Destillation hat man alsdann nur noch nöthig, von Zeit zu Zeit mit Silbernitrat auf Chlor zu prüfen. Sollte dieses im späteren Verlaufe der Destillation (infolge Einwirkung des Alauns auf das Magnesiumchlorid) im Destillate auftreten, so schüttet man durch den Tubus der Blase das halbe Gewicht des vorher angewendeten Alauns an krystall. Natriumphosphat hinzu, destillirt weiter und fangt das Destillat wieder auf, sobald es chlorfrei ist, was übrigens bald der Fall sein wird. Die Destillation wird unterbrochen, wenn in der Blase nur noch der fünfte Theil des vorher eingefüllten Wassers vorhanden ist.

Besitzt das erhaltene destillirte Wasser einen Geruch nicht, so kann es ohne weiteres verwendet werden. Im anderen Falle empfiehlt es sich, dasselbe noch durch ein mit sehr gut ausgewaschener Holzkohle beschicktes Filter zu filtriren, ein Verfahren, welchem in gut geleiteten Laboratorien grundsätzlich alles destillirte Wasser unterworfen wird.

In Laboratorien, welche dauernd einen Dampfapparat geheizt erhalten, kann man ganz erhebliche Mengen destillirtes Wasser auch lediglich mit diesem allein gewinnen, natürlich ist alsdann die Aufwendung grosser Sorgfalt erforderlich, um eine Verunreinigung des Wassers in dem Dampfkessel und damit auch in den meisten Fällen des destillirten Wassers zu vermeiden.

Eigenschaften. Reines destillirtes Wasser ist eine völlig klare, geruch-, geschmack- und farblose, neutrale Flüssigkeit, welche ohne einen Rückstand zu hinterlassen sich verdampfen lässt, und welche frei ist von Chlor, salpetriger Säure, Salpetersäure und von Kohlensäure. Ammoniak darf es nur in ausserst geringen Spuren enthalten.

Prüfung. 1) Man verdampft $\frac{1}{4}$ Liter des Wassers in einer blanken Platinschale, in Ermangelung dessen einige Cukilcentimeter in einem blanken Gläschchen. Es darf alsdann kein wägbarer, bezw. leicht wahrnehmbarer Rückstand hinterbleiben. Einen Aufzug eines Rückstands (konzentrische Ringe) wird zwar fast jedes destillirte Wasser zeigen, dieser Rückstand entstammt in den meisten Fällen den Aufbewahrungsgefässen. 2) Versetzt man 50 ccm des Wassers mit 1 ccm farblosem Nessler'schem Reagens, so darf die Flüssigkeit nicht gelb oder röthlich gefärbt erscheinen. Die Beobachtung ist über einer weissen Unterlage vorzunehmen. 3) 20–30 ccm werden mit je 2–3 Tropfen Salpetersäure und Silbernitratlösung versetzt, es darf keine opalisirende Trübung auftreten. 4) 20 ccm des Wassers, mit 40 ccm klarem Kalkwasser versetzt, müssen eine klare Mischung geben (Trübung zeigt Kohlensäure an). — 5) 100 ccm des Wassers werden mit 1 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzt und zum Sieden erhitzt. Darauf giebt man 0,3 ccm Kaliumpermanganatlösung 1:1000 hinzu und hält 3 Minuten lang im Sieden. Die Flüssigkeit muss nach dieser Zeit noch deutlich roth gefärbt sein. Ist sie farblos, so enthält sie organische Stoffe in unzulässiger Menge.

Aufbewahrung. Das destillirte Wasser muss in wohlverschlossenen Flaschen (am besten Glasstopselflaschen) an einem kühlen Orte, vor direktem Sonnenlichte geschützt, aufbewahrt werden.

Anwendung. Als Auflösungsmittel in der Pharmacie und Chemie vielfach gebraucht. Es ist stets da anzuwenden, wenn das gemeine Wasser vermuthlich Verunreinigungen mit den Arzneisubstanzen eingehen wird, welche nicht beabsichtigt worden sein

können. Der Receptar muss als berechtigt angesehen werden, in solchen Fällen destillirtes Wasser anzuwenden und zu berechnen, selbst wenn der Arzt „gemeines Wasser“ verordnet haben sollte.

Herstellung grösserer Mengen von destillirtem Wasser. Die Gewinnung grösserer Mengen von destillirtem Wasser, wie sie etwa für die Mineralwasser-Fabrikation gebraucht werden, würde mittelst der in den Apotheken-Laboratorien vorhandenen Destillir-Apparate auf die Dauer zu kostspielig sein. Diese Apparate sind zwar vorhanden, bedürfen also keines weiteren Anschaffungskapitals, aber der Verbrauch an Heizmaterial ist im Verhältnis zu dem gelieferten destillirten Wasser ein unverhältnissmässig höher, sie verbrauchen ferner enorme Mengen Kühlwasser, auch sind diese Apparate im besten Falle immer nur von geringer Leistungsfähigkeit. — Man ist daher dazu übergegangen, Apparate lediglich zur Gewinnung von destillirtem Wasser zu konstruiren. Die dabei befolgten




Fig. 87.

Grundsätze sind folgende: Es wird eine möglichst grosse Ausnutzung des Heizmaterials angestrebt. Die zur Kondensation des Wassers erforderliche Menge Kühlwasser wird auf das zulässige Minimum beschränkt. Infolgedessen ist ein Theil des Kühlwassers stets kochendheiss und dieses heisse Kühlwasser wird automatisch zum Speisen der Destillirblase verwendet.

Im Nachstehenden veranschaulichen wir zwei von E. A. LENTZ-Berlin konstruirte Apparate, von denen der eine für freie Feuerung, der andere im Anschluss an eine bestehende Dampfanlage hergestellt ist.

Apparat mit selbständiger Heizung. Fig. 87. Die aus Kupfer hergestellte Blase wird durch die Feuerung *F* geheizt; zur besseren Ausnutzung der Hitze ist die Blase noch mit einem Siederohr *S* versehen. Die entwickelten Dämpfe gehen durch den abnehmbaren Dom *D* nach dem Kühlcylinder *K*. Die Konstruktion desselben siehe in folgender Abbildung. *N* ist das Niveauehaltungsgefäss, welches einerseits das aus dem Kühler kochend heiss abfliessende Kühlwasser aufnimmt, andererseits dasselbe der Blase in dem Maasse zuführt, dass das Niveau in derselben konstant bleibt. *R* ist eine Reinigungsbatterie. Dieselbe ist für gewöhnlich nicht erforderlich; sie tritt meist nur dann in Wirkung, wenn Wasser, welches riechende Stoffe enthält (sog. Grachtwasser) destillirt werden soll.

Apparat mit angeschlossenem Dampfkessel. Der in Figur 88 abgebildete Apparat ist räumlich über einem Dampfkessel, z. B. in einer höheren Etage, aufgestellt gedacht. Der Destillirapparat ist doppelt konstruirt, d. h. es sind 2 Blasen und 2 Kondensatoren vorhanden.

Der Dampf des in einer tieferen Etage aufgestellten Dampfkessels dringt in der Richtung der Pfeile in den Heizkörper der Blase, welcher die Gestalt zweier aneinander gelegter Linien hat. Er erwärmt das umgebende Wasser, wird dabei selbst kondensiert, das Kondensationswasser fliesst durch ein am Boden des Heizkörpers befindliches Rohr wieder in den Dampfkessel zurück. Die in der Blase entwickelten Wasserdämpfe gehen durch das Abzugsrohr in den Kondensator, von da als Wasser durch den gemeinschaftlichen Trichter in den Nachkühler. Das im Kühler fast bis zur Siedehitze erhitze Wasser läuft nach dem Niveauehaltungsgefäss, welches die Aufgabe hat, das Wasser in der Destillirblase konstant durch Zufluss von kochendem Wasser auf gleichem Niveau zu halten.

Der Kondensator besteht, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, aus concentrisch angeordneten Cylindern und einer zwischen beiden liegenden Kühltzange, welche gesonderten Zu- und Abfluss haben. Die Kühltzange füllt den Raum zwischen beiden Cylindern.




Fig. 89.

den fast aus, sodass der Dampf genöthigt ist, so oft um die Wandungen der Kühltzange herumzulaufen, als die Schlange Windungen hat.

Beide Apparate setzen zwar eine erhebliche Ausgabe für die Anschaffung voraus, aber einmal vorhanden, sind sie ausserordentlich leistungsfähig, ausserdem aber sehr sparsam in Bezug auf die Betriebskosten, d. h. den Verbrauch an Heizmaterial und an Kühlwasser.

III. Aqua sterilisata. Sterilisirtes Wasser. Eau sterilisée. Sterilised water. Weder das destillirte noch das gemeine Wasser sind für gewöhnlich keimfrei, sie enthalten vielmehr — und namentlich nach längerem Stehen bei Zimmertemperatur — sehr häufig ganz kolossale Mengen von Mikro-Organismen. Bisweilen kann der Arzt Werth darauf legen, zu irgend einem Zwecke keimfreies bzw. sterilisirtes Wasser zu verwenden. Die einfachste Art der Sterilisation ist, dass man das Wasser während 5 bis 10 Minuten im Sieden erhält. Hierdurch werden mit Sicherheit alle lebenden Mikro-Organismen getödtet. Allerdings wäre es möglich, dass Dauerformen der letzteren, das sind die „Sporen“, die Kochhitze überdauern. Will man auch diese mit Sicherheit unschädlich machen, so würde man das Abkochen an drei auf einander folgenden Tagen zu wiederholen haben (diskontinuirliche Sterilisation). Sterilisirt man unter Watte-Verschluss, so bleibt das Wasser steril, solange der Watte-Verschluss nicht entfernt wird.

Es empfiehlt sich, täglich einen Kolben mit Wasser durch Abkochen zu sterilisieren und nach jedesmaligem Gebrauch des Wassers die Sterilisation immer von neuem auszuführen. Dieses sterilisierte (destillierte) Wasser wäre grundsätzlich zu verwenden für subcutane Injektionen und für Augenhilfsmittel. Am zweckmässigsten wäre es allerdings, wenn für Receptur-Zwecke überhaupt nur sterilisiertes Wasser verwendet würde.

IV Trinkwasser Es muss zwar zugegeben werden, dass die chemische Analyse allein nicht im Stande ist, in jedem Falle ein abschliessendes Urtheil über ein zu Trinkzwecken bestimmtes Wasser abzugeben, immerhin aber stellt sie doch einen wichtigen Theil der gesammten Wasser Untersuchung dar. Von den auszuführenden Bestimmungen sind die wichtigsten die folgenden:

1) Prüfung durch die Sinne. Jedes zu beurtheilende Wasser ist zunächst auf seine äusseren Eigenschaften zu prüfen und zwar, wenn es möglich ist, an Ort und Stelle. Man stellt fest, ob es klar ist, ob es geruchlos und geschmacklos und ob es gefärbt ist. Die letztere Feststellung trifft man so, dass man das Wasser in eine zu diesem Zwecke ein für alle Male bestimmte weisse Flasche giesst und in grosserer Schicht über einer weissen Unterlage beobachtet. Auf den Geschmack prüft man durch Trinken des Wassers aus einem Trinkglase, auf den Geruch prüft man, nachdem das frisch entnommene (!) Wasser kräftig umgeschüttelt worden ist.

Hierauf sind alsdann sogleich einige qualitative Reactionen anzustellen. Insbesondere ist sofort auf salpetrige Säure und auf Ammoniak zu prüfen, da die erstere häufig sich erst im Verlaufe der Aufbewahrung bildet, das letztere aber bisweilen nach einigen Tagen verschwindet. Ebenso ist die Prüfung auf Salpetersäure bald nach der Einlieferung anzustellen.

Eine Probe des Wassers bewahrt man an einem kühlen schattigen Orte unter Watteverschluss auf. Man schüttelt gelegentlich um und prüft, ob später etwa ein Geruch wahrzunehmen ist. War das Wasser nach 24stündigem Stehen klar geblieben, so können die zu besprechenden Bestimmungen nunmehr ausgeführt werden. Hatte es sich getrübt, so lässt man es unter gelegentlichem Umschütteln solange (2—3 Tage) stehen, bis eine weitere Trübung nicht erfolgt und Klärung des Wassers eingetreten ist. Alle gemachten Beobachtungen werden notirt.

Man filtrirt hierauf das Wasser, stellt mit dem Mikroskope fest, aus was ein etwa vorhandener Bodensatz besteht und benutzt zu den folgenden Bestimmungen das Filtrat.

2) Gesamtrückstand. Man verdampft in einer gewogenen Platinschale $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ l des Wassers auf dem Wasserbade zur Trockne. Der Abdampf-Rückstand wird alsdann bei einer bestimmten Temperatur bis zum konstanten Gewicht getrocknet, schliesslich gewogen. Als Trocknungstemperatur wurde früher 180°C gefordert, jetzt nimmt man meist 120°C an. Jedenfalls ist in dem Bericht anzugeben, bei welcher Temperatur getrocknet wurde. — Der Trockenrückstand ist alsdann auch auf sein äusseres Aussehen zu prüfen. Körnige Beschaffenheit weist darauf hin, dass er im wesentlichen aus Calciumcarbonat besteht. Ist er faserig, glänzend, so enthält er grössere Mengen von Gips. Auch auf seine Färbung ist zu achten, da sie von Eisenverbindungen, aber auch von gelbsten organischen Substanzen herrühren kann.

3) Glührückstand. Der gewogene Verdampfungsrückstand wird nunmehr über kleiner Flamme (Pilzbrenner!) auf sehr dunkle Rothgluth erhitzt. Eine stärkere Erhitzung ist zu vermeiden, weil sich sonst Alkalichlorid, insbesondere Kaliumchlorid, verflüchtigen kann. Man achtet auf die Veränderungen und Erscheinungen, welche beim Erhitzen auftreten. Der Abdampf-Rückstand eines guten Trinkwassers färbt sich beim Erhitzen nur einen kurzen Augenblick etwas dunkler. Tritt deutlich wahrnehmbare Verkohlung ein, so ist dies ein Beweis dafür, dass erheblichere Mengen organischer Substanz vorhanden sind. Auch auf den namentlich zu Anfang des Erhitzens auftretenden Geruch ist zu achten. Urinöser Geruch tritt bei urinhaltigen Wassern auf, der Geruch nach versengten Federn weist darauf hin, dass noch nicht mineralisierte Eiweissverbindungen zugegen sind. Das Erhitzen wird solange fortgesetzt, bis der Glührückstand weiss erscheint, bezw. bis alles organische verbrannt ist.

Durch das Gluhen werden die Nitate und Nitrite vollständig, die Carbonate zum grössten Theile in Oxyde übergeführt. Conventional wird der Glührückstand erst dann gewogen, nachdem die Oxyde wiederum in Carbonate übergeführt sind. Zu diesem Zwecke befeuchtet man den erkalteten Glührückstand mit einer Lösung von Ammoniumcarbonat, dunstet auf dem Wasserbade zur Trockne, erhitzt alsdann $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde im Luftbade bei der nämlichen Temperatur, bei welcher der Rückstand vorher erhitzt worden war (120 bez. 180°C) und wägt. Dieses Verfahren ist so oft zu wiederholen, bis Gewichtskonstanz erreicht ist.

4) **Glühverlust** Als solcher wird die Differenz zwischen dem Trockenrückstand sub 2 und dem Glührückstand sub 3 in Rechnung gestellt. Bisweilen wird dieser Werth auch als „organische Substanz“ bezeichnet, doch ist dies eigentlich nicht zulässig.

Der gewogene Glührückstand wird zu den folgenden Bestimmungen 5—8 verwendet.

5) **Kieselsäure** Man befeuchtet ihn mit Wasser, fugt unter Bedecken mit einem Uhrglas vorsichtig einen Ueberschuss stark verdünnter Salzsäure hinzu, erwärmt auf dem Wasserbade bis zur Auflösung bez. bis zum Aufhören der Kohlensäureentwicklung, spritzt das Uhrglas ab und dunstet die Lösung zur Trockne ab. Dann erhitzt man den Rückstand eine Stunde lang auf 150°C , nimmt ihn mit Salzsäure auf, fugt Wasser hinzu, erwärmt, filtrirt durch ein aschebraues Filter und wäscht dieses zuerst mit warmer verdünnter Salzsäure, schliesslich mit heissem Wasser aus. Die auf dem Filter zurückbleibende Kieselsäure wird im Platintiegel, zuletzt vor dem Gebläse, gegluht und gewogen. — Bei Wässern, welche viel Gips enthalten, muss man genügende Mengen Salzsäure (I) anwenden und hinreichend lange erwärmen, damit auch alles ausser der Kieselsäure in Lösung geht.

6) **Eisenoxyd + Aluminiumoxyd** Das salzsaure Filtrat von Nr 5 wird in einer Schale aus Platin oder Porcellan mit etwas Ammoniumchlorid, sodann mit Ammoniak in geringem Ueberschuss versetzt. Man erwärmt auf dem Wasserbade solange, bis der Geruch nach Ammoniak verschwunden ist und die Flüssigkeit neutral ist. Man prüft unbedingt mit Lackmuspapier. Erhitzt man zu lange, so wird die neutrale Lösung wieder sauer, und Thonerdehydrat geht in beträchtlicher Menge in Lösung. Der Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, mit heissem Wasser gewaschen, getrocknet und nach dem Glühen im Platintiegel gewogen. — In den meisten Fällen setzt man den so erhaltenen Werth als Eisenoxyd + Thonerde in Rechnung und verzichtet auf die Trennung dieser beiden. Wird dieselbe aber verlangt, so verfährt man wie folgt.

Man scheidet nochmals aus einer neuen Menge Wasser die Kieselsäure ab, fällt Eisen und Thonerde mit Ammoniak als Hydroxyde, und wäscht den Niederschlag aus. Nun kann man nach zwei Methoden weiter arbeiten. a) Man löst den noch feuchten Niederschlag in warmer Salzsäure, wäscht das Filter nach und trägt die salzsaure Lösung in eine siedende, von Thonerde und Eisen freie Lösung von Natriumhydrat (s. *Natrio*) ein, welche sich in einer Platinschale befindet. Man filtrirt das Eisenhydroxyd ab, wäscht es einige Male aus, löst es in Salzsäure, fällt mit Ammoniak und wägt als Eisenoxyd. — b) Man löst den noch feuchten Niederschlag in verdünnter Schwefelsäure, reducirt das Eisenoxydsalz durch Einsetzen eines Stückes eisenfreien Zinks zu Eisenoxydul und titirt die vom Zink getrennte Lösung mit Kaliumpermanganat. Siehe *Ferrum*.

Kennt man den Werth von Eisenoxyd + Thonerde, andererseits denjenigen des Eisenoxyds, so findet man durch Subtraktion den Werth für die Thonerde und umgekehrt.

7) **Calciumoxyd** Das ammoniakalische Filtrat von 6 wird, eventuell nach Zusatz von etwas Ammoniak, erwärmt, mit einem Ueberschuss von Ammoniumoxalat in der Hitze gefällt und 12 Stunden an einem warmen Orte bei Seite gestellt. Dann filtrirt man ab, wäscht den Niederschlag mit heissem Wasser aus und fahrt ihn durch Glühen — zuletzt vor dem Gebläse — in Calciumoxyd über. — War das Filtrat von Nr 6 zu stark verdünnt (zu lang!), so kann es durch Eindampfen vor der Fällung concentrirt werden, doch macht man es zweckmässig vor dem Eindampfen mit Salzsäure schwach sauer und stellt vor der Fällung die alkalische Reaktion durch Zusatz von Ammoniak wieder her. — Bei ganz genauen Analysen ist das gewogene Calciumoxyd in Salzsäure zu lösen und nach Zusatz von Ammoniumchlorid und Ammoniak nochmals mit Ammoniumoxalat zu fällen und wie vorher zu behandeln. Das zweite Gewicht ist das richtigere, da das Calciumoxalat stets kleine Mengen Magnesiumoxalat mit niederreiss. Das Filtrat von der zweiten Fällung ist alsdann mit dem zuerst erhaltenen Hauptfiltrat natürlich zu vereinigen.

8) **Magnesium** Das Filtrat (bezw. die Filtrate) von 7 werden wiederum salzsauer gemacht, auf etwa 100 cem eingeeengt, dann mit Ammoniak alkalisch gemacht und durch Zusatz von Dinatriumphosphat die Magnesia unter Umrühren gefällt. Man fängt den Niederschlag durch Glühen in Magnesiumpyrophosphat über.

9) **Chlor** Wird in Trinkwassern gewöhnlich massanalytisch bestimmt. Man titirt nach Mohr mit $\frac{1}{20}$ Silbernitratlösung und Kaliumchromat als Indikator oder nach Volhard in salpetersaurer Lösung. Uebrigens ist zu beachten, dass beide Methoden nur relativ richtige Werthe geben. Die beiden Methoden geben selten untereinander oder mit der Gewichtsanalyse völlig übereinstimmende Resultate.

10) **Schwefelsäure** Man sauert 200—500 cem Wasser mit Salzsäure an, erhitzt zum Sieden und fällt mit Baryumchlorid. Vgl. *Acidum sulfuricum* S. 126. Müssen grössere Mengen Wasser abgedampft werden, so ist zu beachten, dass das Leuchtgas nicht unbeträchtliche Mengen von Schwefel enthält, welche beim Verbrennen Schwefelsäure liefern, die in die abzdampfenden Flüssigkeiten gelangen kann. Man arbeitet alsdann mit Weingast-Flammen, um diese Fehlerquelle auszuschliessen.

11) **Salpetersäure** Qualitativ. 1) Man vermischt 5 cem konc. reine Schwefelsäure mit 1 cem Diphenylamin-Lösung (s. Reagentien) und schichtet auf diese Lösung einige

Kühlkentimeter des Wassers Bei Gegenwart von Salpetersäure tritt Blaufärbung auf 2) Man bringt in ein Kölbchen, welches auf einen Porcellanteller gestellt wird, 20 ccm Wasser und giebt 40 ccm conc. reine Schwefelsäure hinzu, mischt vorsichtig und lässt nun tropfenweise Indigolösung (s. weiter unten) unter Umschwenken einfallen Ist Salpetersäure zugegeben, so verschwindet die Blaufärbung

Quantitative Bestimmung Man bedarf folgender Lösungen a) *Kaliumnitrat Lösung* in 1 ccm = 0,001 g Salpetersäure N_2O_5 enthaltend Man löst 1,871 g reines, scharf getrocknetes Kaliumnitrat in 1 l destillirtem Wasser auf

b) *Indigo Lösung* Man reibt 2,0 g reinen Indigo-Karmin (Indigotin Merck) mit 40,0 g reiner conc. Schwefelsäure im Porcellan-Mörser an, spült die Mischung mit Wasser in eine Porcellan-Schale, füllt die Lösung alsdann in einer Flasche mit destillirtem Wasser auf 1800 ccm auf, lässt sie 1–2 Tage stehen und filtrirt sie sehr sorgfältig Die Färbung der Lösung muss so sein, dass sie in einer Schicht von 12–15 mm anfängt durchsichtig zu werden Die Titerstellung dieser Lösung geschieht wie folgt

Titerstellung Man verdünnt 1 Volum der oben angegebenen Kaliumnitratlösung mit 9 Vol. Wasser, so dass 10 ccm dieser Lösung = 0,001 g N_2O_5 enthalten Von dieser Lösung bringt man 10 ccm in ein Erlenmeyer-Kölbchen von 200–300 ccm Fassungsvermögen, giebt 15 ccm destillirtes Wasser, sowie ein einziges Körnchen Kochsalz, schliesslich 5 ccm Indigolösung hinzu und mischt durch Schwenken Zu dieser Flüssigkeit lässt man alsdann am Rande des Kölbchens hinunter, aber auf einmal, soviel conc. reine Schwefelsäure zufließen, als das Volumen der Kaliumnitratlösung + destill. Wasser + Indigo-Lösung beträgt, also in unserem Beispiel 30 ccm und schüttelt tüchtig um Tritt Entfärbung ein, so lässt man zu der Reaktionsflüssigkeit Indigolösung bis zur bleibenden Blaufärbung zufließen Angenommen, es wurden hierzu noch 3 ccm verbraucht, so dass also im ganzen $(5 + 3) = 8$ ccm Indigolösung angewendet worden wäre

Man mischt nun zu einem zweiten Versuche die vorher angegebenen Mengen Kaliumnitratlösung, destill. Wasser und Kochsalz zusammen, setzt aber dieser Lösung gleich 5 ccm Indigolösung mehr zu, als bei dem ersten Versuche im ganzen verbraucht worden war In unserem Beispiele also $(8 + 5 \text{ ccm}) = 13 \text{ ccm}$ Nachdem die Flüssigkeit gemischt ist, lässt man am Rande des Kolbens auf einmal ein der Reaktionsflüssigkeit gleiches Volumen (in unserem Beispiel also 38 ccm) conc. Schwefelsäure zufließen und mischt durch Umschwenken Bleibt die Blaufärbung bestehen, so ist Indigo im Überschusse vorhanden Man sucht nun in neu anzusetzenden Versuchen unter Anwendung geringer Mengen Indigolösung den Punkt zu treffen, bei dem die Reaktionsflüssigkeit nach dem Zumischen der Schwefelsäure meergrüne Färbung annimmt In unserem Beispiele setzt man also bei einem dritten Versuche 10 ccm Indigolösung hinzu Je nachdem dies zu viel oder zu wenig ist, wendet man bei einem vierten Versuche 9 ccm oder 11,5 ccm Indigolösung an u s w

Die zur Erzielung der meergrünen Färbung nöthige Menge Indigo-Lösung zeigt 0,001 g Salpetersäure N_2O_5 an Es ist zweckmässig, wenn die Lösung so eingestellt wird, dass 0,001 g $N_2O_5 = 6–8–10$ ccm Indigolösung entsprechen

Übereinstimmende, genaue Resultate werden nur dann erhalten, wenn die Mischung gerade die zur meergrünen Färbung erforderliche Menge Indigolösung enthält, es ist also nicht statthaft, mit Indigo bis zur meergrünen Färbung auszutitriren Ausserdem muss der Reaktionsflüssigkeit stets ein ihr annähernd gleiches Volumen conc. reiner Schwefelsäure zugesetzt werden

Versuch Von dem zu prüfenden Wasser bringt man 25 ccm in einen Kolben, dazu 10 ccm Indigolösung, ein Körnchen Kochsalz, mischt und lässt 35 ccm conc. reiner Schwefelsäure zufließen und stellt durch Zufließenlassen von Indigolösung oder durch Anwendung geringerer Mengen Wasser fest, wieviel Indigolösung ungefähr zur Hervorbringung der meergrünen Färbung erforderlich ist

Hat man in dieser Weise den Salpetersäuregehalt des Wassers ungefähr ermittelt, so wendet man zu den entscheidenden Versuchen soviel Wasser an, dass die vorhandene Menge Salpetersäure etwa 0,001 g N_2O_5 entspricht, und titirt wie bei der Titerstellung auf meergrüne Färbung Wurde z. B. durch die Vorversuche ermittelt, dass in 10 ccm Wasser etwa 0,001 g N_2O_5 enthalten sind, so mischt man 10 ccm Wasser mit 15 ccm destillirtem Wasser, giebt ein Körnchen Kochsalz sowie 10 ccm Indigolösung und 35 ccm conc. Schwefelsäure hinzu und sucht den genauen Werth wie bei der Titerstellung in mehreren Versuchen zu treffen — Enthält ein Wasser viel Salpetersäure, so ist es mit destillirtem Wasser passend zu verdünnen

12) **Salpetrige Säure** Qualitativ 1) Man giebt 50–100 ccm des zu untersuchenden Wassers in ein Becherglas, fügt 2 ccm Zinkjodid-Stärkelösung sowie 2 ccm verdünnte Schwefelsäure hinzu und rührt um Entsteht sofort Blaufärbung, so ist dies ein Beweis für die Anwesenheit ansehnlicher Mengen salpetriger Säure Tritt Blaufärbung nicht sogleich ein, so stellt man das Glas ins Dunkle und daneben ein Kontrollglas, welches

50–100 ccm destillirtes Wasser mit den gleichen Mengen der Reagentien vermischt enthält Man beobachtet, ob innerhalb 15 Minuten eine Färbung des Versuchsglases eintritt, während das Kontrollglas ungefärbt bleibt Färbungen, welche erst nach dieser Zeit auftreten, lassen sich zu sicheren Schlussfolgerungen nicht verwerthen Der Versuchsraum muss frei sein von Dämpfen des Chlor, Brom, der Salpetersäure und der salpetrigen Säure

2) Nach Gmbs Man sanert 20 ccm Wasser mit verdünnter Schwefelsäure an und fügt schwefelsaures Metaphenylendiamin hinzu Bei Anwesenheit von salpetriger Säure entsteht eine gelbbraune Färbung, welche durch Bildung des Azofarbstoffes Triamidoazobenzol, d. i. Bismarckbraun, bedingt wird

8) Nach LUNGE Man bedarf hierzu folgender Lösungen LUNGE'sches Reagens 0,1 g reinweisses α Naphthylamin wird durch $\frac{1}{4}$ stündiges Kochen mit 100 ccm Wasser aufgelöst Man setzt zunächst 5 ccm Eisessig und alsdann eine Lösung von 1 g Sulfamylsäure in 100 ccm Wasser hinzu Diese Lösung wird, vor Licht geschützt, in gut verschlossenen Gefässen aufbewahrt Schwach rosaröthe Färbung derselben stört nicht, eine stärkere Färbung kann durch Schütteln mit Zinkstaub leicht beseitigt werden

Man versetzt in einem Colorimeter Cylinder 40 ccm des zu untersuchenden Wassers mit 1 ccm von obigem Reagens, fügt sogleich 5 g krystall Natriumacetat hinzu, schüttelt gut durch und lässt 10 Minuten lang stehen Zeigt sich nach dieser Zeit eine rosaröthe Färbung, so ist salpetrige Säure zugegen

Bestimmung Diese erfolgt colorimetrisch nach der LUNGE'schen Reaktion Die Vergleichslösung stellt man wie folgt her

Nitritlösung Man löst 0,03632 g reines Natriumnitrit ($= 20 \text{ mg } \text{N}_2\text{O}_2$) in 100 ccm reinem Wasser Von dieser Lösung fügt man 10 ccm zu 90 ccm reiner Schwefelsäure Diese letztere Lösung enthält in 1 ccm $= 2/100 \text{ mg } \text{N}_2\text{O}_2$ und ist die zum Vergleich bestimmte Nitritlösung

Man versetzt also in einem Colorimeter Cylinder 40 ccm des zu untersuchenden Wassers mit 1 ccm LUNGE'schem Reagens und rührt gut durch Zu gleicher Zeit hatte man Controlcylinder beschickt mit je 40 ccm destillirtem Wasser, je 1 ccm LUNGE'schem Reagens und je 5 g Natriumacetat Diesen Cylindern setzt man je 1–2–3 etc ccm der obigen Nitrit Schwefelsäure von bekanntem Gehalte zu, rührt um und vergleicht nach 10 Minuten die entstehenden rosaröthen Färbungen

Man nimmt an, dass die Lösungen, deren Färbung nach der gleichen Zeit der Einwirkung die gleiche ist, auch den gleichen Gehalt an salpetriger Säure haben Die ganze Reaktion beruht auf Bildung eines Azofarbstoffes

13) Ammoniak a) Qualitativ Man versetze 50–150 ccm Wasser mit 10 Tropfen Natronlauge und 20 Tropfen Sodalösung (welche beide durch Auskochen von Ammoniak vollständig befreit sein müssen), wartet, bis sich der Niederschlag gut krystallinisch abgesetzt hat und giesst die überstehende klare Flüssigkeit ab Zu einem Theile derselben (50 ccm) fügt man 1 ccm NESSLER'sches Reagens und beobachtet die entstehende Färbung Gelbe Färbung weist auf geringen, gelbrothe Färbung auf hohen Gehalt an Ammoniak hin

b) Quantitativ Man bringt 250 ccm Wasser in einen Kolben, fügt 5 ccm ammoniakfreie, gesättigte Sodalösung hinzu und destillirt im Wasserdampfstrom 100 ccm bei guter Kühlung ab

Von dem Destillat giebt man 10 ccm in einen Cylinder, fügt Wasser bis zum Volumen 100 hinzu und versetzt mit 1 ccm NESSLER'schem Reagens In eine Anzahl anderer Cylinder, welche durch 100 ccm Wasser bis zur gleichen Höhe wie der vorige angefüllt werden, giebt man je 100 ccm ammoniakfreies destillirtes Wasser, 1 ccm NESSLER'sches Reagens und verschiedene, von 1–10 ccm ansteigende Mengen einer Salmiaklösung, die in 1 ccm $= 0,05 \text{ mg } \text{NH}_3$ enthält Man vergleicht nun über einer weissen Unterlage den 1 Cylinder in Bezug auf die Farbe mit den Kontroll Cylindern

Angenommen, die Farbe des das Destillat enthaltenden Cylinders entspreche der des Cylinders mit 3,1 ccm Salmiaklösung, so sind in den 10 ccm Destillat $3,1 \times 0,05 = 0,155 \text{ mg } \text{NH}_3$ enthalten Das Gesamtdestillat von 100 ccm wurde demnach $1,55 \text{ mg } \text{NH}_3$ enthalten Da diese Menge durch Destillation von 250 ccm Wasser erhalten wurde, so sind im Liter des zu untersuchenden Wassers $4 \times 0,00155 \text{ d. i. } 0,00620 \text{ g Ammoniak } \text{NH}_3$ enthalten

Ammoniumchlorid Lösung in 1 ccm $= 0,05 \text{ Milligr } \text{NH}_3$ enthaltend Man löst 0,1573 g scharf getrocknetes Ammoniumchlorid in Wasser zu 1 Liter auf

14) Verbrauch an Kaliumpermanganat (nach KUBEL-TIEMANN) Man bedarf hierzu folgender Lösungen

a) Oxalsäure $\frac{1}{100}$ normal 0,63 g reine krystallisirte Oxalsäure werden mit Wasser zu 1 l aufgefüllt Diese Lösung ist als Urlösung anzusehen Man hält zweckmässig eine 10fach stärkere Oxalsäurelösung vorrätzig und verdünnt diese bei Bedarf auf das 10fache Volumen

b) Kaliumpermanganat Lösung $\frac{1}{100}$ normal Man löst 0,4 g Kaliumpermanganat (die theoretische Zahl ist 0,316 g) in Wasser zu 1 l auf Diese Lösung wird nach dem

Absetzen durch Glaswolle oder Asbest filtrirt Man stellt diese Lösung so ein, dass 10 ccm derselben genau 10 ccm der Oxalsäurelösung entsprechen

Zu diesem Zwecke bringt man in einen sauberen Erlenmeyer-Kolben von 300 ccm Fassungsraum 100 ccm frisch destillirtes Wasser, fügt 10 ccm verdünnte Schwefelsäure (1 + 5) hinzu, lässt alsdann tropfenweise Kaliumpermanganat Lösung hinzufliessen, bis die Flüssigkeit deutlich geröthet ist, erhitzt zum Sieden und erhält die Flüssigkeit 10 Minuten lang in gelindem Sieden Sie muss in diesem Stadium des Versuchs noch deutlich roth sein, sonst ist Kaliumpermanganat zuzugeben Dann lässt man zu der noch heissen Flüssigkeit soviel Oxalsäurelösung zufließen, dass die Lösung grade wieder farblos wird Ein nunmehr zugegebener Tropfen Kaliumpermanganat muss schwache Rothfärbung der Lösung hervorrufen Man hat sich jetzt ein von organischen Stoffen freies Wasser bereitet und schreitet nunmehr erst zur eigentlichen Titerstellung Man lässt nun 10 ccm Oxalsäurelösung und hierauf Kaliumpermanganat zu der noch heissen Flüssigkeit tropfenweise solange zufließen, bis grade ein eben wahrnehmbarer, schwacher rother Schein der Lösung auftritt Die Beobachtung ist über einer weissen Unterlage zu machen Um jedes Mal den gleichen Farbenton zu treffen, stellt man sich — ebenfalls auf weisser Unterlage — einen Kolben mit 100 ccm Wasser und einen anderen mit 100 ccm Wasser, welcher mit einem Tropfen Kaliumpermanganatlösung tingirt ist, zur Seite

Angenommen, man habe nach dem Zusatz der 10 ccm Oxalsäure noch 9,35 ccm Kaliumpermanganat Lösung bis zur Röthung verbraucht, so entsprechen eben diese 9,35 ccm Kaliumpermanganat Lösung = 10 ccm Oxalsäure-Lösung Es sind also 9,35 ccm der Kaliumpermanganat Lösung mit Wasser auf 10 ccm oder 935 ccm der Lösung auf 1000 ccm aufzufüllen

Zur Ausführung des Versuches pipettirt man 100 ccm Wasser in ein 300 ccm Kölbchen, giebt 10 ccm verdünnte Schwefelsäure, sowie 10 ccm Kaliumpermanganat Lösung hinzu und kocht 10 Minuten Nach dieser Zeit (die Flüssigkeit muss noch deutlich roth gefärbt sein) lässt man 10 ccm Oxalsäure-Lösung hinzufliessen und setzt nun, ohne zu kochen, zu der noch heissen, farblos gewordenen Flüssigkeit soviel Kaliumpermanganat-Lösung tropfenweise hinzu, dass eben wahrnehmbare Rothfärbung eintritt Die Differenz zwischen den im ganzen zugesetzten Kubikcentimetern Kaliumpermanganat minus der Kubikcentimeter Oxalsäure ist der Verbrauch an Kaliumpermanganat


Beispiel Angewendet 100 ccm Wasser Zugesetzt 10 ccm Kaliumpermanganat Lösung, dann 10 ccm Oxalsäure Lösung Schliesslich 5,1 ccm Kaliumpermanganat-Lösung zum Zurücktitriren verbraucht Mithin wurden verbraucht

15,1 ccm Kaliumpermanganat Lösung minus 10 ccm Oxalsäure-Lösung, d h also 5,1 ccm Kaliumpermanganat Lösung für 100 ccm Wasser

Da 1 ccm der Kaliumpermanganat Lösung = 0,000816 g KMnO_4 enthält, so werden im vorstehenden Versuche $5,1 \times 0,000816 \text{ g} = 0,0041616 \text{ g}$ Kaliumpermanganat (KMnO_4) verbraucht Wir empfehlen, das Ergebniss dieser Bestimmung in der Weise anzugeben, dass gesagt wird, wieviel Gramm Kaliumpermanganat die in 1 l Wasser gelöste organische Substanz zur Oxydation verbraucht

Einige Analytiker drucken das Ergebniss des Versuches als „organische Substanz“ aus, und zwar nehmen sie als organische Substanz die fünffache Menge des verbrauchten Kaliumpermanganates an

Noch andere geben an, wieviel Sauerstoff zur Oxydation verbraucht worden ist. Da die oben angegebene Reaktion nach der Gleichung



verläuft, so ergibt sich, dass 1 ccm der obigen Kaliumpermanganat-Lösung = 0,00008 g Sauerstoff entspricht

Bei der oben beschriebenen Bestimmung dürfen Eisenoxydulverbindungen im Wasser nicht gelöst sein, diese müssen vorher durch Luft und Filtration abgeschieden werden Auch grössere Mengen salpetrige Säure wurden zur Folge haben, dass der Verbrauch an Kaliumpermanganat zu hoch gefunden wird In diesem letzteren Falle kann man den Fehler der Hauptsache nach dadurch corrigiren, dass man das mit Schwefelsäure angesäuerte Wasser zunächst in der Kälte mit Kaliumpermanganat auf schwachroth titirt und dann erst die eigentliche Bestimmung in der Hitze ausführt

15) Bestimmung der Härte Die Härte des Wassers wird bedingt durch die in dem Wasser gelösten Erdalkalien (Kalk, Magnesia) Man bestimmt deren Menge maassanalytisch durch eine Seifenlösung und stellt fest, wieviel Seifenlösung das Wasser verbraucht, bevor Bildung von Schaum eintritt Unter Gesamthärte versteht man die durch alle vorhandenen Salze der Erdalkalien hervorgerufene, unter bleibender Härte diejenige, welche bestehen bleibt, nachdem die Carbonate der Erdalkalien durch Kochen abgeschieden worden sind Die Differenz zwischen Gesamthärte und bleibender Härte wird temporäre oder vorübergehende Härte genannt Man unterscheidet deutsche und französische Hartegrade

Ein deutscher Härtegrad ist gleich 1 Th Calciumoxyd in 100 000 Th Wasser (bezw die dieser Menge Calciumoxyd äquivalente Menge Magnesiumoxyd)

Ein französischer Härtegrad ist gleich 1 Th Calciumkarbonat in 100 000 Th Wasser gelöst (bezw die dieser Menge Calciumoxyd äquivalente Menge Magnesiumoxyd)

Die französischen Härtegrade lassen sich demnach durch Multiplikation mit 0,56 in deutsche umrechnen

Man bedarf für die Ausführung dieser Bestimmung folgender Lösungen

a) *Seifenlösung* Man bereitet sich die für diese nötige Seife, indem man 150 Th Bleipflaster auf dem Wasserbade schmilzt und hernach mit 40 Th reinem Kalium karbonat zu einer gleichmässigen Masse verreibt. Diese wird mit 96proc Alkohol ausgezogen und die Lösung klar filtrirt. Aus dem Filtrat entfernt man den Alkohol durch Destillation oder Abdampfen und trocknet die hinterbleibende Seife im Wasserbade aus.

Zur Bereitung der Seifenlösung löst man 20 Th dieser Seife in 1000 Th Alkohol von 56 Vol Proc auf. Diese Seifenlösung wird nun so eingestellt, dass 45 Th derselben 12 mg Calciumoxyd zu binden vermögen. Diese Einstellung erfolgt mittelst einer Baryum chloridlösung. S weiter unten

b) *Baryumchloridlösung* 0,523 g lufttrocknes reines (unverwittertes) Baryum chlorid $\text{BaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ werden in destillirtem Wasser zu 1 l gelöst. 100 cem dieser Lösung enthalten die 12 mg Calciumoxyd entsprechende Menge Baryumchlorid und entsprechen einer Lösung von 12 Härtegraden

Titerstellung der Seifenlösung Man giebt in ein Stöpselglas von 200 cem Fassungsraum 100 cem der vorstehenden Baryumchloridlösung und lässt aus einer Burette zunächst eine grössere Menge, später immer nur 0,5 cem, zuletzt Tropfen der oben angegebenen Seifenlösung zu, schüttelt nach jedem Zusatz kräftig um und beobachtet, ob ein feinblasiger Schaum entsteht, welcher 5 Minuten lang bestehen bleibt. Dieser Punkt bedeutet die Endreaktion.

Ist diese Endreaktion z B schon bei einem Verbrauch von 22 cem Seifenlösung eingetreten, so enthalten schon 22 cem der Lösung soviel Seife, als eigentlich 45 cem enthalten sollen. Man füllt also 220 cem der Seifenlösung mit 56 volumenprocentigen Alkohol auf 450 cem auf.

Ausführung der Bestimmung In ein Stöpselglas von 200 cem bringt man 100 cem des zu untersuchenden Wassers. Den Stand des Wasserspiegels bezeichnet man mit einer Marke. Hierauf wird Seifenlösung cem für cem unter jedesmaligem Umschütteln, zuletzt tropfenweise, zuzuessen gelassen. Im Uebrigen verfährt man wie bei der Titerstellung.

Wasser, deren Härte grösser als 12 deutsche Grade ist, können so nicht geprüft werden, sie müssen vielmehr vorher passend verdünnt werden. Man bringt also in das Stöpselglas 10 oder 20 oder 30 cem des zu prüfenden Wassers, füllt mit destillirtem Wasser bis zur Marke auf und führt die Bestimmung wie vorher angegeben weiter. Bei der Berechnung der Härtegrade ist die vorgenommene Verdünnung natürlich zu berücksichtigen.

Bei Anwendung von 100 cem Wasser kann man aus nachstehender Tabelle die den verbrauchten Kubikcentimetern Seifenlösung entsprechenden deutschen Härtegrade direkt entnehmen.

Tabelle von Faust und Knauss

Es entsprechen cem verbraucher Seifenlösung	Deutsche Härtegrade	Es entsprechen cem verbraucher Seifenlösung	Deutsche Härtegrade
3,4	0,5	23,3	3,5
5,4	1,0	25,0	7,0
7,4	1,5	27,8	7,5
9,4	2,0	31,6	8,0
Die Differenz von 1 cem Seifenlösung = 0,25 Härtegrad		Die Differenz von 1 cem Seifenlösung = 0,277 Härtegrad	
11,3	2,5	33,3	8,5
13,2	3,0	35,0	9,0
15,1	3,5	36,7	9,5
17,0	4,0	38,4	10,0
18,9	4,5	40,1	10,5
20,8	5,0	41,8	11,0
Die Differenz von 1 cem Seifenlösung = 0,26 Härtegrad		Die Differenz von 1 cem Seifenlösung = 0,294 Härtegrad	
22,8	5,5	43,4	11,5
24,4	6,0	45,0	12,0

Bleibende Härte Man erhält ein gemessenes Volumen Wasser (300—500 cem mindestens $\frac{1}{2}$ Stunde lang im Sieden unter gelegentlichem Ersatz des verdampften Wassers durch destillirtes, füllt nach dem Erkalten mit destillirtem Wasser bis zum ursprünglichen Volumen auf, filtrirt von etwa vorhandenen Ausscheidungen ab und führt mit 100 cem des Filtrates die Härtebestimmung genau wie vorher angegeben aus. Wasser von einer

grösseren permanenten Härte als 12 deutschen Graden muss gleichfalls passend verdünnt werden. Noch zweckmässiger ist es, eine grössere Menge Wasser am Rückflusskühler $\frac{1}{2}$ Stunde lang zu kochen und nach völligem Erkalten zu filtrieren.

Berechnung der Härte aus den gewichtsanalytischen Daten. Sind die in dem Wasser gelösten Mengen Calciumoxyd und Magnesiumoxyd bekannt, so kann die Härte auch durch Rechnung gefunden werden. Je 1 Th Calciumoxyd in 100 000 Th Wasser entspricht = 1 deutschen Härtegrade. Für das vorhandene Magnesiumoxyd muss die diesem äquivalente Menge Calciumoxyd durch Rechnung gesucht und dem ersten Werte zugezählt werden.

Beispiel. Ein Wasser enthält in 100 000 Th = 6,52 Th CaO u. 1,56 Th MgO. Die Härte berechnet sich wie folgt:

Nach dem Ansatz $\frac{\text{MgO}}{40} = \frac{\text{CaO}}{56} = 1,56 \times x = 2,18$ berechnet sich, dass 1,56 Th Magnesiumoxyd = 2,18 Th Calciumoxyd äquivalent sind.

6,25 Th Calciumoxyd in 100 000 Th Wasser sind = 6,52 Härtegraden deutsch
1,56 „ Magnesiumoxyd $\frac{2,18}{6,25}$

Die durch Rechnung gefundene Härte beträgt also $\frac{6,52}{6,25} = 8,70^\circ$ deutsch.

Die durch Seifenlösung und die durch Rechnung gefundenen Härtezahlen stimmen häufig, aber nicht immer genügend überein.

Bestimmung der gesamten, halbgebundenen und freien Kohlensäure nach THILLIG. Die Methode beruht darauf, dass man die freie und halbgebundene Kohlensäure durch einen Ueberschuss titrierter Barytlösung fällt und den alsdann noch vorhandenen Ueberschuss von Baryumhydroxyd in der nach dem Absetzen geklärten Flüssigkeit durch Salzsäure von bekanntem Gehalte bestimmt. Bei Anwesenheit von Alkalikarbonaten oder anderen Salzen der Alkalien, welche schwer lösliche Baryumverbindungen geben, ist der Zusatz einer Lösung von neutralem Baryumchlorid (1 Th $\text{BaCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 10 \text{Th}$ Wasser) erforderlich. Ausserdem muss der Gehalt des Wassers an Magnesiumoxyd bekannt sein oder bestimmt werden, weil die vorhandenen Magnesiumsalze als Magnesiumhydroxyd ausgefällt werden, wodurch eine rechnermässige Menge Baryumhydroxyd beansprucht und demnach eine entsprechende Menge Kohlensäure vorgetauscht wird. Nach der Formel $\text{MgO} (40) \text{CO}_2 (44)$ entsprechen 40 Th Magnesiumoxyd = 44 Th Kohlensäure. Für je 1 mg vorhandenes Magnesiumoxyd ist daher stets 1,1 mg Kohlensäure abzuziehen. — Man bedarf für die Bestimmung folgender Lösungen:

a) Salzsäure, im Liter 1,659 g HCl enthaltend. 1 cem dieser Salzsäure entspricht = 0,001 g Kohlensäure CO_2 . Man stellt diese Säure dar durch Auffüllen von 45,47 cem Normal Salzsäure zu 1 l.

b) Barytlösung. Man löst 7 g Baryumhydroxyd ($\text{Ba}[\text{OH}]_2 + 8 \text{H}_2\text{O}$) in Wasser, setzt 0,2 g kryst. Baryumchlorid hinzu und füllt zu 1 l auf.

Kurz vor Anstellung des Versuches stellt man die Barytlösung auf die Salzsäure unter Benutzung von Phenolphthalein einerseits und Cochenille andererseits als Indikator ein.

Zur Ausführung der Bestimmung bringt man in ein 150 cem Kölbchen von dem zu untersuchenden Wasser 100 cem, fügt 5 cem neutrale Baryumchloridlösung 1 10 (s. o.) sowie 45 cem obige Barytlösung hinzu, verschliesst den Kolben luftdicht, mischt gut durch und lässt 12 Stunden (!) in der Kälte stehen. Während dieser Zeit setzt sich der Niederschlag (das Calciumcarbonat wird krystallinisch) gut ab, und die überstehende Flüssigkeit wird klar. Man hebt nun mit einer Pipette von der klaren Flüssigkeit, ohne den Niederschlag aufzurütteln, zweimal je 50 cem ab, bringt diese in ein BELENMEYER Kölbchen, setzt 2—3 Tropfen Phenolphthalein Lösung hinzu und titirt nun mit der obigen Salzsäure bis zur eben eintretenden Farblosigkeit.

Man findet den Gehalt an freier + halbgebundener Kohlensäure nach folgender Rechnung:

Enthalten 100 cem Wasser = m mg Magnesia (MgO) und sind 45 cem Barytlösung = a cem Salzsäure und brauchen 50 cem der geklärten Flüssigkeit b cem Salzsäure zur Neutralisation, so enthält 1 l Wasser

$$a - [3 \times b] - [1,1 \times m] \times 10 \text{ mg freie und halbgebundene Kohlensäure}$$

Beispiel. Das untersuchte Wasser enthielt im Liter 4 mg Magnesia. 45 cem Barytlösung entsprachen = 39 cem Salzsäure. 50 cem der geklärten Flüssigkeit verbrauchten 9,75 cem Salzsäure zur Neutralisation. Hieraus berechnet sich der Gehalt an freier + halbgebundener Kohlensäure für 1 l zu 58,5 mg.

Zur gleichzeitigen Bestimmung der Gesamt-Kohlensäure versetzt man die in dem Absetz Kölbchen zurückgebliebenen 50 cem Flüssigkeit plus dem Niederschlage mit einigen Tropfen Cochenilletinktur und titirt mit der oben erwähnten Salzsäure bis zur Neutralität. Braucht man hierzu d cem Salzsäure, so enthält 1 l Wasser

$$[d - b - (1,1 \times m)] \times 10 \text{ mg Gesamt-Kohlensäure}$$

Beispiel Bei der Titirung des Restes im Absatz-Kölbchen wurden 20,65 cem Salzsäure verbraucht. Bei der vorigen Bestimmung verbrauchten 50 cem der klaren Lösung noch 9,75 cem Salzsäure. Der Gehalt an Magnesia betrug 4 mg in 100 cem. Hieraus berechnet sich der Gehalt an Gesamt Kohlensäure zu 65 mg im Liter.

Völlig gebundene Kohlensäure Zieht man von der gesammten Kohlensäure die freie + halbgebundene Kohlensäure ab, so erhält man die Zahl für die an Basen völlig gebundene Kohlensäure, in unserem Beispiele 11,5 mg per Liter.

Freie Kohlensäure Zieht man von der freien + halbgebundenen Kohlensäure die völlig gebundene ab, so erhält man die Zahl für die im freien Zustande vorhandene Kohlensäure, in unserem Beispiele 42,0 mg pro Liter.

Beurtheilung. Die chemische Analyse allein ist nicht immer im Stande, ein zutreffendes Urtheil über die Zulässigkeit eines Wassers als Trinkwasser zu geben. Immerhin liefert sie Anhaltspunkte für die Beurtheilung. Ein gutes Trinkwasser zeigt etwa folgenden chemischen Befund. Zu 1 Liter

Trocken Rückstand	0,2—0,6 g	Salpetersäure	0—0,01
Glyhverlust	0,002—0,01 g	Salpetrige Säure	0
Chlor	0,01—0,02 „	Verbrauch an Kalium-	
Ammoniak	0 bis Spur	manganat	0,01—0,015

Reichhaltige Mengen Chlor können von menschlichen und thierischen Abfallstoffen herrühren, da das in den thierischen Organismus eingeführte Chlor zum grössten Theil durch den Urin ausgeschieden wird. Salpetrige Säure, Salpetersäure und Ammoniak machen das Wasser verdüchtig, faulende Substanzen zu enthalten. Hoher Verbrauch von Kaliumpermanganat gilt gleichfalls als verdächtiges Zeichen.

Zurückzuweisen als Trinkwasser ist jedes Wasser, welches unappetitlich aussieht und unangenehmen Geschmack oder Geruch besitzt, falls letzterer nicht durch Lüftung zu beseitigen ist. Man achte auch darauf, ob das Wasser an der Luft Eisenhydroxyd absetzt.

In diesem Falle ist der Auftraggeber davon zu verständigen, dass das Wasser einer Enteisung zu unterworfen ist.

Vom Trinkgebrauch zurückzuweisen ist jedes Wasser, welches einer Verunreinigung durch unreine oberirdische Zuflüsse verdächtig erscheint. Um das Vorhandensein solcher festzustellen, kann die mikroskopische Untersuchung der schwebenden Bestandtheile sowie der Pflanzen und Thierwelt des betreffenden Wassers herangezogen werden. Auch die bakteriologische Untersuchung kann zur Beantwortung bestimmter Fragen herangezogen werden. Das Auffinden pathogener Mikro-Organismen lässt das Wasser ohne weiteres als gesundheitsschädlich erscheinen. Aber auch wenn nur die Möglichkeit einer Infektion besteht, ist das Wasser als infektionsverdächtig zu erklären und zu beanstanden.

Bei Brunnen und ähnlichen Wasseranlagen sind die exakten wissenschaftlichen (chemischen, mikroskopischen und bakteriologischen) Untersuchungen durch die örtliche Bezeichnung, sobald dies nur irgend ausführbar, zu vervollständigen.

Zusätze zu Trinkwasser. Um Trinkwasser wohlschmeckender und besser bekömmlich zu machen, werden demselben vielfach (in Schulen, Bergwerken, Fabriken, Schiffen etc.) Zusätze gemacht, welche wohl den Nebenzweck haben sollen, verdühtiges Wasser unverdächtig zu machen. Von den zahlreichen Vorschriften geben wir die nachstehenden wieder:

- 1) Pariser Schultrank. Glycerin, Zucker, Weinsäure ää 1,5 kg. Pfefferminzöl 32 g, Quassum amorph 10,0 g. Von dieser Mischung werden 3,0 g auf 1 l Wasser gerechnet.
- 2) Nach ADRIAN. Ammoniumglycyrrhinat (rohes), Zucker, Weinsäure ää 1,5 kg. Quassum amorph 8,0 g, Pfefferminzessenz 120,0 g. Auf 1 l Wasser = 3,0 g dieser Mischung.
- 3) Nach ARONSON. Ein Auszug von Radix Liquiritiae 500,0 g, Spiritus 2 l, Citronen 2 Stück auf 100 l Wasser.
- 4) Nach MALTHESE & GENDRON. Enzianwurzel, Pfefferminzblätter ää 200,0 g, siedendes Wasser 100 l. Nach 20 Minuten kochen und zusetzen Ammoniumglycyrrhinat (rohes) 30,0 g, Citronensäure 50,0 g.
- 5) Rum 1 l, Wasser 20 l, Essig (6 Proc) 50 g. Dazu irgend eine adstringierende Substanz, z. B. Auszug von Eichenrinde oder Theebältern.
- 6) Heidelbeeren 125,0 g, Nelken 250,0 g, Ingwerwurzel 600,0 g, Zimmt 250,0 g, Essigsäure verdünnte (30 Proc) 8,0 kg, Essig (6 Proc) 45,0 kg.
- 7) Mistra. Spiritus mit Sternanisöl und Nerhol parfümirt.
- 8) Cocco und Cocco de Calabre sind technisches Glycyrrhizin.

Bestimmung der zur Wasserreinigung erforderlichen Kalk- und Sodamengen. Von O. BINDER. Zu 200 cem Wasser, die sich in einem 800 cem-Kolben befinden, giebt man 50—75 cem gesättigtes Kalkwasser, dessen Gehalt an Calciumoxyd genau bekannt ist. Man bestimmt denselben mit einer Schwefelsäure, welche im Liter 1,857 g SO_2 enthält und Methylorange als Indikator. 1 cem dieser Säure entspricht ungefähr = 1 cem Kalkwasser. Die Säure wird dargestellt, indem man 46,48 cem Normalschwefelsäure zu 1 l auffüllt.

Die mit Kalkwasser versetzte Probe erwärmt man, nachdem der Kolben mit einem Kork, welcher ein Thermometer enthält, lose verschlossen ist, auf die Temperatur, welche man bei der Reinigung anwenden will, also auf $50-60^{\circ}\text{C}$ — Nachdem der Kolbenninhalt auf 15°C abgekühlt worden ist, füllt man mit kohlensäurefreiem, destillierten Wasser bis zur Marke auf, filtriert durch ein trockenes Filter, bestimmt in 250 ccm des Filtrates den noch vorhandenen Aetzalkali durch Titrieren (s. o.) und findet durch Rechnung die für 1 l Wasser erforderliche Kalkmenge.

Bestimmung des Sodazusatzes. Man dampft in einer Platinschale 250–300 ccm Wasser unter Zusatz von 5 ccm einer Normal-Sodalösung ein, zieht den Rückstand mit Wasser aus, filtriert und bestimmt im Filtrat maassanalytisch mit Säure und Methylorange das noch vorhandene unzersetzte Natriumkarbonat. Die Differenz ergibt die zur Zersetzung der Chloride, Sulfate, Nitrate etc. notwendige Sodamenge.

Die Ergebnisse sind auf 1 l zu berechnen und in dem Berichte für 1 Cubikmeter (= 1000 l) anzugeben.

Enteisung von Grundwasser. Das Grundwasser der norddeutschen Ebene enthält sehr häufig Eisen. Dieses Eisen ist in dem Wasser (zu etwa 20–40 mg FeO pro Liter) als Ferrobikarbonat gelöst. Kommt solches Wasser mit Luft in Berührung, so wird es zunächst milchig, dann bilden sich allmählich braune Ausscheidungen von Ferrihydroxyd. Solches Wasser ist zum Trinkgebrauch nicht zu empfehlen, weil es unappetlich aussieht und schwach tinteartig schmeckt, auch ist es für gewisse gewerbliche Zwecke, z. B. zum Mälzen, nicht zu verwenden. Seit 1890 ist man in der Lage, solches Wasser von seinem Eisengehalte zu befreien, und zwar wird vorzugsweise nach zwei Verfahren gearbeitet. Beide gehen von der Absicht aus, das gelöste Ferrobikarbonat zu unlöslichem Ferrihydroxyd zu oxydiren und dieses durch Filtration zu beseitigen.

1) Verfahren von G. OESTEN-Berlin (Grundwasser-Enteisung mittelst Regenfall und Kiesfilter). Dasselbe besteht darin, dass das zu filtrierende Wasser als fein vertheilter Regenfall aus einer Höhe von 2–3 m durch die Luft auf ein Filter von 15 cm Graupenkies auffällt. Bei einer Filtrationsgeschwindigkeit von 100 mm pro Stunde wird das Wasser so vollständig enteisent, dass Eisen aus dem Filtrate sich nicht mehr ausscheidet. Alle 4 Wochen etwa ist eine Reinigung des Filters auszuführen. Fig. 89.

Für kleine Verhältnisse können Filter mit Brause, sowie Reinwasserbassin auf dem Hausboden untergebracht werden (Patentirt).

2) Verfahren von PIEFKE. Die Ausscheidung des Eisens erfolgt hier in einem sogenannten „Koks Rieseler“. Als Filter dient ein Sandfilter. Der „Rieseler“ ist ein cylindrischer Behälter und zwar je nach der Ausdehnung der Anlage ein hölzernes Fass oder eine eiserne Trommel oder ein gemauerter Thurm, welche mit Koks angefüllt sind. Durch einige Vertheiler fließt das zu enteisende Wasser zunächst oben auf den Rieseler. Es sickert alsdann über die Koks-schichten nach unten. Auf diesem Wege kommt es hinreichend mit der Luft in Berührung, das Eisen wird in unlöslichen Zustand übergeführt und kann nunmehr durch ein Sandfilter abgeschieden werden. Das erhaltene Filtrat ist soweit eisenfrei, dass bei weiterem Stehen das filtrirte Wasser Eisen nun nicht mehr ausscheidet. Fig. 90 (Patentirt!).

Beide Verfahren haben sich bisher in kleineren und grösseren Betrieben gut bewährt. Dasjenige von PIEFKE kommt in den Charlottenburger Wasserwerken für eine Tagespro-




Fig. 89 Enteisungsanlage nach G. OESTEN-Berlin.




Fig. 90 Versuchsanlage zum Enteisnen von Grundwasser nach PIEFKE

duktion von etwa 50000 ehm in Anwendung. Ausserdem haben beide Verfahren seit einer Reihe von Jahren sich in industriellen Betrieben, z. B. Mälzereien und Bierbrauereien, bewährt.

Bei dem **Preuss'schen Verfahren** schlägt sich die Hauptmenge des Eisens auf den Koksstücken nieder und überzieht diese mit einer Schicht von Eisenoxydhydrat. Zur Reinigung der Rueseler wird entweder die Eisenoxydhydrat-Schicht durch kräftige Wasserspülung von oben abgelöst oder man schafft den Koks heraus, verwendet ihn nach dem Trocknen an der Luft als Brennmaterial und fällt die Rueseler mit frischem Koks.

Meerwasser, künstliches. A. Nach **LACHMANN**. In 50 Liter möglichst hartes Brunnenwassers werden gelöst: Natriumchlorat 1825,0 g, Magnesiumsulfat crystall 100,0 g, Kaliumsulfat 30,0 g, Magnesiumchlorat 150,0 g. In diese Lösung bringt man, um sie mit Sauerstoff zu sättigen, einige an Steinen haftende grüne Algen und lässt das ganze etwa 3 Wochen leicht zugedeckt im Freien stehen. B. Der Pariser Weltausstellung. In 3 Kubikmeter Wasser (= 3000 Liter) werden 100 kg eines trockenen Gemisches aus Natriumchlorat 78,0, Magnesiumchlorat 11,0, Kaliumchlorat 3,0, Magnesiumsulfat 5,0, Calciumsulfat 3,0 gelöst.

Aquae minerales.

Natürliche Mineralwässer. Als „natürliche Mineralwässer“ bezeichnet man solche natürliche (Quell-)Wässer, welche grössere Mengen mineralischer, fester und gasiger Bestandtheile aufgelöst enthalten, als das gewöhnliche Brunnen- und Trinkwasser, und welche wegen dieser Bestandtheile auf den kranken menschlichen Organismus eine heilsame Wirkung ausüben. Daher der Name Heilquellen, Heilbäder, *Aquae soteriae*. Hat das Mineralwasser zu Tage tretend eine höhere Temperatur als die umgebende Luft, so nennt man es Thermalwasser, seine Quelle nennt man eine *Therma*.

Die Mineralwässer werden je nach den vorwiegend in ihnen enthaltenen Bestandtheilen benannt.

Sauerlinge. Wenn die mineralischen Bestandtheile eines Wassers in sehr geringer Menge vorhanden sind, das Wasser aber so reich mit Kohlensturegas gesättigt ist, dass es auf Lackmus vorübergehend rothend wirkt, beim Einfüllen in ein Glas stark perlt und schäumt (moussirt) und auf der Zunge einen angenehm säuerlich prickelnden und dabei erfrischenden Geschmack bewirkt, so nennt man es Sauerling. Man unterscheidet ihn aber als alkalisch-muriatischen, wenn Natriumkarbonat und Natriumchlorid, als erdig-muriatischen, wenn Karbonate der Erden und Natriumchlorid, als alkalisch-salinischen, wenn Karbonate der Erden und Natriumsulfat, als alkalisch-erdigen, wenn Karbonate der Erden und Alkalien als Bestandtheile auftreten.

Stahl- oder Eisensäuerling ist ein Sauerling, welcher zugleich Ferrokarbonat enthält.

Salinisches Wasser, Kochsalzwasser ist solches Wasser, unter dessen festen Bestandtheilen Natriumchlorid vorwaltet. Enthält es gleichzeitig Jod- oder Brommetalle, so nennt man es jodhaltiges oder bromhaltiges Kochsalzwasser.

Soolen nennt man die Kochsalzwässer, deren spezifisches Gewicht über 1,04 hinausgeht.

Glaubersalzwasser enthalten vorwiegend Natriumsulfat.

Bittersalzwasser enthalten vorwiegend Magnesiumsulfat und

Bitterwasser vorwiegend Magnesiumchlorid oder Magnesiumsulfat.

Schwefelwässer enthalten Schwefelwasserstoff oder Schwefelverbindungen, aus denen Schwefelwasserstoff durch Kohlensäure entwickelt wird.

Indifferentes Wasser enthalten nur geringe Mengen der verschiedenen festen Substanzen und nur wenig Kohlensäure; unterscheiden sich überhaupt eigentlich wenig von gewöhnlichen Quell- oder Brunnenwässern, so dass sich ihre Heilkraft schwer erklären lässt.

Heilwirkung der Mineralwässer. Hierüber mögen folgende beschränkte Angaben einen Platz erhalten.

Säuerlinge wirken durch ihren Reichthum an Kohlensäure anreizend auf die Schleimhäute, erfrischend und kühlend, dann aber erregend auf das Gefässsystem, die Sec- und Exkretionen befördernd. Stahlsäuerlinge gebraucht man bei Muskel- und Nervenschwäche und Schläffheit der Schleimhäute, muriatische oder alkalisch salmische besonders bei chronischen Brustleiden, erdige und alkalisch erdige als resorptionsbefördernde Mittel bei Drüsenanschoppungen und Unterleibsstockungen und vorzugsweise fast bei allen chronischen Leiden der Harnwerkzeuge. Um die erregende Wirkung der Säuerlinge zu mässigen, vermischt man sie mit warmer Milch oder Molken.

Eisensäuerlinge wirken tonisirend und aussern durch einen Salzgehalt eine gegend eröffnende, durch die Kohlensäure vorübergehend belebende Wirkung, alcainhaltige Eisenwasser wirken adstringirend. Eisenwasser finden ihre Anwendung bei Blutarmuth, bei geschwächtem Nervensystem, schlaffen Muskeln, schlaffen Schleimhäuten.

Alkalische Mineralwasser wirken wohlthätig auf die Schleimhäute, das Drüsen- und Lymphsystem, die Nieren und die Haut und regeln die Schleimsekretion. Sie wirken der Saure- und Steinbildung entgegen und vermehren die Harnabsonderung, man gebraucht sie daher bei Gicht, chronischen Hautausschlägen, Drüsenverhartungen, Nervenleiden, chronischen Katarrhen.

Die Kochsalzwasser empfiehlt man bei Skrophulose, rheumatischen und gichtischen Leiden, Verschleimung des Darmkanals, Blennorrhöen der Harn- und Geschlechtsorgane, als Bäder (in Sool- und Seebädern) gegen chronische Hautausschläge, veraltete Geschwüre, rheumatische Leiden.

Glaubersalzwater wirken eröffnend, schleimlösend und diuretisch. Man empfiehlt sie bei Unterleibsstockungen, Leberanschwellungen, Darmverschleimung, Blasenleiden, Gicht, Steinkrankheit.

Kalkhaltige Mineralwasser gelten in Form von Bädern als die Sec- und Exkretionen befördernd.

Bittersalzwater wirken abführend, antiphlogistisch, man wendet sie an bei Congestionen nach Kopf und Brust, chronischen Hautausschlägen mit unregelmässigem Stuhl, unterdrückter Menstruation und stockendem Hämorrhoidalfluss.

Schwefelwasser befördern die Blutcirculation im Unterleibsvenensystem, wirken schweis- und urintreibend und abführend. Man empfiehlt sie bei Blutstockungen im Unterleib (Hämorrhoiden), Blennorrhöen der Athmungs-, Harn- und Geschlechtsorgane, chronischem Rheumatismus, Metallvergiftungen und Hautausschlägen, veralteten Geschwüren etc.

Die indifferenten Thermen (Wildbäder) werden meist in Form von Bädern angewendet. Diese befördern den Stoffwechsel, werden daher bei Rheumatismus, Icthae, Lahmungen verordnet.

Auch den indifferenten Mineralwassern werden in zahlreichen Krankheiten Heilerfolge nachgerühmt. Mit Erfolg werden sie in Verbindung mit einem mehrwöchentlichen Erholungsaufenthalt namentlich bei Neurasthenie und deren Folgeerscheinungen angewendet.

Künstliche Mineralwasser. Mit diesem Namen bezeichnet man Nachbildungen der natürlichen Mineralwasser, wie sie nach den Ergebnissen der chemischen Analyse der letzteren mit Hilfe besonderer Apparate hergestellt werden, im weiteren Sinne auch mit Kohlensäure gesättigte Salzlosungen, welche (wie das Sodawasser) mit gewissen natürlichen Mineralquellen einige Aehnlichkeit haben.

Hiernach sind die künstlichen Mineralwasser im grossen und ganzen also Auflösungen von Salzen in Wasser, welche mit Kohlensäure gesättigt sind. Wir werden demnach zu betrachten haben das Wasser, die Salze und Salzlosungen, die Kohlensäure, die Apparate zur Herstellung der Mineralwasser und die fertigen Mineralwasser selbst.

I. Das Wasser. Die grösseren und renommirteren Fabriken zur Herstellung von künstlichen Mineralwassern benutzen ausschliesslich destillirtes Wasser. Dieses wird von ihnen in besonderen, sehr leistungsfähigen Destillirapparaten (s. S. 329) in grossen Mengen gewonnen und ausserdem noch einer sorgfältigen Filtration über Kohle Sandfilter

unterworfen (§ 327), um dem Wasser auch den geringsten Geschmack zu benehmen und es in völlig blanken Zustand zu versetzen. Es muss zugegeben werden, dass sich eine rationelle Nachbildung natürlicher Mineralwasser, namentlich der eigentlichen Heilwasser, wohl kaum anders als unter Verwendung von destillirtem Wasser bewerkstelligen lässt.

Bei den lediglich Erfrischungszwecken dienenden Wassern wie Selterser oder Sodawasser liegen die Verhältnisse etwas anders. Diese Wasser sind in den letzten Jahrzehnten ein starker Konsumartikel auch für die minder Beguterten geworden. Diese verlangen ein kohlensaures Wasser zu Preisen, zu welchen es schlechterdings mit destillirtem Wasser nicht hergestellt werden kann. Man wird also bei diesen „Erfrischungswässern“ von der principiellen Forderung absehen dürfen, dass sie lediglich mit destillirtem Wasser bereitet sein müssen.

Wir resumiren also dahin, dass wir zur Bereitung der als „Heilwässer“ anzusehenden künstlichen Mineralwässer unbedingt destillirtes Wasser fordern, dass wir dagegen die Verwendung nicht destillirten Wassers für die sogen. Erfrischungswässer (Selterser, Sodawasser) als zulässig halten. Natürlich dürfen alsdann diese Wässer nicht unter Bezeichnungen feilgeboten werden (z. B. „mit destillirtem Wasser“ oder „mit chemisch-reinem Wasser“ bereitet), welche geeignet sind, den Anschein zu erwecken, als seien sie mit destillirtem Wasser bereitet. Und es mag auch gleich hinzugefügt werden, dass es nach unseren Erfahrungen in der Regel nicht möglich ist, an dem fertigen Fabrikate festzustellen, ob es unter Verwendung von destillirtem Wasser hergestellt worden ist oder nicht.

Wird nichtdestillirtes (gemeines) Wasser verwendet, so hat man an dieses die nämlichen Anforderungen zu stellen, welche an ein gutes Trinkwasser gestellt werden. Nur sei man bei der Beurtheilung der Brauchbarkeit lieber etwas zu scharf als zu milde. Die Konsumenten kritisiren ein Fabrikat, welches sie Glas für Glas bezahlen müssen, sehr viel schärfer als das rohe Wasser, von dem sie sich überhaupt nicht die Vorstellung machen, dass es auch Geld kostet. Man wähle also ein Wasser, welches absolut klar, farblos, ohne Geruch und störenden Geschmack ist und diese guten Eigenschaften auch nach 1—2 tägigem Stehen noch behält. Namentlich bezüglich des Geruches und Geschmackes prüfe man sorgfältig, denn auch ein minimaler Geruch kommt im fertigen Mineralwasser sehr deutlich zur Geltung, weil die entweichende Kohlensäure sozusagen Träger des Geruches wird. — In allen Fällen, in denen das zu verwendende Wasser diese Eigenschaften nicht hat, wird man versuchen müssen, ihm diese zu ertheilen. Ist also z. B. das Wasser nicht ganz klar, blank und farblos, so muss es über ein Kohle-Sandfilter filtrirt werden, wozu sich die § 327 angegebene Kombination besonders gut eignet. Sie liefert ein absolut blankes, klares und geruch- und geschmackloses Filtrat. Enthält das Wasser Eisen gelöst oder besitzt es einen Geruch nach Schwefelwasserstoff, so muss es vor der Filtration zerstäubt und während einer Fallhöhe von 1—2 Metern der Einwirkung der Luft ausgesetzt werden.

In Städten mit centraler Wasserversorgung wird man das von dieser geheizte Wasser unbedenklich entweder ohne weiteres, jedenfalls aber nach nochmaliger Filtration über Sand-Kohle verwenden können. Wo man auf Brunnenwasser angewiesen ist, mache man es sich zur Pflicht, dieses in nicht zu langen Zwischenräumen immer wieder auf seine Brauchbarkeit zu prüfen.

II Die Chemikalien. Die für die Herstellung der künstlichen Mineralwässer erforderlichen Chemikalien bestehen meist in Salzen. Man hält diese im festen Zustande, aber — der Bequemlichkeit wegen — auch als Lösungen von bestimmtem Gehalte vorrätig. Haben letztere infolge Abkühlung Krystalle abgeschieden, so sind diese wieder dadurch in Lösung zu bringen, dass man das Gefäß mit locker aufstetzendem Stopfen an einen etwa 80° C warmen Ort bringt. Die Chemikalien wählt man in möglichster Reinheit, die in dem Arzneibuche aufgenommenen sollen auch von der dort vorgeschriebenen Reinheit sein.

Der Bequemlichkeit halber bereitet man die Lösungen so, dass ein bestimmter Gewichtstheil des Salzes in einem bestimmten Volumen der Lösung enthalten ist, dass also z. B. 100 g oder 10 g oder 1 g reinen Salzes in 1 Liter Flüssigkeit enthalten sind. Man ist dann wie bei der Maassanalyse in der Lage, bestimmte Gewichtsmengen einer Substanz durch Messen zu erhalten, was natürlich bequemer ist wie das Wägen.

Um Irrungen zu vermeiden, die durch Uebersehen von Nullen leicht möglich sind, signirt man die im Volumenverhältnis 1:10 bereiteten Lösungen mit 1/X. Diejenigen im Verhältnis 1:100 bereiteten mit 1/C und diejenigen im Verhältnis 1:1000 dargestellten mit 1/M. Alle Lösungen sind mit destillirtem Wasser zu bereiten.

†† **Acidum arsenicum.** Arsensäure-Anhydrid $As_2O_3 = 230$ Bei schwacher Rothgluth zur Trockne gebrachte arupöse Arsensäure 1 g wird in Wasser gelöst und zu 1 l aufgelöst 1 ccm dieser Lösung enthält = 1 mg Arsensäure Signatur Arsensäure 1/M ††

Acidum hydrochloricum. Chlorwasserstoff 400 g der 25procent Salzsäure werden mit Wasser zu 1 l aufgelöst Der ganze Liter enthält 100 g Chlorwasserstoff HCl Signatur Chlorwasserstoff 1/X.

Acidum silicicum. Kieselsäure $SiO_2 = 60$ Wird bei der Herstellung der Mineralwasser in der Form des Natriumsilicates angewendet, von einigen aber, weil als therapeutisch unwirksam angesehen, nicht beachtet und deshalb weggelassen

Acidum sulfuricum. Schwefelsäure-Anhydrid $SO_3 = 80$ Von einer Schwefelsäure vom spec Gew 1,836 werden 180 g, von einer Schwefelsäure vom spec Gew 1,840 werden 125 g zunächst vorsichtig in $\frac{1}{2}$ l Wasser unter Umrühren eingetragen und die Mischung alsdann mit Wasser zu 1 l aufgefüllt 1 l enthält = 100 g Schwefelsäureanhydrid SO_3 Signatur Schwefelsäure Anhydrid SO_3 1/X.

Alumen natrium. Aluminium Natrium sulfuricum Natron-Alaun $Al_2(SO_4)_3 \cdot Na_2(SO_4)_4 = 484$ Es werden 13,76 g krystall Aluminiumsulfat ($Al_2(SO_4)_3 + 18 H_2O$) in Wasser gelöst und nach Zusatz von 80 ccm der 1/X Natriumsulfatlösung mit Wasser zu 1 l aufgefüllt 100 ccm enthalten = 1 g wasserfreien Natronalaun $Al_2Na_2(SO_4)_4$ Signatur Aluminium Natriumsulfat 1/C.

Aluminium sulfuricum. Aluminiumsulfat Thonerdesulfat $Al_2(SO_4)_3 = 342$ Es werden 12,5 g des krystall Aluminiumsulfates ($Al_2(SO_4)_3 + 18 H_2O$) in Wasser zu 1 l gelöst 100 ccm enthalten 1 g wasserfreies Thonerdesulfat Signatur Thonerdesulfat $Al_2(SO_4)_3$ 1/C.

Aluminium chloratum. Aluminiumchlorid $Al_2Cl_3 = 267$ Man fällt eine warme Lösung von 35,5 Th Kal-Alaun mit einer warmen Lösung von 40 Th krystall Natriumkarbonat, so dass am Ende der Fällung die Flüssigkeit deutlich alkalisch reagirt Der entstandene Niederschlag wird auf einem Filter oder Kolatorium gesammelt, einige Male mit Wasser gewaschen, schliesslich mässig abgepresst Man löst ihn dann in erwärmter Salzsäure, filtrirt die Lösung und fällt sie nun in mässiger Wärme durch Ammoniak Der jetzt entstandene Niederschlag wird bis zum Verschwinden der Chlor Reaktion gewaschen, dann in gelinder Wärme getrocknet Man erhält so ein weisses, lockeres, in verdünnten Säuren leicht lösliches Pulver von Aluminiumhydroxyd $Al_2(OH)_3$ Von diesem Pulver werden 5,86 g mit 32,8 g Salzsäure (von 25 Proc, spec Gew 1,123) übergossen und schwach erwärmt Nach erfolgter Auflösung verdünnt man mit Wasser zu 1 l Je 1 ccm dieser Lösung enthält 0,01 g Aluminiumchlorid Al_2Cl_3 Signatur Aluminiumchlorid Al_2Cl_3 1/C.

† **Baryum chloratum.** Baryumchlorid Chlorbaryum $BaCl_2 = 208$ 11,73 g krystallisiertes Baryumchlorid ($BaCl_2 + 2 H_2O$) werden in Wasser zu 1 l gelöst Je 1 ccm enthält = 0,01 g $BaCl_2$ Signatur Baryumchlorid $BaCl_2$ 1/C †

Calcium bromatum. Calciumbromid Bromcalcium $CaBr_2 = 200$ 5 g reines Calciumkarbonat werden in 32,4 g Bromwasserstoffsäure von 25 Proc (spec Gew = 1,208) gelöst, die Lösung wird mit Wasser zu 1 l aufgefüllt 100 ccm dieser Lösung enthalten 1 g Calciumbromid $CaBr_2$ Signatur Calciumbromid $CaBr_2$ 1/C.

Calcium chloratum. Calciumchlorid Chlorcalcium $CaCl_2 = 111$ a) 200 g krystallisiertes Calciumchlorid $CaCl_2 + 6 H_2O$ werden in Wasser zu 1 l gelöst Die Lösung wird auf das spec Gew 1,082 bei 15° C eingestellt 100 ccm dieser Lösung enthalten 10 g Calciumchlorid $CaCl_2$ Signatur Calciumchlorid $CaCl_2$ 1/X.

b) 100 ccm der 1/X Calciumchlorid-Lösung werden mit Wasser zu 1 l aufgefüllt 100 ccm dieser neuen Lösung enthalten 1 g Calciumchlorid $CaCl_2$ Signatur Calciumchlorid $CaCl_2$ 1/C

Lithium chloratum. Lithiumchlorid Chlorlithium $LiCl = 42,5$ Man löst 8,7 Th getrocknetes Lithiumkarbonat in 34,35 Th Salzsäure von 25 Proc (spec Gew 1,123) und füllt diese Lösung zu 1 l auf 1 ccm der Lösung enthält 0,01 g Lithiumchlorid $LiCl$ Signatur Lithiumchlorid $LiCl$ 1/C.

Magnesium chloratum. Magnesiumchlorid Chlormagnesium $MgCl_2 = 95$ In 307,5 g Salzsäure von 25 Proc (spec Gew 1,123), welche mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt ist, löst man 43,0 g frisch gegluhtes Magnesiumoxyd oder soviel davon auf, dass eine kleine Menge ungelöst bleibt und füllt die Lösung zu 1 l auf Der ganze Liter enthält 100 g Magnesiumchlorid $MgCl_2$ Signatur Magnesiumchlorid $MgCl_2$ 1/X

Magnesium nitricum. Magnesiumnitrat Salpetersäure Magnesia $Mg(NO_3)_2 = 148$ Man löst 2,75 g frisch gegluhtes Magnesiumoxyd in 34,0 g Salpetersäure von 25 Proc (spec Gew = 1,153) und füllt mit Wasser bis zu 1 l auf 1 ccm dieser Lösung enthält 0,01 g Magnesiumnitrat $Mg(NO_3)_2$ Signatur Magnesiumnitrat $Mg(NO_3)_2$ 1/C.

Magnesium sulfuricum. Magnesiumsulfat Schwefelsaure Magnesia $\text{MgSO}_4 = 120$ 205,0 g krystallisiertes Magnesiumsulfat ($\text{MgSO}_4 + 7 \text{H}_2\text{O}$) werden in Wasser zu 1 l gelöst. Der ganze Liter enthält 100 g wasserfreies Magnesiumsulfat MgSO_4 . Signatur Magnesiumsulfat MgSO_4 1/X.

†† **Natrium arsenicum.** Natriumarseniat Arsensaures Natrium $\text{AsO}_4\text{Na}_3 = 208$ Man löse 0,553 g trockene, wasserfreie Arsensäure und 0,76 g wasserfreies Natriumkarbonat in Wasser und fülle die Lösung zu 1 l auf. Jeder Kubikcentimeter der Lösung enthält = 1 Milligr Natriumarseniat AsO_4Na_3 . Signatur Natriumarseniat Na_3AsO_4 1/M †††

Natrium carbonicum. Natriumkarbonat Kohlensaures Natrium $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106$ Man löst 540,0 g krystall Natriumkarbonat in Wasser und füllt die Lösung bis zu 2 l auf. 100 g der Lösung enthalten 10 g wasserfreies Natriumkarbonat. Signatur Natriumkarbonat Na_2CO_3 1/X.

Natrium chloratum. Natriumchlorid Chlornatrium Kochsalz $\text{NaCl} = 58,5$ Man löst 100 g gut getrocknetes Kochsalz, welches erhebliche Mengen von Magnesiumchlorid nicht enthält, in Wasser und füllt die Lösung zu 1 l auf. Signatur Natriumchlorid NaCl 1/X.

Natrium phosphoricum basicum. Trinatriumphosphat Basisch-phosphorsaures Natrium $\text{Na}_3\text{PO}_4 = 164$ Es werden 22 g krystallhartes Dinatriumphosphat (Natrium phosphoricum der Officinen) und 3,25 g wasserfreies Natriumkarbonat in Wasser gelöst, die Lösung wird zu 1 l aufgefüllt. 100,0 ccm enthalten 1 g Trinatriumphosphat Na_3PO_4 . Signatur Trinatriumphosphat Na_3PO_4 1/C.

Natrium silicium. Natriumsilicat Kieselsaures Natrium $\text{SiO}_2\text{Na}_2 = 122$ Es werden 100 Th reines Natriumsilicat durch längere Digestion im Wasserbade gelöst und auf 1 l aufgefüllt. 100 ccm enthalten 10 g wasserfreies Natriumsilicat SiO_2Na_2 . Signatur Natriumsilicat SiO_2Na_2 1/X.

Natrium sulfuricum. Natriumsulfat Schwefelsaures Natrium $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142$ Es werden 454,0 g krystall Natriumsulfat in Wasser gelöst und zu 2 l aufgefüllt. 10 ccm der Lösung enthalten 1 g wasserfreies Natriumsulfat Na_2SO_4 . Signatur Natriumsulfat Na_2SO_4 1/X.

Strontium chloratum. Strontiumchlorid Chlorstrontium $\text{SrCl}_2 = 158,5$ Man löst 9,4 g getrocknetes Strontiumkarbonat in 18,60 g Salzsäure von 25 Proc (spec Gew 1,128) und fällt die Lösung zu 1 l auf. 100 ccm enthalten = 1 g wasserfreies Strontiumchlorid SrCl_2 . Signatur Strontiumchlorid SrCl_2 1/C.

Substanzen, welche ausserdem noch bei der Bereitung künstlicher Mineralwässer Verwendung finden

Baryumkarbonat $\text{BaCO}_3 = 197$ Aus der wässrigen Lösung des Baryumchlorids durch Natriumkarbonat auszufällen, hierauf zu waschen und zu trocknen.

Calciumkarbonat. $\text{CaCO}_3 = 100$ Das durch Fällung hergestellte Präparat des Arzneibuches *Calcium carbonicum praecipitatum*.

Calciumphosphat, basisches $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 = 310$ Dreibasisches Calciumphosphat. Wird durch Füllen von Calciumchlorid mit Trinatriumphosphat erhalten.

Calciumsulfat, kryst $\text{CaSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} = 172$ Zur Darstellung werden 20 Th krystall Calciumchlorid in 200 Th Wasser gelöst, die erwärmte Lösung mit einer lauwarmen Lösung von 30 Th kryst Natriumsulfat oder 12 Th Ammoniumsulfat in 300 Th Wasser vermischt. Der nach zwei Tagen abgeschiedene Niederschlag wird ausgewaschen und bei 30° C getrocknet.

Ferrochlorid. $\text{FeCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} = 163$ Das durch Auflösen von Eisenpulver in Salzsäure und durch Verdampfen der Lösung bis zur Salzaut erhaltene krystallisierte Präparat, welches durch Trocknen in der Sonne zum Theil entwässert und oxydfrei erhalten worden ist.

Grünlich-weisses Pulver, welches sich bei sorgfältiger Aufbewahrung hinlänglich gut hält.

Ferrosulfat, krystall $\text{FeSO}_4 + 7 \text{H}_2\text{O} = 278$ Krystall schwefelsaures Eisen. Das Präparat des Arzneibuches, durch Alkohol aus seiner wässrigen Lösung als Krystallpulver gefällt.

Schwefelwasserstoff. H_2S Wird gewöhnlich als Schwefelwasserstoff-Wasser angewendet. Man nimmt an, dass das bei mittlerem Druck und bei mittlerer Temperatur gesättigte Schwefelwasserstoff-Wasser in 10 ccm = 0,083 g oder 20 ccm Schwefelwasserstoffgas enthält.

Magnesiumkarbonat, krystall $\text{MgCO}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} = 188$ Man löst 3 Th kryst Magnesiumsulfat in 10 Th Wasser, filtrirt in einen geräumigen Kolben, setzt 2 Th Natriumkarbonat hinzu und erwärmt unter häufigem Umschwenken allmählich bis 40° C (nicht darüber!). Man lässt nun 2—3 Tage bei gewöhnlicher Temperatur stehen, sammelt den

Niederschlag, presst ihn ab und trocknet an der Luft. Wird, zu feinem Pulver zerrieben, in gut verschlossenen Gefässen aufbewahrt.

Natriumsulfid. $\text{Na}_2\text{S} + 9\text{H}_2\text{O} = 240$ Krystall Natriumsulfid. Man bereitet z. B. 500 cem einer 88proc. Natriumhydroxyd-Lösung (spec. Gew. 1,336) und theilt diese in zwei gleiche Voluma. Ein Volum, also 250 cem, sättigt man völlig mit gewaschenem Schwefelwasserstoffgas. Alsdann fügt man dieser Lösung das andere Volum der Natriumhydroxydlösung hinzu, mischt und lässt an einem kühlen Orte wohlverschlossen stehen. Die sich abscheidenden Krystalle sind das obige Präparat. Sie werden, mit 60proc. Alkohol abgespült, auf Filtrirpapier getrocknet und in gut verschlossenen Gläsern unter Paraffinverschluss aufbewahrt.

III Die Kohlensäure. Die zur Fabrikation von Mineralwassern erforderliche Kohlensäure wird entweder als flüssige Kohlensäure durch den Handel bezogen, oder als gasförmige Kohlensäure selbst bereitet. In letzterem Falle erfolgt die Darstellung dadurch, dass man gewisse natürlich vorkommende kohlensäure Mineralien durch stärkere Säuren zersetzt, und die hierbei freiwerdende Kohlensäure reinigt und aufammelt.

Als solche kohlensäure Mineralien kommen in Betracht Kreide, Marmor, Dolomit, Magnesit. — Als zersetzende stärkere Säuren werden angewendet Salzsäure und Schwefelsäure.

Ob man Salzsäure oder Schwefelsäure als Zersetzungssäure benutzt, hängt im wesentlichen davon ab, welches kohlensäure Mineral man als Kohlensäurequelle verwendet, denn es ist darauf hinzuwirken, dass man bei dieser Reaktion möglichst lösliche Nebenprodukte erhält. Und die Wahl des kohlensäuren Minerals ist im allgemeinen wieder von örtlichen Bedingungen abhängig. Wo also z. B. Kreide oder Marmor wesentlich billiger als andere Materialien zu erlangen sind, wird man diese wählen, obgleich sie im praktischen Betriebe etwas schwieriger zu handhaben sind als z. B. Magnesit. Die Auswahl des Karbonates und der Säure ist also Sache der Kalkulation.

Kreide. Da diese im trockenen Zustande fast reines Calciumkarbonat darstellt, so verbrauchen

	Salzsäure		Schwefelsäure
	von 80 Proc	von 88 Proc	von 95 Proc
100 Th trockene Kreide	243 Th	219 Th	100 Th

Die Salzsäure ist hierbei, um die Kohlensäure-Entwicklung handlich zu gestalten, auf einen Gehalt von rund 20 Proc. Chlorwasserstoff, also mit etwa $\frac{1}{5}$ Volumen Wasser zu verdünnen. Unter diesen Umständen bietet die Zersetzung der Kreide durch Salzsäure wesentliche Schwierigkeiten nicht. Es ist jedoch zu beachten, dass die Kreide nicht trocken, sondern etwa mit dem gleichen Gewichte Wasser angerührt in das Entwicklungsgefäss zu bringen ist, worauf man die wie vorher angegeben verdünnte Salzsäure in kleinen Antheilen zufließen lässt. Es ist ferner auf den Wassergehalt der Kreide Rücksicht zu nehmen.

Benutzt man Schwefelsäure zur Zersetzung der Kreide, so ist diese vorher mit der doppelten Menge lauwarmen Wassers anzurühren, bevor man die Säure in kleinen Antheilen zufließen lässt.

Die Anwendung von Schwefelsäure zur Zersetzung der Kreide bietet den Nachtheil, dass die Zersetzung nicht vollständig wird. Das entstehende unlösliche Calciumsulfat hüllt die Kreideklumpen ein, sodass die Einwirkung der Säure auf diese verhindert wird. — Bei Anwendung von Salzsäure fällt diese Schwierigkeit weg. Dafür aber verbreitet die Salzsäure, wenn sie nicht auf 20 Proc. HCl verdünnt ist, Dämpfe in dem Fabrikationsraume, welche alle dort befindlichen Metalltheile angreifen. Ausserdem werden Salzsäuredämpfe von der entwickelten Kohlensäure hartnäckig mitgenommen, so dass die letztere zur Reinigung durch 4–5 Waschflaschen zu leiten ist. Man wählt alsdann zweckmässig folgende Anordnung der Reinigung: Waschflasche I. Lösung von 10 Proc. kryst. Soda. Waschflasche II. Lösung von 10 Th. kryst. Eisenvitriol, 2 Th. kryst. Soda und 200 Th. Wasser. Waschflasche III. Lösung von 3 Th. Kaliumpermanganat, 100 Th. Wasser und 5 Th. englischer Schwefelsäure. Waschflasche IV. kalt gesättigte Lösung von Natriumbikarbonat. Waschflasche V. Reines Wasser.

Die Verwendung von Kreide bietet an sich den Uebelstand, dass die entwickelte Kohlensäure durch schwefelhaltige und bituminöse (also riechende und schmeckende) Gase verunreinigt ist. Sie kann zwar durch das schon angegebene Reinigungssystem von diesen befreit werden, indessen setzt diese Reinigung eine grosse Sorgfalt in der Wartung voraus.

Für Marmor gilt bezüglich der Wahl von Schwefelsäure oder Salzsäure genau das Gleiche wie für Kreide. Hinsichtlich der Reinheit des zu erwartenden Kohlensäure-Gases ist zu bemerken, dass weisser Marmor eine sehr reine Kohlensäure liefert. Schwarzer

Marmor oder Kalkstein dagegen liefern durch riechende Bestandtheile stark verunreinigte Kohlensäure

2) Dolomit Bekanntlich ein natürliches Mineral, aus Calciumkarbonat und Magnesiumkarbonat bestehend, wird im gemahlten Zustande verwendet Die Zersetzung kann bei Anwendung von Salzsäure bei gewöhnlicher Temperatur erfolgen,¹⁾ bei Benutzung von Schwefelsäure muss man den Dolomit mit heissem Wasser anrühren

	Salzsäure			Schwefelsäure	
	Wasser	von 33 Proc	von 30 Proc	Wasser	von 95 Proc
100 Th Dolomit bedürfen	100 Th	220 Th	240 Th	200 Th	120 Th

Die Kombination Dolomit + Salzsäure bietet alle Unannehmlichkeiten, welche aus der Anwendung von Salzsäure überhaupt resultiren, siehe bei Kreide Die Kombination Dolomit + Schwefelsäure liefert ein reines Kohlensäure-Gas, vorausgesetzt, dass der Dolomit frei von bituminösen Bestandtheilen ist, wovon man sich durch den Versuch zu überzeugen hat Die Reinigung der entwickelten Kohlensäure erfolgt bei Anwendung von Salzsäure wie unter Kreide beschrieben ist, bei Anwendung von Schwefelsäure wie bei Magnesit

3) Magnesit, ein natürliches Magnesiumkarbonat darstellend, wird gleichfalls im gemahlten Zustande in den Handel gebracht Man kann zur Zersetzung zwar Salzsäure benutzen, verwendet in der Regel aber Schwefelsäure In diesem Falle rührt man den Magnesit mit der doppelten Raummenge heissem Wasser zu einem Brei an und lässt alsdann in kleinen Antheilen die concentrirte Schwefelsäure zufließen

	Salzsäure			Schwefelsäure	
	Wasser	von 33 Proc	von 30 Proc	Wasser	von 95 Proc
100 Th Magnesit bedürfen	100	245—250	270—275	200	118—120 140—144

Die Kombination Magnesit + Schwefelsäure liefert eine verhältnissmässig reine, leicht zu reinigende Kohlensäure Die Reinigung erfolgt, indem man das Gas durch folgendes Reinigungssystem leitet Waschflasche I Lösung von 10 Th kryst Ferrosulfat, 2 Th kryst Soda und 200 Th Wasser Waschflasche II Lösung von 10 Proc kryst Soda Waschflasche III Reines Wasser Zwischen II und III kann, falls bituminöser Geruch auftritt, noch eine Flasche mit Kaliumpermanganat eingeschaltet werden

4) Natriumbikarbonat Wir kennen zwar keinen Betrieb, in welchem Natriumbikarbonat verwendet wird, da dieser Fall aber nicht ausserhalb der Möglichkeit liegt, so muss er besprochen werden Zur Verwendung wurde das gewöhnliche Natriumbikarbonat der Ammoniak-Soda-Fabriken gelangen Bei Zersetzung mittelst Salzsäure werden sich die unter Kreide geschilderten Unzutraglichkeiten herausstellen, bei Verwendung von Schwefelsäure ist ein sehr reines Kohlensäure Gas zu erwarten Die Zersetzung erfolgt sowohl mit Salzsäure als mit Schwefelsäure in der Kälte

	Salzsäure			Schwefelsäure	
	Wasser	von 33 Proc	von 30 Proc	Wasser	von 95 Proc
100 Th Natriumbikarbonat bedürfen	100	125,0	133,0	200	60

Die Reinigung des Gases erfolgt wie bei der Kombination Magnesit + Schwefelsäure angegeben

Bei der Kalkulation des Preises ist es natürlich wesentlich, zu wissen, wie hoch sich ein Kilogramm Kohlensäure einstellt Dies wird sich leicht berechnen lassen, wenn man die Mengen der Rohmaterialien kennt, welche zur Gewinnung von 1 kg Kohlensäure erforderlich sind

Für 1 kg Kohlensäure gebraucht man in der Praxis

	Kilo	Schwefelsäure (35 Proc.)	Salzsäure (33 Proc.)
Magnesit	2,2	2,6	5,58
Dolomit	2,52	2,65	5,62
Calciumkarbonat	2,55	2,62	5,57
Natriumbikarbonat	2,2	1,32	2,80

Flüssige Kohlensäure. Diese ist zur Zeit Gegenstand lebhaften Handels und wird zu ausserordentlich billigen Preisen geliefert Ueber Darstellung und Eigenschaften siehe Acidum carbonicum S 32

In den Handel gelangt die flüssige Kohlensäure in nathlosen Stahlflaschen, welche auf einen Druck von 250 Atmosphären amtlich geprüft worden sind Eine solche Flasche

¹⁾ Doch empfiehlt sich auch bei der Kombination Dolomit + Salzsäure, den Dolomit mit warmem Wasser anzurühren

stellt in dem Zustande, in welchem sie sich während des Versandes befindet, einen schlanken Eisencylinder *A* dar, welcher einen verbreiterten Fuassansatz *B* trägt. *C* ist eine Schutzkappe, welche während des Transportes zum Schutz für die Ventileinrichtung aufgeschraubt ist. Entfernt man diese Kappe, so sieht man die Ventilschraube *D*, ferner ist bei *E* ein Schraubenstutzen vorhanden, an welchen wie in Fig. 91 ein Schlauchhahn oder wie in Fig. 92 ein Reducirventil angeschlossen werden kann.

Wird die Ventilschraube *D* im Sinne der Uhrzeiger-Bewegung gedreht, so wird das Ventil geschlossen, wird sie in entgegengesetzter Richtung gedreht, so wird das Ventil geöffnet, und die Kohlensäure strömt bei *E* aus. Da das Gas unter erheblichem Drucke steht, so ist das Oeffnen des Ventils mit Vorsicht zu bewerkstelligen, damit nicht unnöthig Gas verloren geht oder gar Zertrümmerung etwa angeschlossener Apparate erfolgt. Solche Vorkommnisse werden vermieden durch Einschaltung eines Reducirventils. (Fig. 92.)

Ein solches Reducirventil wird unmittelbar an die Kohlensäure-Flasche mittelst einer Schraubenmutter angeschlossen. Oeffnet man den Niederschraubhahn *D*, so kann durch Stellung der Schraube *S* der Druck so regulirt werden, dass bei *G* die Kohlensäure mit einem bestimmten, gleichbleibenden Drucke ausströmt, welcher an dem Manometer abgelesen werden kann. Ein stärkerer Druck kann hinter dem Reducirventil nicht auftreten. Entströmt der Kohlensäureflasche zuviel Kohlensäure, so bläst das Ventil von einem bestimmten Drucke aus gerechnet ab, d. h. der Ueberschuss der Kohlensäure entweicht durch das Sicherheitsventil *V*. (Fig. 92.)

Da bei 760 mm Barometerstand und 15° C. 1 kg Kohlensäuregas den Raum von 585 l einnimmt, so stellen 10 kg Kohlensäure bei mittlerer Temperatur rund 5000 l, d. h. 5 cbm Kohlensäure dar.

Die in den Handel gelangende flüssige Kohlensäure ist in der Regel von grosser Reinheit. Man hat von ihr zu verlangen, dass sie praktisch luftfrei sei. Fängt man sie über Kalilauge auf, so muss sie nach kurzer Zeit von der Kalilauge absorbiert werden, ohne dass bei Mengen von 50–100 cem wahrnehmbare Mengen nicht absorbirter Gase zurückbleiben. Sie muss ferner frei sein von fremdartigen, den Geruch und Geschmack beeinflussenden Beimengungen. Man hat vorgeschlagen, sie hierauf in der Weise zu prüfen, dass man die gasförmig entweichende Kohlensäure durch eine mit Schwefelsäure angesäuerte Kaliumpermanganatlösung leitet und feststellt, welche Mengen Kaliumpermanganat durch ein bestimmtes Gewicht Kohlensäure reducirt werden. Indessen ist die beste Kontrolle die Herstellung des Mineralwassers selbst. Fällt dieses unter Bedingungen, welche sonst ein gutes Produkt liefern, schlecht aus, d. h. besitzt es üblen Geruch oder Geschmack, so ist die Kohlensäure dafür verantwortlich zu machen.

Für den Transport, die Aufbewahrung und die Handhabung der Kohlensäureflaschen sind Polizei-Verordnungen erlassen, welche genau einzuhalten sind. Von Wichtigkeit ist, dass die Flaschen an einem kühlen Orte untergebracht sind, und dass sie vor plötzlichen Erschütterungen möglichst bewahrt werden. Dass von ihnen Substanzen fern zu halten sind, welche Eisen anzugreifen vermögen, versteht sich eigentlich von selbst.

Für die regelmässigen Konsumenten flüssiger Kohlensäure empfiehlt es sich, die erforderlichen Flaschen nicht zu leihen, sondern als Eigenthum zu erwerben, da sich hierdurch der Preis der Kohlensäure wesentlich ermässigt.

IV. Die Apparate. Die Anzahl der für Erzeugung künstlicher Mineralwässer konstruirten Apparate ist eine sehr grosse, da jede Apparaten-Fabrik mehrere besondere Modelle fertigt. Alle diese Apparate lassen sich indessen auf drei Grund-Typen zurückführen.

A. Selbst-Entwickler. Dieser nicht sehr glücklich gewählte Name soll andeuten, dass die Sättigung des Wassers mit Kohlensäure nicht unter Anwendung von Pumpenapparaten, sondern unter dem von der entwickelten Kohlensäure erzeugten eigenen Gasdruck erfolgt. Hieraus ergibt sich, dass der ganze Apparat in allen seinen Theilen ein einziges drucksicheres Gefäss darstellt, und dass deshalb alle einzelnen Theile so konstruirt sein müssen, dass sie einen hohen Gasdruck aushalten. Sie müssen also gasdicht und druckfest sein.




Fig. 91.




Fig. 92.

In beistehender Figur ist *A* das Säuregefäß, in der Regel aus Blei hergestellt. *B* ist der kupferne, stark mit Blei plattirte Entwickler mit dem Rührer *C*. Als *D* ist ein Manometer bezeichnet, welcher den Gasdruck sowohl in dem Entwickler als auch in dem ganzen übrigen Apparate anzeigt. *E E E* sind aus Kupfer hergestellte, innen stark verzinnte, gasdichte und druckeichere Waschflaschen. Das gewaschene Gas gelangt durch die Leitung *F* in den Mischcylinder *G*. Das mit Kohlensäure imprägnirte Wasser gelangt durch die Leitung *J* nach dem Abfüllapparat *H*.

Diese Apparate können heute eigentlich nur noch auf historisches Interesse Anspruch machen. Wie schon bemerkt, stellt der ganze Apparat in allen seinen Theilen ein einziges Gefäß dar, welches während des Betriebes in allen seinen Theilen unter einem Gasdruck von 5–6 Atmosphären steht. Deshalb müssen alle Theile so konstruirt sein, dass sie diesen und einen höheren Druck aushalten. Gewöhnlich werden diese Apparate unter einem Druck von 12 Atmosphären geprüft. Es ergibt sich hieraus die Nothwendigkeit, alle Theile ziemlich schwer in Metall herzustellen. Das Säuregefäß ist z. B. aus Blei, die Waschflaschen sind aus Kupfer hergestellt. Und trotz aller Vorsichtsmaßregeln sind diese Apparate im Gebrauche doch nicht ganz ungefährlich.




Fig. 93.

Wenn ein Rohr sich verstopft, oder das Manometer versagt, können recht gefährliche Gasspannungen in dem Apparate auftreten. Sie sind deshalb von der Praxis ziemlich aufgegeben worden.

B. Pumpenapparate. Bei diesen wird die zu verwendende Kohlensäure aus Karbonaten und Salzsäure oder Schwefelsäure bei gewöhnlichem Drucke entwickelt. Sie wird alsdann gereinigt, in Gasometern aufgefangen und mittelst geeigneter Saug-Druckpumpen in die Mischcylinder gepresst, welche das zu imprägnirende Wasser, bez. die zu imprägnirende Salzlösung enthalten.

In beistehender Figur 94 ist *A* das Säuregefäß, *B* der Entwickler für die Kohlensäure, *C* vier Waschflaschen aus Glas (Woulff'sche Flaschen) mit Sicherheitstrichtern. Die erzeugte und gereinigte Kohlensäure wird unter der Gasometerglocke *D* angesammelt. Von hier wird sie mittelst der Luftpumpe *L* und zwar durch die Leitung *E* in den kupfernen Waschcylinder *F* geleitet und hierauf durch die Leitung *G* in den Mischcylinder *M* gepresst. Das fertige Mineralwasser gelangt durch die Leitung *J* nach dem Abfüllapparat *K*. Die Leitung *H* hat den Zweck, die nach dem Abfüllen des Mineralwassers in dem Mischcylinder *M* verbleibende Kohlensäure wieder in den Gasometer zurückzuleiten.

Die Haupttheile eines solchen Apparates sind demnach: 1) Das Entwicklungsgefäß für Kohlensäure nebst Waschvorrichtung. 2) Der Gasometer. 3) Die Luftpumpe. 4) Der Mischcylinder.

Das Entwicklungsgefäß für Kohlensäure ist in der Regel aus Kupfer hergestellt, welches mit Blei plattirt ist. Das darüberstehende Säuregefäß ist in allen Theilen, welche mit der Säure bestimmungsgemäß in Berührung kommen, gleichfalls mit Blei plattirt, bez. verbleit oder aus Blei hergestellt, soweit nicht Glas zur Verwendung gelangt. Die Gasometerglocke wird am zweckmäßigsten aus Kupfer hergestellt und mit einem Galvanisch-

überzogen. Zur Aufnahme der Gasometerglocke und des Absperrwassers dient gewöhnlich ein hölzerner Bottich. Als Sperrflüssigkeit wählt man Wasser, welches im Sommer alle 6 Wochen, im Winter alle 3 Monate einmal erneuert wird. Calciumchlorid- oder Magnesiumchlorid-Lösungen wählt man nur dann — im Winter — als Sperrflüssigkeit, wenn andernfalls das Einfrieren des Gasometers sicher zu erwarten ist. — Ein sehr wichtiges Organ dieser Apparate ist die Luftpumpe. Diese funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn die Ventile dicht schliessen. Wo dies nicht der Fall ist, müssen sie von einem Sachverständigen (Präcisionsmechaniker) nachgeschliffen werden. Der Hauptfehler, welcher bei allen Pumpen in der Regel gemacht wird, besteht darin, dass man dieselben zur Erzielung leichteren Ganges zu reichlich ölt. Dies ist zu vermeiden. Man mache es sich zum Grundsatz, nicht mehr Oel (gutes Olivenöl oder flüssiges Paraffin) zu geben, als wirklich erforderlich ist und vor jedem neuen Oelen das alte Oel wegzuwischen, auch in regelmässigen Zeiträumen die Pumpen abzuschrauben und alle alten Oelreste zu beseitigen. Nur bei Befolgung dieser Massregeln erzielt man mit Pumpenapparaten dauernd ein gleichmässig wohl-schmeckendes Wasser.




Fig. 84.

Damit die Kohlensäure nicht bloss frei von riechenden und schmeckenden Verunreinigungen, sondern auch frei von Luft erhalten wird, lässt man bei einer neuen Füllung des Entwicklungsgefässes bei geöffneter Füllöffnung die Entwicklung der Kohlensäure erst einige Zeit andauern, damit die Luft aus dem Gefässe verdrängt und durch Kohlensäure ersetzt wird. Dann schliesst man das Entwicklungsgefäss und lässt nun auch durch die Waschflaschen erst einige Zeit den Gasstrom ins Freie treten, bevor man die Kohlensäure unter der Gasometerglocke auffängt. (Prüfung durch ein brennendes Streichholz!)

Ist die Gasometerwanne mit frischem Wasser gefüllt worden, so lässt man sie, indem man den an ihrem höchsten Punkte befindlichen Hahn öffnet, vollständig unter Wasser untertauchen, so dass dieses durch den Hahn durchtritt. Alsdann schliesst man den Hahn und lässt nun die Kohlensäure unter der mit Wasser gefüllten Glocke sich ansammeln.

In manchen Betrieben hält man einen besonderen Gasometer für solche Kohlensäure, welche voraussichtlich mit etwas Luft verunreinigt ist und benutzt diese zum Füllen der Flaschen mit Kohlensäure, s. S. 352.

O) Apparate mit flüssiger Kohlensäure. Durch die Anwendung flüssiger Kohlensäure wird die Einrichtung der Mineralwasserapparate ganz wesentlich vereinfacht. Bei Apparaten mit Mischcylindern von nicht mehr als 50 l Inhalt besteht der ganze Apparat lediglich aus der Kohlensäureflasche mit Reducirventil, dem Mischcylinder und der Abfüllvorrichtung. Gegenüber den Pumpenapparaten fallen weg: die Vorrichtungen für die Entwicklung der Kohlensäure, für das Auffangen der letzteren und die Luftpumpe.

Für Apparate mit Mischcylindern über 50 l Inhalt ist in einigen Bezirken vorgeschrieben zwischen Kohlensäureflasche und Mischcylinder die Einschaltung eines Expansionskessels mit Sicherheitsventil und Manometer. Diese Expansionskessel sind Gefässe aus Kupfer von 100 l Inhalt, welche zur Aufspeicherung der Kohlensäure unter einem bestimmten Drucke dienen (12 Atmosphären).

Ihre Einrichtung entstammt noch einer Zeit, als es noch nicht gelungen war, die Reducirventile in der nöthigen Zuverlässigkeit herzustellen.

Bei Benutzung flüssiger Kohlensäure gestaltet sich die Herstellung kohlensaurer Wasser ungemein einfach: Man bringt das zu imprägnirende Wasser oder die zu imprägnirende

Salzlösung in das Mischgefäß, verbindet dieses mit der Kohlensäureflasche, öffnet diese so weit, dass die Kohlensäure in das Mischgefäß mit dem gewünschten Druck von 4 bis 8 Atmosphären eintritt und sättigt das Wasser alsdann dadurch, dass man die Rührvorrichtung in Thätigkeit setzt u. s. w.

D) **Kleinapparate.** Verfügt man über flüssige Kohlensäure, so kann man mit Hilfe gewisser Kleinapparate auch relativ kleine Mengen kohlensaures Mineralwasser, z. B. eine oder mehrere Flaschen, herstellen. Das ist namentlich für medikamentöse Wasser wichtig. Die bestehende Figur 97 zeigt den Apparat „Blitz“.

In bestehender Figur ist rechts die Kohlensäureflasche *K*, links der eigentliche Apparat. Man füllt zunächst die Flasche *B* mit Wasser oder der vorgeschriebenen Salzlösung und schliesst sie mittelst der Stellschraube *D* fest an den Apparat an. Dann lässt man durch Öffnen des Hahnes *E* Kohlensäure bis zum Drucke von 1–2 Atmosphären Zutreten, schliesst den Hahn der Kohlensäureflasche *G*, fasst alsdann den Hebel *F* und richtet diesen nach oben, so-




Fig. 95. Kleiner Mineralwasser-Apparat für flüssige Kohlensäure. *A* Kohlensäure-Flasche mit Reducirventil und Manometer. *B* Mischcylinder mit Sicherheitsventil und Manometer. *C* Abfall-Vorrichtung.

dass die Kugel *A* nach unten und die Flasche *B* in eine schiefe Lage kommt. Der Inhalt der Flasche *B* ergiesst sich nun nach der Kugel *A*. Man mischt hier das Wasser mit der Kohlensäure durch Hin- und Herschwenken des Apparates und bringt diesen wieder in die ursprüngliche Lage. Nachdem man durch ein kurzes Lüften der Schraube bei *D* die

Hauptmenge der Gase (um die Luft abzublasen) entfernt hat, schraubt man die Flasche wieder fest ein, lässt 4–5 Atmosphären Druck Zutreten, bringt den Inhalt der Flasche durch Neigen wieder in die Mischkugel *A*, sättigt hier durch Schwenken mit Kohlensäure. Sobald die Sättigung erfolgt ist, stellt man den Apparat so ein, dass die Kugel *A* nach unten gerichtet ist und die Flasche *B* senkrecht nach unten steht. Man schliesst den Hahn *G* und *E* und nimmt die umgekehrt stehende Flasche durch Rückwärtadrehen der Stellschraube *D* heraus. Da hier Kugelschluss angenommen ist, tritt sofort Verschluss der Flasche ein.




Fig. 96. Größerer Mineralwasser-Apparat für flüssige Kohlensäure. *A* Kohlensäure-Flasche. *B* Expansionskessel mit Manometer *G* und Sicherheitsventil *H*. *J* Mischgefäß. *P* Wasserpumpe. *S* Abfall-Vorrichtung.

phärische Luft ist. Jedes Wasser, welches mit der Luft in Berührung ist, löst atmosphärische Luft auf und enthält pro Liter nach LIEBIG 3–5 ccm Luft gelöst. Die gelöste Luft verdrängt etwa ihr 20faches Volumen gelöster Kohlensäure aus dem Wasser, ausserdem ist sie die Ursache für eine besondere Erscheinung: Wird nämlich ein luftfreies Wasser mit Kohlensäure imprägnirt und unter Druck auf Flaschen gefüllt, so entweicht zwar beim Öffnen der Flaschen etwas Kohlensäure. Die Hauptmenge der Kohlensäure aber ist in

Das Imprägniren des Wassers mit Kohlensäure. Will man ein tadelloses kohlensaures Wasser herstellen, so hat man zu beachten, dass der grösste Feind desselben die atmos-

dem Wasser gelöst und steigt sehr allmählich in Form kleiner Bläschen aus dem Wasser auf. — Ist dagegen lufthaltiges Wasser mit Kohlensäure (oder Wasser mit lufthaltiger Kohlensäure) gesättigt worden, so entweicht beim Öffnen der Flasche das zwischen Wasser und Stopfen komprimierte Kohlensäuregas mit heftigem Aufsprudeln auf einmal. Giesst man jetzt den Flascheninhalt in ein Trinkglas, so nimmt man nahezu gar kein Aufperlen wahr, denn die Kohlensäure war eben nicht in dem Wasser gelöst, sondern zwischen Wasser und Stopfen komprimiert.

Die Menge Kohlensäure, welche das Wasser unter sonst gleichen Umständen auflöst, ist abhängig von dem Druck und der Temperatur. Luftfreies Wasser nimmt etwa auf:

Unter dem Drucke von:	bei 5—8° C.	10—15° C.	17—20° C.
0 (gewöhnl. Druck)	1,3 Vol.	1,0	0,9
1 Atmosphär. Ueberdruck	2,5 "	2,0	1,8
2 " " "	3,5 "	3,0	2,6
3 " " "	4,3 "	3,8	3,3
4 " " "	4,8 "	4,3	3,8
5 " " "	5,3 "	4,7	4,2
6 " " "	5,7 "	5,0	4,4
7 " " "	6,0 "	5,3	4,5

Ein Wasser, welches drei Volumen Kohlensäure gelöst enthalten soll, wäre demnach bei einer Temperatur von 12° C. unter dem Druck von 2 Atmosphären, bei einer Temperatur von 18° C. dagegen unter dem Druck von 3 Atmosphären zu sättigen.

Die Imprägnierung mit Kohlensäure erfolgt in der Weise, dass man das Mischgefäß zunächst zu nicht mehr als $\frac{1}{10}$ mit dem zu imprägnirenden Wasser anfüllt. Dies kann durch die Wasserpumpe geschehen, wo eine solche vorhanden ist. Im anderen Falle durch direktes Einfüllen in die Füllöffnung. In diesem letzteren Falle empfiehlt es sich, den Mischcylinder völlig bis zum Ueberlaufen mit Wasser anzufüllen, die Verschlusschraube aufzusetzen und nun $\frac{1}{10}$ des Wassers durch Ueberdrücken von Kohlensäure wieder auslaufen zu lassen. Wie man auch operirt haben möge, zunächst wird unter Inbetriebsetzung des Rührwerkes entweder durch die Kohlensäurepumpe oder direkt aus der Kohlensäureflasche soviel Kohlensäure in den Mischcylinder gepresst, dass das Manometer etwa 2 Atmosphären Druck anzeigt. Alsdann lässt man mittels des „Zumischers“ die erforderlichen Lösungen zulaufen, setzt das Rührwerk in Betrieb und presst weiter so viel Kohlensäure (unter kräftigem Rühren) in den Cylinder, bis das Manometer 4 Atmosphären anzeigt. Hierauf lässt man den Apparat einige Augenblicke ruhig stehen, lüftet alsdann den Abblasehahn und lässt das Gas so lange entweichen, als ein Ueberdruck vorhanden ist, wodurch die Luft zum grössten Theile beseitigt und durch Kohlensäure verdrängt wird. Man schliesst nun den Abblasehahn und presst aufs neue unter Bewegung des Rührwerkes Kohlensäure bis zu 4 Atmosphären Spannung in das Mischgefäß. Man lässt wiederum kurze Zeit stehen und den Ueberschuss des Gases alsdann durch Lüftung des Abblasehahnes entweichen. Man schliesst alsdann den Abblasehahn und presst unter Inbetriebsetzung des Rührwerkes aufs neue Kohlensäure ein, bis nach energischem Bewegen des Rührwerkes die Flüssigkeit unter dem vorhandenen Drucke nunmehr mit Kohlensäure vollständig gesättigt ist. Man erkennt dies wie folgt: Angenommen, das Manometer zeigt $4\frac{1}{2}$ Atmosphären an. Man unterbricht das Zupumpen von Kohlensäure oder den weiteren Zutritt von Kohlensäure aus der Stahlflasche und setzt das Rührwerk in energische Bewegung. Geht das Manometer zurück, z. B. auf $3\frac{1}{2}$ Atmosphären, so ist das ein Beweis, dass die Sättigung noch nicht vollendet ist. Bleibt es dagegen auf $4\frac{1}{2}$ Atmosphären stehen, so folgt daraus, dass die Sättigung beendet ist. Im ersteren Falle hat man unter weiterer Inthätigkeitsetzung des Rührwerkes das Zupressen von Kohlensäure fortzusetzen, bis die Sättigung erreicht ist.

Entnimmt man in diesem Zustande eine Probe des Wassers, so darf dieses nicht milchig trübe (durch Luftbläschen) aussehen, sondern es muss klar sein und die Erscheinung des lange Zeit anhaltenden Perlens darbieten. Ist dies nicht der Fall, so muss zum dritten Male abgelassen und die Imprägnation aufs neue vorgenommen werden. Bei Wassern, welche leicht oxydirbare Verbindungen (z. B. solche des Eisenoxyduls und Mangans) enthalten, ist ein dreimaliges Abblasen unter allen Umständen zu empfehlen bez. man bläst so lange ab, bis das entweichende Gas aus völlig luftfreier Kohlensäure besteht.




Fig. 97.

Ist nach dreimaligem Ablassen das Wasser noch nicht von der gewünschten Beschaffenheit, so ist höchstwahrscheinlich die Kohlensäure selbst lufthaltig.

Infolge des Abfüllens des Mineralwassers sinkt der Druck allmählich in dem Mischcylinder. Es ist durch zeitweises Nachpumpen oder Zulassen von Kohlensäure Sorge dafür zu tragen, dass dieses Sinken keinen allzu erheblichen Betrag annimmt.

Die Prüfung der Kohlensäure auf Luftgehalt geschieht mittelst des Aëro-




Fig. 38. p Aërodektter-Rohr. a Abblaserrohr mit Hahn auf dem Mischgefäß. s Gummischlauch mit gekrümmtem Glasrohransatz.

dektterrohres, eines circa 20 cm langen Rohres von Pipettenform, welches an seinem längeren und engeren Ende geschlossen ist. Dieses Aërodektterrohr füllt man völlig mit abgekochtem und erkaltetem Wasser und hierauf mittelst eines Kautschukrohres, welches dem Abblaserrohr aufgesetzt und mit einem Glasrohr armirt und aus welchem durch ablassende Kohlensäure die atmosphärische Luft verdrängt ist, unter Wasser mit der Kohlensäure. Dann schliesst man das Abblaserrohr und die Oeffnung des Aërodektterrohres mit dem Finger unter dem Wasser und führt es in eine verdünnte Aetznatronlauge von 10 bis 15 Proc. über. Unter gelinder Hin- und Herbewegung fällt sich das Rohr bei luftfreier Kohlensäure bis zu seinem geschlossenen äusseren Ende. Bei Gegenwart atmosphärischer Luft wird diese sich dagegen hier ansammeln. Kennt man den Rauminhalt des Aërodektters, so lässt sich auch der Luftgehalt der Kohlensäure dem Volumen nach leicht bestimmen.

Bei Bereitung der Eisensäuerlinge muss die zu absorbierende Kohlensäure völlig frei von Luft sein, während bei Bereitung der sog. Luxuswässer ein sehr geringer Luftgehalt von 0,5—1,0 Proc. allenfalls zulässig ist. Um diese Luftfreiheit sicher zu erzielen, lässt man der Bereitung der Eisenwässer diejenige von gewöhnlichem Selters oder Sodawasser vorausgehen.

Das Abfüllen des Mineralwassers. Wasser, welches auf Glasflaschen gefüllt wird, sättigt man bei 3—4 Atmosphären mit Kohlensäure, Wasser für Syphons bei 4—5 Atmosphären, Wasser für Ausschank-Cüvetten (Ballons) bei 6—7 Atmosphären.

Das Abfüllen des kohlensäurehaltigen Wassers in Flaschen erfolgt mit Hilfe besonderer Abfüllvorrichtungen. In gut geleiteten Fabriken werden die Flaschen vorher mit Kohlensäure gefüllt. Zu diesem Zwecke füllt man sie mit reinem Wasser vollständig an, stellt die gefüllten Flaschen umgekehrt in ein mit Wasser gefülltes Gefäß (pneumatische Wanne) und lässt nun aus einem Rohr oder Gummischlauch die Kohlensäure in die Flasche eintreten, welche sodann herausgehoben und mit einem Kork rasch provisorisch verschlossen wird. Die Kohlensäure, welche hierzu verwendet wird, ist meist diejenige, welche nach Fertigstellung des Mineralwassers aus dem Misch-Cylinder in einen besonderen Gasometer übergeführt wird. Kleinere Fabriken sammeln auch die bei dem zweiten „Ablassen“ sich ergebende Kohlensäure zu dem gleichen Zwecke auf.

Der Verschluss der Flaschen erfolgt entweder durch Korken — und in diesem Falle entweder aus freier Hand oder mit einer Korkmaschine — oder durch Kugelverschluss oder durch Patentverschluss.

Wo Gummitheile an den Verschlüssen vorhanden sind, ist zu beachten, dass das Wasser von neuen Gummischeiben unter Umständen Geruch und Geschmack annehmen kann. Solche neue Gummitheile sind daher vor Ingebrauchnahme in dünner, lauwarmer Sodablösung zu waschen.

Limonaden werden mit Benutzung von kohlensaurem Wasser (ohne Zusatz von Salzen) hergestellt. Man beschickt vorher die zu füllenden Flaschen mit der abgemessenen Menge Sirup, lässt das kohlensaure Wasser dazulaufen, schliesst die Flasche und nimmt nunmehr erst die Mischung durch sanftes Umschütteln vor.

Zusatz von Chemikalien Soweit es irgend möglich ist, werden alle Salze nur in klar filtrirter Lösung dem zu imprägnirenden Wasser zugesetzt. Und zwar bringt man zuerst die Salze der alkalischen Erden hinzu, mischt gut durch und fügt alsdann erst die Salze der Alkalien dazu, vorausgesetzt, dass die letzteren mit den ersteren in gewöhnlichem Wasser unlösliche Verbindungen bilden. Die Karbonate und Sulfate der Erdalkalien lässt man, wenn es irgend angängig ist, sich durch Wechsellagerung im Wasser selbst bilden. Sie lösen sich alsdann im frisch gefällten Zustande bei Zutritt von Kohlensäure leicht auf. Trockenes Calciumkarbonat und krystallisiertes Magnesiumkarbonat müssen, selbst wenn sie zu sehr feinem Pulver zerrieben und mit Wasser angerührt wurden, 4–6 Stunden mit dem kohlensauren Wasser in Berührung bleiben, um vollständig in Lösung zu gehen.

Bei der Herstellung medicinischer Mineralwässer kann man des Zumschers gar nicht entbehren. Dieser Apparat dient dazu, dem Wasser, wenn es schon mit Kohlensäure gesättigt ist, die verschiedenen Salzlösungen zuzusetzen, deren schwerlösliche Umsetzungsprodukte in kohlensaurehaltigem Wasser löslich sind. Um den Zutritt von Luft durch den Zumscher zu vermeiden, lässt man das zweite Abblasen der Kohlensäure nicht durch den Abblase-Hahn, sondern durch den Zumscher erfolgen.

Bei der Bereitung der Eisensäuerlinge ist die Verwendung luftfreien Wassers und luftfreier Kohlensäure unumgänglich nothwendig. Im anderen Falle wird der Eisensäuerling trübe und macht ockerartige Niederschläge. Eisensäuerlinge, welche reichlich Ferrokarbonat enthalten, lassen während der Aufbewahrung an einem zu kühlen Orte leicht einen weisslichen Bodensatz fallen, welcher aber bei mittlerer Temperatur wieder in Lösung geht.

Die Eisenoxydsalze, welche für Bereitung der Eisensäuerlinge verwendet werden, sind hier das durch Weingeist gefällte Ferrosulfat $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ und das an der Sonne theilweise entwässerte Ferrochlorid $\text{FeCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ vertreten. Damit die Lösungen dieser Salze sich nicht oxydiren, werden sie erst kurz vor der Verwendung bereitet und zwar mit einem Zusatz freier Säure. Aus diesem Grunde ist in den später folgenden Vorschriften freie Säure aufgeführt.

Enthalten die nachzubildenden Wasser nicht genügend Chloride oder Sulfate, um die Verwendung der soeben genannten Salze zu ermöglichen, so verwendet man reducirtes Eisen, welches vor der Entlüftung des Wassers direkt in das Mischgefäss eingeschüttet wird. Die Auflösung des reducirten Eisens bedarf indessen geraumer Zeit, es ist häufig 12- und mehrstündige Einwirkung des kohlensauren Wassers erforderlich. Während dieser Zeit ist natürlich das Wasser unter mässigem Kohlensäure Druck (2 Atmosphären) zu halten. Erst nach erfolgter Auflösung des Eisens verstärkt man den Druck und macht das Wasser fertig.

Schwefelwasser lassen sich nicht so darstellen, dass man dem Inhalte des Mischgefässes etwa Schwefelwasserstoffwasser oder eine Lösung von Natrium- oder Kaliumsulfid zusetzt. Vielmehr greift man abgemessene Mengen Schwefelwasserstoffwasser oder der Sulfidlösungen in jede einzelne Flasche und füllt sie darauf mit dem fertigen Wasser voll. Oder man greift jeder Flasche des ausser der Schwefelverbindung alle übrigen Bestandtheile enthaltenden Wassers ein Glaschen mit, welches die erforderliche Menge der Lösung des Schwefelpräparates enthält und dem Wasser vor dem Genuss zuzusetzen ist.

Wir geben im Nachstehenden Vorschriften zur Nachbildung der wichtigeren natürlichen Mineralwässer. Die angegebenen Mengen beziehen sich durchweg auf die Mengen von 100 k des fertigen Mineralwassers. Sammtliche Wässer werden unter einem Druck von 3–4 Atmosphären imprägnirt. Sie enthalten alsdann zwar in der Regel mehr Kohlensäure als die ihnen entsprechenden natürlichen Mineralwässer, doch entweicht dieser Ueberschuss beim kurzen Stehen des Wassers im Trinkglase.

Die wagerechten Striche bei den Zahlen bedeuten, dass die von einem Striche bis zum anderen stehenden Chemikalien zu einer Lösung vereinigt werden können, da sie keine unlöslichen Verbindungen mit einander eingehen.

Zusammensetzung der gangbarsten künstlichen Mineralwässer.

Apenta Analyt LIEBPMANN Berechnet B FISCHER			Calciumkarbonat CaCO_3 89,385 g		
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	2,083 g	Calciumchlorid	CaCl_2	11,450 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	59,00 "	Magnesiumsulfat	MgSO_4	22,406 "
Natriumchlorid	NaCl	187,20 "	Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	6,446 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	2,960 "	Mangansulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,361 "
Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	233,81 "	Natriumarseniat	Na_2AsO_4	0,15 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	1454,16 "	Driburg Hauptquelle Analyt FRESSENIUS		
Magnesiumsulfat	MgSO_4	2449,68 "	1886 Berechnet B FISCHER		
Apolinaris Nach RASPE, Analyt unbekannt Berechnet von B HIRSCH			Natriumsilicat	Na_2SiO_3	5,9074 g
Natriumbikarbonat	NaHCO_3	216,985 g	Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0594 "
Natriumchlorid	NaCl	4,4595 "	Natriumnitrat	NaNO_3	0,0453 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	2,7856 "	Lithiumchlorid	LiCl	0,0854 "
Calciumchlorid	CaCl_2	28,945 "	Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,1988 "
Magnesiumkarbonat	$\text{MgCO}_3 + 8\text{H}_2\text{O}$	42,773 "	Kaliumsulfat	K_2SO_4	2,2246 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	16,731 "	Natriumsulfat	Na_2SO_4	38,0955 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	2,902 "	Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,0280 "
Chlorwasserstoff	HCl	1,8683 "	Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,5349 "
Billin Analyt GINTL 1889 Berechnet B FISCHER			Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	12,9300 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	12,698 g	Schwefels -Anhydrid	SO_2	5,000 "
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0947 "	Baryumchlorid	BaCl_2	0,0133 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	5,4815 "	Strontiumchlorid	SrCl_2	0,4084 "
Natriumchlorid	NaCl	34,6842 "	Calciumchlorid	CaCl_2	6,3541 "
Lithiumchlorid	LiCl	2,2553 "	Magnesiumsulfat	MgSO_4	59,88 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	19,188 "	Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	101,791 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	371,241 "	Calciumkarbonat	CaCO_3	112,1927 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,8756 "	Eger Franksbrunnen Analyt		
Chlorwasserstoff	HCl	1,248 "	BERZELIUS BAUER Berechnet B HIRSCH		
Mangansulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,0222 "	Natriumjodid	NaJ	0,0015 g
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,07853 "	Natriumbromid	NaBr	0,105 "
Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	62,457 "	Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,271 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	24,389 "	Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,424 "
Bocklet in Bayern Stahlquelle Analyt KASTNER 1887 Berechnet B FISCHER			Natriumsilicat	Na_2SiO_3	12,522 "
Natriumsilicat	$\text{SiO}_2 \cdot \text{Na}_2$	5,812 g	Kaliumsulfat	K_2SO_4	12,617 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	93,000 "	Natriumchlorid	NaCl	91,898 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,0789 "	Natriumkarbonat	Na_2CO_3	107,415 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	18,3 "	Natriumsulfat	Na_2SO_4	285,259 "
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,028 "	Strontiumchlorid	SrCl_2	0,042 "
Schwefelsäure Anhydrid	SO_2	1,000 "	Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,208 "
Calciumchlorid	CaCl_2	90,8 "	Calciumchlorid	CaCl_2	26,328 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	43,272 "	Magnesiumsulfat	MgSO_4	12,500 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	57,531 "	Lithiumkarbonat	Li_2CO_3	0,432 "
Magnesiumkarbonat	$\text{MgCO}_3 + 8\text{H}_2\text{O}$	63,8 "	Schwefels -Anhydrid	SO_2	8,312 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	1,70 "	Mangansulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	1,088 "
Cudowa Eugenquelle Analyt P JESSEBICH Berechnet B FISCHER			Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	7,384 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	11,082 g	Eger Salzbrunnen Analyt BERZELIUS 1822		
Natriumarsenit	Na_2AsO_3	0,288 "	Berechnet B HIRSCH		
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,531 "	Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,288 g
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	107,6 "	Natriumsilicat	Na_2SiO_3	12,973 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	10,23 "	Natriumchlorid	NaCl	90,517 "
Lithiumchlorid	LiCl	0,555 "	Natriumkarbonat	Na_2CO_3	101,827 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	4,11 "	Natriumsulfat	Na_2SO_4	248,217 "
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,75 "	Strontiumchlorid	SrCl_2	0,097 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	11,51 "	Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,135 "
Schwefelsäure-Anhydrid	SO_2	3,149 "	Calciumchlorid	CaCl_2	21,876 "
Calciumchlorid	CaCl_2	6,210 "	Magnesiumsulfat	MgSO_4	14,840 "
Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	22,88 "	Lithiumkarbonat	Li_2CO_3	0,540 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	21,94 "	Mangansulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,302 "
Magnesiumkarbonat	$\text{MgCO}_3 + 8\text{H}_2\text{O}$	5,416 "	Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	2,188 "
Cudowa Trinkquelle Analyt DUPLOS Berechnet B HIRSCH			Schwefels -Anhydrid	SO_2	8,503 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	0,52 g	Ems Kesselbrunnen Analyt FRESSENIUS		
Natriumbikarbonat	NaHCO_3	168,15 "	1871 Berechnet B FISCHER		
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,71 "	Natriumsilicat	Na_2SiO_3	9,8698 g
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	18,646 "	Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0842 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	0,741 "	Natriumjodid	NaJ	0,00085 "
			Natriumbromid	NaBr	0,01645 "
			Natriumkarbonat	Na_2CO_3	164,78 "
			Natriumchlorid	NaCl	87,808 "
			Kaliumkarbonat	K_2CO_3	3,465 "
			Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,02198 "
			Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,041 "
			Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,586 "

Die gemachten Angaben beziehen sich ohne Ausnahme auf die Herstellung von 100 k Mineralwasser

Schwefels -Anhydrid	SO ₂	2,000 g
Lithiumchlorid	LiCl	0,4734 "
Strontiumchlorid	SrCl ₂	0,149 "
Baryumchlorid	BaCl ₂	0,1077 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	16,928 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	13,5134 "
Ammoniumsulfat	(NH ₄) ₂ SO ₄	0,6699 "
Natriumsulfat	Na ₂ SO ₄	0,5455 "

Ems Kränchen Analyt FRESSENIUS 1871
Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	10,1142 g
Natriumphosphat	Na ₂ PO ₄	0,1841 "
Natriumjodid	NaJ	0,00224 "
Natriumbromid	NaBr	0,03898 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	164,9 "
Natriumchlorid	NaCl	83,395 "
Kaliumkarbonat	K ₂ CO ₃	2,816 "
Aluminiumchlorid	AlCl ₃	0,01282 "
Manganochlorid	MnCl ₂ +4H ₂ O	0,0215 "
Ferrosulfat kryst.	FeSO ₄ +7H ₂ O	0,3455 "
Schwefels -Anhydrid	SO ₂	1,691 "
Lithiumchlorid	LiCl	0,3016 "
Strontiumchlorid	SrCl ₂	0,1935 "
Baryumchlorid	BaCl ₂	0,0885 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	16,669 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	15,395 "
Ammoniumsulfat	(NH ₄) ₂ SO ₄	0,2219 "
Magnesiumsulfat	MgSO ₄	2,484 "

Friedrichshall Analyt B FISCHER 1894
Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	2,3808 "
Natriumbromid	NaBr	0,809 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	84,777 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	23,68 "
Natriumchlorid	NaCl	1090,27 "
Kaliumsulfat	K ₂ SO ₄	17,100 "
Magnesiumsulfat	MgSO ₄	1164,128 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	83,29 "

Fachingen Analyt FRESSENIUS 1866
Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	5,1849 g
Natriumborborat	B ₂ O ₃ Na ₂ +10H ₂ O	0,0707 "
Natriumjodid	NaJ	0,00095 "
Natriumbromid	NaBr	0,02948 "
Natriumsulfat	Na ₂ SO ₄	0,0963 "
Ammoniumchlorid	NH ₄ Cl	0,1512 "
Lithiumchlorid	LiCl	0,5218 "
Kaliumchlorid	KCl	0,8074 "
Manganochlorid	MnCl ₂ +4H ₂ O	1,092 "
Ferrosulfat kryst	FeSO ₄ +7H ₂ O	0,907 "
Schwefels -Anhydrid	SO ₂	1,989 "
Baryumchlorid	BaCl ₂	0,038 "
Strontiumchlorid	SrCl ₂	0,333 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	5,0988 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	42,826 "
Calciumkarbonat	CaCO ₃	88,83 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	305,56 "

Gelluae Analyt FRESSENIUS 1857
Berechnet B HIRSON

Natriumphosphat	Na ₂ PO ₄	0,087 g
Natriumchlorid	NaCl	0,358 "
Natriumsulfat	Na ₂ SO ₄	0,893 "
Kaliumsulfat	K ₂ SO ₄	1,782 "
Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	5,030 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	78,001 "
Baryumchlorid	BaCl ₂	0,020 "
Ammoniumchlorid	NH ₄ Cl	0,098 "
Calciumkarbonat	CaCO ₃	84,059 "
Magnesiumkarbonat	MgCO ₃ +3H ₂ O	89,144 "
Manganochlorid	MnCl ₂	0,866 "
Ferrochlorid	FeCl ₃	8,041 "

Glesschubel Sauerbrunnen Analyt KAUER.
1860 Berechnet B HIRSON

Natriumchlorid	NaCl	1,133 g
Natriumsulfat	Na ₂ SO ₄	1,448 "
Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	11,590 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	78,233 "
Calciumkarbonat	CaCO ₃	16,00 "
Magnesiumkarbonat	MgCO ₃ +3H ₂ O	14,967 "
Aluminiumchlorid	AlCl ₃	0,86 "
Ferrosulfat kryst	FeSO ₄ +7H ₂ O	2,157 "

Heilbrunn Adelshatdquelle Analyt EGGER
1881 Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	2,5416 g
Natriumbromid	NaBr	5,884 "
Natriumjodid	NaJ	3,012 "
Kaliumchlorid	KCl	0,638 "
Natriumsulfat	Na ₂ SO ₄	1,8957 "
Natriumchlorid	NaCl	437,20 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	98,39 "
Aluminiumchlorid	AlCl ₃	0,362 "
Ferrosulfat kryst	FeSO ₄ +7H ₂ O	0,0772 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	5,035 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	2,708 "
Strontiumchlorid	SrCl ₂	0,6482 "

Homburg Elisabethbrunnen Analyt
FRESSENIUS 1864 Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	5,8578 g
Natriumphosphat	Na ₂ PO ₄	0,0998 "
Kaliumbromid	KBr	0,3704 "
Kaliumjodid	KJ	0,0039 "
Lithiumchlorid	LiCl	2,162 "
Ammoniumchlorid	NH ₄ Cl	2,189 "
Kaliumchlorid	KCl	84,021 "
Natriumchlorid	NaCl	794,453 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	168,868 "
Ferrosulfat kryst	FeSO ₄ +7H ₂ O	5,552 "
Manganochlorid	MnCl ₂ +4H ₂ O	0,282 "
Chlorwasserstoff	HCl	5,15 "
Baryumchlorid	BaCl ₂	0,0887 "
Strontiumchlorid	SrCl ₂	1,682 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	256,010 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	76,24 "
Kaliumsulfat	K ₂ SO ₄	0,405 "

Hunyadi János Analyt FRESSENIUS 1878
Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	2,2810 g
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	80,486 "
Natriumchlorid	NaCl	28,638 "
Natriumsulfat	Na ₂ SO ₄	1930,854 "
Magnesiumsulfat	MgSO ₄	1949,423 "
Kaliumsulfat	K ₂ SO ₄	18,294 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	107,863 "
Ferrosulfat kryst	FeSO ₄ +7H ₂ O	0,4934 "

Jastrzemb (Königsdorf Jastrzemb) Analyt
SCHWARZ. 1864 Berechnet B HIRSON

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	0,447 g
Kaliumchlorid	KCl	0,863 "
Kaliumjodid	KJ	2,011 "
Kaliumbromid	KBr	3,066 "
Natriumkarbonat	Na ₂ CO ₃	5,189 "
Natriumchlorid	NaCl	1188,558 "
Magnesiumchlorid	MgCl ₂	86,160 "
Calciumchlorid	CaCl ₂	59,681 "
Ferrochlorid	FeCl ₃	0,471 "
Chlorwasserstoff	HCl	0,268 "

Karlsbad Sprudel Analyt LUDWIG u.
MAUTHNER. 1879 Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	Na ₂ SiO ₃	14,538 g
Natriumphosphat	Na ₂ PO ₄	0,069 "
Natriumborborat	B ₂ O ₃ Na ₂ +10H ₂ O	0,284 "
Natriumfluorid	NaF	0,508 "
Lithiumchlorid	LiCl	1,417 "

Die gemachten Angaben beziehen sich ohne Ausnahme auf die Herstellung von 100 k Mineralwasser
23*

Natriumcarbonat	Na_2CO_3	177,812 g
Natriumchlorid	NaCl	64,353 „
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,1647 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,7332 „
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,028 „
Schwefels -Anhydrid	SO_2	2,000 „
Natriumsulfat	Na_2SO_4	208,43 „
Kaliumsulfat	K_2SO_4	18,64 „
Magnesiumsulfat	MgSO_4	23,79 „
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,046 „
Calciumchlorid	CaCl_2	80,78 „

Die Karlsbader Quellen sind in Bezug auf die in ihnen gelösten festen Bestandtheile sämmtlich von gleicher Zusammensetzung, sie unterscheiden sich von einander nur durch den verschiedenen Gehalt an gelöster Kohlensäure und durch die verschiedene Temperatur. Diese ist für die wichtigsten Quellen die folgende: Sprudel 72,5°C — Bernhardsbrunn 60,7°C — Eisenquelle 59,7°C — Schlossbrunn 49,0°C — Mühlbrunn 48,0°C — Marktbrunn 41,0°C — Elisabethquelle 40,7°C

Kissingen Pandur Analyt. LIEBIG 1856

Berechnet B. FISCHER.

Natriumsilicat	Na_2SiO_3	0,8896 g
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,552 „
Natriumnitrat	NaNO_3	0,5526 „
Natriumbromid	NaBr	0,7054 „
Lithiumchlorid	LiCl	1,4802 „
Natriumchlorid	NaCl	414,150 „
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	123,700 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	6,941 „
Chlorwasserstoff	HCl	5,07 „
Kaliumsulfat	K_2SO_4	28,190 „
Magnesiumsulfat	MgSO_4	83,979 „
Magnesiumchlorid	MgCl_2	22,906 „
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	1,208 „
Calciumchlorid	CaCl_2	137,800 „

Kissingen Rakoczy Analyt. LIEBIG 1856

Berechnet B. FISCHER.

Natriumsilicat	Na_2SiO_3	2,423 g
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,5996 „
Natriumnitrat	NaNO_3	0,9803 „
Natriumbromid	NaBr	0,8882 „
Lithiumchlorid	LiCl	2,0082 „
Natriumchlorid	NaCl	443,383 „
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	122,972 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	7,568 „
Chlorwasserstoff	HCl	5,070 „
Kaliumsulfat	K_2SO_4	38,504 „
Magnesiumsulfat	MgSO_4	66,830 „
Magnesiumchlorid	MgCl_2	25,987 „
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,286 „
Calciumchlorid	CaCl_2	150,150 „

Krankenheill Bernhards- oder Jodschwefel-Quelle Analyt. FRESSENIUS 1852

Berechnet B. HIRSCH

Natriumjodid	NaJ	0,160 g
Natriumsulfat	Na_2SO_4	0,475 „
Kaliumsulfat	K_2SO_4	0,968 „
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	2,260 „
Natriumchlorid	NaCl	16,410 „
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	88,706 „
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,192 „
Magnesiumchlorid	MgCl_2	2,282 „
Calciumchlorid	CaCl_2	7,848 „
Magnesiumsulfat kryst.	$\text{MgSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,025 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,043 „
Chlorwasserstoff	HCl	1,195 „

Jeder Flasche von rund 600,0 ccm Inhalt werden, wenn es verlangt wird, in einem gesonderten Fläschchen 12 Tropfen Schwefelwasserstoffwasser, verdünnt mit 10 ccm Wasser, beigegeben.

Die gemachten Angaben derselben steh ohne Ausnahme auf die Herstellung von 100 k Mineralwasser

Krankenheill Georgen- oder Jodsoda-Quelle Analyt. FRESSENIUS 1852

Berechnet B. HIRSCH

Natriumjodid	NaJ	0,155 g
Natriumsulfat	Na_2SO_4	1,209 „
Kaliumsulfat	K_2SO_4	1,299 „
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	2,255 „
Natriumchlorid	NaCl	10,852 „
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	82,290 „
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,195 „
Magnesiumchlorid	MgCl_2	2,212 „
Calciumchlorid	CaCl_2	7,654 „
Magnesiumsulfat kryst.	$\text{MgSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,0176 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,0321 „
Chlorwasserstoff	HCl	1,349 „

Kreuznach Elisabethquelle, Analyt. FRESSENIUS 1854.

Berechnet B. FISCHER.

Natriumsilicat	SiO_2Na_2	2,7146 g
Natriumbikarbonat	$\text{Na}_2\text{O}, \text{Na}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$	0,5568 „
Natriumarseniat	AsO_3Na_2	0,0493 „
Natriumphosphat	PO_4Na_2	0,0682 „
Natriumjodid	JNa	0,0431 „
Natriumbromid	BrNa	4,8889 „
Lithiumchlorid	LiCl	6,5610 „
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	2,2155 „
Kaliumchlorid	KCl	15,2612 „
Natriumchlorid	NaCl	990,016 „
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	54,696 „
Manganochlorid kryst.	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,1525 „
Ferrochlorid	$\text{FeCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$	4,2554 „
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,0528 „
Zinkchlorid	ZnCl_2	0,7674 „
Magnesiumchlorid	MgCl_2	20,8544 „
Baryumchlorid	BaCl_2	6,465 „
Strontiumchlorid	SrCl_2	7,961 „
Calciumchlorid	CaCl_2	211,018 „
Chlorwasserstoff	HCl	5,141 „

Leyce Versandwasser Analyt. BARTH u. WEIDEL 1850

Berechnet B. FISCHER.

Natriumarsenit	AsO_3Na_2	0,1792 g
Natriumsilicat	SiO_2Na_2	4,662 „
Das Natriumsilicat ist mit 3,745 g Schwefelsäure H_2SO_4 zu versetzen und das ausgewaschene Kieselsäurehydrat dem Wasser zuzusetzen		
Natriumchlorid	NaCl	0,0018 g
Natriumsulfat	Na_2SO_4	1,3876 „
Kaliumsulfat	K_2SO_4	0,100 „
Ammoniumsulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	0,061 „
Kupfersulfat	$\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$	0,812 „
Magnesiumsulfat	MgSO_4	22,201 „
Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	41,074 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	124,963 „
Ferriisulfat	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	27,272 „
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,0028 „
Aluminiumsulfat	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	15,919 „
Magnesiumkarbonat	$\text{MgCO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	1,666 „

Lipp Springs Arminiusquelle, Analyt. STOLCKHARDT 1863

Berechnet B. HIRSCH.

Natriumsilicat	SiO_2Na_2	1,177 g
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	5,301 „
Natriumsulfat	Na_2SO_4	79,828 „
Calciumchlorid	CaCl_2	50,181 „
Calciumkarbonat	CaCO_3	41,460 „
Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	57,176 „
Magnesiumsulfat	MgSO_4	31,081 „
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	8,584 „
Schwefelsäure-Anhydrid	SO_2	0,772 „

Marienbad Ferdinandsbrunnen

Analyt GINRL 1879

Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	SiO_2Na_2	15,7888 g
Natriumphosphat	PO_4Na_3	0,5197 "
Natriumnitrat	NO_3Na	1,3356 "
Lithiumchlorid	LiCl	2,1840 "
Kaliumchlorid	KCl	4,2180 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,5680 "
Natriumchlorid	NaCl	105,5890 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	250,0599 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	892,1950 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,8155 "
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	2,2868 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	12,8110 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	66,2810 "
Chlorwasserstoff	HCl	5,141 "
Calciumchlorid	CaCl_2	54,562 "

Marienbad Kreuzbrunnen Analyt

REDTENBACHER, 1892

Berechnet B FISCHER

Natriumsilicat	SiO_2Na_2	8,9247 g
Natriumphosphat	PO_4Na_3	0,3234 "
Natriumnitrat	NO_3Na	0,4092 "
Lithiumchlorid	LiCl	1,1838 "
Kaliumchlorid	KCl	60,6937 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,2670 "
Natriumchlorid	NaCl	88,6920 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	220,0750 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	443,9980 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,5935 "
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,5856 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	3,2438 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	87,6200 "
Chlorwasserstoff	HCl	5,1410 "
Calciumchlorid	CaCl_2	54,8160 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,0765 "
Baryumchlorid	BaCl_2	0,0408 "

Pillna Bitterwasser STROVY'sche Tabelle

Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,042 g
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	4,660 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	62,500 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	11,903 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	1456,604 "
Calciumchlorid	CaCl_2	88,746 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	222,857 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	1578,233 "

Pyrmont Haupt- oder Stahlquelle

Analyt FRESSENIUS 1864

Berechnet B HIRSCH

Natriumjodid	NaJ	0,0016 g
Natriumbromid	NaBr	0,0090 "
Natriumnitrat	NaNO_3	0,0158 "
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0171 "
Lithiumchlorid	LiCl	0,0994 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	0,350 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	1,2075 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	6,462 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	11,8934 "
Calciumchlorid	CaCl_2	0,0059 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,0092 "
Baryumchlorid	BaCl_2	0,0811 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,2108 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,3149 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	2,077 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	48,9818 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	72,6982 "
Calciumsulfat	$\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	100,382 "
Magnesiumsulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,8698 "
Ferrochlorid	$\text{FeCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	7,852 "
Chlorwasserstoff	HCl	3,867 "

Rippoldsau Josephsquelle Analyt BONSEN

Berechnet B HIRSCH

Kaliumsulfat	K_2SO_4	5,808 g
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	10,489 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	11,623 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	93,305 "
Calciumchlorid	CaCl_2	4,513 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	4,570 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	117,026 "
Kali Alaun	$\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 + 12\text{H}_2\text{O}$	4,079 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	85,365 "
Mangansulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,601 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	8,935 "
Schwefelsäure-Anhydrid	SO_2	7,621 "

Saidschutz Bitterwasser Analyt BREZELIUS

1839 Berechnet B HIRSCH

Natriumjodid	NaJ	0,567 g
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	0,354 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	53,340 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	92,629 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	483,981 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	28,250 "
Calciumnitrat	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	158,235 "
Magnesiumnitrat	$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$	185,087 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	1814,202 "
Mangansulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	1,615 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	8,994 "
Schwefelsäure Anhydrid	SO_2	0,825 "

Salzbrunn Oberbrunnen, Analyt VALKEN-

TINKR 1866 Berechnet B HIRSCH

Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,09 g
Kaliumsulfat	K_2SO_4	2,68 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	5,18 "
Natriumchlorid	NaCl	10,75 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	189,83 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,08 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,35 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	4,94 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	35,29 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	29,51 "
Ferrosulfat kryst	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,048 "
Lithiumkarbonat	Li_2CO_3	0,75 "
Schwefelsäure Anhydrid	SO_2	3,40 "

Schlangenbad Sechachtbrunnen

Analyt FRESSENIUS

Berechnet B HIRSCH

Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,063 g
Kaliumchlorid	KCl	0,584 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	1,187 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	5,277 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	6,633 "
Natriumchlorid	NaCl	12,727 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	0,705 "
Calciumchlorid	CaCl_2	3,626 "
Chlorwasserstoff	HCl	3,869 "

Selters Analyt FRESSENIUS 1869

Berechnet B HIRSCH

Natriumjodid	NaJ	0,0033 g
Natriumbromid	NaBr	0,0909 "
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0806 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	0,4817 "
Natriumnitrat	NaNO_3	0,6110 "
Kaliumchlorid	KCl	1,7630 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	4,0983 "
Natriumsilicat	Na_2SiO_3	4,3208 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	115,7412 "
Natriumchlorid	NaCl	164,8454 "
Baryumchlorid	BaCl_2	0,0175 "

Die gemachten Angaben beziehen sich ohne Ausnahme auf die Herstellung von 100 k Mineralwasser

Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,0470 g
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,2843 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,5227 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	22,8077 "
Calciumchlorid	CaCl_2	84,2131 "
Lithiumkarbonat	Li_2CO_3	0,3180 "
Chlorwasserstoff	HCl	2,2288 "
Manganosulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,0989 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,7262 "

Soden Milchbrunnen. No I Analyt
CASSELMANN 1859

Berechnet B HIRSCH

Kaliumsulfat	K_2SO_4	2,031 g
Kaliumchlorid	KCl	13,66 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	86,295 "
Natriumchlorid	NaCl	142,139 "
Natriumbromid	NaBr	0,04 "
Lithiumchlorid	LiCl	0,06 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	1,324 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	5,832 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	1,893 "
Manganosulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,620 "
Chlorwasserstoff	HCl	4,088 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,117 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,435 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	21,747 "
Calciumchlorid	CaCl_2	50,989 "

Spaa Analyt, FOURN

STRAUVE'sche Tabelle

Natriumchlorid	NaCl	0,055 g
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,324 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	0,488 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	1,030 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	5,131 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	18,198 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,141 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	12,998 "
Magnesiumkarbonat	$\text{MgCO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	24,001 "
Manganochlorid	$\text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	1,164 "
Ferrochlorid	$\text{FeCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	6,862 "

Teplitz Steinbad. Analyt BERZELIUS

STRAUVE'sche Tabelle

Kaliumsulfat	K_2SO_4	0,059 g
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,246 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	0,804 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	8,526 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	27,441 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	1,796 "
Calciumchlorid	CaCl_2	5,218 "
Kali-Alaun	$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 + 12\text{H}_2\text{O}$	0,222 "
Magnesiumsulfat	MgSO_4	5,285 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,873 "

Vichy Source de la grande grille

Analyt BAUER STRAUVE'sche Tabelle

Natriumjodid	NaJ	0,0028 g
Natriumbromid	NaBr	0,013 "
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,422 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	18,026 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	20,404 "
Natriumchlorid	NaCl	22,686 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	408,185 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,203 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,249 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,523 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	8,991 "
Calciumchlorid	CaCl_2	27,758 "
Manganosulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,076 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,231 "
Schwefelsäure-Anhydrid	SO_2	6,524 "

Wellbach Schwefelquelle

Analyt FRESSENIUS 1856

STRAUVE'sche Tabelle

Lithiumkarbonat	Li_2CO_3	0,058 g
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,057 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	2,958 "
Kaliumkarbonat	K_2CO_3	2,570 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	3,585 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	50,787 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,511 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,018 "
Baryumchlorid	BaCl_2	0,107 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	0,598 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	1,875 "
Calciumchlorid	CaCl_2	27,169 "
Magnesiumkarbonat	$\text{MgCO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	88,722 "
Schwefelwasserstoffwasser 0,4 Proc		169,0 "

Wiesbaden Kochbrunnen

Analyt FRESSENIUS 1856

Berechnet B HIRSCH

Kaliumchlorid	KCl	18,3892 g
Natriumchlorid	NaCl	619,1652 "
Natriumbromid	NaBr	0,4351 "
Natriumjodid	NaJ	0,0017 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	8,4072 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	40,2767 "
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0080 "
Borax	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O}$	0,1574 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	12,7518 "
Lithiumchlorid	LiCl	2,5104 "
Ammoniumchlorid	NH_4Cl	1,7078 "
Calciumchlorid	CaCl_2	56,8377 "
Baryumchlorid	BaCl_2	0,1882 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	1,8948 "
Magnesiumchlorid	MgCl_2	20,0878 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	1,6129 "
Manganosulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,1731 "
Natriumarsenat	Na_2AsO_4	0,0285 "

Wildungen Georg-Victorquelle

Analyt FRESSENIUS 1852

Berechnet B HIRSCH

Kaliumsulfat	K_2SO_4	0,0280 g
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	2,9405 "
Natriumchlorid	NaCl	0,7132 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	4,4076 "
Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,0087 "
Natriumsulfat	Na_2SO_4	4,0141 "
Ammoniumkarbonat	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	0,0338 "
Lithiumkarbonat	Li_2CO_3	0,0183 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,0897 "
Baryumchlorid	BaCl_2	0,0014 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	50,8291 "
Magnesiumkarbon kryst.	$\text{MgCO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	59,7189 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	5,2050 "
Manganosulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,8058 "

Wildungen Stadtbrunnen.

Analyt BAUER

STRAUVE'sche Tabelle

Natriumphosphat	Na_3PO_4	0,094 "
Natriumchlorid	NaCl	0,234 "
Kaliumsulfat	K_2SO_4	1,102 "
Natriumkarbonat	Na_2CO_3	3,013 "
Natriumsulfat	Na_2SiO_3	5,2021 "
Strontiumchlorid	SrCl_2	0,029 "
Aluminiumchlorid	AlCl_3	0,408 "
Calciumkarbonat	CaCO_3	49,707 "
Magnesiumkarbon kryst.	$\text{MgCO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	57,950 "
Ammoniakflüssigkeit	10proc	0,80 "
Schwefelsäure-Anhydrid	SO_2	2,883 "
Manganosulfat	$\text{MnSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$	0,250 "
Ferrosulfat kryst.	$\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	4,849 "

Die gemachten Angaben beziehen sich ohne Ausnahme auf die Herstellung von 100 k Mineralwasser

Die französische Pharmakopée giebt folgende Vorschriften zur Herstellung künstlicher Mineralwässer, welche namentlich für die Grenzgebiete von Wichtigkeit sein werden

Eau gazeuse simple (Gall)

Aqua Acido carbonico impregnata. Aqua acidula simplicior Loco Eau de Seltz
Destillirtes Wasser wird unter 6 Atmosphären Ueberdruck mit Kohlensäure gesättigt

Eau acidule saline (Gall)

Aqua acidulo-salsa Loco Eau de Seltz, Condillac, Remonson, Saint-Galmier, Schwalheim, Soultzmatt etc

Rp Calcii chlorati cryst	0,33
Magnesi chlorati cryst	0,37
Natrii chlorati	1,10
Natrii carbonici cryst	0,90
Natrii sulfurici cryst	0,10
Aquae Acido carbonico impregnatae	650,0

Eau saline purgative (Gall)

Aqua Sedlitzensis Loco Eau de Sedlitz

Rp Magnesi sulfurici cryst	30,0
Aquae Acido carbonico impregnatae	650,0

I

Rp Magnesi sulfurici cryst	30,0
Natrii bicarbonici	4,0
Acidi tartarici in crystall	4,0
Aquae destillatae	650,0

Eau alcaline gazeuse (Gall)

Aqua alcalina effervescens Loco Eau de Vichy, de Vals etc

Rp Natrii bicarbonici	3,12
Kali bicarbonici	0,23
Magnesi sulfurici cryst.	0,55
Natrii chlorati	0,08
Aquae Acido carbonico impregnatae	650,0

Eau ferrée gazeuse (Gall)

Aqua martia effervescens Loco Eau de Spa, Bussang, Saint Alban, Forges, Orezza

Rp Kali bitartrici	0,56
Natrii carbonici cryst.	0,58
Natrii chlorati	0,16
Ferri sulfurici cryst	0,13
Aquae Acido carbonico impregnatae	650,0

Eau sulfurée (Gall.)

Aqua sulfurata Loco Eau de Bonnes, Barèges, Cantierets, Bagnères de Luchon, Saint-Sauveur

Rp Natrii sulfurati ($\text{Na}_2\text{S} + 9\text{H}_2\text{O}$)	0,13
Natrii chlorati	0,13
Aquae destillatae ebulliendo ab aëre liberatae, postea refrigeratae	650,0

Eau acidule bicarbonatée (Gall)

Aqua natio-effervescens Soda-Water
Rp Natrii bicarbonici 1,0
Aquae Acido carbonico impregnatae 600,0

Limonade gazeuse (Gall)

Rp Aquae Acido carbonico impregnatae 600,0
Sirupi Citri 80,0

Nachstehende Vorschriften für künstliche Mineralwässer sind von SOUBEIRAN angegeben worden

Eau de Bussang SOUBEIRAN

Rp Natrii carbonici Na_2CO_3	0,18
Calcii sulfurici $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	0,13
Magnesi sulfurici MgSO_4	0,013
Calcii chlorati CaCl_2	0,16
Ferri sulfurici cryst $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,11
Aquae Acido carbonico impregnatae	1000,0

Eau de Contrexeville SOUBEIRAN

Rp Calcii sulfurici $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	0,81
Magnesi sulfurici MgSO_4	0,009
Calcii carbonici	0,5
Natrii carbonici Na_2CO_3	0,013
Magnesi carbonici $\text{MgCO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	0,13
Calcii chlorati CaCl_2	0,035
Magnesi chlorati MgCl_2	0,013
Ferri sulfurici cryst $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,033
Aquae Acido carbonico impregnatae	1000,0

Eau de Forges SOUBEIRAN

Rp Calcii chlorati CaCl_2	0,004
Magnesi chlorati MgCl_2	0,007
Calcii sulfurici $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	0,037
Magnesi sulfurici MgSO_4	0,05
Ferri sulfurici $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,065
Aquae Acido carbonico impregnatae	1000,0

Eau de Mont Dore SOUBEIRAN

Rp Natrii sulfurici Na_2SO_4	0,58
Natrii chlorati NaCl	0,60
Magnesi chlorati MgCl_2	0,59
Natrii bicarbonici NaHCO_3	5,5
Calcii chlorati CaCl_2	1,72
Ferri sulfurici $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,031
Aquae Acido carbonico impregnatae	1000,0

Eau de Passy GUIBOUT

Rp Calcii sulfurici $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	1,21
Magnesi sulfurici MgSO_4	0,11
Natrii sulfurici Na_2SO_4	0,18
Alumini sulfurici $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	0,06
Ferri sulfurici $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	0,13
Natrii chlorati NaCl	0,15
Magnesi chlorati MgCl_2	0,1
Aquae Acido carbonico impregnatae	1000,0

Für die, die wichtigsten Fabrikate einer Mineralwasseranstalt darstellenden Erfrischungswässer, Selterser und Sodawasser, geben wir nachstehende, sehr wohlschmeckende Wasser verbürgende Vorschriften

Selterser

Lösung I

Rp Natrii carbonici cryst	4830,0
Natrii chlorati	1800,0
Natrii sulfurici cryst	225,0
Aquae destillatae ferridae	15 Liter

Lösung II

Rp Magnesi chlorati cryst	1000,0
Calcii chlorati cryst	1000,0
Aquae destillatae	20 Liter
Für 100 Liter Wasser sind zuzusetzen von Lösung I	
= 1,33 l. von Lösung II = 0,33 l.	

Soda Wasser

Rp Natrii carbonici cryst	200,0
Natrii chlorati	50,0
Calcii chlorati	50,0

Für 100 Liter kohlensaures Wasser

Arachis.

Gattung der Papilionaceae—Hedysareae.

Arachis hypogaea L. Erdnuss. Erdmandel. Erdpistazie. Erdbohne. Erdeichel. Chocoladenwurzel. Mandubilbohne. Pistache de terre. Noix de terre. Arachide. Earth-nut. Ground-nut. Pea-nut. In Amerika heimisch, aber wild nicht bekannt, überall in wärmeren Gegenden kultivirt, auch in Südeuropa. Die unter der Erde reifenden Hülssen sind bis 4 cm lang, durch die stark hervortretenden Gefässbündel grubig, gelblich. Sie enthalten bis 3 braune Samen, die in Form und Grösse den Haselnusskernen ähneln, und einen dicken weissen Embryo enthalten.

Bestandtheile. 45,8 Proc. Fett, 27,65 Proc. Stickstoffsubstanz, 16,75 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, 2,21 Proc. Holzfaser, 6,95 Proc. Wasser, 2,64 Proc. Asche.

Verwendung. Im Süden als Nahrungsmittel, in Spanien mit Kakao etc. zur Herstellung einer billigen Chocolate (auch die Pressrückstände), zur Gewinnung des fetten Oeles (s. unten), die Pressrückstände mit Getreidemehl zu Brot (v. RADEMANNS Nahrungsmittelfabrik, Frankfurt), wozu sie sich ihres hohen Fett- und Proteingehaltes wegen eignen, die gespaltenen und gerösteten Samen als Kaffeesurrogat (afrik. Nussbohnenkaffee von Gebr. SCHMIDT Nachf. in Bockenheim), die Rückstände zum Verfälschen von Kaffee und Gewürzen, sowie als Futtermittel (Erdnusskuchen).

Die Rückstände enthalten 47,48 Proc. Rohprotein, 7,78 Proc. Rohfett und 24,80 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, wovon 91, resp. 86—93, resp. 98 Proc. verdaulich sind.




Fig. 99. Samenschale von *Arachis hypogaea*. ep Epidermis der Oberseite, en Epidermis der Unterseite, p Parenchym. 160 Mal vergrössert (nach MOELLER).

zu den Ausnahmen gehört. Beweisend sind die polygonalen Zellen der Epidermis der Samenschale, deren Wände verdickt und so reichlich gestüpfelt sind, dass sie kammartig erscheinen. (Fig. 99 ep).

Oleum Arachidis. Arachide-, Erdnuss-, Erdmandel- etc. Oel. Mandubil-Oel. Huile d'arachide. Huile de pistache de terre. Ground-nut-Oil. Earth-nut-Oil. Pea-nut-Oil.

Das durch die erste, kalte Pressung gewonnene Oel ist fast farblos und ein vorzügliches Speiseöl, das zweite, oft unter Erwärmen gewonnene Oel von etwas dunklerer Farbe und bohnenartigem Geruche wird als Brennöl verwendet, das letzte durch Auskochen oder Extraktion mit Schwefelkohlenstoff gewonnene dient zur Seifenfabrikation.

Bestandtheile. Der flüssige Theil besteht aus den Triglyceriden der Oel- und der Linolsäure, vielleicht auch Hypogacensäure, der feste Theil aus den Triglyceriden der Lignoerinsäure, Arachinsäure, vielleicht auch Palmitinsäure. — Ferner 0,95—8,85 Proc. freie Fettsäuren.

Eigenschaften. Das beste Oel ist klar, von höchstens gelblicher Farbe, nicht trocknend. Constanten: A. Für das Oel: Spec. Gew. 0,916—0,920, Erstarrungspunkt — 8°C., HEHNER'sche Zahl 95,86, KÖTSDORFER'sche (Verseifungs-) Zahl 190—197, HÜBL'sche Jodzahl 91,0—105,0. REICHERT-MEISSL'sche Zahl 0,4. B. Für die Fettsäuren: Schmelzpunkt + 27,0—35,0°C., Erstarrungspunkt + 23,8°C., HÜBL'sche Jodzahl 95,5—96,9.

Verfälschungen. Das Erdnussöl wird zuweilen mit Mohn-, Sesam-, Baumwollsamensöl verfälscht, wodurch das spec. Gewicht, die Jodzahl und der Schmelzpunkt der Fettsäuren beeinflusst wird (vgl. die entsprechenden Artikel).

Nachweis des Erdnussoles. Es dient zur Verfälschung des höher bezahlten Olivenöles, welches dann eine höhere Jodzahl zeigt als reines Olivenöl (cf Olea). Die übrigen Methoden stützen sich auf den Nachweis der Arachinsäure.

1) 20 g Öl werden durch Kochen mit 10 cem Natronlauge (40 Proc) und 50 cem Alkohol (50 Proc) verseift, der Alkohol abdestillirt, die Fettsäuren mit Salzsäure ausgeschieden, mit heissem Wasser gewaschen und in kochendem Alkohol gelöst. Beim Abkühlen scheidet sich die Arachinsäure in Krystallen von Perlmutterglanz aus (Schmelzp 70–71° C weil die Säure nicht ganz rein ist).

2) Man verseift etwas Öl mit alkoholischer Kalilauge (200 KOH + 500 Alkohol [90 Proc]) durch Erwärmen im Wasserbade $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ Stunden und lässt dann bei 0° bis 6° C stehen. Schon bei 5 Proc Arachisöl scheidet sich an den Wänden krystallinisch arachinsäures Kalium ab.

Chinesischer Balsam, Baume Chinois von Dr MOUNTAIN besteht aus Erdnussöl, Glycerin und Weingeist.

Hämorrhoidalsalbe (nach Vomiloka). In Erdnussöl 100, löst man Salicylsäure 5, mischt Alapurin 50, Bleiessig 2 hinzu und füllt in Tuben.

Kälbermehl ist eine Mischung von Erdnuss, Fleischfuttermehl, Weizenmehl, Stärke, Zucker.

Viehmastpulver, aromatisches englisches, enthält Erdnusskuchen, Reis, Mais, wenig Salz, Kummel, Pfefferminze, Kamillen, Lavendel.

Arbutinum.

Arbutinum. Arbutin (Ergänz.) Arbutine (franz.) Arbutin (engl.) $C_{12}H_{16}O_6$, + $\frac{1}{2}H_2O$. Mol. Gew = 281.

Darstellung. Die zerkleinerten Blätter der Barentraube (*Arbutus Uva Ursi* L.) werden mit Wasser zunächst macerirt, dann wird gekocht und kolirt. Die durch Absetzenlassen geklarte Kolatur wird mit Bleiessig in der Kälte gefällt. Das Filtrat wird vom überschüssigen Blei durch Einleiten von Schwefelwasserstoff befreit. Man filtrirt vom Schwefelblei ab und dampft das Filtrat auf dem Wasserbade auf ein kleines Volumen ein. Beim Erkalten schiessen Krystalle von unreinem Arbutin an. Durch Umkrystallisiren derselben aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle erhält man das reine Präparat.

Eigenschaften. Farblose, seidenglanzende Krystallnadeln, welche ursprünglich 2 Mol Krystallwasser enthalten. Das lufttrockene Präparat enthält nur noch $\frac{1}{2}$ Mol Wasser, durch Trocknen bei 100° C wird das Präparat wasserfrei und schmilzt alsdann bei 144 bis 146° C. Es ist geruchlos und von allmählich hervortretendem bitterem Geschmack. Das lufttrockene Präparat löst sich in 8 Th kaltem oder 1 Th siedendem Wasser, auch in 16 Th Weingeist, kaum in Aether. Die Lösungen sind neutral. Der Schmelzpunkt des lufttrocknen Präparats liegt bei 170° C.

Wird 1 Th Arbutin mit 8 Th Brauntsteinpulver, 1 Th Wasser und 2 Th konc Schwefelsäure erhitzt, so tritt der chlorähnliche Geruch des Chinons auf. Die wässrige Lösung des Arbutins giebt mit Ferrichlorid blaue Färbung, die durch grössere Mengen des letzteren in Grün übergeht. Die wässrige Lösung des Arbutins reducirt direkt weder die Fehling'sche Lösung, noch schwärzt sie ammoniakalische Silberlösung. Beide Reaktionen treten indessen ein, wenn die Lösung zunächst mit etwas verdünnter Schwefelsäure gekocht worden war. Beruht darauf, dass das Glukosid Arbutin dabei unter Aufnahme von Wasser in Zucker und Hydrochinon gespalten wird.



In konc Schwefelsäure löst es sich zunächst farblos auf, nach einiger Zeit tritt eine röthliche, auf Zusatz einer Spur Salpetersäure gelbbraune Färbung auf.

Prüfung. 1) Es schmelze im lufttrocknen Zustande bei 166–168° C. 2) Es verbrenne auf dem Platinbleche ohne einen Rückstand zu hinterlassen. 3) Die wässrige Lösung (1 = 20) werde durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Metalle, namentlich Blei).

Anwendung. Wird in Gaben bis zu 5 g gegen Blasenkatarrhe und Nierenaffektionen gegeben und wirkt wohl durch das Auftreten von Hydrochinon antiseptisch. Im Organismus wird es z. Th. in Hydrochinon und Zucker gespalten, theilweise auch durch den Harn unverändert ausgeschieden. Der Harn giebt mit Ferrichlorid Blaufärbung und ist linksdrehend.

Arctostaphylos.

Gattung der Ericaceae-Arbutoidene.

I. Arctostaphylos Uva Ursi Spr. (Arbutus uva ursi L.). Bärentraube. Wilder Buchsbaum. Heimisch im grössten Theil der nördlichen Hemisphären.

Liefert *Folia Uvae Ursi* (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.), *Folia Arctostaphylli*, *Herba Gayubae*, Bärentraubenblätter. *Feuilles de busserole*, *Raisin d'ours* (Gall.). *Bearberry-leaves*.

Beschreibung. Die bis 2 cm langen, eiförmigen Blätter sind vorn etwa 8 mm breit und verlaufen nach hinten in den 3 mm langen Blattstiel. Sie sind lederig, dabei ziemlich spröde, oberseits rinnig, deutlich netzig, ganzrandig, am Rande (wenigstens im frischen Zustande) mit spärlichen Haaren gewimpert. (Das Blatt ist also nicht kahl.) Die




Fig. 100. I. Fol. Uvae Ursi. II. Blatt von *Vaccinium Vitis Idaea*. III. Blatt von *Vaccinium uliginosum*. IV. Blatt von *Buxus sempervirens*.

abgestumpfte Spitze ist häufig zurückgebogen. (Fig. 100 I.) — Epidermiszellen sehr dickwandig mit geraden Seitenwänden. — Stomatien in Gruppen zusammenstehend fast nur auf der Unterseite.

Palissaden wenig ausgebildet, um die Bündel

der sekundären Nerven Fasern und Krystallzellen.

Bestandtheile. 3,5 Proc. Arbutin $C_{12}H_{16}O_7$, Methylarbutin $C_{13}H_{18}O_7$, Urson $C_{30}H_{48}O_{11}$, Spuren ätherischen Oeles (0,01 Proc.), 34,0 Proc. Gerbstoff, 6,0 Proc. Gallussäure etc.

Verwechselungen. Als solche werden die Blätter anderer Ericaceen angegeben, die gelegentlich mit der Pflanze zusammenwachsen: *Vaccinium uliginosum* L. Blätter am Rande eingerollt, unten graugrün, nicht lederig (Fig. 100 III). V. *Vitis Idaea* L. Blätter lederig, am Rande ungerollt und kleingesägt, unterseits rostfarbig punktiert (Fig. 100 II). *Arctostaphylos alpina* Spr. Der Blattrand sägezählig, in den Fasern keine Krystallzellen. Ferner *Buxus sempervirens* L. Sekundärnerven parallel, Blatt an der Spitze meist ausgerandet (Fig. 100 IV).

Einsammlung. Im Sommer. 5 Th. frische Blätter geben 1 Th. trockene.

Anwendung. Wirken adstringirend und tonisirend, sollen speciell bei Blasenleiden und Steinleiden wirken. Werden im Infusum verwendet bei Blasenkatarrh, Nephritis, Hämaturie, Harnsteinen, Harngries, Leukorrhoe, auch bei Diabetes und Phthisis empfohlen. Meist als Dekokt 10,0—15,0:150,0.

Da die dickledrigen Blätter dem Eindringen des Wassers ziemlich Widerstand entgegensetzen, sind sie fein zu kontundiren oder vor der Verarbeitung einige Zeit mit Alkohol angefeuchtet stehen zu lassen. Der wirksame Bestandtheil der Droge ist das Arbutin, das in Zucker und Hydrochinon zerfällt (S. 361). Infolge des Gehaltes an letzterem färbt sich der Urin nach dem Gebrauch olivengrün bis bläulichgrün. Daneben unzersehtes Arbutin im Urin.

Extractum Uvae Ursi. (U-St.) Dickes Extrakt, aus mittelfein gepulverten Blättern durch Verdrängung (Weingeist 2, Wasser 5 Raumth.) und Eindampfen.

Extractum Uvae Ursi fluidum. (U St) Aus 1000 g Blättern werden mittelst Glycerin 800 ccm und einer Mischung von Weingeist 2 Vol und Wasser 5 Vol durch Verdrängung 1000 ccm Extrakt bereitet

Extractum Uvae Ursi solidum Nach DIETENICH stellt man aus 1000 g grobem Pulver durch Ausziehen mit Wasser 4000 g zunächst in der Kälte, dann mit 3000 g im Dampfbade, Auspressen, Filtriren, Eindampfen mit Milchzucker 700 g bis fast zur Trockne völliges Auskochen bei 30° C und Zusatz von Milchzucker q. s. zu 1000 g ein den Fluid extrakten entsprechendes Dauerextrakt — **Infusum s. Decoctum siccum** — von grosser Haltbarkeit dar

Infusum Uvae Ursi. Infusion of Bearberry (Brit) — Aus Bärentraubenblättern 50 g und siedendem Wasser 1000 ccm zu bereiten

Mixtura Uvae Ursi (Munch Nosokomial-Vorschr) Decoct Uvae Ursi (s 15,0) 180,0, Sir simpl 20,0

Sirupus Uvae Ursi Blätter 10 Th, siedendes Wasser 60 Th, dazu nach dem Erkalten Weingeist 10 Th Die Seihflüssigkeit giebt mit Zucker 40 Th Sirup 100 Th

Antipetrin von STRAZZULUS, ein Antikesselsteinmittel, besteht grösstentheils aus Bärentraubenblättern

S FRANKELS Naturheilmittel, sind geschnittene Bärentraubenblätter

Mixtura antigonorrhoea COOPER Bärentraubenblätterabkochung 200 g, Katchu-tinktur, Ingwersirup je 15 g

Pulvis antidiabeticus von Dr WEISSBACH HARTUNG Salol 36,0, Fol Uvae Ursi 10,0, Radix Valerianae 20,0, Lycopod 30,0 (n AUFRICHT)

Pulvis antisudarius MELCHIOR-ROBERT Entspricht dem Extr Uvae Ursi solidum DIETENICH

Pulvis nephriticus QUAREN Fol Uvae Ursi 20,0, Gummi arab 10,0, Tuber Jalap, Eläosacch Naphae 5,0, Sacch alb 10,0

II Arctostaphylos glauca Lindl (Manzanita, Great-berried Manzanita) In den Weststaaten Nordamerikas Blätter doppelt so gross, wie die vorigen, oval enthalten ebenfalls Arbutin und werden wie die vorigen verwendet.

Areca.

Gattung der Palmae — Ceroxyllinae.

Areca Catechu L Die Heimat ist nicht sicher festzustellen, in Kultur von Socotra, Mauritius, Indien bis zu den Philippinen, nördlich bis Formosa und den Lau-Kiu-Inseln

Man verwendet die Samen Semen Arecae (Germ.), Arecanuss, Betelnuss, Noix d'Areca (Gall), Areca-nut, Ping-lau.

Beschreibung Die Früchte sind bis hühnereigross, am Scheitel genabelt mit anfangs fleischigem, später fasernem Pericarp Der Same ist kegelförmig bis halbkugelig bis niedergedrückt, an der Basis abgeflacht oder etwas eingedrückt und lässt hier eine kleine Vertiefung erkennen, die Stelle, an der der Embryo liegt Auf der Aussenseite ist er mattbraun, netzadeig Auf dem Längsschnitt sieht man die braune Samenschale, die zahlreiche Falten und Einstülpungen in das Endosperm schiebt (semen ruminatum) letzteres ist von weisslicher Farbe und lässt im Centrum eine unregelmässig zerklüftete Hohlung erkennen. Am Grunde findet sich eine weitere kleinere Hohlung, in der der Embryo befindlich gewesen ist

Das Endosperm besteht aus Zellen mit stark verdickten Wänden, in denselben Tüpfel mit nach aussen verbreiterten Enden Die braunen Einstülpungen bestehen aus dünnwandigen, schief getüpfelten Zellen mit rothbraunem Inhalt Die Alkaloide haben ihren Sitz nur in den Zellen des Endosperms

Bestandtheile. Folgende Alkaloide Arecolin $C_8H_{13}NO_2$ (Methyläther der Methyl-tetrahydronicotinsäure), Arekain $C_7H_{11}NO_2 \cdot H_2O$, Arekaidin $C_7H_{11}NO_2 \cdot H_2O$, Guvacin $C_6H_5NO_2$, ferner Cholin, 14—18 Proc Fett (dann Oelsäure, Myristinsäure, Laurinsäure und wahrscheinlich Palmitsäure), Spuren ätherischen Oeles, 14,7 Proc einer gelbsäureartigen Materie

Anwendung. In Asien etc als Zusatz zum Betelkauen im grössten Umfange, medicinisch gegen Diarrhoe und Dysenterie und besonders als Anthelminthicum. Zunächst bei Thieren (Hunden) verwendet, werden die Samen auch bei Menschen empfohlen. Für Hunde rechnet man pro Kilo Körpergewicht 0,5 g, für Pferde gilt als Maximaldosis 100 g = 0,1 Arecolin, für Rinder 250 g = 0,25 Arecolin — Dosis für Menschen 4,0—6,0.

Ausser einer Vorur ist es nothwendig, zugleich ein Abfuhrmittel, am besten Ricinusöl, zu geben.

Electuarium anthelminthicum pro canibus
Wurmiatwerga für Hunde
Rp Seminis Arecae pulverati
Butyr recentis aa 10,0 g
Grösseren Hunden auf einmal, kleineren die Hälfte

Pasta dentifricia cum Areca
(Brit. and Colon Druggist)

Rp Sem Arecae pulv 8,0
Boracis aa 2,0
Sapon hispan. aa 2,0
Calc carbon praecip 16,0
Rhiz Irid pulv
Glycerin aa 4,0
Ol Rosae, Cassiae, Caryophylli,
Spilanthis olivae aa q s
Carmin coerule
Aque q s

Pillulae Arecae Wurmpillen
Rp Seminis Arecae subtilis pulv 6,0
Olei Cacao
Sibi ovilis aa 1,5

Man formt mittels der halberkalteten Fettmischung 10 Pillen, wälzt nach völligem Erhitzen in Graphitpulver und überzieht sie mit Keratin. Für Erwachsene 5—10 Pillen auf einmal zu nehmen.

Pulvis anthelminticus pro equis F HARVEY
(Amerie Druggist)

Rp Sem Arecae pulv
Radix Gentian pulv aa 60,0
Ferri pulv 30,0

Divide in partes XII
Nach dem letzten Pulver giebt man auf einmal

Ol Terebinth 56,0
Ol Linu 560,0
Liq Sapon q s ut f emulsiō

Pulvis anthelminticus pro canibus

Rp Seminis Arecae pulverati
Radix Liquiritiae pulverati aa 10,0 g

Misce D tal dos 2 Grösseren Hunden morgens
nächtem 1, kleineren $\frac{1}{2}$ Pulver, 2 Stunden
später ein Abfuhrmittel

Pulvis dentifricus cum Areca

Rp Seminis Arecae 10,0
Carbonis Tillae 70,0
Myrrhae 3,0
Ossis Sepiae 18,0
Olei Calami gutt. V


M f pulvis subtilis

Tenalin ist ein aus Arekanüssen bereitetes Wurmmittel

Areka-Alkaloide Aus den Areka Nüssen wurden von E. JAHNS die nachstehend beschriebenen Alkaloide wie folgt abgeschieden

Darstellung Die grobgepulverten Areka-Nüsse werden mit schwefelsaurehaltigem Wasser kalt ausgezogen, die Auszüge eingeengt und mit Kaliumwismuthjodid gefällt. Der entstandene Niederschlag wird mit Baryumkarbonat + Wasser gekocht, die Filtrate werden eingedampft, mit Barythydrat im Ueberschuss versetzt und sogleich (I) mit Aether ausgeschüttelt. Dieser nimmt nur Arekolin auf. — Die rückständige Flüssigkeit wird mit Schwefelsäure neutralisirt und mit Silbersulfat vom Jodwasserstoff befreit. Aus dem Filtrat fällt man das Silber durch Schwefelwasserstoff, dann neutralisirt man mit Barythydrat, dampft zur Trockne und zieht den Rückstand mit kaltem Alkohol aus, welcher nur das Cholin löst. Ueber die Trennung der im Rückstande verbleibenden Arekain, Arekaidin und Guvacin s. Archiv Pharm 1891 674.

† **Arekolin**, $C_8H_{13}NO_2$. Farblose, geruchlose, ölige, stark alkalische Flüssigkeit, in Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform in jedem Verhältniss löslich, mit Wasserdämpfen flüchtig, siedet unter Verharzung gegen 209° C. Durch Erhitzen des Arekolins mit Salzsäure wird unter Abspaltung von Methylchlorid (durch Erhitzen mit Kalilauge unter Abspaltung von Methylalkohol) Arekaidin gebildet.



† **Arekolin-Bromhydrat**, $C_8H_{13}NO_2 \cdot HBr$. Krystallin aus der heissen alkoholischen Lösung wasserfrei in langen, dünnen, nicht hygroskopischen Prismen. Schmelzp 167—168° C. In Wasser leicht löslich, neutral. Vorsichtig aufzubewahren.

Arekaidin, $C_7H_{11}NO_2 + H_2O$. In geringer Menge in den Arekanüssen fertig gebildet, entsteht aus dem Arekolin durch die oben angegebene Behandlung. Farblos, luftbeständig, 4- und 6-seitige Tafeln, welche bei 100° C wasserfrei werden und dann bei 223—224° C schmelzen. Der Methyläther dieser Base ist das Arekoin.

Guvacin, $C_8H_9NO_2$. Farblose, luftbeständige Krystalle, in Wasser leicht löslich, unlöslich in absolutem Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol. Die wässrige Lösung ist neutral und wird durch Ferrichlorid tiefroth gefärbt. Schmilzt unter Zersetzung bei 271 bis 272° C.

Arekain, $C_7H_{11}NO_2 + H_2O$. Methylguvacin. Farblose, glänzende, luftbeständige Krystalle, in Wasser leicht löslich, schwer löslich in absolutem Alkohol, fast unlöslich

in Aether, Chloroform, Benzol. Die wässrige Lösung ist neutral und wird durch eine Spur Ferrichlorid schwach rötlich gefärbt. Wird bei 100°C wasserfrei und schmilzt dann bei $213\text{--}214^{\circ}\text{C}$.

Homo-Arekolin, $\text{C}_7\text{H}_{10}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{NO}_2$, der Äthyläther des Arekains. Farblose, alkalisch reagierende Flüssigkeit, mit Wasser in jedem Verhältnisse mischbar, mit Wasser dampfen flüchtig.

Wirkung. Arekadin, Arekain und Guvacin sind nach Marmé unwirksam. Arekolin wirkt ähnlich wie Muscarin auf das Herz. Es befördert die Ausstossung der Darm Parasiten (Bandwurm). Man giebt $0,004\text{--}0,006\text{ g}$ des bromwasserstoffsäuren Salzes. Die 1proc Lösung des gleichen Salzes dient als Myobium. Das Homo-Arekolin ist weniger giftig als das Arekolin, wirkt ähnlich wie dieses, aber schwächer.

Argento-Natrium thiosulfuricum.

† **Argento-Natrium thiosulfuricum seu hyposulfurosus seu subsulfurosus.**
Hyposulfis Sodae et Argenti $(\text{S}_2\text{O}_3\text{Na}_2)_2 + \text{S}_2\text{O}_3\text{Ag}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 680

Darstellung. 10 Th kryst Natriumthiosulfat werden in 20 Th kaltem destillirtem Wasser gelöst. Der (filtrirten) Lösung setzt man allmählich von einer kalten Lösung aus 5 Th Silbernitrat in 15 Th destillirtem Wasser, zuletzt tropfenweise unter Umrühren so lange zu, bis der beim Eintragen der Silbernitratlösung entstehende Niederschlag auch beim sorgfältigen Umrühren nicht mehr in Lösung geht. Die vorhandene Trübung beseitigt man durch Zufügung einiger Tropfen Natriumthiosulfatlösung, dann vermischt man das Ganze mit dem doppelten Volumen Weingeist und stellt es an einen kühlen, dunklen Ort.

Die nach etwa 12 Stunden abgeschiedenen Krystalle sammelt man in einem Trichter über Glaswolle, wäscht sie mit Weingeist ab und trocknet sie schliesslich ohne Anwendung von Wärme auf Thontellern oder durch Walzen auf Filtrirpapier. Ausbeute 8—9 Th.

Eigenschaften. Farblose, kleine, lamellenförmige, ziemlich lichtbeständige Krystalle, in Wasser leicht, in Alkohol schwer löslich. Der Geschmack ist süsslich, schwach metallisch, die Lösung färbt Haut und Wäsche nicht. Man verwechselt dieses Salz nicht mit dem schwerlöslichen $\text{S}_2\text{O}_3\text{Ag}_2 + \text{S}_2\text{O}_3\text{Na}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Anwendung. An Stelle des Silbernitrates, dessen atzende Eigenschaften es nicht besitzt. Innerlich bei Epilepsie zu $0,05\text{--}0,5\text{ g}$ mehrmals täglich. Aeusserlich in $0,5\text{--}1,0\text{proc}$ wässriger Lösung zu Injektionen in Körperhöhlen (Nase, Ohr, Harnröhre), als Klystier bei Diarrhoe, zu Augenwässern bei akuter und chronischer Konjunktivitis.

Argentum.

Argentum Silber. Argent Silver. Ag. Atomgew = 108.

Reines Silbermetall wird zur Herstellung verschiedener Silberpräparate verwendet. Werden solche präparative Arbeiten nur in kleinerem Maassstabe, zu Übungszwecken, vorgenommen, so empfiehlt es sich, das reine Silber „Feinsilber“ beim Goldarbeiter direkt zu kaufen. Andererseits ist es eine nützliche Sitte, alle Silberreste aufzubewahren und gelegentlich zu Silber und Silberpräparaten zu verarbeiten. — In der Grosstechnik geht man in der Regel nicht von reinem Silber aus, sondern verarbeitet Silberlegirungen (Werksilber, Silbermünzen, Silbertressen, photographische Abfälle). Die jedesmalige Art der Verarbeitung richtet sich natürlich nach der Natur des Ausgangsmaterials, indessen lassen sich doch allgemeine Gesichtspunkte anstellen. In der Regel scheidet man das Silber als Silberchlorid ab und führt dieses in metallisches Silber über.

1) Werksilber (Munzen, Geräthe, Bruchsilber), welches im wesentlichen aus Silber und Kupfer besteht, als zufällige Bestandtheile bez. Verunreinigungen aber noch Gold, Blei, Zink, Zinn (vom Lothe) enthalten kann, wird zunächst vom anhaftenden Schmutz durch Scheuern mit warmer Sodalösung und nachfolgendem Abspülen mit Wasser befreit. 10 Th dieses (zerkleinerten) Silbers bringt man behutsam (!) in einen geräumigen Kolben oder in einen hohen Porcellantopf, übergiesst es mit 10 Th Wasser und giesst dazu allmählich reine chlorfreie Salpetersäure von 1,178 spec Gew (27—28 Th) in mehreren Antheilen. Man bedeckt das Gefäss, welches nur zu $\frac{1}{4}$ gefüllt sein soll, und stellt es an einen warmen, aber zugigen Ort. Man beachte, dass allzu concentrirte Salpetersäure das Silber schwer angreift, andererseits soll die Salpetersäure auch nicht zu sehr verdünnt sein. Wenn die Entwicklung von Stickstoffdioxid aufgehört hat und trotzdem noch Silber ungelöst ist, so sind weitere Mengen Salpetersäure zuzusetzen.

Wenn der Auflösungsvorgang beendet ist, so sind in Lösung Silber, Kupfer, Blei, Zink, Wismut. In dem etwa vorhandenen, nicht in Lösung gegangenen Schlamme können zugegen sein metallisches Gold, Antimonoxyd, Zinnoxid. Man spritzt den Deckel des Gefässes mit destillirtem Wasser ab, filtrirt die Lösung durch ein Filter von Glaswolle oder Asbest, laugt den Rückstand noch 2—3 mal mit destillirtem Wasser aus und vereinigt die Filtrate. Zu dem Gesamt-Filtrate, welches auf 40—50° C erwärmt worden ist, setzt man nun unter Umrühren solange Salzsäure von etwa 15 Proc hinzu, bis alles Silber als Chlorsilber ausgefällt, und ein kleiner Ueberschuss von Salzsäure vorhanden ist (Man kann zur Fällung auch eine filtrirte Kochsalzlösung benutzen, indessen bleibt alsdann etwas Chlorsilber gelöst). Man lässt das gefällte Chlorsilber sich absetzen, giesst alsdann die überstehende Flüssigkeit klar ab und wäscht das Chlorsilber noch zweimal durch Dekanthiren mit Wasser. Hierauf bringt man den Niederschlag auf ein glattes doppeltes Filter und wäscht ihn mit schwach salzsäurehaltigem Wasser solange aus, bis das Filtrat mit Schwefelwasserstoff nicht mehr verändert wird.

2) Photographische Papiere, Silbertressen, Tröddeln und andere Abfälle trinkt man mit einer dünnen Lösung von Kalisalpeter, trocknet und aschert sie auf einem sauberen Herde ein. Zu diesem Zwecke zündet man einige Tropfen Petroleum an und trägt die getrockneten Abfälle allmählich in die Flamme ein. Die erhaltene Asche löst man in Salpetersäure, filtrirt die Lösung und schlägt aus ihr das Silber durch Salzsäure als Chlorsilber nieder, wie vorher angegeben ist. Vorsicht! Bei Papieren prüfe man, ob sie explosive Bestandtheile enthalten s. sub 4.

3) Photographische und galvanische Silberbäder. Diese enthalten das Silber in der Regel als Cyandoppelsalz und überdies gewöhnlich grosse Mengen freien Cyankaliums. Zur Abscheidung des Silbers versetzt man diese an einem zugigen Orte, am besten im Freien, mit einer zur vollständigen Zersetzung hinreichenden Menge von Salzsäure. Wie viel von letzterer nothwendig ist, ermittelt man zweckmässig vorher an einer kleinen Probe und berechnet darnach die Menge der für die gesamte Flüssigkeit zuzusetzenden Salzsäure. Man beachte, dass bei dieser Zersetzung grosse Mengen Blausäure gasförmig entweichen, und hüte sich, diese einzuathmen.

4) Analytische Silberreste. In den Laboratorien pflegt man alle Silberreste in einem Gefässe aufzubewahren, in welchem stets Salzsäure in enigem Ueberschuss vorhanden ist. Bei der Verarbeitung solcher Rückstände hat man darauf Rücksicht zu nehmen, dass in ihnen explosive Silberverbindungen enthalten sein können. — Man prüft die über den Resten stehende Flüssigkeit zunächst darauf, ob durch Zusatz von Salzsäure noch Chlorsilber ausgefällt wird. Ist dies nicht der Fall, so giesst man die überstehende Flüssigkeit klar ab, im anderen Falle setzt man Salzsäure im Ueberschuss hinzu, lässt klar absetzen und giesst die klare Flüssigkeit dann erst ab. Den Silberniederschlag rührt man alsdann mit concentrirter Salzsäure an, lässt absetzen, giesst die klare Flüssigkeit ab und digerirt den Niederschlag nochmals mit einer Mischung von verdünnter Salzsäure mit $\frac{1}{2}$ Volumen roher Salpetersäure 12 Stunden hindurch. Alsdann verdünnt man mit Wasser, lässt absetzen, giesst die klare Flüssigkeit ab, wäscht zwei bis dreimal durch Dekanthiren, später auf dem Filter auf. Man löst hierauf das Chlorsilber in 5 proc Ammoniak auf und scheidet es aus der filtrirten Lösung wieder durch Zusatz von Salzsäure aus.

Das so gewonnene Chlorsilber kann nun entweder auf nassem oder auf trockenem Wege in metallisches Silber übergeführt werden nachdem eine kleine Probe beim Erhitzen keine explosiven Eigenschaften gezeigt hat.

I Auf trockenem Wege. Man trocknet das Chlorsilber, mischt es mit der fünffachen Menge calcinirter Soda, füllt diese Mischung in einen Schmelztiegel und erhitzt diesen in einem Windofen solange, bis der Inhalt ruhig fliesst. Ist dieses der Fall, so rührt man mittelst eines eisernen Spatels um, schüttet etwas Salpeter in die Schmelze (um vorhandenes Kohlenstoffsilber zu entkarbonisiren) rührt nochmals um und lässt erkalten. Nach dem Zerschlagen des Tiegels und Aufweichen der Schmelze in Wasser erhält man das Silber als Regulus. Diese Schmelzoperation lässt sich sehr gut in dem Feuer einer Schmiede

oder einer Gasanstalt ausführen. Ist das „Silber“ noch nicht kompakt genug ausgefallen, so kann man es nochmals mit wasserfreiem Borax einschmelzen.

II Auf nassem Wege. A Man rührt das noch feuchte (salpetersäurefreie) Chlorsilber mit 10proc Salzsäure an, so dass diese noch etwas über dem Chlorsilber steht und stellt in den Brei Stangen oder Bleche von Zink (etwa das gleiche Gewicht des Chlorsilbers) ein. Die Reduktion beginnt sofort in der Nahe der Bleche und ist beendet, sobald die ganze Masse grauschwarze Farbe angenommen hat und eine abfiltrirte und gut ausgewaschene Probe in Salpetersäure klar löslich ist. Ist dieses der Fall, so nimmt man das Zink heraus, spült es mit Wasser ab und wäscht das Silberpulver zunächst einige Male durch Dekanthiren mit heissem Wasser, alsdann unter Erwärmen mit verdünnter Salzsäure, hierauf wiederum mit Wasser und trocknet es, bezw. glüht es schwach (sogen. Molekulares Silber).

B 1 Th Chlorsilber in noch feuchtem Zustande wird in einer Porcellanschale mit 2—3 Th Kalilauge von 1,25—1,30 sp Gew übergossen und unter Umrühren erhitzt, worauf man von Zeit zu Zeit einige Stückchen Traubenzucker (oder Honig) in die Flüssigkeit einträgt. Das Silber wird zu einer gelben, körnigen Masse reducirt. Man wäscht eine Probe durch Dekanthiren mit heissem Wasser vollständig aus und prüft, ob sie sich alsdann in Salpetersäure klar löst. Ist dies der Fall, so ist die Reduktion beendet, wenn nicht, so muss das Erhitzen unter Zusatz weiterer Mengen Traubenzucker fortgesetzt werden. Das reducirte Silber wird schliesslich mit heissem Wasser vollständig ausgewaschen, endlich getrocknet. (Sehr zu empfehlen.)

Eigenschaften. Im kompakten Zustande ein weisses, glanzendes, schweisbares Metall von gutem Klange und hoher Politurfähigkeit, ziemlich weich, sehr dehnbar. Spec Gewicht je nach der Bearbeitung 10,424—10,575. Schmilzt gegen 1000°C und lässt sich bei hoher Temperatur destilliren. An normaler Luft unveränderlich, durch Schwefelwasserstoff wird es geschwärzt.

Unlöslich in Salzsäure und kalter verdünnter Schwefelsäure, löslich in Salpetersäure und heisser conc. Schwefelsäure. Von schmelzendem Kali- oder Natronhydrat wird es kaum angegriffen, daher die Verwendung von Silbertiegeln zu Schmelzen mit atzenden Alkalien.

In der Pharmacie findet metallisches Silber in folgenden Formen Verwendung.

Argent purifié (Gall), Argentum purificatum (Brit.) Das Feinsilber des Handels mit einem Gehalte von 99,—100 Proc Ag, nur Spuren von Kupfer und anderen verunreinigenden Metallen (Bi, Pb, Te) enthaltend.

Argentum foliatum (Germ), Blattsilber. Argent en feuilles Leaf-silver. Das durch Walzen und Hämmern in die Form dünner Blättchen gebrachte Feinsilber. Zum Versilbern von Trochiskenplatten verwendet man das Blattsilber in ganzen Blättern, zum Versilbern der Pillen den bei der Blattsilberbereitung sich ergebenden Abfall. — Dieses Blattsilber soll sich in Salpetersäure klar (Trübung durch SbO_3H u. SnO_2H_2) und ohne bläuliche Färbung (Cu) auflösen. Beim Uebersättigen mit Ammoniak soll die salpetersäure Lösung nicht getrübt (Wismuthhydroxyd) und nur schwach bläulich gefärbt erscheinen (mehr als Spuren von Kupfer). Man bewahrt das Blattsilber in Kästen, vor Schwefelwasserstoff geschützt, auf.

Argentum praecipitatum Argentum divisum seu moleculare. Molekulares Silber ist das mittelst Eisen oder Zink s. S. 367 aus dem Chlorsilber auf nassem Wege abgeschiedene metallische Silber. Ein grauschwarzes Pulver, welches wegen seiner feinen Vertheilung zur Herstellung von Verbandstoffen Verwendung findet.

Argentum colloïdale, Argentum solubile. Collargol. Colloïdales Silber. CREDE'sches Silber.

Darstellung. 500 ccm einer 80 proc Lösung von krystallisirtem Ferrosulfat werden mit einer Lösung von 280 g krystallisirtem Natriumcitrat in 500 ccm Wasser gemischt. Diese Mischung wird unter Umrühren in 500 ccm Silbernitratlösung von 10 Proc eingegossen. Man lässt absetzen, giesst die überstehende Flüssigkeit ab und wäscht den Niederschlag durch Dekanthiren mit verdünnter Natriumcitratlösung, dann löst man ihn in Wasser und fällt diese Lösung durch Zusatz von absolutem Alkohol. In feuchtem Zustande eine mattblaue, blau oder grün gefärbte Masse, welche sich in Wasser (1:50) mit tieferer Farbe löst. Aus dieser Lösung wird das Silber durch Salzlösungen wieder abgeschieden, durch Zusatz von Salzsäure fällt eine schwammige Masse aus, welche aus Silber und Chlorsilber besteht. Auch löslich zu 0,2 Proc in Alkohol. Die wässrige Lösung wird auch „Silberhydrocol“, die alkoholische „Siberorganosol“ genannt.

Wird zur Herstellung der CREDE'schen Verbandstoffe und Verbandsalben angewendet. Es wird zur Zeit als eine allotrope Modifikation des Silbers aufgefasst, enthält aber rund nur 97 Proc Ag.

Unguentum Ciedé Cress'sche Salbe Argenti colloidalis 15,0, Aquae 5,0, Cerae albae 10,0, Adipis benzoinati 70,0

Erkennung und Bestimmung A Man erkennt das Silber an folgenden Reaktionen

1) Alle Silberverbindungen geben, mit Soda gemischt, vor dem Löthrohr auf Kohle erhitzt ein weisses, dehnbares Metallkorn, welches sich beim Betupfen mit wässriger Chromsaurelösung roth färbt — Die organischen Silberverbindungen hinterlassen schon beim blossen Glühen metallisches Silber 2) Kupfer, Zink, Eisen, Magnesium, Ferrosulfat, schweflige und phosphorige Säure scheiden aus Silbersalzlösungen metallisches Silber ab 3) Salzsäure und gelöste Chloride erzeugen in Silbersalzlösungen einen weissen käsigen Niederschlag von Silberchlorid AgCl , welcher in Salpetersäure unlöslich, in Ammoniak leichtlöslich ist Befeuchtet man das erhaltene Silberchlorid mit verdünnter Salzsäure und bringt es mit etwas metallischem Zink in Berührung, so wird das Silberchlorid zu metallischem Silber reducirt

B Man bestimmt das Silber entweder gewichts- oder maassanalytisch

Gewichtsanalytisch Die das Silber enthaltende Lösung wird mit reiner Salpetersäure bis zur deutlich sauren Reaktion versetzt und bis auf $50-60^\circ \text{C}$ erwärmt Als dann fügt man unter Umrühren soviel verdünnte Salzsäure hinzu, bis diese in geringem Ueberschuss vorhanden ist Man rührt bis zum Zusammenfallen des Niederschlags und lässt den Niederschlag an einem dunklen (!) Orte sich völlig absetzen Das so erhaltene Chlorsilber wird zunächst mit salpetersäurehaltigem Wasser, schliesslich mit reinem Wasser gewaschen und auf gewogenem Filter gesammelt, bei 100°C getrocknet und gewogen, oder man sammelt im Gooch'schen Tiegel und trocknet bei 140°C Oder man bringt die Hauptmenge des Chlorsilbers auf ein Uhrglas, verbrennt das Filter vollständig (!) in einem gewogenen Porcellantiegel, löst nach dem Erkalten das metallische Silber durch Zufügung von wenig Salpetersäure, giebt alsdann einige Tropfen Salzsäure hinzu und dampft im Wasserbade zur Trockne Hierauf bringt man die Hauptmenge des Chlorsilbers in den Tiegel, erhitzt bis zum beginnenden Schmelzen des Chlorsilbers und wägt nach dem Erkalten $\text{AgCl} \times 0,75261 = \text{Ag}$

Oder man verbrennt das vom Chlorsilber möglichst befreite Filter im Rose'schen Tiegel vollständig, bringt die Hauptmenge des Chlorsilbers dazu und reducirt dieses durch Glühen im Wasserstoffstrom zu metallischem Silber (Sehr genau!)

Liegen organische Silberverbindungen vor, so müssen diese durch Glühen in metallisches Silber übergeführt werden Dieses löst man alsdann in Salpetersäure und verfährt mit der salpetersauren Lösung wie vorher angegeben — Unlösliche Silberverbindungen, z. B. AgCl , AgBr , AgI schmilzt man mit Natriumcarbonat zusammen, scheidet hierdurch metallisches Silber ab, löst dieses in Salpetersäure etc

Maassanalytisch Die maassanalytische Bestimmung des Silbers ist die Umkehrung der maassanalytischen Bestimmung des Chlors nach VOLHARD Die das Silber am besten als Nitrat enthaltende Lösung, welche frei von salpetriger Säure ist, wird mit Salpetersäure sowie etwa 1 ccm conc chlorfreier Eisen-Alaunlösung versetzt Hierauf lässt man unter Umschwenken solange $\frac{1}{10}$ -Normal Ammoniumrhodanidlösung zufließen, bis eben dauernde Rothfärbung eintritt 1 ccm $\frac{1}{10}$ -Ammoniumrhodanidlösung zeigt 0,0108 g Ag an Vergl S 58

Versilberung. Das Ueberziehen von (metallischen) Gegenständen mit einer mehr oder weniger starken Schicht von Silber heisst versilbern Je nach der Art der Objecte kann es auf verschiedenem Wege ausgeführt werden Man beachte die Giftigkeit der Kaliumcyanid enthaltenden Präparate

Fenerversilberung Anwendbar für Kupfer, Messing, Bronze Die mit Pottasche gut gereinigten Gegenstände werden in einer Mischung von conc Schwefelsäure mit conc Salpetersäure gelbbebrannt, alsdann abgewaschen und mit einer Lösung von Mercurinitrat (1:100) abgerieben und so oberflächlich verquickt Hierauf trägt man mittelst einer messingenen Kratzbürste Silberamalgam (2 Silber, 1 Quecksilber) auf, spült mit Wasser ab, trocknet und erhitzt unter gut ziehender Esse über einem Holzkohlenfeuer, bis alles Quecksilber verdunstet ist Durch die galvanische Versilberung fast vollkommen verdrängt

Kalte Versilberung. Um kleinere Gegenstände aus Kupfer, Messing, Zink einseitig mit einer dünnen Silberschicht zu überziehen Eisen muss vorher galvanisch verkupfert werden 1) Man zerreibt 1 Th Silbernitrat und 3 Th 100 proc Kaliumcyanid jedes in einem besonderen Porcellanmörser, mischt beide Pulver zusammen und vermischt sie noch mit 3 Th gefälltem Calciumcarbonat Dieses „Versilberungspulver“ bewahrt man in einer gut verschlossenen Flasche auf Zum Gebrauch wird auf den entfetteten,

sehr gut gereinigten Gegenstand etwas von dem Pulver geschüttet, man giebt einige Tropfen destillirtes Wasser dazu und verrührt mit einem weichen, leinenen Lappchen, es entsteht sogleich eine schöne weisse Versilberung, welche durch weiteres Auftragen des Versilberungspulvers etwas verstärkt werden kann 2) 10 Th trockenes Silberchlorid, 65 Th Kalumbitartrat und 30 Th Kochsalz Man rührt die Mischung mit Wasser zu einem Brei an und reibt mit diesem die zu versilbernden Gegenstände ab oder lässt sie, mit dem Brei bedeckt, vorher einige Zeit stehen

Nasse Versilberung Zum allseitigen Ueberziehen kleiner Gegenstände aus Kupfer, Messing, Zink, z. B. Knöpfe, Stecknadeln etc. mit einer dünnen Silberschicht 1) Man taucht die gereinigten Gegenstände in eine heisse Auflösung von 1 Th Silbernitrat, 4 Th Kalumcyanid und 100 Th Wasser und lässt sie unter Umrühren einige Zeit darin liegen 2) Der zu versilbernde Gegenstand wird einige Minuten in eine kochende Mischung aus 100 Th Weinsteinpulver, 100 Th Kochsalz, 25 Th Silberchlorid und 1000 Th Wasser eingetaucht gehalten, sodann mit Schlammkreide blank gepulzt

Galvanische Versilberung. Kupfer, Messing und alle Kupferlegirungen können direkt versilbert werden, nachdem sie, wie unter Feuerversilberung angegeben entfettet, gebeizt und mit einer Mercurinnitratlösung schwach amalgamirt sind Eisen, Stahl, Nickel, Zink, Zinn, Blei müssen nach dem Entfetten und Beizen im alkalischen Kupferbade verkupfert und dann erst amalgamirt werden Die zu versilbernden Gegenstände kommen als „Kathode“ in das Bad, als Anode dient ein Silberblech Man elektrolysiert mit einer Stromstärke von 0,15–0,20 Ampère pro □ Decimeter Die Versilberung ist zunächst matt und wird durch Behandeln mit der Kratzbürste bezw. durch Poliren glänzend Fügt man dem Bade auf 100 l = 10 Tropfen Schwefelkohlenstoff zu, so fällt die Versilberung sogleich glänzend aus **Vorschrift zum Galvanischen Versilberungsbade** a Silbernitrat 150 g, Wasser 5 l, b Kalumcyanid (95–98 Proc) 250 g, Wasser 5 l Beide Lösungen werden gemischt

Versilberung von Glas Man stellt zwei Lösungen her **A.** Silberlösung Silbernitrat 8,5 g, destillirtes Wasser 91,5 g, **B.** Weinsäure Kali-Natronlösung Natriumkaliumtartrat 15,0 g, destillirtes Wasser 85,0 g Zum Gebrauche werden jedes Mal je gleiche Gewichtsmengen von A und B in einen Kochkolben eingewogen und bei kleinen Spiegeln das Doppelte, bei grösseren das dreifache Volumen der Gesamtmischung an destillirtem Wasser zugemischt Der entstehende weissliche Brei von Silbertartrat wird stark geschüttelt, bis er (nach einigen Sekunden) fein krystallinische Beschaffenheit angenommen hat Man fügt nun vorsichtig tropfenweise Ammoniakflüssigkeit unter Umschütteln hinzu, begrenzt den Ammoniakzusatz aber so, dass ein Theil des weissen Niederschlages noch ungelöst bleibt (Sollte versehentlich zuviel Ammoniak zugegeben worden sein, so mischt man wieder gleiche Gewichttheile von A und B und setzt von dieser Mischung soviel zu, dass ein bleibender Niederschlag ungelöst bleibt) Man schüttelt nun, um allen Ammoniakdampf im Gefässe zu absorbiren, die Flüssigkeit heftig, und sobald der weisse Niederschlag sich zu schwärzen beginnt, filtrirt man die Flüssigkeit durch ein bereit gehaltenes Faltenfilter auf die in horizontaler Lage aufgestellte Glasscheibe und sorgt dafür, dass diese an allen Stellen (Vertheilen mittelst Glasstabes!) mit einer 2–3 mm hohen Schicht der Lösung bedeckt ist Man lässt 1–2 Stunden bei einer Temperatur von 25–26° C (!) stehen, lässt alsdann die Flüssigkeit ablaufen, trocknet durch Schrägstellen und übergiesst die präparierte Seite mit einem Spirituslack — Kleine Hohlgefässe füllt man einfach mit der Versilberungsflüssigkeit voll, sie versilbern sich alsdann sehr schön Grössere Gefässe, z. B. Gartenkugeln, werden dadurch versilbert, dass man das nicht verdünnte Gemisch von A und B (ohne Zusatz von Wasser) nach dem erforderlichen Zusatz von Ammoniak in dieselben hineinfiltrirt und während der Bildung des Silberniederschlages die Kugel nach allen Seiten so dreht, dass alle Theile des Gefässes von der Lösung benetzt werden

Die Versilberungsflüssigkeit soll nicht kälter als 20° C sein, am besten geht die Versilberung in einem auf 25° C temperirten Raume vor sich

Die zu versilbernden Glasflächen müssen absolut sauber sein Man reinigt sie zuerst mit Petroleumäther, dann mit Salpetersäure, schliesslich durch Putzen mit einer Mischung aus Calciumcarbonat und Wasser mittelst eines weichen, leinenen Lappens

Versilberung nicht metallischer Gegenstände, wie Holz, Horn, Knochen, Leder etc. kann man erzeugen durch abwechselndes Bepinseln mit Lösungen von Silbernitrat und Gallussäure bez. Pyrogallussäure

Silberbeize zum Reinigen von Silbersachen ist eine Flüssigkeit aus Weinstein, Alaun, Kochsalz je 40,0 g und 2 l Wasser Die zu reinigenden Gegenstände werden einige Minuten in der zum Sieden erhitzten Flüssigkeit geschwenkt

Silberschwamm für Zahnpfomben wird durch Gluhen von Silbertartrat dargestellt **Silber Seife**, zum Putzen silberner Geräthe etc., ist eine mit 40–50 Proc fein geschlammtem Kaolin oder Thon gefüllte Hausseife

Silber-Legirung zum Plombiren der Zähne Eine solche besteht aus 61 Th Zinn und 39 Th Silber Diese Legirung wird vor dem Gebrauche in einem Porcellan

schälchen mit etwas Quecksilber unter Erwärmen amalgamirt, worauf das noch warme Amalgam zwischen sämisch garem Leder gepresst wird, um den Ueberschuss des Quecksilbers zu entfernen

Silberloth A Hartloth Feinsilber 4—9 Th, Messing 3 Th oder 19 Feinsilber, 1 Kupfer, 10 Messing B Weichloth 2 Feinsilber, 1 Messing oder Silber 12, Kupfer 4, Zink 3

Silberlegirungen. Den Feingehalt der Legirungen des Silbers drückte man früher durch die Angabe aus, wieviel Loth reines Silber in einer Mark (16 Loth) enthalten waren — 12lothiges Silber war also ein solches, welches in 16 Loth der Legirung = 12 Loth Feinsilber (also 75 Proc) enthielt Heute wird der Feingehalt einer Legirung dadurch angegeben, wieviel Theile reines Silber in 1000 Th einer Legirung enthalten sind (Gesetz vom 16 Juli 1884) Es dürfen in Deutschland Silberwaaren von jedem Gehalt angefertigt und gestempelt werden, Uhrgehäuse und silberne Gerathe aber (Löffel etc) dürfen nicht geringwerthiger als von 800 Feingehalt sein Der Silberstempel hat das Siechelzeichen des abnehmenden Mondes und in diesem die Reichskrone (800) Daneben ist der Feingehalt in Tausendsteln anzugeben — Halbsilber Kupfer 100,0, Nickel 70,0, Wolfram 5,0, Aluminium 1,0 Silberähnliche, hämmerbare, luftbeständige Legirung

Fisch-Silber. Der perlglänzende Ueberzug der Schuppen des Weissfisches (*Cyprinus alburnus*, *Alburnus lucidus*) wird durch Reiben mit Wasser abgesondert, geschlämmt, mit ammoniakhaltigem Wasser ausgezogen und dann zum Fabriren der imitirten Perlen benutzt

Argentum aceticum.

† **Argentum aceticum.** Silberacetat. Essigsaures Silber. Acétate d'argent
Acetate of silver. $C_2H_3O_2Ag$. Mol. Gew. = 167.

Darstellung. Eine Lösung von 20 Th Silbernitrat in 50 Th. destillirtem Wasser wird mit einer Lösung von 17 Th kryst Natriumacetat in 100 Th Wasser vermischt Man lässt die Mischung an einem kalten und dunklen Orte 24 Stunden lang stehen, filtrirt den Niederschlag ab, wäscht ihn mit wenig kaltem Wasser aus und trocknet ihn in dünner Lage vor Licht und Staub geschützt Ausbeute 18 Th — Aus der Mutterlauge scheidet man das Silber durch Salzsäure als Chlorsilber aus

Eigenschaften Weisses, aus mikroskopischen Prismen bestehendes, neutrales Pulver von widerlich metallischem Geschmack, in 100 Th kaltem oder 15 Th siedendem Wasser löslich, am Lichte grauviolett werdend, beim Erhitzen riecht es nach Essigsäure, beim Glühen hinterbleibt metallisches Silber In Weingeist ist es wenig löslich, aus der heissen wässrigen Lösung krystallisirt es in glänzenden, nadelförmigen Krystallen Vor Licht geschützt, vorsichtig aufzubewahren

Anwendung In der Therapie kaum verwendet, es wird gelegentlich als chemisches Reagens benutzt Wichtig ist es, die Verbindung zu kennen, da sie gelegentlich einmal bei der Prüfung von Acetaten mit Silbernitrat als Niederschlag auftreten und alsdann zu Täuschungen Veranlassung geben kann

Argentum chloratum.

I. † **Argentum chloratum** (Erganzb Helv) Silberchlorid. Chlorsilber.
Chlorure d'argent Chloride of silver. $AgCl$ Mol. Gew. = 143,5.

Darstellung Man löst 10 Th. Silbernitrat in 500 Th destillirtem Wasser, bringt diese Lösung in eine Flasche, fügt an einem dunklen Orte 15 Th Salzsäure (1,123 spec. Gew) hinzu, schüttelt stark um und lässt im Dunklen absetzen Man filtrirt alsdann den Niederschlag durch einen Trichter, dessen Abfluss durch einen Wattebausch geschlossen ist, wäscht mit destillirtem Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion und trocknet im Dunklen, vor Staub geschützt auf porösen Unterlagen — Nur bei völligem Abschluss von Licht und Staub kann man ein weisses Chlorsilber erwarten

Eigenschaften. In reinem Zustande ein weisses, gewöhnlich aber ein graues oder grauviolett Pulver, unloslich in Wasser, verdünnter Salpetersäure, verdünnter Salzsäure und anderen verdünnten Säuren, merklich loslich in Alkalichloriden (NaCl), leicht loslich (1 Th AgCl in 2 Th Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc) in Ammoniakflüssigkeit, in den Lösungen des Ammoniumkarbonats, Kaliumcyanids, Natriumthiosulfats, auch in heisser Mercurinitratlösung loslich und aus dieser in Würfeln krystallisirend. Durch Digestion mit Kaliumbromidlösung wird es in Silberbromid, durch Digestion mit Kaliumjodidlösung in Silberjodid verwandelt — Es schmilzt bei etwa 260° C ohne Zersetzung zu einer gelblichen Flüssigkeit, welche beim Erstarren eine farblose, durchscheinende, hornartige Masse (Hornsilber) darstellt. Das geschmolzene Chlorsilber ist verhältnissmässig wenig lichtempfindlich.

† **Argentum chloratum RADEWACHER** Wurde von R. in der Weise dargestellt, dass aus 1 Th Silbernitrat abgeschiedene, noch feuchte Silberchlorid solange mit 8 Th verdünntem Weingeist unter Lichtabschluss digerirt wurde, bis es grau geworden war. Dieses Präparat kann (auch nach dem Ergänzb Ap V) durch Silberchlorid ersetzt werden, welches infolge der Einwirkung des Lichtes grau geworden ist.

Aufbewahrung Vorsichtig und vor Licht geschützt.

Anwendung. Besitzt nicht die ätzenden, wohl aber die entfernten Wirkungen der Silbersalze, weil es in Kochsalzlösung merklich loslich ist. Innerlich zu 0,02—0,1 g in Pillen 3—4mal täglich bei Chorea, Epilepsie, Keuchhusten, Gastralgien, chronischen Diarrhöen, früher auch bei Syphilis, jetzt ganz verlassen. Aeusserlich früher bei syphilitischen Geschwüren, sowohl unverdünnt als in Salbenform. Jetzt als Zusatz zu Hollensteinstiften, um diese hart zu machen. Technisch ein Bestandtheil verschiedener Versilberungspulver und flüssigkeiten. Die Lösung in Ammoniakflüssigkeit dient zum Färben von Knochen, Elfenbein, Perlmutter. Als Zusatz zu Glasflüssen, um diese gelb zu färben.

Zur subkutanen Injektion Rp Argenti chlorati recentis praecipitati 0,05 g, Natrum thiosulfurici 0,8 g, Aquae 10,0 g (Jacony).

II † **Argentum chloro-ammoniatum** **Argentum muriatico-ammoniatum.** Ammoniumsilberchlorid. Silbersalmiak. $\text{AgCl} (\text{NH}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 195,5.

Darstellung Das aus 10 Th Silbernitrat gefällte und ausgewaschene Silberchlorid wird noch feucht mit 12 Th Ammoniakflüssigkeit von 20 Proc übergossen und auf 30° C erwärmt. Sollte alsdann nicht vollständige Auflösung eintreten, so setzt man noch kleine Mengen Ammoniakflüssigkeit hinzu. Die Lösung vertheilt man auf flache Gefässe und stellt diese in Exsiccatoren, die mit Calciumchlorid gefüllt sind. Die nach einigen Tagen abgeschiedenen Krystalle werden rasch auf Fliesspapier abgetrocknet, darauf vor Licht geschützt, in Glasstopfengefässen vorsichtig aufbewahrt.

Eigenschaften Farblose, oktaëdrische Krystalle oder bläulichweisses, krystallinisches Pulver, von ammoniakalischem Geruche und ätzendem, metallischem Geschmacke. Sie schwarzen sich am Licht und gehen an der Luft Ammoniak ab, unter Zerfall in Silberchlorid. Nur wenig haltbar.

Anwendung Früher in Gaben von 0,003—0,01 g zwei- bis viermal täglich gegen Chorea, Epilepsie und Syphilis in Pillenform. Höchstgaben pro dosi 0,015, pro die 0,05 g. An seiner Stelle wird gegenwärtig gewöhnlich die folgende, Kopp'sche Lösung angewendet.

† **Liquor Argenti chlorati ammoniatus** Kopp. **Liquor Argenti chlorato-ammoniaci** Kopp.

Darstellung Man fällt aus einer Auflösung von 1 g Silbernitrat in 100,0 g Wasser das Silber als Silberchlorid durch Zusatz von 2,0 g Salzsäure (25 Proc). Den ausgewaschenen Niederschlag löst man in 50,0 g Ammoniakflüssigkeit (10 Proc). Alsdann tropft man vorsichtig unter Umschütteln solange conc. Salzsäure hinzu, bis die Flüssigkeit gerade eine bleibende opalisirende Trübung annimmt. Nachdem diese durch Zusatz einer möglichst geringen Menge (Tropfen!) Ammoniak wieder gehoben ist, verdünnt man die Gesamtflüssigkeit mit destillirtem Wasser auf 125,0 g. **Aufbewahrung und Dispensation** in dunklen Gefässen.

Anwendung Je 1 g dieser Lösung enthält etwa 0,005 g Silberchlorid. Man giebt sie dreimal täglich zu 3—4 Tropfen mit Wasser verdünnt gegen Veitstanz und Epilepsie.

Argentum citricum.

† Argentum citricum. Itrol. Silbercitrat. Citronensaures Silber. $C_6H_5O_7Ag_3$.
Mol Gew. = 513

Darstellung. Man löst 10 Th Citronensäure in 150 Th Wasser, neutralisirt diese Lösung mit Natriumbikarbonat (12 Th), filtrirt wenn nöthig und fügt unter Umrühren eine Auflösung von 24,3 Th Silbernitrat in 100 Th Wasser zu. Der entstehende Niederschlag wird zum Absetzen gebracht, mit Wasser gewaschen und auf porösen Unterlagen getrocknet. Sammtliche Operationen sind vor Licht geschützt auszuführen.

Eigenschaften. Ein weisses, geruchloses, spec. schweres Pulver von mässiger Lichtempfindlichkeit, in 3800 Th Wasser löslich. Beim Glühen hinterlässt es 63,16 Proc metallisches Silber. Die Herstellung der Lösungen erfolgt wie bei Argonin s. d. S. 381.

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt.

Anwendung. Als nicht atzendes Antisepticum. In Substanz auf Wunden gestäubt, macht es diese steril. Lösungen von 1:4000 bis 1:10000 zum Ausspülen von Körperhöhlen. Gegen Gonorrhoe wässrige Lösungen 0,025—0,05 g 200,0 g.

Itrol-Stäbchen bestehen aus Kakaobutter mit Zusatz von 2 Proc Itrol. Itrol-Tabletten bestehen aus 0,1 g Itrol und dienen zur Herstellung antiseptischer Lösungen.

Itrol-Flecke aus Wäsche etc. beseitigt man, indem man sie 2—3 Minuten in eine Lösung von 10 g Mercurichlorid, 25 g Natriumchlorid und 2 l Wasser einlegt, alsdann gut ausspült.

Injectio Itroli nach WERLIER I) 1:1000 II) 1:8000 III) 1:6000 IV) 1:4000
Die fetten römischen Zahlen bedeuten die Originalnummern der Präparate.

Argentum cyanatum.

† Argentum cyanatum. Argenti Cyanidum (U-St) Silbercyanid. Cyansilber. Cyanure d'argent. Cyanide of silver. $AgCN$ oder $AgCy$. Mol. Gew. = 134

Darstellung. Man löst 10 Th Kaliumcyanid in 100 Th destillirtem Wasser und setzt zu der filtrirten Lösung eine Silberlösung, bereitet aus 26 Th Silbernitrat und 260 Th Wasser. Man mischt gut durch, fügt 10 Th reine Salpetersäure (25%) hinzu, rührt um, lässt absetzen, wäscht den Niederschlag aus, sammelt ihn und trocknet ihn vor Staub geschützt auf einer Filtrirpapierunterlage bei gelinder Wärme. Alle Operationen sind zweckmässig an einem vor Licht geschützten Orte auszuführen.

Eigenschaften. Silbercyanid ist ein amorphes, rein weisses, am Lichte sich nicht leicht färbendes Pulver, unlöslich in Wasser und in verdünnter Salpetersäure, löslich in siedender 25proc Salzsäure und aus dieser beim Erkalten in mikroskopischen Prismen sich ausscheidend. Löslich auch in Kaliumcyanid und Natriumthiosulfat. Vgl. auch unter Acidum hydrocyanicum S. 61.

Anwendung. Als Antisypiliticum zwei- bis dreimal täglich zu 0,002—0,006 g. Höchstgaben pro dos 0,015 g, pro die 0,06 g. Im pharm. Laboratorium dient es zur Darstellung der wässrigen Blausäure *ex tempore* s. S. 60.

Argentum iodatum.

† Argentum iodatum. Argenti Jodidum (U-St) Silberjodid. Jodsilber. Jodure d'argent. Jodide of silver. AgJ . Mol. Gew. = 235.

Darstellung. Zu einer Auflösung von 10 Th Silbernitrat in 100 Th destillirtem Wasser wird in kleinen Portionen unter Umrühren einer Lösung von 10 Th Kaliumjodid in 100 Th destillirtem Wasser eingetragen. Man sammelt den Niederschlag auf einem Filter, wäscht ihn aus und trocknet ihn. Diese Operationen werden zweckmässig an einem vor Licht und Staub geschützten Orte vorgenommen.

Eigenschaften. Weisslichgelbes, spec schweres, amorphes Pulver, in Wasser, Weingeist, verdünnten Säuren, Ammoniumkarbonat unlöslich. Ist geruchlos und geschmacklos und wird am-Lichte wenig verändert. Bei 400°C schmilzt es zu einer dunkelrothen Flüssigkeit, welche beim Erkalten zu einer schmutziggelben, etwas durchscheinenden, auf dem Bruche aber körnigen Masse erstarrt. Es löst sich erst in etwa 2500 Th Ammoniakflüssigkeit von 28 Proc, wird übrigens in der Ammoniakflüssigkeit weiss, beim Auswaschen mit Wasser aber wieder gelblich. In konc heisser Salzsäure nur in Spuren löslich, konc, siedendheisse Salpetersäure und Schwefelsäure scheiden daraus Jod ab. In kalter konc Silbernitratlösung ist es erheblich löslicher als Silberchlorid und Silberbromid, dagegen ist das Auflösungsvermögen des Silberjodids in Mercurinitrat, Natriumthiosulfat und Kaliumcyanid etwas geringer als dasjenige des Silberchlorids. — Durch Erhitzen im Chlorstrome wird Silberjodid in Silberchlorid übergeführt.

Aufbewahrung Vorsichtig, vor Licht geschützt, obgleich es verhältnissmässig wenig lichtempfindlich ist.

Prüfung Wird Silberjodid mit einer Mischung aus gleichen Theilen Ammoniumkarbonatlösung und Wasser erwärmt, so darf das Filtrat nach dem Ansäuern mit Salpetersäure nur opalisirend — nicht bis zur Undurchsichtigkeit — getrübt werden (Chlor).

Anwendung Als Antineuralgicum und Antisyphiliticum bei Magenkrampf, Veitstanz, Keuchhusten in Gaben von 0,004—0,01 g drei- bis viermal täglich. Höchstgaben *pro dosi* 0,015 g, *pro die* 0,05 g.

Will man das Silberjodid in einer Arzneimischung *ex tempore* darstellen, so ist zu beachten, dass zur Bereitung von 1 g Silberjodid = 0,7 g Silbernitrat und 0,7 g Kaliumjodid mit etwas Wasser zusammenzureiben sind.

Pilulae Argenti jodati. Zu bereiten aus Argenti nitrici 0,87, Aquae destillatae gtt 20, Kalii jodati 0,4 g, Boli albae 7,5 g, Glycerini q s. Pilulae 100. Jede Pille enthält 0,005 g Silberjodid.

† **Argento Kalium jodatum.** Kalium-Silberjodid. Jodure d'argent et de potassium. Dieses Silbersalz, der Formel $\text{AgJ} + 2\text{KJ}$ entsprechend, wird gewöhnlich *ex tempore* dargestellt. Zur Bereitung von 1 g des Salzes reibt man 0,9 g Kaliumjodid und 0,3 g Silbernitrat mit etwas Wasser zusammen. Dosis 0,005—0,02 g.

Argentum lacticum.

† **Argentum lacticum.** Actol. Silberlactat. Milchsäures Silber. $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{Ag} + \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 215

Darstellung Man löst 10 Th Silbernitrat in 150 Th Wasser und fällt aus dieser Lösung durch Zusatz eines Ueberschusses von Natriumkarbonat das Silbercarbonat vollständig aus. Nachdem dieses mit Wasser ausgewaschen ist, löst man es noch feucht in einer Mischung von 8 Th Milchsäure (75 Proc, spec Gew = 1,22) und 80 Th Wasser unter Erhitzen auf und dampft die erhaltene Lösung bis zur Krystallisation ein. Die Operationen sind im Dunkelzimmer auszuführen.

Eigenschaften. Farblose Krystallnadeln, am Lichte leicht bräunlich werdend, in 15 Th Wasser löslich. Beim Erhitzen hinterlässt es 50,2 Proc metallisches Silber. In der Regel ist das Präparat braunlich gefärbt und giebt mit Wasser eine braunliche, bez röthliche Färbung. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren.

Anwendung Die wässrige Lösung 1:300 bis 1:500 ist in ihrem Desinfektionswerth etwa gleich der 0,1proc Mercurichloridlösung. In Substanz wirkt es auf Wunden reizend, daher nur in Lösungen 1:100 bis 1:2000, ausserdem zur Darstellung von Verbandmaterial.

Actol-Tabletten als Ersatz der Sublimat-Tabletten bestehen aus 0,2 g Actol und dienen zur Herstellung von $\frac{1}{2}$ —1 l Aktollösung.

Silberseide, Silbercatgut, Silberdrains. Das Rohmaterial wird in eine braune Flasche gethan, in welcher eine Aktollösung (1:100) enthalten ist. Seide verbleibt 14 Tage,

Catgut und Drains verbleiben 8 Tage darin, dann wird das Material herausgenommen, mit gewöhnlichem Wasser gespült, bis dieses klar bleibt, und dann dem Tageslicht ausgesetzt, bis es schwarzbraun gefärbt ist

Argentum nitricum.

† **Argentum nitricum.** Silbernitrat Salpetersaures Silber. Azotate d'argent. Argenti Nitras. Silbersalpeter. Causticum lunare. In allen Pharmakopöen AgNO_3 . Mol. Gew. = 170.

Silbernitrat wird in den Apotheken gebraucht 1) in Form von Krystallen, 2) in Form von Stäbchen, 3) mit Salpeter zusammengeschmolzen als salpeterhaltiger Höllestein

I † Krystallisiertes Silbernitrat Argentum nitricum crystallisatum.

Darstellung Eine Lösung von reinem Silber in reiner Salpetersäure wird zur Trockne verdampft, worauf der Rückstand in einem Porcellan-Kasserol bis zum Schmelzen erhitzt wird. Den halb erkalteten Salzrückstand löst man in $\frac{1}{2}$ seines Gewichtes warmen Wassers und stellt die Lösung vor Staub und Schwefelwasserstoff wohl geschützt in flachen Gefäßen an einen warmen Ort, damit das Wasser behufs Krystallbildung langsam verdunstet. Von den Krystallen lässt man später durch Schragstellen der Schale die Mutterlauge völlig ablaufen, bringt diese nochmals an einen warmen Ort zum Verdunsten, die Krystalle aber trocknet man möglichst rasch in der Schale aus, indem man diese, mit Papier bedeckt an einen warmen Ort stellt.



Fig 101. Silbernitrat-Krystall.

Das Schmelzen des Silbernitrates vor der Krystallisation ist notwendig, um ein von freier Salpetersäure freies Präparat zu erhalten. Bei der ganzen Darstellung ist der Zutritt von Staub und Schwefelwasserstoff sorgfältig zu vermeiden.

Eigenschaften. Farb- und geruchlose, bitter, zugleich ätzend metallisch schmeckende,

durchsichtige, tafelförmige, zuweilen auch blätterige rhombische Krystalle, meist mit Kombination eines Rhombenoktaeders (*o*) und eines rhombischen Prismas (*p*) mit der Endfläche (*e*), welche letztere die tafelförmige Gestalt bedingt. Sie lösen sich in 0,6 Th kaltem oder 0,2 Th siedendem Wasser, in 26 Th kaltem oder 5 Th siedendem Weingeist. Die wässrige Lösung ist neutral. In Äther sind sie schwer löslich. Bei 200°C schmelzen sie zu einer gelblichen Flüssigkeit, welche beim Erkalten krystallinisch erstarrt.

Aufbewahrung. Krystallisiertes Silbernitrat verändert sich am Lichte nicht, wenn man es vor Staub geschützt aufbewahrt. Trotzdem empfiehlt es sich, dasselbe unter Lichtschutz vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung. Das krystallisierte Silbernitrat ist die nämliche chemische Verbindung wie das Silbernitrat in Stangenform. Beide können *promiscue* benutzt werden, wenn die Stangenform nicht durch die therapeutische Verwendung bedingt ist. Indessen bevorzugt man gelegentlich doch die eine oder die andere Form aus folgenden Gründen. Das geschmolzene Silbernitrat (in Stangen) ist mit grosserer Sicherheit frei von freier Salpetersäure, das krystallisierte dagegen ist mit grösserer Sicherheit frei von Silbernitrit.

II. † **Argentum nitricum fusum** Lapis infernalis. Geschmolzenes Silbernitrat. Geschmolzenes salpetersaures Silber. Höllestein. Vergl. auch S. 377 Crayons d'azotate d'argent (Gall).

Darstellung Diese zerfällt in die Herstellung einer reinen Lösung von Silbernitrat, in das Eintrocknen derselben, in das Schmelzen des erhaltenen Salzrückstandes und in das Ausgiessen der Schmelze in Stäbchenform. — Im pharmaceutischen Laboratorium kann man in die Lage kommen, reines Silber zu verarbeiten, wenn man z. B. Silberrückstände in molekulares Silber umgearbeitet hatte. In der Technik geht man in der Regel vom Werksilber aus und stellt aus diesem die reine Silbernitratlösung dar.

I Aus reinem (pulverförmigem) Silber. Man bringt in einen Kolben 1 Th pulverförmiges Silber und übergießt es mit 8,5 Th reiner Salpetersäure (von 25 Proc) Der Kolben darf nur zu $\frac{1}{4}$ seines Fassungsraumes mit der Mischung angefüllt sein Den Kolben, in welchen ein Trichter eingesetzt ist, stellt man an einen warmen, aber luftigen Ort, damit die entwickelten Oxyde des Stickstoffs entweichen können ohne lästig zu fallen Schon bei mittlerer Temperatur erfolgt die von Entwicklung brauner Stickoxyde begleitete Auflösung des Silbers Wenn die Einwirkung träge ist, so unterstützt man sie durch Erwärmen auf dem Wasser- oder Sandbade (auf 60–70° C) — Wenn alles Silber gelöst ist, so erwärmt man noch solange, bis braune Dämpfe nicht mehr aufsteigen, alsdann lässt man erkalten und filtrirt die Lösung durch einen Bausch Glaswolle oder Asbest, welcher man vorher mit Salpetersäure ausgekocht hat

Verarbeitet man reines Silber in Form von Blech, so empfiehlt sich die Benutzung einer konzentrierteren Salpetersäure Man hat alsdann auf 1 Th Silber = 2,5 Th Salpetersäure von 1,20 spec Gew anzuwenden

II Aus Silberlegirungen. Da es sich hierbei durchweg um Verarbeitung alter Silbergeräthe (Löffel etc) handelt, so werden diese durch mechanische Bearbeitung mit einer heissen Pottasche Lösung zunächst von Fett und Schmutz befreit Ferner hat man zweckmässig zwei Fälle zu unterscheiden

a) Die Legirung enthält weniger als 10 Proc Kupfer Man verfährt in diesem Falle wie unter Nr I angegeben ist und erhält dadurch eine Lösung welche Cuprinitrat und Silbernitrat, vielleicht auch kleine Mengen von Wismuthnitrat und Bleinitrat enthält, ein unlöslicher Rückstand wurde auf Gold zu prüfen sein Man verdampft die Lösung — um die überschüssige Salpetersäure zu verjagen — zur Trockne Den Salzrückstand nimmt man mit Wasser auf und erhitzt die Lösung mit einer hinreichenden Menge Silberoxyd Durch das letztere werden Kupfernitrat und Wismuthnitrat als Hydroxyde vollständig, Blei nur unvollständig niedergeschlagen Sobald die filtrirte Lösung auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit keine Blaufärbung mehr zeigt, ist sie kupferfrei Man säuert sie alsdann schwach mit Salpetersäure an und dampft sie zur Trockne

Zur Bereitung des hierbei erforderlichen Silberoxyds fällt man entweder eine Lösung von reinem Silbernitrat mit Natronlauge aus und wäscht den Niederschlag aus, bis im Filtrat Salpetersäure (durch Diphenylamin + Schwefelsäure) nicht mehr nachzuweisen ist, oder man nimmt etwa den $\frac{1}{4}$ Theil der kupferhaltigen Silbernitratlösung ab, fällt in der Siedehitze mit Natronlauge, wäscht den Niederschlag aus und benutzt dieses Gemenge von Silberoxyd + Kupferoxyd zur Ausfällung des Kupfers in der Hauptflüssigkeit

b) Die Legirung enthält mehr als 10 Proc Kupfer Man löst die Legirung wie bei I in Salpetersäure und dampft die filtrirte Lösung der Nitrats zur Trockne Als dann erhitzt man den trocknen Salzrückstand in einer Porcellanpfanne bis zu dunkler Rothgluth (etwa auf 240° C) so lange, bis die filtrirte Lösung einer gezogenen Probe durch Zusatz von Ammoniak nur schwach blau gefärbt wird Unter diesen Umständen wird das Kupfernitrat in Kupferoxyd zerlegt, das Silbernitrat bleibt unverändert Man löst alsdann die erkaltete Schmelze in Wasser, filtrirt und dampft die Lösung unter Zusatz von etwas Salpetersäure wieder zur Trockne Sollte die Lösung noch etwas Kupfer enthalten, was sich nach dieser Methode nicht ganz entfernen lässt, so beseitigt man diese letzten Reste durch Behandeln mit Silberoxyd nach a)

Ein zu hohes Erhitzen der Schmelze ist zu vermeiden, weil sich sonst Silbernitrit bilden kann Doch würde dieses durch Eindampfen der mit Salpetersäure versetzten Lösung wieder in Silbernitrat umgewandelt werden

c) Blei- und zinkhaltiges Silber lässt sich auf diesem Wege nicht zu reinem Silbernitrat verarbeiten Es bleibt nichts übrig, als die Legirung in Salpetersäure zu lösen, das Silber aus der Lösung als Silberchlorid zu fällen, dieses zu metallischem Silber zu reduciren (s Argentum) und letzteres nach I auf Silbernitrat zu verarbeiten

Das Schmelzen des Silbernitrats Dieses führt man zweckmässig in einem Porcellankasserol mit Ausguss und angesetztem Stiele aus, kleinere Mengen (z B für den Receptur-Gebrauch) kann man in Porcellantiegeln, zur Noth in Salbenkrausen aus Porcellan schmelzen Fig 102

Man füllt also ein sauberes Porcellankasserol etwa zur Hälfte mit dem eingetrockneten Silbernitrat und erhitzt das Gefäss gelinde über einer Weingeist- oder Gasflamme (Pflzbrenner) Das Salz beginnt bei etwa 200° C zu schmelzen, gleichzeitig entweichen kleine Mengen Wasser und Salpetersäure unter Schäumen weichen durch Umrühren mit einem zuvor erhitzten Glasstabe oder Porcellanspatel Man setzt alsdann das Erhitzen fort, bis der gesammte Inhalt einem Oele gleich ruhig fliesst, hutet sich aber, zu hoch zu erhitzen, da sonst Bildung von Silbernitrit, ja Aus



Fig 102 Porcellanpfanne zum Schmelzen des Silbernitrats

scheidung von metallischem Silber auftreten könnte. Sollte letzteres der Fall sein, so giebt man einige Tropfen conc. Salpetersäure dazu, welche das Silber rasch wieder in Lösung überführen. Man erwärmt nun noch den Ausguss des Porcellankasserols und hat die Masse zum Ausgießen fertig.

Das Ausgießen des Silbernitrates. In der Praxis schmilzt man in einer Charge etwa nur soviel Silbernitrat auf einmal, als erforderlich ist, um die Form auszufüllen. Diese Formen bestehen aus Eisen, Stahl, Serpentin oder Glas. Diejenigen aus Eisen oder Stahl sind innen vergoldet oder versilbert. Formen aus Kupfer oder Messing sind nicht zu empfehlen. — Vor dem Gebrauche werden die Formen sehr sorgfältig gereinigt. Hierauf erwärmt man sie und reibt die Kanäle mit trockenem Talksteinpulver und Glaswolle bezw. Asbest gut aus. Dann stellt man die zusammengeschraubte Form bis zum Gebrauche an einen warmen Ort, am besten mit etwas Papier lose bedeckt. Inzwischen schmilzt man




Fig. 103 Höllensteinform




Fig. 104 Eine Hälfte der Höllensteinform

in der oben angegebenen Weise eine angemessene Menge Silbernitrat. Sobald die Masse ruhig fließt, ruht man mit einem erwärmten Glasstabe um, wärmt auch den Ausguss des Porcellankasserols an und gießt nun ohne Verzug in die etwa 50° C warme Form aus und zwar füllt man jeden Kanal für sich vollständig an, sodass am Schluss des Gießens an jeder Stange ein Gusszapfen ansitzt, auch wohl mehrere Stangen miteinander zusammenhängen. Sobald die Form völlig erkaltet ist ($\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{1}$ Stunde), schraubt man die beiden Hälften auseinander und stößt mit Hilfe eines Stückchens Glasrohr die Stäbchen aus den Kanälen sauft auf einen Porcellanteller. Die Gusszapfen (dicken Köpfe) der Stangen

schlägt man mit einem Mörserspalt aus Porcellan von den Stangen ab und bringt letztere sogleich in die Aufbewahrungsgefäße. Die sich ergebenden Reste (Gusszapfen etc.) verwendet man sofort zu einer neuen Schmelzung. Am zweckmäßigsten arbeitet man mit zwei Formen, dann ist die eine in der Regel gebrauchsfertig, wenn die andere gefüllt ist. — Um einen Höllenstein zu gewinnen, welcher im Verlaufe der Aufbewahrung nicht grau werden soll, ist es nöthig, bei den vorstehend beschriebenen Operationen das Hinzutreten von Staub und Schwefelwasserstoff durchaus zu vermeiden. Man arbeite also an einem staubfreien Orte, fasse das Silbernitrat nicht mit den Fingern oder mit Handschuhen an und lasse auch die Salzlösungen nicht unnöthig herumstehen, sondern beschleunige alle Operationen nach Möglichkeit.

Eigenschaften. Farblose, trockene und nicht hygroskopische, auch nicht matte etwa Federkiel dicke Stäbchen, welche auf dem Bruche nicht körnig sind, sondern ein radiales, krystallinisches Gefüge zeigen. Der Geschmack ist scharf metallisch bitter. In Berührung mit organischen Stoffen schwarzen sich die Stäbchen unter dem Einflusse des Lichtes, natürlich erfolgt Bräunung oder Schwarzung auch durch Schwefelwasserstoff. Die Stäbchen haben keine besondere Festigkeit, sondern brechen leicht ab. S weiter unten. Im übrigen besitzt der Höllenstein die nämlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie das krystallisierte Silbernitrat.

Aufbewahrung und Dispensation. Der weisse Höllenstein wird ebenso wenig wie das krystallisierte Silbernitrat am Lichte grau, wenn er vor Staub und Schwefelwasserstoff geschützt wird. Hieraus ergibt sich ohne weiteres, dass er vor Staub und Schwefelwasserstoff geschützt aufzubewahren ist. Ausserdem geschieht die Aufbewahrung vorsichtig, zweckmäßig auch unter Lichtschutz.

Prüfung. Höllenstein soll reines Silbernitrat sein. Von Verunreinigungen kommen vor Silberchlorid, Kupfernitrat, Wismuthnitrat, Bleinitrat, Zinknitrat, Kaliumnitrat. Alle diese werden durch folgende drei Proben erkannt. Man bereitet sich eine Auflösung von 1 g Silbernitrat in 5 ccm destillirtem Wasser. Diese muss vollständig klar und neutral sein.

1) 1 ccm dieser Lösung versetzt man mit 15 ccm absolutem Weingeist. Eine krystallinische Abscheidung, welche nicht nach wenigen Minuten von selbst verschwindet, deutet auf Kalisalpeter, eine weisse Trübung auf Chlorsilber. 2) 1 ccm dieser Lösung werde mit 5 ccm Ammoniakflüssigkeit versetzt. Man muss eine klare und ungefarbte Flüssigkeit erhalten. Blaufärbung zeigt Kupfer an, eine weisse Trübung deutet auf Wismuth oder Blei. 3) 1 ccm dieser Lösung verdünnt man mit 20 ccm Wasser, fällt alsdann das Silber durch Zugabe einiger Tropfen Salzsäure aus, schüttelt bis zum Zusammenballen, filtrirt und verdampft das Filtrat in einem Glasschälchen. Es darf alsdann kein nichtflüchtiger Rückstand hinterbleiben. Hinterbleibt ein solcher, so ist er nach dem gewöhnlichen Gange der Analyse zu untersuchen. 4) Zu einer Auflösung von 0,1 g Kaliumjodid in 10 ccm Wasser, welcher etwas Starkelösung und einige Tropfen verdünnter Schwefelsäure zugesetzt sind, bringt man einige Tropfen der vorerwähnten Lösung. Als bald auftretende Blaufärbung zeigt Silbernitrit an.

Glaubt man Ursache zu haben, eine Verunreinigung oder Verfälschung des Silbernitrats vermuthen zu sollen, so führt man die Probe 3 quantitativ aus, d. h. man bestimmt das Silber als Chlorsilber und im Filtrat die vorhandenen Fremdstoffen. — Die Prüfung auf Blei wird gewöhnlich in der wässrigen Lösung durch Schwefelsäure ausgeführt. Man hüte sich, hierbei etwa ausfallendes Silbersulfat, welches schwer löslich ist, für Bleisulfat zu halten, ein Irrthum, welcher schon recht häufig vorgekommen ist und zu trügerischen Weiterungen geführt hat.

Anwendung. Silbernitrat verbindet sich mit Eiweiss zu unlöslichem Silberalbuminat, wirkt daher in concentrirter Lösung und in Substanz ätzend. Die Ätzwirkung erstreckt sich aber nur auf die mit dem Silbernitrat direkt in Berührung kommenden Parttheen. In verdünnter Lösung wirkt es adstringirend, sekretionsbeschränkend, entzündungswidrig. Man giebt es innerlich in Lösung oder in Pillen bei Krankheiten des Magens und des Darmes, auch bei nervösen Erkrankungen (Epilepsie). Der dauernde Gebrauch von Silbersalzen hat zur Folge, dass durch Ablagerung von metallischem Silber sich eine nicht mehr schwindende Grau-Blaufärbung der Haut, des Zahnfleisches und des Gaumens einstellt, welche „Argyria“ genannt wird. Pillen, welche Silbernitrat enthalten, werden zweckmässig mit Bolus bereitet. Gegenmittel bei Vergiftungen ist Kochsalz. Höchstgaben *pro dosi* 0,08 g, *pro die* 0,2 g (Germ. Helv.).

III † Argentum nitricum cum Kalio nitrico (Aust. Germ. Helv.) **Argentum et Potassii Nitrates**. **Argentum Nitras dilutus** (U-St.) **Argentum Nitras mitigatus** (Brit.) **Lapis infernalis mitigatus seu nitratus**. **Lapis causticus Desmarres**. **Bacilla Barral**. **Barral'sche Stifte**. Die nachfolgenden Pharmakopöen (Brit. Aust. Germ. Helv. U-St.) lassen eine Mischung von 1 Th. Silbernitrat mit 2 Th. Kaliumnitrat schmelzen und in Stäbchenform bringen. Das Präparat enthält somit 33,3 Proc. Silbernitrat. Die Stäbchen sind porcellanartig, hart, auf dem Bruche körnig ohne radial-krystallinische Struktur und neigen sehr zum Grau- bezw. Schwarzwerden, sind daher vor Licht und Staub besonders gut zu schützen. Sie brechen weniger leicht als Stäbchen von reinem Silbernitrat.

Prüfung. Wird 1 g des Präparates in 10 ccm Wasser gelöst und mit 20 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Natriumchloridlösung und 10 Tropfen Kaliumchromatlösung versetzt, so darf nur 0,5 bis 1,0 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Silbernitratlösung bis zur dauernden Röthung der Flüssigkeit verbraucht werden.

† **Argentum nitricum fusum** (Helv.) **Argentum Nitras induratus** (Brit.) wird durch Schmelzen einer Mischung von 95 Th. Silbernitrat und 5 Th. Kaliumnitrat bereitet.

† **Crayons d'Azotate d'argent mitigé** werden aus einer Mischung von 90 Th. Silbernitrat und 10 Th. Kaliumnitrat hergestellt (Gall.).

IV † Argentum nitricum cum Argento chlorato (Ergänzb.) **Argentum Nitras fusus** (U-St.) Silberchloridhaltiges Silbernitrat. **Moulded Silver Nitrate**.

1) Nach Ergänzb. werden 100 Th. zerriebenes Silbernitrat mit 10 Th. Salzsäure (1,128 spec. Gew.) gemischt, die Mischung in einer Porcellanschale eingedampft, vorsichtig geschmolzen und in Stäbchenform gegossen. Enthält etwa 10 Proc. Silberchlorid.

2) Nach U-St. werden 100 Th Silbernitrat mit 4 Th Salzsäure (1,168 spec Gew) in gleicher Weise behandelt. Das Präparat enthält rund 5 Proc Silberchlorid.

Weisse oder grauweisse, harte feste Stäbchen von körnigem Bruche. Sie brechen nicht leicht ab und sind so hart, dass sie sich mit dem Messer spitzen lassen, daher besonders zum Ätzen in Körperhöhlen.

Sel Clément ist ein mit etwa 20 Proc Natrium- und Magnesiumnitrat zusammengesetztes Silbernitrat. Es wird lediglich in der Photographie gebraucht.

Unauslöschliche Tinte für Wäsche. Lösung A Silbernitrat 5,0, Ammoniakflüssigkeit 10,0. Lösung B Natriumkarbonat krystall 7,0, Arabisches Gummi 5,0, destill. Wasser 12,0. Man gießt A in B ein und erhitzt die Mischung, bis sie braunschwarz ist. Man schreibt mit einer Stahlfeder auf das gestärkte und gebügelte Gewebe und überfährt die Schrift nach dem Trocknen mit einem heissen Bügeleisen.

Silberflecken-Vertilgung. Aus ungefärbten Zeugstoffen entfernt man diese am zweckmässigsten, indem man die Flecken mit einer wässrigen Lösung von Kalumcyanid befeuchtet, solange liegen lässt, bis Auflösung erfolgt ist, alsdann mit Wasser gut durchspült. Oder man betupft die Flecken zunächst mit einer Lösung von Kalumjodid und reibt sie dann mit einer Lösung von Natriumthiosulfat.

Flecken auf der Haut betupft man mit Jodtinktur und reibt sie alsdann mit Natriumthiosulfatlösung ab.

Aqua Aethiopica

Eau éthiopique ou égyptienne. Eau de la Chine. Eau grecque.

Rp Argenti nitrici 2,0
Aque Rosae 40,0
Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati 10,0
Spiritus odorati 5,0

Zum Schwätzen der Haare, letztere wöchentlich 2 Mal mit einer Bürste zu benetzen. Giftig!

Bacilla ophthalmica GRAEFE.

GRAEFE'sche Augentifta.

Rp Argenti nitrici pulv 5,0
Cupri sulfurici pulv 10,0
Aque destillatae q s

Zu Stäbchen auszurollen.

Cereoli Argenti nitrici

(Münch Nosokom.-Vorschr.)

Rp Argenti nitrici 0,07
Olei Caeae rasp 4,0
Gummi arabici 2,0
Glycerini 0,5

Fiant cum aqua cereoli 4 cm lang und 8 cm dick.

Pilulae Argenti nitrici

(Münch Nosokom.-Vorschr.)

Rp Argenti nitrici 0,1
Boli albae 1,0

Fiant cum aqua pilulae 10, conspersendae bolo.

Injectio Argenti nitrici

(Münch Nosokom.-Vorschr.)

Rp Argenti nitrici 0,1
Aque destillatae 800,0

Unguentum Argenti nitrici compositum

(Hamb Vorschr.)

Rp Argenti nitrici sublt pulv 3,3
Zinci oxydati
Balsami peruviani EA 10,0
Adipis 80,0

Collyrium Argenti nitrici

Rp Argenti nitrici 0,05
Aque destillatae 25,0

Augenwasser

Collyrium neonatorum.

Rp Argenti nitrici 0,1
Aque destillatae 25,0
Glycerini 5,0

Augenwasser. Bei Augenblennorrhoe der Neugeborenen täglich einmal in die Augenlidpalpe einzureiben. Auch prophylaktisch unmittelbar nach der Geburt.

Injectio antigonorrhoea.

Rp Argenti nitrici 0,85—0,5
Aque destillatae 100,0

Linamentum nigrum

Schwarze Charpie

Rp Argenti nitrici 5,0
Aque destillatae 100,0
Linamenti 50,0

Die Charpie wird mit der Lösung getränkt, dann auf Porcellantellern an einem warmen Orte getrocknet. Verbandmittel für atonische Wunden und Geschwüre (s S 373).

Pilulae antiepilepticae HENK

Rp Argenti nitrici 0,66
Opil puri 0,4
Extracti Conii 8,0
Succi Liquiritiae 2,0
Radici Liquiritiae q s

Fiant pilulae 100. Täglich zweimal 3—5 Pillen.

Pilulae Argenti nitrici

(CHARCOT, VULPIAN, WUNDERLICH)

Rp Argenti nitrici 1,0
Argillae albae 10,0
Aque q s

Fiant pilulae 100, argilla conspersendae. Täglich 1—3 Stück bei Tabes dorsalis.

Pilulae contra gastroducniam ulcerosam

FRERICHS

Rp Argenti nitrici 0,85
Aque destillatae gtt. 8
Extracti Belladonnae 0,5
Olei Caryophyllorum 0,3
Extracti Gentianae 5,0
Radici Gentianae q s

Fiant pilulae 120. Dreimal täglich 2—3 Pillen bei Magengeschw.

Pulya inspersionis contra otorrhoeam

BONNAPONT

Rp Argenti nitrici sublt pulv
Zinci veneti praeparati
Lycopodii EA 5,0

Zum Einblasen in den Gehörgang bei Otorrhoe.

Pulya inspiratoria WALDENBURG

Rp Argenti nitrici 0,1 (—0,5)
Aluminis usti 5,0

Zum Einblasen in Pharynx oder Larynx bei Ulcerationen beider.

Unguentum antigonorrhoeum CASPER.

Rp	Argentii nitrici	1,0—1,5
	Aquae destillatae	1,0—1,5
	Adipis Lanse	80,0
	Olei Olivarum	20,0

Bei chronischer Gonorrhoe Die Salbe wird auf caecillirte Bougies gestrichen, welche 10—30 Minuten in der Urethra liegen bleiben.

Unguentum Argentii nitrici compositum FRICKS

Rp	Argentii nitrici	1,0
	Balsami Peruviani	5,0
	Unguenti Zinci	20,0

Zum Verbands syphilitischer Geschwüre und anderer schlecht eiternder Wunden

Unguentum Argentii nitrici GRAEFE**Unguentum ophthalmicum GOUTHRIE.**

GRAEFE GOUTHRIE'sche Salbe

Rp	Argentii nitrici pulv	0,5
	Adipis suilli	10,0
	Liquoris Plumbi subacetici	gtt. X

Unguentum Argentii nitrici MACDONALD

Rp	Argentii nitrici	1,0
	Aquae destillatae gtt	XV
	Adipis suilli	10,0

Bei Gonorrhoe mittels Bougies in die Harnröhre einzuführen

Unguentum capillis densigans

Rp	Argentii nitrici	1,0
	Ammonii carbonici	1,5
	Aquae Rosae	gtt. XX
	Unguenti pomadini	80,0

Zum Schwärzen des Haupt- und Barthaars zweimal wöchentlich aufzutragen

Vet. Linimentum ad contusiones recentes

Rp	Argentii nitrici	5,0
	Aquae destillatae	100,0
	Olei Lini	200,0
	Liquoris Ammonii caustici	5,0

Flat Linimentum Zum Bestreichen frischer Verbrennungen und Brandwunden.

Haarfärbemittel. Diese bestehen meist aus zwei Präparaten einer ammoniakalischen Silberlösung, welche auf das Haar aufgetragen wird, und einem Reduktions- oder Schwefelungsmittel, welches die Bildung von reducirtem Silber oder von Schwefelsilber veranlasst

I. Lösung A Silbernitrat 1,0, destill Wasser 10,0 **Lösung B** Schwefelleber 3,0, Wasser 80,0 Das Haar wird zunächst gewaschen und getrocknet, dann mit Lösung A und nach einigen Minuten mit Lösung B befeuchtet Man wartet noch 2 Minuten und wäscht nun mit Wasser nach Es empfiehlt sich, Vorversuche an einem Kaninchenfell zu machen Wird eine schwächere Silberlösung verwendet, so erhält man braune, mit stärkerer Silberlösung schwarze Töne

II. Lösung A Pyrogallussäure 7,5, Spiritus 60,0, Wasser 800,0 Wird zuerst angewendet **Lösung B** Silbernitrat 7,5, Ammoniakflüssigkeit 15,0, Wasser 45,0 Gebrauch wie bei I

III. Schwarz Lösung A Pyrogallussäure 2,0, Rektifizirter Holzessig 25,0, Spiritus 65,0, Eau de Cologne 10,0 **Lösung B** Ammoniakalische Silberlösung wie bei II

IV. Braun Silbernitrat 30, kryst Kupfersulfat 20, Citronensäure 20,0, destill Wasser 950,0, Ammoniakflüssigkeit q s, bis der entstehende Niederschlag grade wieder verschwunden ist Direkt aufzutragen

V. Blond Silbernitrat 10,0, Kupfersulfat 15,0, Citronensäure 20,0, dest Wasser 950,0, Ammoniakflüssigkeit wie bei IV Direkt aufzutragen

Silbernitrat-Lösung, ammoniakalische. Man löst 1 g Silbernitrat in 20 ccm Wasser und setzt tropfenweise so lange Ammoniakflüssigkeit hinzu, bis der zunächst entstandene Niederschlag fast völlig wieder gelöst ist Dann lässt man absetzen, filtrirt und bewahrt vor Licht geschützt auf (U-St) Reagens auf arsenige Säure u s w

Argentum oxydatum.

† **Argentum oxydatum** Argentii Oxidum (Brit U-St) Silberoxyd. Oxyde d'argent Silver oxide. Ag_2O . Mol. Gew. = 232.

Darstellung Man löst 10 Th Silbernitrat in 100 Th destillirtem Wasser und tröpfelt diese Lösung in 1500 Th frisch bereitetes Kalkwasser unter Umrühren ein Der entstehende braunschwarze Niederschlag wird zuerst durch Dekanthiren, schliesslich auf einem Filter mehrmals ausgewaschen, dann auf porösen Unterlagen bei mittlerer Wärme getrocknet (Brit)

Vorsicht. Man beachte, dass weder die Silbernitratlösung noch das Kalkwasser Ammoniak enthalten darf, weil sich sonst das ausserordentlich gefährliche Knallsilber bilden kann

Eigenschaften. Frisch gefällt ein braunlich grauer Niederschlag, nach dem Trocknen ein fast schwarzes, spec schweres Pulver von metallischem Geschmack, in etwa 8000 Th Wasser löslich und ihm alkalische Reaktion ertheilend Im feuchten Zustande zieht es aus der Luft Kohlensäure an Durch Einwirkung von Licht wird es reducirt,

ebenso zerfällt es bei 250—300° C in Silber und Sauerstoff. Wird es mit leicht oxydirbaren bzw. brennbaren Substanzen (Schwefelantimon, Schwefelarsen, Schwefelmilch, amorphem Phosphor, Gerbsäure) zusammengerieben, so kann Entzündung erfolgen.

Aufbewahrung Vorsichtig, vor Licht, Staub und Ammoniak geschützt in trockenen Gefäßen. Für die Darstellung von Pillen reibe man es im Morser zunächst mit einigen Tropfen Wasser an.

Prüfung 1) Werden 0,5 g Silberoxyd im Porcellantiegel geglüht, so sollen 0,465 g metallisches Silber (93,1 Proc.) hinterbleiben. 2) In Salpetersäure löse es sich ohne Entwicklung von Kohlensäure auf, die Lösung sei farblos und von der Reinheit des Silbernitrates.

Anwendung Wegen des Fehlens einer Aetzwirkung wird Silberoxyd in Amerika und England dem Silbernitrat vorgezogen. Innerlich in Gaben von 0,005—0,05 g drei bis viermal täglich in Pillen und Pulvern bei Syphilis, Epilepsie, Chorea, Diarrhöen, Uterusblutungen, Uteruskoliken. Höchstgaben *pro dos* 0,015 g, *pro die* 0,05 g.

Pillulae Argenti oxydati		Pillulae Argenti oxydati cum Nuce vomica Cox	
Rp	Argenti oxydati 1,0	Rp	Argenti oxydati 1,0 (I)
	Opii pulverati 0,1		Semina Strychni 2,0
	Boli albae 7,5		Extracti Gentianae 6,0
Fiant cum aqua pilulae 100 Dreimal täglich je eine Pille		Fiant pilulae 40	
Pillulae Argenti oxydati THWEATT		Unguentum antisyphiliticum SERRA	
Rp	Argenti oxydati 1,0 (I)	Rp	Argenti oxydati 1,0
	Opii pulverati 0,1		Adipis suilli 25,0
Conserve Rosarum			
Fiant pilulae 20			

Argentum sulfuricum.

† Argentum sulfuricum Silbersulfat Schwefelsaures Silber. Sulfate d'argent Sulphate of silver Ag_2SO_4 . Mol Gew = 312.

Darstellung Eine Lösung von 10 Th Silbernitrat in 50 Th destillirtem Wasser wird unter Umrühren mit einer Lösung von 11 Th kryst. reinem Natriumsulfat in 50 Th destillirtem Wasser vermischt. Man läßt einige Stunden an einem kühlen, schattigen Orte stehen, sammelt das ausgeschiedene Salz auf einem Filter, wäscht es mit 50 Th eiskaltem Wasser, welche man in kleinen Antheilen zugeibt, dann mit verdünntem Weingeist und läßt es auf porösen Unterlagen trocknen. Ausbeute 6—6,5 Th.

Eigenschaften Farblose, rhombische Krystalle, von neutraler Reaktion, in 200 Th kaltem oder 70 Th siedendem Wasser löslich. Es ist, solange nicht Staub dazu tritt, nicht besonders lichtempfindlich, wird aber doch zweckmässig vor Licht geschützt aufbewahrt.

Prüfung 1) Es löse sich in 100 Th Wasser klar auf. 2) 1 g gebe bei der Bestimmung 0,9198 g Silberchlorid. Vergl. S. 368.

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt.

Anwendung. Als chemisches Reagens, namentlich in der präparativen Chemie.

Argenti salia varia.

† Argentaminum. Argentamin. Aethylendiaminsilberphosphat. Man mischt 10 Th Aethylendiamin mit 100 Th Wasser und löst in dieser Lösung 10 Th Silberphosphat auf. — Farblose, alkalisch reagierende Flüssigkeit, welche weder mit Kochsalz — noch mit Eiweiss enthaltenden Flüssigkeiten Niederschläge giebt. Wird am Lichte zersetzt. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren. Gegen Gonorrhoe zu Einspritzungen in die urethra anterior in Verdünnung 1:5000, in die urethra posterior 1:1000. Nicht ohne Reizerscheinungen.

† **Argoninum** *Argentum-Casein* *Argentum Natrio-caseinicum* Zur Darstellung versetzt man eine Lösung von Casein Natrium (s. Casein) mit Silbernitratlösung und fällt die so entstandene Mischung mit Alkohol. Der erhaltene Niederschlag wird mit verdünntem Weingeist gewaschen und getrocknet. Enthält etwa 4 Proc Ag

Eigenschaften. Feines weisses Pulver, in heissem Wasser leicht, in kaltem Wasser schwer löslich. Zur Auflösung schüttelt man das Präparat zuerst mit einem Theile des vorgeschriebenen Wassers in der Kalte an, giesst den Rest des Wassers in heissem Zustande zu und schüttelt bis zur Auflösung. Die erzielte Lösung giesst man durch Glaswolle. Es lassen sich 10 procentige Lösungen darstellen. Durch Säuren wird das Argonin in seine Bestandtheile gespalten. Eiweiss wird durch Argonin nicht gefällt, mit Kochsalzlösung entsteht kein Niederschlag. Uebergiesst man es mit Schwefelwasserstoffwasser, so bleibt es farblos, auf weiteren Zusatz von Ammoniak erfolgt Auflösung unter Braunfärbung.

Prüfung 1) Es braune feuchtes Curcuma-Papier nicht, enthalte also kein freies Alkali. 2) Schichtet man die wässrige Lösung über eine Auflösung von Diphenylamin in concentrirter Schwefelsäure, so soll Blaufärbung nicht eintreten (Salpetersäure).

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschützt.

Anwendung. Als nicht ätzendes Antisepticum empfohlen. Die 1,5 bis 3 procentige wässrige Lösung zu Injektionen gegen Gonorrhoe.

† **Argentum chinaseptolicum** *Oxychinolinsulfosaures Silber.* *Argentol.* $C_9H_5N(OH)SO_3Ag$ Mol. Gew. = 332

Wird fabrikmässig durch Umsetzung der Lösungen von oxychinolinsulfosaurem Natrium mit Silbernitrat dargestellt.

Ein gelbliches, fast geruchloses, in kaltem Wasser, in Alkohol und Aether schwer, in heissem Wasser etwas leichter lösliches Pulver. Erhitzt man das Pulver längere Zeit mit Wasser, so wird Silber in höchst feiner Vertheilung abgespalten und kann mit Hilfe eines Glasstabes zu glänzenden Blättchen gerieben werden. Die wässrige Lösung wird durch Fernichlorid blaugrün gefärbt. Der Silbergehalt beträgt 32,5 Proc.

Angewendet als Streupulver und Salben für Wunden, Granulationen, Hautkrankheiten. Bei Gonorrhoe Anreibungen von 1:300—1000, mit Hilfe von etwas Gummischleim bereitet. Vor Licht geschützt, vorsichtig aufzubewahren.

† **Protargolum** *Protargol.* Eine Verbindung des Silbers mit einem Eiweisskörper, vermuthlich einer Albumose (Somatose?). Ueber die Darstellung löslicher Silber-Proteinverbindungen liegen bisher folgende Angaben vor. Die Niederschläge, welche entstehen durch Behandlung von Proteinsubstanzen (Eiweißalbumin, Serumalbumin, Pflanzenalbumin, Albumosen, Peptonen), mit Silbersalzen, werden mit Lösungen von Albumosen behandelt. Die neuen, löslichen Silberverbindungen werden entweder durch Eindampfen oder durch Zusatz von Alkohol abgeschieden. An Stelle der Proteinsubstanzen können Derivate derselben, z. B. das künstliche Methylenderivat angewendet werden. Engl. Patent 18478.

Staubfreies, hellgelbes Pulver, von schwach metallischem Geschmack, in Wasser leicht löslich, sogar 1+1. Die Lösungen sind braun gefärbt und angeblich neutral, thatsächlich aber schwach sauer oder schwach alkalisch. Die letztere Reaktion ist vorzuziehen. Die wässrige Lösung wird weder durch Alkalien noch durch Schwefelalkalien, Kochsalz oder Eiweiss gefällt. Salzsäure fällt zwar einen Niederschlag, doch besteht dieser angeblich (?) aus Protargol und löst sich beim Erwärmen wieder auf. In der Lösung erzeugt dagegen Pikrinsäure einen gelben Niederschlag. Versetzt man die Lösung mit einem Ueberschuss von Natronlauge und setzt alsdann tropfenweise Kupfersulfatlösung hinzu, so tritt Violettfärbung auf (Biuret Reaktion, auf Pepton hinweisend). Der Gehalt an metallischem Silber beträgt 8 Proc und ist durch Veraschen des Präparates zu bestimmen.

Das Protargol ist vorsichtig und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren, die Lösungen, welche wie diejenigen des Argonins zu bereiten sind, bedürfen gleichfalls des Lichtschutzes, indessen ist die Angabe, dass sie sich am Lichte schnell

verändern, nach unseren Versuchen unzutreffend Sauer reagierende Lösungen können reizend wirken

Dem Protargol werden bactericide Eigenschaften in hohem Grade nachgerühmt Da es mit Eiweiss keine unlösliche Verbindung eingeht, kann es auch in tiefere Schichten wirken Man wendet die 0,25 bis 2,0 procentige Lösung bei der acuten Gonorrhoe der Männer an Bei Urethritis der Frauen werden noch 5 bis 10proc Lösungen ohne Reizerscheinungen vertragen

† **Argentum phenylosulfuricum** Phenolsulfosaures (Carbolsulfosaures) Silber.
 $C_6H_4(OH)SO_3Ag$ Mol. Gew. = 281.

Darstellung. Es werden 537 Th paraphenolsulfosaures Baryum in 2000 Th Wasser gelöst und mit einer Menge verdünnter Schwefelsäure versetzt, welche genau 98 Th Schwefelsäurehydrat entspricht Nach völligem Absetzen wird je eine Probe der klaren Flüssigkeit einerseits durch Zusatz von Schwefelsäure auf Baryumverbindungen, andererseits auf Schwefelsäure geprüft Fällt eine der Proben positiv aus, so entfernt man den Ueberschuss durch tropfenweises Zusetzen von verdünnter Schwefelsäure bez von Baryumsulfophenylat, von dem man etwas zurückbehalten hatte Nach dem Filtriren dampft man zur Sirupdicke ein Den Sirup versetzt man mit der gleichen Menge Wasser, erwärmt im Wasserbade und setzt unter Lichtabschluss soviel Silbercarbonat hinzu, bis kein Aufbrausen mehr erfolgt Dann wird filtrirt, die Lösung bei mässiger Wärme verdunstet und zum Krystallisiren gebracht (Lichtabschluss!) Vergl S 87

Eigenschaften. Farblose, feine prismatische Nadeln, geruchlos, von metallischem Geschmack Löslich in 3 Th Wasser oder in 80 Th Weingeist, in Aether, Schwefelkohlenstoff und Chloroform unlöslich Zersetzen sich bei Lichtzutritt, auch beim Erhitzen auf $120^\circ C$ unter Auftreten von Phenol, Annahme bräunlicher Färbung und Bildung von Silbersulfid Beim stärkeren Erhitzen hinterbleibt metallisches Silber

Die wässrige Lösung ist neutral, in derselben entsteht durch Kalilauge schwarzer Niederschlag, durch Ammoniak keine Fällung Chloride und Salzsäure geben weisses Silberchlorid, Ferrisalze erzeugen Violettfärbung, die durch Mineralsauren verschwindet

Prüfung. Die wässrige Lösung sei neutral und werde weder durch Baryumchloridlösung (Schwefelsäure) noch durch verdünnte Schwefelsäure (Baryumsalze) getrübt Durch Aether lasse sich aus dem trocknen Salze kein Phenol extrahiren


Anwendung. Als Antisepticum in der Wundbehandlung (ZAKARSKI)

Aristolium.

Unter dieser Gesamtüberschrift sollen die Glieder der Gruppe der jodirten Phenole zusammengefasst werden, welche als Ersatzmittel des Jodoforms eingeführt worden sind

† **Aristolium** (Ergänzb) Dijododithymol (Gall) Dithymoldijodid. Anisalin. Thymotol $C_{20}H_{14}J_2O_2$. Mol. Gew. = 550. DRP 40739

Darstellung. Man reibt 60 g Jod und 80 g Kaliumjodid im Porcellanmörser unter Zusatz kleiner Mengen Wasser an und bereitet so eine Jodlösung von 300 ccm Andererseits löst man 16 g Natronhydrat in etwas Wasser, lost darin 15 g Thymol auf und füllt diese Lösung gleichfalls zu 300 ccm auf Dann trägt man unter Umrühren die Jodlösung in die alkalische Thymolösung ein Der entstandene bräunliche Niederschlag wird mit CH_2 1—1,5 Liter Wasser gewaschen, alsdann bei $40-50^\circ C$ getrocknet (Gall)



Eigenschaften Ein hellschokoladenfarbiges Pulver, fast ohne Geruch und Geschmack, unlöslich in Wasser und in Glycerin, schwer löslich in Alkohol, leichtlöslich in Aether und in Chloroform, auch in fetten Oelen und in Vaseline löslich Beim Erhitzen für sich oder mit concentrirter Schwefelsäure wird es unter Entwicklung violetter Joddämpfe zerstört Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es ein Dithymol, in welchem die Wasserstoff Atome der Hydroxyl-Gruppen durch Jod ersetzt sind Der Jodgehalt beträgt 46,1 Proc.

Prüfung. 1) Es färbt beim Aufstreuen auf feuchtes rothes Lackmuspapier dieses nicht blau (freies Alkali) 2) 0,5 g verbrennen im Porcellantiegel ohne einen Rückstand zu hinterlassen 3) Werden 0,5 g mit 10 ccm Wasser kurze Zeit durchgeschüttelt, so darf das Filtrat nach Zusatz von Salpetersäure durch Silbernitrat nur opalisirend getrübt werden (Lösliche Jodide, z. B. KJ, auch Jodwasserstoff)

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt, an einem kühlen Orte

Anwendung. Es besitzt zwar in Pulver- oder Salbenform keine antibakteriellen Eigenschaften, indessen befördert es Granulation und Vernerbung Bei gewissen Hautkrankheiten Psoriasis, Lupus, syphilitischen Processen, gilt es als Specificum Man benutzt es als Ersatz des Jodoforms in Pulverform, ferner in Form von Salben, auch in Aether und Collodium gelöst Diese Lösungen sind ohne Erwärmung zu bereiten

Sozoborol (Sozoboral). Mischung von Aristol, Sozodol- und Borsäure Salzen, Schnupfenmittel

II. † Europhenum Europhen. Isobutylorthokresoljodid. $C_{11}H_{13}O_2J$. Mol. Gew. = 452 Wird in gleicher Weise wie das Aristol durch Einwirkung einer Lösung von Jod-Jodkalium auf eine alkalische Lösung von Isobutylorthokresol dargestellt Konstitutionsformel $C_6H_5(OCH_3)C_6H_4 - C_6H_4 - C_4H_9(CH_3)OJ$

Ein feines gelbes, in Wasser unlösliches Pulver, löslich in Alkohol, Aether, Chloroform und fetten Oelen Im trockenen Zustande beständig, mit Wasser befeuchtet spaltet es Jod ab unter Bildung einer löslichen organischen Jodverbindung Auch durch Aetzalkalien und Alkalikarbonate wird Jod abgespalten Der Jodgehalt beträgt 23,1 Proc

Europhen-Mull 1 m Verband-Mull wird mit einer Lösung von 3–8 g Europhen in 80 g Spiritus und 100 g Glycerin imprägnirt

Prüfung. Wie unter Aristol, nur fällt die Prüfung sub 3 weg, wegen der leichten Abspaltbarkeit des Jods

Aufbewahrung Vorsichtig und vor Licht geschützt

Anwendung. Es besitzt wegen der leichten Abspaltbarkeit von Jod antibakterielle Eigenschaften und wird als Jodoform Ersatz empfohlen Zusatz von Stärke-Pulver (Amylum) zu Streupulvern ist wegen der Jodabspaltung zu vermeiden

† Carvacrolum Jodatium Carvacroljodid. Jodocrol. $C_{10}H_{11}OJ$. Mol. Gew. = 312. Wird wie das Aristol durch Einwirkung einer Lösung von Jodjodkalium auf eine alkalische Lösung von Carvacrol erhalten

Gelbbraunes Pulver, unlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol, leichtlöslich in Aether, Ligroin, Chloroform und Olivenöl. Erweicht bei 50° C und schmilzt gegen 90° C zu einer braunlichen Flüssigkeit Bei höherem Erhitzen erfolgt Zersetzung unter Abspaltung von Jod Es ist ziemlich lichtbeständig und wird von schwefliger Säure nicht verändert

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt. Anwendung Als Ersatz des Jodoforms

Arnica

Gattung der Compositae—Tubuliflorae—Senecioneae.

Arnica montana L. (Wolverel. Wolfsblume Johannisblume. Fallkraut, Verfangkraut St. Lucienkraut.) Heuschreck in einem grossen Theile Europas auf Bergwiesen Die Pflanze ist ein ausdauerndes Kraut mit schiefem Rhizom, von dessen Unterseite zahlreiche Wurzeln abgehen Stengel bis 60 cm hoch, drusig behaart Meist 4 grundständige Blätter und am Stengel zwei Paare schmalere Blätter, dieselben sind länglich, verkehrt-eiförmig, sitzend, ganzrandig, ziemlich steif, oberseits kurzhaarig, unterseits kahl Blüthenstand aufrecht oder etwas nickend Der glockenförmige Hüllkelch ist zweizeilig mit 20–24 lineallanzettlichen, zugespitzten, krautigen Blättchen, die äusseren aussen drusig,

kurzhaarig, purpurn berandet mit brauner Spitze Blütenboden hochgewölbt, grubig und behaart Das Körbchen enthält ungefähr 20 randständige, zehnnervige Zungenblüthen und zahlreiche, kürzere Scheibenblüthen, beide mit Pappus (Fig 105) Verwendung finden

1 Die Blüthen Flores Arnicae (Germ Helv Austr U-St) Flores Alismae sen Plantaginis montanae. Arnikablüthen Bergwurzelblumen. Gensblumen. Blutblumen. Fleurs d'arnica. Capitule d'arnica (Gall) Arnica flowers Mountain Tobacco.




Fig 105 Blüthe von Arnica montana
a Scheibenblüthe b Staubblüthe

Die Blüthen sind von goldgelber Farbe und eigenthümlich aromatischem Geruch und Geschmack Die Zungenblüthen sind 7—10nervig, vorn 3zählig, 4—6 mm breit, 3,5—5,0 cm lang, Fruchtknoten 5kantig behaart, Pappus haarförmig, Haar 5—8 mm lang

An der Fruchtknotenwand befinden sich charakteristische Zwillingshaare, die in eine doppelte Spitze auslaufen, ferner in seiner Wand dendritisch verzweigte Sekreträume, die mit einem dunklen Sekret erfüllt sind




Fig 106 Scheibenblüthe, vergrößert.
fr Fruchtknoten
p Pappus + Röhre der Blumenkrone
a Achaenen st Griffel mit Narben

Bestandtheile 0,04—0,07 Proc ätherisches Oel vom spec Gew 0,905—0,91, das Laurinsäure, Palmitinsäure und Paraffin enthält und in der Kälte erstarrt, ferner den als den wirksamen Bestandtheil betrachteten Bitterstoff Arnicin, Gerbstoff, Harz, gelben Farbstoff

Verwechslungen Es kommen als solche öfter gelbblühende Compositen vor Anthemis tinctoria L Strahlblüthen 1,5 cm lang, 2,0 bis 2,5 cm breit, gelb, Receptaculum mit Spreublättern Achaenen ohne Pappus

Calendula officinalis L Strahlblüthen 2,5 cm lang, 3—4 mm breit, 4nervig Achaenen gross, gekrümmt, ohne Pappus

Inula britannica L. Strahlblüthen 4nervig, 2 cm lang, 1,5 mm breit Scheibenblüthen 4—5 mm lang Receptaculum nackt Alle Blüthen mit Pappus 1894 zu 50% unter der Droge beobachtet

Blüthenkörbchen von Cichoriaceen alle Blüthen Zungenblüthen, Pappus gefiedert

Einsammlung und Aufbewahrung. Die im Juni und Juli gesammelten Blüthenkörbchen werden auf Horden schnell und gut getrocknet, von etwaigen Larven der Arnikaflye gereinigt, in Blechkästen aufbewahrt. 5 färsche Blüthen geben etwa 1 Th trockene

Anwendung. Die Wirkung ist ziemlich scharf Auf die Haut wirken sie reizend und Brennen erregend, auf die Magenschleimhaut ebenfalls reizend, bewirken Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerz Auf das Nervensystem ist die Wirkung in kleinen Dosen erlegend, in grossen deprimirend, Harn- und Schweisssekretion soll vermehrt werden Man verwendet sie bei Collaps, Typhus, Epilepsie, Lahmungen, Amaurose, chronischen Rheumatismus Manche der Wirkungen mögen mechanische sein und den Pappushärchen zugeschrieben werden müssen

2 Die Blätter Folia Arnicae, Feuilles d'arnica (Gall)

Beschreibung cf oben Fast ohne Geruch, Geschmack etwas scharf und bitterlich

§ Das Rhizom mit den Wurzeln *Rhizoma Arnicae* (Brit U St) *Radix Arnicae* (Ergh) *Racine d'arnica* (Gall)

Beschreibung Das schief in der Erde liegende Rhizom ist an der Spitze oft mehrköpfig, hier mit Stengel und Blattresten versehen, bis 10 cm lang, 5 mm dick, von der Unterseite gehen zahlreiche, 1 mm dicke, bis 10 cm lange Wurzeln ab. Es ist lötlichbraun, langsförmig, schwachlich eingekelt. Im Querschnitt lassen Rhizom und Wurzel schizogene Sekretgänge erkennen. Geruch schwach aromatisch, Geschmack scharf aromatisch-bitterlich.

Bestandtheile. Wahrscheinlich Arnicin und 0,5–1,0 Proc atherisches Öl vom spec Gew 0,99–1,00. Es dreht schwach links und enthält Isobuttersäurephlorol-ester, Thymohydrochinonmethylether, Phlorolmethylether.

Wirkung und Anwendung der der Blüthen analog, aber schwächer.

Verwechslungen kommen vor mit den unterirdischen Theilen von *Betonica officinalis* L., *Eupatorium cannabinum* L., *Fragaria vesca* L., *Succisa pratensis* L., *Geum urbanum* L., denen aber Sekretgänge fehlen.

Tinctura Arnicae Arnikatinktur, Engelkraut-, Simplex-, Wohlverleai-Tinktur — *Tincture of Arnica* — *Teinture d'arnica* — Austr Arnikawurzel 80 Th, -blüthen 20 Th, verd Weingeist 500 Th 3 Tage zu digeriren. Brit Aus Arnikawurzel 50 g, Weingeist (70%) q s werden durch Verdrängung 1000 ccm Tinktur hergestellt. Germ Arnikablüthen 1 Th, verd Weingeist 10 Th. Helvet Aus der frischen, blühenden Pflanze und Weingeist 55 durch Stägiges Ausziehen. U-St Aus 100 g Wurzel werden mittelst einer Mischung von Weingeist 650 ccm und Wasser 850 ccm durch Verdrängung 1000 ccm Tinktur gewonnen. Aus 200 g Blüthen durch Perkolation mit verd Alkohol 1000 ccm Tinktur. Gall Alcoolature d'arnica Aus 1000 g Blüthen und 1000 g Alkohol (90%) durch 10 tägige Maceration eine Tinktur.

Teinture d'arnica (Gall) Aus 100 g Blüthen und 500 g Alkohol (60%) ebenso. **Extractum Arnicae radialis.** U-St 1000 g Wurzel werden mit verd Alkohol perkolt und aus dem Perkolat ein Extrakt von Pillenkonsistenz hergestellt.

Extractum Arnicae fluidum. U-St Aus 1000 g Wurzel durch Perkolation mit verd Weingeist (Alk 750, Aq 250) 1000 ccm Extrakt.

Emplastrum Arnicae: Arnica Plaster. U-St Heftpflaster 67 Th, Arnica-extrakt 33 Th.

Emplastrum Arnicae. (Diet) Bleipflaster 90 g, Gummipflaster 10 g, atherisches Arnikaöl 1 Tropfen, Arnikatinktur 5 g.

Emplastrum Arnicae molle (Diet) Bleipflaster 60 g, Gummipflaster 10 g, Kamillenöl 90 g, atherisches Arnikaöl 1 Tropfen. In Blechdosen abzugeben.

Emplastrum Anglicum arnicatum, Arnikaklebstaffet, wird wie gewöhnlicher Klebstaffet hergestellt, nur setzt man den letzten Theilen Hausenblasenlösung vor dem Aufstrich Arnikatinktur zu.

Tisane de fleurs d'arnica. (Gall) Aus 4 g Flores Arnicae durch Infusion mit 1000 g Wasser zu bereiten.

Collemplastrum Arnicae (Diet) Kautschukpflasterkörper (siehe unter Kautschuk) 800 g wird nach und nach einer mit Harzöl 20 g, Aether 800 g angefeuchteten, gleichmassigen Pulvermischung aus Arnikablüthen 90 g, Sanderak 20 g, Salicylsäure 6 g zugerührt, die strichfertige Masse streicht man ohne Erwärmen messerrückendick auf unappretiertes Gewebe.

Colloidium Arnicae Arnika-Kolloidium (Diet) Aetherische Arnikatinktur 30 Th, Kolloidium 70 Th.

Gelatina Arnicae. Arnika-Gallerte, Arnika-Jelly (Diet) Weizenstärke 10 Th, Wasser 20 Th, worin Aetzalkali 0,2 Th gelöst, Glycerin 100 Th erhitzt man zusammen bis zur Verkleisterung, fugt Arnikatinktur 15 Th hinzu und füllt sogleich in Zinntuben.

Glycerinum Arnicae. Arnika-Glycerin. (Diet) Arnikatinktur 50 Th, Glycerin 90 Th dampft man im Wasserbade auf 100 Th ein.

Gossypium arnicatum (20 proc) Arnika-Watte (Diet) Arnikatinktur 300 g, Glycerin 200 g, verd Weingeist 2500 g, man tränkt damit 1000 g Watte, presst bis zum Gewicht von 3000 g aus und trocknet. In Flaschen abzugeben.

Oleum Arnicae infusum (Diet) Arnikaöl Aus Arnikablüthen 100 Th, Kurkumapulver 10 Th, Ammoniakflüssigkeit 1 Th, Weingeist 100 Th, Olivenöl 1000 Th, wie *Oleum Hyoscyami* zu bereiten. Wird im Handverkauf als Arnika-Heeröl verlangt.

Sapo arnicatus (Diet) Ist Molln mit 10 Proc Arnikatinktur.

Saponimentum Arnicae. Arnika-Opodeldok Man ersetzt bei Bereitung des gewöhnlichen Opodeldok etwa $\frac{1}{4}$ des Weingeists durch Arnikatinktur und lässt die ätherischen Öle sowie das Ammoniak fort In braunen Glasern abzugeben

Balneum Arnicae. Arnikabad (Diet) Arnikatinktur, Gereinigter Honig je 250 g Für ein Vollbad

Charta adhaesiva arnicata. Arnikapapier (Diet) Charta adhaesiva (s. dort) überpinselt man auf der Glanzseite mit einer Mischung von Arnikatinktur 85 Th, Benzoeinktur 10 Th, weissem Sirup 5 Th

Ajapolka ist die volkstümliche Bezeichnung für Tinct Arnicae cum Aqua

Arnikatinktur, weisse verbesserte von APRIAN BENNEWITZ ist destillierte Tinct Arnicae Conservateur für Haarleidende, von BUEHLIGEN besteht aus Arnika, Glycerin, verd

Weingeist

DRESEL'S Nervenfluid Ein mentholhaltiger Arnika Auszug

Eau de Notre-Dame des Neiges ist Tinct Arnicae a planta recente

EISELS Liniment ist Tinct Arnicae und Liniment ammoniat aa

Glycoarnicum, ZELLER'S. Gegen Krebs und Tuberkulose Ein mit Honig versüsster

Arnika-Auszug

Klemmolin, eine Tinktur aus Arnika, Pappelknospen und Kiefernspitzen

KUATKE'S Heilmittel gegen Nervenleiden u dgl bestehen aus 3 Flaschen verschieden gefärbter Arnikatinktur

Odontodol, amerikan Zahnmittel, enthält Cocain, Kirschchlorbeeröl, Arnikatinktur, Liq Ammon acet

Reisetropfen des Pfarrers KNEIPP Arnika-, Kamillen-, Wermuth-, Tausendgulden Tinktur aa

TANZER'S Mittel gegen Blutandrang ist Weinessig mit Arnika

Tinctura vulneraria Delboux ist ein Auszug aus Arnika, Lavendel, Salbei etc

Veterinärischer Balsam von MIZESEKY enthält Arnikatinktur, Tolubalsam, Elemi und ätherische Öle

WEISSMANN'S Schlagwasser ist Tinctura Arnicae und Tinctura Kino 10 1 Neuauflage auch Arnikatinktur mit Alkanna gefärbt

Oleum Arnicae florum. Arnikablüthenöl. Aus den Arnikablüthen gewinnt man durch Destillation mit Wasserdampf 0,04—0,07 Proc. ätherisches Öl von rötlich brauner Farbe und starkem, charakteristischen Arnikageruch Das Öl ist bei gewöhnlicher Temperatur von butterartiger Konsistenz oder erstarrt wenigstens beim Abkühlen Spec Gew 0,906

Im Arnikablüthenöl sind wahrscheinlich die in den Blüthen von BÖRNER aufgefundenen, mit Wasserdampf etwas flüchtigen Säuren, Laurin- und Palmitinsäure, sowie Paraffine enthalten

Oleum Arnicae rhizomatis. Arnikawurzelöl Das bei der Dampfdestillation der frisch getrockneten Arnikawurzel in einer Ausbeute von 0,5—1 Proc gewonnene Öl ist anfangs hellgelb und wird später dunkler Es hat einen rettighähnlichen Geruch und einen scharfen, aromatischen Geschmack Spec Gewicht 0,990—1,00 Drehungswinkel (100 mm-Rohr) = $-1^{\circ}58'$

Arnikawurzelöl enthält nach SIGEL Isobuttersäurephorylester, Thymohydrochinon-methyläther sowie Phlorolmethyläther In den Destillationswässern sind Spuren von Ameisensäure, ferner Isobuttersäure sowie eine höhere Säure (Baldrian- oder Angelicasäure) aufgefunden worden

Arsenum.

Arsenum Arsenium. Arsen. As = 75. Unter dem Namen „Arsen“ ist wissenschaftlich nichts anderes zu verstehen als das Element Arsen Im gewöhnlichen Sprachgebrauch ist man ziemlich inkonsequent und bezeichnet mit dem vorstehenden Namen auch Verbindungen dieses Elementes

Das Element Arsen ist ein stahlgrauer, glänzender, wenig harter aber spröder Körper, welcher sich an feuchter Luft bald mit einer schwarzlichen Haut überzieht Es kristallisiert hexagonal in spitzen Rhomboedern vom spec Gewicht 5,73 und ist isomorph

mit Antimon und Tellur. Bei Luftabschluss erhitzt, verdampft es ohne zu schmelzen und sublimirt in kleinen glänzenden, rhomboëdrischen Krystallen. Arsendampf hat citronengelbe Farbe und verbreitet ekelhaften Knoblauchgeruch. An der Luft erhitzt, verbrennt es unter Verbreitung von Knoblauchgeruch mit bläulich-weisser Flamme zu Arsenigsäure, welche sublimirt. An feuchter Luft überzieht es sich mit einer schwärzlichen Haut (Arsensuboxyd), welche allmählich in Arsenigsäure übergeht. Es ist unlöslich in Wasser, Weingeist, Aether, Chloroform etc. Von concentrirter Schwefelsäure wird es beim Erhitzen, von mässig konc. Salpetersäure schon in der Kälte gelöst, bez. oxydirt. Es verbindet sich leicht mit Chlor, Brom, Jod, Schwefel und mit nascirendem Wasserstoff.

Ausser dem krystallisirten Arsen kennt man noch zwei allotrope Modifikationen: a) Das amorphe schwarze Arsen, welches sich u. A. beim MARSH'schen Versuch als schwarze, glänzende Masse abscheidet; b) Das amorphe graue Arsen, welches bei dem gleichen Versuche ebenfalls auftritt. Beide amorphen Modifikationen haben das spec. Gewicht 4,71 bei 14° C. und gehen beim stärkeren Erhitzen in die krystallisirte Modifikation über.

I. †† Arsenum metallicum. Cobaltum. Näpfchenkobalt. Scherbenkobalt. Schwarzer Arsenik. Fliegenstein. Hierunter versteht man das im Handel vorkommende rohe metallische Arsen. Dieses ist entweder der natürlich aufgefundene und bergmännisch abgebaute Scherbenkobalt oder das Sublimationsprodukt aus Arsenkies (FeAsS oder Fe_3AsS_2). Wird der Arsenkies, mit Eisen gemischt, der Sublimation unterworfen, so hinterbleibt Schwefeleisen, während das metallische Arsen sich verflüchtigt. Der natürlich vorkommende Scherbenkobalt ist verunreinigt durch Eisen, Nickel, Cobalt, Antimon, Silber, der durch Sublimation bereitete besonders durch Arsensulfid und Arsenigsäure.




Fig. 107.

Stahlgraue, metallglänzende, infolge Oxydation durch die Luft mehr oder weniger mattgraue oder -braune rhomboëdrische Krystalle und Krystallkonglomerate von den oben angegebenen Eigenschaften. Es kommt in der Pharmacie nicht zur Verwendung, wird nur gelegentlich im Handverkaufe als „Fliegenstein“ zur Bereitung von Fliegenwasser gefordert. Die Herstellung des letzteren beruht darauf, dass das metallische Arsen sich in Berührung mit Luft und Feuchtigkeit oberflächlich oxydirt. Es ist daher stets mit einer geringen Menge Arsensuboxyd und Arsenigsäure bedeckt. Man erhält also durch Abkochen des Steines mit Wasser stets eine mehr oder weniger dünne Lösung von Arsenigsäure und kann den Stein immer wieder aufs Neue benutzen.

Aufbewahrung. Mit Rücksicht auf seine leichte Ueberführung in Arsenigsäure in der Reihe der direkten Gifte neben den anderen Arsenikalien.

Abgabe. In Thonkruken verpackt, lediglich gegen Giftschein, versiegelt, mit der Signatur „Gift“, überhaupt unter den nämlichen Bedingungen wie der weisse Arsenik.

II. †† Acidum arsenicosum (Austr. Germ. Helv.). Acidum arseniosum (Brit.). Acidum arsenosum (U-St.). Acide arsénieux (Gall.). Arsenige Säure. Arsenitrioxyd. Weisses Arsenik. Arsenicum album. Arsenious acid. White arsenic. As_2O_3 . Mol. Gew. = 198. (Homöopathisch = Geffum).

Eigenschaften. Da der gepulverte Arsenik bisweilen durch Gips, Schwerspath und ähnliche Zusätze verfälscht ist, so empfiehlt es sich, zum Recepturgebrauche die arsenige Säure in Stücken vorrätig zu halten. Sind die Stücke durchscheinend glasartig, so bestehen sie aus der amorphen, sind sie porcellanartig, so bestehen sie aus der kry-

stallisirten Modification Da die arsenige Säure unmittelbar nach der Bereitung im amorphen Zustande erhalten wird, die amorphe Modification allmählich aber in die krystallinische übergeht, so besteht die „arsenige Säure in Stücken“ zum Theil aus der amorphen, zum Theil aus der krystallinischen Modification Sie bildet specifisch schwere, weisse, auf dem Bruche glasartige, an der Oberfläche porcellanartig undurchsichtige Stücke Das spec Gewicht der amorphen Modification ist 3,738, dasjenige der krystallinischen = 8,699 — Die amorphe Modification schmilzt zunächst und verflüchtigt sich gegen 200° C, die krystallinische Modification dagegen verflüchtigt sich, ohne vorher zu schmelzen Werden die Dämpfe der arsenigen Säure abgekühlt, so verdichten sie sich zu regulären Oktaedern, welche unter dem Mikroskop leicht zu erkennen sind Auf Kohle erhitzt, wird sie zu metallischem Arsen reducirt, welches in Dampfform den charakteristischen, knoblauchartigen Geruch verbreitet

Arsenige Säure in Pulverform benetzt sich mit Wasser schwierig, so dass sie, mit Wasser uborgossen, zunächst auf diesem schwimmt und erst nach der Benetzung zu Boden sinkt Die glasige (amorphe) Arsensäure wird von etwa 30 Th, die porcellanartige (krystallinische) Arsensäure von etwa 80 Th Wasser von mittlerer Temperatur gelöst Dieser Auflösungs Vorgang vollzieht sich indessen ausserordentlich langsam 12 Th siedendes Wasser lösen etwa 1 Th Arsensäure In Weingeist ist sie nur wenig, in absolutem Aether und Chloroform kaum löslich Grössere Mengen werden von Glycerin gelöst Leicht löslich ist sie ferner in Salzsäure, ferner in den Lösungen der ätzenden und kohlensäuren Alkalien, mit denen sie die Salze der arsenigen bez metaarsenigen Säure (Arsenite und Meta Arsenite) bildet

Erkennung Liegt Arsensäureanhydrid in Substanz vor, so charakterisirt sie sich auch in kleinen Mengen durch ihr hohes spec Gewicht Die Arsenpartikel liegen daher stets am Grunde von Flüssigkeiten Werden solche Partikelchen isolirt, abgewaschen und getrocknet, so kann man mit ihnen folgende Proben anstellen

1) Man erhitzt es im offenen Röhrchen, bis es sublimirt ist Das Mikroskop zeigt bei 50–100facher Vergrösserung die oben abgebildeten Oktaeder 2) Erhitzt man ein



Fig 108.

Körnchen vor dem Löthrohr auf Kohle, so verbreitet es charakteristischen Geruch nach Knoblauch 3) Man bringt ein Körnchen in das geschlossene Ende *a* eines Rohres aus schwer schmelzbarem Glase (Fig 108) und schiebt darüber einen Splitter frisch ausgeglühter Holzkohle *b* Man erhitzt nun, indem man das Glühröhr horizontal hält, mittelst einer kleinen (!) Flamme zunächst nur den Kohlesplitter Wenn dieser glüht, so hält man das Röhrchen schräg in die Flamme, so dass der Kohlesplitter weiter glüht, gleichzeitig aber das Körnchen *a* zum Sublimiren gebracht wird Die über die glühende Kohle streichenden Dämpfe der Arsensäure werden zu metallischem Arsen reducirt, welches sich als glänzender, braunschwarzer Spiegel bei *c* ablagert Schneidet man das geschlossene Ende des Rohres ab und erhitzt den Spiegel, so verbreitet er Knoblauchgeruch und geht in Arsensäure über, welche als schwerer weisser Dampf entweicht und an den kalten Stellen des Rohres sich in Form von Oktaedern verdichtet 4) Erhitzt man ein Körnchen mit der 3–4fachen Menge trocknen Kalium- oder Natriumacetates im einseitig geschlossenen Glasrohr, so tritt der widerliche Geruch nach „Kakodyloxyd“ auf 5) Man löst ein Körnchen in warmer Salzsäure auf und fügt gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser hinzu Es entsteht sogleich ein citronengelber Niederschlag

Eine wässrige Lösung der arsenigen Säure zeigt folgendes Verhalten 1) Sättigt man sie mit Schwefelwasserstoff, so nimmt sie nur gelbe Färbung an, erst nach Zusatz von Salzsäure entsteht durch Schwefelwasserstoff ein citronengelber Niederschlag von Arsentrisulfid, unlöslich in Salzsäure, leicht löslich in Ammoniak, Ammoniumkarbonat und Ammoniumsulfid, sowie ätzenden und kohlensäuren Alkalien 2) Silbernitrat erzeugt nur eine weisse Trübung, neutralisirt man die Flüssigkeit vorsichtig mit Ammoniak, so entsteht ein gelber Niederschlag von Silberarsenit AsO_3Ag_3 , welcher in Ammoniak sowohl als auch in Salpetersäure leicht löslich ist 3) Kupfersulfat erzeugt in der neutralisirten Lösung einen gelbbrochgrünen Niederschlag von Cupriarsenit CuHAsO_4 4) Erwärmt man eine mit Salzsäure versetzte Lösung auf einem blanken Kupferbleche, so entsteht auf diesem Arsenkupfer als stahlgrauer Fleck 5) Versetzt man die salzsaure Lösung mit dem 2–3fachen Volumen

Zinnchloridlösung (BESTENDORF's Reagens), so scheidet sich allmählich metallisches Arsen als braunschwarzer Niederschlag aus 6) Durch nascenten Wasserstoff aus saurer Quelle (Zink + Salzsäure oder Schwefelsäure) wird Arsenigsäure leicht zu Arsenwasserstoff reduziert und im MAZSI'schen Apparat nachgewiesen 7) Kalkwasser scheidet weisses Calciumarsenit ab, welches im Ueberschuss von Arsenigsäurelösung, ferner in Ammoniumchlorid und in Mineralsäuren löslich ist 8) Durch Magnesiamixtur wird Arsenigsäure bei hinreichenden Mengen von Ammoniumchlorid nicht gefällt (Unterschied von Arsensäure)

Durch Oxydationsmittel kann die arsenige Säure ziemlich leicht in Arsensäure übergeführt werden Als Oxydationsmittel kommen in Betracht Chlor, Brom, Jod, Salpetersäure, Kaliumpermanganat, Mischungen von Kaliumchlorat + Salzsäure

Prüfung 1) Die für den Recepturgebrauch bestimmte Arsenigsäure stelle weisse Stücke dar, welche frei sind von gelben oder röthlichen Adern bez Stellen (Schwefelarsen) 2) Erhitzt man ein stecknadelkopfgrosses Kornchen in einem trockenen, blanken Probirrohr, so verflüchtigt es sich ohne Rückstand (Baryumsulfat, Calciumsulfat) 3) Man löse 0,5 g Arsenigsäure in 5 ccm Ammoniakflüssigkeit auf Die Lösung muss annähernd klar (blank) sein, ungelöst wurden hinterbleiben Baryumsulfat, Calciumsulfat, Talcum Wird diese Lösung mit Salzsäure übersättigt, so darf kein gelber Niederschlag auftreten (Schwefelarsen)

Gehaltsbestimmung Man bringe 0,5 gepulverte Arsenigsäure sowie 8 g Kaliumbikarbonat in ein 100 ccm Kölbchen, füge 3–5 ccm Wasser hinzu und erhitze bis zur völligen Auflösung Nach dem Erkalten fülle man bis zur Marke mit Wasser auf 10 ccm dieser Lösung werden mit 30 ccm Wasser und etwas Stärkelösung versetzt, darauf mit $\frac{1}{10}$ Normal-Jodlösung titirt Es sollen von letzterer 10 ccm bis zur eintretenden Blaufärbung erforderlich sein Da 1 ccm $\frac{1}{10}$ Jodlösung — welche 0,0127 g Jod enthält — unter diesen Umständen = 0,00495 g Arsenigsäure anzeigt, so ist damit ein Gehalt von mindestens 99 Proc Arsenigsäureanhydrid As_2O_3 verlangt

Aufbewahrung Dieselbe erfolgt unter den direkten Giften in der Abtheilung „Arsenikalien“ Die zur Abgabe des Arseniks bestimmten Geräthe Porcellanmörser, Löffel, Wage etc müssen sämmtlich mit „Arsenicum“ signirt sein

Abgabe. Die Abgabe von Arsenik in Substanz oder in Form von Zubereitungen einschliesslich der Ungeziefermittel und des Fliegenpapieres ist nur gegen Giftschein gestattet. Arsenik in Substanz, welcher von Kammerjägern und Conservatoren (Ausstopfern), auch zu technischen Zwecken verlangt wird, muss in festen Gefässen, welche die Firma des Verkäufers, sowie die Signatur „Gift“ enthalten, und welchen eine Belehrung über die Gefährlichkeit des Inhaltes beigelegt ist, abgegeben werden Die Abgabe an Kinder unter 14 Jahren ist verboten Arsenhaltigen Ungeziefermitteln muss in Wasser leicht löslicher grüner Farbstoff z B Malachitgrün-Sulfosäure beigelegt sein Im übrigen sind im deutschen Reiche die „Bestimmungen vom 24 November 1894 über den Handel mit Giften“ streng zu beachten

†† **Acidum arsenicosum technicum pulveratum** Gepulverter (roher) Arsenik Giftmehl. Ein weisses oder weissliches, specifisch schweres Pulver, im Handel erhältlich Darf zum Recepturgebrauch nicht, wohl aber zu technischen Zwecken, z B zum Vertilgen von Ungeziefer verwendet werden Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Apotheker dasselbe vorrätig halten darf, nur sei es deutlich als „technische“ Sorte signirt Sollte sich eine Gehaltsbestimmung nothwendig machen, so geschehe diese wie bei dem reinem Präparate s S 389 Im übrigen gelten für dieses alle verkehrspolizeilichen Vorschriften, wie sie für den Arsenik überhaupt gegeben sind

Pulverung. Das Pulvern der arsenigen Skure erfolgt durch Reiben im Porcellan-Mörser, bei grösseren Mengen unter Besprengen mit verdünntem Weingeist Man hute sich, den Staub einzuathmen! Der als Thergift zu verwendende Arsenik kann im eisernen Mörser gestossen werden, wobei das Besprengen mit Weingeist nicht unterbleiben sollte Der Arbeiter hat Mund und Nase durch eine Maske zu schützen und sofort nach erfolgter Arbeit sich durch ein Bad zu säubern, auch die Kleider zu wechseln Der Mörser und die übrigen Geräte sind unter sachverständiger Aufsicht zu reinigen Am besten aber bezieht man das fertige Pulver und untersucht dieses

Arsenik als Ungeziefer-Mittel. Zum Vertilgen von Hausmäusen, Schaben und Ratten mischt man Arsenikpulver mit der 30—50fachen Menge Weizenmehl und etwas Zucker, setzt der Mischung etwa 1 Proc Malachitgrün zu und vertheilt dieses Gift in flachen irdenen Näpfchen an Orten, wo Kinder und Haustiere nicht hingelangen können. Man stellt es am besten über Nacht auf und hält es während des Tages unter Verschluss. Gegen Feldmäuse, auch gegen Hausmause, verwendet man folgende Pillen. In jedes Mäuseloch werden 1—2 Pillen mindestens 10 cm tief eingeschoben, worauf man das Loch mit dem Fusse zutrifft.

Die Verwendung des Arsens als Ungeziefermittel bietet den Nachtheil, dass der Arsenik seine Giftigkeit für eine im Voraus nicht zu bestimmende lange Zeit bewahrt und deshalb gefährlich werden kann, wenn man längst darauf vergessen hat, dass einmal Gift gelegt worden ist. Wenn es daher angängig ist, sollte man an Stelle des Arsens lieber Phosphor anwenden.

Mäusepillen		
I		
Rp	Arsenici pulv	10,0
	Farinae Tritici	20,0
	Sirupi communis	10,0
	Malachitgrün	0,5
	Glycerini q s	
Siant pilulae 200 Jede Pille enthält 0,05 g Arsenik		

II		
Rp	Arsenici pulv	10,0
	Farinae Tritici	15,0
	Fruct Anisi pulv	7,5
	Sirupi communis	10,0
	Malachitgrün	0,5
	Glycerini q s	
Siant pilulae 200 Jede Pille enthält 0,05 g Arsenik		

Rattengift		
I.		
Rp	Arsenici pulv	5,0
	Micac panis domestici pulv	25,0
	Sirupi communis q s	
	Malachitgrün	0,5
Man bereite eine weiche Paste, streiche diese auf Brotscheibchen oder auf Holz und lege diese in die Gänge der Ratten		

II		
Rp	Arsenici pulv	5,0
	Malachitgrün	0,5
	Farinae Tritici	50,0
	Adipis suilli assati	50,0
	Olei Anisi	gtt 1.

Wie I zu gebrauchen

Pâte arsenicale pour la destruction des animaux nuisibles (Gall)

Rp	Farinae Tritici	
	Adipis	aa 1000,0
	Acidi arsenicosi	100,0
	Fuliginis	10,0
	Olei Anisi	1,0

Fructus Frumenti venenatus Giftkorn Giftweizen etc. Getreidefrüchte, wie Gersten-, Roggen-, Weizen-, Haferkörner, 1000 Th, übergiesst man in einem kupfernen Kessel mit einer lauwarmen Lösung von 20 Th Arsenigsäure und 20 Th Pottasche in 338 Th Wasser. Diese Lösung wird in derselben Weise, wie die Solutio Fowleri (S 394) dargestellt. An einem lauwarmen Orte unter bisweiligem Umrühren lässt man die Aufsaugung der Giftlösung durch die Getreidefrucht vor sich gehen. Nach Verlauf von 30—40 Stunden breitet man die Getreidefrucht auf einem leinenen Tuche aus und lässt sie in der Sonne oder an einem lauwarmen, abgeschlossenen Orte trocknen werden, worauf sie mit einer alkoholischen Malachitgrün-Lösung zu färben ist.

Behufs Anwendung des Giftkornes gegen Feldmäuse werden zunächst auf einer Feldmark alle Mäuselöcher zugetreten und den darauffolgenden Tag in jedes neu entstandene Mäuseloch mittelst eines Löffels mit ca 20 cm langem Stiele soviel, wie ein gehäufte Theelöffel beträgt, möglichst tief eingetragen und das Loch dann durch Zutreten oder Verschütten mit Erde geschlossen. Nach 5—8 Tagen wird dieselbe Procedur bei allen sich wieder eingefundenen Mäuselöchern vorgenommen.

In manchen Gegenden gebrauchen die Landleute zur Tilgung der Läuse auf Hausthieren (Rindern, Pferden, Ziegen) eine verdünnte Arseniklösung, deren Anwendung jedoch von einigen Regierungen untersagt ist.

Lotio contra pediculos		
Läusewasser		
Rp	Arsenici albi	1,0
	Natrii carbonici crystallati	5,0
	Aquae destillatae	3,0
Solve, solutioni adde		
	Aquae communis	1500,0
	Infusi Quassiae ligni	500,0
	Acidi carbonici	gtt 30

S Läusewasser Gift. +++

Lotio contra pediculos X plex		
10faches Läusewasser		
Rp	Arsenici albi	10,0
	Natrii carbonici	50,0
	Aquae destillatae	50,0

Solve, solutioni adde	
Infusi Quassiae concentratissimi	1550,0
Acidi carbonici	12,5
Spiritus Yvni	50,0

S Gift +++ Zum Gebrauche mit der 9—10fachen Menge Wasser zu verdünnen

Anwendung Die Anwendung des Arsens als Arzneimittel ist gegenwärtig nur noch eine seltene. Bei innerer Medikation wird meist die Fowler'sche Lösung verordnet.

Aeusserlich dient Arsenik als Aetzmittel bei Krebs, Lupus, phagedänischen Geschwüren und wird mit Morphium und Kreosot kombiniert zur Zerstörung der Zahnpulpa (Nervtöden) angewendet. Infolge von Resorption können auch bei ausserlicher Anwendung Intoxikationen eintreten. Innerlich giebt man Arsenik zur Belebung des Stoffwechsels bei verschiedenen Hautkrankheiten, namentlich Psoriasis, ferner gegen schwere intermittierende Fieber, gegen welche Chinin erfolglos war. Die grösste Einzelgabe ist = 0,005 g, die grösste Tagesgabe ist 0,02 g. Darüber hinausgehende Gaben werden zwar als „periculosa“ angesehen, doch können nach eingetretener Gewöhnung unter Umständen noch sehr viel höhere Gaben ohne Schaden vertragen werden.

Bei Thieren wird noch viel Arsenik angewendet. Ausserlich in Form von Salben gegen sehr verschiedene Schäden, in Abkochungen zum Vertreiben des Ungeziefers bei den Hausthieren, doch ist diese Anwendung recht gefährlich und von einigen Regierungen untersagt. Innerlich giebt man es namentlich Pferden (zu 0,1–0,2 g täglich), welche dadurch wohlausehend und glattfellig werden. — Die Verwendung als Gift gegen Ratten und Mäuse hat seit Einführung des Phosphors zu gleichem Zwecke wesentlich abgenommen.

Technisch findet der Arsenik Verwendung zur Fabrikation der Arsensäure, des Schweinfurtergrüns, in der Glasfabrikation zur Entfärbung der Glasflüsse, hier und da noch zum Ausstopfen von Thierhäuten, in der Hutmacherei beim Schwarzfärben der Hute. Eine Lösung von Arsenik in Glycerin dient als Mordant (Beize) in der Kattundruckerei, eine Lösung in Salzsäure zum Graubeizen von Messing (bei Mikroskopen etc.).

Als Gegengift bei Arsenvergiftungen wirkt, solange das Gift noch nicht resorbiert ist, frisch gefälltes Eisenhydroxyd, wie es in dem Antidotum Arsenici (Fuchsi) enthalten ist, am sichersten. Früher benutzte man das Ferrum hydricum in Aqua, ferner Kalkwasser und gebrannte Magnesia. Alle diese Basen wirken dadurch antidotisch, dass sie mit arseniger Säure unlösliche Salze (Arsenite) bilden, welche später durch die Magenspumpe, oder Brech- oder Abfuhrmittel aus dem Organismus entfernt werden.

Antidotum Arsenici (Fuchsi) Als Antidot gegen arsenige Säure werden von den einzelnen Pharmakopöen verschiedene Mischungen vorgeschrieben.

Antidotum Arsenici albi (Austr.) Magnesium hydroxydatum in aqua Magnesiumoxyd 75,0, heisses Wasser 500,0. Im Bedarfsfalle durch Schütteln in verschlossener Flasche herzustellen. Darf mit Essigsäure nicht aufbrausen.

Antidotum Arsenici. A. Helv. Liquoris Ferri sulfurici oxydata (1,48 spec. Gew.) 16,0, Aquae 45, wird unter Ausschuss von Wärme gemischt mit einer Anreibung von Magnesiae ustae 3,0, Aquae 36,0. Auf Verordnung jedesmal frisch zu bereiten. **B. Ergänzt.** Liquoris Ferri sulfurici oxydata (Spec. Gew. = 1,43) 100,0, Aquae 250,0, wird unter Ausschuss von Erwärmung gemischt mit einer Anreibung von Magnesiae ustae 15,0, Aquae 200,0. Auf Verordnung jedesmal frisch zu bereiten.

Arsenic Antidote (U-St.) Ferri oxydum hydratum cum Magnesia (U-St.) Liquoris Ferri sulfurici oxydata (spec. Gew. 1,32) 50 ccm, Aquae 100,0. Ferner Magnesiae ustae 10,0 g angerieben mit Aquae 500,0. Beide Flüssigkeiten sind in gut verschlossenen Gefässen vorrätig zu halten. Im Bedarfsfalle sind beide zu mischen und gut durchzuschütteln.

Aqua Tofana, das Giftpräparat der berühmten Gräfin TOFA in Neapel soll eine Arsenklösung gewesen sein. Nach anderen eine Bleizuckerlösung oder ein Cantharidenpräparat. Noch andere glauben, dass es ein bei Gegenwart von Arsenik entstandenes Produkt der Fleischfäulnis gewesen ist.

FRANCESCO's Tonicum. Nach einem complicirten Verfahren (Pharm. Ztg. 1895 458) dargestellt, enthält in 100 ccm = Ferri citrico ammoniati 18,0 g, Mangani citrico ammoniati 1,4 g, Acidi arsenicosi 0,4 g, Strychnini puri 0,14 g, Brucini 0,06 g.

RATHJEN's Anstrichfarbe für Schiffsböden. Zinnober 15,0, Zinkkarbonat 10,0 g, Harz 20,0, Kreide 15,0, Arsenik 10,0, Trockenfirnis 10,0, Petroleum 8,0, Bleiacetat 2,0, Menge 10,0.

Arsenikseife zum Ausstopfen der Thiere. I. Arsenik 320,0, Kaliumkarbonat (gegluht) 120,0, Wasser 320,0 werden bis zur Auflösung erhitzt. Dann fügt man Marseiller Seife kleingeschnitten 320,0 hinzu und nachdem diese aufgelöst, setzt man hinzu gepulverten Aetzkalk 40,0, Kampferpulver 10,0 g. Dient zum Bereiben der Innenseite der Thierhäute, auch als Zusatz zur Ausstopfmasse.

II. Natriumarsenit 100,0, Wasser, heisses 825,0, Seifenpulver 85,0, Weisses Bolus 465 g, doppelter Kampherspiritus 45,0 g. Bereitung wie vorher.

Pasten zum Todten des Zahn-Nerven. I. *Acidi arsenicosi, Cocaini hydrochlorici* aa 1,0, *Mentholi* 0,25, *Glycerini* q s
 II **Abbotts Pasta** *Acidi arsenicosi, Morphi acetici* aa, *Kreosoti* q s
Antichloros. Pillen gegen Chlorose *Ferri sulfurici, Kali carbonici, Chinini sulfu-
 ric, Seminis Strychni* aa 5,0 g, *Acidi arsenicosi* 0,2 g, fiant pilulae 100

Candela antiasthmaticae SARRADIN
Cônes antiasthmatiques

Rp *Acidi arsenicosi* aa 2,0
Opi aa 2,0
Fructus Phellandrii 4,0
Herbae Belladonnae
Herbae Hyoscyami
Herbae Stramonii
Benzoë aa 20,
Kali nitrici 40,0
Tragacanthae 4,0

Für 20 Kerzen. Ein Kerzchen wird im Zimmer des Asthmakranken angezündet und zum Ver-
 glühen gebracht. Als Ersatz der Arsenik-
 Cigaretten.

Cigarettae arsenicatae BOUDIN
Cigarettes de Dioscoride

Rp *Acidi arsenicosi* 0,1
Natrii nitrici 0,2
Aquae destillatae 15,0

Man trinkt mit der Lösung [200 ccm] Filtrir-
 papier. Nach dem Trocknen schneidet man es
 in 10 Streifen und formt aus diesen 10 Cigaretten,
 von denen jede 0,01 g Arsenigsäure enthält.

Glycerinum Acidi arsenicosi.

Rp *Acidi arsenicosi* 0,5
Glycerini 100,0

Granula Acidi arsenicosi
Granules d'acide arsenieux (Gall.)
Granules de Dioscoride

Rp *Acidi arsenicosi* 0,1
Sacchari Lactis 4,0
Gummi arabici 1,0
Mellis depurati q s

Für 100 Granulae, von denen jedes 0,001 g Arsenig-
 säure enthält.

Guttae antiprosopalgicae ROMBERG

Rp *Liquoris Kali arsenicosi* 5,0
Spiritus diluta
Aquae destillatae aa 7,5
Tincturae Opii simplicis 2,5

Dreimal täglich 12 Tropfen bei Gesichtsschmerz

Guttae antipsoriaticae ROMBERG

Rp *Liquoris Kali arsenicosi* 5,0
Aquae destillatae 10,0

Dreimal täglich 8 Tropfen, allmählich bis auf
 18 Tropfen zu steigen. Bei Schuppenflechte,
 Psoriasis

Injectio Natrii arsenicosi
 (Münch Vorschr)

Rp *Acidi arsenicosi* 1,0 g
Liquoris Natrii caustici (4 Proc) 5 ccm
Aquae q s ad 100,0

In kleine Gläschen abzufüllen und zu sterilisiren.

Liquor antipyrreticus HARRISS
Liquor Natrii arsenicosi HARRISS

Rp *Natrii carbonat. cryst.*
Acidi arsenicosi
Aquae destillatae aa 0,1

Solutio adde

Aquae Cinnamomi 2,0
Aquae destillatae 10,0

Maximaldosis pro dosi 0,60 g = 10 Tropfen, pro
 die — 1,4 g = 25 Tropfen.

Liquor arsenicalis VALANGIN
VALANGIN's solution of solvent mineral

Rp *Acidi arsenicosi* 0,1
Acidi hydrochlorici (25%) 0,1
Aquae destillatae 33,0

Maximaldosis 20 Tropfen

Liquor arsenicalis cum Ferro CASATE

Rp *Ferro-Kalii tartarat*
Liquoris Kali arsenicosi aa 4,0
Aquae 12,0

Vor jeder Hauptmahlzeit 5–10 Tropfen in Wein,
 bei Bleichsucht.

Liquor Arsenici bromati CLEMENS
Liquor Potassii Arseniatis et Bromidi
 (Hamb Vorschr, Nat. form)

Rp *Acidi arsenicosi*
Kali carbonat
Aquae destillatae aa 1,0

Solutio adde
Aquae q s ad 100,0
 2,0

Zweimal täglich 2–5 Tropfen in Zuckerwasser bei
 chronischen Hautkrankheiten, veralteter Syphilis

Liquor Arsenici hydrochloricus (Brit)

Liquor Acidi arsenosi (U-St.)

Rp *Acidi arsenicosi* 1,0
Acidi hydrochlorici (25%) 18,5
Aquae destillatae 20,0

Durch Erhitzen auflösen und zusetzen
Aquae destillatae q s ad 100,0

Pasta caustica DUPUYTREN

DUPUYTREN's Aetzpaste.

Rp *Acidi arsenicosi* 0,5
Hydrarg. chlorati mitis 2,0
Gummi arabici 10,0
Aquae destillatae q s

ut fiat pasta mollis

Pilulae arsenicalis BOUCHARDAT (Gall.)

Pilulae asiaticae fortiores
 (Münch Nosokom)

Rp *Acidi arsenicosi* 0,5
Piperis nigri 5,0
Gummi arabici 1,0

fiant pilulae 100 Jede Pille enthält 0,005 g Ar-
 senigsäure

Pilulae asiaticae (Ergänzb)

Arsenikpillen.

Rp *Acidi arsenicosi* 1,0
Piperis nigri 20,0
Radix Liquiritiae 50,0
Mucilaginis Gummi arabici q s

fiant pilulae 1000 Jede Pille enthält 0,001 g Ar-
 senigsäure

Pilulae Ferri arsenicosi (Form Barol)

Rp *Ferri reduci* 8,0
Acidi arsenicosi 0,08
Piperis nigri
Radix Liquiritiae aa 1,5
Mucilag. Gummi arab q s

fiant pilulae 60 Jede Pille enthält 0,001 g Arsenig-
 säure

Diese Pillen haben wahrscheinlich infolge Bildung
 von Arsenwasserstoff schon wiederholt Intoxi-
 kationen verursacht

Pilulae arsenicales BANTON

Rp Acidi arsenicosi 0,1
Saponis medicati 2,0
Opii pulveris 0,4

fiant pilulae 40 Jede Pille enthält 0,0025 g Arsenigsäure Morgens und abends je 1 Pille bei intermittens

Pilulae arsenicales HENRA

Rp Acidi arsenicosi 0,06
Thyaeanthae 0,5
Mucilag Gummi arabici q s

fiant pilulae 12

Pilulae arsenicales LIEBMT

Rp Chinini sulfurici 2,0
Acidi arsenicosi 0,03
Extracti Valerianae q s

fiant pilulae 30 Jede Pille enthält 0,001 g Arsenigsäure

Pilulae febrifugae GAZEN

Rp Acidi arsenicosi 0,1
Chinini sulfurici 4,0
Conservae Rosae 2,0

fiant pilulae 30 Jede Pille enthält 0,0033 g Arsenigsäure

Pilulae Metallorum (Nat. Form)**PIL. Metallor. ATKENS TOMQ**

Rp Chinini sulfurici 6,0 6,0
Ferri reducti 6,0 4,0
Strychnini puri 0,8 0,12
Acidi arsenicosi 0,8 0,12

Aus jeder dieser Massen sind 100 Pillen zu formen
Pilula Metallorum enthält 0,003 g, ATKENS Forme
per Pille 0,0012 g Arsenigsäure

Pulvis arsenicalis DUBOIS (sen PATRUX)**Pulvis escharoticus mitis**

Rp. Acidi arsenicosi 1,0
Cinnabaris 16,0
Rosinae Draconis 8,0

Vor dem Gebrauch mit Wasser oder Gummischleim zu einem dünnen Brei anrühren, welcher mittels Pinsels auf das Krebsgeschwür gestrichen wird

Poudre escharotique arsenicale (Gall.)**(Formule du frere Côme)**

Rp Acidi arsenicosi 1,0
Cinnabaris 5,0
Carbonis Spongiae 2,0

Mit Wasser anzurühren wie vorher

Pulvis arsenicalis Cosmi (Ergänz.)**Cosmi'sches Pulver**

Rp Cinnabaris 30,0
Carbonis animalis 2,0
Sanguinis Draconis 8,0
Acidi arsenicosi 10,0

Mit Wasser oder Gummischleim anzurühren wie die vorigen

Pulvis arsenicalis BUSSELOT

Rp Acidi arsenicosi 1,0
Cinnabaris
Sanguinis Draconis 23,0

Wie die vorigen anzuwenden

Pulvis causticus ESMARCH

Rp Acidi arsenicosi 1,0
Morphini sulfurici 1,0
Hydrargyri chlorati mitis 8,0
Gummi arabici 48,0

Pulvis febrifugus arsenicalis BOUDIN

Rp Acidi arsenicosi 0,01
Sacchari Lactis 2,0

Divide in partes 30 Jedes Pulver enthält 0,0005 g Arsenigsäure

Solutio arsenicalis BODIN**Soluté d'acide arsénieux (Gall.)**

Rp Acidi arsenicosi 0,1
Aqua destillatae 100,0

Die Dosis ist 10mal grösser wie bei der Solutio Fowleri

Solutio arsenicalis DEVERGHE

Rp Acidi arsenicosi
Kali carbonici 23 0,045
Aqua destillatae 100,0
Spiritus Melissa 3,0
Tincturae Alkaninae q s

Dosis 30—50—80 Tropfen

Solutio arsenicalis ISHARD

Rp. Acidi arsenicosi 0,1
Aqua destillatae 100,0

Spiritus arsenicatus

Rp Spiritus Vini (90%) 1 Liter
Acidi arsenicosi pulv 1,0
Naphthalin 2,5

Dient zum Töden der schädlichen Insekten in Sammlungen von Insekten

Unguentum arsenicale COOPER**COOPER'S Aetzsalbe**

Rp Acidi arsenicosi
Sulfuris depurati 23 1,5
Unguenti cera 25,0

Unguentum arsenicale HELLMUND**Unguentum Cosmi**

Rp Pulvis arsenicalis Cosmi 1,5
Unguenti narcotico-balsamici Hellmunda 12,0

Vet. Balneum zinciae arsenicale**CLEMENT**

Rp Acidi arsenicosi 1000,0
Zinci sulfurici 5000,0

In der 17—20fachen Menge kochendem Wasser gelöst zu Bädern für 100 Schafe (bei Rände der Schafe Ein lauwarmes Bad 5 Minuten)

Vet. Guttas arsenicales pro canibus**a) Deutsche Vorschrift**

Rp Liquoris Fowleri 10,0
Aqua Cinnamon 25,0

Täglich 10—15 Tropfen bei chronischem Ekzem.

b) Englische Vorschrift

Rp Solutio Fowleri 4,0
Syrupi Zingibers 12,0
Aqua 150,0

Dreimal täglich 1 Theelöffel

Vet. Linimentum arsenicale equorum.

Rp Acidi arsenicosi pulv 2,0
Extracti Aloë 10,0
Acidi carbolici 10,0
Spiritus Vini diluti
Aqua communis 23 150,0

Ein Wergbausch wird täglich mit dem Liniment durchfeuchtet und in die Eiterhöhle eingeführt (bei Strahlkrebs)

Vet. Liquor arsenicatus causticus equorum.**Babolner Krebstinctur**

Rp Acidi arsenicosi contusi 0,5
Kali caustici fusi 5,0
Aqua destillatae 5,0

Man kocht bis zur Auflösung und fügt hinzu Aloë pulveratae 7 5

gelöst in

Aqua destillatae
Spiritus Vini diluti 23 50,0

D S Die Geschwürsfläche täglich einmal ru bestreichen (bei Krebs, Hufkrebs, Flegwarzen)

Vet Lotio antipsores TESSIER
Poudre pour le bain de TESSIER (Gall)
Tessier's Waschmittel gegen Räude der Schafe

Rp Acidi arsenicosi 1000,0 (1 kg)
 Ferri sulfuris crudi 10000,0 (10 kg)
 Ferri oxydati fusi 400,0
 Radicis Gentianae 200,0

S Für circa 100 Schafe

Zum Gebrauch wird das Pulver in die zwölffache Menge kochendes Wasser (in einem kupfernen Kessel) eingetragen und 10 Minuten gekocht. Soll die Flüssigkeit als lauwarmes Bad angewendet werden, so ist statt der zwölffachen die 15fache Menge Wasser zu nehmen. Ein Bad soll 5 Minuten dauern. Vergleiche auch *Balneum zincico arsenicale*

Vet Pasta arsenicata
gegen Hautwurm der Pferde

Rp Acidi arsenicosi subtile pulverati
 Farinae secalis 60,0
 Aluminis pulverati 20,0
 Glycerini 10,0
 Aquae q s

M ut fiat pasta

Vet Pilulae arsenicatae equorum

Rp Acidi arsenicosi subtile pulv 2,0
 Rhizomatis Calami 60,0
 Farinae secalinae 20,0
 Glycerini 20,0
 Aquae q s

Piant pilulae 10 Jede Pille enthält 0,25 Acidi arsenicosi

D S Früh und abends je eine Pille (bei denselben Leiden, welche unter *Pulvis arsenicatus* erwähnt sind)

Vet Pulvis arsenicatus equorum

Rp Acidi arsenicosi pulverati 0,2 (dug 8)
 Natrii carbonici dilapsi 3,0
 Seminis Foenu Graeci
 Stibii sulfurati nigri 25,0

Dantur tales doses 10

S Früh und abends je ein Pulver auf das Futter (bei Kurzathmigkeit, Mangel an Fresslust, Magerkeit, Wurm, Flechten etc.)

Vet Pulvis antihelminthicus equorum

Rp Acidi arsenicosi 2,0
 Hydrargyri chlorati mitis 4,0

Doses tales 2 Gegen Bandwurm der Pferde

B

Rp Acidi arsenicosi 2,0
 Aloës 20

Dos tales 2 Gegen Spulwürmer der Pferde (auch in Pillenform zu geben)

Pulvis roborans equorum

A

Rp Acidi arsenicosi 0,2
 Kali bicarbonici 5,0
 Fructum Carvi 10,0

Dos tales 10 Für Pferde mit schlechter Ernährung täglich je 1 Pulver

B Englische Vorschrift

Rp Acidi arsenicosi 0,6
 Cantharidum pulv 0,6
 Ferri sulfuris acid 8,0

Stärkungspulver Einmal täglich mit dem Futter zu geben

†† **Liquor Kali arsenicosi (Germ)** **Kalium arsenicosum solutum (Helv)**

Liquor Potassii arsenitis (U-St) **Solutio arsenicalis Fowleri (Austr)** **Liquor arsenicalis (Brit)** **Soluté d'Arsénite de potasse (Gall)** **Fowler'sche Lösung** Dieses Präparat stellt nach allen genannten Pharmakopoen eins mit Hilfe von Alkali bereitete einprocentige Lösung der arsenigen Säure dar. Alle Pharmakopoen schreiben vor 1 g arsenige Säure und 1 g Kaliumkarbonat (nur U-St schreibt dafür 2 g Kaliumbikarbonat vor) mit Hilfe der erforderlichen Menge Wasser in Lösung zu bringen und die Lösung zum Schluss auf 100 g bez 100 ccm aufzufüllen. Dagegen weichen die einzelnen Pharmakopoen ab in den aromatischen Zusätzen.

	Austr	Brit.	Gall	Germ	Helv	U-St
Acidi arsenicosi	1,0 g	1,0 g	1,0 g	1,0 g	1,0 g	1,0 g
Kali carbonici	1,0 „	1,0 „	1,0 „	1,0 „	1,0 „	—
Kali bicarbonici	—	—	—	—	—	3,0 „
Spiritus Lavandulae	—	—	—	5,0 „	—	—
Tinctura Lavandulae comp	—	3,0 ccm	—	—	—	3,0 ccm
Spiritus	—	—	—	10,0 „	10,0 „	—
Spiritus Melissa comp	—	—	3,0 „	—	5,0 „	—
Spiritus aromatici	5,0 „	—	—	—	—	—
Aquae q s ad	100,0 „	100,0 ccm	100,0 „	100,0 „	100,0 „	100,0 ccm

Die Darstellung erfolgt in der Weise, dass man in einem Probirglase 1 g der gepulverten arsenigen Säure mit 1 g Kaliumkarbonat (oder 2 g Kaliumbikarbonat) sowie 1 g (nicht mehr!) Wasser erhitzt, bis vollständige Auflösung eingetreten ist, die Lösung mit Wasser verdünnt und, abgesehen von den übrigen Zusätzen, mit Wasser auf 100 g bez 100 ccm bringt. Während sich unter diesen Umständen der ganze Auflösungsprozess binnen wenigen Minuten abspielt, kann er sich, wenn man von Anfang an viel Wasser anwendet, stundenlang hinziehen.

Die Gehaltsbestimmung. Weiden 5 ccm der Lösung mit einer kalt bereiteten Lösung von 1 g Natriumbikarbonat in 20 ccm Wasser sowie einigen Tropfen Stärkelösung

vermischt, so müssen 10 cem $\frac{1}{10}$ Normal-Jodlösung entfärbt werden. Auf weiteren Zusatz von 0,1 cem der Jodlösung (= 2 Tropfen) muss Blaufärbung auftreten. Hieraus berechnet sich nach S. 889, dass 100 cem der FOWLER'schen Lösung 0,99—1,00 g arsenige Säure As_2O_3 enthalten sollen. — Man beachte, dass nach längerer Zeit der Aufbewahrung das Kaliumarsenit theilweise in Kaliumarseniat übergeht, und dass alsdann die mitgetheilte maassanalytische Bestimmung zu niedrige Werthe giebt.

Anwendung. Die FOWLER'sche Lösung ist diejenige Form, in welcher die arsenige Säure am häufigsten verwendet wird. Höchste Gaben *pro dosi* 0,5 g, *pro die* 2,0 g (Austri Germ. Helv.)

III †† Acidum arsenicum (Erganzb.) Acide arsénique (Gall.) Arsensäure, krystallisirte. Arsenic acid $AsO_4H_3 + \frac{1}{2}H_2O$ Mol. Gew. = 151.

Mit dem Namen „Arsensäure“ wird sowohl das obige Hydrat als auch das Arsen-pentoxyd As_2O_5 bezeichnet, doch haben das Ergänzb. und die Gall. das Hydrat $AsO_4H_3 + \frac{1}{2}H_2O$ aufgenommen.

Darstellung. Man übergiesst in einer Retorte oder einem langhalsigen Kolben 100 Th. arsenige Säure in erbsengrossen Stücken mit 100 Th. Salpetersäure von 1,38 spec. Gew. und erwärmt langsam, bis Stickstoffoxyde nicht mehr entweichen. Die erhaltene Lösung wird von den unverbrauchten Stücken abgeseigt und zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird in wenig Wasser gelöst und zur Trockne verdampft. Alsdann löst man ihn nochmals in Wasser und prüft die Lösung auf arsenige Säure, indem man sie mit Natronlauge neutralisirt und mit Kaliumdichromat versetzt. Es darf keine Grünfärbung eintreten. Ist arsenige Säure nicht mehr zugegen, so dampft man die Lösung wiederholt mit Wasser ein (zur Verjagung der Salpetersäure) und trocknet sie entweder auf dem Wasserbade ein, oder man bringt sie zur Sirupkonsistenz und lässt sie in der Kälte krystallisiren.

Die konc. sirupdicke Lösung hat das spec. Gew. 2,5, die im Handel vorkommende sirupöse Arsensäure hat das spec. Gew. 2,0.

Eigenschaften. Aus der konc. Lösung scheidet sich die Arsensäure in Form rhombischer Tafeln oder Prismen der Formel $AsO_4H_3 + \frac{1}{2}H_2O$ ab. In der Regel aber kommt sie als weisse krümelige Masse oder als ein weisses grobes Pulver in den Handel, welche Wasser aus der Luft aufnehmen und zu sirupöser Säure zerfließen. Sie schmilzt beim vorsichtigen Erhitzen im Probirrohr bei etwa 100° C. Bei stärkerem Erhitzen (Rothgluth) zerfällt sie in Sauerstoff und arsenige Säure, welche beide flüchtig sind. Bei 110° C. wird sie wasserfrei und hat dann die Zusammensetzung AsO_4H_3 . Leicht löslich in Wasser, Alkohol, auch in Glycerin. Die wässrige Lösung besitzt metallischen Geschmack, sie entfärbt Kaliumpermanganat nicht. Sie wird von Schwefelwasserstoff nicht direct gefällt. Säuert man sie aber mit Salzsäure an und erwärmt sie, so erzeugt Schwefelwasserstoff allmählich einen gelben Niederschlag, welcher je nach den eingehaltenen Bedingungen aus Arsensulfid und Schwefel oder aus Arsenpentasulfid besteht. — Aus der neutralisirten Lösung fällt Silbernitrat rothbraunes Silberarseniat, Ag_3AsO_4 , welches so wohl in Salpetersäure als auch in Ammoniak leicht löslich ist. Auf Kohle erhitzt, verbreitet die Arsensäure Knoblauchgeruch, im MARSH'schen Apparate führt sie ebenso wie Arsensäure zur Bildung von Arsenwasserstoff. Sie ist eine dreibasische Säure, die Salze heissen Arseniate.

Mit Magnesia-Mixtur entsteht ein weisser krystallinischer Niederschlag von Ammonium-Magnesiumarseniat (arsensaure Ammoniak-Magnesia) $AsO_4MgNH_4 + H_2O$. Molybdänsäure erzeugt in Lösungen der Arsensäure einen gelben Niederschlag, welche dem von Phosphorsäure ähnlich ist.

Die Arsensäure selbst wird therapeutisch nicht, dagegen werden einige ihrer Salze therapeutisch benutzt. Die Säure ist giftig und erzeugt, im konc. Zustande auf die Haut gebracht, Brandblasen.

Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschützt, sehr vorsichtig unter den Arsenikalien.

†† **Ammonium arsenicum** *Arsenias ammonicus* Ammonarseniat. Arsen-saures Ammon. $\text{AsO}_4(\text{NH}_4)_3$ Mol Gew. = 198 Man stellt dieses Salz dadurch her, dass man konc. Arsensäurelösung mit doppeltem Salmiakgeist übersättigt, mit einem gleichen Volum Weingeist vermischt und das abgeschiedene Salz mehrere Tage hindurch an der Luft ohne Warmanwendung trocken werden lässt. Es bildet ein weisses, in Wasser leicht lösliches Salzpulver, welches in einem gut verschlossenen Glasgefasse in der Reihe der direkten Gifte aufzubewahren ist. Maximaldosis 0,008, maximale Gesamtdosis auf den Tag 0,02 g. Man hat es bei verschiedenen Hautleiden empfohlen. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

Liquor arsenicallis BRETT

Rp. Ammonii arsenici 0,2
Aquae destillatae 100,0

Täglich 2–3 mal 10–15 Tropfen.

Solutio arsenicallis BAZIN

Rp. Ammonii arsenici 0,05
Aquae destillatae 800,0

Morgens und Abends einen Esslöffel, bis zu 4 Esslöffel steigend. Bei Ekzema herpeticum.

†† **Chinum arsenicum** *Arsensaures Chinin*. Arseniate de Quinine $2[\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_6] \cdot \text{H}_3\text{AsO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew. = 934. Zur Darstellung lost man einerseits 8 Th Chininchlorhydrat in 200 Th Wasser, andererseits 3,1 Th Natriumarseniat ($\text{AsO}_4\text{Na}_2\text{H} + 7\text{H}_2\text{O}$) in 100 Th Wasser und vermischt beide Lösungen. Der entstandene Niederschlag wird abgesaugt und aus siedendem Wasser umkrystallisiert. — Farblose, an warmer Luft verwitternde Prismen, in kaltem Wasser schwer, leicht in heissem Wasser löslich. Die wässrige Lösung giebt mit Silbernitrat rothbraunen, nach dem Versetzen mit Salzsäure und Erwärmen auf 80° C mit Schwefelwasserstoff einen gelben Niederschlag. In der Lösung des Salzes in Chlorwasser erzeugt Ammoniakflussigkeit Grünfärbung (Thaliochin-Reaktion). Das Salz enthält 12,8 Proc. Arsensäure Anhydrid As_2O_5 . Höchstgaben pro dosi 0,02 g, pro die 0,05 g. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

†† **Kalium arsenicum** *Arsenias kalicus*. Kaliumarseniat. Sal arsenicale MACQUER. AsH_2KO_4 . Mol Gew. = 180. Es enthält 63,6 Proc. Arsensäure As_2O_5 , welche 55,5 Arsenigsäure As_2O_3 entsprechen.

Bereitung. Gleiche Theile hochstfein gepulverte Arsenigsäure und trockner gepulverter Kalisalpeter werden in einem Hessischen Tiegel so lange erhitzt, als Dämpfe daraus hervortreten (eine dunkle Rothgluth ist nicht zu überschreiten). Die erkaltete Schmelze wird in kochendem Wasser gelöst, die Lösung, wenn sie nicht sauer reagiren sollte, mit Essigsäure sauer gemacht und dann zur Krystallisation gebracht, die letzte Mutterlauge aber verworfen.

Eigenschaften. Ein farbloses, in vierseitigen Prismen krystallisirendes, an der Luft beständiges, in Wasser leicht lösliches Salz, dessen Lösung Lackmus rothet. Es ist sehr giftig und mit denselben Cautionen zu bewahren wie die Arsenigsäure.

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften. Man giebt es in Einzelgaben von 0,008–0,005–0,006. Höchstgaben pro dosi 0,007 g, pro die 0,02 g.

†† **Fliegenpapier.** Löschpapier, welches roth gefärbt und mit entsprechendem Aufdruck versehen ist, wird mit folgender Lösung getränkt. Kali arsenici 2,5 g, Sacchar 10,0, Aquae 100,0, Ananassather gtt 5.

Man beachte, dass dieses Papier nur gegen Giftschein abgegeben werden darf.

Kuhkoth-Salz. Als Ersatz der Kuhkoth-Bäder zum Befestigen von Bozen auf Geweben in der Färberei dient das oben beschriebene Kaliumarseniat.

†† **Natrum arsenicum** (Haly) Natriumarseniat. Arseniate de soude (Gall.) Sodii Arsenas (Brit.) $\text{AsHNa}_2\text{O}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew. = 312. Es enthält 38,85 Proc. Arsensäure As_2O_5 .

Bereitung. Trocknes gepulvertes Natriumnitrat 100,0 und fein gepulverte Arsenigsäure 118,0 werden gut gemischt in einem Hessischen Tiegel so lange erhitzt, als Dämpfe daraus hervorgehen, eine dunkle Rothgluth ist jedoch nicht zu überschreiten. Die erkaltete Schmelze wird in ihrer 8fachen Menge heissem destillirten Wasser gelöst, die Lösung mit einer Lösung von circa 150,0 krystallisirtem Natriumkarbonat bis zur alkalischen Reaktion versetzt und bei 18 bis 25° C zur Krystallisation gebracht, die letzte Mutterlauge aber

verworfen Während der Krystallisation ist darauf zu achten, dass die Flüssigkeit stets alkalisch reagiere Die ohne Anwendung von Wärme getrockneten Krystalle müssen in einem gut verschlossenen Glasgefäss aufbewahrt werden

Eigenschaften Farblose, prismatische Krystalle von schwach alkalischer Reaktion, löslich in 3,6 Th kaltem Wasser, auch in 55 Th Weingeist Das Natriumarseniat ist sehr giftig und wird mit derselben Vorsicht wie die Arsensäure aufbewahrt und behandelt Da das Natriumarseniat je nach der Temperatur während des Krystallisationsaktes verschiedene Mengen Krystallwasser bindet, es ferner leicht verwittert, so ist die Bestimmung seiner Dosis eine etwas unsichere Die Brit hat das wasserfreie Salz angenommen, welches durch Austrocknen der Krystalle bei 150°C erhalten wird

Anwendung. Das Natriumarseniat wird in denselben Krankheitsfällen angewendet wie die Arsensäure Man giebt es zu 0,001—0,002—0,003 g Als Maximaldosis sind 0,005 *pro dosi* und 0,010 *pro die* (Helv) anzunehmen

Cigarettae antiphthisicae Trousseau

Rp Natri arsenici 1,0
Aque destillatæ 50,0
Man trinkt damit Filtrpapier (400 □cm) und fertigt nach dem Trocknen 20 Cigaretten, von denen jede 0,05 g Natriumarseniat enthält Der Patient nimmt täglich 2—3 mal je 4—5 Züge

Liquor arsenicollis ad inhalationes Reyzel

Rp Natri arsenici 0,01
Aque destillatæ 100,0
Bei syphilitischen Affektionen des Kehlkopfs und der Luftwege

Liquor arsenicollis Pearson

Natrium arsenicum solutum (Helv)
Solutio d'arséniate de soude (Gall)
Rp Gall Helv
Natri arsenici 1,0 1,0
Aque destillatæ 800,0 500,0
Dosis maxima *pro dosi* 1,0, *pro die* 4,0

Liquor Natrii arsenicollis (Ergänzb)

Rp Acidu arsenicollis (bei 100°C getrocknet) 1,0
Natrii carbonici cryst. 2,0
Aque q s ad 100,0
Dosis maxima *pro dosi* 0,5, *pro die* 1,0

Liquor Sodii arsenatis (Brit)

Rp Natri arsenicum anhydric 1,0
(vel Natri arsenicollis cryst 1,65)
Aque destillatæ q s ad 100,0

Mixtura arsenicollis Denuox.

Rp Natri arsenici 0,1
Aque destillatæ 300,0
Mittags und Abends $\frac{1}{2}$ Esslöffel als Prophylacticum gegen Furunkeln

Pilulae Natrii arsenicollis Britt, Deyresall.

Rp Extracti Cornu 0,5
Natri arsenici 0,05
Radici Althaeae
Srupi Amantii florum ss q s.
Fiant pilulae 30 Dosis täglich 2—5 Stück

Solutio arsenicollis antiaethmatica Trousseau

Rp Natri arsenici 0,05
Aque destillatæ 100,0
Tinctura Coccolliæ q s
Je vor dem Mittag- und Abendbrot 1 Theelöffel

Syrupus Natrii arsenicollis Bouchoir

Rp Natri arsenici 0,01
Aque destillatæ 1,0
Srupi Sacchari 40,0
Dosis 1—3 Esslöffel täglich

†† **Calcium arsenicum** Kalkarseniat. Arsensaures Calcium $(\text{AsO}_3)_2\text{Ca}$.
Mol Gew. = 398 Wird bei Darstellung einiger künstlichen Mineralwasser gebraucht

Darstellung Trockene Arsensäure wird in der siebenfachen Menge 5procentiger Aetzammonflüssigkeit gelöst, oder eine flüssige Arsensäure mit Aetzammon in starken Ueberschuss versetzt, die Flüssigkeit verdunst und mit einer verdünnten Calciumhydroxidlösung so lange versetzt, als dadurch eine Trübung entsteht Der Niederschlag wird gesammelt, ausgewaschen und im Wasserbade ausgetrocknet Es ist ein zartes weisses Pulver, in Wasser kaum löslich

†† **Ferrum arsenicum** Ferroarseniat Arsensaures Eisenoxydul. Arseniato ferri (Gall) Ferri arsenas (Brit) Die Gall hat die Verbindung $\text{AsO}_3\text{FeH} = 196$, die Brit diejenige $\text{Fe}_2(\text{AsO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew. = 554 aufgenommen

Darstellung A) Gall Man löst einerseits 50 g krystallisiertes Natriumarseniat in 500 cem Wasser, andererseits 10 g krystallisiertes Ferrosulfat in 100 cem Wasser Beide Lösungen werden vermischt, der entstehende Niederschlag wird ausgewaschen, rasch getrocknet und in wohl zu verschliessende Gefässe gebracht

B) Brit Man löst 53,0 g wasserfreies oder 89,0 g kryst Natriumarseniat in 200 cem heissem Wasser, andererseits 41,5 g kryst Ferrosulfat in 140 cem heissem Wasser und mischt beide Flüssigkeiten Dann setzt man eine Lösung von 9 g Natriumbikarbonat in 200 cem Wasser hinzu und rührt gut um Der Niederschlag wird auf einem Leinentuche

gesammelt, ausgewaschen, abgepresst und bei einer 38° C nicht überschreitenden Temperatur getrocknet

Eigenschaften A) Gall Weisses, an der Luft grünlich werdendes, amorphes Pulver, in Wasser unlöslich, in Ammoniak mit grüner Färbung löslich. Löslich auch in Salzsäure, in dieser Lösung entsteht durch Kahlauge ein weisser Niederschlag

B) Brit Grünliches, amorphes Pulver ohne Geschmack, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Salzsäure. Diese Lösung wird durch Ferricyankalium sofort gebläut

Beide Präparate stellen Verbindungen der Arsensäure mit Eisenoxydul und Eisen oxyd dar. Sie werden bei Lupus und Krebs in Gaben von 0,003—0,006—0,01 g täglich dreimal gegeben. Höchste Gaben *pro dosi* 0,025, *pro die* 0,05 g

Pilulae anteczematiosae VALERIUS

Rp Ferri arsenicoidi 1,0 (1)
Extracti Ophi 0,5
Extracti Chinae 10,0

fiant pilulae 200 Jede Pille enthält 0,05 g Eisenarseniat. Mitzwei Pillen pro Tag anzufangen und bis 12 Pillen allmählich zu steigen. (Das Original giebt die doppelte Dosis Eisenarseniat an)

Pilulae Ferri arsenicoidi BERT

Rp Ferri arsenicoidi 0,3
Extracti Lupuli 10,0
Sirupi Aurantii florum
Radici Aithaeae aa q s

fiant pilulae 100 Jede Pille enthält 0,003 g Eisenarseniat. Täglich 1 Pille, bis zu 8 Pillen steigend

Pilulae Ferri arsenicoidi HARDY

Ferri arsenicoidi 1,0
Conservae Rosae q s

fiant pilulae 100

Pilulae Ferri arsenicoidi VIGNARD

Rp Ferri arsenicoidi 0,5
Morphini hydrochlorici 0,04
Extracti Gentianae q s

fiant pilulae 20 Täglich 1—5 Pillen bei Flechten, Hautjucken. (Das Original giebt die doppelte Dosis Eisenarseniat an)

Pilulae arsenicales BAZIN

Rp Ferri arsenicoidi 0,1
Extracti Dulcamarae q s

fiant pilulae 20 Mit 2 Pillen täglich anzufangen und bis zu 30 Pillen täglich zu steigen. Bei herpetischen Ausschlägen

IV †† Arsenium iodatum (Ergänzh) Arsenjodid. Jodure d'arsenic. Arsenii Jodidum (Brit) Arseni Jodidum (U-St) AsJ₃. Mol. Gew. = 456.

Zur Darstellung werden 4,0 metallisches Arsen, so eben zu einem feinen Pulver zerrieben, mit 20,0 Jod unter Reiben innig gemischt, alsdann in ein Glaskolbchen gegeben und bei gelinder Wärme geschmolzen. Nach dem Erkalten übergiesst man die Masse mit ca 60,0 Schwefelkohlenstoff, macerirt 1—2 Tage, filtrirt im bedeckten Trichter durch Glaswolle und überlässt das Filtrat an einem dunklen Orte der freiwilligen Verdunstung.

Glanzende, rothgelbe, krystallinische, neutrale Schuppchen von jodartigem Geruch, in 3,5 Th Wasser oder in 10 Th Weingeist, auch in Aether und Schwefelkohlenstoff löslich. Die wässrige Lösung ist gelb gefärbt, neutral gegen Lackmus, nach längerem Stehen, rascher beim Erhitzen, ist in der wässrigen wie in der alkoholischen Lösung arsenige Säure und Jodwasserstoff enthalten. Es löse sich klar in Schwefelkohlenstoff und hinterlasse beim Glühen keinen Rückstand. Sehr vorsichtig, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, aufzubewahren. Höchstgaben *pro dosi* 0,01 g, *pro die* 0,06 g. Es wird hauptsächlich zur Bereitung der Donovan'schen Lösung verwendet.

Hydrargyrum arseniato-jodatum. Joduretum Arsenii et Hydrargyri. Jodure d'arsenic et de mercure ist ein Gemisch aus gleichen Theilen Arsenium jodatum und Hydrargyrum bijodatum rubrum.

Liquor Arsenii et Hydrargyri Jodidi
(Brit U-St.)

Rp Arsenii jodati 10,0
Hydrargyri bijodati rubri 10,0
Aqua destillatae q s ad 1 l

Durch Anreiben mit Wasser in Lösung zu bringen, zum Schluss zu filtriren.

Pilulae Arsenii jodati GEMMY

Rp Arsenii jodati 0,2
Extracti Conii 2,5

fiant pilulae 35 Dreimal täglich 1 Pille bei Lepra, Psoriasis

Pilulae Arsenii jodati THOMSON

Rp Arsenii jodati 0,5
Extracti Conii 5,0

fiant pilulae 160

Unguentum Arsenii Jodati THOMSON

Rp Arsenii jodati 0,1
Adipia benzoïnati 20,0

Einreibung bei verschiedenen chronischen und syphilitischen Hautausschlägen

Solutio Donovan

Liqueur de Donovan (nach BOUCHARDAT)

Rp Arsenii jodati 0,1
Hydrargyri bijodati rubri 0,2
Kalii jodati 2,0
Aqua destillatae 60,0

Von 5 bis zu 100 Tropfen steigend mit Wasser verdünnt 2—3mal täglich bei chronischen und syphilitischen Hautausschlägen

Solutio Donovan
(von HERBA abgeändert)

Rp	Acidi arsenicosi	1,25
	Hydragryi depurati	8,25
	Jodi	2,5

Mit etwas Spiritus feinreiben, dann schütteln mit

Acidi hydrojodici (10 %)	10,0
Aquae destillatae	570,0

fiat solutio Dosis 4 Tropfen, täglich um 2 Tropfen steigend bis zu 80 Tropfen dann wird in gleichem Masse die Dosis vermindert und auf 4 Tropfen zurückgegangen

Potus Donovan
(nach BOUCHARDAT)

Rp	Solutionis Donovan	5,0
	Aquae destillatae	100,0
	Sirupi Zingiberis	20,0

Täglich drei bis vier Esslöffel

V †† Stibium arsenicicum Arséniate d'antimoine. Antimonarseniat ($4Sb_2O_3 + As_2O_3$), ein weisses, in Wasser und Weingeist unlösliches Pulver

Bereitung 10,0 Brechweinstein werden in 80,0 kochend heissem Wasser gelöst und mit einer Lösung der Arsensäure in destillirtem Wasser allmählich versetzt, solange dadurch ein Niederschlag entsteht. Dann erhitzt man das Ganze bis zum Aufkochen, bringt den Niederschlag auf ein genasstes Filter und wäscht hier solange mit Wasser aus, bis das Abtropfende durch ammoniakalische Magnesiumsalzlösung nicht mehr getrübt wird. Dann wird der Niederschlag in gelinder Wärme getrocknet. Ausbeute ca 7,5 (HAGER). Nach CHAPSAI soll man Antimonchloridlösung mit einer konzentrirten Natriumarsenatlösung fallen etc.

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften

Anwendung Das Antimonarseniat ist bei Neurosen und Hautkrankheiten, besonders aber bei Herzkrankheiten, auch bei Asthma und Lungenemphysem warm empfohlen worden. Dosis 0,001—0,002—0,003 zwei- bis dreimal des Tages. Höchstgaben *pro dosi* = 0,008 g, *pro die* 0,01 g. Bei heftigen Anfällen steigt man selbst bis zu einer Gesamtdosis von 0,02 g. Alkalische Speisen und Getränke müssen während des Gebrauchs gemieden werden.

Granules antimoniaux DE PAPILLAUD sind kandierte 0,1 schwere Pillen oder Granule (1 Flacon mit 100 Granulen kostet 5 Francs), welche nach DOYVAULT Antimonjodur zur Basis haben, aber nach BLASEX aus Antimonarseniat 0,0005, Tragant 0,01 und rothgefärbtem Zucker 0,04 auf eine Granule zusammengesetzt sind.

VI †† Arsenium sulfuratum citrinum Arsenium flavum seu citrinum Auripigmentum. Operment Rauschgelb. Gelbes Schwefelarsen. Arsentrisulfid **Sulfure jaune d'arsenic** (Gall.) **Yellow arsenic.** As_2S_3 Mol. Gew. = 246

Man hat von dieser Verbindung drei verschiedene Sorten zu unterscheiden 1) das natürlich (in Persien und Japan) vorkommende Auripigment, welches frei von arseniger Säure und daher ungiftig ist 2) Das künstlich dargestellte Auripigment des Handels, welches durch Zusammenschmelzen von 6 Th metallischem Arsen mit 4 Th Schwefel oder Sublimation von 4 Th. Arsensäureanhydrid mit 3 Th Schwefel erhalten wird und bisweilen erhebliche Mengen von Arsensäureanhydrid enthält, daher von sehr wechselnder Giftigkeit ist 3) Das medicinale Auripigment, dessen Darstellung hier angegeben ist

Darstellung Man löst 100 Th Arsensäureanhydrid in einer Mischung von 300 Th Salzsäure (1,17 spec Gew) und 900 Th Wasser, sättigt die Lösung mit Schwefelwasserstoff und lässt die Flüssigkeit in verkorkter Flasche einen Tag hindurch stehen. Nach dieser Zeit muss sie noch deutlich nach Schwefelwasserstoff riechen, andernfalls wäre das Einleiten von Schwefelwasserstoff zu wiederholen. Man filtrirt ab, wäscht den Niederschlag mit kaltem Wasser aus, bis das ablaufende Wasser nicht mehr sauer reagirt, sowie beim Verdampfen auf Platinblech keinen Rückstand mehr hinterlässt und trocknet auf porösen Unterlagen bei 60—70° C

Ein zartes, gelbes, amorphes Pulver, unlöslich in Wasser und in Salzsäure, löslich in ätzenden und in kohlensauen Alkalien, auch in Schwefelalkalien. An der Luft erhitzt, verbrennt es zu Schwefeldioxyd und zu Arsensäureanhydrid. Zieht man es mit siedendem Wasser aus, so darf das mit Salzsäure angesäuerte Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser weder gelb gefärbt noch gelb gefällt werden.

†† Auripigmentum technicum Bildet entweder gelbe bezw orange gelbe glänzende, specifisch schwere, feste Stücke mit muschligem Bruch bezw von blättriger Struktur,

spec Gew 3,46, oder ein gelbes, mehr oder weniger mattes Pulver, welches, wie schon bemerkt, oft mehrere Procente Arsensäureanhydrid enthält. Diese Sorte darf nur zu technischen Zwecken verwendet werden.

Aufbewahrung Sehr vorsichtig, in der Reihe der Arsenikalien.

Anwendung. Das reine Schwefelarsen gilt bei innerlicher Darreichung als ungiftig, indessen dürfte diese Angabe einer näheren Prüfung wohl kaum Stand halten, da wohl zu erwarten ist, dass es im alkalischen Darmsaft nicht ganz unlöslich sein wird. Innerlich wird es kaum angewendet, abgesehen davon, dass Arsenikesser es regelmässig zu sich nehmen, die aber alsdann natürlich die Handelsorten wählen. Aeusserlich dient es als Aetzmittel bei Krebs, bei sehr unreinen Schankergeschwüren, bei purulenter Konjunktivitis, endlich als Depilatorium bei Hautkrankheiten.

Rhusia Toxicaria. Man mischt 1 Th Auripigment mit 5 Th gepulvertem Aetzkalk und bewahrt die Mischung in einem gut zu verschliessenden Gefässe auf. Zum Gebrauche rührt man 3 Th dieses Pulvers mit 2 Th heissem Wasser an. Ob die Mischung brauchbar ist, wird wie folgt geprüft. Man bestreicht damit eine Federfahne, nach einer halben Stunde muss sich der Federbart leicht ablösen lassen. Cosmetisches Enthaarungsmittel!

Orientalisches Extract von W. KRAUSS in Köln, **Enthaarungsmittel** 27 Proc Aetzkalk, 18 Proc Schwefelarsen, 60 Proc Weizenstärke 30 g = 1,50 Mk. [Unters. Amt Breslau]

Depilatorium DELCROIX	
Rp Calcariae ustae	30,0
Gummi arabici	30,0
Auripigmenti	4,0

Depilatorium PLECK	
Pasta epilatoria PLECK	
Rp Auripigmenti	5,0
Calcariae ustae	50,0
Amyli Trici	30,0

Die Mischung wird mit Wasser zu einem Brei angerührt und dieser auf die zu enthaarenden Stellen messerrückendick aufgetragen. Sobald die Schicht zu trocknen beginnt, wird sie mit einem glatten Holzspachtel entfernt.

Liquor LANFRANC	
Mixture cathérétique (Gall)	
Collyre de LANFRANC	

Rp 1 Aloës	5,0
2 Myrrhæ	5,0
3 Aeruginis	10,0
4 Auripigmenti	15,0
5 Aquæ Rosæ	380,0
6 Vinî albi	1000,0

Man reibt 1–4 im Mörser fein, reibt sie mit 6 an, fügt 5 hinzu und bewahrt in verschlossener Flasche auf. Vor dem Gebrauch anzuschütteln! Zum Bestreichen des inneren Augenlides bei Ophthalmia purulenta, auch zum Verbinden von Schankern und syphilitischen Geschwüren.

†† **Arsenium sulfuratum rubrum** Arsenicum rubrum. Realgar Sulfure rouge d'arsenic. Red orpiment As_2S_3 . Mol Gew = 214. Sandarach Arsen-Rubin. Kommt natürlich vor und wird künstlich dargestellt durch Zusammenschmelzen von 15 Th metallischen Arsen mit 6,5 Th Schwefel oder durch Sublimation eines Gemisches von 2 Th Arsensäureanhydrid mit 1 Th Schwefel, in den Hütten durch Sublimation von Arsenkies mit Schwefelkies.

Das natürliche rothe Schwefelarsen stellt rubinrothe monokline Prismen vom spec Gew 3,54 dar, das künstlich erzeugte dunkelrothe, an den Kanten durchscheinende glasige Massen. In Wasser unlöslich, löslich in Kaliumsulfid, Natriumsulfid und Ammoniumsulfid. An der Luft erluchtet, verbrennt es zu Schwefeldioxyd und Arsensäureanhydrid. Wird therapeutisch nicht, wohl aber in der Technik verwendet, z. B. als Malerfarbe, in der Farberei zur Reduktion des Indigo, zu Weissfeuer, ferner in der Weissgerberei (sog. „Salbe“ der Gerber) zum Enthaaren der Felle.

Weissfeuer	
Rp Kalu nitrat	50,0
Sulfuris depurati	15,0
Realgar	4,0
(vel Auripigmenti	4,9),

Rhusma der Gerber	
Rp Realgar	1
Calcariae ustae	3

Mit Wasser zu einem Brei zu löschen. Wird in einem Holzfasse angerührt.

Analytisches. Die Schwefelverbindungen des Arsens werden durch nascenten Wasserstoff aus saurer Quelle (Zink + Säure) nicht in Arsenwasserstoff übergeführt. Dagegen gelingt diese Ueberführung durch Wasserstoff aus alkalischer Quelle. Man kann also Arsensulfide in Arsenwasserstoff überführen, wenn man sie in Natrium- oder Kalilauge auflöst und Zink oder Aluminium auf diese Lösung einwirken lässt. Bei Anwendung von Zink ist die Wasserstoffentwicklung eine sehr spärliche. Will man den Arsengehalt der Arsensulfide im gewöhnlichen Marsh'schen Apparate nachweisen, so muss man die Sulfide zuvor oxydiren. S. S. 406.

Das in den Arsensulfiden enthaltene Arsen lässt sich auch leicht im einfachen Glührohr durch Bildung eines Arsenspiegels nachweisen. Zu diesem Zwecke mischt man 1 Th trockenes Arsensulfid mit 1 Th Kaliumcyanid und 3 Th wasserfreiem Natriumkarbonat. Diese Mischung bringt man in den untersten, geschlossenen Theil eines schwer schmelzbaren Glasrohres von der Form, welche Fig. 109 wiedergibt. Man wischt zunächst den nicht gefüllten Theil des Rohres sorgfältig mit Filtrirpapier aus, erhitzt alsdann das Gemisch vorsichtig nur soweit, dass jede Spur von Feuchtigkeit ausgetrieben wird und wischt nun das Rohr mit Filtrirpapier wieder trocken. Hierauf erhitzt man das Gemisch bis zum Schmelzen und erhält es einige Zeit bei Rothgluth. Das vorhandene Schwefelarsen wird nunmehr zu metallischem Arsen reduziert, welches sich als glänzender Spiegel in dem weiteren Theile des Glasrohres absetzt. Dieser Nachweis lässt sich noch empfindlicher machen, wenn man den Reduktionsvorgang nach FRÄSENIUS und BABO in einem langsamen Strome von Kohlensäure vor sich gehen lässt.



Fig. 109

VII †† Acidum kakodylicum Kakodylsäure. Dimethylarsensäure. $\text{As}(\text{CH}_3)_2\text{O}_3\text{H}$. Mol. Gew. = 138.

Erhitzt man trockenes Kaliumacetat mit gleichen Theilen Arsensäureanhydrid, so erhält man ein in Wasser ziemlich unlösliches, bei 170°C siedendes Oel von ausserordentlich widerlichem Geruche (CADET'sche Flüssigkeit), das wenig Kakodyl $\text{As}_2(\text{CH}_3)_4$ und viel Kakodyloxyd $\text{As}_2(\text{CH}_3)_4\text{O}$ enthält. Wird dieses Gemisch mit Quecksilberoxyd behandelt, so werden beide Verbindungen zu Kakodylsäure $\text{As}(\text{CH}_3)_2\text{O}_3\text{H}$ oxydirt.

Geruchlose, schiefrhombische Säulen, in Wasser sehr leicht löslich. Wird durch phosphorige Säure zu Kakodyloxyd reducirt, welches durch den Geruch erkennbar ist. Einbasische Säure. Die Salze sind in Wasser löslich und meist amorph.

†† Natrium kakodylicum. Kakodylsaures Natrium $\text{As}(\text{CH}_3)_2\text{O}_2\text{Na}$ = 160. Amorphes, weisses, in Wasser lösliches Pulver.

Die Kakodylsäure, welche rund 54 Proc. metallisches Arsen enthält, wurde in der letzten Zeit als Aisenpräparat bei hartnäckigen Hautkrankheiten empfohlen, ohne dass die Versuche als abgeschlossen gelten können. Dass sie giftig ist, unterliegt keinem Zweifel, doch ist sie anscheinend weniger giftig als die arsenige Säure und die Arsensäure. DANLOS gab die Säure und ihr Natriumsalz in Tagesgaben von 0,25 g innerlich und von 0,1 g subkutan mit Erfolg bei Psoriasis.

Rp. Acid. kakodylic. 2,5
Oel. Menthae pip. gtt. 2
Sirup. Aurantii corticis
Sirup. Sacchari aa 20,0
Aqua destillatae 60,0
Täglich 4 Kaffeeelöffel = 0,5 g der Kakodylsäure
DANLOS gab bis zu 8 Kaffeeelöffel. Bei Psoriasis

Rp. Natri. kakodylic. 1,0
Aqua destillatae 15,0
Dreimal täglich 15–20 Tropfen

Rp. Natri. kakodylic. 1,0
Aqua destillatae 10,0
Zur subkutanen Injektion $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$ Pravazspritze

Toxicologischer Nachweis, Bestimmung. Arsenik ist wegen seiner vielfachen Anwendung in der Technik, wegen seiner relativen Geschmacklosigkeit, der leichten Anwendbarkeit und der sicheren Wirkung auch heute noch dasjenige Gift, welches am häufigsten zu Giftmorden angewendet wird. Ausserdem ist auf das Vorkommen von Arsen in vielen Gebrauchsgegenständen etc. Rücksicht zu nehmen.

Man unterscheidet eine chronische und eine akute Arsenvergiftung. Die erstere, welche durch länger andauernde Zuführung kleinster Arsenmengen zustande kommt, kann hier übergangen werden. Die akute Vergiftung wird durch Einführung toxischer Dosen veranlasst. Ihre Symptome sind folgende: Schmerzen im Verdauungskanal, Erbrechen, Durchfall blutiger oder reiswasserähnlicher Massen, cyanotische Verfärbung und Gedunsen sein des Gesichtes, Kälte der Haut, Krämpfe in Händen und Waden, beschleunigter Puls, Athemnoth, Albuminurie, Hamaturie, auch Urinverhaltung. Der Tod erfolgt nach einigen Stunden unter Konvulsionen, das Bewusstsein kann in den letzten Stadien aufgehoben, aber auch erhalten sein. Das ganze Bild ähnelt demjenigen der Cholera nostras.

Welche Dosen von Arsenik und Arsenverbindungen für Menschen letal sind, ist schwer zu sagen. Es sind Fälle bekannt, in denen relativ kleine Mengen rasch zum Tode

führen, andere, in denen nach Genuss grosser Mengen (in Breslau ging vor zwei Jahren ein Fall in Genesung über, in welchem ein Mann 250 g Schweinfurtergrün genommen hatte) Wiederherstellung eintrat. Thatsächlich liegen die Verhältnisse so. Wenn ein Mensch eine gewisse Menge eines Arsenpräparates einnimmt, also z. B. 0,09 g weissen Arsenik,¹⁾ so tritt zunächst eine Intoxikation ein. Ob diese in Genesung übergeht oder zum Tode führt, hängt von Umständen (voller Magen, leerer Magen, Resorptionsverhältnisse, individuelle Disposition) ab, welche niemand vorher beurtheilen kann. Es wäre u. B. durch aus falsch, eine Gabe von 0,09 g als nicht tödtlich zu bezeichnen. Diese Erörterung ist wichtig, weil sehr häufig vor Gericht die Frage gestellt wird, ob eine bestimmte Gabe als tödtlich anzusehen ist oder nicht.

Trotzdem ist der Sachverständige natürlich gezwungen, die mittleren tödtlichen Gaben kennen zu lernen. Als solche werden angesehen 0,1 g Arsengsaure Anhydrid, 1,0 g technisches Schwefelarsen, 2,0 g Schweinfurtergrün.

Untersuchung von Leichentheilen. Besteht der Verdacht einer Vergiftung durch Arsenik, so kann unter Umständen schon die äussere Beschichtigung der Organtheile werthvolle Fingerzeige geben. Die Magenschleimhaut ist in der Regel geröthet, die event. dabei befindliche blutige Flüssigkeit ist hellroth gefärbt. Fäulnissgeruch ist in geringerem Masse als bei nicht mit Arsenik vergifteten vorhanden. Man breitet den Magen auf einer sauberen Porcellanschale so aus, dass die Schleimhaut oben liegt und untersucht, ob auf der Schleimhaut etwa weisse Partikel aufsitzen, wobei man namentlich auch die Falten der Schleimhaut zu prüfen hat. Sind solche verdächtige Partikel vorhanden, so werden sie auf einem Uhrglase gesammelt. Ebenso sieht man zu, ob sich etwa aus dem flüssigen Theile speciellich schwere weisse oder gelbliche Körnchen zu Boden gesetzt haben. Solche Partikel wären nach dem Abspülen sogleich durch Erhitzen mit Kohle im Glührohr nach S 388 und durch Auflösen in Salzsäure und Einleiten von Schwefelwasserstoff zu prüfen. Tauschungen können erfolgen durch erstarrte Fettkugeln, durch Grzes und ähnliche Bestandtheile der Nahrung. — Das Blut ist nach Arsenvergiftungen dunkelkirschroth und hält sich über die normale Zeit hinaus ohne erheblichen Fäulnissgeruch.

Hat die Vorhemmung Arsenik in Substanz auffinden lassen, so sucht man diesen mit der Pincette oder durch Sedimentiren zu sammeln. (In einem Falle wurden 25 g Arsenik mit der Pincette aus einem Mageninhalt isolirt.) Man bestimmt alsdann das Gewicht und stellt den Procentgehalt einer Durchschnittsprobe entweder gewichtsanalytisch oder massanalytisch fest. Die von der Hauptmenge des Arseniks befreiten Organtheile — oder, wenn sich Arsenik mechanisch nicht auslesen liess, die ursprünglichen Organtheile — werden nun weiter verarbeitet. Man sucht zunächst eine leicht zu behandelnde Lösung, die sog. „Gifflösung“ herzustellen. Das kann nach verschiedenen Verfahren geschehen, von denen im Folgenden die zuverlässigste Methode angegeben werden soll. Bemerkte soll schon hier werden, dass alle bei den folgenden Operationen zu gebrauchenden Reagentien und Gefässe bez. Apparate absolut frei von Arsen sein müssen, worauf wir noch zurückkommen werden.

Herstellung der Gifflösung. Ist das Untersuchungsobjekt eine dünne Flüssigkeit, so macht man sie, wenn sie sauer reagiren sollte, mit Natriumkarbonat schwach alkalisch und dampft sie auf dem Wasserbade zur Syrupkonsistenz ein. Konsistentere Objekte werden mit einer starken Scheere zerkleinert. Dann bringt man den sirupösen Abdampfrückstand oder die zerkleinerten Massen in Mengen von 150–200 g (falls soviel Material überhaupt vorhanden ist) in einen Kolben von etwa 1 l Fassungsraum, übergiesst sie in diesem mit etwa 8–500 ccm absolut arsenfreier Salzsäure (s S 57) so dass ein dünner Brei entsteht und erwärmt den Kolben auf dem Wasserbade. Wenn der Inhalt lauwarm geworden ist, giebt man von Zeit zu Zeit kleine Mengen chlorsauren Kalks (jedemal etwa 0,5 g) unter Umschütteln dazu. Dies setzt man solange fort, bis die Organtheile bis auf geringe Rückstände in Lösung übergegangen sind. Bei Magen und Darm ist dies in verhältnissmässig kurzer Zeit geschehen, bei Lunge, Leber, Herz dauert es etwas länger, beim Gehirn muss man darauf verzichten, eine vollständige Lösung zu erzielen, weil die Cholesterinfette sehr schwer zu spalten sind. Hier muss man sich damit begnügen, durch die geschilderte Behandlung alles Lösliche in Lösung gebracht zu haben. Wenn also die Organtheile der Hauptsache nach in Lösung gegangen sind, lässt man erkalten, filtrirt alsdann durch ein genüßtes Filter und wäscht mit heissem Wasser nach. Man erhält bei Magen, Darm und Gehirn ein hellgelbes, bei Lunge und Leber, überhaupt blutreichen Organen, ein etwas dunkleres Filtrat, wenn man richtig operirt hatte. (Im Falle man in Schalen arbeitet und zu weit eindampfen lässt, fallen die Filtrate stets sehr dunkel aus.)

¹⁾ Das von mir gewählte Beispiel ist aus dem Leben gegriffen. Es handelte sich darum, ob 0,09 g Arsenik als tödtliche Gabe anzusehen seien. Zwei medicinische Sachverständige verneinten sie, weil in der Literatur die tödtliche Gabe zu 0,1 g angegeben sei, von selbst erklärte die Gabe aus den oben erwähnten Gründen für tödtlich. B. FISCHER.

Dieses Filtrat wird alsdann in einer Schale aus echtem Porcellan auf dem Wasserbade in der Weise erhitzt, dass man von Zeit zu Zeit das verdampfte Wasser wieder ersetzt. Dieses Erhitzen hat nämlich den Zweck, das noch vorhandene Chlor zu beseitigen und einen Theil der im Ueberschuss vorhandenen Salzsäure zu verjagen. Da aber aus einer salzsauren Lösung Arsensäureanhydrid in Form von Arsenchlorid verflüchtigt wird, so ist der gelegentliche Ersatz des verdampften Wassers unabwieslich. Ist alles Chlor mit Sicherheit entfernt und der grössere Theil der Salzsäure verjagt, so lässt man nunmehr die Flüssigkeit erkalten und füllt sie bis zu einem bestimmten Volumen, z. B. 500 ccm, auf.

Von dieser Lösung benutzt man zunächst einen aliquoten Theil, z. B. 50 ccm, um die Anwesenheit oder Abwesenheit von Arsen qualitativ festzustellen. Diese Feststellung wird im MARSH'schen Apparate ausgeführt. Ergibt sich hierbei die Anwesenheit von Arsen, so wird dasselbe später in dem vorhandenen Reste der Gifflösung quantitativ bestimmt.

Der MARSH'sche Apparat. Wenn man die Absicht hat, Arsen im MARSH'schen Apparat nachzuweisen, so soll man darauf verzichten, Kombinationen (sog. kleine MARSH'sche Apparate) zu benutzen, welche als nicht ordnungsmässig bezeichnet werden müssen. Zum Nachweis grosser Arsenmengen bedarf man des MARSH'schen Apparates überhaupt nicht und sobald man in mangelhaften Apparaten arbeitet, können leicht auch nicht ganz kleine Mengen Arsen sich dem Nachweise entziehen. Zur ordnungsmässigen Ausführung des Versuches bedarf man:

1) Arsenfreie Schwefelsäure oder Salzsäure. Ueber die Darstellung der letzteren s. S. 57.

2) Arsenfreies Zink, welches unter der Bezeichnung „Zink, absolut arsenfrei zur forensischen Analyse“ von MERCK, SCHUCHARDT, KAHLBAUM und anderen Firmen jederzeit zu erhalten ist.

3) Schwer schmelzbares Glasrohr von nebenstehendem Kaliber, „Jenenser Glas“ oder „Kavalier-Glas“. Dasselbe muss 6–10 stündiges Erhitzen aushalten, ohne zusammenzufallen und ohne durch das Erhitzen eine dunkle Färbung anzunehmen, was bei vielen Glasarten leider eintritt.

Der Apparat selbst besteht aus dem Zersetzungsgefäss *A*, welches mit einem doppelt durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen ist. Die eine Bohrung enthält das bis zum Boden des Gefässes reichende Trichterrohr, die andere das Gasabzugsrohr, welches an das Chlorcalciumrohr *B* angeschlossen ist. Mit dem letzteren ist wiederum das Glüh-



Fig. 110
Querschnitt
eines Glüh-
rohres zum
MARSH'schen
Apparat.




Fig. 111 Reduktionsrohr zum MARSH'schen Apparat

rohr *C* verbunden, welches die durch beistehende Figur 111 verdeutlichte Form hat. — Das Chlorcalciumrohr ist mit linsengrossen Stücken granulirten oder geschmolzenen Calciumchlorids gefüllt. Man unterlasse es, wie früher vorgeschlagen worden ist, einige Stücke Kalhydrat vorzuschlagen, weil hierdurch geringe Arsenmengen dem Nachweis entgehen können.

Blinder Versuch. Um die Reinheit der Reagentien zu prüfen wird ein blinder Versuch angestellt. Man nimmt soviel Zink, dass dasselbe sowohl für den blinden als auch für den entscheidenden Versuch ausreicht, also z. B. 150 g, bringt dieses in ein Porcellanschälchen und wäscht es nacheinander mit Aether, Alkohol und Wasser ab, dann beizt man es mit etwas concentrirter arsenfreier Salzsäure ab, bringt es in den Zersetzungs Kolben *A* und lässt durch das Trichterrohr zunächst etwas destillirtes Wasser, sowie etwas Salzsäure zufließen. Die Wasserstoffentwicklung¹⁾ beginnt alsbald und man über-

¹⁾ Bei Anwendung von reinem Zink und reiner Salzsäure ist die Wasserstoffentwicklung häufig träge. Dieselbe durch Einflüssenlassen von etwas Platinchlorid zu beschleunigen, empfiehlt sich nicht, weil man alsdann Spuren Arsen übersehen kann. Besser schon ist es, das Zink ausserhalb des Apparates durch Uebergiessen mit verdünnter Platinchloridlösung zu platiniren und nach dem Abwaschen in den Apparat zu bringen. Verfährt man aber, wie es hier angegeben (Entfetten durch Aether und Vorbeizen mit conc. Salzsäure), so ist die Entwicklung für gewöhnlich hinreichend lebhaft.

lässt nun den Apparat etwa $\frac{1}{2}$ Stunde sich selbst, damit alle Luft aus dem Apparate ausgetrieben wird. Nach $\frac{1}{4}$ Stunde prüft man das austretende Gas (durch Ueberstülpen eines trockenen Probircylinders über den ausgezogenen Schnabel und Entzünden des in dem Probirrohre angesammelten Gases), ob es noch erheblich lufthaltig ist. Verläuft die Verbrennung ruhig, ohne heftige Explosion, so stellt man eine Flamme unter eine nicht verjüngte Stelle *a*, *b* oder *c* der Figur des Glührohrs und erhitzt dieses zum Glühen. In vielen Abbildungen wird das Verfahren so dargestellt, dass man gerade die verjüngten Stellen erhitzen soll. Das ist natürlich falsch, denn die verjüngten Stellen sind gerade dazu da, dass sie von der umgebenden Luft abgekühlt werden, sodass sich die Arsenospiegel an diesen Stellen absetzen können. Ausserdem ist man gar nicht in der Lage, eine solche verjüngte Stelle stundenlang zu erhitzen, ohne dass das Glas an dieser Stelle zusammenfällt. Man erhitzt also das Glührohr mit einer kräftigen Bunsenflamme zu dunkler Rothgluth und sorgt durch gelegentliches Nachgiessen von Salzsäure dafür, dass eine hinreichend lebhaft bez. deutliche Wasserstoffentwicklung im Gange bleibt. Hat sich im Glührohr dicht hinter der Erhitzungsstelle nach 6stündigem Glühen ein dunkler Beschlag nicht abgesetzt, so sind Zink und Salzsäure arsenfrei und man kann zum entscheidenden Versuche übergehen. Hat sich aber ein dunkler Beschlag gebildet, so muss man der Ursache desselben nachgehen. Zunächst lässt man das Glührohr erkalten, dann schneidet man das Rohr dicht vor dem Beschlage ab, erwärmt eine kleine Boke des Rohres da, wo der Beschlag sitzt, in einer kleinen Flamme und prüft den Geruch. Tritt deutlicher Geruch nach




Fig. 112.

Knoblauch auf, so besteht der Beschlag aus Arsen. Man muss alsdann der Quelle des Arsens nachgehen und feststellen, woher letzteres stammt, ob aus dem Zink, der Salzsäure oder aus dem Glas des Apparates, indem man neue Salzsäure darstellt, eine andere Sorte Zink und einen neuen Apparat verwendet. Tritt Knoblauchgeruch nicht auf, so muss der Beschlag (welcher z. B. von verkohlter organischer Substanz herrühren kann) in der noch anzugebenden Weise (s. Arsen Spiegel), z. B. durch Schwefelwasserstoff, Auflösen in Salpetersäure etc. weiter geprüft werden. Wir nehmen indessen an, dass nach 6stündigem Erhitzen des Glührohrs ein Beschlag nicht

aufgetreten ist, dass also die angewendeten Reagentien arsenfrei sind.

In diesem Falle giesst man die Flüssigkeit von dem Zink ab, spült dieses mit Wasser nach und bringt frische Salzsäure und etwas Wasser hinzu. Wenn alle Luft aus dem Apparat verdrängt ist, erhitzt man das Glührohr zum Glühen, giebt alsdann von der auf S. 402 erwähnten Gifflösung, von welcher in unserem Beispiel eine Menge von 500 ccm zur Verfügung steht, in kleinen Antheilen 50 ccm in den Apparat — während das Glührohr zur dunklen Rothgluth erhitzt ist — und sorgt durch gelegentliches Nachgiessen von Salzsäure dafür, dass die Wasserstoffentwicklung nicht ins Stocken kommt. Man unterhält nun das Glühen und die Wasserstoffentwicklung weiter und beobachtet den Apparat von Zeit zu Zeit. Ist Arsen in einigermaassen beträchtlichen Mengen (z. B. ein bis mehrere Milligramm) in den angewendeten 50 ccm Flüssigkeit vorhanden, so erscheint nach kurzer Zeit (10–20 Minuten) hinter der Glühstelle in dem verjüngten Theile des Rohres ein dunkler, glänzender Beschlag (Arsen Spiegel). Wenn derselbe einige Stärke erlangt hat, so kann man eine andere Stelle des Glührohrs vor einer zweiten Verjüngung erhitzen und so einen zweiten Spiegel erzeugen. Erscheint es wünschenswerth, so kann man das gebrauchte Glührohr gegen ein neues auswechseln und einen dritten und vierten Spiegel erzeugen.

Glaubt man eine genügende Anzahl von Arsenspiegeln erzeugt zu haben, so entfernt man die Flamme von dem Glührohr und entzündet das austretende Gas. Sind einigermaassen erhebliche Mengen von Arsen zugegen, so ist die Wasserstoffflamme „süßblau“ gefärbt. Drückt man die Flamme mit einem kalten Porcellan Gegenstande nieder, so entsteht auf diesem ein dunkler, metallglänzender Fleck. Man erzeugt so in dem Hohlraume eines Porcellanschälchens eine Anzahl solcher „Arsenflecken“.

Schliesslich wendet man den Schnabel des Glührohrs nach unten und leitet das austretende Wasserstoffgas in stark verdünnte Silbernitratlösung. (Fig. 113.) Bei Anwesenheit von Arsen entsteht in dieser eine schwarze Ausscheidung von metallischem Silber. Filtrirt man nach Beendigung des Versuches von dieser ab und neutralisirt das Filtrat vorsichtig mit stark verdünntem Ammoniak, so erfolgt Ausscheidung von gelbem Silberarsenit.

Um bei Anwesenheit geringer Arsenmengen mit Sicherheit Arsenspiegel zu erhalten, muss man 1) für eine hinreichend starke aber nicht allzu lebhafte Wasserstoffentwicklung sorgen. 2) Das Gasgemisch muss, bevor es zum Glühen erhitzt wird, völlig getrocknet werden. 3) Die zu prüfende Lösung muss frei sein von Chlor, Chlorsäure, Salpetersäure, Quecksilberverbindungen und anderen oxydirenden Agentien. 4) Durch die Bildung von Arsenflecken lassen sich nur verhältnissmässig grosse, durch die Bildung von Arsenspiegeln aber noch sehr kleine Mengen Arsen (z. B. $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{60}$ mg) sicher nachweisen.

Unterscheidung der Arsenflecken und -Spiegel von Antimonflecken und -Spiegeln. Der Nachweis des Arsens mit Hilfe des Verfahrens von MARSH wird dadurch kompliziert, dass auch Antimonverbindungen, wenn sie dem gleichen Verfahren unterworfen werden, ähnliche Flecken und Spiegel geben; indessen ist es glücklicherweise möglich, beide von einander zu unterscheiden.

Arsen.

1) Die Flecken sind dunkelbraun, metallglänzend, ja spiegelnd; beim Erhitzen verbreiten sie Knoblauchgeruch (letzteres äusserst wichtig!).

2) Die Flecken und Spiegel werden durch eine Lösung von unterchlorigsaurem Natrium¹⁾ alsbald gelöst.

3) Werden die Spiegel im Wasserstoffstrome erhitzt, so lässt sich das Arsen leicht von einer Stelle zur anderen treiben.

4) Im Sauerstoff- oder Luftstrome erhitzt, verbrennen sie zu Arsensäure-Anhydrid, welches sich an den kälteren Theilen des Rohres in Krystallen (Oktaëder s. S. 337) absetzt, bez. als deutlich sichtbarer weisser, specifisch schwerer Rauch entweicht.

5) Leitet man über die Spiegel unter schwachem Erwärmen Schwefelwasserstoffgas, so werden sie in gelbes Arsentrisulfid verwandelt, welches in Salzsäure unlöslich ist.

6) Löst man die Flecken oder Spiegel in Salpetersäure, dampft die Lösung bis fast zur Trockne, bringt einen Tropfen Silbernitratlösung hinzu und bläst behufs Neutralisation etwas Ammoniakdampf auf, so wird ein gelber oder röthlicher Niederschlag ausgeschieden.

Sind alle diese Reaktionen eingetreten, so kann kein Zweifel darüber existiren, dass die vorliegenden Flecken oder Spiegel von Arsen herrühren. — Man schreitet alsdann zur quantitativen Bestimmung des Arsens und zwar benutzt man hierzu die in unserem Beispiele noch vorhandenen 450 ccm Giftlösung. Ob man die gesammte Menge oder nur einen Theil davon in Arbeit nimmt, hängt davon ab, ob viel oder wenig Arsen vorhanden ist, worüber man sich indessen aus dem raschen oder langsamen Auftreten der Spiegel bezw. aus deren Stärke schon ein ungefähres Urtheil gebildet haben kann.

Bestimmung des Arsens. Wir erhitzen in unserem Beispiel den ganzen Rest der vorhandenen Giftlösung (450 ccm) auf dem Wasserbade bis auf etwa 80° C. und leiten nunmehr bis zum Erkalten (etwa 2—3 Stunden) einen Strom arsenfreien Schwefelwasserstoffs durch die Lösung. Hierauf erhitzt man die Flüssigkeit nochmals, leitet wiederum




Fig. 118.

Antimon.

1) Die Flecken sind matt (sammetartig), von schwarzer Farbe. An dem der Erhitzungsstelle zugewendeten Rande der Spiegel lassen sich Kügelchen wahrnehmen.

2) Die Flecken und Spiegel werden durch eine Lösung von unterchlorigsaurem Natrium¹⁾ nicht verändert.

3) Die Spiegel lassen sich bei weitem schwieriger verflüchtigen.

4) Der Spiegel wird zu nicht leicht flüchtigem, amorphem Antimonoxyd oxydirt.

5) Die Spiegel werden beim Ueberleiten von Schwefelwasserstoffgas unter schwachem Erwärmen in rothes Antimontrisulfid verwandelt, welches beim stärkeren Erhitzen schwarz wird und in Salzsäure löslich ist.

6) Löst man die Flecken oder Spiegel in Salpetersäure, dampft bis fast zur Trockne ein, fügt nach dem Erkalten Silbernitrat zu und bläst Ammoniakdampf auf, so entsteht in der Kälte keine Färbung, in der Wärme ein schwarzer Fleck, von metallischem Silber herrührend.

¹⁾ Die Lösung des unterchlorigsauren Natriums darf weder freies Chlor noch freie unterchlorige Säure enthalten. Man stellt sie dar, indem man 1 Th. Chlorkalk mit 20 Th. Sodälösung (1:10) ansieht und die Flüssigkeit filtrirt.

bis zum Erkalten 2–3 Stunden Schwefelwasserstoffgas ein und setzt das Gefäss, wohlverstopft, 24 Stunden an einem warmen Orte zur Seite. Während dieser Zeit setzt sich bei Leichenuntersuchungen unter allen Umständen ein bräunlicher Niederschlag ab, dem man es meist nicht ohne weiteres ansehen kann, ob er arsenhaltig ist oder nicht. Man filtrirt den Niederschlag ab und wäscht ihn mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser aus (leitet auch in das Filtrat nochmals Schwefelwasserstoff ein, um sicher zu sein, dass auch alles Arsen ausgefällt wird), bis er frei von Chlor ist. Man bringt nun den Niederschlag sammt Filter in eine kleine (7–9 cm Durchmesser) Porzellanschale und trocknet ihn zu nächst im Wasserbade aus. Dann fügt man tropfenweise rauchende chlorfreie Salpetersäure hinzu, bis alles befeuchtet ist, dampft im Wasserbade zur Trockne, und wiederholt dieses Befeuchten und Abdampfen nochmals. Den Rückstand feuchtet man unter Bearbeiten mit einem Glasstabe mit zuvor erwärmter Schwefelsäure gleichmässig an und erhitzt zu nächst 2–3 Stunden im Wasserbade, zuletzt bei etwa 170°C im Luftbade, bis die verkohlte Masse eine bröckelige Beschaffenheit annimmt und eine kleine (dem Ganzen später wieder zuzufügende) Probe, mit Wasser vermischt, nach dem Absetzen eine farblose oder fast farblose Flüssigkeit liefert. Stellt der Rückstand nach dem Erhitzen auf 170 bis 180°C noch eine bräunliche Flüssigkeit dar, so rührt man einige Stückchen reines Filtrirpapier darunter und setzt das Erhitzen fort, bis der gewünschte Zustand erreicht ist. — Ist dieses der Fall, so erwärmt man den Rückstand mit einer Mischung von 1 Th Salzsäure und 3 Th Wasser im Wasserbade, filtrirt und wäscht mit heissem, etwas Salzsäure enthaltendem Wasser aus.

A Als Schwefelarsen. Das Filtrat¹⁾ wird auf 80°C erwärmt und hierauf 2 bis 3 Stunden bis zum Erkalten mit arsenfreiem Schwefelwasserstoff gesättigt. Man erwärmt nochmals, behandelt wiederum mit Schwefelwasserstoff und lässt im verschlossenen Gefässe 24 Stunden lang an einem warmen Orte stehen. Man filtrirt hierauf durch ein gewöhnliches Filter und wäscht mit Schwefelwasserstoffwasser aus. Den auf dem Filter befindlichen gelben Niederschlag löst man in Ammoniumcarbonatlösung und wäscht das Filter mit Ammoniumcarbonat enthaltendem Wasser aus. Das Filtrat wird mit Salzsäure stark angesäuert, dann erwärmt man es auf 60 – 70°C und leitet noch etwa 15–20 Minuten arsenfreien Schwefelwasserstoff ein, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wäscht mit Schwefelwasserstoffwasser aus und trocknet bei 100°C [FUSSENJUS]. Das gewogene $\text{As}_2\text{S}_3 > 0,80488$ ist = Arsensäureanhydrid As_2O_3 .

Die vorstehend mitgetheilte Methode bietet den Vortheil, dass man eine charakteristische Arsenverbindung (das gelbe Arsentrichlür) zur Wagung bringt, und dass dieses nach dem Trocknen in schön gelbem Zustande erhalten wird, selbst wenn nur kleine Mengen aus grossen Mengen Organtheilen zu isoliren sind.

B Als Magnesiumpyroarseniat. Man übergiesst das gefällte und noch feuchte Arsensulfid mit arsenfreier Salzsäure, erwärmt auf dem Wasserbade und setzt unter Umschwenken Kaliumchlorat körnchenweise solange hinzu, bis das Arsensulfid gelöst ist. Man verdünnt alsdann mit etwas Wasser, erwärmt bis zur Verjagung des Chlors, filtrirt und lässt erkalten, dann macht man mit Ammoniak ammoniakalisch, fällt unter Umrühren mit einem Ueberschuss Magnesiumammonium, setzt noch $\frac{1}{8}$ vom Gesamtvolumen der Flüssigkeit an 10proc Ammoniak hinzu und lässt 6–12 Stunden stehen. Dann filtrirt man den Niederschlag ab, wäscht ihn bis zur Chlorfreiheit mit 2,5proc Ammoniak aus und trocknet. Schliesslich trennt man den Niederschlag möglichst vom Filter, befeuchtet dieses mit Ammoniumnitratlösung, trocknet und verbrennt das Filter in einem gewogenen Roser'schen Tiegel. Hierauf bringt man den Niederschlag in den Tiegel und führt ihn durch Glühen im Sauerstoffstrom in Magnesiumpyroarseniat $\text{As}_2\text{O}_3\cdot\text{Mg}$ über. Das gewogene Magnesiumpyroarseniat $> 0,6987$ ist = Arsensäureanhydrid As_2O_3 .

Die Herstellung der „Gifflösung“ kann auch nach anderen Verfahren ausgeführt werden. Ist z. B. die Menge der vorhandenen organischen Substanz nicht zu gross, so kann man die zerkleinerten Massen mit arsenfreier Salzsäure zu einem dünnen Brei anrühren und unter Zusatz von 5–10 g arsenfreiem Ferrochlorid der Destillation unterwerfen. Diese Destillation erfolgt zweckmässig aus einer tabulirten Retorte, deren Hals schräg nach oben gerichtet und unter einem stumpfen Winkel mit einem Linné'schen Kühler verbunden ist. Man destillirt etwa $\frac{1}{8}$ ab und erhält, wenn die vorhandene Arsenmenge nicht zu gross ist, meist das gesammte Arsen in das Destillat. Sind die Arsenmengen sehr gross, so wird der Rückstand mit einer neuen Menge Salzsäure übergossen und nach Zufügung von 3–5 g Ferrochlorid nochmals der Destillation unterworfen. Arsensäure, Arsensäure und deren Salze lassen sich so quantitativ als Arsentrichlür in das Destillat überführen, während die gleiche Ueberführung der Sulfide des Arsens nicht möglich ist.

¹⁾ Das Filtrat würde übrigens alle in Betracht kommenden Metalle ausser Blei, Baryum und Strontium enthalten.

Nachweis und Bestimmung des Arsens in Gebrauchsgegenständen

Hierfür sind als Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze über die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben vom 5 Juli 1887 genaue Anweisungen von dem Reichskanzler unter den 10 April 1888 gegeben worden, welche im Pharm Kalender 1889, Theil II und in irgend einem Buche, welches die Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln oder Gebrauchsgegenständen behandelt, eingesehen werden können

Die Vorprüfung aller dieser Gegenstände erfolgt meist in der Weise, dass man die selben mit warmer arsenfreier Salzsäure auszieht und den Auszug nach Gutzert prüft

Arsen-Nachweis nach Gutzert Von der stark salzsauren, Arsen enthaltenden Lösung werden etwa 10 cem in ein Probirrohr gebracht Dann fügt man ein Stückchen arsenfreies Zink hinzu, schiebt in den leeren Theil des Glases einen ganz lockeren Bausch reine Watte, überdreht die Oeffnung des Rohres mit etwas Filtrirpapier und befeuchtet dieses mit einem Tropfen reine Silbernitratlösung 1+1 (nicht dünner!) Ist Arsen zugegen, so färbt sich die befeuchtete Stelle nach einiger Zeit citronengelb Wird der gelbe Fleck mit Wasser befeuchtet, so wird er schwarz Täuschungen können dadurch entstehen, dass auch Phosphorwasserstoff und Schwefelwasserstoff ähnliche Erscheinungen verursachen Man betrachte deshalb die Probe nach Gutzert unter allen Umständen lediglich als Vorprobe und führe den exakten Nachweis des Arsens stets nach MARSH aus

Prüfung der Reagentien Die Beschaffung und Prüfung der Reagentien ist für den Arsen-Nachweis von grosser Bedeutung und sollte mit der grössten Feinheit ausgeführt werden

1) Arsenfreies Zink ist gegenwärtig leicht im Handel erhältlich, nur muss man ausdrücklich „Zink absolut arsenfrei zur forensischen Analyse“ bestellen Die Prüfung erfolgt im MARSH'schen Apparate, indem man 100—150 g in der S 408 bei dem blinden Versuche geschilderten Weise anwendet

2) Arsenfreie Salzsäure bereitet man zweckmässig selbst s S 57 Man halte nicht zu grosse Vorräthe, sondern führe die Selbstdarstellung etwa alle Monate einmal aus, im Zweifelsfalle, oder wenn solche Untersuchungen nur selten vorkommen, bereite man die Säure stets kurz vor dem Verbrauch Die Prüfung erfolgt im MARSH'schen Apparate $\frac{1}{2}$ —1 l Salzsäure wird nach Hinzufügung einiger Körnchen chloresauren Kalks und etwas Wasser, welches man von Zeit zu Zeit ersetzt, im Wasserbade eingedampft Zum Rückstand fügt man reine verdünnte Schwefelsäure, erwärmt bis zur Verjagung der Salzsäure und bringt den Rückstand in den MARSH'schen Apparat

3) Arsenfreie Schwefelsäure ist im Handel zu haben, doch muss auch diese als „Schwefelsäure absolut arsenfrei zur forensischen Analyse“ bestellt werden Man prüft sie in einer Verdünnung 1 6 im MARSH'schen Apparate

4) Arsenfreies Kaliumchlorat wird aus dem reinsten Handelspräparate durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Wasser erhalten Man prüft es, indem man 5 g mit arsenfreier Salzsäure vollständig versetzt und die chlorfreie Lösung in den MARSH'schen Apparat bringt

5) Arsenfreier Schwefelwasserstoff Man erhält ihn direkt durch Zersetzen von Baryumsulfid oder Zinksulfid mit reiner Salzsäure *Baryum sulfuratum in bacillis* und *Zincum sulfuratum in bacillis* zur Entwicklung arsenfreien Schwefelwasserstoffs für die forensische Analyse sind im Handel zu haben Ferner kann man den durch Zersetzung von Schwefeleisen mit Salzsäure sich ergebenden arsenwasserstoffhaltigen Schwefelwasserstoff in der S 120 angegebenen Weise reinigen

Artemisia.

Gattung der Compositae—Anthemideae.

I Artemisia Absinthium L. Alsam. Wermuth. Wurmtod. Grabkraut. Heiligbitter. Bitterer Belfass Kampferkraut. Magenkraut. Grande Absinthe. Alyne. Common Wormwood. Heimath unsicher Von Nordafrika und SüdEuropa bis Kaschmir und Sibirien Aus alten Kulturen vielfach verwildert

Verwendung findet das blühende Kraut *Herba Absinthii* (Germ Hely Austr) *Summitates Absinthii*. Absinthe. Aluyn. Absinthium (U-St) Wormwood *Feuille et sommité fleurie d'Absinthe* (Gall)

Beschreibung. Bis 1,5 m hoch Die unteren Blätter sind im Umriss dreieckig eirundlich, doppelt, die oberen einfach gefiedert, dann dreizipfelig, endlich einfach-lanzettlich Die Fiedern sind breit, zungen- bis spatelförmig Oberseits grünlich, unterseits weissfäzig Die charakteristischen Haare sind T förmig, auf einem wenigzelligen Stiel befestigt

Der Blütenstand besteht aus rispig angeordneten Trauben Die Blütenkörbchen sind 3 mm gross, nickend, fast kuglig Die Blüten sind meist zwittrige Röhrenblüthen, wenig weibliche Randblüthen ohne Zunge

Die Pflanze enthält reichlich Oeldrüsen, deren Kopf meist aus 4 Zellen besteht und auf einem kurzen, scheibenförmigen Fuss ruht Geruch aromatisch, Geschmack bitter aromatisch

Wirkung und Anwendung. In kleinen Dosen reizt das Kraut den Appetit an, in grossen erzeugt es Kopfschmerz und Schwindel Das ätherische Oel besitzt narkotische Eigenschaften, erzeugt Krämpfe Man wendet es zu Umschlagen an, bei Quetschungen etc, innerlich als Anthelminthicum, bei Intermittens, bei Bleichsucht, bei Dyspepsie Ist Bestandtheil vieler bitterer Liqueure Der gewohnheitsmässige Genuss derselben soll zu Epilepsie führen

Bestandtheile Im frischen Kraut 0,2–0,4 Proc grünblanes ätherisches Oel vom spec Gew 0,92–0,95, es enthält Terpene und bei 203° C siedendes Absinthol $C_{10}H_{16}O$ Ferner Absinthiin $C_{20}H_{32}O_4 + \frac{1}{2}H_2O$, von intensiv bitterem Geschmack Asche etwa 7 Proc Aus dem trocknen Kraut kann man 2,7 Proc Salpeter gewinnen Früher baute man die Pflanze zur Potaschegewinnung, *Sal Absinthii*

Einsammlung Im Juli und August von der wild wachsenden oder von der angebauten Pflanze, letztere ist weniger bitter 5 Th frisches Kraut geben 1 Th trockenes Die Verarbeitung des Krautes zu Pulver ist mit einem Verlust von etwa 12 Proc verbunden

Aufbewahrung Von den dicksten Stengeln befreit, geschnitten oder grob gepulvert — wie *Rad Angelicae*

Aqua vulneraria spiritiosa (Ergänz.) Wermuth, Lavendelblüthen, Pfefferminzblätter, Rosmarinblätter, Rautenblätter, Salbeiblätter je 1 Th, verdünnter Weingeist 20 Th, Wasser 50 Th lässt man 48 Stunden stehen und destillirt dann 40 Th ab Trübe, von kräftigem Geruche

Elixir amarum (Germ) Wermuthextrakt 2 Th, Pfefferminzölzucker, aromatische Tinktur, bittere Tinktur je 1 Th, Wasser 5 Th wenig trübe

Extractum Absinthii. Wermuthextrakt — *Extrait d'absinthe* — Germ Durch 24stündiges Ausziehen von Wermuth (Sieb II) 2 Th mit Weingeist 2 Th, Wasser 8 Th, dann nochmals mit Weingeist 1 Th, Wasser 4 Th und Eindampfen der Pressflüssigkeit zu bereiten Diak, in Wasser trübe löslich Ausbeute 30–33 Proc Helvet Man übergiesst Wermuth (Sieb II) 1 Th mit kochendem Wasser 8 Th, presst nach 24 Stunden, wiederholt dasselbe mit 4 Th Wasser, dampft die Pressflüssigkeiten auf 2 Th ein, mischt mit Weingeist 1 Th, filtrirt nach 48 Stunden und dampft zum dicken Extrakt ein In Wasser fast klar löslich

Oleum Absinthii infusum s coctum. Fettes Wermuthöl (Ergänz.) Wermuth, grob gepulvert, 4 Th lässt man mit Weingeist 8 Th befeuchtet einige Stunden stehen, erwärmt dann mit Olivenöl 40 Th im Dampfbade, bis der Weingeist verdunstet ist, presst und filtrirt Braungrünes Oel

Species amarae (Helvet) Bittere Kräuter *Espèces amères* — Biberklee, Cardobenedikte, Pomeranzenschale, Tausendgüldenkraut, Wermuth, zu gleichen Theilen

Species amariontes (Austr) *Species zum Bitterthee* Wermuthkraut, Tausendgüldenkraut, Orangenschalen je 100 Th, Fieberkleeblätter, Kalmuswurzel, Enzianwurzel je 50 Th, Zimtrinde 15 Th — Hunger hat ausserdem noch Cardobenedikte aufgenommen

Tinctura Absinthii (Germ Helvet) Wermuthtinktur, Rochustropfen — *Teinture d'absinthe* — Aus mittelfein zerschnittenem Wermuth 1 Th, verdünntem Weingeiste 5 Th, durch 8tägiges Ausziehen, Pressen und Filtriren zu bereiten

Tinctura Absinthii composita (Austr Hung) *Elixir stomachicum Stoughton.* Wermuthkraut 50 Th, Orangenschalen 20 Th, Kalmuswurzel Enzianwurzel je 10 Th, Zimtrinde 5 Th, verdünnter Weingeist 500 Th

(Helvet) Tinctura amara, bitters Tinctur Teinture amère) Wermuth 8 Th, Tausendguldenkraut 4 Th, Galgant, Kalmuswurzel, Pomeranzenschale je 2 Th, Zimmt, Nelken je 1 Th, verdünnter Weingeist 100 Th

Unguentum aromaticum (Aust) Aromatische Salbe Ungt nervinum Wermuth, zerschitten 125 Th digerirt man 6 Stunden mit verdünntem Weingeist 250 Th, erwärmt mit Schweinfett 1000 Th bis zum Verschwinden aller Feuchtigkeit, sieht durch, schmilzt die Kolatur mit gelbem Wachs 250 Th, Lorbeeröl 125 Th, sieht durch und mischt nach dem Erkalten dazu Wacholderöl, Pfefferminzöl, Rosmarinöl, Lavendelöl je 10 Th

Balsamum stomachale Wacker, WACKERS Magenbalsam Schweinfett 50 Th, Olivenöl, gelbes Wachs je 12,5 Th, Muskatbutter 5 Th schmilzt man und fugt hinzu atherisches Wermuthöl und Rosmarinöl je 2,5 Th, Krauseminz- und Nelkenöl je 2 Th HOFFMANN'S Lebensbalsam, Armonischen Bolus je 5 Th

Essentia amara Hallensis. Tinctura Absinthii kalina Wermuthtinktur 50 Th, bittere Tinktur 20 Th, aromatische Tinktur 10 Th, Wermuthextrakt 5 Th, Kaliumkarbonatlösung 15 Th

Magentrost, Pfarrei KNEIPP'S Wermuth, Bitterklee, Schachtelhalm, Augentrost, Tausendguldenkraut je 5 Th Johanniskraut, Schafgarbe, Wacholderbeeren, Hagebutten, Enzianwurzel je 10 Th, Pfefferminzöl 1 Th werden mit verdünntem Weingeist 1000 Th ausgezogen

Wermuthpillen desselben enthalten 0,1 Wermuth, Gummi q s

Oleum Absinthii terebinthinatum Aetherisches Wermuthöl 1 Th, gereinigtes Terpentingöl 9 Th

Oleum stomachicum Zwelfer. Fettes Wermuthöl 60 g, Aetherisches Wermuthöl, Nelkenöl, Rosenholzöl je 10 Tropfen, Macisöl 20 Tropfen

Schweizer Absinthol. (HORMANN) Anisöl 350 g, Fenchelöl 180 g, Röm Kamillenöl 6 g, Sternanisöl 128 g, Wermuthöl 800 g, Wermuthessenz, Veichenessenz je 40 g Liefert mit verdünntem Weingeist den Schweizer Absinth, Absinthe fine ou suisse Grün gefärbt heisst der letztere Rosolio d'Absinthe

Schweizer Alpenkräuteresenz (Buchh) Wermuth, Anis je 45 g, Kalmus 40 g, Salbei, Pomeranzenschale, Pfefferminz je 30 g, Wacholderbeeren 25 g, Angelikawurzel, Lavendel je 20 g, Nelken 15 g, Weingeist q s zu 1 l Essenz

Sirupus Absinthii. Wermuthtinktur 15 Th, weisser Sirup 85 Th

Species anthelminticae (Diet) Wurmthee Wermuth, Kamillen, Rainfarnblüthen, Wurmssamen, gleiche Theile

Thea Helvetica Species vulnerariae Schweizer Thee Falltrank Thé suisse Wermuth, Ysop, Schafgarbe, Thymian, Gundermann, Melisse, Salbei, Heflattich, Arnikablüthe, gleiche Theile

Tinctura amara Biester Wermuthtinktur 30 Th, bittere Tinktur, Pomeranzenschalentinktur, Baldriantinktur je 20 Th, Guajakharzinktur 7,5 Th, Kaliumkarbonat 5 Th

Essentia amara, Königsecker, ist ein weingeistiger Auszug aus Wermuth, Schafgarbe, Bitterklee, Rainfarn, Enzian, Pomeranzen mit Ammoniak

Magnetic Oil aus Amerika ist eine Tinktur aus spanischem Pfeffer, worn die ätherischen Oele von Wermuth, Sassafras, Zimmt, Dost, sowie Waldwollöl und Terpentingöl gelöst sind

Stomachicum von O BIER, ein aus Wermuth, unreifen Pomeranzen, Ingwer, Zittwer, Angelika, Anis und Pfefferminze bereiteter Schnaps

Zahntinktur von NIK BAKK ist Wermuthtinktur

Vinum Absinthii. Wermuthwein 1) Wermuth 40 Th, Weisswein 1000 Th Nach 8 Tagen presst man aus und filtrirt

2) Vermouth di Torino Wermuth 300 Th, Ivakraut 100 Th, Ceylonzimmt 4 Th, Ingwer 3 Th, Muskatnuss 2 Th werden mit Kognak 2400 Th ausgezogen, der Auszug mit Wein 200 Th vermischt

3) Wermuthextrakt 2,5 Th, Wermuthtinktur 10 Th, Weisswein 250 Th Man mischt und filtrirt

Thierheilmittel (Diet)

Fresspulver 1) für Pferde Wermuth, Enzian je 100 Th, Haselwurzel 50 Th, künstliches Karlsbader Salz 250 Th Grob gepulvert zu mischen Esslöffelweise aufs Futter

2) Für Rinder Wermuth, Kalmus je 250 Th, Kochsalz 300 Th, Glaubersalz 150 Th, Ingwer 50 Th — Wie das vorige zu gebrauchen

Leckpulver für Schafe Wermuth, Ingwer je 5 Th, Wacholderbeeren 10 Th, Eichenrinde 20 Th, Kochsalz 100 Th Älteren Thieren bei Durchfall täglich dreimal ein Esslöffel voll zum Lecken

Trank bei Buchverhartung der Rinder Wermuth 60 Th, roher Weinstein 40 Th, Spiesglanz 20 Th, Glaubersalz 450 Th Vierstündlich $\frac{1}{2}$ in 1 l warmem Wasser,

Wurmtrank für Rinder Wermuth, Rainfarnkraut, Aloë, grob gepulvert, je 30 g, Hirschhornöl 15 g, Leinöl 500 g Innerhalb 5 Stunden auf zwei Mal zu geben

Oleum Absinthii Wermuthöl. Essence d'Absinthe (Gall.) Oil of Worm wood Wird aus dem frischen Kraute der Wermuthpflanze in Nord Amerika, Frankreich, Spanien und Algier durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen Ausbeute etwa $\frac{1}{2}$ Proc

Eine etwas dickliche Flüssigkeit von dunkelgrüner oder seltener blauer Farbe, die im Alter in ein dunkles Braun übergeht Geruch stark und nicht angenehm, Geschmack bitter, kratzend und lange anhaltend Spec Gew 0,925—0,955 Das Oel löst sich in 3 Theilen 80procentigen Alkohols klar auf

Die Hauptbestandtheile sind das früher „Absinthol“ genannte Keton Thujon (Tanacetone) $C_{10}H_{18}O$ sowie der dazugehörige Thujylalkohol $C_{10}H_{17}OH$ Dieser macht etwa 24 Proc des Oels aus und ist nach SCHMIDT & Co theils frei, theils an Essigsäure, Isovaleriansäure und Palmitinsäure gebunden Weniger wichtig sind Phellandren, und ein zweites Terpen, wahrscheinlich Pinen, die beide in nur sehr geringer Menge vorhanden sind In den hoch siedenden Antheilen ist Cadinen, $C_{15}H_{24}$, sowie ein um $800^{\circ}C$ siedendes blaues Oel enthalten

Prüfung Wermuthöl wird häufig mit Terpentinöl verfälscht Zum Nachweise destillirt man 10 Proc von dem zu prüfenden Oele ab und prüft das Destillat auf seine Löslichkeit in 2 Th 80procentigen Alkohols Bei reinen Oelen tritt klare Lösung ein, bei den mit Terpentinöl verfälschten nicht

II Artemisia vulgaris L. Beifuss Johannesgütel Gänsekraut. Sonnenwendel Armoise Von Europa durch das mittlere und nördliche Asien bis Japan, Nordamerika

Verwendung findet

a) Das Kraut mit den Blüten, **Herba Artemisiae** (Ergänzb) **Summitates Artemisiae** **Herba regia.** Feuille d'armoise (Gall) Die unteren Blätter doppelt, die oberen einfach fiederspaltig mit lanzettlichen, meist eingeschnittenen Zipfeln Oberseits kahl, dunkelgrün, unterseits weissfilzig, Rand umgeschlagen Bluthenköbchen rundlich oder länglich, das Involucrium flügelig; die Blüten röthlich

Bestandtheile 0,2 Proc Ätherisches Oel vom spec Gew 0,907, es enthält Cineol

Einsammlung. Im August 4 Th frisches Kraut geben 1 Th trocknes

Anwendung. Selten als Arzneimittel, häufiger als Kuchengewürz

Sirupus Artemisiae compositus, Sirop d'Armoise composé (Gall) Sirop de Fernel Ein mit Zucker und Honig versüßter, weingeistiger Auszug aus Beifusskraut, Katzenmelisse, Polei, Sadebaum, Basilicum, Ysop, Majoran, Mutterkraut, Rauten, Alant, Fenchel-, und Liebstöckelwurzel, Zimmt und Anis

b) Die Wurzel **Radix Artemisiae** (Ergänzb) **Beifusswurzel. Stabwurz. Rhizome d'armoise** (Gall) **Mugwort-root.**

Beschreibung. Hin- und hergehogene, dünne, runzlige, aussen hellbraune, innen weisse Wurzeln, von denen das bis 2,5 cm dicke Rhizom möglichst zu beseitigen ist Die Rinde beträgt $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{10}$ des Durchmessers Vor den Gruppen der Bastfasern in der Rinde liegen 3—5 ansehnliche Sekretbehälter

Einsammlung Die im Herbst und ersten Frühjahr gegrabene Wurzel wird ohne Waschung gesäubert, möglichst schnell getrocknet und in Blechgefäßen aufbewahrt Jährlich zu erneuern 3 Th frische Wurzel geben 1 Th. trockene

Anwendung. Gegen Epilepsie und Vertanz

Extractum Artemisiae (Ergänzb) ist wie Extr Absinthii (Germ) zu bereiten

Tinctura Artemisiae radialis (RADEMACHER) wird aus Beifusswurzel 1 Th und 45proc Weingeist 5 Th durch 8tägige Digestion gewonnen

Folgende Epilepsiemittel enthalten Beifuss als wesentlichen Bestandtheil

BRASSLER's eine Mischung aus Beifusswurzel und Zucker

BUCHHOLZ' 1) eine mit Beifussstanktur und Zimmtsirup versetzte Abkochung von Beifuss und Pfingstrosenwurzel, 2) ein Thee aus Beifusskraut, Guajakholz, Pomeranzen- und Sennesblättern

Fraulein Gotzkow's (aus Goldap) Beifuss, Zimmt und Thierkohle in abgetheilten Pulvern

WEPLER's Abgetheilte Pulver aus Beifuss, Diptam, Zittwerwurzel, Kienruss, Magnesia, Zucker, Baldrian- und Cajeputöl

Hierzu gehören auch die Epilepsiemittel von DURAND, PAOLI, QUANTE, KARIQ, der Berliner Straussapotheke

Polichrest-Thee, Spanischer, besteht aus Beifuss, Stiefmütterchen, Huflattag, Schafgarbe, Mohnköpfen, rothem Sandelholz, Hirschhorn, Süssholz, Sarsaparille, Seifen- und Seggenwurzel (Pharm Ztg)

Scheu-fu DR SCHROPPER's Beifusswurzel mit Kurkuma

III Artemisia Abrotanum L Eberante. Stabwurz. Citronenkraut Iwa
Aurore des jardins Southern wood. Oldman In Sudeuropa und dem Orient häufig,
nicht selten kultivirt

Verwendung findet:

Das blühende Kraut Herba Abrotani. Summitates Abrotani. Feuille et sommité fleurie d'Aurore male ou Citronelle (Gall) Die unteren doppelt gefiederten und die oberen einfach gefiederten Blätter besitzen schmal lineale, fast fadenförmige Zipfel, unterseits behaart Die kleinen, nickenden Blüthenkörbchen sind oval rundlich, von grauer Farbe Von scharf aromatischem Geruch und Geschmack

Hier und da als magenstärkendes und wurmwidriges Mittel im Gebrauch

Einsammlung. Im Juli und August 4 Th frisches Kraut geben 1 Th trockenes.

Aufbewahrung In Blech- oder Glasgefässen

IV Artemisia campestris L Rother Beifuss. In Nordafrika, von Europa durch Asien bis China Blüthenkörbchen sehr klein, Randblüthen fruchtbar, Scheibenblüthen fehl-schlagend Früher als Sem Artemisiae rubrae u campestris im Gebrauch

V Artemisia Dracunculus L Dragen. Estragon. Kaisersalat Bertram (wie Pyrethrum) In Russland und der Mongolei heimisch, als Gewürz häufig gebaut Blätter ungetheilt, lineal, kahl

VI Artemisia frigida Willd Berg-Salvei Herba Artemisiae spinosae. Mountain Sage. Sage bush Heimisch in den Weststaaten Nord-Amerikas Das Kraut wird neuerdings als Fiebermittel, auch als Diureticum, ferner bei Rheuma, Scharlach etc empfohlen

VII Artemisia herba alba Asso Chih. Im Mittelmeergebiet Soll die berberischen Flores Cinae liefern cf Cina

VIII Artemisia pontica L Römischer Wermuth Römischer Beifuss Pontischer Wermuth. Das blühende Kraut (Herba Absinthii pontici seu romani) soll aromatischer und weniger bitter sein wie das von Artemisia Absinthium

IX Artemisia Mutellina Vill, A glacialis L, A spicata Woulf liefern Herba Absinthii alpini seu Genipi albi, den weissen Genip, Genipi vrai (Gall) Artemisia vallesiana Vals liefert den schwarzen Genip Als Genip kommen auch Achillea-Arten in Betracht Diese sehr aromatischen Kräuter dienen zur Fabrikation von Liqueuren Schweizer Absinth

X Flores Cinae cf Cina

Arum.

Gattung der Araceae—Aroidae.

I. Arum maculatum L Aronstab. Eselsöhren. Fieberwurz. Fresswurz. Lungenkraut. Zehrwurz. Pied de veau, Genet. Heimisch in Mittel- und Sudeuropa, zuweilen (in Indien) kultivirt.

Verwendung findet

a) das Rhizom *Tuber Ari* *Rhizoma Ari* *Radix Ari* *Radix Aronis* *Radix Dracontii minoris* *Tubercule d'Arum* (Gall)

Beschreibung Unregelmässig rundlich oder oval ist es von der Grösse einer kleinen Kartoffel, unten bewurzelt. Getrocknet ist es etwa haselnussgross, rundlich, weisslich, von den äusseren Theilen und den Wurzeln befreit. Das Gewebe besteht aus dünnwandigem, mit Stärke erfülltem Parenchym, zerstreute Zellen enthalten Oxalat-Raphiden und spärliche Gefässbündel.

Geschmack der frischen Knollen brennend scharf, bei trocken mehlig, wenig kratzend.

Bestandtheile. 71 Proc. Stärke, 18 Proc. Bassorin, 0,6 Proc. fettes Oel etc. Der die ausserordentliche Schärfe dieser und anderer Araceen bedingende Stoff ist nicht bekannt, man hat als giftigen Stoff dem Saponin nahestehende Stoffe nachgewiesen, ferner enthält die Pflanze (und andere Aiaceen) Blausäure frei oder locker gebunden, jedenfalls nicht als Amygdalin. Die Anschauung, dass die Schärfe durch mechanische Verletzungen der Schleimhäute durch die Oxalat-Raphiden bedingt sei, dürfte falsch sein. Charakteristisch ist es, dass die scharfen Stoffe sehr flüchtig sind, so dass getrocknete oder erhitzte Drogen ihre Schärfe verloren haben.

Anwendung. Das Pulver zuweilen noch als Bestandtheil einiger Magenpulver. Die gekochten Knollen werden gegessen. Aus den Knollen dieser Art oder von *Arum italicum* Mill. und *Arum esculentum* L. gewinnt man zuweilen *Portland-Arrowroot*. Die Körnchen 3–21 μ , meist 7–15 μ gross, sind Theilkörner zusammengesetzter Stärkekörner, daher auf einer Seite abgerundet, auf der anderen flach und kantig, zuweilen finden sich auch kleine, rundliche Körnchen. Die meisten Körner haben einen kleinen, centralen Spalt. Zwischen den Stärkekörnern nicht selten Oxalat-Raphiden oder Bruchstücke solcher.

b) Die spießspelförmigen, langgestielten, oft braungefleckten Blätter werden getrocknet (also ihrer Schärfe beraubt) in manchen Gegenden gegen Brustkrankheiten verwendet (*Aronkraut*).

II *Arum italicum* Mill. Heimisch im Mittelmeergebiet. Die grösseren Knollen dieser Art (*Radix Ari gallici*) werden wie die der ersteren verwendet. Sie sollen an ihrer Stelle oft in den Handel kommen.

III *Arisaema triphyllum* Schott. in Nordamerika liefert *Tuber* oder *Radix Ari indici*. *Dragon root*. *Indian turnip*. Das Pulver (*Cupress-powder*) dient als Kosmetikum. Ebenso verwendet man *Arisaema Dracontium* Schott.

Zahlreiche andere Arten dienen in den Tropen als Nahrungsmittel.

Pulvis stomachicus BIRKMANN. **Pulvis Ari compositus** s. **alkalinus**, BIRKMANN's Magenpulver. *Aronwurz* 20 Th, *Kalmus* 10 Th, *Bibernellwurzel*, *Zimmt*, *Präp. Austernschalen*, *Natriumbicarbonat* je 5 Th.

Asa foetida.

Asa foetida (Germ. *Helv.* Austr. Brit. Gall. U-St.) **Gummi—resina Asa foetida.** *Lacryma syriaca*. *Stereus diaboli*. *Asant*. *Stinkasant*. *Teufelsdreck*. *Asa fétide*. *Stinking Asa*. *Devils—dung* ist das Gummiharz verschiedener zu den *Umbelliferae—Apiaceae—Peucedaneae* gehöriger Pflanzen. Es werden als solche genannt *Ferula Asa—foetida** L., *Ferula foetida* Rgl. (= *Scorodisma Bentley* u. Trimen, *Scorodisma foetidum* Bunge), *Ferula Narthex* Boiss. (*Narthex Asa foetida* Falconer),¹⁾ *Ferula persica* Willd. Die sehr ansehnlichen Pflanzen sind heimisch in den Wüsten und Steppen zwischen dem persischen Meerbussen und dem Aralsee, bei Herat und Kabul sollen auch Kulturen sein. Man gewinnt das Gummiharz aus den Wurzeln, indem man dieselben oben von der Erde entblösst, von Zeit zu Zeit eine Scheibe abschneidet und das aus den schizogenen Behältern hervortretende Sekret sammelt. Hauptstapelplatz ist Bombay.

¹⁾ Neuerdings als Lieferant der Droge bestritten.

Beschreibung. Die beste Sorte (A. f. in Thränen und Kornern, A. f. in lacrymis seu granis) besteht aus unregelmässig gerundeten, bis 4 cm grossen, glatten, weissen bis blassbraunlichen Stücken, die in der Kälte hart, in der Wärme erweichen und dann zusammenkleben. Auf dem Bruch opalartig oder porcellanartig, zuerst weiss, dann an der Luft meist roth bis violett werdend. Spec. Gew. 1,3. Der Geruch ist schwächer wie bei der folgenden Sorte.

Diese (in Massen, A. f. amygdaloides seu in massis) besteht aus unregelmässigen, klumpigen Stücken von dunkler Farbe, in welche Körner der ersten Sorte eingebettet sind. Diese Sorte ist oft mit Pflanzenresten, Steinchen, Sand, Haaren vermischt und daher von sehr wechselnder Beschaffenheit. Im allgemeinen wird sie aber des stärkeren Geruches wegen der ersten Sorte vorgezogen.

Eigenschaften. Geruch und Geschmack sehr charakteristisch. Entfernt man das ätherische Oel durch Erhitzen, so tritt ein angenehmer, an *Styrax* erinnernder Geruch auf. Mit 3 Theilen Wasser sorgfältig verrieben, giebt der Asant eine weissliche Emulsion, die durch Zutropfen von Ammoniak oder Natronlauge gelb wird. Koncentrirte Salz- und Salpetersäure färben beim Betupfen die Mandeln malachitgrün. Beim Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure färbt sich die Droge unter Entwicklung von Schwefeldioxyd roth bis rothbraun, mit 15 Th. Wasser verdünnt und mit Kalilauge übersättigt, zeigt sich blaue Fluorescenz. Mit alkoholischer Natronlauge gekocht, färbt sich die Lösung nach dem Abdunsten des Alkohols mit Nitropussidnatrium violett (Schwefelgehalt).

Bestandtheile. Die *Asa foetida amygdaloides* enthält nach POLAŠEK 61,4 Proc. ätherlösliches Harz (Ferulasäure Ester des Asaresinotannols), 0,6 Proc. ätherunlösliches Harz (freies Asaresinotannol), 25,1 Proc. Gummi, 6,7 Proc. ätherisches Oel (cf. pag. 415), 0,06 Vanillin, 1,28 Proc. freie Ferulasäure, 2,36 Proc. Feuchtigkeit, 2,5 Proc. Verunreinigungen.

Der Aschengehalt ist grossen Schwankungen unterworfen, Thränen enthalten nur etwa 0,75 Proc., die Sorte in massis hat bis 14 Proc.

Prüfung hat sich zunächst auf die oben schon angegebenen Merkmale zu erstrecken, ferner auf die Bestimmung des in Alkohol löslichen Theiles, es verlangen Germ über 50 Proc., Helv. 50 Proc., Gall. 66 $\frac{2}{3}$ Proc., Brit. 65 Proc., U.-St. 60 Proc.

Als Höchstgehalt an Asche gestatten Germ 6 Proc., Helv. 6—8, höchstens 10 Proc., Brit. 10 Proc., Austr. 10 Proc. Die Beschaffung einer *Asa in massis* mit nur 6 Proc. Asche scheint Schwierigkeiten zu machen. — Austr. verlangt, dass die Droge mit Salzsäure nicht aufbraust (Verfälschung mit CaCO_3).

Bestimmung der Säurezahl (nach DIETERICH) 1 g der gepulverten Droge übergiesst man mit 10 ccm $\frac{1}{2}$ N. alkoholischer und 10 ccm $\frac{1}{2}$ N. wässriger Kalilauge und lässt verschlossen 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Dann 500 ccm Wasser zusetzen und mit Phenolphthalein und $\frac{1}{2}$ N. Schwefelsäure zurücktitulieren. Die verbrauchten Kubikcentimeter $\text{KOH} \times 28$ geben die Säurezahl. Grenzwerte 68—77,5.

Verseifungszahl 1 g + 30 ccm $\frac{1}{2}$ N. alkoholischer Kalilauge werden 1 Stunde am Rückflusskühler gekocht. Dann mit 200 ccm H_2O verdünnen und mit Phenolphthalein und $\frac{1}{2}$ N. Schwefelsäure zurücktitulieren. Die verbrauchten Kubikcentimeter $\text{KOH} \times 28$ geben die Verseifungszahl. Grenzwerte 121—184.

Restzahl ergibt sich aus der Differenz beider. Grenzwerte 82,2—129.

Verfälschungen und Verunreinigungen kommen vor mit Theilen der Pflanze (speziell der Wurzel), Sand, Steinchen, angeblich auch mit fremden Harzen. Die im Vorstehenden angeführten quantitativen Bestimmungen und die Aschenbestimmung geben darüber Aufschluss.

Reinigung. Helv. lässt die gepulverte Droge durch Absieben von Unreinigkeiten befreien. Gall. schreibt eine mit Alkohol gereinigte *Asa foetida* vor (cf. *Ammoniacum*).

Aufbewahrung. In Blech- oder Thongefässen, am besten über Aetzkalk.

Pulverung. Vorbereitung und Ausföhrung wie bei *Ammoniacum*. Für Asant ist ein besonderes Sieb erforderlich (Austr.), Mörser und dergl. reinigt man mittelst Soda-Lösung. — Nach dem Verfahren von DIETERICH beträgt die Ausbeute 60—65 Proc. Es

empfiehlt sich, für thierarzneiliche Zwecke eine Mischung von gleichen Theilen Asa foetida und Sem foenu graeci vorrathig zu halten

Anwendung. Wird bei Hysterie, Amenorrhoe, Koliken etc angewendet, wahr scheinlich ohne Erfolg

Geruch und Geschmack wird in Mixturen durch wenig Chloroform, in Pillen durch einen Gelatinekübelzug verdeckt Versilberte Pillen werden durch Bildung von Schwefel silber schwarzfleckig Im Handel sind Gelatineperlen mit je 0,1 Asa foetida erhaltlich

Aqua Asae foetidae. (Diet) Asafoetida Oel 1 Tropfen schüttelt man mit heissem, destillirtem Wasser 1000 g

Aqua Asae foetidae composita (Ergänzb) Aqua foetida antihysterica Zu sammengesetztes Asantwasser Prager Wasser Asant, Pfefferminze je 40 Th, Baldrian, Zitwerwurzel je 50 Th, Galbanum, Quendel, Römische Kamillen je 25 Th, Myrrhe 20 Th, Angelikawurzel 13 Th, Kanadisches Bibergeil 8 Th werden grob zerkleinert und mit verdünntem Weingeist 500 Th 24 Stunden bedeckt stehen gelassen, dann Wasser 1000 Th hinzugefügt und abdestillirt 1000 Th (Der Wasserzusatz fällt bei Destillation mittelst Dampfstrom fort)

Elixir foetidum Fulde. Tinctura Castorei thebaica Asant 10 Th, Kanadisches Bibergeil 20 Th, Opium 5 Th, Ammoniakflüssigkeit 5 Th, verdünnter Weingeist 150 Th, durch zweitägiges Digeriren zu bereiten

Liquor antispasticus BENARD Asantinktur 10 Th, Bibergeilinktur, Aether je 5 Th, Safranhaltige Opiuminktur 2,5 Th

Mixtura antispastica REECE. Asantinktur 5 g, Opiuminktur 20 Tropfen, Brech wurzelpulver 0,75 g, Wasser 100 g

Emulsio Asa foetidae; Mixtura Asa foetidae, Emulsion of Asafoetida, Milk of Asafoetida (U-St) Wird wie Emuls Ammoniaci (U-St) bereitet

Pilulae Asae foetidae, Pills of Asafoetida (U-S) Asant 20 g, Seife 6 g, Wasser q s zu 100 Pillen

Oleum Asae foetidae compositum Zusammengesetztes Stinkasant-Oel Keuchhusten-Einreibung Roche's embrocation (Hamburg Vorschr) Asae foetidae grosso pulver, Rad Alkannae grosso pulver ää 50,0 werden mit Olei Olivarum 1800,0 während 8 Tagen digerirt, dann filtrirt und zugesetzt Olei Carvi, Olei Terebinthinae ää 90,0, Olei Pini Pumilionis 12,0, Olei Bergamottae 8,0

Pilulae antihystericae SELLE. Asant, Galbanum, Baldrianextrakt je 4 g, Biber geil, Safran je 1 g, Opium 0,5 g zu 100 Pillen

Pilulae antihystericae SIDENHAM Asant 5 g, Galbanum, Myrrhe je 2,5 g, Biber geil 1,25 g, Baldrianinktur q s zu 100 Pillen, die mit Safranpulver bestreut werden

Pilulae antihystericae s antispasmodicae HEIM Asant 10 g, Eisenpulver 2,5 g, Bibergeil 1,25, Quassiaextrakt q s zu 150 Pillen

Pilulae magneticae Magnetische Pillen Asant, Eisenpulver je 10 g, Kampher, Seife je 1 g, Bertramwurzel 3 g, Weingeist q s Nach eintägigem Stehen formt man Pillen von 0,125 g und versilbert dieselben Bei Ohren-, Kopf- oder Zahnschmerz mit Watte umhüllt ins Ohr zu stecken

Emplastrum Asae foetidae. (Ergänzb) Empl foetidum Empl antihystericum Empl resolverschmucker Stinkasantpflaster Asant 30 Th, Ammoniakgummi 10 Th, Terpentin 20 Th, im Dampfbade geschmolzen und einer halberkalteten Mischung aus gelbem Wachs und Fichtenharz je 20 Th zugefügt

Spiritus Ammoniae foetidus. Fetid Spirit of Ammonia (Brit) Asant 75 g lässt man mit 90 proc Weingeist 750 cem 24 Stunden stehen, destillirt die weingeistigen Theile ab, vermischt mit konz Ammoniakflüssigkeit (spec Gew 0,960) 100 cem und Wein geist q s zu 1000 cem

Tinctura Asae foetidae Asantinktur Asastropfen Habakuktropfen Stinktropfen Tinctur of Asafoetida Teinture d'ase fétide Wie Tinctura Aloës zu bereiten (Ergänzb, Helvet), nach Brit und U-St durch Behandeln von Asant 200 g mit Weingeist von 70 Proc (Brit) oder 90 Proc (U-St) q s zu 1000 cem Tinktur

Tinctura Asae foetidae aetherea wird aus Asant 1 Th und Aetherweingeist 5 Th bereitet

Thierheilmittel

Kolikessenz für Pferde: Bilsenkrautextrakt 8 g, Aloëextrakt 15 g, Wasser 70 g, Wein geist, Asantinktur je 80 g $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel voll in Kamillenthee (Pharm Ztg)

Kolikmixturen, Trakehner Versüßter Salpetergeist, Asantinktur je 5 Th, Aloë extrakt 40 Th, Glycerin, Ricinusöl je 80 Th (Apoth Ztg)

Wurmlatwerge für Pferde Asant 20 Th, Aloë 30 Th, Weizenmehl 50 Th, Wermuth 100 Th, Stearöl, Raimfarnöl je 15 Th Zweistündlich hühnereigross auf die Zunge zu streichen. (Diet)

Blähungsheilmittel, *Liquide météorifuge*, von Gebr MENARD ist Asantinktur mit Salmiakgeist

Pepsin, Kolikmittel für Pferde 1) Eine Bleizuckerlösung in Pfefferminzwasser 10 200 mit einer Spur Opium und Kummelöl 2) Mischung aus Asantinktur 120 Th, Baldrian- und Aloëstinktur je 40 Th Stündlich ein Esslöffel (Pharm Ztg)

Pfeideessenz, *Chinesische*. Eine Mischung von Glaubersalz, Bittersalz, Asant, Kamillen, Pfefferminze, Zittwerwurzel und Wasser

Oleum Asae foetidae Stinkasant-Oel Bei der Destillation der *Asa foetida* erhält man 3—6,7 Proc eines atherischen, höchst unangenehm nach Zwiebeln und Knoblauch riechenden, optisch linksdrehenden Oels Spec Gew 0,975—0,990 Enthält nach SEMMLER zwei Terpene, von denen das eine wahrscheinlich mit Pinen identisch ist Drei Disulfide, $C_7H_{14}S_2$, $C_{11}H_{20}S_2$, $C_{10}H_{18}S_2$ und ausserdem zwei andere Bestandtheile, deren Zusammensetzung durch die Formeln $(C_{10}H_{18}O)_n$ und $C_8H_{10}S_2$ ausgedrückt wird.

Asarum.

Gattung der *Aristolochiaceae*—*Asareae*.

1 Asarum europaeum L Haselwurz. Hasenohrlein. Scheibelkraut Brechwurz. Heimisch in Laubwäldern Europas und Sibiriens

Verwendung findet

Das Rhizom *Rhizoma Asari*. *Radix Asari* (Ergänzb) *Radix Nardi rusticae seu silyestris*. *Racine de cabaret* (Gall) Haselwort. *Asara-back root*

Beschreibung. Unregelmässig vierkantig, gegliedert, astig, besonders an der Unterseite bewurzelt, aussen graubraun Auf dem Querschnitt eine dicke Rinde und ein kleiner Holzkörper, mit etwa 12 durch breite Markstrahlen getrennten Gefässbündeln und Mark Im Parenchym Oelzellen Starkekörnchen einzeln oder bis zu vier zusammengesetzt, in der Droge häufig verkleinert Die trockene Droge enthält häufig noch die langgestalten, nierenförmigen Laubblätter Geschmack scharf gewürzhalt, an Kampher erinnernd

Bestandtheile In der trockenen Droge 1 Proc ätherisches Oel, vom spec Gew 1,018—1,07 Das darin enthaltene Asaron findet sich zu 1 Proc auch sonst in der Pflanze (cf pag 416)

Einsammlung. Die im ersten Frühjahr oder im August gesammelte Wurzel wird, bei sehr gelinder Wärme getrocknet, in Blech- oder Glasgefassen aufbewahrt 9 Th frische Wurzel geben 2 Th trockene

Anwendung Erzeugt Erbrechen und Durchfall, soll, dem Branntwein zugesetzt, Skufen dessen Genuss vermeiden Aeusserlich wirkt es reizend, daher auf die Schleimhaut der Nase gebracht, Niesen erregend Wenig gebraucht Dosis als Niesepulver 0,1—0,2, als Brechmittel 0,5—1,0 im Infusum — In Frankreich werden auch die viel weniger wirksamen *Folia Asari* verwendet

Tinctura Asari wird wie *Tinct Abanthi* bereitet GÜNTHER'S Mittel gegen die Trunksucht ist ein wengeistiger Auszug aus Haselwurz und Cascarrillrinde

Elixir antasthmaticum Boerhave. Haselwurz 2 Th, Alant, Kalmus, Veilchenwurzel, Süssholzwass je 10 Th, Ams 5 Th, Kampher 0,3 Th, verdünnter Weingeist 300 Th

Pulvis sternutatorius Schneebergensis Schneeberger Haupt- und Schnupfpulver, Schneeberger Schnupftabak Haselwurz 20 g, Maiblumenblüthen 5 g, Nieswurz 2 g, Veilchenwurzel 50 g, Bergamottöl 15 Tropfen — Die giftige Nieswurz lässt sich (n Diet) durch Seifenpulver ersetzen

Saint-Angé's Hauptpulver (*Poudre capitale de S. A*) ist ein Niesepulver aus Haselwurz, Nieswurz, Raute, Majoran und Betonienblättern

Pulvis errhinus Hedenius Kalomel 1 Th, Majoran, Haselwurz, Zucker je 2 Th
Pulvis sternutatorius (Gall) Besteht aus den Blättern von *Asarum* *Betonica* Majoran und den Blüten der *Convallaria*




Fig 114 Querschnitt durch das Rhizom von *Asarum europaeum* 8 mal vergrössert *h* Rinde *m* Mark

II Asarum canadense L. und Asarum arifolium Michx. Canada snake root Wild Ginger Heimisch im atlantischen Nordamerika Das Rhizom wird wie das der vorigen Art benutzt, scheint aber milder in der Wirkung zu sein, man setzt es dem Wein zu, um dessen Wohlgeschmack zu erhöhen, verwendet es auch in der Hauswirtschaft als Gewürz Das Rhizom ist dicker, harter und dunkler wie das vorige

Bestandtheile. Enthält 2,5—4,5 Proc ätherisches Oel vom spec Gew 0,93—0,96 Es enthält Pinen, Asarol (Linalool?), Essigsäure und Valeriansäureester des Asarols, Methylengenol

Tinctura Asari canadensis. Durch Digestion aus 1 Th des Rhizoms und 5 Th verdünntem Alkohol

Extractum Asari canadensis fluidum. Aus 100 Th Rhizom, 50 Th Glycerin und 250 Th Alkohol (spec Gew 0,838) durch Digestion, Auspressen, Filtriren, Abdampfen bis auf 105 Th Rückstand, dann absetzen lassen und 100 Th abgessen Wohl besser durch Percolation zu bereiten

Sirupus Asari canadensis. Durch Mischen aus 5 Th Fluidextrakt und 95 Th Sirupus Sacchari

III Asarum Sieboldi Miq. 10—sai—shin. In Japan Wird ähnlich wie die vorigen verwendet

Oleum Asari europaei. Die Asarumwurzel enthält etwa 1 Proc ätherisches Oel, von dunkler Farbe, aromatischem Geruch und pfefferartig brennendem Geschmack Spec Gew 1,018—1,068 Beim Stehen scheiden sich aus dem Oele häufig harte Krystalle von Asaron ab Asaron krystallin monoklin, schmilzt bei 57° C und siedet bei 296° C Es ist seiner chemischen Konstitution nach ein Oxyhydrochinonderivat der Formel $C_{12}H_8(C_2H_5)[1]-(OCH_3)[3]-(OCH_3)[4]-(OCH_3)[6]$ Ausserdem enthält das Asarumöl Links Pinen $C_{10}H_{16}$ und Methylengenol $C_{11}H_{14}O_2$

Wichtig für die Parfümerie ist das in Nordamerika viel gebrauchte, wohlriechende Oel der Wurzel von *Asarum canadense* L. Es hat das spec Gew 0,93—0,96 und enthält nach Power Pinen, Asarol(=Linalool?) frei und als Ester der Essigsäure und Valeriansäure und Methylengenol.

Asellus.

Gadus Morhua L., *Morhua vulgaris* Cloquet, der Kabliau, aus der Abtheilung der Weichflosser (Anacanthini) und der Familie der Schellfische *Gadus Callarias* L., der „gewöhnliche Dorsch“ ist eine kleinere Varietät dieser Art des Kabliau. Be wohnen die nördlichen Theile des atlantischen Oceans zwischen dem 40° und 75° nördlicher Breite

1. Oleum Jecoris Aselli (Austr Germ Helv) **Oleum Morhuae** (Brit U-St) **Oleum Jecoris Gadi** Stockfischleberthran. Leberthran. Huile de foie de morue (Gall) Cod-liver-oil. Ist das flüssige Fett aus den Lebern oben genannter Fische

Gewinnung. Die Gewinnung des Leberthrans wird im grossen Maassstabe auf der Inselgruppe der Lofoten, in Bergen in Norwegen, feiner in Neufundland und auch in Newhaven (Schottland) betrieben Sie ist nicht überall die gleiche, im grossen und ganzen aber wird wie folgt verfahren

Man sammelt in grossen Behältern, welche oft bis zu 100 Tonnen Raum haben, die ungereinigten Lebern mit den Gallenblasen. Der freiwillig aus den Lebern ausfliessende Thran wird abgeschöpft und in anderen Behältern zum Absetzen gebracht. Die so gewonnenen, ersten Antheile sind verhältnissmässig hell. Wenn später die Lebermasse in Faulnuss gerath, fällt das Oel natürlich dunkler aus. Sobald freiwillig kein Thran mehr aus den Lebern austritt, werden die Rückstände mit Wasser ausgekocht und der Thran durch Pressen abgeschieden, oder man gewinnt die letzten Antheile durch Ausbraten und Auspressen. Die so gewonnenen Sorten heissen „naturelle Thrane“, ihre Färbung wechselt von hellgelb bis dunkelbraun. Diese Thrane sollen therapeutisch nicht verwendet werden

Dampfthran Die Gewinnung dieser Sorten erfolgt direkt auf den Schleifen, welche für diesen Zweck mit besonderen Einrichtungen ausgerüstet sind. Unmittelbar nach dem Fange der Fische werden die Lebern herausgenommen, von den Gallenblasen und etwaigen kranken Theilen gesondert, durch Waschen mit Wasser gereinigt, zerkleinert und nun in Kesseln, welche durch Dampf geheizt sind (Brit verlangt, dass die Erhitzung nicht über $82,2^{\circ}\text{C}$ hinausgeht) erhitzt. Der ausfliessende Thran wird abgeschöpft, durch Absetzen geklärt, alsdann durch Ausfrieren bei -5 bis -10°C von festen Glyceriden befreit, filtrirt und sofort in Kanister verpackt.

Um einen besonders haltbaren Thran zu gewinnen, schliesst Peter MOELLER neuerdings die Einwirkung der Luft während der Gewinnung des Thrans aus, indem er das Ausschmelzen im luftverdünnten Raume oder bei Gegenwart eines indifferenten Gases (Kohlensäure) vor sich gehen lässt. Es soll unter diesen Umständen eine Oxydation der „Therapinsäure und Jecoleinsäure“ zu Oxyfettsäuren vermieden werden.

Handelssorten Im Handel unterscheidet man gegenwärtig die Hauptsorten Natursellen Thran und Dampfthran. Jede dieser Sorten wird nun je nach ihrer Färbung noch besonders bezeichnet z. B. als „Dampfthran weiss, hellblond, gelb“, ferner „Natureller Thran blond, gelb, hellbraun, braun“. Ausserdem aber kommt in Betracht, wie der Geschmack einer Thransorte ist, und aus diesem Grunde sollte der Apotheker stets nach Muster kaufen und die Muster sorgfältig auf den Geschmack prüfen. Als die auf dem europäischen Kontinent bevorzugte Sorte gilt der norwegische Leberthran, andere Sorten, z. B. der Neufundländer oder Labrador-Leberthran haben nur untergeordnete Bedeutung, sie unterscheiden sich von dem norwegischen Thrane lediglich dadurch, dass sie schon bei $+7$ bis $+5^{\circ}\text{C}$ feste Fette absetzen. BASCHIN'scher Leberthran, der JONAS'scher Leberthran sind nichts anderes als normale, aber zu hohen Preisen verkaufte Sorten Leberthran.

Eigenschaften. Ein hellgelbes, eigenthümlich, aber nicht widerlich riechendes und schmeckendes Oel. Das spec. Gew. schwankt von 0,920—0,930. Es geben an Brit. 0,920—0,930, Helv. 0,926—0,931, U-St. 0,920—0,925, doch sind diese Schwankungen leicht zu erklären. Die Verseifungszahl wird zu 170—195, die Jodzahl von 123—144 angegeben. FAHMY giebt neuerdings die Jodzahl bis zu 166 an.

Leberthran gehört zu den trocknenden Oelen. Bei der Elaidinprobe giebt er keine Ausscheidung von festem Elaidin, die Elaidinprobe ist hier mit Kupfer und Salpetersäure auszuführen s. Olea. Er ist ferner ein ziemlich schwer verseifbares Fett. — Unmittelbar nach der Darstellung soll der Leberthran neutral sein, d. h. freie Fettsäuren nicht enthalten. Die im Handel befindlichen Thrane enthalten aber durchweg grössere oder geringere Mengen freier Fettsäuren und zwar um so mehr, je geringere Sorgfalt bei der Bereitung angewendet wurde. Bei den medicinalen Sorten sind zur Sättigung der vorhandenen freien Fettsäuren, für 1 g Leberthran = 0,5—3,0 Milligramme KOH erforderlich, bei den natürlichen Sorten steigt dieser Verbrauch bis auf 6,0—23,0 Milligramme und darüber.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach enthält der Leberthran etwa 70 Proc. Oelsäure-Glycerid, 25 Proc. Palmitinsäure-Glycerid, kleine Mengen Stearinsäure-Glycerid, ausserdem Glyceride niedriger Fettsäuren (Essigsäure, Buttersäure, Valeriansäure, Caprinsäure). Ausserdem Cholesterin, 0,002—0,008 Proc. Jod, ausserdem Chlor, Brom, Schwefel, Phosphor, Eisen in organischer Bindung, ferner Basen: Ammoniak, Trimethylamin, Butylamin, Amylamin, Hexylamin und als charakteristische Basen Asellin $\text{C}_{25}\text{H}_{34}\text{N}_4$, Morrhuin $\text{C}_{19}\text{H}_{27}\text{N}_3$. Ausserdem werden folgende charakteristische Säuren angeführt: Asellinsäure $\text{C}_{17}\text{H}_{22}\text{O}_2$, Jecorinsäure $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_2$, Morrhuinsäure $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{NO}_2$, Therapinsäure $\text{C}_{17}\text{H}_{22}\text{O}_2$ und Jecoleinsäure $\text{C}_{19}\text{H}_{28}\text{O}_4$.

Endlich sind eigenthümliche, mit conc. Schwefelsäure sich blau färbende Farbstoffe — Lipochrome — zugegen, welche als besonders charakteristische Bestandtheile angesehen werden können.

Prüfung. Guter Leberthran ist hellgelb, klar und blank und schmeckt zwar fischig, aber nicht widerlich und hintennach kratzend und ranzig, anderenfalls ist er eben

ranzig Zur Sättigung der freien Fettsäuren sollen für 1 g Leberthran nicht mehr als 8 Milligramme Kalihydrat erforderlich sein 1) Löst man 1 Tropfen Leberthran in 20 Tropfen Schwefelkohlenstoff oder Chloroform und fügt 1 Tropfen conc Schwefelsäure hinzu, so färbt sich die Mischung zunächst violett, dann purpurfarbig, braunroth, dunkelbraun (Reaktion des Lipochroms und Cholesterins) Tritt diese Reaction nicht ein, so liegt überhaupt kein Leberthran vor 2) Man stellt etwa 15 cm Leberthran in einem Probirrohr in klein geschlagenes Eis Es dürfen sich nur wenig oder gar keine festen Fette abscheiden Gute norwegische Medicinal-Thrane scheiden unter diesen Umständen wenig oder gar keine festen Fette ab, Labrador Thran, neufundländischer Thran und die unten zu besprechenden fremden Thranarten scheiden erheblich mehr feste Fette ab 3) 5 g Thran werden mit alkoholischer Natronlauge (nicht Kalilauge!) verseift, man trocknet die Seife mit kalkfreiem Sande völlig ein und extrahirt den Rückstand mit Chloroform Nach Abdestilliren des letzteren hinterbleibt etwa gegenwärtiges Paraffin, welches durch Bestimmung der Verseifungszahl (s Olea) näher zu kennzeichnen ist — Auf nicht trocknende fremde Oele (z B Rüßöl, Specköl, Baumwollsamööl, Olivenöl, Sesamöl etc) wurde durch die Elaidinprobe zu prüfen sein Man bringt in ein Probirglas je 5 cm Leberthran und reine Salpetersäure (25 Proc) sowie einige Kupferschmelze, schüttelt gut durcheinander und lässt stehen Auch nach 6—10 Stunden dürfen sich keine festen Abscheidungen zeigen 4) Unterscheidung von fremden Thranen nach KREMER Pharm Centr-Halle 1884, 337 Bringt man 10—15 Tropfen Leberthran auf eine Porcellanschale und setzt 3—5 Tropfen rauchender Salpetersäure (1,50 spec Gew) hinzu, so tritt bei echtem Dorschleberthran an der Berührungsstelle eine rothe Färbung auf, die beim Umrühren mittels Glasstabes durch die ganze Masse in Feurigroth übergeht, um schliesslich in kurzer Zeit rein citronengelb zu werden — Bei Sejfischthran wird die Einlaufstelle blau, beim Umrühren der Mischung braun und erst nach 2—3 Stunden gelb, ähnlich verhält sich japanischer Thran Robbenthran wird durch die Säure anfangs in seiner Farbe nicht beeinflusst und erst nach längerer Zeit braun

Aufbewahrung Leberthran gehört zu den trocknenden Oelen Er nimmt aus der Luft Sauerstoff auf und wird ranzig Man bewahre ihn daher in nicht zu grossen, aber möglichst gefüllten Flaschen an einem kühlen Orte, vor Licht geschützt auf Bezieht man ihn in Originalfassern, so lässt man diese an einem kühlen Ort 3—4 Wochen ablagern und zieht dann den Thran in die Standgefässe ab, welche völlig gefüllt und mit neuen Korkstopfen geschlossen werden Man fülle niemals frischen Thran zu alten Resten Die Reinigung der Thranstandgefässe erfolgt am leichtesten mit conc Schwefelsäure Etwa notwendige Filtration des Thranes beschleunige man nach Möglichkeit

Anwendung Die Ansicht, dass der Heilwerth des Leberthrans auf seinem Gehalte an Jod beruht, ist zur Zeit aufgegeben worden Vielmehr dürfte derselbe darauf zurückzuführen sein, dass der Leberthran ein Fett ist, welches gut resorbirt und selbst von Kindern und schwächlichen Personen gut vertragen wird, ohne Durchfälle oder sonstige Störungen zu verursachen Die leichte Resorbirbarkeit des Leberthranes dürfte in letzter Instanz nicht auf dessen Säuregehalt zurückzuführen, sondern eine spezifische Eigenschaft des Thranes selbst sein — Man giebt ihn bei den verschiedensten Krankheiten als ein die Ernährung des Körpers unterstützendes, daher den Kräftezustand hebendes Mittel, in der Regel morgens und abends in Mengen von 1 Theelöffel bis 2 Esslöffel Die braunen Sorten werden in den Gewerben zur Herstellung von Schmierseife, zum Einfetten des Leders (Stiefelschmiere) und in der Samisch Gerberei verwendet

Sey-Thran. Seyfischthran *Oleum Jacoris Merlangi* Huile de foie de Merlan Coal-fish oil Das aus den Lebern des Sey Fisches, *Gadus carbonarius* L (*Merlangus carbonarius* Cuv) gewonnene flüssige Fett Der blanke Sey-Thran ist heller als der blanke Dorsch-Thran Spec Gew = 0,927 Bei 0° wird der Thran steif und körnig

Haifisch-Thran. *Oleum Squali* Huile de Selache (ou de Requin) Shark oil Wird aus den Lebern verschiedener Haie dargestellt Hellgelbes, klares, eigenartig aber nicht widerlich riechendes, dagegen stark kratzendes Oel Löslich in 10 Th Alkohol bleibt bei —8° C noch klar Spec Gew sehr niedrig 0,870—0,875 bei 15° C

Robbenthran *Oleum Phocae* Huile de phoque Seal oil Dog fish oil
Von verschiedenen Robbenarten Gelbes, unangenehm riechendes Oel, spec Gew 0,915
bis 0,925 Cornesin wird ein besonders geeigneter Robbenthran genannt

Japanischer Thran stammt von verschiedenen, nicht näher bekannten Fischarten
ab und wechselt in Eigenschaften und Zusammensetzung

Butyromel, Ersatz des Leberthrans Eine Emulsion aus 2 Th ungesalzener Butter
und 1 Th Honig

Jecorin, Leberthran-Ersatz des Apothekers BERKENHEIMER in Diedenhofen, enthält in
20 g Calciu chlorhydrophosphoricu, Calciu lactophosphoricu ää 0,1 g, Acidi lactici 0,05 g,
Acidi phosphoricu 0,6 g, Bromi 0,01, Jodi 0,01 g, Ferri jodati 0,075 g, Extractu Artemisiae
comp 1,0 Als Vehikel bezw Korrigentien Frucht- und Pflanzensaft

Lipamin, durch von MERRING als Ersatz des Leberthrans empfohlen, besteht aus
Olivenöl mit einem Zusatz von rund 6 Proc reiner Oelsäure

Morrhual (Gaduol) Ein von CHAPEAUTEAUT mit Weingeist hergestellter Auszug
aus Leberthran, welcher die wirksamen Bestandtheile desselben enthalten soll Man extra-
hirt Leberthran mit Alkohol von 90 Proc, filtrirt den Auszug und zieht durch Destillation
den Alkohol ab Im Rückstande verbleiben 2—6 Proc eines scharf und bitter schmeckenden
und widerlich riechenden Oeles Dies ist das Morrhual Anwendung namentlich in den
romanischen Ländern zu 0,2 g in Gelatinekapseln Eine Kapsel soll = 5 g Leberthran
entsprechen

SCOTT'S Emulsion enthält (nach Herb) Ol Jecoris 42, Glycerin 16, Calcium hypo-
phosphorus 1,2, Natr hypophosphorus 0,6 in 100 Th

SPEANOE'Sche Salbe. Besteht aus Harz, Olivenöl, Leberthran, Kampher

Terrol der Terrol-Co in London, Leberthran Ersatz Doch wohl nur für technische
Zwecke! Sirupdicke Flüssigkeit, ein Destillat des Petroleums

II Fischthran *Gewöhnlicher Thran* *Oleum piscium* *Oleum ceti* Wird
durch Ausschmelzen des Speckes bez Fettes verschiedener See-Säugethiere (Waltherie,
Robben, Walrosse, Seehunde u a) und Fische (Haifisch, Pottfisch) gewonnen Er ist je
nach Herkunft und Gewinnung von ziemlich verschiedener Beschaffenheit, gewöhnlich ein
dunkles, widerlich riechendes Oel vom spec Gew 0,920—0,935, in der Kalte starke Boden-
satze bildend, von stark saurer Reaktion

Es verliert nach 5stündigem Trocknen nicht merklich an Gewicht (Wasser), — 1 g
hinterlasse beim Verbrennen keinen wägbaren Rückstand (Abwesenheit von Seifen) Auf
Paraffinol oder Harzöl prüft man durch Verseifen von 5 g des Thrans mit alkoholischer
Natronlauge Die Seife muss nach dem Verjagen des Alkohols in Wasser klar löslich sein
Oder man prüft in der bei *Oleum Jecoris* angegebenen Weise durch Extraktion der mit
Sand eingetrockneten Natronseife mittels Chloroform Verwendung in den Gewerben wie
die braunen Sorten Leberthran

III Abfall-Thran Bei der Konservirung der Heringe, Sardellen und Sardinen etc
ergeben sich grosse Mengen von Abfällen (Kopf, Eingeweide) Man kocht diese aus und
schöpft das sich abscheidende Fett ab Da die Abfälle meist schon in Fäulniss überge-
gangen sind, so ist auch dieser Thran von brauner Farbe, saurer Reaktion und wider-
lichem Geruch und Geschmack, übrigens von wechselnden Eigenschaften Verwendung in
den Gewerben wie der braune Leberthran

Balneum cum Oleo Jecoris Aselli

Einem warmen Vollbade von 200 Litern Wasser,
worin 340 g krystallisirtes Natriumcarbonat ge-
löst sind, wird ein heftig durchschütteltes Gemisch
von 50,0 g krystallisirtem Natriumcarbonat,
500,0 g warmem Wasser und 250,0 g Leberthran
zugesetzt

Mixtura pectoralis RAYER

**Mixtura (Emulsio) Olei Jecoris Aselli
composita.**

Rp Olei Jecoris Aselli 100,0
Gummi arabici 20,0
Aque distillatae 70,0

Mixtura emulsae adde

Sirupi opiat 70,0

Morgens, mittags und abends von der umgeschütt-
elten Mischung je 1½ Esslöffel zu nehmen (bei

chronischer Pneumonie Sollte der Magen die
angegebene Dosis nicht vertragen, so giebt man
jeder Dosis 4—5 Tropfen Opiumtinktur hinzu)

Oleum Jecoris desinfectum
CARLO PAVESI

Rp Olei Jecoris Aselli 1000,0
Seminis Coffeae tostae tritae 50,0
Carbonis osseum 25,0

Man erhitzt zunächst 1—2 Stunden im Dampfbade,
lässt alsdann 3 Tage an einem warmen Orte ab-
setzen und filtrirt. Besitzt kaffeeähnlichen Ge-
schmack.

Oleum Jecoris Aselli aromaticum

Auf 100 g Leberthran giebt man 8—4 Tropfen
einer Mischung aus Wintergrün Oel 4 Th,
Esssafran-Oel, Citronen Oel je 2 Th, Neroli-Oel
1 Th

Oleum Jecoris aromaticum dulcificatum

Bad. Taxe

Rp	Saccharum	1,0
	Alcohol absoluti	5,0
	Olei Jecoris	990,0
	Olei Cinnamomi	1,0

Oleum Jecoris dulcificatum
(Münch. Ap.-V.)

Rp	Saccharum	0,5
	Vanillinum	0,1
	Alcohol absoluti	20,0
	Olei Jecoris	980,0
	Olei Cinnamomi Ceylanici gtt. X.	

Oleum Jecoris dulcificatum
Nach Dr. Eisensohn

Rp	1 Saccharum	2,0
	2 Aetheris scetici	2,0
	3 Olei Jecoris	100,0
	4 Olei Menthae pip. gtt. 2	

(vel Olei Cassiae gtt. 1½, vel Eidebenäther 2,0 g)
Man löst 1 in 2, vermischt mit 8 und setzt schlie-
lich 4 zu.

Oleum Jecoris Aselli ferratum (Ergänzb.,
Hamburg V.)

Rp	Ferr. benzoici	1,0
	Olei Jecoris	100,0

Man verreibt das Ferribenzoat mit dem Leberthran
und erwärmt gelinde bis zur Auflösung

Oleum Jecoris Ferro Jodatum (Bad. Taxe,
Münch. Ap.-V.)

Rp	1 Olei Jecoris	100,0
	2 Jodi	1,7
	3 Ferr. pulverati	1,0
	4 Olei Jecoris	900,0

Man löst 2 durch Anreiben mit 1, schüttelt mit
3, bis das freie Jod verschwunden ist, läßt ab-
setzen, filtrirt und setzt 4 zu

Oleum Jecoris jodatum (Ergänzb. Helv.,
Hamburg V.)

Rp	Jodi	1,0
	Olei Jecoris	1000,0

Durch Anreiben zu lösen. Die Helv. löst 1 Th.
Jod in 2 Th. Chloroform lösen und 1000 Th. Leber-
thran zusetzen.

Emulsio Olei Jecoris Aselli composita
(Form. Americ.)

Rp	Olei Jecoris Aselli	384 cem
	Vitell. ovorum No. XII	
	Kreosoti	22 "
	Emuls. Amygdal. dulc. (e 40,0)	100 "
	Aquae Vitae	150 "
	Liquor. Ferri peptonati	100 "
	Olei Amygdal. amar. aeth.	
	Olei Citri	aa guttae X
	Sirup. simpliciter	q s ad 1000 "

Dosis 1—4 Theelöffel

Oleum Jecoris jodoferratum

Jodeisenleberthran (Hamburg V.)

Rp	Jodi	8,0
	Olei Jecoris	1000,0
	Ferr. pulverati	10,0

Im Uebrigen wie das Präparat der Badischen Taxe
zu bereiten.

Oleum Jecoris Aselli phosphoratum
(Münch. Apoth.-Veren.)

Rp	1 Phosphori	0,1
	2 Olei Olivarum	10,0
	3 Olei Jecoris Aselli	980,0

1 wird gut abgetrocknet unter Erwärmen in 2 ge-
set und mit 3 vermischt

Oleum Jecoris gelatinatum

Rp	1 Gelatinae albae	5,0
	2 Aquae destillatae	
	3 Sirup. Sacchari	aa 80,0
	4 Olei Jecoris	60,0
	5 Tincturae aromatica	1,5

Man löst 1 in 2 und 3, rührt 4, zum Schluß 5
hinzu und giest in abgekühlte Formen (Tran-
sglas oder dergl.) aus

Leberthran GlicaeCrème d'huile de foie de morue
von N. JOLLY

460 Th. Leberthran, 150 Th. Zucker und 300 Th.
Eiweiß zur Emulsion zusammengesetzt und durch
eine warme Gelatine aus Gelsee bereitet steif
gemacht (Eine Glasflasche mit 330,0 des Gelsee's
— 4 Frances)

Oleum Jecoris Aselli solidificatum

Rp	Olei Jecoris Aselli	85,0
	Glucose	15,0

Durch Zusammenschmelzen zu vereinigen.

Pasta cum Oleo Jecoris Aselli

300 Th. gestossener Zucker werden mit 50 Th. Leber-
thran zusammengerieben, mit einer heissen Lösung
von 10 Th. Gelatine in 30 Th. Wasser unter Reiben
in einem erwärmten Möser gemischt, und die
Masse in Kapseln aus paraffinirtem Papier aus-
gebreitet und erkalten gelassen

Sapo calcideus Olei Jecoris

VAN DEN CORPUT

Rp	Calcaiae recens ustae	60,0
	Aquae fervidae	150,0

Zu der entstandenen Kalkmilch bringt man eine
durch Schütteln eizelte Mischung von
Olei Jecoris Aselli 70,0
Aquae destillatae 80,0

Man kocht bis zur Verseifung, wäscht die Seife
mit Wasser ab und trocknet sie an einem warmen
Orte. Dann formt man daraus unter Zusatz von
Olei Anisi stellata 1,0
Bissen (bol.) von 0,3 g Gewicht.

Sapo Olei Jecoris Aselli

Rp	Olei Jecoris Aselli	125,0
	Sabi. taurini	80,0
	Olei Coccol	50,0

Man schmilzt und führt dem auf 20°C erkalteten
Fettgemisch hinzu

Liquoris Natru caustici (1,866—1,870)	100,0
Liquoris Kali caustici (1,33)	10,0

Die Verseifung erfolgt auf kaltem Wege. Wasch-
mittel bei Hautaffektionen

Sirupus Olei Jecoris Aselli

Rp	Olei Jecoris Aselli	10,0
	Gummi arabici	20,0
	Aquae Menthae piperitae	80,0

Der Emulsion wird zugesetzt

Sirup. Sacchari	110,0
Aquae Amygdalarum amararum	1,0

DUCLOUX's Sirup ist zusammengesetzt aus 25,0
Leberthran, 15,0 Arabischem Gummi 37,5 Wasser,
12,5 Zuckerstrup und 70,0 Zucker

Pileles d'huile de foie de Morue

Rp	Olei Jecoris optimi	500,0
	Calcaiae ustae	50,0
	Aquae fontanae	q s

Man verseift das Oel mittelst der Kalkmilch und
formt aus der plasteartigen Masse Pillen
von 0,2—0,3—0,4 g, die man mit Magnesia car-
bonica bestreut

Asparagus.

Gattung der Liliaceae — Asparagoideae.

I Asparagus officinalis L. Spargel, Spars etc. Schwammwurz. Heimisch in Europa und dem westlichen Asien, häufig kultivirt

Verwendung finden a) Die unterirdischen Sprosse, **Tubiones Asparagi juniores. Tubions d'Aspeige** (Gall), das bekannte Gemüse. Bildet dickfleischige Achsen mit spiralig gestellten Niederblättern. Man unterscheidet zwei Spielarten mit weissen und mit grünen Sprossen.

Bestandtheile. 93,75 Proc Wasser, 1,79 Proc Stickstoffsubstanz, 0,25 Proc Fett, 0,37 Proc Zucker, 0,54 Proc Asche etc. In der Trockensubstanz 34,47 Proc Gesamtprotein und 5,01 Proc Amidverbindungen (vorwiegend Asparagin).

Wirkung. Stark diuretisch. Der Urin hat nach dem Genuss einen unangenehmen Geruch von Zersetzungsprodukten des Asparagins.

b) Das Rhizom mit den Wurzeln, **Rhizoma Asparagi, Radix Asparagi, Radix Altiels, Racine d'Aspeige.**

Das fingerdicke, horizontal verlaufende Rhizom, oben mit Stengelnarben, unten mit schmutzig weissen Wurzeln. Frisch ist es weisslich, saftig, trocken hart und grau. Schmeckt fade, süsslich. Enthält kein Asparagin und keine Stärke. Wird im Herbst gesammelt.

Sirupus Asparagi. Von dem frischen Saft der Spargelsprossen werden 10 Th mit 3 Th Weingeist versetzt, nach einigen Tagen filtrirt und 10 Th des Filtrats mit 17 Th Zucker zum Sirup gekocht.

Sirupus Asparagi amari, Sirop de Johnson, aus den Sprossen von *Asparagus amarus*, wie der vorige zu bereiten.

Sirupus Asparagini (Vorschr. d. Münch. Ap. Ver.) Asparagin 2 Th löst man in Weissm. Sirup 98 Th.

II In Indien wird das Rhizom von *Asparagus adscendens* Roxb. wie Salep verwendet, auf Formosa das von *Asparagus lucidus* Ldl. als Diureticum.

Asparaginum Asparamid. Links-Asparagin. Amidobornsteinsäureamin-säure. Althaein $C_2H_3(NH_2)CO_2H \cdot CONH_2 + H_2O$ Mol. Gew. = 150.

Kommt in vielen Pflanzentheilen, namentlich in solchen vor, die sich im Dunkeln entwickelt haben, z. B. Spargelsprossen, Süssholz-, Althaeawurzel, Runkelrüben, in im Dunkeln etiolirten Keimen der Leguminosen.

Zur Darstellung zieht man Althaeawurzel wiederholt mit kaltem Wasser aus und concentrirt die Auszüge durch Eindampfen zum dünnen Sirup. Nach mehrwöchentlichem Stehen scheidet sich das Asparagin in Krystallen aus, welche durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Benutzung von Thierkohle gereinigt werden.

Grosse harte, spröde, rhombische Krystalle, geruchlos, luftbeständig, zwischen den Zähnen knirschend. Bei 100° C. werden sie wasserfrei. Löslich in 60 Th. kaltem oder 5 Th. siedendem Wasser, unlöslich in absolutem Alkohol, in Aether, in fetten und flüchtigen Ölen. Die wässrige neutrale oder alkalische Lösung ist linksdrehend, die saure Lösung rechtsdrehend. Es verbindet sich mit Säuren, Basen und mit Salzen. Es löst Quecksilberoxyd auf. **S Hydrargyrum asparaginum.**

Im Pflanzenreich gilt das Asparagin für eine Verbindung, in deren Form der Eiweissstickstoff in der Pflanze wandert. Man nimmt an, dass Eiweiss in Asparagin und Kohlehydrate gespalten wird, und dass das an andere Stellen gewanderte Asparagin sich mit Kohlehydraten wieder zu Eiweiss verbindet. — Bei der Ernährung des thierischen Körpers kann das Asparagin das Eiweiss zwar nicht ersetzen, aber es gilt — ebenso wie Leim — als „Eiweiss-Sparrer“.

Asperula.

Gattung der Rubiaceae—Coffeoidae—Galiceae.

Asperula odorata L. (Waldmeister. Steinkraut. Herzfreude. Sternleberkraut. Meserig). Heumisch in Wäldern von Nordafrika bis 66° nördl Br von Mitteleuropa bis Persien und Sibirien

Pharmaceutische Verwendung findet das blühende Kraut *Herba Asperulae* Hb cordialis. Hb Hepaticae stellatae. Hb. Matrisilviae. Meeskenkraut. *Asperule* Muguet des bois Wood-root Wood-ward.

Beschreibung Stengel bis 30 cm hoch, vierkantig, an den Knoten borstig, die länglich lanzettlichen, stachelspitzigen, gewimperten, bis 4 cm langen, etwa 6 mm breiten Blätter stehen unten in 6zahligen, oben in 8zahligen Wirteln. Blüten weiss, trichterförmig, vielzählig, in Trugdolden. Riecht, besonders trocken, nach Cumarin

Bestandtheile. Cumarin und Aspertansäure $C_7H_5O_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$

Einsammlung Aufbewahrung Das im Mai und Juni gesammelte, blühende Kraut wird in Bündelchen an der Luft getrocknet und in Blechgefässen aufbewahrt. Es wird nur noch selten im Handverkauf zu Theemischungen verlangt

Verwechsehung Das Kraut von *Galium silvaticum* L., das viel zarter und hüfälliger ist, nicht nach Cumarin riecht und von blaugrüner Farbe ist

Herba Asperulae recens Frischer Waldmeister, das im Frühling vor dem Aufblühen gesammelte Kraut, dient zur Bereitung des Matrankes und einer Essenz, bisweilen auch zur Wurze von Bier und Kase

Essentia Asperulae Ess Vini majalis Matrankessenz, Waldmeisteressenz Frischer Waldmeister 250 g wird mit Weingeist von 40 Proc q s zu 1 l ausgezogen, nach acht Tagen ohne Pressung abfiltrirt und Limonadenessenz (s unter Citrus) 50 g zugefügt. Der Waldmeister lässt sich durch Cumarin 5 g ersetzen (Buchh.) 2–3 Theelöffel hiervon liefern mit 6 Flaschen Weisswein, 500 g Zucker, 1 Flasche Schaumwein eine sehr gute Matwein Bowle

Essentia Asperulae artificialis (Diet) Cumarin 0,1 g, Citronensäure 5 g, Grüner Thee 10 g, Verdünnter Weingeist 100 g, man lässt 3 Tage stehen, filtrirt und setzt zu Süss-Pomeranzenöl, Bitter-Pomeranzenöl je 0,5 g, Blattgrün q s $\frac{1}{2}$ Kaffeelöffel hiervon nebst 75 g Zucker, $\frac{1}{2}$ Weinglas voll Selterswasser und 1 Flasche leichtem Weisswein giebt einen tadellosen Matrank

Essentia Asperulae saccharata Matwein-Extrakt Waldmeister Extrakt (Diet) Matrankessenz 2 g, Weingeist 8 g, Wasser Sirup 110 g Auf eine Flasche Weisswein

Tinctura Asperulae. Waldmeister-tinktur Frischen, im steinernen Mörser zerstampften Waldmeister 100 Th zieht man mit Weingeist 120 Th eine Stunde lang aus, presst und filtrirt nach einigen Tagen Zum Ersatz des frischen Krautes

Asphaltum.

Unter „Asphalt“ werden emander zwar nahestehende, aber schliesslich doch sehr verschiedene, Bitumen enthaltende Naturprodukte verstanden. Wir theilen dieselben ein in die drei Gruppen 1) reine Asphalte, 2) Roh-Asphalte, 3) Asphaltsteine

1 **Asphaltum.** Reiner Asphalt Bitumen Judaicum Schwarzer Bernstein. Bergpech Judenpech Bitume de Judée (Gall.) Ein durch natürliche Veränderung organischer Substanzen (möglicherweise des Erdöls) entstandenes fossiles Harz, welches besonders an den Ufern des todtten Meeres und auf diesem schwimmend, ferner in den Asphalt-Seen von Trinidad vorkommt. Die geschätzteste Sorte, welche auch allein für die Pharmacie in Betracht kommt, ist der vom todtten Meer stammende, als „syrischer Asphalt“ in den Handel kommende

Syrischer Asphalt bildet feste, tief schwarze, stark glänzende, spröde Massen von muschelgem Bruch und in der Kälte nur schwachem bituminösem Geruch. Das spec Gewicht ist 1,1–1,2. Er wird beim Reiben elektrisch, verbreitet beim Entzünden bitu

mindsten Geruch und verbrennt mit stark rauchender Flamme. In Wasser sowie in Säuren und in Alkalien ist er unlöslich. Alkohol löst etwa 5 Proc einer öligen Substanz aus dem Asphalt heraus, Aether löst etwa 75 Proc des Asphalts. Dagegen ist er leicht löslich in Terpentinöl, Petroleum, Schwefelkohlenstoff, Chloroform. Beim Erhitzen mit konz. Schwefelsäure entweicht schweflige Säure. Fein gerieben stellt er ein braunes Pulver dar (Braun- und Steinkohlenpech geben ein schwarzes Pulver). Er schmilzt bei etwa 135° C und liefert bei höherem Erhitzen rund 65 Proc eines flüchtigen Oeles (Oleum Asphalti aethereum), welches früher auch „Petrolen“ genannt wurde. Beim Verbrennen hinterlässt er etwa 1 Proc Asche. Der Asphalt besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen, vielleicht mit kleinen Mengen Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff enthaltender Verbindungen.

Der amerikanische Asphalt steht dem syrischen nahe, indessen ist er weniger werthvoll, auch billiger als der syrische.

Anwendung. Früher zu Raucherungen gegen Rheumatismus, innerlich auch als krampfstillendes Mittel angewendet. Gegenwärtig besonders zur Herstellung von Asphalt-Lacken, welche sowohl als Anstrichmittel, aber auch um photographischen Druck- und Ätzeverfahren Verwendung finden. Letzteres beruht darauf, dass belichteter Asphalt in gewissen Lösungsmitteln unlöslich wird. Von den Aegyptern als „Mumia mineralis“ zum Einbalsamiren verwendet.

Oleum Asphalti aethereum **Oleum Asphalti rectificatum** Zur Bereitung desselben werden 10 Th Asphalt mit 15 Th reinem, grobem und trockenem Sande zu einem Pulver gemischt und aus einer gläsernen oder thönernen Retorte bis zur Trockne destillirt. Die zuerst übergehende wässrige Flüssigkeit wird besätigt und das gesammelte Oel nochmals einer Destillation (Rektifikation) unterworfen, so lange ein gelbliches Oel übergeht. Sobald Tropfen eines braunen Oeles auftreten, wird die Destillation abgebrochen. Ausbeute beträgt ca 30 Proc des Asphalts. — Das Oel wird in kleinen Gefässen vor Licht geschützt aufbewahrt.

Ein hellgelbes, durch Einwirkung von Licht und Luft sich braun färbendes Oel von eigenthümlich brenzlichem Geruch. Es wurde früher zu 10–15 Tropfen zwei bis dreimal täglich (in Kapseln) als Exstans bei Phthisis, langwierigen Geschwüren, eiternden Pocken gegeben. Ausserlich bei Frostbeulen, Rheumatismus, entweder unvermischt oder mit Oel und Fett gemischt.

Mumia **Mumia vera seu Aegyptiaca**. **Mumie**. Verdankte hauptsächlich ihrem Asphalt oder Bitumengehalt (die alten Aegypter verwendeten Asphalt zum Einbalsamiren der Todten) die Anwendung als Medikament. Sie wird noch hier und da in den Apotheken gefordert. Die Mumie, welche man im Handel antrifft, ist meist nur eine Nachahmung, bestehend aus harzartigen rothbraunen oder braunschwarzen Stücken, durchmischt mit emgen gebräunten Knochenresten, kleinen Leinwandstücken. Man hält die Mumie in Stücken und gepulvert vorrätig. Sollte man einmal echte Mumie erhalten bezw abgeben, so vergesse man nicht, diese auf einen Gehalt an Arsen, bezw Arsensulhid zu prüfen!

Ein die Mumie ersetzendes Kunstprodukt ist ein durch Schmelzung bewirktes Gemisch aus Asphaltpulver ca 100,0, Weihrauchpulver 40,0, Aloëpulver 10,0, Kicophon und Fichtenharz aa 20,0, braunem Ocker als feines Pulver 20,0.

Mumiin **Mumienbraun** **Extrait de Momie** Lasurfarbe für die Oelmalerei, ausserdem Volksheilmittel. Aegyptische Mumie in Pulverform wird mit Ammoniakflüssigkeit von 0,91 spec Gew ausgezogen. Das Filtrat wird auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft.

II Roh-Asphalte **Bergtheer**. Hierunter versteht man Natur-Produkte, welche aus Asphalt mit erheblichen Mengen mineralischer Beimengungen bestehen. Ein solcher Asphalt ist z. B. der von Trinidad, welcher im Mittel aus 45 Proc Bitumen, 25 Proc Wasser und 30 Proc Mineralstoffen besteht. Sind diese Sorten durch Ausschmelzen (meist an Ort und Stelle) von den groberen Steinen und vom Wasser befreit worden, so führen sie den Namen „Épurée“. Wird der Roh-Asphalt mit etwa 5–15 Proc Paraffinöl zu sammengeschmolzen, so führt das Produkt den Namen „Goudron“.

III Asphalt Steine Man versteht hierunter besonders Kalksteine oder Dolomit, welche mit Bitumen (wahrscheinlich auch aus Erdöl entstanden) getränkt sind. Solche Steine kommen vor in Lünner bei Hannover, im Traversthal (Schweiz), namentlich aber auf Sicilien. Der Bitumengehalt beträgt 5–15 Proc und darüber. Die Steine werden gemahlen, das Pulver wird durch „Gathieren“ auf einen mittleren Gehalt von 10 Proc

Bitumen gebracht, auf 150°—180° C erhitzt und im heissen Zustande durch Kompression mit heissen Geräthen in Strassenbeläge (Stampf-Asphalt) verwandelt. Ein solcher Belag hat frisch das spec Gew 1,8, durch den Strassenverkehr steigt dieses allmählich auf 2,3—2,4

IV Asphalt-Kitt Asphalt-Mastix. Wird erzeugt, indem man gemahlene Asphaltsteine erhitzt und soviel Trinidad-Asphalt zusetzt, dass sich die Masse in Blöcke formen lässt. Die Blöcke kommen auch schlechthin als „Asphalt“ in den Handel und werden zur Herstellung von „Gussasphalt“ verwendet, indem man ihnen 6—8 Proc Goudron zusetzt und mit 60 Proc grobem Sand zusammenschmilzt.

Analyse. Asphalt wird häufig durch Braunkohlen- und Steinkohlenpech verfälscht, ja man stellt sogar durch Imprägniren von Kalkstein mit Theer und dergl künstliche Asphaltsteine her. **CLAYE** empfiehlt zum Nachweis von Theerprodukten im Asphalt folgende Probe:

Schüttelt man 0,1 g der aschefreien bezw 0,15 g der aschehaltigen Substanz mit 10 ccm rauchender Schwefelsäure, so zeigen sich bemerkenswerthe Unterschiede, dieselben treten besonders in dünner Schicht, also beim Neigen und Wiederaufrichten des Reagensglases an der Wandung des letzteren hervor. — Die an der Gefasswandung zurückfließende Flüssigkeit ist bei Syrischem Asphalt = braun, Trinidad-Asphalt = braun, Braunkohlentheerpech = grau, ins Braune spielend, Steinkohlentheerpech = grauschwarz, Spur grünlich, von Kohlepartikeln streifig.

Bestimmung des Bitumengehaltes. 2 g gepulverter Asphalt werden in ein ERLENMEYER'sches Kölbchen von 100 ccm Fassungsvermögen eingewogen. Man übergiesst mit 30—40 ccm Chloroform und erhitzt am Rückflussrohr etwa 2 Stunden auf dem Wasserbade zu mässigem Sieden. Man lässt alsdann erkalten, etwa 1 Stunde absetzen und giesst hierauf die erzielte Bitumenlösung vorsichtig von dem Bodensatz ab in ein 50 ccm Kölbchen. Der hinterbleibende Rückstand wird noch 2—3 mal mit kleineren Mengen Chloroform ausgezogen, und zwar giesst man den Auszug jedesmal erst nach $\frac{1}{2}$ stündigem Absetzen ab. Die vereinigten Auszüge füllt man bis zur Marke mit Chloroform auf, dann verschleusst man das Kölbchen mit einem gut schliessenden Stopfen, mischt den Inhalt und lässt (über Nacht) absetzen. Nach dem Absetzen stellt man den Inhalt des Maasskölbchens durch Anwendung geeigneter Temperatur genau bis zur Marke ein, alsdann bringt man 25 ccm in eine ungewogene Platinschale und bestimmt nach dem Verdampfen des Chloroforms den Trockenrückstand durch 2 stündiges Trocknen im Wasserbad Trockenschranke. Der Rückstand wird hierauf versocht, die Asche durch Befeuern mit Ammonkarbonat in Karbonate übergeführt und die Schale wiederum gewogen. Die Differenz beider Wägungen giebt den Bitumengehalt in 1 g Substanz an.

Asphaltpech Künstlicher Asphalt. Mit diesen Namen bezeichnet man den durch Eindicken von Steinkohlentheer oder Braunkohlentheer zu erhaltenden Rückstand. Namentlich als Zusatz zu Asphalt-Lacken. Die mit reinem Asphalt bereiteten Lacke haben einen etwas braunen Farbenton, durch Zusatz von Asphaltpech erhält man tief schwarze Lacke.

Asphaltum coctum Asphalt Lacke. Zur Herstellung der Asphaltlacke wird der Asphalt zunächst geschmolzen, dann erst erkalten gelassen und nunmehr zerkleinert und in den Lösungsmitteln gelöst. Verwendet man Trinidad Asphalt, so ist bei Bemessung des Lösungsmittels auf die vorhandenen mineralischen Beimengungen (event wird eine Bitumen-Bestimmung ausgeführt) Rücksicht zu nehmen. Dieser Asphalt ist hier als „Asphaltum coctum“ aufgeführt.

Asphaltlack			Schwarzer Braunschweiger Lack		
Rp	Asphalt Syriaci cocti	800,0	Rp	Asphalt cocti	100,0
	Olei Terebinthinae	700,0		Steinkohlentheerpech	20,0
Eisenlack.				Vernix Lin	50,0
Rp	1. Asphalt cocti	300,0		Olei Terebinthinae	200,0
	2 Colophonu Sacini	100,0	Zum Lackiren eiserner Gitter		
	3 Vernix Lin	50,0			
	4 Olei Terebinthinae calcfacti	800,0			
1, 2, 3 werden geschmolzen, dann 4 daruntergeführt. Vorsicht wegen Feuergefahr					
Böttcher's Glanzlack			Schwarzer Lack für Glas		
Rp	Asphalt cocti	100,0	Rp	Asphalt cocti	100,0
	Steinkohlentheerpech	20,0		Benzol crudi	800,0
	Benzol crudi	800,0			
Billiger Asphaltlack (fett)					
Rp	Steinkohlentheerpech	600,0			
	Vernix Lin	100,0			
	Olei Terebinthinae	500,0			

Atropinum.

In verschiedenen Theilen von *Atropa Belladonna* L., *Datura Stramonium* L., *Hyoscyamus niger* L., *Scopolia japonica* und *Duboisia myoporoides* R. Br. finden sich eine Anzahl mydriatischer, bez. narkotischer Alkaloide. Bei der Verarbeitung der genannten Pflanzen erhielt man früher namentlich Atropin und Hyoscyamin. Es darf heute als ziemlich sicher angenommen werden, dass die genannten Pflanzen ursprünglich hauptsächlich Hyoscyamin führen, und dass dieses erst im Verlaufe der Verarbeitung mehr oder weniger in Atropin übergeht. Fabrikmäßig wird das Atropin aus der Belladonna-Wurzel zu 0,3–0,4 Proc. gewonnen. Die Samen von *Atropa Belladonna* ergeben bis zu 0,33 Proc., die Blätter bis zu 0,2 Proc., die Samen des Stechapfels liefern bis zu 0,26 Proc. Atropin bez. Hyoscyamin.

†† Atropinum (Erganzb.) Atropin. Atropina (Gall.) Atropina (Brit. U-St.)

Die freie Atropinbase $C_{17}H_{23}NO_3$. Mol. Gew. = 289 (Identisch mit Daturin)

Das stellung 1000 Th. gepulverte Wurzel werden mit Weingeist befeuchtet und im Perkolator mit Weingeist perkolirt, bis das Perkolat 6000 Th. beträgt. Demselben setzt man 50 Th. gelöschten Kalk hinzu, macerirt unter Umschütteln 24 Stunden, nimmt die alkalische Reaktion der Flüssigkeit mit verdünnter Schwefelsäure weg, filtrirt und verdunstet bis auf 150 Th. Auf der sirupdicken Flüssigkeit schwimmt das fette Oel der Wurzel in Gestalt eines krystallinischen Überzuges. Man verdünnt den Sirup mit 200 Th. Wasser, filtrirt ihn durch ein vorher genässtes Filter und wäscht so lange nach, bis das Filtrat ungefähr 380–400 Th. beträgt. Das Filtrat schüttelt man mit 50 Th. Chloroform (worin sich das schwefelsaure Atropin nicht löst). Das Chloroform scheidet man ab, setzt der Flüssigkeit wiederum 75 Th. Chloroform, dann soviel Aetzkalklauge hinzu, bis stark alkalische Reaktion auftritt, und schüttelt wiederholt tüchtig um. Man lässt nun das mit Atropin beladene Chloroform absetzen. Die Chloroformschicht wird einmal mit Wasser gewaschen, dann destillirt man das Chloroform aus dem Wasserbade ab. Das zurückbleibende Atropin wird schliesslich in wasserfreiem Weingeist gelöst, mit Thierkohle geschüttelt und der Krystallisation überlassen. Ausbeute beträgt etwa 0,3 Proc. der getrockneten Wurzel. (PROCTER)

Das so erhaltene Atropin sucht man in Krystalle zu verwandeln. Dies gelingt sehr schwer, so lange dem Atropin Wasser anhaftet. Es ist daher wesentlich, das trockene Atropin in der 7–8fachen Menge heissen, möglichst wasserfreien Alkohols zu lösen, und diese Lösung in flachen Gefässen an einem kaum lauwarmen Orte unter Abschluss von Feuchtigkeit langsam abdunsten zu lassen. Unter diesen Umständen lässt sich das Atropin in glänzende, gut ausgebildete, nadelförmige Krystalle verwandeln. Aus dem sog. wasserfreien Weingeist des Handels krystallisirt es nicht, der eingetrocknete Rückstand bildet dann, zerrieben, ein krystallinisches, meist scheinbar amorphes Pulver.

Enthält das Atropin Hyoscyamin, so kann dieses durch folgendes Verfahren in Atropin übergeführt werden. Man löst 10 Th. des Alkaloidgemisches in 100 Th. Weingeist, fugt 1 Th. Natronlauge hinzu, mischt und lässt bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Nach etwa 2 Stunden ist das Hyoscyamin in Atropin übergegangen, was sich daran erkennen lässt, dass die alkoholische Lösung optisch inaktiv geworden ist. Man verjagt alsdann den Alkohol durch Abdampfen bei niedriger Temperatur und wäscht das hinterbleibende Atropin mit möglichst wenig Wasser aus.

Eigenschaften Das reine Atropin krystallharrt in schweren, spießigen Nadeln vom Schmelzpunkt 115,5° C. Es ist geruchlos, von widerlich bitterem, scharfem, anhaltendem Geschmack. Es ist löslich in 300 Th. kaltem, 60 Th. heissem Wasser, sehr leicht löslich in Weingeist, Chloroform, Toluol, Amylalkohol, weniger leicht löslich in Aether, kaum löslich in Petroläther. Wenn man es über 140° C. erhitzt, so verflüchtigt es sich unter Aufblähen und Ausstossen eigenthümlich riechender weisser Dämpfe. Bei vorsichtigem Erhitzen lässt es sich sublimiren, beim Kochen seiner wässrigen Lösung verflüchtigt sich ein geringer Theil mit den Wasserdämpfen. Die wässrige sowohl wie die alkoholische Lösung des Atropins reagiren alkalisch. Es ist optisch inaktiv. Das Atropin ist eine einsaurige Base, seine Salze krystallisiren schwierig und sind meistens in Wasser und Alkohol leicht löslich.

Atropinsalzlösungen werden durch Gerbsäure, Kaliumquecksilberjodid, Mercurichlorid weiss, durch Platinchlorid gelblich weiss, durch Phosphormolybdän-


säure gelb gefällt. Jodjodkaliumlösung giebt je nach der Concentration einen gelblichen oder röthlich-braunen Niederschlag, welcher nach einiger Zeit krystallinisch erstarrt. Unter dem Mikroskope erblickt man dann bei 80- bis 100facher Vergrößerung rothbraune prismatische Nadeln, hier und da gelblich braune Blättchen. Pikrinsäurelösung erzeugt in nicht zu verdünnten Lösungen eine milchige Trübung, welche krystallinisch wird. Die Krystalle erscheinen unter dem Mikroskop als sehr dünne glänzende Blättchen von wechselnder Grösse.

Charakteristisch für das Atropin ist sein salzsaures Golddoppelsalz $C_{17}H_{21}NO_3 \cdot HCl \cdot AuCl_3$. Dasselbe entsteht durch Fällung einer salzsauren Atropinlösung mit Goldchlorid als ocker Niederschlag, welcher nach einiger Zeit krystallinisch wird. Es ist glanzlos und hat einen Schmelzpunkt von 135 bis 137° C. Es schmilzt jedoch in siedendem Wasser.

Atropin wird nur aus (reinen) concentrirten Salzlösungen durch Aetzkalk und die Alkali Carbonate weiss gefällt, durch einen Ueberschuss des Fällungsmittels aber wieder gelöst. Aetzammon fällt die concentrirte Lösung nur unvollkommen, Ammoncarbonat und Alkalibicarbonat fallen sie nicht. Atropin löst sich in concentrirter Schwefelsäure langsam und ohne Färbung auf, und diese Lösung wird auf Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure nicht verändert. 0,05 bis 0,06 g Atropin mit 3 bis 4 cem einer 12- bis 15proc. Aetzkalklauge geschüttelt, bilden eine weiss trübe Flüssigkeit, in welcher bei sanfter Erwärmung die Atropinpartikel zu klaren bläulich-weißen, ausgeprägt sphärischen Tropfen schmelzen, sich als solche an der Oberfläche der Flüssigkeit sammeln, beim Erkalten aber, ohne die Form zu ändern, weiss und durchsichtig werden und zu Boden sinken. Endlich giebt eine verdünnte Atropinlösung mit Kaliumdichromatlösung innerhalb der ersten 5 Minuten keine Fällung oder Trübung.

Atropin liefert beim Behandeln mit Salpetersäure Apotropin $C_{17}H_{21}NO_3$.

Beim Erhitzen mit Barytwasser oder concentrirter Salzsäure zerfällt es zunächst in Tropin und Tropasäure $C_8H_9O_3$. Letztere geht durch Wasserabspaltung in Atropasäure und Isotropasäure $C_8H_9O_3$ über. Beim Stehenlassen von Atropin mit rauchender Salzsäure in der Kälte oder beim Erwärmen mit Barytwasser auf 58° C. bilden sich Tropin und Tropasäure und nur sehr wenig Atropasäure.



Atropinformel nach WILLSTÄDTER.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Atropin als „Tropasäure — Tropinather“ aufzufassen. Seine Constitution ist gegenwärtig so gut wie aufgeklärt, und zwar erscheint das Atropin auch hiernach als ein näher Verwandter des Cocains.

Reaktionen. 1) Beim Erwärmen einer Lösung von 0,01 g Atropin in 2,0 g conc. Schwefelsäure entwickelt sich ein intensiver Geruch nach Orangen- oder Schlehdornblüthen (*Prunus spinosa*). Dieser Geruch tritt besonders hervor, wenn man, sobald die Lösung anfangt braun zu werden und Dämpfe entwickelt, vorsichtig die gleiche Menge Wasser hinzufügt (GOLZALMO).

2) Wenn man zu der heissen Mischung (aus Atropin, Schwefelsäure und Wasser sub 1) ein Körnchen einer oxydirenden Substanz, wie Kaliumpermanganat, Kaliumdichromat oder Ammoniummolybdat hinzufügt, so entwickelt sich ein Geruch, welcher mehr an Bittermandelöl als an den der *Spiraea Ulnaria* erinnert (PFEIFFER und HENAU).

3) Tropft man in einer Schale Kaliumchromatlösung auf Atropin, so bildet sich beim Bewegen der Schale blaugrüne Streifen. Auf Zusatz von mehr Kaliumchromatlösung entsteht eine hellgrüne Flüssigkeit (D. VITALI).

4) Wenn man Atropin oder ein Atropinsalz mit etwas rauchender Salpetersäure übergiesst, dann auf dem Dampfbade antrocknet und nach dem Erkalten einen Tropfen wasserfreier weingeistiger Aetzkalklauge hinzulassen lässt, so erfolgt violette Färbung, welche bald in Roth übergeht (D. VITALI).

Mit dieser Reaction will VITALI noch 0,000001 g Atropinsulfat nachweisen können. Es ist hierbei zu bemerken, dass Strychnin und Veratrin (BECKMANN, Archiv d. Pharm. 1886, 482) unter gleichen Verhältnissen ebenfalls eine schon rothe Farbe geben.

5) Wird Atropin mit einer Mischung von Kaliumdichromat und Schwefelsäure der Destillation unterworfen, so verflüchtigt sich Benzoesäure

6) Die wichtigste Reaktion für das Atropin (und Hyoscyamin) bleibt immer dessen Eigenschaft, die Pupille zu erweitern. Bei einem etwaigen Versuche atropinisirt man das eine Auge einer Katze und vergleiche dann beide Pupillen, Kaninchen eignen sich zum Anstellen dieser Reaktion nicht

Prüfung. 1) Das Atropin bilde farblose Krystalle, welche nach dem Trocknen über Schwefelsäure bei 115,5° C schmelzen. 2) In konc. Schwefelsäure löst es sich ohne Färbung, diese Lösung werde auch durch Zusatz von etwas Salpetersäure nicht verändert (fremde Alkaloide). 3) Erhitzt verbrenne es, ohne einen Rückstand zu hinterlassen

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, unter den direkten Giften, Abtheilung „Alkaloida“. Zur äusserlichen Anwendung bestimmte Atropinlösungen sind nach mehrfachen Verordnungen zu versiegeln und mit einem Giftetikett zu versehen

Anwendung. Die freie Atropinbase findet höchst selten einmal medicinische Anwendung, sie wird in allen Fällen mit Vortheil durch die leichter löslichen Salze ersetzt. Höchstgaben pro dosi 0,001 g, pro die 0,003 g

Collyrium atropinicum FARKS
Rp Atropini 0,05
Aquae destillatae 150,0
Bei Iritis dreistündlich die Cornea zu baden. Giftetikett

Glycerinum Atropini
Rp Atropini 0,1
Glycerini 20,0
Infectio antieclampsia DIXON
Rp Atropini
Morphina gr 0,05
Aquae destillatae 10,0
Acidi hydrochlorici gtt. 2
Zur Injektion bei Eclampsia Gebärender Unzweckmässige Vorschrift. Die beiden freien Basen sind, unter Hinzugabe der Salzsäure zweckmässig in Form der schwefelsauren Salze anzuwenden

Pilulae Atropini
Rp Atropini 0,05
Sacchari albi
Gummi arabici Ka 5,0
Mant. cum Aqua glycerinata pilulae 100. Jede Pille enthält 0,0005 g Atropin. Mit Talcum venetum auszurollen

Pulvis Atropini
Rp Atropini 0,05
Sacchari 30,0
divide in partes 100. Jedes Pulver enthält 0,0005 g Atropin. 2–3 Pulver täglich bei Keuchhusten. Allen niemals Kindern!

Sirupus Atropini BOUCHARDAT
Rp Atropini 0,1
Sirupi simplici 1000,0
Acidi hydrochlorici gtt. V
10,0 g Sirup enthalten die Maximalgabe 0,001 g Atropin

Unguentum Atropinae (Brit.)
Rp Atropini 0,5
Acidi oleici 2,5
Adipis 22,5

Toxikologisches. Atropin wirkt auf das centrale Nervensystem zunächst erregend, dann lähmend. Charakteristisch ist für die Wirkung des Atropins eine Erweiterung der Pupille (Mydriasis), welche sowohl nach dem Einträufeln einer verdünnten Lösung ins Auge, als auch nach innerer Darreichung eintritt und die Folge einer Lähmung der Endigungen des Nervus oculomotorius ist, wodurch die Accommodation aufgehoben wird. Innerlich wirkt es als starkes Narkoticum. Man giebt es. Äusserlich als Einträufelung in die Augen als wässrige Lösung 1,0 200,0. Subcutan in Gaben von 0,0003–0,001 g, bei Neuralgien, Krämpfen. Innerlich in Gaben von 0,0005–0,001 g zwei bis dreimal täglich gegen die Nachtschweisse der Phthisiker. Höchste Gaben pro dosi 0,001 g, pro die 0,003 g

Als tödtliche bez. gefährliche Gaben gelten 0,05–0,2 g. Die nach 5–10 Minuten auftretenden Vergiftungserscheinungen sind fieberhafte Aufregung, Trockenheit im Halse, Rothe des Gesichts, funkelnde Augen mit herabhängenden Lidern oder vorstehenden glotzenden Augäpfeln, stets starke Erweiterung und Unempfindlichkeit der Pupille, Erbrechen, freiwilliger Stuhlgang, Stimmlosigkeit, Aufhören des Hör- und Tastvermögens, Sopor. In 6–24 Stunden erfolgt der Tod. In Wunden eingetragen oder subkutan applicirt, überhaupt nach irgendwie erfolgter Resorption, treten ähnliche Erscheinungen ein, niemals fehlt aber die Erweiterung der Pupille. Die Ausscheidung des Atropins erfolgt hauptsächlich durch den Harn im unveränderten Zustande

Antidot. Solange das Gift noch im Magen ist Tannin, Jod, Kohlepulver mit nachfolgender Anwendung der Magenpumpe Nach der Resorption werden als physiologische Antidote Morphin und Physostigmin empfohlen

Nachweis Nach einer Atropin- (Hyoscyamin oder Hyoscin-) Vergiftung sind die genannten Alkaloide vorzugsweise im Magen, Darm, Blut und Harn aufzusuchen Bei Einhaltung des Stras Otto'schen Ganges gehen nur Spuren von Atropin in die atherische Ausschüttelung aus saurer Lösung, die Hauptmenge geht in die atherische Ausschüttelung aus alkalischer Lösung über Arbeitet man nach DRAGENDORFF, so geht das Atropin aus der ammoniakalischen Lösung in die Benzol-Ausschüttelung über Die nach Verdunsten der Lösungsmittel erhaltenen Rückstände prüft man zunächst bezüglich ihrer Wirkung auf das Katzenauge, dann mittels der VITALI'schen Reaktion Erst hierauf soll man weitere Reaktionen anstellen — Das Atropin widersteht der Faulniss einige Zeit, z B mehrere Wochen

Atropinum sulfuricum.

! †† Atropinum sulfuricum (Austr Germ Helv) Sulfate d'atropine (Gall)
Atropinae Sulfas (Brit U-St) Atropinsulfat Schwefelsaures Atropin, $(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$, Mol Gew. = 678

Darstellung In einer Schale aus Porcellan mischt man 1 Th verdünnter Schwefelsäure (von 16 Proc H_2SO_4) mit 2 Th Weingeist, macht etwas mehr als lauwarm und setzt dann nach und nach soviel Atropin (1 Th) unter Umrühren hinzu, bis nach geschehener Auflösung die Flüssigkeit neutral oder kaum merklich alkalisch reagirt Die Flüssigkeit wird nun im Wasserbade oder an einem ca 50° C warmen Orte bis auf den dritten Theil des Volumens abgedampft und an einem lauwarmen Orte ausgetrocknet, denn das Salz geht nur langsam aus dem amorphen in den krystallinischen Zustand über Um es nun in die Form eines schön krystallinischen Pulvers zu bringen, löst man das gut ausgetrocknete Sulfat unter Erwärmen in ca der 20fachen Menge wasserfreiem Weingeist und überläßt die Lösung an einem kaum lauwarmen Orte der freiwilligen Abdunstung Oder man löst das ausgetrocknete Atropinsulfat in einem Kölbchen in der 20fachen Menge möglichst wasserfreiem Weingeist unter Erwärmen auf höchstens 50° C, oder in soviel Weingeist, dass man eine concentrirte Lösung erlangt Nachdem die Lösung auf ungefähr 35° C erkalbet ist, giesst man sie unter sanftem Agitiren in ein 4faches Volumen Aether, welchen man durch Chlorcalcium völlig entwässert hat und der sich in einem becherförmigen Gefässe befindet Nachdem man mit einer geringen Menge wasserfreiem Weingeist die in dem Kölbchen an der Wandung hängengebliebene Lösung aufgenommen und dem Aether zugesetzt hat, giesst man noch ebensoviel Aether dem Volum nach hinzu, als das Becherglas bereits Flüssigkeit enthält, rührt sanft um und stellt das Gefäss dicht bedeckt an einen kalten Ort Nach Verlauf eines Tages setzt man auf einen Steinkolben einen Trichter, dessen Abflussöffnung mit einem Dütchen von Fliesspapier locker geschlossen ist, und giebt in den Trichter den ätherhaltigen Krystallbrei aus dem Becherglase Was vom Salze etwa an der Wandung des Becherglases hängen bleibt, lässt man sitzen und freiwillig abdunsten und trocken werden Den nach dem Abflauen des Aethers in dem Trichter verbliebenen Krystallbrei wäscht man durch Aufgessen von etwas wasserfreiem Aether ab und breitet ihn dann auf einem flachen Glasgefässe aus Nach dem freiwilligen Abdunsten des Aethers verbleibt das Atropinsulfat als eine sehr weisse, aus sehr kleinen Krystallen bestehende Masse zurück Zum Gelingen der Darstellung sind möglichst wasserfreier Weingeist und wasserfreier Aether nothwendig, und dann auch zur Bildung der Kryställchen eine Temperatur von weniger als 12° C Im anderen Falle erhält man ein Sulfat, welches zu mehr als der Hälfte seiner Masse amorph ist

Eigenschaften. Das Atropinsulfat ist ein weisses, aus feinen Nadelchen bestehendes Pulver, gewöhnlich kommt es in mattweissen, krystallinischen Massen in den Handel Es giebt mit gleichviel Wasser oder 8 Th. 90procentigem Weingeist oder 30 Th absolutem Weingeist klare, farblose, neutrale Lösungen In Chloroform, Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzol ist es fast unlöslich Die Lösungen besitzen sehr bitteren, widerlichen, Uebelkeit erregenden Geschmack Eine 10procentige Lösung, mit destillirtem Wasser bereitet, ist in dichtgeschlossnem Gefäss und vor Licht geschützt, unveränderlich Es schmilzt gegen 183° C Das Hyoscyaminsulfat schmilzt bei 206° C Erhitzt, schmilzt das Atropinsulfat

zuerst, verkohlt unter theilweiser Verflüchtigung und verbrennt schliesslich ohne Rückstand Seine wasserige Lösung (1:60) wird durch Aetzammon nicht getrübt In konz. Schwefelsäure ist es ohne Färbung löslich Die Lösung wird erst nach längerem Stehen gefärbt Wird ein Tropfen einer wasserigen Lösung auf ein Objektglas gegeben und in der Wärme eingetrocknet, so erblickt man nach einigen Stunden bei 60 bis 80facher Vergrösserung unter dem Mikroskop Bündel von radial angeordneten, prismatischen Nadeln

Die wasserige Lösung giebt mit Baryumchlorid einen weissen, in Salpetersäure unlöslichen Niederschlag Das Vorhandensein von Atropin weist man nach S 426 nach

Prüfung. 1) Etwa 0,02 g Atropinsulfat verbrennen auf dem Platinblech ohne einen Rückstand zu hinterlassen 2) Das sorgfältig getrocknete (!) Präparat schmelze bei 188° C Ein höherer Schmelzpunkt wird auf die Anwesenheit von Hyoscyaminsulfat (Schm-P 206° C) hinweisen 3) Werden 3 cem einer Lösung 1:60 mit 1 cem Ammoniakflüssigkeit versetzt, so muss die Mischung klar sein und klar bleiben Trübung weist auf Belladonna hin 4) Um zu ermitteln, ob das untersuchte Präparat aus einem Atropin vom Schmelzpunkt 115,5° C, dargestellt wurde, nimmt man 0,1 g des Salzes, löst es in 6 cem destill. Wasser, übersättigt die Lösung mit Kaliumkarbonat, schüttelt sie in einem kleinen Scheidetrichter mit 6 cem Aether aus, lässt nach der Trennung der beiden Flüssigkeitsschichten die untere, wässerige ab, trocknet die Aetherlösung durch Schütteln mit etwas trockener Pottasche, dampft die filtrirte Aetherlösung in einem kleinen Schälchen ab und trocknet den Rückstand bei 100° C Die so dargestellte freie Base muss bei 115,5° C schmelzen

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften, sehr vorsichtig, in der Abtheilung „Alkaloidia“ Bezüglich der Abgabe gilt für das Atropinsulfat das für das freie Atropin S 427 Gesagte

Anwendung. Das Atropinsulfat ist dasjenige Salz, als welches das Atropin überhaupt am häufigsten angewendet wird Es gilt daher für dasselbe alles dasjenige, was auf S 427 über die freie Atropinbase gesagt ist Es enthält 85,5 Proc Atropin und 14,5 Proc Schwefelsäure

†† **Charta atropinata** Charta medicamentosa Atropini sulfurici 0,001 in centimetris singulis quadratis continens. Papier atropiné Streatfield. Paper impregnated with Atropia Streatfield. Collyrium siccum graduum Atropini. Atropinpapier Ist mit Atropinsulfat getränktes zartes Fliesspapier Jeder Quadratzentimeter (getheilt in 9 Theile) enthält 0,001 Atropinsulfat Ein oder zwei Neuntel-Quadratzentimeter wird auf die Innenfläche der unteren Konjunktiva gelegt in Stelle der Atropinsolution Ueber die Darstellung des Atropinpapiers vergl. Charta medicamentosa gradata. Receptformel als Beispiel

Rp Chartae atropinatae Centimetros quadratos 3

D ad chartam paraffinatam

S Zum äusserlichen Gebrauch, nach Verordnung

†† **Gelatina atropinata** Atropin-Gelatine Stellt aus bester Gelatine hergestellte Lamellen dar, welche pro Stück 0,0025 g Atropinsulfat enthalten Sie werden mit einem feuchten Pinsel aufgenommen und auf die zu behandelnde Stelle im Auge gebracht

Collyrium Atropini SICHEL.

Rp Atropini sulfurici 0,01

Aquae destillatae 10,0

Glycerini 5,0

D S Täglich einmal später öfter einträufeln und nach jeder Einträufelung die Augen in kaltem Wasser zu baden (bei Ophthalmie) — Gift+++

Collyrium Atropini sulfurici oleosum.

OWEN

Rp Atropini sulfurici 0,05 (ad 0,2)

Olei Ricini 80,0

Bei Hornhautentzündung) — Gift+++

Collyrium stillatitium GRAEFE

Rp Atropini sulfurici 0,05 (ad 0,08)

Aqua destillatae 10,0

D S Augentropfwasser — Gift+++

Glycerolatum Atropini sulfurici

Unguentum Atropini sulfurici cum

Glycerino

Rp Atropini sulfurici 0,04

Unguenti Glycerini 5,0

D S Zweimal täglich wie einen Stecknadelkopf gross auf die Innenfläche des unteren Augenhödes zu bringen

Injectio subcutanea Atropini sulfurici

Rp Atropini sulfurici 0,1

Aquae destillatae 10,0

Dosis 0,1—0,2—0,3 cem (!) Gift+++

Atropinum valerianicum.

†† **Atropinum valerianicum** (Ergänzb) Valérianate d'Atropine (Gall) Valérianate of Atropine Atropinvalerianat. Baldriansaures Atropin $C_{17}H_{23}NO_4$ $C_6H_{10}O_4 + H_2O$. Mol Gew = 409.

Darstellung Das Atropinvalerianat wird nur dann in Krystallen erhalten, wenn man zur Darstellung möglichst wasserfreie Materialien anwendet. Man geht daher im vorliegenden Falle von der wasserfreien Valeriansäure $C_6H_{10}O_4$ aus, welche man bei der Rektifikation als letztes Drittel des Destillates (Siedep $175^\circ C$) erhält (s. S 145)

10,0 g wasserfreier Valeriansäure (s. oben) und 28,0 g reines Atropin werden in einem porcellanen Mörser zusammengerieben, dann in circa 20 ccm absolutem Weingeist gelöst. Die Lösung wird in ein Glasgefäß mit geraden Wänden, z. B. ein Becherglas eingetragen, welches 150 ccm absoluten Aether enthält, kraftig umgerührt, anfangs einen Tag mittlerer Temperatur, dann zwei Tage der Kälte (-5 bis $+5^\circ C$) ausgesetzt, hierauf die Krystalle in einem Trichter über einem lockeren Büschchen Glaswolle gesammelt und mit etwas jenem absoluten Aethers abgewaschen. Man breitet den krystallinischen Brei auf einer Porcellanfläche aus und lässt den Aether bei möglichst niedriger Temperatur an einen völlig trocknen Orte freiwillig abdunsten.

Hatte man nicht genügend wasserfreie Materialien verwendet, so erhält man keine Krystalle, sondern eine sirupdicke Flüssigkeit.

Eigenschaften Das Atropinvalerianat bildet hygroskopische, farblose oder nach einiger Zeit der Aufbewahrung weisse, lockere, rhombische Krystalle oder krystallinische Krusten, welche schwach nach Valeriansäure riechen, in einer Wärme von $20^\circ C$ erweichen, bei $42^\circ C$ schmelzen, dann in den krystallinischen Zustand nicht wieder zurückkehren und in der Wärme des siedenden Wassers ihre Valeriansäure verlieren. In Wasser und Weingeist ist das Valerianat in jedem Verhältnisse löslich, damit eine neutrale oder schwach alkalische Lösung gebend, in Aether, welcher weingeist- und wasserfrei, ist es nur in Spuren löslich. Das Präparat enthält rund 70 Proc Atropin.

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften, sehr vorsichtig, in der Abtheilung „Alkaloida“

Anwendung Dieses Salz ist besonders für den innerlichen Gebrauch bestimmt und als Antispasmodicum, Antineuralgicum und als Antiepilepticum gerühmt, indessen als ziemlich überflüssig angesehen. Höchste Gaben pro dosi 0,001 g und pro die 0,008 g.

†† **Atropinum jodicum.** Atropinjodat. Jodsaures Atropin $C_{17}H_{23}NO_4$ JO_2 H Mol Gew = 465 Enthält 62,1 Proc Atropin

Man neutralisirt 10 g Atropin in alkoholischer Lösung mit 6,1 g Jodsäure und dampft bis zum Krystallisationspunkt ein. Farblose Krystallnadeln, in Wasser und in Alkohol löslich. Die wässrige Lösung soll sich lange keimfrei halten. Daher die 0,5 bis 1,5 procentige Lösung in der Augenpraxis. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

†† **Atropinum boricum.** Atropinborat. Ist keine einheitliche Verbindung. 1 Th Atropin wird in Alkohol gelöst und mit einer Lösung von 2 Th Borsäure in Alkohol vermischt, dann zur Trockne verdampft. Der Rückstand ist zu pulvern und gut zu mischen. Wässres Pulver, in Wasser löslich. Enthält 83,3 Proc Atropin. In Augewässern angewendet. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

†† **Atropinum stearicum.** Atropinstearinat. $C_{17}H_{23}NO_4$ $C_{18}H_{35}O_2$ Mol Gew = 573

Zur Darstellung schweimmt man 5,68 g Stearinsäure (gepulverte) in 50 ccm destillirtem Wasser auf, giebt 20 ccm Normal-Natronlauge hinzu und erwärmt bis zur Auflösung. Hierauf setzt man eine Lösung von 6,76 g Atropinsulfat in 100 ccm Wasser hinzu. Der entstehende Niederschlag wird ausgewaschen, getrocknet und aus Alkohol umkrystallisirt.

Feine, weisse, glänzende, fettig anzufühlende Nadeln, schon bei gewöhnlicher Temperatur 1 100 in fetten Oelen löslich. Schmelzp gegen $120^\circ C$. Der Atropingehalt ist = 50,4 Proc.

†† **Atropinum salicylicum.** Atropinsalicylat. Salicylsaures Atropin. $C_{17}H_{21}NO_4$ $C_7H_5O_2$ Mol Gew = 427 Enthält 67,7 Proc Atropin

Zur Darstellung werden 2,9 g Atropin unter Erwärmen in 10 ccm Weingeist gelöst und mit 1,38 g Salicylsäure neutralisirt. Man dampft die filtrirte Lösung zunächst in Wasserbade ein und bringt sie zum Schluss im Wasserbad-Trockenschranke zur Trockne.

Weisses krystallinisches Pulver, in Wasser nur mässig löslich. Wird in der Augenpraxis verwendet, weil es besser wirken soll als das Sulfat. Aufbewahrung: Sehr vorsichtig.

†† Atropinum santonicum. Santoninsäures Atropin.

Zur Darstellung werden 10,0 Th Atropin in alkoholischer Lösung mit 8,5 Th Santonin in verdünntem Alkohol gelöst zusammengebracht und zur Trockne verdampft.

Farbloses, krystallinisches Pulver, in Wasser löslich. Vor Licht geschützt sehr vorsichtig aufzubewahren. In der Augenheilkunde angewendet, soll gut vertragen werden, die Lösungen sollen haltbar sein.

Aurum.

Aurum. Gold. Or. Gold (Englisch) Au. Atomgew. = 196.

I Aurum foliatum Blattgold. Wird, zwischen Goldschlägerpapier geschichtet, in den Handel gebracht. Das Goldschlägerpapier ist wie die Blätter eines Buches zusammengeheftet. Ein Buch enthält circa 252 Blatt Gold, jedes Blatt ist circa 17 qcm gross. Zum Vergolden der Pillen kann man aber zweckmässig auch den bei der Blattgold-Fabrikation sich ergebenden Abfall verwenden.

Das Blattgold dient zum Vergolden der Pillen. Mittelst eines breiten Messers wird ein Blatt aufgenommen und auf die zu vergoldenden Pillen (10 Stück) in der Horn- oder Holzkapsel, wie eine solche beim Versilbern der Pillen in Anwendung kommt, gelegt, die Kapsel geschlossen etc.

Das Blattgold enthält meist etwas Silber, was seiner Verwendung nicht entgegen steht. Kupferhaltiges Gold soll man verwerfen.

Man verwechselt es nicht mit dem Goldschaum, Metallgold, welches Blattmetall aus Tombak, einer Legierung von Kupfer und Zink, dargestellt ist.

Prüfung. Man übergiesst ein Blättchen des Metalls mit circa 3 ccm reiner Salpetersäure, erwärmt einige Minuten, giesst die Flüssigkeit in ein Reagirglas klar ab und vermischt sie mit circa 5 ccm Aetzammonflüssigkeit. Es darf eine blaue Färbung nicht erfolgen (Kupfer). Tombak ist in Salpetersäure übrigens völlig löslich.

II Aurum pulveratum Aurum alcoholicatum. Gepulvertes Gold. In einen porcellanenen Mörser giebt man mehrere Blätter Goldblatt und circa die 20fache Menge gepulvertes Kaliumsulfat und zerreibt zu einem höchst feinen Pulver, wäscht dann das Salz mit heissem Wasser weg und trocknet das zurückbleibende Goldpulver. Es ist obsolet. Die Anwendung ist dieselbe, wie die des folgenden Präparats.

III Aurum praecipitatione divisum Aurum praecipitatum purum Praecipitirtes Gold. Eine Goldchloridlösung, welche etwas freie Salzsäure enthält, wird mit soviel einer Ferrosulfatlösung versetzt, als dadurch ein Niederschlag hervorgebracht wird. Letzterer wird gesammelt, ausgewaschen und getrocknet. Es bildet ein zimtbraunes glanzloses Pulver, welches unter Druck und Reiben Metallglanz annimmt.

IV Aurum colloidal Colloidales Gold. Lösliches Gold.

25 ccm einer Lösung von 0,6 g Goldchloridchlorwasserstoff im Liter werden mit etwa 100 ccm Wasser verdünnt, hierauf mit einer $\frac{1}{10}$ -normalen Lösung von Kaliumkarbonat (14 g K_2CO_3 in 1 Liter) versetzt und zum Sieden erhitzt. Unmittelbar nach dem Aufkochen entfernt man die Flüssigkeit von der Flamme und fugt portionsweise 4 ccm einer Lösung von 1 Th frisch destillirtem Formaldehyd in 100 Th Wasser zur kochend heissen Goldlösung unter lebhaftem Umrühren der Flüssigkeit. Diese wird zuerst prachtig hellroth, schliesslich tiefroth gefärbt. Das verwendete destillirte Wasser muss völlig rein sein, schon geringe Mengen Erdalkalisalze verhindern den Eintritt der Reaktion. — Um die Lösung concentrirter zu machen, muss sie der Dialyse unterworfen werden.

Man erhält so rothgefärbte Lösungen, aus denen das Gold durch Neutralsalze, durch Säuren und Alkalien metallisch gefällt wird (ZSIGMONDY).

Anwendung. Die therapeutische Anwendung des metallischen Goldes lässt sich auf die alchymistischen Anschauungen des Mittelalters zurückführen. Das fein ver-

theilte Gold fand innerliche Anwendung bei gesunkener Verdauungskraft und Lebens-
thätigkeit, äusserlich und innerlich bei Syphilis, Skrofeln, Krebs, Uterinblutungen, skrofu-
lösen und syphilitischen Augenentzündungen, in Salbenform hinter den Ohren eingerieben
zur Beseitigung der Geschwüre und Flecken der Hornhaut Dosis 0,02—0,04—0,06, in
Einreibungen auf Zunge oder Zahnfleisch zu 0,1—0,15—0,2 auf den Tag

Im allgemeinen halten die Aerzte das gepulverte und das präcipitirte Gold thera-
peutisch für gleichwerthig

Amalgama Auri
Rp Hydrargyri 1,0
Auri puri praecipitati 0,2
Bei mässiger Wärme zusammen zu schmelzen.

Linetus auriferus LEBRAND
I
Rp Aur. praecipitati 0,06
Mellis depurati 25,0
Morgens und
(für Kinder) abends einen Theelöffel zu geben

II
Rp Aur. praecipitati 0,3
Mellis depurati 100,0
Morgens und abends einen Theelöffel zu nehmen
(für Erwachsene)

Pilulae Auri amalgamati RICHARD
Rp. Amalgamae Auri 0,6
Thridacos 0,2
Conservae Rosae 0,5
Radici Liquiritiae pulveratae q s
Fiant pilulae 10 Täglich 1—3 Pillen (bei sekun-
därer Syphilis Salivation tritt nicht ein)

Saccharum auratum
Rp Aur. pulverati 0,1
Sacchari pulverati 10,0
Zum Bereiten des Zahnfläschchens

Sirupus auratus
Rp Aur. pulverati 1,0
Sirupi Sacchari 80,0
Zum Bepinseln der Schankergeschwüre im Rachen

Unguentum Auri
Rp Aur. pulverati 1,0
Unguenti cerei 20,0

Chemie und Analyse. Gold ist ein edles Metall von eigenartiger gelber Farbe und hoher Politurfähigkeit, im fein vertheilten Zustande ein braunes Pulver, welches beim Reiben Metallglanz annimmt. Das spec Gew des kompakten Goldes schwankt je nach der Bearbeitung von 19,26—19,35. Der Schmelzpunkt liegt bei etwa 1300° C.

Gegen Luft, Sauerstoff und Wasser erweist sich Gold bei jeder Temperatur als unveränderlich. Ebenso wird es von keiner einfachen Säure z. B. Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure) angegriffen, dagegen wird es angegriffen von schmelzendem Kalihydrat, Natriumhydrat, auch von schmelzendem Salpeter. Freies Chlor und alle Mischungen, welche solches entwickeln, ebenso freies Brom wirken sehr heftig auf Gold ein, weniger heftig ist die Einwirkung von freiem Jod. Schwefelwasserstoff wirkt auf blankes Gold nur wenig ein. Goldene Gegenstände werden durch Schwefelwasserstoff bei weitem nicht so leicht geschwärzt, wie solche aus Silber. — Das gebräuchlichste Mittel, Gold aufzulösen, ist das Königswasser, s. S. 77, eine Mischung von Salzsäure und Salpetersäure, welche Chlor im statu nascendi in Freiheit setzt.

Goldlösungen sind gelb, in conc. Zustände röthlich bis bräunlich. Sie geben folgende

Reaktionen 1) Aetzkalk und Aetznatron fallen braunes Hydroxyd, welches im Ueberschuss des Fällungsmittels leicht löslich ist. Alkalikarbonate bewirken erst in der Siedehitze Ausscheidung von röthlich-gelbem Goldhydroxyd. — Durch Ammoniak oder Ammoniumkarbonat entstehen, jedoch nur in konzentrirten Lösungen, röthlichgelbe Niederschläge von Goldoxyd-Ammoniak (Knallgold), welches im getrockneten Zustande bei der leichtesten Berührung heftig explodirt. 2) Schwefelwasserstoff fällt aus einer neutralen oder sauren Goldlösung alles Gold aus. Die braunschwarzen Niederschläge sind Gemenge von Goldsulfid, metallischem Gold und Schwefel. Sie sind unlöslich in Salzsäure oder Salpetersäure, dagegen löslich in Königswasser, ferner in farblosen oder gelben Schwefelalkalien. 3) Zinnchloridlösung, welche etwas Zinnchlorid enthält (man füge zu Zinnchloridlösung etwas Chlorwasser), erzeugt auch in sehr verdünnten Goldlösungen einen purpurrothen, bisweilen ins Violette oder Braunrothe spielenden Niederschlag von Goldpurpur. 4) Eisenoxydulsalze reduciren Goldchlorid in seinen Lösungen und scheiden metallisches Gold als feines braunes Pulver ab. Die darüber befindliche Flüssigkeit erscheint im durchfallenden Lichte schwarzlichblau. Wird der getrocknete Niederschlag mit einer Messerklinge gedrückt, so nimmt er Metallglanz an. 5) Kaliumnitrit fällt ebenfalls metallisches Gold, bei sehr starker Verdünnung ist die Flüssigkeit zunächst nur blau gefärbt. 6) Oxalsäure fällt aus der nicht zu sauren Lösung in der Siedehitze metallisches Gold.

Metallisches Gold fallen aus der Goldlösung überhaupt die meisten unedlen Metalle, ferner Quecksilber, Silber, Platin. Ebenso wirken als Reduktionsmittel Ferrochlorid, Ferro-

sulfat, Cuprochlorid, Antimontrichlorid, arsenige Säure, schweflige Säure, phosphorige Säure u s w Endlich führen auch viele organische Verbindungen, z B Chloralhydrat, Ameisensäure, Oxalsäure, Formaldehyd, Hydroxylamin, Phenylhydrazin u s w die gleiche Reduktion herbei

Alle Goldverbindungen geben beim Erhitzen auf Kohle vor dem Lötrohr gelbe, glänzende, dehnbare Metallkörner, beim Schmelzen mit Soda oder Borax gelbe, glänzende, dehnbare Metallflitter

Bestimmung Diese erfolgt stets in der Form des metallischen Goldes Man fällt dasselbe aus der stark salzsauren (weder freies Chlor noch Salpetersäure enthaltenden) Lösung mittels Ferrochlorid oder Ferrosulfat, wäscht es mit Salzsäure, später mit Wasser aus, trocknet und glüht im Porzellantiegel Das Filter wird verascht Aus der nicht zu sauren Lösung kann die gleiche Reduktion durch Oxalsäure in der Siedehitze erfolgen

Scheidung des Goldes aus Bruchgold etc Für pharmaceutische Präparate ist das Gold der Dukaten, welches mit durchschnittlich 1 Proc Silber legirt ist, hinreichend rein Das Silber wird bei ihrer Auflösung in Königswasser als Chlor Silber abgeschieden Zur Verwerthung von Bruchgold, das eine Legirung des Goldes mit verschiedenen Mengen Silber und anderen Metallen ist, scheidet man Gold auf folgende Weise rein ab Nachdem das Gold, wenn nöthig, ausserlich mit Sodaausgang gereinigt ist, übergiesst man es in einem Kolben mit der 4fachen Gewichtsmenge Königswasser und löst unter Digestion auf Die Lösung wird bis zur Syrupkonsistenz abgedampft, der Rückstand in der 30fachen Menge destillirtem Wasser gelöst, filtrirt (um gegenwärtiges Silberchlorid abzusondern) und nun mit etwas Natrumsulfatlösung versetzt Ist (von Lötungsstellen herrührend) Blei gegenwärtig, so wird dieses als Bleisulfat gefällt und durch Filtration beseitigt Die klare Goldlösung wird nun mit einer filtrirten Lösung aus 8 Th reinem kryst Ferrosulfat in 40—50 Th Wasser und 1 Th reiner Chlorwasserstoffsäure gemischt Das Gold fällt allmählich als Metall in Gestalt eines braunen Pulvers nieder Man kann auch aus der Goldlösung die Metalle mittelst Zinkmetall ausfällen, den Niederschlag mit Salzsäure und Wasser auswaschen, hierauf mit 25proc Salpetersäure die fremden Metalle oxydiren, beziehentlich auflösen, das Ungelöste mit Wasser abwaschen und endlich mit Salzsäure digeriren Reines Gold bleibt zurück

Goldlegirungen Reines Gold ist ausserordentlich weich, daher der Abnutzung ziemlich stark unterworfen Es eignet sich deshalb für Münzen, Gebrauchsgegenstände u dgl im reinen Zustande nicht Durch Legirung mit anderen Metallen kann man ihm, ohne Beeinträchtigung der meisten anderen Eigenschaften, Härte und Widerstandsfähigkeit verleihen Zur Herstellung von Münzen und Schmuckgegenständen legirt man es entweder mit Kupfer (rothe Karatirung) oder mit Silber (weisse Karatirung), die Legirung mit Silber und Kupfer heisst gemischte Karatirung

Feingehalt Unter dem Feingehalt einer Goldlegirung versteht man deren Gehalt an reinem Golde Früher bezeichnete man denselben in der Weise, dass man angab, wie viel Karate Gold in einer feinen Mark (= 24 Karat) enthalten sind 14karatiges Gold enthält somit in 24 Th = 14 Th Gold und 10 Th andere Metalle, d h es enthält 58,33 Proc reines Gold Gegenwärtig wird der Feingehalt einer Goldlegirung in Tausendsteln angegeben, d h man gibt an, wie viel Milligramm reines Gold in 1 g der Legirung enthalten sind 14karatiges Gold wird also jetzt als Gold mit einem Feingehalte von 0,583 bezeichnet

Nach dem deutschen Reichsgesetz vom 16 Juli 1884 dürfen Uhrgehäuse und Geräte aus Gold nicht geringeren Feingehalt als 0,585 = 14 Karat (Fehlergrenze $\frac{5}{1000}$) haben Schmucksachen dürfen mit jedem Feingehalt (Fehlergrenze $\frac{10}{1000}$) hergestellt werden, doch muss der Feingehalt auf jedem einzelnen Stücke mittelst eines Stempels angegeben sein Das auf Gerathen anzubringende Stempelzeichen für Gold besteht in einer Reichskrone, welche von einem Kreise (⊙) — die Sonne darstellend — umgeben ist

Münzgold Die deutschen Reichs Goldmünzen sind hergestellt aus einer Legirung, welche aus 90 Proc Gold und 10 Proc Kupfer besteht

Goldlötlöthe. 1) Hartlöth für 0,750 Gold besteht aus 9 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer 2) Weichlöth für 0,750 Gold = 12 Gold, 7 Silber, 3 Kupfer 3) Löth für 0,666 Gold, = 24 Gold, 10 Silber, 8 Kupfer 4) Löth für 0,583-Gold = 3 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer **Goldähnliche Legirung** für Schmucksachen, Gebrauchsgegenstände (Bleifederhalter etc) = 2,5 Gold, 7,5 Aluminium, 90,0 Kupfer

Goldschwamm für Zahnplomben. Werden 100 g einer 10proc Goldchloridlösung mit Kalumbikarbonat genau neutralisirt, alsdann mit einer gesättigten Lösung von 3,3 g Kalumbikarbonat versetzt, hierauf mit 20,8 g gepulverter Oxalsäure vermischt und die Mischung 2 Minuten lang gekocht, so scheidet sich das Gold als schwammartige Masse aus, welche nach dem Auswaschen und sehr gelindem Glühen zu Plombirungen verwendet wird

Goldamalgame, Telschow's besteht aus 4,18 Gold, 55,0 Silber und 40 Zinn, wird mit etwa dem gleichen Gewichte Quecksilber zum Amalgam zusammengeschmolzen

Goldbronze. Muschelgold **A.** echte Blattgold wird mit dünner Honiglösung fein gerieben **B** unechte besteht aus zerkleinerten Legierungen des Kupfers mit Zink

Goldseife. Wird bereitet durch Fallen einer Lösung von Goldchlorid mit Seifenlösung und wird benutzt in der Keramik zur Herstellung des Goldlusters

Goldpurpur. Cassius'scher Man versetzt eine Lösung von Ferrichlorid mit soviel Zinnchloridlösung, dass die gelbe Farbe verschwindet und eine grünliche Färbung auftritt Diese Flüssigkeit gießt man tropfenweise unter Umrühren in eine von Salpetersäure freie Goldchloridlösung (1:400) Nach eintägigem Absetzen wird der Niederschlag gewaschen und getrocknet Er stellt alsdann ein braunes Pulver von schwankendem Goldgehalte dar, welches zur Färbung von Rubinglas verwendet wird

Erkennung des Goldmetalles oder echter Vergoldung. Ob ein Gegenstand, z. B. eine Münze oder ein Schmuckstück etc. aus massivem Golde hergestellt ist, lässt sich durch Bestimmung des spec. Gewichtes feststellen Das spec. Gewicht des Münzgoldes liegt zwischen 18,0 und 19,0 Das spec. Gewicht anderer, z. B. zu Schmucksachen verarbeiteter Legierungen nähert sich den angegebenen Zahlen um so mehr, je mehr Gold die Legierungen enthalten — Wird eine Goldlegierung (z. B. von 14 Karat) mit einem angefeuchteten Silbernitratstift berieben, oder mit einer Lösung von Kupferchlorid (1:10) befeuchtet, so entsteht ein schwarzer Fleck nicht Messing und ähnliche goldähnliche Legierungen (Goldimitationen) geben einen schwarzen Strich Lukenlose Vergoldungen bleiben gleichfalls ungefärbt Man kann daher mit Hilfe dieser Reaktionen auch feststellen, ob ein gelber Metallüberzug Gold ist Will man das darunter befindliche Metall prüfen, so macht man an einer unauffälligen Stelle mit einer Nadel einen Ritz und prüft diesen mit dem Silbernitratstift oder mit der Kupferchloridlösung

Goldflecke. Bringt man Goldlösung auf Haut oder Wasche, so verursacht sie braunrothe Flecken Man entfernt diese, indem man sie zunächst mit verdünnter Kalilauge, dann mit 1 proc. Jodlösung, alsdann mit Kaliumjodidlösung und schliesslich mit Natriumthiosulfatlösung und Salmiakgeist beseitigt

Vergoldung anderer Metalle auf nassem Wege. Man löst 10 Th. Goldchlorid in 1800 Th. destillirtem Wasser, giebt 110 Th. Natriumbikarbonat dazu und kocht die Flüssigkeit in einem porcellanen Kasserol oder Glaskolben zwei Stunden lang, oder bis ihre gelbliche Färbung in eine grünliche übergegangen ist Den zu vergoldenden, wohl gereinigten Gegenstand hängt man, an Messingdraht befestigt, in das kochende Goldbad Nach 3—8 Minuten ist die Vergoldung vollendet (SCHUBARTI) Neusilber, Silber, Platin befestigt man an Zinkdraht, Eisen muss zuvor verkupfert werden

Eine andere wirksame Vergoldungsflüssigkeit besteht aus 10,0 Goldchlorid, gelöst in 20,0 destillirtem Wasser und dann gemischt mit einer Flüssigkeit, bereitet aus 30,0 Kaliumcyanid, 30,0 Natriumchlorid, 20,0 krystallisirtem Natriumcarbonat und 1250,0—1500,0 destillirtem Wasser Die Mischung wird bei Sate gestellt und wiederholt geschüttelt, bis sie farblos erscheint In diese bis zum Kochen erhitzte Vergoldungsflüssigkeit wird der zu vergoldende silberne, mit Weingeist und Schlammkreide wohl abgeriebene Gegenstand hineingelegt und gleichzeitig mit zwei Zinkstäben an entgegengesetzten Stellen berührt In wenigen Minuten ist die Vergoldung vollendet Das dabei am Zink etwa metallisch abgeschiedene Gold wird gesammelt etc.

Vergoldungspulver, Goldpulver, zur kalten Vergoldung des Silbers durch Anreiben, bereitet man angeblich in der Weise, dass man 10 Th. Gold und 2 Th. Kupfer in Königswasser löst, mit der Lösung Leinwandlappen trankt, diese trocknet und verbrennt Die Asche oder den Zunder reibt man mit einem mit Kochsalzlösung befeuchteten Leder oder Kork in die gut gereinigte Messing- oder Silberfläche

Goldsalzäther zum Vergolden von Eisen oder Stahl bereitet man in der Weise, dass man eine concentrirte wässrige, aber säurefreie Goldchloridlösung mit einem 3 bis 5fachen Volumen Aether wiederholt kräftig durchschüttelt und den Goldsalzäther von der farblos gewordenen wässrigen Schicht abhebt Mit dieser Goldlösung wird das mit Schmirgel und Weingeist blank geputzte Eisen mit Hilfe eines weichen Pinsels bestrichen

Eine Flüssigkeit zur galvanischen Vergoldung bereitet man aus 10 Th. Goldchlorid, 100 Th. Kaliumcyanid und 1000 Th. Wasser Als Anode dient ein Goldblech

Ein **Anlegeöl** für die Vergoldung lackirter Blechwaren mit Goldblatt oder mit Musivgold bereitet man durch Kochung unter Umrühren aus 10 Anise, 10 Asphalt, 15 Bleiglätte, 15 Umbra, letztere drei Substanzen höchst fein gepulvert, und 150 Leinöl Dieser kohlte Firnis wird mit Zinnober abgerieben, um ihm Körper zu geben, und dann mit Terpentinöl verdünnt, um ihn bequem mit einem Pinsel aufzutragen

Vergoldemehl zum heissen Stempeln (z. B. in Hütfutter u. dergl.) ist ein feines Pulver aus gleichen Theilen Dammar, Mastix, Sandarak und Kolophonium

Gluhwachs zur Erhöhung der Goldfarbe Es wird damit die Vergoldung bestrichen und der Gegenstand abgegluht Es besteht aus circa 50 Wachs, 5 rothem Bolus, 4 Grünspon, 4 gebranntem Alaun oder aus 100 Wachs, 25 gebranntem Bolus, 25 Colcothar, 15

Grünspan oder Kupferasche, 5 gebranntem Borax. Sobald das Wachs des über die Vergoldung gestrichenen Glühwachses abgebrannt ist, wird in kaltem Wasser abgelöscht etc

Glasvergoldung Dazu gehören drei Flüssigkeiten I Lösung von 2,0 saurefreiem Goldchlorid in 150,0 destillirtem Wasser — II Lösung von 5,0 trockenem Natriumhydrat in 80,0 destillirtem Wasser — III Lösung von 2,5 Starkezucker in 80,0 destillirtem Wasser, 25,0 Weingeist und 20,0 käuflichem reinem Aldehyd — Behufs der Vergoldung mischt man 200 cem der Flüssigkeit I, 50 cem der Flüssigkeit II und 5 cem der Flüssigkeit III schnell und giesst die Mischung in das zu vergoldende mit SodaaLösung und Wasser gereinigte Glas In 5 Minuten ist die Vergoldung geschehen

Unechte Vergoldung Man löst Bleiacetat und Natriumthiosulfat zusammen in Wasser und lässt die versilberten Gegenstände 2—3 Minuten bei 70° C darinnen.

† Aurum tribromatum Goldbromid Goldtribromid $\text{AuBr}_3 = 486$

Darstellung Sehr fein vertheiltes Gold wird mit wenig Wasser übergossen und darauf unter Umrühren die berechnete Menge Brom hinzugefügt Sobald Lösung eingetreten ist, wird die filtrirte Lösung bei gelinder Wärme zur Trockne eingedunstet

Eigenschaften Dunkelbraune Masse, löslich in Wasser, Weingeist und Aether Das Salz bildet mit anderen Bromiden Doppelsalze

Der Goldgehalt wird durch Glühen des Salzes und Wägen des Rückstandes bestimmt

Anwendung Dieses Präparat wurde von GOURBERT als ein vortreffliches Mittel gegen Epilepsie empfohlen, da es selbst in sehr kleinen Gaben sehr rasch wirkt und lange Intermissionen der Anfälle bedingt, während weder Bromismus noch Verdauungsbeschwerden und Schwäche der intellektuellen und sexuellen Fähigkeiten zu beobachten sind Die Tagesdosis beträgt bei Kindern 0,008—0,006 g, bei Erwachsenen 0,008—0,012 g Bei Migräne Anfällen kann man 0,008 g zweimal des Tages eine Stunde vor den Mahlzeiten geben

† Aurum-Kalium bromatum Kalium-Goldbromid $\text{KAuBr}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 591$

Darstellung 100 Th feinst zertheiltes Gold, 61 Th Bromkalium und 128 Th Brom werden mit ca 2500 Th Wasser übergossen und solange geschüttelt, bis Lösung eingetreten ist Darauf wird filtrirt und das Filtrat zur Krystallisation eingedampft Die ausgeschiedenen und abgesaugten Krystalle werden aus Wasser umkrystallisirt

Eigenschaften Braunschwarze, nadelförmige Krystalle, leicht löslich in Wasser Aether nimmt aus diesem Doppelsalz das Goldtribromid auf und scheidet Kalumbromid ab

Den Goldgehalt bestimmt man durch Glühen des Salzes und Auslaugen des Rückstandes

Anwendung. Dieses Präparat wurde von MERCK an Stelle des leicht zersetzlichen Goldtribromids empfohlen und von IVAN TANKURA und LAUFENAUER bei Epilepsie und Hysteroepilepsie mit gutem Erfolge gebraucht Die innerliche Anwendung des Mittels empfiehlt sich nicht, dagegen ist die subkutane Injektion empfehlenswerth

Rp Aur Kalu bromati 0,4

Aquas destillatae 20,0

S D S Zur Injektion [LAUFENAUER]

Hiervon injicirt man anfänglich 0,5 cem und steigt allmählich bis zu 2 cem Die mittlere Dosis beträgt 0,02 g des Präparates, was 1 cem obiger Lösung entspricht

†† Aurum Kalium cyanatum Kalium-Goldcyanid $2\text{KAuCy}_4 + 3\text{H}_2\text{O} = 732$

Darstellung. Eine concentrirte Lösung von 54 Th neutralem Goldtrichlorid wird in eine concentrirte heisse Lösung von 46 Th Kalium cyanatum puriss (pro analysi) gegossen, das beim Erkalten sich ausscheidende Salz abgesaugt und aus Wasser umkrystallisirt

Eigenschaften. Durchsichtige tafelförmige Krystalle, löslich in Wasser, unlöslich in Weingeist Bei massigem Glühen geht das Salz in Kalium-Goldcyanur KAuCy_3 über

Den Goldgehalt des Salzes bestimmt man durch sehr starkes Glühen und Auslaugen des Rückstandes

Anwendung. Dieses Doppelsalz ist ein sehr starkes Antisepticum Ein Theil vermag schon 25000 Th Blutsorurn zu sterilisiren und für die Entwicklung pathogener Mikroben ungeeignet zu machen Für klinische Zwecke wurde das Präparat noch nicht verwandt, es wäre jedoch zu versuchen, dasselbe an Stelle des schon vor mehr als 40 Jahren von CHRISTIAN in die Therapie eingeführten und bei Skrophulose, Phthisis und Amenorrhoe gebrauchten Aurum cyanatum zu geben

Aufbewahrung Sehr vorsichtig, vor Licht geschützt

Aurum chloratum.

Unter dem Namen „Goldchlorid“ werden gewöhnlich zwei Verbindungen durcheinandergeworfen 1) Das neutrale Goldchlorid AuCl_3 und 2) der Goldchlorid-Chlorwasserstoff $\text{AuCl}_3 + \text{HCl} + 4\text{H}_2\text{O}$

I. † Aurum chloratum acidum (Erganzb.) Aurum chloratum chlorhydricum Goldchlorid-Chlorwasserstoff Wasserstoffgoldchlorid. Wasserstoff-Aurichlorid Aurichlorwasserstoff. $\text{AuCl}_3 + \text{HCl} + 4\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew. = 411

Darstellung. Man löst 10 Th. reines metallisches Gold unter mässiger Erwärmung in einem Kolben in 45 Th. Königswasser und dampft das Filtrat im Wasserbade ein, bis es frei von Salpetersäure (s. w. unten) ist und ein Tropfen, auf eine kalte Glasplatte gesetzt, erstarrt. Den Rückstand bringt man in einen mit Aetzkalk gefüllten Exsiccator zum Krystallisieren. Die Masse wird später zerrieben, und das Pulver über Aetzkalk nachgetrocknet.

Eigenschaften. Orangefarbige, krystallinische, an der Luft zerfliessende Salzmasse, in Wasser, Weingeist oder Aether leicht löslich. Es sei in Weingeist oder Aether völlig löslich. Bei Annäherung eines mit Ammoniakflüssigkeit benetzten Glasstabes gebe es keine Nebel (freie Salzsäure). Beim Glühen hinterlasse es nahezu 48 Proc. (theoretisch 47,68 Proc.) metallisches Gold. — Wird die 10proc. wässrige Lösung durch Erwärmen mit Oxalsäure vom Gold befreit, so darf 1 ccm des Filtrates nach dem Mischen mit 2 ccm konc. Schwefelsäure keine braune Zone geben, wenn die Mischung mit 1 ccm Ferrosulfat-Lösung überschichtet wird (Salpetersäure).

Das soeben beschriebene Präparat ist das in der Praxis gebräuchlichere und wird sehr häufig fälschlich als „Goldchlorid“ schlechthin bezeichnet.

II † Aurum chloratum (neutrale). Goldchlorid. Aurichlorid Goldtrichlorid. Chlorgold. Chlorure d'or (Gall.) AuCl_3 . Mol Gew. = 302,5.

Um diese Verbindung zu erhalten, dampft man die bei dem vorigen Präparate erhaltene saure Goldchloridlösung im Sandbade unter Umrühren so lange ein, bis Chlor sich zu entwickeln beginnt. Alsdann lässt man erkalten, löst den Rückstand in Wasser, filtrirt und dampft die Lösung im Wasserbade ein, bis sie beim Erkalten fest wird. Die erkaltete Masse hat die Zusammensetzung $\text{AuCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$, durch Erhitzen auf 150°C wird das Präparat wasserfrei. Braune, sehr hygroskopische Masse, dem vorigen Präparat sehr ähnlich. Enthält im wasserfreien Zustande 64,8 Proc. metallisches Gold.

Aufbewahrung. Beide Präparate sind vorsichtig vor Licht und vor Feuchtigkeit sehr gut geschützt aufzubewahren.

Anwendung. Goldchlorid dient zur Darstellung verschiedener Goldverbindungen, in der organischen Chemie zur Darstellung der Gold-Doppelsalze (von Alkaloiden), als Reagens in der Analyse, zu Vergoldungen, zum Tönen der photographischen Bilder. In der Therapie wird es besonders bei dem LANDOLFF'schen Verfahren zur Behandlung des Krebses angewendet.

Causticum LANDOLFF
Rp Auri trichlorati
Zinci chlorati
Liquoris Sublii chlorati
Bromi chlorati aa 5,0
Farinae triticeae q s
M f pasta mollis 8 mm dick auf Leinen zu
streichen, und auf der exulcerirten Stelle so lange

liegen zu lassen, bis sie mit dem abgestorbenen Gewebe abfällt.

Causticum RECAMIER
Liquor Auri nitroso-muriatici.
Rp Auri trichloridi 0,8
Aquae regiae 80,0
(Aetzmittel für Carcinoma)

Auro-Natrium chloratum.

Unter dem Namen „Auro Natrium chloratum“ oder „Natrium Goldchlorid“ werden Verbindungen des Goldchlorids mit Natriumchlorid von verschiedenem Goldgehalt verstanden, man muss sich daher in jedem einzelnen Falle die Frage vorlegen, was ein gegebenes Präparat darstellen soll

I † Auro-Natrium chloratum (Germ Helv) **Auri et Sodii Chloridum** (U-St)
Natrium-Aurichlorid. Chlorgoldnatrium Gozzi's Salz. Officinelles Goldsalz Das im Nachstehenden zu besprechende Präparat ist keine einheitliche, chemische Verbindung, sondern eine Mischung der Verbindung Natrium-Goldchlorid $\text{AuCl}_3 \cdot \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ mit Kochsalz Es ist in den genannten drei Pharmakopoen von gleicher Zusammensetzung

Darstellung Man bringt in einen gläsernen Kolben 18 Th reines Gold, übergiesst dasselbe mit einer Mischung aus 16 Th Salpetersäure (von 25 Proc) und 48 Th. Salzsäure (von 25 Proc), setzt auf den Kolben einen kleinen Trichter auf und erwärmt den Inhalt bis zur völligen Auflösung des Goldes Dann giesst man die Lösung (ist Filtration erforderlich, so erfolgt diese durch einen Bausch Asbest oder Glaswolle) in eine Porcellanschale, spült Trichter und Kolben gut nach und dampft die Lösung auf dem Wasserbade bis zur Sirupkonsistenz unter Umrühren ein Den zurückbleibenden Sirup löst man in 20 Th Wasser, dann bringt man 20 Th schwach gegluhtes reines Natriumchlorid hinzu, dampft die Lösung im Wasserbade unter Umrühren mit einem Glasstabe ein und führt das Austrocknen schliesslich im Wasserbad Trockenschranke zu Ende Dann zerreibt man den Trockenrückstand in einem erwärmten Morser, mischt das resultierende Pulver und füllt es sogleich in kleine, gut zu verschliessende (Korken mit Paraffindichtung!) Gläser ab

Eigenschaften. Pomeranzengelbes Pulver von neutraler oder nur schwach saurer Reaktion und metallischem Geschmack, in 2 Th. Wasser zu einer gelben Flüssigkeit löslich Weingeist löst aus dem Präparat nur das Natrium-Aurichlorid $\text{AuCl}_3 \cdot \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ heraus, während das ausserdem vorhandene Natriumchlorid ungelöst bleibt Beim Glühen giebt es Chlor ab, und es hinterbleibt ein Gemisch von Natriumchlorid und metallischem Gold Das Präparat ist eine Mischung von 61—62 Proc Natrium-Aurichlorid ($\text{AuCl}_3 \cdot \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$), 35—37 Proc Natriumchlorid und 2—4 Proc Wasser — Es ist, mit reinem Natriumchlorid bereitet, nicht gerade hygroskopisch, kann aber aus der Luft etwa 5 Proc Feuchtigkeit aufnehmen, ohne feucht zu erscheinen

Prüfung 1) Schüttelt man das Standgefäss des Präparates um, öffnet es alsdann und nähert seiner Oeffnung hierauf einen mit Ammoniakflüssigkeit schwach benetzten Glasstab, so darf Bildung weisser Nebel nicht erfolgen, andernfalls enthält das Präparat freie Salzsäure 2) Bestimmung des Goldgehaltes Man bringt 0,5 g des Salzes in ein Becherglas, übergiesst es mit etwas verdünnter Ameisensäure und verdunstet diese durch mässiges Erwärmen Man wiederholt dieses Befeuchten mit Ameisensäure und Abdampfen noch zweimal, dann sammelt man das hinterbliebene metallische Gold auf einem Filter, wäscht es aus und bestimmt sein Gewicht Es soll erhalten werden Nach Germ und U St mindestens 80,0 Proc, nach Helv = 82,5 Proc metallisches Gold Es ergibt sich hieraus, dass die Helv ein scharf getrocknetes Präparat vorschreibt

Aufbewahrung Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, vorsichtig

Anwendung Das beschriebene Präparat wirkt ausserlich schwach atzend, färbt die Haut violett, schliesslich schwarz Man wendet es ausserlich an zu Einreibungen in die Zunge und in das Zahnfleisch bei syphilitischen Erkrankungen dieser Organe Innerlich wird dem Goldchlorid eine Wirkung auf den Geschlechtsstreb, die Menstruation und die Diurese zugeschrieben, ohne dass hierfür exakte Beweise vorliegen Langerer Gebraucht führt wie beim Quecksilber Speichelfluss herbei Höchste Gaben *pro dosi* 0,05 g, *pro die* 0,2 g (Germ Helv) Technisch zum Tönen der photographischen Silber Kopien, auch wohl zur Herstellung galvanischer Vergoldungslösungen

II. † Natrium-Goldchlorid Natrium-Aurichlorid. Chlorure d'or et de sodium (Gall) Goldsalz. Sal Auri Chrestien. Sal Auri Figuer. $\text{AuCl}_3 \cdot \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 397. Dieses von der Gall aufgenommene Präparat ist die der oben angegebenen Formel entsprechende chemische Verbindung „Natrium Goldchlorid“ — Die Darstellung erfolgt in der nämlichen Weise wie bei dem vorigen (Seite 437) angegeben worden ist, nur setzt man der aus 13 Th Gold erhaltenen Lösung nur 3,88 Th reines schwach geglähtes Natriumchlorid hinzu Die Lösung bringt man entweder durch Abdampfen im Wasserbade zur Trockne oder man lässt sie — beabs. Erzeugung von Krystallen — im Schwefelsäure Exsiccator stehen

Pomeranzengelbe, prismatische, an der Luft beständige, in absolutem Alkohol völlig lösliche Krystalle von ähnlichen Eigenschaften wie das vorige Sie sollen, in der auf S 437 angegebenen Weise auf den Goldgehalt geprüft, mindestens 49 Proc (theoretisch 49,37 Proc Gold hinterlassen Anwendung in der Photographie und zum Vergolden Höchste Gaben *pro dos* 0,05, *pro die* 0,15

III † Auro-Kalium chloratum Kalium-Aurichlorid. Kalium-Goldchlorid. $\text{AuCl}_3 \cdot \text{KCl} + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 413 Wird in analoger Weise dargestellt wie die vorigen, nur wird die aus 13 Th Gold erhaltene Lösung von Goldchlorid mit 4,95 Th scharf getrocknetem Kaliumchlorid eingedampft Gelbe, durchsichtige, rhombische Tafeln, welche an der Luft verwittern

IV † Auro-Ammonium chloratum Ammonium-Aurichlorid. Ammonium-Goldchlorid. $\text{AuCl}_3 \cdot \text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 392 Wird wie die vorigen dargestellt, nur dampft man die aus 13 Th Gold erhaltene Lösung von Goldchlorid mit 2,73 Th scharfgetrocknetem Ammoniumchlorid ein Gelbe, rhombische Tafeln

KEELEY'S Goldcure gegen Trunksucht I Rp Auro-Natri chlorati 0,75, Ammon chlorati 0,4, Strychni nitrici 0,065, Atropini sulfurici 0,015, Extracti Chinæ fluidi 90,0, Extracti Cocae, Glycerini, Aquae destillatae aa 30,0 Zweistündlich einen Theelöffel II. Rp Auro-Natri chlorati 0,15, Aquae destillatae 30,0 Zur subkutanen Injektion

Guttas aureas LEHMANN

Rp Auro-Natri chlorati 0,1
Aquae destillatae 50,0

D S Dreimal täglich 20 Tropfen (allmählich steigend auf 50 Tropfen und Gebrauch von Sassa parill-Dekokt bei sekundärer Syphilis)

Liquor Auri ammoniaci chlorati

FURNARI et DUBESCHAMPE

Rp Auro-Ammon chlorati 0,5
Aquae destillatae
Spiritus (90 Proc.) aa 800,0

D S Einen Theelöffel voll des Morgens und Abends (bei Amenorrhoe, Dysmenorrhoe)

Pilulae auriferae CHRESTIEN

Rp Auro-Natri chlorati crystallisati 0,5
Amyli Solani tuberosi 2,0
Gummi arabici 5,0
Aquae q s
fiant pilulae 120

Pilulae Auro Natrii chlorati

MARTINI

Rp Auro Natri chlorati 0,3
Extracti Dulcamarae 3,0

fiant pilulae 50

D S Täglich mittags und abends nach jeder Mahlzeit eine Pille, wöchentlich um je eine Pille bis zu 5 Pillen steigend (bei Anschwellungen und Verhärtungen des Uterus)

Sirupus Auro Natrii chlorati

Rp Auro-Natri chlorati 0,05
Sirupi Sacchari 200,0

Aurum jodatum.

† Aurum jodatum. Joduretum aurosum. Aurojodid. Goldjodür. Goldmono-jodid AuJ. Mol. Gew. = 323

Bereitung Das säurefreie Chlorid aus 10,0 Gold oder 15,2 scharf getrocknetes Aurichlorid werden in 200,0 destillirtem Wasser gelöst und allmählich unter Umrühren mit einer Lösung von 28,0 Kaliumjodid in 100,0 destillirtem Wasser versetzt Man lässt die Flüssigkeit absetzen, dekanthirt, giesst auf den Bodensatz circa 400,0 destill. Wasser, dekanthirt und sammelt den Bodensatz in einem Trichter, welcher mit einem lockeren Bauschehen Glaswolle geschlossen ist, wäscht mit Wasser nach, bis das Abtropfende

kaum noch eine Färbung zeigt. Den Niederschlag breitet man auf einen flachen Porcellanteller aus und trocknet ihn an einem lauwarmen, 35°C nicht überschreitenden, vor Licht geschützten Orte, bis das anhängende freie Jod vollständig verflüchtigt ist. Ausbeute circa 15,0. In den Waschwässern ist etwas Gold enthalten, und kann dasselbe durch Zink abgeschieden werden.

Eigenschaften. Das Aurojodid ist ein leicht zersetzliches, citronengelbes Pulver, gewöhnlich wegen anhängenden freien Goldes oder freien Jods grünlich. Beim Erhitzen auf 120°C , auch schon beim Kochen der wässrigen Lösung zerfällt es in seine Bestandtheile. Es ist in Wasser und Weingeist unlöslich.

Aufbewahrung und Anwendung sind dieselben, wie man unter Auro-Natrium chloratum angegeben findet. Ein obsoletes Präparat.

Aurum oxydatum.

† Aurum oxydatum (seu hydroxydatum) Acidum auricum Crocus Solis. Aurihydrat. Goldoxyd (hydrat) Goldsäure. $\text{Au}(\text{OH})_3$. Mol Gew = 247

Bereitung. 10,0 präcipitirtes Gold werden in 40,0 Königswasser gelöst, und im Wasserbade bis zur Sirupdicke eingedampft, dann in 300,0 bis 400,0 destillirtem Wasser gelöst, die Lösung mit 50,0–55,0 gebrannter Magnesia versetzt und einen Tag an einem dunkeln Orte bei Seite gestellt. Den von der überstehenden Flüssigkeit durch Dekanthiren getrennten Niederschlag zieht man mit einer circa 2,5 procentigen reinen Salpetersäure (gemischt aus 50,0 reiner Salpetersäure von 1,153 spec Gew und 450,0 Wasser), um die anhängende Magnesia zu beseitigen, zuletzt mit destillirtem Wasser aus und trocknet ihn auf flachen Tellern ausgebreitet vor Licht geschützt bei gewöhnlicher Temperatur. Ausbeute 12,0.

Eigenschaften. Das häufig als Goldoxyd bezeichnete Präparat ist eigentlich das Goldhydroxyd, es bildet frisch gefällt ein gelbes, in der Wärme braun werdendes Pulver, welches bei 100°C in Wasser und Goldoxyd Au_2O_3 zerfällt, sich auch im Licht zersetzt unter Abscheidung von metallischem Golde. Es ist löslich in Salzsäure, auch in concentrirter Salpetersäure, unlöslich in verdünnter Salpetersäure. Beim Uebergießen mit Ammoniak bildet sich das im trocknen Zustande leicht explodirende „Knallgold“ (*Aurum fulminans*).

Aufbewahrung. In der Reihe der stark wirkenden Arzneistoffe in kleinen, dicht geschlossenen Flaschchen, vor Licht geschützt. Bei Verarbeitung zu Pillen (im porcellanen Morser anzustossen!) benetzt man es vor dem Verreiben mit einigen Tropfen Wasser, weil ein gekauftes Präparat, wie die Erfahrung gezeigt hat, zuweilen Knallgold enthält.

Anwendung. Das Goldoxyd wurde wie das Goldchlorid als Antisymphiliticum in Gebrauch gezogen, heute aber wird es kaum noch beachtet. Die Dosis ist derjenigen des Auro-Natrium chloratum gleich.

Avena.

Gattung der Gramineae—Aveneae.

Avena sativa L., der „Hafer“

Verwendung findet die von den Hüll- und Deckspelzen befreite Frucht *Fructus Avenae excoctatus*. Semen *Avenae excoctatum*. Grutum. Hafergrütze als leicht-verdauliches Nahrungs- und reizmildendes Heilmittel. Die bei der Fabrikation der Hafergrütze gewonnenen Abfälle gelangen als Futtermittel unter den Namen Haferweissmehl, Haferrothmehl und Haferbulsen in den Handel.

Bestandtheile 12,11 Proc Wasser, 10,66 Proc Stickstoffsubstanz, 4,99 Proc Fett, 58,37 Proc stickstofffreie Extraktstoffe, 10,58 Proc Rohfaser, 3,29 Proc Asche

Erkennung der Haferstärke of Amylum S S 295

Giftgrutze ist eine mit Strychninlösung (2,5—5,0 g Strychnin nitro in heissem Wasser q s gelöst auf 1 kg Grutze) getränkte, dauerhaft roth gefarbte Hafergrutze, zum Verhütn der Hausmause bestimmt Zum Auslegen im Freien eignen sich mehr die ganzen, vergifteten Körner

Avenacia von RADEMANN enthält in 100 Th etwa Fett 7, Protein 14, Kohlenhydrate 66, Salze 3 Th

Hafer-Konserve von GUST WARNECKE besteht aus Hafermehl, dextrinirtem Erbsenmehl, Roggen- und Leinsamenmehl

Hafermehl, Präparirtes, von KNORR, sowie

Hafermehl, Präparirtes, von WEIDENHAIN, sind Nahrungsmehle, die in 100 Th Verdauliches Eiweiss 9, Fett 5—7, Kohlenhydrate 72, Wasser 10, Salze 1 (abgerundet) enthalten und wahrscheinlich dem pisp Gerstenmehl ähnlich behandelt werden

Herculo, KATHRENNER'S ein Kaffee-Ersatz, der durch Walzen von Haferkörnern hergestellt wird

Präparirtes amerikanisches Hafermehl (Horn by steam cooked oatmeal), enthält Fett, 6,71 Proc, Stickstoffsubstanz 16,30 Proc, stickstofffreie Extraktivstoffe 64,44 Proc, Asche 1,82 Proc, Wasser 10,73 Proc

Lactina, Schweizerische, von PAUSHAUD & Co zur Thierernahrung, ist ein Gemisch aus Hafer-, Mais-, Reis-, Leinsamenmehl, Knochenmehl, Salz und Fenchelöl

Ballota.

Gattung der Labiatae — Stachyoidae

Ballota nigra L. Schwarzer Andorn. Heimisch von Nordafrika und Europa bis Nordpersien, liefert in dem getrockneten Kraut

Herba Ballotae nigrae **Herba Marrubii nigri seu foetidi.** **Herba Marrubiastr** **Ballote**, Gottesvergess ¹⁾ Die Pflanze ist charakterisirt durch den trichterförmigen, vor springend zehnnervigen Kelch mit kielig gefalteten Zähnen Sie ist weichbehaart, die Blätter gestielt, eirund oder am Grunde herzförmig, grob gesägt

Von unangenehmem Geruch, bitterem und etwas aromatischem Geschmaack

Einsammlung Das bei beginnendem Aufblühen gesammelte Kraut 4 Th frisches Kraut geben 1 Th trockenes

Leonurus lanatus (L.) Spreng (ebenfalls Labiatae — Stachyoidae) Heimisch in Sibirien liefert

Herba Ballotae lanatae. **Hb. Ballotae lanatae sibiricae.** **Hb. Leonuri lanati** **Hb. Panzeriae lanatae.** Panzerie. Sibirische oder wollige Ballote. Wolfstappkraut

Wie die vorige obsolet

Ballota suaveolens L (*Erva cidriera*), wird in Jamaica bei tuberkulöser Peritonitis angewendet

Balnea medicata.

Balnea. Bäder Bains Bath. (Plural=Baths) Die wachsende Bedeutung der Bäder für die Allgemeinbehandlung macht eine Besprechung der für den Apotheker in Betracht kommenden Gesichtspunkte erforderlich

Allgemeines Je nachdem der ganze Körper oder nur Theile desselben der Bade-procedure unterworfen werden sollen, unterscheidet man 1) Vollbad, *Balneum totale* = 250—300 l Wasser 2) Sitzbad, *Enkathisma* seu *Insessus* = 25—40 l Wasser 3) Fussbad, *Pediluvium* = 6—18 l Wasser 4) Armbad, *Brachiluvium* = 5—8 l Wasser 5) Handbad, *Maniluvium* = 1—2 l Wasser

¹⁾ Unter diesem Namen auch *Marrubium vulgare* und *Succisa pratensis*

Je nach der anzuhaltenden Temperatur nennt man ein Bad eiskalt von 0–5° C, sehr kalt von 5–12° C, kalt von 12–18° C, kühl von 18–25° C, lauwarm von 25–32° C, warm von 32–37° C, heiss von 37–42° C

Die Dauer der Bäder beträgt bei warmen und heissen Bädern etwa 5 Minuten, bei kühleren, wenn Wärmeentziehung beabsichtigt ist, bis zu 20 Minuten. Sie ist vom Arzt genau anzugeben.

Als Bade-Gefässe, in welchen die Bäder zu nehmen sind, benutzt man Wannen aus Zink, Kupfer, Porcellan für solche Bäder, deren Ingredienzen auf diese Stoffe nicht einwirken. Bäder mit differenten Stoffen werden zweckmässig in Wannen aus Holz genommen. Zur letzteren Gruppe gehören nicht nur die Bäder, welche Säuren enthalten, sondern auch solche, die mit Eisensalzen, Schwefelleber, Moor versetzt sind.

Die zu den medicinischen Bädern zu verwendenden Bade Ingredienzen brauchen nicht von höchster Reinheit zu sein, man verwendet vielmehr gewöhnlich technische Sorten. Die im Nachstehenden angeführten Mengen sind für „Vollbäder“ berechnet. Für Sitzbäder rechnet man den $\frac{1}{3}$, für Fussbäder den $\frac{1}{10}$ und für Handbäder den $\frac{1}{20}$ Theil.

Von den Ingredienzen werden Salze direkt im Badewasser gelöst oder diesem in Form von Lösungen zugesetzt. Kräuter u. dgl. werden zum Theil als Aufguss, zum Theil in Substanz dem Badewasser zugesetzt, in einigen Fällen auch in locker gewebten Sackchen in das Badewasser eingehängt.

Kohlensäure-Bäder. Zur Nachbildung der natürlichen Kohlensäure-Bäder sind vielfache Vorschläge gemacht worden. Das Verfahren, kohlensäure Salze durch Säuren zu zersetzen, führt zwar zur Entwicklung von Kohlensäure, aber diese wird nur wenig vom Wasser gelöst, daher üben diese Bäder nur geringen Hautreiz aus. Das vollkommenste Verfahren ist das von Bloch in Elberfeld, dieses führt zu einem Badewasser, welches auch noch bei Blutwärme ganz erhebliche Mengen Kohlensäure gelöst enthält.

Bade-Tabletten von SANDOW. DRP. Krystallisiertes Ferrosulfat wird mit Kalium bisulfat zusammengeschmolzen und in Pastillenform gebracht. Diese Pastillen werden in ein Natriumbikarbonat enthaltendes Bad eingetaucht.

Pasta Mack, Zusatz zum Waschwasser, bez. zu Bädern. Reisstärke 27,0, Brausepulver 73,0. Es werden Pastillen von 6 g Schwere geformt. 8 Pastillen = 2 \mathcal{A} .

Sandbäder. In eine Kiste wird eine 10 cm hohe Schicht warmer Flusssand geschüttet. Der Patient setzt sich, in eine Decke gehüllt, hinein und wird mit Sand von 45–50° C zugedeckt. Brust und Bauchdecke bleiben frei.

Fango, Linimentum minerale. Der Schlamm der heissen Quellen von Battaglia in Italien, welcher zu Bädern bzw. Umschlagen gegen Rheumatismus, Frauenkrankheiten etc. angewendet wird. Enthält Wasser 50,0 Proc., organ. Substanz 8,0 Proc., Mineralbestandtheile (Sand, CaO, MgO, Fe₂O₃, Al₂O₃, Cl, SO₃, CO₂, P₂O₅, K₂O, Na O) 42 Proc.

Limanol, Einreibung gegen Ischias, Migraine etc., besteht aus Chloroform, Ammoniakflüssigkeit, Terpentinöl, Seifenspiritus und Moorextrakt. Wird nach dem Bade angewendet.

Aechener Bad (Aechener Bäderseife)	
Rp	Calen sulfinati 45,0
	Natrii chlorati 15,0
	Kalii iodati 2,0
	Kalii bromati 2,0
	Saponis kalini 136,0
Alaun Bad	
Rp	Alumini 100–150,0
Alkalisches Bad	
Balneum Sodae Bain alcalin. (Gall)	
Rp	Natrii carbonici cryst 250,0
Ameisen Bad	
I	
Rp	Spiritus Formicarum
	Tincturae Formicarum aa 250,0
II	
Rp	Acidi formici (25 %) 10,0

Aromatisches Bad	
I Rp	Specierum aromatic 500,0
Weiden in lose gewebtem Beutel abgeben. Man	
infundirt mit 10 Liter heissem Wasser $\frac{1}{2}$ Stunde	
und giesst die Kolatur in das Bad. In gleicher	
Weise Lindenblüthen-Bad	
II Rp	Mixturae oleosae balsamicae
	Tincturae Calami aa 100,0
Arsenikalisches Bad	
Rp	Natrii arsenici 5–6,0
	Natrii carbonici cryst 12,0
Gegen chronische Gelenk-Entzündung	
Balneum Bareginense	
Bain dit de Barèges (Gall)	
Rp	Natrii sulfurati (Na ₂ S + 9H ₂ O)
	Natrii chlorati aa 50,0
	Natrii carbonici calcinati 30,0
In Glasgefässen abzugeben	

Balneum Pennesiae.

Bain de Pennès

A

Rp	Kali bromat	
	Calcii carbonic	50,0
	Natrii phosphoric	8,0
	Natrii sulfurici sicc	5,0
	Alumini sulfurici	1,0
	Ferri sulfurici sicc	3,0
	Natrii carbonici sicc	800,0

B

Rp	Olei Rosmarini	
	Olei Lavandulae	
	Olei Thymi	50,0
	Tinct Staphidis agrae	50,0

Die Salzmischung A wird im Vollbade gelöst, worauf man B zuzusetzt

Balneum Plumbianum

Bain dit de Plombières (Gall.)

A

Rp	Natrii carbonici cryst.	100,0
	Natrii sulfurici cryst.	50,0
	Natrii chlorati	
	Natrii bicarbonici	50,0

B

Rp Gelatinae pulv 100,0
A und B werden getrennt abgegeben, B wird in 1 Liter Wasser gelöst

Balneum Vichienae

Bain dit de Vichy (Gall.)

Rp Natrii bicarbonici 500,0

Eisen und Stahlbäder

I

Rp	Ferri sulfurici cryst	100
----	-----------------------	-----

II

Rp	Tartari ferric	100,0
	Aquae fervidae	900,0

Die Lösung ist zu filtrieren

Jod-Bad

I

Rp	Kali jodati	50,0
----	-------------	------

II

Rp Nach Lugol.

Für Erwachsene

	I	II	III.
Kali jodati	15,0	20,0	24,0
Jodi	8,0	10,0	12,0
Aquae	625,0	625,0	625,0

Für Kinder

Kali jodati	5,0	6,0	9,0
Jodi	2,5	3,0	4,0
Aquae	300,0	300,0	300,0

In Holzwannen zu nehmen Die römischen Zahlen I—III geben die verschiedenen Stärken an, wie sie vom Arzte auch zu verordnen sind.

Kalmus Bad

Rp	Tincturae Calami	100—300,0
----	------------------	-----------

Kiefernadel Bad

Rp	Extrakt der Nichten- oder Kiefernadeln	250—500,0
	Olei Pini sylvestris	15,0
	Spirtus	60,0

Kleie Bad

Man setzt dem Bade das Dekokt von 1—2 kg Weizenkleie zu Auch kann man die Kleie in locker gewebten Beuteln in das Bad einhängen und die Beutel zum Frottieren benutzen

Kohlensäure Bad (Diet M)

A

Rp	Natrii bicarbonici	150,0
----	--------------------	-------

B

Rp Acidi hydrochlorici (25 %) 250,0
Man löst zunächst A im Badewasser und rührt alsdann B darunter

Kreuznacher Mutterlaugen-Bad

Natrii chlorati	68,0
Calcii chlorati fusi	750,0
Kali chlorati	75,0
Magnesi chlorati	110,0
Natrii bromati	2,0

Langen Bad

Auf ein Vollbad setzt man zu, eine der nach stehenden Substanzen

Pottasche	200—500,0 oder
Soda calcinirt	200—500,0 oder
Natronlauge (15%)	50,0

Leim Bad

Bain gelatineux (Gall.)

Rp Gelatinae pulv 500,0

Wird, in 2 Litern heissem Wasser gelöst, dem Bade zugesetzt

Malz Bad

1—3 kg geschrotetes Gersten-Malz wird mit 5—10 Litern Wasser von 40° C eingemaischt Nach 1 Stunde erwärmt man auf 65° C, läßt 2 Stunden bei dieser Temperatur, erhitzt sodann eine Stunde im Wasserbade und presst scharf ab Nicht vorrätig zu halten

Moorbad

Auf 1 Vollbad werden 50 kg Mooreerde gerechnet Temperatur 33—38° C An Stelle von Mooreide werden neuerdings auch 1/2—1 kg Moorsalz oder 1—2 kg Moorlauge angewendet

Moor Salz (Künstliches)

Rp	Ferri sulfurici sicc	500,0
	Natrii sulfurici sicc	40,0
	Calcii sulfurici praecip	20,0
	Magnesi sulfurici sicc	20,0
	Ammonii sulfurici	20,0

Mutterlaugen Bader

von Kreuznach, Kösen, Rehme, Wittkind u a O

Mutterlauge 2—3 kg

Kochsalz 0,5—1,0 kg

Neuhemer Bad (Künstliches)

	mild	mittl	stark
Kreuznacher Lauge	0,8 l	1,0 l	1,5 l
Natriumbicarbonat	250,0 "	400,0 "	500,0 "
Salzsäure (25%)	300,0 "	500,0 "	600,0 "

Pottasche-Bad

Rp	Kali carbonici caudi	125,0
----	----------------------	-------

Quecksilber Bad

Bain de sublimé corrosif (Gall.)

Rp	Hydrargyri bichlorati	
	Ammonii chlorati	50,0
	Aquae destillatae	200,0

sub signo veneni

Das Bad ist in einer Holzwanne zu nehmen.

Reichenhaller Mutterlaugensalz.

Rp	Kali chlorati	50,0
	Lithii chlorati	1,6
	Natrii bromati	8,5
	Magnesi chlorati	720,0
	Natrii chlorati	140,0
	Magnesi sulfurici sicc	70,0

Salz Bad
A Kochsalzbad
 Rp Salis culinaris 2—3 kg
B Soolbad
 Rp Salis culinaris 6—8 kg
 Bäder mit einem Salzgehalt von mehr als 3 Proc heissen Soolbäder Solche mit 3% heissen mittelstark, mit 4% stark
C Seesalzbad
 Bain de sel marin (Gall)
 Rp Salis marini (vel culinaris) 5 kg
Schwefel Bad
 Rp Kali sulfurati pro balneo 60,—120,0
 Dem Bade wird bisweilen, aber unzweckmässig, noch 10 g englische Schwefelsäure zugesetzt Holzwannen! An Stelle von Kali-Schwefeleber kann auch Natriumtrisulfid treten.

Seifen Bad
 Rp Saponis domestici 250,0
 Wird in Wasser gelöst zugesetzt

Senf Bad
 Aufein Fussbad (Pédiluve sinapisé Gall.) wendet man 150,0 entöltes Senfpulver an, welches vorher $\frac{1}{4}$ Stunde mit kaltem Wasser angerührt stehen gelassen war Die Temperatur des Bades wassers darf 40° C nicht überschreiten.

Sulzer Mutterlaugensalz (künstliches)
 Rp Salis culinaris 938,0
 Calci chlorati fusi 5,5
 Magnesi chlorati sicc 25,0
 Natrii bromati 6,5
 Calci sulfurici praecip 25,0,

Tannin Bad
 Pp Acidi tannici 50 0
 Aquae destillatae 200,0
Terpentinol Bad
 (PINKNEY)
 Rp Saponis Kalini
 Aquae 32 100,0
 werden im Dampfbade erwärmt, alsdann rührt man gleichmässig darunter
 Olei Terebinthinae 90—120,0

Unnaer Mutterlaugensalz (Künstliches)
 Rp Salis culinaris 119,0
 Magnesi chlorati sicc 270 0
 Natrii jodati 3,0
 Kali chlorati (KCl) 85,0
 Calci chlorati fusi 570,0
 Natrii bromati 8,0

Vet Balsneum arsenicale
 Rp Arsenici albi 1,0
 Ferri sulfurici cryst 10,0
 Aquae 100 0
 Früher gegen Räude der Tiere (Schafe) benutzt, Für 100 Schafe rechnete man 1,4 kg Arsenik.

Vet Bain arsenical THASDOT (Gall.)
 in loco Bain de THASDOT
 Rp Arsenici albi 1 kg
 Zinci sulfurici crudi 5 „
 Aloës 0,5 „
 Aquae 100 Liter

Balsamum Canadense.

Balsamum Canadense (Erganzb) **Terebinthina Canadensis** (Brit U St.) **Canadabalsam**, **Baume du Canada** (Gall) **Canada Turpentine**. Ist der Harzsaft mehrerer zu den **Coniferae-Abietineae** gehörender Baume **Abies balsamea (L) Mill**, im östlichen Nordamerika, **Abies Fraseri Lindl**, in Pennsylvania, Virginia und den Alleghanies, den man gewinnt, indem man die ansehnlichen Balsambeulen der Rinde anbohrt und ausfliessen lässt

Beschreibung Zahflussig, von dünner Honigkonsistenz, klar, hellgelb oder etwas grünlich, von angenehmem balsamischem Geruch und bitterem, etwas scharfem Geschmack Wird mit der Zeit dunkler, verdickt sich, bleibt aber klar Vollständig löslich in Chloroform, Essigäther, Benzol, Terpentinol, fast vollständig löslich in Äther und Schwefelkohlenstoff, in Petroläther zu 83,4—87,9 Proc, in Alkohol zu 91—93 2 Proc löslich Saurezahl 84—88,8 Jodzahl 180,4—236,07 Mit $\frac{1}{6}$ des Gewichtes Magnesia usta vermenget verdickt er sich und wird schliesslich fest

Spec Gew 0,998 Brechungsindex bei 15—20° C = 1,535

Bestandtheile. 24 Proc ath Oel, 59,8 Proc in Alkohol lösliches, 16,2 Proc in Alkohol unlösliches Harz Das äthersche Oel dreht links — 29,66°, es enthält Bornylacetat und vielleicht Pinen Spec Gew 0,8892

Anwendung In Amerika, England und Frankreich an Stelle des Terpentins Aeusserlich zu Pflastern etc, innerlich bei Erkrankungen der Bronchial und Urethra Schleimhaut in Pillenform

Ferner als Kitt bei optischen Apparaten zum Aneinanderkitten von Linsen, die daher vor starker Erwärmung zu schützen sind, ferner als Einschlussmittel für mikroskopische Präparate

Den Kanadabalsam zum Einschliessen mikroskopischer Präparate verdünnt man mit Chloroform bis zur dünnen Sirupskonsistenz.

Um Objekte, die Wasser enthalten (Pflanzentheile), in Kanadabalsam einzuschliessen, entwässert man dieselben, indem man sie, wenn sie sehr zart sind, nacheinander in 30, 50, 70, 90 pro und schliesslich in absoluten Alkohol überträgt, sie dann in Alkohol Xylol (8 Xylol 1 Alkohol) bringt, in einem Exsikkator, der Xylol enthält, den Alkohol durch Diffusion grössten-theils entfernt und sie endlich in eine Lösung von Kanadabalsam in Xylol von dünner Sirupskonsistenz auf dem Objektträger bringt, worauf das Xylol allmählich verdunstet.

Gröbere Präparate (Rinden, Samen etc.) kann man direkt aus Wasser in absoluten Alkohol etc. übertragen.

Balsamum Copaivae.

Balsamum Copaivae (Germ. Hely. Austr.) **Balsamum Copaihae** **Balsamum brasiliense** **Copaivabalsam**. **Jesuiterbalsam** **Baume de Copahu** **Oléo-résine de Copahu** (Gall.) **Copaiba** (U-St. Brit.) **Balsam of Copaiha**. Der in schizo-lysenen Sekretbehältern des Holzes und Markes enthaltene Harzsaft verschiedener zu den *Caesalpiniaceae* — *Cynometreae* gehörender sudamerikanischer Bäume, nämlich

Copaiba (Copaifera) officinalis Jacq. in Guyana, Columbien und Venezuela, **Copaiba guyanensis** (Desf.) O. Ktze. u. **Copaiba multijuga** (Hayne) O. Ktze. im Amazonasgebiete, **Copaiba confertiflora** (Benth.) O. Ktze. in Piahy, **Copaiba coriacea** (Mart.) O. Ktze. in Bahia, **Copaiba Langsdorffii** (Desf.) O. Ktze. u. **Copaiba oblongifolia** (Mart.) O. Ktze. Indessen ist nicht sicher, ob Balsam von allen diesen Arten in den Handel gelangt.

Man gewinnt den Balsam, indem man Löcher in den Baum bis in das Kernholz haut, aus denen er dann in hineingesteckten blechernen Röhren ausfliesst. Ein Baum kann bis 48 l liefern.

Handelssorten Der Balsam wird aus den Produktionsgebieten in die Städte und Häfen gebracht und meist nach diesen benannt. Man unterscheidet im Handel aus Venezuela Maracaibo, Maturin und Angostura, aus Columbia Cartagena, aus Brasilien Bahia und Para. Von diesen ist der dickflüssige Maracaibobalsam gegenwärtig bevorzugt.

Beschreibung. Eine klare, gelbe bis gelbbraunliche, dickliche Flüssigkeit, die gar nicht oder nur ganz schwach fluorescirt, die eigenthümlich gewurzhaft riecht und unangenehm bitter, hintennach scharf und brennend schmeckt. Spec. Gew. 0,96—0,99 (Germ.), mindestens 0,96 (Hely.), 0,94—0,99 (Austr. U-St.), 0,916—0,993 (Brit.). Refraktometerzahl für Maracaibo 1,514, für Para 1,505, Drehung (Rohr 100 mm) Maracaibo + 25° 20', Para — 13° 40'.

Löslich in Aether, Terpentinol, Chloroform, Benzol, in Essigäther, Petroläther, Amylalkohol, Schwefelkohlenstoff und absolutem Alkohol meist ebenfalls klar löslich. Auf dem Wasserbade bis zur Entfernung des ätherischen Oeles erwärmt (wozu mehrere Tage nothig sind), resultirt ein hartes, sprödes, durchsichtiges, glänzendes Harz, das unter dem Mikroskop keine Krystalle erkennen lässt.

Bestandtheile Der Balsam ist eine Auflösung von Harz in ätherischem Oel. Der Gehalt an letzterem schwankt von 18—87 Proc. (vgl. besonderen Artikel). Die Angaben über das Harz weichen nach den untersuchten Sorten recht erheblich von einander ab. Jedenfalls geht aus den unter Prüfung mitgetheilten Zahlen hervor, dass dasselbe nur zum geringsten Theil aus Estern, vielmehr vorwiegend aus Säuren besteht. Es wird beschrieben eine *Copaivasäure* $C_{12}H_{22}O_4$, aus Parabalsam eine *Oxycopaivasäure* $C_{10}H_{20}O_5$, H_2O , aus Maracaibobalsam eine *Metacopaivasäure* $C_{22}H_{42}O_4$, Schmelzpunkt 205° C. Ferner enthält der Balsam einen bitterschmeckenden Stoff, der sich durch Auskochen mit Wasser gewinnen lässt.

Prüfung und Verfälschungen Die vorgeschlagenen Methoden zur Prüfung haben sammtlich Widerspruch erfahren. Einmal mag der Balsam bei der Verschiedenheit der ihn befeindenden Pflanzen wirklich von etwas verschiedener Zusammensetzung sein, dann aber wird er auch schon im Produktionslande offenbar stark verfälscht, da solcher Balsam für Zwecke der Technik immer noch verwendbar sein kann. Man verfälscht ihn mit Coniferenharzen (Colophonium), Harzöl, Terpenthinöl, fetten Ölen und Gurjunbalsam, vielleicht auch Paraffinöl. Für die Prüfung kommen zunächst die unter Beschreibung angegebenen Momente in Betracht. Ferner ist Folgendes zu beachten:

1) Ist der Abdampfdruckstand klebrig oder weich, so lässt das auf einen Zusatz fetter Öle und Harze schliessen. — 2) Lässt er rauchhch Krystalle erkennen, so ist wahrscheinlich Gurjunbalsam zugesetzt. Es ist nothwendig, den auf dem Objektträger zu verdampfenden Tropfen sorgfältig vor Staub zu schützen und den Rückstand mit dem Polarisationsmikroskop zu untersuchen. Es ist darauf zu achten, ob beim Erhitzen Geruch nach Terpenthinöl etc. auftritt. 3) Ebenfalls hegt wahrscheinlich eine Verfälschung mit Gurjunbalsam vor, wenn der Balsam stark fluorescirt, wobei aber noch einmal darauf aufmerksam gemacht sei, dass auch sonst unverdächtig Balsam in geringem Maasse fluoresciren kann. 4) 20–40 Tropfen werden mit 1–2 ccm 16 proc. alkoholischer Natronlauge übergossen und einige Male aufgekocht. Die Mischung darf weder beim Abkühlen noch nach Zusatz von 2 Vol. Aether und Abkühlung auf 0° C. gallertartige Ausscheidungen geben. Andernfalls fettes Öl. 5) 1 Vol. Balsam muss mit 3 Vol. 90 proc. Alkohol eine Mischung geben, die auch nach 1 Stunde keine Öltröpfchen abscheidet. Andernfalls fettes Öl, ausser Ricinusöl. 6) 1 Th. Balsam werde mit 5 Th. Wasser von 50° C. geschüttelt, die Mischung trenne sich nach dem Erwärmen im Wasserbade in zwei scharf geschiedene, nicht zu trübe Schichten. Gurjunbalsam gibt eine Emulsion, Terpenthinöl, Harzöl und Sassafrasöl geben stark trübe Schichten. 7) 5 g Balsam und 50 g liq. Ammon. caust. werden kraftig durchgeschüttelt. Es soll eine dünnflüssige, milchige, nur trübe Flüssigkeit entstehen. Stellt man das Gemisch 24 Stunden kalt, so soll es nicht ganz oder theilweise gelatiniren oder schleimig werden. Soll Colophonium anzeigen. Dieser Methode ist vorgeworfen worden, dass es Colophonium (amerikanisches) giebt, welches zu 20–30 Proc. dem Balsam zugefügt, kein Gelatiniren hervorruft, andererseits sollen Balsame existiren, die beim Zusatz von 30 Proc. Colophonium noch keine Aenderung ihres Verhaltens gegen liq. Ammon. caust. zeigen. Germ schreibt vor, die Probe nicht mit dem Balsam selbst, sondern mit dem von Öl befreitem Harz (1 5 NH₃) anzustellen, wogegen dieselben Einwände erhoben worden sind. Die folgenden Farbenreaktionen bezwecken den Nachweis von Gurjunbalsam. 8) 1 Th. Balsam wird mit 20 Th. Schwefelkohlenstoff verdünnt und mit einigen Tropfen eines abgekühlten, frisch bereiteten Gemisches von Schwefelsäure und Salpetersäure geschüttelt. Es soll sich keine rothe oder violette Farbe einstellen. Helv. verschärft diese Probe, indem sie sie mit den mittleren und letzten Fraktionen des abdestillirten Oeles anstellen lässt. 9) Einer Mischung von 4 ccm Aether aceticus und 2 Tropfen Acid. sulfuric. werden 6–8 Tropfen Balsam zugefügt und geschüttelt, die Mischung darf innerhalb 15 Minuten nicht roth oder violett werden. Setzt man dann eine kleine Menge Wasser hinzu, so soll kein rother Bodensatz entstehen. 10) 1 Vol. Balsam, 3 Vol. Alkohol (95 proc.), 1 g Zinnchlorür werden bis zur Lösung des letzteren gekocht. Es darf beim Kochen und nach 1/2 Stunde keine rosa oder rothviolette Färbung eintreten. 11) 4 Tropfen Balsam, gemischt mit 14 g Essessig und 4 Tropfen Salpetersäure sollen nicht röthlich oder purpur werden. (Brit.)

Wie schon angedeutet, dürfte niemals der Ausfall einer einzigen Reaktion berechnen, ein Urtheil über einen Balsam abzugeben. Bezüglich des specifischen Gewichtes ist noch zu bemerken, dass die untere Grenze der Germ und Helv. für einen dickflüssigen Maracabobalsam wohl zu acceptiren ist, dass indessen die obere Grenze anscheinend noch etwas hinaufgerückt werden kann bis etwa 0,996.

Wichtig sind weiter folgende *quantitative Bestimmungen*

Bestimmung der Säurezahl (Dietrich) Man löst 1 g Balsam in 200 ccm absolutem Alkohol und titirt mit 1/2 N alkoholischer Natronlauge unter Verwendung von Phenolphthalein. Die verbrauchten Kubikcentimeter Lauge $\times 28$ = Säurezahl. Grenzzahlen 75–85 für Maracabo, 40–60 für Para.

Bestimmung der Verseifungszahl 1 g Balsam übergiesst man in einer Glasstöpselflasche von 1 l mit 20 ccm 1/2 N alkoholischer Kalilauge und 50 ccm Benzin (spec. Gew. bei 15° C. = 0,70), lässt 24 Stunden wohlverschlossen bei Zimmertemperatur stehen und titirt nach Verdünnen mit Alkohol mit 1/2 N Schwefelsäure und Phenolphthalein.

zurück Die verbrauchten Kubikcentimeter Lauge $\times 28 =$ Verseifungszahl Grenzzahlen 80—90 für Maracabo, 30—80 für Para.

Die Esterzahl ermittelt man durch Subtraktion der Saurezahl von der Verseifungszahl Grenzzahlen 3—6 für Maracabo, 2—8 für Para Ein möglichst zuverlässiger, garantirt reiner Maracabobalsam hielt sammtliche Proben aus mit Ausnahme von 7, Modification der Germ Das Gemisch hatte nach 24 Stunden Terpentinconsistenz angenommen 8, Modification der Helv 9, wenn man wie bei 8 das atherische Oel verwendet Verseifungszahl 92,86

Afrikanischer Copaivabalsam von unbekannter Herkunft ist dunkelrothbraun und fluorescirend, er neigt sehr zur Krystallbildung Ein Tropfen auf dem Objektträger verdampft zeigt reichlich kurze, dicke Krystalle, die von den schlankeren des Gurjunbalsams deutlich verschieden sind Er giebt die Reaction mit Schwefelsäure und Salpetersäure (Nr 8) sehr deutlich

Aufbewahrung Im Keller in dicht verschlossenen Gefässen aus Blech oder aus gelbem Glase, deren Hals nach jedesmaligem Abfüllen sorgfältig ausgewischt werden muss, um das Festkleben der Stopfen und Herabfliessen des Balsams zu verhüten Für das Standgefäss in der Officin wählt man einen gerillten Stopfen oder einen Tropfensammler nebst Glaskappe

Anwendung. Innerlich und äusserlich in Form von Injektionen, Klystieren und Suppositorien bei Tripper, ferner bei Cystitis und auch wohl bei Lungenblennorrhoe

Injektion 2,0 Balsam, 1,0 Natr carb und 200,0 Aq destill Clyma 5—10,0 Balsam mit Engelb emulgirt auf 200,0 g Flüssigkeit

Suppositorien Bals Copaivae, Ol Cacao, Cerae aa

Innerlich am besten in Gallertkapseln Diese kommen 1) als Perlae gelatinosae mit einem Gehalte von 0,25 g, 2) als Capsulae gelatinosae durae mit 0,3, 0,5 und 0,6 g und 3) als Capsulae elasticae mit 0,6, 1,0, 2,0 und 3,0 g Inhalt in den Handel, sehr gebräuchlich ist auch die Füllung mit Copaivabalsam und Kubeben- oder Matkoextrakt aa Die Capsulae gelatinosae au Copahu von Mörkes enthalten jede 0,5 g Balsam

Die Füllung dieser Kapseln ist stets zu untersuchen, da der dazu verwendete Balsam besonders häufig verfälscht wird

Zur Darstellung von Pillen schmilzt man 2 Th Balsam und 1 Th Wachs zusammen oder setzt auf 10 Th Balsam 1 Th Magnesia usta hinzu, welche Mischung nach einigen Tagen (beim Erwärmen im Wasserbade schneller) erstarrt

Zur Herstellung eines pulverförmigen Balsams pulvert man 150,0 g Copavaharz (vgl unten), schmilzt mit 200,0 g Balsam zusammen und giebt 100,0 g Magnesia usta hinzu — Äusserlich wird der Balsam bisweilen gegen Krätze verordnet In der Technik benutzt man ihn als Zusatz zu Lacken und Firnissen, damit diese nicht rissig trocknen, ferner in der Oelmalerei und zur Herstellung durchscheinender Papiere (Pauspapier)

Beim Gebrauch von Bals Copaivae giebt der Urin mit Salpetersäure einen harzigen Niederschlag, der sich beim Kochen und in Alkohol löst, also nicht aus Eiweiss besteht

Resina Copaivae. Balsamum Copaivae siccum s inspissatum Bals Parisense Acidum copaicum Resin of Copaiiba (U St) Durch Eindampfen des Balsams im Dampfbade zu erhalten

Anwendung Mit Kakaobutter aa zu Stahlzäpfchen (HUSEMANN)

Aqua Balsami Copaivae. Copavabalsam 30 Tropf schnittelt man mit warmem, destillirten Wasser 1 l, lässt einige Tage stehen und filtrirt

Balsamum Copaivae ceratum. Copavabalsam 2 Th mischt man mit filtrirtem gelben Wachs 1 Th, welches bei gelinder Wärme geschmolzen ist — Dient zur Bereitung von Pillenmassen

Balsamum Copaivae gelatinosum VAN DE WALLE Copahu gelatiniforme — Copavabalsam 125 Th, Zuckerpulver, Roher Honig je 62,5 Th, Wasser 12 Th werden im Dampfbade gemischt, mit Karmin q s (0,1) gefärbt und nach dem Erkalten Pfefferminzöl 1,25 Th zugefügt

Massa Balsami Copaivae. Massa Copaiiba Mass of Copaiiba Solidified Copaiiba (Ph U-St) Gebrannte Magnesia 6 g, mit wenig Wasser angerieben, erwärmt man mit Copavabalsam 94 g unter öfterem Umrühren im Wasserbade $\frac{1}{2}$ Stunde lang und setzt dann bei Seite, bis die Masse Pillenconsistenz angenommen hat Man hält dieselbe nur für kürzere Zeit vorrätig Haltbarer ist folgende Mischung (nach DANNEKY) Copavabalsam 20 Th, Gelbes Wachs 2 Th, Gebrannte Magnesia 1 Th

Massa Pilularum Balsami Copaivae (Diet) Copavabalsam 10 Th, Glycerin 3 Th, verreibt man mit Zuckerpulver 10 Th, fugt dann Gebrannte Magnesia 10 Th, Sussholz-

pulver 8 Th hinzu und knetet zur Pillenmasse Dieselbe ist haltbar und liefert wasserlösliche Pillen

Boli Balsami Copaivae DANNEBT

Rp Balsami Copaivae	40,0
Cerae flavae	10,0
Magnesia usta	2,0

Man erwärmt, stellt einige Zeit bei Seite und formt 100 Pillen

Electuarium balsamicum**Opiat balsamicum de BODART**

1 Balsami Copaivae	70,0
2 Cerae flavae	80,0
3 Olei Amygdalarum	
4 Terebinthinae coctae	
5 Terebinthinae venetae	10,0
6 Balsami Peruviani	5,0
7 Aluminis usi	2,0
8 Cubebarum pulverat	80,0
9 Olei Anisi	1,0

Man schmilzt 1—6 bei gelinder Wärme zusammen und mischt 7—9 darunter Dreimal täglich haselnussgross in Oblaten

Electuarium Copaivae (Helv)

Rp Balsami Copaivae	
Cubebarum pulverat	33 40,0
Catechu (Sieb VI)	
Bismuti subnitrici	33 10,0
Opi pulverati	0,5
Olei Menthae pipentae	0,3

Electuarium Copaivae compositum (Gall)**Opiat de Copahu composé**

Rp Balsami Copaivae	100,0
Cubebarum pulv	150,0
Catechu pulv	50,0
Olei Menthae pip	8,0

Emulsio Balsami Copaivae (Gall.)

Rp Balsami Copaivae	2,0
Alcohol (90 Proc)	10,0
Tinct Quillajae	10,0
Aquae destill calid	78,0

Enema balsamicum RECORD**Lavement au Copahu**

Rp Balsami Copaivae	25,0
Vitellum ovi unius	
Extracti Opi	0,05
Aquae	150,0

Enema balsamicum VELLEZ

Rp Balsami Copaivae	20,0
Vitellum ovi unius	
Tincturae Opi simplicis	2,0
Infusi florum Malvae	500,0

Gelatina Balsami Copaivae MARTIN

Rp Balsami Copaivae	5,0
Cetacei	1,0

Bei gelinder Wärme zusammenzuschmelzen

Guttas balsamicas ZEISSL

Rp Balsami Copaivae	15,0
Tincturae aromaticae acidae	5,0

Injectio adstringens ABERNETHY

Rp 1 Balsami Copaivae	10,0
2 Gummi arabici	
3 Aquae	33 12,5
4 Aquae Calcinae	500,0

Man emulgirt 1—3 und fügt 4 allmählich hinzu

Injectio balsamica CLERK

Rp Balsami Copaivae	1,0
Vitelli ovi	10,0
Aquae	120,0

Injectio balsamica JEANNEL**Injectio antigonorrhoica JEANNEL**

Rp 1 Balsami Copaivae (Para)	2,0
2 Natrii carbonici cryst	1,0
3 Aquae destillatae	47,0
4 Aquae	150,0
5 Tincturae Opi simplicis	1,0

Man emulgirt 1—3 durch kräftiges Zusammenschütteln und fügt 4—5 hinzu

Injectio zincica LANGLEBERT

Rp Zinci sulfurici	0,4
Zinci oxydati	5,0
Aquae Balsami Copaivae	100,0

Mixtura balsamica FULLER

Rp Balsami Copaivae	50,0
Vitella ovorum duorum	
Sirupi Balsami Peruviani	50,0
Vini albi	100,0

Mixtura Brasilionis

Rp Balsami Copaivae	50,0
Vitella ovorum duorum	
Sirupi gummosi	80,0
Aquae destillatae	120,0
Tincturae Croci	4,0

Pilulae antigonorrhoicae

Rp Balsami Copaivae	50,0
Cerae flavae	25,0
Gallarum pulv	
Catechu pulv	33 50,0

Fiant pilulae 1250, conspergendae radice Liquiritiae Viermal täglich 5—8 Pillen

Pilulae Copaivae (DIET)

Rp Massae pilularum Balsami Copaivae (DIET) 100,0
Fiant pilulae 500 Jede Pille enthält 0,05 g Copaiva-Balsam

Pilulae Copaivae (Gall)**Pilules de Copahu (Gall)**

Rp Balsami Copaivae	15,0
Magnesi carbonici q s	

fiant pilulae 40 obducendae Gelatina vel Saccharo

Pilulae Copaivae compositae

Rp Balsami Copaivae	10,0
Cerae flavae	5,0
Cubebarum pulv	15,0

fiant pilulae 150 Dreimal täglich 5—10 Stück

Potio balsamica**Potion de Copart****I Cod Gall**

Rp Sirupi Balsami Tolutani	
Balsami Copaivae	33 50,0
Aquae Menthae pip	100,0
Spiritus (80%)	50,0
Spiritus Aetheris nitrosi	5,0

II n. PARISEL

Rp Balsami Copaivae	
Sirupi Ficis	33 60,0
Aquae Ficis	100,0
Gummi arabici	15,0
Spiritus Aetheris nitrosi	2,0

Zweimal täglich 1 Esslöffel

Sirupus Balsami Brasilionis MAY

Rp Balsami Copaivae	50,0
Magnesia usta	8,0
Vitellum ovi unius	
Sirupi Sacchari	100,0

Sirupus Balsami Copaiyae POORE

Sirop au Copahu

- Rp 1 Balsami Copaiyae 40,0
 2 Gummi arabici 10,0
 3 Aquae destillatae 25,0
 4 Sirupi Sacchari 200,0
 5 Olei Menthae pip. gtt XX.

Man emulgirt 1—3 und fügt 4—5 hinzu

Suppositoria Balsami Copaiyae WENNER.

Rp Balsami Copaiyae 100,0

- Olei Cacao
 Cetacei ss 20,0
 Cerae flavae 10,0
 Ophi pulverat. 0,15

Mant suppositoria No X

Suppositoria resinae Copaiyae COLOMBAT

- Rp Resinae Copaiyae 5,0
 Extracti Opi 0,03
 Olei Cacao 5,0
 Cerae flavae 1,0

Zu 1 Stuhlöffner

Tinctura Copaiyae (Form Beil)

- Rp Balsami Copaiyae
 Tincturae aromaticae ss 7,5

Dreimal täglich 15 Tropfen

Tragene Balsami Copaiyae cum Pice Liquida

Bois de Copahu et de Goudron (Ricord)

- Rp 1. Balsami Copaiyae 110,0
 2 Magnesia ustae 10,0
 3 Pice liquidae 10,0

Man lässt 1 mit 2 erhitzen, fügt 3 hinzu und formt 200 eiförmige Pillen, welche mit Gelatine zu überziehen sind

Vet Tinctura vulneraria BOURDON

Wundesaig bei Hornspalt.

- Rp Tincturae Aloës
 Petrolei
 Olei Terebinthinae
 Balsami Copaiyae ss 20,0
 Acidi nitrici crudi 20

Man lässt die Mischung vor der Abgabe 1 Tag in offener Flasche stehen Mit einem Pinsel aufzutragen

Vet Unguentum ad ungulam equorum

Hornspaltensalbe

- Rp Balsami Copaiyae
 Cerae flavae
 Unguenti basilici ss

Ambrettseedöl ist Copaiyabalsamöl mit schwachem Moschuskörnergeruch**Blasenkatarrh Tropfen** von EDLERSEN sollen aus gleichen Theilen Copaiyabalsam und Terpentinöl bestehen**Capsules de Raquin** Pilulae Raquin, sind mit Feinleim überzogene Pillen aus Copaiyabalsam und Magnesia**Copahine.** Eiförmige, überzuckerte Pillen aus Copaiyabalsam, Wachs und Kubebenpulver**Copahine Mège de Joyean** Mit Salpetersäure oxydirt, dann mit Wasser aus gewaschener Copaiyabalsam wird mit Kubeben, Natriumbikarbonat und gebrannter Magnesia zur Masse angestossen, woraus eiförmige Pillen geformt werden, die man mit gefärbtem Zucker überzieht**Dragées balsamiques de Fortin** Überzuckerte Pillen aus Copaiyabalsam und Magnesia**Dragées de Cubèbe au Copahu.** Trochisci cubebini Cubebines von LAMB LONN Längliche Pillen aus Copaiyabalsam, Kubebenextrakt, Eigelb und Sussholzpulver**Gelee de Baume de Copahu Carlot** Ist eine mit Pfefferminzöl versetzte Gallerte aus Copaiyabalsam, Zucker, Wasser und Hausenblase**Natronicopaiyatpillen** Pilulae Natrii copaiyici von GEZA LUCHER Enthalten je 0,13 g Natriumcopaiyat, entsprechend 0,4 g Copaiyabalsam**Oleum Balsami Copaiyae** Copaiyabalsamöl. **Essence de Baume de Copahu** Oil of Copaliba (U-St Brit)**Gewinnung** Durch Destillation des Copaiyabalsams mit Wasserdampf. Gewöhnlich wird die Parasteife verwendet, da diese die grösste Ausbeute, nämlich 60—90 Proc giebt. Aus Maracaiibo und Maranhambalsam erhält man nur etwa 40 Proc. Der Balsamrückstand, ein sprödes, durchsichtiges Harz, wird zur Herstellung feiner Lacke gebraucht**Eigenschaften.** Oelige, farblose oder gelbe bis gelbgrüne Flüssigkeit von pfefferartigem Geruch und bitterem, nachhaltig kratzendem Geschmack. Spec Gew 0,890—0,910 (U-St) 0,900—0,910 (Brit). Optisch linksdrehend. Drehungswinkel (100 mm Rohr) — 7 bis — 35°. Siedet zwischen 250 und 275° C. Es ist in gleichen Theilen absoluten Alkohols löslich (Brit) und unterscheidet sich hierdurch von dem Oele aus dem afrikanischen Balsam unbekannter Herkunft, der neuerdings auf dem Londoner Markte erschienen ist (vgl oben). Mit 10 Th Spiritus giebt das Oel eine trübe Mischung (U-St), auch mit einem grossen Ueberschuss von Spiritus wird keine klare Lösung erzielt.**Bestandtheile.** Copaiyabalsamöl besteht in der Hauptsache aus Kohlenwasserstoffen der Sesquiterpenreihe, besonders aus Caryophyllen $C_{15}H_{24}$, dem Sesquiterpen des Nelkenöles, das durch das schön krystallisirende, bei 36° C schmelzende Caryophyllenhydrat $C_{15}H_{26}O$

gekennzeichnet ist Ausserdem sind 5—6 Proc alkoholische, nicht näher untersuchte Bestandtheile zugegen

Prüfung Die manchmal beobachtete Verfälschung mit Gujünbalsamöl wird durch die Erhöhung des specifischen Gewichts und die Vergrösserung des Drehungswinkels erkannt

Anwendung Das Copaivaöl wird medicinisch zu demselben Zweck wie der Copaivabalsam angewendet Man giebt es zu 0,25—0,75 g oder zu 8—20 Tropfen zwe- bis dreimal täglich Es wirkt stark harntreibend, was sich schon beim Einathmen der Dämpfe während der Wasserdampfdestillation bemerkbar macht Die hauptsächlichste Verwendung findet das Öl zur Verfälschung anderer ätherischer Öle

Balsamum gurjunicum.

Balsamum gurjunicum Balsamum Gujunae seu Garjanae Balsamum Dipterocarpi. Gurjun-, Gardschanbalsam. Ostindischer Copanabalsam. Capivibalsam. Wood-oil.¹⁾

Ist der vermuthlich ebenso wie der Copaivabalsam entstehende Harzsaft verschiedener in die Familie der Dipterocarpaceae gehörender grosser Bäume Südasiens

Es werden als solche genannt *Dipterocarpus alatus* Roxburgh in Hinterindien, auf den Andaman-Inseln und den Nicobaren, *D. angustifolius* Wight et Arnott in Tschittagong, *D. gracilis* Blume in Westjava, *D. hispidus* Thwaites auf Ceylon, *D. incanus* Roxb in Hinterindien, *D. litoralis* Blume in Südjava und auf der kleinen Insel Nusa Kambayan, *D. retusus* Blume in Westjava, *D. trinervis* Blume in Westjava und auf den Philippinen, *D. turbinatus* Gartin fil von Hinterindien bis Bengalen, *D. zelanicus* Thwaites in Ceylon

Man gewinnt den Balsam, indem man Höhlungen in die grossen Stämme haut und Feuer darin anzündet, wonach der Balsam ausfliesst

Ein Baum kann im Jahre bis zu 180 l Balsam liefern

Beschreibung Ziemlich dickflüssig, im durchfallenden Licht rothbraun, im anfallenden (besonders im verdünnten Zustande) grünlich fluorescirend Von charakteristischem Geruch und Geschmack, an Copaivabalsam erinnernd Mischbar mit Chloroform, Schwefelkohlenstoff und ätherischen Ölen, Petroläther, theilweise löslich in absolutem Alkohol, Amylalkohol, Aether, Essigäther, Aceton, Petroleum Nach und nach mit dem Fünffachen Wasser versetzt und dabei geschüttelt, entsteht eine steife Emulsion Giebt in der Ruhe einen reichlich Krystalle enthaltenden Bodensatz Spec Gew 0,958—0,964

Bestandtheile. Enthält bis 70 Proc ätherisches Öl, der Rest ist Harz und ein in Wasser löslicher, bitter schmeckender Stoff, der mit Gerbsäurelösung einen reichlichen Niederschlag giebt

Das ätherische Öl hat das spec Gew 0,915—0,93, es dreht (100 mm Rohr) — 35° bis — 120° In Schwefelkohlenstoff gelöst und 1) mit Chlorwasserstoff gesättigt wird es blau, 2) mit Salzsäure geschüttelt wird es zuerst hellroth, später violett, 3) mit Salzsäure und Schwefelsäure dieselbe Farbe Die gleichen Reaktionen treten ein bei Verwendung des Balsams (vgl. Balsam Copaivae) Aus dem Balsamharz dargestellte Säuren scheinen bei den einzelnen Sorten, vielleicht von verschiedenen Arten stammend, nicht identisch zu sein

Säurezahl nach der bei Balsam Copaivae mitgetheilten Methode ermittelt 5,0—10,0 Verseifungszahl 10,0—20,0 Esterzahl 1,0—10,0

¹⁾ Darf mit dem in Indien ebenso bezeichneten fetten Öle der Samen von *Aleurites cordata* Müll. Arg., dem leicht trocknenden Tung- oder Holzöl nicht verwechselt werden Unter dem Namen Wood-oil kommt auch ein dem Steinkohlenbenzin ähnliches Produkt vor

Aufbewahrung. Wie beim Copayabalsam. Bildet (unfiltrirt) einen krystallinen Bodensatz und ist deshalb vor jedesmaligem Gebrauch umzuschütteln.

Anwendung. Gurjunbalsam wird in der Heilkunde und in der Technik wie Copayabalsam angewendet. Als Firniss eignet er sich besonders für Gegenstände, die einer Wärme bis zu 80° ausgesetzt sind.

Balsamum vulnerarium indicum. Wundbalsam für grössere Hausthiere. Aloë, Benzoe, Gurjunbalsam je 10 Th., Weingeist 150 Th.

Vermix aurea. Goldlack für Metalle. Drachenblut, Bernstein, Gutta je 10 Th., Gurjunbalsam 150 Th., Terpentinöl 50 Th.

Balsamum antiarthriticum indicum von ELNAIN. Indischer Pflanzensaft. War ursprünglich Gurjunbalsam, soll neuerdings aber ein Gemisch aus Harzsäuren, einem unverseifbaren Oel und Baldriansäure sein.

Oleum balsami gurgunici. Gurjunbalsamol. Ostindisches Copayabalsamol. **Oleum Balsami Copalvae Indiae orientalis.** Das im Gurjunbalsam bis zu 70 Proc. enthaltene atherische Oel ist dem des Copayabalsams zwar ähnlich, aber mit demselben durchaus nicht identisch. Spec. Gew. 0,915—0,930. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) — 35 bis — 130°. Es sollen auch rechtsdrehende Oele vorkommen. In Spiritus ist Gurjunbalsamol nicht klar löslich, wohl aber in mehreren Theilen absoluten Alkohols. Es besteht in der Hauptsache aus einem bei 255—256° C. siedenden, nicht näher bekannten Sesquiterpen $C_{15}H_{24}$ und wird zur Verfälschung des Copayabalsamöls und anderer atherischer Oele verwendet.

Balsamum peruvianum.

Balsamum peruvianum (Germ. Helv. Anstr. Brit. U. St.) **Bals. indicum nigrum.** **Bals. de San Salvador.** **Opobalsamum liquidum.** — **Perubalsam.** **Chinaöl.** Indischer oder indianischer Balsam. **Wundbalsam.** — **Baume du Perou noir** (Gall.) **de Sonsonate ou d'Inde noir.** — **Balsam of Peru.**

Wird von der zu den Papilionaceae — Sophoreae gehörigen *Tolulifera Pereirae* (Klotzsch) Baillon (*Myroxylon Pereirae* Klotzsch) gewonnen, einem bis 17 m hohen Baume, der vom nördlichen Südamerika bis Mexiko heimisch ist.

Vorkommen und Gewinnung. Der Balsam praxistirt nicht in der Pflanze, sondern entsteht als pathologisches Produkt erst infolge unserer Eingriffe (vgl. Balsam toluatan, Benzoe, Styrax). Man gewinnt ihn in der Republik San Salvador an der Costa del Balsamo zwischen dem Hafen Acajutla und dem Flüschen Comalapa. Neuerdings scheint auch in Honduras Balsam gewonnen zu werden.

Zur Gewinnung wird die Rinde im November oder December mit einem stumpfen Instrument anhaltend geklopft, wonach etwas Balsam austritt, den man in Lumpen aufängt. Dann schält man den Baum mit Fackeln an, worauf der Balsam sich reichlich ergiesst und ebenfalls in Lumpen aufgefangen wird und wobei die Rinde bald abfällt. Die letztere sowie die mit Balsam gefüllten Lumpen werden mit Wasser ausgekocht (Balsamo de trapo). Die Wunden werden wochentlich mit neuen Lumpen verbunden und der Baum im April zum zweitenmal angeschält.

Der durch Anskochen der Rinde gewonnene Balsam ist minderwerthig (Balsamo de cascara oder Tacuasante).

Meist werden wohl beide zusammengeengt und in den Hafen Acajutla und La Libertad weiter verarbeitet, indem man den mehr gelblichen oder graugrünen Balsam in Kästen absetzen lässt und in eisernen Kesseln erhitzt. Seine braune Farbe soll er schon vor dem Erhitzen erhalten.

Ein Baum liefert jährlich etwa 2,5 kg und zwar 30 Jahre hindurch, wenn man ihm zwischendurch mehrjährige Pausen gönnt.

Die Jahresproduktion wird auf 15000—30000 kg geschätzt. Man exportirt ihn gegenwärtig in Blechkanistern von etwa 12 k Gewicht, die vorher zum Import von Maschinenöl aus Birmingham dienten.

Eigenschaften. Eine braunrothe bis dunkelbraune (doch stets mit röthlichem Farbentone), in dünner Schicht klar durchsichtige Flüssigkeit von dicklich öliger Konsistenz, nicht klebend, nicht fadenziehend, von saurer Reaktion. Der Geschmack ist anfänglich milde, erwarmend, dann im Schlunde stark brennend, bitterlich gewürzhaft, nicht angenehm. Geruch sehr angenehm, an Vanille erinnernd. Setzt auch bei längerem Ruhen keine Krystalle ab. Das specifische Gewicht wird wie folgt angegeben: Germ 1,135—1,145, Helv 1,135—1,150, Austr 1,140—1,160, Brit 1,137—1,150, U-St 1,135—1,150.

Mit Wasserdämpfen destillirt geringe Mengen (0,4 Proc) eines Oeles (Zimmtsäurebenzylester und Benzoesäurebenzylester) liefernd.

Löslich in Chloroform, Essigäther, absolutem Alkohol. In 90 proc Alkohol löslich zu 99,74 Proc, in Aether zu 93—97 Proc, in Benzol zu 94—98 Proc, in Petroläther zu 66—68 Proc, in Terpentinöl zu 85—89 Proc, in Schwefelkohlenstoff zu 86—88 Proc (nach DIETERICH). In fetten Oelen theilweise löslich, Ricinusöl nimmt er bis zu 15 Proc ohne Trübung auf. In Wasser ist er fast unlöslich, indessen nimmt dasselbe beim Schütteln mit dem Balsam den Geruch an und entzieht ihm Zimmtsäure.

Bestandtheile. Der Perubalsam besteht aus einem flüssigen und einem festen Bestandtheil, dem Harz. Der erstere, das Cinnamein, besteht vorwiegend aus Benzoesäure-Benzylester und zum geringeren Theil aus Zimmtsäure-Benzylester. Daneben enthält es noch freie Zimmtsäure und Vanillin.

Der feste Bestandtheil, das Harz, ist ebenfalls ein Ester, er liefert bei der Verseifung neben Zimmtsäure und Benzoesäure einen Harzalkohol, das Peruresinotannol $C_{18}H_{20}O_6$.

Prüfungen und Verfälschungen. Die dunkle Farbe, die physikalische Beschaffenheit, der hohe Preis, der geringe Umfang der Produktion laden förmlich zu Verfälschungen ein, die anscheinend schon im Produktionslande, dann aber auch in Europa vorgenommen werden.

Die nachfolgenden Prüfungen, besonders die qualitativen, haben sämmtlich Widerspruch gefunden, und es darf das Urtheil nie auf den Ausfall einer einzigen Probe basirt werden.

1) Specifisches Gewicht. Dasselbe wird zweckmässig in einem Pyknometer oder in einem 10 g-Glaschen, dessen Stopfen am besten mit einer Langspritze versehen ist, ermittelt. Es ist auf 1,135—1,155 festzusetzen und besonders die untere Grenze genau festzuhalten. Thatsache ist, dass Perubalsam früher (z. B. Pharm. Germ. I 1,15—1,16) ein höheres specifisches Gewicht hatte, da keine Veranlassung vorliegt, anzunehmen, dass er früher in höherem Maasse als gegenwärtig verfälscht wurde. (CAESAR und LORETZ setzen als Durchschnitt fest 1,140—1,145.) Die meisten Verfälschungsmittel setzen es herab, Tolu balsam und Benzoe erhöhen es.

2) 10 Tropfen Balsam mit 20 Tropfen concentrirter Schwefelsäure zusammengerieben, nach einigen Minuten mit kaltem Wasser übergossen, werden auf der Oberfläche violett und nach dem Auskneten mit kaltem Wasser bröcklig. Soll fettes Öl anzeigen. Gilt als wenig empfindlich und deshalb unzuverlässig.

3) 2 Th Balsam werden im Wasserbade mit 1 Th Kalkhydrat zusammengerieben. Die Mischung darf keinen Fettgeruch abgeben und nicht zerreiblich oder wohl gar krümlig werden. Es ist von verschiedenen Seiten behauptet, dass sicher gute Balsame oft die Probe nicht aushalten, also krümlig werden. Es ist nothwendig, die Mischung bis zur definitiven Beurtheilung mehrere Tage (Helv. 8—10 Tage) stehen zu lassen. Ein geringer Alkoholzusatz (2 Tropfen auf 1 g Balsam) soll das Erstarren beschleunigen. Nach SCHACHT (1895) wurde Balsam mit 10 Proc Styrax, Kolophonum, Kopaivaharz, Siambenzoe sofort hart, blieb aber mit 10 Proc Gurjunbalsam, Tolubalsam und Tacamahaca mehr oder weniger weich. Nur zur Erkennung grober Verfälschungen geeignet.

4) 5 Tropfen Balsam mit 3 ccm Ammoniakflüssigkeit geschüttelt, sollen eine wenig schäumende Flüssigkeit geben, der Schaum muss bald verschwinden, die Flüssigkeit soll nach 12—24 Stunden nicht gelatiniren. Man nimmt die Probe in einem Reagircylinder vor. Soll zum Nachweis von Koniferenharzen dienen (Vergl. die entsprechende Probe bei Bals. Copaivae).

5) Mit dem gleichen Gewicht Alkohol klar mischbar, auf weiteren Zusatz von 5–10 Th Alkohol wird die Mischung trübe

6) 3 Th Balsam nehmen 1 Th Schwefelkohlenstoff ohne Trübung auf, auf Zusatz von 3 weiteren Theilen Schwefelkohlenstoff scheidet sich braunes Harz ab, dessen Menge bei reinem Balsam 11–16 Proc beträgt. *Styrax*, alkoholisches *Kolophoniumextrakt*, *Kopaivabalsam*, *Racineöl* lösen sich, wurden also den Harzgehalt herabsetzen, eingedampfte alkoholische Benzolösung wurde den Harzgehalt erhöhen

Die klare, vom Harz abgeglichene Lösung soll nicht fluoresciren (*Gurjunbalsam*) und nach dem Verdampfen einen gelben Rückstand von Oelkonsistenz geben. Derselbe soll beim Erwärmen auf 150° C keinen fremdartigen Geruch erkennen lassen und bei Benetzung mit einem Gemisch gleicher Theile Schwefelsäure und Salpetersäure orange braun, nicht aber blaugrün (*Terebinthina*, *Bals Copaivae*) und nicht schmutzig violett (*Gurjunbalsam*) werden

7) 2 g Balsam und 8 g Petroleumbenzin werden kräftig im Reagircylinder geschüttelt und der klare, ev filtrirte Auszug abgegossen. Er soll fast farblos, höchstens gelblich und nicht trübe sein. Man verdunstet ihn auf dem Wasserbade und bringt auf den Rückstand 5 Tropfen Salpetersäure (spec Gew 1,38). Auch bei gelindem Erwärmen soll die Farbe gelb sein, nicht blau oder grün (*Styrax*, *Terebinthina*, *Kolophonium*, *Bals Copaivae*)

Für den Ausfall der Reaction ist es nothwendig, ein benzolfreies bei 55° C siedendes Petroleumbenzin (von C A F KAHLBAUM) zu verwenden. Sollte, wie fast immer bei der Handelswaare, ein benzolfreies Benzin nicht zu haben sein, so ist es durch Nitriren und Auswaschen vom Benzol zu befreien

8) Da die zum Verfälschen benutzten festen Harze etc in concentrirter alkoholischer Lösung verwendet werden, so soll man einen Theil des Balsams (50 g) mit Wasserdämpfen destilliren und das Destillat auf Alkohol prüfen (Jodoformprobe). Oder man bringt einige Gramm des Balsams mit der Vorsicht in ein Reagensglas, dass die Wände nicht berührt werden, schiebt 2 cm vor den Balsam einen locker in Watte gebulten Fuchsinkrystall und erwärmt. Verdampfender Alkohol würde von dem Fuchsin lösen und die Watte roth färben

Von grösserer Bedeutung als die vorhergehenden Proben sind die folgenden quantitativen Bestimmungen nach DUMERIEUX

9) Man erwärmt 1 g des Balsams mit Aether in einem Kolbchen und zieht auf einem gewogenen Filter so lange mit Aether aus, bis einige Tropfen des Filtrats keinen Rückstand hinterlassen. Den Filtrückstand trocknet man bei 100° C und wägt. Die ätherunlöslichen Antheile betragen 1,5–4,5 Proc

10) Die ätherische Lösung von 9 wird in einem Scheidetrichter einmal mit 20 cem 2proc Natronlauge ausgeschüttelt, die abgetrennte alkalische Lösung mit verdünnter Salzsäure gefällt, durch ein gewogenes Filter filtrirt, der Rückstand auf dem Filter bis zum Ausbleiben der Chlorreaction gewaschen und endlich bei 80° C bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Die so ermittelten Harzester betragen 20–28 Proc

11) Die von der Ausschüttelung 10 zurückgebliebene ätherische Lösung wird der Verdunstung überlassen, dann 12 Stunden im Exsiccator getrocknet, gewogen, noch einmal 12 Stunden getrocknet und wieder gewogen. Das Mittel beider Wägungen giebt den Cinnamengehalt an und zwar 65–77 Proc. Diese Methode giebt etwas höhere Zahlen als die von GEHLE & Co 1897 mitgetheilte, da ausser dem Cinnamain auch andere flüchtige, riechende Bestandtheile mit gewogen werden

12) Säurezahl. 1 g Balsam wird in 200 cem absolutem Alkohol gelöst und mit $\frac{1}{10}$ N Kalilauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator titirt. Die verbrauchten Kubikcentimeter Lauge $\times 5,6$ = Säurezahl. Grenzwerte 60–80

13) Verseifungszahl. In einen Kolben von 500 cem Inhalt wird 1 g Balsam, 50 cem Petroleumbenzin (spec Gew 0,7) und 50 cem $\frac{1}{10}$ N alkoholische Kalilauge gegeben und unter öfterem Umschütteln verschlossen 24 Stunden im Zimmer stehen gelassen. Dann fügt man 300 cem Wasser zu, schwenkt gut um und titirt unter fortwährendem Umschwenken mit $\frac{1}{2}$ N Schwefelsäure und Phenolphthalein. Die gebundenen Kubikcentimeter Lauge $\times 28$ = Säurezahl. Grenzwerte 240–270

14) Esterzahl. Diese ermittelt man, indem man die Säurezahl von der Verseifungszahl subtrahirt. Grenzwerte 180–200

Andere Sorten. Ein angeblich aus den Cumarin enthaltenden Hülsen mit den Samen gewonnener Balsam, ebenso der dem Teinbalsam ähnliche Balsam von *Myropeperum peruvianum* D C (*Balsamo del Perú*), endlich ein dem officinellen Balsam ähnlicher von *Myrocarpus frondosus* Allem. gelangen nicht in den europäischen Handel

Aufbewahrung. Wie beim Copaivabalsam Um das Vorrathsgefäß sauber zu erhalten, erleichtert man das Abfließen des Balsams, indem man zwischen Stöpsel und Flaschenhals einen Streifen dickes Pergamentpapier legt

Anwendung. Aeusserlich in Einreibungen gegen Krätze und Ungeziefer, wunde Brustwarzen und Frostheulen, zu Pinselungen bei Kellkopftuberkulose Bei Ozaena zu Pinselungen der Nasenschleimhaut oder Einföhrung mit Balsam getränkter Wattetampons in die Nase Bei Erkrankungen der Haarwurzeln

Innerlich bei chronischen Katarrhen des Urogenitalapparates und der Respirationsorgane mit profuser Sekretion

Dosis 0,2—1,0 in Pillen, Emulsion etc

Ferner als Zusatz zu Rauchermitteln, Pomaden etc Die Verwendung als Ersatz der Vanille in Chokoladen hat abgenommen seit Einföhrung des synthetischen Vanillins

Sirupus Balsami peruviani, Sir balsamicus — Perubalsamsirup, Balsamsaft — 1) (n Ergänz b) 1 Th Balsam wird mit 10 Th heissem Wasser übergossen, unter öfterem Schütteln 24 Stunden stehen gelassen, 8 Th des Filtrats geben mit Zucker 12 Th einen blass gelblichen Sirup

2) (n Diet) Eine Verreibung von Talk 20 Th mit weissem Sirup 1000 Th erwärmt man mit Perubalsam 50 Th in einem Kolben im Wasserbade auf 66—70° C, schüttelt 5 Minuten kräftig, stellt 2 Tage bei Seite und filtrirt durch ein mit weissem Sirup befeuchtetes Filter Dieses Verfahren ist einfacher und mit geringerem Verlust an flüchtigen Bestandtheilen verknüpft, als das vorige

Tinctura Balsami peruviani, Perubalsamtinktur Perubalsam 1 Th, Weingeist (90 proc) 10 Th mischt man und filtrirt nach einigen Tagen

Oleum Balsami Peruviani Perubalsamol Das Perubalsamol ist, da es mit Wasserdämpfen nicht flüchtig ist, kein ätherisches Oel Man gewinnt es durch Ausschütteln des Perubalsams mit leichtem Petroläther in einer Ausbeute von 60—70 Proc. Es ist eine gelbbraune, ölige, angenehm riechende Flüssigkeit vom spec Gew 1,1 Perubalsamol ist optisch schwach rechtsdrehend, und löst sich klar in gleichen Theilen Spiritus auf Bei der Destillation über freiem Feuer im Kohlensäurestrome siedet es unter geringer Zersetzung von 298—302° C Es besteht zum grössten Theile aus Benzoesäure Benzylester, zum kleineren aus Zimmtsäure-Benzylester Verwendung findet es in der feineren Parfümerie

Balsamum peruvianum artificiale, Künstlicher Perubalsam Siambenzoesäure 100 Th, Gurjunbalsam 20 Th löst man in der Wärme in absolutem Weingeist 400 Th. und dampft das Filtrat (im Dunstsammler) zum Sirup ab

Emulsio Balsami peruviani ad injectionem (nach BRAUIGAN) Einem frisch bereiteten Schleime aus arabischem Gummi und Wasser je 1,0 g fugt man unter starkem Verreiben tropfenweise Perubalsam 2,0 g, dann unter stetem Umrühren destillirtes Wasser 4,5 g und physiologische Kochsalzlösung (0,6 proc) 1,5 g hinzu, neutralisirt mittelst einiger Tröpfchen Natriumbicarbonatlösung (1 : 25) und sterilisirt im strömenden Wasserdampf

Emulsio balsamica antibronehitica (BOUGHARDAT) Perubalsam 1 g, Mandelöl 20 g, Arabisches Gummi 10 g werden mit Wasser emulgirt und weisser Sirup 50 g, Wasser 200 g zugefügt

Emulsio balsamica anticatarrhoica (WISS) Perubalsam 5 g, Mandelöl, Arabisches Gummi je 10 g emulgirt man mit Wasser 15 g und fugt Wasser 250 g, Zimmtsirup 50 g hinzu.

Balsamum Capucinarum		Benzoës	aa 5,0
Kapuzinerbalsam		Ligni santalini rubri	15 0
Rp	Balsami peruviani	Kalki carboniel	7,5
	Balsami toluatani	Spiritus diluti (66%)	1000,0
	Styracis	Volkheilmittel gegen innere und äussere Krankheiten aller Art	
	Terebinthinae venetae	Balsamum cephalicum SCHERZER	
	Nucis moschatas	Balsamum aromaticum aethereum.	
	Myrrhae	Rp	Olei Nucistae 50,0
	Radice Angelicae		Balsami peruviani 10,0
	Radice Gentianae aa 10,0		Olei Caryophyllorum
	Croci		Olei Rosmarini aa 5,0
	Corticis Cinnamomi		Olei Succini rectificati 2 0
	Masticis		
	Succini		

Balsamum Chironis.
Baume Chiron ou de Lausanne
CHIRON'scher Balsam

Rp	1 Olei Olivarum	50,0
	2 Terebinthinae venetae	14,0
	3 Cerae flavae	14,0
	4 Alkannini	0,03
	5 Camphorae	0,3
	6 Olei Olivarum	10,0
	7 Balsami peruviani	8,5

Man schmilzt 1—3, fügt die Lösung von 4—6 und zum Schluss der halberkalteten Masse 7 hinzu (Diet.) In Frankreich beobachtete Wundsalbe

Balsamum Lobkowitz

Rp	Resinae Pini	90,0
	Terebinthinae	20,0
	Olei Menthae crispae	10,0
	Olei Terebinthinae	20,0
	Olei Rosmarini	—
	Balsami peruviani	aa 40,0
	Semina Foenugraeci pulv	90,0

Volkshelmmittel gegen Gicht und dergl.

Balsamum Locatelli

Balsamum italicum
Lokateller (Wund-) Balsam (Diet)

Rp	Cerae flavae	80,0
	Olei Olivarum	40,0
	Terebinthinae venet	25,0
	Balsami peruviani	5,0
	Alkannini	0,2

Heilmittel für wunde Brustwarzen Frostbeulen.

Balsamum mamillare album
Brustwarzenbalsam (Diet)

Rp	1 Olei Amygdalarum	8,0
	2 Balsami peruviani	2,0
	3 Gummi arabic	6,0
	4 Aquae Rosae	8,0
	5 Acidi borici	2,0
	6 Aquae Rosae	74,0

Man emulgiert 1—4 und fügt die Lösung von 5 und 6 hinzu

Balsamum mamillare nigense
Rigaer Brustwarzenbalsam

Rp	Balsami peruviani	10,0
	Vitellum ovi unius	—

ist emulsi

Balsamum ophthalmicum AELZ
Nach DIETERICH

Rp	Balsami peruviani	2,0
	Olei Lavandulae	—
	Olei Caryophyllorum	—
	Olei Succini rectific	aa 1,5
	Spiritus (80%)	95,0

Balsamum vitae FRITZ

Rp	Mixturae oleoso balsamicae	100,0
	Olei Succini rectificati	gtt XX.

Balsamum vulnerarium (Diet)

Blutstillender Wund-Balsam.

Rp	Liquoris Ferri sesquichlorati	—
	Balsami peruviani	aa 10,0
	Glycerini	20,0
	Tincturae Balsami peruviani	60,0

Emplastrum balsamicum SCHIEFFHAUSEN

Rp	Emplastri saponati	60,0
	Emplastri fusci camphorati	80,0
	Balsami peruviani	—
	Balsami Copaivae	aa 2,5
	Sebi ovilla	5,0

In Stangen auszurollen

Linimentum ad mamillas HARLESS

Rp	Balsami peruviani	5,0
	Vitellum ovi unius	—
	Boracis	2,5
	Olei Amygdalarum	30,0

Linimentum stimulare REIL

Rp	Balsami peruviani	—
	Olei Lauri	aa 5,0
	Olei Nucis	3,0
	Olei Caryophyllorum gtt	XV

Bef. Lähmung der Augenlider

Mixtura oleoso balsamica

Balsamum vitae Hoffmanni

Balsamisch-ölige Mixtur Lebensbalsam
HOFFMANN'scher Lebensbalsam Mixtura
oleobalsamica Baume de vie de HOFF-
MANN HOFFMANN's restorative Balsam
Mixtura oleobalsamica

	Germ	u	Helv	Austr
Rp	Olei Citri	4,0	—	4,0
	Olei Lavandulae	4,0	—	4,0
	Olei Macidis	4,0	—	2,0
	Olei Caryophyllorum	4,0	—	2,0
	Olei Thymi	4,0	—	—
	Olei Cinnamomi	4,0	—	gtt X
	Olei Aurantii flor	—	—	2,0
	Balsami peruviani	10,0	—	4,0
	Spiritus (90%)	960,0	—	—
	Spiritus aromatici	—	—	1000,0

Pilulae antientarrhales MARKUS

Rp	Balsami peruviani	10,0
	Myrrhae pulv	20,0
	Extracti Opii	3,0

fiunt pilulae 260, conspergendae Rhizomate Iridis florentinae

Sapo Balsami peruviani pulvinaris
Perubalsam-Pulverseife nach EICHENOFF

Rp	1 Balsami peruviani	—
	2 Natrii carbonici sicc	aa 5,0
	3 Aquae destillatae	2,5
	4 Saponis pulvinar alkalini	90,0

Man erwärmt 1—3, bis die Masse sich zu Pulver zerreiben lässt, und mischt 4 dazu (Diet.)

Sapo Balsami peruviani ungulosus

Perubalsam-Seife (Diet)

Rp	Balsami peruviani	10,0
	Mollini	90,0

Saponimentum Balsami peruviani.

Perubalsam-Opodeldoo (Diet)

Rp	Saponis stearinici dialysati	80,0
	Saponis oleinici dialysati	40,0
	Natrii caustici	2,0
	Spiritus (90%)	800,0
	Balsami peruviani	100,0

Nach dem Auflösen und Filtriren ergänzt man mit Spiritus auf 1000,0

Spiritus peruvianus (Form barol)

Rp	Balsami peruviani	10,0
	Spiritus (90%)	40,0

Tinctura balsamica.

Wiener Balsam (für Handverkauf)

Rp	Aloës	—
	Myrrhae	—
	Olibani	aa 18,0
	Bals peruvian	—
	Syrac. liqu	aa 35,0
	Croci	2,0
	Spiritus (90 %)	1500,0

Tinctura ad dentes REICHEL
REICHEL's Zahn- und Mundessenz.

Rp Balsam peruviani	5,0
Balsam tolutanum	10,0
Acid carbolicum	
Olei Caryophyllorum	aa 2,0
Opi	3,0
Spiritus (80%)	1000,0

Tinctura ad perniciosos RUST
Frosttinktur

Rp Balsam peruviani	5,0
Mixtura oleoso-balsamica	
Spiritus coloniensis	aa 80,0

Zum Bestreichen der Frostheulen

Unguentum ad clavas DIETRICH
Hühneraugensalbe

Rp 1 Resinae Pin. depurati	8,0
2 Terebinthinae venetae	12,0
3 Cerse flavae	48,0

4 Vaschni flavi 16,0

5 Acidi salicylici

6 Balsam peruviani aa 8,0

Man schmilzt 1—4 und fügt 5—6 hinzu Auf Leinwand gestrichen mehrere Tage lang aufzulegen, dann ein Fussbad zu nehmen

Unguentum contra scabiem ULLMANN

Rp Bals peruviani	
β Naphthol	aa 10,0
Sapon lauri	
Crotae albæ	aa 20,0
Vasogen sulf spiss (8%)	40,0

§ 24 Stunden auf den vorher mit Seifenspiritus abgeriebenen Stellen liegen lassen

Unguentum pomadinum HEBBA
HEBBA's Haarpomade

Rp Balsam peruviani	25,0
Olei Cacao	850,0
Olei Olivarum	825,0

Antiscabin von FUHRMANN, ein Krätzemittel, enthält Perubalsam, Seife, Glycerin, Weingeist, Borsäure und β-Naphthol

Gran Aschmannssalbe ist Zinksalbe mit Perubalsam 10 1

Haarspiritus, LIDLOFF's HOFFMANN's Lebensbalsam mit Perubalsam, Gerbsäure und Kampher

Hamburger gelbes Lebensöl, ist eine Mischung von ordinarem Lebensöl (s unter Anisum) mit Benzotinktur und einer weingeistigen Lösung von Storax, Perubalsam und verschiedenen ätherischen Ölen

Havannatinktur zur Verwandelung geringwerthiger Cigarren in echte Havannas, ist Perubalsam in Weingeist gelöst

Klosteressenz, Spanische, ist ein verdünnter HOFFMANN'scher Lebensbalsam

Kosmetikum, Haarstärkendes Öl des Dr PINKAS, ist eine weingeistige Lösung von Perubalsam und Wallnusschalenextrakt mit Zimmttinktur

Dr. LEVINGSTONE's Ameisenbalsam von A. AHNELT enthält Ricinusöl, Perubalsam und Bergamottöl

GEHRL'scher Balsam ist HOFFMANN'scher Lebensbalsam mit einem Zusatz von Hoffmannstropfen und verschiedenen ätherischen Ölen

Perukognak von DALLMANN & Co, bei Lungenschwindsucht empfohlen, enthält in Liter die Bestandtheile von 25 g Perubalsam ohne die belastigenden, unwirksamen Harze

Peruwasser, gegen Schuppen der Kopfhaut, besteht aus Perubalsam, Ricinusöl, Ratanhatinktur und Alkohol

Quintessence balsamique du Harem ist eine filtrirte Lösung von Perubalsam, Lavendelöl, Kampher und Weingeist

Sanal, Dr MULLER's, gegen Gicht etc, ist eine Salbe aus Bleiglätte, Bolus, Galmei, Perubalsam, Wachs und Vaseline

Schmerzstillende Einreibung des Wiener Handverkaufs Mixt oleos. balsam, Spirit camphor, Spirit saponat, Chloroform aa 20,0, Spirit aether, Tinct Arnicae, Liq Ammon caust aa 10,0

Yoonhof-Geeet von Van der Lund, ein Barterzeugungsmittel Weingeistige Lösung von Perubalsam, Lavendelöl, Bergamottöl, Zimmtöl, Nelkenöl

Wistaria-Öl besteht aus Kopaiva- und Perubalsam, Geranium- und Ylang-Ylangöl

Wunderbalsam, Englischer 1) Mit Sandelholz gefärbte, weingeistige Lösung von Perubalsam und Aloë 2) Zusammengesetzte Benzotinktur

Zuckerkrankheit-Heilmittel von Dr JOH MULLER besteht aus 1) einer Einreibung aus Perubalsam und Weingeist, 2) einer Lösung von Glaubersalz, Salicylsäure und Bitterstoffen in Zimmetwasser

Balsamum tolutanum.

Balsamum tolutanum (Gem. Helv Austr Brit U-St) Bals. americanum. Bals. s Opopalsamum de Tolu. Bals. indicum siccum. Resina tolutana. — Tolu-balsam. Thomashalsam — Baume de Tolu (Gall) Baume d'Inde sec. — Balsam of Tolu.

Wird von der zu den Papilionaceae-Sophoreae gehörigen **Tolulifera Balsamum** L. (*Myroxylon tolulifera* H. B. K.) gewonnen, einem bis 27 m hohen Baume, der im nördlichen Südamerika weit verbreitet ist.

Vorkommen und Gewinnung Wie der Perubalsam, praexistirt auch der Tolubalsam nicht in der Pflanze, sondern entsteht in derselben als pathologisches Produkt in Folge ausserer Eingriffe (vgl. auch Benzoe und Styrax). Man gewinnt ihn im Unterlauf des Magdalena bis Turbaco, Las Mercedes und Plato, Tolu etc., indem man V-förmige Vertiefungen in den Stamm haut, aus denen der Balsam aussickert und in kleinen Kalebassen aufgefangen wird, oder man lässt ihn am Stamm herabfließen und fängt ihn auf Marantablättern auf. Der Ausfuhrhafen ist Sabania. Produktion 30–40000 kg jährlich. Die Anschauung, dass Tolu- und Perubalsam von demselben Baume stammen, der erstere ein normales, der letztere aber ein pathologisches Sekret sei, hat sich nicht bestätigt, da auch *Tolulifera Balsamum* in der sekundären Rinde keine Sekretbehälter hat. Uebrigens ist auch ohne Schwalen gewonnener Perubalsam mit dem Tolubalsam nicht identisch.

Eigenschaften. Der frische Balsam ist zahflussig, von Konsistenz des Terpentins, in dünnen Schichten durchsichtig (weisser Balsam). So gelangt er in den Handel. Allmählich wird er fest und krystallinisch. Die Farbe ist rothbraun mit gelbgrauer Nuance. Der Geruch ist ein sehr angenehmer und feiner, der Geschmack aromatisch, wenig kratzend. Die alkoholische Lösung reagirt sauer. Löslich in Alkohol, Chloroform, Aceton, Essigäther, Essig, Kalilauge, weniger in Aether und Schwefelkohlenstoff, kaum in ätherischen Oelen, nicht in Petroläther.

Bestandtheile 7,5 Proc. einer öligen, angenehm riechenden Flüssigkeit, die aus Benzoesäure-Benzylester und Zimmtsäure-Benzylester besteht, ferner 12 bis 15 Proc. freie Zimmtsäure und Benzoesäure, 0,08 Proc. Vanillin. Die Hauptmenge ist Zimmtsäure- und Benzoesäureester des Toluresinotannols $C_{17}H_{18}O_8$, eines Harzalkohols. Endlich etwa 3 Proc. Verunreinigungen.

Prüfung 1) Der Tolubalsam wird häufig mit Colophonium verfälscht. In Schwefelkohlenstoff ist er nur in geringem Maasse löslich (20 Proc.), die Lösung soll eingedampft von gelber Farbe und vom angenehmen Geruch des Balsams sein und mit concentrirter Schwefelsäure übergossen intensiv blutroth werden, auch beim Erhitzen des Rückstandes nicht nach Terpentintol riechen.

2) Wiederholt nacheinander mit Wasser ausgekocht, liefert er Filtrate, die beim Erkalten krystallinische Säuren ausfallen lassen. Dann noch einmal unter Zusatz von gebranntem Kalk gekocht, liefert er ein gelbes Filtrat, welches nach dem Ansäuern mit Salzsäure, die vorher als Ester gebundenen und als lösliche Kalksalze abgeschiedenen Säuren fallen lässt.

3) Bestimmung der Säurezahl wie bei Balsam Peruvianum. Grenzzahlen nach DIETZSCH 114,80–158,60.

4) Bestimmung der Verseifungszahl 1 g Balsam wird in einer ausreichenden Menge Alkohol (96 proc.) gelöst, 20 ccm $\frac{1}{2}$ N. alkoholische Kalilauge zugegeben und unter Beifügung einer Platinspirale eine Stunde am Rückflusskühler erhitzt. Dann verdünnt man mit 100 ccm Alkohol (96 proc.) und titirt nach dem Erkalten mit $\frac{1}{2}$ N.-Schwefelsäure und Phenolphthalein. Die Anzahl der gebundenen Kubikcentimeter Kalilauge > 23 = Verseifungszahl. Grenzzahlen nach DIETZSCH 155,30–187,40.

5) Die Esterzahl berechnet sich aus der Differenz der beiden vorhergehenden Grenzzahlen nach DIETZSCH 31,2–46,50.

Anwendung. Wie Perubalsam, innerlich in Gaben von 0,3–1,0 g in Pulvern oder Pillen, häufiger in Gallertkapseln mit Kreosot oder Guajakol (Sommerbrodt). Sonst zu Parfümerie- und Raucherzwecken. Die BLANQUARD'schen Jodeisenpillen werden in der Regel mit Tolubalsam überzogen.

Sirupus Balsami tolutani (Ergänzb. Helvet), **Sir. tolutanus** (Brit., U-St.) — Tolubalsamsirup — Sirop de Tolu — Syrup of Tolu — (vgl. auch Extr. Balsam tolutan.)

Brit Tolubalsam 62,5 g werden $\frac{1}{4}$ Stunde lang mit siedendem Wasser q s ausgezogen und aus dem erkalteten Filtrat mit Zucker 1800 g, Sirup 2400 g hergestellt — **Ergänzb Tolubalsam** 1 Th wird mit heissem Wasser 10 Th übergossen 24 Stunden stehen gelassen. Das Filtrat 8 Th giebt mit Zucker 12 Th Sirup 20 Th **Helvet Tolu balsam** 5 Th, gewaschener Sand 50 Th werden zweimal mit Wasser je 20 Th 8 Stunden im Wasserbade erhitzt, das Filtrat 36 Th giebt mit Zucker 64 Th Sirup 100 Th **Gall Tolubalsam** 50 g wird zweimal mit je 500 g Wasser 2 Stunden im Wasserbade ausgezogen. Im Filtrat löst man Zucker 100 Th. U-St **Tolubalsam** 10 g in Alkohol 50 ccm gelöst verreibt man mit einer Mischung von *precip Calciumphosphat* 50 g und Zucker 150 g, verjagt den Alkohol in der Wärme, fügt allmählich Wasser 500 g zu, filtrirt, löst Zucker 700 g und bringt das Ganze auf 1000 ccm. Auch durch Verdünnung herstellbar (s Sirup simpl) — **Diet** Genau so, wie Sirup Balsami peruvian (Seite 453) Zur Geschmacksverbesserung von Mixturen, z B Chloralhydrat

Den bei Bereitung des Sirups bleibenden Balsamrückstand trocknet man und verwendet ihn zu Raucherzwecken

Tinctura Balsami tolutani, Tinct tolutana — **Tolubalsamtinktur** — **Tincture of Balsam of Tolu** **Brit Tolubalsam** 100 g, Alkohol (90 proc) q s zu 1000 ccm Tinktur — **U-St Tolubalsam** 100 g, Alkohol (91 proc) q s zu 1000 ccm Tinktur **Gall Tolubalsam** 100 g Alkohol (80 proc) 500 g — **Diet Tolubalsam** 10 Th, Weingeist (90 proc) 1000 Th

Tinctura Balsami tolutani aetherea. Aetherische Tolubalsamtinktur **Tolubalsam** 10 Th, Weingeist (90 proc), Aether je 50 Th. In eingedicktem Zustande als **Pillenlack** zu verwenden **Gall Tolubalsam** 100 g, Aether (spec Gew 0,758) 500 g

Emulsio Balsami tolutani. Emulsion de Baume de Tolu (**Gall**) **Tolubalsam** 20 g löst man in Alkohol (90 proc) 100 g, fügt Quillaextractur 100 g und nach und nach heisses destillirtes Wasser 780 g hinzu

Extractum Balsami tolutani fluidum Merck dient zur extempore-Bereitung der verschiedenen Tolu sirupe 4 Th Extrakt = 1 Th Balsam

Lacca ad pilulas. **Pillenlack** 1) **Tolubalsam** 15 g wird mit heissem Wasser 50 g eine Stunde lang ausgezogen, die erkaltete Flüssigkeit abgossen, der Rückstand nach Zusatz von Kolophonum 1,5 g in Weingeist 15 g, Aether 100 g gelöst 2) (**n Diet**) **Tolubalsam** 7 Th, Schellack 2 Th, Medicinische Seife 1 Th, Aether 20 Th, Weingeist (90 proc) 65 Th. Die filtrirte Lösung bringt man mit Weingeist auf 100 Th. Zum Lackiren von Pillen bedient man sich einer geräumigen Schale mit möglichst flachem Boden und steiler Wandung

Lozenges with Tolu Basis (Brit) Die 500fache Menge des für eine Pastille verordneten Mittels (Alkaloide in 10,5 ccm Wasser gelöst) wird mit Zuckerpulver 482 g Gummi arabicum plv 19,5 g gemischt mit Tolubalsamtinktur 10,5 ccm, Gummischleim 35,5 ccm, Wasser q s. Zur Masse angestossen und 500 Pastillen daraus geformt

Pastilli Balsami tolutani. (**Gall**) **Tablettes de Baume de Tolu** — **Tolubalsam** 100 Th zieht man mit Wasser 200 Th 2 Stunden im Wasserbade aus und bringt die erkaltete und filtrirte Flüssigkeit mit Zucker 2000 Th, Traganth 5 Th in Pastillen von 1 g

Pilulae balsamicae Delleux. Natriumbikarbonat 10 g, Tolubalsam 5 g, Eisenoxyd, Lärchenterpentin je 2,5 g. Man formt 100 Pillen. Täglich dreimal 3 Pillen **Pilulae balsamicae Chabrely** Tolubalsam 10 g, Storax 7,5 g, Magnesiumkarbonat q s zu 50 Pillen

HILL'scher Honighalsam ist ein weingeistiger Auszug von Tolubalsam, Storax, Opium und Honig

Keuchhustensirup, de Almeida's Kreosot 0,25, Sulfonal 0,2, Sirup tolutanus 150,0

Lungenleiden-Mittel aus Nordamerika besteht aus verdünnter Tolubalsamtinktur **Tolu Chewing Gum** enthält Tolubalsam, Burgunderharz, Wachs und Paraffin

Oleum Balsami Tolutani **Tolubalsamol.** Das durch Wasserdampfdestillation aus Tolubalsam in einer Ausbeute von 1,5—3,0 Proc gewonnene Öl ist eine höchst angenehm hyacinthenartig riechende Flüssigkeit vom spec Gew 0,945 bis 1,1. Es enthält ein nach Elemi riechendes Terpen (Tolu), $C_{10}H_{18}$, sowie sauerstoffhaltige Antheile, vermuthlich Ester der Zimmtsäure und Benzoesäure sowie des Benzylalkohols. Tolubalsamöl wird in der Parfümerie gebraucht

Baptisia.

Gattung der Papilionaceae—Podalyrieae.

Baptisia tinctoria R Br Wild Indigo Heimisch in Nordamerika Die Wurzel wird als Adstringens und gegen Fieber verwendet, in stärkerer Dosis bewirkt sie Erbrechen und Diarrhöe

Bestandtheile. 2 Glykoside, von denen das genauer bekannte Baptisin $C_{26}H_{32}O_{14} \cdot 9H_2O$ bei $240^\circ C$ schmilzt und Rhamnose $C_6H_{12}O_6$ und Baptigenin $C_{14}H_{12}O_6$ liefert, ferner einen giftigen Stoff Baptitoxin, der mit dem Cytisin identisch ist

Ein im Handel befindliches Baptisin ist nicht dieses, sondern Pseudobaptisin $C_{27}H_{30}O_{14} \cdot 7\frac{1}{2}H_2O$ Schmelzpunkt $247-248^\circ$

Mit dem Namen Baptisin bezeichnet man ferner ein durch einfache Extraktion gewonnenes Harz, das zu 10 Proc in der Wurzel vorhanden ist

Die ganze Pflanze **Baptisia tinctoria** dient zum Blaufärben, die jungen Sprosse werden wie Spargel gegessen

Baryum.

I † **Baryum oxydatum** Baryumoxyd. *Baryta usta. Baryta caustica sicca.* Aetzbaryt *Teria ponderosa* BaO . Mol. Gew. = 153.

Entsteht durch Verbrennen von metallischem Baryum an der Luft — Am einfachsten stellt man es dar, indem man in einer Retorte aus Porcellan oder in einem heissen Tiegel Baryumnitrat heftig erhitzt — Grauweiße, poröse, zerreibliche Masse, spec Gew 4,0—5,45 Verbindet sich mit Wasser unter Entwicklung hoher Hitze zu Baryumhydroxyd

II † **Baryum hydroxydatum** *Baryta hydrica. Baryumhydroxyd.* Aetzbaryt. $Ba(OH)_2$. Mol. Gew. = 171.

Feuchtet man Baryumoxyd mit Wasser an, so verwandelt es sich unter Entwicklung hoher Hitze, die bis zum Glühen und Schmelzen des gebildeten Baryumhydroxydes sich steigern kann, in Baryumhydroxyd $Ba(OH)_2$ Weisses Pulver oder geschmolzene weisse Masse von krystallinischem Gefüge, welche bei Glühhitze zu einem Oele schmilzt Spec Gew = 4,495. Es verliert in der Glühhitze kein Wasser, es sei denn, dass es gleichzeitig Kohlensäure aufnimmt

Beide soeben genannte Präparate sind im allgemeinen nicht Gegenstand des Handels

III † **Baryum hydroxydatum crystallisatum** *Baryta hydrica crystallisata.* Krystallisirtes Baryumhydroxyd. Krystallisirtes Aetzbaryt. $Ba(OH)_2 + 8H_2O$. Mol. Gew. = 315. Ist diejenige Substanz, welche in der Praxis schlechthin als „Aetzbaryt“ oder „Barythydiat“ bezeichnet wird

Zur Darstellung bringt man Baryumoxyd mit Wasser zusammen und krystallisiert das entstandene Baryumhydroxyd aus siedendem Wasser um Oder man löst 80 Th Natriumhydroxyd in 500 Th Wasser, erhitzt zum Sieden und trägt unter Umrühren 244 Th zerriebenes Baryumchlorid ($BaCl_2 + 2H_2O$) ein Aus der geklärten Flüssigkeit scheidet sich das Baryumhydroxyd beim langsamen Erkalten in Krystallen aus

Grosse wasserhelle, tetragonale Tafeln und Prismen, welche gegen $80^\circ C$ schmelzen In trockener Luft geben sie etwa 40 Proc Krystallwasser (= 7 Mol H_2O) ab unter Uebergehen in das wasserärmere Salz $Ba(OH)_2 + H_2O$ Das letzte (8) Molekül Wasser verliert es erst bei Rothgluth unter Hinterlassung der Verbindung $Ba(OH)_2$, die auch bei heller Rothgluth noch nicht zerfällt — Löslich in 20 Th kaltem oder in 3 Th siedendem Wasser Die Lösung ist starker alkalisch als eine äquivalente Lösung von Calciumhydroxyd.

Aufbewahrung Vorsichtig, vor Kohlensäure geschützt

† **Baryum hydroxydatum crystall pro analysi natriumfrei** Zur Bestimmung der Alkalien bedarf man eines von Natriumverbindungen völlig freien Barythydrates. Man gewinnt dieses, indem man das reinste Präparat des Handels so oft aus siedendem Wasser umkristallisiert (5–6 mal), bis die Lösung von 1 g des Salzes, nach dem Ausfällen allen Baryums durch einen Ueberschuss von Schwefelsäure, beim Verdampfen keinen glühbeständigen Rückstand mehr hinterlässt. Ueber die maassanalytische Prüfung s. S. 166 u. 167.

Aqua Barytae Barytwasser. Reagens der chemischen Analyse, besonders zur Abscheidung der Magnesia gebraucht und zum Nachweis bez. zur Bestimmung der Kohlen-säure, ist eine klare Auflösung von 1 Th. kryst. Barythydrat in 30 Th. Wasser.

IV † Baryum hyperoxydatum Baryumhyperoxyd. Baryumsuperoxyd Baryi Dioxidum (U-St.) BaO_2 Mol. Gew. = 169. Wird technisch dargestellt, indem man über pulveriges Baryumoxyd, welches auf dunkles Rothgluth erhitzt ist, kohlen-säurefreien Sauerstoff leitet.

Weisse oder grauweisse pulverige Massen. Zerfällt bei höherer Temperatur in Baryumoxyd und in Sauerstoff, verbindet sich mit Wasser zu dem krystallisirenden Baryum-superoxydhydrat ($\text{BaO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$). Dient zur technischen Darstellung von Sauerstoff (BOUSSINGAULT) und von Wasserstoffsuperoxyd.

Gehaltsbestimmung des technischen Präparates. Löst man 2,11 g Baryum-superoxyd in 25 proc. Phosphorsäure (welche auf 0° C. abgekühlt ist) zu 25 cm auf, so sollen 5 cm dieser Lösung (entsprechend 0,422 g Substanz) nicht weniger als 40 cm $\frac{1}{10}$ -Normal Kaliumpermanganat-Lösung (0,316 g KMnO_4 in 1 l. enthaltend) zur schwachen Rothfärbung erfordern, entsprechend 80 Proc. BaO_2 (U-St.). Ein völlig reines Präparat würde unter den gleichen Verhältnissen 50 cm verbrauchen.

V † Baryum hyperoxydatum hydratum seu crystallisatum Baryum-superoxydhydrat. $\text{BaO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 313. In kalte wässrige Salzsäure von 2 Proc. HCl trägt man unter Umrühren feingepulvertes technisches Baryumsuperoxyd, welches mit Wasser zu einem Brei angerührt ist, so lange ein, bis die Flüssigkeit eben noch sauer reagirt. Man macht alsdann mit verdünntem Barytwasser schwach alkalisch, filtrirt von ausgeschiedenem Eisenhydroxyd + Thonerdehydrat ab und versetzt das Filtrat (welches Wasserstoffsuperoxyd enthält) mit überschüssigem Barytwasser. Man hört mit diesem Zusatz auf, wenn eine abfiltrirte Probe nach dem Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure und nach Zusatz von etwas Kaliumdichromat beim Schütteln mit Aether diesen nicht mehr blau färbt. Die ausgeschiedenen Krystalle werden gesammelt, durch eiskaltes Wasser gewaschen und durch Pressen zwischen Filtrirpapier getrocknet.

Hexagonale, perlglänzende Schnuppen, Säulen oder Tafeln, oder flimmernde Blättchen, die in kaltem Wasser fast unlöslich sind, von siedendem Wasser in Baryumhydroxyd + Sauerstoff zersetzt werden. Man kann die Verbindung im feuchten Zustande (mit Wasser zum Brei angerührt) in verschlossenen Gefässen ohne Zersetzung aufbewahren und benutzt sie zur Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd. Trocknet man sie und erhitzt den Rückstand auf 130° C., so hinterbleibt reines Baryumsuperoxyd BaO_2 als weisses, der Magnesia ähnliches Pulver.

Erkennung und Bestimmung Man erkennt die Baryumverbindungen an folgenden Reaktionen:

1) Die flüchtigen Baryumverbindungen (einschliesslich Baryumsulfat) färben die nicht leuchtende Flamme gelbgrün. Man befeuchtet die Probe zweckmässig mit Salzsäure, die Flammenfärbung kommt besonders in den heissesten Theilen der Flamme zu Stande und hält geraume Zeit an. 2) Kali- und Natronlauge fällen nur aus concentrirter Lösung weisses Baryumhydroxyd. Kohlensäurefreies Ammoniak erzeugt überhaupt keine Fällung. 3) Neutrales Kaliumchromat erzeugt einen gelben Niederschlag von Baryumchromat BaCrO_4 , um anwesende Mineralsäuren zu binden, empfiehlt sich der Zusatz von Natrium-acetat oder Ammoniumacetat. 4) Phosphate der Alkalien erzeugen in neutralen Lösungen weisse Niederschläge von Baryumphosphaten, welche in Salzsäure, auch in Salpetersäure löslich sind. 5) Siliciumfluorwasserstoffsäure fällt farbloses, gallertartiges Baryumsilico-Fluorid SiF_6Ba , erst in 4000 Th. Wasser löslich, leichter löslich in Salzsäure und in Salpetersäure, unlöslich in Alkohol. 6) Schwefelsäure, Sulfate (sogar die Lösungen von Calciumsulfat und von Strontiumsulfat) geben weissen Niederschlag von Baryumsulfat, so gut wie unlöslich in verdünnten Säuren und verdünnten Alkalien, löslich in etwa 400 000 Th. Wasser.

Die Bestimmung erfolgt a) als Baryumsulfat. Man säuert die Baryumsalzlösung mit einigen Tropfen Salzsäure an, erhitzt sie zum Sieden und fällt durch tropfenweisen Zusatz verdünnter Schwefelsäure, bis ein Ueberschuss von letzterer vorhanden ist. Im übrigen verfährt man genau wie bei der Bestimmung der Schwefelsäure $\text{BaSO}_4 \times 0,5566 = \text{BaO}$ $\text{BaSO}_4 \times 0,557982 = \text{Ba}$

b) Weniger häufig erfolgt die Bestimmung als Baryumkarbonat. Man fällt die Baryumsalzlösung in siedendheisser Flüssigkeit mit Natriumkarbonat, wäscht den Niederschlag mit Wasser aus, trocknet ihn durch schwaches Glühen, befeuchtet mit Ammoniumkarbonat, erhitzt nochmals gelinde und wägt.

Toxikologisches Alle in Wasser bez. in verdünnten Säuren löslichen Baryumverbindungen sind giftig. Symptome der Vergiftung sind Uebelkeit, Erbrechen, Angst, Kolikschmerzen, Diarrhoen, Kalte, Blässe. Gegenmittel sind Magenpumpe, Brechmittel, Magnesiumsulfat, Natriumsulfat. Als toxische Gabe sind für einen Erwachsenen etwa 15 g Baryumchlorid oder Baryumnitrat anzusehen.

Barysalz.

Bei der Darstellung der Baryumsalze geht man a) entweder vom Witherit (natürlichem Baryumkarbonat) aus, indem man diesen in den entsprechenden Säuren auflöst, oder b) man bedient sich als Ausgangsmaterial des Schwerspathes. Dieser wird durch Glühen mit Kohle oder einem kohlenstoffhaltigen Material, wie Theer, Starke etc. in Baryumsulfid verwandelt und dieses nach verschiedenen Verfahren in die entsprechenden Salze übergeführt. c) Gewisse unlösliche Salze werden auch durch doppelte Umsetzung löslicher Baryumsalze erhalten. d) Kleinere Mengen von Baryumsalzen können mit Vortheil im pharmaceutischen Laboratorium auch unter Verwendung von reinem Baryumkarbonat gewonnen werden.

I † Baryum aceticum Baryumacetat. Baryacetat. Essigsäures Baryum. Essigsaurer Baryt. Acétate de Baryum. Acetate of Barium. $\text{Ba}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 273.

Man verdünnt 400 Th. Essigsäure von 80 Proc. mit der gleichen Menge Wasser und trägt unter mässigem Erwärmen 197 Th. reines Baryumkarbonat ein. Die filtrirte Lösung wird mit Essigsäure nothigenfalls schwach angesäuert und durch Eindampfen zur Krystallisation gebracht.

Aus der heissen conc. Lösung scheidet sich das Salz obiger Zusammensetzung in vierseitigen Prismen ab, aus der bei 0° gesättigten Lösung erhält man monokline Prismen $\text{Ba}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 + 3\text{H}_2\text{O}$. — Das obige Salz löst sich in etwa 1 Th. Wasser, auch in etwa 100 Th. Alkohol. Reagens zum Nachweis bez. zur Bestimmung der Chromsäure, in der Katfdruckerei zur Herstellung der Thonerde-Beize.

II † Baryum bromatum Baryumbromid. Bromwasserstoffsäures Baryum. Brombaryum. Bromure de Baryum (Gall.) Bromide of Barium. $\text{BaBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 333.

Man neutralisirt eine Mischung von 100 Th. Wasser und 200 Th. Bromwasserstoffsäure von 25 Proc. HBr mit 60 Th. reinem Baryumkarbonat und bringt die filtrirte Lösung durch Eindampfen zur Krystallisation.

Farblose, rhombische Tafeln, unangenehm bitter und herb schmeckend, luftbeständig, in Wasser und Alkohol löslich. Wird zur Darstellung der Bromwasserstoffsäure benutzt (s. S. 52).

III † Baryum bromicum Baryumbromat. Bromsaures Baryum. Bromate de Baryum. Bromate of Barium. $\text{Ba}(\text{BrO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 411.

Man löst 1 Th. krystall. Barythydrat ($\text{Ba}(\text{OH})_2 + 8\text{H}_2\text{O}$) in 30 Th. Wasser und fügt zur warmen Lösung allmählich 3 Th. Brom hinzu. Man erhitzt einige Zeit zum Sieden. Beim Erkalten scheidet sich das obige Salz aus, welches durch Umkrystallisiren gereinigt wird.

Kleine, glänzende, monokline Krystalle, löslich in 180 Th kaltem oder in 25 Th siedendem Wasser Sind mit gleicher Vorsicht zu behandeln wie Kaliumchlorat, d i chlor-saures Kalium

IV † Baryum carbonicum Baryumkarbonat Kohlensaures Baryum Barytkarbonat Carbonate de Baryum. Carbonate of Barium. BaCO_3 . Mol. Gew. = 197.

Man fällt eine Lösung von 100 Th Baryumchlorid in 1000 Th Wasser mit einer Lösung von 120 Th krystall Natriumkarbonat in 1000 Th Wasser Durch Erwärmen der Fällungsflüssigkeit kann der Niederschlag dichter erhalten werden Man wäscht den Niederschlag nach dem Absetzen aus und trocknet ihn

Weisses, specifisch schweres, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser kaum, aber doch so weit löslich, dass es feuchtes rothes Lackmuspapier blaut Löslich in verdünnten Säuren Ist bei Rothgluth beständig, d h es spaltet Kohlensäure nicht ab — Die Lösung in Salpetersäure soll 1) durch Silbernitrat nicht getrübt werden 2) Nach dem Ausfällen des Baryums durch Schwefelsäure soll das Filtrat nach Zusatz von Ammoniak durch Ammoniumoxalat nicht getrübt werden (Kalk) 3) Die vom Baryum befreite Flüssigkeit darf beim Eindampfen keinen glühbeständigen Rückstand hinterlassen (Magnesia, Alkalien)

Baryum carbonicum pro analysi Das in der quantitativen Analyse gebrauchte Baryumkarbonat muss gelegentlich frei von Alkalisalz sein Man stellt ein solches Präparat dar, indem man eine Lösung von 1 Th alkalifreiem Baryumchlorid in 80 Th Wasser mit einer Lösung von 2 Th Ammoniumkarbonat und 5 Th Ammoniak in 30 Th Wasser fällt, den Niederschlag auswascht und trocknet

Baryumkarbonat dient als Reagens in der Analyse, ferner als Ausgangsmaterial zur Darstellung von Baryumsalzen

Baryum carbonicum nativum Witherites Witherit Das natürlich vorkommende Baryumkarbonat Weiss bis graue, derbe Stücke von blättrigem bez stahligem Gefüge, spec Gew = 4,2—4,3 oder ein weisses bis graues Pulver

Pasta Barytae venenosa Baryt Pasta als Rattengift 100 Th Baryumkarbonat, 10 Th Ultramarin, 30 Th Weizenmehl, 30 Th Zucker, 10 Th Sternanispulver werden mit 20 Th indischem Sirup und der erforderlichen Menge Glycerin zu einem Teige angestossen, aus welchem man haselnussgrosse Kugeln formt, die in die Löcher der Ratten gelegt werden Empfiehlt sich zum Vergiften der Ratten besonders in Viehställen

V † Baryum chloratum (Erganzb) Baryta chlorata oder muriatica Baryumchlorid. Chlorbaryum Chlorure de Baryum (Gall) Chloride of Barium Terra ponderosa salita. $\text{BaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 244

Darstellung 1) Kleinere Mengen des reinen Salzes erhält man durch Auflösen von 100 Th reinem Baryumkarbonat in 150 Th reiner Salzsäure von 25 Proc Man verdünnt die Lösung mit dem gleichen Volumen Wasser, filtrirt und bringt sie durch Eindampfen zur Krystallisation 2) Grössere Mengen gewinnt man aus Witherit Man fugt zu roher oder reiner Salzsäure so viel gepulverten Witherit, dass die Säure vollständig abgestumpft ist, alsdann sättigt man die Flüssigkeit mit gewaschenem Chlorgas, lässt einen Tag stehen, fällt das Eisen durch mehrtägiges Maceriren (unter öfterem Umschütteln) mit Baryumkarbonat, filtrirt, säuert die Lösung schwach mit Salzsäure an und dampft zur Krystallisation ein

Eigenschaften Farb- und geruchlose, wasserhelle, luftbeständige, rhombische Tafeln mit abgestumpften Ecken oder glänzende Schuppen von unangenehm bitterem, scharfsalzigem Geschmack Löslich in 2,5 Th kaltem oder 1,5 Th heissem Wasser, fast unlöslich in Weingeist (Unterschied von Calcium- und Strontiumchlorid) Schwerlöslich auch in Salzsäure, die concentrirte wässrige Lösung wird daher durch Salzsäure gefällt Spec Gew bei 15°C = 3,05 Das Salz wird bei 120°C wasserfrei und schmilzt alsdann bei 920°C Die specifischen Gewichte der wässrigen Lösungen von Baryumchlorid sind nach Schürf bei $21,5^\circ \text{C}$

Proc $\text{BaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	1	8	5	8	10	12	15	18	20
Spec Gew	1,0078	1,0222	1,0374	1,061	1,0776	1,0947	1,1211	1,1488	1,1688

Prüfung 1) Die wasserige Lösung 1 10 sei neutral 2) Sie werde weder durch Schwefelwasserstoff (Metalle), noch nach dem Ansäuern mit Salzsäure, durch Kaliumferrocyanid verändert 3) Nach Abscheidung des Baryums mittels verdünnter Schwefelsäure hinterlasse das Filtrat keinen glühbeständigen Rückstand (s Barythydrat S 459) 4) Wird das gepulverte Salz mit Weingeist geschüttelt, so darf das Filtrat weder beim Entzünden mit rother Flamme brennen, noch beim Abdampfen einen zerfließlichen Rückstand hinterlassen (Calcium und Strontiumchlorid) Vorsichtig aufzubewahren

Anwendung Innerlich früher bei Syphilis, Skrophulosis zu 0,02—0,1 g Höchstgaben 0,2 g *pro dosi*, 0,6 g *pro die* (Erganzb) Aeusserlich zu Augentropfwässern 0,05—0,2 10,0 und als Verbandwasser bei Geschwüren Technisch zur Darstellung von Baryumpräparaten und als Antikesselstein-Mittel, in der Analyse als Reagens

Baryum chloratum alkalfrei pro analysi Ein solches Präparat wird zur Bestimmung der Alkalien gebraucht Man stellt es dar, indem man eine 10proc Lösung des reinen krystallharten Salzes mit dem gleichen Volumen 25proc Salzsäure vermischt, den ausfallenden Niederschlag absaugt und aus Wasser umkrystallisiert

VI † Baryum chloricum *Baryta chlorica* Chlorsaures Baryum. Chlorsaurer Baryt. Baryumchlorat¹⁾ Chlorate de Baryum. Chlorate of Baryta. $\text{Ba}(\text{ClO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 322.

Darstellung. A. als Laboratoriumspräparat Man löst in einer Porzellanschale 8 Th Ammoniumsulfat sowie 5 Th Kaliumchlorat in 15 Th heissem Wasser und dampft diese Lösung unter beständigem Umrühren zur Konsistenz eines Breies ab Letzteren giebt man nach dem Erkalten in einen Kolben und zieht ihn mit der 4fachen Menge Alkohol (von 80 Proc) unter Erwärmen auf 50° C aus Man filtrirt und wäscht den aus Kaliumsulfat bestehenden Rückstand mit obigem Alkohol nach Von dem (Ammoniumchlorat enthaltenden) Filtrat wird der Alkohol durch Destillation entfernt. Man erwärmt den Destillationsrückstand in einer Porzellanschale so lange mit gesättigtem Barytwasser, bis Ammoniak nicht mehr entweicht Dann löst man ihn in Wasser, fällt aus der Lösung den Ueberschuss von Barythydrat durch Einleiten von Kohlensäure, filtrirt und dampft zur Krystallisation ein B Technisch durch Umsetzen heiss gesättigter Lösungen von Calciumchlorat und Baryumchlorid

Farblose, durchsichtige, prismatische Krystalle, in 4 Th kaltem oder 1 Th siedendem Wasser löslich, beim Uebergiessen mit 25 proc Salzsäure reichlich Chlor entwickelnd Die Lösung in 100 Th destillirtem Wasser werde durch Silbernitrat nur schwach getrübt Verwendung findet das Salz in der Pyrotechnik, ferner bei der Darstellung der Chlorsäure, s Chlorum

Aufbewahrung. Vorsichtig Die Handhabung des Baryumchlorates erfordert die nämliche Vorsicht wie diejenige des Kaliumchlorates (chlorsauren Kaliums)

VII † Baryum chromatum. Baryumchromat. Chromsaures Baryum Chromsaurer Baryt Chromate de Baryum. Chromate of Barium. BaCrO_4 Mol. Gew. = 253.

Zur Darstellung fällt man eine Lösung von 100 Th Baryumchlorid in 1 Liter Wasser mit einer Lösung von 80 Th neutralem Kaliumchromat (K_2CrO_4) in 1 Liter Wasser, wäscht den Niederschlag aus und trocknet ihn Citronengelbes Pulver, unlöslich in Wasser und in Essigsäure Gelöst, bez zersetzt wird es durch Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure Findet Verwendung als gelbe Malerfarbe unter dem Namen Gelbes Ultramarin, Gelbin, Barytgelb, Jaune de Steinbuhl.

¹⁾ Man beachte die Abweichung der chemischen von der pharmaceutischen Nomenklatur

VIII † Baryum hypophosphorosum Baryta subphosphorosa. Baryum hypophosphit. Unterphosphorigsaures Baryum Hypophosphite de Baryum Hypophosphite of Baryta. $\text{Ba}(\text{H}_2\text{PO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$. Mol Gew = 285

100 Th krystall Barythydrat werden in 1800 Th destillirtem Wasser gelöst und unter Zusatz von 12,5 Th granulirtem Phosphor so lange an einen warmen Ort (etwa 1 Woche) gestellt, bis die Gasentwicklung beendet ist. Man filtrirt und wäscht den Rückstand mit Wasser nach. Aus der Lösung wird der Ueberschuss von Barythydrat durch Einleiten von Kohlensäure entfernt, bis letztere keine Trübung mehr erzeugt. Dann filtrirt man ab, engt das Filtrat auf 400 ccm ein und überlässt es an einem warmen Orte der Krystallisation, wobei man ein Verwittern der Krystalle zu vermeiden hat.

Farblose, prismatische Krystalle, leicht in Wasser, auch in verdünntem Weingeist löslich. Vorsichtig aufzubewahren.

Therapeutisch ist es zu 0,03–0,1 g drei- bis fünfmal täglich in Lösungen wie das entsprechende Calciumsalz verwendet worden. Höchstgaben *pro dosi* 0,15 g, *pro die* 1,5 g.

IX † Baryum iodatum Baryumiodid. Jodbaryum. Jodide de Baryum. Jodide of Baryta. BaJ_2 . Mol Gew = 391.

Zu 30 Th Baryumsulfid, die in 120 Th lauwarmem destillirtem Wasser vertheilt sind, fugt man allmählich in kleinen Antheilen soviel (circa 35 Th) zerriebenes Jod hinzu, als von diesem in Lösung geht. Man setzt nun allmählich 27 Th Baryumkarbonat hinzu und erwärmt unter Umrühren im Wasserbade bis zur Austreibung der Kohlensäure. Färbt sich die Flüssigkeit gelb, so entfärbt man sie durch Zufügung kleiner Mengen von Baryumsulfid. Man lässt in geschlossener Flasche absetzen, filtrirt schnell und dampft im Vacuum zur Trockne. Ausbeute 53 Th.

Kleine Mengen kann man zweckmässig auch durch Auflösen von reinem Baryumkarbonat in Jodwasserstoffsäure darstellen. 10 Th Baryumkarbonat erfordern 130 Th Jodwasserstoffsäure von 10 Proc JH.

Frisch dargestellt ein farbloses, in der Regel aber ein gelblich-weisses, hygroskopisches Salzpulver. Leicht löslich in Wasser, auch in verdünntem Weingeist, von ekelhaftem Geschmack. An der Luft und durch die Einwirkung des Lichtes wird es unter Abscheidung von Jod zersetzt.

Früher in Gaben von 0,005–0,01 dreimal täglich innerlich bei Scrophulosis angewendet. Aeusserlich in Salben von 0,2–0,5 auf 25,0 Fett ebenfalls bei Scrophulosis. Höchstgaben *pro dosi* 0,015, *pro die* 0,05 g.

X † Baryum nitricum (Erganzb.) Baryumnitrat Barytnitrat Salpetersaurer Baryt Azotate de Baryte. Nitrate of Baryta. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. Mol Gew. = 261. Das technische Salz wird durch Einwirkung von Salpetersäure auf einen Ueberschuss von Witherit dargestellt.

Kleinere Mengen des reinen Baryumnitrates erhält man durch Auflösen von 100 Th. reinem Baryumkarbonat in 256 Th Salpetersäure (von 25 Proc.), Verdünnen mit 750 Th. Wasser und Eindampfen der Lösung zur Krystallisation.

Farblose, harte, oktaedrische Krystalle, an der Luft unveränderlich, löslich in 12,5 Th Wasser von 15° C, oder in 2,8 Th siedendem Wasser, unlöslich in Alkohol. Verpufft auf glühender Kohle mit blassgrüner Flamme. Geht beim starken Glühen in Baryumoxyd BaO über. Die wässrige Lösung sei neutral und werde durch Silbernitrat nicht verändert (Chlor). Die weitere Prüfung auf Reinheit geschehe wie unter Baryum chloratum angegeben. Vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung als Reagens in der chemischen Analyse und in der Feuerwerkerei zu grünen Flammensätzen.

Beim Zusammenreiben bez. Zusammenschmelzen dieses Salzes mit leicht oxydirbaren bez. leicht entzündlichen Substanzen ist gleiche Vorsicht geboten wie beim Kali-Salpeter, bez. beim Kaliumchlorat.

Grüne Flammensätze. Feuerwerkssätze für grüne Flammen 1) Barytnitrat und Milchsücker, von jedem 10 Th, Kaliumchlorat 20 Th Jede Substanz wird fein gepulvert und die Mischung der beiden ersten mit dem Kaliumchlorat mit Hilfe einer Federfahne bewerkstelligt. Vergleiche wegen der dabei nothigen Vorsicht unter Kaliumchlorium — 2) Barytnitrat 20 Th, Kaliumchlorat 18 Th und gewaschenes Schwefelblumen 10 Th Die Mischung erfordert alle Vorsicht Sie geschieht wie sub 1 angegeben. Der Schwefel muss ein völlig trockenes Pulver sein, also in Form der gewaschenen Schwefelblumen genommen werden — 3) Barytnitrat 60 Th, Kaliumchlorat 10 Th, gepulverter Schellack 20 Th Mischung wie sub 1 — 4) Barytnitrat 80 Th, gewaschenes Schwefelblumen 6 Th, rohes Schwefelantimon 2 Th, Kohle 1 Th, Kaliumchlorat 40 Th Mischung wie sub 1 — 5) Barytnitrat 50 Th und Kaliumchlorat 25 Th Nachdem beide gemischt sind, wird ein Gemisch aus gewaschenen Schwefelblumen 10 Th, Holzkohle 1,25 Th zugefügt.

Enthaarungsmittel nach O. HELLMAN. Baryum sulfuratum technicum pulv 1,0 Calcium carbonicum praecipitatum 5,0 werden mit Wasser zu einem Brei angerührt.

XI † Baryum sulfurosum Baryumsulfid. Schwefligsaures Baryum. Schwefligsaurer Baryt. BaSO_2 . Mol Gew. = 217.

100 Th reines Baryumkarbonat werden mit 300 Th Wasser feingerieben. In die Mischung leitet man unter öfterem Umrühren Schwefligsauresgas bis zur Sättigung. Der weisse Bodensatz wird auf einem Filter gesammelt, und auf flachen Porcellantellern möglichst rasch bei 25–30° C getrocknet, hierauf sogleich in gut zu verschliessende Glasgefässe gebracht.

Weisses, krystallinisches, in Wasser schwer lösliches, in Weingeist unlösliches Pulver. Findet Verwendung in der Analyse, zur Darstellung des Baryumjodids und in der Papierfabrikation. Vorsichtig aufzubewahren.

XII Baryum sulfuricum Baryumsulfat. Schwefelsaurer Baryt. Sulfate de Baryum. Sulfate of Barium. BaSO_4 . Mol Gew. = 233. Diese Verbindung kommt im Handel in vier verschiedenen Formen vor.

1) *Spathum ponderosum*, Barytes, Baryta sulfurica nativa, Schwerspath, natürliches Barytsulfat, in schweren dichten, krystallinischen, weissen Massen oder in geschobenen viereckigen Tafeln oder geraden rhombischen Prismen in verschiedenartiger Gruppierung. Spec Gew 4,1–4,7. Der gemahlene Schwerspath dient als Material zur Darstellung verschiedener Barytsalze.

2) *Spathum ponderosum praeparatum*, Baryta sulfurica nativa praeparata, Schwerspathmehl, gemahlener Schwerspath, Barytin, auf besonderen Mühlen gemahlener Schwerspath, ein mehr oder weniger feines, sehr weisses Pulver. Trotz des niederen Kaufwerthes ist dasselbe mit Gipsmehl verfälscht angetroffen worden. Diese Verfälschung wird entdeckt, wenn man das Pulver mit dünner Ammoniumchloridlösung digerirt und das Filtrat mit Baryumchlorid auf Schwefelsäure prüft.

3) *Baryta sulfurica praecipitata (pura)*, präcipitirter Schwerspath, präcipitirtes Barytsulfat, Barytweiss, Permanentweiss, Blanc fixe wird theils als Nebenprodukt in chemischen Fabriken, theils aus Witherit und Schwefelsäure gewonnen. Das Barytweiss bildet entweder sehr weisse, leicht zerbrechliche und zerreibliche Stücke oder ein sehr weisses Pulver. Es wird zur Verdünnung der Farben, zum Anstreichen und vielen anderen technischen Zwecken gebraucht.

4) Präcipitirter Schwerspath in Teigform, Blanc fixe en pâte, also der noch feuchte Baryumsulfatniederschlag. Er findet eine gleiche technische Verwendung wie der vorstehend erwähnte. Er bietet den Vortheil, ohne Vorbereitung mit den wässrigen Farben sich mischen zu lassen.

Baryumsulfat gilt im allgemeinen wegen seiner Unlöslichkeit nicht für giftig. Wesentlich anders würde der dauernde Genuss von Baryumsulfat zu beurtheilen sein. Aus diesem Grunde wurde die Zumischung dieser Verbindung zu Mehl etc nicht bloss als Verfälschung zu betrachten, es wurde u. U. auch gesundheitsschädliche Wirkung des Genusses solcher Nahrungsmittel sehr wohl möglich sein.

Als Material zu weissen Anstrichen eignet er sich allein nicht, weil er zu wenig Deckkraft hat. Dagegen dient er als Zusatz- bez Verfälschungsmittel des Bleiweisses,

als Körper für Appreturen weisser baumwollener und leinener Zeuge, als Füllstoff für Papiermasse, als Zusatz für Feuerschutzstarke u dergl. m

Baryumsulfat ist fast unlöslich (1:400000) in Wasser, desgleichen in verdünnten Mineralsäuren und verdünnten Lösungen von Alkalikarbonaten. Etwas löslich in konz. Schwefelsäure, und in Lösungen der Acetate und Thiosulfate. Konzentrierte Lösungen der Carbonate des Kaliums und Natriums setzen sich mit Baryumsulfat erst in der Siedehitze und auch dann noch langsam um.

XIII † Baryum sulfuratum Baryumsulfid. Schwefelbaryum. Baryta sulfurata. BaS Mol. Gew. = 169 Das mit dem vorstehenden Namen bezeichnete Präparat ist ein technisches, ziemlich unreines Produkt.

Ein inniges Gemisch aus 100 Th gemahlenem Schwerspath, 17,5 Th Holzkohlenpulver und 25 Th gepulvertem Kolophon werden in einen geräumigen Tiegel eingetragen, der Tiegel mit einem Deckel versehen, dann bei allmählich und langsam gesteigerter Hitze bis zur hellen Rothgluth gebracht und darin $1\frac{1}{2}$ Stunde erhalten. Die erkaltete Masse wird zu einem Pulver zerrieben und alsbald in dicht verkorkten Glasflaschen aufbewahrt — Oder man macht aus 100 Th gemahlenem Schwerspath, 25 Th Holzkohlenpulver und 15 Th Roggenmehl mit Wasser einen derben Teig, formt aus diesem daumdicke, 8–10 cm lange Stäbe, trocknet dieselben völlig aus und brennt sie in einem Windofen in der Weise, dass sie auf einer 15 cm hohen Schicht Holzkohlen ruhen, von einigen kleinen Kohlen durchschichtet und von Kohlen umgeben und bedeckt sind.

Gelbliches oder rothliches, oder (infolge beigemischter Kohle) graues Pulver, specifisch schwer, in Wasser unter Uebergehen in Baryumhydroxyd und Baryumsulfhydrat löslich $2\text{BaS} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{Ba}(\text{SH})_2$. Beim Glühen an der Luft geht es in Baryumsulfat über, mit Sauerstoff entwickelt es Schwefelwasserstoff.

Dient zur Darstellung von Baryumhydroxyd, ferner zur Entwicklung arsenfreien Schwefelwasserstoffs und als Depilatorium.

XIV. † Baryum sulhydratum Baryumsulfhydrat. Schwefelwasserstoff-Schwefelbaryum. $\text{Ba}(\text{SH})_2$ Mol. Gew. = 203 Die wässrige Lösung wird erhalten durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in Barytwasser bis zur Sättigung.

Bologneser Leuchtstein. Bononischer Leuchtstein Wird durch Glühen einer innigen Mischung von 5 Th gefülltem Baryumsulfat mit 1 Th Holzkohle unter Luftabschluss erhalten. Besteht aus einem Gemenge von Baryumsulfid mit Baryumsulfat und hat die Eigenschaft, nach Belichtung durch die Sonne oder Magnesiumlicht im Dunkeln zu leuchten.

Bebeerinum.¹⁾

Bebeerin. Bebirin. Bibirin. Pelosin (Buxin). $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_3$ Mol. Gew. = 299. Aus der Rinde des Bebeerbaumes [*Nectandra Rodiae* Schomb ?], wurde ein als Bebeerin (Behirin, Bibirin, Nectandrin) bezeichnetes Alkaloid $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_3$ isolirt, welches nach M. SCHOLTZ identisch ist mit dem aus der amerikanischen Gries- oder Pareurawurzel, von *Chondodendron tomentosum* R. et P. [*Botryopsis platyphylla* Miels], von WIGGERS abgeschiedenen Pelosin. Ob das Bebeerin ausserdem noch identisch ist mit dem aus *Buxus sempervirens* L. abgeschiedenen Buxin, erscheint nach M. SCHOLTZ unwahrscheinlich.

Darstellung. Die Bebeeru-Rinde wird mit schwefelsaurehaltigem Wasser ausgekocht. Aus den durch Eindampfen auf dem Wasserbade concentrirten Auszügen fällt Ammoniak ein Gemisch von Basen. Der Niederschlag wird in verdünnter Schwefelsäure gelöst, die Lösung mit Thierkohle behandelt und wiederum mit Ammoniak gefällt. Dem

¹⁾ Nicht zu verwechseln mit Berberin!

trockenen Basengemisch entzieht alsdann Aether das Bebeerin, während eine zweite Base (Sipirin) ungelöst zurückbleibt

Es muss indessen darauf aufmerksam gemacht werden, dass die gegenwärtig als Bebeerin im Handel befindlichen Präparate noch sehr unrein sind, da es überhaupt erst seit etwa $\frac{1}{2}$ Jahr bekannt ist, auf welchem Wege die Reindarstellung gelingt (SCHOLTZ, Archiv Pharm 1898 580)

Eigenschaften des Handelspräparates Amorphes braunes Pulver, leicht löslich in Aethylalkohol, Chloroform, Aceton, Benzol, Schwefelkohlenstoff, etwas schwieriger in Aether, von bitterem Geschmack Löslich auch in Natronlauge, ferner in 6000 Th kaltem oder 1800 Th siedendem Wasser Vereinigt sich mit Säuren zu amorphen Salzen (s aber unter Bebeerinum purum)

Anwendung Medicinisch wird nicht die freie Base, es werden vielmehr ihre Salze, insbesondere das schwefelsaure Salz und zwar als Ersatz des Chinins, als Tonicum und Febrifugum angewendet

Bebeerinum hydrochloricum, das Präparat des Handels Bebeerinchlorhydrat, salzsaures Bebeerin Man neutralisirt das Bebeerin mit verdünnter Salzsäure, bringt diese Lösung durch Eindunsten bei 60° C zum Sirup und streicht diesen auf Glasplatten Man trocknet bei 60—80° C und stößt alsdann das trockene Präparat in Lamellenform ab

Bräunliche, durchscheinende Lamellen oder ein bräunliches, etwas hygroskopisches Pulver, leicht löslich in Wasser und in Weingeist

Bebeerinum sulfuricum Bebeerinsulfat Schwefelsaures Bebeerin Das Präparat des Handels $[C_{18}H_{21}NO_4]_2 H_2SO_4$ (?) Zur Darstellung löst man 10 Th Bebeerin des Handels in 80 Th Weingeist, neutralisirt diese Lösung mit verdünnter Schwefelsäure (ca 9,5 Th), dunstet sie im Wasserbade zum Sirup ein und bringt diesen durch Aufstreichen auf Glasplatten in Lamellenform Braune, durchscheinende Lamellen oder ein bräunliches Pulver, leicht löslich in Wasser und in Weingeist

Angewendet wird namentlich das schwefelsaure Salz als Ersatz des Chinins und zwar als bitteres Tonicum zu 0,05—0,1—0,2 g mehrmals, als Febrifugum zu 0,2—0,5—1,0 g mehrmals täglich Antitypische Eigenschaften besitzt das Bebeerin nicht

Bebeerinum purum Ist in zwei Formen und zwar im amorphen und krystallisierten Zustande bekannt

1) **Amorphes** Wird dem kauflichen Bebeerin durch Extraktion mit Aether entzogen Ferner hinterbleibt es als Rückstand, wenn man die Lösung des krystallisierten Bebeerins in Aceton oder Chloroform verdunsten lässt Farbloses, amorphes Pulver, Schmelzp 180° C Löst man das amorphe Bebeerin in Methylalkohol, so scheidet es sich wieder als krystallisiertes Bebeerin (Schmelzp 214° C) ab

2) **Krystallisiertes** Löst man amorphes Bebeerin in Methylalkohol, so krystallisiert es sehr rasch aus Man wascht die Krystalle mit Methylalkohol nach und trocknet sie bei 100° C Glasglänzende, farblose Prismen, Schmelzp 214° C Schwer löslich in Methylalkohol und Aethylalkohol Leicht löslich in Aceton oder Chloroform Beim Verdunsten dieser Lösungen hinterbleibt es in der amorphen Form vom Schmelzp 180° C

Durch Neutralisation des krystallisierten Bebeerins mit verdünnter Salzsäure hat M SCHOLTZ ein krystallisiertes salzsaures Salz in kleinen, bei 259—260° C schmelzenden Nadeln erhalten

Therapeutisch werden bis auf weiteres lediglich die amorphen Handelspräparate zu verwenden sein, da sich die Angaben über Wirkung, Dosirung etc nur auf diese beziehen, die reine Base ausserdem zur Zeit noch gar nicht im Handel ist

Belladonna.

† **Atropa Belladonna L.** Familie der Solanaceae — Solanaceae. Tollkirsche, Tollkraut, Tollwurz, Schlafbeere, Wolfsbeere, Teufelsbeere, Waldnachtschatten, Giftkriesel — Belladone, Morelle furieuse. — Dwale, Deadly Nightshade Heimisch durch Mittel- und Südeuropa bis Vorderasien (Persien) Zum arzneilichen Gebrauch viel-

2 kultivirt

Verwendung finden:

† 1) Die Blätter. *Folia Belladonnae* (Germ. Hely. Austr. Brit. U-St.). *Herba Belladonnae*. *Herba Solani furiosi*. *Belladonnablätter*. *Tollkirschenblätter*. *Tollkraut*. *Feuilles de belladone ou de Morelle furieuse* (Gall.). *Belladonna Leaves*. *Dwale Leaves*.

Beschreibung. Sie sind bis 20 cm lang, bis 10 cm breit, spitz elliptisch, kahl oder unterseits besonders an den Nerven spärlich behaart, Blattstiel kürzer wie die Hälfte der Spreite, diese allmählich in ihn verlaufend. Die Sekundärnerven gehen vom Primärnerven unter einem Winkel von durchschnittlich 60° ab.

Oberseits bräunlich grün, zuweilen auf beiden Seiten weisse Pünktchen erkennen lassend. Geschmack widerlich, schwach bitter.

Die Haare bestehen aus Drüsenhaaren mit 2–6 zelligem Stiel und einzelligem Köpfchen und solchen mit kurzem Stiel und 6 in 2 Reihen angeordneten Kopfzellen, Gefäßbündel bikollateral, Spaltöffnungen auf beiden Seiten. Im Mesophyll Zellen mit Krystall-




Fig. 115. Tangentialschnitt durch die Unterseite des Blattes von *Atropa Belladonna*. K Zellen mit Krystalland. st Spaltöffnungen. fv Gefäßbündel. (Voelz.)

sand von Kalkoxalat, die angeblich auch fehlen können. Sie sind das am meisten charakteristische Gewebelement, daneben kommen auch die Drüsenhaare und die beiderseitigen Spaltöffnungen in Betracht. Für die Untersuchung genügt es meist, Stückchen der Blätter oder das Pulver in Chloralhydratlösung (8 Chloralh.:2H₂O) durchsichtig zu machen. (Fig. 115.)

Bestandtheile. 0,3–0,4 Proc. Alkaloide und zwar vorzugsweise Hyoscyamin neben wenig Atropin, als Malate, ferner Asparagin. Asche der bei 100° C. getrockneten Blätter 14,5 Proc.

Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes werden (nach KELLER) 25 g der gepulverten Blätter (Sieb 5 der Germ. und Hely.) in einer Arzneiflasche von 300 ccm Inhalt mit 100 g Aether und 25 g Chloroform gut durchgeschüttelt, 10 g Ammoniakflüssigkeit hinzugesetzt und während einer halben Stunde häufig umgeschüttelt. Dann setzt man 40–50 g Wasser hinzu und schüttelt von neuem um, wobei sich das Pulver zusammenballt, so dass man 100 g der Flüssigkeit ohne weiteres klar abgessen kann, oder sie, wenn trübe, durch einen Trichter mit Wattebüschchen gehen lässt. Die Flüssigkeit giebt man in einen Scheidetrichter und schüttelt so lange mit kleinen Mengen (25, 15, 10 etc.) 1 proc. Salzsäure aus, bis ein Tropfen der letzten Ausschüttelung mit MEYER'schem Reagens keine Trübung mehr giebt. Die wässrige Lösung wird von neuem in einen Scheidetrichter gegeben, mit Ammoniakflüssigkeit alkalisch gemacht und so lange mit Aetherchloroform (2 Aether, 3 Chloroform) ausgeschüttelt, bis einige Tropfen auf einem Uhrgläschen ver-

dunstet, mit 1 proc Salzsäure aufgenommen, mit MEYER'schem Reagens keine Trübung mehr geben. Die Flüssigkeit wird dann aus einem Erlenmeyerkölbchen abdestillirt, der Rückstand im Wasserbade bis zum konstanten Gewicht getrocknet und gewogen. Der Rückstand $\times 5 =$ Alkaloidgehalt.

Zur Titration löst man die Alkaloide in 5—10 cem saurefreiem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur beginnenden Trübung hinzu und titrirt unter Benutzung von Haematoxylin als Indikator mit $\frac{1}{10}$ N Salzsäure. 1 cem derselben = 0,0289 g Alkaloid.

Als *Verwechslung* werden die Blätter von *Solanum nigrum* L. genannt, sie sind kleiner, eiförmig oder fast dreieckig, gestielt und kurz in den Stiel verschmalert, ganzrandig oder buchtig gezahnt, viel kleiner. Sie enthalten Einzelkrystalle von Oxalat. Vergl. Bd II, S. 612.

Einsammlung, Aufbewahrung. Zur Blüthezeit von der wilden Pflanze (Germ. Helv. Austr. Brit.) gesammelt, bei Lichtabschluss und höchstens 30°C Wärme rasch getrocknet, in gut verschlossenen Gefässen vorsichtig und vor Licht geschützt (nach Austr. nicht über 1 Jahr) aufbewahrt. 6,5—7,5 Th. frische Blätter geben 1 Th. getrocknete. — Das Pulver bereitet man aus frischer, über Aetzkalk nachgetrockneter Waare (vgl. unter Tub. Aconiti). Verlust durch Eintrocknen und Verstauben 13—15 Proc.

Anwendung. finden die Blätter zu schmerzstillenden Breiumschlägen, als Rauchmittel, ev. in Opiumtinktur getränkt, in Cigarrettenform, zu Raucherungen, selten innerlich.

Grösste Einzelgabe nach Austr.	0,2 g	Germ.	0,2 g	Helvet.	0,1 g
Grösste Tagesgabe "	0,6 g	"	1,0 g	"	0,5 g

Der aus der ganzen frischen Pflanze gepresste Saft, aus dem Germ. das Extrakt bereiten lässt, hält sich mit $\frac{1}{2}$ Proc. Aether versetzt einige Zeit, sodass man ihn versenden kann.

† 2) Die Wurzel *Radix Belladonnae* (Helv. Austr. Brit. Ergb. USt.) *Radix Solani furiosi*. *Belladonnawurzel*. *Tollkirschenwurzel*. *Tollwurz*. *Racine de belladone* (Gall.) *Belladonna Root*.

Beschreibung. Meist der Länge nach gespaltene und dann nach aussen gebogene graue oder graubraune, wenig runzelige, im Innern weisse, mehligte, im Bruch ebene, stäubende Stücke. Bis 10 cm lang, 1—2 cm dick. Geschmack anfangs süsslich, dann bitter und etwas scharf. Auf dem Querschnitt beträgt die Rinde etwa $\frac{1}{8}$ des Durchmessers. Sie, sowie der Holzkörper, lassen mit Ausnahme der dem Cambium zunächst liegenden Parthien der letzteren radiale Streifung nicht erkennen. Im Parenchym der Rinde und des Holzes Zellen von Oxalatsand wie in den Blättern, ferner einfache und aus wenigen zu zusammengesetzten Stärkekörnern, die einen Durchmesser von 20 μ erreichen. Verholzte Elemente, wie Steinzellen und Bastfasern fehlen ausser den Gefässen und spärlichen Holzfasern. Zunächst dem Cambium zeigt das Holz breite Holz- und schmale Markstrahlen, weiter nach innen finden sich kleine Gefässgruppen, und das Centrum wird wieder von Holzgewebe eingenommen.

Bestandtheile. Hyoscyamin und Atropin wie in den Blättern etwa zu 0,6 bis 0,7 Proc. Im Juh, also von der blühenden Pflanze, gesammelte Wurzel, ebenso solche von wildwachsenden und nicht zu alten Pflanzen (2—4 Jahre alt) ist besonders alkaloidreich. Das Alkaloid hat seinen Sitz im Parenchym.

Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes verfährt man, wie oben bei den Blättern angegeben, doch verwendet man nur 12 g der gepulverten Wurzel, 90 g Aether und 30 g Chloroform, giebt 10 g Ammoniak und später 15 g Wasser hinzu, giesst 100 g der Flüssigkeit (= 10 g Wurzel) ab und verfährt wie oben angegeben. Natürlich ist die Menge der schliesslich gefundenen Alkaloide mit 10 zu multipliciren.

Verwechslungen. Als solche werden genannt die Wurzeln von *Inula*, *Lappa*, *Althaea*, *Malva*, sie entbehren sämtlich der Zellen mit Oxalatsand.

Einsammlung. Die Wurzel wird von der 2—3jährigen, wildwachsenden (Helvet.) Pflanze zur Blüthe- und Fruchtzeit (nach Brit. im Herbst) gesammelt, von verdorbenen Theilen befreit und ohne Schälung sorgfältig getrocknet. Austr. und Helvet. schreiben jährliche Erneuerung vor, 8 Th. frische Wurzel = 3 Th. trockene.

Aufbewahrung und Pulverung wie bei *Folia Belladonnae* 100 Th trockene Wurzel geben etwa 90 Th grobes und 80—85 Th feines Pulver

Grösste Einzelgabe nach Austr 0,07 g nach Helvet 0,1 g
 „ Tagesgabe „ „ 0,8 g „ „ 0,5 g

Anwendung wie bei den Blättern

Hinsichtlich der pharmaceutischen Zubereitungen aus der Tollkirsche herrscht in den Arzneibüchern grosse Verschiedenheit. Die Vorschriften liefern Erzeugnisse von sehr ungleicher Wirksamkeit (vergl Verzeichniss der Höchstgaben), und es ist deshalb bei Anfertigung ausländischer Verordnungen mit Extract oder Tinct Bellad Vorsicht geboten

† 3) Die Samen. *Semen Belladonnae etc Semences de belladone* (Gall)

Beschreibung. Die glänzend violettschwarzen, kirschgrossen, fadsusslich schmeckenden, zweifächerigen Beeren sind von dem bleibenden Kelch theilweise eingehüllt. Sie enthalten zahlreiche Samen. Diese sind 3 mm breit, nierenförmig, von den Seiten zusammengedrückt, graubraun, grubig punktiert. Der im reichlichen Nährgewebe liegende Embryo ist stielrund, gebogen.

Die Zellen der Epidermis der Samenschale sind an der Innenwand und den Seitenwänden stark verdickt, eine Form, die sich auch sonst bei den Solanaceen findet. Immerhin ist, wenn es sich um den botanischen Nachweis einer Vergiftung mit Belladonnafrüchten handelt, auf diese Zellen zu achten.

Bestandtheile und Anwendung wie bei der Wurzel und den Blättern

† *Extractum Belladonnae* Austr *Extr Belladonn foliorum* Tollkirschenblätter Extract. Dicker Extract, wie *Extr Aconiti radices* Austr zu bereiten. Ausbeute etwa 18 Proc. Diet empfiehlt, nach Verdunsten des Weingeistes das störende Chlorophyll abzufiltriren.

Brit 1) *Extr Belladonn liquidum*, *Liquid Extract of Belladonna*. Gepulverte Belladonnawurzel (Nr 20) wird mittelst einer Mischung von 7 Raumth 90 proc Alkohol und 1 Raumth Wasser im Verdampfungswege ausgezogen, mit dem Perkolat wird noch dreimal nach einander eine neue, gleiche Menge der Wurzel ebenso behandelt und der auf solche Weise angereicherte Auszug auf einen bestimmten Gehalt eingestellt. 100 com desselben enthalten 0,75 g Alkaloide.

2) *Extr Belladonnae alcoholicum* *Alcoholic Extract of Belladonna*. Wird aus vorgem durch Eindampfen mit einer vorher zu bestimmenden Menge Milchsücker auf $\frac{3}{4}$ seines Gewichts hergestellt. Enthält 1 Proc Alkaloide.

3) *Extr Belladonn viride* *Green Extract of Belladonna*, ist das aus dem frischen Saft der Blätter und Zweige durch Eindampfen gewonnene dicke Extract.

Germ *Extr Belladonnae* *Belladonnaextract*. Frisches, blühendes Belladonnakraut 20 Th besprengt man mit Wasser 1 Th, zerstösst, presst aus, wiederholt dasselbe mit Wasser 3 Th, erwärmt die gemischten Flüssigkeiten auf 80° C, seigt durch, dampft auf 2 Th ein, fügt Weingeist 2 Th hinzu, lässt 24 Stunden unter bisweiligem Schütteln stehen, seigt durch. Den Rückstand zieht man mit verdünntem Weingeist 1 Th unter Erwärmen aus, vereinigt die klar abgessene Flüssigkeit mit der übrigen, filtrirt und dampft zu einem dicken Extrakte ein. Dunkelbraun, in Wasser fast klar löslich. Ausbeute 2—3 Proc.

Gall 1) *Extractum Atropae belladonnae* *Extrait de Belladone* (avec le suc). Weiches Extract, wie *Extractum Belladonnae viride* zu bereiten.

2) *Extractum de radice Belladonnae* *Extrait de Belladone* (Raouie). Belladonnawurzel gr pulv 1000 g digerirt man 2 mal mit je 3000 g Weingeist (60 proc) einige Stunden, presst, filtrirt, destillirt den Weingeist ab, dampft ein, löst den Rückstand im 4fachen kalten Wassers, filtrirt und bringt durch Eindampfen zur Pillenkonsistenz.

Helv 1) *Extr Belladonn duplex a siccum* *Trockenes Belladonnaextract* — *Extrait de belladone sec* — Belladonnawurzel (V) 200 Th werden mit einer Mischung von Wasser und Weingeist $\frac{1}{2}$ im Perkulator erschöpft. Die ersten 170 Th werden für sich aufgefangen, der auf 80 Th verdampfte Rest darin gelöst. Aus diesen 200 Th stellt man, wie bei *Extr Aconiti dupl* angegeben, trockenes Extract 100 Th dar.

2) *Extr Belladonn fluidum* *Belladonna-Fluidextract* — *Extrait fluide de belladone* — Belladonnawurzel (V) 100 Th werden mit einer Mischung von Glycerin 10 Th, Wasser 15 Th, Weingeist 25 Th befeuchtet und durch Verdrängung mit einer Mischung von Weingeist und Wasser $\frac{1}{2}$ erschöpft. Die ersten 85 Th fängt man für sich auf und löst darin den auf 15 Th eingedampften Rest. Gesamtgewicht 100 Th.

U-St 1) *Extr Belladonn foliorum alcoholicum* *Alcoholic Extract of Belladonna Leaves* — Belladonnablätterpulver (Nr 60) werden mit einer Mischung

von Alkohol 2 Raumth und Wasser 1 Raumth. durch Verdrängung erschöpft, der Auszug bei 50° C zur Pellenkonsistenz eingedampft

2) *Extractum Belladonnae radiceis fluidum* Fluid Extract of Belladonna Root Aus Belladonnawurzepulver (Nr 60) 1000 Th werden mittelst einer Mischung von Alkohol (91 proc) 800 ccm und Wasser 200 ccm durch Verdrängung (s Extr Aconiti fluid) 1000 ccm Extrakt hergestellt

Extractum Belladonnae siccum Austr und Germ werden wie Extr Aconiti siccum (S 155) dargestellt

Extractum Belladonnae solidum Diet, Belladonna-Dauereextrakt, bereitet man wie Extr Uvae Ursi solidum (S 363)

		Höchste Einzelgabe	Höchste Tagesgabe
Extr Bellad	folior Austr	0,05 g	0,2 g
"	alcohol Brit	0,015—0,06 g	
"	vinde "	0,015—0,06 "	
"	Germ	0,05 g	0,2 g
"	dupl Helvet	0,025 "	0,075 "
"	fluid.	0,05 "	0,15 "

Aufbewahrung. Vorsicht

† *Tinctura Belladonnae* (Brit, Helvet), *Tinct Belladonn foliorum* (Austr, U-St), *Tinct Belladonn ex Herba recente* (Ergänzb) — Tollkirschenblätter-tinktur, Tollkraut-tinktur — *Teinture de belladone* — *Tincture of Belladonna Leaves*

Austr Aus gepulverten Blättern wie Tinct Aconiti Austr zu bereiten (S 155)

Brit Belladonnafluidextrakt 60 ccm, Alkohol (60 proc) q s zu 900 ccm Nach dem Absetzen zu filtrieren

Ergänzb Frisches, zerquetschtes Belladonnakraut 5 Th, Weingeist 6 Th

Gall 1) *Teinture ou Alcoolé de feuille de Belladone* Grobgepulverte Blätter 100 Th, Alkohol (60 proc) 500 Th

2) *Alcoolate de feuille de Belladone* Frische Belladonnablätter, Alkohol (90 proc) je 1000 g Nach 10 Tagen auspressen und filtrieren — Auf gleiche Weise aus frischer Wurzel die *Alcoolate de racine de Belladone*

Helvet Aus Belladonnakraut (V) 10 Th und verdünntem Weingeist q s werden durch Verdrängung 100 Th Tinktur hergestellt Klar, braunlich-grün, mit 5 Th Wasser opalisierend

U-St Wie Helvet, doch im Verhältniss von 150 g Blätter zu 1000 ccm Tinktur zu bereiten

	Austr	Brit.	Ergänzb	Helvet
Grösste Einzelgabe	1,0 g	0,8—0,9 g	1,0 g	0,5 g
" Tagesgabe	4,0 "		8,0 "	2,5 "

Aufbewahrung. Vorsicht, vor Licht geschützt

Belladonnatinktur ist ein Hauptmittel der Homöopathie bei Fieber und entzündlichen Leiden aller Art, bei Rose, Zahnweh, u dergl Ueber die Abgabe s unter Aconitum S 156

Unguentum Belladonnae. Belladonnasalbe — *Pommade belladonée*

— Belladonna Ointment — Brit Flüssiges Belladonnaextrakt 40 ccm werden auf 5 g eingedampft und mit Benzoesfett 45 g gemischt — Ergänzb Aus Belladonnaextrakt 1 Th und Wachsalbe 9 Th zur Abgabe frisch zu bereiten — Gall Belladonnaextrakt 4 Th, Wasser 2 Th, Schweinefett 24 Th — Helvet Belladonna-Fluidextrakt 2 Th, Benzoinirtes Schweinefett 8 Th (Dieses Verhältniss gilt für alle Unguenta narcotica — Narkotischen Salben — *Pommades calmantes*) — U St Alkohol Belladonnaextrakt 10 g werden mit verdünntem Weingeist 5 ccm verrieben, dann benzoinirtes Schweinefett 85 g zugemischt

Cigarettes de Belladone (Gall) sollen je 1 g Belladonnablätter enthalten

† *Succus Belladonnae.* Brit Juice of Belladonna Der aus frischen Blättern und Zweigen ausgepresste Saft wird auf 8 Raumth mit 1 Raumth Alkohol (90 proc) vermischt, nach 7tägigem Absetzen filtrirt Einzelgabe 0,8—1,0 g

Suppositoria Belladonnae. Belladonna-Stuhlzäpfchen — Belladonna Suppositories

1) Brit Aus alkohol Belladonnaextrakt 1,2 g und Kakaobutter q s (12 g) formt man 12 Stuhlzäpfchen, ein jedes enthält 0,001 g Belladonna-Alkaloide

2) Diet Glyceringelatine 85 g schmilzt man, setzt Belladonnaextrakt 0,5 in 10 Tropfen Wasser gelöst zu und gießt 10 Zäpfchen aus

8) Münch Nosokom-Vorschr Belladonnaextrakt 0,01 Kakaobutter 2,0 zu 1 Stuhl zäpfchen

Taffetas narcotisatum. *Sparadrap narcoticum* Bereitet man wie Empl Anghicum und bestreicht je 1000 □mm mit folgender Lösung Hausenblase 7 g, Belladonnaextrakt, Bilsenkrautextrakt, Schierlingextrakt je 2,5 g, Wasser 75 g, Weingeist 10 g

Antasthmatische Pappe ist eine Pappe, die mit dem gesättigten Aufguss einer Asthma Kräutermischung getränkt wurde

Asthma remedy LANGE'S ist Belladonnapulver mit 10 Proc Salpeter

Asthmacigaretten von GRIMMALT & Co bestehen im wesentlichen aus Belladonna blättern

Asthmatic and Fumigating pastilles von SAMUEL KIDDER sind Raucherkerzen aus Belladonna, Stechapfel, Salpeter, Kohle und Gewürzen, neuerdings (von DANIEL WHITE & Co) aus Salpeter, Scammoniumharz, Gummi und Kohle

DOBREINE'S Salbe gegen Nervenschmerz besteht aus Belladonnaextrakt, Opiumextrakt und Fett

Heilpflaster, RICHARD'S, soll aus Belladonna, Pech und Kautschuk bestehen

KLEWEIN'S Abführpillen, Sagraeaeextrakt, Rhabarberextrakt, Podophyllin, Belladonnaextrakt 50 überzuckerte und versilberte Pillen

Poudre antiasthmique von Dr CLEBY ist eine Mischung aus Belladonna, Salbei und Salpeter

Sedative Pills, GUNTHERS, enthalten Belladonnaextrakt, Asa foetida, Baldrianextrakt, Zinkoxyd, Castoreum

† Acetum Belladonnae

Rp	Foliorum Belladonnae conc	
	Spiritus (90%)	aa 10,0
	Aceti (6%)	90,0

Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren

Cataplasma antarthriticum TROUSSEAU

Rp	Micas Paris	150,0
	Aquae fervidae	50,0
	Extracti Belladonnae	2,0
	Extracti Opii	1,0
	Camphorae	2,0
	Spiritus camphorati	15,0
	Spiritus q s ut fiat puls	

Cigarettae pectorales ESCH

Rp	Foliorum Belladonnae conc	80,0
	Foliorum Stramoni conc	
	Herbae Hyoscyami conc	aa 15,0
	Fructus Phellandrii grosse pulv	5,0

Werden befeuchtet mit einer Lösung
Extracti Opii 1,5
Aquae Lauro-Cerasi q s
und getrocknet. Die Hülse fertigt man aus Fließpapier, welches mit einem Aufguss obiger Mischung getränkt und wieder getrocknet wird. Bei Athemenot täglich 2—4 Stück zu rauchen

Collemplastrum Belladonnae

Belladonna-Kautschukpflaster Diet

Rp	Masseae Collemplastri	800,0
	Foliorum Belladonnae pulv	70,0
	Sandarae	20,0
	Acidi salicylici	6,0
	Olei Resinae	30,0
	Aetheris	130,0

Vergl Collemplastrum Arnicae S 88a

Emplastrum Belladonnae

Belladonna-Pflaster Emplâtre de belladone

1 DIETERICI

Rp	1 Foliorum Belladonnae pulv	25,0
	2 Spiritus (90%)	12,5
	3 Spiritus Dzondli	gtt X
	4 Cerae flavae	50,0
	5 Olei Olivarium	
	6 Terebinthinae	aa 12,5

Man befeuchtet 1 mit 2 und 3, lässt einen Tag stehen, erhitzt 1—3 im Wasserbade 2 Stunden mit 4—6 und rollt halberkalt in Stangen aus

II Ergänzungsbuch

Rp	Cerae flavae	4,0
	Terebinthinae	
	Olei Olivarium	aa 1,0
	Foliorum Belladonnae pulv	2,0

III Britannica

Rp	1 Extracti Belladonnae liq	100 cem
	2 Emplastri resinae	125,0

1 wird im Wasserbade auf 25,0 eingedampft, dann mit 2 durchgearbeitet

IV Helvetica

Rp	1 Extracti Belladonnae fluidi	30,0
	2 Emplastri Plcis	70,0
	3 Elemi	15,0
	4 Olei Olivarium	5,0

1 wird auf 10 Th eingedampft und mit 2—4 zum Pflaster durchgearbeitet

V United-States

Rp	Emplastri Resinae	
	Emplastri Saponis	aa 4,0
	Extracti Belladonnae spirituosae	2,0

VI Gallica

Rp	Extracti seminis Bellad	90,0
	Elemi	10,0
	Emplastri Diachyl gummat	20,0

Emplastrum narcoticum Diet

Rp	Emplastri Belladonnae	
	Emplastri Conii	
	Emplastri Hyoscyami	aa

Sämtliche Pflaster werden mit Olivenöl ausgerollt
I und II (Diet Ergänzb) werden über Aetzkalk aufbewahrt weil sie sonst schimmeln

Glyceritum Belladonnae

Glycér d extract de Belladone (Gall)

Rp	Extracti Belladonnae	2,0
	Glycerini	gtt X
	Unguenti Glycerini	13,0

Injectio narcotica TROUSSEAU

Rp	Foliorum Belladonnae	
	Foliorum Stramoni	aa 20,0
	infunde ad colaturam	1000,0
	Tincturae Opii crocatae	2,5

Lanollimentum Belladonnae Diet

Rp	Extracti Belladonnae	10,0
	Glycerini	5,0
	Unguenti cerei	20,0
	Lanolini	65,0

Linimentum Belladonnae

I Liniment of Belladonna (Brit)

Rp	Camphorae	25,0
	Spiritus (90%)	150,0 cem
	Extracti Belladonnae fluidi	250
	Aquae destillatae	50 "
	Spiritus (90%) q s ad	500 "

II United-States

Rp	Camphorae	50,0
	Extracti Belladonnae fluidi q s ad	1000,0 cem

Liquor Belladonnae cyanicus HUFFLAND

Rp Extracti Belladonnae 0,35
Aqua Lauro Cerasi 15,0

I Oleum Belladonnae

Rp 1 Foliorum Belladonnae pulv 100,0
2 Spiritus (90%) 75,0
3 Liquoris Ammonii caustici 2,0
4 Olei Olivarum 600,0
5 Olei Olivarum 400,0

Man mischt 1—3 und lässt 24 Stunden bedeckt stehen. Dann erwärmt man 1—3 mit 4 im Wasserbade 12 Stunden bei 60—70° C, presst ab, erwärmt den Rückstand nochmals mit 5, presst ab, lässt absetzen und filtriert (Dick).

II Huile de Belladone (Gall.)

Rp Foliorum Belladonnae recent 100,0
Olei Olivarum 200,0

Man kocht, bis alle Feuchtigkeit verdampft ist, presst und filtriert.

Pilulae antipneuralgicae HARVEY LINDSEY

Rp Extracti Belladonnae 1,0
Ferri oxydati 1,0
Chinini sulfurici aa 2,0
Radices Althaeae 0,5

fiant pilulae 40

Pilulae catharticae GOUTAKET

Rp Extracti Belladonnae
Extracti Rhei aa 1,0
Rizom Rhei 2,0

fiant pilulae 40 Abends 1—2 Stück

Pilulae catharticae DICKSON

Rp Extracti Belladonnae 1,0
Rizom Rhei
Extracti Aloes aa 2,0
Spiritus saponati q s

fiant pilulae 40

Pilulae lenientes RICORD

Rp Extracti Belladonnae 0,3
Extracti Valerianae 4,0
Radices Althaeae q s

fiant pilulae 80

Potio contra tussim convulsivam JEANNEL,

Kauchlaster-Trank
Rp Aquae Lauro Cerasi 10,0
Sirupi Belladonnae 80,0
Aquae Tiliae 110,0

Zusätzlich einen Kinderlöffel

Pulvis antasthmaticus fumalis CREVOISIER

Rp Foliorum Belladonnae
Foliorum Digitalis
Foliorum Stramonii
Foliorum Salviae
Kali nitrici aa

Die grob gepulverten Kräuter werden mit dem etwas angefeuchteten Salpeter gemischt. $\frac{1}{2}$ Theelöffel voll wird angezündet und mit einem oben offenen Papierkegel bedeckt und der Dampf bei Athemnoth eingeathmet.

Pulvis antasthmaticus fumalis GRÉNY

Rp 1 Opi pulverati 8,0
2 Foliorum Belladonnae
3 Foliorum Stramonii aa 45,0
4 Kali nitrici 7,0
5 Aquae destillatae 20,0

Die Mischung von 1—3 wird mit der Lösung von 4 in 5 befeuchtet, getrocknet und gemischt. Man streut das Pulver auf eine heiße Ofenschwefel und athmet die Dämpfe ein.

Pulvis antiprospalgius STEINBÜCK

Rp Radices Belladonnae 1,0
Ferri oxydati 2,0
Elaeosacchari Calami 10,0

Divide in partes X

Pulvis Belladonnae ad clysmata VOGT

Rp Foliorum Belladonnae 1,0
Tuborum Salep 1,2

Tales doses IV

Pulvis contra Emuresin nocturnam infantum

LAVAR

Rp Extracti Belladonnae
Semina Strychni aa 0,1
Ferri oxydati 1,0
Sacchari 2,5

divide in partes X Taglich 1 Pulver

Pulvis antiphlogisticus STONER

Rp Calomelanos 0,1
Magnesiae ustae
Radices Belladonnae aa 0,5
Sacchari 2,0

Divide in partes X

I Sirupus Belladonnae

Rp Extracti Belladonnae 0,2
Sirupi Sacchari 100,0

II Sirop de Belladone (Gall.)

Rp Tincturae Belladonnae 75,0
Sirupi Sacchari 925,0

Species antiasthmaticae (Bad Taste)

Rp 1 Foliorum Stramonii conc 100,0
2 Foliorum Belladonnae conc
3 Herbae Hyoscyami conc aa 25,0
4 Spiritus (90%) 50,0
5 Kali nitrici 50,0
6 Kali carbonici 0,35
7 Aquae destillatae 800,0

Man befeuchtet die Mischung von 1—3 mit 4, lässt 24 Stunden bedeckt stehen, trinkt mit Lösung von 5—6 in 7, lässt 24 Stunden stehen und trocknet vorsichtig.

I Species narcoticae (Hamb Vorsch.)

Rp Foliorum Belladonnae
Herbae Hyoscyami
Herbae Conii
Florum Chamomillae aa

würden als grobe Pulver gemischt

II Espèces narcotiques (Gall.)

Rp Foliorum Belladonnae
Herbae Conii
Foliorum Hyoscyami
Foliorum Solani nigri
Foliorum Nicotianae
Foliorum Papaveris aa

Tinctura Belladonnae acida

Rp Foliorum Belladonnae 100,0
Spiritus diluti (68%) 1000,0
Acidi sulfurici concentrati 5,0

† Tinctura Belladonnae aetherea

Tincture éthérée ou Éthérolé de Belladone (Gall.)

Rp Foliorum Belladonnae pulv 100 g
Aetheris (p spec 0,758) q s

Im Verdrängungswege bereitet man Tinktur 500 g

Unguentum ophthalmicum SCHMEL

Rp Extracti Belladonnae 8,0
Unguentum Hydrargyri cinerei 10,0

Vet Electuarium expectorans et calmans (Gall.)

Rp Extracti Belladonnae 4,0
Kermes mineralis 8,0
Radices Liquiritiae, Mellis aa q s
M i electuarium

Vet Husten Latwerge für Pferde

Rp Extracti Belladonnae 20,0
Mellis
Glycerini
Kali chlorid aa 100

Benzaldehydum.

Benzaldehydum Benzaldehyd Künstliches Bittermandelöl Oleum Amygdalarum aetherum artificiale. C_6H_5CHO . Mol. Gew. = 106

Benzaldehyd, C_6H_5COH wird künstlich durch Oxydation von Benzylchlorid, $C_6H_5CH_2Cl$ mit Bleinitrat, oder durch Erhitzen von Benzylidenchlorid, $C_6H_5CHCl_2$ mit Wasser auf 150—160° C dargestellt.

Benzaldehyd ist eine farblose, stark lichtbrechende, bei 179° C siedende, nach gekauten Mandeln riechende Flüssigkeit vom spec Gewicht 1,053 bei 15° C Benzaldehyd ist im Gegensatz zum blausaurehaltigen Bittermandelöl nicht giftig Von seiner Darstellung her enthält der technisch reine Benzaldehyd stets mehr oder weniger grosse Mengen von chlorhaltigen Körpern, und zwar finden sich sowohl Chloride wie Benzylchlorid, als auch gechlorte Substitutionsprodukte, z B C_6H_4ClCOH Wegen dieser übelriechenden Verunreinigungen ist der technische Benzaldehyd für feinere Parfumerien und zur Liqueurfabrikation unbrauchbar vergl S 283

Es kommt neuerdings auch chlorfreier künstlicher Benzaldehyd in den Handel

Benzaldehyd ist nicht zu verwechseln mit Nitrobenzol oder Mirbandl, das früher auch als künstliches Bittermandelöl bezeichnet wurde

Benzaldehyd geht noch leichter als das blausaurehaltige Bittermandelöl durch den Luftsauerstoff in Benzoesäure über Ein Zusatz von 10 Proc Spiritus wirkt konservierend Verwendet wird der künstliche Benzaldehyd zur Parfümierung von gewöhnlichen Mandelseifen

Benzinum.

Unter „Benzin“ schlechthin sind lediglich Destillate aus Petroleum (s dieses) zu verstehen, deren Eigenschaften (Spec Gewicht, Siedetemperatur) in ziemlich weiten Grenzen schwanken können Soll es Destillate anderer Rohmaterialien darstellen, so ist dies durch einen besonderen Namenszusatz zum Ausdruck zu bringen, z B Braunkohlen-Benzin Ausserdem ist zu beachten, dass Benzin bisweilen mit Benzol verwechselt wird Z B ist unter „Benzine“ in französischen Abhandlungen fast durchweg Benzol zu verstehen

Man beachte, dass alle Benzine Gemische verschiedener Kohlenwasserstoffe sind, deshalb keinen scharfen Siedepunkt haben, sondern innerhalb ziemlich weiter Grenzen überdestilliren

I Benzin, technisches BRÖNNER'sches Fleckwasser Die bei 60—110° C übergehenden Antheile des amerikanischen Petroleums Besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen der Methanreihe C_5H_{14} bis C_8H_{18}

Farblose, klare, nicht fluorescirende Flüssigkeit, von starkem, nicht unangenehmem Geruch, leicht flüchtig und sehr leicht entzündlich Spec Gewicht etwa 0,680 — 0,700 Gutes Lösungsmittel für Fette, Oele und Harze, nicht aber für Asphalt und Schwarzpech (welche von Chloroform leicht gelöst werden)

Diese Sorte wird besonders als Fleckwasser im Handverkauf abgegeben Man prüft sie, indem man etwa 10 cm auf Fliesspapier freiwillig abdunsten lässt und nun beobachtet, ob ein farbiger Rand auf dem Papier entstanden ist und ob ein unangenehmer Geruch wahrzunehmen ist Es empfiehlt sich, auch für den Handverkauf Sorten anzuschaffen, welche ohne farbige Ränder und ohne einen übeln Geruch zu hinterlassen auf Filtrirpapier verdunsten

II Benzinum medicinale Benzinum Petrolei (Germ) Aether Petrolei (Helv) Benzinum (U-St) Destillationsprodukt aus dem amerikanischen Petroleum Germ Spec Gew 0,64—0,67, Siedep 55—75° C, Helv Spec Gew 0,66—0,70, Siedep 50—60° C, U-St Spec Gew 0,67—0,675, Siedep 50—60° C Dieses Produkt wird von den Pharma-

köpfen sowie im Handel bald als „Petroleumather“ bald als „Petroleumbenzin“ bezeichnet. Klare, farblose, eigenartig aber nicht unangenehm riechende Flüssigkeit, im ganzen von den Eigenschaften des obigen, aber wesentlich reiner. Es erstarrt in der Kälte nicht (Unterschied vom Benzol). Unlöslich in Wasser, löslich in etwa 2 Vol Alkohol von 95 Proc., leicht löslich in Aether, Chloroform, Benzol, mischbar mit Fetten bez. fetten Oelen (ausgenommen Ricinusöl) und mit vielen ätherischen Oelen. Sehr leicht entzündlich, die Dämpfe gehen, mit Luft gemischt, explosive Gemenge.

Prüfung 1) Es hinterlasse beim Verdunsten und nachherigen Erwärmen auf dem Wasserbade nur Spuren eines nicht flüchtigen Rückstandes und verbreite in keinem Stadium des Verdunstens unangenehmen Geruch. Hierzu ist indessen zu bemerken, dass die niedrig siedenden Petroleumdestillate sich im Verlaufe der Aufbewahrung zum Theil oxydiren, so dass in ihnen allmählich höher siedende Substanzen entstehen. 2) Mischt man 1 Th. cone. Schwefelsäure mit 4 Th. rauchender Salpetersäure und schüttelt nach der Abkühlung mit 2 Th. Benzin, so darf kein deutlicher Geruch nach Bittermandelöl (Nitrobenzol) auftreten und die Mischung sich nicht stark dunkel färben (Benzol). 3) Mischt man 1 cem Benzin mit 5 cem ammoniakalischer Silbernitratlösung und erwärmt kurze Zeit, so darf sich die Silberlösung nicht braun färben (Schwefelverbindungen, meist aus Braunkohlenbenzin stammend).

III Benzinum e ligno fossilo. Braunkohlenbenzin. Lignitbenzin. Benzoin. Ligroin. Photogen. Ist das bei 50–110° C gesammelte Destillat bei der trockenen Destillation der Braunkohlen, bez. des Braunkohlentheers. Farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit von unangenehmem, an Rettig und Zwiebeln erinnerndem Geruch. Spec. Gew. = 0,770–0,800. Dieses Produkt besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen nicht näher bekannter Zusammensetzung, enthält aber auch Sauerstoff und schwefelhaltige Körper, welche den unangenehmen Geruch veranlassen und mit ammoniakalischer Silbernitratlösung nachgewiesen werden können. Beim Mischen mit cone. Schwefelsäure tritt starke Erhitzung ein. — Es wird in den Paraffin-Fabriken zum Umkrystallisiren des Paraffins verwendet und dient gelegentlich als Fleckwasser und zur Vermischung mit Petroleumbenzin.

Aufbewahrung und Handhabung. Die Aufbewahrung ist besonders aus dem Gesichtspunkte der Feuergefährlichkeit zu besprechen.

In der Officin hält man zweckmässig mehrere Vorrathsflaschen, welche man nicht in den oberen Theilen der Regale, sondern mehr nach dem Boden zu, in möglichster Entfernung von Licht- und Wärmequellen aufstellt. Grössere Vorräthe werden im Keller, am besten in einem feuersicheren Räume aufbewahrt. Das Abfüllen von Benzin geschehe stets mittelst Trichters, thunlichst bei Tageslicht. Ist das Abfüllen bei künstlichem Licht nicht zu vermeiden, so benutze man eine Davy'sche Sicherheitslampe¹⁾ und beobachte trotzdem alle nöthigen Vorsichtsmaassregeln. Sind kleine Mengen Benzin in Brand gerathen, so kann man das Feuer durch Aufschütten von Sand ersticken. Grössere Benzinbrände können nur im regelrechten Löschverfahren bewältigt werden. Erscheint in solchen Fällen die Feuerwehr, so ist derselben sofort Kenntniss zu geben, welche Mengen Benzin in Brand gerathen sind, und wo etwa noch nicht entzündete Vorräthe von Benzin oder anderen leicht entzündlichen Materialien lagern. Etwaige Verschwendung oder falsche Auskunft kann traurige Folgen haben. (†)

Anwendung. Aeusserlich wirkt es reizend auf die Haut, wird daher zu ableitenden Einreibungen gegen Rheumatismus verwendet. In Dampfform eingeathmet erzeugt es rauschartigen Zustand, Bewusstlosigkeit, doch ist die therapeutische Anwendung nur gering. Technisch wird es in enormen Mengen als Extraktionsmittel für Alkaloide, Lösungsmittel für Oele und Harze, auch zum Tödteten kleiner Insekten verwendet. Der grösste Verbrauch findet als Flecken-Reinigungsmittel statt. Ausserdem dient es zu Beleuchtungszwecken. Es gehört in dieser Beziehung zur Klasse I der Mineralöle, welche zu Brennzwecken nur mit der Signatur „Feuergefährlich, zu Brennzwecken nur

¹⁾ Die sog. Petroleum-Sturmlaternen können Benzin gegenüber nicht als Sicherheitslaternen angesehen werden. Nur eine ordentliche wirkliche Davy'sche Sicherheitslampe bietet genügenden Schutz!

unter besonderen Vorsichtsmassregeln verwendbar“ abgegeben werden darf Ueberhaupt gebe man Benzin im Handverkaufe nur mit der rothen Signatur „Benzin, feuergefährlich“ ab und mache die Käufer auf die leichte Entzündbarkeit aufmerksam

Benzinbrände in Wäschereien. In chemischen Waschanstalten ereignen sich bis weilen Brände, welche von den Bethedigten auf Selbstentzündung zurückgeführt werden Diese Angabe ist zutreffend Wie RICHTER experimentell nachgewiesen hat, entsteht beim Schwenken der Stoffe mit Benzin elektrische Erregung, welche zur Entzündung des Benzins sich steigern kann Diese Erregung erfolgt besonders in trockener Luft, also während der kalten Jahreszeit Man kann dem Benzin diese Fähigkeit nehmen durch Zusatz kleiner Mengen Oelsäure Seife

Antielektron, Seife gegen die Selbstentzündung des Benzins 10 Th Oelsäure werden mit 1 Th gebrannter Magnesia unter Zuhilfenahme von Weingeist verseift, die Seife wird in 100 Th Benzin gelöst Auf 200 l Benzin wird 1 l des Präparates zugesetzt **Antibenzinpyrin** Ist identisch mit Antielektron

Novusine, Fleckenwasser für Handschuhe u dgl Saponin 8,5, Wasser 65,0, Alkohol 35,0, Benzin 364,0, Mirbanöl 2,5

Benzoë.

Benzoë (Austr Germ Helv) *Asa dulcis s. odorata*. Benzoinum (Brit U St) **Besina Benzoë** — Benzoë. Benzoëharz. Bienenharz. Kamynian. Wohlriechender Asant Benjoin (Gall) Benzoin Gum Benjamin Ist das Harz wahrscheinlich mehrerer Arten der Gattung *Styrax*, Familie der *Styracaceae*, mittelhohe Bäume, die in Hinterindien und im malayischen Archipel heimisch sind

Vorkommen und Gewinnung. Wie der Peru- und Tolubalsam und der *Styrax* praexistirt das Harz nicht in der Pflanze, sondern entsteht erst als pathologisches Produkt infolge ausserer Eingriffe Als solche haben Einschnitte zu gelten, die man in die Rinde macht und aus denen das Harz dann nach einiger Zeit in Form weisser Tropfen austritt, die erstarren und aussen bald braun werden Neuerdings gewinnt man es auch in flachen Platten, die sich anscheinend zwischen Holz und Rinde bilden, vielleicht, weil man die Rinde nicht anschneidet, sondern nur klopft Das Harz älterer Bäume ist brauner und mehr massig Es kommen entweder die isolirten Tropfen oder Mandeln oder Platten in den Handel, oder man schmilzt das Harz zusammen oder formt, indem man es an der Sonne oder in heissem Wasser erweicht, Blöcke daraus, die dann die Mandeln noch erkennen lassen Kommt in Kisten oder Matten verpackt in den Handel

Sorten Man unterscheidet nach der Herkunft verschiedene Sorten, die man da nach grupirt, ob sie nur Benzoesäure oder diese und Zimmtsäure enthalten

a) Sorten, die nur Benzoësäure enthalten

1) **Siam-Benzoe** (Germ Helv Brit Gall) Abstammung unbekannt, Heimath in Hinterindien, hauptsächlich im Distrikt Luang-Rabang am linken Ufer des Mekong im Nordosten der Shanstaaten von Siam Die beste Siambenzoe besteht ausschliesslich aus losen Körnern oder Thränen (Benzoe in lacrymis), die gelbbraun bis fast weiss, auf dem Bruch milchweiss, wachsartig oder glasglanzend sind Sie sind spröde, schmelzen bei 75°C Spec Gew 1,17—1,235 Von angenehm vanilleartigem Geruch In Deutschland allein officinell

Dieser Sorte gleichwerthig sind die oben erwähnten Platten — Die zweite Sorte besteht aus einer schön braunen Grundmasse, in welche die Thianen und Mandeln eingebettet sind (Benzoe amygdaloides)

2) **Calcutta-Benzoe, Blockbenzoe** (Benzoe in massis, B in sortis) bildet poröse, rothbraune Massen mit kleinen, helleren Thränen und zahlreichen Pflanzentrümmern Spec Gew 1,10—1,12

3) Palembang-Benzoe, Palembang-Benzoe, ebenfalls von Sumatra, billige Sorte in massis, sich zur pharmaceutischen Verwendung nicht eignend

b) Sorten, die Benzoesäure und Zimmtsäure enthalten, Geruch an *Styrax* erinnernd

4) Sumatra-Benzoe stammt von *Styrax Benzoin Dryander*, der auf Sumatra und Java kultivirt wird und vom 6—20 Jahre Benzoe liefert (Holv Austr Bit U-St Gall) Gekant in grossen, viereckigen, in Matten verpackten Blöcken in den Handel, die aus einer matt grauröthlichen Grundmasse und zahlreichen, weissgelblichen Mandeln bestehen. Die Mandeln schmelzen bei 85°C, die Grundmasse bei 95°C. In Oesterreich officinell

5) Penang-Benzoe oder Storax-Benzoe. Als Stammpflanze wird *Styrax subdenticulata* Michx vermuthet. Bildet braune, poröse Massen, anscheinend durch Zusammenschmelzen gewonnen. Enthält viele Unreinigkeiten. Spec Gew 1,145—1,155

Eigenschaften Benzoe ist in Chloroform sehr wenig, in Aether zum Theil, in Alkohol bis auf fremde Beimengungen meist löslich (und zwar Siam-B völlig, Sumatra-B zu 70—80 Proc). Kone Schwefelsäure soll Siambenzoe karminroth, die anderen Sorten braunroth lösen, diese Lösung der Siambenzoe soll mit Alkohol versetzt violettroth, bei Sumatra- und Penangbenzoe mehr rothlich werden.

Bestandtheile a) Siambenzoe freie Benzoesäure und 1,5 Proc Vanillin. Das den grössten Theil der Droge ausmachende Harz ist ein Gemenge von zwei Estern der Benzoesäure mit zwei Harzalkoholen, dem weissen Benzoresinol $C_{16}H_{26}O_2$ und dem braunen Siarresinotannol $C_{14}H_{14}O_2$. Das Harz enthält 88,2 Proc Benzoesäure, 5,1 Proc Benzoresinol und 56,7 Proc Siarresinotannol. Ferner ist noch ein öliger Bestandtheil vorhanden, ebenfalls ein Ester der Benzoesäure.

b) Sumatrabenzoe. Spuren von Benzaldehyd und Benzol, etwa 1 Proc Vanillin, freie Benzoesäure und freie Zimmtsäure. Das Harz ist ein Gemenge von etwa 1 Proc Zimmtsäurephenylpropylester $C_{18}H_{18}O_2$, 2—3 Proc Styrazin (Zimmtsäurezimmester), wenig Zimmtsäurebenzoresinolester und viel Zimmtsäureresinotannolester. Das braune Resinotannol hat die Zusammensetzung $C_{18}H_{20}O_4$.

Prüfung 1) Diejenigen Sorten, die nur Benzoesäure enthalten sollen, sind auf Zimmtsäure zu prüfen! Man zerreibt 3—4 g des Harzes mit kaltem Wasser zu einem Brei, setzt mehr Wasser hinzu, erwärmt bis fast zum Kochen und filtrirt heiss. Das Filtrat wird bei gelinder Wärme auf 7—9 g eingeengt, zum Kochen erhitzt und mit einer kcon Lösung von Kaliumpermanganat versetzt. Es darf kein Geruch nach Benzaldehyd (Bittermandelöl) auftreten. $C_6H_5O_2 + 4O = 2CO_2 + H_2O + C_7H_6O$

2) 100 g in Alkohol gelbster Benzoe sollen mindestens 6,6 g wasserfreies Natriumkarbonat sättigen, was etwa 15 Proc Benzoesäure entspricht.

3) Bestimmung des in Alkohol löslichen Antheiles (cf oben). Man erschöpft dazu 10 g mit heissem 96 proc Alkohol, verdunstet den Alkohol und wägt den bei 100° getrockneten Rückstand.

4) Bestimmung der Säurezahl nach DIETERICH. 1 g des fein zerriebenen Harzes (Durchschnittsprobe) bringt man in ein Kolbehen, fügt 10 ccm $\frac{1}{2}$ N alkoholische Kalilauge und 50 ccm starken Alkohol hinzu. Nach 5 Minuten titirt man mit $\frac{1}{2}$ N Schwefelsäure und Phenolphthalein bis zur Gelbfärbung zurück, d. h. so lange, bis ein frisch zugesetzter Tropfen Indikator keine Rothfärbung mehr hervorruft. Die gebundenen ccm KOH $\times 28$ = Säurezahl.

5) Bestimmung der Verseifungszahl nach DIETERICH. 1 g Benzoe (wie bei 4) übergiesst man in einer Glasstöpselflasche von 1 Liter mit 20 ccm $\frac{1}{2}$ N alkoholischer Kalilauge und 50 ccm Benzol (0,700 spec Gew). Man lässt verschlossen 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und titirt nach dem Verdünnen mit Alkohol mit $\frac{1}{2}$ N Schwefelsäure und Phenolphthalein wie oben zurück. Die gebundenen ccm KOH $\times 28$ = Verseifungszahl.

6) Die Esterzahl erhält man durch Subtraktion der Säurezahl von der Verseifungszahl

7) Aschenbestimmung

nach DIETTERICH

Sorte	Säurezahl	Verseifungszahl	Esterzahl	Asche
Siam	140,0—170,0	220,0—240,0	50,0— 75,0	0,028—1,5 Proc
Sumatra	100,0—130,0	180,0—230,0	65,0—125,0	0—1,5 "
Penang	121,8—137,2	210,0—236,8	87,5— 91,7	0,38—0,778 "
Padang	121,8—124,6	201,6—205,8	79,8— 81,2	1,07 "
Palembang	113,4—130,9	198,0—219,8	84,0— 91,0	1,101—4,028 "

Aufbewahrung In Blech- oder Porcellangefäßen auf der Materialkammer, das Pulver in dicht schliessenden Gefäßen aus gelbem Glase

Anwendung Zuweilen an Stelle der Benzoesäure innerlich, äusserlich als antiseptisches und desinfizierendes Mittel. Man verwendet die Tinktur als Kratzmittel an Stelle des Perubalsams, zu Waschungen bei Sommersprossen, als Zusatz zu Zahn- und Mundwässern. Als Expektorans das Harz bei chronischen Katarrhen.

Umfangreichen Gebrauch macht man von der Benzoe in der Parfumerie, zur Herstellung von Rauchermitteln, zum Lackiren der Chokoladen, ferner um das Ranzigwerden von Fetten zu verhüten.

Eine für „Parfumeriezwecke“ vorrätig zu haltende „flüssige Benzoe“ erhält man durch Ausziehen des Harzes mit Aether, Mischen des Filtrates mit Ricinusöl und Verdunsten des Aethers durch Erwärmen.

Siam-Benzoe in Mandeln ist ein vorzügliches Bindemittel für Pillen mit Kreosot, atherischen Ölen u. dergl., diese werden dabei so vollständig emulgirt, dass sie beim Ausrollen gebunden bleiben, die Masse erfordert nur wenig Pflanzenpulver, bröckelt nicht und liefert verhältnissmässig kleine, in Wasser leicht zerfallende Pillen (Vergl. Massa Pilul cum Benzoe und Pilul Kreosoti).

Tinctura Benzoes s Benzoini — Benzoetinktur — Teinture ou Alcoolé de Benjoin — Tincture of benzoin

1) Austr., Germ., Helvet. Aus grob gestossener Benzoe 1 Th und Weingeist (90 proc.) 5 Th zu bereiten, nach Austr. in der Wärme bis zur völligen Lösung. 2) U-St. Aus Benzoe 200 g und Alkohol q s werden 1000 cem Tinktur hergestellt. Gall. Benzoe 100 g, Alkohol (80 proc.) 500 g. — Die aus Sumatrabenzoe gewonnene Tinktur eignet sich besonders für Handverkaufszwecke.

Tinctura Benzoes aetherea. Helvet. Aetherische Benzoetinktur. Teinture de benjoin étheree. Benzoe (V) 2 Th, Aether 10 Th lässt man eine Woche stehen, filtrirt alsdann. Zum Benzoiniren von Fetten.

Tinctura Benzoes s Benzoini composita. Balsamum Commendatoris, Bals. Friarii, Bals. Hierosolymitanse, Bals. traumaticum s. vulnerarium — Tinctura balsamica — Zusammengesetzte Benzoetinktur, Balsamtropfen, BURRHUS' Wundelixir, FRIAR'scher oder Jerusalemer Balsam, Sympathiebalsam, WAD'sche Tropfen, Wund- oder Wunderbalsam — Teinture ou Alcoolé balsamique. Baume du Commandeur de Permes — Compound Tincture of Benzoin — Ergänzt Benzoe 10, Aloe 1, Perubalsam 2, Weingeist 75. Brit. Benzoe 100 g, Gereinigter Storax 75 g, Tolubalsam 25 g, Socotraloe 18,3 g, Alkohol (90 proc.) q s zu 1000 cem Tinktur. U-St. Benzoe 120 g, Gereinigte Aloe 20 g, Storax 80 g, Tolubalsam 40 g, Alkohol (91 proc.) q s zu 1000 cem Tinktur, durch 2ständiges Erwärmen auf höchstens 65° C zu bereiten. Gall. Angelikawurzel 10, Johanniskraut 20, Alkohol (80 proc.) 720. Nach 8 Tagen presst man aus, macerirt nochmals 8 Tage mit Aloe, Myrrhe, Weihrauch je 10, Benzoe, Tolubalsam je 60 und filtrirt.

Chocoladen-Lack (Diet.) Sumatrabenzoe, Blonder Schellack je 75, Vanillin 1, löst man in Weingeist (95 proc.) 850, filtrirt und wäscht das Filter mit Weingeist nach, bis das Filtrat 1000 beträgt.

Eau des Princesses. (Buchh.) Moschustinktur 0,5, Pottasche, Kampferspiritus je 3, Benzoetinktur 15, Wasser 280, Kölnisches Wasser 750.

Benzoe-Haaröl (Diet.) Benzoeöl, Mandelöl oder Erdnussöl je 500, Perubalsam 5, fettes Jasminöl 10, Bergamottöl 2, Alkannin, Vanillin je 0,1, Kumin 0,05.

Pix cerevisiariorum, Lindauer wohlriechendes Brauerpech. Schwarzes Pech 850, Sumatrabenzoe 150, schmilzt man zusammen.

Sapo benzoatus pulvinaris (Diet) Benzoe-Pulverseife Man mischt Benzoeharz 3, mit neutraler oder überfetteter Pulverseife 97

Bouquet céleste (Buchh) Rosenöl 0,5, Lavendelöl, Zimmtöl, Orangenblüthenöl, Moschustinktur je 1,5, Perubalsam, Nelkenöl je 5, Citronenöl 7,5, Benzoe-tinktur 25, Weingeist 950

Brillantine Sumatrabenzoe, Medicinische Seife je 2 g, Ricinusöl 20 g, Rosenöl 1 Tropf, Bergamottöl 5 Tropf, Absoluter Weingeist 180 g Man löst und filtrirt Zum Glänzendmachen der Barthaare Wird mittelst Bürsten aufgetragen Das Ricinusöl kann zur Hälfte durch Glycerin ersetzt werden

Lacca ad fornacem. Räucherlack, Raucherwachs, Ofenlack Bâtons aromatiques russes (Buchh) Schellack 150, Benzoe 600, Storax 100, Kohlepulver 150, schmilzt man, setzt Perubalsam, Bergamottöl, Geraniumöl je 3, zu und rollt in Stangen aus Man streicht damit am heissen Ofen entlang

Essentia fumalis. Tinctura fumalis Räucheressenz 1) n Diet Benzoe 30, Storax 20, Perubalsam 5, Bergamottöl 2, Rosenöl 1, Ylangöl, Rosenholzöl je 0,5, Geraniumöl, Sandelholzöl Zimmtöl, Sassafrasöl, Nelkenöl je 5 Tropf, Bittermandelöl 2 Tropf, Veilchenwurzelöl 1 Tropf, Kumin 0,07, Moschus 0,1, Vanillin 0,5, Essigäther 10, Jasmin-extrakt 30, Weingeist 150, nach einigen Tagen filtrirt man und wäscht das Filter mit Weingeist nach, bis das Filtrat 250 beträgt — Die Weingeistmenge wird nach Beheben vermehrt

2) n Diet Nelkenöl 2,5, Kumin 3,0, Geraniumöl, Lavendelöl je 5,0, Portugalöl 7,5, Moschuswurzel-tinktur 50, Benzoe-tinktur, Tolubalsamtinktur je 60, Vanille-tinktur, Veilchenwurzel-tinktur je 125, Heliotropextrakt 250, Weingeist 310

3) Orangenblüthenöl 5, Bergamottöl, Lavendelöl je 3, Geraniumöl 1, Nelkenöl 0,5, Benzoe-tinktur 500, Weingeist 490

Candelae Benzoes Benzoe-kerzchen Diet Lindenkohle, gepulvert, 500 wird mit einer Lösung von Kalumnitrat 80 in Wasser 600 getränkt, getrocknet, mit Benzoe-pulver 400, Tragant 20, Kumin 0,2 vermischt und mittelst Tragant-schleim, der 2 Proc Salpeter enthält, zur Masse angestossen Man formt kleine Kegel und bepanselt dieselben noch feucht mit Goldbronze

Candelae fumales nigrae (Diet) Schwarze Räucherkerzchen Gepulverte Lindenkohle 900, trinkt man mit einer Kalumnitratlösung 15 1000, trocknet, vermischt mit Tragant 20, Benzoe-tinktur 50, Perubalsam, Storax, Tolubalsam je 20, Hoffmann'schem Lebensbalsam 10 g, Kumin 0,5 und verfährt weiter, wie vorhin angegeben

Candelae fumales rubrae Fur Rothe Räucherkerzen nimmt man statt der Kohle 725 g Sandelholz-pulver und erhöht die Salpetermenge auf 75 g

Charta fumalis 1) Buchh Benzoe, Tolubalsam und Weihrauch aa schmilzt man, setzt ein gleiches Gewicht Räucheressenz zu, streicht noch warm auf starkes Schreib-papier und reibt nach dem Trocknen mit Talkum ab

2) Diet Benzoe, Storax, Aether je 50, Weingeist 100, der filtrirten Lösung fugt man hinzu Räucheressenz 100, Essigsäure 2, und verfährt wie vorhin angegeben — Die nach 1 und 2 hergestellten Papiere werden auf heissen Platten erwärmt

Lillione (n Voväcka) Benzoe-tinktur 15, Quilla-tinktur 75, Potasche 15, Borax 40, Rosenwasser 900, Talkum 100, Glycerin 50, Theerosen Extrakt q s

Räucherpapier zum Verbrinnen wird folgendermassen (n Buchh) bereitet Man trinkt Papier mit einer Salpeterlösung 1 10, trocknet und bestreicht mit einer Tinktur aus Benzoe 75, Sandelholz, Weihrauch je 50, Vetiveressenz 25, Lemongrasöl 5, Weingeist 500 Das in Streifen geschnittene Papier darf nur glimmen

Species fumales Pulvis fumalis Species ad suffiendum — Räucher-pulver Königsrauch Königsraucherpulver Flussräucherpulver — a Auf die Ofenplatte zu streuen 1) Nach Buchh siebt man Buchenholzspähne zu einer gleich-mässigen Speciesform, färbt und mischt im folgenden Verhältnisse Roth 3, Blau, Grün 1½, Gelb 1, Ungefärbt 1½, dazu Veilchenwurzel 1½ Th Die ungefarbten Spähne trinkt man mit einer Essenz aus Benzoe, Storax je 50, Räucheressenz 200, Aether 250 (auf 1000 Species)

2) Aus Blüten und dergl (Buchh) Kornblumen, Ringelblumen je 60, Rosen-blätter 120, Lavendelblumen, Veilchenwurzeln je 150, Zimmt, Nelken je 75, Benzoe 150, Kaskarillrinde 160 Essenz wie vorhin b Auf glühende Kohlen zu streuen (Buchh) Bernstein, Weihrauch, Bunte Species je 20, Wacholderbeeren 12, Lavendelblüthen 8, Benzoe 6, Veilchenwurzel, Kaskarillrinde, Storax je 4, Nelken 2

Species fumales templorum Räucherpulver für katholische Kirchen Weihrauch 200, Benzoe 100, Kaskarillrinde 50, Salpeterpulver 25 mischt man, besprengt mit Wasser und trocknet an der Luft

Species ad pulvillos odoriferos. Füllung für Riechkissen Sachets (Diet) Eine feine Theemischung aus Veilchenwurzel, Rosenblättern je 250, Lavendelblüthen Feld-

thymian, Zimmt, Sumatrabenzoe je 50, Nelken 5, Pomeranzenschalenmark 300 wird mit einem beliebigen Parfum (s. unter Ess Bouquet) getränkt

Tabulae fumales. Raucher-Tafelchen (Diet) Bismutpulver 25, Gebrannter Gips 75, ruht man mit Wasser zum Teig an, giesst in kleine, geölte Blechformen, trocknet und trinkt mit Räucheressenz Zum Gebrauch legt man in eine warme Ofenröhre

Balsamwasser von JACKSON. Mit Alkanna gefärbtes Destillat aus Benzoe, Guajakharz, Myrrhe, Tolubalsam, Pomeranzenschalen, Angelikawurzel, Zimmt, Vanille, Pfefferminze, Löffelkraut

BERNANI's Zahnwasser, eine Tinktur aus Benzoe, Myrrhe, Ratanhia, Pfefferminzöl
Cosmetic Vinegar ist eine klare Mischung aus Benzoealkohol 60, Perubalsam 10, Kölnischem Wasser und HOFFMANN'schem Lebensbalsam je 150, Essig 300

Eau cosmétique de GUERLAIN, GUERLAIN's Sommersprossenwasser enthält Bittermandelwasser, Rosenwasser, Bleiessig, Weingeist, Benzoe

Englischer Wunderbalsam ist Tinct Benzoes comp

Gurkenmilch, Glycerin and Cucumber, eine milchige Flüssigkeit aus Benzoe, Melisse, Weingeist, Glycerin

Kopfschmerzen- und Sommersprossenmittel von ANTHOR bestehen aus 1) Faulbaum, 2) Cold cream, 3) Benzoe

LOHR's Epidermaton gegen Flechten etc Gemeines Wasser mit einer Spur Benzoesäure und Harz

Haarstärkende Pomade, Pommade des Châtelains, von CHALMIN ist ein Gemisch aus Fett, Harz, Gutt, Benzoe und ätherischen Oelen

Lait de Manilla gegen Sommersprossen enthält Borax, Kupfer, Benzoealkohol und Bittermandelöl

Lilienmilch von Frau M SCHUBERT, ein Schönheitsmittel, ist eine Boraxlösung mit Benzoealkohol

Nitidin Ein Lack aus Benzoe, Gummilack, absolutem Alkohol, Fuchsin

Odier-Zahn-Mundwasser von Dr WALLISS Eine Tinktur aus Benzoe, Nelken und Perubalsam

POHLMANN's kosmetisches Mundwasser ist eine Tinktur aus Sternanis, Parakresse, Benzoe, Myrrhe, Bertramwurzel, Ivarankussawurzel, Veilchenwurzel, Cochenille, Minzenöl, Zimmtöl

POHLMANN's Schönheitsmilch ist eine Mandelölemulsion mit Glycerin, Erdbeerwasser, Benzoealkohol, Macisöl, Patschouli- und Jasminextrakt, Peru und Tolubalsam

Reichenhaller Asihmapulver von A SCHMID besteht aus Grindelia robusta, Eucalyptus, Stechapfel, Salpeter, Benzoe

Rheumatismusöl von CARL ARNDT enthält Benzoe, Perubalsam, Pfefferminzöl, Thymianöl, Kampher

Rosenmilch ist eine Mischung aus Rosenwasser 20, Benzoealkohol 1

Sommersprossenwaschmittel von RUSS besteht aus Benzoealkohol, HOFFMANN's Lebensbalsam und Rosenwasser

Styroglycerit gegen aufgesprungene Hände Zusammengesetzte Benzoealkohol 4, Glycerin 8, Grüne Seife 1, Rosenwasser 16

Tinctura confortativa, Sicherer zur Erhaltung der Manneskraft ist eine Tinktur von mehreren Harzen, wie Benzoe, Storax, Perubalsam, Canthariden (?)

Venusmilch der Gebr TRECKLENBURG in Leipzig, ein Mittel für Alles, besteht aus Benzoealkohol 5, Rosenwasser 200

Vulneral ist eine Benzoe, Myrrhe etc enthaltende Wundsalbe

Zundvlift, Crayon feu von MOSER in Paris, zum Aetzen vergifteter Wunden, besteht aus Benzoe, Eisen, Salpeter und Kohle

Acetum Benzoes cosmeticum		II. Ep	Tincturae Benzoes	
Vinaigre virginal			Spiritus (80%)	35 400,0
Ep	Benzoes pulv	100,0	Acidi acetici diluti (80%)	100,0
	Acidi acetici diluti (80%)		Aetheris acetici	
	Spiritus (90%)	35 200,0	Essentiae Jasmini	35 50,0
Acetum suffitorium			Olei Rosae	gtt X
Acetum fumale Räucheressig.			Olei Auranti florum	
I. Ep	Tincturae Benzoes	100,0	Olei Wintergreen	35 gtt V
	Olei Bergamotiae		Cumacini	0,31
	Olei Citri		Aether Benzoes	
	Acidi acetici (96%)	35 50,0	Ep Benzoes	4,0
	Olei Caryophyllorum	20,0	Olei Amygdalarum	1,0
	Olei Cinnamomi	16,0	Aetheris	8,0
	Balsami peruviani	30,0	Colloidum benzoïnatum KELLER	
	Spiritus (85%)	684,0	Ep Tincturae Benzoes comp	60,0 com
Tropfenweise auf die heisse Platte zu giessen			Glycerini	5,0 "
(Buchh.)			Colloidi	120,0 "

Lae Virginis		Oleum balsamicum BOUGHARDAT	
Jungfermilch Laet virginis		BOUGHARDAT's balsamisches Oel	
Rp	Tincturae Benzoes 15,0	Rp	1 Benzoes
	Tincturae Balsami tolutani 20,0		2 Balsami tolutani 55 10,0
	Aqua Rosarum 96%,0		3 Aethers 50,0
			4 Olei Amygdalarum 1000,0
Lanolinum benzoïnatum		Man löst 1 und 2 in 3, giebt 4 hinzu und erwärmt, bis 3 verdunstet ist, dann setzt man zu	
LASSAB's Benzoe-Lanolin		Olei Cajuputi	
Rp	Lanolini 20,0	Olei Citri 55 2,0	
	Vasolini flavi 5,0	Oleum benzontum s benzoinatum	
	Tincturae Benzoes 1,0	Benzoe Oel	
Lulimentum anthrasorrhoidale ADLER		Wird wie Adeps benzoatus (S 159) aber mit Olivenöl bereitet Nach Helf	
Rp	Extracti Hamamelidis fluidi	Tincturae Benzoes aetherosae 10,0	
	Extracti Hydrasus fluidi	Olei Olivarum 100,0	
	Tincturae Benzoes comp 55 4,0	Zu erwärmen, bis der Aether verdunstet ist	
	Tincturae Belladonnae 1,0	Sirupus Benzoes	
	Olei carbolisati (5%) 8,0	Rp Tincturae Benzoes 15,0	
Lutum cum Benzoin		Sirupi Sacchari 85,0	
Mastic dentaire au Benjoin (Gall)		Tinctura gingivalis MIALHE	
Benzoe Zahntink		MIALHE's Zahntinktur	
Rp	Benzoes in lacrimis 20,0	Rp	Benzoes
	Aethers (spec Gew 0,724) 10,0		Balsami tolutani 55 1,0
Lösen und durch Watte filtriren			Kino
Massa pilularum cum Benzoe (n Götting)			Radices Ratanhuae 55 25,0
Rp	1 Olei aetheri praescripti 2,0		Spiritus (90%) 1000,0
	2 Benzoes Siam in lacrymis 1,8		Olei Anisi 0,5
	3 Boracis pulverati 0,6		Olei Menthae piper
	4 Glycerini diluti gtt IV		Olei Cinnamomi 55 1,0
	5 Radici Liquiritiae pulv q s	Tinctura gingivalis PASCHKIS	
2 pil. No 20 2 in 1 lösen, 3 und 4 zufügen, mit 5 anstoßen		PASCHKIS Antiseptische Zahntinktur	
		Rp	Tincturae Benzoes
			Tincturae Myrrhae 55 10,0
			Spiritus Cochleariae 80,0

Benzolum ¹⁾

1 Benzolum (Erganzb Brit) Benzol. Steinkohlenbenzin. Benzinum Lithanthracis. C_6H_6 . Mol. Gew. = 78. Ist der aus dem Steinkohlentheer durch Destillation abgeschiedene Kohlenwasserstoff C_6H_6 , bez die aus dem Steinkohlentheer abgeschiedenen Gemische von Kohlenwasserstoffen, welche vorwiegend Benzol enthalten

Handelssorten. 1) Die reinste Sorte, *Benzolum ex Acido benzoico*, durch Destillation von 1 Th Benzoesäure mit 3 Th Aetzkalk erhalten, kommt nur für synthetisch-chemische Arbeiten in Betracht 2) *Benzolum crystallatum* (d 1 krystallisirbares Benzol) wird durch sorgfältige Rectifikation des Rohbenzols in Kolonnen-Apparaten mit darauffolgender Krystallisation in der Kälte gewonnen und ist das Präparat des Ergänzungsbuches Es enthält immer noch etwas Thiophen 3) Die Rohbenzole werden nach dem Procentgehalte gehandelt, d. h. als 80, 60, 70, 90 proc Benzol, und zwar bezeichnet man als Benzol-Procente alles das, was unter 100° C übergeht Ein solches 70 proc Rohbenzol ist von der Brit aufgenommen

Eigenschaften. a) Benzol des Ergänzb Dem krystallisirbaren Benzol der Preislisten entsprechende klare, farblose, flüchtige, stark lichtbrechende Flüssigkeit, von eigenartigem Geruche, leicht flüchtig, bei 80,5° C siedend, spec Gew = 0,880—0,884 — Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether, Methylalkohol, Essigessig, Aceton, Chloroform Ausgezeichnetes Lösungsmittel für Schwefel, Phosphor, Jod, Fette, Oele, Harze, Asphalt, Alkaloide u a Substanzen Verbrennt, entzündet, mit leuchtender, stark russender Flamme Erstarrt unter 0° C zu rhombischen Krystallblättern, welche bei -4° C

¹⁾ In französischen Mittheilungen wird es „Benzine“ genannt s S 473

wieder schmelzen (*Benzolum crystallisatum*) Giesst man 1 cem Benzol tropfenweise vorsichtig (!) in 5 cem kalte (!) rauchende Salpetersäure, so wird es unter Entwicklung rother Dämpfe und Braunfärbung gelöst. Nach dem Verdünnen mit Wasser scheidet sich alsdann das eigenartig bittermandelolähnlich riechende Nitrobenzol in öligen Tröpfchen ab. — In konz. Schwefelsäure löst es sich beim Erwärmen allmählich auf (unter Bildung von Benzolsulfosäure $C_6H_5SO_3H$). Eine hierbei auftretende indigoblaue Färbung rührt von einem Gehalte an Thiophen her. Dieses Benzol muss seiner ganzen Menge nach bei $80-81^\circ C$ überdestilliren und unter $0^\circ C$ zu eisähnlichen Krystallen erstarren.

b) Benzol des Brit. Farblose, nicht opalisirende Flüssigkeit. Spec. Gew. = 0,880 bis 0,888. Es beginnt zu siedern bei $80^\circ C$, bis $100^\circ C$ gehen etwa 90 Proc. über, der Rest destillirt bis $120^\circ C$. Es besteht aus etwa 70 Proc. Benzol und 20–30 Proc. Toluol, auch etwas Xylol.

Aufbewahrung. Benzol ist fast ebenso leicht entzündlich wie Petroleumbenzin. Es gelten für dasselbe alle für Benzinum gemachten Angaben.

Anwendung. Benzol wirkt gährungs- und faulniswidrig und ist ein heftiges Gift für niedere Thiere. Die Dämpfe, erkeathmot, erzeugen Kopfschmerz, rauschähnlichen Zustand, schliesslich Bewusstlosigkeit. Aeusserlich bei Krätze, in Salbenform (1 Benzol 2 Fett), im Clyma gegen Eingeweidewürmer, Trichinen mit fraglichem Erfolge (2,–4,0 200,0). Innerlich bei fermentativen Processen im Magen, gegen Darmtrichinen zu 0,5–1,0, mehrmals täglich. Höchstgaben *pro die* 6,0 g. — Technisch als Fleckenreinigungsmittel wie Petroleumbenzin, natürlich die rohen Sorten, ferner zur Darstellung der Benzolderivate (Anilin, Phenol) die reineren Sorten. Das Rohbenzol dient in grossen Mengen zum Karburiren des Leuchtgases. Auf 1 Kubikmeter Wassergas rechnet man 6–7 g Benzol.

II † Nitrobenzolum (Ergänzb.) Nitrobenzin. Nitrobenzit. Mirban-Oel.
Essence de Mirbane. $C_6H_5NO_2$ Mol. Gew. = 123

Darstellung. Zu 100 Th. Benzol lässt man aus einem Hahntrichter in kleinen Portionen und unter Umschwenken eine erkaltete Mischung von 115 Th. Salpetersäure (1,42 spec. Gew.) und 160 Th. konz. Schwefelsäure zufließen, wobei das Reaktions-Gefäss so zu kühlen ist, dass die Temperatur des Inhalts nicht über $25-30^\circ C$ hinauskommt. Wenn alle Säure zugegeben ist, erwärmt man das Reaktionsgemisch noch $\frac{1}{2}$ Stunde auf dem Wasserbade unter Umschütteln. Nach dem Erkalten fügt man etwa 300 Th. Wasser hinzu, trennt das gebildete Nitrobenzol mittels Scheidetrichters von der Säure, wäscht es mit Wasser, destillirt es zunächst im Wasserdampfströme ab und rektifizirt es alsdann nochmals unter direkter Erhitzung aus einem Fraktionskolben.

Eigenschaften. Schwach gelb gefärbte, nach Bittermandelöl riechende, lichtbrechende, flüchtige Flüssigkeit. Spec. Gew. bei $15^\circ C$ = 1,208, Siedep. $206^\circ C$. Erstarrt in der Kälte zu grossen, bei $+3^\circ C$ schmelzenden Krystallblättern. In Wasser wenig löslich, in Alkohol, Aether, Benzol, rauchender Salpetersäure löslich, es ist selbst ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für zahlreiche organische Substanzen, z. B. für Indigo. Mit Wasserdämpfen leicht flüchtig. Um Nitrobenzol nachzuweisen, digerirt man es mit verdünnter Schwefelsäure + geraspelttem Zink (oder Eisenpulver). Nach Beendigung der Wasserstoffentwicklung übersättigt man die Flüssigkeit mit Natronlauge und schüttelt sie mit Aether aus. Das nach dem Verdunsten des Aethers hinterbleibende Anilin wird mit verdünnter Schwefelsäure aufgenommen und kann nach S. 311 geprüft werden.

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt.

Handelssorten. Das leichte Nitrobenzol des Handels ist das vorstehend beschriebene, aus technisch reinem Benzol hergestellt. Das schwere Nitrobenzol, spec. Gew. 1,18–1,19, Siedep. $210-220^\circ C$, enthält neben Nitrobenzol noch Nitrotoluole. Das sehr schwere Nitrobenzol, spec. Gew. 1,167, Siedep. $220-240^\circ C$, besteht vorwiegend aus Nitrotoluolen und enthält nur wenig Nitrobenzol, ausserdem noch Nitroxylöle. Uebrigens stehen die Nitrotoluole und Nitroxylöle in ihrem Geruche dem Nitrobenzol sehr nahe. Das Nitrobenzol des Ergänzb. hat das spec. Gew. 1,186.

Anwendung Nitrobenzol wird therapeutisch nicht verwendet. Es wirkt giftig und wird besonders leicht in Dampfform resorbiert. Die Giftwirkung scheint mit einer Zersetzung des Blutes bez. Bildung von Methämoglobin einherzugehen. Technisch besonders in der Parfümerie und zwar zum Parfümiren der billigen Cocoseifen. Ferner zur Darstellung des Anilins. In der Analyse als Lösungsmittel bei der Werthbestimmung des Indigo.

Benzolinar, Fleckenreinigungsmittel Gemisch von 1 Th. Aether mit 4 Th. Benzol, parfümirt mit Birnenäther.

Betula.

Gattung der Betulaceae — Betulaceae

I Betula verrucosa Ehrh. in Asien und Mitteleuropa und **Betula pubescens**

Ehrh. ungefähr von derselben Verbreitung, aber weiter nördlich gehend.

Die Blätter werden als unschädliches Diureticum empfohlen (30 g im Aufguss zu 200 g, täglich 3 solcher Dosen) oder als Extrakt. Um die Betuloretinsäure, die der wirksame Bestandtheil sein soll, besser in Lösung zu bringen, wird vorgeschlagen, dem Aufguss Natriumkarbonat zuzusetzen, früher verwendete man die Blätter gegen Krätze und gegen Flechten.

Bestandtheile. 8,64 Proc. Tannin, 8,37 Proc. Zucker, 0,006 Proc. eines Alkaloides und Betuloretinsäure.

Die Rinde enthält 10–12 Proc. Betulin $C_{26}H_{40}O_2$, das weisse Flocken oder Krystallwarzen bildet, Schmelzp. $258^{\circ}C$, es ist ein zweisauriger Alkohol, feiner enthält sie Betuloresinsäure $C_{26}H_{40}O_3$, Schmelzp. $94^{\circ}C$. Konc. Schwefelsäure färbt sie roth.

Durch trockene Destillation gewinnt man, besonders in Russland, aus der Rinde und aus den Zweigen einen Theer, den Birkentheer, Dagget, Birkenöl, Lithauer Balsam, Juftenöl, Oleum Betulae empyreumaticum, Oleum betulinum, Oleum Rusci (Hely Ergänz.), Oleum Moscoviticum, Oleum Lituanicum, Huile russe, Huile de bouleau, Birch oil.

Beschreibung Eine braune, dickliche Flüssigkeit, von eigenthümlich brenzlichem Geruche und nach Juftenleder. Spec. Gew. 0,926–0,945 bei $20^{\circ}C$ und zwar gilt ein niederes spec. Gew. als Kennzeichen der Güte. Reagirt sauer. Löslich in Alkohol und Aether zum grossten Theile, in Wasser kaum löslich, demselben aber Geruch und saure Reaktion ertheilend. Die wässrige Lösung wird mit verdünnter (1:1000) Eisenchloridlösung grün (Tannentheer wird roth), ebenso Wacholdertheer. Birkentheer ist in Anilin nicht vollkommen löslich (Wacholdertheer ist völlig löslich). Enthält Guajaköl, Kreosöl, Kresol, Xylenol und wahrscheinlich auch Spuren von Phenol.

Anwendung Aussserlich bei Hautkrankheiten an Stelle des Tannen- oder Wacholdertheers. Hier und da in der Volksmedizin als Wurmmittel und gegen Kolik der Hausthiere. In Russland in grossem Umfange bei der Fabrikation des Juftenleders verwendet. Bestandtheil des Aromas für künstlichen Rum.

Zur Herstellung einer wässrigen Lösung löst man in 100 Th. Birkentheer 50 Th. Colophonium unter öfterem Umschütteln bei Zimmertemperatur oder unter Erwärmen und fügt dann eine Lösung von 6–8 Th. Natriumhydrat in 12–16 Th. Wasser hinzu.

Essentia Rusci Birkentheer 10,0, Weingeist 100,0. Nach dem Absetzen filtrirt man. Dient zur Bereitung des Rumessenz.

Oleum lateritium, Ol. Lam. empyreumaticum, Ol. philosophorum. Ziegelöl (Regenwurmöl, Sehnöl, Schwarzes Schneckenöl). Man verabfolgt gewöhnlich eine Mischung aus Rüböl 100, Birkentheer 3 Th.

Oleum Terebinthinae compositum, Renköl, Recköl, Trecköl. Terpentinöl 100, Birkentheer 5 Th. Volksmittel. Ausserlich, selten innerlich zu 10–15 Tropf.

Rother Juftenlack. (Diet) Sandarak 100, Mastix 50, Larchenterpentin 20, Elemi, Ricinusöl je 5, Weingeist (90 proc) 850. Man löst, fügt rektifiziertes Birkentheeröl 10, Fuchsin 5, hinzu, filtrirt und bringt mit Weingeist auf 1000. Vor dem Lackiren ist das Leder mit Benzin zu entfetten.

Sapo ungguinosus cum Oleo Rusci (Diet) Birkentheermölhn Birkentheerbalsam-seife Mölhn 90, Birkentheer 10.

Spiritus Rusci (Form mag Berol) Birkentheer, Weingeist $\overline{\text{aa}}$ 25,0. Aeusserlich.
Tinctura Rusci (Bad. Erganz. Taxe) Birkentheer 1, Aetherweingeist 2, Lösen und Filtriren.

Tinctura Rusci (HEBRA), HEBRA's Birkenölkantur Lavendelöl, Rautenöl, Rosmarinöl je 1, rektific. Birkenöl 25, Aether, Weingeist je 36.

Unguentum cum Oleo Rusci (WOLFF), WOLFF's Theerpomade Wachsalbe 42, Birkentheer 8.

Betulinai von GROSCH und REICHARDT zur Hautpflege. Enthält nach Angabe der Hersteller Salicyl-Menthol-Betulin, Borglycerin, Birkentinktur, aromatis. Birkenwasser.

Gichtbalsam RADIES ist ein mit Ol. Rusci geschütteltes Gemisch von Ruböl und Terpentnöl.

Noortwyks Diphtherieheilmittel soll aus Birkentheer, Kreosot und Spiritus bestehen.

II Betula lenta L. Hemisch im atlantischen Nordamerika. **Sweet Birch, Black Birch, Mountain Mahogany, Zuckerbirke.** Die Rinde enthält 0,6 Proc. eines ätherischen Oeles vom spec. Gew. 1,18—1,187. Dasselbe enthält 99,8 Proc. Methylsalicylat, ferner ein Paraffin $\text{C}_{30}\text{H}_{62}$ und einen Ester $\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{O}_2$. Die Rinde soll das Methylsalicylat in Form eines Glykosides enthalten, aus dem es durch ein ebenfalls in der Rinde enthaltenes Ferment in Freiheit gesetzt wird.

Anwendung des Oeles. Wie das aus *Gaultheria procumbens* gewonnene fast identische Öl oder das synthetisch dargestellte Methylsalicylat. Aus dem Saft des Baumes gewinnt man Zucker.

Unguentum ad Ekzema Mammæ	
℞ Ol. Rusci	
Sulf. præcipitati	$\overline{\text{aa}}$ 5,0
Vaselinum	
Lanolinum	$\overline{\text{aa}}$ 15,0

Bismutum.

I Bismutum technicum. Wismut. Bismut. Marcasita. Bl. Atomgew. = 208. Das technische Wismutmetall wird besonders von den sächsischen Blaufarbenweken Oberschlema und Pfannenstiel erzeugt und enthält stets grössere oder kleinere Mengen fremder Elemente (Schwefel, Arsen, Antimon, Tellur, Nickel, Eisen, Blei, Kupfer, Silber, Zinn) als Verunreinigung. Wenn die Gesamtmenge der Verunreinigungen nicht mehr als 5 Proc. beträgt, so beeinflussen sie die Verarbeitung zu Wismutpräparaten nicht, andernfalls muss das Wismut gereinigt werden.

II Bismutum depuratum seu purificatum. Gereinigtes Wismutmetall. **Bismuth purifié** (Gall.) 100 Th. des in einem eisernen Mörser zu grobem Pulver gestossenen Wismuts werden mit 5 Th. gepulvertem Kalisalpeter und 2 Th. Natronsalpeter gemischt. Diese Mischung trägt man in einen Hessischen Tiegel ein und erhitzt im Kohlefeuer zum Schmelzen. Die Schmelze wird öfters mit einem thönernen Pfeifenstiel oder mit einem erwärmten Porcellanstab umgerührt, schliesslich lässt man den Tiegel $\frac{1}{2}$ Stunde bedeckt in der Schmelzhitze stehen, damit sich die Schlacke absetzen kann. Nach dieser Zeit giesst man das Metall unter der Schlacke vorsichtig auf einen erwärmten Teller aus. Nach dem Erkalten beseitigt man die Schlacke zunächst durch mechanisches Auslesen, das hinterbleibende Metall wird zerstoßen, durch Digeriren mit 5 procentiger Salzsäure, darauffolgendes Waschen und Trocknen von der Schlacke befreit, nöthigenfalls in einem innen berusteten Tiegel nochmals eingeschmolzen.

III Bismutum purum. Man löst Wismutnitrat (oder Subnitrat) in salpetersäurehaltigem Wasser und trägt diese Lösung in überschüssige Ammoniakflüssigkeit ein. Das

gefallte Wismuthhydroxyd wird völlig ausgewaschen, alsdann mit 8 proc Natronlauge, welche $\frac{1}{12}$ Volumen Glycerin enthält, in Lösung gebracht, diese Lösung wird mit dem 4--5fachen Gewichte des angewendeten Wismuts an Traubenzucker versetzt und zum Sieden erhitzt. Das Wismut fällt als graues Pulver aus, welches zuerst mit Natronlauge haltendem, später mit Schwefelsäure enthaltendem, endlich mit reinem Wasser gewaschen und getrocknet wird. Wenn nöthig, kann es noch in einem innen berusteten Tiegel umgeschmolzen werden.

Eigenschaften. Stark glänzendes, rothlich-weisses, sprodes Metall von gross blätterig krystallinischem Gefüge. Es lässt sich im Eisenmörser pulvern, im völlig reinen Zustande ist es etwas hammerbar. Es schmilzt bei 268°C und erstarrt bei 242°C unter bedeutender Ausdehnung, bei Weissgluthitze verdampft es. An der Luft oxydirt es sich nicht, dagegen wird es von Schwefelwasserstoff gebräunt. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit bläulicher Flamme zu Wismutoxyd. In verdünnter luftfreier Salzsäure und desgl. Schwefelsäure ist es unlöslich. Von heisser conc. Salzsäure wird es nur wenig unter Entwicklung von Wasserstoff angegriffen. Von conc. Schwefelsäure wird es beim Erhitzen unter Entwicklung von Schwefeldioxyd zu Wismutsulfat gelöst. Massig conc. Salpetersäure löst es in der Kälte sowohl wie in der Wärme zu Wismutnitrat unter Entwicklung von Stickoxyden. Durch Kupfer, Zink, Zinn, Eisen, Blei, Cadmium wird das Wismut aus seinen Salzlösungen als Metall gefällt. Das spec. Gewicht ist $= 9,75$.

Prüfung. Zur Feststellung der Verunreinigungen des Wismuts mischt man 10,0 des gepulverten Metalls mit 1,5 gepulvertem Kalisalpeter und 1,5 gepulvertem Nationsalpeter und schmilzt im Porcellantiegel. Die erkaltete Schmelze wird zerkleinert und die Schlacke von dem Metall abgeschlämmt. Diese die Schlacke enthaltende Flüssigkeit dampft man ein und nimmt den Rückstand mit circa 20 proc. Salpetersäure unter Digestion auf (ungelöst bleiben Zinn und Antimon). Das Filtrat verdünnt man mit einem gleichen Volum Wasser (erfolgt eine Trübung, so bringt man dieselbe durch Zusatz von Salpetersäure zum Verschwinden) und versetzt mit Salzsäure. Eine dadurch entstehende Trübung oder ein Niederschlag ist Chlorsilber. Die davon abfiltrirte Flüssigkeit wird mit Ammoniak neutralisirt, mit Salzsäure sauer gemacht, bis zum Aufkochen erhitzt und noch heiss mit Schwefelwasserstoff übersättigt. Die abgeschiedenen Metallsulfide werden gesammelt, daraus durch Digestion mit Ammonbikarbonat das Schwefelarsen, hierauf durch Maceration mit Schwefelammonium eine etwaige Spur Schwefelzinn extrahirt, die rückständigen Metallsulfide in Salpetersäure gelöst, die verdünnte Lösung mit Natriumsulfatlösung versetzt und einige Stunden bei Seite gestellt, um dem Bleisulfat Zeit zum Absetzen zu gewähren. Die durch Filtration vom Bleisulfat gesonderte Flüssigkeit wird mit einem Ueberschuss Aetzammon versetzt. Eine weisse Fällung rührt von Wismuthhydroxyd her, eine blaue Färbung der Flüssigkeit zeigt Kupfer an. Aus der oben mit Schwefelwasserstoff behandelten sauren, von den Metallsulfiden befreiten Flüssigkeit werden [nach der Uebersättigung mit Ammon] Eisen, Nickel, Zink durch Schwefelammonium abgeschieden.

Die Prüfung des Wismuts auf Arsengehalt lässt sich auch in der Weise ausführen, dass man circa 2,0 des zerkleinerten Metalls in einem Probircylinder vorsichtig bis zum Schmelzen erhitzt und in dieser Temperatur einige Minuten erhält. Bei Gegenwart von mehr als Spuren Arsen bildet sich im kalteren Theile des Cylinders ein Beschlag von Aesengssäure. — Man sprengt den oberen Theil des Probirglases ab, bringt die arsenige Säure durch Kochen mit 12 proc. Salzsäure in Lösung und fällt diese mit Schwefelwasserstoff.

Erkennung und Bestimmung. A) Man erkennt das Wismut an folgenden Reaktionen. Wird eine Wismutverbindung mit Natriumcarbonat vermischt auf Kohle vor dem Löthrohr der Reduktionsflamme ausgesetzt, so erhält man weisse, sprode Metallkörner, zugleich einen gelben, in der Hitze orangegelben Beschlag von Wismutoxyd. Die Lösungen der Wismutsalze zeigen folgendes Verhalten: 1) Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniak fällen weisses Wismuthhydroxyd Bi(OH)_3 . 2) Natriumcarbonat oder Ammoniumcarbonat fällen weisses basisches Wismutcarbonat $(\text{BiO})_2\text{CO}_3$. 3) Kaliumdichromat fällt basisches Wismutchromat $(\text{BiO})_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, leicht löslich in verdünnter Salpetersäure, unlöslich in Kali- oder Natronlauge (Unterschied von Bleichromat). 4) Schwefelwasserstoff oder Schwefel

ammonium fallen in saurer oder neutraler Lösung schwarzes Wismutsulfid, unlöslich in Alkalien und in Kaliumcyanid, löslich in heisser Salpetersäure 5) Die Lösungen der neutralen Wismutsalze werden, falls nicht zu grosse Mengen freier Säure vorhanden sind, durch Zugabe von viel (!) Wasser unter Abscheidung unlöslicher basischer Salze zerlegt (getrübt). Diese Reaktion ist am empfindlichsten beim Wismutchlorid. Entsteht in salpetersauren Lösungen beim Verdünnen mit Wasser keine Ausscheidung, so tritt diese fast stets so gleich auf Zusatz von Natriumchlorid- oder Ammoniumchloridlösung ein. Weinsäure verhindert die Fällung der Wismutverbindungen durch Wasser nicht (Unterschied vom Antimon).

B) Man bestimmt das Wismut, indem man es aus der sauren, mit Essigsäure enthaltendem Wasser stark verdünnten Lösung durch Schwefelwasserstoff fällt. Das ausgefallene Wismutsulfid wird in Salpetersäure gelöst, die durch Erwärmen vom Schwefelwasserstoff befreite Lösung wird mit Ammoniak gefällt und das gewaschene und getrocknete Wismuthydroxyd durch Glühen im Porcellantiegel (!) in Wismutoxyd verwandelt. $\text{Bi}_2\text{O}_3 \times 0,89655$ ist $= \text{Bi}$. Durch direktes Glühen kann man den Gehalt an Wismutoxyd bestimmen im Wismutnitrat, Wismuthydroxyd, Wismutoxyd, Wismutkarbonat, in allen organischen Wismutsalzen mit nicht verkohlenden Säuren.

Unter Umständen kann es sich auch empfehlen, das Wismut als metallisches Wismut zu wägen. In solchen Fällen schmilzt man das zu reduzierende Wismutoxyd, Wismutoxychlorid oder Wismutsulfid mit der 6fachen Menge Cyankalium einige Zeit in einem gewogenen Porcellantiegel, laugt die erkaltete Schmelze mit Wasser aus, wäscht das metallische Wismut zunächst mit Wasser, dann mit verdünntem, schliesslich mit starkem Weingeist, sammelt auf gewogenem Filter, trocknet und wägt. Tiegel + Filter + Wismut minus Tiegel + Filter giebt die Menge des gefundenen Wismuts an. Hat man bei der ersten Schmelze nicht gut charakterisierte Metallkörner, sondern nur ein schwarzes Pulver erhalten, so wiederholt man die Schmelzoperation.

Wismut-Legierungen. Die Legierungen des Wismuts zeichnen sich durchweg durch einen niedrigen Schmelzpunkt aus. Hierdurch wird in vielen Fällen ihre technische Verwendung erklärt.

ROSE's Metall. Wismut 50,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Schmelzp. 92°C . Durch Zusatz von 2,0 Quecksilber sinkt der Schmelzp. auf 55°C .

NEWTON's Metall. Wismut 80,0, Blei 50,0, Zinn 30,0. Schmelzp. $94,5^\circ \text{C}$. Oder Wismut 80,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Schmelzp. $91,6^\circ \text{C}$.

WOOD's Metall. Wismut 150,0, Blei 80,0, Zinn 40,0, Cadmium 80,0. Schmelzpunkt 60°C .

BIBBA's Münzabguss-Metall. Wismut 60,0, Blei 130,0, Zinn 30,0.

Lettern-Metall. Kupfer 4,62, Blei 57,8, Wismut 1,16, Antimon 17,34, Zinn 11,56, Nickel 4,62, Kobalt 2,90.

Wismutbronze, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kupfer 52,0, Nickel 30,0, Zinn 12,0, Blei 5,0, Wismut 1,0.

Wismut-Amalgam. Quecksilber 100,0, Zinn 175,0, Blei 310,0, Wismut 500,0. Schmelzp. $70,0^\circ \text{C}$. Dient zum Ausspritzen anatomischer Präparate. Oder Quecksilber 200,0, Wismut 120,0, Blei 40,0, Zinn 70,0.

LIPOWITZ' Legierung. Cadmium 30,0, Zinn 40,0, Wismut 150,0, Blei 80,0. Als Metallblatt und als Sperrfugigkeit an Stelle von Quecksilber.

Cliché-Metall für Holzschnitte, Gips-, Thon-, Schwefelformen. 50 Wismut, 30 Blei, 20 Zinn. Schmelzp. 92°C (also das ROSE'sche Metall) oder 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinn. Behufs Herstellung eines Clichés wird der Holzschnitt in eine Legierung aus 60 Blei und 10 Antimon in dem Augenblicke eingedrückt, in welchem die Legierung zu erstarren beginnt. Diese Matrize wird dann mit einem kräftigen Schläge auf das Cliché-Metall in dem Augenblicke seines Erstarrens oder Teigigwerdens gepresst, oder die Matrize wird schwach mit Lampenruss bedeckt und das Cliché-Metall darauf gegossen.

Schnellloth (geben nicht dauerhafte Lötungen)

1	Wismut	1	Blei	1	Zinn	—	Schmelzp	124°C
1	"	2	"	2	"	—	"	145°C
1	"	3	"	3	"	—	"	255°C
1	"	4	"	4	"	—	"	269°C

Loth für Orgelbauer 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinn
Legirung zum Ausfüllen der Löcher in Metallguss 10 Wismut, 30 Antimon, 80 Blei
ENASTROM'S Tutania oder Königinmetall. 9 Wismut, 71 Blei, 885 Zinn und 85 Kupfer
Metallschmiere 50 Wismut, 50 Blei, 50 Zinn, 40 Cadmium Schmelzp 65,5° C
Wickersheimer Metall Wismut 8,0, Blei 3,0, Zinn 2,0, Quecksilber 2,0

Bismutum albuminatum.

Bismutum albuminatum. Wismut-Albuminat. Wismut-Eiweiss. Eine Verbindung von Wismutoxyd mit Eiweiss von unbestimmter Zusammensetzung

Darstellung 25 Th Bismutum citricum ammoniacatum werden in möglichst wenig Wasser gelöst und mit einer filtrirten wässrigen Lösung von 75 Th Albumen Ovi siccum Ph G III gemischt Diese Mischung wird bei niedriger Temperatur, am besten im Vacuum, zur Trockne verdunstet

Eigenschaften Grauwisses, schwach sauer reagirendes Pulver, aus einem Gemisch eines wasserlöslichen Wismutdoppelsalzes mit Eiweiss bestehend In Wasser meist trübe löslich infolge eines Gehaltes an unlöslich gewordenem Eiweiss

Das Handelspräparat enthält 10—12 Proc Wismut

Anwendung. Bismutum albuminatum wirkt als mildes Wismutpräparat und wird besonders bei Magen- und Unterlebskrämpfen in der Dosis von 0,3—1 g täglich 3—4mal gegeben

Bismutum carbonicum.

Bismutum carbonicum (Ergänzb) Bismuthi Carbonas (Brit) Bismuthi Subcarbonas (U-St) Wismutsubkarbonat. Ist je nach der Bereitung von verschiedener Zusammensetzung, durchschnittlich etwa $\text{CO}_2(\text{BiO})_2 + \frac{1}{4}\text{H}_2\text{O}$ Zur Darstellung rührt man 100 Th krystall Wismutnitrat mit Wasser zu einem feinen Brei an und trägt diesen in kleinen Antheilen unter Umrühren in eine heisse, filtrirte Lösung von 50 Th Ammoniumkarbonat in 1000 Th Wasser ein Man digerirt etwa 1—2 Stunden (Umrühren!) im Wasserbade, wäscht aus und trocknet Ausbeute 55 Th

Eigenschaften. Weisses oder gelblichweisses, amorphes Pulver, ohne Geruch, specifisch schwer Unlöslich in Wasser oder Weingeist, löslich in Salpetersäure oder Salzsäure unter Aufbrausen Beim Glühen hinterlässt es citronengelbes Wismutoxyd Es fordern Ergänzb > 85 Proc U-St = 87—91 Proc Bi_2O_3 Brit lässt die Bestimmung als Wismutsulfid ausführen und verlangt 99 Proc Bi_2S_3 entsprechend 89,7 Proc Bi_2O_3

Prüfung. 1) Beim Erwärmen mit Kalilauge entwickle es nicht den Geruch nach Ammoniak 2) Wird eine mit verdünnter Schwefelsäure hergestellte Lösung von 1 g des Salzes mit 2 cem konc Schwefelsäure gemischt und nach dem Erkalten mit 2 cem Ferro-sulfatlösung überschichtet, so darf keine braune Zwischenzone auftreten (Salpetersäure) 3) Wird 1 g des Salzes in Salpetersäure gelöst und die Lösung mit Ammoniak im Ueberschuss gefällt, so darf das Filtrat durch Natriumphosphatlösung nicht getrübt werden (Magnesiumkarbonat) 4) Auf die übrigen metallischen Verunreinigungen ist die salpetersaure Lösung wie unter Bismutnitrat angegeben zu prüfen

Aufbewahrung. Vor Schwefelwasserstoff geschützt **Anwendung.** Wirkt etwa wie Wismutsubnitrat, aber zugleich saurethigend Man giebt es zu 0,3—1,0 g dreimal viermal täglich in Pulvern

Pastilli Bismuti carbonici 1,0 g schwere Pastillen aus Kakao Masse, je 0,25 g Bismutcarbonat enthaltend

Bismutum citricum.

I Bismutum citricum. Wismutcitrat. Citrate de bismuth. Bismuthi Citras (U-St) $C_6H_5O_7Bi$ Mol Gew. = 397

100 Th Wismutsubnitrat werden mit 70 Th Citronensäure und 400 Th. Wasser 15 Minuten oder so lange gekocht, bis ein Tropfen der Flüssigkeit sich in Ammoniakflüssigkeit klar auflöst. Dann giebt man 5000 Th Wasser hinzu, lässt absetzen, wäscht den Niederschlag, bis das Waschwasser geschmacklos abläuft, und trocknet den Rückstand bei 50—60° C (U-St)

Weisses, amorphes oder mikrokristallinisches Pulver, ohne Geruch und Geschmack, luftbeständig. Unlöslich in Wasser oder in Alkohol, löslich in Ammoniakflüssigkeit und in den Lösungen der Alkalicitrate

II Bismutum-Ammonio-citricum Ammonium-Wismutcitrat Bismuthi et Ammonii Citras (U-St) Man rührt 100 Th Wismutcitrat mit 200 Th Wasser zu einem Brei an, erwärmt die Mischung auf dem Wasserbade und giebt soviel Ammoniakflüssigkeit hinzu, bis das Salz gelöst und die Lösung neutral oder nur schwach alkalisch ist. Man filtrirt alsdann, dampft im Wasserbade zum Sirup ein, und verwandelt diesen durch Aufstreichen auf Glasplatten und Trocknen in Lamellen — Durchsichtige farblose Blättchen, an der Luft undurchsichtig werdend, leicht löslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol

Liquor Bismuthi et Ammonii Citratis (Brit) **Liquor Bismuti.** Man löst 70 Th Wismutsubnitrat in 150 Th Salpetersäure von 25 Proc und setzt zu dieser Lösung unter Umrühren solange Wasser hinzu, bis sie beginnt sich zu trüben. Dann fügt man eine Lösung von 70 Th Kaliumcitrat und 20 Th Kaliumkarbonat in wenig Wasser hinzu und erhitzt bis zum Sieden. Nach dem Erkalten wird der erzeugte Niederschlag mit Wasser bis zur völligen Entfernung der Salpetersäure gewaschen, alsdann fügt man Ammoniakflüssigkeit bis zur Auflösung bez. Neutralität hinzu, füllt mit Wasser auf 1000 Th auf und filtrirt — Neutrale oder schwach alkalische Flüssigkeit von schwach metallischem Geschmack, spec Gew 1,070 Enthält in 1 cem = 0,05 g Wismutoxyd

Bismutum citro-boricum. Natrium-Wismutetropypyroborat 399 Th Wismutcitrat und 382 Th Borax werden gemischt und in einer hinreichenden Menge Wasser gelöst. Man filtrirt, dampft zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet

Liquor Ferri et Bismuti citrici 100 Th des Liquor Bismuti et Ammonii citrici, 5 Th Ferrum citricum und 2 Th Ammoniakflüssigkeit (0,96) werden im Dampfbade auf 100 Th eingedampft. Zu 4—8,0 g mit Wein bei Dyspepsie und Gastralgie der Phthisiker

Liquor Bismuti citrici kalicius Liquor bismuticus ad capillos 10 Th Wismutsubnitrat und 150 Th Glycerin werden gemischt und unter Erwärmen im Wasserbade mit soviel Kalilauge versetzt, dass Auflösung erfolgt. Dann macht man mit Citronensäure schwach sauer, neutralisirt wieder mit Kalilauge und füllt mit Wasser auf 300 Th auf. Zum Braunfärben der Haare 2—3 mal wöchentlich aufzutragen

Liquor Bismuti natrico glycerinatus. Alkalische Wismutlösung. Reagens auf Traubenzucker. Man digerirt im Wasserbade 10 Th Wismutsubnitrat, 30 Th Glycerin, 50 Th Natronlauge von 1,333 spec Gew und 110 Th Wasser. Die filtrirte Lösung soll = 200 Th betragen. Sie giebt beim Erhitzen mit Traubenzucker Ausscheidung von metallischem Wismut

Bismutum oxydatum.

I Bismutum hydroxydatum Bismutum oxydatum hydratum. Wismuthydroxyd. Oxyde de bismuth hydraté (Gall) BiO_3H Mol Gew. = 241.

Man löst 100 Th kryst Wismutnitrat in einer Mischung von 380 Th Salpetersäure (25 Proc) und 670 Th Wasser. Diese Lösung wird mit soviel Ammoniakflüssigkeit versetzt, dass diese deutlich vorwaltet. Man lässt einige Zeit stehen, filtrirt oder colirt den Niederschlag ab, wäscht ihn vollständig aus und trocknet ihn bei 80—70° C (Gall)

Weisses, neutrales, geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver. Löst sich in Säuren unter Bildung der betreffenden Wismutsalze. Frischgefalltes Wismuthdioxyd löst sich bei Gegenwart von genügender Menge Glycein in Natronlauge auf (s S 484). Wird namentlich in frischgefalltem Zustande zur Darstellung einiger wichtiger Wismutsalze verwendet. — Da die Verbindung rund 96 Proc Wismutoxyd enthält, so wird sie in der Technik bisweilen anderen Wismutsalzen (z. B. dem Wismutsubnitrat) zugemischt, um dieselben auf den vorgeschriebenen Gehalt an Wismutoxyd zu bringen.

II Bismutum oxydatum. Wismutoxyd. Bismuthi Oxydum (Bist) Bi_2O_3 . Mol. Gew. = 464. Zur Darstellung kocht man Wismutsubnitrat mit einem Ueberschuss von Natronlauge einige Zeit, wäscht das Wismutoxyd mit Wasser und trocknet es (Bist). Specifisch schweres, citronengelbes, mikrokrySTALLINISCHES Pulver, welches sich beim Erhitzen vorübergehend dunkler färbt. In Mineralsäuren löslich, in Wasser und den Alkalien fast unlöslich.

Intestin. Gemisch aus Wismutoxyd, Benzoesäure und Naphthalin (Darm-Antisepticum).

Bismutum nitricum.

I † Bismutum nitricum crystallisatum Bismutum trisnitricum. Krystallisirtes (oder neutrales) Wismutnitrat oder kryst. salpetersaures Wismut. Azotate de Bismuth neutre. Bismuthi trinitrias $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 5\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 484.

Darstellung. Man giebt in einen nicht zu dünnwandigen Kolben von 5 Liter Fassungsraum 2500 g Salpetersäure von 1,20 spec. Gew. Diesen Kolben setzt man schräg in ein Wasserbad oder Sandbad ein und heizt langsam an. Wenn die Temperatur der Säure = 80°C ist, so stellt man die Feuerung ab und trägt in die Säure allmählich, in kleinen Antheilen, aber ohne Unterbrechung, 500 g grob gepulvertes und gesiebtes (!) Wismut-Metall ein, dessen Auflösung unter stürmischer Entwicklung von Stickstoffoxyden erfolgt. (Daher Ausföhrung dieser Operation unter einem Abzuge oder im Freien!) Wenn es nöthig werden sollte, kann man die vollständige Auflösung des Metalles durch nochmaliges Anwärmen des Kolbenninhaltes unterstützen.

Ist alles oder nahezu alles gelöst, so erhitzt man die Lösung kurze Zeit zum Sieden, lässt sie erkalten und stellt sie in einer starkwandigen (!) Flasche so lange zum Absetzen, bis sie vollkommen klar geworden ist. (Ein weisser Bodensatz besteht aus Wismutarseniat!) Man filtrirt alsdann die Lösung durch Papier, Collodiumwolle, Glaswolle oder Asbest und dampft das klare Filtrat bis zur Krystallisation ein. — Die erhaltenen Krystalle werden in einem Trichter gesammelt und nach dem Abtropfen der Mutterlauge einige Male mit kleinen Mengen einer Mischung von 7 Th. Wasser und 2 Th. Salpetersäure nachgewaschen. Dann trocknet man sie durch Walzen auf Filtrirpapier und bringt sie in gut zu verschliessenden Gefässen unter (Germ).


Die Mutterlaugeu liefern beim Eindampfen weitere Mengen von Krystallen. Aus der letzten Mutterlauge fällt man das Wismut durch Natriumkarbonat als Wismutkarbonat.

Eigenschaften. Grosse, farblose, durchsichtige, etwas feucht aussehende säulenförmige Krystalle. Sie schmelzen bei 78°C in ihrem Krystallwasser, gehen bei 80°C Salpetersäure und Wasser ab unter Uebergang in ein basisches Wismutnitrat $\text{BiONO}_3 + \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$. Ueber 260°C hinaus tritt weitere Zersetzung ein. In wenig Wasser oder in Salpetersäure oder in Eisessig zu einer stark sauren Flüssigkeit löslich, die durch Zusatz von viel Wasser unter Abscheidung von basischem Wismutnitrat getrübt wird. Löslich auch in 5 Th. Glycein. Diese Lösung kann, ohne dass sie alsbald getrübt wird, mit ziemlich viel Wasser verdünnt werden. — Die Prüfung erfolgt wie bei dem folgenden Präparate. Aufbewahrung. Vorsichtig.

II. Bismutum subnitricum (Austr. Germ. Helv.). Azotate (sous) de bismuth (Gall.). Bismuthi Subnitratis (Brit. U-St.). Bismutum nitricum praecipitatum. Basisches Wismutnitrat. Basisch-salpetersaures Wismut(oxyd). Magisterium Bismuti. Wismut-Weiss.


Darstellung. 100 Th. kryst. Wismutnitrat werden in einem Porcellan-Mörser mit 400 Th. kaltem destillirten Wasser feingerieben, bez. zu einer gleichmässigen Flüssigkeit angerieben. Diese Flüssigkeit trägt man in mehreren Absätzen unter Umrühren in 2100 Th. siedendes Wasser ein. Von dem entstandenen Niederschlag wird nach völligem Absetzen und Erkalten die überstehende Flüssigkeit abgezogen. Alsdann sammelt man den Niederschlag auf einem Kolatorium oder einem Filter, wäscht ihn mit dem ihm gleichen Volumen kalten Wasser aus, lässt abtropfen und trocknet bei 80° C. unter möglichstem Schutze vor Schwefelwasserstoff (Germ.).

Aus der Mutterlauge schlägt man das in dieser gelöste Wismut entweder durch Natriumkarbonat oder durch Ammoniak nieder. — Bei der im Vorstehenden beschriebenen Fällung des Wismutnitrates ist sowohl die Temperatur als auch die Menge des anzuwendenden Wassers genau einzuhalten.




K.Wn

Fig. 116.
Wismutsubnitrat aus kalter
Flüssigkeit gefällt.
120fache Vergrösserung.



W.Wn

Fig. 117.
Offic. Präparat.
Wismutsubnitrat aus 80—90° C.
heisser Flüssigkeit gefällt.
120fache Vergrösserung.



h.Wn

Fig. 118.
Wismutsubnitrat aus kochend-
heisser Flüssigkeit gefällt.
120fache Vergrösserung.

Eigenschaften. Die physikalische Beschaffenheit des Wismutsubnitrates hängt von den Fällungsbedingungen, namentlich von der Menge und der Temperatur des zur Fällung verwendeten Wassers ab. Je niedriger die Fällungstemperatur ist, desto grobkörniger fällt auch das Präparat aus. Ausserdem enthält das bei Siedehitze gefällte Wismutsubnitrat mehr Wismuthydroxyd als das bei niedriger Temperatur erhaltene. Die physikalische Beschaffenheit des Präparates ist nicht ohne Einfluss auf seine Auflöslichkeit in Säuren und wohl auch auf seine therapeutische Wirkung.

Schneeweisses, lockeres, krystallinisches Pulver, ohne Geruch und fast ohne Geschmack, unter dem Mikroskop kleine glänzende, rhombische Prismen darstellend. Gegen Lackmus von saurer Reaktion. Vom Sonnenlichte wird es nicht verändert. (Im Lichte grau werdendes Wismutsubnitrat ist durch Silberchlorid verunreinigt.) Unlöslich in Wasser, Alkohol, Glycerin (s. S. 488), löslich in mässig verdünnter Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure. Es besteht aus etwa 79—82 Proc. Wismutoxyd Bi_2O_3 , 15—17 Proc. Salpetersäure N_2O_5 und 4—5 Proc. Wasser. Bei 100° C. schon entweichen etwa 3—5 Proc. Salpetersäure + Wasser, bei höherer Temperatur tritt völlige Zersetzung ein, so dass lediglich citronengelbes Wismutoxyd hinterbleibt. Die einzelnen Pharmakopöen normiren den Gehalt des Präparates an Wismutoxyd Bi_2O_3 , wie folgt:

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U-St.
Proc. Bi_2O_3	—	76,1	76,78	79—82	80,0	79—82

Als Ausdruck der chemischen Zusammensetzung des Präparates wird in der Regel die Formel $\text{BiO}(\text{NO}_3) + \text{H}_2\text{O}$ angenommen.

Prüfung 1) Das Vorhandensein von Wismutoxyd, Salpetersäure und Wasser kann man einfach durch Glühen des Präparates feststellen. Hiermit wurde sich die Bestimmung des Wismutoxydgehaltes verbinden lassen, welche durch Glühen von 1 g des Präparates im Porcellantiegel bis zum konstanten Gewicht auszuführen ist. 2) Es sei geruchlos. 1) Bisweilen nimmt ein Wismutsubnitrat im Verlauf der Aufbewahrung einen von Salpetersäure herrührenden Geruch nach Chlor oder Jod an. Ein solches Präparat lässt sich wieder geruchlos machen, wenn man es in dünner Schicht auf Porcellantellern ausbreitet und an einem warmen Orte trocknet. 3) 0,5 g des Wismutsubnitrates sollen sich bei 15–16°C in 25 ccm verdünnter Schwefelsäure klar und ohne Entbindung von Kohlensäure auflösen. Ein Theil dieser Lösung wird mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt, es darf keine Blaufärbung auftreten, anderenfalls wäre Kupfer zugegen. Ein anderer Theil wird mit Wasser verdünnt. Alsdann fällt man das Wismut durch Schwefelwasserstoff vollständig aus. Das vom Wismutsulfid gewonnene Filtrat darf wagbare Mengen eines glühbeständigen Abdampf-Rückstandes nicht hinterlassen, anderenfalls könnten Salze der Alkalien oder alkalischen Erden zugegen sein. Wir mochten hierzu bemerken, dass eine völlige, klare Auflösung von Wismutsubnitrat in den vorgeschriebenen Mengen verdünnter Schwefelsäure bei vielen grobkörnigen Präparaten fast nicht möglich ist. 4) 0,5 g basisches Wismutnitrat werden in 5 ccm Salpetersäure gelöst, die Lösung muss klar sein und darf auf Zusatz von 0,5 ccm Silbernitratlösung höchstens opalisirend getrübt (Chlor), sowie durch 0,5 ccm einer mit der gleichen Gewichtsmenge Wasser verdünnten Baryumnitratlösung nicht getrübt werden (Schwefelsäure). Die Verdünnung der Baryumnitratlösung ist nothwendig, weil sich sonst Baryumnitrat ausscheiden kann, welches in conc. Salpetersäure schwer löslich ist. — Mit Natronlauge im Ueberschusse erwärmt, darf 1 g des Präparates Ammoniak nicht entwickeln, d. h. die entweichenden Dämpfe dürfen feuchtes rothes Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniak). 5) Wird der Glührückstand von 1) zerrieben und in 3 ccm Zinnchlorür-Lösung gelöst, so darf innerhalb 1 Stunde braunliche Färbung nicht auftreten (Arsen). Der Nachweis des Arsens erfolgt indess zweckmässiger dadurch, dass man den Glührückstand in verdünnter Schwefelsäure auflöst und die Lösung in den Marsh'schen Apparat bringt. 6) Man löst 0,5 g Wismutsubnitrat in Salzsäure, kocht diese Lösung einige Minuten und versetzt sie noch heiss mit einer Lösung von schwefliger Säure. Es darf auch nach längerem Stehen weder eine rothe (Selen) noch eine schwarze Färbung (Tellur s. unten) eintreten.

Aufbewahrung Unter den indifferenten Arzneimitteln, vor Ammoniak und Schwefelwasserstoff wohl geschützt.

Anwendung. Die löslichen Wismutverbindungen wirken innerlich toxisch, dem so gut wie unlöslichen Wismutsubnitrat kommen toxische Eigenschaften kaum zu. Es wirkt äusserlich und innerlich adstringirend und wegen seiner Verwandtschaft zu Schwefel und vielen Verbindungen des letzteren desinficirend und desodorisirend.

Man wendet es an: Aeusserlich als Streupulver bei der Wundbehandlung, zu Einblasungen in den Kehlkopf, zum Desodoriren jauchiger Wunden, besonders in Körperhöhlen (beruht auf Bildung von Bi_2S_3), innerlich bei Dyspepsie, Magengeschwüren, Krebs, Brechdurchfällen, Darmschwüren.

Die Ausscheidung erfolgt bis auf Spuren durch die Faeces als Wismutsulfid, die Stühle sind daher schwarz gefärbt. Enthalt das Wismutsubnitrat Tellur, so nimmt nach dem Gebrauche der Athem unangenehmen Geruch an.

Bestimmung der Salpetersäure. 5 g Wismutsubnitrat werden in 100 ccm destillirtem Wasser suspendirt. Man setzt einige Tropfen Phenolphthaleinlösung hinzu und titirt unter Abkühlung mit Normal-Kalklauge, bis eine 10 Minuten lang beständige Rothfärbung auftritt. 1 ccm Normal Kalklauge zeigt 0,054 g N_2O_5 an.

Tablettes de sous-nitrate de Bismuth (Gall.) Bismuti subnitrici 10,0 g, Sacchari albi 90,0, Mucilaginis Tragacanthae 9,0, fiant pastilli 100.

QUESNEVILLE's Crème de Bismuth Ist das frisch, aus kalter Flüssigkeit gefällte, wenig ausgewaschene, noch feuchte Wismutsubnitrat. Französische Specialität gegen Diarrhöe. 5–10 g in 100 g Zuckersirup vertheilt, davon zweistündlich 1 Kaffeeleßel.

Aqua leniens externa

Rp	Bismuti subnitrici	1,0
	Aquae Amygdalarum amararum	
	Tincturae Digitalis	
	Tincturae Benzoes	aa 5,0
	Glycerini	25,0
	Aquae Rosae	100,0

Außerlich gegen Jucken, Abschälen der Haut,
Hautausschläge etc.

Enema cum Bismuto subnitrico

Rp	Bismuti subnitrici	10,0
	Opii pulverati	0,05
	Aquae	50,0
	Mucilaginis Gummi arabici	20,0

Zu einem Klystier bei Diarrhoe, Dysenterie

Injectio Bismuti Ricord

Rp	Bismuti subnitrici	15,0
	Aquae Rosae	200,0

M D S Umgeschüttelt täglich dreimal eine Ein-
spritzung bei Gonorrhoe

Injectio Bismuti (Form Berol.)

Rp	Bismuti subnitrici	5,0
	Aquae destillatae	195,0

Linctus Bismuti subnitrici

Rp	Bismuti subnitrici	1,0
	Mucilaginis Gummi arabici	
	Sirupi simplicis	aa 30,0
	Aquae destillatae	120,0

Umgeschüttelt täglich 1 Theelöffel bei Brechdurch-
fall der Kinder

Lotionum cosmeticum

gegen Sommersprossen und Hautflecke

Rp	Bismuti subnitrici	2,0
	Gummi arabici	4,0
	Aquae Rosae	30,0
	Glycerini	20,0
	Tincturae Benzoes	10,0

Hautflecke täglich ein- bis zweimal mit der um-
geschüttelten Mischung zu bestreichen

Pasta Bismuti Osthoff

Rp	Bismuti subnitrici	q s
----	--------------------	-----

Wird mit abgekochtem Wasser zu einem dicken
Brei angerieben und dieser mittels Pinsels auf
die Brandwunden aufgestrichen

Pulvis antioedematus Oppolzer

Rp	Bismuti subnitrici	1 25
	Morphini acencl	0,05
	Sacchari albi	5 0

Divide in partes aequales X Dreimal täglich ein
Pulver bei Herzweh

Pulvis antidiarrhoeus

Rp	Bismuti subnitrici	
	Calci carbonici	aa 5,0
	Opii pulverati	0 25

Divide in partes aequales X Täglich zweimal vor
der Mahlzeit ein Pulver, bei chronischer Diar-
rhoe

Pulveres antidyseptici Gendrin

Rp	Bismuti subnitrici	5,0
	Concharum praeparatarum	8,5
	Fabae St Ignatii	1,0

Divide in partes XX Vor der Mahlzeit ein Pulver

Pulvis stomachicus (Form Berol.)

Rp	Bismuti subnitrici	
	Rhizom Rhei	aa 5,0
	Natrii bicarbonici	20,0

Unguentum Bismuti (München Vorschr.)

Pp	Bismuti subnitrici	5,0
	Unguenti lenientis	20,0

Morgens und abends einzureiben (auf Flechten,
und andere Hautausschläge, bei Hautgucken)

Unguentum contra intertriginem Guyon

Rp	Bismuti subnitrici	
	Zinci oxydati albi	aa 2,5
	Unguenti Glycerini	80,0

Unguentum pomadinum capillos fuscans

Rp	Bismuti subnitrici	5,0
	Olei Amygdalarum	gtt XV
	Unguenta pomadina	40,0
	Tincturae Catechu	5,0

D S Pomade zum Braunfärben des Haupthaars
(der Erfolg tritt langsam ein)

Trochisci Bismuti compositi (Brit.)

Rp	Bismuti carbonici	
	Magnesi carbonici ponderosi	aa 13 0
	Calci carbonici praecipitati	25,0
	Sacchari albi	52 0
	Gummi arabici	4,0
	Mucilaginis Gummi arabici	4,0
	Aquae Rosae q s ad Trochisc	100

PATERSON'S Pastillen 10,0 Wismutsubnitrat, 10,0 gebrannte Magnesia, 90,0 Zucker,
0,2 Tragant werden mit Pomeranzenblüthenwasser zu 100 Pastillen verarbeitet 5—10 Stück
den Tag über bei Dyspepsie und Gastralgie

PATERSON'S Pulver 5,0 Wismutsubnitrat, 5,0 gebrannte Magnesia und 80,0 Zucker

Physichrom. Haar Regenerierungsmittel von Apotheker Dr JOH LAMATSON in Wien,
zur Ruckerstattung der Natur-Haarfarbe Besteht aus 120 g einer klaren wasserhellen
Flüssigkeit, bereitet aus 1,2 kryst Wismutnitrat, 14 Glycerin, 20,0 Natriumthiosulfat, 2,8 g
salpetersaurem Alkali, 1,8 g Aetzalkali, und 81,7 g Wasser — und einer Vorbereitungs-
flüssigkeit Nr 1, aus 0,9 g Kochsalz, 3,1 g Aetznatron, 1,8 g kryst kohlenensaurem Natrium
und 74,2 g Wasser 6 Mk (HAGEN, Analyt)

Prinzessin-Wasser Waschwasser zur Erhaltung und Erzeugung eines reinen Teint's
Wismutsubnitrat 1,0, Talkpulver 15,0, Rosenwasser 150,0

Bismutum oxyjodatum.

I. † Bismutum oxyjodatum (Erganzb) **Wismutoxyjodid** **Basisches Wismutjodid** BiOJ Mol. Gew. = 351

Darstellung. 95,4 g krystallisiertes Wismutnitrat werden in der Kälte in etwa 120 ccm Essigsäure gelöst und unter Umrühren in eine Lösung von 38,2 g Jodkalium und 50 g Natriumacetat in 2 Liter Wasser unter Umrühren eingetragen. Jeder einfallende Tropfen bewirkt zuerst die Ausscheidung eines grünlich braunen Niederschlages, der sich beim Anfang der Operation sofort in einen citronengelben Niederschlag umwandelt. Bei fortschreitendem Zusatz der essigsäure Wismutlösung nimmt der Niederschlag allmählich lebhaft ziegelrothe Färbung an. Man lässt absetzen, wäscht das ausgeschiedene Wismut oxyjodid vorerst durch Dekantieren, dann auf einem Filter oder Kohlruch und trocknet es schliesslich bei 100°C .

Eigenschaften. Lebhaft ziegelrothes, specifisch schweres, nach Jod riechendes, in Wasser und in Weingeist, auch in Alkohol und in Chloroform unlösliches Pulver, welches im trockenen Probirrohr erhitzt violette Joddämpfe entwickelt unter Hinterlassung eines im wesentlichen aus Wismutoxyd bestehenden Rückstandes. Von conc. Mineralsäuren wird es namentlich beim Erwärmen unter Abscheidung von Jod, von Aetzkalken unter Bildung von Wismutoxyd zersetzt. Beim Schütteln mit verdünnter Schwefelsäure liefert es schwarz braunes Wismutjodid BiJ_3 .

Prüfung. 1) Werden 0,5 g mit 10 ccm Wasser geschüttelt, so darf das Filtrat nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitratlösung nur opalisirend getrübt werden (Chlor). 2) Wird 1,0 g des Salzes mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure geschüttelt, und das Filtrat mit der doppelten Raummenge conc. Schwefelsäure gemischt, alsdann 1 Tropfen Indigolösung zugefügt, so muss die Flüssigkeit deutlich blau gefärbt erscheinen (Salpetersäure). 3) Wird 1 g des Salzes mit 10 g Salpetersäure im Porcellantiegel zur Trockne gedampft und der Rückstand bis zu konstantem Gewicht gegluht, so müssen 0,66—0,675 g an Gewicht erhalten werden. 4) Der Glührückstand sub 3 wird durch Auflösen in Stannochloridlösung auf Arsen geprüft (s. S. 490).

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, vorsichtig (Erganzb).

Anwendung. Als ungiftiges, geruchloses Trocken-Antisepticum, dem Jodoform analog, bei eiternden Wunden, Ulcerationen in Substanz. Bei Gonorrhoe in Suspension mit Wasser (1:100). Innerlich zu 0,1—0,3 g mehrmals täglich bei Magengeschwüren und bei typhösem Fieber.

KRAUTS Reagens (Ersatz von DRASENDORFFS Reagens, s. S. 207, No. 13) Alkaloidreagens. 80 g Wismutsubnitrat werden in 200 g Salpetersäure von 1,18 spec. Gew. gelöst und die Lösung in eine conc. Lösung von 272 g Kaliumjodid eingegossen. Nach dem Auskrystallisiren des Salpeters wird die Flüssigkeit filtrirt und mit Wasser auf 1 l aufgefüllt.

Bei der Anwendung ist die zu fällende Alkaloid-Lösung mit so viel verdünnter Schwefelsäure zu versetzen, dass diese nach Zersetzung etwa vorhandener Salze im Ueberschuss vorhanden ist.

II. † Bismutum oxyjodatum subgallicum **Wismutoxyjodidgallat.** Airol $\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_3\text{CO}_2\cdot\text{Bi}(\text{OH})\text{J}$. Mol. Gew. = 521.

Darstellung. 850 Th. Wismutoxyjodid werden im frischgefallten Zustande mit etwa 500 Th. Wasser und 188 Th. Gallussäure im Wasserbade so lange erwärmt, bis alle Gallussäure an das Wismut gebunden ist, d. h. bis das ziegelrothe Wismutoxyjodid in ein grau-grünes Pulver übergegangen ist. — Man kann auch 1 Mol Wismutsubgallat bei Gegenwart von Wasser mit 1 Mol Jodwasserstoffsäure erwärmen. D. R. P. 80599.

Eigenschaften. Grau-grünes, voluminöses Pulver ohne Geruch und Geschmack, unlöslich in Wasser und in Weingeist, beim Kochen mit Wasser sich roth färbend. In verdünnten Säuren löst es sich leicht mit gelblicher Farbe. Von Natronlauge wird es ebenfalls gelöst, diese Lösung nimmt an der Luft rothe Färbung an. — Die Lösung des Salzes in stark verdünnter Salzsäure wird durch Fernichlorid dunkelgrün gefärbt, durch

Schwefelwasserstoff schwarz gefällt. Schüttelt man die salzsaure Lösung mit wenig Chlorwasser und Chloroform, so wird letzteres violett gefärbt. — An feuchter Luft geht die Verbindung allmählich in ein rothes Pulver über, welche ein noch starker basisches Wismutoxyjodidgallat darstellt. Der Jodgehalt des reinen Präparates beträgt 24,4 Proc.

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor feuchter Luft und vor Licht geschützt, s. oben.

Anwendung. Als geruchloser, nicht reizender Ersatz des Jodoforms in der Wundbehandlung, also als Trocken-Antisepticum, entweder in Substanz als Pulver oder als 10 proc. Salbe, mit wasserfreien Vehikeln bereitet.

Pasta Airoll Bruns

Rp	Airoll
	Mucilag. Gummi arab.
	Glycerini
	Boli albae
	20,0

Für Occlusiv-Verbindungen genähter Wunden

Jodogallolin. Wismutoxyjodidmethylgallol $C_6H_2(OH)_3CO_2CH_3$, $Bi_2O(OH)_2J$. Wird analog dem Airol durch Einwirkung von frisch gefälltem Wismutoxyjodid auf Gallussäuremethyläther (Gallicin s. S. 51) dargestellt.

Spez. leichtes, amorphes, dunkelgraues Pulver, in den gewöhnlichen Lösungsmitteln ist es unlöslich, von Säuren und Alkalien (auch schon von Wasser bei längerer Einwirkung) wird es in seine Komponenten zerlegt. Es enthält 23,6 Proc. Jod und 33,4 Proc. Wismut. Ist als ungiftiges Antisepticum, bezw. als Ersatz des Jodoforms empfohlen worden.

Bismutum oxyjodatum pyrogallicum. Wismutoxyd pyrogallat $C_6H_2(OH)_3O$, $Bi(OH)_2J$. Wird durch längeres Digeriren molekularer Mengen von frisch gefälltem Wismutoxyjodid und Pyrogallol oder durch Fällen einer Lösung von Kaliumjodid und Pyrogallol mit einer essigsäuren Lösung von Wismutnitrat dargestellt. [D. R. P. 94287.]

Sehr feines, amorphes Pulver von gelbrother Farbe, in Wasser und in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlöslich, und vollkommen licht- und luftbeständig. Wird durch Wasser nicht leicht zersetzt.

Anwendung als ungiftiges Antisepticum, bezw. als Jodoformersatz.

Bismutum subgallicum.

Bismutum subgallicum (Ergänzb.) **Bismutum gallicum.** **Wismutsubgallat.** **Wismutgallat.** **Dermatol.** **Gallate basique de Bismuth** (Gall.) **Subgallate of Bismuth.** $C_6H_2(OH)_3CO_2Bi(OH)_2$. Mol. Gew. = 411.

Darstellung. 150 Th. kryst. Wismutnitrat werden in 300 Th. Eisessig gelöst. Diese Lösung wird mit 2000—2500 Th. Wasser verdünnt und filtrirt. Hierzu fügt man unter Umrühren eine noch warme Lösung von 50 Th. Gallussäure in 2000—2500 Th. Wasser. Der entstehende gelbe Niederschlag wird zunächst durch Dekanthiren, später auf dem Saugfilter mit lauwarmem Wasser gewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt und mit Diphenylamin die Reaktion der Salpetersäure nicht mehr giebt. Alsdann trocknet man den Niederschlag auf porösen Tellern, zuerst bei mittlerer Temperatur, schliesslich bei 70—80° C.

Eigenschaften. Gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser, Weingeist oder Aether unlöslich, in Natronlauge zu einer gelbbraunen Flüssigkeit löslich, die an der Luft rothe Färbung annimmt. Verkohlt beim Erhitzen ohne zu schmelzen und hinterlässt schliesslich gelbes Wismutoxyd. — Durch Schwefelwasserstoffwasser oder durch Schwefelammonium wird es in braunschwarzes Wismut-sulfid verwandelt.

Prüfung. 1) Werden 0,5 g des Salzes mit 5 ccm Weingeist geschüttelt und so gleich filtrirt, so darf das Filtrat blaues Lackmuspapier nicht röthen (freie Gallussäure). 2) 0,5 g des Salzes lösen sich in 5 ccm Natronlauge klar auf (andere Wismutsalze bleiben ungelöst). 3) Werden 0,2 g Wismutsubgallat mit 1 ccm conc. Schwefelsäure übergossen, und wird die Lösung mit 2 ccm Ferrosulfatlösung überschichtet, so darf eine braune Zone nicht entstehen (Salpetersäure). 4) Das Salz muss beim Glühen und nachfolgender Behandlung mit Salpetersäure (s. S. 495) mindestens 55 Proc. Wismutoxyd hinterlassen (der theoretische

Gehalt an Bi_2O_3 beträgt 56,66 Proc.) 5) Der sub 4 erhaltene Glührückstand ist in der bei *Bismutum subnitricum* (S 490) angegebenen Weise auf metallische Verunreinigungen zu prüfen

Aufbewahrung Es ist hierüber nichts Besonderes zu erwähnen

Anwendung Wirkt zwar nicht erheblich antibakteriell, dagegen sekretionsbeschränkend und austrocknend. Man wendet es in Substanz als Pulver auf aseptischen Wunden im Trockenverbande an. Innerlich ist es zu 0,25–0,5 g gegen die Diarrhoeen der Phthisiker und der Typhuskranken gegeben worden.

Dermatolgabe 5, 10 und 20 Proc Wird in der Regel so bereitet, dass man auf eine abgewogene Menge Gaze die entsprechende Menge Wismutsubgallat durch Aufstreuen vertheilt. Die Bestimmung erfolgt in hinreichend genauer Weise wie folgt. Man klopft über einem glatten Papierbogen die Hauptmenge des Wismutgallats ab, wägt diese und bestimmt alsdann in einem aliquoten Durchschnittsmuster der hinterbleibenden Gaze den Verbrennungsrückstand, welchen man als Bi_2O_3 in Rechnung stellt und auf Wismutgallat umrechnet. Genaue wird die Bestimmung, wenn man einen aliquoten Theil der abgeklopften Gaze nach *KJELDHAL* zerstört und das Wismut alsdann als Wismutsulfid oder Wismutoxyd bestimmt.

Pulvis insperorius Bismuti subgallici (München Vorschr.)	
Bismutum subgallicum mixtum Wis-	
mutsubgallatsreupulver Dermatol-	
Streupulver (MEISTER, LUCIUS & BRÜNING)	
Rp Bismut subgallicum	20,0
Talcus veneti	70,0
Amyli Tritici	10,0

Pulvis insperorius cum Dermatolo (Hamburg Vorschr.)	
Rp Dermatoli	10,0
Talcus veneti	40,0
Amyli Oryzae	50,0

Bismuto Magnesium gallicum Wismut-Magnesiumgallat $\text{C}_7\text{H}_5\text{MgBiO}_6$ wird als gelber, bei Zutritt von Luft und Licht sich grün färbender krystallinischer Niederschlag erhalten, wenn eine mit Magnesiumkarbonat gesättigte Gallussäurelösung durch eine Lösung von Wismutacetat gefällt wird.

† **Pyroform** Wird dem Arocl analog durch Behandeln von Wismutoxydiodid im frisch gefällten Zustande mit oxydtem Pyrogallol (nach UNNA) dargestellt. Es wird an Stelle des Pyrogallols in der Dermatologie angewendet und soll weniger giftig sein als dieses.

Bismalum Methylendigallussäures Wismut D.R.P. 87 099. Wird durch Diggieren von 4 Mol Methylendigallussäure mit 3 Mol Wismuthydroxyd erhalten. Graublaues, sehr voluminöses Pulver, in Alkalien mit gelbrother Farbe löslich, durch Säuren daraus wieder abscheidbar. Als Adstringens bei Diarrhoeen zu 0,1–0,3 g, bei tuberkulöser Darmentzündung.

Bismutum subsalicylicum.

Bismutum subsalicylicum (Germ.) **Bismutum salicylicum** (Helv.) **Salicylate basique de bismuth** (Gall.) **Bismuthi Salicylas** (Brit.) **Wismutsubsalicylat** **Salicylsäures Wismut** $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{CO}_2\text{BiO}$. Mol. Gew. = 361

Von den verschiedenen Wismutsalicylaten wird das der obigen Formel entsprechende therapeutisch verwendet. Man kann es durch Fällung einer Wismutnitratlösung mit einer Natriumsalicylatlösung erhalten, zuverlässiger aber stellt man es in folgender Weise dar.

Darstellung Man löst 484 Th kryst Wismutnitrat ($\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 5\text{H}_2\text{O}$) unter Zusatz der gerade ausreichenden Menge Salpetersäure in 5–6000 Th Wasser, fällt aus dieser Lösung durch Eintragen in verdünntes Ammoniak (oder Kalilauge, oder Natronlauge) das gesammte Wismut als Wismuthydroxyd und lässt einige Zeit absetzen. Dann hebert man die Flüssigkeit klar ab und wäscht das Wismuthydroxyd mit Wasser so lange aus, bis das Waschwasser keine Reaktion auf Salpetersäure mehr giebt. — Hierauf spült man das Wismuthydroxyd in einer Porcellanschale, rührt es mit warmem destillirtem Wasser zum dünnen Brei an, giebt 138 Th Salicylsäure hinzu und erwärmt auf dem Wasserbade

unter Umrühren Wenn sich aus einer abfiltrirten Probe beim Erkalten Salicylsäure in Krystallen nicht mehr abscheidet, sammelt man das Salz, wäscht es einige Male mit lauwarmem Wasser aus und trocknet auf porösen Unterlagen, zuletzt bei etwa 75° C

Eigenschaften Weisses, lockeres, beim Reiben elektrisch werdendes, aus kleinen Prismen bestehendes Pulver ohne Geruch und fast ohne Geschmack Unlöslich in Wasser, beim längeren Kochen mit Wasser aber wird unter Abspaltung freier Salicylsäure ein basischeres Salz gebildet Alkohol und Aether entziehen bei kurzer Einwirkung keine freie Salicylsäure — Tragt man eine kleine Menge des Salzes in verdünnte Ferrichloridlösung ein, so erfolgt Violettfärbung — Beim Erhitzen tritt Verkohlung ein, als Glührückstand hinterbleibt ein Gemenge von Bismut + Bismutoxyd + Kohle

Prüfung 1) Schüttelt man 0,5 g des Salzes mit 5 cem Wasser und filtrirt sofort, so darf das Filtrat nicht sauer reagiren, auch wird es in der Regel durch Ferrichlorid nicht violett gefärbt (freie Salicylsäure) 2) Erhitzt man 1 g des Salzes im Porcellantiegel, so muss ruhiges Verkohlen eintreten (schneppulverartiges Verbrennen deutet auf Gegenwart von Wismutnitrat) Wird der kohlige Rückstand nach dem Erkalten durch Befeuchten mit Salpetersäure, Eintrocknen und Gluhen in Wismutoxyd verwandelt, so beträgt dessen Gewicht bei dem reinen Präparate 0,613 (= 64,3 Proc Bi_2O_3) Die einzelnen Pharmakopoen verlangen folgenden Gehalt an Bismutoxyd Germ > 63%, Helv > 60%, Brit 62–64%, Gall 61% Diese Bestimmung zeigt, dass das der obigen Formel entsprechende Salz, und nicht etwa ein anders zusammengesetztes Wismutsalicylat vorliegt 3) Der sub 2 erhaltene Glührückstand kann in der bei *Bismutum subnitricum* (S 490) angegebenen Weise auf metallische Verunreinigungen geprüft werden 4) Man bringt in ein trocknes Probirglas 0,5 g des Salzes, übergiesst mit 1 cem conc Schwefelsäure und mischt durch Schütteln [Es dürfen keine braunrothen Streifen in der Mischung auftreten] Schichtet man alsdann auf die Mischung 2 cem Ferrosulfatlösung, so darf eine braune Zone nicht entstehen (Salpetersäure)

Aufbewahrung Vor Schwefelwasserstoff geschützt aufzubewahren Die Germ. hat überflüssigerweise auch noch Lichtschutz vorgeschrieben

Anwendung. Es zeigt die spezifische Wirkung der Wismutverbindungen und der Salicylsäure, wird auch gut vertragen Innerlich zu 0,5–1,0 g mehrmals täglich in Pulverform bei verschiedenen Leiden des Magens und des Darmes, auch bei Typhus als Darm-Adstringens und innerliches Antisepticum Aeusserlich als Ersatz des Jodoforms bei eiternden Wunden, Abscessen etc empfohlen, aber nicht eingebürgert

SCHÜTZE's Blutreinigungs-Pulver Magnesi sulfurici sicc 65,0, Kali sulfurici 35,0, Natrii bicarbonici 25,0, Acidi tartarici 15,0, Bismuti salicylici, Natrii chlorati aa 5,0, Lithii carbonici 0,3 (Vorschrift des Fabrikanten)

Antichlorin Mittel gegen Bleichsucht. Gemisch von Traubenzucker, basischem Wismutformiat und Natriumbikarbonat

Bismutum valerianicum.

Bismutum valerianicum (Erganzb) Wismutvalerianat. Baldriansaures Wismut. Valerianate de Bismuth. Bismuti Valerianas. $\text{Bi}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2)_2 + 2\text{Bi}(\text{OH})_3$ (?). Mol. Gew. = 928 (?)

Darstellung. 105,0 Wismutsubnitrat werden in einem porcellanen Mörser mit wenig destillirtem Wasser zu einem zarten Brei zerrieben und dann mit einer Lösung von 40,0 krystallisirtem Natriumkarbonat und 30,0 Valeriansäure in 100,0 destillirtem Wasser gemischt Nach einstündiger Digestion bei gelinder Wärme und öfterem Umrühren lässt man erkalten, sammelt den Niederschlag, wäscht ihn mit kaltem Wasser aus, saugt ihn auf poröser Unterlage ab und trocknet ihn bei 50–60° C

Eigenschaften Weisses, spezifisch schweres, nach Baldriansäure riechendes Pulver Unlöslich in Wasser und in Weingeist, dagegen unter Abscheidung oliger Tropfen leicht löslich in Salpetersäure Diese Lösung wird durch Zusatz von viel Wasser milchig getrübt

Prüfung 1) Die salpetersaure Lösung werde a) durch Baryumchlorid (Schwefelsäure), b) durch verdünnte Schwefelsäure (Blei), nicht verändert, c) durch Silbernitrat nur opalisierend getrübt 2) Wird 1 g Wismutvalerinnat mit Hilfe von Salpetersäure im Porcellantiegel verascht (s S 495), so müssen 0,73—0,75 g Wismutoxyd hinterbleiben 3) Der erhaltene Glührückstand ist durch Auflösen in 3 ccm Stannochloridlösung auf Arsen zu prüfen (s S 490)

Anwendung. Zu 0,05—0,2 g mehrmals täglich in Pulvern, Pillen bei Neuralgien, Cardialgien, Epilepsie, Chorea

Bismuti Phenolata.

Unter obigem Namen sollen einige Verbindungen des Wismuts mit Phenolen zusammengefasst werden Dieselben werden seit Anfang 1893 durch Dr v HAYDON's Nachf in Radebeul nach einem patentirten Verfahren dargestellt und zur therapeutischen Verwendung und zwar innerlich als Darmantiseptica, äusserlich als Jodoformersatz empfohlen

Die Darstellung erfolgt am besten durch Einwirkung von Wismutchlorid oder Wismutnitrat auf Alkaliphenolate

Bismutum phenolicum Phenol-Wismut $\text{Bi}(\text{OH})_2(\text{C}_6\text{H}_5\text{O})$ Grauweisses, neutrales Pulver, fast ohne Geruch und Geschmack, unlöslich in Wasser und in Alkohol Durch Salzsäure wird es in Wismutchlorid und Phenol gespalten Salpetersäure wirkt gleichfalls spaltend, nebenbei bildet sie mit dem Phenol gelb gefärbte Nitroprodukte

Innerlich als Darmantisepticum mehrmals täglich 1 g, äusserlich als Jodoformersatz

Bismutum meta-kresolicum m-Kresol Wismut Grauweisses Pulver, dem vorigen in allen Punkten sehr ähnlich und wie dieses innerlich als Darmantisepticum, äusserlich als Jodoformersatz empfohlen

Bismutum tribromphenolicum Tribromphenol-Wismut (Eiganzb) Xeroform $\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{OH} (\text{OC}_6\text{H}_2\text{Br}_3)$ Gelbliches Pulver, unlöslich in Wasser und in Alkohol, neutral, geruchlos, geschmacklos, enthält 57—61 Proc Bi_2O_3 (theoretisch 58,6 Proc) Durch Salzsäure oder Salpetersäure wird unter Bildung von Wismutchlorid bzw nitrat Tribromphenol abgespalten Wird 1 g des Pulvers mit 5 proc Natronlauge gekocht, filtrirt und das Filtrat mit verdünnter Schwefelsäure versetzt, so entsteht ein weisser, käsiger Niederschlag, der nach dem Waschen und Trocknen bei 95° C schmilzt (Tribromphenol) Zur Prüfung auf Arsen glüht man 1 g des Präparates im Porcellantiegel und löst den Glührückstand in 3 ccm Stannochloridlösung auf (s S 490)

Innerlich in Gaben von 0,5—1 g (täglich 5—7 g) als Darmantisepticum, äusserlich als Jodoformersatz Nach HUXFORD ist es bei Cholera ein werthvolles Mittel (Berl klin Wochenschr 1893 163)

Bismutum resorcinicum Resorcin-Wismut $[(\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_2)_2\text{Bi}]_2 + \text{Bi}_2\text{O}_3$ Gelblich-braunes Pulver, beim Verbrennen etwa 40 Proc Wismutoxyd hinterlassend Bei akutem und chronischem Magenkatarrh und bei Gährungsprocessen im Magen

Bismutum naphtholicum β -Naphthol-Wismut, Orphol $\text{Bi}_2\text{O}_3(\text{OH})(\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O})$ Bräunliches, geruch- und geschmackloses, neutrales Pulver, in Wasser und in Alkohol ist es unlöslich Durch Salzsäure und Salpetersäure wird es unter Abscheidung von β Naphthol zerlegt

Innerlich als Darmantisepticum, äusserlich als Ersatz des Jodoforms SCHUBENKO und BLACHSTEIN haben bei Anwendung des Präparates (2 g pro die) bei Cholera gute Erfolge erzielt

Bismutum pyrogallicum Pyrogallol-Wismut, Helcosol $[\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_3\text{O}]_2\text{Bi} \cdot \text{OH}$ Gelbes Pulver, geruchlos, geschmacklos, nicht atzend, unlöslich in Wasser, löslich in Natronlauge, diese Lösung ist braun und dunkelt infolge Absorption von Sauerstoff aus der Luft stark nach Der Gehalt an Wismutoxyd Bi_2O_3 ist = 48 Proc

Voraussichtlich als Antisepticum und in der Dermatologie

Bismuti salia varia.

I Bismutum benzoicum Wismutbenzoat. Benzoesaures Wismut. Benzozate basique de Bismuth (Gall) Bismuthi Benzons. $C_6H_5CO \text{ BiO (?)}$. Mol Gew. = 345 (?)

Darstellung Man fällt aus 48,4 Th krystall Wismutnitrat, wie auf S 494 angegeben ist, das Wismuthdioxyd, wäscht es gut aus, spült es ohne Verlust in eine Porcellanschale, giebt Wasser bis zum Gesamtgewicht von 450 Th sowie 13 Th Benzoesaure (e Toluolo) hinzu und erhitzt unter Umrühren etwa $\frac{1}{2}$ Stunde auf dem Wasserbade. Man sammelt alsdann den Niederschlag, wäscht ihn 2—3 mal mit kleinen Mengen lauwarmen Wassers aus, saugt ab und trocknet bei ca 80° C

Eigenschaften Weisses, amorphes Pulver, ohne Geruch oder Geschmack, in kaltem Wasser so gut wie unlöslich. Unter Abscheidung von Benzoesäure löslich in Salzsäure, Salpetersäure und verdünnter Schwefelsäure. Durch Befeuchten mit Ferrichlorid färbt es sich ledrigbraun infolge Bildung von Ferribenzoat. Es hinterlässt beim Glühen (s S 495) 65—70 Proc Wismutoxyd. Die oben angegebene Formel verlangt 67,25 Proc Bi_2O_3 .

Anwendung. Unter den gleichen Indikationen und in den nämlichen Gaben wie Wismutsäcylat. Es soll angeblich besser vertragen werden wie dieses s S 495

II Bismutum oxychloratum Wismutoxychlorid. Basisch Wismutchlorid $BiOCl$. Mol Gew = 259,5. Wird erhalten 1) durch Eintropfen einer Wismutnitratlösung in eine verdünnte Natriumchloridlösung und heisst alsdann Blanc d'Espagne oder Schminkweiss. 2) Durch Eintropfen einer Wismutnitratlösung in stark verdünnte Salzsäure und heisst alsdann Blanc de perle oder Perlweiss.

Die erhaltenen Niederschläge werden gewaschen und unter Abschluss des Sonnenlichtes bei massiger Temperatur getrocknet. Sie dienen als Schminke. Verfälschungen. Bleiweiss wird nachgewiesen dadurch, dass man mit Kalilauge extrahiert und das Filtrat mit Schwefelwasserstoff behandelt. — Bei Gegenwart von Talkstein ist es in Salpetersäure nicht völlig löslich. Vor Schwefelwasserstoff geschützt aufzubewahren.

Bismutum chloratum Wismutchlorid. Wismut-Butter. Butyrum Bismuti, $BiCl_3$, wird durch Einwirkung von Chlor auf metallisches Wismut erhalten.

In Alkohol lösliche, weisse, butterähnliche Masse. Schmelzp 227° C, Siedep 450° C

III. Bismutum lacticum Wismutlactat. Milchsäures Wismut. Bereitet man durch Mischung von frisch gefalltem feuchtem Wismuthhydrat, welches (laut vorhergehender Anweisung) aus 12,2 Wismutsubnitrat dargestellt ist, mit 11,0 der officinellen Milchsäure, und Eintrocknen der Mischung im Wasserbade.

Es ist ein in Wasser schwer lösliches weisses Pulver, welches in Gaben wie das Wismutsubnitrat in Anwendung gekommen ist.

IV Bismutum peptonatum Wismutpeptonat. Peptonwismut

Darstellung Die Darstellung dieses Salzes unterscheidet sich von der des Wismutalbuminates (s S 486) nur dadurch, dass Pepton spiss an Stelle von Eiweiss tritt. 20 Th Bismutum citricum ammoniacatum werden in Wasser zu einer kornigen Lösung gelöst, mit einer filtrirten wässrigen Lösung von 80 Th Pepton sicc versetzt und genau wie das Wismutalbuminat weiter behandelt.

Eigenschaften. Graubraunes, schwach sauer reagirendes Pulver, aus einem Gemisch eines wasserlöslichen Wismutdoppelsalzes mit Pepton bestehend. Es ist leicht löslich in Wasser, unlöslich in starkem Weingeist. Das Handelspräparat enthält 7—8 Proc Wismut.

Anwendung Das Präparat wirkt gleich dem Bismutum albuminatum als ein mildes Darmadstringens und wird bei Dyspepsien und Gasteralgien empfohlen.

V Bismutum phosphoricum solubile (RASPE) Die Darstellung ist durch D. R. P. 78324 geschützt und geschieht durch Zusammenschmelzen von Wismutoxyd,

Phosphorsäure-Anhydrid und Natriumphosphat. Weisses, in 2 Th. Wasser lösliches Krystallpulver. Konc. Lösungen halten sich nicht lange, sehr verdünnte trüben sich dagegen erst nach einigen Tagen. Die Lösungen reagieren etwas alkalisch und besitzen schwach bitter-salzigen Geschmack; durch Säuren und Basen, sowie durch Kochen werden sie getrübt. Wirkt als Adstringens des Darmes und wird bei akuten Diarrhöen Erwachsener, Darmtuberkulose, Typhusdurchfällen, Magenkrampf und gegen Kindercholera empfohlen. Erwachsene erhalten 0,2–0,5, Kinder 0,05–0,15 g mehrmals täglich in Form von Mixturen.

Bismutol. Angeblich ein Gemisch des Bismutum phosphoricum solubile mit Natriumsalicylat. Anwendung als antiseptisches Streupulver mit Talcum 1:2 bis 5, ferner in Salben 1:5 bis 10.

VI. Bismutum tannicum (Ergänzb.). Wismuttannat. Gerbsaures Wismut. 12 Th. Wismutsubnitrat werden in einem gut zu verschliessenden Glase mit einer Mischung aus 10 Th. Ammoniakflüssigkeit (0,980) und 15 Th. Wasser übergossen und öfter durchgeschüttelt. Die Mischung wird nach 1 Stunde (besser nach 5–6 Stunden) auf ein Filter gebracht, der Filterinhalt gut ausgewaschen, noch feucht mit einer Lösung von 15 Th. Gerbsäure in 15 Th. Wasser sorgfältig gemischt, im Wasserbade vollständig angetrocknet und feingerieben (Ergänzb.).

Gelbes oder schwach bräunlich-gelbes Pulver, ohne Geruch und Geschmack, in Wasser, Weingeist oder Aether unlöslich. Eine Formel lässt sich für das Präparat nicht angeben. — 1 g hinterlasse beim Glühen im Porcellantiegel unter Anwendung von Salpetersäure (s. S. 495) 0,40 g (40 Proc.) Wismutoxyd. — Der Glührückstand werde durch Auflösen in 3 cem Stannochloridlösung auf Arsen geprüft (s. S. 490). In Gaben von 0,5–1,0–2,0 mehrmals täglich und zwar als Pulver gegen Diarrhöen an Stelle des Wismutsubnitrates.

Blatta.

Blatta orientalis (Ergänzb.). Schabe. Küchen^oschabe. Gemeine Schabe. Kakerlak. Schwarze Tarakane. Schwabe. Russe. Ist das zu den Orthoptera-Cursoria gehörige, allgemein bekannte Insekt **Periplaneta orientalis L.**, wahrscheinlich aus dem

Orient stammend, jetzt überall verbreitet, warme Orte bevorzugend, nur im Dunkeln zum Vorschein kommend.

Beschreibung. 19–23 mm lang, schwarzbraun mit helleren Beinen und Flügeldecken, langen Fühlern. Die Flügel sind beim Männchen lang, beim Weibchen klein. Der Kopf ist von dem glatten Brustschild bedeckt (Fig. 119). Wirksame Bestandtheile sind nicht isolirt. Das als solcher angegebene, krystallinische Antihydropin oder Taracanthin hat sich als unwirksam erwiesen.

Einsammlung und Aufbewahrung. Die mit zusammengelegten Tüchern erschlagenen Insekten werden gesammelt, bei gelinder Wärme getrocknet und in gut verschlossenen Gefässen als




Fig. 119.

feines und als grobes Pulver, letzteres zu Aufgüssen, aufbewahrt. Die Haltbarkeit wird durch Einlegen eines mit Aether getränkten Wattebausches erhöht.

Wirkung und Anwendung. Wirken diaphoretisch und diuretisch, ohne die Nieren zu reizen.

Man verwendet sie als Pulver zu 0,5—1,0 oder in Pillen, 3—4 mal täglich Im Dekokt 5,0—10,0 150,0 dreimal täglich ein Essloeffel voll

Verwechslung. Andere Arten, mit denen man sie verwechseln könnte, wie *Phyllocladon germanica* Westwood und *Ectobia lapponica* Serv sind nur halb so gross, die in Europa selten vorkommende amerikanische *Periplaneta americana* wird bis 32 mm lang

Tinctura Blattae orientalis Liqueur antihydropsicus Blattatinktur Scha bentinktur Schabonpulver 1 Th wird mit Weingeist (90 proc) 5 Th ausgezogen

Schwabenpulver Da diese lichtscheuen Insekten sich mit Vorliebe in Kuchen und Wohnräumen in den Fugen der Herde und Oefen aufhalten, so sind zu ihrer Vertilgung giftige Mittel selbstverständlich ausgeschlossen Ganz besonders sollte vor der Anwendung des gefährlichen Schweinfurter Grün (Kupferarseniat) gewarnt werden, wenn dasselbe zu diesem Zwecke in der Apotheke verlangt wird

Man breitet Mischungen aus Borax und Weizenmehl, noch besser aus Borax und Insektenpulver, auf flachen Tellern aus und stellt diese auf, oder man formt daraus einen Teig und streicht denselben in die Fugen der Oefen Benzin und Schwefelkohlenstoff sind ihrer Feuergefährlichkeit wegen nur mit grosser Vorsicht anzuwenden

Boldo.

Peumus Boldus Molina (syn. *Boldoa fragrans* Jussieu), Familie der *Montiaceae*, heimisch auf trockenen, sonnigen Hügeln in Chile, liefert die Boldoblätter, *Folia Boldo seu Boldu*, *Folia boldoa*, *Folia Ruiziae fragrantis*, *Feuilles de Boldo* (Gall)

Beschreibung Sie sind 4—8 cm lang, gestielt, eiförmig, ganzrandig, am Rande umgerollt, dick, steif, sehr zerbrechlich, unterseits mit deutlich hervortretenden, oberseits mit eingesunkenen Nerven, von zahlreichen Knotchen rau, mit Büschelhaaren

Die Epidermen beiderseits mit deutlicher Cuticula, unter der Epidermis der Oberseite ein schleimführendes Hypoderm, darunter die Palasadschicht, im Mesophyll grosse Oelzellen Spaltöffnungen nur auf der Unterseite

Geruch und Geschmack kampherartig aromatisch

Bestandtheile 2 Proc ätherisches Oel, vom spec Gew 0,914—0,945, das zwischen 170 und 250° C siedet, ein Alkaloid Boldin zu 0,1 Proc, ein Glykosid Boldoglucin $C_{26}H_{32}O_8$ zu 0,8 Proc, ferner Zucker, Citronensäure, Gerbstoff, Gummi und 10 Proc Asche

Anwendung Die seit 30 Jahren nach Europa gelangenden Blätter werden gegen Leberkrankheiten und Gallensteine, auch gegen Rheuma, Gonorrhoe und Dyspepsie empfohlen Man giebt sie in weingeistigem Auszuge oder als Elixir in Gaben von 1—5 g Das aus dem ätherischen Oele durch fraktionirte Destillation gewonnene Boldol wird zu 5 bis 10 Tropfen mehrmals täglich bei Tripper empfohlen und soll frei von störenden Nebenwirkungen sein In ihrer Heimath sind sie ein Kuchengewürz

Neben den Blättern verwendet man in Chile die gerbstoffreiche Rinde, die man für wirksamer hält Technisch dient sie zum Gerben und Färben Das Holz giebt eine geschätzte Kohle

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen vor Licht geschützt

Tinctura Boldo. *Tincture ou Alcoolé de Boldo* (Gall) Aus grob gepulverten Boldoblättern 1 Th und Alkohol (80 proc) 5 Th durch 10 tagige Maceration zu bereiten **Vinum Boldo** (Gall), wie Vinum Colombo zu bereiten

Oleum foliorum Boldo Boldoblätteröl Die trockenen Blätter des Boldobaumes geben bei der Destillation circa 2 Proc ätherisches Oel Boldoblätteröl ist eine aromatische, nach Cymol und schwach nach Pfefferminze riechende Flüssigkeit Spec Gew 0,914—0,945 Das Oel siedet zwischen 170 und 250° C und giebt mit Eisenchlorid eine grüne Färbung Optisch ist es schwach linksdrehend Von den Bestandtheilen des Oels ist noch keiner isolirt und untersucht worden

Borax.

Borax (Brit Germ Helv) **Natrium boracicum** (Austr) **Borate de soude** (Gall)
Sodii Boras (U-St) **Natrium biboracicum** seu **biboricum** seu **boricum**. **Natrium-**
subborat **Natriumbiborat**. **Pyroborenaures Natrium** **Tetraborsaures Natrium**.
Bauracon $\text{B}_4\text{O}_7\text{Na}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew. = 382

Handelssorten. Man unterscheidet im Handel 1) den prismatischen Borax, welcher als raffinierter Borax in den Preislisten aufgeführt wird und der officinelle Borax ist Enthalt 47 Proc Krystallwasser 2) Den oktaedrischen Borax mit 30,8 Proc Krystallwasser, welcher nur in der Technik Verwendung findet

I Borax, gewöhnlicher Borax der Officinen. Prismatischer Borax.

Eigenschaften. Der raffinierte (officinelle oder prismatische) Borax bildet grosse krystallinische Salzstücke oder ziemlich grosse Prismen oder schiefe rhombische Säulen, farblos, durchscheinend, glanzend, ziemlich hart, auf dem Bruche flachmuschelig und glänzend Spec Gew 1,7 Löslich in 17 Th kaltem oder 0,5 Th siedendem Wasser, auch in 4 bis 5 Th Glycerin, nicht löslich in Weingeist Der Geschmack ist mild aussüßlich, kühlend, später laugenhaft Die wässrige Lösung reagirt alkalisch und braunt Curcumapapier An trockener Luft verwittert er, erhitzt schmilzt er zunächst in seinem Krystallwasser, dann bläht er sich zu einer weissen, schwammigen Masse (*Borax calcinatus* seu *ustus*) auf, die schliesslich in einen farblosen Fluss übergeht und nach dem Erkalten ein farbloses Glas darstellt (Boraxglas) Der geschmolzene Borax löst Metalloxyde unter Bildung von Doppelsalzen auf und schützt wie ein Firnis die Metalle vor Oxydation Man benutzt ihn daher in der Analyse zur Herstellung der „Boraxperlen“, ferner zum Löthen der Metalle Borax hat die Eigenschaft, Schleime, z B diejenigen des arabischen Gummi und des Salep zu verdicken und starr zu machen Zusatz von Zucker hebt diese Eigenschaft auf Er macht ferner Harze und harzartige Stoffe (z B Schellack) in Wasser löslich, verseift Fette, löst Eiweissstoffe, Harnsäure, Salicylsäure etc) Lösungen des Borax in Glycerin zeigen gegen gewisse Indikatoren saure Reaction (s unten) Lösungen von Borax mit Salicylsäure oder Natriumsalicylat schmecken bitter

100 Th Wasser lösen von dem krystallinischen Borax $\text{B}_4\text{O}_7\text{Na}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ nach POGGIALE

bei	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100° C
	2,88	4,65	7,88	11,9	17,9	27,41	40,48	57,85	76,19	119,7	201,4

Er färbt die nicht leuchtende Flamme gelb, nach dem Befeuchten mit Schwefelsäure grün Uebergiesst man 0,5 g Borax mit 2—3 cem verdünnter Schwefelsäure, 10—20 cem Weingeist und entzündet die Mischung, so zeigt die Weingeistflamme grüne Ränder — Die wässrige Lösung reagirt alkalisch. Bringt man die mit Salzsäure angesäuerte Lösung auf Curcumapapier, so färbensich die angefeuchteten Stellen, besonders beim Trocknen, rothbraun Werden diese Stellen alsdann mit Ammoniakflüssigkeit betupft, so nehmen sie blauschwarze Färbung an

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung (1 = 50) werde weder durch Schwefelwasserstoffwasser (Metalle, z B Cu, Pb, Zn), noch durch Ammoniumoxalat (Calcium) verändert 2) Beim Uebersättigen mit Salpetersäure brause sie nicht auf (Natriumkarbonat), diese salpetersäure Lösung werde weder durch Baryumnitrat (Schwefelsäure), noch durch Silbernitrat (Chlor) mehr als opalisirend getrübt 3) 50 cem der 2proc Lösung werden, nach dem Ansäuern mit Salzsäure, durch Kaliumferrocyanidlösung nicht sofort geblaut (Spuren von Eisen sind zuzulassen)

Bestimmung der Borsäure. Man bereite eine Lösung von 5,0 g Borax in Wasser und fülle diese zu 250 cem auf — 50 cem dieser Lösung versetze man mit 3 bis 4 Tropfen Dimethylamidoazobenzollösung und titriere mit $\frac{1}{2}$ -Normal-Salzsäure bis zur eben eintretenden nelkenrothen Färbung 1 cem der $\frac{1}{2}$ -Normal Salzsäure zeigt 0,0955 g Borax $\text{B}_4\text{O}_7\text{Na}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ oder 0,062 g Borsäure BO_3H_3 an — Zur Kontrolle fügt man zu der obigen, mit Salzsäure auf Nelkenroth titrirten Lösung einige Tropfen Phenolphthaleon

lösung, sowie etwa 40 cem reines Glycerin und titirt alsdann mit möglichst kohlenwasserstofffreier Normal-Kalilauge (oder mit Barytlauge) bis zur Rosafärbung. Ist dieser Punkt erreicht, so giebt man 10 cem Glycerin zu und beobachtet, ob Entfärbung erfolgt. Ist dies nicht der Fall, so ist der Versuch beendet. Erfolgt jedoch Entfärbung, so wird weiterhin tropfenweise Kalilauge bis zur eintretenden Rothfärbung zugesetzt. Man setzt neuerdings 10 cem Glycerin zu und stellt fest, ob wieder Entfärbung eintritt. Dieses Verfahren wiederholt man so oft, bis auf erneuten Zusatz von Glycerin Entfärbung nicht mehr eintritt. Unter diesen Bedingungen zeigt 1 cem Normal-Kalilauge = 0,062 g Borsäure BO_3H_3 an. — Beide Bestimmungen müssen übereinstimmende Resultate liefern.

Aufbewahrung, Pulverung. Der krystallisirte Borax lässt sich ohne merkliche Veränderung in Holzkasten an einem trockenen, aber nicht allzuwarmen Orte aufbewahren. Das Pulvern erfolgt zweckmässig in einem Mörser aus Stein, das Pulver ist vor dem Einfüllen in die Gefässe etwas nachzutrocknen, weil es sonst zusammenbackt.

Anwendung. Borax hat faulnisswidrige, desinficirende Eigenschaften und ein starkes Lösungsvermögen für harnsaure Salze. Aeusserlich zum Wundverbande, als Augewasser (1—5,0 100,0 Aqua), zu Pinselungen bei Aphthen, Soor, Angina 1 5—10,0 Honig, Sirop oder Glycerin, zu Teintwaschungen 0,5 100,0. Innerlich zu 0,5—2,0 g mehrmals täglich bei Nieren- und Blasensteinen (Uratsteinen), Larynxkatarrh, als Diureticum. Die Wirkung auf Menstruation und Wehenthatigkeit ist nicht sichergestellt. Wird durch den Urin unverändert ausgeschieden. Technisch zum Lothen, als Flussmittel bei Schmelzoperationen, zur Darstellung von Emailen und künstlichen Edelsteinen, als Appretur und Plattmittel, in der Analyse zu Lothhiversuchen. Ob die Verwendung zur Konservirung von Nahrungsmitteln als zulässig gelten kann, darüber sind die Ansichten noch nicht geklärt. Zum Lothen ist der oktaedrische Borax geeigneter, da er nicht wie der prismatische beim Erhitzen in kleine Stücke zerspringt.

Natrium boroglycerinatum IWANOW. Boraxpulver und Glycerin ää werden im verzinnten Kessel oder in einer Porcellanschale so lange gekocht, bis die Masse dem Gefässboden nicht mehr anhaftet. Alsdann giesst man in Blechkapseln aus und zerschneidet die Masse in Tafelchen, die im wohlverschlossenen Gefässe aufzubewahren sind.

II Oktaedrischer Borax Juwelier-Borax. Wird erhalten, wenn man den Borax aus einer konc., über 60°C warmen Lösung krystallisiren lässt. Reguläre Oktaeder der Zusammensetzung $\text{B}_2\text{O}_3\cdot\text{Na}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$, spec. Gew. 1,815. Geht beim Liegen an feuchter Luft wieder in gewöhnlichen Borax über.

III Natrium tetraboricum neutrale Boro-Borax. Borsäure-Borax. Neutraler Borax Boro-Borsäure. Antipyronin. Unter diesen 2 Th. recht unzweckmässigen Namen werden Gemische von Borax mit Borsäure verstanden, in denen die laugenhaften Eigenschaften des Borax durch die Borsäure herabgemindert sind. Die gegebenen Vorschriften wechseln. A) 10 Th. kryst. Borax werden mit 5,5 Th. Borsäure zusammengeschmolzen. B) Borax und Borsäure ää 1 Th. werden in 1 Th. heissem Wasser gelöst und zur Trockne gedampft (Hamburg Vorschr.). Es mag ziemlich gleich sein, nach welcher Vorschrift gearbeitet wird. Das Präparat wird in der Augenheilkunde verwendet.

Antibacterid von C. ASCHMANN. 350 Th. Borax und 200 Th. Glukose werden unter Zusatz von etwas Wasser geschmolzen, worauf man 125 Th. Borsäure zusetzt.

Antifungin von FRIEDLANDER ist eine Mischung von 20 Proc. Borax und 80 Proc. Borsäure.

Antipyrogen des Ingenieur KUHLEWEIN, ein Flammenschutzmittel, ist ein Gemisch gleicher Theile Ammoniumsulfat, Borax und Borsäure.

Barmelit, Natrium chloro-borosum. Antimyceton von RUGER ist etwas verwirrter Borax, der mit feuchtem Chlorgase behandelt worden ist (G. KOTTMAYER). Wird zur Konservirung von Nahrungsmitteln empfohlen.

Borax-Appretur, Glanzstarke. Sind Mischungen von Reisstarke mit Borax. Unter dem Platzeisen schmilzt der Borax in seinem Krystallwasser, zieht in die Gewebe ein und verleiht ihnen Glanz und Stauffigkeit.

Borosal. Wassrige Lösung von Alun, Borax, Salicylsäure und Glycerin. Gegen Fusschweiss.

Glanz-Platt-Oel. Borax 50,0, Traganth 5,0, Wasser 1000,0, Glycerin 250,0, Lavendelöl 0,5, event. noch Specksteinpulver 50,0

Sandmandelklee von KIRCHMANN-OTTENSEN Furfur Amygdalarum dulcium, Farinae Tritici \bar{a} 25,0 Boracis, Glycerini \bar{a} 10,0, Rhizomatis Iridis 5,0, Terrae siliceae praeparatae (Kieselguhr) 25,0, Talci veneti 2,0

Schaben-Pulver Mischung aus Borax, Weizenmehl und Zucker zu gleichen Theilen
SEILLER's antiseptische Tabletten Natri bicarbonici, Boracis \bar{a} 30,0, Natri benzoici, Natri salicylici \bar{a} 1,3, Eucalyptoli, Thymoli \bar{a} 0,7, Olei Gaultheriae 0,25, Mentholi 0,85 Hieraus Pastillen von 1 g Gewicht zu formen

Solphinol Französische Specialität zur Desinfektion der Instrumente Gemisch von Borax, Borsäure und Natrumbisulfit

Stärkeglanz, flüssiger. Cetacei, Gummi arabici, Boracis \bar{a} 1,0, Glycerini 2,5, Aquae 24,5 Dem Stärkekleister zuzusetzen

Swagatin Angeblich unfähbares Mittel gegen Zahnschmerzen, ist entwässerter Borax
Milch-Schutz. Borax 100,0, Kaliumkarbonat 50,0, Aqua 1250,0 1 Theelöffel konservirt 1 l Milch etwa 24 Stunden

Schönheitsstaub Victoria, ein Waschmittel zur Verbesserung und Erhaltung des Teints, besteht aus 60 Th Reisstärke und 40 Th Boraxpulver mit Tuberose parfümirt (Untersuch. Amt Breslau)

Aquae cosmeticae

I Lenticulosa

Rp	Boracis	10,0
	Kalii carbonici	
	Kali chlorici	\bar{a} 5,0
	Aquae Auranti florum	
	Aquae Rosae	\bar{a} 75,0
	Glycerini	80,0

Hautflecken jeder Art werden täglich mehrmals damit befeuchtet

II Maltheau-Waschwasser (May-Dew-Lotion.)

Rp	Boracis	3,0
	Natri sulfurici cryst	8,0
	Glycerini	15,0
	Aquae Rosae	450,0

Gegen Gesichtsflecken

III. Lilionäse

Rp	Boracis	10,0
	Kalii carbonici	2,5
	Aquae Auranti florum	
	Aquae Rosae	\bar{a} 100,0
	Aquae Coloniensis	80,0
	Talci veneti praeparati	20,0

Aeusserlich gegen Hautflecke, Finnen, Mitesser etc.

IV Odaline

Rp	Boracis	10,0
	Cocconellae pulv	1,0
	Aquae Auranti florum	
	Aquae Rosae	
	Glycerini	\bar{a} 50,0
	Spiritus Rosae	2,0

Werden $\frac{1}{2}$ Stunde digerirt und nach dem Erkalten filtrirt. Aeusserlich wie oben angegeben ist.

Aqua cosmeticae STANTIN

Rp	Boracis	10,0
	Kalii chlorici	5,0
	Glycerini	50,0
	Aquae Rosae	250,0
	Olei Rosae	gtt I
	Spiritus (90%)	20,0

Zum Waschen aufgesprungener Haut, Schrunden, aufgesogener Brustwarzen, Sommersprossen etc.

Aqua cosmetica WALTHER

Rp	Boracis	5,0
	Aquae Rosae	150,0
	Tincturae Benzoes	
	Balsami Vitae Hoffmanni	
	Tincturae Cantharidum	\bar{a} 2,0

Zum Waschen der Sommersprossen und anderer Hautflecken

Balsamum contra peritones auricularum

Rp	Boracis pulverati	2,5
	Auridi carbolic puri	1,0
	Glycerini	20,0
	Mucilaginis Gummi arabici	30,0
	Tincturae Opi simplicis	1,0

Aeusserlich (die erkrankten Ohren täglich einmal mit der lauwarm gemachten Mischung zu befeuchten)

Cellulose au borate de soude (Gall.)

Rp	Boracis pulv	5,0
	Mellis rosati	20,0

Anzuweilen!

Collyrium antiblephariticum SEIGEL.

Rp	Boracis	1,0
	Mucilaginis Cydoniae	10,0
	Aquae Lauro Cerasi	5,0
	Aquae destillatae	100,0

Zum Befechten der Augenhäute und zum Eintröpfeln in das Auge

Collyrium badium LEBERT

Rp	Boracis	2,0
	Infus. Hyoscyami foliorum	8,0 60,0

Zweimal täglich eine Stunde hindurch mittelst Kompressen auf das Auge zu appliciren (bei Photophobie)

Collyrium badium WARLOMONT

Aqua badia WARLOMONT

Rp	Boracis	10,0
	Extracti Hyoscyami	5,0
	Decocti Althaeae	185,0

Aeusserlich (bei neuer Augenentzündung Alle zwei bis drei Stunden lauwarm mittelst dicker Kompressen auf die geschlossenen Augen zu appliciren und 40–50 Minuten liegen zu lassen)

Collyrium boraxatum

Rp	Boracis	2,0
	Sacchari albi	4,0
	Aquae Rosae	120,0

Gegen Flecke der Hornhaut

Gargarisma boraxatum

Rp	Boracis	10,0
	Infus. foliorum Salviae	200,0
	Tincturae Benzoes	10,0
	Mellis rosati	80,0

Mundwasser bei Stomatitis aphthosa.

Gargarisma Boracis MACKENZIE

Rp	Boracis	
	Glycerini	
	Tincturae Myrrhae	aa 15,0
	Aquae destillatae	500,0

Gargarisme au borate de soude (Gall)

Rp	Infusi flor Rosae rubrae	10,0	250,0
	Boracis	5,0	
	Mellis rosati	50,0	

Glycerinum Boracis (Brit.)

Rp	Boracis	20,0
	Glycerini	150,0

Liquor contra apthas SWEDIAUR

Rp	Boracis	5,0
	Aquae Rosae	20,0
	Mellis rosati	40,0
	Tincturae Myrrhae	20,0

Zum Betupfen und Bereiben der Schwämmchen

Lotio boracina

Rp	Boracis	5,0
	Aquae Rosae	110,0
	Spiritus Vini	
	Glycerini	aa 5,0

Zum Befeuchten der wunden Hautstellen (mittels Pinsels oder Compressen bei Excoeriationen)

Mel Boracis (Brit.)

Rp	Boracis	50,0
	Glycerini	25,0
	Mellus depurati	400,0

Lotio leniens MINGS

Rp	Boracis	15,0
	Morphium sulfurei	0,2
	Aquae Rosae	200,0

Zwei- oder dreimal des Tages als Waschung anzuwenden (bei Pruritus vulvae und in der Zwischenzeit Anlyum oder Lycopodium einzustreuen)

Mel rosatum cum Borace**Mel boraxatum (Hamb. Vorschr.)**

Rp	Boracis pulverati	2,0
	Mellis rosati	15,0

Zum Bestreichen und Bereiben der Aphthen.

Mixtura boracina FITSCHART

Rp	Boracis	5,0
	Aquae Melissae	100,0
	Aquae Amygdalarum amararum	3,0

D S Stündlich einen Esslöffel (bei Menstrualkolik)

Potio uratolytica

Rp	Boracis	5,0
	Natrii bicarbonici	10,0
	Syrupi Sacchari	100,0
	Aquae communis	850,0
	Acidi citrici crystallorum	5,0

Alle 2—3 Stunden ein Weinglas voll (bei Harngries)

Pulvis ad partum**Wehenpulver Geburtspulver**

Rp	Boracis	
	Cort Cinnamomi	aa 5,0

D S Stündlich einen halben Theelöffel mit Kamillenthee zu geben

(Den grossen Haustieren wird stündlich ein halber Esslöffel mit Kamillenaufguss eingegeben)

Pulvis contra pernioles BAUDOT

Son d'amandes antipernionculoux de BAUDOT

Rp	Boracis	5,0
	Aluminis	4,0
	Benzoëis	3,0
	Rhizomatis Iridis Florentinae	
	Seminis Sinapis	
	Farinae secalinae	aa 20,0
	Farinae Amygdalarum	30,0
	Olei Bergamottae	
	Olei Citri	aa gtt XV

D S Ein halber Theelöffel mit Wasser zum Brei anzumehren und damit die Froststellen einzuruben

Pulvis obstetricus WEDDEL

Rp	Boracis	4,0
	Croci pulverati	0,6
	Olei Cassiae Cinnamomi	0,1

Divide in partes duas Stündlich 1 Pulver zur Beförderung der Wehen

Sapo boraxatus**Boraxseife**

Rp	Boracis pulverati	10,0
	Saponis coccoi recentis odorati	120,0

Solutio hore salicylica (Münch. Vorschr.)

Rp	Acidi borici	
	Acidi salicylici	aa 6,0
	Aquae destillatae	983,0

Tablettes de borate de soude (Gall)

Rp	Boracis	100,0
	Sacchari	900,0
	Tragacanthae	2,5
	Aquae	60,0
	Tincturae Benzoëis	10,0

fiat pastilli ponderis 1,0

Unguentum boraxatum**Unguent ad pernioles HUFFLAND**

Rp	Boracis subit. pulverati	5,0
	Unguenti rosati	20,0

Zum Einreiben (der Froststellen)

Vet.

Electuarium diureticum

Rp	Boracis	50,0
	Fructuum Juniperi	200,0
	Farinae secalinae	25,0
	Aquae q s	

ut fiat electuarium

Alle vier bis fünf Stunden den $\frac{1}{2}$ Theil zu geben (als mildes Diureticum bei Influenza, Brustfellentzündung etc. der Pferde)

Kitte für Porcellan und Glas

Als Kitt für Porcellan und Glas empfiehlt sich ein Glasfluss aus 8 Mennige, 10 gebranntem Borax, 1 Kieide, $\frac{1}{2}$ gepulv. weissem Glase. Die Substanzen werden fein gepulvert gemischt, geschmolzen und dann zu einem unfühlbaren Pulver zerrieben. Das Pulver wird mit Wasser angerührt angewendet, der Gegenstand in einer Muffel oder im Töpferofen geglüht. Kleine Kittstellen werden über einer Gasflamme oder mittelst des Löthofes geglüht. Wasserglas und Kieide zum Brei angerührt ist ebenfalls ein guter Kitt, widersteht aber nicht dem Wasser. Ein durchsichtiger Kitt ist eine konz. Lösung von Mastix in Chloroform.

IV Tartarus boraxatus (Germ. Halv.) Kalium tartaricum boraxatum.

Cremer Tartari solubilis Tartrate borico-potassique (Gall.) Tartarus solubilis Boraxweinstein.

Darstellung Nach Germ und Helv Borax 2 Th werden in einer Porcellanschale im Dampfbade in 15 Th Wasser gelöst, dann setzt man 5 Th gepulverten Weinstein zu und ruht öfter um Nach erfolgter Auflösung wird filtrirt und die Flüssigkeit eingedampft. Die zurückbleibende zähe Masse wird zerzupft, auf Porcellantellern ausgetrocknet, bis die Stücke durch ihre ganze Masse undurchsichtig geworden sind (!), schliesslich pulvert man sie im erwärmten Möser und bringt das Pulver sogleich in die gut getrockneten Standgefässe — Gall lässt 100 Th Kaliumbitartrat nebst 25 Th Borsäure in 250 Th Wasser auflösen und wie oben verfahren.

Bei der Darstellung muss man metallene Geräthe ausschliessen und dem Austrocknen, sowie der Aufbewahrung des Präparates besondere Sorgfalt zuwenden, sonst backt es zusammen oder zerfliesst in den Standgefässen.

Eigenschaften Amorphes weisses oder gelblich-weisses, sehr hygroskopisches Pulver von saurem Geschmack und saurer Reaktion. Löslich schon in 1 Th Wasser. Die wässrige Lösung giebt auf Zusatz von Weinsäure krystallinische Fällung. Wird das mit verdünnter Schwefelsäure befeuchtete Salz in eine farblose Flamme gebracht, so färbt es diese grün. — Die wässrige Lösung (1:10) werde weder durch Schwefelwasserstoff (Metalle), noch durch Ammoniumoxalat (Kalk) verändert. Nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure werde sie durch Baryumnitrat (Schwefelsäure) und durch Silbernitrat (Chlor) höchstens opalisirend getrübt. — Borax-Weinstein ist kein chemisches Individuum, daher lässt sich eine Formel für denselben nicht angeben.

Das Präparat zeigt die Wirkung des Weinstein und der Borsäure. Man giebt es zu 0,5–2,0 g drei- bis viermal täglich als gelinde eröffnendes und diuretisches Mittel, als Abführmittel zu 5–10 g täglich. Aeusserlich die 5 procentige Lösung bei juckenden Hautausschlägen und zum Verbinden krebsiger Geschwüre.

Tartarus boraxatus in lamellis wird erhalten, indem man die sirupdicke Lösung (s. o.) auf Glasplatten streicht und auf diesen trocknet.

Electuarium laxativum COPLAND		
Rp	Tartari depurati	30,0
	Boracis	10,0
	Sulfuris depurati	20,0
	Electuarium Sennae	40,0
	Sirupi Zingiberis	30,0

Abends vor dem Schlafengehen 1–2 Theelöffel.

Mistura obstetrica WALDENBURG		
Rp	Tartari boraxati	25,0
	Aquae destillatae	200,0
	Tinctura Croci	10,0
	Sirupi Cinnamomi	25,0

1–2 stündlich 1 Esslöffel zur Beförderung der Wehen, bei schmerzhafter Menstruation.

Brenzcatechinum

† **Brenzcatechin** **Pyrocatechin**. **Ortho-Dioxybenzol** **Brenzcatechinsäure** **Oxyphensäure** $C_6H_4(OH)_2$ (1:2) Mol. Gew. = 110. Kommt in geringer Menge in einigen Pflanzen und im rohen Holzessig vor, als Brenzcatechinschwefelsäureäther im pathologischen Harn und im Pferdeharn. Es entsteht bei der trockenen Destillation des Catechu, Kino, einiger Gerbsäuren, ferner durch Einwirkung von schmelzenden Alkalien auf Braunkohle und auf einige Harze wie Benzoe, Guajakharz.

Darstellung Lediglich fabrikmässig. 1) Durch Erhitzen von Catechu oder Kino. 2) Durch Schmelzen von Ortho-Jodphenol, Ortho-Chlorphenol oder Ortho-Bromphenol oder Ortho-Phenolsulfosäure oder Benzoldisulfosäure (1:2) mit Kalihydrat. 3) In Guajakol, welches auf 200° C erhitzt ist, wird Jodwasserstoff eingeleitet, bis Jodmethyl nicht mehr entweicht.

Eigenschaften Weiss, glänzende, bitter schmeckende rhombische Krystalle von schwachem Geruche, aus Lösungsmitteln kurze, säulenförmige Krystalle. Schmelzp 104° C, Siedep 240–245° C. Leicht löslich in Wasser, in Alkohol und in Aether. Die wässrige Lösung wird durch Ferrichlorid grün gefärbt, diese Färbung geht durch wenig Natriumkarbonat oder Ammoniak in Violett über. Die Lösungen in Kalilauge oder Ammoniak färben sich zunächst an der Luft grün, dann braun, schliesslich schwarz. In der wässrigen

Lösung erzeugt Bleiacetat einen weissen Niederschlag $C_6H_5O_2Pb$. Die Lösungen edler Metalle werden durch Brenzcatechin schon in der Kalte, alkalische Kupferlösung dagegen wird erst beim Erwärmen reducirt.

Aufbewahrung, Anwendung Ist vor Licht und ammoniakalischen Dämpfen geschützt vorsichtig aufzubewahren. Wird arzneilich nicht verwendet, dagegen dient es zur Herstellung von chemischen Präparaten.

Bromalum hydratum.

† **Bromalum hydratum. Hydras Bromali. Bromalhydrat Tribromaldehydhydrat.** $CBr_3CH(OH)_2$ Mol Gew = 299

Darstellung In absoluten Alkohol wird zunächst unter Abkühlung, später unter Weglassung der Kühlung Bromdampf eingeleitet, bis Bromwasserstoff nicht mehr in erheblicher Menge entweicht. Man destillirt das Reaktionsprodukt zunächst aus dem Wasserbade, später aus dem Sandbade. Aus den bei $150-180^\circ C$ übergehenden Antheilen wird das wasserfreie Bromal durch fraktionierte Destillation als eine bei $172-173^\circ C$ siedende Flüssigkeit abgeschieden. Löst man das Bromal in Wasser, so scheidet die Lösung beim langsamen Verdunsten das Bromalhydrat in schönen grossen Krystallen ab. — Der bei der Darstellung entweichende Bromwasserstoff kann durch Auffangen in Kaliumkarbonat zu Kaliumbromid verwandelt werden.

Eigenschaften Farblose, rhombische Krystalle, welche bei $53,5^\circ C$ schmelzen und bei der Destillation, desgl. beim Behandeln mit concentrirter Schwefelsäure in der Kalte in Wasser und Bromal zerfallen (Conc. Schwefelsäure in der Hitze zerstört die Verbindung unter Abscheidung von Brom). Gegen Auf Lösungsmittel und Reagentien verhält es sich ähnlich wie Chloralhydrat. Durch ätzende Alkalien wird es in Ameisensäure und Bromoform gespalten.

Der Geschmack ist dem des Chloralhydrats ähnlich, aber noch unangenehmer und kratzender, der Geruch scharf, stechend, zu Thranen reizend.

Prüfung 1) Die wässrige Lösung (1:10) sei klar (Trübung = Bromal-Alkoholat)
2) Sie werde durch Silbernitratlösung nicht getrübt (Bromwasserstoff).

Aufbewahrung. In Gefässen mit Glasstopfen, vorsichtig.

Anwendung Es ist ein Hypnoticum wie Chloralhydrat, wirkt aber weniger energisch wie dieses, der Schlaf ist weniger tief und andauernd. Gegen Epilepsie, Chorea und Tabes dorsalis zu $0,05-1,0$ g mehrere Male täglich in Pillen oder Bissen. Um die Alkalescenz der Gewebsäfte zu erhalten, empfiehlt sich die gleichzeitige Anwendung von Natriumbikarbonat.

Bromum.

† **Bromum** (Germ. Helv. U-St.) **Brome** (Gall.) **Bromine. Murides. Br.** Atomgewicht = 80

Dieses Element wird gegenwärtig im Zustande grosser Reinheit durch die Stassfurter Werke in den Handel gebracht, insbesondere ist das Stassfurter Brom völlig frei von Jod. Dagegen muss ein Gehalt von rund 1 Proc. Chlor in dem kauflichen (officinen) Brom als zulässig angesehen werden.

Eigenschaften Dunkelbraunrothe Flüssigkeit, welche an der Luft braunrothe, erstickend riechende und die Schleimhäute heftig reizende Dämpfe ausstösst. Spec. Gew. bei $15^\circ C = 2,97-2,99$. Siedet bei $63^\circ C$ und erstarrt bei $-7,8^\circ C$ zu dunkelbraunen, dem Jod ähnlichen Krystallblättern mit gelbgrünem Metallreflex. Löslich in etwa 80 Th. Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff mit gelbbrauner

Farbe Brom setzt das Jod aus den Jodiden in Freiheit und färbt Stärkelösung orange gelb Brom ist in ähnlicher Weise wie Chlor ein energisches Oxydationsmittel, es entfärbt Lackmus und Indigo, zerstört Holz, Kork u dgl Substanzen Auf die Haut gebracht wirkt es zerstörend auf diese Mit Ammoniak verbindet es sich zu Ammoniumbromid

Prüfung. 1) Einige Tropfen auf ein Uhrglas gebracht, müssen sich in der Wärme verflüchtigen, ohne einen wagbaren Rückstand zu hinterlassen (Bleibromid etc) 2) 20 Tropf müssen sich in 5 cem Natronlauge zu einer klaren Flüssigkeit auflösen (Abscheidung öliger Tropfen wurde auf Verunreinigung durch organische Bromverbindungen, z B Bromoform, hinweisen) 3) Schüttelt man die wässrige Lösung (1 : 30) mit überschüssigem Eisenpulver, so darf das Filtrat nach Zusatz von Ferrichlorid weder Chloroform, welches mit der Mischung geschüttelt wird, violett färben, noch durch Zusatz von Stärlösung blau gefärbt werden (Jod) 4) Chlor weist man am zweckmassigsten nach, indem man das Brom durch Ammoniak in Ammoniumbromid (s S 263) überführt und dieses nach dem Trocknen in der S 263 angegebenen Weise massanalytisch prüft

Aufbewahrung Wegen seiner grossen Flüchtigkeit ist das Brom in Gefässen mit sehr gut eingeriebenen Glasstopfen aufzubewahren Diese Gläser erhalten zweckmassig eine aufgeschliffene Glasglocke, deren Schliff man durch Einfetten mit etwas Paraffinsalbe oder Ceratsalbe dichtet Ausserdem soll man den Bromvorrath an einem kühlen Orte (!), also im Keller aufbewahren In der Officin halte man überhaupt kein Brom vorrathig, weil Bromdämpfe die Emaille der Glasgefässe stark angreifen Hat man kleinere Vorräthe im Keller (z B ein Glas mit 5 oder 10 g Brom), so kann es vorkommen, dass man die Gefässe im Bedarfsfalle leer vorfindet Man wird sich alsdann in der S 507 angegebenen Weise helfen können

Sollte Brom als solches oder in der Form von Bromwasser zu dispensiren sein, so ist es in Gläsern mit Glasstopfen (letztere mit Baumwachs umklebt) abzugeben

Erkennung und Bestimmung. A Man erkennt das freie Brom an seinem Geruche und an seiner Färbung, ferner an folgenden Reaktionen 1) Feuchtes Stärkemehl wird durch freies Brom orange gelb gefärbt 2) Es setzt aus einer Kaliumjodidlösung Jod in Freiheit, welches durch Ausschütteln mit Chloroform oder durch Zusatz von Stärkelösung nachgewiesen werden kann 3) Freies Brom wird durch schweflige Säure zu Bromwasserstoff reducirt und zeigt alsdann die für die Bromwasserstoffsäure angegebenen Reaktionen s S 58 4) Freies Brom giebt mit einer wässrigen Lösung von Karbolsäure einen weissen Niederschlag von Tribromphenol B Man bestimmt das Brom am zweckmassigsten massanalytisch Man bringt eine (in einem dünnwandigen Glaskügelchen) abgewogene Menge Brom in eine Lösung von überschüssigem Kaliumjodid, zertümmert das Kügelchen, nachdem es in die Kaliumjodidlösung eingetaucht worden ist, und titirt das ausgeschiedene Jod durch Natriumthiosulfatlösung Je 1 cem der $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung zeigt 0,008 g Brom an — Von nicht concentrirten wässrigen Bromlösungen kann man mit Pipetten gemessene Mengen direkt in überschüssige Kaliumjodidlösung ablaufen lassen, ohne wesentliche Verluste befürchten zu müssen — Betont sei indessen, dass bei dieser Art der massanalytischen Bestimmung des Broms auf einen Chlorgehalt* des letzteren nicht Rücksicht genommen ist Ein Chlorgehalt des Broms würde verursachen, dass bei dieser Bestimmung die gefundenen Resultate etwas zu hoch ausfallen

Anwendung Brom ist ein starkes Antisepticum und Desinfectiens In Substanz erzeugt es auf Haut (unter Gelbfärbung) und Schleimhäuten starke Aetzung In den Magen gebracht verursacht es heftige Gastroenteritis, angeathmet starke Reizung der Luftwege (Gegenmittel = Alkohol) Man benutzt es in Dampfform zur Desinfection geschlossener Räume (wobei die gleichzeitige Anwendung von Karbolsäure zu vermeiden ist, da beide sich in ihrer Wirkung unter Bildung von Tribromphenol fast aufheben) Ferner die Lösung 0,5—1,0 100,0 Wasser in der Wundbehandlung als Antisepticum, zu Pinselungen bei Diphtherie, zu Inhalationen Um die Auflösung des Brom zu unterstützen, lässt man der wässrigen Lösung in der Regel Kaliumbromid zusetzen Bei der Darreichung sind Metallöffel zu vermeiden Die Abgabe von Brom oder seinen Lösungen hat in dunklen Flaschen zu erfolgen Zur Desinfection von Wohnräumen ist das Brom wegen der specifischen Schwere der Bromdämpfe stets hoch zu stellen

Bromum ex tempore Wie schon bemerkt wurde, kann es eintreten, dass trotz aller Sorgfalt der Aufbewahrung ein nicht allzugrosser Vorrath von Brom eines Tages spurlos

verschwunden ist. Da indessen freies Brom in der Regel nur in einigen Fällen vorordnet wird, so beachte man folgende Winke. 1) Man kann kleine Mengen Brom leicht und rasch darstellen durch Destillation einer Mischung von 1 Th Kalumbromid und 1 Th Kalumidichromat mit 5 Th konz. Schwefelsäure. 2) In Mixturen lässt sich freies Brom durch Zersetzung von Kalumbromid mittelst Chlorwasser gewinnen. An Stelle von 1 g Brom nehme man 1,5 g Kalumbromid. Zur Zersetzung von 1,5 g Kalumbromid bedarf man 115 g Chlorwasser. Eine Verordnung von Brom 1,0, Aquea destillatae 150,0 wäre im Nothfalle also in folgender Weise auszuführen. Kali bromat 1,5 g, Aquea Chlori 115,0, Aquea destillatae 35,0.

Bromum solidificatum Brom-Kieselguhr Cylinder nach Dr. FRANK. Sind mit Brom getränkte (durch Aufsaugen) Cylinder aus Kieselguhr, zur Desinfektion von Wohnräumen etc.

Aqua bromata medicinalis Bromwasser zum medicinischen Gebrauche ist eine Auflösung von 1 Th Brom in 200 Th Wasser. Im Dunklen aufzubewahren, bez. nur zur Abgabe zu bereiten. Nicht zu verwechseln mit dem Brom(salz)wasser nach ERLÉNMEYER s. dieses (!) und dem folgenden Präparat.

† **Bromwasser als chemisches Reagens** ist eine wässrige Auflösung von Brom 1 50. Sie ist haltbarer als Chlorwasser, unterliegt im direkten Sonnenlichte schliesslich aber auch der Umwandlung in Bromwasserstoffsäure. Vergleiche das vorhergehende Präparat.

† **Bromsalzsäure**, in der chemischen Analyse als kräftiges Oxydationsmittel, z. B. zur Ueberführung von Schwefelwasserstoff in Schwefelsäure angewendet, ist eine bei gewöhnlicher Temperatur gesättigte Lösung von Brom in 25 proc., bisweilen auch in rauchender Salzsäure. Zur Bereitung übergiesst man 10 Th Brom mit 100 Th Salzsäure, schüttelt kräftig durch und giesst nach Bedarf die über dem nicht gelösten Brom stehende Lösung ab.

Liquor desinfectorius Pennés, **Liquor antiseptique de Pennés** gegen Stich und Biss giftiger Thiere und gegen muthmassliche Infektion durch Leichengift ist ein Gemisch von 20 Th Karbolsäure, 5 Th Bromwasserstoff und 500 Th verdünntem Spiritus.

Liquor inhalatorius SCHWETZ.

Rp Bromi 1,0
Kali bromat 35,0
Aquea destillatae 150,0

Mit dieser Lösung wird ein Schwamm getränkt, dieser in eine Röhre von Paraffinpapier gelegt und vor Mund und Nase 5—10 Minuten lang gehalten. Diese Operation wird stündlich wiederholt (bei Croup und Diphtherie).

Liquor ad vulnera gangraenosa

Rp Bromi 1,0
Aquea Calceariae 85,0

Mixtura bromata LUTHELM

Rp Bromi 1,0
Kali bromat 0,25
Aquea destillatae 120,0

Stündlich einen Theelöffel in Wasser zu geben, neben Anwendung des Liquor inhalatorius SCHWETZ (bei Croup und Diphtherie).

Mixtura bromata OZANAM

Rp Kali bromat 0,1
Bromi Guttae unam
Aquea destillatae 200,0

Stündlich 1 Esslöffel (bei Croup, Diphtherie etc.)

Opodeldoo bromatum

Linimentum bromatum PRIEGER

Rp 1) Kali bromat pulv 5,0
2) Liquoris Ammonii caustici

3) Aquea destillatae 75 5,0
4) Linimenti saponat. camphorati 180 0
5) Bromi 5,0

Man löst 1 in 2 und 3, fügt diese Lösung zu 4, nachdem dieses verflüssigt ist, setzt alsdann 5 zu, mischt und lässt durch Einstellen in kaltes Wasser erstarren.

Die PRIEGER'sche Vorschrift giebt an 4,0 Brom, 3,0 Kalumbromid und 100 Opodeldoo, indessen ist eine vollständige Auflösung des Kalumbromids nicht zu erreichen.

Pilulae bromatae LANDOLF

Rp Bromi 0,12
Extracti Conii 2,0
Radices Althaeae 1,0
Fructus Phellandri q s

Mant pilulae No 30. Fructu Phellandri pulverato conspergendae. D in vitro clauso S 1—2 mal täglich eine Pille.

Spiritus bromatus SCHRÖDER

Rp Bromi 10,0
Spiritus (80 Proc.) 50,0

Nur die frisch bereitete Mischung kommt zur Anwendung. Damit getränkte Watte-Tampons werden 5—10 Minuten an die kareomatöse Vaginalportion gebracht etc., die umliegenden Theile mit Natrumbicarbonatlösung geschützt.

† **Bromum chloratum**. **Chloratum Bromi** **Bromchlorid** **Chlorbrom**. Leitet man Chlor in kalt gehaltenes Brom, so wird ersteres absorbiert und man erhält schliesslich eine rothgelbe, bewegliche Flüssigkeit, welche sich in Wasser mit gelber Farbe löst und angeblich Brompentachlorid BrCl_5 darstellt. Kühlt man die Lösung auf 0°C ab, so scheidet sich ein Hydrat in Krystallen aus, welche bei $+7^\circ \text{C}$ schmelzen. Im Falle diese Verbindung verordnet werden sollte, empfiehlt es sich, eine 50 procentige Lösung derselben darzustellen.

† **Liquor Bromi chlorati seu perchlorati 50 Proc**. In ein auf $+5^\circ \text{C}$ kalt zu haltendes Gemisch von 20,0 Brom mit 80,0 destillirtem Wasser wird gewaschenes Chlorgas

solange eingeleitet, bis das sich anfangs bildende und auf dem Wasser schwimmende Bromchlorid sich gelöst hat und in Bromperchlorid übergegangen ist. Alsdann wird die Flüssigkeit mit Wasser auf 180,0 g verdünnt. Sie enthält 50 Proc Bromperchlorid.

Aufbewahrung wie Brom an einem kühlen Orte. Man hute sich, die Dämpfe dieser Verbindung einzuathmen.

Causticum Valentini
Rp Bromi chlorata 1,0
Acidi nitrici (1,40) 10,0
Ad vitrum opistomio vitreo munitum Aetzflüssigkeit bei Angina gangraenosa, Fistelgeschwülen etc

Pasta caustica Bryx
Rp Bromi chlorata 5,0
Liquoris Stibii chlorati
Zinci chlorata aa 4,0
Radices Althaeae pulv aa 10,0
Gummi urabaei 1,0
Mucilaginis Gummi arabici q s
ut fiat pasta Nur zum baldigen Verbrauch zu bereiten

Brucinum.

†† **Brucinum** (Ergänzb) **Brucine** (Gall) **Caniramin.** **Vomicin** $C_{23}H_{29}N_3O_4 + 4H_2O$. Mol Gew = 466 Ist neben dem Strychnin in verschiedenen Strychnos Arten enthalten

Darstellung. Die bei der Gewinnung des Strychninnitrates abfallenden Mutterlaugen enthalten neben etwas Strychninnitrat vorzugsweise Brucinnitrat. Man concentriert diese Laugen durch Eindampfen und fällt aus ihnen das Gemisch beider Basen (Brucin + Strychnin) durch Ammoniak. Alsdann vertheilt man den Niederschlag in Wasser, fügt Oxalsäure bis zur Sättigung hinzu, erhitzt bis zur Auflösung, entfärbt, wenn nöthig, mit Thierkohle, filtrirt und dampft das Filtrat auf ein passendes Volumen ein. Beim Erkalten krystallisirt Brucinoxalat aus. Man sammelt dieses und wäscht es mit absolutem Alkohol aus. Alsdann löst man es in Wasser und fügt der Lösung Kalkmilch in mässigem Ueberschuss zu. Der nach einiger Zeit entstehende Niederschlag wird abfiltrirt, getrocknet und mit siedendem Alkohol extrahirt. Beim Erkalten der concentrirten alkoholischen Lösung werden Krystalle von Brucin erhalten, welche durch Umkrystallisiren zu reinigen sind. — Besonders grosse Krystalle erhält man durch freiwilliges Verdunsten der alkoholischen Lösung (Gall).

Eigenschaften. Aus seiner Lösung in verdünntem Alkohol freiwillig abgeschieden. Farblose, durchsichtige, monokline Tafeln. Aus der heiss gesättigten Lösung entweder als später krystallinisch erstarrendes Oel oder als glänzende farblose, federartige Krystalle. Der Geschmack ist sehr stark bitter, die Reaction alkalisch. Die Krystalle enthalten 4 Mol Krystallwasser (= 15,45 Proc), welches schon an trockener Luft theilweise abgegeben wird. Bei 100° C oder über Schwefelsäure werden sie völlig wasserfrei. Das krystallisirte, Krystallwasser enthaltende Brucin schmilzt wenig über 100° C, das völlig wasserfreie Brucin bei 178° C. Das krystallisirte Brucin löst sich in 320 Th kaltem oder 150 Th siedendem Wasser (zu einer alkalisch reagirenden Flüssigkeit), leicht löslich ist es in Alkohol und in Chloroform. Die wässrige Lösung ist linksdrehend.

Reine conc Schwefelsäure löst Brucin ohne Färbung. Conc Salpetersäure oder salpetersäurehaltige Schwefelsäure lösen es mit blutrother Färbung, welche allmählich in Orange, schliesslich in Gelb übergeht. — Wenn man zu dieser Reaction nur wenig Salpetersäure anwendet und wartet, bis die rothe Färbung vorüber und in die gelbe Färbung übergegangen ist, so tritt auf nunmehrigen Zusatz von Stannochlorid oder von farblosem Schwefelammonium zu der gelben Lösung eine schon violette Färbung auf. Chlorwasser (ebenso eine Mischung von Kaliumchlorat + Salzsäure) färbt Brucin lebhaft roth, ein Ueberschuss von Chlorwasser entfärbt diese Flüssigkeit wieder.

Prüfung. Es ist von Wichtigkeit, dass das therapeutisch zu verwendende Brucin frei von Strychnin ist. Um dies festzustellen, bringt man 1 Th Brucin mit 10 Th absolutem (!) Alkohol in ein geschlossenes Gefäss und schüttelt gelegentlich um. Sind nach 1—2 Stunden nicht gelöste Antheile vorhanden, so giesst man die Lösung klar ab

Den Rückstand löst man in einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure, bringt diese Lösung, eventuell unter Zusatz von etwas Wasser, auf ein Uhrglas und fugt unter Umrühren Kaliumdichromatlösung hinzu. Sobald sich Krystalle abscheiden, tupft man die Mutterlauge mit Filterpapier ab (!). Werden die Krystalle nunmehr in konz. Schwefelsäure gebracht oder mit konz. Schwefelsäure übergossen, so verursachen sie blauviolette Färbung, falls sie Strychnin enthalten.

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften, sehr vorsichtig. Lichtschutz ist nicht unbedingt erforderlich, aber zu empfehlen.

Anwendung. Brucin soll bei lokaler Anwendung anästhesirende Wirkung haben, doch ist diese Angabe unsicher. Innerlich wirkt es wie Strychnin (s. dieses), aber schwächer als dieses. Nach einigen soll es nur $\frac{1}{10}$, nach anderen sogar nur $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{50}$ der Stärke der Strychninwirkung besitzen. Indessen sind auch diese Angaben nur mit Vorsicht aufzunehmen. In Deutschland ist es nur sehr wenig im Gebrauch. Man giebt die freie Base oder deren Salze zu 0,01—0,05—0,1 g in Pillen oder Tropfen. Höchstgaben. 0,1 g *pro dosi*, 0,2 g *pro die* (Ergänzb.).

†† **Brucium nitricum** Brucin nitrat Salpetersaures Brucin $C_{23}H_{26}N_2O_4$
 $HNO_3 + \frac{1}{2} H_2O = 493$ Zur Darstellung werden 100 Th. kryst. Brucin in 200 Th. warmem Alkohol von 45 Proc. gelöst und mit (53 Th.) Salpetersäure von 25 Proc. neutralisirt, worauf man die Lösung an einem warmen Orte langsam abdunsten lässt. Farblose vierseitige, in Wasser und in Weingeist leicht lösliche Prismen. Aufbewahrung, Anwendung und Dosierung wie unter Brucin angegeben.

†† **Brucium sulfuricum** Brucinsulfat Schwefelsaures Brucin $(C_{23}H_{26}N_2O_4)_2$
 $H_2SO_4 + 7 H_2O = 1012$ Zur Darstellung löst man 100 Th. kryst. Brucin in soviel (64 Th.) verdünnter Schwefelsäure, dass eine neutrale Lösung entsteht und bringt diese durch Abdunsten zur Krystallisation. Aus der Lösung in überschüssiger Schwefelsäure krystallisirt ein saures Salz. Aufbewahrung, Anwendung und Dosierung wie unter Brucin angegeben.

†† **Brucium crudum** Rohes Brucin. Das bei der Fabrikation des Strychnins abfallende Roh-Brucin, welches stets mehr oder weniger Strychnin enthält, wird zum Theil unter dem Namen Brucin, zum Theil als „Strychnin“ von den Fabriken als Gift zum Vertheilen von Raubzeug etc. abgegeben.

Bryonia.

Gattung der Cucurbitaceae — Cucurbitaceae-Cucumerinae.

Bryonia dioica Jacq. mit rothen Früchten, heimisch in Mittel- und Südeuropa, und **Bryonia alba L.** mit schwarzen Früchten, heimisch von Nordpersien bis Ungarn und Südrussland. Vielfach angepflanzt und aus den Kulturen an Zäunen und Hecken verwildert.

Beide Arten liefern in ihrer fleischigen, über armdicken, 60 cm langen Wurzel die **Radix Bryoniae**. **Radix Uvae ursinae**. **Radix Vitis albae** Zaunröhre Faulröhre Giehröhre Hundskubis. Stiekwurz Weisses Enzian. Racine de Bryone blanche (Gall.) **Bryonia Bryonia** (U-St.) Die Wurzel ist innen weisslich mit Milchsaft, aussen weiss gelblich bis blass-bräunlich, bei **Bryonia dioica** glatt, bei **Bryonia alba** geringelt und warzig. Geschmack ekelhaft bitter, Geruch widrig. Trocken ist sie schwammig, mehlig, fast geruchlos und wenig bitter.

Der Holzkörper besteht aus schmalen Holz- und breiten Markstrahlen.

Bestandtheile. Ein Glykosid Bryonin $C_{34}H_{48}O_8$, löslich in Wasser und Alkohol, unlöslich in Aether, zu 1,0—1,2 Proc. in der Wurzel. Ferner Bryoresin $C_{87}H_{138}O_{18}$, löslich in Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser, in der Pflanze wahrscheinlich in Form eines Alkaliresinates vorhanden. Das Bryonin findet sich in der Pflanze in schlauchförmigen Zellen lokalisiert.

Einsammlung und Aufbewahrung. Die Wurzel wird im Frühjahr vor der Blüthe gegraben, gewaschen, in Scheiben geschnitten und auf Bindfaden aufgereiht getrocknet. 9 Th. frische Wurzel geben 1 Th. trockene. Man bewahrt sie in gut verschlossenen Blech- oder Glasgefässen auf.

Anwendung. Man verwendet sie hier und da als drastisches Abführmittel, 0,3–0,5 g des Pulvers oder 4,0–15,0 g eines Infusum (1:10). Der ausgepresste Saft der frischen Wurzel war früher ein Bestandtheil der Frühlingskuren. In der Homöopathie bei Rheuma, Lungen- und Brustfellentzündung.

Alcoolature de Bryone (Gall.). Aus gleichen Theilen frischer Wurzel und Alkohol (90 proc.) durch 10-tägiges Anziehen zu bereiten.

Aqua Bryoniae (spirituosa). Frische, geschnittene Zaunrübe 200 Th., Verdünnter Weingeist 300, Wasser q. s. Man destillirt 1200 Th. über.

Fomentum bryoniatum TRAMPBL. Frische, geschnittene Zaunrübe 150, Heisses Wasser 1500. Zur Kolatur fügt man hinzu Essig 1500 und Kochsalz, soviel sich löst.

Spiritus Bryoniae compositus. **Aqua Bryoniae composita.** Rautenöl 0,5, Sadebaumöl, Krauseminzöl, Orangenschalenöl je 2,5, Bibergeil-Tinktur 7,5, Zaunrübenwasser 125.

Tinctura Bryoniae. **Tincture of Bryonia.** U-St. Aus frischer, gepulverter Wurzel 100 g werden mittelst Alkohol (91 proc.) durch Verdrängung 1000 ccm Tinktur hergestellt.

Bucco.

Bucco, Buccu, Buchu, südafrikanischer Name für eine Anzahl im Kapland heimischer Arten der Gattungen *Barosma* und *Empleurum*, Familie der Rutaceae—Rutoidae—Diosmeae. Verwendung finden die Blätter. Man unterscheidet:

1) Breite Buccoblätter, **Folia Bucco lata seu rotunda** (Ergänz. Gall.). **Buchu** (U-St.). **Buchu folia** (Brit.). **Fenilles de Buchu ou Bucco.** **Buchu leaves** von ***Barosma crenulatum* (L.) Hooker** mit länglichen, eiförmigen oder verkehrt-eiförmigen, gekerbten oder klein gesägten Blättern; im Kaplande am Tafelberg; ***Barosma crenatum* Kunze**, mit ovalen oder verkehrt-eiförmigen, an der Spitze stumpfen, am Rande gekerbten, gegenüber den vorigen etwas

breiteren Blättern, und ***Barosma betulinum* (Thunb.) Bartl. et Wendl.** mit rhombisch verkehrt-eiförmigen, am Rande unregelmässig gezähnten Blättern. Die erstgenannte Art pflegt die Hauptmasse der Droge auszumachen.




Fig. 120.
B. betulinum.

Fig. 121.
B. crenatum.

Fig. 122.
B. crenulatum.

Fig. 123.
B. serratifolium.

2) Lange Buccoblätter, **Folia Bucco longa** (Gall.), von ***Barosma serratifolium* (Curt.) Willd.** mit 2–3 cm langen, lineal-lanzettlichen, scharf gesägten Blättern, heimisch

im südwestlichen Kapland, und ***Empleurum ensatum* (Thunb.) Ertl. et Zeyh.** (syn. *Empleurum serratum* Ait.), Sägezähne mehr abstehend, Spitze mehr ausgezogen wie bei der vorigen Art. Ebenfalls im südwestlichen Kapland. Die letztgenannte Art kommt auch als selbständige Sorte vor.

Die unter der Epidermis der Oberseite gelegene Zellschicht verschleimt, die Epidermiszellen enthalten Sphaerokrystalle, die man für Hesperidin hält. Im Mesophyll lysigene Ölbehälter und Oxalatdrüsen.

Geschmack und Geruch scharf aromatisch, an Raute, Kampfer und Pfefferminze erinnernd.

Bestandtheile. Ein Unterschied in den Bestandtheilen scheint zwischen den einzelnen Arten nicht zu bestehen. Sie enthalten ätherisches Öl (*B. serratifolium* 1,0 Proc.,

B betulinum 2,0 Proc) Ausserdem enthalten sie Harz, Schleim, Salicylsäure und zu 4 Proc einen als Diosmin bezeichneten, wenig bekannten Körper

Verwechslung An Stelle der ersten Droge sind die viel kleineren Blätter des *Barosma eicifolium* vorgekommen

Anwendung Man verwendet sie als diuretisches und stimulirendes Mittel, meist in Form des Infusum. Sie sind in Europa seit 1821 bekannt, werden aber wenig gebraucht, obschon sie nach neueren Nachrichten die *Folia Uvae Ursi* an Wirksamkeit übertreffen sollen. Die beste Form der Anwendung dürfte die der Tinktur oder des Fluid extraktes sein.

Aufbewahrung Die geschnittenen Blätter bewahrt man in gut verschlossenen Gefässen aus Blech, das Pulver in gelben Haefenglasern auf.

Extractum Buchu fluidum. U-St Fluid Extract of Buchu — Aus gepulverten Buccoblättern (Nr 60) 1000 g werden mittelst Alkohol (91 proc) im Verdrängungsverfahren 1000 ccm Fluidextrakt hergestellt.

Infusum Buchu Brit Infusion of Buchu. Wie Inf Uvae Ursi Brit (S 363) zu bereiten. Gabe 80—60 g.

Tinctura Buchu Tincture of Buchu (Brit) Teinture ou Alcool de Buchu. Aus Buccoblätterpulver (Nr 20) 200 g und Alkohol (60 proc) werden im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur bereitet. — Gabe 2—3,5 g. Gall. Aus Buccoblättern 1 Th, Alkohol (80 proc) 5 Th durch 10tägiges Ausziehen zu bereiten.

Vinum Bucco (Gall), wie Vinum Colombo zu bereiten.

Ptisana de folio Buchu

Tisane de Buchu (Gall)

Rp Folior Bucco 10,0

Aq dest ebull 1000 0

Nach einer halben Stunde abzupressen

Rheumatismusmittel von Felix Meyer ist ein Gemisch von Buccoblättern, Lindenblüthen, Hollunderblüthen, Wollblumen, Barentraubenblättern, Sennesblättern, Bittersussstengeln, Faulbaumrinde, Fenchel, Hauhechel, Sussholz, Sarsaparille, Eibischwurzel und Lebstöckel.

Vet Pulvis diureticus HARRYER
(Apoth Zeitung)

Rp Fol Bucco 45,0

Resinae Pini

Kalij nitric 55 90,0

M f pulv Div in p aeq XII

Morgens und Abends ein Pulver im Futter

Oleum foliorum Buccu Bukkublätteröl Essence de Feuilles de Bucco.
Oil of Buchu leaves

Sowohl die langen wie die runden Bukkublätter geben bei der Destillation mit Wasserdampf atherisches Oel. Die Blätter von *Barosma serratifolium* enthalten 0,8—1,0 Proc Oel. Dieses ist arm an Diosphenol und deshalb bei gewöhnlicher Temperatur flüssig. Spec Gew 0,944—0,962. Die Blätter von *Barosma betulinum* sind öreicher und geben beim Destilliren 1,3—2 Proc Oel. Es ist bei mittlerer Temperatur mit Krystallen von Diosphenol durchsetzt. Spec Gew ca 0,94 bei 27° C. Bukkublätteröl ist eine dunkle Flüssigkeit von starkem minz- und kampherartigen Geruch und bitterem, kuhlendem Geschmack. Diosphenol $C_{10}H_{16}O_2$ schmilzt in reinem Zustande bei 82° C und siedet nicht unzersetzt bei 232° C. Ein zweiter Bestandtheil des Bukkublätteröls ist wahrscheinlich identisch mit Linksmenthon.

Das in den Blättern von *Empleurum serrulatum* zu 0,6 Proc enthaltene atherische Oel hat das spec. Gew 0,946 und siedet zwischen 200 und 235° C. Es erinnert im Geruch an Raute und giebt beim Schütteln mit Natriumbisulfit eine feste Verbindung.

Butylchloralum hydratum.

† Butylchloralhydrat (Erganzb) Chloralhydratum Butyli Trichlorbutylaldehydhydrat Crotonchloralhydrat. Hydras Crotonchloralis $C_4H_5Cl_3O + H_2O$
Mol. Gew. = 193,5

Darstellung. Man leitet in Acetaldehyd, oder besser in Paraldehyd, welche zu nächst gut gekühlt werden, so lange trockenes Chlorgas in langsamem Strome ein, bis Chlorwasserstoff nicht mehr entweicht. Alsdann setzt man das Einleiten des Chlors weiter fort, zuerst unter Weglassung der Kühlung, später unter Erwärmen, welches schliesslich auf 100° C gesteigert wird. Das Reaktionsprodukt wird mit concentrirter Schwefelsäure geschüttelt und das sich abscheidende wasserfreie Trichlorbutylaldehyd abgehoben und fractionirt destillirt, wobei die bei 168—165° C siedenden Theile gesammelt werden. 9 Th der wasserfreien Verbindung bringt man mit 1 Th Wasser zusammen. Wenn sich das Trichlorbutylaldehydhydrat als Krystallmasse gebildet hat, krystallisirt man dieses aus siedendem Wasser um.

Eigenschaften. Dunno, weisse, seidenglänzende Blättchen von eigenthümlich süsslichem (fruchtartigem) Geruche und brennendem, bitterlichem Geschmacke. Sie lösen sich in etwa 30 Th kaltem, leichter in siedendem Wasser, reichlich in Weingeist und Aether, weniger leicht in Chloroform. Glycerin befördert die Auflöslichkeit in Wasser. Sie schmelzen bei 78° C unter Zerfall in Wasser und Trichlorbutylaldehyd, welches letztere sich durch stechenden Geruch und reizende Einwirkung auf die Schleimhäute kennzeichnet. Wird das Butylchloralhydrat mit concentrirter Schwefelsäure erwärmt, so scheidet sich Trichlorbutylaldehyd als ölige Tropfen aus. Die wässrige Lösung des Butylchloralhydrats schwärzt ammoniakalische Silberlösung infolge Reduction des Silbersalzes zu metallischem Silber.

Prüfung. 1) Die weingeistige Lösung 1 = 10 rothe blaues Lackmuspapier nicht und werde durch Silbernitrat nicht getrübt (Salzsäure, fremde Chlorverbindungen). 2) Mit Schwefelsäure gelinde erwärmt braune es sich nicht (fremde Chlorverbindungen). 3) Es schmelze bei 78° C und verbrenne, ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Aufbewahrung. Vorsichtig, grossere Vorräthe auch vor Licht geschützt.

Anwendung. Butylchloralhydrat ist ein Anästheticum, als Hypnoticum wirkt es nicht so sicher wie Chloralhydrat. Es wirkt zuerst auf das Grosshirn, die Anästhesie beginnt am Kopfe. Die Respiration wird durch Einwirkung auf das Respirationcentrum verlangsamt, darauf die Reflexerregbarkeit des Rückenmarks herabgesetzt. Der Tod tritt nach grossen Gaben durch Respirationslähmung ein, das Herz wird nicht betroffen. Man giebt es gegen Trigeminus Neuralgien und Schmerzen der Tabiker zu 0,2—0,5 g zweistündlich, als Hypnoticum 0,5—1—2,0—4,0 g in wässriger Lösung mit Glycerin oder Syrup. Höchstdosen pro dosi 2,0 g, pro die 4,0 g (Ergänz.) — Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als „Urobtylchloralursäure“, bei Vergiftungen ist die künstliche Respiration als Hauptmittel anzuwenden.

Rp Butylchloral hydrati	Rp Butylchloral hydrati 5,0—10,0
Acidi carbonici aa 20	Glycerini 20,0
	Aquae destillatae 180,0
Einen mit der Mischung getränkten Wattepfropfen	Bei Tic douloureux, innerhalb 15 Minuten 1—2
in den hohlen Zahn zu drücken, Gegen den	Esslöffel.
Schmerz carieser Zähne	

Butyrum.

Butyrum Butter. Beurre. Butter (engl.)

Allgemeines. Butter ist die durch mechanische Operationen (Schlagen, Schütteln, Schaukeln) aus der Kuhmilch abgeschiedene unige Mischung von Milchfett und anderen Bestandtheilen der Milch, welche, nachdem sie der „anerkannten molkereigerechten Behandlung“ unterworfen worden ist, theils gesalzen, theils ungesalzen in Verkehr kommt.

In der Milch ist das Butterfett in Form mikroskopisch kleiner Kugeln suspendirt, welche sich für gewöhnlich wahrscheinlich deshalb zu grosseren Massen nicht vereinigen, weil sie sich im Zustande der „Ueberschmelzung“ befinden. Wird die Milch regelmässig wiederkehrenden Erschütterungen durch den sog. Butterungsprocess ausgesetzt, so erstarrt

das Butterfett, und die Kügelchen vereinigen sich zu grosseren Massen — Aus praktischen Gründen unterwirft man dem Butterungsprocess nicht die Milch selbst, sondern den aus dieser gewonnenen Rahm im süssen oder gesauerten Zustande und bezeichnet dementsprechend das Endprodukt als Sussrahm Butter oder Sauerrahm-Butter. Durch den Butterungsprocess erhält man also die vom Butterfett der Hauptsache nach befreite Milch (Buttermilch) einerseits und die Butter andererseits.

Die abgeschiedene „Butter“ besteht der Hauptsache nach aus Butterfett, enthält aber im Zustande emulsionsähnlicher Vertheilung noch beträchtliche Mengen von Buttermilch eingeschlossen. Zum Zwecke besserer Haltbarkeit wird die Butter, um sie von diesen Beimengungen in einem gewissen Grade zu befreien, mehrmals mit reinem Wasser ausgewaschen, schliesslich von der Hauptmenge des ihr hierbei einverleibten Wassers durch Kneten und Schlagen befreit. Eine völlige Entfernung der Buttermilch und des Wassers wird nicht beabsichtigt, weil hierunter der Wohlgeschmack der Butter leiden würde — Die so hergestellte Butter kommt alsdann im ungesalzenen oder gesalzenen Zustande in den Verkehr.

Pharmaceutische Verwendung finden, allerdings nur sehr selten, sowohl die wasserhaltige Butter als auch das wasserfreie Butterfett, ausserdem wird das Butterfett auch noch zur Herstellung einiger pharmaceutischer Präparate, z. B. des Butteräthers (s. S. 176) und der Butterseife gebraucht.

I Butyrum insulsum Ungesalzene Butter. Hierunter ist die nicht gesalzene, möglichst gut ausgewaschene, wasserhaltige Butter zu verstehen. Wird sie verlangt, so versuche man, sich dieselbe aus der nachstgelegenen Molkerei zu verschaffen. Man verlange ausdrücklich „Sussrahmbutter“. Bei häufigerem Bedarf wird es sich empfehlen, eine kleine Butterungsmaschine anzuschaffen, wie solche jetzt in sehr guter Ausstattung billig zu haben sind, und aus einem Quantum „Sussrahm“ die erforderliche Menge Butter durch Buttern von dem Kuchenpersonal herstellen zu lassen. Die erbutterte Butter ist solange mit Wasser zu waschen, bis dieses nicht mehr milchig abläuft und dann durch Schlagen und Kneten von dem überschüssigen Wasser nach Möglichkeit zu befreien. Man nehme, um 10 Theile Butter zu gewinnen, mindestens 150 Th Sussrahm in Arbeit.

Diese wasserhaltige Butter findet gelegentlich zur Herstellung von Kuhlalben, Augensalben etc. Verwendung. Man versuche unter keinen Umständen sie dadurch zu ersetzen, dass man gesalzene Butter auswäscht, denn es ist schwer, der Butter alles Kochsalz durch Waschen mit Sicherheit zu entziehen. Weit eher wäre ein Ersatz durch geschmolzenes Butterfett, *Adeps Butyri*, zu rechtfertigen.

II Adeps Butyri Butterfett (Ergänzb.) Frische Butter wird in einem hohen Gefässe, z. B. einer Infundirbuche aus Porcellan, im Dampfbade geschmolzen und solange erwärmt, bis sich das Fett als völlig klare, obere Schicht abgeschieden hat. Alsdann wird diese noch warme Fettschicht abgegossen und in trockene, kleine, völlig anzufüllende Glasflaschen filtrirt. Hierzu ist zu bemerken, dass man mit der Filtration nicht eher beginnen soll, bis nicht eine deutliche Scheidung des geschmolzenen Butterfettes von den Molken stattgefunden hat. Die Filtration geht rasch von statten, wenn man das Filter vorher gut austrocknet. Das Filtriren hat an einem warmen Orte, bei grösseren Mengen mittels eines Warmwasser- oder Dampftrichters zu erfolgen.

Ein gelblichweisses bis weisses, körniges Fett von eigenartigem, nicht ranzigem Geruche und Geschmacke. Es schmelze bei 80–87°C zu einer klaren, mehr oder weniger gelben Flüssigkeit. — Werden 10 g Butterfett in 10 ccm Chloroform gelöst, 10 ccm Weingeist und 1 Tropfen Phenolphthaleinlösung hinzugefügt, so muss die Lösung nach Zusatz von 0,3 ccm Normal-Kalklauge und nach kräftigem Schütteln roth gefärbt erscheinen, was einem zulässigen Maximalgehalt von 3 Bunsen'schen Säuregraden entspricht.

Ersatz für wasserfreies Butterfett. Als solches gelten folgende Mischungen:
1) Olei Cacao 4 Th., Olei Amygdalarum 6 Th. 2) Olei Cacao 2 Th., Adipis 8 Th.

Unguentum ad combustiones STAHL. STAHL'sche Brandsalbe. Ist eine Mischung von 1 Th. gelbem Wachs und 2 Th. wasserfreiem Butterfett.

Untersuchung der Butter Die Butter des ehrlichen Marktverkehrs hat etwa folgende Zusammensetzung Butterfett 80—85 Proc, Wasser 10—15 Proc, Milchzucker, Casein, aus der Milch stammende Salze zusammen 1—3 Proc. Ausserdem ist auf das marktüblich zugesetzte Kochsalz Rücksicht zu nehmen.

Die Gesichtspunkte, unter denen die Marktuntersuchung der Butter zu geschehen hat, sind folgende:

1) Verfälscht kann Butter dadurch werden, dass ihr a) eine grössere Menge Wasser einverleibt wird, als es im ehrlichen Verkehr gebräuchlich ist, b) dass ihr eine übergrosse Menge Kochsalz zugesetzt wird, c) dass das Butterfett zum Theil durch billigere Fette oder Fettgemische ersetzt wird.

2) Verdorben ist Butter, welche in einen solchen Zustand übergegangen ist, dass sie nach der allgemeinen Ansicht zum menschlichen Genuss oder doch für die vom Käufer vorausgesetzte bestimmungsgemässe Verwendung nicht mehr geeignet ist.

3) Nachgemacht ist Butter, wenn an ihre Stelle ein Kunstprodukt, z. B. Margarine, untergeschoben ist.

Die Untersuchung führt man zweckmässig in folgender Weise aus:

1) Bestimmung des Wassergehaltes

a) Approximativ Man füllt in ein weites Probirrohr (2,5 cm lichte Weite), welches man selbst graduirt hat, etwa 20 g Butter und bringt diese durch Einstellen in heisses Wasser zum Schmelzen. Nach einiger Zeit hat sich das geschmolzene Butterfett über der wässrigen Flüssigkeit (den Molken) soweit abgesetzt, dass beide Schichten sich deutlich abgrenzen. Man schätzt nunmehr die Menge des geschmolzenen Fettes und der Molken. Beträgt die Menge der letzteren mehr als $\frac{1}{6}$, so ist die exakte Wasserbestimmung auszuführen.

b) Exakt Man bringt in eine Platinschale etwa 20 g mit Salzsäure gut ausgewaschenen Quarzsand oder Bimsstein, dazu ein kleines Glasstäbchen und glüht die so beschickte Schale gründlich durch, bis sie konstantes Gewicht hat. Dann bringt man 5 g Butter hinzu, die von möglichst vielen Stellen der Probe entnommen ist, rührt ohne Verlust um und trocknet im Wasserbad Trockenschrank bis zu konstantem Gewicht (nach fünfständigem Trocknen die erste Wägung!) Im Soxhlet'schen Trockenschrank ist das Trocknen nach $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Stunden beendet.

2) Bestimmung des Fettgehaltes Den sub 1 erhaltenen Trockenrückstand verreibt man mit noch etwa 20 g getrocknetem Sande oder Bimsstein, extrahirt das Ganze in einem Extraktionsapparate (nach Soxhlet) mit wasserfreiem Aether und verfährt im übrigen, wie unter Milch angegeben ist (s. Lac).

3) Bestimmung des Gehaltes an Kochsalz Man wägt 5 g Butter in eine Platinschale, verdampft die Hauptmenge des Wassers durch einstündiges Erhitzen auf dem Wasserbade und verascht bei nicht zu hoher Temperatur. Die Asche wird gewogen, alsdann mit Wasser ausgezogen und in der Lösung das Chlor durch Titriren mit Silbernitrat und Kaliumchromat nach Mohr bestimmt. Wägung und Titration müssen fast mit einander übereinstimmen.

4) Bestimmung des Gehaltes an Casein 5—10 g Butter werden durch drei bis vierständiges Trocknen vom Wasser befreit. Dann zieht man mit Aether aus, sammelt das in Aether Unlösliche auf einem schwedischen Filter und wäscht es mit Aether aus. Schliesslich bringt man Filter + Inhalt in einen Stickstoff-Kolben und bestimmt den Stickstoff nach KJELDHAL. Stickstoff $\times 6,37$ ergibt die Menge des vorhandenen Caseins ¹⁾.

5) Bestimmung des Säuregrades Man löst 5 g Butter in 80 ccm saurem Aether, fugt 8 Tropfen Phenolphthaleinlösung zu und titirt mit $\frac{1}{10}$ Normalalkoholischem Kali. Jeder für 100 g Butter verbrauchte Cubikcentimeter Normal-Kalilauge zeigt 1 Säuregrad nach BUSTYX an.

¹⁾ Die Ausführungsbestimmungen des Reichskanzlers schreiben den Faktor 6,25 vor, doch soll der Faktor 6,37 genauer sein.

6) Fremde Fette Vorprüfungen

1) Schmelzprobe Beim Erwärmen im Wasserbade schmilzt Butter zu einem rasch klar werdenden Fette, während Margarine längere Zeit ein trübes Aussehen behält. Die Probe beruht darauf, dass das Butterfett ursprünglich als Emulsion in der Milch enthalten war, und dass diese Emulsion absichtlich zerstört worden ist, während der Margarine Milch oder Rahm zugeführt worden ist, in der Absicht, eine Emulsion zu bilden. Nur als Vorprobe zu benutzen.

2) Refraktometrisch Man bestimmt die Refraktion im Abbe'schen Butter-Refraktometer. Butterfett hat bei 25° C eine Refraktion von höchstens 52,5. Der Apparat kostet etwa 150 M und gestattet lediglich die pure Unterscheidung von Butter und Margarine. In zweifelhaften Fällen lässt er häufig im Stiche — Jedem Apparat ist eine genaue Gebrauchsanweisung beigegeben, ausserdem findet sich eine eingehende Beschreibung des Apparates und seiner Anwendung in den Ausführungsbestimmungen des neuen Margarine Gesetzes.

Exakte Methoden 1) Nach HEHNER-ANGELL Man bringt durch Differenz-Wagung 3—4 g klar filtrirtes Butterfett in eine kugelige Porzellanschale, fugt 50 ccm Alkohol sowie 2 g Aetzkali hinzu und verseift das Fett durch Erwärmen auf dem Wasserbade unter Umrühren. Dann lässt man den Alkohol vorsichtig aber vollständig abdunsten und übergiesst die zurückbleibende Seife mit 150 ccm heissem destillirtem Wasser, in welchem sie sich klar auflösen muss. Zu der klaren Lösung giebt man verdünnte Schwefelsäure im Ueberschuss und erhitzt so lange, bis sich die Fettsäuren als ölige Schicht klar (!) abgesetzt haben und die wässrige Flüssigkeit nicht mehr milchig erscheint. Man filtrirt nun die Flüssigkeit durch ein vorher in einem Wageglaschen getrocknetes und gewogenes Filter von dichtem Papier, welches vorher mit heissem Wasser gerasst und angefüllt worden ist, mit der Vorsicht, dass während der ganzen Dauer der Filtration die Fettsäuren niemals ganz nach dem Grunde des Filters gelangen, sondern dass sich auf diesem zu jeder Zeit genügend wässrige Flüssigkeit befindet, um ein Durchlaufen der Fettsäuren zu verhindern. Man spritzt nun alle Fettsäurereste aus der Schale auf das Filter und wäscht die gesamten Fettsäuren mit siedendem Wasser (ca 1½ Liter) so lange aus, bis das Filtrat gegen empfindliches Lackmuspapier nicht mehr sauer reagirt. Man bringt hierauf die Fettsäuren auf dem Filter zum Erstarren, indem man den ganzen Trichter in eiskaltes Wasser eintaucht, bringt Filter + Fettsäuren in das Wageglas und trocknet im Wasserbadtrockenschranke bis zu konstantem Gewicht. (Erste Wagung nach 3 Stunden, dann in einstündigen Pausen.)

2) Die REICHERT-MEISSEL'sche (WOLLNY'sche) Zahl in der Modifikation von LEFFMANN-BEAM 5 g (genau gewogen!) reines filtrirtes Butterfett werden in einem 300 ccm fassenden Erlenmeyer-Kolben genau abgewogen, hierzu 20 ccm Glycerin-Natron¹⁾ gegeben, der Kolben wird mittels einer mit Kautschukschlauchstücken überzogenen Tiegelzange erfasst und über freier Flamme unter beständigem Umschwenken erhitzt. Hierdurch, wie auch im Nothfalle durch zeitweiliges Entfernen von der Flamme, wird die stark schaumende Masse leicht am Uebersteigen gehindert. Nach 3—4 Minuten ist die Reaktion beendet, das Wasser verdampft, die Flüssigkeit hört auf zu kochen und ist fast plötzlich vollständig klar. Alsdann fugt man, zu Anfang tropfenweise, da sonst leicht Uebersäumen eintritt, 135 ccm destillirtes, ausgekochtes Wasser zu und nach eingetretener Auflösung von etwa erstarrter Seife 2 Stückchen Bimsstein und 5 ccm Schwefelsäurelösung²⁾. Man destillirt alsdann mit vorgelegtem Liebig'schen Kühler 110 ccm ab. Das Destillat wird gemischt und filtrirt. Von dem Filtrate titrirt man 100 ccm mit 1/10 Normallauge und

¹⁾ Zur Herstellung des Glycerin-Natrons löst man 100 g Natronhydrat in 100 ccm destillirtem Wasser. Von dieser Lösung werden 20 ccm mit 180 ccm reinem konc Glycerin gemischt.

²⁾ Von der Schwefelsäurelösung enthalten 100 ccm = 20 ccm konc Schwefelsäure.

Phenolphthalein. Die verbrauchten Cubikcentimeter $\frac{n}{10}$ -Länge multiplicirt man mit 1,1. Die so erhaltene Zahl ist die REICHERT-MEISSL'sche Zahl (oder WOLLNY'sche Zahl).

Beurtheilung. Der Gehalt an Kochsalz bzw. an Wasser wird meist nach örtlichen Verordnungen beurtheilt. Wo diese fehlen, kann man in maximo 3 Proc. Kochsalz und 15 Proc. Wasser zulassen und in minimo einen Fettgehalt von 80 Proc. verlangen.

Ob Butter verdorben ist, lässt sich am besten durch die Kostprobe (Aufstreichen auf Brod oder Semmeln) beurtheilen. Die Bestimmung des Säuregrades erfolgt in der Regel nur zur wissenschaftlichen Begründung des durch die Kostprobe gewonnenen Urtheils. Die meisten Chemiker nehmen als zulässige Maximalzahl 8 Säuregrade an.

Fremde Fette (Margarine, s. auch diese) weist man am sichersten durch Bestimmung der REICHERT-MEISSL'schen (WOLLNY'schen) Zahl nach. Für reines Butterfett ist 24,0 als niedrigste REICHERT-MEISSL'sche (WOLLNY'sche) Zahl anzunehmen. Es hat sich aber herausgestellt, dass gewisse Fütterungsarten (Reis, Palmkerne) die WOLLNY'sche Zahl herabdrücken. Ergeben sich nach der Bestimmung der REICHERT-MEISSL'schen Zahl Zweifel

über die Unverfälschtheit der Butter, so kann man noch die Bestimmung der HENNER-ANGELL'schen Zahl heranziehen. Diese wird für reines Butterfett in maximo als 90,0 angenommen. Doch kommen auch hier geringe Ueberschreitungen vor.

In zweifelhaften Fällen giebt allein unanfechtbare Auskunft die Selbstherstellung von Butter aus der in Frage kommenden Milch, bzw. Buttern unter amtlicher Aufsicht und vergleichende Untersuchung des so erhaltenen Butterfettes.

Färbung der Butter mit unschädlichen Farbstoffen




Fig. 124. Destillationsapparat zur Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren nach REICHERT-MEISSL.

gen gilt zur Zeit als ein erlaubtes Verschönerungsmittel.

I. 5. k. Nachweis von Sesamöl (aus der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 1. April 1893).¹⁾

a) Wenn keine Farbstoffe vorhanden sind, die sich mit Salzsäure roth färben, so werden 5 cem geschmolzenes Butterfett mit 0,1 cem einer alkoholischen Furfural-Lösung (1 Raumtheil farbloses Furfural in 100 Raumtheilen absoluten Alkohols gelöst) und mit 10 cem Salzsäure vom spec. Gew. 1,19 mindestens $\frac{1}{2}$ Minute lang kräftig geschüttelt. Wenn die am Boden sich abscheidende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende deutliche Rothfärbung zeigt, so ist die Gegenwart von Sesamöl nachgewiesen.

b) Wenn Farbstoffe zugegen sind, die durch Salzsäure roth gefärbt werden, so schüttelt man 10 cem geschmolzenes Butterfett in einem kleinen cylindrischen Scheidetrichter mit 10 cem Salzsäure vom spec. Gew. 1,125 etwa $\frac{1}{2}$ Minute lang. Die unten sich ansammelnde rothgefärbte Salzsäureschicht lässt man abfließen, fügt zu dem in dem Scheidetrichter enthaltenen geschmolzenen Fette nochmals 10 cem Salzsäure vom spec. Gew. 1,125 und schüttelt wiederum $\frac{1}{2}$ Minute lang. Ist die sich abscheidende Salzsäure noch roth gefärbt, so lässt man sie abfließen und wiederholt die Behandlung des geschmolzenen Fettes mit Salzsäure vom spec. Gewichte 1,125, bis letztere nicht mehr roth gefärbt wird. Man lässt alsdann die Salzsäure abfließen und prüft 5 cem des so behandelten geschmolzenen Butterfettes nach dem unter a) beschriebenen Verfahren auf Sesamöl. Zu diesen Versuchen verwendet man keine höhere Temperatur, als zur Erhaltung des Fettes im geschmolzenen Zustande erforderlich ist.

¹⁾ Die cursiv gesetzten Stellen sind der Bekanntmachung des Reichskanzlers wörtlich entnommen.

I. 4 Nachweis von Konservierungsmitteln

a) *Borsäure* 10 g Butter werden mit alkoholischem Kalk in einer Platinschale verseift, die Seifenlösung eingedampft und verascht. Die Asche wird mit Salzsäure übersättigt. In die salzsaure Lösung taucht man einen Streifen gelbes Kurkumapapier und trocknet das Papier auf einem Uhrglase bei 100° C. Bei Gegenwart von Borsäure zeigt die eingetauchte Stelle des Kurkumapapiers eine rothe Färbung, die durch Auftragen eines Tropfens verdünnter Natriumcarbonatlösung in Blau übergeht.

b) *Salicylsäure* Man mischt in einem Probirrohren 4 cem Alkohol von 20 Vol Proc mit 2—3 Tropfen einer verdünnten Eisenchloridlösung, fügt 2 cem Butterfett hinzu und mischt die Flüssigkeiten, indem man das mit dem Daumen verschlossene Probirrohren 40—50 mal umschüttelt. Bei Gegenwart von Salicylsäure färbt sich die untere Schicht violett.

c) *Formaldehyd* 50 g Butter werden in einem Kölbchen von etwa 250 cem Inhalt mit 50 cem Wasser versetzt und erwärmt. Nachdem die Butter geschmolzen ist, destillirt man unter Einleiten von Wasserdampf 25 cem Flüssigkeit ab. 10 cem Destillat werden mit 2 Tropfen ammoniakalischer Silberlösung versetzt, nach mehrstündigem Stehen im Dunklen entsteht bei Gegenwart von Formaldehyd eine schwarze Trübung. (Die ammoniakalische Silberlösung erhält man durch Auflösen von 1 g Silbernitrat in 30 cem Wasser, Versetzen der Lösung mit verdünntem Ammoniak, bis der anfänglich entstehende Niederschlag sich wieder gelöst hat, und Auffüllen der Lösung mit Wasser auf 50 cem.)

Fremdartige Zusätze Kartoffelmehl, Kartoffelbrei, Getreidemehl, Mohrrubenbrei, welche bisweilen, aber nur selten, der Butter in betrügerischer Absicht zugesetzt werden oder durch Zufall in diese gelangen, weist man nach, indem man ein Quantum Butter erst mit Alkohol, dann mit Äther auszieht und den hierbei ungelöst hinterbleibenden Rückstand mit dem Mikroskop untersucht. Gips, Thon u. dergl. unorganische Zusätze, welche wohl kaum als übliche Verfälschungen gelten können, wurden in der Asche aufzusuchen und nachzuweisen sein.

I 5 1 Nachweis fremder Farbstoffe Die Gegenwart fremder Farbstoffe erkennt man durch Schütteln des geschmolzenen Butterfettes mit absolutem Alkohol oder mit Petroleumäther vom spec. Gew. 0,638. Nicht künstlich gefärbtes Butterfett erhält diesen Lösungsmitteln keine oder nur eine schwach gelbliche Färbung, während sie sich bei künstlich gefärbtem Butterfett deutlich gelb färben.

Zum Nachweise gewisser Theerfarbstoffe werden 2—3 g Butterfett in 5 cem Äther gelöst und die Lösung in einem Probirrohren mit 5 cem conc. Salzsäure vom spec. Gew. 1,125 kräftig geschüttelt. Bei Gegenwart gewisser Azofarbstoffe färbt sich die sich unten absetzende Salzsäureschicht deutlich roth.

Schmelzbutter, Butterschmalz, Schmalz (letzteres eine spezielle, süddeutsche Bezeichnung). Hierunter versteht man das durch Ausschmelzen der Butter und Abgessen von den Molken gewonnene wasserfreie Butterfett, welches in Süddeutschland namentlich während des Winters zu Küchen- und Konditoreizwecken verwendet wird. Es ist bezüglich eines Gehaltes an fremden Fetten in gleicher Weise zu untersuchen und zu beurtheilen wie die Butter. — Schmelzbutter lässt unter dem Mikroskop Krystallnadeln erkennen.

Colostrum-Butter In einigen Gegenden gilt die aus dem Colostrum [d. i. die unmittelbar bis einige Tage nach dem Geburtsakt abgesonderte Milch], hergestellte Butter innerlich wie ausserlich als besonders heilkräftig. Colostrum-Butter ist braungelb, starrer als gewöhnliche Butter, reich an Eiweissstoffen, von schleimigem Geschmack. Sie wird leicht ranzig.

Sapo butyrinus. Sapo e Butyro Butterseife. Zur Herstellung derselben kann mit Vortheil ranzige, zu Speisezwecken nicht mehr verwertbare Butter verwendet werden. Man schmilzt ein beliebiges Quantum Butter, lässt das Butterfett in der Wärme sich klären, filtrirt oder kocht es und verfahrt wie folgt.

100 Th geschmolzenes Butterfett werden in einer Porcellanschale mit 180 Th Natronlauge (von 15 Proc NaOH) im Wasserbade unter Umrühren so lange erhitzt, bis ein klarer, gleichmässiger Seifenleim entstanden ist. Nachdem die Erhitzung im Wasserbade noch 1 Stunde fortgesetzt worden ist, fügt man zu dem Seifenleim eine filtrirte (!) Lösung von 25 Th Kochsalz und 2,5 Th kryst. Soda in 100 Th Wasser, rührt $\frac{1}{4}$ Stunde um, lässt dann etwa 1 Stunde im Wasserbade ruhig absetzen und bringt hierauf die Schale in die Kälte. Nachdem die Seife völlig erstarrt ist, wird sie von der Unterlauge abgehoben, mit Wasser abgespült, in Stücke geschnitten und an einem warmen Orte, vor Staub geschützt, getrocknet. Ausbeute ca. 120 Th. Verwendung zur Herstellung von Opodeldok.

Butterpulver Hierunter versteht man Pulver, welche, dem Rahm zugesetzt, die Abscheidung der Butter beim Buttern beschleunigen sollen. Diese Pulver, deren Nutzen zweifelhaft ist, bestehen in der Regel 1) Aus Natriumbikarbonat, 1–2 g auf 1 l Rahm 2) Gemische von (1 Th) Natriumbikarbonat mit (3 Th) Kochsalz Auf 1 l Rahm rechnet man 3–4 g der Mischung 3) Kochsalz Auf 1 l Rahm = 2–6 g 4) Kalumbitartrat Auf 1 l Rahm = 1–2 g Diese Pulver werden gelegentlich auch noch mit Auszügen von Orleans oder Kurkuma gefärbt und dienen alsdann zugleich als Farbmittel.

Butterfarbe, um zu heller Butter (Winterbutter) eine schöne Färbung zu verleihen 1) Aetherisches Orleanextrakt 2–3,0 g, Olivenöl 100,0 2) 1 Th getrockneter Orlean, 2 Th Kurkumapulver werden mit 10 Th Olivenöl 3 Tage lang im Dampfbade erhitzt, dann abgepresst und nach dem Absetzen filtrirt (E. ROSENDORF's Butterfarbe) In dunklen Gläsern abzugeben 3) 3 Th Dimethylamidoazobenzol werden in 97 Th Olivenöl unter Erwärmen gelöst 4) Man zieht 100 Th Orlean mit einer Lösung von 1,5 Th Kalumkarbonat in 100 Th Wasser in der Wärme aus und zieht den Rückstand noch zweimal mit einer Lösung von je 0,6 Th Kalumkarbonat in 100 Th Wasser aus. Die vereinigten Auszüge werden auf 60 Th verdampft, dann mit 12 Th Alkohol versetzt und nach dem Absetzen filtrirt.

Butyromel Gemisch von 1 Th Honig mit 2 Th Butterfett oder Butter

Emplastrum universale Styriae Hofrathspflaster (Oesterr. Handverkaufsartikel) Cerae flavae, Adipis Butyri recentis, Terebinthinae venetae aa 320,0 Myrrhae, Aluminis usti, Camphorae aa 40,0, Croci 2,0

III Margarine Kunstbutter. „Margarine im Sinne des Gesetzes vom 15 Juni 1897 sind diejenigen der Milchbutter oder dem Butterschmalz ähnlichen Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht ausschliesslich der Milch entstammt.“

Bereitung Frischer, gewaschener Rindertalg wird bei 60°C durch Dampf geschmolzen. Das geläuterte (filtrirte) Fett lässt man 12–24 Stunden bei 20°C stehen und presst bei 80°C das ausgeschiedene feste Stearin von dem flüssiger bleibenden Oleomargarin ab. Das Oleomargarin wird — meist nach Zusatz anderer Fette und Öle, z. B. Sesamol, s. w. unten — mit 10 Proc. süsser oder saurer Milch in besonderen Emulsionsapparaten verbuttert, die Mischung wird alsdann gefärbt, gesalzen, auch parfümirt und giebt so nach dem Erstarren das „Margarine“ genannte Produkt. — Der Naturbutter ausserordentlich ähnliche Massen, nur durch die chemische Analyse (s. S. 516) von dieser zu unterscheiden.

Gesetzliche Bestimmungen Die Fabrikation der Margarine und der Verkehr mit derselben unterliegt für das Deutsche Reich den Bestimmungen des Gesetzes vom 15 Juni 1897 und dessen Ausführungsbestimmungen. Für die Thätigkeit des Analytikers kommen besonders folgende Bestimmungen des Gesetzes in Betracht.

§ 3 Die Vermischung von Butter oder Butterschmalz mit Margarine oder anderen Speisefetten zum Zwecke des Handels mit diesen Mischungen ist verboten. — Unter diese Bestimmung fällt auch die Verwendung von Milch oder Rahm bei der gewerbmässigen Herstellung von Margarine, sofern mehr als 100 Gewichtsteile Milch oder eine dementsprechende Menge Rahm auf 100 Gewichtsteile der nicht der Milch entstammenden Fette in Anwendung kommen.

Damit ist folgendes gesagt. In Deutschland ist es untersagt, Mischungen von Butter mit anderen Speisefetten gewerbmässig herzustellen und zu Genusszwecken zu verkaufen. Zugelassen ist die Herstellung der Margarine mit der Beschränkung, dass für 100 Th Nicht-Milchfett nicht mehr als 100 Th Milch oder eine dieser entsprechende Menge Rahm zur Verwendung kommen. Für die analytische Kontrolle ist anzunehmen, dass 100 Th Milch in maximo 4 Th Butterfett entsprechen, und die dem Analytiker gestellte Aufgabe besteht somit darin, festzustellen, ob das wasserfreie Fett einer Margarine mehr als 4 Proc. Butterfett enthält oder nicht. Dies geschieht durch Bestimmung der REICHERT-MEISSEL'schen Zahl. Die REICHERT-MEISSEL'sche Zahl beträgt bei einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Margarine nicht mehr als 2,0. Geht sie über 2,0 erheblich hinaus, so ist auf Zusatz grosserer Mengen von Butterfett zu schliessen. Dieser Schluss würde nur dann nicht immer zutreffend sein, wenn das Fettgemisch erhebliche Mengen von Kokosfett enthält. Dieses hat an sich eine höhere REICHERT-MEISSEL'sche Zahl. Auf die Anwesenheit von Kokosfett wird man aufmerksam gemacht bei der Bestimmung der HEINZEL'schen Zahl dadurch, dass sich aus dem erkalteten Filtrate Krystallnadeln von Fettsäuren

abscheiden, und dass die Fettsäuren auch nach lange Zeit fortgesetztem Trocknen keine Gewichtskonstanz zeigen

§ 6 „Margarine und Margarinekase, welche zu Handelszwecken bestimmt sind, müssen einen die allgemeine Erkennbarkeit der Waare mittelst chemischer Untersuchung erleichternden, Beschaffenheit und Farbe derselben nicht schädigenden Zusatz enthalten — Die näheren Bestimmungen hierüber werden vom Bundesrath erlassen und im Reichsgesetzblatt veröffentlicht“

Ueber die Art des Kennzeichnungsmittels bestimmt die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 4 Juli 1897 folgendes

1) Um die Erkennbarkeit von Margarine und Margarinekase, welche zu Handelszwecken bestimmt sind, zu erleichtern, ist den bei der Fabrikation zur Verwendung kommenden Fetten und Ölen Sesamol zuzusetzen. In 100 Gewichtstheilen der angewandten Fette und Öle muss die Zusatzmenge bei Margarine mindestens 10 Gewichtstheile, bei Margarinekase mindestens 5 Gewichtstheile Sesamol betragen — Der Zusatz des Sesamols hat bei dem Vermischen der Fette vor der weiteren Fabrikation zu erfolgen

2) Das nach No 1 zuzusetzende Sesamol muss folgende Reaktion zeigen. Wird ein Gemisch von 0,5 Raumtheilen Sesamol und 99,5 Raumtheilen Baumwollsamensöl oder Erdnussöl mit 100 Raumtheilen rauchender Salzsäure vom spec Gew 1,19 und einigen Tropfen einer 2 procentigen alkoholischen Lösung von Furfural geschüttelt, so muss die unter der Ölschicht sich absetzende Salzsäure eine deutliche Rothfärbung annehmen. Das zu dieser Reaktion dienende Furfural muss farblos sein

Für die Schätzung des Sesamölgehalts der Margarine geben die „Vorschriften für die chemische Untersuchung von Fetten und Käsen vom 1 April 1898 folgende Anweisung

II Die Untersuchung der Margarine erfolgt nach denselben Grundsätzen wie die der Butter. Ausserdem ist noch folgende Prüfung auszuführen

0,5 ccm des geschmolzenen, klar filtrirten Margarinefettes werden mit 9,5 ccm Baumwollsamensöl, das, nach dem unter I 5 k (S 516) beschriebenen Verfahren geprüft, mit Furfural und Salzsäure keine Rothfärbung giebt, vermischt. Man prüft die Mischung nach dem unter I 5 k (S 516) angegebenen Verfahren auf Sesamol. Hat die Margarine den vorgeschriebenen Gehalt an Sesamol, von der vorgeschriebenen Beschaffenheit, so muss die Sesamol Reaktion noch deutlich eintreten

Enthält die Margarine zugleich Farbstoffe (gewisse Azofarbstoffe, z B Dimethylamidoazobenzol), welche mit Salzsäure direkt eine Rothfärbung geben, so ist demnach die Prüfung auf Sesamol nach I 5 k β der für die Untersuchung der Butter gegebenen Anweisung auszuführen.

Cacao.

Theobroma Cacao L. Familie der Sterculiaceae—Büttnerieae.

Der bis 13 m hohe Baum ist einheimisch in den Küstenländern des mexikanischen Golfes und in Sudamerika bis zum Amazonas. Gegenwärtig fast überall in den Tropen mehr oder weniger in Kultur (cf unten). — Verwendung finden die Samen. Samen Cacao (Ergänzb.) Faba seu Nuclei Cacao (Gall.) Semen Theobromatis Faba mexicanae. Kakao. Kakaobohnen. Fèves de Cacao. Cacao-beans.

Ausser der genannten sollen noch einige andere Arten die Droge liefern. *Theobroma bicolor* Humb et Bpl (in Kolumbien und am Rio negro), *Theobroma angustifolium* Moç et Sess (Socónusco), *Theobroma ovalifolium* Moç et Sess (Esmeraldas)

Beschreibung. Die beerenartigen, fleischigen, gelben, rothen oder braunen Früchte von Grösse einer mittleren Gurke enthalten, in ein schleimiges, angenehm schmeckendes Fruchtfleisch eingebettet, die dicht in 5 Längsreihen geordneten etwa 40 Samen, die frisch weiss sind und die braune Farbe erst durch die darauf folgende Zubereitung annehmen. — Sie sind im Umriss ungefähr eiförmig, meist etwas plattgedrückt, etwa 2,5 cm lang, 1,5 cm breit, 1,0 cm dick. Am stumpferen Ende befindet sich das Hilum, von wo aus auf der einen Schmalseite die Raphe zum gegenüberliegenden Ende verläuft und sich hier in mehrere Bündel auflöst, wodurch sich das reichliche Vorkommen derselben in der Samen

schale erklärt. Die braune, ziemlich spröde Samenschale umschliesst den Embryo, der noch von einem zarten Häutchen (Silberhaut) bekleidet ist. Der Embryo besteht aus den dickfleischigen Kotyledonen, die vielfach in einander gefaltet und von aussen eingeschnürt sind, der keuligen Radicula und der als kleines Spitzchen kenntlichen Plumula. Wegen der vielen Falten etc. zerfallen die Kotyledonen leicht in kantige Stücke. Ihre Farbe ist auf dem Querschnitt mehr oder weniger braun bis violett. Die Kotyledonen bestehen zu äusserst aus einer aus dünnwandigen Zellen gebildeten Epidermis, die häufig (besonders an den Falten und an der Radicula) zu eigenthümlichen Haaren (MITSCHERLICH'sche Körperchen Fig. 125 *tr*) ausgewachsen sind. Die Epidermiszellen enthalten 3–4,5 μ grosse kantig-rundliche Pigmentkörner von orangegelber bis branner Farbe, die mit Chloralhydrat blutroth, mit Eisenchlorid olivenbraun werden. Das übrige Gewebe besteht, abgesehen von zarten Procambiumsträngen und schwach entwickelten Gefässbündeln, aus zarten Parenchymzellen, als deren Inhalt sich krystallinisches Fett, Plasma und Aleuronkörner erkennen lassen. Letztere enthalten entweder ein Krystalloid und färben sich mit Jod gelb, oder sie färben




Fig. 125. Gewebe des Kakao. 160 Mal vergrössert.

A Silberhaut des Samens. *f* Faltkrystalle. *K* Oxalatkrystalle. *tr* MITSCHERLICH'sche Körperchen, von der Samenschale abgebrochen. *d* Sklereiden der Samenschale. *E* Parenchym der Kotyledonen der Stärke, Fett, Aleuron (*a*) und Farbstoffzellen (*v*). *sp* Spiralgefässe. (Nach MOELLER).

sich nicht mit Jod und enthalten dann ein oder mehrere Globoide. Beide Formen sollen nicht in derselben Sorte neben einander vorkommen (TSCHIRCH). Endlich enthalten sie Stärke in kleinen einfachen, rundlichen oder wenig zusammengesetzten Körnern. Die Körnerchen sind bei den einzelnen Sorten nicht gleich gross, und sie können wohl mit benutzt werden, einzelne Sorten zu charakterisiren. (S. 521.)

Zahlreiche Zellen (Pigmentzellen, Fig. 125 *v*) der meisten Sorten enthalten Farbstoff (Kakaoroth), der entweder braun oder violett (mit mehr oder weniger rüthlichem Stich) ist, diese Pigmentzellen sind im allgemeinen regellos zerstreut, gegen die Epidermis bilden sie häufig kurze Reihen. Manchen Sorten fehlen sie ganz. Sie werden mit Eisenchlorid blauschwarz, mit konc. Säuren roth, mit Kalilauge blau.

Aus dem Gewebe der Radicula sind als charakteristische Elemente zu erwähnen: Einzelkrystalle und kleine Drusen von Kalkoxalat. Die Gefässbündel sind weiter entwickelt wie diejenigen der Kotyledonen.

Das den Embryo bedeckende Silberhäutchen, der Rest des Perisperms, enthält in seinen Zellen Krystalle und Krystallaggregate von Fett in rundlichen oder keuligen Formen.

Aus dem Gewebe der Samenschale (Fig. 126) ist bemerkenswerth die Epidermis mit polygonalen Zellen, deren gelbgefärbte Wände etwas verdickt sind, das zusammen-

gefallene Parenchym mit braunröthlichem Inhalt, die abrollbaren Spiralgefäße, und eine Schicht kleiner Sklereiden (Fig 125 d), die an der Innenwand und den Seitenwänden verdickt sind

Zubereitung der Samen Die eingesammelten Früchte werden geöffnet, die Samen herausgenommen, durch Reiben mit den Händen oder auf Sieben vom Fruchtmus befreit und auf luftigen Hürden getrocknet. Die so zubereiteten Samen nennt man ungerottet, sie sind von geringem Aroma und ziemlich bitterem Geschmack. Diese Methode wird jetzt nur noch selten angewendet. Fast überall unterwirft man die Samen einem Gährungsprocess und erhält so die weniger bitteren gerotteten Samen, deren Aroma sich durch den genannten Process entwickelt hat.

Zu diesem Zweck breitet man sie in bis 10 cm dicker Schicht auf Brettern aus und beschwert sie oder bringt sie in Kasten oder Tische oder grub sie früher einfach in die Erde — Die gerotteten Samen werden dann getrocknet und kommen in den Handel. Sie haben nun eine braune Farbe angenommen, der violettrothe Farbstoff in den Kotyledonen ist aber, wenigstens in vielen Fällen, schon vorher vorhanden gewesen. Früher nahm man das Rotten in roher Weise in Erdgruben vor und die Samen erhielten dadurch einen Ueberzug von Erde, den man ihnen jetzt oft künstlich giebt.

Sorten Guayaquil-Machala 24 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick Zimmtfarbig Querschnitt graubraun

Guayaquil-Arriba 24 mm lang, 15 mm breit, 7,5 mm dick Rostfarbig Querschnitt dunkelbraun violett oder grau Stärkekörnchen bis 7μ

Guayaquil-Balao 23 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick Rostfarbig Querschnitt braun oder violett Stärkekörnchen bis $5,2\mu$

Puerto-Cabello 23 mm lang, 6 mm breit, 13 mm dick Ockerfarbig, erdig Querschnitt hellbraun

Para 22 mm lang, 11 mm breit, 5 mm dick Rostfarbig matt Querschnitt braun bis graubraun

Bahia 25 mm lang, 14 mm breit, 7 mm dick Rothbraun Querschnitt dunkelviolett Stärkekörnchen bis 7μ

Maracas 23 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick Rothbraun Querschnitt graubraun Stärkekörnchen bis $3,6\mu$

Canca 23 mm lang, 13 mm breit, 10 mm dick Rostfarbig oder graubraun Querschnitt gelblich braun Stärkekörnchen bis $7,2\mu$

Caracas 23 mm lang, 11,5 mm breit, 9 mm dick Ockerfarbig Querschnitt hellbraun, oft mit violettem Ton

Garupano 24 mm lang, 13,5 mm breit, 6 mm dick Erdfarbig grau Querschnitt violett Stärkekörnchen bis $13,5\mu$

Domingo 22 mm lang, 13 mm breit, 6 mm dick Schmutzig grau Querschnitt gelblich-braun

Trinidad 23 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick Rostfarbig Querschnitt rothviolett

Ceylon 21 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick Röthlichbraun, Querschnitt braun Stärkekörnchen bis 7μ

Java 22 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick Kupferfarben Querschnitt braun

Kamerun 24 mm lang, 13,5 mm breit, 6 mm dick Dunkel zimmtfarbig Querschnitt innen violettbraun

St Thomé 25 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick Graubräunlich Querschnitt grau-violett bis violett Stärkekörnchen $5,3\mu$

Die mitgetheilten Maasse der Samen sind das Mittel aus 20–30 Messungen — Die Farbe des Querschnitts wird bedingt durch die Farbe der Pigmentzellen und den




Fig 126 Samenschale des Kakao 160 Mal vergrößert.
ep Epidermis p Parenchym (Nach MOELLER)

durch das Rösten meist braun gefärbten Inhalt der übrigen Parenchymzellen — Aus der Beschaffenheit der Pigmentzellen allein sind Schlüsse auf eine bestimmte Sorte nicht zulässig

Verarbeitung der Samen. Dieselben werden zunächst in rotirenden Sieb-cylindern von Fremdkörpern und Staub befreit, die schlechten und wurmstichigen Stücke ausgelesen. Dann röstet oder brennt man sie, wodurch das Aroma erhöht, das Stärkemehl zum Theil verquollen und der etwa noch vorhandene bittere Geschmack gemildert wird. Ausserdem werden die Schalen ausgetrocknet und sprode, sodass sie leicht entfernt werden können. Das Rösten geschieht meist in besonders konstruirten Trommeln bei einer Temperatur von 130—150° C. Danach werden die Samen durch einen kalten Luftstrom möglichst rasch und vollständig abgekühlt und gelangen in die Brechmaschine, die aus einem innen mit Stiften versehenen genägten Cylinder besteht, in welchem sich eine aussen ebenfalls mit Stiften versehene Walze dreht. Der Zwischenraum zwischen Cylinder und Walze ist so klein, dass ihn die Samen unzerbrochen nicht passieren können. Die dabei abspringenden leichten Schalen werden durch einen Luftstrom weggeführt. Häufig wird für Herstellung feiner Chocoladen auch die Radicula und Plumula durch eine Siebvorrichtung entfernt, man setzt sie dann geringeren Sorten zu. — Dann mischt man für die weitere Verarbeitung meist mehrere Sorten unter einander (z. B. Caracas und Guayaquil ää, Caracas und Bahia ää, Trinidad und Maragnon ää) und zerreibt die zerkleinerten Samen auf Glockenmühlern. — Für Herstellung der sogen. entblühten Kakaos wird dann das Fett zum Theil abgepresst auf Handpressen oder mittels hydraulischer Pressen, deren Platten zur Erwärmung mit Dampfeinströmung versehen sind. Für Kakaos, die später mit Dampf oder Alkalien aufgeschlossen werden sollen, lässt man etwa 80% Fett darin, bei anderen Sorten zuweilen nur 12%. Bei der weiteren Verarbeitung solcher Kakaos wird das Pulver mit Alkalien (K_2CO_3 oder Na_2CO_3) bei 40—50° C. 24 Stunden digerirt. Es ist zu beachten, dass die Alkalien im Pulver bleiben und den Aschegehalt erhöhen. Durch diesen Process wird das noch vorhandene Fett zum Theil verseift, Erweichstoffe etc. angeblich leichter löslich gemacht (Vergl. aber Bestandtheile). Bei dem Aufschliessen durch Dampf wird das Pulver einer erhöhten Temperatur und starkem Dampfdruck längere Zeit ausgesetzt. Die Albuminate werden in lösliche Albumosen, die Stärke theilweise in Dextrin etc. verwandelt.

Neuerdings werden auch beide Methoden kombiniert, indem man das Aufschliessen mit Ammoniumsalzen besorgt und dann dämpft, wobei zugleich die Ammoniumsalze wieder entfernt werden.

Für die Herstellung der Chokolade wird die nichtentfettete Masse bei einer Temperatur von 35—40° C. auf Maschinen verschiedener Konstruktion mit Walzen auf einem Reibsteine, mittels eines gefurchten Kegels, der sich in einem gleichfalls gefurchten Mantel dreht, etc. höchst fein zerrieben und dabei zugleich mit den verschiedenen Zusätzen versehen. Bei geringen Chocoladen presst man auch wohl das Fett ab und ersetzt es durch minderwerthiges Fett anderer Art. Als Zusätze sind zu erwähnen Zucker, möglichst staubfrei und völlig ausgetrocknet, da feuchter Zucker eine matte, glanzlose Chokolade liefert. An Stelle des Zuckers tritt neuerdings häufig das Saccharin (s. d.), ferner Vanille resp. Vanillin, das die erstere aus der Chokolade immer mehr verdrängt, früher ersetzte man wohl die Vanille ganz oder theilweise durch Perubalsam resp. Benzoe, endlich Zimmt, Gewürznelken, Muskatnuss, Muskatblüthe, Cardamomen. Der Gewürzzusatz zu Chokolade, die im übrigen nur Kakao und Zucker enthalten darf, soll nicht mehr wie 1% betragen. Um billige, kohlehydratreiche Chokoladen herzustellen, oft aber auch zum Zwecke der Täuschung, macht man den Chokoladen häufig einen Zusatz von Stärke (Reis-, Mananta-, Sago-, Weizen-, Kartoffelstärke), auch Dextrin.

Für manche Zwecke (zu Figuren, Pralinées etc.) ist es nothwendig, der Chokolade oder dem Kakao noch einen besonderen Zusatz von Kakaofett zu machen, um sie recht dünnflüssig zu erhalten (Convertüren Masse).

Bestandtheile der Kakaosamen und der nichtentfetteten Kakao Masse.

nach H. WEIGMANN

Kakaosamen	Wasser	Stickstoff- haltige Sub- stanz	Theobromin	Fett	Stärke	Stickstoff- freie Ex- traktstoffe	Rohfaser	Asche	In der Trocken- substanz		
									Stickstoff- haltige Sub- stanz	Theo- bromin	Fett
									Procent		
Rohe, ungeschälte	7,93	14,19	1,49	45,57	5,85	17,07	4,78	4,61	15,41	1,62	49,49
Geröstete, ungeschälte	6,79	14,13	1,58	46,19	6,06	18,04	4,68	4,16	15,56	1,69	49,56
Geröstete, geschälte	5,58	14,13	1,55	50,09	8,77	13,91	3,93	3,59	14,96	1,64	53,04
Geknetete Masse	4,16	13,97	1,56	53,03	9,02	12,79	3,40	3,63	14,88	1,66	56,48
Kakaoschalen	11,73	13,95	0,78	4,66	43,29	16,02	10,71 ¹⁾	15,79	0,82	5,26	

Es scheint, dass durch das Rösten die Verdaulichkeit des Kakaos beeinträchtigt wird, nach Stutzer blieben von 100 Th N-haltiger Substanz beim Behandeln mit künstlichem Magensaft unverdaut

Von rohen Samen 19,3—23,2 Proc, von gerösteten Samen 39,7—40,3 Proc

Der werthvollste Bestandtheil, auf dem die Wichtigkeit des Kakaos als Genussmittel beruht, ist das Theobromin, an dem der Kakao im Verhältniss zu den andern verwandten, coffeinhaltigen Genussmitteln relativ arm ist. Neben dem Theobromin kommt in geringen Mengen (0,33—0,35 Proc) ein zweites sehr ähnliches Alkaloid in den Samen vor, wahrscheinlich Coffein.

Von sonstigen Bestandtheilen ist noch zu erwähnen eine geringe Menge Gerbstoff (6,71 Proc) und das wahrscheinlich aus demselben entstandene Kakaoth (2,2 Proc)

Bestandtheile fertiger Kakaos

nach KOENIG

Kakaosorten	Wasser	Stickstoff- haltige Sub- stanz	Theobromin	Fett	Stärke	N-freie Ex- traktstoffe	Rohfaser	Asche	In H ₂ O lös- liche Stoffe	Kali	Ammoniak- stickstoff
	Procent										
Gewöhnlicher	6,35	21,50	1,87	27,34	15,17	16,48	5,44	5,19	6,43	1,85	0,028
Holländischer mit K ₂ CO ₃ aufgeschlossen	4,54	19,66	1,74	31,61	12,61	17,25	5,85	8,48	6,22	4,01	0,021
Gaedke's mit Ammoniak u Ammon carb aufgeschl	5,66	22,12	1,69	27,83	14,46	17,86	5,96	4,39	7,06	1,66	0,330

Weitere Bestandtheile derselben Sorten nach Stutzer

Kakaosorten	Gesamt- stickstoff	In Procenten des Gesamtstickstoffs					In H ₂ O lös- liche Stoffe	Phosphor- säure	Von d. Phos- phorsäure löslich in % derselben
		Theo- bromin- stick- stoff	Ammo- niak- stick- stoff	Amid- stick- stoff	Verdaul- iches Stick- stoff	Unverdaulich Stick- stoff			
		P r o c e n t							
Gewöhnlicher	3,68	16,57	1,36	6,25	44,56	31,26	12,20	1,85	77
Holländischer	3,30	16,66	0,91	0,61	37,00	44,82	18,47	2,52	19
Gaedke's	3,76	15,96	8,24	3,46	39,09	32,23	11,54	2,10	35

Die Erhöhung des Gehaltes an Kali resp. Ammoniak durch die Röstzusätze tritt deutlich hervor. Die Löslichkeit der Phosphorsäure wird verringert, die anderer Stoffe wird nicht erhöht (Koenig). Es scheinen danach die Methoden, die eine sog. Aufschliessung des Kakaos beabsichtigen, keine Vortheile zu bieten.

¹⁾ Mit 4,06 Proc Sand.

Zusammensetzung einiger Kakao- resp. Chokoladespecialitäten.

Nahrsalzkakao von Dr. LAHMANN Wasser 8 Proc, Stickstoffsubstanz 17,5 Proc, Theobromin 1,78 Proc, Fett 28,26 Proc, Stärke 11,09 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 26,24 Proc, Rohfaser 4,21 Proc, Asche 4,7 Proc, Kali 1,66 Proc, Phosphorsäure 1,56 Proc

Malto-Leguminosen-Kakao Wasser 7,38 Proc, Stickstoffsubstanz 19,71 Proc (davon 18,26 Proc verdaulich), Theobromin 0,71 Proc, Maltose 1,88 Proc, Dextrin etc 3,53 Proc, Stärke 27,82 Proc, sonstige stickstofffreie Extraktstoffe 13,8 Proc, Rohfaser 2,36 Proc, Asche 4,94 Proc, Kali 1,74 Proc, Phosphorsäure 1,51 Proc

Michelkakao Wasser 5,88 Proc, Stickstoffsubstanz 13,51 Proc, Fett 14,82 Proc, Gerbstoff 2,42 Proc, Zucker 26,91 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 30,16 Proc, Holzfaser 2,91 Proc, Asche 3,64 Proc, Phosphorsäure 1,21 Proc

Saccharinkakao Wasser 7,26 Proc, Stickstoffsubstanz 20,5 Proc, Theobromin 2,09 Proc, Fett 32,25 Proc, Saccharin 0,4 Proc, Stärke 13,02 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 13,51 Proc, Holzfaser 5,27 Proc, Asche 5,93 Proc, Kali 2,16 Proc, Phosphorsäure 1,69 Proc

Peptonkakao Wasser 4,08 Proc, Stickstoffsubstanz 20,56 Proc, Albuminosen 8,25 Proc, Pepton 4,41 Proc, Theobromin 1,03 Proc, Zucker 49,51 Proc, sonstige stickstofffreie Bestandtheile 9,37 Proc, Holzfaser 1,43 Proc, Mineralstoffe 4,17 Proc, Kali 1,97 Proc, Phosphorsäure 1,21 Proc

Verfälschungen. Als solche kommen vor Auf dem Etiquette nicht deklarirte Beimengungen von Mehl und Stärke (Weizen, Reis, Kartoffel, Tapioca, Sago, Leguminosenmehl, Eichelmehl, Cichorienmehl etc), Nusschalenpulver, Zucker (wird, weil viel billiger, dem Kakao beigemengt, sollte in Chokolade nicht mehr wie etwa 50 Proc betragen), fein gemahlene Kakaoschalen (Pöos), fremde Fette (durch die man für die Chokoladefabrikation einen Theil des abgepressten Kakaofettes ersetzt, es werden als solche verwendet Randstalg, Dikabutter von *Mangifera gabonensis*, gereinigtes Kokosfett), mineralische Substanzen (Bols, Eisenoxyd mit etwas Alaun, Ocker werden reichlich mit Stärke versetzten Kakaosorten zur Herstellung der Farbe beigemengt)

Untersuchung 1) Mikroskopische Da die Kakaosamen ausserordentlich fein gemahlen werden, so sind alle Gewebelemente stark zertrümmert und schwer zu erkennen. Einer zu untersuchenden Probe ist vorher, nachdem sie ev. fein zerrieben ist, das Fett durch 24stündige Maceration mit Aether zu entziehen. Handelt es sich darum, in stark mit fremder Stärke versetzten Mustern noch nach anderen Verfälschungen zu suchen, so beseitigt man die Stärke, nachdem man sie mikroskopisch bestimmt hat, durch Kochen mit stark verdünnter Salzsäure und untersucht den Bodensatz von neuem (cf S 299), wobei zu beachten ist, dass die Pigmentzellen sich dabei roth färben.

Das Pulver reinen Kakao und reiner Chokoladen lässt unter dem Mikroskop die kleinen einzelnen oder aus wenigen zusammengesetzten Stärkekörnchen erkennen, Bruchstücke der Fett, Aleuron und Stärke enthaltenden bis 40 μ grossen Parenchymzellen, selten zarte Spiralgefässe und die Bruchstücke der Pigmentzellen (er oben). Auf sie wird man am meisten Gewicht legen, wenn es sich um den Nachweis von Kakao handelt, es ist aber zu beachten, dass sie in einigen und zwar besonders feinen Sorten fehlen können, ferner dass sie (anscheinend durch zu starkes Erhitzen) beim Rösten braun geworden sein können. Eine Verfälschung mit fremden Stärkemehlorten ist leicht festzustellen (cf S 294).

Schwieriger ist schon der Nachweis von beigemengten Kakaoschalen. Zunächst fallen reichlicher vorhandene und etwas stärkere Spiralgefässe auf, ferner achte man auf die Epidermiszellen (Fig 126 ep), als das entscheidende Element gelten die kleinen sklerotischen Zellen (Fig 125 d), die man aber, wenn sie aus dem Verbands gelöst, einzeln liegen, mit ganz kurzen Bruchstücken der Spiralgefässe verwechseln kann, wenn man nicht darauf achtet, dass letztere in der Aufsicht keinen völlig geschlossenen Ring bilden, sondern mit den beiden Enden des Spiralbandbruchstückes meist über einander liegen.

2) Chemische Untersuchung a) Asche 5–10 g der lufttrockenen, fein zerriebenen Masse werden in einer Platinschale bei anfangs kleiner Flamme verbrannt. Nach eingetretener Verkohlung löscht man die Flamme, zerdrückt nach dem Erkalten die Kohle, feuchtet mit Wasser an und führt die Veraschung bei verstärkter Flamme zu Ende.

b) Fett Es ist zweckmässig, die zerriebene Substanz mit Aether im Soxhlet zu extrahiren, dann den Inhalt der Patrone mit feinem Sand zu zerreiben und nochmals bis zur Erschöpfung mit Aether zu extrahiren.

c) Theobromin und Caffein (nach Mulder) 10 g Kakao oder 20 g Chokolade werden mit Wasser angerieben, $\frac{1}{2}$ Stunde gekocht, mit Magnesia usta versetzt und unter öfterem Umrühren auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft. Der trockene Rückstand wird im Soxhlet bis zur Erschöpfung mit Chloroform extrahirt, das letztere abdestillirt, der verbleibende Rückstand in heissem Wasser gelöst, filtrirt, das Filtrat in einer gewo-

genen Platinschale zur Trockne verdampft, gewogen, eingeschert und wieder gewogen. Gesamtgewicht minus Asche ist Theobromin + Coffein

Zur Bestimmung des Coffeins behandelt man eine zweite Probe in derselben Weise, wagt, äschert aber den gewogenen Rückstand des Chloroformansatzes nicht ein, sondern extrahiert ihn mit Benzol, worin sich Coffein löst, während Theobromin so gut wie unlöslich ist

d) Zucker (nach KOENIG) Die Kakaomasse oder Chokolade wird am besten erst im Soxhlet mit Aether extrahiert, dann ein neues Kölbchen vorgelegt und der Zucker mit Alkohol ausgezogen. In der alkoholischen Lösung wird dann der Zucker bestimmt, indem man die Lösung mit Bleiessig, bezw. Thonerdehydrat oder Alaun klärt und dann polarisiert (cf. Saccharum). Oder man verdampft den Alkohol, stellt das Gewicht des Rückstandes fest, löst in Wasser, filtriert und verdünnt so, dass man keinen höheren Gehalt als 1 Proc. annehmen kann. Ein aliquoter Theil wird durch halbständiges Erwärmen mit Salzsäure im kochenden Wasserbade invertiert, mit titrierter Natronlauge genau neutralisiert und mit Fehling'scher Lösung der Zuckergehalt bestimmt (cf. Saccharum).

e) Stärke und Mehlsatz (nach KOENIG) 5 g der Substanz werden im Soxhlet erst mit Aether und dann mit Alkohol extrahiert, dann bringt man den fett- und zuckerfreien Rückstand nach dem Trocknen in eine starkwandige Glasbox oder einen bedeckten Zinnbecher von 150–200 ccm, mit 100 ccm Wasser gemengt in einen Soxhlet'schen Dampftopf (Fig. 127) und erhitzt 3–4 Stunden bei 3 Atm. Druck. — In Ermangelung eines Dampftopfes kann man auch ein REINSHAUEN-LINTNER'sches Druckfläschchen benutzen, das man 8 Stunden auf 108–119° C im Glycerinbade erhitzt. — Der Inhalt des Fläschchens oder Bechers wird noch heiss durch einen mit Asbest gefüllten Trichter filtriert und mit siedendem Wasser ausgewaschen. Der Rückstand darf mit Jod keine Blaufärbung mehr geben. Das Filtrat wird auf 200 ccm ergänzt und mit 200 ccm Salzsäure (spec. Gew. 1,25) drei Stunden am Rückflusskühler im kochenden Wasserbade erhitzt. — Dann wird rasch abgekühlt und mit Natronlauge bis zur nur noch schwach sauren Reaktion neutralisiert und auf 500 ccm aufgefüllt. Die in der Lösung befindliche Dextrose wird mit Fehling'scher Lösung nach ALLIEN (cf. Saccharum) bestimmt. Die gefundene Menge Kupfer $\times 0,9$ ergibt die Stärkemenge.

f) Der Nachweis von Kakaoschalen kann durch die Bestimmung der Rohfaser unterstützt werden, da die entschälten Samen davon 3,5 Proc., die Schalen 15–16 Proc. enthalten. Die Entscheidung kann aber nur der mikroskopische Nachweis bringen.

Die Kakaoschalen Kakaothee Testae Cacao Cortex Cacao tostus machen 12,8–20,1 Proc. (Mittel 15 Proc.) der Samen aus und bilden ein schwer verwertbares Nebenprodukt, das aber, da es auch Theobromin enthält, als Genussmittel nicht ganz werthlos ist. *Bestandtheile* cf. S. 523

Verwendung. Die Verwendung bietet Schwierigkeiten. Hier und da benutzt man sie als billigen Kaffee- oder Theeersatz, wozu sie sich ihres Theobromingehaltes wegen sehr wohl eignen, oder überzieht sie als Naschmittel mit Zucker. Anderwärts verwendet man sie als Futtermittel, als Düngemittel oder macht Briquettes daraus.

Pasta Cacao (Ergänzb.) **Massa Cacao** **Pasta cacaotina.** **Kakaomasse** **Chokoladenmasse.** **Pâte de Cacao** **Cacao-paste.** Die aus den Samen gewonnene Masse (cf. S. 522) kommt gewöhnlich in dicken Tafeln in den Handel, ist ein beehrtes, starkendes Genuss- und Nahrungsmittel und eignet sich vorzüglich zur Herstellung medicinischer Zeltchen, Pastillen und Chokoladen. Zu diesem Zwecke erweicht man sie im Wasserbade,




Fig. 127

Soxhlet'scher Dampftopf.

fügt die betreffenden Arzneistoffe hinzu und giesst entweder in Formen oder sticht mittelst eines Pastillenstechers aus

Cacao ab oleo liberatum **Cacao deoleatum s. expressum.** Entölter Kakao
Entfettete Kakaomasse. Gesundheitschokolade. Wird aus der Kakaomasse durch Abpressen des fetten Oeles erhalten (cf S 522), ist als Grundlage für Pillen oder Pulver zur Aufnahme bitterer Stoffe sehr zu empfehlen

Die Chokoladen und Chokoladenpulver des Handels sind Mischungen aus Kakaomasse, Zucker und Gewürzen, bisweilen enthalten sie auch Stärke oder geröstetes Mehl. Sie liefern alsdann mit kochendem Wasser alsbald ein gleichförmiges, wohlschmeckendes Getränk, während reiner Kakao sich bei gleicher Behandlung in kurzer Zeit zu Boden setzt. Diese Zusätze von Stärke oder Mehl sind natürlich zu deklarieren.

Kakaomasse und Chokoladen müssen in einem trockenen, kühlen Raume aufbewahrt werden, um das Schimmeln und eine Verminderung des Aromas zu verhüten, kann man sie mit verdünnter Benzoeinktur (o Spirit aa) bestreichen und in Stanniol einschlagen

Essentia Cacao BERNEGAT	
Rp	1 Cacao deoleati 125,0
	2 Vanillae 2,0
	3 Corticis Cinnamomi 2,0
	4 Caryophyllorum 0,75
	5 Macidis 0,5
	6 Rhizomatis Zingiberis 0,1
	7 Spiritus (90 proc) 750,0
	8 Aquae 250,0
	9 Sacchari 550,0
	10 Aquae 750,0

Man zieht 1—6 mit 7—8 acht Tage lang aus und filtriert dann in die heisse Lösung aus 9 und 10 Stärkungsmittel für Rekonvalescenten, besonders mit verquämtem Eigelb

Pasta Cacao alba Chocolat blanc.	
Rp	1 Olei Cacao 16,0
	Amyli Oryzae 56,0
	Sacchari albi 192,0
	Amyli 16,0
	Gummi arabici 8,0
	Tincturae Vanillinae 1,0

Aquae fervidae q s ut fiat pasta

Man formt Pastillen, die zum Gebrauch in heissem Wasser oder Milch gelöst werden

Pasta Cacao aromatica Gewürz-Chokolade (Diet)	
Rp	1 Pastae Cacao 500,0
	2 Sacchari bene siccati 500,0
	Corticis Cinnamomi 10,0
	Fructuum Cardamomi 2,0
	Caryophyllorum 2,0
	Macidis 1,0

Man schmilzt 1 im Dampfbade, erhitzt $\frac{3}{4}$ Stunde unter Umrühren, setzt 2 mit den Gewürzen gemischt zu, bringt in Blechformen und vertheilt durch gleichmässiges Aufschlagen

Pasta Cacao cum Extracto Chinae China-Chokolade

Rp	Extracti Chinae spirit 2,5
	Corticis Cinnamomi 100
	Rhizomatis Zingiberis 2,5
	Sacchari 500,0
	Pastae Cacao 485,0

Wird wie Gewürzchokolade bereitet

Pasta Cacao cum Extracto Glandium Quercus Eichel-Kakao (Diet)

Rp	Extracti Gland Quercus saccharati 100,0
	Sacchari 500,0
	Pastae Cacao 400,0

Wie Pasta Cacao aromatica zu bereiten

Pasta Cacao cum Hordeo praeparato Gerstenmehl-Chokolade

Rp	Pastae Cacao 500,0
	Sacchari 450,0
	Farinae Hordei praeparatae 50,0

Pasta Cacao ferrata Eisen-Chokolade (Diet)	
Rp	Ferri oxydum saccharati (Germ) 50,0
	Sacchari Vanillini (8%) 2,0
	Sacchari 498,0
	Pastae Cacao 450,0

Pasta Cacao purgativa Abführende Chokolade

Rp	1 Pastae Cacao 300,0
	2 Olei Ricini 100,0
	3 Magnesiae ustae 300,0
	4 Sacchari 400,0

Man schmilzt 1 mit 2 und fügt dann 3 und 4 hinzu

Pasta Cacao saccharata Gesundheits-Chokolade

Rp	Pastae Cacao 490,0
	Amyli Marantae 10,0
	Sacchari 500,0

Pasta Cacao vanillata

Vanille-Chokolade

Rp	Pastae Cacao 450,0
	Sacchari 450,0
	Sacchari Lactis 95,0
	Sacchari Vanillini 5,0

Pastilli medicinales cum Cacao

Pastillen mit Kakaogrundlage

Rp	1 Medicamenta praescripta 25,0—50,0
	2 Sacchari 575,0—550,0
	3 Pastae Cacao 400,0
	4 Sacchari Vanillini 2,0

Man schmilzt 3, setzt die sehr fein gepulverte Mischung aus 1, 2, 4 hinzu, mischt innig und vertheilt mit Messlöffel oder Wage in gewürzte Blechformen, durch Aufschlagen auf die Unterlage erhalten die Pastillen die richtige Form. Obige Masse giebt 1000 Stück, jede Pastille enthält 0,025—0,05 g des wirksamen Arzneistoffs

b nach HELL's Man (für Pastilli Santonini)

Rp	(Santonini 2,5)
	Sacchari 100,0
	Pulveris Chocolatas 100,0
	Butyri Cacao 2,0

Plant trochisci No 100

Pulvis Cacao compositus

Sachhalt. Reiskontent. Kontentmehl.

A	
Rp	Pastae cacaoinae 500,0
	Farinae Oryzae 250,0
	Sacchari albi 245,0
	Cassiae Cinnamomi 5,0

B	
Rp	Massae Cacao deoleat 150,0
	Amyli Marantae 200,0
	Tuberum Salep 48,0
	Sacchari 600,0
	Sacchari Vanillini 2,0

Batafia Cacao Kakaolikör		
I		
Rp	Pastae Cacao vanillatae	150,0
	Spiritus	550,0
	Aquae	500,0
II		
Rp	Cacao delecta	200,0
	Coclonellae	2,0
	Tinct Vanillae	40,0
	Arrac	200,0
	Spiritus	3800,0
	Sacchari	4000,0
	Aquae	5000,0

Vinum Chinae cum Cacao BUGAUD		
Vin toni-nutritif BUGAUD		
Rp	Semina Cacao tost pulverat	100,0
	Spiritus Vini gallici	400,0
Nach 2tägiger Digestion fügt man hinzu		
	Cortices Chinae regiae	120,0
	Corticis Cinnamomi	10,0
	Sirupi simplicis	200,0
	Vini Hispanici	2000,0
Nach mehrtägigem Stehen presst man, lässt absetzen und filtrirt.		

Um Pastillen mit Chokolade zu überziehen, schmilzt man $\frac{1}{2}$ Kilo Kakaomasse im Wasserbade, arbeitet mit 250 g Zuckerpulver und 5 g Vanillinzucker durch und taucht entweder die Pastillen einzeln mittelst einer Stricknadel, oder in grösserer Zahl auf in Korkscheiben befestigte Stifte gespießt in die Masse.

Pillen werden mit Chokolade überzogen, indem man sie mit Zuckersirup befeuchtet und in einer geräumigen Schale mit einer Mischung aus Kakao 4 Th, Zuckerpulver 6 Th rollt. Die lufttrockenen Pillen erhalten durch nochmaliges Rollen in einer gehende erwärmten Schale Glanz, den man noch durch Ueberziehen mit atherischer Benzotinktur erhöhen kann. Im grossen dient zu diesem Verfahren der Drageekessel.

Chocolat digestif, Vichy-Chokolade ist Chokolade mit geringem Gehalt an Natriumbikarbonat.

Chocolat rétablière aus Wien enthält Ferrum reductum, getrocknetes Fleisch, Erbsen- und Weizenmehl, Zucker und Kakao.

Cocoa, ein Nahrungsmittel, enthält als Grundlage Kakaoschalen.

Davosin, von HERTZ in Basel ist Chokolade mit Guajakolkarbonat.

Dictamia von GROUT & BOUTRON RUSSSE, ein Stärkungsmittel, besteht aus Kakao, präpariertem Gerstenmehl, Stärke, Zucker, Vanille.

Gaugau, ein Wiener Kinderthee, besteht aus Kakaoschalen.

Hardidadik, Asiatische Chokolade, ist aus Kakao, Zucker, Stärke, Reismehl, Vanille zusammengesetzt.

Homöopathische Chokolade von KNEFLIN besteht aus geröstetem Weizenmehl 20, Kakao 85, Zucker 45.

Kaiffa, Fecule orientale. Gemisch aus Kakao, Reismehl, Sago, Salep, Stärke, Gelatine, Zucker.

Kindernährpulver von LEHMANN-Berlin. Fleischextrakt, Kakao, Salep, Zucker, Conchae präp.

Nähr- und Heilpulver von Dr KOEHN enthält Zucker, Kakao, Griesmehl, Eichelkaffee.

Palamoud des Turcs besteht aus Kakao, Reismehl, Stärke und Sandelholz.

Racahout des Arabes Cacao pulv 2, Amylum 5, Salep 1, Saccharum 8, Tinct. Vanill q s.

Theobromade, Theobromine ist ein trockenes Extrakt aus Kakaoschalen.

Wacaca des Indes Cacao pulv 60, Saccharum 165, Cort Cinnamom 8, Vanilla 2, Tinct Ambrae q s.

Oleum Cacao (Austr Germ Helv) Oleum Theobromatis (Brit U-St) Oleum Cacao expressum s unguinosum. Butyrum Cacao Kakaobitter. Kakaofett Kakaool. Kakaotalg. Beurre de cacao (Gall) Oil of Theobroma Butter of Cacao.

Gehalt der Samen an Fett und Darstellung of S 522, 523. Rohe Samen enthalten etwas mehr Oel als gebrannte, z B 48 45 Proc. Das frisch abgepresste Oel ist mit Theilen der Samen verunreinigt, man stellt es zum Absetzenlassen längere Zeit in einen auf 40—50° C erwärmten Raum und giesst dann ab. Für pharmaceutische Zwecke wird es dann häufig noch durch einen Heisswassertrichter filtrirt.

Eigenschaften. Es ist gelblichweiss, nach längerem Liegen gelb, ziemlich hart, hat einen schwach aromatischen Geruch und Geschmack nach Kakao. Es löst sich klar in Aether, Petroläther und Chloroform, in 5 Th kochenden, absoluten Alkohols, unlöslich in 90 proc Alkohol (Unterschied von Cocosfett). — Die gewöhnliche Annahme, dass Kakaobutter schwieriger ranzig werde, als viele anderen Fette, ist falsch. Eine Probe, die frisch 0,06 ccm $\frac{1}{2}$ Normallauge zur Neutralisation verbrauchte, verbrauchte nach sechsmonatlichem Aufbewahren in verschlossenen Glasern 0,22 ccm. — Schon durch das gebräuchliche Ent

wassern und Filtriren im Dampftrichter kann sich der Säuregehalt auf das Doppelte erhöhen, weshalb man längeres Erhitzen vermeiden soll

Konstanten Spec Gewicht bei 15° C 0,952–0,981, bei 90° C 0,892 Schmelzpunkt bei den einzelnen Sorten nicht konstant 29,5–35,0° C (Trinidad 31,5–32,5° C, Caracas 31,9–34,2° C, Granada 33,0–33,3° C, Ceylon 33,0–33,6° C, Guayaquil 33,6 bis 38,0° C) (Die Arzneibücher verlangen Germ 31–32° C, Helv 30–32° C, Austr 30 bis 35° C, U-St 30–33°, Brit 31,1–33,9°)

Schmelzpunkt der Fettsäuren 50,5° C, Erstarrungspunkt 27,0° C, Erstarrungspunkt der Fettsäuren 49,5° C Refraktometerzahl bei 40° C = 46,5, bei 50° C 41,0 Brechungsindex bei 33,5° C = 1,45327 Jodzahl 27,0–37,5 HENNER'sche Zahl 94,89

Bestandtheile Glyceride der Stearin-, Palmitin-, Laurin- und Arachninsäure, ferner Ameisensäure, Essigsäure, Buttersäure und Cholesterin

Verfälschungen Die Kakaobutter wird häufig mit Nierenfett (Talg), Wachs, Stearinsäure und Paraffin verfälscht Besonders geeignet dazu ist aber das Cocosfett und das Dikafett aus dem Samen der *Mangifera gabonensis* und wohl auch das der *Irvingia Barteri* Um einen „schönen“ Bruch der Chocolate zu erzielen, ist es vielfach gebräuchlich, derselben bis 4 Proc Sesamöl zuzusetzen

Prüfung 1 Saurezahl 10 g Ol Cacao löst man in 40 ccm Chloroform + Alkohol aa und titirt mit $\frac{1}{10}$ N alkoholischer Kalilauge und Phenolphthalein Die verbrauchten Kubikcentimeter Länge $> 5,6$ = Saurezahl (d h Milligramm KOH, die 10 g Ol Cacao binden) Grenzzahlen 7,8–25,20

2 Verseifungszahl heiss und kalt Grenzzahlen, heiss 195,07–207,67, kalt 189,83–198,83

a) 3 g werden in einem Kolben mit 40 ccm $\frac{1}{10}$ N alkoholischer Kalilauge auf dem Sandbade 1 Stunde im Sieden erhalten, den verdunsteten Alkohol ersetzt man erst, wenn der Inhalt des Kölbchens noch etwa 10 ccm beträgt Dann bringt man auf das ursprüngliche Volumen und titirt mit $\frac{1}{2}$ N Schwefelsäure zurück Die gebundenen Kubikcentimeter KOH < 28 = Verseifungszahl

b) 3 g werden in 25 ccm Petrolbenzin gelöst, dann 25 ccm N alkohol Kalilauge zugegeben und über Nacht stehen gelassen, dann titirt man mit $\frac{1}{10}$ N Salzsäure zurück

3 Aetherprobe 3 g Ol Cacao werden mit 6 g Aether übergossen, das Reagensglas mit einem Kork verschlossen und bei 18° C durch Schütteln in Lösung gebracht Die klare Lösung stellt man in Wasser von 0° C, wenn sie sich dann nach 10–15 Minuten trübt und bei 19–20° C wieder klar wird, so ist das Fett rein — Mit Wachs verfälschtes Ol Cacao giebt von vornherein eine trübe Lösung Mit Rindstalg verfälscht beginnt die Trübung früher (7–8 Minuten) und die neue Klärung tritt erst bei 22–25° C ein — Dikafett wird durch diese Proben nicht angezeigt

c) Anilinprobe 1 g Ol Cacao wird mit 2–8 g Anilin bis zur Lösung erwärmt und bleibt bei 15° C eine Stunde stehen Reines Oel schwimmt als klare Schicht auf dem Anilin und erstarrt erst nach Stunden Ist das Oel verfälscht mit Talg und Stearinsäure oder wenig Paraffin, so setzen sich körnige oder schollige Partikel ab in der Oelschicht Ist Wachs oder viel Paraffin vorhanden, so erstarrt die Fettschicht, bei Gegenwart von viel Stearin erstarrt das Ganze zu einer krystallinischen Masse

d) Sesamöl (vergl oben) weist man nach, indem man 2 g mit einem Gemisch von 1 ccm Salzsäure (spec Gew 1,18) und 0,05–1,0 g Rohrzucker gelinde erwärmt Reines Kakaool wird gelb bis braun, bei Gegenwart von Sesamöl ist die Färbung mehr oder weniger roth

e) Nach den bisherigen Erfahrungen ist Dikafett kaum nachzuweisen sein Schmelzpunkt ist 29–31° C, die Jodzahl 80,9–81,8 Die Säurezahl wird auf 17,8–19,6 angegeben

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt an einem kühlen Orte Das Oel füllt man am besten flüssig in trockene, nicht zu grosse, gelbe Arzneigläser Die Handelsware erhält man gewöhnlich in Tafeln, die mit Stanniol umhüllt sind Für Rezeptur zwecke ist die Form der Faden oder des groben Pulvers, das man sich mittels eines Reibens darstellt, am zweckmässigsten, doch hält man davon nur einen mässigen Vorrath, da das Oel, mit der Luft in Berührung, bald missfarbig wird

Anwendung Innerlich sehr selten als Emulsion, die in einem erwärmten Mörtel mit warmem Wasser zu bereiten ist, oder als Grundlage für Pillenmassen mit Metallsalzen,

zu Augensalben und Lippenpomaden; hauptsächlich aber zu Suppositorien, Vaginalkugeln, Urethralstäbchen und ähnlichen Arzneiformen.

Infolge des neuerdings vermehrten Verbrauches von entöltem Kakao, verwendet man das in grosser Menge erhältliche Fett zur Herstellung von Seifen: dazu werden 1000 g Kakaöl mit 850 g Natronlauge (spec. Gew. 1,34) im Wasserbade so lange unter Umrühren erhitzt, bis eine Probe sich in heissem, destillirten Wasser klar löst. Dann bringt man dazu 700 g einer filtrirten Lösung von Natriumchlorid in destillirtem Wasser und erhitzt unter Umrühren $\frac{1}{2}$ Stunde, lässt in einem nicht metallenen Gefäss erkalten, und hebt die abgeschiedene Seife ab um sie weiter zu reinigen (cf. Sapo medicatus).

Pillen überzieht man mit Kakaöl, indem man sie in einer möglichst grossen, erwärmten Schale mit geschmolzenem Oel rollt und nach dem Erkalten dieses wiederholt, bis der Ueberzug gleichmässig und glänzend erscheint. Auf 100 Pillen nimmt man jedesmal etwa 1 g Kakaobutter.

Suppositorien, Suppositoires, Suppositories, sind kegel-, walzen-, kugel- oder eiförmige Arzneiformen, je nachdem sie in den Darm, in die Harnröhre oder in die Scheide eingeführt zu werden bestimmt sind. Als Grundlage dient, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, Kakaobutter (Brit., Germ., Helv., U-St.); die Arzneistoffe werden gelöst oder mit wenig Kakaobutter angeriechen, bei gelinder Wärme mit dem Reste derselben gemischt und die




Fig. 128. Maschine für Voll-Suppositorien von R. LIEBAU in Chemnitz.




Fig. 129. KUMMER'sche Presse für Suppositorien und für Vaginalkugeln von E. A. KUMMER in Berlin.

Masse unter beständigem Rühren während des Erkaltes in kleine Wachs-Düten gegossen — das älteste und am wenigsten zu empfehlende Verfahren —; oder man bedient sich der gepulverten Kakaobutter und stösst nach Zusatz von wenig Lanolin zu einer bildsamen Masse an, die mit der Hand und dem Rollbrett auf einer Glasplatte, auf Wachtuch oder Pergamentpapier ausgerollt, eingetheilt und unter Bestreuen mit Talk (Amylum, Lycopodium) geformt wird; oder man stopft diese abgetheilte Masse in Formen aus Holz oder Metall, in die man zuvor mittelst eines Stiftes Stanniol eindrückt.

Stäbchen erhält man in beliebiger Stärke sehr sauber mittelst der BOUGIES-Spritze, auf jeden Fall gleichmässiger als durch Aufsaugen der geschmolzenen Masse in Glasröhren. Die fertigen Suppositorien werden, in Wachspapier oder Stanniol gehüllt oder einfach zwischen Watte gelegt, verabfolgt. — **Stuhlzäpfchen, Rectal Suppositories**, sind kegelförmig; Brit., U-St. lassen dieselben etwa 1 g schwer, Gall. 4 g schwer, Germ., Helv. 3—4 cm lang und 2—3 g schwer anfertigen; **Urethralstäbchen, Bacilli, Cereoli, Bougies, Urethral Suppositories** sind walzenförmig und 1 g schwer (U St.); **Vaginalkugeln, Globuli vaginales, Vaginal Suppositories** 3 g (U-St.) oder 4—6 g (Germ., Helv.) schwer. — In wärmeren Ländern giebt man der Suppositorienmasse einen entsprechenden Zusatz von Cera alba (Brit.). — Die fabrikmässig aus Kakaöl hergestellten Hohlzäpfchen dürfen (Germ., Helv.) nur auf ausdrückliche Vorschrift abgegeben werden.

Bacilli s. Cereoli Argenti nitrid

(cum Oleo Cacao parati).

Höllensteinstäbchen.

Apotheker-Zeltg.

Rp. Argenti nitrid 0,1
Oleo Cacao 18,0
Adipis Lanae 2,0.

Man formt 40 Stäbchen von 8 cm Länge und 4 mm Dicke. Das Arg. nitr. wird als feines Pulver zugesetzt.
Handb. d. pharm. Praxis. I. 34

Bacilli Olei Cacao Kakao-Stäbchen.

Rp Olei Cacao 10,0
Adipis Lanae 1,0

Man formt 10 Stäbchen von 10 cm Länge, 8 mm Dicke

Für 1 Stäbchen von 10 cm Länge sind erforderlich:

bei 2 mm Dicke	0,3 g Oleum Cacao
" 8 " "	0,7 " " "
" 4 " "	1,25 " " "
" 5 " "	2,0 " " "
" 6 " "	2,9 " " "
" 7 " "	4,0 " " "
" 8 " "	4,75 " " "

Sollen derartige Stäbchen Arzneistoffe aufnehmen, so wird die Menge der Kakaobutter um die Gewichtsmenge der ersteren verringert

Bacilli Olei Cacao elastici KREMEL.

Rp 1 Ol Cacao 50,0
2 Gummi arab plv 25,0
2 Glycerin
4 Aq destillat ss 12,5

Man schmilzt 1, lässt mit 2 vermischt $\frac{1}{2}$ Stunde bei 85° C stehen und fügt allmählich 3 und 4 zu. Die Masse lässt sich vorzüglich halten.

Ceratum labiale

Lippen-Pomade Pomade pour les lèvres

Rp Olei Cacao 75,0
Olei Olivum 25,0
Olei Rosae gtt V

Durch 9 s Olei Alkanneae färbt man nötigenfalls rosa und giesst halb erkaltet in Glasröhren, Tafeln oder Schiebedosen aus Zinn

Pasta urethralis SOULARD

Urethralstäbchenmasse

Rp Olei Cacao 2,0
Lanolin 1,0
Cerae albae 1,0

Man formt 10 Stäbchen

Pasta urethralis UNNA

Rp Cerae Euvae 4,0
Olei Cacao 94,0
Balsami peruviani 2,0

Pilulae Argenti nitrici

Höllensteinpillen (Apoth Zeitg)

Rp Argenti nitrici 0,3
Olei Cacao 2,0
Adipis Lanae 0,8

M f pilul No 80 Conspr Talc venet pulv
Jede Pille enthält 0,01 g Argentum nitricum

Anusolzapfchen gegen Hamorrhoiden, von F. BUORHA's Kopf-Apotheke in Frankfurt a. M., bestehen aus jodresorcin sulfonsaurem Wismut (= Anusol), Zinkoxyd, Perubalsam, Kakaobutter, Wachsalbe

Chokoladenbutter, von England aus als Ersatz der Kakaobutter empfohlen, zeigte alle Eigenschaften des Kokosfettes

Hygima, THEINHARDT's, braunliches, süß und nach Kakao schmeckendes, pulverförmiges Nahrungsmittel. Enthält 22 Proc Eiweiss, 6,6 Proc Fett, 52,8 Proc lösl Kohlehydrate, 2,5 Proc Nährsalze

Kakaobutter, künstliche, aus der Königl Hofapotheke von SANDER in Potsdam, wird aus Kakaoschalen gewonnen

Kakaophen. Ein Mehl aus Reis, Hulsenfruchten, Kakao — Fett 12 Proc, Protein 26 Proc

Martol STROSCHEIN ist ein dickes, Eisentannat enthaltendes Extrakt aus Kakaoschalen

Rhinalgin, gegen Schnupfen, sind Zäpfchen aus Kakaoöl 1,0, Alumnol 0,01, Menthol 0,025, Baldrianöl 0,025, die in die Nase gesteckt werden

Sicherheitspessarien von Dr. GUTTMANN, HENKE, KETZER & Co, NOFFKE, SCHWEIZER, „Therapie“, sind sämtlich Kakaoöl-Suppositorien mit einem Gehalt von 0,025 bis 0,05 Chinin

Agonoplasmin besteht aus Kaliumpermanganat und 6 Kakaosuppositorien

Pilulae Hydrargyri chlorati mitis Kalomelpillen. (Apoth-Zeitg)

Rp Hydrargyri chlorati mit 3,3
Olei Cacao 4,0
Adipis Lanae 1,0

M f pilul No 80 Conspr Talc venet
Jede Pille enthält 0,04 g Kalomel

Pilulae Kali iodati

Jodkaliumpillen (Apoth-Zeitg)

Rp Kali iodati 15,0
Magnesi carbonici 1,0
Olei Cacao 5,0
Adipis Lanae 2,5

M f pilul No 80 Consprg Talc veneto Jede
Pille enthält 0,5 g Jodkalium

Styli medicinales UNNA.

UNNA's Salbenstifte

Rp 1 Ol Cacao 70,0
2 Paraffin solid 10,0
3 Ol Olivum 10,0

Man schmilzt 1 und 2, fügt die mit 3 angeriebenen Arzneistoffe (2—15 Proc) zu und giesst halb erkaltet in Glasröhren

Suppositoria Olei Cacao

Kakao-Stuhlzäpfchen

Rp Olei Cacao 20,0
Adipis Lanae 2,0

Man stösst zur Masse an und formt daraus 10 Suppositorien

Suppositoria cum Oleo Cacao

Suppositoire de Beurre de Cacao (Gall)

Rp Ol Cacao 4,0
Zu einem Suppositorium

Unguentum pomadinum UNNA

Rp Olei Cacao 10,0
Olei Amygdalarum dulc. 20,0
Olei Rosae gtt I

Unguentum pomadinum compositum UNNA.

Rp Ungt pomadin UNNA 100,0
Sulfuris praecipitati 4,0
Resorcin 2,0

Unguentum pomadinum sulfuratum UNNA

Rp Olei Cacao 10,0
Olei Amygdalarum 20,0
Sulfuris praecipitati 1,0
Olei Rosae gtt II

Hygienische Sicherheitsovale aus Berlin N 54 enthalten Kakaoöl, Borsäure, Weinsäure

Suppositoires Malthus von SAUTER in Genf (Préservatif des dames) bestehen aus Kakaoöl 2, Chininsulfat 0,035, Thymol 0,02

Theobrom LEPÈRE, ein Getränk aus Zuckerrüben, das mit Kakao nichts gemein hat.

Tutelol Dr SMITSON enthält neben Kakaoöl wenig Weinsäure

UNGER's Sicherheitsovale enthalten Borsäure, Chinin, Chinisol, Kakaobutter (AUFRECHT)

Cadmium.

Cadmium (Gall) Kadmiun. Cadmie (französisch) Cadmium (engl) Cd.
Atom-Gew = 112.

1 Cadmium metallicum Cadmiummetall. Kommt in den Erzen meist mit Zink zusammen vor und ist bei der Ausbringung des Zinks in den ersten Antheilen des Destillates enthalten, da es bei niedrigerer Temperatur siedet als das Zink. Man schlägt es ferner aus den Zinksulfatlösungen des Flugstaubes aus Zinkblende Röstanstalten durch metallisches Zink nieder.

Eigenschaften. Zinnweisses, glanzendes, geschmeidiges Metall vom spec Gewicht 8,6—8,7. Harter als Zinn, lässt sich aber mit dem Messer schneiden, zu Blech walzen und zu Draht ausziehen. Es krystallisirt in regulären Oktaëdern, beim Biegen kreischt es wie Zinn, der Bruch ist hakig, das Gefüge dicht. Es schmilzt bei 320° C und siedet bei etwa 760° C (Gall spec Gew = 8,6, Schmelzp 315° C, Siedep ca 860° C). An der Luft verhält es sich dem Zink ähnlich. In trockener, reiner Luft hält es sich unverändert, an feuchter Luft bedeckt es sich oberflächlich mit einer Schicht von Cadmiumsubkarbonat. In Wasser bedeckt es sich allmählich mit einer weissen Schicht von Cadmiumhydroxyd und -Subkarbonat. An der Luft erhitzt, verbrennt es unter Entwicklung eines braunen, widerlich riechenden und Kopfschmerzen verursachenden Dampfes zu Cadmiumoxyd CdO . — In Essigsäure, Chlorwasserstoffsäure und verdünnter Schwefelsäure löst es sich unter Entwicklung von Wasserstoff langsamer als Zink, leicht löslich ist es in verdünnter Salpetersäure unter Entbindung von Stickstoffoxyd. — Aus seinen Salzlösungen wird das Cadmium durch Zink gefällt (s oben). — Cadmium kommt meist in Form von Stangen in den Handel.

Prüfung. 1) Man bestimmt das spec Gewicht, welches 8,6—8,7 betragen muss. 2) 2 g Cadmium werden in 10 ccm Salpetersäure gelöst. Die Lösung muss klar sein (ein weisser unlöslicher Rückstand würde Zinn anzeigen). Diese Lösung wird getheilt. 3) 5 ccm der Lösung sub 2 werden mit Ammoniak in starkem Ueberschusse versetzt. Blaue Färbung zeigt Kupfer an. 4) 5 ccm der Lösung sub 2 werden mit 10 ccm Wasser versetzt, mit Kalilauge im Ueberschusse gefällt und filtrirt. Das Filtrat darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht braunschwarz (Blei) oder weiss (Zink) gefällt werden. 5) Auf Arsen prüft man, indem man einige Stücke Cadmium mit arsenfreiem Zink zusammen in einen Marsir'schen Apparat bringt.

Man beachte indessen, dass geringe Mengen fremder Metalle das Cadmium für die meisten Zwecke noch nicht ungeeignet machen.

Aufbewahrung In gut verschlossenen Gefässen.

Anwendung Zur Herstellung einiger Metall Legierungen, namentlich für Zahnärzte, ferner zur Darstellung der Cadmiumsalze.

Chemie und Analyse A. Erkennung. Man erkennt das Cadmium an folgenden Reaktionen. 1) Wird das Metall vor dem Löthrohre auf Kohle erhitzt, so verbrennt es mit braunem, die Kohle beschlagendem Oxyd. — Erhitzt man ein Salz des Cadmiums mit Soda auf Kohle vor dem Löthrohre, so erhält man in der Reduktionsflamme einen braunen Beschlag. 2) Kalium- und Natriumhydroxyd fallen aus Cadmiumsalzlösungen weisses, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlösliches Cadmiumhydroxyd $Cd(OH)_2$.

3) Ammoniak fällt gleichfalls Cadmiumhydroxyd, aber dieses löst sich in einem Ueberschuss von Ammoniak klar auf 4) Natriumkarbonat und Ammoniumkarbonat fallen weisses Cadmiumkarbonat, CdCO_3 , welches in einem Ueberschuss des ersteren unlöslich, des letzteren nur wenig löslich ist 5) Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium fallen aus neutraler, saurer und alkalischer Lösung gelbes Cadmiumsulfid CdS , leicht löslich beim Erwärmen in Salzsäure, Salpetersäure oder verdünnter Schwefelsäure Die Gegenwart von Kaliumcyanid verhindert die Fällung nicht (Unterschied vom Kupfer) Cadmiumsulfid ist unlöslich in Alkalisulfiden (Unterschied vom Arsensulfid) Sind die Lösungen zu stark sauer, so fällt aus ihnen das Cadmiumsulfid erst nach gehöriger Verdünnung durch Wasser

B Bestimmung Man bestimmt das Cadmium entweder als Cadmiumoxyd CdO oder als Cadmiumsulfid a) Als Cadmiumoxyd Die Lösung des Cadmiumsalzes wird in einer Platinschale oder Porzellanschale mit Kaliumkarbonat in der Wärme gefällt Man sammelt das Cadmiumkarbonat auf einem Filter, wäscht es aus und trocknet es Dann wird der Niederschlag vom Filter möglichst getrennt, letzteres mit Ammoniumnitratlösung befeuchtet, getrocknet und im Porcellantiegel verascht Hierauf bringt man die Hauptmenge des Cadmiumcarbonates dazu und glüht erst schwach, dann starker bis zu konstantem Gewicht $\text{CdO} \times 0,875 = \text{Cd}$

β) Als Cadmiumsulfid Man fällt die nicht zu stark saure Lösung unter massigem Erwärmen mit Schwefelwasserstoff, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wäscht mit Schwefelwasserstoffwasser, dem ein wenig Salzsäure zugegeben ist, aus, trocknet bei 100°C bis zum konstanten Gewichte und wägt Das Filtrat darf, mit einer grosseren Menge gesättigten Schwefelwasserstoffwassers versetzt, auch nach einigen Stunden keine Ausscheidung von gelbem Cadmiumsulfid mehr zeigen Enthält das gefällte Cadmiumsulfid Schwefel beigemengt, so wäscht man es successive mit Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff aus $\text{CdS} \times 0,7778 = \text{Cd}$

Legirung für Clichés nach HOFER GROSJEAN Cadmium 22,5, Zinn 36,0, Blei 50,0
Schnell Loth. Cadmium 20,0, Zinn 40,0, Blei 20,0 Schmelzp 150°C

Explementum ad dentes EVANS
Rp Stanni puri 100,0
Cadmii 50,0
Man löst die gefällte Legirung in überschüssigem
Quecksilber und presst den Ueberschuss des
letzteren durch Leder ab

Explementum metallicum ad dentes
Metallzahnkitt Plombe für Zähne

I
Rp Cadmi respati 10,0
Hydrargyri 30,0

II
Rp Cadmi respati 10,0
Hydrargyri 28,5

III
Rp 1 Cadmi
2 Stanni aa 20,0
3 Diamuti 80,0
4 Plumbi 40,0
5 Hydrargyri 20,0

Man schmilzt 1–4 bei mässiger Hitze und fñg
5 hinzu

II † Cadmium bromatum Cadmiumbromid. Bromcadmium. $\text{CdBr}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$.

Mol Gew. = 344. Man übergiesst in einem Glaskolben 110 Th metallisches Cadmium in kleinen Stücken mit 600 Th destillirtem Wasser und 150 Th Brom und lässt das Gemisch unter gelegentlichem Umschwenken so lange an einem warmen Orte stehen, bis eine farblose Lösung entstanden ist Man giesst diese von dem etwa nicht verbrauchten Cadmium ab, filtrirt sie, dampft sie bis zum Salzhäutchen ein und lässt sie an einem warmen Orte bei $35\text{--}40^\circ \text{C}$ krystallisiren

Farblose, glänzende, durchsichtige, lange prismatische Krystallnadeln, in Wasser oder in Alkohol leicht löslich, bei längerem Liegen an der Luft verwitternd Bei 100°C geben sie 2 Mol, bei 260°C alles Krystallwasser ab Aufbewahrung Vorsichtig Anwendung In der Photographie

Behufs der Werthbestimmung fällt man aus 1 g des Salzes das Cadmium durch Kaliumkarbonat als Cadmiumkarbonat und führt dieses durch Glühen in Cadmiumoxyd über, ferner bestimmt man das Brom nach VOLHARD oder nach MOHR Ein reines Präparat enthält 37,21 Proc Cadmiumoxyd CdO und 46,51 Proc Brom Wird mehr Brom gefunden, so ist das Salz chlorhaltig

† **Cadmium bromatum anhydricum** $\text{CdBr}_2 = 272$ Wird durch Trocknen des krystallisierten Salzes zunächst bei 100°C und allmähliches Erhitzen bis auf 260°C erhalten. Farbloses Salzpulver. Aufbewahrung: Vorsichtig und vor Feuchtigkeit geschützt, im übrigen s. das vorige.

III † Cadmium jodatum **Cadmiumjodid** **Jodecadmium** CdJ_2 . Mol. Gew. = 360. Die Darstellung erfolgt 1) Analog wie beim Cadmiumbromid. Man übergiesst 115 Th. zerkleinertes Cadmiummetall mit 1200 Th. destillirtem Wasser und trägt — indem die Flüssigkeit warm gehalten wird — in mehreren Antheilen 250 Th. Jod ein. Die farblose Lösung wird filtrirt und entweder bis zum Salzhauteichen oder direkt zur Trockne verdampft. 2) Man dampft die concentrirte Lösung von 10 Th. Cadmiumsulfat und 18 Th. Kaliumjodid zur Trockne und zieht den Salzrückstand bei gelinder Wärme mit absolutem Alkohol aus. Beim Verdunsten des Alkohols hinterbleibt das Salz in Krystallen.

Farblose, perlmutterglänzende Krystallschuppen, schon bei relativ niedriger Temperatur schmelzend. Löslich in 1,1 Th. kaltem oder in 0,75 Th. siedendem Wasser, auch leicht löslich in Weingeist. Die wässrige Lösung reagirt sauer. Aufbewahrung: Vorsichtig. Anwendung: Früher vorübergehend in Salben (5–40) als Antiscrophulosum. Technisch in der Photographie. Mit Kaliumjodid combinirt als Alkaloidreagens (s. S. 206).

IV Cadmium sulfuratum **Cadmiumsulfid**. **Schwefelcadmium**. **Jaune brillant**. **Cadmiumgelb**. CdS . Mol. Gew. = 144. Eine Lösung von Cadmiummetall in Salpetersäure wird mit dem zwanzigfachen Volum Wasser verdünnt, mit Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaktion versetzt und dann mit Schwefelwasserstoff bis zum Ueberschuss gesättigt. Der anfangs citronengelbe, allmählich pomeranzengelb werdende Niederschlag wird gesammelt, mit kaltem Wasser gewaschen und bei nicht über 30°C getrocknet. 100,0 Cadmium geben gegen 130,0 Sulfid aus.

Schwefelcadmium bildet ein gesättigt pomeranzengelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, welches in Ammoniakflüssigkeit unlöslich ist (Schwefelarsen ist darin löslich) und von concentrirter Salzsäure unter Erwärmen gelöst wird (Schwefelarsen ist in Salzsäure nicht löslich). Der ammoniakalische Auszug lässt, mit Salzsäure sauer gemacht, keinen gelben Niederschlag fallen (Arsen). Die salzsaure Lösung, mit einem starken Ueberschuss Aetzkalklösung versetzt und mit Wasser verdünnt, giebt ein Filtrat, welches durch Schwefelwasserstoff nicht verändert wird (Blei). Beimischtes Baryumsulfat giebt sich durch seine Nichtlöslichkeit in Salzsäure zu erkennen.

Schwefelcadmium wird zum Färben der kosmetischen Seifen, überhaupt als Malerfarbe und zu blauen Feuerwerksätzen gebraucht. Als Malerfarbe verträgt es keinen Bleiweisszusatz, wohl aber Baryt- oder Zinkweiss. Es ist nicht giftig.

Schwefelcadmium en pâte ist mit Oel abgeriebenes Cadmiumsulfid. Es wird besonders zum Färben der Seifen verwendet. Es kommt im Handel in einer citronengelben, sowie einer orangegelben Modifikation vor.

V † Cadmium sulfuricum (Erganzb.) **Cadmiumsulfat**. **Schwefelsaures Cadmium**. $3\text{CdSO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 768 ¹⁾

Darstellung In einen Glaskolben giebt man 19 Th. concentrirte reine Schwefelsäure, 50 Th. destillirtes Wasser und nach geschehener Mischung 31 Th. Salpetersäure von 25 Proc. und 20 Th. Cadmiummetall, in Stücken wie es ist. Der Kolben wird, mit einem Trichter lose bedeckt, zur Seite gestellt. Unter Entwicklung von Stickoxydgas und unter Wärmeentwicklung geht die Auflösung lebhaft vor sich. Wenn die Reaktion nachlässt, stellt man an einen heissen Ort, bis die Lösung erfolgt ist. Die Lösung dampft man in einem porcellanen Kasserol unter Umrühren mit einem Porcellanstabe bis zur Trockne ein. Der Salzrückstand wird in der $2\frac{1}{2}$ -fachen Menge heissem destillirtem Wasser gelöst, durch Papier oder Glaswolle filtrirt und durch Eindampfen bis auf ein halbes Volum und Beiseitestellen zur Krystallisation gebracht. Aus der letzten etwas sauren Mutterlauge fällt man das Cadmium durch Zink heraus. — Ist man genöthigt, die Darstellung des Cadmiumsulfats aus unreinem zinkhaltigen Cadmium zu unternehmen, so ist es nothwendig,

¹⁾ Gall führt an: Sulfate de Cadmium, $\text{CdSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ s. unter Eigenschaften.

dieses in Salpetersäure zu lösen, aus der filtrirten Lösung das Cadmiumoxydhydrat durch einen starken Ueberschuss Aetznatron- oder Aetzkallilauge auszufallen, auszuwaschen, alsdann in warmer, schwach verdünnter Schwefelsäure zu lösen und die Lösung zur Krystallisation zu bringen. Die gesammelten Krystalle lässt man abtropfen und trocknet sie zwischen Fliesspapier, ohne mehr als höchstens eine laue Wärme anzuwenden, weil sie leicht verwittern, 20 Th Metall geben gegen 47 Th krystallisirtes Salz. Bei Darstellung kleiner Mengen fallen die Krystalle unansehnlich aus.

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige, monokline, an der Luft verwitternde Krystalle, ohne Geruch, von herbem, metallischem Geschmacke. Löslich in 2 Th. Wasser, nicht löslich in Weingeist. Die wässrige Lösung reagirt schwach sauer. Je nach den gewählten Bedingungen krystallisirt das Cadmiumsulfat mit verschiedenen Mengen Krystallwasser (angegeben werden Salze $\text{Cd SO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$, auch $4\text{H}_2\text{O}$). Das Salz obiger Zusammensetzung krystallisirt bei mittlerer Temperatur aus der gesättigten Lösung.

Die verdünnte wässrige Lösung giebt auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser einen gelben Niederschlag von Cadmiumsulfid, welcher beim Uebersättigen der Flüssigkeit durch Ammoniak nicht verschwindet. Baryumnitratlösung erzeugt einen weissen, in Salpetersäure unlöslichen Niederschlag von Baryumsulfat. Durch Zusatz von wenig Ammoniak entsteht in der wässrigen Lösung ein weisser Niederschlag $[\text{Cd}(\text{OH})_2]$, der im Ueberschuss von Ammoniak löslich ist.

Prüfung. 1) Wird aus der mit Salzsäure mässig angesauerten, wässrigen Cadmiumsulfatlösung durch Einleiten von Schwefelwasserstoff alles Cadmium als Cadmiumsulfid ausgefällt, so darf das Filtrat beim Verdampfen in einem Platinschälchen keinen glühbeständigen Rückstand hinterlassen (Zink). 2) Wird der sub 1 erhaltene gelbe Niederschlag mit Wasser ausgewaschen und hierauf mit Ammoniakflüssigkeit geschüttelt, so darf in dem Filtrate nach dem Uebersättigen durch Salzsäure keine Trübung oder gelbe Ausscheidung entstehen (Arsen).

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen, vorsichtig.

Anwendung. Die innerliche Anwendung wird in Gaben von 0,005–0,01 g und zwar als Pillen bei Syphilis und Rheumatismus empfohlen, ist aber in Deutschland nicht gebräuchlich. Aeusserlich in der Augenheilkunde an Stelle des Zinksulfates zu adstringirenden Collyrien (0,05–0,2 und 10,0 Aqua), zu Augensalben (0,1–0,2 10,0 Adeps), ferner zu Injektionen bei Tripper und Otorrhoe (1,0 100,0–200,0 Aqua). Höchstgaben *pro dosi* 0,1 g, *pro die* 0,4 g (Erganzb).

Collyrium ANGLAX.

Rp Cadmi sulfuri 0,06 (ad 0,6)
Mucilagina Gummi arabici
Tincturae Opi crocatae 33 8,0
Gegen Hornhautflecke. Man bestreicht mittelst eines Pinsels 2–3mal täglich den Hornhautfleck und lässt jedesmal das Auge einige Minuten schliessen, damit das aufgetragene Mittel nicht von den Thränen weggespült werde. Die Cadmiumsulfatmenge wird nach Umständen gesteigert.

Injectio antiblemnorrhagica MELCHIOR ROBERT

Rp Cadmi sulfurici 1,0
Aqua destillatae 200,0
Zwei bis drei Injectionen täglich in die Harnröhre zu machen.

Injectio styptica LAROCHE

Rp Cadmi sulfurici 1,0
Infusi Rosae florum 100,0
Tincturae Opi crocatae 3,0
Zum Einspritzen (bei Otorrhoe).

VI † Cadmium salicylicum. Cadmiumsalicylat. Salicylsaures Cadmium $\text{Cd}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2)_2$. Mol. Gew. = 386.

Zur Darstellung erwärmt man in einer Porcellanschale 10 Th Salicylsäure mit 300 Th destillirtem Wasser und trägt unter Umrühren so viel Cadmiumcarbonat (circa 12 Th) ein, dass die Flüssigkeit neutral ist. Dann sauert man mit Salicylsäure ganz schwach an, dampft auf etwa 120 Th ein und lässt krystallisiren. Die Mutterlauge liefert nach dem Eindampfen auf 80 Th nochmals Krystalle.

Farblose tafelförmige Krystalle von neutraler oder sehr schwach saurer Reaction, löslich in 68 Th kaltem oder in 24 Th siedendem Wasser, auch löslich in Alkohol, Aether oder in warmem Glycerin, unlöslich in Chloroform und in Benzin. Die wässrige Lösung (1 100) wird durch Ferrichlorid violett gefärbt, nach dem Ansäuern mit Salzsäure wird

sie durch Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser citronengelb gefallt Das Salz hinterlässt beim Gluhen braunes Cadmiumoxyd Die Bestimmung des Cadmiumoxyd Gehaltes erfolgt durch Eindunsten des Salzes mit konc Salpetersäure und Gluhen des hinterbleibenden Cadmuninitrates

Das Cadmiumsalicylat ist äusserlich von Cerasis in wässriger Auflösung als desinfectirendes und adstringirendes Mittel empfohlen worden bei eitrigen Ophthalmien, Hornhaut Entzündungen, Konjunktividen, Syphiliden, Gonorrhoe, Vaginitis Dosirung wie bei Sadium sulfuricum

Caesalpinia.

Gattung der Caesalpinaceae — Eucacsalpineae.

I Caesalpinia echinata Lam. In Brasilien. Namen Ibirá pitanga und Ymira piranga Liefert das Fernambuk- oder Brasilienholz Nicaraguaholz Rothholz. Lignum Fernambuci. L. Brasilense. L. sanctae Marthae. Bois de Brésil Bois de Fernambouc Brazil-wood. Pernambuco-wood, das in dichten, armdicken, rothbraunen oder schwärzlichen, innen gelbrothen Stücken in den Handel kommt.

Beschreibung Unter der Lupe erkennt man die einzelnen oder in kleinen Gruppen zusammenstehenden Gefässe, von kleinen Holzparenchymgruppen umgeben, die zarten, hellen Markstrahlen und concentrische, an Jahresringe erinnernde Zonen

Die Markstrahlen sind 10—24 Zellen hoch, 1—3 Zellen breit, radial gestreckt, sie führen zuweilen Krystalle Die behoft-getupfelten Gefässe sind 35—127 μ weit, oft von Keimgummipfropfen verschlossen Im Längsform häufig Krystallkammerfasern mit Einzelkrystallen

Bestandtheile. Brasilin $C_{16}H_{14}O_6$, aus concentrirten Lösungen in derben, bernsteingelben, rhombischen Krystallen, aus verdünnten Lösungen in weissen, seidenglänzenden Nadeln erhalten, die ersten mit H_2O , die anderen mit $1\frac{1}{2}H_2O$, das beide bei $130^\circ C$ verlieren Schmeckt süss, hintennach bitterlich Löst sich in verdünnter Natronlauge mit rother Farbe, durch Zinkstaub wird die Lösung entfärbt, färbt sich aber an der Luft bald wieder roth

Anwendung. Das früher als zusammenziehendes Mittel gebräuchliche Holz wird in der Färberei gebraucht Zur Bereitung rother Tinten giebt man jetzt den wasserlos hohen Anilinfarben den Vorzug

Die Rinde des Baumes wird unter dem Namen **Nacaseulorinde** zum Gerben benutzt

Geringere Sorten Rothholz kommen von den westindischen Inseln von **Caesalpinia crista L** in **Caesalpinia bijuga Sw**, von Ostindien das Sappanholz von **Caesalpinia Sappan L**, das neben Brasilin das farblose Sapanin $C_{12}H_{10}O_4 \cdot 2H_2O$ enthält

Ausser der zuerst genannten liefern auch andere Arten Gerberinden, so **Caesalpinia Sappan L**, **C. bijuga Sw**, **C. pauciflora H B u a**

Charta exploratoria Fernambuci Fernambukpapier, Rothholzpapier (Diet) Ligni Fernambuci raspi 80,0, Aquae destillatae 1000,0 Man macerirt 24 Stunden, filtrirt, setzt tropfenweise Ammoniak bis zur beginnenden, blaurothen Färbung zu und trankt mit der Lösung säurefreies (mit Ammoniak behandeltes) Fliesspapier

II Caesalpinia coriaria Willd In Westindien Die gerbstoffreichen Hülsen Dividivi, Libidibi, Samak, Nanacascalote sind sförmig eingerollt, bis 8 cm lang, 2—8 linsenförmige Samen enthaltend Sie enthalten 30—50 Proc Gerbstoff (Ellagengerbstsäure) Man verwendet sie selten medicinisch, reichlich technisch zum Gerben und Färben In Amerika macht man daraus mit Eisensulfat eine Tinte Nacaseolo, die man zum Färben benutzt

III. Arzneilich verwendet werden noch **Caesalpinia Bonducella** Flemming Nicker tree, Yeux de bourrique, in den Tropen und **C Bonduc** Roxb Die Samen (Grains de Cniquier, Grey seed, Poormanns Quinine) gegen Fieber und Wasser sucht, das aus ihnen gewonnene Oel gegen Krampfe

C. pulcherrima Swartz, Small gold mohor, Fleur de pavon, Macata, Guacamaya Die Blätter als Purgir- und die Menstruation beförderndes Mittel, die Blüthen als Expectorans und gegen Fieber **C adnata** g. m. in Westindien, Moruro abey, als Adstringens

Calamus.

Acorus Calamus L. Araceae — Pothoideae — Acoreae Ursprünglich vielleicht in Asien heimisch, jetzt weit verbreitet, auch zum arzneilichen Gebrauch angebaut — Verwendung findet

Das Rhizom. **Rhizoma Calami** (Germ Helv) **Radix Calami aromatici** (Austr) s. odorati. **Calamus** (U-St)¹ **Rhizoma Acori** **Radix Singentianae**. Kalmuswurzel Deutscher Ingber. Gewurzkalmus. Magenwurz. **Rhizome d'Acore vrai** (Gall) **Acorus-root** Sweet-Flag.

Beschreibung Das ein Sympodium bildende Rhizom, dessen Verzweigung abwechselnd nach rechts und links geschieht, kommt in 20—80 cm langen, etwas platt gedruckten, bis 3 cm breiten Stücken vor. Sie lassen auf der Ober- und Unterseite abwechselnd rechts und links die Narben der reitenden, schwertförmigen Blätter erkennen, in ihrer Achsel die Knospen oder Reste der Zweige, auf der Unterseite die Narben der Wurzeln, die in der Regel eine unregelmässige Zickzacklinie bilden, die Farbe ist graubraun, der Querschnitt gelblich mit rothlichem Ton.

Das Rhizom besteht aus Parenchym mit so grossen Interzellularräumen, dass zwischen den einzelnen meist nur eine Zellreihe breite Parenchymplatten stehen. Die einzelnen Zellen sind rundlich, getupfelt und enthalten feinkörnige Stärke. Die Zellen an den Kreuzungsstellen der Parenchymplatten sind etwas grösser und zu atherisches Oel führenden Sekretzellen umgewandelt. Ausserdem haben zahlreiche, von den Parenchymzellen in der Grösse sich nicht unterscheidende Zellen einen dicklichen Inhalt, der mit Vanillin und Salzsäure schon roth, mit Ferrichlorid im frischen Rhizom braun, in der trockenen Droge schwarz wird. (Sie eignen sich ausgezeichnet zum Nachweis des Kalmuspulvers) — Rinde und Gefässcylinder sind durch eine wenig deutliche Endodermis getrennt, die Gefässbündel in der ersteren sind kollateral, im letzteren konzentrisch. Geruch aromatisch, Geschmack brennend aromatisch.

Bestandtheile Atherisches Oel (in deutscher Waare 1,5—3,5 Proc, in japanischer bis 5 Proc) (vgl unten), ein angebliches Glukosid **Acorin** $C_{26}H_{40}O_8$, dessen Existenz bestritten wurde, ein Gerbstoff, Methylamin (Calamin), Cholin.

Verwechslung. Das Rhizom von **Iris Pseudacorus** L, das früher als **Radix Acori vulgaris** s. **palustris** Verwendung fand, wird zuweilen mit der Droge gesammelt. Es schrumpft beim Trocknen stark zusammen und ist nicht aromatisch.

Einsammlung, Aufbewahrung. Officiell ist der ungeschälte Wurzelstock, **Rhiz Calami crudum** der Drogisten. Man gräbt denselben im Spätherbste (Austr Helv) oder im Frühjahr vor der Blüthenentwicklung, entfernt Wurzeln und Blattreste, wäscht, spaltet zuweilen der Länge nach und trocknet bei gelinder Wärme 9 Th frische Wurzel geben etwa 2 Th trockene.

Geschnitten und grob gepulvert in Blechbüchsen, fein gepulvert in gelben, dicht verschlossenen Glasern vorrätig. Für kosmetische Zwecke zieht man das aus der geschälten Wurzel hergestellte, hellere Pulver vor. Beide, Speciesform und Pulver, trockne

man vor dem Einfüllen scharf nach 100 Th liefern etwa 90 Th grobes, 85—88 Th, feines Pulver

Anwendung. Innerlich als Tonicum amarum bei Dyspepsie, Flatulenz in Form von Pulver zu 0,5—2,0 g, Aufguss 1 10, Tinktur oder Extrakt, zu Mundwassern und Zahntinkturen, grob geschnitten zu Bädern bei Rachitis und Skrophulose (als wässriger Aufguss aus $\frac{1}{4}$ —1 Kilo auf ein Bad) — Eine Mischung aus Kalmuspulver und Ammoniumkarbonat wird zur Vertreibung der Ameisen empfohlen

Confectio Calami. Conditum Calami Kalmuskonfekt Kandirter oder überzuckerter Kalmus Frisches oder trockenes, geschältes Kalmusrhizom wird in siedendem Wasser genügend erweicht, mit einem Sirup aus Zucker 100 Th, Wasser 25 Th einige Minuten gekocht, nach 3 Tagen das Flüssige abgeseiht, für sich eingedampft und nach Zusatz der Wurzel unter Umrühren zur Trockne gebracht

Extractum Calami (Germ) **Extractum Calami aromatici s Acori** (Austr) Kalmusextrakt

Austr Aus grob gepulverter Wurzel wie Aconit Extrakt (S 155) zu bereiten Ausbeute etwa 17 Proc

Germ Rhizomat Calami concisi (Sieb III) 2

Spiritus 4 }	I	Spiritus 2 }	II
Aquae 6 }		Aquae 3 }	

Man zieht mit I 4 Tage, hierauf mit II 24 Stunden lang aus und dampft die abgepressten Flüssigkeiten (von denen man 5 Th Weingeist abdestillirt), zu einem dicken Extrakte ein Harzige Ausscheidungen werden durch vorsichtigen Zusatz von Weingeist (Destillat) gelöst Rothbraunes, in Wasser trübe lösliches Extrakt Ausbeute 18—20 Proc, bei Verwendung grob gepulverter Wurzel etwa 30 Proc Der Pressruckstand giebt bei der Destillation noch Weingeist und ätherisches Oel aus Innerlich zu 0,5—1,0 g in Pillen

Extractum Calami fluidum (U St) Fluid Extract of Calamus Rhizoma Calami pulveratum (Nr 60) 1000 g, Alkohol (81 Proc) q s Man befeuchtet mit 350 ccm, sammelt durch Verdrängung zunächst 900 ccm und bereitet 1 a 1000 ccm Extrakt

Tinctura Calami (Germ, Holv) **Tinctura Calami aromatici s Acori** (Austr) Kalmustinktur Teinture d'acore vrai Tincture of Calamus

Austr Wie Tinctura Auranti Corticis zu bereiten Germ Rhizomatus Calami concisi (Sieb II) 1, Spiritus diluta 5 Holv Rhizomatus Calami 20 Th mischt man mit Spiritus diluta 8 Th und bereitet durch Perkolation mit Spiritus diluta q s 100 Th Tinktur

Bräunlichgelbe Tinktur . Innerlich $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel

Aqua Calami
Kalmuswasser
Rp Rhizomatus Calami gr pulv 50,0
durch Destillation im Dampfstrom sammelt man 1000,0
Ex tempore
Olei Calami gtt 10
Aque destillatae fervidae 1000,0
Man mischt durch Schütteln

Pulvis dentifricus roborans
Kräuterzahnpulver
Rp Rhizomatus Calami 80,0
Fohorum Salviae 80,0
Calci carbonici praecipitati 85,0
Lapidis Pumicis praeparati 5,0

Sirupus Calami
Rp Tincturae Calami 15,0
Sirupi simplicis 85,0

Species aromaticae ad balnea
Thee zu aromatischen Bädern.
Rp Rhiz Calami
Species aromat.
Flor Chamomill.
Herb Majoran
Fol Menth pip 33
Als Aufguss (200—500 g mit 2—5 Liter Wasser)
dem Bade zuzusetzen.

Species herbarum ad balnea
Thee zum Kräuterbad

Rp Rhizomatus Calami
Herbae Menthae crispae
Herbae Rosmarini
Herbae Scorpilli
Florum Chamomillae
Florum Lavandulae 33 50,0

Zu einem Vollbade

Spiritus Calami
Kalmusspiritus (Ergänzb)
Rp Rhizomatus Calami concisi (Sieb 2) 1 Th.
Spiritus 3 " "
Aquae 3 " "
Nach 24stündigem Stehen werden 4 Theile abdestillirt

Tinctura Calami composita
(Preuss Arzneytaxe)
Rp Rhizomatus Calami 2,0
Rhizomatus Zedoariae 3,0
Rhizomatus Zingiberis 3,0
Fructuum Auranti immaturorum 5,0
Spiritus diluta 100 0

Tinctura stomachica KASTL.

Dr KASTL's Magentropfen.

Rp	Rhiz Calami	
	Pol Menth pip	
	Rad Angelicae	aa 10,0
	Cort Canellae	
	Cort Cinnamomi	
	Rhiz Zingibers	
	Autophyllorum	aa 50
	Spiritus (70 proc)	1000,0
	Ol Juniperi	
	Ol Macidis	aa 5,0

Tinctura stomachica LENTIN

Elixir stomachicum LENTIN

Rp	Tincturae Calami	4,0
	Tincturae Rhei aquosae	2,0
	Tincturae amarae	20
	Tincturae aromaticae	2,0

Vet Appetit-Latwerge für Pferde

Rp	Rhizomata Calami	
	Radices Gentianae	
	Rhizomata Zingibers	
	Herbae Absinthii	aa 50,0
	Natri chlorati	
	Farinae Secalis	aa 100,0
	Tincturae Capsici	15,0

Aquae q s ut fiat electuarium
3mal täglich 1 Esslöffel (Diet.)

Vet. Appetitpillen für Hunde

Rp	Rhizomata Calami	
	Natrii sulfurei siccii	aa 5,0
	Natrii bicarbonici	
	Rhizom Rhei	aa 2,0

Man formt mit Syrupus communis 6 Pillen Tag-
lich 2mal 1 Pille

CORDIALS Appetitpillen. Rhizoma Calami, Semen Foenugraeci, Tartarus stibiatus, Succus Liquiritiae aa 50 g, Natrium sulfureum 200 g stößt man mit einem Gemisch aus Glycerin 25, Aqua 15, Syrupus simplex 12,5 zur Masse an und formt 50 g schwere Pillen

Gut Heil von AUST ist ein Likör aus Kalmus, Rhabarber, Zimmt, Pomeranzen schalen

HUB ULLEICH's Kräuterwein, angeblich aus Malaga, Weinsprit, Glycerin, Rothwein, Ebereschensaft, Kirschsaft, Manna, Fenchel, Anis, Alantwurzel, amank Ginsengwurzel, Enzian, Kalmus

Magenwasser, BEUMAY's Lakör aus Kalmus, Ingwer, Anis

Sareptabalsam. Mit Kurkuma gefärbtes weingeistiges Destillat aus Kalmus und Lavendel

Wundertränkelein, JOH TREMLER's ist Kalmushkör

Oilum Calami (Ergänzb) Kalmusöl Oil of Calamus. Hülle d'Acore vral.

Das Rhizom liefert beim Destilliren mit Wasserdämpfen frisch 0,8 Proc, getrocknet 1,5—3,5 Proc ätherisches Oel. Dasselbe ist klar, etwas dicklich, gelb bis braungelb, von starkem Kalmusgeruch und -Geschmack. Spec Gew 0,96—0,97. Drehung (100 mm Rohr) des aus frischem Rhizom gewonnenen Oeles +20—31°, aus trockenem +18—21°. Es ist mit Weingeist in jedem Verhältniss klar mischbar, in verdünntem Alkohol schwer löslich, die alkoholische Lösung wird durch Ferrichlorid dunkel gefärbt.

Bestandtheile Ein bei 158—159° C siedendes Terpen $C_{15}H_{26}$ (Pinen?), ein über 250° C siedendes Sesquiterpen $C_{15}H_{24}$, ein höher wie 255° C siedender sauerstoffhaltiger Antheil, vielleicht $C_{12}H_{16}O$, ein zwischen 270 und 280° C übergehendes blaues Oel, geringe Mengen eines Phenoles

Vet Fresspulver für Schweine

Rp	Rhizomata Calami	50,0
	Radices Gentianae	50,0
	Subli sulfurati nigri	50,0
	Natrii bicarbonici	250,0
	Natrii chlorati	300,0
	Natrii sulfurici	300,0

Mehrmals täglich einen Esslöffel voll

Vet Magenpulver

bei zäher Milch der Kälbe

Rp	Rhizomata Calami pulvisiat.	
	Florum Chamomillae	"
	Fructuum Carvi	"
	Natrii chlorati	"
	Natrii sulfurici	"

mischt man zu gleichen Theilen 3 Tage lang 3mal
täglich 1 gehäufte Esslöffel voll (Diet.)

Vet Milch- und Nutzenpulver für Rinder

Rp	Rhizomata Calami	
	Fructuum Foeniculi	
	Fructuum Anisi	
	Natrii chlorati	
	Natrii bicarbonici	
	Bohi albi	aa

Bei blauer oder dünner Milch 3mal täglich ein
gehäufte Esslöffel voll

Vet Pulvis anticolicus

Kolikpulver für Pferde

Rp	Rhizomata Calami	30,0
	Radices Valerianae	10,0
	Opii puri	0,5

M f pulvis Dent tales doses 5

Vet Pulver gegen wasserige Milch

Rp	Rhizomata Calami	
	Herbae Absinthii	
	Natrii chlorati	aa 300,0
	Tartari crudi	60,0
	Subli sulfurati crudi	40,0

3mal täglich 1 Esslöffel voll

Prüfung Eine Verfälschung mit Terpentinol setzt das spec Gewicht herab und vermindert die Löslichkeit in Alkohol, ebenso vermindern Cedernholzöl und Gurjunbalsamöl die Löslichkeit in Alkohol. Ausserdem sind die beiden letzteren linksdrehend.

Galizischer Kalmus liefert ein minderwerthiges Öl das aus japanischem Rhizom zu 5 Proc gewonnene hat spec Gewicht 0,985—1,0 und ist in verdünntem Alkohol leicht löslich.

Anwendung Zu 1—3 Tropfen einigemal am Tage mit Zucker, zum Bade 15—20 g in einem halben oder ganzen Liter Alkohol gelöst.

Rotulae Calami

Werden wie Rotulae Menthae pipentae dargestellt.

Spiritus ad balnea			Spiritus antirheumaticus		
Badespiritus			Spiritus Calami (Form mag Berol.)		
Rp	Öl Calami	25,0	Rp	Öl Calami	1,0
	100 Ammonii caustici spiritus	50,0		Spiritus	99,0
	Mixturae oleoso-balsamicae	100,0			
	Spiritus	225,0	D S	Aeusserlich.	
	Spiritus saponati	600,0			

Calcaria.

I. Calcaria usta (Germ) Calcium oxydatum (Austr. Helv) Chaux commune ou vive (Gall) Calx (Brit. U-St) Lime. Aetzkalk. Gebrannter Kalk. CaO Mol. Gew. = 56.

Der Aetzkalk wird in grossen Mengen durch Glühen („Brennen“) von verschiedenen Abarten des Calciumcarbonates in den sog „Kalköfen“ erzeugt. Als Ausgangsmaterialien benutzt man Kalkspath, Marmor, Kalkstein, auch Muschelschalen. Zum pharmaceutischen Gebrauche eignen sich ausgesuchte, weisse Stücke eines fetten Aetzkalkes (s. w. unten), ganz besonders aber die aus weissem Marmor gebrannte Sorte „Calcaria usta e marmore“.

Eigenschaften. Weissliche oder weisslich-graue, dichtere oder lockere, harte oder zerreibliche Massen, welche aus der Luft allmählich Kohlensäure und Feuchtigkeit anziehen und infolgedessen zu einem aus Calciumcarbonat und Calciumhydroxyd bestehenden Pulver zerfallen. Löslich in etwa 800 Th kaltem oder 1300 Th siedendem Wasser. Benutzt man sie mit Wasser, so erwärmen sie sich stark, und verwandeln sich unter Entwicklung von Wasserdämpfen je nach der Menge des zugesetzten Wassers entweder in ein staubiges Pulver (Calciumhydroxyd) oder in eine breiartige Masse (Kalkbrei). Beide Formen des Calciumhydroxydes müssen sich in Salzsäure ohne erhebliche Kohlensäureentwicklung, ohne Auftreten von Schwefelwasserstoff, bis auf einen nur geringen unlöslichen Rückstand auflösen.

An diesem Verhalten gegen Wasser (das „Löschen“ des Kalkes genannt) ist zu erkennen, ob der Kalk brauchbar ist oder nicht. Guter Aetzkalk muss, wenn man ihn mit der Hälfte seines Gewichtes Wasser allmählich besprengt, unter lebhafter Dampfentwicklung zu einem weissen, staubigen Pulver zerfallen, welches auf weiteren Zusatz von 3—4 Th Wasser einen dicken, gleichmässigen, weissen Kalkbrei bildet. Kalk, welcher diese Eigenschaften besitzt, heisst „fetter Kalk“, im Gegensatz zum „mageren Kalk“, welcher sich langsamer abloscht, dabei weniger Hitze entwickelt und mit mehr Wasser keinen fetten Brei, sondern eine körnige, sandige Mischung bildet. Die Ursache für diese Erscheinung ist ein Gehalt von mehreren (15—25) Procenten Magnesia und Thonerde. „Todtgebrannt“ heisst der Kalk, wenn er sich mit Wasser nicht löscht. Dies kann herrühren von mangelhafter Leitung des Brennprocesses oder von einem zu grossen Gehalte an Calciumsilicat.

Aufbewahrung. Am zweckmassigsten in weithalsigen Glasflaschen mit Korkverschluss und Dichtung mit festem Paraffin Weissblechgefässe bieten für längere Zeit nicht die Gewähr dafür, dass der Aetzkalk in ihnen nicht Kohlensäure und Feuchtigkeit aus der Luft anzieht

Anwendung In der Pharmacie zur Darstellung verschiedener Präparate und als Reagens, auch als Austrocknungsmittel in den sog Kalktrockenschranken Die technische Anwendung ist eine sehr vielseitige, übrigens hinreichend bekannte

Prüfung Nicht selten wird die Bestimmung der wichtigsten Bestandtheile des Aetzkalkes gefordert Zunächst wird eine gute Durchschnittsprobe hergestellt Mit dieser verfährt man dann wie folgt

1) Kohlensäure + Feuchtigkeit 2—3 g werden in einem Platintiegel zunächst über einem gewöhnlichen Bunsenbrenner, schliesslich über dem Gebläse bis zum konstanten Gewicht geglüht Der Gewichtsunterschied ist = Kohlensäure + Feuchtigkeit

2) Kohlensäure In 5 g der Probe wird in der S 34 angegebenen Weise der Kohlensäuregehalt bestimmt Durch Subtraktion von dem zu 1) erhaltenen Werthe ergibt sich die Feuchtigkeit

3) 5 g der Probe werden im bedeckten Becherglase mit Wasser abgelöscht, dann giebt man allmählich etwa 50 cem Salpetersäure (von 25 Proc) hinzu, dampft die saure Lösung in einer Schale aus Platin oder Porcellan ein und erhitzt den Rückstand 2 Stunden lang auf 120—130° C Dann nimmt man mit salpetersäurehaltigem Wasser auf, filtrirt ab und wäscht das Filtrat zuerst mit salpetersäurehaltigem, dann mit reinem Wasser aus Un gelöst bleiben Kieselsäure, Sand und Aluminiumsilicat

Das salpetersäure Filtrat versetzt man in einer Schale aus Platin oder Porcellan mit 5 g Ammoniumchlorid, darauf mit Ammoniak in mässigem Ueberschuss und erhitzt so lange, bis der Ueberschuss des Ammoniaks verjagt ist (vergl S 242 u 332) Der erhaltene Niederschlag besteht aus Aluminiumhydroxyd und Eisenhydroxyd (Bei ganz genauen Bestimmungen muss er nochmals in Salpetersäure gelöst und abermals durch Ammoniak gefällt werden Das Filtrat ist mit dem vorigen zu vereinigen) Man wäscht ihn aus, trocknet und führt ihn durch Glühen in Aluminiumoxyd + Eisenoxyd über Ueber die Trennung beider vergl S 332

Das hierbei gewonnene Filtrat (bezw die vereinigten Filtrate) werden nunmehr auf 500 cem aufgefüllt und gut gemischt Von dieser Lösung bringt man 50 cem in ein Becherglas, giebt Ammoniakflüssigkeit in mässigem Ueberschuss hinzu und fällt in der Siedehitze mit einem Ueberschuss von Ammoniumoxalat Nach 12stündigem Absetzen wird das Calciumoxalat abfiltrirt und nach dem Auswaschen durch Glühen in Calciumoxyd übergeführt (Bei ganz genauen Bestimmungen ist das gewogene Calciumoxyd nochmals in Salzsäure zu lösen Die mit Ammoniak alkalisch gemachte Flüssigkeit ist nochmals mit Ammoniumoxalat zu fällen) Das Filtrat ist mit dem vorigen zu vereinigen (s S 543)

Die vereinigten Filtrate werden mit Salzsäure sauer gemacht und in einer Porcellanschale auf etwa 100 cem eingedampft, dann übersättigt man mit Ammoniak, fällt mit Natriumphosphat und führt das Magnesium-Ammoniumphosphat in Magnesiumpyrophosphat über Vergl unter Magnesia

Der zu 100 Proc fehlende Rest ist als Alkalien (K_2O , Na_2O) in Rechnung zu stellen

Calcium oxydatum purissimum Reines Calciumoxyd Wird durch Glühen von reinem Calciumnitrat oder von reinem Calciumoxalat über Weingeistflammen dargestellt Leuchtgasflammen sind wegen der im Leuchtgas enthaltenen Schwefelverbindungen zu vermeiden Ein solches Präparat wird lediglich zu analytischen Zwecken gebraucht

II. Calcaria hydrica Calcaria hydrata. Calcil Hydras (Brit) Kalkhydrat. Calciumhydroxyd. Calcaria extincta. Chaux éteinte (Gall) Slaked lime $Ca(OH)_2$. Mol Gew. = 74. Ein weisses, zartes, trockenes Pulver, welches für den jedesmaligen Gebrauch frisch bereitet wird

Man giebt 100 Th guten Aetzkalk (in Stücken) in eine Porcellanschale, bei grösseren Mengen in ein Gefäss aus Eisen, und besprengt ihn mit 40—50 Th Wasser Die Kalkstücke zerfallen unter starker Selbsterhitzung zu einem staubigen Pulver, welches bis zum Verbrauch in ein gut schliessendes Gefäss gebracht, aber nicht längere Zeit auf bewahrt wird.

Gehalt der Kalkmilch an Aetzkalk bei 15° C
(LUNGE und BLATTNER)

Grad Baumé	Gew von 1 l Kalkmilch in g	CaO in 1 l g	CaO Gew Proc	Grad Baumé	Gew von 1 l Kalkmilch in g	CaO in 1 l g	CaO Gew Proc	Grad Baumé	Gew von 1 l Kalkmilch in g	CaO in 1 l g	CaO Gew Proc
1	1007	7,5	0,745	11	1083	104	9,60	21	1171	218	18,61
2	1014	16,5	1,64	12	1091	115	10,54	22	1180	229	19,40
3	1022	26	2,54	13	1100	126	11,45	23	1190	242	20,34
4	1029	36	3,54	14	1108	137	12,35	24	1200	255	21,25
5	1037	46	4,43	15	1116	148	13,26	25	1210	268	22,15
6	1045	56	5,36	16	1125	159	14,13	26	1220	281	23,03
7	1052	65	6,18	17	1134	170	15,00	27	1231	295	23,96
8	1060	75	7,08	18	1142	181	15,85	28	1241	309	24,90
9	1067	84	7,87	19	1152	193	16,75	29	1252	324	25,87
10	1075	94	8,74	20	1162	208	17,72	30	1263	339	26,84

Kalkmilch. Lac Calcis Lait de chaux Milk of chalk Man verwandelt 100 Th Aetzkalk in Kalkhydrat und fugt soviel Wasser hinzu, dass im ganzen 1000 Th. Wasser verbraucht werden Eine milchweisse, stark ätzende Flüssigkeit, welche zu den mannigfachsten Zwecken Verwendung findet, insbesondere auch als billiges Desinfektionsmittel —

Wiener Kalk Wiener Polirmittel Ist ein sehr weisses, sandfreies, magnesiahaltiges Kalkhydrat Es kommt in Flaschen und Blechbüchsen in den Handel und wird als Polir- und Putzmittel von Metallgegenständen gebraucht

Wiener Weiss Bologneser Weiss Marmorweiss Bestehen aus sehr weissem gebrannten Kalkstein oder gebranntem weissen Marmor und werden nur als Polir- und Farbmittel gebraucht

III Aqua Calcariæ (Germ) Aqua Calcis (Austr) Calcium hydricum solutum (Helv) Eau de chaux (Gall) Liquor Calcis (Brit U-St) Kalkwasser Lime-water. Eine bei gewöhnlicher Temperatur gesättigte Lösung von Calciumhydroxyd in Wasser

Darstellung Germ, Austr Man bringt in einen Topf aus Steinzeng 1 Th. guten Aetzkalk, löscht diesen durch Besprengen mit 4 Th Wasser und mischt das gebildete Calciumhydrat mit 50 Th destillirtem Wasser gut durch Man giesst die Mischung in eine gut zu verschliessende Flasche, welche etwa von ihr angefüllt wird und lässt sie bis zur erfolgten Klärung stehen Dann zieht man (um die in der Kalkmilch vorhandenen kleinen Mengen Natronhydrat oder Kalhydrat zu beseitigen) die klare Flüssigkeit mittels eines Hebers ab, giesst auf den Rückstand nochmals 50 Th destillirtes Wasser, schüttelt während einiger Stunden oder Tage mehrmals um und bewahrt die Mischung in gut verschlossener Flasche auf Zum Gebrauche wird umgeschüttelt und eine entsprechende Menge des Kalkwassers abfiltrirt

Helv giebt die namliche Vorschrift mit folgender Abweichung 1 Th Aetzkalk wird mit 5 Th Wasser abgelöscht Dann mischt man 100 Th Wasser hinzu und lässt absetzen Nach Beseitigung des ersten Auszuges werden nochmals 100 Th Wasser zugemischt Man schüttelt während der folgenden Tage öfter um, bewahrt in wohlverschlossener Flasche auf und filtrirt im Bedarfsfalle ab

In der Praxis verfährt man in der Regel so, dass man auf 100 Th Wasser eine erheblich grossere Menge, z B 5 Th Aetzkalk anwendet Der erste Auszug wird weggegossen Dann füllt man das Vorrathsgefäss bis unter den Stopfen mit Wasser an und verschliesst es gut Im Bedarfsfalle filtrirt man nach dem Umschütteln aus der Vorrathsflasche ab, füllt diese wieder mit destillirtem Wasser vollig an, schüttelt öfter um und bewahrt den Vorrath sorgfältig auf Dieses Entnehmen und Auffüllen mit destillirtem Wasser kann öfter wiederholt werden Nach einigen Wochen schüttet man den Inhalt der Flasche weg und setzt eine neue Menge Aetzkalk in gleicher Weise an

Eigenschaften. Eine klare, farblose und geruchlose Flüssigkeit von schwach alkalischem, herb erdigem Geschmack. Sie bläunt Curcumapapier und bläut rothes Lackmuspapier, röthet Phenolphthalein. Bei Einleitung von Kohlensäure oder Einblasen der ausgethmeten Luft wird sie durch Bildung von Calciumcarbonat getrübt. Durch Versetzen mit Ammoniumoxalat entsteht eine starke Trübung von Calciumoxalat. — Wird Kalkwasser zum Sieden erhitzt, so trübt es sich unter Ausscheiden mikroskopischer Krystalle von Calciumhydroxyd. Diese Trübung gilt als ein Zeichen für den vorschriftsmässigen Gehalt an Calciumhydroxyd. Sie beruht darauf, dass Calciumhydroxyd in siedendem Wasser weniger löslich ist als in kaltem Wasser. 1 Th Calciumhydroxyd löst sich nämlich schon in 750 Th Wasser von 15° C, aber erst in 1800 Th siedendem Wasser. Mit einem gleichen Volumen Leinöl geschüttelt giebt Kalkwasser ein gleichmässiges Linniment.

Prüfung. Dieselbe kann sich auf den vorschriftsmässigen Gehalt an Calciumhydroxyd beschränken. Man versetzt 100 cem Kalkwasser mit einigen Tropfen Phenolphthaleinlösung und titrirt die rothgefärbte Flüssigkeit mit Normalsalzsäure bis zur eben eintretenden Entfärbung. 1 cem Normalsalzsäure zeigt unter diesen Umständen die Gegenwart von 0,028 Calciumoxyd CaO an.

Zur Neutralisirung von 100 cem Kalkwasser sollen verbraucht werden

	Austr	Gall	Germ	Helv	Brit	U-St
Normal Salzsäure cem	—		> 4,0	> 4,0	4,17	4,0
Gehalt an CaO in Proc	—	0,1285	0,112	0,128	0,117	0,112

Aufbewahrung. Wegen der Neigung, Kohlensäure aus der Luft anzuziehen und mit dieser unlösliches Calciumcarbonat zu bilden, bewahrt man grössere Vorräthe in Glasflaschen auf, welche mit guten Korkstopfen verschlossen und gekorkt sind. Flaschen mit Glasstopfen sind hierzu nicht zu empfehlen, weil die Stopfen durch Bildung von Calciumcarbonat emgekittet werden. Gefässe aus Steinzeug sind deshalb als Aufbewahrungsfässer nicht geeignet, weil ihre Wandungen für Luft nicht ganz undurchlassig sind. — In der Officin hält man das Kalkwasser in Standgefässen mit Glasstopfen vorrätig, welche häufiger durch Behandeln mit Salzsäure gereinigt werden. — Für die Dispensation ist zu beachten, dass das filtrirte (!) und nicht etwa nur klar abgessene Kalkwasser abzugeben ist.

Anwendung. Kalkwasser verflüssigt zahschleimige Sekrete, löst äusserlich angewendet Croup- und Diphtherie-Membranen, wirkt auf Schleimhäute, Geschwüre sekretionsbeschränkend, austrocknend, adstringirend, desinficirend. Innerlich neutralisirt es die Säure des Magensaftes, wirkt sekretionsbeschränkend auf den Darm, stopfend. Längere Zeit gebraucht, stört es Appetit und Verdauung. Man wendet es an verdünnt (1 + 2) oder unverdünnt zu Waschungen und Umschlagen auf nassende Wunden, Brandwunden, als Gurgelwasser und in Form von Inhalationen bei Angina, Croup, Diphtherie. Innerlich als Antacidum, bei Magen- und Darmgeschwüren, Diarrhoe der Kinder und zwar am besten mit 4 Th Milch oder Bouillon vermischt. In der Analyse dient es zur Abscheidung der Magnesia als Magnesiumhydroxyd.

Kitte und Cemente mit Aetzkalk. 1) Kaseinkitt, Universalkitt. Frischer Kasein aus völlig abgerahmter Milch wird durch Auspressen so viel als möglich von den Molken befreit, dann in dünnen Schichten ausgetrocknet und gepulvert. 10 Th dieses Kaseinpulvers und 1 Th gepulverter Aetzkalk gemischt, werden mit so viel Wasser angerührt, dass ein halbflüssiger Brei entsteht. Dieser Brei ist sofort zu verwenden. — 2) Einen ähnlichen Kitt erhält man aus der Mischung des Erweisses eines Eies mit 1,0 Kalkhydrat. Auch dieser Kitt ist sofort zu verwenden. — 3) Wasserdichten Kitt, welcher dem Wasser widersteht, erhält man durch Mischung von 10 Th gepulvertem Aetzkalk, 12 Th frischem Milchkasein und 2 Th Wasser. Auch dieser Kitt erhärtet sehr schnell. — 4) Cement für Fussboden und die Fugen zwischen den Stubendielen. Ein Gemisch von Kalkhydrat und Steinkohlenasche mit Wasser angerührt. — 5) Holzkitt, ein Kitt für Risse und Spalten im Holz, für Stubendielen etc besteht aus 10 Th Kalkhydrat, 20 Th Roggenmehl und der genügenden Menge Leinölfirnis. — 6) Eisenkitt, Kitt

für Dampfkessel, eiserne Gerathschaften und zum Ausfüllen von Löchern und Rissen in Eisen besteht aus 30 Th Graphit, 15 Th Kalkhydrat, 40 Th Blanc fixe und der genügenden Menge Leinölfirnis — 7) Der sogenannte Diamantkitt besteht aus 30 Th Bleiglatte, 10 Th Kalkhydrat, 20 Th Schlammkreide, 50 Th Graphit und 20 Th oder der genügenden Menge Leinölfirnis Dieser Kitt wird vor der Anwendung erwärmt — 8) Zinkkitt, Kitt für Zinkgegenstände, ist ein Gemisch von 20 Th Kalkhydrat und 4 Th Schwefelblumen mit einer heissen Lösung von 10 Th Leim in 7 Th heissem Wasser Muss frisch verwendet werden — 9) Ein universaler Füllkitt besteht aus 10 Th Infusorienerde, 10 Th Bleiglatte, 5 Th Kalkhydrat und der genügenden Menge Leinölfirnis — 10) Ofenkitt Graphit, Sand, Knochenkohle, Kalkhydrat zu gleichen Theilen mit Ochsenblut oder mit frischem feuchten Kase gemischt Muss frisch verwendet werden — 11) REINOLD's chemisch-hydraulischen Universalkitt fand HAGER zusammengesetzt aus Aetzkalkpulver (gebranntem Marmor) und Arabischem Gummi

Chemie und Analyse. A Man erkennt die Calciumverbindungen (die Kalkerde) an folgenden Reaktionen

1) Kalksalze färben die nicht leuchtende Flamme gelbroth Am besten zeigt diese Erscheinung das Calciumchlorid Es empfiehlt sich daher, Kalksalze nach dem Befeuchten mit Salzsäure dieser Reaktion zu unterwerfen Die Färbung ist von der durch Strontium hervorgebrachten nicht sicher zu unterscheiden 2) Aetzende Alkalien (KOH, NaOH) fallen aus genügend conc Kalksalzlosungen weisses Calciumhydroxyd Ammoniak bringt diese Fällung nicht hervor, doch entsteht in der ammoniakalischen Lösung durch Aufnahme von Kohlensäure Trübung, welche durch Calciumcarbonat verursacht wird 3) Alkalikarbonate fallen weisses Calciumcarbonat, in Mineralsäuren unter Aufbrausen leicht löslich 4) Natriumphosphat fällt aus der neutralen Lösung Dicalciumphosphat CaHPO_4 , löslich in verdünnter Salzsäure, Salpetersäure, auch in Essigsäure (Calciumoxalat ist in Essigsäure unlöslich) 5) Oxalsäure oder Ammoniumoxalat fallen aus der neutralen ammoniakalischen oder essigsauren Lösung weisses, krystallinisches Calciumoxalat Dieses ist unlöslich in Essigsäure, löslich in Mineralsäuren Durch Glühen wird es schrittweise in Calciumcarbonat und in Calciumoxyd verwandelt 6) Schwefelsäure und Ammoniumsulfat fallen aus der nicht zu stark verdünnten Lösung weisses Calciumsulfat $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$, unlöslich in Weingeist, löslich in conc Salzsäure 7) Kieselfluorwasserstoffsäure und Chromsäure bewirken keine Fällung (Unterschied von Baryum)

B Die Bestimmung erfolgt in der Regel als Calciumoxalat Die zu bestimmende Lösung, welche keine Phosphorsäure oder Oxalsäure enthalten soll, wird mit soviel Ammoniak versetzt, dass sie deutlich darnach riecht Entsteht hierbei ein Niederschlag von Magnesiumhydroxyd, so ist dieser durch Zugabe hinreichender Mengen von Ammoniumchlorid in Lösung zu bringen Man erwärmt die klare Lösung bis fast zum Sieden und fällt unter Umrühren durch allmähliche Zugabe von Ammoniumoxalatlösung, bis diese im Ueberschuss vorhanden ist Man lässt 12 Stunden an einem warmen Orte absetzen, filtrirt darauf das Calciumoxalat ab, wäscht es mit siedendem Wasser aus, trocknet und führt es durch Glühen vor dem Gebläse in Calciumoxyd CaO über Es empfiehlt sich, nur soviel Substanz anzuwenden, dass nicht mehr als etwa 0,3 g Calciumoxyd zur Wagung gelangen

In der Regel handelt es sich bei der Kalkbestimmung zugleich um eine Trennung von gleichzeitig vorhandener Magnesia In diesem Falle beachte man, dass der Fällungsflüssigkeit so viel Ammoniumoxalat zugesetzt werden muss, dass die gesammte Magnesia in das lösliche Oxalatdoppelsalz mit Sicherheit übergeführt wird Ausserdem empfiehlt es sich, für genaue Bestimmungen das gewogene Calciumoxyd in Salzsäure zu lösen und aus der mit Ammoniak alkalisch gemachten und mit Ammoniumchlorid versetzten Lösung den Kalk nochmals mit Ammoniumoxalat zu fällen Unter Umständen muss diese Auflösung und Fällung noch ein drittes, ja ein viertes Mal (so lange, bis zwei aufeinander folgende Fällungen das gleiche Resultat geben) wiederholt werden

IV. Calcaria saccharata Zuckerkalk (Erganzb) Saccharum calcareum. Kalksaccharat Antacidin

100,0 Kalkhydrat, 800,0 Zuckerpulver und 1200,0 destillirtes Wasser werden in einer gut verkorkten Flasche unter öfterem Umschütteln zwei Tage bei Seite gestellt. Die abgessene Flüssigkeit wird in kohlenstofffreier Atmosphäre filtrirt, im Wasserbade zur Sirupdicke abgedampft und, auf Glastafeln ausgegossen, getrocknet. Ziemlich luftbestandige, weisse, seidenglänzende Lamellen oder ein weisses Pulver von anfangs süsslichem, hintennach langenhaftem Geschmack, welches beim Erhitzen unter Verkohlungs Caramelgeruch verbreitet. Löslich in 12 Th Wasser, leicht löslich in zuckerhaltigem Wasser, unlöslich in Alkohol. Die wässrige Lösung reagirt alkalisch, sie trübt sich beim Aufkochen unter Zersetzung in Zucker und eine basischere Saccharatverbindung, welche beim Erkalten wieder in die vorher bestandene Verbindung übergeht. Die wässrige Lösung 1:10 giebt, mit $\frac{1}{10}$ Raumtheil Ferrichloridlösung gemischt, eine klare braune Flüssigkeit. Durch Ammoniumoxalatlösung wird sie weiss gefällt. Durch Schwefelwasserstoffwasser werde sie nicht verändert (Metalle), durch verdünnte Schwefelsäure nicht sogleich getrübt (Strontium, Baryum). Nach dem Ansäuern mit Salpetersäure werde sie weder durch Baryumnitrat (Schwefelsäure) noch durch Silbernitrat verändert. — 1 g Zuckerkalk soll zur Neutralisation (Phenolphthalein als Indikator) mindestens 3 ccm Normalsalzsäure verbrauchen, was einem Gehalt von 8,4 Proc Calciumoxyd entspricht. Aufbewahrung in gut verschlossenen Gefässen, vor Kohlensäure geschützt.

Das Kalksaccharat wird als Antacidum, bei Flatulenz und besonders Diarrhoe der Kinder gebraucht. Dosis 0,5–1,0–1,5, für Kinder 0,3–0,5–1,0. Ausserdem wird es häufig als Gegenmittel bei Vergiftungen, z. B. Karbolsäure, Oxalsäure, angewendet. Der Brauer bedient sich des Zuckerkalks zum Entsäuern des Bieres, der Kufer zur Entsäuerung des Weines.

Liquor Calcis saccharatus (Brit.) Zuckerkalklösung. Calciumhydroxyd 50 Th, Zuckerpulver 100 Th, destillirtes Wasser 1000 Th werden unter gelegentlichem Umschütteln in einer wohlverschlossenen Flasche zur Seite gestellt, dann unter Bedeckung mit einer Glasscheibe rasch filtrirt. Alkalische Flüssigkeit. Spec. Gew. = 1,055. — Zur Neutralisation von 10,0 g sollen = 6,3 ccm Normal Salzsäure ausreichen, entsprechend einem Gehalte von 1,77 Proc Calciumoxyd.

Sirupus Calcis Sirup of lime (U-St.) Man mischt 65 Th Aetzkalk mit 400 Th Zuckerpulver im Mörser. Diese Mischung trägt man in 500 Th siedendes Wasser unter Umrühren ein und kocht unter Umrühren 5 Minuten und seigt durch. Die Kolatur wird mit dem gleichen Volumen ausgekochtem Wasser verdünnt und filtrirt. Das Filtrat wird auf 700 Th abgedampft und nach dem Abkühlen mit Wasser bis 1000 Th Gesamtflüssigkeit versetzt.

Aqua Calcis saccharata (Hungarica) Frisch gebrannter Kalk 15,0 wird mit 10,0 Wasser gelöscht, dann fügt man Zuckerpulver 25,0 Th und nach erfolgter Auflösung Wasser 1000,0 Th zu. Die Mischung wird in einem wohlverstopften Gefässe aufbewahrt. Zum Gebrauch filtrirt man die erforderliche Menge ab. Das Filtrat enthält 0,5 Proc Calciumhydrat.

Aqua digestiva FROL.	
Rp Unguent digestivi	50,0
Vitella ovorum duorum	
Aquae Calcariae	450,0
Caementum dentarium OSTERMAIER.	
OSTERMAIER's Zahnkitt.	
Rp Calcarina ustae pulveratae	3,5
Acidi phosphorici glacialis	3,0
Misce. Das Gemisch wird in die Zahnhöhle eingedrückt. Stets frisch zu bereiten.	

Causticum cosmeticum POLLAU

KLEGER's Causticum.	
Rp 1 Kali caustici fus.	
2 Saponis medicati	55,0
3 Calcarina ustae	40,0
4 Aquae calidae	15,0

3 wird mit 4 gelöscht und mit der Mischung von 1 und 2 zusammengemischt. In gut geschlossenen Gläsern aufzubewahren.

POLLAU wendete die Mischung erst 6 Monate nach der Bereitung an. Ein solches Präparat würde man für den sofortigen Gebrauch erhalten durch Ersetzung des Kalhydrates mit trockenem Kaliumcarbonat.

Zur Beseligung von Warzen, Mutterkornern, Hautflecken. Man macht eine gewisse Menge des Pulvers mit 30 Proc. Weingeist zur Paste an und bringt diese in der Höhe von 4–5 mm auf die zu ätzende Stelle. Sobald sich eine entzündliche Areole bildet oder starkes Brennen eintritt, wird die Paste entfernt und die geätzte Stelle mit Umschlägen von Borsäurelösung oder dergl. behandelt.

Glycerinum cum Calcaria saccharata LATOUR.
Zuckerkalk-Glycerin
Rp 1 Calci hydrati 20,0
2 Sacchari pulverati 40,0
3 Aquae destillatae 200,0
4 Glycerini 40,0

Man mischt 1—3, lässt die Mischung in verschlossener Flasche 1 Tag unter öfterem Umschütteln stehen und filtrirt. Dem Filtrat setzt man 4 zu und dampft bis auf 100 Vol ein. Bei Brandwunden anzuwenden.

Linimentum calcareum BEASLEY

Rp Aquae Calcariae 200,0
Glycerini
Aquae Rosae aa 50,0
Tragacanthae pulveratae 10,0

Aeusserlich bei Verbrennungen, wunder Haut, aufgesprungenen Brustwarzen und Lappen.

Liniment calcareum (Gall)

Rp Oli Amygdalarum
Aquae Calcariae aa

Linimentum contra combustiones (Form Berol)

Linimentum Calcis (Helv)

Linimentum Calcariae (Ergänz Hamb V)

Rp Oli Lini
Aquae Calcariae aa

Linimentum calcareum aquosum BRUNN

Glycerolé calcaire anesthétique.

Rp 1 Calcariae ustae 5,0
2 Aquae 15,0
3 Glycerini 100,0
4 Aetheris 5,0

1 wird mit 2 abgelöscht, dann mit 3 und 4 gemischt. Auf Brandwunden mittels Compressen aufzulegen.

Linimentum calcareum DÉCLAT

Rp Aquae Calcariae
Oli Lini aa 100,0
Acidi carbonici 2,0

Zum Aufstreichen auf Brandwunden.

Linimentum oleoso calcareum

Rp Glycerini cum Calcaria sacchar LATOUR 20,0
Oli Olivarum 40,0
Misce conquassando Zum Wundverbande.

Pasta ad naevos maternos

Rp Calci hydrati
Saponis medicati pulv aa 5,0
Spiritus saponis 2,5

Anwendung wie Causticum POLLAU

Vet Pulvis depilatorius HERTWIG

Rp Natri sulfurici pulverati 12,0
Calcariae ustae pulveratae
Amyli pulverati aa 40,0

Mit etwas Wasser zu einem Brei angemacht zwischen die Haare auf den Teil aufzustreichen, von welchem man dieselben (behnfs Application von Pflastern, Verbänden, Sinapismen) entfernen will.

Aetzkalk als Trocknungsmittel.

Wegen seiner Eigenschaft, Wasser aus der Luft aufzunehmen und sich mit diesem zu Calciumhydroxyd (Kalkhydrat) zu verbinden, ist der Aetzkalk ein ausgezeichnetes Trocknungsmittel, um so mehr, als er verhältnissmässig billig und ohne Schwierigkeit überall zu beschaffen ist — Natürlich wird der umsichtige Apotheker in jedem Einzelfalle zu erwägen haben, ob ein auszutrocknendes Objekt für die Trocknung durch Kalk geeignet ist oder nicht. Ferner wird man zu beachten haben, dass der Aetzkalk, indem er Wasser anzieht, allmählich in ein feines trocknes Pulver zerfällt, welches leicht stäubt, vor dessen Staube also die zu behandelnden Objekte zu schützen sind — Endlich wird man in vielen Fällen die Hauptanwendung nicht darin suchen, sehr wasserreiche Objekte thatsächlich auszutrocknen, sondern bereits vorgetrocknete nachzutrocknen oder bereits getrocknete im trocknen Zustande zu erhalten. In dieser

Pulvis pinguedinem absorbens

Rp Calci hydrati 100,0
Acidi carbonici 10,0
Spiritus (90%) 20,0

Zum Beseitigen und Bestreuen der inneren Flächen der Thierfelle beim Ausstopfen der Thierbälge.

Sirupus Calcariae

Rp Sacchari 100,0
Aquae Calcariae 60,0

Werden zum Sirup gekocht

Sirupus Calcariae TROUSSEAU

Rp 1 Calcariae ustae
2 Aquae destillatae aa 1,0
3 Aquae destillatae 10,0
4 Sirupi Sacchari 100,0
5 Sirupi Sacchari 400,0

Man löst 1 mit 2 flgt 3 hinzu, kocht mit 4 während 10 Minuten, kühlt und vermischt nach dem Erkalten mit 5. Bei chronischer Diarrhoe esslöffelweise.

Unguentum anteczematicum NEUMANN

Rp Calci hydrati
Natri carbonici crystall aa 3,5
Extracti Opi 0,3
Adipis suilli 50,0

Unguentum calcareum SPENDER.

Rp Adipis suilli 25,0
Oli Olivarum 6,0
Calci hydrati 100,0

Zum Verbands atonischer Fussgeschwüre

Unguentum contra tinea capitis (BIETT, CAZENAVE, PETIT)

Rp Calcariae hydratae 5,0
Natri carbonici crystallati 7,5
Adipis suilli 40,0

M. Fiat unguentum D S Ausserlich (Zuerst werden die Krusten des Grundes durch Umschläge abgewischt und dann obige Salbe aufgelegt)

Vet. Kalkzucker.

Rp 1 Calcariae ustae 100,0
2 Aquae calidae 85,0
3 Sacchari albi pulverati 500,0

Man löst 1 mit 2 und mischt 3 dazu. In wohlverschlossenen Gefässen aufzubewahren. Einen Drittel-Esslöffel (Schafen), einen gehäuteten Esslöffel (Rindern) mit 0,3 und 0,5 Liter Wasser gemischt einzugrassen (bei Bluth oder Trommel-sucht)

Beziehung wird sich also eine Aufbewahrung in einem mit Aetzkalk beschickten Raume decken mit dem Begriff des „trockenen“ Ortes, welcher für die Aufbewahrung zahlreicher Substanzen in diesem Buche empfohlen ist

Wir geben im Nachstehenden die wichtigsten Fälle an, in denen sich Aetzkalk als Trocknungsmittel empfiehlt

Aetzkalk als Trocknungsmittel in Aufbewahrungsgefassen Substanzen, welche sich an feuchter Luft leicht verändern, z B trockene Extrakte, Pulver von Harzen, leicht schimmelnde Pflaster, hygroskopische Salze, bewahrt man zweckmässig in Behältern auf, welche durch Aetzkalk trocken gehalten werden — Man füllt zu diesem Zwecke den Aetzkalk in Dosen oder Kapseln aus Blech, deren Form derjenigen der Aufbewahrungsbehälter anzupassen ist — Damit die Luft ungehinderten Zutritt zu dem Aetzkalk hat, sind die Dosen oder Kapseln an geeigneter Stelle mit Lochern zu versehen. Damit ein Verstauben des Kalkpulvers möglichst verhütet wird, legt man auf den Kalk eine Schicht Watte

Porcellan-Kruken Als Einsätze für Porcellanbüchsen benutzt man runde Dosen aus Weissblech. Durch einen leicht anzubringenden Bajonett-Verschluss trägt man



Fig 150
Kalkdose in Porcellanbüchsen zu setzen




Fig 181
Kalkkästen als Einsatz in Kästen mit leicht schimmelnden Pflastern




Fig 182
Mit Aetzkalk gefüllter Glasstopfen für Pulverflaschen

Sorge dafür, dass der Deckel sich vom Untertheil der Dose beim Aufheben nicht trennt. Ein Griff auf der oberen, perforirten Seite dient zum bequemen Erfassen der Dose. Diese Dosen setzt man auf den hygroskopischen Inhalt der Büchsen. Fig 180

Pulver-Flaschen Um in diesen Gefassen hygroskopische Pulver trocken zu erhalten, empfiehlt es sich, den Aetzkalk in den Stopfen unterzubringen. Am bequemsten sind hohle Glasstopfen, welche durch das in das Innere der Flasche reichende offene Ende gefüllt und hierauf mit Schafleder überbunden werden. In solchen Gefassen halten sich z B trockene Extrakte ganz vorzüglich. Fig 182

Schiebekästen Um z B leicht schimmelnde Pflaster und dergl trocken zu halten, legt man in die Aufbewahrungskästen kleine Kalkkästchen parallelepipedischer Form, die an einer Stirnseite mit übergreifendem Deckel geschlossen und nur auf einer Seite perforirt sind.




Fig 183

Kalk-Trockenschranke Um im pharmaceutischen Laboratorium ohne Anwendung von Wärme Drogen zu trocknen, bezw nachzutrocknen oder trocken zu erhalten, benutzt man die sogen Kalk-trockenschranke oder Kalt-Trockenschränke. Der von TOELLNER Bremen in verschiedenen Grössen konstruirte hat die Form eines Eisschranks und wird von vielen Seiten empfohlen (D.R.P. 73769 und 75680)

Derselbe besteht aus einem schrankförmigen, innen mit Blech ausgeschlagenen

Holzkasten Durch eine eigenartig zusammengesetzte Querwand ist das Innere des Apparats in zwei nebeneinander liegende, verschieden grosse Abtheilungen geschieden. Die grössere dient zur Aufnahme des Trockengutes, kann mit Horden, Haken etc. ausgestattet werden und ist durch eine dicht schliessende Thür zugänglich. — Die kleinere Abtheilung hat an der oberen und an der Vorderwand (unten) je eine Oeffnung. Erstere dient zum Einfüllen des Aetzkalks, letztere zum Entnehmen desselben, nachdem er zu Pulver zerfallen und durch einen Eisenrost von dem noch wirksamen Kalk in Stücken getrennt worden ist. — Das unwirksam gewordene Pulver sammelt sich in einem ausschlebbaren Blechkasten und kann nach Bedürfniss entfernt werden.

Nachdem die kleinere Abtheilung durch die Oeffnung im Deckel mit Aetzkalk beschickt und die Oeffnungen verschlossen sind, ist der Apparat zum Betriebe bereit.

Der Apparat lässt sich mit Vortheil zu folgenden Zwecken benutzen:

1) Zum Trocknen von Aloe, Ammoniacum, Asa foetida, Benzoe, Galbanum, Gewürzen aller Art, Manna, Myrrha, Opium, Salzen (krystallwasserhaltigen), Senfsamen, Spanischem Pfeffer.

2) Zum Nachtrocknen von trocknen Extrakten, Lakritz Präparaten, Mutterkorn, Pflastern, Seifen, Vanille, Zuckerwaaren.

3) Zur trockenen Aufbewahrung zahlreicher Drogen, galenischer und chemischer Präparate.

Kalk-Mörtel Ein baugerechter Mörtel wird hergestellt durch Vermischen von 1 Vol Baukalk (d. i. gelblicher Kalk, der in einer Grube so viel Feuchtigkeit an den Boden abgegeben hat, dass ein Kalkhydrat von fettartiger Beschaffenheit zurückbleibt) mit 2,5 Vol feuchtem Kies. In bestimmten Fällen, z. B. nach dem Einsturz eines Neubaus kann die Frage vorgelegt werden, in welchen Verhältnissen Baukalk und Kies gemischt worden sind, um einen gegebenen Mörtel herzustellen. In diesem Falle verfährt man wie folgt:

Sand 5 g Mörtel werden in einer Porcellanschale mit 20 ccm Wasser angerührt, darauf mit etwa 30 ccm Salzsäure (25 Proc.) zuerst in der Kälte (Uhrglas auflegen!), hierauf auf dem Wasserbade zersetzt. Man filtrirt alsdann durch ein aschefreies Filter unter Dekantiren, und wäscht den Rückstand in der Schale, sowie das Filter mit Wasser vollständig aus. Hierauf spült man etwa auf dem Filter befindliche Kieselsäure mit einer genügenden Menge Natriumkarbonatlösung in die Schale zu dem Sandrückstand, wäscht das Filter etwas aus, verascht es und bringt die Asche zu dem Rückstand in der Porcellanschale. Man erhitzt die Flüssigkeit nun etwa 2 Stunden auf dem Wasserbade, um alle hydratische Kieselsäure in Lösung zu bringen, filtrirt darauf, wäscht den Rückstand nacheinander mit Sodablösung, Wasser, stark verdünnter Salzsäure, schliesslich mit Wasser aus, bringt den Sand in eine Platinschale, verascht das Filter, bringt auch dieses hinzu, glüht bei dunkler Rothgluth und wägt. — Man stellt fest, ob dieser Sand seiner Korngrösse nach als „Kies“ oder als „Schleifsand“ zu bezeichnen ist.

Als Sand ist in Rechnung zu stellen das Gewicht von Sand + Eisenoxyd + Thonerde.

Kalk Das sub 2 erhaltene salzsaure Filtrat füllt man auf 500 ccm auf 100 ccm desselben versetzt man mit einer hinreichenden Menge Ammoniumchlorid und fällt nun mit Ammoniak in der Wärme Eisenoxyd und Thonerde. Das Filtrat hiervon macht man mit Essigsäure sauer und fällt den Kalk durch Ammoniumoxalat und führt das abgeschiedene Calciumoxalat durch Glühen in Calciumoxyd über. — Im Filtrat bestimmt man noch die Magnesia als Ammoniummagnesiumphosphat. Als Kalk ist in Rechnung zu stellen das gefundene Calciumoxyd + Magnesiumoxyd.

Aus den erhaltenen Werthen berechnet man die zur Herstellung des Mörtels verwendeten Mengen Baukalk und Kies unter Zugrundelegung folgender Daten:

1) Guter Baukalk enthält 83,84 Proc. Calciumoxyd und 66,66 Proc. Wasser. 1 l guter Baukalk wiegt 1328 g. [Das Gewicht eines Volumens ist also 1,328.]

2) Feuchter Kies (Bausand) besteht aus 93,76 Proc Glührückstand und 6,24 Proc Wasser 1 Liter feuchter Bausand wiegt = 1542 g [das Gewicht eines Volumens ist also 1,542]

Beispiel Gefunden

Sand	Kalk + Magnesia
85 Proc	7 Proc

a) 85,0 g trockner Sand sind $[93,76 \cdot 100 = 85 \cdot x] = 90,65$ g feuchter Bausand
Diese sind $[90,65 \cdot 1,542] = 58,78$ cem feuchter Bausand

b) 7 Proc geblühter Aetzkalk CaO sind $[33,34 \cdot 100 = 7 \cdot x] = 21$ g Baukalk Diese sind $[21 \cdot 1,328] = 15,8$ cem feuchter Baukalk

Mithin ist der Mörtel $[58,78 \cdot 15,8]$ aus 1 Vol Baukalk und 3,71 Vol feuchtem Bausand hergestellt worden

Calcium aceticum.

Calcium aceticum Calciumacetat Essigsaurer Kalk. *Acétate de chaux* (Gall.) $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 176. Die reine Verbindung wird erhalten durch Neutralisation von 4 Th verdünnter (30 Proc) Essigsäure mit 1 Th gefalltem Calcium karbonat in der Wärme Man filtrirt die neutrale oder sehr schwach sauer reagierende Lösung und bringt sie durch Eindampfen zur Krystallisation

Farblose, glänzende Nadeln oder Prismen, welche an trockner Luft und bei 100°C das Krystallwasser nur zum Theil abgeben Von herb salzigem Geschmack, leicht löslich in Wasser, weniger leicht in Alkohol löslich. Die wässrige Lösung löst Bleisulfat reichlich auf Das reine Salz findet Verwendung zum Nachweis bezw zur Bestimmung der Oxalsäure

Weisskalk oder Holzkalk ist die Bezeichnung des zur Darstellung der Essigsäure dienenden rohen Calciumacetats, welches durch Neutralisation des Holzessigs mit Aetzkalk und Eindampfen der Lösung erhalten wird

Calcium benzoicum.

Calcium benzoicum Calciumbenzoat. Benzoësaures Calcium. *Benzoate de chaux* (Gall.) $(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2)_2 \text{Ca} + 4\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 354.

Darstellung Man bereitet aus 10 Th Aetzkalk eine dünne Kalkmilch, trägt in diese 43 Th Benzoëssäure ein, erhitzt 5–10 Minuten zum Sieden und filtrirt Das Filtrat wird durch Eindampfen concentrirt, nöthigenfalls nochmals filtrirt, alsdann der Krystallisation überlassen Aus den Mutterlaugen kann man durch Ansäuern mit Salzsäure die Benzoëssäure wiedergewinnen

Eigenschaften. Farblose, verwitternde Nadeln, löslich in 20 Th kaltem, leichter löslich in siedendem Wasser Aus der wässrigen Lösung werden durch Salzsäure Krystalle von Benzoëssäure abgeschieden. Zur Prüfung auf Chlor wird das Salz schwach geblüht und der Glührückstand nach dem Auflösen in Salpetersäure durch Silbernitrat geprüft. Die wässrige Lösung wird durch Ammoniumoxalat weiss, durch Ferrichlorid roh braun gefällt.

Anwendung. Als innerliches Antisepticum wie Natriumbenzoat und Natrium salicylat.

Calcium boricum.

Calcium boricum Calcium pyroboricum Calcium tetraboricum. Calciumborat $B_2O_3 \cdot Ca + 6H_2O$. Mol Gew = 304

Zur Darstellung von Calciumsalzen der Borsäure existiren eine ganze Reihe von Vorschriften. Die Zusammensetzung der Präparate ist indessen von den gewählten Versuchsbedingungen ausserordentlich abhängig. Es ist also die im folgenden angegebene Vorschrift genau einzuhalten, wenn man das oben aufgeführte Präparat erhalten will.

Darstellung. Man löst 10 Th krystallisiertes Calciumchlorid $CaCl_2 + 6H_2O$ in 100 Th Wasser, ferner 17,4 Th krystallisierten Borax in 100 Th Wasser und mischt beide Lösungen, welche mittlere Temperatur haben sollen, durch Umrühren. Es entsteht sogleich weisser, breiartiger Niederschlag. Man saugt denselben vor der Strahlpumpe ab, wäscht ihn mit kleinen Mengen Wasser bis zur Chlorfreiheit aus und trocknet ihn auf porösen Unterlagen bei Lufttemperatur, worauf er zerrieben wird.

Eigenschaften. Ein weisses, fast geschmackloses Pulver, oder weisse, an der Zunge haften bleibende Massen, der Stärke oder weissem Thon ähnlich. Sie blauen das rothe Lackmuspapier. In kaltem Wasser fast unlöslich, wenig löslich in heissem Wasser, massig löslich in den Lösungen des Calciumchlorids und in denen des Borax. Ziemlich leicht löslich in Glycerin, namentlich in der Wärme. Diese Lösung reagirt gegen Lackmus deutlich sauer. Löslich auch beim Erwärmen in Ammoniumchloridlösung unter Entwicklung von Ammoniak, in dieser Lösung entsteht auf Zusatz von Ammoniumoxalat ein weisser, in Essigsäure unlöslicher Niederschlag. — Löslich in verdünnter Salzsäure. Diese Lösung färbt Curcumpapier braunroth. Durch Ammoniak werden die braunroth gefärbten Stellen in Schwarzblau übergeführt. — Uebergiesst man 0,5 g des Salzes mit 2 ccm verdünnter Schwefelsäure und 3 ccm Alkohol, so verbrennen die beim Erwärmen entweichenden Dämpfe mit grüner Flamme.

Anwendung. Ausserlich bei nassenden Ekzemen, Verbrennungen, ubelriechendem Schweiss, innerlich zu 0,3–0,4 g gegen Diarrhoe der Kinder.

Calcium boro-glycerinum Borylycerinkalk. (Ross.) Eine Lösung von 8 Th gelbem Kalk $[Ca(OH)_2]$ und 25 Th Borsäure in 76 Th Glycerin.

Calcium bromatum.

Calcium bromatum Calciumbromid. Bromcalcium Calcii Bromidum (U St) $CaBr_2$. Mol Gew = 200

Darstellung. Man neutralisirt 650 Th Bromwasserstoffsäure (von 25 Proc) mit 100 Th gefalltem Calciumcarbonat unter schwachem Erwärmen. Die filtrirte neutrale Lösung wird eingedampft.

Eigenschaften. Ein farbloses, körniges, zerflüssliches Salz von scharf salzigem Geschmack. Löslich in 0,7 Th Wasser von 15° C oder in 1 Th Alkohol von 94 Vol Proc. Die wässrige Lösung ist neutral und giebt mit Silbernitrat einen gelbbchweissen Niederschlag von Silberbromid, mit Ammoniumoxalat einen weissen in Essigsäure unlöslichen Niederschlag von Calciumoxalat. Auf Zusatz von etwas Chlorwasser färbt sie sich gelb-braun, durch Schütteln mit Chloroform geht das Brom in dieses über.

Prüfung. 1) Das Salz färbe sich beim Befeuchten mit verdünnter Schwefelsäure nicht sofort gelb (Calciumbromat $Ca(BrO_3)_2$). 2) Die wässrige Lösung (1:10) werde nach Zusatz von etwas Stärkelösung durch wenige Tropfen Chlorwasser oder Ferrichlorid nicht blau gefärbt (Jod). 3) 0,2 g des scharf getrockneten Salzes sollen bei der Titration unter Zusatz einiger Tropfen Kaliumchromatlösung bis zur eben eintretenden Rothfärbung 20 ccm $\frac{1}{10}$ Normal Silbernitratlösung verbrauchen. Ein höherer Verbrauch würde Gehalt an Calciumchlorid anzeigen.

Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschützt, in sehr gut verschlossenen Glasgefässen


Anwendung. Als Nervinum in Gaben von 1—2 g mehrmals täglich

Eluxir Calcii Bromidi, Eluxir of Calciumbromide (Nat formul) Calom bromati 85,0 g, Acidi citrici 4,0, Eluxir aromati q s ad 1000 ccm

Calcium carbonicum.

Calciumkarbonat kommt in mehreren verschiedenen Formen zur pharmaceutischen Verwendung, 1) als präcipitirtes Calciumkarbonat, 2) Schlammkreide, 3) Marmor, 4) präparirte Austernschalen, 5) Krabsteine, 6) und 7) rothe und weisse Koralle, 8) weisses Fischbein

I Calcium carbonicum (Helv) Calcium carbonicum praecipitatum (Austri Germ) Carbonate de chaux précipité (Gall) Calcii Carbonas praecipitatus (Brit U-St) Calciumkarbonat. Kohlensäurer Kalk. CaCO_3 , Mol. Gew = 100



CCP

Fig 184

Präcipitirtes Calciumkarbonat
400fache Vergr

Darstellung Man geht zweckmässig vom weissen Marmor aus. Man löst 100 Th weissen Marmor in einer Mischung von 300 Th Salzsäure (25 Proc) und 300 Th Wasser auf. Um die in dieser Lösung neben Calciumchlorid enthaltenen Verunreinigungen (Ferrochlorid, Manganochlorid und Magnesiumchlorid) zu beseitigen, versetzt man die deutlich salzsaure Flüssigkeit mit einer dünnen Anreicherung von (5 Th) Chlorkalk mit Wasser, bis die Flüssigkeit deutlich nach Chlor riecht. Nach mehreren Stunden der Einwirkung des Chlors wird die Flüssigkeit mit der zweifachen Menge Wasser verdünnt, erhitzt und nunmehr unter Umrühren so lange mit Kalkmilch (aus *Calcaria usta e marmore*) versetzt, bis deutlich alkalische Reaction vorhanden ist. Eisen und Manganverbindungen werden hierdurch vollständig, Magnesiumchlorid wird der Hauptmenge nach ausgefällt. Man filtrirt sogleich eine kleine Probe ab und stellt fest, ob sie eisenfrei ist. Die alkalische Flüssigkeit darf durch Schwefelammonium nicht dunkel gefärbt, die mit Salzsäure angesäuerte Lösung darf durch Ferrocyankalium nicht blau gefärbt werden, sonst muss die Behandlung mit Chlorkalk und Kalkmilch wiederholt werden. Man lässt einige Stunden absetzen, filtrirt die Lösung, stellt ihr spec Gewicht fest und ermittelt aus einer Tabelle (s S 558) den Gehalt an Calciumchlorid CaCl_2 . Hiernach ist die ungefähr anzuwendende Menge von Natriumkarbonat zu berechnen. Auf 100 Th in Lösung befindliches Calciumchlorid CaCl_2 bedarf man rechnungsmässig rund 260 Th krystallisirtes Natriumkarbonat.

Man erwärmt das mit Salzsäure schwach angesäuerte Filtrat nunmehr auf 60—70° C und fällt unter Umrühren mit einer filtrirten Lösung von (etwa 800 Th) kryst Natriumkarbonat in der 3—4fachen Menge Wasser. Am Schlusse der Fällung muss die Flüssigkeit deutlich alkalisch reagieren. Man lässt den Niederschlag einige Stunden absetzen, dann wäscht man ihn zunächst durch Dekanthiren, später auf einem Papierfilter oder auf einem gut geküssten Colatorium so lange aus, bis das Ablaufende chlorfrei ist, also nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nicht mehr opalisirend getrübt wird. Dann lässt man das Wasser abtropfen oder absaugen, trocknet den Niederschlag und pulvert ihn.

Die Fällungstemperatur ist auf die Beschaffenheit des Präparates nicht ohne Einfluss. Bei gewöhnlicher Temperatur fällt das Calciumkarbonat zunächst als amorpher voluminöser Niederschlag aus, der nur schwierig auszuwaschen ist, nach längerem Stehen aber freiwillig dicht und krystallinisch wird, wobei er in die rhomboedrische Form des Kalkspaths übergeht. Aus siedender Lösung fällt das Calciumkarbonat sofort in krystallinischem Zustande aus und zwar in der Form des Arragonits.

Eigenschaften. Ein trockenes, sehr weisses, zartes, geruch- und geschmacklos, der Zunge anhaftendes Pulver, welches aus mikroskopisch-kleinen, rhomboedrischen, durchsichtigen Krystallchen besteht, löslich in etwa 27000 Th kaltem Wasser, dagegen leichter löslich in kohlensäurehaltigem Wasser, und zwar unter Bildung von Calciumbikarbonat, leicht, vollständig, klar und farblos auflöslich in verdünnter Salzsäure, Salpetersäure oder Essigsäure. Die Krystallchen des aus kalter Lösung gefällten Calciumkarbonats sind erheblich kleiner als die aus heisser Lösung abgeschiedenen. Letztere eignen sich daher besser für Zahnpulvermischungen.

Beim Glühen geht das Calciumkarbonat wieder in Calciumoxyd über.

In der essigsauren Lösung, welche unter Aufbrausen vor sich gehen muss, entsteht durch Zusatz von Ammoniumoxalat ein weisser Niederschlag von Calciumoxalat $\text{C}_2\text{O}_4\text{Ca} + \text{H}_2\text{O}$, der in Salzsäure und in Salpetersäure löslich, in Essigsäure unlöslich ist (Identität).

Prüfung. Durch diese ist namentlich der Nachweis zu führen, dass das Präparat bis auf Spuren frei von Chlor ist und kein Alkalikarbonat (Na_2CO_3) enthält. 1) 1 Th Calciumkarbonat mit 50 Th Wasser geschüttelt gebe ein nicht alkalisch reagirendes (also neutrales) Filtrat, welches beim Verdunsten einen wagbaren Rückstand nicht hinterlässt. Alkalische Reaktion und Verdampfungsrückstand wurden schliessen lassen, dass das Präparat mangelhaft ausgewaschen wurde und noch Natriumkarbonat¹⁾ enthält.

2) Die mit Hilfe von Salpetersäure dargestellte wässrige Lösung (1 = 50) darf durch Baryumnitratlösung nicht sofort verändert (weisse Trübung von Baryumsulfat zeigt Schwefelsäure an) und durch Silbernitratlösung nur opalisirend getrübt werden, es sind daher Spuren von Chlorwasserstoff bezw. Chlornatrium zugelassen (Ueber das chlorfreie Präparat s. w. u.).

3) Die salzsaure Lösung werde a) durch Ammoniak, im Ueberschuss versetzt, inner halb 10 Minuten nicht getrübt (Thonerde), b) durch Kaliumferrocyanidlösung nicht sogleich blau gefärbt (Eisen).

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Glasgefässen.

Anwendung. Innerlich genommen neutralisirt das Calciumkarbonat die Säure in den ersten Verdauungswegen unter Abscheidung von Kohlensäure und Bildung der betreffenden Calciumsalze, ein Ueberschuss Calciumkarbonat geht mit den Fäces fort. Ein Theil der Kalksalze wird resorbirt und zur Bildung des Knochengerüsts verbraucht. Man giebt das Calciumkarbonat zu 0,5–1,0–1,5 g als Antacidum bei übermässiger Säurebildung, Diarrhoen, Knochenkrankheiten, Skrophulose, neuerdings, mit Calciumphosphat kombiniert mit gutem Erfolge bei Diabetes. Aeusserlich ist es ein mildes, austrocknendes Mittel, besonders eine viel gebrauchte Grundlage für Zahnpulver.

Calcium carbonicum purissimum, chlorfrei (Austr. Germ.) Dieses zu analytischen Zwecken, z. B. zur Prüfung der Benzoesäure auf gechlorte Produkte, benutzte Präparat wird durch Fällung einer Lösung von Calciumnitrat mit Natriumkarbonat bei 60–70° C und nachfolgendes gründliches Auswaschen erhalten.

II Creta praeparata Calcium carbonicum nativum (Austr.) Schlammkreide. Kreide. Blanc d'Espagne (de Paris ou de Meudon). Craie. Chalk. Die Kreide kommt als „Stückenkreide“ und als „geschlammte Kreide“ im Handel vor.

Zur Darstellung der letzteren wird die natürlich vorkommende, weisse Kreide gemahlen und einem Schlammprocess unterworfen. Das geschlammte Produkt wird getrocknet und kommt entweder als Pulver oder in Trochiskenform (als kleine Kegel) in den Verkehr.

Zartes, weisses Pulver, unfühlbar. In verdünnter Essigsäure soll es sich fast klar ohne Hinterlassung von Sandkörnern auflösen. Die hierbei entwickelte Kohlensäure besitzt in der Regel modrigen Geruch — Schlammkreide stellt amorphes Calciumkarbonat dar, in

¹⁾ Man hüte sich, sodahaltiges Calciumkarbonat zu Zahnpulvern zu verwenden, die Käufer bringen letzteres wegen des laugenhaften Geschmacks mit Protest zurück. Es empfiehlt sich, das für Zahnpulver bestimmte Calciumkarbonat durch den Geschmack zu prüfen.

der Regel verunreinigt durch kleine Mengen Thonerde, Thonerdesilikat, Magnesiumkarbonat, Calciumkarbonat, Calciumphosphat, organische Substanz und Spuren von Eisenoxyd

Die Kreide besteht hauptsächlich aus den Schalen mikroskopisch kleiner Foraminiferen (Polythalamien), unter dem Mikroskop zeigt sie meist abgerundete Partikel von linsenförmiger Gestalt und verschiedener Grösse Fig 136

Innerlich wird die Schlammkreide überhaupt nicht mehr angewendet Sie ist hier, wie auch zur Herstellung von Zahnpulvern, durch das gefällte Calciumkarbonat während der letzten 20 Jahre vollständig verdrängt worden Technisch wird sie zur Bereitung von Kitten, zur Gewinnung von Kohlensäure in der Mineralwasserfabrikation verwendet

III Marmor album Weisser Marmor. Marbre. Marble Der Abfall aus den Werkstätten der Bildhauer ist zu einem sehr geringen Preise zu erlangen Der weisse Marmor ist meist ein sehr reines Calciumkarbonat und wird daher zur Darstellung der Kalksalze und als Kohlensäurematerial gebraucht Auch die Mineralwasserfabrikanten, welchen die Erlangung des Magnesiums erschwert ist, benutzen ihn als Kohlensäurematerial, denn die daraus entwickelte Kohlensäure ist sehr rein Man sehe nur darauf, dass zum pharmaceutischen Gebrauch möglichst weisse Marmorstücke verwendet werden Nöthigenfalls lese man die weissesten Stücke aus Der durch Brennen von weissem Marmor erhaltene Aetzkalk ist sehr rein (s S 539)

IV Conchae praeparatae (Erganzb) Testae Ostreae laevigatae. Präparirte oder geschlammte Austernschalen.

Die gepulverten und geschlammten Schalen der gemeinen Auster, *Ostrea edulis* Linn, einer an den europäischen Küsten vielfach vorkommenden, zur Klasse der Lamelli branchiaten gehörigen Molluske aus der Familie der Ostreiden




Fig 135 *On. p.* Präparirte Austernschalen




Fig 136. *Ort p* Schlammkreide.

400fache Vergrößerung.

Darstellung. Die aus den Wein- bezw Austernstuben während der kalten Jahreszeit in grossen Mengen kostenfrei zu erhaltenden Schalen werden zunächst von anhaftenden Unreinigkeiten mechanisch durch Abkratzen gereinigt Alsdann weicht man sie in ammoniakhaltigem Wasser ein, kocht sie hierauf mit Wasser aus, bürstet sie mit einer Stahldrahtbürste aussen ab, wäscht sie mit reinem Wasser und trocknet sie Hierauf stösst man die äusseren, gefärbten Schichten der Schale mit einem starken, kurzklingigen Messer ab und pulvert die von diesen befreiten Schalen im Mörser möglichst fein Das Pulver wird alsdann im Mörser aus Porcellan mit Wasser feingerieben (im grossen auf Mahlgängen) und einem Schlammprocess unterworfen Die sich absetzenden feinsten Theilchen werden gewaschen, alsdann in der Regel in die Form kleiner Kegel gebracht und getrocknet.

Eigenschaften. In den Handel gelangen sie entweder in der Form der schon beschriebenen Kegel von etwa 1 cm Höhe oder als feines Pulver Zerrieben stellen sie ein weissliches, feines, unfühbares Pulver dar, welches keine glänzenden Partikel enthält In kalter Salzsäure löst es sich unter Aufbrausen mit Hinterlassung einiger weniger Flöckchen auf Aus dieser Lösung scheidet sich durch Uebersättigen mit Ammoniak nur

ein geringer Niederschlag von Calciumphosphat ab, während z. B. Knochenasche einen sehr reichlichen Niederschlag von Calciumphosphat giebt. Eine Unterscheidung von Kreide entdeckt man, wenn man eine Probe zwischen den Zähnen laut. Das Präparat aus Austernschalen enthält, auch wenn es zwischen den Fingern unfehlbar erscheint, doch stets harte, scharfe Partikelchen, welche zwischen den Zähnen und auf der Zunge leicht kenntlich sind. Solche scharfe Partikel fehlen der Kreide. Fig. 185

Mit Sicherheit lassen sich Kreide und Austernschalen unter dem Mikroskop unterscheiden. Die präparirten Austernschalen bestehen aus verschiedenen grossen, ziemlich scharfkantigen, bisweilen länglichen, durchsichtigen Stückchen, denen man es aber immer ansieht, dass sie von platten- oder tafelförmigen Gebilden herühren. Die Kreide zeigt zwar auch grössere und kleinere Theilchen, aber diese sind nicht scharfkantig, sondern nähern sich mehr der Linsen- oder Kugelform. Nach CHATIN und MUNTZ enthalten die Austernschalen in Procenten 0,1 Stickstoff, 0,15 Schwefel als Sulfat, 0,02 Schwefel als Sulfid, 0,4 Magnesiumoxyd, 0,012 Mangan, 0,025 Eisen, 1,0 Siliciumdioxid, 50,0 Calciumoxyd, 45,0 Kohlensäure (CO_2), 0,003 Jod, 0,005 Brom, 0,02 Fluor, 0,09–0,4 Phosphorsäure (P_2O_5) und 1,0 organische Bestandtheile.

Anwendung. Die präparirten Austernschalen werden unter den gleichen Indicationen wie der kohlensäure Kalk angewendet. Sie sind Bestandtheil zahlreicher Kinder (beruhigungs)pulver, ferner vieler Zahnpulver. Die Ansicht, dass man sie ohne weiteres durch das reine gefällte Calciumcarbonat ersetzen könne, muss als irrtümlich bezeichnet werden.

V Lapis Cancrorum (Erganzb.) Oculi Cancrorum Calculli Cancrorum. Krebsaugen. Krebssteine. Werden gegenwärtig vorzugsweise aus Russland eingeführt.

Der Flusskrebs, *Astacus fluviatilis* Linn., ein zur Unterklasse der Malakostraken gehöriger Kruster aus der Familie der Astaciden, wechselt alljährlich und zwar von Juni bis August seine Kalkschale. Während dieser Häutungszeit findet man an den Seiten seines Magens und am Grunde der Speiseröhre harte, ziemlich weisse, matte, kreisrunde, konkav-konvexe, auf der konkaven Seite mit wulstig vortretendem Rande versehene, 0,3 bis 1,0 cm im Durchmesser haltende, 0,2–0,5 cm dicke Körper. Sie zeigen im Innern concentrische Schichtung. In ihrer chemischen Zusammensetzung sind sie den Austernschalen ähnlich. In kochendem Wasser nehmen die Krebssteine gewöhnlich eine rosenrothe Farbe an. Beim Erhitzen in der Weingeistflamme schwarzen sie sich anfangs, werden dann aber in der Gluthitze wieder weiss. Sie lösen sich in verdünnter Salzsäure unter Aufbrausen und hinterlassen eine gallertartige Haut von der Gestalt des gelosten Krebssteines. In der salzsauren Lösung erzeugt Ammoniak, wenn es im Ueberschuss zugesetzt wird, einen ziemlich reichlichen Niederschlag von Calciumphosphat. Sie enthalten nach WEISKE 14,44–15,08 Proc. organische Materie, 55,42–55,72 Calciumoxyd, 30,6–31,9 Kohlensäure und 10,73–11,23 Phosphorsäure.

Man halt die Krebssteine unzerkleinert oder als feines Pulver vorräthig. Die unzerkleinerten wendet das Volk an, um Fremdkörper aus dem (menschlichen) Auge zu entfernen. Zu diesem etwas rohen Verfahren sollten möglichst kleine Krebsaugen abgegeben werden. Das Pulver wird innerlich in gleicher Weise wie Calciumcarbonat und Conchae praeparatae angewendet.

VI Corallium album Weisse Koralle. Unter dieser Bezeichnung wurden früher verschiedene Augenkorallen (Oculiniden) gesammelt, namentlich die Jungfernkoralle, *Oculina virginea* Less. und verschiedene andere, der Gattung *Madrepora*, Familie der *Madreporidae*, zugezählte Korallen. Das Kalkgerüst dieser Korallen fand in der alten Medicin häufig als giftwürgendes Mittel Verwendung.

Der Korallenstock ist baumartig und astig, milchweiss, glatt, mit zusammenlaufenden Aesten. Die als weisse Koralle in den Handel kommenden Bruchstücke der Aeste sind




Fig. 187 Krebssteine
a Vertikaldurchschnitt,
b kleiner Krebsstein von
unten, c ein grosser von
oben gesehen.

hart, 2 bis 10 cm lang, 0,5—1,0 cm dick, cylindrisch, hin und her gebogen, glatt mit vielen rundlichen Vertiefungen mit strahlig gestellten Blättchen. Innen sind sie hohl und strahlig. Sie bestehen hauptsächlich aus Calciumkarbonat mit Spuren Jod und etwas thierischer chitinartiger Substanz.

Die weisse Koralle, welche höchst selten und nur als feines Pulver in Anwendung kommt, wird durch *Conchae praeparatae* vollständig ersetzt, sowohl in Pulvern für den innerlichen Gebrauch, als auch in Zahnpulvermischungen.

VII Corallium rubrum Rothe Koralle. Hierunter sind die kleinen Fragmente der im Mittelmeer und im rothen Meere gefischten Blut- oder Edelkoralle *Corallium rubrum* Lam., Familie der Gorgonidae, Ordnung der Octactinia zu verstehen.

Der Polypenstock ist strauchartig und astig. Die in den Handel kommenden rothen Korallen sind harte, 3—5 cm lange Bruchstücke der Äeste. Sie sind strohhalm- bis federhiedick, cylindrisch oder plattgedrückt, hin und her gebogen, zart gestreift. Sie bestehen hauptsächlich aus Calciumkarbonat mit kleinen Mengen Magnesia, Eisenoxyd, chitinartiger Substanz und Spuren Jod. Durch Digestion in Terebintinöl werden sie weiss.

Die rothe Koralle wird nur als ein feines Pulver zu Zahnpulvern verwendet.

Corallin hat man die als Farbmateriale benutzte Rosolsäure genannt. Diese entsteht aus einem Gemisch von 1 Th Oxalsäure, $1\frac{1}{2}$ Th Karbolsäure und 2 Th Schwefelsäure durch mehrstündiges Erhitzen bis auf 140 bis 150° C.

VIII Os Sepiae (Erganzb.) Ossa Sepiae. Tegmina Sepiae. Sepie. Sepia. Knochen. Weisses Fischbein.

Der Tintenfisch, die gemeine Sepie, *Sepia officinalis* Linn., ein zur Unterordnung der Decapodiden gehörender Cephalopode aus der Familie der Myopsiden, trägt unter seiner äusseren Haut eine kalkige Rückenschale (Rückenschulp), welche die Sepia des Handels darstellt.

Das weisse Fischbein des Handels besteht aus langlich ovalen, 12—25 cm langen, 4—8 cm breiten, weissen, spröden und leicht zerbrechlichen Stücken. Man unterscheidet leicht drei Lagen des Schulpes. Nach aussen ist eine feste, dünne (papierstarke) Kalkschicht mit chagrinirter, feinhöckeriger Oberfläche. Die mittlere Schicht ist ein dünnes Hornblatt. Das grösste Volumen nehmen sehr zahlreiche, schief nach oben gerichtete Kalkblättchen ein, welche sich unter einander verbinden und die dritte Schicht bilden. Diese letztere ist bisweilen von schwachem Seewassergeruch und schwach salzigem Geschmack. Das weisse Fischbein besteht hauptsächlich aus Calciumkarbonat und thierischer leimartiger Substanz nebst sehr geringen Mengen Calciumphosphat und Natriumchlorid.

Zur Darstellung des gepulverten weissen Fischbeins wird die innere weisse lockere Schicht mit einem Messer mit rundem Ende von der harten äusseren Decke abgestossen und zu Pulver zerrieben. Es ist zuweilen Bestandtheil des Zahnpulvers oder wird vom Volke als Fieber- und Magenmittel genommen, oder zum Poliren metallener Gerathschaften gebraucht. Zu letzterem Zwecke wird häufiger das ganze oder nicht zerkleinerte Fischbein benutzt. Die Goldarbeiter benutzen die ganzen Sepia Schalen zur Herstellung von Gussformen für Ringe und dergl. Hierfür sind besonders grosse und dicke Exemplare auszuwählen.

Die unter dem Namen Sepia geschätzte dunkelbraune Malerfarbe ist der eingedickte Saft des Tintenbeutels des Tintenfisches.

Zahn-Pasten Das Calciumkarbonat ist ein Bestandtheil der meisten Zahnpasten, welche bekanntlich ausserdem noch Seifenpulver, Borax und andere mehr indifferente Bestandtheile enthalten. Für die Darstellung guter Zahnpasten ist folgendes als wichtig zu beachten. Die Mischung der vorgeschriebenen Pulver ist lediglich unter Anwendung von concentrirtem Glycerin zur Paste anzustossen. Der vorgeschriebene Farbstoff ist im Glycerin zu lösen und als Glycerinlösung zuzufügen. Zusätze von Wasser und Alkohol sind streng zu vermeiden, denn sie machen die Paste in kurzer Zeit steinhart.

Aqua Calcariae bicarbonicae
Carrara-water
 Rp *Aquae Calcariae* q s
 Ist mit Kohlensäure zu imprägniren.
Globuli anterysipelacei
Elisabethiner Kugeln
 Rp *Cretae levigatae* 130,0
Alumini pulverati 10,0
Ammoni chlorati 5,0
Camphorae tritae 2,5
Mucilaginis Amyli q s
 Man bereite hieraus 10 Kugeln und trockne sie an einem warmen Orte

Mistura Cretae (Brit.)
 Rp *Calci carbonici praecip* 5,0
Tragacanthae pulv 0,7
Sacchari pulverati 10,0
Aquae Cinnamomi q s ad 160,0 com

Mistura Cretae (U-St.)
 Rp *Pulvis Cretae compositi* 200,0
Aquae Cinnamomi 400,0
Aquae destillatae q s ad 1000,0 com.

Mixtura cretaeae (Hamb V)
Austernschalen-Mixtur Lac Perlarum
 Rp *Concharum praeparatarum* 3,0
Gummi arabici pulv 8,0
Aquae Amygdalar amar dil 20,0
Sirupi Sacchari 15,0
Aquae destillatae q s ad 100,0

Pasta dentifricia nobilis
Dr B FISCHER's Zahnpasta
 Rp *Boracis* 3,0
Rhizomatis Iridis pulv 5,0
Saponis medicati 10,0
Calci carbonici praec 20,0
Olei Menthae piperitae
Olei Geranii 33 1,0
Phloxinroth
Glycerini 33 q s

Diese Zahnpasta, von B FISCHER während 10 Jahren erprobt, ist die schönste, welche wohl überhaupt existirt. S oben unter Zahn-Pasten.

Pulvis antilyssus
Graf ISENBERG's Pulver
 Rp 1 *Concharum praeparatarum*
 2 *Corallosum rubrosum* 33 20,0
 3 *Auri foliati*
 4 *Argentii foliati* 33 q s
 Man mischt 1 und 2 und reibt von 3 und 4 so viel darunter, dass glänzende Flitter in der Mischung deutlich zu sehen sind

Pulvis Cretae aromaticus (Brit.)
 Rp *Corticis Cinnamomi* 80,0
Nucis moschatae 60,0
Caryophyllorum 80,0
Fructus Cardamomi 20,0
Sacchari 500,0
Calci carbonici 220,0

Pulvis Cretae compositus (U-St.)
 Rp *Calci carbonici praecip* 30,0
Gummi arabici 20,0
Sacchari albi 50,0

Pulvis dentifricus albus
Weisses Zahnpulver (Ergänzb)
 Rp *Calci carbonici praec* 340,0
Saponis medicati 50,0
Olei Menthae piperitae 5,0

Pulvis dentifricus albus (Austr.)
 Rp *Rhizomatis Iridis pulv*
Magnesi carbonici 33 3,0
Calci carbonici 40,0
Olei Menthae piperitae gtt IV

Pulvis dentifricus cum Camphora (Ergänzb)
Poudre dentifrice de crete camphree (Gall)
Ligänzb Gall
 Rp *Camphorae* 1,0 1,0
Calci carbonici 18,0 90,0

Pulvis dentifricus saponatus LASSAR.
LASSAR'sches Zahnpulver
 Rp *Calci carbonici* 100,0
Kalk chlorici
Lapis Pumicis pulv 33 25
Saponis medicati 25,0
Olei Menthae pip 1,0

Pulvis dentifricus ruber nobilis
Dr B FISCHER's rothes Zahnpulver
 Rp *Calci carbonici* 100,0
Rhizomatis Iridis pulv 5,0
Magnesi carbonici 5,0
Solutionis Phloxini spirituos q s
Olei Menthae pip
Olei Geranii 33 10
 Eins der schönsten rothen Zahnpulver

Pulvis Principis Friderici
Prinz Friedrichspulver
 Rp *Calci carbonici*
Sacchari albi 33 50,0
Magnesi carbonici 10,0
Tincturae capiti Papaveris 5,0
 Wird kleinen Kindern messerspitzenweise mit Milch als Antemetacum und Antidiarrhoeicum gegeben.

Tinctura Corallosum
Korallentropfen
 Rp *Tincturae Ratanhae*
Tincturae Cinnamomi
Tincturae aromaticae 33 15,0
Spiritus diluti (70%) 55,0
 Früher wurde diese Tinktur aus Gewürzen und rothen Korallen bereitet. Da von diesen aber nichts gelöst wurde, so hat man der obigen Mischung den Namen Korallentinktur gelassen

Trochisci Cretae (U-St.)
 Rp *Calci carbonici* 25,0
Gummi arabici 7,0
Spiritus Maedis 8 com
Sacchari albi 40,0
 fiant cum aqua q s trochisci No 100

Balm of White Lilies, for preserving and beautifying the skin, von H A HOADLEY in New-York. Schönheitswasser für die Haut. Roth gefärbtes Wasser, welches eine grosse Menge Kalkkarbonat in Suspension, aber keine schädlichen Metalle enthält (CHANDLER, Analyt.)

Epilepsiemittel, von der Frau Gross-Herzogin von Mecklenburg-Schwerin empfohlen, zu beziehen aus der Hofapotheke zu Schwerin, besteht aus 91,28 g Paonienpulver und 8,77 g präparirten Krebssteinen, vertheilt auf 24 Pulver, und einer Flasche Maiblumenwasser (HMLY, Analyt.)

Fettflecke aus Marmor zu entfernen. Man trägt einen Brei von gebrannter Magnesia und Benzin auf, bedeckt, um das rasche Abdunsten von Benzin zu verhüten.

dern, mit einer Schale und wäscht das Pulver, nachdem es trocken geworden ist, weg. Das Verfahren muss unter Umständen wiederholt werden.

Hühner-Pulver, um die Hühner zum vermehrten Eierlegen zu veranlassen. Grob gestossene Austernschalen 250,0, Kreide 33,0, Calciumphosphat 33,0, Schwarzer Pfeffer, Paprika je 4,0, Eisenoxyd 6,0, Natriumchlorid 8,0.

Kalodont von SARG in Wien. Calciumkarbonat 250,0, Magnesiumoxyd 80,0, Glycerin 500,0, medicinische Seife 150,0, Zimmtöl, Pfefferminzöl je 2,0, Phloxinroth q s (DAHMEN). In Tuben zu füllen.

Kinderberuhigungspulver (Wiener Spezialität). Pulvis Visci albi, Magnesi carbomel, Rhizomatis Iridis florentinae, Concharum praeparatarum aa 10,0, Ligni Santali rubri pulverati 20,0.

Lily White and Rose Bloom, LAVEL's. Kalkkarbonat mit Speckstein (CHANDLER, Analyt).

Lily White, superior, besteht aus Kalkkarbonat und wenig Magnesiumsubkarbonat (CHANDLER, Analyt).

Marmorplatten aufleimen. Um Marmorplatten auf Holz, z. B. auf Nachttische und Spiegeltische aufzuleimen, benutzt man eine Mischung von heissem Leim mit Gips. Die zu verbindenden Flächen sind anzuwärmen, auch ist rasch zu arbeiten.

Opiat pour les dents von PRATD, eine Zahnlatwerge. 70 Th mit Rosanilin rothgefärbter Zuckersyrup, 21 Th Kreide, $7\frac{1}{2}$ Th Gips, $1\frac{1}{3}$ Th Magnesia (PRIEBAM, Analyt).

Patentkitt, Karlsbader. Besteht I) aus Wasserglas von 1,84 spec Gew. II) Aus 1 Th Calciumkarbonat und 29 Th Kaolin. Zum Gebrauch erwärmt man die zu kittenden Bruchflächen, mengt das Pulver mit dem Wasserglas zu einem dicken Brei an, bestreicht die Bruchflächen, presst sie aneinander und lässt sie zwölf Stunden in gelinder Wärme trocknen.

Pondarine von FALTINGER & Co in Wien, ein Pulver, welches die Hühner zum Eierlegen anregen soll, ist angeblich eine Mischung von Schlammkraute mit Eisenoxyd (Eisenmennige).

Sozodont von BUSKIRK, Zahnreinigungsmittel. I) Gemisch von Calciumkarbonat, Magnesiumkarbonat und Veilchenwurzelpulver, mit Nelkenöl schwach parfümirt. II) Lösung von Oelseife 5,0, Glycerin 6,0, Spiritus 30,0, Wasser 20,0. Parfümirt mit Nelkenöl, Pfefferminzöl, Anisöl etc. und mit Kochenille tingirt.

Steinpillen der Frau STEPHENS. 0,2 g schwere Pillen aus Kalkkarbonat und Seife. Täglich fünfmal je 5 Pillen.

Superior Lily White von BAZIN in Philadelphia. Besteht aus Kalkkarbonat mit kohlensaurer Magnesia und ist frei von schädlichen Metallen (CHANDLER, Analyt).

Zahnpasta, aromatische, von SUIN DE BOULEMARD in Rheimsberg. 62,5 Proc Oelseife, 6,5 Proc Stärkemehl, 17,4 Proc Kugellack, 7,35 Proc kohlensaurer Kalk, 0,95 Proc schwefelsaurer Kalk, 6,2 Proc Bimstein nebst wenig Pfefferminzöl. 24 g = 0,6 Mark (WITTEBIN, Analyt).

Zahnpasta von PFEFFERMANN in Wien. 60 Th Schlammkreide, 26 Th Austernschalen, 6 Th Florentiner Lack, 8 Th Pfefferminzöl werden mit der nöthigen Menge Tragant schleim zur Konsistenz geformt. 50 g = 2,5 Mark (HILDWEIN, Analyt).

Zahnpulver, FRIKOW'sches, besteht aus Ossis Sepinae, Lapidum Cancrorum ana 20,0, Rhizomatis Iridis 15,0, Lapidis Fumicus 5,0, Carmini rubri 0,6, Olei Menthae piperitae 0,15, Olei Rosae 0,05.

Zahnpulver, vegetabilisches, von J. G. POPP in Wien. 20 Th Veilchenwurzel, 10 Th gebranntes Hirschhorn, 1 Th Florentiner Lack. 30 g = 1,8 Mark (HILDWEIN, Analyt).

Calcium chloratum.

Im Handel unterscheidet man folgende drei Hauptsorten des Calciumchlorids. 1) *Calcium chloratum crystallisatum* $\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, 2) *Calcium chloratum siccum* seu *granulatum* $\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ und 3) *Calcium chloratum fusum* CaCl_2 .

I Calcium chloratum crystallisatum. Chlorure de calcium cristallisé (Gall.) Krystallisirtes Calciumchlorid. Calx salita. Sal ammoniacum fixum. Chlorcalcium, krystallisirtes $\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 219.

Darstellung. 100 Th grob gepulverter weisser Marmor werden in einen gekämigen Glaskolben gegeben und nach und nach mit 300 Th reiner Salzsäure von

circa 1,124 spec Gew übergossen. Gegen das Ende dieser Operation erwärmt man den Kolben im Sandbade, um die Auflösung des Marmors und die Austreibung der Kohlensäure zu befördern. Hierauf giebt man noch 5 Th oder so viel gepulverten weissen Marmor hinzu, dass bei fortgesetzter Digestion ein Theil des Marmors ungelöst bleibt. Der warmen Flüssigkeit werden nun ohne zu filtriren 5 Th Chlorkalk, welcher mit Wasser zu einem Brei angerührt ist, nach und nach hinzugesetzt. Das Erwärmen wird eine halbe Stunde oder solange fortgesetzt, bis eine abfiltrirte geringe Menge der Lösung, mit einigen Tropfen Aetzammon versetzt, auf Zusatz von Schwefelwasserstoff nicht farbig verandert wird, also die Abscheidung etwa gegenwärtigen Eisenoxyds gesichert ist.

Die erkaltete Flüssigkeit wird filtrirt, wenn sie deutlich alkalisch reagiren sollte, mit reiner Salzsäure neutralisirt und in einer porcellanen Schale in der Wärme des Sandbades (110—130° C) entweder unter Umrühren zur Trockne eingedampft oder bis zur Sirupdicke eingeeengt und zur Krystallisation bei Seite gestellt. Ausbeute circa 210 Th. In beiden Fällen erhält man das krystallisirte Calciumchlorid $\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, welches fast 50 Proc Wasser enthält.

Hatte man Krystalle erzielt, so bringt man diese zum Abfließen in einen bedeckten Trichter, trocknet sie rasch durch Walzen auf Filtrirpapier und bringt sie — obgleich sie jetzt noch feucht aussehen werden — sogleich in trockne, mit guten Korken zu verschliessende und sogleich mit Paraffin zu dichtende Gefässe, die man an einem kühlen Orte aufbewahrt.

Eigenschaften. Das krystallisirte Calciumchlorid bildet geruch- und farblose, sehr hygroskopische und an der Luft zerfliessende, gewöhnlich etwas feuchte, 4- und 6seitige Säulen mit scharf zulaufenden Endspitzen oder ein trockenes, weisses, krystallinisches Pulver von erwärmend salzigem, bitterem, scharfem Geschmack und mit einem Krystallwassergehalt von 49,32 Proc, leicht löslich in Wasser und Weingeist, damit neutrale Flüssigkeiten gebend.

Beim Erhitzen schmilzt es und giebt einen Theil des Krystallwassers ab. Wird es längere Zeit auf 200° C erhitzt, so giebt es 4 Mol Krystallwasser ab und es hinterbleibt ein undurchsichtiges wasserarmes Salz der Zusammensetzung $\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, welches rund 24,5 Proc Wasser enthält. Wird die Erhitzung bis zur Rothgluth gesteigert, so wird auch der Rest des Wassers abgegeben und man erhält das wasserfreie Calciumchlorid CaCl_2 als geschmolzene, ölige Flüssigkeit, welche nach dem Erkalten zu durchsichtigen, krystallinischen Massen erstarrt.

Während das krystallisirte Calciumchlorid leicht neutral erhalten werden kann, tritt sowohl bei der Darstellung des Salzes $\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ als auch bei derjenigen des wasserfreien Salzes CaCl_2 eine geringe Abspaltung von Salzsäure ein unter Bildung von basischem Calciumchlorid, so dass diese beiden Salze, so wie sie im Handel vorkommen stets mehr oder weniger alkalisch reagiren, worauf man unter Umständen Rücksicht zu nehmen hat.

Prüfung 1) Die Lösung in 10 Th Wasser sei klar und gegen Lackmuspapier annähernd neutral. 2) Beim Versetzen mit Ammoniakflüssigkeit entstehe nicht sogleich ein Niederschlag, ein weisser Niederschlag würde von Thonerde, ein bräunlicher von Eisenverbindungen herrühren. 3) Die mit Salzsäure mässig angesäuerte Lösung werde durch Baryumchlorid nicht getrübt (Schwefelsäure) und durch Schwefelwasserstoff nicht gefärbt (Metalle, z B Eisen, Blei). Durch Kaliumferrocyanid werde sie nicht sogleich blau gefärbt (Eisen).

Aufbewahrung Wegen seiner stark hygroskopischen Eigenschaften wird das Calciumchlorid in Glasgefässen, welche dicht mit Kautschuk- oder mit paraffinirten Korkstopfen geschlossen sind, an einem trocknen Orte aufbewahrt.

Anwendung Das krystallisirte Calciumchlorid wirkt in Substanz wegen seiner Neigung, Wasser aufzunehmen, auf Schleimhäute schwach ätzend, in verdünnter Lösung adstringirend. In Deutschland wird es nur selten, häufiger in England und Amerika angewendet. Man giebt es äusserlich in Augewässern (0,1 10,—20,0 Aqua), zur Zerkleinerung von Drüsengeschwülsten in Form von Salben (1, 10,0 Fett), als Verbandwasser

(1, 20,—30,0 Wasser) Innerlich bei Scrophulosis und Phthisis mehrmals täglich 0,2—0,5 in stark verdünnter, wässriger Lösung Gaben von 2,0—5,0 bewirken Ekel, Erbrechen, Mattigkeit, Angst, Schwindel, Zittern und ähnliche Zufälle

Die Hauptmengen des krystallisierten Calciumchlorids werden, soweit der Pharmaceut in Betracht kommt, zur Darstellung künstlicher Mineralwasser, namentlich des künstlichen Selterswassers verbraucht — Ferner dient das Calciumchlorid des Ausgangsmaterials zur Darstellung zahlreicher Calciumverbindungen. Endlich ist es ein Bestandtheil zahlreicher Feuerlöschmittel

Calcium Mittel gegen das Gefrieren der Schanfenster etc ist eine Auflösung von Calciumchlorid

Calcium chloratum crudum Dieses Salz ist im krystallisierten Zustande oder in Gestalt der konc wässrigen Lösung ein Nebenprodukt, ja häufig ein lastiges Abfallprodukt der chemischen Industrie Man verwendet es zur Darstellung von Bädern (100—200 g auf ein Vollbad), besonders aber als Gefrier-Laugen bei der künstlichen Herstellung von Eis Concentrirte Calciumchloridlösungen können nämlich auf -10°C und darunter abgekühlt werden, ohne zu erstarren Man hat also damit die Möglichkeit, Kalte in Form einer stark abgekühlten Flüssigkeit durch Rohrenleitungen nach beliebigen Orten hinzu führen Aus dem gleichen Grunde benutzt man Lösungen von Calciumchlorid als Sperrflüssigkeit für Gasometer in solchen Fällen, in denen bei Anwendung von reinem Wasser muthmasslich ein Einfrieren des letzteren eintreten würde s S 849

Werden 3 Th krystallisiertes Calciumchlorid mit 1 Th Schnee oder zerkleinertem Eis gemischt, so sinkt die Temperatur bis auf -36°C — Eine solche Mischung wird daher in der Praxis als Kaltmischung benutzt

Zu manchen Zwecken muss dieses Salz neutral sein oder vielmehr, es darf nicht sauer reagiren Man prüft eine grossere Menge der auf einen Gehalt von etwa 15 Proc des krystallisierten Salzes verdünnten Lösung mit Methylorange Die Lösung muss gelb bleiben und darf nicht roth gefärbt werden Ein saures Präparat könnte durch Digeriren mit Marmorpulver oder durch Zugabe von Kalkmilch entsauert werden

Volumgewicht und Gehalt der Lösungen an krystallisiertem und wasserfreiem Calciumchlorid bei $18,3^{\circ}\text{C}$. (SCHIEFF)

Spec. Gew bei $18,3^{\circ}\text{C}$	Proc $\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	Proc CaCl_2	Spec. Gew bei $18,3^{\circ}\text{C}$	Proc $\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	Proc CaCl_2	Spec. Gew bei $18,3^{\circ}\text{C}$	Proc $\text{CaCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	Proc CaCl_2
1,0079	2	1,014	1,1107	26	13,177	1,2262	50	25,340
1,0159	4	2,028	1,1199	28	14,191	1,2368	52	26,354
1,0241	6	3,041	1,1292	30	15,204	1,2465	54	27,368
1,0323	8	4,055	1,1386	32	16,218	1,2567	56	28,381
1,0407	10	5,068	1,1480	34	17,232	1,2669	58	29,395
1,0491	12	6,082	1,1575	36	18,245	1,2778	60	30,408
1,0577	14	7,096	1,1671	38	19,259	1,2877	62	31,422
1,0663	16	8,107	1,1768	40	20,272	1,2981	64	32,436
1,0750	18	9,121	1,1865	42	21,286	1,3087	66	33,449
1,0838	20	10,136	1,1963	44	22,300	1,3198	68	34,463
1,0927	22	11,150	1,2062	46	23,313	1,3300	70	35,476
1,1017	24	12,164	1,2162	48	24,327			

II Calcium chloratum siccum (Erganzb) Calcium chloratum granulatum. **Calcii Chloridum (Brit.)** Entwässertes oder trockenes Chlorcalcium. Granulirtes Chlorcalcium. $\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 147.

Darstellung Eine neutrale oder schwach saure Lösung von Calciumchlorid wird in einer Porzellanschale auf dem Sandbade unter Umrühren mit der Vorsicht erhitzt, dass die Temperatur nicht wesentlich über 200°C hinauskommt Die Flüssigkeit wird zunächst flüg-dick, später bildet sich auf ihr eine weisse, undurchsichtige Haut, schliesslich wandelt sie sich in eine krümelige weisse, undurchsichtige Salzmasse um Man setzt das Erhitzen (bei 200°C) so lange fort, bis die Salzmasse rein weiss aussieht, eine darüber gehaltene

kalte Glasplatte nicht mehr mit Feuchtigkeit beschlagt und die Masse sich ohne allzu grosse Schwierigkeiten in Krusten von der Schale ablosen lässt

Man zerkleinert diese Salzmassen noch heiss, bringt die Stücke durch Absieben auf eine einigermassen gleichartige Korngrösse und füllt sie sogleich in vorgewärmte, gut zu verschliessende Gefässe ein. Die mehr pulverigen Antheile werden gesondert aufbewahrt

Eigenschaften Weisses kornig-krystallinisches Salzpulver, meist aber granulirte, poröse Massen von Erbsengrösse darstellend. Sie ziehen mit Begierde Feuchtigkeit aus der Luft an, wobei sie zu einer sirupösen Flüssigkeit zerfliessen. In Wasser sind sie unter Selbsterwärmung löslich. Die wässrige Lösung reagirt in der Regel etwas alkalisch (s. vorher S. 557), verhält sich im übrigen aber ebenso wie die wässrige Lösung des krystallisierten Calciumchlorids. — Das Salz enthält nach der obigen Formel rechnungsmässig rund 24,5 Proc. Krystallwasser, die es beim Erhitzen auf Rothgluth unter Uebergehen in den geschmolzenen Zustand abgibt. Deshalb verlangt der Ergänzbg., dass das entwässerte Calciumchlorid, längere Zeit geschmolzen, nicht mehr als 25 Proc. an Gewicht verlieren solle.

Anwendung Dieses Salz ist dasjenige, welches vorzugsweise zum Trocknen von Gasen, zum Füllen von Exsiccatoren, zum Einstellen in Wagegehäuse verwendet wird. Es eignet sich hierzu, obgleich es noch 2 Moleküle Wasser enthält, wesentlich besser als das wasserfreie, geschmolzene Calciumchlorid, weil es den Gasen seiner porösen Beschaffenheit wegen eine grössere Oberfläche darbietet. Zur Füllung von Absorptionsröhren für die Kohlensäurebestimmung, auch für die Elementar-Analyse benutzt man meist das im Vorstehenden beschriebene reine Salz, nachdem es neutral gemacht worden ist, für Exsiccatoren, zum Trocknen von Gasen, bei nicht quantitativen Arbeiten u. dgl. die noch zu besprechende technische Sorte.

Calcium chloratum siccum neutrale. Neutrales Calciumchlorid. Zur Füllung der Absorptionsröhren für die Bestimmung der Kohlensäure bedarf man eines getrockneten Calciumchlorids, welches frei ist von basischem Calciumchlorid. Man gewinnt dasselbe, indem man das Gefäss, in welchem sich das Calciumchlorid befindet, entweder a) mit feuchter Kohlensäure oder b) mit trockener, gasförmiger Salzsäure füllt, das betr. Gas etwa 12 Stunden im verschlossenen Gefässe einwirken lässt und alsdann durch mehrstündiges Durchleiten von getrockneter Luft den Ueberschuss des betreffenden Säuregases wieder entfernt.

Die geeignetsten Absorptionsröhren sind langschenkeltige, die man nach dem Füllen (mit Calciumchlorid oder einem anderen Medium) durch Abschmelzen verschliesst.

Calcium chloratum siccum technicum. Wird in den chemischen Fabriken durch Eindampfen der mehr oder weniger reinen, neutralen Chlorcalciumlauge in eisernen Kesseln erhalten. Im pharmaceutischen oder chemischen Laboratorium verarbeitet man bisweilen die abgebrauchten Füllungen der Kohlensäureapparate auf dieses Salz. — Es ist meist durch etwas Ferroxychlorid oder Eisenoxyd verunreinigt, daher gelblich gefärbt. Indessen schadet das seiner Verwendung als Trocknungsmittel nicht. Die Selbstbereitung dieses Salzes, welches zu sehr niedrigem Preise im Handel zu haben ist, bietet materiell keinen Vortheil.

III Calcium chloratum fusum. Geschmolzenes Calciumchlorid. Wasserfreies Chlorcalcium. Calcii Chloridum (U-St.) CaCl_2 Mol. Gew. = 111.

Darstellung. Krystallhartes Calciumchlorid oder die im Sandbade eingetrocknete Lösung des Calciumchlorids (s. S. 556) wird in einer porcellanen Schale bis auf circa 200°C erhitzt und bei dieser Temperatur unter Umrühren eine Stunde erhalten. Die erkaltete Salzmasse wird alsdann in einen Hessischen Tiegel gegeben und nach Auflegen eines Deckels bei allmählich verstärktem Kohlenfeuer bis zur Dunkelrothgluth oder soweit erhitzt, bis das Salz eine wie dickes Oel fliessende Masse darstellt. Diese wird auf eine eiserne oder marmorne Platte ausgegossen, nach dem Erkalten sofort in Stücke zerbrochen,

welche in dicht zu verschliessende Glasgefässe eingeschichtet an einem trocknen Orte auf bewahrt werden Die Korkstopfen sind zweckmassig mit Paraffin auszugriessen

Das unreine geschmolzene Calciumchlorid wird in der Weise dargestellt, dass man eine neutrale salzsaure Lösung des weissen Marmors in einem gusseisernen Kessel eindampft und zuletzt bis zur dunklen Rothgluth erhitzt, es eine Viertelstunde in dieser Temperatur erhalt und nun auf Eisenplatten ausgiesst etc

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige, krystallinische Massen, welche aus der Luft Wasser anziehen, zunächst undurchsichtig werden, später zerfliessen Sie lösen sich unter Selbsterwärmung in 1,5 Th Wasser, auch in 8 Th kaltem oder 1,5 Th siedendem Alkohol (von 90 Proc), in Aether, Fetten und ätherischen Oelen, Chloroform, Kohlenwasserstoffen u dgl sind sie unlöslich Die wässrige Lösung reagirt wegen eines geringen Gehaltes von basischem Calciumchlorid in der Regel schwach alkalisch

Geschmolzenes Calciumchlorid verbindet sich mit Methylalkohol und Aethylalkohol zu den krystallisirenden Verbindungen $\text{CaCl}_2 + 4\text{CH}_3\text{OH}$ bez $\text{CaCl}_2 + 4\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, es kann also nicht mit Vortheil zum Entwässern dieser Alkohole, wohl aber zur Abscheidung dieser Alkohole benutzt werden — Mit Ammoniakgas bildet es die Verbindung $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{NH}_3$, aus diesem Grunde kann es auch nicht zum Trocknen von Ammoniakgas verwendet werden

Anwendung. Das geschmolzene Calciumchlorid dient namentlich zum Trocknen von Flüssigkeiten, z B Aethern, Saure-Aethern, ätherischen Oelen, Kohlenwasserstoffen u dgl Zu diesem Zwecke trägt man es in bohnergrossen Stücken in die betreffenden Flüssigkeiten ein, lässt die Mischung unter häufigem Umschütteln 12—24 Stunden stehen Hierauf giesst man die entwässerte Flüssigkeit ab und behandelt sie entweder mit neuen Mengen geschmolzenem Calciumchlorid oder man destillirt sie ab

Balneum Balaruense artificiale
Bain de Balarue.

Rp	Calci chlorati cryst. crud.	500,0
	Magnesi chlorati	200,0
	Natrii chlorati crud.	2000,0
	Kali bromati	10,0
	Natrii sulfurici crystallisati	500,0
	Aquae calidae	800 l

Inter agitationem immisce

Natrii bicarbonici pulverati 600,0

Liquor antiscrophulosus NIEMANN.

Rp.	Calci chlorati	8,0
	Tincturae Calami	37,0

20—40 Tropfen mit Zuckerwasser drei- bis viermal täglich.

Liquor Calci chlorati RADEMACHER.

Liquor Calcarii muriaticae RADEMACHER.
(Ergänz.)

Rp.	Calci chlorati sicc. ($\text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$)	20,0
	Aquae destillatae	40,0
D S	15—30 Tropfen dreistündlich (bei chronischen Magenleiden mit Erbrechen und Atrophie)	

Mixtura antihæctica BENDORA

Rp	Calci chlorati cryst.	3,0
	Extracti Hyoscyami	0,5
	Aquae destillatae	150,0
	Sirupi Liquiritiae	25,0

Viermal täglich einen Esslöffel (bei skrophulöser Lungenschwindsucht)

Pastilli ferro calcarei

Dragées de Pougues

Rp	Calci chlorati	100,0
	Magnesi chlorati	20,0
	Ferri chlorati	10,0

Solutis in
Aquae communis 2000,0

admisce Natrii carbonici crystallisati 200,0

soluta in
Aquae communis 1000,0

Sedimentum exortum collige in colatorio linteo,
exprime et cum

	Natrii bicarbonici	100,0
	Tragacanthae	1,0

in pastillos ducentos rediga.

Pasta Calci chlorati cum Pice URNA

Rp	Zinci oxydati	4,0
	Olei cadini	4,0
	Terrae siliceae	8,0
	Calci chlorati fusi	2,0
	Aquae destillatae	20,0
	Vasellini flavi	26,0

Annihilator. Apparat zum Löschen kleiner Brände Eine Handdruckspritze mit Calciumchlorid-Lösung gefüllt

Calcium hypophosphorum.

† Calcium hypophosphorum (Erganzb Helv) Calci Hyposphosphis (Brit U St)
Hypophosphite de chaux (Gall) Calcium subphosphorum. Calcium hypophosphit
Unterphosphorigsaures Calcium. $\text{Ca}(\text{PO}_2\text{H}_2)_2$. Mol Gew. = 170.

Darstellung 100 Th frisch bereitetes Kalkhydrat und circa 250 Th destilliertes Wasser werden in einem steinzeugnen Topfe gemischt, dann mit 40 Th Phosphor, welcher in einer Flasche unter Wasser geschmolzen und durch Schütteln granuliert worden ist, versetzt und unter häufigem Umrühren und Ersatz des etwa verdampften Wassers eine Woche hindurch oder so lange digerirt, bis die Entwicklung des entzündlichen Phosphorwasserstoffs beim Umrühren nicht mehr stattfindet. Nach Zusatz von 300 Th heissem destillirtem Wasser wird durch Leinwand kohrt und das im Kolatorium Verblebene mit etwas heissem destillirtem Wasser nachgewaschen. In die Kolatur wird nun Kohlensäure eingeletet, so lange durch diese eine Abscheidung von Calciumkarbonat erfolgt. Dann wird filtrirt und das Filtrat in der Wärme des Wasserbades (nicht über freiem Feuer) unter beständigem Umrühren zur Trockne eingedampft (Ausbeute ca 35 Th) oder nur concentrirt und durch Beiseitstellen in Krystalle gebracht (Ausbeute 30 Th). Die Krystalle werden durch Drücken zwischen Fliesspapier getrocknet.

Eigenschaften. Farblose, luftbeständige, säulenförmige Krystalle von Perlmutterglanz, oder ein weisses krystallinisches Pulver, geruchlos, von widerlich bitterem und zugleich laugenhaftem Geschmack, löslich in 6 Th Wasser von 15° C, etwas leichter löslich in siedendem Wasser, unlöslich in Alkohol und in Aether. Wird das Salz in einem trockenen Probirrohr erhitzt, so entweicht ein selbstentzündliches Gas, welches ein Gemisch von Wasserstoff und Phosphorwasserstoff ist, im Rückstande hinterbleibt ein Gemisch von Calciumpyrophosphat mit Calciummetaphosphat mit etwas rothem Phosphor. Beim Erhitzen mit Kalihydrat entweicht nur Wasserstoff.

Die wässrige Lösung ist gegen Lackmus neutral und giebt mit Ammoniumoxalat einen weissen, in Essigsäure unlöslichen Niederschlag. Wird sie schwach (!) mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, so giebt sie mit Silbernitrat einen Niederschlag, der zunächst weiss ist, sehr bald aber — unter Ausscheidung von metallischem Silber — braun bis schwarz wird. — Das Calciumhypophosphit ist ein energisches Reduktionsmittel, diese Eigenschaft tritt in folgenden Reaktionen zu Tage.

1) Aus Mercurichloridlösung wird Mercurchlorid, ja metallisches Quecksilber abgeschieden. 2) Beim schwachen Erwärmen mit Kupfersulfatlösung entsteht ein brauner Niederschlag von Kupferwasserstoff. 3) Erwärmt man die wässrige Lösung schwach mit etwas verdünnter Schwefelsäure und Ammoniummolybdat, so tritt blaue Färbung auf. 4) Die mit Schwefelsäure angesäuerte wässrige Lösung reducirt Kaliumpermanganat. Wird die Oxydation mit Kaliumpermanganat bis zur bleibenden Rothfärbung durchgeführt, so enthält die Flüssigkeit alsdann Phosphorsäure, welche durch Ammoniummolybdatlösung gefällt werden kann.

Prüfung. 1) Es löse sich in 10 Th Wasser zu einer klaren neutralen Flüssigkeit auf. Eine Trübung könnte von Calciumsulfat oder von Calciumphosphat herrühren. 2) Die wässrige Lösung werde nicht getrübt a) durch Baryumchlorid (Schwefelsäure, der Niederschlag würde in Salzsäure unlöslich sein), b) durch Bleiacetat (lösliche Phosphate). 3) Sie werde auch durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Metalle).

Gehaltsbestimmung Wird 0,1 g Calciumhypophosphit in 10 ccm Wasser gelöst, diese Lösung mit 10 ccm conc. Schwefelsäure sowie 50 ccm $\frac{1}{10}$ N Kaliumpermanganatlösung (8,16 g KMnO_4 in 1 l) gemischt und die Mischung 15 Minuten lang im Sieden erhalten, so sollen nicht mehr als 8 ccm $\frac{1}{10}$ N Oxalsäurelösung (6,3 g krystall. Oxalsäure in 1 l) zur eben eintretenden Entfärbung verbraucht werden.

Die Oxydation erfolgt nach der Gleichung $\text{Ca}(\text{PH}_2\text{O}_2)_2 + 2\text{O}_2 = \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. Jeder 1 ccm der obigen Lösung giebt 0,0008 g Sauerstoff zur Oxydation ab. Jeder 1 ccm der $\frac{1}{10}$ N Kaliumpermanganatlösung zeigt das Vorhandensein von 0,002127 g Calciumhypophosphit an.

Aufbewahrung. Vorsichtig, im gut geschlossenen Gefässe. Man hüte sich, dieses Salz mit Calciumphosphat zu verwechseln!

Anwendung. Calciumhypophosphit wirkt schon in verhältnissmässig kleinen Mengen giftig. In kleinen, medicinalen Gaben soll es den Appetit anregen und Pulsfrequenz sowie die Temperatur steigern. Längere Zeit oder in grosseren Gaben gebraucht, stört es den Appetit und erzeugt Schwindel, Ohrensausen und ähnliche Nebenerscheinungen. Es wird namentlich in England und Amerika in Gaben von 0,2–0,5 g drei- bis viermal täglich zur Hebung des allgemeinen Kräftezustandes bei Phthisis, ferner bei Scrophulosis, Chlorosis und Rachitis gegeben.

Cave. Man vermeide während des Gebrauches Säuren, saure Speisen, Kalium chloricum.

Das Präparat ist für eine Reihe von Magistralvorschriften verwendet worden (Sirupe), von denen wir im Nachstehenden die wichtigsten angeben.

Calciumhypophosphit-Sirup von GRAMMELT & Co in Paris. Calci hypophosphorosi 1,0, Aquae destillatae 30, Aquae Calcinae 6,0, Sacchari 64,0. Mit Kochenille röthlich gefärbt. [HAAGEN]

Elixir Calcii Hypophosphitis, Elixir of Calcium Hypophosphite (Nat. Form). Calci hypophosphorosi 35,0 g, Acidi citrici 4,0, Elixir aromati q s ad 1000 cem.

Emulsio Olei Jecoris cum Calcio hypophosphoroso I. Rp Olei Jecoris Aselli 71,0, Olei Menthae piperitae 0,5–1,0, Glycerini 37,0, Calci hypophosphorosi, Natru hypophosphorosi aa 1,0, Gummi arabici 80,0, Aquae destillatae 168,0 II. Rp Aquae Calcinae 250,0, Saccharum 0,2, Spiritus q s, Calci hypophosphorosi 30,0, Natru hypophosphorosi 15,0, Gelatinae 30,0, Olei Jecoris Aselli 250,0, Olei Amygdalarum amararum aetheri gtt 5, Olei Anisi gtt 15.

FRILLOW'S Syrup of Hypophosphites Amerikanische Specialität. Ferni phosphorosi sublimi 1,0, Natru hypophosphorosi 8,0, Chinini sulfurei 0,06, Strychnini 0,08, Mangan hypophosphorosi 1,0, Sirupi Sacchari q s ad 1/2 Liter.

Sirupus Calcii hypophosphorosi, **Calciumhypophosphit-Sirup**. A. Ergänzb. Calci hypophosphorosi 1,0, Sacchari pulveris 64,0, Aquae destillatae 30,0, Aquae Calcinae 6,0. Durch Erwärmen auf 40–50° C zum Sirup zu verarbeiten. Die namliche Vorschrift enthalten auch die Hamburg. Vorschr.

B. Gall. Calci hypophosphorosi 5,0, Sirupi Auranti florum 50,0, Sirupi Sacchari concentrati (spec. Gew. 1,32) 445,0.

C. Nat. form. Sirupus Calci Hypophosphitis. Calci hypophosphorosi 35,0 g, Acidi citrici 1,5 g, Sacchari 775,0 g, Aquae q s ad 1 Liter.

Sirupus Calcii et Sodii Hypophosphitum (Nat. form). Calci hypophosphorosi, Natru hypophosphorosi aa 35,0 g, Acidi citrici 1,5 g, Sacchari 775,0 g, Aquae q s ad 1 Liter.

Sirupus Calcii hypophosphorosi ferratus, **Kalksensirup** (Ergänzb., Hamburg. Vorschr.) Sirupi Calci hypophosphorosi 2 Th, Sirupi Ferri hypophosphorosi 1 Th.

Sirupus Hypophosphitum, **Syrup of Hypophosphites** (U-St). Calci hypophosphorosi 45,0, Kalii hypophosphorosi, Natru hypophosphorosi aa 15,0, Acidi hypophosphorosi diluti (10 Proc.) 2,0, Sacchari 500,0, Spiritus Citri 5 cem, Aquae destillatae q s ad 1 Liter.

Sirupus Hypophosphitum compositus, **Compound Syrup of Hypophosphites** (Bad. Taxe, Münch. Ap. V). Calci hypophosphorosi 35,0, Kalii hypophosphorosi, Natru hypophosphorosi aa 12,0, Mangan hypophosphorosi 2,0, Ferri lactici 5,0, Chinini puri 1,0, Strychnini puri 0,06, Acidi citrici 10,0, Sacchari pulv. 600,0, Aquae destillatae q s ad 1000,0. Man löst zunächst Chinin, Strychnin und Citronensäure in wenig Wasser, dann die übrigen Salze ohne Anwendung von Wärme im Reste des Wassers. Mit der gemachten Flüssigkeit schüttelt man den Zucker bis zur Lösung, lässt gut absetzen und filtrirt. Von gelblicher Farbe.

Sirupus Hypophosphitum cum Ferro, **Syrup of Hypophosphites with iron** (U-St). Ferri lactici, Kalii citrici aa 10,0, Sirupi Hypophosphitum (U-St) q s ad 1 Liter. Die beiden Salze sind mit dem Sirup bis zur Auflösung anzureiben.

Calcium jodatum.

I. † Calcium jodatum Calcium hydrojodicum. Calciumjodid. Jodcalcium. CaJ_2 . Mol Gew. = 294 Man kann bei der Darstellung des Präparates direkt vom Jod ausgehen. Kleinere Mengen aber stellt man zweckmässig aus Calciumkarbonat und Jodwasserstoffsäure dar

Darstellung 1) 100 Th Calcium sulfurosum neutrale purum (s S 131) werden in 400 Th lauwarmem destillirten Wasser vertheilt, alsdann fügt man in kleinen Antheilen so viel Jod (etwa 158—160 Th) hinzu, als sich in der Flüssigkeit auflöst und bis die Lösung anfangt, dauernd eine gelbliche Färbung anzunehmen. Man beseitigt die gelbe Färbung durch einen gerade hinreichenden (!) Zusatz von etwas Calciumsulfidlösung, giebt zu der noch lauwarmen Lösung nach und nach 63 Th reines Calciumkarbonat hinzu und erwärmt, bis die Kohlensäure ausgetrieben ist. Nachdem die Flüssigkeit sich durch Absetzen in einer möglichst völlig gefüllten, gut verschlossenen Flasche geklärt hat, wird filtrirt und das Filtrat — am besten im luftverdünnten Raume — zur Trockne verdampft. Den Salzrückstand erhitzt man in einem Porcellan-Kasserol (s S 375) zum Schmelzen, giesst das geschmolzene Salz auf eine Marmorplatte aus und bringt es sofort (!) in gut verschlossenen Gefässen unter 2) Man neutralisirt 102,4 Th Jodwasserstoffsäure von 25 Proc HJ (oder 256 Th von 10 Proc HJ) mit 10,0 Th reinem Calciumkarbonat und bringt die filtrirte Lösung wie oben angegeben zur Trockne bezw. in die Form des geschmolzenen Salzes

Eigenschaften. Aus der concentrirten wässrigen Lösung schiesst das Salz in wasserhaltigen Nadeln an. Beim Abdampfen der Lösung zur Trockne (wobei durch die Einwirkung der Luft theilweise Zersetzung erfolgt) entsteht eine weisse zerflüssliche, schmelzbare Masse, die beim Erkalten krystallinisch erstarrt — Ein weisses (gewöhnlich gelbliches), sehr hygroskopisches krystallinisches Pulver oder solche Stücke von herbitterem Geschmack, leicht löslich in Wasser und wasserhaltigem Weingeist. Es bietet die Reaktionen der Kalkerde und der Jodwasserstoffsäure. An der Luft oder feucht werdend zersetzt es sich unter Abscheidung von Jod und dadurch gelb werdend.

Aufbewahrung. In der Reihe der starkwirkenden Arzneistoffe in kleinen dicht geschlossenen Flaschen

Anwendung Das Calciumjodid wurde als Alterans und Resolvens bei Scrophulosis mit Aufgedunsenheit der Gewebe, ausserlich zur Zertheilung von Drüsengeschwulsten empfohlen. Dosis 0,02—0,05—0,2 zwei bis dreimal täglich in wässriger Lösung. Von Vivexor wird es neuerdings als Antisyphiliticum dem Kaliumjodid vorgezogen. Es wird 1,0 dieses schwer konservirbaren Jodids durch eine Mischung von 1,15 Kaliumjodid mit einer gleichen Menge Kalkphosphat für Pillen und Pastillen vollständig ersetzt und in dieser Weise ex tempore oder auch, wie folgt, dargestellt

† Liquor Calcii jodati mit 10 Proc Calciumjodidgehalt wird durch Mischung und Lösung von 11,5 Kaliumjodid und 7,5 krystallisirtem Calciumchlorid in 81,0 destillirtem Wasser dargestellt

Sirupus Calcii jodati mit 2 Proc Calciumjodid, 23 Kaliumjodid und 1,5 krystallisirtes Calciumchlorid werden in 970 Sirupus Sacchari gelöst. Thee löffelweise. In Amerika hat man einen 9proc Calciumjodidsirup im Gebrauch

Sirupus Calcii Jodidi (Nat. Form.) Man bereitet aus 57 g Jod, sowie 28 g Eisenspulver und 185 g Wasser eine Auflösung von Ferrojodid. Diese filtrirt man in eine Flasche, welche 19 g Jod enthält, wäscht das Filter mit 60 ccm Wasser nach und wärmt bis zur Auflösung des Jods schwach (!) an. Dann erhitzt man in einer geräumigen (!) Porcellanschale 250 ccm destillirtes Wasser zum Sieden und giebt nun (von einer abgewogenen Menge von 34 g gefälltem Calciumkarbonat) abwechselnd kleine Mengen Calciumkarbonat und Ferrojodidlösung unter Umrühren und gelegentlichem Ersatz des verdampften Wassers dazu. Man erhält schliesslich kurze Zeit im Sieden, filtrirt und wäscht mit Wasser nach, bis das Filtrat im kalten Zustande 500 ccm ausmacht. In diesen 500 ccm löst man 700 g Zucker und füllt mit Zuckersirup bis zu 1000 ccm auf

II † Calcaria Jodata *Calcaria jodosa. Calcaria hypojodosa. Jodkalk*
Jodurte Kalkerde, ein dunkel braunschwarzes, nach Jod riechendes, scharf und herb schmeckendes hygroskopisches Pulver, dargestellt durch Mischung einer erwärmten Kalkmilch aus 100 Th Kalkhydrat und 350 Th destillirtem Wasser mit 310 Jod, und Eintrocknen der Mischung unter bestandigem Umrühren in der Wärme des Wasserbades. Das trockne Pulver wird noch warm in kleine Flaschen gefüllt und in der Reihe der starkwirkenden Arzneisubstanzen aufbewahrt.

Man wendet dieses höchst überflüssige Präparat in denselben Fällen und in gleicher Dosis wie das Calciumjodid an. Es ist in Deutschland nicht gebräuchlich, besteht übrigens im wesentlichen aus einer Mischung von jodsaurem Calcium $\text{Ca}(\text{JO}_3)_2$ mit Calciumjodid.

Calcium lacticum.

I. Calcium lacticum *Calciumlaktat. Lactate de chaux purifié, (Gall)*
Milchsaurer Kalk. $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2)_2 + 5\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 308.

Grosse Mengen von Calciumlaktat werden gelegentlich der Darstellung der Milchsäure als Zwischenprodukt gewonnen. Es empfiehlt sich indessen zur Bereitung kleiner Mengen des reinen Calciumlaktats nicht, von diesem Rohprodukt auszugehen. Man zieht es vor, reines Calciumkarbonat mit reiner Milchsäure zu neutralisieren.

Darstellung. In ein heisses Gemisch von 120 Th Milchsäure (25 Proc) mit 600 Th destillirtem Wasser werden 50 Th. oder soviel reines Calciumkarbonat eingetragen, als unter Kohlensäureentwicklung gelöst wird und bis ein geringer Theil Calciumkarbonat ungelöst bleibt. Die Flüssigkeit wird noch warm filtrirt und in der Kälte zur Krystallisation gebracht. Die Mutterlaugen werden durch Eindampfen concentrirt.

Eigenschaften. Warzig vereinigte Nadeln oder weisse, körnige Massen, ohne Geruch, von wenig hervortretendem Geschmack, löslich in 9,5 Th kaltem Wasser, in jedem Verhältniss in siedendem Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol, etwas löslicher in siedendem Alkohol, fast unlöslich in Aether. Bei 100°C wird das Salz wasserfrei.

Anwendung. Man giebt es, um dem Organismus Kalk in resorbirbarer Form darzubieten, bei Rhachitis, Skrophulose, zu 0,2–0,5 g mehrmals täglich, meist mit Calciumkarbonat, Calciumphosphat oder Ferrolaktat kombinirt. Am häufigsten aber in der Form des *Sirupus Calci lacto-phosphorici*.

II Calcium lacto-phosphoricum *Milchphosphorsaures Calcium. Phosphormilchsäures Calcium. Calcium phosphorico lacteum.* Ob das im Nachstehenden zu beschreibende Präparat in der That eine chemische Verbindung oder nur eine Mischung ist, muss dahingestellt bleiben.

Man löst in einer Porcellanschale 15 Th reines gefälltes Calciumkarbonat in einer Mischung von 96 Th Milchsäure (75 Proc) und 150 Th Wasser auf, filtrirt wenn nöthig, mischt darunter 39,2 Th. Phosphorsäure (25 Proc) und trocknet die Mischung in der mit Papier überdrehten Schale an einem warmen Orte (nicht im Wasserbade!) oder im Schwefelsäure-Vakuum-Exsiccator aus. Wenn der Rückstand trocken geworden ist, wird er zu einem groben Pulver zerrieben und dieses gut gemischt.

Weisses Salzpulver, in etwa 30 Th kaltem Wasser langsam aber vollständig löslich, von saurer Reaktion und saurem Geschmack. Es ist hygroskopisch!

Elixir Calcii Lactophosphatis (Nat. Form.) *Calci lactici* 17,5 g, *Acidi phosphorici* (85 Proc) 8 cem, *Aquae* 60,0 g, *Sirupi Sacchari* 60 cem, *Elixir aromatici* (U-St) q s ad 1 Liter.

Lactophosphate de chaux en solution (Gall.) *Calci phosphorici* 17,0, *Acidi lactici* (75 Proc) 19,0, *Aquae* 964,0. Man reibt das Calciumphosphat mit etwas Wasser an, fügt die Milchsäure hinzu und filtrirt nach erfolgter Auflösung.

Sirupus Calcii lacto-phosphorici cum Ferro et Mangano. *Kalk-Eisen-Mangan Sirup* (Bad. Taxe, Hamburg. Vorschr.) *Calci lactici phosphorici* 20,0,

Ferni lactici 5,0, Mangani lactici 1,0, Aquae destillatae 74,0 Die filtrirte Lösung wird mit Sacchari 600,0 und Aquae destillatae 800,0 sowie Olei Citri gtt 2 zum Sirup gekocht.

Sirupus Calci phospho lactici. Calciumphosphat-Laktatsirup I (Ergänzb., Hamburg Vorschr.) Calci carbonici 2,5, Aquae destillatae 80,0, Acidi lactici (75 Proc) 6,0, Acidi phosphorici (25 Proc) 5,5 Diese Lösung filtrirt man in Sirupi simplicis 200,0 und wäscht mit Wasser bis zum Gesamtgewicht 250,0 nach Enthalt etwa 5 Proc Calciumphospholaktat II. Bad Taxe Calci lacto phosphorici 20,0, Aquae 80,0 Das Filtrat mit Sacchari (blaufrei) 600,0, Aquae destillatae 800,0, Olei Citri guttas II zum Sirup erwärmen III U-St Calci carbonici 25,0, Aquae 100,0 g, Acidi lactici (75 Proc) 60 cem, Acidi phosphorici (85 Proc = 1,71 spec Gew) 86,0 cem, Aquae florum Auranti 25,0 g, Sacchari 700,0 g, Aquae destillatae q s ad 1 Liter

Sirupus Ferro-Calci lactophosphorici Ferri sulfurici crystallisati 5,56, Calci phosphorici 14,68, Acidi lactici (75 Proc) 20,0, Aquae q s ad 350,0, Sacchari (blaufrei) 650,0, Olei Neroli gtt $\frac{1}{4}$ Fiat Sirupus

Nat Form Sirupus Calci Lactophosphatis cum Ferro Ferri lactici, Kali citrici aa 8,5 g, Aquae 60,0 g, Sirupi Calci phospho lactici q s ad 1 Liter

Vin de Vial. Calci lacto phosphorici 10,0, Ferri citrici ammoniaci 3,0, Extract Carnis 8,0, Extracti Chinae 10,0, Vini Xerensis, Vini Malacensis aa 250,0

Calcium phosphoricum.

Die dreibasische Phosphorsäure PO_4H_3 bildet mit der Kalkerde drei verschiedene Salze, deren Benennung, weil sie nach verschiedenen, auch zeitlich auseinander liegenden Grundsätzen erfolgte, ziemlich verworren ist Wir werden uns daher erst über die Nomenclatur zu einigen haben

I	II	III
$(\text{PO}_4\text{H}_2)_2\text{Ca}$	$\text{PO}_4\text{H Ca}$	$(\text{PO}_4)_2\text{Ca}_3$
Primäres Calciumphosphat	Sekundäres Calciumphosphat	Tertiäres Calciumphosphat
Monocalcium phosphat	Dicalcium phosphat	Tricalcium phosphat
Saures Calciumphosphat	Neutrales Calciumphosphat	Basisches Calciumphosphat

Von diesen drei Salzen ist das unter II aufgeführte, sekundäre Calciumphosphat dasjenige, welches in der Therapie und Pharmacie gewöhnlich unter dem Namen „Calciumphosphat“ verstanden wird

I Calcium phosphoricum acidum Saures Calciumphosphat. Einbasisches Calciumphosphat Primäres Calciumphosphat. Monocalciumphosphat Phosphate monocalcique (Gall) $(\text{PO}_4\text{H}_2)_2\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew = 270.

Darstellung Man vertheilt 600,0 gepulverte Knochenasche in 1200,0 Wasser und giesst allmählich unter Umrühren 500,0 cone Schwefelsäure hinzu Unter Freiwerden von Kohlensäure tritt Selbsterwärmung der Flüssigkeit ein, schliesslich wandelt sie sich in einen steifen Krystallbrei um Wenn dies der Fall ist, ruht man soviel Wasser dazu, dass ein dünner Brei entsteht und lässt 24 Stunden unter gelegentlichem Umrühren stehen Nach dieser Zeit verdünnt man mit siedendem Wasser, seht die Flüssigkeit durch und zieht den Rückstand noch zweimal mit siedendem Wasser aus Die durch Absetzenlassen geklärten Kolaturen dampft man zum dünnen Sirup ein Nachdem durch mehrstädtiges Stehen an einem kalten Orte das Calciumsulfat völlig abgeschieden ist, filtrirt man die sirupöse Flüssigkeit, dampft sie zum dicken Sirup ab und überlässt diesen an einem warmen Orte der freiwilligen Verdunstung, worauf das obige Salz auskrystallisirt

Eigenschaften. Farblose, perlmutterglänzende Blattchen, in viel Wasser ohne Zersetzung löslich, hygroskopisch Die wässrige Lösung reagirt sauer und giebt mit Silbernitrat einen gelben Niederschlag von Silberphosphat, PO_4Ag_3 Das Salz wird bei 100°C wasserfrei und geht bei Glühtemperatur unter Abgabe von Wasser in Calciummetaphosphat $(\text{PO}_3)_2\text{Ca}$ über, welches beim Befeuhen mit Silbernitrat sich nicht gelb färbt (Unterschied vom tertiären Calciumphosphat) — Das Salz findet keine arzneiliche Verwendung, ist aber gelegentlich Bestandtheil künstlicher Blumen- und Gartendünger Es ist auch in den

„Superphosphaten“ enthalten Ausserdem ist es ein Bestandtheil mancher Backpulver, in denen es das Kaliumbitartrat ersetzt

II Calcium phosphoricum (neutrale) (Austr Germ Hely) **Phosphate bicalcique** (Gall.) **Dicalciumphosphat** Sekundäres Calciumphosphat **Zweibasisches Calciumphosphat**. **Phosphorsaurer Kalk** (gewöhnlicher) $\text{CaPO}_4\text{H} + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew = 172. Das zum therapeutischen Gebrauche bestimmte Calciumphosphat ist durch Fällung von Calciumsalzlösungen mit Natriumphosphat zu bereiten Das aus Knochenasche dargestellte Calciumphosphat enthält immer Schwefelsäure und ist vom Arzneigebrauche ausgeschlossen

Hierzu ist zu bemerken, dass die Gall das Salz ohne Krystallwasser aufführt Die Darstellung erfolgt nach allen genannten Pharmacopoen durch Fällung neutraler oder ausserst schwach saurer Lösungen von Calciumchlorid mit Dinatriumphosphat Die in den Vorschriften vorhandenen Abweichungen sind nur unwesentliche

Darstellung. (Germ) Man übergiesst 20 Th weissen Marmor mit einer Mischung aus 50 Th reiner Salzsäure (25 Proc) und 50 Th Wasser Wenn in der Kälte eine weitere Einwirkung nicht mehr erfolgt, führt man die Auflösung durch massiges Erwärmen zu Ende, lässt absetzen und giesst die Flüssigkeit von dem etwa nicht gelosten Marmor Rest ab Alsdann vermischt man sie mit soviel frisch bereitetem Chlorwasser, dass sie stark (!) darnach riecht und lässt sie wohlverschlossen 12 Stunden im Dunkeln stehen Nach dieser Zeit muss noch deutlicher Geruch nach Chlor wahrzunehmen sein, sonst müsste eine neue Menge Chlorwasser zugefügt werden Hierauf erwärmt man auf 50–60° C, setzt Kalkmilch, welche aus 1 Th oder soviel Kalk bereitet ist, dass die Flüssigkeit alkalisch reagirt und etwas Kalkhydrat im Ueberschuss verbleibt, hinzu, erwärmt $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$ Stunde auf 70–80° C und filtrirt (von Eisenhydroxyd und Calciumhydroxyd) ab — Das Filtrat säuert man durch Zufügung von 1 Th Phosphorsäure (25 Proc) an Nach dem Erkalten fugt man ihm unter Umrühren eine filtrirte und auf 25–30° C erkaltete Lösung von 61 Th krystallisirtem Natriumphosphat in 300 Th Wasser hinzu und rührt so lange, bis der Niederschlag krystallinisch geworden ist Dann lässt man ihn absetzen, giesst die überstehende Flüssigkeit ab, sammelt den Niederschlag auf einem Filter, wäscht ihn erst mit gewöhnlichem und schliesslich mit destillirtem Wasser aus, bis das Filtrat nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nicht mehr getrübt wird — Dann presst man den Niederschlag mässig ab, trocknet ihn bei massiger Wärme, pulvert ihn und schlägt ihn durch ein Sieb —

An Stelle der salzsauren Lösung von 100 Th weissem Marmor kann man auch eine Lösung von 220 Th krystallisirtem Calciumchlorid oder 110 geschmolzenem Calciumchlorid anwenden.

Eigenschaften. Ein rein weisses, zartes, krystallinisches, geruch und geschmackloses, in Wasser beinahe unlösliches, ohne Aufbrausen in Essigsäure, Chlorwasserstoffsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure leicht lösliches Pulver In Kohlensäure enthaltendem Wasser, auch in Natriumchlorid und Ammoniumsalzlösungen ist es etwas löslich Es enthält verschiedene Mengen Krystallwasser, je nach der Wärme, bei welcher die Fällung geschah, und der Länge der Zeit, in welcher der Niederschlag in der Fällungsflüssigkeit verblieb Die chemische Zusammensetzung des nach der Germ bereiteten Präparates entspricht der Formel $\text{CaHPO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Die mit Hilfe von Salpetersäure bereitete wässrige Lösung (1=20) bleibt auf Zusatz von Ammoniumoxalat klar, fugt man aber der Mischung Natriumacetat hinzu, so dass man an Stelle der freien Salpetersäure jetzt freie Essigsäure hat, so erfolgt Ausscheidung eines weissen Niederschlages von Calciumoxalat $\text{CaC}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$ — Wird die salpetersaure Auflösung mit Ammoniakflüssigkeit genau neutralisirt, so entsteht in der neutralen Lösung auf Zusatz von Silbernitratlösung ein gelber Niederschlag von Silberphosphat, Ag_3PO_4 , das sowohl in Salpetersäure als auch in Ammoniakflüssigkeit leicht löslich ist.

Wird Calciumphosphat direkt mit Silbernitratlösung befeuchtet, so färbt es sich gleichfalls gelb, wobei sich sekundäres Silber(ortho)phosphat Ag_3HPO_4 bildet, welches gelbe Färbung besitzt $\text{CaHPO}_4 + 2\text{AgNO}_3 = \text{Ca(NO}_3)_2 + \text{Ag}_3\text{HPO}_4$.

Wurde das Salz jedoch vorher stark gegluht, so färbt es sich mit Silbernitratlösung nicht mehr gelb, da es alsdann unter Wasserverlust $2\text{CaHPO}_4 = \text{H}_2\text{O} + \text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$ in Calciumpyrophosphat übergegangen ist, welches sich mit Silbernitratlösung zu weissem Silberpyrophosphat $\text{P}_2\text{O}_7\text{Ag}_4$ umsetzt.

Unter dem Mikroskop zeigt das Calciumphosphat säulen- oder tafelförmige Krystalle, deren Flächen und Kanten etwas verwittert sind.

Prüfung Die möglichen Verunreinigungen bestehen in Arsen, Sulfaten, Chloriden und Metallen. Ausserdem ist auf den richtigen Wassergehalt zu prüfen. 1) Wird 1 g Calciumphosphat mit 3 ccm Stannochloridlösung geschüttelt, so darf im Verlaufe einer Stunde braune Färbung nicht auftreten (Arsen, welches mutmasslich dem Natriumphosphat entstammen würde). — 2) Wird Calciumphosphat mit 20 ccm Wasser geschüttelt, so darf das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat durch Baryumnitratlösung nicht verändert werden. Eine Trübung würde Schwefelsäure bzw. Calciumsulfat anzeigen. Das Ansäuern mit Essigsäure hat den Zweck, das Ausfallen von Baryumphosphat zu verhindern. Die Anwesenheit von Schwefelsäure könnte davon herrühren, dass das verwendete Natriumphosphat aus Knochenasche hergestellt wurde. — 3) Man bereite eine Auflösung von 1 g Calciumphosphat in etwa 6 ccm Salpetersäure und 13 ccm Wasser. Ein Theil dieser, freie Salpetersäure enthaltenden Lösung darf durch Silbernitratlösung nach 2 Minuten nur opalisierend getrübt werden. Eine starke weissliche Trübung zeigt einen unzulässig hohen Gehalt an Chloriden an. — Ein anderer Theil der salpetersauren Lösung muss mit Ammoniak einen rein weissen Niederschlag von tertiärem Calciumphosphat geben, das durch Zugabe von Schwefelwasserstoff nicht dunkel gefärbt werden darf (Metalle, z. B. Kupfer, Blei, Eisen). 4) 1 g Calciumphosphat darf beim Glühen bis zum gleichbleibenden Gewichte nicht mehr als 0,25–0,26 g Wasser verlieren. Nach der Formel $\text{CaPO}_4\text{H} + 2\text{H}_2\text{O}$ ergibt sich rechnerisch ein Gewichtsverlust von 0,2616 g.

Anwendung. In physiologischer Beziehung ist das phosphorsaure Calcium ein nothwendiges Material zum Aufbau des thierischen Knochengerüsts und unerlässlich bei der Zellenbildung. Obgleich man den grössten Theil des eingeführten Phosphats in den Faeces wiederfindet, so hat sich dennoch sein Gebrauch bei Knochenerweichung, Rachitis, Knochenfrakturen, bei Oxalurie mit Diarrhoe, skrophulösen Leiden, Geschwüren, Diarrhoe der Kinder in der Zahnungsperiode, allein oder mit tonischen Mitteln (besonders Eisenoxyd), in Gaben von 0,5–1,0–2,0 g heilsam erwiesen.

III Calcium phosphoricum basicum Phosphate tricalcique (Gall.) Calcii Phosphas (Brit.) Calcii Phosphas praecipitatus (U-St.) Tricalciumphosphat. Tertiäres Calciumphosphat. Dreibasisches Calciumphosphat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Mol. Gew. = 310.

Darstellung Man geht entweder von der Knochenasche aus oder man fällt die neutrale oder schwach alkalische Lösung eines tertiären Phosphats mit Calciumchlorid.

A. Man rührt 500 Th gepulverte Knochenasche mit Wasser zu einem Brei an, fugt in mehreren Antheilen 1100 Th Salzsäure (25 Proc.) hinzu, rührt um und überlässt das Ganze an einem warmen Orte unter gelegentlichem Umrühren 5–7 Tage oder so lange sich selbst, bis die Säure nicht mehr auflösend wirkt. Alsdann verdünnt man mit 5000 bis 6000 Th Wasser, lässt absetzen und filtrirt. Zu dem Filtrat giebt man unter Umrühren so viel Ammoniak, dass die Flüssigkeit schwach alkalische Reaction hat, wodurch ein weisser Niederschlag entsteht. Man erhitzt und hält die Flüssigkeit 1 Minute lang im Sieden, lässt absetzen, dekanthirt die klare Flüssigkeit, sammelt den Niederschlag, wäscht ihn mit warmem Wasser bis zur Chlorfreiheit aus, giesst ab und trocknet ihn. **B.** Zu der aus 100 Th Marmor erhaltenen Auflösung von Calciumchlorid (oder an deren Stelle zu einer Lösung von 220 Th krystallisiertem Calciumchlorid oder 110 Th geschmolzenem Calciumchlorid in 600 Th Wasser) wie sie bei der Darstellung des sekundären Calciumphosphats beschrieben ist, fugt man unter Umrühren eine Auflösung von 360 Th krystall-

surtem Natriumphosphat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 + 12 \text{ Aqua}$) in 1800 Th Wasser, die mit 170 Th Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc) versetzt ist. Der entstandene Niederschlag wird entweder nach kurzem Erwärmen oder nach längerem Absetzen gesammelt, gewaschen, im übrigen wie unter A weiter verarbeitet.

Eigenschaften. Weisses amorphes, luftbeständiges Pulver ohne Geruch und Geschmack. Unlöslich in kaltem Wasser, von siedendem Wasser wird es allmählich zersetzt, indem sich ein unlösliches basisches Salz bildet und ein lösliches saures Salz in Lösung geht. Nur im frischgefallenen Zustande löslich in Essigsäure. Dagegen ist es bedingungslos löslich in Salzsäure oder Salpetersäure. Auch von kohlensäurehaltigem Wasser wird es merklich gelöst. Durch Glühen wird es nicht verändert. Daher nimmt es beim Befeuchten mit Silbernitratlösung — gleichgültig ob es vorher gegläht wurde oder nicht — gelbe Färbung an (Unterschied von dem primären und sekundären Calciumphosphat).

Da der Niederschlag sehr voluminos ist und sich deshalb nur schwer auswaschen lässt, so enthält das Präparat stets einen geringen Chlorgehalt. Will man ein chlorefreies Calciumphosphat erzielen, so nimmt man an Stelle einer Calciumchloridlösung eine solche von Calciumnitrat. Das aus Knochenasche gewonnene ist stets durch etwas Magnesiumphosphat verunreinigt.

Prüfung. Man schüttelt 2 g des Salzes mit 20 cem Wasser an und giebt tropfenweise Salpetersäure bis zur Auflösung hinzu. Aus dieser Lösung wird das Calciumphosphat durch Zusatz von Ammoniak unverändert gefällt. Durch schwaches Erwärmen mit Ammoniummolybdätnatlösung entsteht ein gelber Niederschlag.

1) In der salpetersauren Lösung erzeuge Silbernitrat nur eine opalisierende Trübung (Begrenzung des Chlorgehalts). 2) Löst man in 5 cem der salpetersauren Lösung 0,5 g Natriumacetat auf, und fällt den Kalk durch Ammoniumoxalat im Ueberschuss aus, so darf durch Zugabe von überschüssigem Ammoniak nur eine leichte Trübung (Magnesia) entstehen. 3) Die Lösung von 1 g des Salzes in 1 g Salzsäure und 20 cem Wasser werde weder in der Kälte noch in der Wärme durch Schwefelwasserstoff verändert (Metalle, namentlich Arsen, Blei, Kupfer).

Anwendung und Aufbewahrung wie die vorigen.

IV Calcium phosphoricum crudum (Ergänz.) *Os calcinés* (Gall.) **Knochenasche.** *Beinasche.* *Bone ash.* *Ossa usta alba.* *Os ustum.* *Cornus Cervi ustum.* *Magisterium Cornu Cervi.* *Cranium humanum philosophice praeparatum.* *Ebur ustum album.* Gebranntes Hirschhorn. Weiss gebranntes Elfenbein. Die aufgeführten Namen sind Benennungen für Knochenasche. Die Gepflogenheit, die Knochenasche durch *Conchae praeparatae* zu ersetzen, ist durchaus verwerflich, wenn überhaupt eine Substitution in Frage kommen sollte, so konnte diese nur durch basisches Calciumphosphat (sub III) oder durch das Dicalciumphosphat (sub II) erfolgen. Am besten aber giebt man eben die wirkliche Knochenasche ab.

Darstellung. Knochen vom Rinde (auch vom Kalbe) oder Hammel werden von anhaftenden Fleischtheilen durch Abschaben befreit, mit Wasser gewaschen, getrocknet und bei Luftzutritt weiss gebrannt. Für die zum inneren medicinischen Gebrauche bestimmten Sorten nimmt man das Weissbrennen in einem mit Holzkohle erhitzten Windofen vor, für rohere Produkte kann man die Knochen auch einfach in irgend eine beliebige Feuerung eintragen. — Nach dem Weissbrennen hinterbleiben die Knochen in ihrer ursprünglichen Form, aber sie sind von etwas geringerem Volumen als vorher, von kreidigem Aussehen und von niedrigem specifischen Gewichte. Die weiss gebrannten Knochen werden durch mechanisches Auslesen von etwa vorhandenen kohligen Stellen befreit, alsdann in ein feines Pulver verwandelt.

Eigenschaften. Ein weisses oder grauweisses Pulver, welches in verdünnter Salzsäure unter nur geringem Aufbrausen fast völlig klar löslich ist, diese Lösung giebt beim Uebersättigen mit Ammoniakflüssigkeit einen voluminösen, weissen Niederschlag. Wird Knochenasche mit Silbernitratlösung befeuchtet, so färbt sie sich allmählich gelb.

Im übrigen giebt sie alle Reaktionen, welche für das tertiäre Calciumphosphat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ schon mitgetheilt worden sind

Der Hauptbestandtheil der Knochenasche ist das tertiäre Calciumphosphat, daneben enthält sie noch Magnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Fluor und Chlor an Calcium gebunden ZALESKY fand z B in 1000 Th der Knochenasche vom Ochsen

Calciumphosphat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	860,9 Th	Kohlensäure (CO_2)	62,0 Th
Magnesiumphosphat $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$	10,2 "	Chlor	2,0 "
Calcium, an CO_2 , Fl u Cl gebunden	78,6 "	Fluor	3,0 "

Die Zusammensetzung der Knochenasche schwankt natürlich bei den einzelnen Thierarten Aber sie ist auch bei der namlichen Art bei den einzelnen Individuen etwas verschieden Ausserdem ist auch bei den namlichen Individuen die Zusammensetzung der einzelnen Knochen nicht die ganz gleiche Indessen bewegen sich die Schwankungen doch nur innerhalb geringer Grenzen

Anwendung Namentlich in Frankreich, England und Amerika als ein die Knochenbildung unterstützendes Mittel, etwa wie bei uns das sekundäre Calciumphosphat, ferner als Antiepilepticum, gegen incontinentia urinae etc In der Volksmedizin, auch der Gebildeten, spielt die Knochenasche bestimmter Thiere noch eine bedeutende Rolle Der Apotheker wird immer gut thun, diese Drogen originalter zu besorgen und sich nicht auf Substitutionen einzulassen

Werbhbestimmung des Knochenmehls A. Stickstoff 10,0 g einer möglichst sorgfältig durchmischten Probe werden in einem 500 ccm-Rundkolben mit 9 Tropfen Quecksilber und 55 ccm reiner konc stickstofffreier Schwefelsäure übergossen und — zunächst bei kleiner Flamme — so lange erhitzt („Jeldahlart“ s unter Nitrogenum), bis die Masse weiss geworden ist Tritt zu starkes Schäumen ein, so setzt man ein linsengrosses Stückchen Paraffin zu — Nach dem Abkühlen fugt man etwa 10 ccm konc Natriumchloridlösung hinzu und füllt bei 15°C bis zur Marke auf

50 ccm des klaren Filtrates (= 1 g Substanz) werden mit einer hinreichenden Menge Schwefelnatriumlösung, etwas Zink und 40 ccm Natronhydratlösung (von 30 Proc NaOH) destillirt unter Vorlegen von 20 ccm $\frac{n}{3}$ Schwefelsäure Ueber die Einzelheiten der Bestimmung siehe KJELDHAL'S Stickstoffbestimmung unter Nitrogenum

B Phosphorsäure In weiteren 50 ccm des klaren Filtrates (= 1 g Substanz) wird die Phosphorsäure nach der Citrat-Methode bestimmt, indem man 100 ccm Citratlösung zugeht, mit 25 ccm Magnesiälösung, welche tropfenweise unter Umrühren zugeben werden, fällt, 5 Minuten lang umrührt, und nach dreistündigem Stehen die phosphorsäure Ammoniakmagnesia abfiltrirt und nach S 91 weiter verarbeitet Die Citrat-Methode gestattet die direkte Bestimmung der Phosphorsäure, ohne vorherige Abscheidung als molybdänposphorsäures Ammonium (s S 92) bei Gegenwart von Kalk und Eisenverbindungen, welche durch das Ammoniumcitrat in Lösung gehalten werden

Citratlösung 110,0 g kryst Citronensäure mit 400 g Ammoniakflüssigkeit von 0,91 spec Gewicht und der nöthigen Menge Wasser gelöst und zu 1 Liter aufgefüllt

Lecksuchtpulver Rimpacher Zehrpulver Ossium ustorum pulv 300,0, Saliculinaris 100,0, Radici Gentianae 200,0

Lac Calci phosphoric Lac Ossium Kalkphosphatmilch (Hamburg Vorschr) Man löst 6 Th krystall Calciumchlorid in 200 Th Wasser und mischt eine Lösung von 10 Th Natriumphosphat in 200 Th Wasser in der Kälte hinzu Der entstehende Niederschlag wird nach dem Auswaschen mit Wasser angerührt, bis das Gesamtgewicht 200 Th beträgt

Blumendünger. Engrais artificiale pour des pots à fleurs

A Ammonii nitrici 40, Ammonii phosphoric 20,0, Kali nitric 25,0, Ammonii chlorati 5,0, Calci sulfurici praecipitati 6,0, Ferri sulfurici oxydulati ammoniacati 4,0 Die groben Pulver werden gemischt 4 g der Mischung werden in 1 l Wasser gelöst Diese Menge genügt zum Begiessen von 12 mittleren Blumentöpfen und ist 1—2mal wöchentlich anzuwenden

B Kali nitric, Calci carbonici, Natrii chlorati, Calci phosphoric, Natrii silicici aa 5,0, Ferri sulfurici oxydulati ammoniacati 1,5 Gebrauch wie bei A

C KNOX'S Pflanzen-Nährsalz Calci phosphoric 10,0, Kali nitric 2,5, Kali phosphoric sicci 2,5, Magnesi sulfurici 2,5

MARAGLIANO'S Kraftpulver Calci phosphoric, Natrii chlorati, Natrii bicarbonici aa 10,0, Ferri lactici 3,0, Manganii superoxydati, Rhizomatis Calami aa 2,0

Calcaria phosphorica gelatinosa COLLAS, ist frisch gefälltes, im Filtrum gesam-
meltes, darin ausgewaschenes und noch feuchtes, also nicht ausgetrocknetes basisches Kalk
phosphat. Es enthält ca 68,6 Proc Wasser. Wird dieser Niederschlag in der genügenden
Menge reiner Salzsäure gelöst, so erhält man den

Liquor Calcii muratici phosphorici CORREX, von welchem täglich 1—2 Thee-
löffel voll in einer Mischung von Wein mit Wasser genommen werden.

Sirupus Calcii chlorhydrophosphatis (Nat Form) Calcii phosphorici 17,5 g,
Aqua 80,0 g, Acidi hydrochlorici (25 Proc) q s ad solutionem (ca 10,0 g), Essentiae Citri
20,0 g, Sirupi Sacchari q s ad 1 Liter.

Sirup de lactophosphate de chaux (Gall) Calcii phosphorici 12,5, Acidi lactici
14,0, Aquae 340,0, Sacchari (blaufrei) 630,0, Essentiae Citri e cortice recente (1+2) 10,0.

Sirup de phosphate acide de chaux (Gall) Calcii phosphorici 12,5, Acidi phos-
phorici (25 Proc) 44,0, Aquae 818,0, Sacchari (blaufrei) 630,0, Essentiae Citri e cortice
recente (1+2) 10,0.

Panis cum Calcio phosphorico

Zu 1 kg fertigen Brotteiges wird ein Gemisch aus
25,0 g Calciumphosphat und 50,0 g Zucker zu-
gesetzt und daraus ein Brot gebacken.

Pulvis antatrophicus

Discut wird zu grobem Pulver zerrieben und mit
 $\frac{1}{10}$ des Gewichtes Calciumphosphat gemischt.

1 Theelöffel bis Esslöffel beim Frühstück mit Kaffee,
Milch oder Schokolade zu nehmen.

Pulvis antirachiticus

(Hamb. Vorschr., Form Berol.)

Rp	Calcii carbonici	32,0
	Calcii phosphorici	12,0
	Ferri lactici	3,0
	Sacchari Lactis	50,0

Pulvis calcareus BOUCHUT

Rp	Calcii phosphorici	5,0
	Natrii bicarbonici	10,0
	Sacchari Lactis	15,0

Rachitischen Kindern 4mal täglich eine Messer-
spitze

Sirupus Calcii phosphorici

Rp	Calcii phosphorici	10,0
	Sirupi Sacchari	80,0
	Acidi phosphorici (25%)	30,0

Unter Erwärmen zu lösen, dann zusetzen
Sirupi Sacchari 400,0

Sirupus Calcii chlorhydrophosphorici

Sirup de chlorhydrophosphate de chaux

Rp	Calcii phosphorici	12,5
	Acidi hydrochlorici (25%)	12,0
	Aquae destillatae	840,0
	Sacchari albi	630,0
	Tincturae Citri e cortice recente (1+2)	10,0

Solutio Calcii chlorhydrophosphorici

Rp	Calcii phosphorici	17,0
	Acidi hydrochlorici (25%) q s	
	ad solutionem (ca 10,0)	
	Aquae destillatae	973,0

Trochisci antatrophici

Rp	Calcii phosphorici	20,0
	Calcii carbonici	10,0
	Ferri reducti	3,0
	Massae Cacao cum Saccharo	87,0

fiant pastilli 100

Calcium sulfuratum.

Von den geschwefelten Verbindungen des Calciums haben einige entweder pharma-
ceutische oder gewerbliche Bedeutung. Es ist indessen darauf aufmerksam zu machen,
dass die Nomenklatur dieser Substanzen eine ziemlich verworrene ist, und dass mit ge-
wissen Namen nicht immer einheitliche Verbindungen, sondern zum Theil auch Mischungen
bezeichnet werden.

I. Calcium sulfuratum purum. Reines Calciumsulfid. Reines Schwefel-
calcium. CaS. Mol. Gew. = 72

Die reine Verbindung kann erhalten werden durch^{*)} Gluhen von Calciumsulfat im
Wasserstoffstrom oder durch Gluhen von Calciumoxyd im Schwefelwasserstoffstrom oder
durch Gluhen von Calciumcarbonat in einem Gemisch von Schwefelkohlenstoffdampf und
Kohlensäure.

Weisse, in Wasser unlösliche Masse, welche an feuchter Luft nach Schwefelwasser-
stoff riecht. Es hat die Eigenschaft, im Dunklen zu leuchten, wenn es vorher dem Lichte
ausgesetzt worden war. Diese reine Verbindung wird weder in den Gewerben, noch in
der Pharmacie verwendet, sie kann als Sammlungspräparat betrachtet werden.

II Calcium sulfuratum crudum. Calcium sulfuratum (Erganzb.) Calx
sulphurata (Brit. U-St.) Rohes Calciumsulfid. Rohes Schwefelcalcium. Hepar
Sulfuris calcareum. Kalk-Schwefelleber

Darstellung. A) (Brit U-St.) Man bereitet eine innige Mischung aus 70 Th entwassertem Calciumsulfat (Gips), 10 Th Holzkohlepulver und 2 Th Stärke. Diese Mischung packt man unter mässigem Druck in einen Hessischen Tiegel, bedeckt diesen mit einem Deckel und erhitzt nun 1—2 Stunden, anfangs gelinde, später starker, bis die Masse auch in ihren inneren Theilen grauweiss geworden ist. Alsdann lässt man erkalten, pulvert die Masse und bringt das Pulver sogleich in kleine, gut zu verschliessende, trockene Flaschen.



B) Ergänzb. 100 Th. fein gepulverter weisser Aetzkalk und 80 Th sublimirter Schwefel werden innig gemischt und damit ein Hessischer Tiegel unter Rütteln bis zum Rande angefüllt. Nachdem mittels Thones ein Deckel aufgeklüftet ist, setzt man den Tiegel in einen Windofen und umschüttet ihn mit Holzkohlen, so dass eine geringe Kohlschicht den Deckel bedeckt. Nun schüttet man glühende Holzkohlen auf, so dass das Kohlenfeuer langsam von oben nach unten um sich greift. Wenn das Feuer bis fast zur Sohle niedergegangen ist, schüttet man noch Kohlen auf, so dass die Glühung circa eine Stunde währt. Man lässt erkalten, nimmt den Deckel vorsichtig vom Tiegel, zerreibt die gelbröthliche Masse zu einem Pulver und bringt dieses alsbald in Glasflaschen unter.

Eigenschaften. Grauweisses oder leicht röthliches Pulver, schwach nach Schwefelwasserstoff riechend, von widerlichem, alkalischem Geschmack. An feuchter Luft wird es unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff allmählich zersetzt. Es ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch von Calciumsulfid und unverändertem Calciumsulfat mit wechselnden Mengen Kohle. Es soll nach Ergänzb. etwa 85 Proc., nach Brit. nun destens 50 Proc., nach U-St. mindestens 60 Proc. Calciumsulfid CaS enthalten. Die im Nachstehenden angegebenen Reaktionen sind diesem Gehalt an Calciumsulfid zuzuschreiben.

In kaltem Wasser ist es schwer löslich, etwas leichter in heissem Wasser. Durch siedendes Wasser wird das Calciumsulfid in Calciumhydroxyd und in Calciumsulfhydrat zersetzt: $\text{CaS} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Ca}(\text{SH})_2$. Durch verdünnte Essigsäure wird es unter Freiwerden von Schwefelwasserstoff zersetzt, das Filtrat enthält alsdann Calciumacetat und giebt deshalb mit Ammoniumoxalat einen weissen, in Salzsäure löslichen Niederschlag.

Gehaltsbestimmung. Man trägt eine bestimmte Menge Calciumsulfid allmählich in eine siedende Lösung von Kupfersulfat von bekanntem Gehalt ein, digerirt alsdann 15 Minuten lang auf dem Wasserbade und filtrirt. Das erkaltete Filtrat darf alsdann mit einigen Tropfen Kaliumferrocyanidlösung eine braune Färbung nicht geben. Es wird hierdurch in jedem Falle ein bestimmter Minimalgehalt an Calciumsulfid CaS festgestellt. Diese Prüfung gestaltet sich bei den verschiedenen Pharmakopöen wie folgt. Ergänzb. 1 g Calcium sulfuratum zu einer Lösung von 1,20 g krystall. Kupfersulfat in 50 ccm Wasser. Minimalgehalt rund 85 Proc. CaS . Brit. 1 g Calcium sulfuratum zu einer Lösung von 1,75 g krystall. Kupfersulfat in 50 ccm Wasser. Minimalgehalt = 50 Proc. CaS . U-St. 1 g Calcium sulfuratum zu einer Lösung von 2,08 g krystall. Kupfersulfat in 50 ccm Wasser. Minimalgehalt = 60 Proc. CaS .

Aufbewahrung. In dicht verkorkten kleineren Flaschen. Bei Luftzutritt verwandelt sich das Calciumsulfid unter allmählicher Entwicklung von Schwefelwasserstoff in Calciumkarbonat.

Anwendung. Innerlich hat man das Calciumsulfid zu 0,2—0,3—0,5 mehrmals täglich in denselben Fällen wie die Kalischwefelleber angewendet. Sehr starke Gabe 0,6. Aeusserlich gebrauchte man es bei Kopfgrind und anderen Hautausschlägen, Kratze, auch als Enthaarungsmittel. Zu letzterem Zwecke ist das Calciumhydrosulfid geeigneter.

III Calcium hydrosulfuratum. Calcaria hydrosulfurata. Calciumsulfhydrat. Calciumhydrosulfid. Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium. Massa depilatoria MARTINS. $\text{Ca}(\text{SH})_2 + \text{Aqua}$.

Darstellung. 100 Th. Aetzkalk werden durch Besprengen mit 50 Th. warmem Wasser in Kalkhydrat verwandelt, mit 200 Th. oder der genügenden Menge kaltem Wasser zu einem dünnen Brei angerührt und nun durch Einleiten von Schwefelwasserstoff (entwickelt aus circa 300 Th. Eisensulfid und 700 Th. verdünnter Schwefelsäure)

mit diesem Gase übersättigt, bis die breuge Flüssigkeit eine blaugraue Farbe angenommen hat

Man erhält so Flüssigkeiten, welche bis zu 7 Proc $\text{Ca}(\text{SH})_2$ enthalten. Das Calciumsulfhydrat ist nicht im trockenen Zustande, sondern lediglich in Auflösung bekannt. Wenn das Präparat als Depilatorium verwendet werden soll, so wird der entstehende Kalkbrei ohne vorherige Filtration abgegeben.

Aufbewahrung. In ganz gefüllten Glasgefässen mit Glasstopfen und mit Paraffin dicht verkittet.

Anwendung. Dieses Präparat ist ein energisches Depilatorium (von RUD. BORTRER empfohlen). Es wird in 5 mm dicker Schicht auf die mit Haaren bedeckte Haut aufgetragen und nach 10 Minuten mit einem nassen Schwamme abgewaschen. Es löst das Haar zu einer gallertartigen Masse auf. Obgleich ein vorzügliches Depilatorium, so wird es dennoch höchst selten benutzt, indem man dem Rhusma (S 400), ferner dem nachstehenden Depilatorium, neuerdings auch den mit Baryumsulfid bereiteten Depilatorien (s S 464) den Vorzug giebt.

Depilatorium. I Natrii sulfhydrati crystallisati 1,0, Calci carbones 3,0 oder II. Natrii sulfhydrati crystallisati 3,0, Calcariae ustae pulveratae, Amyli aa 10,0. Beide Präparate sind mit Wasser zu einem Brei anzurühren, welcher messerrückendick auf die zu enthaarenden Stellen aufzutragen ist.

IV Calcium oxysulfuratum Calciumoxysulfuret. Unter diesem nicht sehr zutreffenden Namen werden Präparate verstanden, welche durch Kochen von 1 Th Aetzkalk mit 2 Th Schwefel bei Gegenwart von Wasser dargestellt werden. Hierbei bilden sich nach der Gleichung $3\text{CaO} + 12\text{S} = \text{CaS}_3\text{O}_3 + 2\text{CaS}_2$ Calciumthiosulfat und Calciumpentasulfid, so dass die so entstehenden Präparate im wesentlichen diese beiden Verbindungen enthalten. Die geschilderte Reaktion wird übrigens vorzugsweise zur Herstellung der sog. VLEMINCKX'schen Lösung benutzt.

Calcium oxysulfuratum Calciumoxysulfuret Austr. Calcariae ustae (*e marmore*) 80,0 werden in Stücke zerschlagen und mit Aquae 20,0 besprengt. Zum gelochten Kalk gebe man Sulfuris sublimati 60,0 und mische gut durch. — Die Mischung ist in bestens verschlossenen Gefässen aufzubewahren.

Calcium oxysulfuratum solutum (Austr.) Solutio VLEMINCKX. 3 Th der vorstehenden Mischung (als Calcium oxysulfuratum Austr. aufgeführt) werden mit 20 Th siedendem Wasser bis zur Kolatur von 12 Th unter beständigem Umrühren eingekocht. Die Lösung ist bestens verschlossen aufzubewahren.

Liquor Calcii sulfurati (Ergänz.) Calcium sulfuratum solutum (Helv.) VLEMINCKX'sche Lösung Golden lotion. Yellow lotion. Calcariae ustae (*e marmore*) 1,0 wird mit Wasser zu Pulver gelocht, dann mit 2,0 Schwefel und 20,0 Wasser in einer Porcellanschale unter Umrühren gekocht, so dass 12,0 durchgeseichte oder klar abgegossene Flüssigkeit erhalten werden. — Gelbrothe Flüssigkeit, auf Saurezusatz Schwefelwasserstoff entwickelnd, unter Abscheidung von Schwefel. In kleinen, ganz gefüllten, gut verschlossenen Gläsern aufzubewahren. Die nämliche Vorschrift geben Helv., Hamb. Vorsch.

V. Calcium stibiato-sulfuratum. Calcium sulfurato-stibiatum. Calcaria stibiato-sulfurata. Calx Antimonii cum Sulfure (HOFFMANN). Antimonhaltige Kalkschwefelleber, kalkhaltige Spießglanzeber.

Bereitung. 90 Th gepulverter Aetzkalk und 30 Th Antimonpentasulfid (Goldschwefel) werden gemischt in ein porcellanes Gefäss gegeben, mit 150 Th Wasser übergossen und in der Wärme des Wasserbades unter bisweiligem Umrühren trocken gemacht.

Eigenschaften. Die antimonhaltige Kalkschwefelleber ist ein gelblichgraues, fast geruchloses, in heissem Wasser zum grösseren Theile mit gelblicher Farbe lösliches Pulver, welches mit verdünnter Salzsäure behandelt reichlich Schwefelwasserstoff entwickelt und einen Goldschwefelniederschlag fallen lässt.

Aufbewahrung In kleinen, völlig gefüllten Flaschen.

Anwendung Dieses im 18. Jahrhundert von HOFFMANN in Mainz als Geheimmittel vertriebene Präparat wurde bei Scrophulosis, Hautkrankheiten, Gicht, Syphilis, Unterleibsstockungen in Pulvern, Pillen, selbst in der Abkochung zu 0,1—0,2—0,3 zweier- bis viermal täglich gegeben, auch äußerlich zu Umschlägen, Waschungen, Bädern, Pflastern und Salben, selbst als Depilatorium angewendet.

Aqua Calcariae sulfurato stibiatae HOFFMANN
Aqua sulfurato-stibiata Decoctum
HOFFMANN

Rp Calcariae sulfurato stibiatae 10,0
Aqua calidae 2500,0
Ebulliendo evaporent ad 2000,0 remanentia, quae
filtrantur
D S Tassenweise mit Milch oder Fleischbrühe
mehrmals am Tage zu trinken

Decoctum Helgolandicum

Decoctum Calcariae piscinum
Rp Calcariae stibiata sulfuratae 10,0
Aquaes fervidae 2000,0
Stent per horas quadrantem, et additis
Piscis liquidae 300,0
digere saepius agitando per horas quadrantem
Tum seponere. Liqueor frigidus decantheur et in
lagnis obturatis servetur

Depilatorium Boudet

Rp Natrii hydrosulfurati 3,0
Calcariae ustae pulveratae
Amyli aa 10,0
Mit Wasser angerührt auf die mit Haaren besetzte
Haut aufzutreiben (in 3—4 Minuten ist die
Wirkung erreicht)

Emplastrum antarthriticum Helgolandicum

Emplastrum Calcariae piscinum.
Rp Calcariae stibiata sulfuratae 15,0
Cerae flavae 15,0
Pisces nigrae 55,0
Pisces liquidae 25,0

Globuli sulfurati ad balneum

Boules Barégiennes
Rp Calcii sulfurati 100,0
Natrii chlorati crudi 50,0
Natrii thio-sulfurici 30,0

Natrii carbonici crystallisati 50
Gummi arabici 10,0
Glycerini 30,0
Aquaes q s

Fiant globuli duo
Eines bis zwei Kugeln zu einem Vollbade
Nach einer französischen Vorschrift wird eine
Kugel aus 40,0 Calciumsulfid, 10,0 Kochsalz,
5,0 Seifenwurzelextrakt und der genügenden
Menge konzentrierter Lefmlösung zusammen-
gesetzt

Pilulae Calcii stibiata sulfurati HOFFMANN

Rp Calcii stibiata sulfurati
Tragacanthae pulveratae aa 2,0
Aquaes destillatae q s
Fiant pilulae sexaginta (60), Cassia cinnamomae
pulverata conspergendae D ad vitrum 8
Zweimal täglich 5 Stück (bei chronischer Metall-
vergiftung)

Pilulae Calcii sulfurati

Rp Calcii sulfurati
Argillae aa 5,0
Aquaes glycerinatae q s
Fiant pilulae centum (100), Cassia cinnamomae
pulverata conspergendae
Täglich drei- bis viermal 3—5—8 Pillen.

Pulvis antipsorionicus FICHTEL.

Rp Calcariae sulfuratae 20,0
Divide in partes aequales decem.
D ad chartam paraffinatum
S Ein Pulver mit Olivenöl angerieben zum Ein-
reiben

Unguentum antiherpeticum GIBERT

Rp Calcariae sulfuratae 20,0
Camphorae tritae 1,0
Adipis suilli 30,0
M D S Zum Einreiben (bei Herpes)

Sulphur-Ärzenen. Aus Amerika importierte Geheimmittel, S-Mixture, S ointment, S pills, S-soap enthalten Calciumpentasulfid und Calciumthiosulfat. Es handelt sich also um Präparate, welche durch Kochen von Schwefel mit Kalk und Wasser hergestellt sind.

Leuchtfarben (BALMAIN'S) Wie schon bemerkt wurde, hat das Calciumsulfid die Eigenschaft, im Dunklen zu leuchten, wenn es vorher beheizt worden war. Im Nachstehenden geben wir eine Vorschrift zur Darstellung phosphorescierenden Calciumsulfids und zur Zusammenstellung einiger Farbmischungen. Man mischt 20 g sehr fein gepulverte, gebrannte Muschelschalen (von *Hypopus vulgaris* mit 6 g Schwefel und 2 g Stärke, versetzt die Masse tropfenweise mit 8 cem einer Lösung von 0,5 Wismutnitrat (und einigen Tropfen Salzsäure) in 100 cem absolutem Alkohol, lässt $\frac{1}{2}$ Stunde stehen, erhitzt in einem geschlossenen Tiegel 20 Minuten lang auf heller Rothgluth, entfernt nach völligem Erkalten die entstandene dünne Gipschicht von der Oberfläche, pulverisirt und glüht nochmals $\frac{1}{2}$ Stunde bei gleicher Temperatur, wobei ein aus kleinen, kaum agglomerirten Körnern bestehendes Produkt erhalten werden muss, welches nicht weiter zerkleinert werden darf. Dieses Produkt phosphorescirt schön violett. Durch Befügung von 0,1 Proc der Schwefelverbindungen von Antimon, Cadmium, Kupfer, Platin, Uran, wird der Ton des leuchtenden Calciumsulfids gelbgrün bis blaugrün (Verneuil).

Ein schön phosphorescirendes Präparat enthält 37 Proc Calciummonosulfid, 50 Proc Calciumoxyd, 7 Proc Calciumsulfat, 5 Proc Calciumcarbonat nebst Spuren von Kieselsäure, Magnesia, Phosphaten, Alkalien und einigen Zehntausendsteln Wismut-sulfid.

Im Nachstehenden geben wir einige gefärbte Mischungen für Anstrichfarben.

Orange		Blau	
Firniss	46,0	Firniss	42,0
Baryumsulfat	17,5	Baryumsulfat	10,2
Indisches Gelb	1,0	Ultramarinblau	6,4
Alizarin	1,5	Kobaltblau	5,4
Calciumsulfid	38,0	Calciumsulfid	46,0
Gelb		Violett	
Firniss	48,0	Firniss	42,0
Baryumsulfat	10,0	Baryumsulfat	10,2
Baryumchromat	8,0	Ultramarinviolett	2,8
Calciumsulfid	34,0	Kobaltarsenik	9,0
		Calciumsulfid	36,0
Grau		Braungelb	
Firniss	45,0	Firniss	48,0
Baryumsulfat	6,0	Baryumsulfat	10,0
Calciumkarbonat	6,0	Auripigment	8,0
Ultramarinblau	0,5	Calciumsulfid	34,0
Zinksulfid grau	6,5		
Calciumsulfid	36,0		

In den vorstehenden Vorschriften ist unter „Calciumsulfid“ stets das aus Muschelschalen wie oben angegeben hergestellte phosphorescierende Calciumsulfid zu verstehen. An Stelle von Firniss kann auch Wasserglas als Bindemittel verwendet werden.

Leuchtende Leimfarben. Gelatine 500,0 g, heisses Wasser 2 l, Calciumsulfid 1,5 kg, Glycerin 50,0. Noch warm aufzutragen, aber kein Kaliumdichromat zusetzen.

Noctiluca heisst die leuchtende Substanz der Leuchtthiere und gewisser Pflanzen, z. B. Agaricus.

Calcium sulfuricum.

Das Calciumsulfat kommt in der Natur im wasserfreien Zustande als „Anhydrit“ CaSO_4 vor. Im wasserhaltigen Zustande kommt das Calciumsulfat in der Natur gleichfalls vor, es hat alsdann die Zusammensetzung $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ und fñhrt die Bezeichnung Gips. Die namliche Zusammensetzung ($\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) hat das kñnstlich gefällte Calciumsulfat. — Endlich hat man den durch Erhitzen des wasserhaltigen Gipses erhaltenen sog. gebrannten Gips zu berñcksichtigen.

I. Calcium sulfuricum praecipitatum. Gefälltes Calciumsulfat. Sulfate de chaux. Sulfate of lime. $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 172.

Zur Darstellung mischt man eine filtrirte Lösung von 100 Th. krystallisirtem Calciumchlorid in 1000 Th. Wasser mit einer Lösung von 150 Th. krystallisirtem Natriumsulfat in 1500 Th. Wasser. Man lñsst die Mischung einen Tag absetzen, wascht alsdann den Niederschlag mit warmem Wasser aus und trocknet ihn bei etwa 30°C .

Feines weisses, zartes Pulver, aus monoklinen Krystallen bestehend. Schwer lñslich in Wasser. Bei 15°C lñst es sich in etwa 500 Th. Wasser. Das Lñsungs Optimum liegt bei 35°C , bei dieser Temperatur lñst es sich in rund 870 Th. Wasser. Verhåltnissmässige leicht lñslich in nicht zu sehr verdünnter Salzsåure (Unterschied von Baryum- oder Strontiumsulfat. Das Präparat findet Verwendung zur Darstellung kñnstlicher Mineralwässer (s. S. 344), die concentrirte wasserige Auflñsung auch als Reagens in der chemischen Analyse.

Ein durch Fållung in der Grosstechnik dargestelltes Calciumsulfat ($\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) kommt im Handel als Annalin oder Pearl hardening vor und wird namentlich als Füllstoff in der Papier-Fabrikation angewendet.

Gipswasser. Calciumsulfatlñsung. Man übergiesst etwa 5 g gefälltes Calciumsulfat mit 1 l destillirtem Wasser, lñsst einige Tage unter gelegentlichem Umschütteln stehen und filtrirt alsdann ab. Reagens zum Nachweis des Strontiums und Baryums, ferner zum Nachweis der Traubensäure.

II Calcium sulfuricum nativum. Gips. Wasserhaltiger Gips. $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew = 172.

Der natürliche, wasserhaltige Gips kommt in monoklinen Krystallen vor, unter denen sich häufig Zwillinge Krystalle (sogen Schwalbenschwanze) finden. Ist er von körniger, dem Marmor ähnlicher Struktur, so heisst er „Alabaster“. Lässt er sich in dünne Blättchen spalten, so wird er „Marienglas“ oder „Fraueneis“ genannt. Stellt er faserige Massen dar, so heisst er „Fasergips“. „Gipsstein“ heissen die dichten, weniger reinen Sorten.

Lapis specularis *Glacies Mariae* Marienglas Fraueneis. Ist ein durchsichtiger blättriger Gips, GipsSPATH. Man hält die völlig farblose Waare in Stücken und als mittelfeines Pulver vorrätig. Ersteres wird zu Zwecken in der Technik, z. B. zur Färbung künstlicher Blumen, letzteres als Medikament für Schweine und auch innerlich und äusserlich gegen rosenartige Entzündungen und zu sympathetischen Kuren in den Apotheken gefordert.

Dieser GipsSPATH ist nicht mit dem Glimmer (Kaliummer, Russisch Glas) zu verwechseln, welcher mitunter auch als Marienglas oder Frauenglas bezeichnet wird, sich aber durch die elastisch-biegsamen Plättchen von dem GipsSPATH unterscheidet und ein Material für Deckgläser mikroskopischer Objekte liefert.

III Calcium sulfuricum ustum (Austr. Germ. Helv.) Calcii Sulphas exsiccatus (U-St.) Gebrannter Gips. Plâtre cuit. Burnt Plaster. Dried Gypsum

Ist der durch massiges Erhitzen seines Krystallwassers zum grössten Theile beraubte natürliche, wasserhaltige Gips.

Darstellung. Wird der wasserhaltige Gips erhitzt, so verliert er bei $100-105^\circ \text{C}$ einen Theil seines Krystallwassers. Bei $105-170^\circ \text{C}$ geht dann der Rest des Krystallwassers weg, wobei zwischen 135 und 150°C nochmals eine Periode des Stillstandes eintritt. Wird die Erhitzung über 200°C hinausgesteigert, so giebt der Gips mit Wasser nicht mehr einen schnell erhärtenden Brei, er heisst dann „todtgebrannt“. Beim Brennen (Entwassern) des Gipses ist demnach dafür Sorge zu tragen, dass die Entwässerung bei einer mittleren Temperatur von etwa 150°C ausgeführt wird, und dass die Temperatur unter keinen Umständen über 200°C hinausgeht.

Kleine Mengen Gips erhitzt man zum Zweck der Entwässerung in Form eines groben Pulvers unter Umrühren in flachen eisernen Kesseln, so lange eine darüber gehaltene kalte Glasscheibe beschlägt. Grössere Mengen brennt man in einem gewöhnlichen Backofen. Nachdem der Backofen geheizt ist und die Kohlen herausgenommen sind, giebt man den Gips in ungefähr taubeneigrössen Stücken auf die Sohle des Ofens, schliesst die Thür und überlässt ihn anderthalb Tage dieser Wärme. Wenn ein in das Mundloch des Ofens gehaltenes kaltes Stück Glas nicht mehr beschlägt, so ist die Entwässerung beendet. In Gipsbrennereien benutzt man Gipsöfen, welche eine den Kalköfen ähnliche Einrichtung haben. In allen Fällen ist es Aufgabe des Gipsbrenners, die Entwässerung bei möglichst niedriger Temperatur zu bewirken und eher einige Procente Wasser im Gips zu lassen, als durch zu starke Hitze die Entwässerung vollständig zu machen, d. h. den Gips tod zu brennen. Auch der nicht völlig entwässerte Gips zeigt die Fähigkeit, mit Wasser einen schnell erhärtenden Brei zu bilden.

Handelswaare. Der gebrannte Gips kommt gepulvert oder, wie es in der Kunstsprache heisst, klargeschlagen oder gemahlen, verpackt in hölzernen Fässern, in den Handel. Die beste, für pharmaceutische Zwecke geeignetste Sorte ist der von den Bildhauern benutzte „Alabastergips“.

Eigenschaften. Der gebrannte Gips bildet ein weisses oder auch ein schmutzig weisses, trockenes, amorphes Pulver, welches mit der Hälfte seines Gewichtes Wasser in einigen Minuten zu einer harten, schwer zu zerbrechenden Masse erstarrt. Der gebrannte Gips des Handels enthält in der Regel noch etwa 5 Proc. Wasser. Erstarrt der Gips, mit der Hälfte seines Gewichtes Wasser angerührt, nach einigen Minuten nicht zu einer harten, schwer zu zerbrechenden Masse, so ist er eben zur pharmaceutischen Verwendung ungeeignet. Worauf das beruht, lässt sich in den meisten Fällen durch eine Wasserbestimmung

mung feststellen. Betragt der Wassergehalt erheblich mehr als 5 Proc, so war der Gips wahrscheinlich zu wenig entwässert. Ist er aber wesentlich geringer als 5 Proc, so liegt entweder todtgebrannter Gips oder Anhydrit vor.

Aufbewahrung. Obgleich der gebrannte Gips an der Luft nur sehr langsam Wasser anzieht, so empfiehlt es sich doch, ihn in gut schliessenden Gefässen aus Glas, Steinzeug oder Blech an einem trocknen Orte, am besten im Trockenschranke, aufzubewahren. Zweckmässig ist es, ihn in $\frac{1}{4}$ Pfundbüchsen von Blech einzufüllen und diese durch Umkleben von Papierstreifen zu verschliessen.

Anwendung. In den Apotheken wird der gebrannte Gips wegen seiner häufig vorkommenden chirurgischen Verwendung bei Knochenbrüchen vorrätig gehalten. Gebrannter Gips wird mit etwa der Hälfte seines Gewichtes Wasser von mittlerer Temperatur zu einem Breie gemacht und damit in circa 1 cm dicker Lage mit Hilfe eines Stückes baumwollenen Zeuges das betreffende Glied eingehüllt. Will man die Erhärtung des Gipsbreies verlangsamen, so erreicht man dies durch einen Zusatz von wenig Glycerin. Eine Mischung aus 100 gebranntem Gips, 50 Wasser und 5 Glycerin erhärtet erst nach einer Stunde, dagegen beschleunigt man das Erhärten durch Zusatz von Wasserglas. Im pharmaceutischen Laboratorium benutzt man den Gips zum Lutren der Apparate. Mit Mehl gemischt, auch wohl mit Anis aromatisirt, wendet man ihn als Ratten- und Mausegift an. In den Künsten und in der Technik ist seine Anwendung eine ausgedehnte, in der Landwirthschaft dient der gebrannte und ungebrannte Gips als Düngemittel.

Gypsum bituminatum. Getheerter Gips (Diät.) 4 Th gebrannter Gips mischt man mit 1 Th Buchenholztheer.

Calcium thiosulfuricum.

Calcium thiosulfuricum. Calcium hyposulfurosum. Calcium subsulfurosum. Thioschwefelsaurer Kalk. Unterschweifigsaurer Kalk. $\text{CaS}_2\text{O}_3 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 260

Darstellung. 100 Th sublimirter Schwefel, 50 Th Aetzkalk mit Wasser in das Hydrat verwandelt und 600 Th Wasser werden in einem eisernen Kessel und unter Ersatz des verdampfenden Wassers anderthalb Stunden gekocht, dann auf ein Filter gebracht und der Rückstand im Filter mit etwa 100 Th destillirtem Wasser nachgewaschen. In das rothgelbe Filtrat wird nun Schwefligsauregas eingeleitet, bis die Flüssigkeit farblos erscheint. Diese Flüssigkeit wird alsdann filtrirt und in einer Wärme, welche 60°C nie übersteigen darf, bis auf circa 100 Th eingedunstet und zur Krystallisation bei Seite gestellt. Die Mutterlauge giebt noch Krystalle aus. Ausbeute circa 70 Th.

1) $3\text{CaO} + 12\text{S} = \text{CaS}_2\text{O}_3 + 2\text{CaS}_2$ 2) $2\text{CaS}_2 + 3\text{SO}_2 = 2\text{CaS}_2\text{O}_3 + 9\text{S}$

Eigenschaften. Calciumthiosulfat bildet grosse, farblose, hexagonale Prismen, welche in gleichviel Wasser löslich sind und sich in dieser Lösung bei einer Wärme über 60°C in Schwefel und Calciumsulfid zersetzen.

Aufbewahrung. Man bewahrt das Calciumthiosulfat in wohl verstopften Flaschen, soviel als möglich vor Licht und Luft geschützt.

Anwendung. Das Calciumthiosulfat wurde als Heilmittel der Hautkrankheiten, besonders aber bei Lungenphthisis empfohlen und zu 0,5–1,0–1,5 g einigemal des Tages in Zuckerlösung oder Pastillen gegeben. Der gleichzeitige Genuss oder Gebrauch saurer Substanzen ist zu vermeiden.

Pastilli Calcii thiosulfurici		
Rp	Calcii thiosulfurici	5,0
	Sacchari albi	100,0
	Tragacanthae	0,25
	Olei Menthae piperitae	gtt. 20,0
	Aquae q. s.	
Mant. pastilli centum (100)		

Syraps Calcii thiosulfurici		
Rp	Calcii thiosulfurici	5,0
	Syrupi Sacchari	95,0
Drei- bis vierstündlich einen halben bis ganzen Esslöffel.		

Calendula.

Gattung der Compositae—Tubuliflorae—Calenduleae.

I Calendula officinalis L. Ringelblume Studentenblume. Todtenblume. Dotterblume Warzenkraut. Tous les mois Souci-Marigold. Heimath im Mittelmeergebiet, durch die Kultur weit verbreitet und zuweilen verwildert

Verwendung finden zuweilen die Blumenkörbchen **Flores Calendulae**. Calendulablüthen. Dotterblumen. Ringelblumen. Blütenköpfchen mit zweireihigem Hüllkelch, orangefarbenen Blüten und flachem Blütenboden. Die Randblüthen (Fig 138) mit langer, dreizähliger, viernerviger Zunge, fruchtbar. Die Früchte ohne Kelchsaum, einwärts gekrümmt, die äussersten schnabelförmig verlängert, die innersten kürzer, ungeschnabelt, zuweilen geflügelt. Die Scheibenblüthen unfruchtbar.

Bestandtheile 0,02 Proc ätherisches Oel. Mit dem Namen „Calendulin“ hat man einen gallertigen Körper, einen amorphen Bitterstoff, und den gelben Farbstoff der Blüten bezeichnet. Sie enthalten ausserdem ein in Aether und Alkohol lösliches Harz und 8 Proc Asche.

Einsammlung und Aufbewahrung. Man pflückt vom Juni bis September die Blütenköpfe, trocknet, entfernt die Hüllkelche und bewahrt die Blüten vor Licht geschützt in Blech- oder Glasgefassen auf. 7 Th frische Blüten geben 1 Th trockene.

Anwendung. Die als Heilmittel (gegen Skropheln, Gelbsucht, Krebs) veralteten Blüten finden als Bestandtheile von Raucherspecies, in der Färberei und zur Verfälschung der Arnikablüthen Verwendung, mit Fernambuk oder Anilinroth gefärbt, kommen sie als Safranersatz in den Handel und werden zu dessen Verfälschung benutzt.

Extractum Calendulae wird aus frischem blühendem Kraut wie **Extractum Belladonnae** (Germ.) bereitet (vergl. S. 469).

Tinctura Calendulae Tincture of Calendula (U. St.) Flores Calendulae (pulv. Nr. 20) 200 g, Alkohol (91 proc.) q. s., man befeuchtet mit 200 ccm und stellt im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur her.

Liquor anticarcinomaticus Rust

Rp Extracti Calendulae
Extracti Chamomillae aa 10,0
Aquae Laurocerasi 80,0
Tincturae Opii simplicis 5,0

Verbandwasser (bei Krebsgeschwüren)

Pilulae anticarcinomaticae Rust

Rp Extracti Calendulae
Extracti Conii
Ferri oxydati fusci aa 5,0
Florum Calendulae pulverat q. s.

M f. pilul. 200

8mal täglich 4–5 Pillen (bei Krebs)

Unguentum Calendulae

Rp Extracti Calendulae 1,0
Unguenti cerei 9,0

Harzer Gebirgsthee, LAUBER's, ist zusammengesetzt aus Flores Acaciae, Calendulae, Lavandulae, Millefolii, Sambuci, Folia Sennae, Herba Farfarae, Majoranae, Matrisylviae, Menthae pip., Veronicae, Lignum Sassafras, Radix Liquiritiae (Apoth.-Zeitg.)

Liquor Calendulae SCHNEIDER, ein Blutstillungsmittel, erhält man, indem man frische Ringelblumen mit Wasser befeuchtet, mehrere Monate lang in verschlossener Flasche der Sonne aussetzt, die Pressflüssigkeit mit Weingeist vermischt und filtrirt.

Das Kraut (Herba Calendulae, Herba Calthae sativae, Herba Verrucariae) wurde ähnlich verwendet wie die Blüten.

II. Calendula arvensis L. Heimath wie die vorige, aber nördlich bis Belgien und Süddeutschland, auch kultivirt. Kleiner wie die vorige. Früher das Kraut als Herba Calendulae sylvestris im Gebrauch, die Blüten (Molton) zum Färben von Butter und Käse.




Fig 138
Randblüthe
von Calendula
officinalis

Camphora.

I. Camphora (Austr Brit Germ Helv U-St) *Camphre du Japon* (Gall)
 Laurineen-Kampher Gewöhnlicher Kampher Japankampher $C_{10}H_{16}O$ Mol
 Gew. = 152

Der Kampherbaum *Cinnamomum Camphora* F Nees et Ebeim *Laurus Camphora* L., Familie der Lauraceae, ist besonders an der Küste Ostasiens von Cochinchina bis zur Mündung des Jang-tse-Kiang, ferner auf den Inseln Hainan und Formosa und den südlich vom 34 Breitengrade gelegenen Theilen Japans verbreitet. Er enthält in allen seinen Theilen ein ätherisches Oel, dessen Hauptbestandtheil der Kampher ausmacht. Daneben enthält es noch Terpene und dem Kampher verwandte sauerstoffhaltige Bestandtheile, z B Safrol.

Gewinnung Dieselbe erfolgt in Japan in der Weise, dass die Spähne des Kampherbaumholzes (auch zerkleinerte Zweige und Blätter) einer mehr oder weniger einfachen Destillation mit Wasser unterworfen werden. Auf dem Destillate schwimmt schliesslich ein halbfestes und halbflüssiges Gemisch von festem Kampher und Kampherol. Letzteres wird von dem ausgeschiedenen festen Kampher durch Abkühlen getrennt, worauf der Kampher in Form körnig krystallinischer Massen in sog Tubben, d h in Holzbottichen von etwa 80 kg Inhalt, welche mit geflochtenen Matten umkleidet sind, in den Handel gelangt. Der Formosa-Kampher wird in Kisten von 50–60 kg Inhalt verpackt, welche mit dicker Bleifolie ausgeschlagen sind.

Das Kampher-Oel, welches noch grössere oder geringere Mengen Kampher gelöst enthält, wird gleichfalls nach Europa eingeführt, wo es durch Destillation auf Kampher, Safrol und sog leichtes Kampherol verarbeitet wird.

Sublimation Der nach Europa eingeführte „Rohkampher“ ist mehr oder weniger durch Gips, Kochsalz, Holz und Rindenstücke etc verunreinigt und muss, bevor er zur therapeutischen Verwendung gelangt, einem Raffinirungs-Process unterzogen werden, welcher im wesentlichen in einer langsamen Sublimation besteht. Solche Raffinerien bestehen z B in Hamburg.

In den europäischen Fabriken wird der „Rohkampher“ mit etwas Kohle, Sand, Eisenfeile oder Kalk gemischt und in sog „Bombolas“ gebracht, d h Glaskolben, welche im Sandbade rasch auf 120–190° C erwärmt werden, um das Wasser auszutreiben. Dann wird die Temperatur während 24 Stunden auf 204° C gehalten. Nach beendigter Sublimation sprengt man die Glaskolben durch Auflegen nasser Tücher und nimmt die Kuchen, welche gewöhnlich 3–4 kg wiegen, heraus.

In Amerika wird der Rohkampher aus eisernen Retorten in abgekühlte Kammern sublimirt, in denen sich die Kampher-Dämpfe pulverförmig condensiren. Das so erhaltene Kampherpulver wird alsdann unter hohem hydraulischem Drucke in Scheiben von 40 cm Durchmesser und 3 cm Dicke gepresst. Dieser Scheibenkampher ist dichter und in Massen weniger flüchtig als der Kuchenkampher.

In den deutschen Handel gelangt der raffinirte Kampher in fast halbkugelförmigen, oben konvexen, unten konkaven, in der Mitte häufig mit einem Loche — welches der Oeffnung des Sublimir-Kolbens entspricht — versehenen 3–5 kg schweren Broten, welche meist in blaues Papier eingeschlagen sind.

Eigenschaften. Aus Alkohol krystallisirt, glänzende, harte, hexagonale Krystalle. Meist aber durchscheinende, körnig-krystallinische, etwas zähe Massen von eigenartigem Geruche und brennend bitterem, hinterher kühlendem Geschmack. Beim Zerreiben im Mörser bröckelt er zusammen, doch lässt er sich nach dem Befeuchten mit Alkohol oder Aether oder Chloroform unter Vermeidung starken Druckes in ein feines Pulver verwandeln. Mit dem Messer lässt er sich schneiden, die Schnittfläche ist glanzend. Er sublimirt lebhaft beim Erwärmen, verflüchtigt sich aber schon bei gewöhnlicher Temperatur merklich. Wegen dieser schon bei mittlerer Temperatur stattfindenden Verdampfung gerathen


Kampherstücke, wenn man sie auf Wasser wirft, in lebhaft rotirende Bewegung. Diese hört indessen auf, wenn man etwas Fett oder Oel auf das Wasser bringt.

Das spec Gewicht wird verschieden angegeben [0,922 bei 10° C, ferner 0,995 (Brit U-St) bei 15° C]. Diese Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass das spec Gewicht wechselt, je nachdem der Kampher mehr oder weniger kompakt ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 175° C, der Siedepunkt bei 204° C. Entzündet brennt der Kampher mit heller, russender Flamme.

Kampher ist leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Petroläther, Schwefelkohlenstoff, in Terpenen, ätherischen und fetten Ölen, in Essigsäure und in Schwefelsäure. In Wasser ist er nur wenig löslich (1:1200), doch ertheilt er diesem deutlich seinen eigenartigen Geruch und Geschmack. Verreibt man Kampher mit trockenem Chloralhydrat oder Phenol, Thymol, Menthol, Resorcin, Pyrogallol, Mono- und Dichloressigsäure und einigen anderen festen organischen Verbindungen, welche noch näher angeführt werden sollen, so erfolgt Verflüssigung, d. h. die Mischungen werden flüssig und behalten den flüssigen Aggregatzustand bei mittlerer Temperatur.

Die konzentrierte alkoholische Lösung des Kamphers lenkt die Ebene des polarisirten Lichtes stark nach rechts ab, doch nimmt die Rechtsdrehung bei zunehmender Verdünnung rasch ab. $[\alpha]_D = +44,22^\circ \text{C}$

Von Schwefligsäure Anhydrid absorbiert der Kampher unter Verflüssigung mehr als 300 Volume. Beim Erwärmen giebt diese Flüssigkeit die schweflige Säure unter Hinterlassung von Kampher wieder vollständig ab. — Durch Oxydation mit Salpetersäure geht der Kampher in Kamphersäure über. S. 23.



Die Arbeiten über die chemische Konstitution des Kamphers haben zu einer unbestrittenen Konstitutionsformel noch nicht geführt. Die bis jetzt vorliegenden Reaktionen lassen sich noch am besten an der Hand der BREDT'schen Formel erklären.

Prüfung und Aufbewahrung. Verfälschungen des Kamphers sind in Deutschland wohl kaum beobachtet worden. Wenn der Kampher den richtigen Schmelzpunkt und Siedepunkt hat und wenn er beim Erhitzen ohne zu verkohlen und ohne Hinterlassung eines nicht flüchtigen Rückstandes sublimirt und im übrigen den Lösungsmitteln gegen über keine auffälligen Eigenschaften besitzt, so kann er als unverfälscht angesehen werden.

Wegen seiner merklichen Flüchtigkeit und wegen seines durchdringenden Geruches, welcher von anderen Arzneistoffen leicht angenommen wird und diesen lange anhaftet, schenke man der Aufbewahrung besondere Aufmerksamkeit. — Kleinere Vorräthe bringt man in weithalsigen Glasern mit Glasstopfen unter. Für grössere Vorräthe benutzt man Büchsen aus Weissblech zur Aufbewahrung. Immer aber stellt man die Gefässe räumlich möglichst entfernt von anderen Arzneistoffen, ferner an einem kühlen Orte auf. — Abgewogene Mengen Kampher für den Handverkauf halte man nicht zu lange vorrathig, da ihr Gewicht stark schwindet.

Anwendung. Aeusserlich in Form von Verbandwasser und Salben (1 Kampher, 9 Fett) als Antisepticum bei schlaffen Geschwüren, jauchiger Eiterung. In Substanz als ableitendes Mittel, indem man z. B. bei Zahn- und Ohrenschmerz ein Stückchen Kampher, in Watte gehüllt, in den Gehörgang steckt. Ferner als reizendes und ableitendes Mittel in Form der verschiedenartigsten Einreibungen bei den mannigfaltigsten Zuständen.

Innerlich ist er in kleineren Gaben ein werthvolles Eregungsmittel. Man giebt ihn zu 0,05—0,2 g drei- bis viermal täglich bei drohendem Kollaps, bei Vergiftungen mit Narcotics, als Expectorans. Grössere Gaben, wie 0,5—0,8 g, werden als Sedativum bei Delirium, Epilepsie, Nymphomanie, Kantharidenvergiftung gegeben.

Subkutane Injektionen (1 Kampher 10 Olivenöl oder Alkohol oder Aether) werden namentlich bei Kollaps angewendet.

Technisch zur Herstellung des Celluloids, zur Herstellung gewisser Sorten rauch schwachen Schiesspulvers, ferner als Mottenmittel Grosse Mengen Kampher wirken toxisch erzeugen z B Krämpfe

Dispensation. Zur Herstellung von Pulvermischungen zerreibt man den Kampher zuerst mit Weingeist und fügt dann die anderen pulverförmigen Bestandtheile unter Reiben mit dem Pistill hinzu, wobei man starkes Aufdrücken vermeidet, da sich sonst der Kampher an Pistill und Mörserwand festsetzt Kampher enthaltende Pulver werden in gläsernen Gefässen, oder in Wachspapier dispensirt Wird der Kampher in wässrigen Mixturen verordnet, so mischt man ihn zuerst mit dreimal soviel arabischem Gummi, oder kommt Zucker, Tragant, Eigelb etc zur Mixture, mit diesen, und verdünnt unter Reiben die Mischung allmählich mit Zuckersaft oder Wasser Wird er Oel- oder Balsam Emulsionen zugesetzt, so löst man ihn zuvor unter Schütteln und gelindem Erwärmen in den Oelen, welche emulgirt werden sollen Ein vorzügliches Umhüllungsmittel für Kampher in wässrigen Flüssigkeiten ist kohlensäure oder gebrannte Magnesia Viele trockne oder harte Harze macht der Kampher durch seine Gegenwart flüssig oder weich In Mischungen mit einigen Gummiharzen und Harzen, besonders dem Stankasant, verliert er allmählich seinen Geruch Zu Salben wird er mit etwas fettem Oel angerieben In dieser Form wird er auch den geschmolzenen, aber nicht zu heissen Pflastern zugesetzt 8 Theile fettes Oel lösen 3 Theile Kampher


Camphora trita Kampherpulver. Wird dadurch hergestellt, dass man Kampher stücke mit starkem Weingeist oder mit Aether besprengt und in einem porcellanen Mörser unter mässigem Druck zerreibt Das Pulver wird nicht durch ein Sieb geschlagen Man lässt den Weingeist oder Aether an der Luft abdunsten und schüttet das Pulver locker in sein Standgefäss Grössere Mengen Kampherpulver stellt man auch wohl dadurch her, dass man mit erwärmtem Weingeist eine gesättigte Auflösung macht, diese mit einem doppelten Volum Wasser mischt, den abgeschiedenen Kampher in einem Kolatorium sammelt und auspresst

Da das Kampherpulver im Verlaufe der Aufbewahrung doch wieder mehr oder weniger zusammenbackt, so halte man es nicht für gar zu lange Zeit vorräthig Das durch Fällung der alkoholischen Lösung mit Wasser bereitete Kampherpulver backt nicht mehr zusammen

Camphora in cubulis. Kampher in Würfeln Ist eine für den Handverkauf bestimmte und hierfür sehr zu empfehlende Form Sie wird durch Komprimiren von Kampherpulver wie der Kampher in Platten hergestellt

Camphora formylca, Kampheraldehyd, Formyl-Kampher, $C_{11}H_{16}O_2$

Darstellung. Man löst 1 Atom Natrium in einer Lösung von 1 Mol Kampher in Toluol auf und fügt unter Abkühlung 1 Mol Ameisensäureäthyläther hinzu Nach längerem Stehen wird in Eiswasser gegossen und die alkalische Lösung, welche den Kampheraldehyd in Form des Natriumsalzes enthält, von dem aufschwimmenden Toluol getrennt Die alkalische Lösung wird mit Essigsäure angesäuert und der ausgeschiedene, öhlartige Aldehyd mit Aether aufgenommen Nach dem Verdunsten des letzteren hinterbleibt die Verbindung als Oel, welches später krystallinisch erstarrt D R P 49165



Der so erhaltene Kampheraldehyd schmilzt bei 76–78° C, er hat saure Eigenschaften, ist leicht in Alkalen löslich und giebt mit Kupferacetat und Zinkacetat ein krystallinisches Kupfer- bzw Zinksalz Mit Eisenchlorid liefert er in alkalischer Lösung eine intensive Dunkelviolett-färbung

Der Kampheraldehyd ist zur Verwendung als Arzneimittel und als Ausgangsprodukt für Arzneimittel in Aussicht genommen.

Camphora artificialis Künstlicher Kampher Camphoricin $C_{10}H_{16} \text{ HCl}$ Mit diesem wenig zutreffenden Namen bezeichnet man das durch Einwirkung von wasser freier Salzsäure auf Terpentintöl gewonnene Pinenchlorhydrat, Terpentintölmoneochlorhydrat

Man leitet in abgekühltes Terpentinöl trockenes Salzsäuregas bis zur Sättigung ein. Beim Abkühlen unter 0° C scheidet sich die Verbindung als krystallinische Masse aus, welche nach dem Abpressen aus Alkohol umkrystallisiert werden kann.

Farblose, kampherartig riechende, je nach der Abstammung des Terpentins bei 115–125° C schmelzende Krystalle, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol.

Camphora benzoica Benzoesäure-Kampher Gemisch von Kampherpulver mit Benzoesäure in verschiedenen Verhältnissen.

Camphora carbolisata Karbolkampher *Acidi carbolici* 9,0, *Spiritus* 1,0, *Camphorae tritae* 25,0 Oelige, blassgelbliche Flüssigkeit von schwachem Kamphergeruch, unlöslich in Wasser und in Glycerin, mischbar in allen Verhältnissen mit Mandelöl oder Olivenöl. Als Verbandmittel an Stelle der Karbolsäure, auch zum Bepinseln von diphtherischen Belägen.

Camphora naphtholica Naphthol-Kampher Eine durch Zusammenreiben im erwärmten Mörser aus 1 Th β Naphthol und 2 Th Kampher erhaltene Flüssigkeit.

Camphora resorcinata Resorcin-Kampher Durch Zusammenschmelzen von gleichen Theilen Kampher und Resorcin zu erhaltende Flüssigkeit.

Camphora salicisata Salol-Kampher 10 Th. Kampher werden mit 14 Th Salol im erwärmten Mörser bis zur Verflüssigung zusammengerieben. Auf Baumwolle-Bäuschen zum Verbands von Furunkeln und Karbunkeln.

Camphora thymolica Thymol-Kampher Wird dargestellt durch Zusammenreiben gleicher Theile Thymol und Kampher im erwärmten Mörser bis zur Verflüssigung.

Aqua camphorata (Ergänzb.) **Eau camphrée** (Gall.) Kampherwasser Gall *Camphorae* 2,0 löst man in wenig *Spiritus*, und reibt mit *Aquae destillatae* 1000,0 an. Die Mischung wird aufbewahrt und im Bedarfsfalle filtrirt. Ergänzb. *Spiritus camphorati* 2,0, *Aquae* 100,0. Kräftig schütteln, im Bedarfsfalle abfiltriren.

Linimentum ammoniato-camphoratum (Germ. Helv.) Flüchtiges Kampherliniment. Germ. *Camphorae* 8,0, *Olei Olivarum* 27,0, *Olei Papaveris* 10, *Liquoris Ammonii caustici* (0,96 spec. Gew.) 10,0. Helv. *Camphorae* 7,5, *Olei Olivarum* 67,5, *Liquoris Ammonii caustici* (0,96 spec. Gew.) 25,0. Man beachte, dass die Brit. unter einem ähnlichen Namen ein völlig verschiedenes Präparat führt.

Linimentum Camphorae ammoniatum. (Brit.) *Camphorae* 50,0 g, *Olei Lavandulae* 2,5 ccm, *Liquoris Ammonii caustici* (0,891 spec. Gew.) 100 ccm, *Spiritus* (90 Proc.) q. s. ad 400 ccm.

Oleum camphoratum (Germ. Helv.), **Huile camphrée** (Gall.) Kampheröl. Germ., Helv. und Gall. *Camphorae* 1,0, *Olei Olivarum* 9,0. Austr. *Camphorae* 1,0, *Olei Olivarum* 8,0.

Linimentum Camphorae. Brit. *Camphorae* 1,0 g, *Olei Olivarum* 4 ccm. U-St. *Camphorae* 1,0, *Olei Gossypii* 4,0.

Spiritus camphoratus (Austr. Germ. Helv.) **Spiritus Camphorae** (Brit. U-St.) **Teinture de Camphre** (Gall.)

Germ. Helv. *Camphorae* 1,0, *Spiritus* (90 Proc.) 7,0, *Aquae* 2,0. Austr. *Camphorae* 1,0, *Spiritus diluti* (70 Vol. Proc.) 9,0. Brit., U-St. *Camphorae* 50,0, *Spiritus* (90 Proc.) q. s. ad 500 ccm.

Gall. **Teinture de Camphre faible** *Camphorae* 10,0, *Spiritus* (60 Vol. Proc.) 390,0. **Teinture de Camphre concentrée** *Camphorae* 1,0, *Spiritus* (90 Proc.) 9,0.

Vinum camphoratum (Germ.) Kampherwein. *Camphorae* 1,0 löst man in *Spiritus* 1,0, darauf fugt man unter Umschütteln *Mucilaginis Gummi arabici* 3,0 und *Vini albi* 45,0 hinzu. Einen schöneren Kampherwein erhält man, wenn man im Mörser 1,0 Th. Kampher in 1,0 Weingeist löst, 1,0 Th. arabisches Gummi (Pulver) hinzumischt und nun in kleinen Mengen 47,0 Th. Weisswein dazu ruhrt.

Kampher-Cold-Cream *Camphorae tritae* 5,0, *Unguenti lenientis* 95,0.

Sel de vinaigre sind Kahumsulfatkrystalle, bez. deren Bruchstücke, befeuchtet mit *Acetum britannicum* s. S. 10.

Thiocamf Lässt man schweflige Säure unter gewöhnlichen Verhältnissen auf Kampher einwirken, so vereinigen sich beide zu einer Flüssigkeit, welche die schweflige Säure nur locker gebunden enthält. 1 Vol. Kampher absorbiert etwa 300 Vol. Schwefligsaures Gas. Die wässrige Lösung des Präparates dient als Antisepticum. Durch Erwärmen des Thiocamfs wird Schwefligsaures Gas entwickelt.

Kryostaz Eine Mischung von krystall. Phenol, Kampher, Zaponlack und Terpentinöl. Gallertartige Masse, welche in der Kälte flüssig ist und bei Zimmertemperatur gerinnt.

Wiener Kampherkugeln Aeusserlich gegen geschwollene Backen. *Alumini crud.* 30,0, *Ammonii chlorati* 15,0, *Aquae* 180,0, *Oreatae albae* 400,0, *Cerussae* 250,0, *Camphorae*

(in Spiritus gelöst) 8,0 Fiat boli von 15,0 g Gewicht Oder Calci carbonici nativi pulv 590,0, Cerussae 395,0, Camphorae 15,0, Aquae q s

ANGELSTEIN'S Liniment antirheumatic. Camphorae 5,0, Olei Cajeputi 5,0, Glycerini 100,0

Balsam, Poser'scher, von Ebn Gross in Breslau, Einreibung bei chronischen und lokalen Rheumatismen 125,0 einer gelben Flüssigkeit, aus ca 4,0 Rosmarinöl, 10,0 Kampher, 15,0 Ameisentinktur, 5,0 Spanschfiegentinktur, 90,0 Weingeist und 10 Tropf Salianktur bestehend (4 Mark) (HAGER, Analyt)

Universalmittel, BRESER'S 1) das Universalmittel gegen Epilepsie besteht aus 30,0 roth gefärbtem Kampherspiritus, Preis 1,5 Mark, 2) das Universalmittel gegen Wassersucht besteht aus 50,0 Stengeln und Blättern von *Spartium Scoparium*, Preis 1,5 Mark, 3) das Universalmittel gegen Rheumatismus und Gicht, im Preise von 0,2 Mark, besteht aus einem groben Pulver aus Bernstein, Weihrauch, Lavendelblumen, Kamillen und Wacholderbeeren (SCHADLER, Analyt)

Blattleidium oder Mottentod von MACKS 3 Th Kampher, 1 Th Lavendelöl, 1 Th Spicköl, 1 Th Terpentinöl, 2 Th Benzol, 32 Th Spiritus (330 g = 2 Mark) (HAGER, Analyt)

Balauminen-Tinctur von Dr RAUSCH, gegen Rheumatismus Spiritus 1000,0, Grüne Tannenzapfen 200,0, Florum Arnicae 150,0, Spiritus Formicarum 250,0, Fructum Juniperi, Terebinthinae venetae, Camphorae aa 30,0

Ellixir Karoly pour les fourrures ist eine Lösung von Kampher und Karbolsäure in starkem Spiritus, gemischt mit einer hellbraunlichen scharfen Tinktur (Tinctura Pyethi rosei?) (CASSELMANN, Analyt)

Espirit de hanneton (Maiküferspiritus) von FRANZ GROSS in Landsberg a d W ist eine trübe, gelbliche, spiritöse Flüssigkeit, dargestellt aus 80 Th Spanischer Seife, 20 bis 25 Th Kampher, 400 Th Wasser, 600 Th Alkohol, 80—100 Th frischen Maikraut, durch Maceration und Köhren (80 g = 1,5 Mark) (HAGER, Analyt)

Keytonia, gegen Zahnschmerz entweder auf Watte in den hohlen Zahn einzuführen oder zum Einreiben der schmerzenden Stelle, ist ein Gemisch aus 10 Kampher, 20 Kajeputöl, 40 Chloroform und 1 Nelkenöl (HAGER, Analyt)

Frostbalsam DOEPF'Scher, ein Gemisch aus gleichen Theilen Oleum camphoratum Oleum Rosmarini und Acetum plumbicum

Frostbalsam, RICHARDIN'Scher, eine Lösung von 2,0 Kampher, 3,0 Wacholderöl, 3,0 Thymianöl in 4,0 Salmiakgeist und 32,0 Weingeist

Gehoröl des Dr MENE MAURICE Ein mit Alkana gefärbtes Gemisch aus 30,0 Provençeröl, 0,3 Kampher, 8 Tropf Zimmtöl und 15 Tropf Essigäther (6 Mark) (E HORN, Analyt)

Gehoröl von Dr JOHN ROBINSON 1000 Th Speiseöl (Sonnenblumenöl mit Mohnöl), 15 Th Kampher, 6 Th Kajeputöl, 1 Th Sassafrasöl, 1 Th Bergamottöl, 1 Th Pelargonienöl (90 g = 15 Mark) (HAGER, Analyt)

Gehoröl von Dr SEYDLER, ein mit Kampher und Kajeputöl parfümirtes mohnhalbiges Provençeröl, mit Alkana roth gefärbt Daneben etwas gekampherte Wollwatte (HAGER, Analyt)

Gichtliniment, HOME'S, Englisches Arcanum, besteht aus 3,0 Kampher, 10,0 Terpentinöl, 20,0 Nervenöl, 35,0 schwarzer Seife, 10,0 gepulvertem Mutterkümmel und 1,0 Ammonkarbonat

Kampher-Milch von COLER, Mittel gegen Hautkrankheiten Zinci oxydati 10,0, Aquae Rosae 180,0, Spiritus camphorati 5,0

Katarrh remedy, Dr SAGE'S von R V PIERCE, gegen Lungenleiden Ein Pulver gemischt aus Acidi carbonici 0,5, Camphorae 0,5, Natrii chlorati 10,0 Wird, in $\frac{1}{2}$ l Wasser gelöst, in die Nase eingeblasen

Laurineen von BLUMENTHAL in Berlin. Mittel gegen rheumatische Leiden Saponis medicati 4,0, Camphorae 1,5, Olei Rosmarini 0,5, Spiritus (75 Proc) 94,0

Mottentinktur von P SCHUTZE I. Acidi carbonici 1,5, Camphorae, Olei Rosmarini aa 30,0, Olei Caryophyllorum, Fuchsin aa 5,0, Spiritus 2500,0 II. Olei Terebinthinae, Olei Caryophyllorum, Olei Bergamottae aa 1,0, Camphorae 2,0, Tincturae Capsici 15,0, Spiritus 32,0

Regenerations-Pillen von Dr R RICHARD, gegen geschwächtes Nervensystem 120 mit Lycopodium konspargirte Pillen, aus 7,5 g Kampher, 10 g Enzianextrakt und 6 g Althaeapulver bestehend (Dr HORN, Analyt)

Remedium miraculosum, gegen Blüthen im Gesicht, Mitesser, unreine Haut etc Fabrikant Apotheker STEINGARBER in Rossleben 45 g eines Gemisches aus Zinc oxyd 5, Sulf praec 20, Aqua 70, Spirit camph $2\frac{1}{2}$, Eau de Cologne $2\frac{1}{2}$ 1 Mark (SCHADLER Analyt)

Rheumatismus-Extract von JOSEPH BOHLEN in Bayreuth, besteht aus circa 220 Chloroform, 16,0 Spiritus, 8,0 Terpentinöl, 1,0 verharztem Lavendelöl, 1,0 Rosmarinöl, gefärbt mit etwas Alkanna Eine Flasche mit 48,0 dieser Flüssigkeit kostet 1,75 Mark. (HAGER, Analyt.)

Salbe des Einsiedlers JOHANN TREITLER 3 Th Nürnbergers kampherhaltiges Pflaster, 1 Th Baumöl oder ungesalzene Butter, 3 Th Theer (HAGER, Analyt.)

Sommersprossen, Mittel von HOFFELD I. 15 g weisse Präcipitatsalbe mit etwas Wachs versetzt II. Ein Waschwasser aus 0,25 g Kampher, 8 g Benzoeinktur, 15 g Seifen-spirit und 125 g Rosenwasser (WIETSTEIN, Analyt.)

Spiritus Bohemi gegen alle Arten von Zahnschmerz Eine weingeistige Lösung von Kampher und Nelkenöl 15 g = 3 Mark (LUDWIG, Analyt.)

Spiritus anticephalicus WARD, **Spiritus ammoniacalis** HAWKINS gegen Migrane, eine Lösung von 10,0 Camphora in 50,0 Spiritus Ammonii caustici spirituosus, 20,0 spiritus Coloniensis und 80,0 Spiritus Lavandulae Damit befeuchtete Leinwand auf die Stirn zu legen

WEINHOLD'S Universalbalsam, zum innerlichen und äusserlichen Gebrauch Alkoholsche Lösung von Kampher, Krauseminzöl, Rosmarinöl, Kummelöl, Thymianöl, gefärbt mit Alkanna

Kampher-Oel Bei der Destillation des Kamphers aus den verschiedenen Theilen des Kampherbaumes wird ein öliges Destillat gewonnen, aus welchem sich beim Erkalten der feste Kampher abscheidet Das zurückbleibende Oel, „Kampher-Oel“, galt früher als ein ziemlich werthloses Nebenprodukt, welches an Ort und Stelle meist als Leucht-Material verbraucht wurde

Nachdem es etwa 1887 in grösseren Mengen nach Europa gebracht worden war, und man erkannt hatte, dass in diesem Oel noch fester Kampher in solchen Mengen, dass die Abscheidung sich materiell lohnt, ferner Saflor enthalten sei, ist auch das Kampheröl ein werthvolles Material geworden Das meist aus Japan kommende „rohe Kampheröl“ wird (durch SCHIMMEL & Co, Leipzig) der fraktionirten Destillation unterworfen, durch welche man besonders den festen Kampher und das Saflor abscheidet Man erhält als Nebenprodukte ein sog „weisses leichtes Kampheröl“ in grösseren Mengen und in geringeren Mengen das sog „schwere Kampheröl“

Leichtes Kampheröl Ein farbloses, dem Terpentinöl ähnliches Oel, nach Terpenen bez kampherartig riechend Spec Gewicht bei 15° C 0,895—0,900—0,920 Siedepunkt gegen 170—180° C. Entflammungspunkt 44,5° C (Entflammungspunkt des Terpentins = 33,7° C)

Es enthält Terpene Pinen, Camphen, Dipenten, Phellandren, sämmtlich $C_{10}H_{18}$ Wirkt stark desinficirend

Man verwendet es als Ersatz des Terpentins zum Auflösen von Harzen, ferner zu 2—3 Proc zur Verdeckung des Geruches billiger Schmierseifen, zur Parfümierung weisser Schmierseife und der sog Terpentinsseifen. Doch ist seine Verwendung immer von dem augenblicklichen Preisstande abhängig

Schweres Kampheröl Besteht aus den von 240—300° C übergehenden Antheilen des Kampheröls Spec Gewicht 0,960—0,970 Enthält Sesquiterpen $C_{15}H_{24}$, Saflor $C_{10}H_{10}O_2$, Eugenol $C_{15}H_{18}O_2$, Cineol $C_{10}H_{18}O$, Fenchon $C_{10}H_{16}O$, Terpeneol $C_{10}H_{18}O$ Kann zur Parfümierung von Seifen verwendet werden, tritt aber im Handel gegen das leichte Oel sehr zurück

Rixolin ist ein Gemisch von leichtem Kampheröl mit Petroleum

Purin, Fleckenwasser von BERNDT & Co in Berlin ist ein Produkt der Destillation aus Kampheröl mit Natronlauge und Alkohol (?)

Acetum camphoratum
(Ergänz Hamburg Vorschr.)

Rp Camphorae 1,0
Spiritus (90%) 9,0
Aceti (6%) 90,0

Vinaigre camphre (Gall.)

Rp Acidi acetici glacialis
Camphorae aa 25,0
Aceti (7—8%) 950,0

Aether camphoratus

Tinctura camphorata aetherea.
Kampher-Aether

Rp Camphorae 5,0
Aetheris 20,0

Tolature étherée de camphre (Gall.)

Rp Camphore 10,0
Aethers 65,0
Spiritus 27,0

Aqua camphorata aetherea

Rp Aethers camphorati 10,0
Aqua destillata 200,0

Man schüttelt kräftig um und filtrirt alsdann ab

Aether piceo camphoratus

Rp Camphorae
Piceis liquidae
Spiritus (90%) aa 10,0
Aetheris 50,0

Man macerirt einige Tage und filtrirt

Aqua otalgica Lunewie

Lunewie's Ohrentropfen

Rp Spiritus Colonicensis 40,0
Olei Juniperi Fructus gtt 8
Camphorae 0,15
Liquoris Ammonii caustici (0,960) gtt 15

Bei Schwerhörigkeit einige Tropfen auf Baumwolle in den Gehörgang

Aqua St. Johannis

Rp 1 Zinci sulfurici 3,0
2 Cupri sulfurici 1,0
3 Croci pulverati 0,25
4 Spiritus camphorati 860,0
5 Aquae destillatae 1000,0

Man mischt 1—3, reibt mit 4 an, fügt 5 hinzu, macerirt 2 Tage und filtrirt. Zu Waschungen und Umschlägen bei Kontusionen und Luxationen.

Aura camphorata GOLLIS

Rp Camphorae tritae 0,05
Gummi arabici 1,0
Tincturae Opii crocatae gtt 4
Infusi radices Althaeae 100,0

Balsamum GFNEVIER

Rp Cerae flavae 25,0
Cetacei 5,0
Olei Olivarum 80,0
Olei Terebinthinae 2,0
Camphorae 1,8
Ligni Santali rubri pulv 4,0

Verbandsalbe für schlaffe Geschwüre, brandige Wunden.

Balsamum nervinum VENELL

Rp Adipis Alkanna tincta 50,0
Cerae flavae 7,5
Olei Nucistae 15,0

Leni calora liquatis admisce

Olei Rosmarini
Olei Menthae crispae
Olei Lavandulae
Olei Caryophyllorum
Olei Thymi
Olei Salviae aa 0,3
Balsami Peruviani 4,0
Camphorae tritae 1,5
Spiritus Vini 5,0

Balsamum Saponis camphoratum

Liniment savonneux camphré (Gall)

Rp Spiritus saponati 50,0
Camphorae
Olei Amygdalarum aa 5,0
Spiritus 40,0

Balsamum odontalgicum

Zahnbalsam

Rp 1 Camphorae tritae
2 Opii pulverati aa 5,0
3 Olei Caryophyllorum
4 Olei Cajuputi aa 1,0
5 Sanguinis Draconis 2,5
6 Olei Myristicae 45,0

Man mischt 1—5 und rührt sie in 6, nachdem es halb erkaltet ist, ein

Candela Camphorae

Rp Camphorae tritae 15,0
Kali nitrici 7,5
Radiceis Althaeae 12,5
Aquae q s

M. Tiant candela quinque

Antiseptisches und desinfizierendes Räuchermittel, auch gegen Gicht und Gliederreissen

Ceratum Camphorae compositum

Kampher-Eis Camphor-Ice (Nat form 96)

Rp Cerae albae 150,0
Cetacei 480,0
Olei Ricini 250,0
Camphorae tritae 107,0
Acidi benzoici 10,0
Acidi carbolici 2,0
Olei Amygdalarum amararum aetheris 1,0

In Ceratformen auszugossen

Cigaretas camphoratae

Leinsengrosse Kampherstbölchen werden in Gaze gehüllt und in ein papierenes, hölzernes etc Rohr eingeschoben. Durch dieses Rohr athmet der Patient die Luft ein.

RASPAIL in Paris empfahl sie gegen verschiedene Brustleiden, gegen Katarrh, Heiserkeit, Stimmlosigkeit, Husten, Keuchhusten, Lungensucht, ferner gegen Magenkrampf, Magenwob, Gastritis, wenn man beim Gebrauch der Cigaretten den Speichel verschluckt.

Glycma camphoratum LISFRANC

Rp Camphorae 0,25
Tincturae Opii crocatae gtt 15
Vitellum ovi unius
Infusi Althaeae 80,0

In einem kalten Lavement vor dem Schlafengehen (bei Dyamenorrhöe)

Emplastrum antarthriticum BENNINGSEN

BENNINGSEN'sches Gichtpflaster

Rp Emplastri saponacei 50,0
Camphorae tritae 1,5
Castorei Canadensis pulverati 0,5

In Papierkapseln auszugossen

Emplastrum balsamicum SCHIFFHAUSEN

Rp Emplastri saponati 40,0
Emplastri fusi 20,0
Camphorae tritae 2,5
Castorei Canadensis pulverati 1,25

In Papierkapseln auszugossen

Emplastrum miraculosum RADEMACHEE

Rp 1 Minii 100,0
2 Olei Olivae 200,0
3 Succum sublimissime pulverati 5,6
4 Camphorae tritae 8,0
5 Aluminis usui pulverati 1,5

Man kocht 1 und 2 zum Pflaster, fügt, wenn es etwas abgekühlt ist, 3, 5, und 4 hinzu und giesst in Kapseln aus.

Emplastrum contra morbum nauticum

Rp Emplastri Plumbi composita 40,0
Leni calore liquatis admisce
Olei Cajuputi 1,0
Camphorae 8,0
Opi pulverati

Ammonii carbonici pyro-oleosi aa 2,0

D 3 Wird auf die Magengegend gelegt (gegen und bei Seekrankheit)

Emplastrum resolvens camphoratum

Rp Emplastri Plumbi compositi
Emplastri Melliloti aa 25,0
Camphorae tritae 1,25

In Papierkapseln auszugossen.

Emulsio camphorata

Rp	Camphorae	0,5
	Gummi arabici	2,5
	Spiritus Vini	glt 25
Centerendo mixtis immisce		
	Siccarii albi	25,0
	Emulsionis Amygdalinarum	250,0

English Odontino

Rd	Camphorae	2,5
	Spiritus Vini	5,0
	Chloroformi	10,0

Fomentum anticephalalgicum
Migräneumschlag

Rp	Aceti aromatici	10,0
	Aquae Rosae	50,0
	Albumen ovorum duorum	
	Glycerini	15,0

Agitando mixtis adde
Camphorae 3,0

soluta in
Aetheris 5,0
Zwischen zwei leinenen Lappchen auf die Stirn
zu legen (bei Hemikranie, Migräne)

Guttas contra choleram LOSKOWITZ

	Tinctura Secalis camphorata	
Rp	Fructuum Secalis cerealis tostorum	10,0
	Spiritus Vini (90 Proc)	100,0
Digere et exprime In colaturae 90,0 solve		
	Camphorae	20,0
Halbstündlich 10—20 Tropfen		

Guttas contra choleram OPFOLZEN

Rp	Camphorae	1,0
	Aetheris acetici	12,0
	Tincturae Opii simplicis	3,0
D S Alle 15—30 Minuten 10—15 Tropfen (bei		
Cholera asphyctica)		

Linimentum ammoniato camphoratum
(Form mag Berol.)

Rp	Olei camphorati (1 10)	20,0
	Olei Rapae	80,0
	Liquoris Ammonii caustici (0,98)	20,0

Linimentum antitherpeticum SUNDEWALL

Rp	Olei camphorati	20,0
	Olei Caryophyllorum	1,0
	Adipis suilli	50,0
M D S Nach dem Abscheeren der Haare und		
täglich einmaligem Abwaschen mit Sodalösung		
zweimal einzureiben (bei Herpes tonsurans)		

Liquor baroscopius**Baroskop-Flüssigkeit**

Rp	Spiritus Vini absoluti	
	Spiritus Vini (90%)	50,0
	Camphorae	50,0

Kali nitrici pulverati
Ammonii hydrochlorici pulverati 50,0

Man erwärmt die Mischung eine Stunde lang und
bewahrt die Flüssigkeit mit dem Niederschlage
auf Vor dem Einfüllen in das Baroskop um-
zuschütteln

Liquor nervinus BANGH

Rp	Camphorae tritae	10,0
	Aetheris	20,0
20—30 Tropfen in Wein zu nehmen.		

Lotio cosmetica alida (Hamb Vorschr)

	Saures Gesicht-Waschwasser	
Rp	Acidi acetici glacialis	5,0
	Tincturae Benzoes	
	Spiritus camphorati 50	5,0
	Tincturae Santali rubri	7,5
	Spiritus (90%)	77,5

Mixtura camphorata

Rp	Camphorae tritae	4,0
Affunde		
	Spiritus Vini	1,0
Tum misce cum		
	Aquae destillatae	195,0
et cola per luteum		

Mixtura camphorata acida

Rp	Mixturae camphoratae	85,0
	Aceti Vini (5%)	5,0

Mixtura Magnesiae camphorata MURCHISON

Rp	Camphorae tritae	1,2
	Spiritus Vini	0,3
Tum admisce		
	Magnesiae subcarbonicae	2,5
	Aquae destillatae	200,0

D S Halb- bis beständiglich einen Esslöffel (bei
Typhus, besonders gegen den quälenden Durst)

Oleum acusticum

Gehöröl Ohrenöl gegen Schwerhörigkeit

Rp	Olei Olivae Provincialis	20,0
	Olei camphorati	2,5
	Olei Cajuputi	
	Olei Sassafras	
	Aetheris	50 gtt 5

M D S Fünf bis zehn Tropfen auf Baumwolle
in den Gehörgang einzuführen

Oleum besocardicum

Rp	Olei camphorati	100,0
	Olei Bergamottae	
	Olei Alkanna tinctoria	5,0

Misce

Oleum otacusticum RUST

Rp	Olei camphorati	glt 15
	Olei Amygdalarum	80,0
	Liquoris Ammonii anisati	glt 8

M D S Täglich einige Tropfen in den Gehör-
gang zu geben (bei Hypocophosis asthenica)

Oleum Terebinthinae camphoratum**Englische Zahntropfen**

Rp	Camphorae	5,0
	Olei Terebinthinae	20,0

(Mittel gegen Schmerz hohler Zähne, Frostbeulen)

Pasta Camphorae

Rp	Camphorae tritae	20,0
	Olei Olivae Provincialis	2,0
	Spiritus Vini q s	

ut massa linimenti spissitudinis efficiatur
Aeusserlich (in den hohlen schmerzhaften Zahn
zu bringen, auf die Wange in der Gegend des
Zahnschmerzes oder auf andere schmerzhaft
Stellen, auf syphilitische Geschwüre und An-
schwellungen zu legen)

Pilulae anticholerae DEBRYNE

Rp	Asae foetidae	
	Camphorae	50 10,0
	Extracti Belladonnae	8,0
	Extracti Opi	1,0
	Gummi arabici q s	

Flant pilulae ducentae (200)

Des Morgens nüchtern 2, und allmählich steigend
bis zu 6 Pallen (bei Chorea)

Pilulae mitigantes ROSKOT

Rp	Camphorae	2,0
	Secalis cornuti	4,0
	Mucilaginis Gummi arabici q s	

Flant pilulae quinquaginta (50)

Morgens und abends eine Pille (bei Pollutiones
nocturnae)

- Pilulae mitigantes VIEILLEAU**
 Rp Camphorae
 Kali nitrici aa 5,0
 Radicis Ipecacuanhae 2,5
 Aquae q s
 Plant pilulas quinquaginta (50)
 Drei- bis vierstündlich eine Pille (bei Delirien nach gewissen Operationen, bei Gesichtsröthe)
- Pilulae Nitri camphoratae**
 Rp Kali nitrici 10,0
 Camphorae
 Conservae Rosae aa 5,0
 Plant pilulas ponderis 0,2
 Fünf bis zehn Pillen (bei schmerzhafter Blennorrhagie)
- Pilulae otalgicae PINTER**
 PINTER's Ohrenpillen
 Rp Camphorae tritae 10
 Ceræ flavae 8,0
 Emplastri fuscii 60
 Leni calore mixta post refrigerationem in pilulas sexaginta (60) redigantur In Watte gehüllt abzugeben
 s Eine Pille in Baumwolle gehüllt in den Gehörgang einzuführen
- Pilulae sedativae RICORD**
 Rp Camphorae
 Thridamus aa 3,0
 Mucilaginis Gummi arabici q s
 M f pilulas viginti (20)
 D 8 Vier bis sechs Pillen des Abends (bei Priapismus, schmerzhaften Erectionen, acuter Harnröhrentzündung, Chorda, Balanitis)
- Pommade camphree (Gall.)**
 Rp Camphorae tritae 30,0
 Ceræ albae 10,0
 Adipis 30,0
- Pulvis antisepticus RUST**
 Rp Camphorae
 Myrrinae aa 5,0
 Corticis Chinae fusci 10,0
 Florum Chamomillae aa 10,0
 Carbonis ligni 20,0
 M f pulvis subtilior Zum Einstreuen in gangränöse Wunden
- Pulvis camphorae compositus**
 Frostpulver
 Rp Camphorae tritae 30,0
 Opii pulverati 2,0
 Amyli Solani tuberosi 60,0
 Zum Einstreuen in die wollenen Handschuhe (gegen Frostanschwellungen, Frostbeulen)
- Pulvis dentifricus cum Camphora (Ergänz.)**
 Kampher-Zahnpulver
 Rp Camphorae tritae 1,0
 Calci carbonici 18,0
- Pulvis diaphoreticus GRAEVE**
 GRAEVE's Schweisspulver
 Rp Camphorae 0,1
 Opii 0,03
 Kali nitrici 0,3
 Sacchari 10,0
 Vor dem Schlafengehen in Thee zu nehmen.
- Pulvis ad erysipelas camphoratus**
 Aller Heiligen Rothlaufpulver
 Rp Herbae Majoranae
 Florum Chamomillae
 Florum Sambuci aa 10,0
 Foliorum Malvae
 Herbae Meliloti aa 20,0
 Fabarum albarum 30,0
 Camphorae 2,0
 M f pulvis grossulaceus

- Pulvis expectorans (form Berol.,**
 Rp Acidi benzoici 0,15
 Camphorae tritae 0,03
 Sacchari albi 0,5
 doses tales X
- Sagena gossypina aromatica**
 Gichtwatte
 Rp Camphorae 10,0
 Olei Caryophyllorum 2,0
 Liquoris Ammonii caustici spirituosus 15,0
 Mixturae oleoso-balsamicae 50,0
 Zum Besprengen der Wattelafeln
- Sapo camphoratus**
 Rp Saponis coccoini amorphi recentis 100,0
 Camphorae tritae 5,0
 Misce
- Solutio Camphorae aetherea TROUSSEAU**
 Rp Camphorae 20,0
 Aetheris 50,0
 D 8 Zum Bepinseln Leichtentzündliche Flüssigkeit! (Mittelt eines Pinsels wird die erysipelatöse Hautfläche bei Neugeborenen bestrichen)
- Spiritus aethereus camphoratus**
 Liquor nervinus BANGIL
 Rp Camphorae 5,0
 Spiritus aetheris 45,0
 20—30 Tropfen in Wein zu nehmen (bei Cholera Dysenterie, Kolik)
- Spiritus anticephalalgicus**
 Kopf- und Hirnschmerz
 Rp Liquoris Ammonii caustici
 Spiritus camphorati
 Spiritus Rosmarini aa 10,0
 Zum Itzen und auf Kompressen auf Stirn und Schläfe zu legen (bei Migräne, Kopfschmerz).
- Spiritus camphoratus crocatus (Ergänz.)**
 Elixir camphoratum HARTMANN
 Rp Spiritus camphorati 12,0
 Tincturae Croci 1,0
- Spiritus cephalicus GROMNITZKI**
 GROMNITZKI's Kopfgeist Migränegeist
 Rp Camphorae 15,0
 Olei Menthae piperitae 5,0
 Balsami Vitae Hoffmanni 10,0
 Spiritus (90 Proc.) 50,0
 Auf Stirn und Schläfe einzureiben
- Spiritus contra Ferniones II (Hamburg Voischr.)**
 Frost-Spiritus
 Rp Acidi hydrochlorici (25%) 1,0
 Spiritus camphorati 2,0
- Spiritus nervinus camphoratus**
 Strassburger flüssiger Opodeldok
 Rp Liquoris Ammonii caustici spirituosus 5,0
 Spiritus camphorati
 Spiritus saponati aa 15,0
 Spiritus Vini (90 Proc.) 45,0
 Tincturae Opii simplicis 2,5
 Olei Lavandulae
 Olei Rosmarini aa 1,0
- Spiritus resolvens SCHMUCKER**
 Fomentum resolvens SCHMUCKER
 Rp Spiritus camphorati 35,0
 Spiritus saponati 25,0
 Spiritus Rosmarini 50,0
 Ammonii hydrochlorici pulverati 8,0
 Misce, agita et filtra.
 Bei Verrenkung, Kontusionen, Frost etc Ein flanel-Lappen wird durchtränkt und auf die leidende Stelle aufgelegt oder aufgebunden

Tinctura anticholerica Krüger
(Hamburg Vorschr)

Rp	Spiritus aetherel	2,0
	Spiritus camphorati	15,0
	Aquae destillatae	33,0
	Spiritus (30%)	50,0

Tinctura contra tineas
Mottentinktur

Rp	Tincturae Capsici annui	
	Spiritus (80 Proc)	55 100,0
	Camphorae	30,0
	Acidi carbonici puri	5,0

Zum Besprengen des Pelzwerkes und der Wollenzuge

Unguentum Althaeae camphoratum

Rp	Unguenti Althaeae	25,0
	Camphorae tritae	
	Spiritus (90 Proc)	55 2,5

M

Unguentum camphoratum (Ergänzb)

Rp	1 Camphorae tritae	2,0
	2 Unguenti cerei	3,0

Man löst 1 unter Erwärmen in 2 und rührt bis zum Erkalten

Unguentum camphoratum (Helv)

Rp	Cerae albae	1,0
	Adipis suilli	7,0
	Camphorae	2,0

Unguentum contra Perniones seu camphoratum
(Form Berol)

Rp	Camphorae tritae	5,0
	Vasellini flavi	50,0

Unguentum flavum FRANK CÔME

Rp	Cerae flavae	10,0
	Olei Olivae	15,0
	Camphorae tritae	3,0

Leni calore mixtus adde

Aceti plumbici 4,5

Nach Anwendung des arsenikalischen Causticums auf die cancröse Wunde zu appliciren

Unguentum Picis camphoratum ROLLT

Rp	Picis liquidae	
	Camphorae	55 5,0
	Adipis suilli	40,0

Unguentum contra Perniones I (Hamb Vorschr)
Frostsalbe I

Rp	Camphorae tritae	10,0
	Vasellini flavi	90,0

Unguentum contra Perniones II (Hamb Vorschr)
Frostsalbe II

Rp	Camphorae tritae	
	Opi pulverati	
	Acidi tannici	
	Aquae destillatae	55 5,0
	Balsami Peruviani	10,0
	Adipis suilli	70,0

Unguentum Plumbi compositum
Ceratum Plumbi camphoratum

Rp	Unguenti plumbici	25,0
	Camphorae tritae	0,1

Unguentum Terebinthinae camphoratum
Genfer Balsam

Rp	Olei Olivae	50,0
	Terebinthinae	20,0
	Cerae flavae	30,0
	Camphorae tritae	5,0
	Ligni Santali rubri	2,5

Leni calore mixta agitentur, donec refrigerint,

Unguentum contra decubitus FRANKS

Rp	Camphorae tritae	0,3
	Morphini hydrochlorici	0,12
	Balsami Tolutani	0,6
	Zinca oxyditi	2,0
	Vasellini flavi	20,0
	Cerae flavae	2,5

Vet Electuarium camphoratum HERTWIG

Rp	Camphorae tritae	10,0
	Kali nitrici	
	Radices Valerianae	55 75,0
	Farinae secalinae	40,0
	Aquae q s	

ut fiat electuarium

Den fünften Theil alle 3 Stunden (bei Starrkrampf, Entzündungsfiebern mit brandiger Beschaffenheit des Blutes)

Vet Electuarium diaphoreticum

Rp	Florum Arnicae	50,0
	Florum Sambuci	100,0
	Sulfuris sublimati	50,0
	Camphorae	10,0
	Tartari stibiat	5,0
	Radices Althaeae	50,0
	Aquae q s	

ut fiat electuarium

Alle Stunden den fünften Theil zu geben (zur Förderung der Hautausdünstung, bei rheumatischen Zufällen der Pferde)

Vet Electuarium nervinum

Rp	Camphorae	
	Aloës	55 10,0
	Florum Arnicae	120,0
	Rhizomatis Calami	100,0
	Sulfuris sublimati	30,0
	Farinae secalis	20,0
	Aquae q s	

ut fiat electuarium

Dreistündlich wie ein Hühnerrei gross zu geben (bei chronischem Rheumatismus der Pferde)

Vet Electuarium stimulare HERTWIG

Rp	Camphorae	10,0
	Corticis Quercus	
	Rhizomatis Calami	55 30,0
	Farinae secalinae	30,0
	Aquae q s	

ut fiat electuarium

Den fünften Theil alle vier Stunden (bei asthenischen Zuständen mit Atonie und Reizlosigkeit z. B. bei atonischem Durchfall, Blutharnen, Harnruhr, Schleimflüssen der Pferde und Rinder)

Vet Electuarium stypticum camphoratum
HERTWIG

Rp	Ferri sulfurici crystallisati	
	Camphorae	55 15,0
	Rhizomatis Calami	120,0
	Radices Althaeae	45,0
	Aquae q s	

M f. electuarium

D S Den vierten Theil alle zwei Stunden zu geben (bei asthenischen Krankheiten mit wässriger Blutbereitung, Faulfieber, Harnruhr etc.).

Vet Linimentum camphorato terebinthinatum

Rp	Liquoris Ammonii caustici	100,0
	Olei Rapae raffinati	250,0
	Agitando exacte mixtus adde	
	Olei Terebinthinae	50,0
	Camphorae tritae	20,0

Zum Einreiben der grossen Hausthiere

Vet	Pilulae canum Hundepillen	
Rp	Camphorae	2,0
	Ammonii carbonici pyro oleos	3,0
	Opi	0,5
	Radici Valerianae	20,0
	Saponis pulverat	
	Glycerin	ss 5,0
	Aquae q s	
	Fiant pilulae sexaginta	
	8 Grossen Hunden 3—4 Pillen, kleinen 1—2 Pillen	
	morgens und abends (bei Staupe, Epilepsie,	
	Krämpfen, Lähmung)	

Vet	Spiritus camphoratus opiatu	
Rp	Spiritus camphorati	20,0
	Tincturae Opii simplicis	2,5
	Die Hälfte der Flüssigkeit in ein Ohr des Mutter	
	schweines zu güssen (wenn es die Ferkel nicht	
	snugen lassen will und diese aufzufressen sich	
	anschiekt)	


II Borneolum Borneol. Rechts-Borneol. Borneo-Kampher Baros Kampher Malayischer Kampher. Sumatra-Kampher. $C_{10}H_{16}O$. Mol. Gew. = 154

Dieser Kampher ist sowohl im freien Zustande als auch als Ester (der Essigsäure, Valeriansäure u a Sauren) als Bestandtheil zahlreicher ätherischer Oele nachgewiesen worden. In den grossten Mengen kommt er frei vor in Hohlungen und Rassen, auch unter der Rinde der älteren Stämme von *Dryobalanops aromatica* Gaertn., eines zur Familie der Dipterocarpaceen gehörenden, auf Borneo und Sumatra vorkommenden Baumes. Zur Gewinnung des Naturproduktes müssen die Bäume — und zwar gerade die älteren Stämme — vollständig vernichtet werden. Und da ein Baum von 30—40 Meter Höhe nur wenige Kilo dieses Kamphers liefert, so ist es erklärlich, dass derselbe einen ausserordentlich hohen Preis hat.


Das natürliche Borneol stellt mehr oder weniger bräunliche, aus hexagonalen Krystallfragmenten bestehende Massen dar, welche dem Laurineen Kampher sehr ähnlich sind, doch ist der Geruch etwas abweichend. Er ist zugleich kampher- und pfefferartig und an Ambra erinnernd. Nach dem Umkrystallisiren aus Petroläther oder nach dem Sublimiren erhält man ihn im farblosen Zustande mit dem Schmelzp $203-204^{\circ}C$, Siedep $212^{\circ}C$. Das spec Gew ist niedriger als dasjenige des Wassers. Die alkoholische Lösung dreht die Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts.

Dieser natürliche Kampher gelangt nach Europa nur als überaus seltenes Sammlungspräparat, da er an Ort und Stelle zu religiösen Ceremonien, z B zu Raucherungen bei Begräbnissen und zum Einbalsamiren der Todten verbraucht wird.

Laurineen-Kampher



Borneo-Kampher,



Zum gewöhnlichen Laurineenkampher steht das Borneol im Verhältniss eines sekundären Alkohols zum zugehörigen Keton. Daher kann der Laurineen-Kampher durch Reduktion in Borneol und umgekehrt Borneol durch Oxydation in Laurineen-Kampher verwandelt werden. Diesen Zusammenhang zeigen die beistehenden Formeln.

Borneol, künstliches. Die Darstellung dieser interessanten Verbindung erfolgt durch Reduktion des Laurineen-Kamphers nach mehreren Methoden. Die bequemste ist folgende:

Man löst 1 Th. Laurineen-Kampher in 10 Th. Alkohol (96 Proc) und fügt allmählich 1 Th. metallisches Natrium in kleinen Stückchen hinzu. Nachdem die Wasserstoff-Entwicklung beendet ist, destillirt man den Alkohol ab, wäscht den Rückstand mit Wasser aus, trocknet das zurückbleibende Borneol und reinigt es entweder durch Sublimation oder durch Umkrystallisiren aus Petroläther.

Das künstliche Borneol ist immer — nach welcher Reduktionsmethode man auch arbeiten mag — ein Gemenge von rechtsdrehendem Borneol und linksdrehendem Isoborneol. Nach dem vorstehenden Verfahren erhält man ein Gemenge von etwa 80 Proc Borneol mit 20 Proc Isoborneol.

Dieses als künstliches Borneol in den Handel kommende Gemenge stellt sechsseitige Tafeln oder Blättchen dar, welche (wegen der Anwesenheit des bei $212^{\circ}C$ schmelzenden Isoborneols) bei $206-207^{\circ}C$ schmelzen.

Das Kunstprodukt dreht in alkoholischer Lösung rechts und gleicht in seinen physikalischen Eigenschaften so vollständig dem natürlichen Borneol, dass es gegenwärtig nach dem Osten exportirt wird und dort an Stelle des Naturproduktes bei religiösen Ceremonien tritt. — In Europa gelangt das Borneol zur Verwendung in der Parfümerie.

Laifan ist wasserhaltiges, rohes Borneol, auch roher Ngai-Kampher.

Bornylacetat. $C_{15}H_{17}O \cdot C_2H_3O$. Essigsäure-Bornylester. Ist der Träger des Aromas aller Koniferen-Destillate, z. B. der riechende Bestandtheil der Fichtennadel-Oele. Wird künstlich dargestellt, indem man eine Lösung von Borneol in wasserfreier Essigsäure bei Gegenwart geringer Mengen von Schwefelsäure erhitzt. Der entstandene Ester wird unter vermindertem Drucke destillirt.

Farblose, rhombische Säulen, vom Schmelzp. $29^{\circ} C$. Siedep. $106-107^{\circ} C$. bei 15 mm. Spec. Gew. 0,991 bei $15^{\circ} C$. Leicht löslich in Alkohol und in Aether.

Ngai-Kampher. Blumen-Kampher. Stammt von der in Indien und China einheimischen Composite *Blumea balsamifera* D. C. ab. Dieser Kampher ist mit dem Borneol vollkommen identisch mit dem einzigen Unterschiede, dass seine alkoholische Lösung in demselben Maasse links dreht als das Borneol rechtsdrehend ist. Er ist daher das als Links-Borneol zu bezeichnende optische Isomere des Borneols.

Dieser Kampher ist gleichfalls nicht Gegenstand des Handels.

Camphora monobromata.

Camphora monobromata (Ergänzb. Helv. U-St.). **Camphre monobromé** (Gall.). **Monobromkampher. Bromkampher. Bromure de Camphre. Monobromated Camphor.** $C_{15}H_{15}BrO$. Mol. Gew. = 231.

Lässt man auf Kampher etwa das gleiche Gewicht Brom einwirken, so wird letzteres zunächst addirt und es entsteht die „Kampherdibromid“ genannte additionelle Verbindung $C_{15}H_{13}O \cdot Br_2$. Die Bildung derselben geht besonders rasch vor sich, wenn der Kampher in Chloroform gelöst ist. Sie ist ein roth-braunes Krystallpulver. Erhitzt man diese Verbindung auf dem Wasserbade, so spaltet sie sich in Monobromkampher und Bromwasserstoff.

Darstellung. In einem Kolben *A* von mindestens 600 cem Inhalt bringt man 80 g gepulverten Kampher und lässt durch den Scheidetrichter *B* allmählich 32 g trockenes Brom zufließen. Sobald die Masse sich verflüssigt hat, erwärmt man den Kolben im Wasserbade, zunächst vorsichtig. Es entweicht nun durch das Rohr *C*, welches ziemlich weit sein muss, Bromwasserstoff, welcher in der Vorlage *D* aufgefangen wird. Die Retorte *E* dient dazu, ein Zurücksteigen des vorgelegten Wassers in




Fig. 130. Apparat zur Darstellung des Monobromkamphers. Das Gasabzugsrohr *C* ist ziemlich weit zu wählen.

den Kolben *A* zu verhindern. Wenn die Entwicklung des Bromwasserstoffs nachlässt oder ganz aufhört, so bringt man zu dem Inhalt des Kolbens *A* etwa 80—100 ccm heisses Wasser, schüttelt tüchtig durch, sammelt nach dem Erkalten den farblos gewordenen Monobromkampher, saugt ihn auf einer Porzellanplatte ab und krystallisiert ihn, wenn er trocken geworden ist, aus heissem Alkohol oder heissem Ligroin um (Helv).

Das den Bromwasserstoff enthaltende Wasser in Vorlage *D* kann man durch Neutralisation mit Baryumkarbonat auf Baryumbromid bez. Bromwasserstoff verarbeiten, s. S. 52 und 460.

Eigenschaften Grosse farblose Krystalle (Nadeln oder Schuppen) von schwach kampherartigem Geruch und Geschmack, bei 76° C schmelzend, bei 274° C ohne Zersetzung siedend, schon unter 100° C sublimierend. Löslich in 15 Th. Weingeist, leicht löslich in Aether, Chloroform, heissem Benzin (Ligroin) und in fetten Ölen, fast unlöslich in Wasser, wenig löslich in Glycerin.

Von kalter konz. Schwefelsäure wird Monobromkampher ohne Zersetzung gelöst und aus dieser Lösung durch Zusatz von genügenden Mengen Wasser unverändert wieder abgeschieden. — Schmilzt man eine kleine Menge mit Natriumkarbonat + Salpeter zusammen, so giebt die mit Salpetersäure angesäuerte Lösung der Schmelze auf Zusatz von Silbernitratlösung einen gelblichweissen Niederschlag von Silberbromid. Abspaltung der Bromwasserstoffsäure tritt auch schon ein durch Kochen des Monobromkamphers mit einer genügenden Menge konzentrierter wässriger Silbernitratlösung.

Prüfung 1) Er bilde farblose, bei 76° C schmelzende, neutrale Krystalle, die beim Erhitzen völlig flüchtig sind. 2) Werden 0,5 g mit 10 ccm Wasser geschüttelt, so sei das Filtrat neutral und werde durch Silbernitratlösung nicht merklich getrübt. 3) Werden 0,5 g Kamphermonobromid mit einer Lösung von 1 g Silbernitrat in 20 ccm Wasser 1—2 Stunden auf dem Wasserbade erwärmt, so erhalte man 0,406 g Silberbromid, s. S. 53 u. 58.

Das gefällte Silberbromid ist auf gewogenem Filter oder im Gooch'schen Tiegel zu sammeln, mit Wasser zu waschen und zur Beseitigung des Kamphers mit Alkohol und Aether auszuwaschen. **Aufbewahrung.** In gut verschlossenen Gefässen. Lichtschutz ist nicht erforderlich.

Anwendung Monobromkampher wirkt in kleinen Gaben als Sedativum, erst bei längerem Gebrauch erfolgt Herabsetzung der Pulsfrequenz, auch soll er den Geschlechtstrieb herabsetzen. Grosse Dosen erzeugen Druck und Schmerz im Kopf, geistige Depression, sogar Bewusstlosigkeit. Innerlich zu 0,1—0,5 g als Sedativum bei Epilepsie, Delirium tremens (hier 1,0—1,5 g), Hysterie, Migräne, Chorea, auch bei Strychnin-Vergiftung empfohlen. Subkutan zu 0,1 g in Öl gelöst.

Cannabis.

Gattung der Moraceae — Cannaboidene.

Nur 1 Art *Cannabis sativa* L., Hanf, Chanvre, Hemp. Wahrscheinlich in Centralasien (Sibirien) heimisch, durch die Kultur zur Gewinnung der Fasern, des fetten Oeles und des narkotisch wirkenden Krautes weit verbreitet. Die kleineren männlichen Pflanzen des zweihäusigen Hanfes werden mancherorts als Fimmel (femina), die kräftigeren weiblichen Pflanzen als Mäschel (masculus), also dem wahren Verhalten entgegengesetzt, bezeichnet.

a) † *Herba Cannabis Indicae* (Austr. Ergänz. Helv.) *Cannabis Indica* (Brit. U-St.) *Summitatis Cannabis*. — Indischer Hanf. Indisches Hanfkraut. Haschisch. — Chanvre indien. — Indian Hemp.

Das Kraut der weiblichen blühenden oder mit jungen Früchten versehenen Pflanze und zwar fast ausschliesslich das der in Indien gewachsenen, da der Hanf aus nördlichen Gegenden viel geringere narkotische Eigenschaften hat oder wirkungslos ist

Beschreibung Die Blätter etc sind oft durch ausgetretenes Harz mit einander verklebt. Sie sind langgestielt, gefingert (5—9 zählig), die oberen dreizählig, die obersten ganz ungetheilt. Die Abschnitte schmal lanzettlich, am Rande gesägt, der mittlere Abschnitt ist am längsten. Die weiblichen Blütenstände sind beblätterte Scheinähren mit gehäuftten Blüten. Das Deckblatt der weiblichen Blüthe umgibt dieselbe und lässt nur die 2 Narben hervortreten. Fruchtknoten oberständig mit einem Ovulum. Das Blatt trägt Drüsenhaare mit mehrzelligem Kopf vom Typus der Labiatendrüsen, dickwandige, gekrümmte, einzellige Haare, die am Grunde einen undeutlich geschichteten Cystolithen von Calciumkarbonat enthalten, es führt wie die Rinde und das Mark der Achse Drüsen von Calciumoxalat und im Phloem Milchsaftschläuche mit braunem Inhalt.

Bestandtheile Ueber die die narkotische Wirkung bedingenden Stoffe herrscht wenig Klarheit. Cannabin, Oxycannabin, Cannabinin, Tetano-Cannabin sind nicht einheitlich, sondern anscheinend Gemenge harzartiger Körper vielleicht mit Alkaloiden. Von letzteren werden angegeben Cholin, Trigonellin und Muscarin. Neurendung wird als wirksamer Bestandtheil angegeben Cannabinol C_3H_7O (1895), und ein zu 2,3 Proc erhaltenes rothes Oel Cannabinol (1896), das in Dosen von 0,05 g Haschisch rausch erzeugen soll. Ferner 0,1—0,3 Proc ätherisches Oel, welches Terpen, Sesquiterpen (Cannaben, Cannabenwasserstoff) und einen sauerstoffhaltigen Körper enthält.

Aufbewahrung Vorsichtig und vor Licht geschützt in dicht geschlossenen Blech oder Glasgefassen, das Pulver in braunen Stopfelgläsern.

Anwendung und Wirkung Wirkt zuerst anregend und verursacht Hallucinationen meist angenehmer Art, oft auch Tobsucht, später tiefen Schlaf. Wegen der unangenehmen Nebenwirkungen Erbrechen, Kopfschmerz, Aufregung etc kein brauchbares Hypnoticum. Auch als Sedativum, als Antispasmodicum bei Tetanus, Verstanzen empfohlen. Ferner empfohlen bei Gicht, Rheuma, Intermittens, Hydrophobie, Neuralgien. Antidot bei Strychninvergiftung. 0,25—2,0 g als Pulver, in Pillen oder mit Zucker und Tragant zu Kuchen geformt. (Helv Dosis maxima pro dosi 0,5, pro die 2,0)

Bekannt ist die ausserordentlich ausgedehnte Verwendung der Hanfpräparate als narkotische Genussmittel bei allen muhamedanischen Völkern von Indien bis Marokko. Man fasst die verschiedenen Formen gewöhnlich unter dem Namen Haschisch zusammen. Verwendung finden auch hier nur die Spitzen der weiblichen Pflanzen. Namen der verschiedenen Präparate Churus, Charas, Chur, Ganjah, Gunjah, Bheng, Siddhi, Majun etc.

† **Extractum Cannabis Indicae** Indisch-Hanfextrakt. *Extrait de chanvre de l'Inde*. Fein geschnittenes (Austr) oder grob gepulvertes (Brit Helv U-St) Indisches Hanfkraut wird mit q s Weingeist (87 bezw 91 proc) im Verdrängungswege erschöpft, der Auszug zu einem dicken Extrakt eingedampft. Gall Aus 1000 g mittelfein gepulvertem Kraut mit 6000 g Alkohol (60 proc) ebenso zu bereiten.

Ergänzb lässt das fein zerschnittene Kraut 6, dann 3 Tage lang mit je 5 Th Weingeist ausziehen, die Pressflüssigkeit zu einem dicken Extrakt eindampfen. Dunkelgrün, in Wasser wenig, in Weingeist völlig löslich. Ausbeute aus gutem Kraut 14—16 Proc. Die Verarbeitung der *Herba Cannabis „pro extracto“* ist nicht ratsam.

Dosis max simpl	0,06 Brit	0,1 Austr	0,1 Helv.	0,2 Ergänzb
Dosis max pro die		0,3	0,5	0,6

Wenn dieses Extrakt in flüssigen Arzneiformen verordnet ist, so muss es mit q s einer Mischung aus Gummi und Zucker $\frac{1}{2}$ angerieben werden.

Die Abgabe zum innerlichen Gebrauch ist nur gegen ärztliche Verordnung gestattet.

† **Extractum Cannabis Indicae fluidum**, *Fluid Extract of Indian Cannabis* (U-St). Aus *Herb Cannabis Ind* (No 20) 1000 g und q s Alkohol (91 proc) im Verdrängungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 500 ccm und stellt 1 a 1000 ccm Extrakt her.

† **Tinctura Cannabis Indicae**. Indisch-Hanf-tinktur. *Teinture de Chanvre indien* — *Tincture of Indian Hemp*.

Brit Auflösung von 5 g Extract Cannabis indic in Spiritus q s ad 100 ccm
 Ergänzb 5 g Indischhanfextrakt in 95 g Weingeist zu lösen
 Gall Aus 100 g grobgepulvertem Kraut und 500 g Alkohol (60 proc) durch
 10 tagiges Ausziehen
 Helv lässt aus 20 Th grob gepulvertem Kraut 100 Th, U-St aus 15 g 100 ccm
 Tinktur durch Verdrängung mit Weingeist herstellen
 Klar, dunkelgrün, schwach bitter, von betäubendem Geruch Innerlich je 4—6 Tropf
 1/2 stündlich
 Vorsichtig, vor Licht geschützt aufzubewahren Dosis max simpl 1 g, pro die
 5 g (Helv)

Charta Cannabis Indicae
Indisch-Hanf-Papier

Rp Extract Cannabis Indicae 10,0
 Spiritus 100,0

Mit der Lösung wird Filterpapier getränkt, das
 zuvor in eine Salpeterlösung getaucht und
 getrocknet wurde Man trocknet in gehinder
 Wärme und schneidet in Streifen Diese lässt
 man verglimmen und atmet den Dampf ein

Grüne Lupussalbe UNNA

Rp Acid salicylicum
 Liq Stib chlorati aa 2,0
 Extr Cannabis Ind
 Kreosoti aa 4,0
 Adip Lanae 8,0

Oleum Cannabis Indicae

Aus grob gepulvertem Ind Hanf wie Oleum Bella-
 donnae (S 472) oder durch Lösen von
 Extract Cannabis Ind 1,0
 in Olei Olivarum 20,0
 in der Wärme und Absetzenlassen zu bereiten

Pastilli Cannabis Indicae (Diet)

Rp Extract Cannabis Indicae 5,0
 Sacchari 25,0
 Pastae Cacao 20,0
 Sacchari Vanillini 0,2

Man formt 100 Pastillen mit je 0,05 Hanfextrakt,

Stilus Cannabis uguensis

Cannabis-Salbenstift Diet
 Rp Colophonii 5,0
 Extract Cannabis Indicae 10,0
 Cerae flavae 45,0
 Olei Olivarum 40,0

Man schmilzt und giesst halberkaltet in Stangen-
 formen.

BEYERSDORF's Hühneraugenpflaster ist ein Pflastermull mit Indisch-Hanfextrakt
 und Salicylsäure

Bromidia, ein Schlafmittel, besteht aus Chloralhydrat, Bilsenkraut- und Indisch-
 Hanfextrakt

Cigaretten, Indische. Mit Opium-, Lobelia- und Indisch-Hanfextrakt getränk-
 tes Papier

Cornillin, ein Hühneraugenpflaster von der Zusammensetzung des BEYERSDORF'schen
Cornicide ist Colloodium salicylatum Ergänzb, ebenso das

Hühneraugenmittel des Apothekers RADLAUER in Berlin Ähnliche Mischungen
 sind die

Hühneraugentinkturen von ESSER, KRANICH, SIKORSKI, WÜRFELING, GOLINSKY,
 BARROWSKI, BONGARTZ und HASCHSCH vom Apotheker KARREN

Pulver von BICKFORD & SPOONER ist mit Salpeter behandelter Hanf

† **Cannabinum tannicum.**

Darstellung. Indischem Hanf wird das ätherische Oel durch Destillation mit
 Wasserdämpfen entzogen, derselbe sodann mit Wasser ausgezogen, der Auszug mit Blei-
 acetat gefällt, der Bleiniederschlag mit Schwefelwasserstoff zerlegt und die so in Freiheit
 gesetzten Glykoside an Tannin gebunden — Nach anderer Angabe wird der wässrige Aus-
 zug direkt mit Tannin gefällt

Eigenschaften Gelbgrünes oder mehr bräunliches Pulver von etwas bitterem
 und stark zusammenziehendem Geschmack. Wenig löslich in Wasser, Weingeist und
 Aether, leicht löslich in angesäuertem Weingeist und Wasser Die letztere Lösung wird
 durch Alkalien weisslich gefällt, durch Jodlösung getrübt

Prüfung. Ohne betäubenden Hanfgeruch, auf Platinblech verbrannt, höchstens
 0,1 Proc Rückstand lassend, in 10 Theilen mit 10 Proc. Salzsäure versetztem Weingeist
 ohne Rückstand löslich.

Aufbewahrung. In wohl verschlossenen Gefässen vorsichtig

Anwendung. Bei leichteren Formen der Schlaflosigkeit als Hypnoticum Dosis
 simplex 0,25—1,0, pro die 2,0

Rp Cannabin. tannic. 1,0

Sacch alb 2,0

M i pulv div in p. aeq IV

8 Abends vor dem Schlafengehen ein Pulver

† **Cannabinum purum** Durch Einwirkung von Zinkoxyd auf Cannabintannat als braunes Pulver erhalten

Auf Platinblech erhitzt, ohne Rückstand flüchtig, geschmacklos, in Wasser unlöslich, in Weingeist, Aether, Chloroform leicht löslich In Dosen von 0,05—0,1 wie voriges

† **Haschisch purum** Ein alkoholisches Extrakt aus Cannabis, das man vorher vom aetherischen Oel befreit hat, wud mit Alkalien behandelt und dadurch alle saueren Bestandtheile, fettes Oel etc beseitigt Der nicht an Alkali gebundene Antheil liefert das Präparat Ein braunes Weichharz, in Wasser unlöslich, löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Amylalkohol, Essigäther, Aceton

Wirkt anfangs erregend, später beruhigend Dosis 0,02—0,04

† **Cannabinonum** (Erganzb)⁹⁸ Aus dem vorigen wird schädlich wirkendes Tetanin (?) mit Gerbstoff gefällt, es hinterbleibt dann Cannabinon in Form eines braunen Harzes Soll rein schlafferregend wirken Dosis 0,03—0,1 g

b) Die Früchte **Fructus Cannabis** (Erganzb) **Semen Cannabis** — Hanfsamen. **Hanfkorner** — **Graine ou Semence de chanvre** **Chênevis** (Gall) **Hemp-seed**

Beschreibung Die nusschenartigen Schliessfrüchte sind bis 5 mm lang, 2 mm breit, oval-breit-eiförmig, von der Rückenseite etwas zusammengedrückt, grünlich-graubraun, an beiden Rändern schwach weisslich gekielt, von einem feinen Gefässbündelnetz umspannt Schale dünn, spröde, leicht zerbrechlich In dem sparlichen, graugrünlchen Endosperm liegt der gekrümmte Embryo mit gelben Kotyledonen — In der Fruchtschale palissadenartig gestreckte, an den Seiten faltig verbogene, reichlich poröse Steinzellen Im Embryo 4—8 μ grosse Aleuronkörner mit einem grossen Globoid und Krystallloid

Bestandtheile Fettes Oel 32—58 Proc (vergl unten), Wasser 8,92 Proc, Stickstoffsubstanz 18,23 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 21,06 Proc, Holzfaser 14,97 Proc, Asche 4,24 Proc In der Trockensubstanz Stickstoffsubstanz 20,01 Proc, Fett 35,77 Proc, Stickstoff 3,2 Proc

Einsammlung Aufbewahrung. Die im August gesammelte Frucht wird getrocknet und an einem trocknen Orte aufbewahrt

Anwendung Zu Emulsionen (1 10, die Früchte sind vorher abzuwaschen), zur Gewinnung des fetten Oeles, leicht gequetscht zu Theemischungen

Emulsio Cannabis — Hanfmilch.

(Münch, Nosok-Vorschr)

Rp	Fructus Cannabis	50,0
	Aquae	500,0
	Sirupi simplicis	20,0

Emulsion de chènevis (Gall)

Rp	1 Fructus Cannabis	50,0
	2 Sacchari albi	50,0
	3 Aquae destillatae	1000,0

Man stösst 1 mit $\frac{1}{2}$ von 2 und q s von 3 zur Pasta an und fügt den Rest von 3 hinzu, presst ab und löst den Rest von 2

Extrait Cannabis

Ein aus Hanfsamenmehl bestehendes Geheimmittel.

Vet. Latwerge bei Harnverhalten der Schafe (Diet.)

Emulsio Cannabis composita

Rp	Kali nitrici	5,0
	Natrii nitrici	5,0
	Extracti Hyoscyami	0,5
	Aquae Amygdalar amar	10,0
	Emulsionis Cannabis	200,0

Rp	Fructus Cannabis contus	100,0
	Magnesi sulfurici	50,0
	Amygdalarum amarar	10,0
	Fructus Juniperi contus	25,0
	Farinae Secalis	25,0
	Aquae q s	

Stündlich taubeneigross

Oleum Cannabis Hanfö. **Huile de chanvre.** **Huile de chènevis.** **Hemp seed oil**

Wird aus den gepulverten Früchten durch Auspressen gewonnen Frisch gepresst ist es infolge eines Gehaltes an Chlorophyll hellgrün bis grünlichgelb, mit der Zeit wird es braungelb Von eigenthümlichem Geruch, mildem Geschmack Trocknet leicht Es löst sich in 30 Theilen kalten Alkohols, seine Lösung in 12 Theilen kochenden Alkohols scheidet beim Erkalten Stearin aus

Konstanten Spec Gew 0,925—0,931 Wird bei -15°C dick, bei $-27,5^{\circ}\text{C}$ fest Schmelzpunkt der Fettsäuren 19°C Erstarrungspunkt 15°C Verseifungszahl 193,1 Jodzahl 143—157,5 Jodzahl der Fettsäuren 122,2—125,2 Brechungsindex bei 18°C 1,47843

Bestandtheile. Triglyceride der Stearinsäure und Palmitinsäure, Linolsäure nebst wenig Linolensäure und Isolinolensäure.

Prüfung. Mit Natronlauge gekocht giebt es eine braungelbe, feste (Leinöl eine gelbe, weiche) Seife. — Schwefelsäure färbt intensiv grün, ebenso färbt Salzsäure; altes Oel wird gelbgrün. — Ein Gemisch von gleichen Theilen Wasser, konc. Schwefelsäure und rauchender Salpetersäure giebt mit dem 5 fachen Volum Oel eine Grünfärbung, die in Schwarz und nach 24 Stunden in Rothbraun übergeht. — Besonders charakteristisch die hohe Jodzahl.

Anwendung. In der Technik zur Herstellung^{des} von Seifen. Arzneilich neuerdings empfohlen zu Einreibungen als die Milchsekretion hemmendes Mittel.

Cantharides.

Lytta vesicatoria Fabricius (*Cantharis vesicatoria* L.). Familie der Cantharidae. — Verwendung finden die ganzen Thiere:

† **Cantharides** (Anstr. Germ.). **Cantharis** (Brit. Helv. U-St.). **Kanthariden**. **Blasenkäfer**. **Pflasterkäfer**. **Spanische Fliegen**. — **Cantharides** (Gall.). **Mouches d'Espagne**. — **Blistig-flies**. **Spanish-flies**.

Beschreibung. Der Käfer (die Bezeichnung „Fliege“ ist also falsch) ist länglich, fast cylindrisch, bis 2,5 cm lang, bis 8 mm breit. Von oben gesehen smaragdgrün oder goldgrün, nur das Abdomen ist etwas bläulich oder kupferfarben, die Beine und die elfgliedrigen Fühler schwarz. Der gesenkte Kopf ist fast herzförmig, am Scheitel mit einer Rinne, fein punktiert und weissgrau behaart, mit braunen halbniereförmigen Augen. Das unterste Glied der Fühler ist länger als die übrigen und behaart. Das Halsschild ist schmal, nach hinten verengert, das Brustschild viereckig mit stumpf dreieckigem Schildchen. Flügeldecken fein gerunzelt mit zwei feinen Längsrippen, unten braun, biegsam, nach hinten abgerundet. Die Flügel sind gross, häutig, geädert, braun. Von den sechs Beinen haben die zwei vorderen Paare fünfgliederige, das hintere viergliederige Tarsen mit in zwei ungleiche Hälften gespaltenen Klauen. Die Fühler des Männchens sind halb so lang wie der Körper, die des Weibchens kürzer. Das Durchschnittsgewicht eines Käfers beträgt 0,1 g.




Fig. 140.

Bestandtheile. Die luftgetrocknen Käfer enthalten 7,5–8,5 Proc. Wasser, die gepulverten 7,8–12,45 Proc. Der Gehalt an Asche beträgt bis 6 Proc. (Im Pulver fand DIETRICH bis 10,55 Proc.) Alkohol (90 proc.) nimmt 15 Proc. auf. Sie enthalten ferner 12 Proc. eines gelben, butterartigen Fettes, flüssiges Oel, Harz, einen gelben, in Schwefelkohlenstoff löslichen, und einen rothen, darin unlöslichen Körper, und als wirksamen Stoff 0,3–0,6 Proc. Cantharidin, theilweise an Alkalien gebunden (BAUDIN fand 0,72 Proc. freies Cantharidin, 0,32 Proc. an Alkalien gebunden). Der Sitz des Cantharidins soll in den Genitalien und in den Eiern sein.

Prüfung. Dieselbe hat sich neben der Feststellung des Aschengehaltes auf die gute äussere Beschaffenheit zu richten, dass die Käfer nicht von Schmarotzern (Larve einer Motte: *Tinea flavifrontella*, Käfer: *Anthrenus museorum*, *Hoplia farinosa*) zerfressen sind. Ferner hat man sein Augenmerk darauf zu richten, dass die Käfer nicht etwa mit Alkohol, Benzol oder Aether extrahirt sind, event. unter Zusatz von Schwefelsäure. In letzterem Fall ist die Asche reich an Sulfaten. — Der ätherische Auszug aus guten Kanthariden hinterlässt etwa 10 Proc. eines dicklichen, grünlich-gelben Extrakts, in dem sich Kantharidinkristalle befinden, bereits extrahirte liefern viel weniger Extrakt.

(etwa 2 Proc) — Ferner ist darauf zu achten, dass den Canthariden nicht fremde Käfer beigemengt sind, als solche sind beobachtet *Cetonia aurata*, *Cantharis togata*, *Lytta syriaca*, *Silpha quadripunctata*, *Aromia moschata* — Mit fettem Oel beschwerte Canthariden machen, zwischen Papier sanft gepresst, einen Fettfleck

Bestimmung des Cantharidgehaltes. Zur Bestimmung des Gesamtcantharidins lässt man 25,0 g feingepulverte Canthariden mit 100,0 g Chloroform und 2,0 g Salzsäure eine Nacht stehen, schüttelt dann während 3 Stunden öfter um und filtrirt durch einen bedeckten Trichter 82 ccm des Filtrats (= 15 g Canthariden) werden verdunstet, der Rückstand mit 5 ccm Schwefelkohlenstoff oder Petroläther behandelt, das Ganze auf ein gewogenes Filter gebracht, mit 10 ccm Schwefelkohlenstoff oder Petroläther nachgewaschen, das Filter bei 60° C getrocknet und gewogen. Bei Verwendung von Schwefelkohlenstoff rechnet man 0,01 g für durch denselben gelöstes Cantharidin hinzu. Die Bestimmung des freien, nicht an Alkalien gebundenen Cantharidins geschieht in derselben Weise, nur lässt man die Säure weg — Eine Cantharidinbestimmung ist stets vorzunehmen, die Gäll verlangt 0,5 Proc

Vorkommen und Einsammlung. Heimisch in Mittel und Südeuropa bis Russland in den Monaten Mai bis Juli auf Oleaceen (*Fraxinus*, *Ligustrum*, *Syringa*), Caprifoliaceen (*Sambucus*, *Lonicera*), *Acer*, *Populus*, *Larix*. Die in den frühen Morgenstunden auf ausgebreiteten Tüchern gesammelten Käfer tödtet man in verschlossenen Flaschen, indem man in dieselben auf 1 l Inhalt 5 g Aether giebt, und trocknet sie sorgfältig bei gelinder Wärme (nicht über 30° C), zuletzt über Aetzkalk 5 Th frische Canthariden geben etwa 2 Th trockne

Aufbewahrung. Die Canthariden sind, sobald sie sich leicht zu Pulver zerreiben lassen, in dicht zu verschliessende Standgefässe aus Stein oder Blech zu bringen, in welche man zur Fernhaltung von Insekten einen mit Aether getränkten Wattebausch hängt. Sie werden an einem trockenen Orte vorsichtig aufbewahrt, das grobe Pulver hält man in Blechgefässen, das feine in braunen Stopfseglasern, beide in nicht zu grosser Menge, vorrathig, bei längerer Aufbewahrung verliert das Pulver ganz erheblich an Wirksamkeit.

Germ schreibt das Vorrathighalten der unzerkleinerten Käfer vor, Helv lässt dieselben jährlich erneuern.

Verarbeitung. Beim Pulvern der Canthariden sind besondere Siebe zu verwenden. Der Arbeiter hat eine Schutzbrille anzulegen, Mund und Nase mit einem feuchten Tuche zu verbinden. Das fertige Pulver trocknet man vor dem Einfüllen in die Vorrathgefässe über Aetzkalk nach 100 Th lufttrockene Canthariden liefern 90—94 Th grobes oder 85—88 Th feines Pulver.

Beim Verarbeiten des Pulvers zu Auszügen, Pflastern u. dergl. in der Wärme sind Wasserbad und verschlossene Gefässe zu verwenden, um einer Verflüchtigung des wirksamen Bestandtheils vorzubeugen, da dessen Dämpfe überdas Augen und Lungen höchst gefährlich werden können, arbeitet man unter einem Abzug oder im Freien. Bei trockener Verarbeitung des Pulvers ist dasselbe, um Stauben zu verhüten, mit wenig Alkohol anzufeuchten.

Wirkung und Anwendung. Sie wirken stark reizend auf die Harnwege. Schon geringe Dosen rufen gefährliche Vergiftungen hervor, wobei es zu Albuminurie, Hämaturie, Cystitis etc. kommt, ferner bestehen Dysurie, Strangurie, schmerzhaftes Erektionen. Bei schweren Fällen kommt es zu Respirationsstörungen, Krämpfen und akuter Gastroenteritis. Innerlich als Aphrodisiacum und Diureticum gar nicht mehr im Gebrauch und mit Recht, weil die zuweilen beabsichtigten, anscheinend erotischen Erscheinungen eben nichts anderes als Zeichen schwerer Erkrankung der Harnwege sind. — Aeusserlich als Vesikans bei Pleuritis, Pneumonie, Gelenkrheumatismus, Neuralgien, rheumatischen Zahnschmerzen, Augenentzündungen etc.

Dosis maxima Germ Helv 0,05 g, pro die 0,15 g, Austr 0,2 g

Bei Cantharidenvergiftung infolge äusserer Anwendung Ausspülungen der Blase mit warmem Wasser, warme Sitzbäder, Blutentziehung in der Nierengegend, innerlich Opium — Infolge innerer Anwendung Ausspülungen des Magens, Magenpumpe, schleimige Mittel, Opium. Fette sind zu vermeiden.

Dem freien Verkehr sind Canthariden und ihre Zubereitungen entzogen.

† *Aether cantharidatus*. Spanischfliegenäther (Ergänzb.) *Liquor epispasticus*. Blistering Liquid (Brit.) Aus 10 Th mittelfein gepulverter Canthariden sammelt man nach 24stündigem Stehen mit 15 Th Aether im Verdrängungswege durch Nach-

gossen von q. s. Aether 10 Th. Flüssigkeit. Klare, bräunlich-grüne, schwach saure Flüssigkeit, die vorsichtig und im Kühlen aufzubewahren ist. (Fig. 141. T Trichterrohr, D Deplacirtrichter, b Baumwollbausch, l Luftrohr)

Brit. schreibt Essigäther vor und lässt aus 50 g Kantharidenpulver 100 cem Auszug herstellen.

+ Colloidium cantharidatum s. cantharidale s. vesicans. Spanischfliegen-Kolloidium. Blasenziehendes Kolloidium. — Colloïdion cantharidé. — Blistering Collodion. Germ., Helv. 100 Th. grob gepulverte Spanische Fliegen werden mit q. s. Aether im Perkulator erschöpft, der Auszug in gelinder Wärme zum Sirup eingedampft und mit Kolloidium q. s. zu 100 Th. vermischt.

U-St. 60 g Kantharidenpulver wird im Perkulator mit Chloroform erschöpft, der Auszug auf 15 g eingedampft und mit 85 g elastischem Kolloidium vermischt.

Brit. lässt 5 g Schiessbaumwolle in 200 cem Kantharidenäther (Liq. epispastic. Brit.) lösen.

Emplastrum Cantharidum (Austr.). Empl. Cantharidum ordinarium (Germ.). Empl. Cantharidis (Brit. Helv.). Empl. vesicans s. vesicatorium. Blasenpflaster. Kantharidenpflaster. Spanischfliegenpflaster. — Emplâtre vésicatoire (Gall.). — Cantharides Plaster. Blistering Plaster. Vesicatory.

a. Austr. 100,0 gelbes Wachs 100,0 venetianischer Terpentin, 20,0 Olivenöl schmilzt man, sieht durch, trägt 125,0 gepulverte Kanthariden ein, erwärmt 1 Stunde im Wasserbade, setzt 10,0 Perubalsam zu und lässt erkalten.

b. Brit. Man schmilzt 20,0 Kolophonium, fügt 5,0 Seifenpflaster, dann je 20,0 gelbes Wachs und Schweinefett und zuletzt 35,0 Kantharidenpulver hinzu.

c. Germ. 2 Th. mittelfeines Kantharidenpulver, 1 Th. Olivenöl 2 Stunden im Dampfbad erwärmen, 4 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Terpentin zufügen, rühren bis zum Erkalten.

d. Helv. 25 Th. frisches Kantharidenpulver wird mit 12 Th. Olivenöl 2 Stunden im Wasserbade erwärmt, in eine abgekühlte Mischung aus 50 Th. gelbem Wachs, 8 Th. Terpentin, 5 Th. Elemi eingetragen. Mit Glycerin in Stangen auszurollen und jährlich zu erneuern.

e. Gall. 10 Th. Elemi, 4 Th. Olivenöl, 30 Th. Königsalbe, 40 Th. gelbes Wachs schmilzt man, sieht durch und mischt 42 Th. feines Kantharidenpulver hinzu.

f. Nach H. DIETERICH. 100,0 Olivenöl, 525,0 gelbes Wachs, 125,0 Terpentin

schmilzt man, setzt 10,0 Weingeist mit 1,0 Schwefelsäure, dann 250,0 fein gepulverte Kanthariden hinzu, erwärmt 2 Stunden (60–70° C.) und mischt 2,0 Baryumcarbonat mit 5,0 Weingeist zu. Nach dieser Vorschrift wird auch das gebundene Kantharidin wirksam. In lose bedeckten Kästen aufzubewahren, in Blechgefäßen schmilzt das Pflaster.

Emplastrum Cantharidum extensum. Um ein sauberes Pflaster zu erhalten, streicht man die Masse auf Wachspapier, schneidet mit der Scheere die gewünschte Form, drückt auf gestrichenes Heftpflaster und zieht das zuvor mit Aether oder Benzin benetzte Wachspapier glatt ab.

Emplastrum Cantharidum d'Albespeyres. (Ergänz.) Albespeyres Pflaster. 35,0 Kolophonium, 15,0 gelbes Wachs, 12,0 Terpentin, 5,0 Hammeltalg, 2,0 Storax schmilzt man, sieht durch, lässt mit 80,0 mittelfein gepulverten spanischen Fliegen 1 Stunde bei 60–65° C. stehen und streicht dann.




Fig. 141.

Dieses Pflaster kommt in Originalpackung auf grünes Wachstuch gestrichen in den Handel und zeichnet sich durch Haltbarkeit und zuverlässige Wirkung aus

Emplastrum Cantharidum perpetuum. (Austr Germ Helv) Empl calefaciens (Brit) Empl epispasticum Empl Euphorbiae Janini s Jaegeri Empl vesicans mediolanense (Gall) s vesicatorium perpetuum Immetwährendes Spanischfliegenpflaster Bestandiges Kantharidenpflaster (Zugpflaster Germ) — Mouches de Milan Emplâtre a mouche de Milan Vesicatoire de Janin — Warming plaster

a Germ 14,0 Kolophonum, 7,0 Terpentin, 10,0 gelbes Wachs, 4,0 Talg schmilzt man und setzt 4,0 mittelfein gepulverte Kanthariden, 1,0 Euphorbium zu

b Helv 30,0 Elemi, 20,0 gelbes Wachs, 10,0 Storax schmilzt man und fñgt 5,0 Kampher in 5,0 Olivenöl gelöst und 30,0 fein gepulverte Kanthariden hinzu Zu einer „Mouche de Milan“ nimmt man 1 g hiervon

c Austr Je 30,0 Venetianischen Terpentin und Mastix schmilzt man und setzt 10,0 gepulverte Kanthariden, 5,0 gepulvertes Euphorbium hinzu

d Brit 10,0 Kantharidenpulver zieht man 6 Stunden mit 50 ccm siedendem Wasser aus, presst dampft die Flüssigkeit auf $\frac{1}{3}$ ein und schmilzt 10,0 gelbes Wachs, 10,0 Kolophonum, 130,0 Heftpflaster, 30,0 Seifenpflaster hinzu

Gall Je 50 Th Burgunder Pech und gelbes Wachs schmilzt man, seih durch, erwärmt mit 50 Th feinem Kantharidenpulver 2 Stunden im Wasserbade, fñgt 10 Th venetianischen Terpentin hinzu, rñhrt bis zum Erkalten und setzt je 1 Th Lavendelöl und Thymianöl hinzu Wird in flachgedrückten Kugeln zu 1 g, in ein Stück schwarze Seide von 6 cm Durchmesser eingeschlagen, abgegeben

Emplastrum Drouoti Empl Mezerei cantharidatum (Ergänzb) Pannus vesicatorius Taffetas vesicans Empl epispasticum Drouoti Drouot'sches Pflaster Blasenstoff Spanischfliegen Seidelbastpflaster — In einer aus 30,0 grobem Kantharidenpulver, 10,0 fein zerschnittener Seidelbastrinde, 100,0 Essigthei bereiteten Tinktur löst man 4,0 Sandarak, 2,0 Elemi, 2,0 Pichtenharz und bestreicht mit tollst breiten Pinsels ausgespannten, vorher mit einer Lösung von 20,0 Hausenblase und 2,0 Zucker in 200,0 Wasser überzogenen Seidentaffet Vorstehendes Verhältniss in Grammen liefert 3000 □cm (s auch unter Empl adhaesivum Anglicum)

Extractum Cantharidum Extrait éthéré de cantharide (Gall) ist wie Extr Cinae aethereum (Gall) zu bereiten

Extrait alcoolique de cantharide (Gall) wie Extr Scillae

Linimentum Cantharidis (Nation Form 1896) Cantharides pulv 150,0 g werden in der Wärme mit 1000 ccm Terpentlnöl ausgezogen, das Filtrat wird mit Terpentlnöl auf 1000 ccm gebracht

Oleum cantharidatum (Germ) Spanischfliegenöl Huile de cantharide (Gall) 8 Th grobes Kantharidenpulver werden mit 10 Th Olivenöl 10 Stunden im Dampfbade behandelt, gepresst und filtrirt Gall Aus 1 Th grobem Kantharidenpulver und 10 Th Olivenöl durch 6 stündiges Erwärmen Dieses Oel wird zweckmassiger durch Oleum Cantharidini ersetzt

Sparadrap vesicans (Gall) Je 25 Th gelbes Wachs, schwarzes Pech und Kolophonum schmilzt man, seih durch, fñgt 2 Th Olivenöl und je 4 Th Glycerin und venetianischen Terpentin, zuletzt unter Umrñhren 40 Th mittelfeines Kantharidenpulver hinzu Nach halbstündigem Erwärmen im Wasserbade wird die Masse auf Wachstuch gestrichen

† **Tinctura Cantharidum** (Austr Germ) s. Cantharidis (Brit Helv U-St) Spanischfliegentinktur Kantharidentinktur — Teinture ou Alcoolé de cantharide (Gall) — Tincture of Cantharides

a Germ Grobes Kantharidenpulver 1,0, Spiritus 10,0

b Helv Aus 10 Th Kantharidenpulver und q s Weingeist (94 proc) stellt man durch Verdrängung 100 Th Tinktur dar

c Austr Aus Kantharidenpulver wie Tinet Aconiti (Austr), doch mit 87 proc Weingeist zu bereiten

d Brit Kantharidenpulver 12,5 g, Spiritus (90 Proc) 1000 ccm Durch Maceration zu bereiten

e U-St aus 50 g Kantharidenpulver 1000 ccm Tinktur wie nach Helv herstellen

f Gall Grobes Kantharidenpulver 1 Th, Alkohol (80 proc) 10 Th, 10 Tage zu maceriren

Grñulichgelbe Tinktur, mit Wasser gemischt milchig trñbe Vorsñchtig aufzubewahren

Grösste Einzelgabe	Austr 0,5	Germ Helv 0,5
Grösste Tagesgabe	1,0	1,5

Gegen Anfallen der Haare (HUSEMANN)

Rp	Tincturae Cantharidum	1,0
	Spiritus Sinapis	5,0
	Spiritus	50,0
	Olei Lavandulae	
	Olei Amygd amar	8th
	Olei Rosae	
	Olei Aurantii Florum	87 0,25

Rp	Tincturae Cantharidum	
	Mixtura odoriferae	aa 0,5
	Olei Ricini	50,0

Haaröl

Jeden 2 Tag die Kopfhaut einreiben

† Tinctura Cantharidum aetherea. 1,0 Kantharidenpulver, 7,0 Aether, 8,0 Wein geist (90 proc) Man macerirt und bringt ohne auszupressen aufs Filter
Gall Teinture étherée de cantharide Cantharidum gr pulv 10,0, Aethers acetic 100,0 Im Verdrängungswege zu bereiten (Fig 141)

Unguentum Cantharidum (Germ) s Cantharidis (Brit Helv) Ceratum Cantharidum Ungt irritans Spanischfliegensalbe Kantharidensalbe Reiz salbe Fontanellsalbe Pommade épispastique — Cantharides Ointment

a Germ 3 Th Oleum cantharidatum, 2 Th Cera flava

b Helv lässt 2 Th frisch gepulverte Kanthariden mit 8 Th Olivenöl 4 Stunden im Dampfbade erwärmen, pressen, filtrieren und 6 Th des Filtrates mit 4 Th weissem Wachs zusammenschmelzen

c Brit 3 Th Kanthariden, 80 Th Benzoeöfett digerirt man 12 Stunden (bei etwa 50° C) und seigt unter gehindem Pressen durch

d Gall 1) Pomatum luteum de Cantharide. Pommade épispastique jaune 60 Th grobes Kantharidenpulver erwärmt man mit 840 Th Schweinefett 4 Stunden im Wasserbade, lässt absetzen, giesst klar ab, digerirt 1 Stunde mit 4 Th Karkumapulver, filtrirt im Heisswassersichter, schmilzt 120 Th gelbes Wachs hinzu, rührt kalt und giebt 4 Th Citronenöl hinzu

2) Pomatum viride cum Cantharide. Pommade épispastique verte 280 Th Pappelsalbe werden mit 40 Th weissem Wachs zusammengeschmolzen und 10 Th Kantharidenpulver zugemischt

Die Salbe dient zum Offenhalten von Wunden und ist im Handverkauf mit Vorsicht abzugeben

Pommade pour Papier épispastique

Rp	Sebi ovilis	240,0
	Adipis benzoati	360,0
	Cantharidum gr m pulv	100,0

Man erwärmt 2 Tage im Wasserbade, presst ab und filtrirt heiss

Charta epispastica (Gall) Papier épispastique

	No I	No II	No III
Rp Unguenta A	360	450	600
Adipis benzoati	150	90	—
Sebi ovilis	100	80	—
Cerae albae	60	60	60

Durch einseitiges Auftragen der geschmolzenen Salben auf Papierstreifen erhält man die Papiere No I, II, III

† Acetum Cantharidis (Brit)
Vinegar of Cantharides

Rp	Cantharidum gr pulv	100,0 g
	Acidi acetic glacial (88%)	
	Aquae aa q s	

Man macerirt mit 900 ccm und sammelt im Verdrängungswege 1000 ccm

Balsamum Vinariense

Linimentum Saponis rubefaciens
Weimarscher Seifenbalsam.

Rp	1 Linimentum saponato-camp	80,0
	2 Olei Terebinthinae	5,0
	3 Tincturae Cantharidum	2,5

Man schmilzt 1, setzt 2 und 3 zu und kühlt schnell ab

Ceratum Cantharidis (U-St)

Rp	1 Cantharidum pulv (No 60)	320,0 g
	2 Cerae flavae	180,0 "
	3 Colophoni	180,0 "
	4 Adipis anili	220,0 "
	5 Olei Terebinthinae	150,0 ccm

Man macerirt 1 mit 5 48 Stunden, fügt 2, 3, 4 geschmolzen hinzu und dampft im Wasserbade bis auf 1000 g ein

Charta antirheumatica stimulans
Reizendes Gichtpapier

Rp	Resinae Pini	100,0
	Cerae flavae	50,0

schmilzt man, fügt

Tincturae Cantharidum	
Tincturae Euphorbii	aa 4,0

hinzu, verdunstet den Weingeist im Wasserbade und verfährt wie bei Charta cerata

Collempastrum Cantharidini (Diet)

Rp	Massae ad Collempastrum	300,0
	Rhizomatis Iridis pulver	32,0
	Sandaracae	20,0
	Olei Rosinae Pini (Harzöl)	20,0
	Acidi salicylici	6,0
	Cantharidini sublt pulv	2,5
	Aethers	150,0

Bereitung wie Collempastrum Arneae (S 385)

Collempastrum Cantharidini perpetuum (Diet)

Wie voriges, doch nur mit 0,25 Cantharidini und 80,0 Rhizom Iridis, und statt Sandarak mit 50,0 Euphorbium und 20,0 Olibanum zu bereiten.

Emplastrum Cantharidum Berolinense

Bandpflaster

Rp	Terebinthinae larum	200
	Cerae flavae	300
	Resinae Pini	120
	Sebi ovilis	70

Man schmilzt, flüßt

	Euphorbia pulv	10,0
	Cantharidum pulv	10,0
	Sandaracae pulv	25,0

hinzu, streicht auf Seidenzeug und schneidet in 3 cm breite Streifen. Aus diesen erhält man mittelst eines Pflasterstechers ohrförmige Stücke (Ohrpflaster, Zahnpflaster)

Emplastrum Cantharidum FERRARI

entspricht dem Empl Cantharid perpet. Germ., erhält aber noch wenig Styrae und Oleum Thymi

Emplastrum Cantharidum camphoratum

Vesicatorium camphoratum Vésicatoire camphré (Gall)

Emplastrum Cantharidum extensum wird mittelst eines Pinsels mit Aether camphoratus bestrichen

Emplastrum Cantharidum Imbecense

LUEBECK'sches Blasenpflaster

Rp	Colophonii	20,0
	Resinae Pini	20,0
	Styracis liquidae	10,0
	Cantharidum sub pulv	10,0

Emplastrum ad clavos pedum KREIMHOLZ

Rp	Emplastri Litharg comp	40,0
	Emplastri Galbani	10,0
	Picis navalis	20,0
	Ammonii hydrochlor	1,5
	Aeruginis	1,5
	Cantharidum	1,0

Emplastrum Picis cantharidatum (U-St.)

Warming Plaster

Rp Cerat Cantharidis 80,0 g
Durch Schmelzen und Durchsieben trennt man von den Canthariden, fügt zum flüssigen Telle Resinae Pini Burgund q s ad 1000,0 g und bereitet 1 s eine gleichmäßige Masse.

Emulsio Cantharidum VAN MONS

Rp	Olei cantharidum	6,0
	Vitellum ovi unius	
	Mellis depurata	30,0
	Gummi arabici	10,0
	Aquae Juniperi	90,0

† Extractum Cantharidum

Rp	1 Cantharidum gr m pulver	100,0
	2 Spiritus diluti	1000,0
	3 Spiritus diluti	800,0

Man zieht zuerst mit 2 dann mit 3 aus, filtriert und dampft zum dicken Extrakt ein. Ausbeute etwa 60 Procent.

Globuli ad fonticulos

Fontanellerbsen Eitererbsen

Globulos e Rhizomate Iridis magnitudine pisi parvi

beutet man mit einer Mixtur aus

	Tincturae Cantharidum	10,0
	Balsami Tolutani	1,0

Limentum orinale

(Amer Drugg)

Rp	Cantharidini	0,06
	Aetheris acetici	7,5
	Spiritus	90,0
	Olei Ricini	30,0
	Olei Lavandulae gttis	15

Linimentum vesicans SWEDIAUR.

Rp	Cantharidum contusar	60
	Camphorae	10,0
	Olei Olivarum	5,0
	Olei Terebinthinae	20,0

Digeriren, auspressen, filtriren

Mittel gegen Harnaussfall LEISTHOW

Rp	Tincturae Cantharidum	3,0
	Chlorali hydrati	20
	Lanolini	5,0
	Vasolini	
	Aquae Laurocerasi	
	Aquae Calcis	33 10,0

Oleum Cantharidini (Diet)

(Loco Olei cantharidati)

Rp	Cantharidini pulverati	1,0
	Acetoni	40,0

Man löst im Wasserbade in verschlossenem Glaskolben, trägt allmählich in

Olei Olivarum 960,0

das auf 50° C erwärmt ist, und bewahrt bei Zimmerwärme in gelben Stöpselgläsern auf

Pilulae antenureticae MEISSNER

Gegen Bettläsungen

Rp	Cantharidum pulverat	0,66
	Ferri pulverati	1,33
	Succi Iiquiritiae	5,0

M f pilulae No 100

Pilulae stimulantia SUNDLIN

Rp	Cantharidum	0,4
	Fructus Capsici	0,6
	Camphorae	1,6
	Resinae Guajaci	5,0
	Tincturae Colocynth q s	

f pilul No 100

Pomata trichophytica DUPUYTREN

Rp	Medullae osseum bovin.	100,0
	Balsami Peruviani	4,0
	Olei Cinnamomi	2,0
	Olea Bergamottae	1,0
	Tincturae Cantharidum	1,5
	Mixturae oleoso balsamicae	3,5

D S. DUPUYTREN'sche Haarwuchspomade.

Rattengift (Apoth Zeitg)

Rp	Cantharidum pulverat	40,0
	Mati pulverati	480,0
	Moschi	0,06
	Olei Ligni Rhodii	
	Olei Carvi	33 gttis 6
	Sacchari fusi	60,0

M f pasta Man legt kleine Kugelnchen aus

Saponimentum Cantharidini UNNA.

Cantharidin-Opodeldoid (Diet)

Rp	Saponis stearin dialys	100,0
	Saponis olein dialys	50,0
	Spiritus (90%)	450,0
	Aquae	25,0

Man löst durch Digestion und fügt hinzu eine Lösung aus

	Cantharidini	5,0
	Acetoni	300,0

Spiritus contra alopeciaem syphiliticam

LANGLEBERT

Rp	Tincturae Cantharidum	5,0
	Hydrargyri bichlorati	0,06
	Spiritus	
	Spiritus Melissae	33 40 0
	Aquae Rosae	20,0

Spiritus crinalis**Haarspiritus**

1 (Gaz. hebdomadaire de méd.)

Rp	Tincturae Cantharidum	
	Acidi tannici	aa 8,5
	Chinini hydrochlor	
	Ligni Santali	aa 1,5
	Glycerini	20,0
	Spiritus Colonienensis	15,0
	Vanillae	0,4
	Spiritus diluti q s ad 300,0	

2 (Form americana)

Rp	Tincturae Cantharidum	
	Tincturae Capsici	aa 4,0
	Tincturae Gallarum	8,0
	Spiritus (88%)	
	Spiritus Colonienensis	aa 180,0
	Olei Ricini	75,0

8 Gegen Kopfschmerzen

(Ball. of Pharm.)

Rp	Tincturae Cantharidum	8,5 cem
	Tincturae Chini	7,5 "
	Phloeraphini hydrochlor	0,24 g
	Chlorali hydrati	36 "
	Glycerini	28 cem
	Bay Rum	q s ad 450 "

Spiritus crinalis roborans**Haar-Tonicum (Ph. Era)**

Rp	Tincturae Cantharidum	14 cem
	Liquor Ammon caust arom	28 "
	Mixtura oleoso-balsam	113 "
	Glycerinal	142 "
	Aquae Rosae	568 "
	Spiritus	q s ad 908 "

Spiritus trichophyticus**Haarwuchswasser**

Rp	Tincturae Cantharidum	1,0
	Acidi salicylici	2,0
	Mixtura oleoso balsam	20,0
	Spiritus	80,0
	Glycerini	80,0
	Aquae Rosae	80,0

Täglich die Kopfhaut an befeuchten.

Spiritus trichophyticus ERNSTEIN

Rp	Tincturae Cantharidum	10,0
	Spiritus Sinapis	1,0
	Olei Lavandulae	
	Olei Amygdalis amar aesth.	
	Olei Rosae	
	Olei Auranti florum	aa gttis 5
	Spiritus	100,0

Jeden 2 Tag 1 Theelöffel voll in die Kopfhaut ansureiben

Unguentum ad fonticulos BERO

Rp	Extracti Mezerei	1,0
	Terebinthinae laticinae	5,0
	Unguenti Cantharidum	20,0
	Unguenti basilici	50,0
	Capri acetici subit pulv	4,0

Unguentum ad fonticulos (Ergänzb.)

Rp	Euphorbi subit. pulv	1,0
	Unguent. Cantharid.	18,0

Unguentum epispasticum**Unguentum irritans Lausannense.**

Rp	Unguenti Cantharidum	
	Unguenti Althaeae	aa 10,0
	Olei Citri	gttis 2

Vet Charge de Lebas (Gall)

	Lebas scharfe Einreibung	
Rp	Adipis suill	125,0
	Picea liquid abietum	125,0
	Tinctur Cantharidum	100,0
	Olei Terebinthinae	100,0

Vet Charge résolutive (Gall)

Rp	Picea liq Lanthanacea	250,0
	Petrolei albi	75,0
	Tincturae Cantharidum	75,0

Vet Emplastrum acre**Scharfes Pflaster Piaphackenpflaster**

Rp	Cantharidum pulver	25,0
	Euphorbi pulver	5,0
	Terebinthinae	
	Olei Olivarum	aa 125
	Cerae flavae	45,0

digerirt man einige Stunden im Dampfbade

Vet Emplastrum Cantharidum pro usa veterinario (Germ.)

Rp	1 Colophonii	8,0
	2 Terebinthinae	6,0
	3 Cantharidum gr m pulv	8,0
	4 Euphorbi subtile pulv	1,0

Man schmilzt 1 und 2 und setzt 3 und 4 hinzu.

Vet. Oleum acre**Oleum irritans Anglicum Feu anglais**

Rp	Euphorbi pulverat	
	Cantharidum pulverat	aa 1,0
	Olei Terebinthinae	
	Olei Olivarum	aa 50,0

Man digerirt 1 Tag und filtrirt.

Vet. Oleum acre BLISTER.

Rp	Olei Rapae	250,0
	Olei Terebinthinae	50,0
	Cantharidum pulverat	20,0
	Euphorbi pulverat	10,0

Einige Tage digeriren. Vor dem Gebrauch umzu schütteln

Vet. Spiritus acor**Feu français**

Rp	Tincturae Cantharidum	
	Tincturae Euphorbi	
	Spiritus	aa

Vet. Tinctura Cantharidum concentrata, s fortior

Rp	Cantharidum pulverat	1,0
	Spiritus	5,0

Vet. Unguentum Cantharidum pro usa veterinario (Germ.) Ungt. acre**Scharfe Salbe Spathsalbe**

Rp	1. Cantharidum subtile pulv	2,0
	2. Olei Olivarum	4,0
	3. Cerae flavae	1,0
	4. Terebinthinae	2,0
	5. Euphorbi subtile pulv	1,0

1 und 2 werden 10 Stunden im Dampfbade erwärmt, 3 und 4 zugefügt, dann mit 5 bis zum Erkalten gerührt

Vet. Unguentum vesicatorium (Gall)**Onguent résicatoire Lebas**

Rp	Cerae flavae	5,0
	Picea nigrae	4,0
	Resinae Pin	4,0
	Olei Olivarum	10,0
	Cantharidum gr m pulv	8,0
	Euphorbi pulv	2,0

Vet. Unguentum vesicatorium mercuriale (Gall)**Onguent résolutif Traubot.**

Rp	Unguenti vesicatori Lebas	
	Unguenti mercurialis duplicis (50%)	aa

Geheimmittel

Berenizon von Wortley, Haarwuchsmittel Enthalt Perubalsam, Ricinusöl, China tinktur, Kantharidentinktur, Weingeist, Rosenwasser

Blistering Ointment von James, für Späth, Ueberbein etc., besteht aus Kantha-

riden 12,5, Euphorbium 25,0, gelbes Wachs 4,0, Kolophonium 6,0, Terpentan 15,0, Fett 60,0

b Laq Blster Kanthariden 120,0, Euphorbium 30,0, Methylalkohol 550,0

Blistering Ointment von James, für Späth, Ueberbein etc., besteht aus Kanthariden, Euphorbium, Elemisalbe, Wacholder, Rosmarin und Terpentinöl

Gichtbalsam, nach Dr LAVILLER Bestandtheile Kanthariden, Salmiakgeist, Spiritus, Seife, Kumpfer, Rosmarinöl

Gliadinpflaster von Kloss, enthält als Hauptbestandtheil Kanthariden und Euphorbium

Haarbalsam, von Schwarzlose Ein Spiritus Coloniensis mit Storax, Fett, Pottasche und wahrscheinlich auch Kantharidenauszug

Haar balsam, WACKERSOWS Carmin, Koloquintenextrakt, Kantharidentinktur, Perubalsam mit Haarpomade gemischt

Haarwuchshelfer von Wilson, enthält Kantharidentinktur, Mandelöl, Salmiakgeist, Citronenöl, Rosmarinspiritus

Hair-Wash von Dr LESLIE besteht aus Alkohol, Ricinusöl, Kantharidentinktur, Macis- und Rosenöl

Kronathyl soll ein ätherischer Auszug aus chinesischen Kanthariden sein

Pariser Kantharidenpflaster wird aus starker Kantharidentinktur, Harz, Perubalsam und eingedicktem Leinöl bereitet

Pastillen, aromatische von STEHL, sind aus Eisensulfat, Kantharidentinktur, Zucker und Zimmbwasser hergestellt

Prolifisches Pulver, zur Stärkung der Manneskraft Im wesentlichen Kanthariden, Cascarella, China, Kubeben, Zimmt, Zucker

Shampooflüssigkeit, ein amerikanisches Haarwasser 1000,0 Rum, 120,0 Weingeist, 3,0 Kantharidentinktur, 5,0 Ammoniumkarbonat und 10,0 Kaliumkarbonat

Taffetas vesicans DUBOISSON wird mit weingeistigem Kantharidenauszug und Gelatinelösung wie Englisches Pflaster hergestellt

†† **Cantharidinum** (Ergänzb) **Kantharidenkampher. Cantharidine** (Gall)
 $C_{10}H_{12}O_4$ Mol Gew = 196

Die Wahl des Ausgangsmaterials zur Herstellung des Cantharidins hängt vom jeweiligen Preise des Rohmaterials und von seinem Gehalt an Cantharidin ab Im Nachfolgenden ist angenommen, dass es sich um Kanthariden handelt Da das Cantharidin in den Blasenkafern nur zum Theil im feinen Zustande, zu einem anderen Theile an Alkali gebunden vorhanden ist, so muss man dieses letztere in geeigneter Weise (durch Saure Zusatz) in freien Zustand bringen


Darstellung 1000 g mittelfein gepulverte, chinesische Kanthariden werden mit einer Mischung aus 20 g konz Schwefelsäure und 1500 g Essigäther zwei Tage lang bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen Dann mischt man mit Hilfe eines Holzspatels (nicht mit den Händen!) 40 g Baryumkarbonat darunter, bringt das Gemisch in einen Extraktionsapparat und erschöpft es in diesem durch Extraktion mit Essigäther — Nachdem von dem Auszuge der Essigäther abdestillirt worden ist, wird der aus Fett, Harz und Cantharidin bestehende Rückstand 8 Tage lang sich selbst überlassen, damit das Cantharidin auskrystallisiren kann

Nach dieser Zeit wird der Rückstand mit 200,0 g Petroläther (0,74 sp G) übergossen und gelinde erwärmt, um das Fett zu lösen, die Lösung abfiltrirt, das Cantharidin mit Petroläther gewaschen und aus 90proc Alkohol in der Wärme umkrystallisirt Das so erhaltene Cantharidin ist fast weiss und als „Vesikans“ hinreichend rein Wird es z B zu subkutanen Injektionen völlig rein verlangt, so muss es unter Zusatz von Knochenkohle aus Essigäther umkrystallisirt werden (DIERFELDER)

Eigenschaften Farblose, glänzende, geruchlose, neutrale Säulen oder Blättchen des rhombischen Systems, welche bei 218° C schmelzen, darüber hinaus erhitzt als weisse Nadeln sublimiren Es löst sich in 30000 Th kaltem oder 15000 Th siedendem Wasser In Wasser, welches Säuren, z B Schwefelsäure, oder ätherische Oele gelöst enthält, ist es reichlicher löslich Es löst sich ferner in 3800 Th Alkohol von 90 Proc, oder in 1650 Th

Schwefelkohlenstoff, in 560 Th Aether, oder 65 Th Chloroform oder 40 Th Aceton. Es löst sich ferner reichlich in Eisessig, conc Schwefelsäure, in fetten Oelen, Wachs und Harz. Es ist nach Gall schon bei gewöhnlicher Temperatur merklich flüchtig und beginnt schon oberhalb 120° C zu sublimiren.

Seinen chemischen Eigenschaften nach stellt es sich als das Anhydrid der zweibasischen, im freien Zustande nicht bekannten Cantharidinsäure $C_{10}H_{16}O_8$ dar. Behandelt man es unter Erwärmen mit Kali oder Natronlauge, so geht es (langsam auch bei Einwirkung von Ammoniak) in Lösung unter Bildung cantharidinsaurer Salze, z B



Diese Salze sind wenig beständig, sie werden z B schon durch Einwirkung der Luftkohlensäure theilweise zerlegt. Behandelt man sie mit stärkeren Säuren, so erhält man nicht die freie Cantharidinsäure, sondern ihr Anhydrid, das Cantharidin.

Nachweis. Der chemische Nachweis des Cantharidins stösst auf Schwierigkeiten, weil der Verbindung charakteristische Reactionen mangeln. Für die Alkalisalze des Cantharidins werden folgende Reactionen angegeben. Die nicht zu sehr verdünnte Lösung giebt 1) Mit Calciumchlorid, Baryumchlorid, Quecksilberchlorid und Silbernitrat weisse, krystallinische Niederschläge. 2) Mit Kupfersulfat einen grünblauen, körnig-krystallinischen Niederschlag. 3) Mit Kobaltoxydullösung eine blassrothe, in Wasser äusserst schwer lösliche Fällung, mit Niccolsulfat eine grüne Fällung. 4) Mit Palladiumchlorid entsteht zunächst nur eine Trübung, nach 24stündiger Einwirkung aber ein Netzwerk hellgelber Krystallnadeln. 5) Erhitzt man Cantharidin mit conc Schwefelsäure unter Zusatz von etwas Kaliumchromat, so entsteht prächtig grüne Färbung, die nach einigen Stunden trüb blattgrün wird.

Diese Reactionen sind natürlich nicht gerade eigenartig für das Cantharidin und beweisen deshalb dessen Anwesenheit nicht.

Man ist daher in den meisten Fällen auf den physiologischen Nachweis des Cantharidins angewiesen, und zwar um so mehr, als es sich in der Regel um den Nachweis so geringer Mengen handeln wird, dass die Erzielung messbarer Krystalle und die Ausführung von Schmelzpunkts-Bestimmungen nicht möglich ist. — Um in Speiseresten, Organtheilen etc das Vorhandensein von Cantharidin festzustellen, verfährt man nach DRAGENDORF wie folgt:

Die zu untersuchenden Substanzen werden, wenn nöthig, fein zerschnitten und mit Kalilauge von 8 Proc. so lange erwärmt, bis eine gleichartige Flüssigkeit entstanden ist. Diese Flüssigkeit wird nach dem Erkalten, wenn nöthig, mit Wasser verdünnt und dann mit Chloroform mehrmals ausgeschüttelt, um Unreinigkeiten (z B Fett) zu beseitigen. Nachdem das Chloroform abgetrennt worden ist, wird durch verdünnte Schwefelsäure übersättigt und sogleich mit etwa dem vierfachen Volumen Alkohol von ca 95 Proc gemischt. Die Mischung wird am Rückflusskühler einige Zeit im Sieden erhalten, dann heiss filtrirt, das Filtrat möglichst stark abgekühlt, alsdann nochmals filtrirt und dann durch Destillation vom Alkohol befreit. Die zurückbleibende, wässrige Flüssigkeit wird hierauf mit Chloroform behandelt, nachdem zuerst die an den Wandungen des Destillationskolbens haftenden Substanzen durch dasselbe aufgenommen worden sind, soweit sie sich in Chloroform lösen. Die Chloroform-Auszüge werden zunächst durch Waschen mit Wasser von etwa anhaftender Schwefelsäure befreit, dann zur Verdunstung gebracht. Einen etwa hinterbleibenden Rückstand prüft man auf das Vorhandensein von Krystallen (durch das Mikroskop und Polarisations-Mikroskop) und stellt schliesslich den physiologischen Versuch an.

Physiologischer Versuch. Man reibt den Rückstand der Chloroform-Auszüge mit wenigen Tropfen Mandelöl an, nimmt die ölige Lösung alsdann mit etwas Watte auf und applicirt diese auf den Oberarm einer Versuchsperson in der Weise, dass man auf die abgetrocknete Hautstelle zunächst den ölgigen Wattebausch bringt, darüber etwas Guttaperchapapier auflegt und nun einen leichten Verband anlegt. Ist im Rückstand Cantharidin enthalten gewesen, so entsteht an der Applikationsstelle nach 3–6–12 Stunden lebhafte Rötthung der Haut, die sich schon nach 0,00015 g Cantharidin bis zur Blasenbildung steigern kann.

Aufbewahrung Sehr vorsichtig, in gut verschlossenen Gefässen, Lichtschutz ist nicht erforderlich

Prüfung Die Prüfung kann sich, wenn erforderlich, auf die Feststellung der völligen Flüchtigkeit beim Erhitzen, sowie auf die Ermittlung des Schmelzpunktes beschränken. Doch sei man beim Hantieren mit Cantharidin ausserst vorsichtig

Anwendung Das Cantharidin beginnt sich immer mehr als Ersatz der Kanthariden zur Herstellung von Vesikationen Eingang zu verschaffen. Diese Ersetzung der Kanthariden durch Cantharidin ist auch durchaus zu billigen, weil man das Cantharidin leicht genau dosieren kann, während der Cantharidgehalt der spanischen Fliegen sehr wechselnd ist. Man gebraucht es ferner zur Herstellung der sog. **LIEBREICH'schen Mittel**. Bei der ausserlichen Anwendung rechnet man 1 Th. Cantharidin als gleichwerthig mit 200 Th. Kanthariden.

† **Solutio Kali cantharidini Liebreich pro injectione** **LIEBREICH's** Mittel. Dieses Arzneimittel ist eine Lösung von Kaliumcantharidat. Da dieses Salz aber schwer rein darzustellen ist, so geht L. bei der Darstellung vom Cantharidin selbst aus und bezieht auch die Dosirung auf das freie Cantharidin.

Darstellung 0,2 g (2 Decigramme) Cantharidin und 0,4 g Kalihydrat — beide genau gewogen — werden in einem 1 Liter-Kolben mit Marke mit 20 ccm Wasser im Wasserbade erwärmt, bis klare Lösung erfolgt ist. Alsdann fugt man unter fortdauernder Erwärmung allmählich Wasser bis ungefähr zur Marke zu, mischt gut durch und füllt nach dem Erkalten mit Wasser bis zur Marke auf. Die völlig erkaltete Lösung wird filtrirt (**LIEBREICH**).

1 ccm dieser Lösung enthält = 0,0002 g Cantharidin in der Form des Kaliumcantharidats $C_{10}H_{14}K_2O_6 + H_2O$

Diese Lösung ist früher von **LIEBREICH** zur Injektionskur vorgeschrieben worden.

†† **Kalium cantharidanicum Cantharidate de potasse (Gall.) Cantharidas potassicus** $C_{10}H_{14}K_2O_6 + 2H_2O$ Mol. Gew. = 326

Man bringt in einen Kolben von 500 ccm Fassungsraum 10 g Cantharidin, 5,78 g reines Kalihydrat sowie 200 ccm Wasser, erhitzt im Wasserbade bis zur völligen Auflösung und filtrirt noch heiss im Dampftrichter. Beim Erkalten scheidet sich das Salz in Krystallen ab. (**Gall.**)

Farblose Nadeln, löslich in 25 Th. kaltem oder in 12 Th. siedendem Wasser, wenig löslich in Alkohol, unlöslich in Aether und in Chloroform.

Sehr vorsichtig in gut geschlossenen Gefässen aufzubewahren.

An Stelle der obigen Injektionen wird zur Zeit die innere Darreichung in folgender Form empfohlen.

† **Tinctura Cantharidini Liebreich** **LIEBREICH's** Cantharidin-Tinktur. Nicht zu verwechseln mit Canthariden-Tinktur!

0,1 g (Ein Decigramm!) Cantharidin wird in 300 ccm Tinctura Auranti corticis unter massigem Erwärmen gelöst, worauf man die erkaltete Lösung mit Tinctura Auranti corticis auf 500 ccm auffüllt. Diese Tinktur ist sorgfältig zu mischen und zu filtriren (!). Man nimmt diese Tinktur innerlich ein, indem man 0,1—1,00 ccm mit der **PRAVAZ'schen** Spritze abmisst und in ein halbes Weinglas voll Wasser einträgt.

† **Solutio Natrii cantharidini Liebreich pro injectione** **Cantharidin Natrium-Lösung LIEBREICH**

Man bereitet in der bei dem Kaliumsalz angegebenen Weise eine wässrige Lösung aus 0,2 g (Zwei Decigramm) Cantharidin und 0,8 g Natriumhydroxyd und füllt diese mit Wasser zu 1 Liter auf. Je 1 ccm enthält 0,0002 g Cantharidin in Form des Natriumcantharidats.

LIEBREICH hat das Cantharidin gegen tuberkulöse Processe, Phthisis, tuberkulöse Erkrankungen des Pharynx, Larynx, gegen Lupus, Psoriasis, Lepra empfohlen. Er beginnt innerlich und subkutan mit $\frac{1}{10}$ Decimilligramm = 0,00006 g, entsprechend 0,8 ccm der

obigen Lösungen, nach und nach steigend um je 0,00002 g, d. h. um 0,1 cem der obigen Lösungen — Vor jeder Anwendung, welche nicht täglich erfolgen darf, ist der Harn auf Erweiss zu prüfen, bei eintretender Nephritis ist der Gebrauch einzustellen. Wegen der leicht eintretenden Nieren-Reizung ist die grösste Vorsicht geboten.

Dispensation. Die LIEBERKUHNS'schen Lösungen werden nicht den Patienten aus-
gefolgt, sondern dem Arzte übergeben und werden von diesem selbst aufbewahrt. Die
Aufbewahrung in den Apotheken hat vorsichtig zu erfolgen.

Der Arzt mache es sich zur Pflicht, diese Mittel auf den Recepten stets ohne Ab-
kürzung zu verschreiben. Der Apotheker lege jedes zweifelhafte Recept dem Arzte
zur nochmaligen Durchsicht vor.

† **Aether Cantharidin.** Kantharidinäther. Loco Aetheris cantharidati
1 g gepulvertes Kantharidin wird im Kälbchen unter Erwärmen in 40,0 g Aceton gelöst.
Diese Lösung giesst man in 940,0 g Aether, den man durch Einstellen in lauwarmes Wasser
auf 25° C erwärmt hatte, in mehreren Antheilen unter Umschwenken ein. Schliesslich
trägt man 2,0 Hanfextrakt ein, schüttelt bis zur Auflösung desselben und filtrirt nach mehr-
tägigem Absetzen. (DIETTERICH)

† **Colloidum Cantharidini.** Kantharidin-Kollodium. Cantharidini 0,1 wird
mit Olea Ricini 4,0 verrieben, und in Colloidi duplicis 96,0 eingetragen, worauf man das
Präparat durch Zusatz von Tincturae Cannabis indicae 1,0 grünlich färbt.

Capsella.

Gattung der Cruciferae—Hesperideae—Capsellinae.

Capsella bursa pastoris (L.) Mnch. Ueberall gemeines Unkraut. Kahl oder
behaart, Grundblätter eine Rosette bildend, gestielt, ganzrandig, buchtig gezähnt oder
fiederspaltig, Stengelblätter kleiner, sitzend, Stengel aufrecht, Schötchen auf wagerecht ab-
stehenden Stielen dreieckig verkehrt-herzförmig, Griffel kurz, die Ausrandung nicht
überragend.

Man verwendet das Kraut *Herba Bursae pastoris* (Ergänzb.) *Herba Capsellae*
Hirtentäschel. Gänsekresse. Säckel- oder Täschelkraut. — Panetière. — Shepherd's
purse.

Bestandtheile. Ein leicht zersetzliches Alkaloid, eine eigenthümliche Säure von
glukonischem Charakter Bursasäure. Das ätherische Oel der Samen ist Allylsenöl,
es enthalten ausserdem 28 Proc. fettes Oel.

Anwendung. Das Mittel ist veraltet, aber durch Pfarrer KNEIPP wieder in Er-
innerung gebracht. Die RADEMACHER'sche Schule benutzt es gegen Blutungen und Blasen-
leiden in Form der Tinktur und der Salbe. Neuerdings als Ersatz des Rhizoma Hydrastis
und Secale cornutum gegen Haemorrhagien empfohlen, besonders in Form des Fluidextrakts.

Extractum Bursae pastoris fluidum wird aus dem fein geschnittenen Kraut mit
Weingeist (68 proc.) im Verdrängungswege bereitet.

Tinctura Bursae pastoris Rademacheri (Ergänzb.) RADEMACHER's Hirtent-
täscheltinktur, wird aus 5 Th. zerquetschtem frischem Kraut mit 6 Th. Weingeist be-
reitet. Ausbeute 6 1/2—7 Th. Innerlich zu 15—80 Tropfen 4—6mal täglich.

Unguentum Bursae pastoris Rademacheri. 1 Th. frisches, zerquetschtes Kraut
wird mit 2 Th. Schweinefett gekocht, bis die Feuchtigkeit völlig verdunstet ist, dann ge-
presst und klar abgeseigt.

Capsicum.

Gattung der Solanaceae — Solanaceae.

I. Capsicum annuum L. mit verlängerten, aufrechten Früchten und **Capsicum
longum D. C.** mit verlängerten, hängenden Früchten. Es ist unsicher, ob beide Arten
wirklich verschieden sind, da angeblich Pflanzen mit hängenden und aufrechten Früchten

aus den Samen derselben Frucht hervorgegangen sind, beide würden dann in *C. annum* L. zusammen zu ziehen sein. Heimisch in Amerika (vielleicht Brasilien), in allen heissen und gemässigten Gegenden der Früchte wegen in zahlreichen Formen kultivirt.

Fructus Capsici (Germ. *Helv.*). *Piper Hispanicum* s. *Turcicum*. Spanischer oder Türkischer Pfeffer. Beissbeere. Guineapfeffer¹⁾. Schoten- oder Taschepfeffer. — *Poivre d'Espagne*. *Piment des jardins*. *Poivre de Guinée*¹⁾ (Gall.).

Beschreibung. Eine saftlose, vom bleibenden Kelch gestützte Beere, meist aus 3, selten aus 2 Karpellen hervorgegangen. Die Frucht ist durch theilweises Verwachsen der Karpelle im unteren Theile drei-, im oberen einfächerig. An den Placenten befinden sich zahlreich die flachen, rundlichen, hellgefärbten Samen.

Die pharmaceutisch verwendeten Früchte sind langgestreckt, bis 12 cm lang, dunkelbraunroth, fein quergestreift.

Auf die Epidermis folgt ein aus 5—6 Zellschichten bestehendes Collenchym, woran sich ein dünnwandiges Parenchym schliesst, die Zellen dieser Schichten enthalten rothgelbe Körnchen und spindelförmige dreispitzige oder runde, gelbe Chromatophoren, die sich mit Schwefelsäure tiefblau färben.

Die Wände der Collenchymzellen sind fein gekörnelt. Im Parenchym verlaufen die zarten Gefässbündel zuweilen mit einigen Bastfasern. Zwischen dem Parenchym und der inneren Epidermis liegen auffallend grosse Zellen, die durch derbe Querwände oder schmale Platten kleinerer Zellen getrennt sind. Die Zellen der unteren Epidermis unter den grossen Zellen sind verholzt, verdickt und getüpfelt, die unter den Zwischenplatten sind dünnwandig, nicht verholzt. Diese innere Epidermis mit abwechselnden grösseren Parthien verholzter (also mit Phloroglucin und Salzsäure roth werdender) und schmälerer unverholzter Zellen ist für die Erkennung der Droge charakteristisch neben den gelben Chromatophoren und rothgelben Tropfen des Parenchyms.

An den Scheidewänden der Frucht wird die Cuticula durch die Bildung eines Sekretes von den darunter liegenden gestreckten Epidermiszellen emporgehoben. Es findet sich hier das scharfschmeckende Prinzip der Frucht. — Die Samen umschliessen ein reichliches Endosperm und den gekrümmten Embryo. Die Epidermiszellen der Samenschale sind vielfach in einander verzapft und verkeilt und gewähren auf der Flächenansicht ein sehr




Fig. 142. Gewebe der Fruchtschale des spanischen Pfeffers. *en* Epidermis der Innenfläche mit verholzten Zellen *st*. *ep* Epidermis der Oberseite. *coll* Collenchym. 160 mal vergr. (MOELLER, Mikroskopie.)




Fig. 143. Samenschale in der Aufsicht. *ep* Epidermis. *p* Parenchym. 160 mal vergr. (MOELLER, Mikroskopie.)

¹⁾ Unter diesem Namen versteht man eigentlich die Früchte der *Xylopia aethiopica* A. Rich. und *X. aromatica* D. O.

verworrenes aber höchst charakteristisches Bild. Sie sind ebenfalls für die Erkennung der Droge von Wichtigkeit. Ihre Aussenwand besteht aus drei Schichten: der Cuticula, einer mit Jod sich ohne weiteres blau färbenden und einer verholzten Schicht.

Bestandtheile. Wir sind darüber verhältnissmässig wenig unterrichtet. Der scharf brennend schmeckende Bestandtheil wird als Capsaicin $C_{26}H_{44}O_2$ (?) bezeichnet. Es bildet farblose, bei $59^\circ C$ schmelzende Krystalle, die in kaltem Wasser wenig, in heissem mehr löslich und mit Wasserdämpfen in geringer Menge flüchtig sind, sich in Alkohol und Alkalien lösen.

Capsacutin $C_{28}H_{54}N_2O_7$, zu 0,05—0,07 Proc. in der Droge, von saurer Reaktion. Capsicin und Capsicol sind weiche, gelbe bis rothbraune, scharfschmeckende Substanzen, offenbar nicht einheitlich.

Capsicin, ein flüchtiges Alkaloid, ist ebenfalls zweifelhaft.

Nach KOENIG: Wasser 12,42 Proc., Stickstoffsubstanz 13,43 Proc., flüchtiges Öl 1,58 Proc., Fett 14,40 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 34,49 Proc., Holzfaser 19,59 Proc., Asche 5,67 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 15,84 Proc., Fett 16,44 Proc., Stickstoff 2,45 Proc.

Aufbewahrung. An einem trocknen Orte, die ganzen oder geschnittenen Früchte in Holz- oder in Blechgefassen, das Pulver in braunen, gut verkorkten Gläsern. — Trotz seiner Schärfe ist der Spanische Pfeffer dem Insektenfraß ausgesetzt, eine häufige Durchmischung der Vorräthe deshalb geboten. Das für Cantharides (S. 595) empfohlene Verfahren ist auch hier von Vortheil. Beim Verarbeiten der Droge ist Staubentwicklung zu vermeiden, da die Schleimbante dafür höchst empfindlich sind und heftige Entzündungen entstehen können. Um die Früchte zu zerschneiden, feuchtet man sie daher durch leichtes Bestäuben mit Wasser an und trocknet sie nach dem Schneiden wieder. Das Pulver bereitet man nach Angabe einiger Arzneibücher, indem man die zerkleinerten Früchte mit Gummi- oder Traganterschleim befeuchtet, trocknet und hierauf stösst. Der Arbeiter hat dabei das Gesicht in geeigneter Weise zu schützen. 100 Theile liefern 88—90 Theile mittelfines Pulver.

Anwendung. Innerlich selten bei Verdauungsschwäche, Flatulenz, zu 0,05—0,5. Im Aufguss (1,0:200,0) zu Gurgelwassern bei Angina maligna. Aeusserlich sehr häufig als Bestandtheil hautreizender Mittel. Im Haushalt ein beliebtes Gewürz zu Saucen, Mixed Pickles und dgl. Missbrauchlich als verschärfender Zusatz zu Essig und Brantwein.

Tinctura Capsici. Tinctura Piperis Hispanici. Spanischpfeffertinktur. Teinture de poivre d'Espagne. Tincture of Capsicum. a) Rrit. Aus 50 g Capsicumpulver und 1000 ccm Weingeist (70 proc.) durch Maceration zu bereiten. b) Germ. Aus 1 Th. mittelfein zerschnittenem Spanischem Pfeffer mit 10 Th. Weingeist zu bereiten. c) Helv. Aus 10 Th. Spanischem Pfeffer (V) und verdünntem Weingeist sind durch Perkolation 100 Th. Tinktur zu sammeln. d) U.-St. Aus 50 g Capsicumpulver und q. s. Weingeist (Alkohol 950 ccm, Wasser 50 ccm) sind durch Perkolation 1000 ccm zu sammeln. Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Capsicum-Opodeldoe.
(Bull. of Ph.)

Rp.	Tinctura Capsici	10,0
	Spiritus	40,0
	Saponis hispanici	6,0
	Camphorae	4,0
	Liquoris Ammoni caust.	2,0
	Mentholi	1,0
	Olei Spilanthis oleracei	0,5

Charta antirheumatica Anglica.
Englisches Gichtpapier (Diet. Man.)

Rp.	Tinctura Capsici	10,0
	Tinctura Euphorbiae	10,0
	Terebinthinae	20,0
	Olei Terebinthinae	60,0
	Alkohol. absoluti	500,0
	Resinae Pin. depuratae	400,0

Die durchgeführte Lösung wird mit breitem Pinsel auf Seidenpapier gestrichen und dieses auf Schnitten an der Luft getrocknet.

Collemplastrum Capsici (Diet.)
Capsicumplaster

Rp.	Massae ad Collemplastrum	800,0
	Rhizomatis Iridae pulv.	90,0
	Olibani	20,0
	Extracti Capsici aetheral.	20,0
	Olei Resinae Pin.	15,0
	Acidi salicylici	6,0
	Aetheris	150,0

Wie Collemplastrum Arnicae (S. 385) zu bereiten. Auf Leinwand gestrichen und durchocht gleicht diese Masse einem Ersatz für das Capstan-Porons-Pflaster, BEXSON'S Plaster aus New York.

Collyrium antamauroticum BRASLEY

Rp.	Fructus Capsici	0,5
	Aquae destillatae	300,0

Nach 8stündigem Stehen filtriren.

Curry powder

Nach Buchh.

Rp	Fructus Capsici	
	Rhizomatis Zingiberis	
	Fructus Cardamomi	3A 75,0
	Fructus Pimentae	
	Rhizomatis Curcumae	3A 100,0
	Piperis nigri	120,0
	Cassiae Cinnamomi	150,0
	Fructus Coriandri	300,0

werden als mittelfeine Pulver gemischt

Emplastrum Capsici (U-St)

Rp Oleoresina Capsici

Emplastri adhaesivi 3A q s

Auf das dünn auf Mussellin gestrichene Pflaster trägt man mittelst eines Pinsels das Capsicum Extrakt auf, so dass 0,25 g davon 10 □ cm bedecken

Extractum Capsici

wird wie Extractum Absinthii (S 408) bereitet.

Extractum Capsici aethereum

Oleoresina Capsici (U-St)

Rp Fructus Capsici subtile pulv 500 g
Aetheris q s

Das Pulver wird durch Perkolation erschöpft, der Aether durch Destillation, zuletzt durch freiwilliges Verdunsten entfernt, den flüssigen Theil sammelt man, während der schaumige Rückstand verworfen wird

Extractum Capsici fluidum (U-St)

wird aus 1000 Th fein gepulverten Fruct Capsici und 91 proe Alkohol durch Perkolation bereitet, man befeuchtet mit 500 ccm, sammelt zuerst 900 ccm und stellt 1 a 1000 ccm Extrakt her

Gargarisma anticatarrhale GRAVES

Rp Decocti Corticis Chinac (e 15) 300,0
Tincturae Capsici 10,0

Zum Gurgeln Bei Catarrh.

Guttas carminativae

New-Yorker Forme

Rp	Tincturae Capsici	1 vol.
	Tincturae Opii	1 "
	Spiritus camphorati	1 "
	Spiritus Menthae pip	1 "
	Aquae	4 "

Dosis 5 ccm

Linimentum antarthriticum

Gichtfluid (VOMACKA)

Rp	Tincturae Capsici	500,0
	Tincturae Colchici	10,0
	Olei Rosmarini	20,0
	Olei Menthae pip	3,0
	Camphorae	30,0
	Saponis medicati	25,0
	Aetheris	50,0
	Liquoris Ammon caust	300,0
	Kali iodati	30,0

Linimentum Capsici compositum

I Ph Neerl III Suppl

Rp Fructus Capsici pulv 1,0
Spiritus (0,884) 8,0digare p dies 3, exprime, hujus tinct part 525 0
adde

	Camphorae	30,0
	Olei Rosmarini	
	Olei Lavandulae	
	Olei Thymi	
	Olei Caryophyllorum	3A 10,0
	Olei Cassiae	2,0
	Liquoris Ammon caust	100,0
	Saponis medicati	3,0

II Nach FASSATI.

Rp 1	Fructus Capsici gr plv	500,0
2	Aetheris	12,0
3	Spiritus	125,0
4	Spiritus q s	
5	Camphorae	500,0
6	Liqu Ammon caust (spec Gew 0,910)	62,0
7	Olei Thymi	
8	Olei Lavandulae	3A 10,0

Man perkohrt 1 mit 2 und 3, sammelt durch Nachgessen von 4 1250 g Flüssigkeit, lost darin 5, 7 und 8 und mischt 6 hinzu

Ersatz für RICHTER's Pain Expeller und d'-den amerikanischen Pain Killer

Mottenspiritus

I Russischer Mottenspiritus

Rp	Tincturae Capsici	
	Tincturae Colocynthis	3A 50,0
	Spiritus	100,0
	Camphorae	20,0
	Acidi carbonici puri	5,0

II Motten Essenz nach DIETELH

Rp	Fructus Capsici minor conc	100,0
	Oli Terebinthinae	50,0
	Spiritus (98%)	300,0
	macerirt man 8 Tage, presst aus, löst	
	Naphthalin	25,0
	Camphorae	25,0
	Oli Caryophyllorum	10,0

last absetzen und filtrirt

Auf Fliesspapier gegossen zwischen Pelz- oder Wollgegenstände zu legen

Piper Hispanicum solubile

Löslicher Cayennepfeffer (Buchh)

Rp Fructus Capsici concisi 100,0
Spiritus 150,0

Man macerirt, presst aus, filtrirt und verdampft das Filtrat mit

Natri chlorati 100,0

zur Trockne.

Spiritus Russicus (Ergänz)

Russischer Spiritus

Rp 1	Semin Sinapis gr pulv	5,0
2	Aquae	10,0
3	Fructus Capsici concisi	2,0
4	Camphorae	2,0
5	Natri chlorati	2,0
6	Liquoris Ammon caustici	5,0
7	Spiritus (91%)	80,0
8	Oli Terebinthinae	3,0
9	Aetheris	3,0

Man rührt 1 mit 2 zum Teig an, lässt stehen, bis sich ein kräftiger Geruch nach Senf entwickelt, fügt 3, 5, 7 hinzu, presst nach Stüßigem Stehen, löst 4, filtrirt und setzt 6, 8, 9 zu.

Unguentum Capsici (Brit)

Capsicum Ointment

Rp Fructus Capsici concisi 12,0
Cetacei 5,0
Olei Olivarum 44,0

Man erwärmt 1 Stunde im Wasserbade und seigt durch.

Vet Acetum sternutatorium MARTHOUS

Rp	Aluminis	
	Zinci sulfurici	3A 30,0
	Fructus Capsici	60,0
	Camphorae	8,0

mischt man in Pulverform zu

Olei Terebinthinae 80,0
Aceti 1000,0

Zum Einspritzen in die Nüstern der Kinder, bei Catarrh je 1 Theelöffel

Vel.		Linimentum resitutorium Restitutionsfluid	
a (Frg'znb)		b Pharm Zeitg	
Rp	Tincturae Capsici 150,0	Rp	Tincturae Capsici 50,0
	Spiritus 300,0		Spiritus camphorati
	Spiritus camphorati 100,0		Spiritus aetherel
	Spiritus aetherel 100,0		Spiritus denaturati (30%)
	Olei Terebinthinae 10,0		Liquoris Ammonii caustici ää 100,0
	Liquoris Ammonii caustici 20,0		Decocti Florum Ailicae (25,0) 500,0
	Ammonii hydrochlorici 50,0		Natrii chlorati crudi 75,0
	Natrii chlorati 20,0		
	Aquae 350,0		Sepone et filtra

II Capsicum fastigiatum Blume (*C. minimum* Roxb.) Kleiner Strauch mit orangerothen, kaum 2 cm langen, aufrechten Früchten. Liefert ebenfalls in den Früchten **Fructus Capsici**, **Capsicum** (Brit U St) **Cayenne Pepper**, **African Pepper** (U St)

III. Capsicum frutescens L. Ebenfalls sträuchig, Früchte roth, 1 cm lang, aufrecht. Liefert in den Früchten **Piment de Cayenne** (Gall.) Diese beiden Arten liefern hauptsächlich das unter dem Namen **Cayennepfeffer**, **Chillies** bekannte Gewürz, wogegen man unter **Paprika** meist die erstgenannte Art versteht.

C. fastigiatum und *C. frutescens* kann man von *C. annuum* leicht unterscheiden auch im zerkleinerten Zustande durch die Epidermiszellen der Samenschale, die bei ihnen schlank und hoch, bei der anderen Art im Querschnitt kurz und gedrungen sind. Die innerste Schicht der Aussenwand bildende verholzte Lamelle ist bei ihnen viel dicker wie bei *C. annuum*.

Bestandtheile. Capsaicin (s oben) ist auch in *C. fastigiatum* gefunden.

Wirkung und Anwendung wie bei I.

Apone, von Dr. POULET, ist ein weingeistiger Auszug von Capsicum mit Salmiakgeist, Thymianöl und Chloralhydrat.

Blister essence, C. SIMON's, ist dem Restitutionsfluid ähnlich zusammengesetzt.

Brannwein-schärfe von STREPAN ist ein weingeistiger Auszug von spanischem Pfeffer.

Capsicin. Unter dieser Bezeichnung kommt eine Mischung aus Ammoniak, Seife, Kampher, äther. Oelen und den Fluidextrakten von Capsicum und Gaultheria in den Handel.

Capsicum-Vaseline der Chesebrough-Gesellschaft ist durch Ausziehen des Spanischer Pfeffers mittelst Vaseline hergestellt.

Ernstings Magentropfen bestehen aus Tinctura aromatica, Calami, Capsici, Liquor. Kali acetici und Spiritus dilutus.

Glycoblaster des Prof. KLETZINSKY ist ein weingeistiger, mit Glycerin und wohl riechenden Oelen versetzter Auszug aus Spanischem Pfeffer.

Magnetie-Elixir von LOW enthält Capsicumtinktur, Terpentinöl, Kampherspiritus, Salmiakgeist, Sassafrasöl, Sassafrasextrakt.

Mustard-Paper oder **Sinapine tissue** von COOPER ist dünnes Papier mit einem Gummüberzug, der die scharfen Stoffe des Spanischen Pfeffers und des Euphorbium enthält.

Pain-Expeller 1) von RICHTER. Nach Apoth.-Ztg. Fructus Capsici 8,0, Flore Arnicae 2,0, Spiritus dilutus 100,0, Spir. camphoratus 20,0, Oleum Caryophyllor gtt. XX. Liquor Ammonii caustici 30,0. 8 Tage digeriren, dann filtriren.

2) Von SACHS. Tinctura Capsici 8,0, Tinctura Arnicae 12,0, Oleum Caryophyllor gtt. X., Spiritus 50,0, Aqua 50,0, Spiritus camphoratus 20,0, Liquor Ammonii caust. 30,0.

3) Von SCHÖNKE. Tinctura Capsici (1:3) 900,0, Tinct. Piperis 90,0, Tinct. Galangae 60,0, Tinct. Ratanhae 30,0, Semen Paradisi cont. 180,0. Man digerirt 8 Tage, press. aus und fügt hinzu Oleum Thymi, Caryophyllor, Rosmarini, Lavandulae ää 15,0, Spiritus camphoratus, Liquor Ammonii caust. spirituos. ää 450,0, Sapo domesticus 45,0, Tinctur. resinae Guajacae 100,0. Nach mehrtägigem Absetzen zu filtriren. (Soll dem RICHTER'schen Pain-Expeller in jeder Hinsicht gleichkommen.)

Papier Winsi ist dünnes Papier, das mit einem Ueberzuge von Capsicum, Benzoe, Euphorbium, Kopaivabalsam, Drachenblut, die zuvor in Weingeist gelöst wurden, versehen ist.

Pilules Alègres von COLLAS, gegen Hämorrhoiden, bestehen aus Extractum Capsici, Extr. Graminis und Radix Althaeae.

Prompto Allivio von RADWAY, ein Allheilmittel, enthält Capsicum, Kampher, Salze, Aether und Weingeist.

Russol von Dr. BLOCH in Basel, ein Gichtmittel, enthält Capsicum, Colchicum, Chloroform, Sennspirtus, Gaultheriaöl.

Speciality for Diphtherie, Dr WHITE's, ist mit Capsicumauszug und Oenanthe-ether versetzter Rum

Tympanitesenz. Lq Ammonianisat 12,0, Tinct Capsici 7,5, Tinct Zingiberis 30,0, Aqua commun q s ad 2 L Bei Trommelsucht der Rinder, auf einmal, wenn nöthig nach $\frac{1}{2}$ Stunde dieselbe Dosis nochmals zu geben

Vegetable Bathing-Prepareds von RÄGLER, besteht aus grob zerkleinerten Capsicum- und Roskastanienfruchten

Venetianisches Liniment von TOBIAS, Allheilmittel, ist eine dem Pain Expeller ähnliche Mischung

Capsulae.

Unter Kapsel, Capsula, Capsule versteht man eine Hülle zur Aufnahme einer Dosis irgend eines Medikaments. Und zwar kann diese Hülle entweder lediglich zur Aufbewahrung eines Arzneistoffes dienen oder dazu bestimmt sein, zugleich mit dem Arzneimittel hinuntergeschluckt zu werden. In diesem Falle müssen die Kapseln aus einem Material bestehen, welches von den Verdauungssäften gelöst wird.

Man unterscheidet im allgemeinen Papierkapseln, Devorativkapseln, Stärkekapseln und Gelatinekapseln.

I Capsulae chartaceae Pulverkapseln. Papierkapseln. Diese dienen zur Aufnahme kleiner Pulvermengen, besonders der sogenannten „abgetheilten“ Pulver. Sie werden gewöhnlich aus glattem, weissem Schreibpapier hergestellt. Zur Aufnahme von hygroskopischen Pulvern oder solchen, welche leicht flüchtige Bestandtheile enthalten, verwendet man Kapseln, die aus sogenanntem Wachspapier (charta cerata) hergestellt sind. Dieses Wachspapier wird zur Zeit durch Tranken von Papier mit Ceresin, nicht mit Wachs erzeugt.

Zur Aufnahme des Natriumbikarbonates als Bestandtheil der englischen Brausepulver benutzt man Kapseln aus rothem oder blauem Papier. Die Weinsäure soll in diese farbigen Kapseln nicht eingefüllt werden, weil diese alsdann fleckig werden würden. — Zur Aufnahme besonders kostbarer, auch starkadhärierender Substanzen faltet man Kapseln aus Glanzpapier, die glänzende Seite nach innen. Der Gebrauch der Papierkapseln ist ein so allgemeiner, dass auf ihre nähere Beschreibung verzichtet werden kann.

II Capsulae catapotae plicatiles Devorativ-Kapseln. Verschluckbare Kapseln. Sie sind von E. DIETZSCH erfunden worden, haben die Form der Papierkapseln und bestehen aus einer, Stärke und Glycerin enthaltenden Masse, etwa vom Aussehen dunnen, heißen Guttapercha-Papieres. Aus dieser Masse werden die Kapseln ähnlich wie die Papierkapseln hergestellt. Ihre Füllung mit dem Medikament und das Verschliessen der gefüllten Kapseln erfolgen in gleicher Weise wie bei den Papierkapseln.

III Stärkemehlkapseln Capsulae amylaceae. Amylkapseln. Cachets. Sie sind aus den schon früher benutzten sog. Einnahme-Oblaten hervorgegangen, wurden etwa

1873 von LIMOUSIN in Genf eingeführt, später von FASSER in Wien verbessert. Die Stärkemehlkapseln werden ähnlich den Oblaten entweder aus reiner Weizenstärke oder aus Gemischen von Weizenstärke und Weizenmehl in sogenannten Oblatenbackereien gebacken. Sie sind rundliche Blättchen mit flachem Rande und centraler Vertiefung. Für gewöhnlich werden sie in drei Grössen

und zwar von 2,0, 2,5 und 3,0 cm Durchmesser angefertigt. Sie dienen ausnahmslos zum Einhüllen fester Substanzen, besonders der Pulver. Sehr voluminöse Pulver z. B. Chininsalze,



Ob
Fig. 144



G
Fig. 145

Salicylsäure, kann man mit Hilfe eines Pastillenstechers in trockenem Zustande etwas comprimiren und dann in die Kapseln bringen. Der Verschluss erfolgt in der Weise, dass auf die das Pulver tragende Kapselhälfte die andere, angefeuchtete Hälfte aufgedrückt wird. Verschlussapparate sind konstruirt worden von LIMOUSIN, DIGNA, SEVZIK, FASSER, VONACKA u. A. Fig. 144 und 145.




Fig. 144.

Beim Bezug einer grösseren Menge dieser Kapseln auf einmal werden dieselben von den Fabriken mit der Firma des Bestellers geliefert.

Bei dem Einkauf der Stärkemehlkapseln beachte man folgende Punkte: Sie sollen nicht stark geblänt sein, dürfen keine giftigen Bestandtheile enthalten, (Metalle würden in der Asche aufzusuchen sein, welche nicht mehr als 1 Proc. betragen soll.) Sie müssen ferner elastisch und frei von Bruchstücken sein und, in Wasser getaucht, sofort zu einer formlosen Masse zusammenfallen.

Vorräthige Oblatenpulver nehmen sehr bald ein unansehnliches Aussehen an.

IV. Capsulae gelatinosae. Von diesen zum Theil aus unvermischter Gelatine, zum Theil aus Gelatine mit Zusätzen hergestellten Kapseln unterscheidet man namentlich 1) Deckelkapseln, 2) Gefüllte harte Kapseln und 3) Gefüllte elastische Kapseln.

Die technische Darstellung dieser verschiedenen Sorten Gelatine-Kapseln ist mit geringen, sich von selbst ergebenden Abweichungen, die gleiche. Als Ausgangsmaterial wird von den Fabriken nicht die dünnblättrige Gelatine, sondern ein in dickeren Tafeln im Handel vorkommendes Produkt, der sogenannte französische oder belgische Gelatine-Leim verwendet, weil die mit diesem hergestellten Kapseln klarer und durchsichtiger ausfallen.

Darstellung. A. Der harten Kapseln. 1 Th. Gelatineleim lässt man im Gefässe B mit 3 Th. Wasser quellen und erhitzt die Masse alsdann im Wasserbade A zum Schmelzen. Wenn die Temperatur etwa 65° C. ist, so lässt man kurze Zeit stehen, schiebt alsdann die an der Oberfläche der Leimlösung abgesetzte Schaumschicht mit einem Spatel oder dergl. zur Seite. Fig. 146.

Vorher hatte man die zur Darstellung der Gelatine-kapseln erforderlichen Formen (Docken), olivenförmige Stäbe aus polirtem Zinn oder Stahl, mittels eines mit Olivenöl benetzten Läppchens abgerieben und diese Formen zu 12–20 Stück mit den Stielen nach unten (Fig. 146 O) in eine Korkplatte oder eine ähnliche Vorrichtung gesteckt, so dass die Köpfe alle in einer Ebene liegen. Man ergreift nun eine solche, mit kalten Metallformen besteckte Platte und taucht sie in die heisse Gelatinelösung, etwa bis A, Fig. 147, langsam ein und zieht sie ebenfalls langsam wieder heraus. Damit sich an den Enden keine Thränen bilden, zieht man den hier befindlichen Ueberschuss der Masse durch momentane leise Berührung mit der Oberfläche der Gelatinelösung wieder ab. Dann dreht man, behufs gleichmässiger Vertheilung der Gelatine, das Brett mit den Formen langsam in der Hand so, dass die Formen etwa wagerecht liegen, 1–2 Minuten lang und stellt das Ganze hierauf etwa $\frac{1}{4}$ Stunde an einen kühlen, schattigen Ort. Nach dieser Zeit ist die Gelatine soweit erstarrt, dass man die Hüllen von den Formen entfernen kann. Man setzt bei B, Fig. 147, die Schneide eines Messers an und macht hier durch Rollen der mit Gelatinemasse überzogenen Form auf der Messerschneide einen Ringschnitt. Dann zieht man die Gelatine-kapsel mit der rechten Hand über die Olive, die abgetrennte Hülle aber mit der linken Hand über das verjüngte Ende der Form ab.

Die Kapseln werden reihenweise in Brettchen mit Vertiefungen eingesetzt und hier etwas übertrocknet.

Die Füllung mit Flüssigkeiten erfolgt, solange die Kapseln noch nicht ganz getrocknet, sondern noch etwas feucht sind. Das Füllen der Kapseln mit Flüssigkeiten erfolgt zweckmässig mit einer Spritze, deren




Fig. 147.

Ausflussrohr einen allongenförmig gebogenen Glasansatz mit feiner Spitze trägt. Der Glas-
schnabel wird in die Öffnung der Kapsel eingeführt, worauf man durch sanften Druck
des Kolbens der Spritze die Füllung ausführt. Eine geschickte Arbeiterin füllt in einem
Arbeitstage etwa 6000 Kapseln der gewöhnlichen Grösse. Zum Füllen der Kapseln mit




Fig. 148

pulverförmigen Arzneimitteln bedient man sich eines kleinen dütenförmigen Fülltrichters
aus Metall, durch welchen man die gepulverten Arzneistoffe mit Hilfe eines „Stopfers“ in
die Kapseln hinein bringt. Eine geschickte Arbeiterin füllt von diesen Kapseln im Tage
höchstens 600 an.

Man sehe indessen darauf, dass die Kapseln nicht zu voll gefüllt werden, weil sonst
das Verschliessen derselben schwierig, ja unmöglich wird.

Das Verschliessen der gefüllten Kapseln geschieht dadurch, dass man auf ihre Öff-
nung einen Tropfen warmer Leimlösung mit Hilfe eines kleineren oder grösseren Pinsels
setzt. Und zwar geschieht dies zweimal hintereinander. Durch das erste Betupfen erfolgt
nur ein horizontaler Verschluss der Kapsel. Durch das zweite Aufsetzen eines Tropfens
warmer Leimlösung erhält der Verschluss eine gefällige, abgerundete Form.

Die so hergestellten Kapseln müssen daraufhin untersucht werden, ob nicht mangel-
haft verschlossene (leckende) Kapseln unter ihnen sind. Zu diesem Zwecke belässt man
die Kapseln in ihren Einsatzbrettern, bis sie lufttrocken geworden sind, dann legt man sie
einzeln auf treppenförmig gebogenes Papier aus und liest nach etwa 24 Stunden die
jenigen Kapseln mechanisch aus, welche geleckert haben. Der Rest wird auf Hürden im
Trockenschranke vollständig ausgetrocknet.

Im Vorstehenden ist angegeben, dass die harten Kapseln lediglich aus Gelatine-
Leim und Wasser hergestellt werden. In der That ist das diejenige Darstellungsweise,
nach welcher die meisten Fabriken arbeiten. Die Gall schreibt folgende Masse vor:
Gelatinae 25,0, Glycerini 10,0, Sacchari 8,0, Aquae circa 45,0.

Übrigens ist die Darstellung der Gelatine Kapseln eine ziemlich einfache Arbeit,
welche sich recht wohl im pharmaceutischen Laboratorium ausführen liesse.

B. Der elastischen Kapseln. Die Grundmasse für die elastischen Gelatine-
kapseln besteht aus Gelatineleim 1 Th., Wasser 1 Th., Glycerin 2 Th. Die Herstellung der
elastischen Kapseln erfolgt genau in der nämlichen Weise, wie es bei A. beschrieben
wurde. Die Füllung der Kapseln geschieht, wenn sie zwar schon starr, aber noch nicht
völlig getrocknet sind. Ebenso erfolgt der Verschluss der gefüllten Kapseln mit heisser
Glycerin Gelatinemasse, solange die Kapseln noch nicht völlig getrocknet sind wie unter A.
angegeben. Dagegen wird die Trocknung nicht mit künstlicher Wärme, sondern im Kalk-
Trockenschranke (s. S. 546) über Aetzkalk oder Chlorcalcium ausgeführt. Die Kapseln
bleiben solange im Kalk-Trockenschranke, bis sie an Papier nicht mehr anbacken. — Als
eine geeignete Masse empfiehlt FORBET: Gelatinae 16 Th., Aquae 20 Th., Glycerini 15 Th.,
Sirupi Sacchari 10,0. Sollen lichtempfindliche Substanzen in Kapseln untergebracht wer-
den, so kann die Gelatinemasse Zusätze von unschädlichen, wasserlöslichen Farbstoffen,
z. B. Indulin oder Nigrosin erhalten.

Capsulae gelatinosae durae. Harte Gelatine-kapseln. Unter Gelatine-kapseln
schlechthin versteht man die harten Gelatine-kapseln. Sie werden meist in mittleren Grössen
von 0,1—1,0 g Inhalt hergestellt, die gebräuchlichste Sorte aber ist die von 0,5 g Inhalt.

In diese Kapseln kann man alle solche Flüssigkeiten
und feste Stoffe einfüllen, welche die Gelatinehülle nicht auf-
lösen bez. zerstören, z. B. Balsame, alkoholische und atheri-
sche Extrakte, ätherische Oele, Antipyrin, Apioi, Chinin,
Phenole und phenolartige Körper, z. B. Kreosot und Creolin.

Bei gewissen Substanzen kann man den Angriff auf die Gelatinehülle dadurch verhindern,
dass man sie in ölgiger Lösung einfüllt, z. B. Chloralhydrat in Oel gelöst. Wässrige
Flüssigkeiten sind vom Einfüllen in Gelatine-kapseln natürlich ausgeschlossen.



Fig. 149

Von diesen Kapseln ist zu verlangen, dass sie aus gutem Gelatineleim hergestellt sind, der nicht unangenehm riecht und schmeckt. Sie müssen ferner gut aussehen, d. h. die Gelatinehülle muss klar sein. Sie dürfen ferner nicht lecken und nicht verschimmelt sein. Es empfiehlt sich, alle käuflich bezogenen Kapseln (auch die folgenden Sorten) darauf hin zu prüfen, ob das Gewicht des Inhaltes stimmt und ob die eingefüllte Substanz den bezüglich der Reinheit an sie zu stellenden Anforderungen genügt. Fig. 149.




Fig. 150.

Obgleich die harten Kapseln nicht gerade besonders empfindlich sind gegen Feuchtigkeit, so empfiehlt es sich doch, sie an einem trockenen Orte, am besten im geheizten Zimmer, aufzubewahren. In feuchten Räumen werden sie trübe, können unter Umständen sogar verschimmeln.

Capsulae gelatinosae elasticae seu molles. Elastische Gelatinekapseln. Diese Kapseln werden in Grössen von 0,15 — 1,0 — 5,0 — 10,0 — 15,0 g Inhalt angefertigt. Noch beträchtlichere Grössen kommen nur für die Veterinär-Praxis in Betracht. Man kann in diese Kapseln grössere Mengen, namentlich von Flüssigkeiten, einfüllen, weil sie sich wegen ihrer Elasticität der Form der Speiseröhre anpassen, also dem Hinunterschlucken nicht allzugrossen Widerstand entgegensetzen. Als Füllung dieser kommen namentlich Ricinusöl und Leberthran in Betracht, doch können sie mit jeder Substanz gefüllt werden, welche die Gelatine-Masse nicht zerstört.

Diese Kapseln sind gegen Feuchtigkeit erheblich empfindlicher als die harten. Durch feuchtes Lagern werden sie trübe; sie erhalten alsdann durch Nachtrocknen an einem lauwarmen, trockenen Orte oder im Kalk-Trockenschrank ihr gutes Aussehen für gewöhnlich wieder. Zu hoher Wärme dürfen sie aber auch nicht ausgesetzt werden, weil sie alsdann schmelzen würden. Sie sind auch gegen Staub sehr empfindlich, weil sie ihn an ihrer Oberfläche festhalten. Man bewahrt sie also vor Staub geschützt, an einem trockenen, nicht zu warmen Orte auf, am besten im Kalk-Trockenschranke.




Fig. 151.

Perlae gelatinosae. Gelatineperlen. Die deutschen Gelatineperlen sind harte Kapseln, aber nicht wie diese olivenförmig, sondern von Kugelform. Ihre Herstellung erfolgt wie diejenige der harten Kapseln unter Benutzung kugelförmiger Zinnformen. (Fig. 151). Die Bildung eines unauffälligen sauberen Verschlusses erfordert grösseres Geschick als bei den olivenförmigen Kapseln. Die französischen Gelatineperlen bestehen aus zwei durch Pressung miteinander vereinigten Halbkugeln und haben daher eine, jede Kapsel in zwei Hälften theilende Naht. Ihre Herstellung erfolgt mit Hilfe besonderer Maschinen, welche von N. PALLAV & Co., Paris, Avenue du Maine 43, ebenso wie alle übrigen Apparate zur Herstellung und Füllung von Gelatinekapseln und -Perlen, geliefert werden.

Die Gelatineperlen dienen besonders zur Aufnahme von Arzneien, welche in kleineren Mengen zur Verwendung gelangen, wie Aether, ätherische Oele, Morrhual, Orexin, Pepsin und Alkaloide (Hydrastinin).

Capsulae operculatae. Deckelkapseln. Sie bestehen aus einem Untertheil und Obertheil aus dünner Gelatine, welcher letztere über den ersteren hinweggeschoben wird. Sie haben den Zweck, die olivenförmigen Kapseln zu ersetzen, d. h. solche Arzneistoffe aufzunehmen, welche nur selten in dieser Form verordnet und deshalb nicht fabrikmässig hergestellt werden. In der Regel dienen sie zur Aufnahme von festen Arzneistoffen, bisweilen,

aber seltener, auch zur Aufnahme von extraktförmigen. Das Füllen geschieht, indem man die unterzubringende fein gepulverte Substanz einfach in die Hälfte mit dem geringeren Durchmesser hineinschüttet und die dazu passende (übergreifende) Hälfte darüber schiebt. Bei lockeren Pulvern (z. B. Chininsalzen) kommt man besser zum Ziel, wenn man das abgewogene Pulver auf Papier schüttet und nun mit der schlankeren Hälfte einfach aufstopft. Den Deckel bestreicht man inwendig mit etwas Gummischleim, um ein Lockerwerden desselben zu verhindern. Wichtig ist natürlich, dass von der schlecht-schmeckenden Arznei nichts auf die Aussenseite der Kapsel gelangt. Fig. 152.



Fig. 152.

Capsulae operculatae pro suppositoriis. Deckelkapseln für Suppositorien. Diese werden vorzugsweise zur Applikation des Glycerins in den Mastdarm angewendet. Sie bestehen aus einer steifen konischen Gelatinehülle mit übergreifendem Deckel (Fig. 153). Unmittelbar vor dem Gebrauche füllt man die konische Hälfte mit konc. Glycerin, setzt den übergreifenden Deckel auf, taucht das gefüllte Zäpfchen, um es schlüpfrig zu machen, einen Augenblick in kaltes Wasser und schiebt es alsdann so gleich möglichst tief in den After ein.

Da diese Kapseln in einer verhältnissmässig kurzen Zeit im Darm gelöst werden, so können sie natürlich auch zur Füllung mit anderen Suppositorien-Massen verwendet werden.

Suppositorien-Kapseln mit Fettdeckel. Diese sind eigentlich nur die konischen Hälften der vorigen, zu welchen Fettdeckel aus starrer, aber leicht schmelzbarer Fettmasse beigegeben werden. Man braucht sie zur Herstellung von Cacao-Suppositorien, indem man einfach die geschmolzene Suppositorien-Masse in sie hineingiesst, oder falls die Masse durch Anstossen erzeugt wurde, diese Masse in sie hineinstopft. Die gefüllten Kapseln werden schliesslich mit dem beigegebenen Fettdeckel verschlossen.

Capsulae keratinosae. Pohl's Dünndarmkapseln. Diese Kapseln werden aus einer plastischen und elastischen Masse hergestellt, welche besteht aus einer Mischung von a) filtrirter, bis zur Sirupsdicke eingedampfter Lösung von Keratin in Ammoniakflüssigkeit, b) ebenfalls bis zur Sirupsdicke eingedampfter Lösung von wachsfreiem Schellack, Borax und Wasser und c) sehr geringer Menge ammoniakalischer Kolophonium-Lösung. D.R.P. 35976. Diese Masse besitzt die Eigenschaft des Keratins: im Magen ungelöst zu bleiben, im Darm aber in Lösung zu gehen, dagegen nicht die Sprödigkeit und Zerreiblichkeit des reinen Keratins.



Fig. 153.

Sie dienen zur Aufnahme von Arzneistoffen, welche nicht im Magen, sondern erst im Darm zur Wirkung gelangen sollen, z. B. Acidum arsenicosum, Acidum hydrochloricum, Acidum salicylicum, Acidum tannicum, Alumen, Balsamum Copaivae, Bismutum subnitricum, Chinin und dessen Salze, Chrysarobin, Extractum Cnabearum, Extractum Filicis (überhaupt alle Bandwurmmittel), Ferrum und dessen Verbindungen, Kreosot, Naphthalin, Opium, Phosphor, Plumbum acetium, Quecksilber-Verbindungen, Resorcin, Santonin.

Man prüfe sie, ob sie in einer Mischung von 100 ccm Wasser, 10 Tropfen Salzsäure und 0,1 g Pepsin bei 35° C ungelöst bleiben.

Carbida.

Carbida. Karbide. Unter „Karbiden“ versteht man die Verbindungen des Kohlenstoffs mit Elementen, vorzugsweise mit Metallen.

Einige Karbide haben, seitdem es möglich geworden ist, im elektrischen Ofen (d. h. im elektrischen Flammenbogen) Temperaturen von vordem nicht erreichter Höhe zu er-

zielen, ganz erhebliche technische Bedeutung erlangt. — Zum Verständniss des Folgenden sei vorausgeschickt, dass man durch den zwischen 2 Kohle-Elektroden übergehenden Flammenbogen (also im Lichtbogen der sog. elektrischen Bogenlampen) Temperaturen von etwa 3500–4000° C. erzeugen kann. Bei diesen Temperaturen gelingt es, Substanzen wie Aetzkalk u. a. zu schmelzen, welche vordem für unschmelzbar gehalten wurden. Infolgedessen gelingt es auch Reaktionen herbeizuführen, welche man vordem nicht kannte. Bei der Darstellung der im Folgenden zu besprechenden Carbide wirkt der elektrische Strom nur als Wärmequelle. Eine „Elektrolyse“ findet nicht statt. Man würde im Stande sein, die gleichen Reaktionen auch ohne den elektrischen Strom auszuführen, wenn man auf anderem Wege Temperaturen von der angegebenen Höhe erzielen könnte.




Fig. 154. Elektrischer Ofen.

Die äussere Wandung A des Ofens besteht aus feuerfesten Chamottesteinen. In den Ofen ragen die beiden Kohle-Elektroden CC, um welche die Reaktions-Mischung F geschichtet ist. Das geschmolzene Reaktionsprodukt fließt bei F nach D ab.

sondern es enthält bis zu 20 Proc. Verunreinigungen, welche aus den Ausgangsmaterialien stammen. Die guten Sorten stellen specifisch schwere Massen dar mit krystallinischem Bruch und charakteristisch braunrother Färbung. Häufig finden sich unter den Karbidstücken solche, welche völlig unbrauchbar sind. Das spec. Gewicht ist 2,20 bis 2,25. —

Der Luft ausgesetzt, verbreitet das Calciumkarbid einen unangenehmen knoblauchartigen Geruch, welcher von entwickeltem Phosphorwasserstoff herrührt, zugleich geht es allmählich in Calciumhydroxyd und Calciumcarbonat über. Gegen die meisten chemischen Agentien ist es von einer bemerkenswerthen Beständigkeit; von Wasser und wässrigen Flüssigkeiten aber wird es unter Bildung von Acetylen und Calciumhydroxyd stürmisch zersetzt $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2$. Auf dieser Reaktion beruht z. Z. die praktische Wichtigkeit der Verbindung.

1 kg Calciumkarbid liefert theoretisch 350 Liter Acetylen, das Calciumkarbid des Handels aber giebt nur etwa 280–300 Liter, weil es eben einen beträchtlichen Procentsatz von Verunreinigungen enthält. — Unter diesen Verunreinigungen sind namentlich Verbindungen des Phosphors (Phosphorcalcium Ca_3P_2), des Schwefels und des Stickstoffs vorhanden, welche durch die Einwirkung von Wasser zur Bildung von Phosphorwasserstoff, bez. Schwefelwasserstoff, bez. Ammoniak Veranlassung geben. Dieser Umstand macht eine Reinigung des aus dem Calciumkarbid entwickelten Acetylens (s. d. w. u.) erforderlich.

Aufbewahrung. Kleinere Mengen können in Pulverflaschen mit Glasstopfen aufbewahrt werden, in denen sie sich aber für gewöhnlich nicht lange gut halten. Grössere Vorräthe bewahrt man in zugestrichenen Blechbüchsen auf. Man beachte, dass für den Transport und für die Aufbewahrung von Calciumkarbid besondere lokale Verordnungen (s. w. unten) existiren, welche genau zu beachten sind. Unter allen Umständen ist das Calciumkarbid vor Feuchtigkeit möglichst geschützt aufzubewahren.

I. Carbidum Calcii. Calciumkarbid.

Gasstein, CaC_2 . Mol. Gew. = 64.

Die ergiebige Darstellung des Calciumkarbids im elektrischen Ofen ist 1894 von dem Amerikaner Wilson angegeben und von Moissax weiter vervollkommen worden.

Darstellung. Man stellt eine Mischung von 120 Th. frisch geglühtem Aetzkalk mit 80 Th. Kohle (Anthracit, Koks oder Zuckerkohle) her und schmilzt diese im elektrischen Ofen bei etwa 3500° C. zusammen. Eine solche Temperatur wird erreicht durch einen elektrischen Strom von 350 Ampère bei 70 Volt Spannung. Die Ausbeute beträgt 120 bis 150 Th.



Eigenschaften. Das gegenwärtig im

Handel befindliche Calciumkarbid ist nicht rein,

Anwendung. Die Hauptanwendung erfolgt zur Darstellung des Acetylen. Die Benutzung zur Entwässerung von Alkohol (Darstellung von absolutem Alkohol) hat sich nicht bewahrt — Therapeutisch ist es von GUINARD zur Bekämpfung der Blutungen des weiblichen Geschlechtsorgans empfohlen worden. Zu diesem Zwecke werden über Nacht nussgrosse Stücke des Calciumkarbids in der Scheide belassen.

Calciumkarbid, petrolisirtes oder paraffinirtes. Um das Calciumkarbid gegen die Einflüsse der Luft einigermassen widerstandsfähig zu machen, trankt man es, nachdem es in haselnussgrosse Stücke zerkleinert worden ist, mit Petroleum oder Paraffin. In diesem Zustande ist es einigermassen unempfindlich gegen die Luftfeuchtigkeit, wird aber von Wasser noch mit genügender Energie angegriffen.

Werthbestimmung. Da der Werth des Calciumkarbids in der Menge des entwickelten Acetylgases liegt, so würde es nahe liegen, eine Werthbestimmung auf die Volummenge des aus der Gewichtseinheit entwickelten Acetylen zu gründen. Diese Art der Bestimmung stösst aber auf Schwierigkeiten, weil 10 g Calciumkarbid schon 3 Liter Acetylen liefern. Um also noch genau messbare Mengen Acetylen zu erhalten, müsste man sehr kleine Mengen von Calciumkarbid in Arbeit nehmen. Bei der leichten Veränderlichkeit des Calciumkarbids an der Luft würde aber schon die Wägung eine erhebliche Fehlerquelle in sich schliessen. H. BAMBERGER hat daher empfohlen, die Gehaltsbestimmung ähnlich wie bei der Bestimmung der Kohlensäure auf den Gewichtsverlust zu gründen. Der benutzte Apparat ist dem MOHR'schen Apparat zur Kohlensäure-Bestimmung nachgebildet, aber erheblich grösser.

Der Apparat besteht aus einer zweihalsigen Flasche von 400 ccm Fassungsvermögen, welche in dem einen Tubus ein Chlorcalciumrohr trägt, während durch den anderen ein 250 ccm fassender Tropftrichter hindurchführt. — Zur Ausführung der Analyse bringt man in die Flasche 50–60 g grob zerschlagenes Calciumkarbid, füllt in den Trichter etwa 200 ccm einer 15–20 procentigen Kochsalzlösung und bestimmt das Gesamtgewicht des Apparates auf einer noch 0,01 g anzeigenden Tarrwaage. — Lässt man jetzt vorsichtig die Kochsalzlösung zutropfen, anfangs 5–6 Tropfen in der Minute, so wird das Karbid zersetzt ohne die heftige Reaktion, welche mit reinem Wasser eintritt, und der langsam entweichende Gasstrom wird durch das Calciumchlorid getrocknet. Wenn nach 3–4 Stunden die Hälfte der Kochsalzlösung zuge tropft ist, lässt man den Rest auf einmal zu, erwärmt etwas, saugt 10 Minuten Luft durch den Apparat und wägt nach dem Erkalten. Die Gewichts Differenz ergibt die Ausbeute an Acetylen, aus der man, unter Berücksichtigung, dass 1 kg Reinkarbid = 406,25 g (40,625 Proc) oder 348,9 l (bei 0° C und 760 mm B) Acetylen liefert, sowohl den Gehalt an Reinkarbid wie an Gasausbeute berechnen kann.

Acetylenum Acetylen. Aethin. Steingas. C_2H_2 Mol Gew. = 26.

Wie schon erwähnt wurde, wird das Acetylen in sehr einfacher Weise durch Einwirkung von Wasser auf Calciumkarbid dargestellt.

Eigenschaften. Farbloses, unangenehm, aber nicht nach Phosphorwasserstoff riechendes Gas. Spec Gewicht (Luft = 1) = 0,90. Bei 0° C kann es durch einen Druck von 21,5 Atmosphären verflüssigt werden. Das flüssige Acetylen siedet bei –83° C. Beim raschen Verdunsten hinterlässt es festes Acetylen vom Schmelzp. –81° C. Die kritische Temperatur für die Verdichtung ist = +37° C. 1 Liter Acetylgas wiegt bei 0° C und 760 mm B = 1,165 g. 1 kg flüssiges Acetylen entspricht = 858 Liter Gas bei 0° C und 760 mm B.

Das Acetylgas ist in Wasser ziemlich löslich. 1 Vol Wasser löst 1 Vol Acetylgas, Alkohol und Aether lösen es reichlicher. Dagegen ist es in concentrirter Kochsalzlösung fast unlöslich. — Wird es durch ammoniakalische Kupferchloridlösung durchgeleitet, so entsteht ein brauner, beim Durchleiten durch ammoniakalische Silberlösung ein weisser Niederschlag von Acetylen Kupferoxydul C_2H_2 , Cu_2O bez Acetylen Silberoxyd C_2H_2 , Ag_2O . Beide Niederschläge sind im trockenen Zustande sehr explosiv. Wegen der möglichen Bildung des ersten Niederschlages hat man Kupfer als Material für die Acetylen Leitungen etc. auszuschliessen, ausserdem bemüht man sich, das Ammoniak aus dem Acetylen durch Waschen zu entfernen.

Wird unvermisches Acetylen an der Luft entzündet, so verbrennt es mit heller, stark russender Flamme. Das Russen kann unterdrückt werden, und das Acetylen wird als Lichtquelle besonders vorthailhaft ausgenutzt, wenn man geeignete Gemenge von Acetylen mit Luft (oder Sauerstoff) zur Verbrennung bringt. Ein solches geeignetes Gemenge ist eine Mischung von 3 Vol Acetylen und 2 Vol Luft. Ein solches Gemenge verbrennt, wenn es unter einem Druck von etwa 60 mm Wassersäule aus engen Oeffnungen ausströmt, ohne zu russen mit blendend weissem Lichte. Ein Brenner, welcher pro Stunde 140 Liter Acetylen verbrennt, hat eine Leuchtkraft von 240 Normal-Stunden-Kerzen. (Leuchtgas giebt unter den gleichen Bedingungen nur 16 Normal-Stunden-Kerzen. 140 Liter Leuchtgas im Auer-Brenner ergeben etwa 120 Normal-Stundenkerzen.)

Gemische von Acetylen mit Luft verbrennen unter Explosion. Solche Gemische sind gefühlicher als ähnliche Gemische von Leuchtgas mit Luft, denn die Explosionsfähigkeit in solchen Gemischen ist noch vorhanden innerhalb folgender Grenzen: 1) Gemisch von 3 Vol Proc Acetylen mit 97 Vol Proc Luft bis 2) Gemisch von 81 Vol Proc Acetylen mit 19 Vol. Proc Luft. Das Explosions-Maximum zeigt ein Gemisch von 1 Vol Acetylen mit 12 Vol Luft. — Gelangt ein Gemisch von 1 Vol. Acetylen mit 1 Vol Sauerstoff zur Verbrennung, so kann eine Temperatur von 4000°C erzeugt werden.

Eingeathmet wirkt das Acetylen zwar auf den Organismus giftig, aber weniger giftig als Leuchtgas. Es verursacht keine nachweisbare Veränderung des Blutes (Unterschied vom Leuchtgas, bez Kohlenoxyd) und wirkt mehr narotisch. Säugethiere können in einer Luft mit 9 Vol. Proc Acetylen ohne merkliche Beeinflussung noch leben.

Reinigung. Das aus technischem Calciumkarbid dargestellte Acetylen enthält bis zu 4 Proc Verunreinigungen, von denen die wichtigsten Phosphorwasserstoff und Schwefelwasserstoff sind, während den übrigen Ammoniak, Kohlenoxyd, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff geringere Bedeutung zukommt. Ein solches Rohacetylen zeigte z. B. folgende Zusammensetzung:

I. Aus amerikanischem Karbid		II. Aus Schweizer Karbid	
Acetylen	98,87 Proc	99,87 Proc	
Phosphorwasserstoff	0,04 "	0,02 "	
Schwefelwasserstoff	0,02 "	—	
Ammoniak	0,06 "	0,04 "	

Die Entfernung dieser Verunreinigungen erscheint nothwendig, weil sie zum Theil giftig sind, ferner, weil möglicherweise selbstentzündlicher Phosphorwasserstoff auftreten kann und weil endlich das Ammoniak in Gemeinschaft mit dem Acetylen zur Bildung explosiver (Cu-) Verbindungen Veranlassung geben kann.

Die Reinigung erfolgt dadurch, dass man das Gas zunächst in Wasser wäscht, welches das Ammoniak aufnimmt, sodann über feuchten Chlorkalk leitet, welcher die Phosphorwasserstoffe zu Phosphorsäure oxydirt, hierauf über Kupfersulfat oder Lammische Masse (Eisenhydroxyd) führt, welche den Schwefelwasserstoff bindet und schliesslich durch Ueberleiten über Aetzkalk trocknet. Das Trocknen kann auch zweckmassig durch Calciumkarbid erfolgen.

Komprimirtes Acetylen. Während gasförmiges Acetylen, welches unter gewöhnlichem Druck steht, zur Explosion nicht neigt, stellt Acetylen, welches unter Druck steht, einen Energie-Speicher — etwa wie ein Explosionsstoff — dar, welcher unter günstigen Bedingungen seine Energie abgiebt, d. h. explodirt. Eine solche Explosion nennt man eine innere Entflammung.

Gasförmiges Acetylen ist fähig, infolge einer inneren Entflammung zu explodiren, wenn ein Behälter von 1 Liter Fassungsraum mehr als 2,5 g Acetylen enthält. In Aceton gelöstes Acetylen ist einer inneren Entflammung nur dann ausgesetzt, wenn der anfängliche Druck 10 Atmosphären überschreitet.

Deshalb ist durch verschiedene Verordnungen festgesetzt, dass komprimirtes Acetylen nur unter bestimmten Vorsichtsmassregeln verwendet werden darf.

Flüssiges Acetylen Flüssiges Acetylen kommt zwar im Handel vor, indessen gilt dasselbe zur Zeit noch für eine recht gefährliche Substanz, deren Eigenschaften noch keineswegs genau bekannt sind. Man wird daher gut thun, das Hantiren mit dieser Substanz vorläufig zu unterlassen.

Wir geben an dieser Stelle einen Auszug der für den Reg. Breslau erlassenen Polizei Verordnung über den Verkehr mit Acetylen und Calciumkarbid wieder.

Die Apparate zur Entwicklung und Aufbewahrung von Acetylen gas müssen so eingerichtet sein, dass in ihnen kein höherer als ein Ueberdruck von einer Atmosphäre sich bilden kann.

Calciumkarbid in Mengen von mehr als 10 kg muss in wasserdicht geschlossenen Gefässen in trockenen, hellen, gut gelüfteten Räumen aufbewahrt werden. Die Lagerung im Keller ist untersagt.

Die Gefässe müssen die Aufschrift tragen „*Karbid, gefährlich, wenn nicht trocken gehalten*“.

§ 7 Die zur Aufnahme flüssigen Acetylen bestimmten Flaschen müssen durch einen weissen Anstrich und die Aufschrift „*Flüssiges Acetylen, feuer gefährlich*“ gekennzeichnet, mit Angabe der Tara und des Fassungsraumes in Litern versehen und auf einen Druck von 250 Atmosphären geprüft sein.

Bei der Füllung der Flaschen darf das Verhältniss von 1 kg Acetylen auf 3 l Wasser Rauminhalt nicht überschritten werden.

§ 9 Die Flaschen für verdichtetes Acetylen gas müssen durch die Aufschrift „*Acetylen gas, feuergefährlich*“ gekennzeichnet und mit der Angabe des höchsten zulässigen Druckes versehen sein. Sie müssen mit dem doppelten des zulässigen Druckes geprüft sein.

§ 10 Die mit flüssigem oder komprimiertem Acetylen gefüllten Flaschen dürfen weder der Sonne noch der Ofenwärme ausgesetzt werden.

§ 11 Flüssiges oder verdichtetes Acetylen dürfen nur in Flaschen gefüllt werden, an denen kein Theil aus Kupfer oder Kupferlegierungen besteht.

Wir empfehlen darauf zu achten, dass sämtliche Verordnungen unterscheiden

1) Acetylen gas, 2) komprimirtes Acetylen gas und 3) flüssiges Acetylen.

Da die kritische Temperatur des Acetylen bei $+37^{\circ}\text{C}$ liegt, so stellen mit flüssigem Acetylen gefüllte Gefässe bei dieser oder höherer Temperatur einen Energie Speicher von hoher Spannung dar. Der Druck in den Gefässen ist bei 37°C und darüber nicht bloss von der Temperatur, sondern auch von dem Grade der Füllung abhängig (vergl. S. 32).

Karburisation Die Hoffnungen, welche man darauf gesetzt hatte, es werde gelingen, dem Steinkohlen-Leuchtgas durch Beimischung eines gewissen Procentsatzes von Acetylen eine bedeutend höhere Leuchtkraft zu ertheilen, scheinen sich nicht erfüllt zu haben. Zwar die Ansicht vieler Gastechner, dass Acetylen und Leuchtgas wegen der abweichenden spec. Gewichte sich nicht zu einem homogenen Gemenge vereinigen lassen, [dass sich vielmehr beide Gase aus dem Gemisch nach ihren verschiedenen specifischen Gewichten wieder trennen wurden], muss aus theoretischen Erwägungen als unzutreffend bezeichnet werden, aber es scheint, dass die Leuchtkraft solcher Gemische den gehegten Erwartungen nicht entsprochen hat.

Dagegen haben Versuche ergeben, dass das aus Petroleum-Rückständen gewonnene Oelgas sich mit Acetylen karburiren lässt. Die preussischen Eisenbahn-Verwaltungen benutzen mit Vortheil zur Beleuchtung der Eisenbahnwagen ein Mischgas, welches aus 35 Vol. Acetylen und 65 Vol. Oelgas besteht. Dieses Gemisch verträgt eine Kompression auf 6 Atmosphären ohne sich zu verflüssigen oder Explosionsgefahr zu bieten.

II. Carbideum Aluminiumi Aluminiumkarbid C_3Al_4 Mol. Gew. = 144.

Wird durch Schmelzen einer Mischung von Kaolin mit Kohle oder Aluminium mit Kohle im elektrischen Ofen wie das Calciumkarbid dargestellt. Im reinen Zustande gelbe Krystalle, spec. Gew. = 2,86. Das technische Produkt stellt ein gelbliches Pulver dar.

Die wichtigste Reaktion dieser Verbindung besteht darin, dass sie, mit Wasser zusammengebracht, im Sinne der nachstehenden Gleichung $\text{C}_3\text{Al}_4 + 12\text{H}_2\text{O} = 3\text{CH}_4 + 2[\text{Al}_2(\text{OH})_6]$ in Methan und Aluminiumhydroxyd zerlegt wird. — Die Zersetzung erfolgt in der Kälte nur langsam, weitaus energischer mit mässig warmem Wasser.

Das Aluminiumkarbid wird zur Zeit namentlich von Sprengstoff-Fabriken verwendet, um in ihren Versuchsstationen schlagende Wetter (d. i. Mischungen von Methan und Luft) nachzubilden.

III Carbidum Silicii Siliciumkarbid. Carborundum. SiC . Mol. Gew. = 40

Wird durch Zusammenschmelzen von 50 Th Kohle (Koks) und 25 Th Kieselsäure (Sand) bei Gegenwart eines Flussmittels, wie Kochsalz, im elektrischen Ofen dargestellt.

Im reinen, bez. eisenfreien Zustande ist es farblos, bisweilen erhält man reguläre Hexaeder vom spec. Gew. 3,22. Bei der technischen Darstellung erhält man kleine verschiedenartig gefarbte, meist blauschwarze (eisenhaltige) Krystalle.

Das technische Siliciumkarbid wird „Carborundum“ genannt. Es ist ausser ordentlich hart, nützt Saphir, wird aber selbst vom Diamanten geritzt. Es ist unlöslich in Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, fast unlöslich in Fluorwasserstoffsäure. Beim Schmelzen mit Natriumkarbonat oder Natronhydrat wird es unter Abscheidung von Kohlenstoff zu Natriumsilikat aufgeschlossen. Bei Weissgluth verbrennt es im Luft- oder Sauerstoffstrome nur schwierig zu Kieselsäure und Kohlensäure.

Die Carborundum Krystalle werden durch Stampfen zerkleinert und das Pulver nach dem Feinheitsgrade wie Smirgel sortirt. Man benutzt es zum Schleifen von Diamanten und, mit einem festen Bindemittel in Form von Rädchen oder Prismen gebracht, zum Schneiden von Glas, zum Schleifen von Glas, auch zum Bearbeiten von Metallen. Carborundum verrichtet in der Zeiteinheit etwa 3–4 mal mehr Schleifarbeit als Korund.

Carbo animalis.

I. Carbo Carnis Carbo animalis (medicorum) (Ergänzb.) Fleischkohle. Thierkohle (medizinische).

Bereitung. Von dem Fette befreites und in kleine Stücke zerschnittenes Kalbfleisch wird mit ungefähr dem dritten Theile seines Gewichtes kleiner Kalbsknochen in einem passenden bedeckten Gefasse geröstet, so lange brennbare Dämpfe daraus hervortreten. Der erkaltete Rückstand wird in ein Pulver verwandelt. (Ergänzb.)

Das Gefäß, in welchem die Röstung vorgenommen wird, ist am besten ein gusseiserner Topf, welcher mit dem Fleische nur zu $\frac{1}{2}$ seines Rauminhaltes angefüllt und mit einem thönernen Deckel bedeckt ist. Das Kohlenfeuer, durch welches die Erhitzung des Topfes geschieht, darf nur ein mässiges sein. Die Ausbeute beträgt etwa 7 Proc.

Eigenschaften. Die Fleischkohle ist ein braunschwarzes, wenig glänzendes (natt metallisch glänzendes), sehr wenig brenzlich riechendes, in Rothglühhitze fast ohne Flamme erglühendes Pulver. Sie unterscheidet sich von der in der chemisch-technischen Praxis häufig „thierische Kohle“ genannten Knochenkohle genügend durch ihre stark braun nuancirte Schwärze und eine bedeutend geringere Eigenschwere, chemisch durch einen fünf mal geringeren Gehalt an Knochenerde. Unter dem Namen „Carbo animalis“, Thierkohle, werden in den Pharmakopöen und in der Technik verschiedene Substanzen verstanden, welche wohl auseinander zu halten sind.

Die Fleischkohle enthält neben Calciumphosphat hauptsächlich stickstoffhaltige Kohle, welcher man die Formel C_xN_y zuschreibt. In Berührung mit der Luft erleidet sie keine merkliche Veränderung.

Aufbewahrung. Man bewahrt die Fleischkohle in dicht verschlossener Glasflasche. Diese Aufbewahrung ist nothwendig, da die Fleischkohle nur selten in Anwendung kommt und ein Quantum von 50 g für den Gebrauch während mehrerer Jahre auszureichen pflegt.

Beim Erhitzen an der Luft hinterlässt sie eine beträchtliche Menge (etwa 60 Proc.) von Asche, beim Ausziehen mit Salzsäure giebt sie ein Filtrat, welches auf Zusatz von Ammoniak einen reichlichen gallertartigen Niederschlag giebt.

Anwendung. In ihren physikalischen Eigenschaften gleicht die Fleischkohle etwa der Knochenkohle und der Holzkohle, d. h. sie hat wie diese ein starkes Absorptionsvermögen. Sie unterscheidet sich von diesen durch einen grosseren Gehalt an Stickstoffverbindungen. Bezüglich des Gehaltes an anorganischen Salzen steht die Fleischkohle in der Mitte zwischen der Knochenkohle und der Holzkohle. — Man giebt die Fleischkohle innerlich zu 0,5–2,0 g 3–4mal täglich bei krebigen Leiden der Brüste, Gebärmutter, Lippen etc., bei Verhartungen dritiger Organe, Skropheln, ausserlich in Substanz und in Salbenform bei krebigen Wunden. Ueber die Wirkung ist man sich insofern nicht ganz im klaren, als gerade die Fleischkohle von den Medicinern häufig mit der gereinigten Thierkohle verwechselt wird. — Die Volksmedizin schreibt der Fleischkohle von gewissen Thieren ganz besondere Heilkraft zu. Hierher wurden z. B. gehören die Schwalbenkohle, *Hirundines ustae*, und die Maulwurfskohle, *Talpae ustae*.

II Carbo Ossium Carbo animalis crudus. Carbo animalis (U-St.) Charbon animal ordinaire (Gall.) Cornu Cervi ustum nigrum. Ebur ustum Spodium Knochenkohle. Knochen schwarz Beinschwarz Thierische Kohle. Dieses Produkt entsteht durch Glühen von Knochen bei Luftabschluss, wobei das organische Gewebe der selben verkohlt und die Kohle in der unorganischen Grundsubstanz der Knochen (Knochenerde) abgelagert wird. In den Handel gelangt die Knochenkohle entweder im gekörnten oder im gepulverten Zustande.

Darstellung. Knochen von grösseren Thieren werden zunächst durch Extraktion mittelst Benzin, Schwefelkohlenstoff oder Kohlenstofftetrachlorid entfettet (das Fett wurde Veranlassung zur Bildung von unwirksamer Glanzkohle geben) und alsdann entweder zerkleinert oder bis zu Bohnengrosse zerkleinert (Patent-Kohle) durch Erhitzen in Töpfen oder in eisernen Retorten bei Luftabschluss verkohlt. Als Nebenprodukte werden gewonnen Stinkendes Thieröl, Leuchtgas und Ammoniak.

Die gewonnene Kohle wird durch Absieben bez. Zerkleinern auf eine bestimmte Korngrösse (von Bohnengrosse) gebracht. Alle Abfälle werden gepulvert.

Die granulirte Knochenkohle wird meist in die Zuckerfabriken bez. in andere chemische Fabriken als Entfärbungsmittel geliefert, das Pulver wird hauptsächlich zur Färbung von Schuhwischen verbraucht.

Eigenschaften. Die gekörnte Knochenkohle stellt linsen-, erbsen- bis bohnen-grosse Stuckchen dar, deren Kanten nicht abgeschliffen sind. Eine gute Kohle ist rein schwarz mit sammetartig matter Bruchfläche, welche an der feuchten Zunge einige Zeit haften bleibt. Kohle, deren Bruchfläche glänzend und glasartig ist, entfärbt nicht gut. Ein gerüttelter Liter von Kohle dieser Korngrösse wiegt 730–780 g, unter keinen Umständen aber mehr als 800 g.

Ihrer chemischen Zusammensetzung nach besteht die Knochenkohle aus rund 90 Proc. anorganischen Bestandtheilen und nur etwa 10 Proc. Kohlenstoff. Die nähere Zusammensetzung einer guten Knochenkohle ist z. B. folgende:

Kohlenstoff + Stickstoffkohle	11,0 Proc.	Calciumsulfat CaSO_4	0,2 Proc.
Calciumphosphat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	80,0 "	Alkalisalze	0,4 "
Magnesiumphosphat $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$		Eisenoxyd Fe_2O_3	0,1 "
Calciumkarbonat CaCO_3	8,0 "	Kieselsäure SiO_2	0,3 "

Sie hinterlässt beim Glühen etwa 85 Proc. einer fast weissen Asche.

Die Verwendung in der Technik verdankt die Knochenkohle ihrer Absorptionswirkung, d. h. der Fähigkeit, gewisse in Lösungen befindliche Substanzen, wie Farbstoffe, Alkaloide, Glukoside, Kohlehydrate, anorganische Salze, aber auch Gase und Dämpfe auf sich niederzuschlagen. Diese Absorptionswirkung wird z. Z. auf Flächenanziehung zurückgeführt und erklärt sich dadurch, dass der Kohlenstoff in der Knochenkohle ausserordentlich fein vertheilt ist und infolgedessen eine grosse Oberfläche darbietet. — Das Absorptionsvermögen ist übrigens begrenzt und verschiedenen Stoffen gegenüber verschieden. Auch kann es z. B. einer bestimmten Substanz gegenüber erschöpft sein, während eine andere Substanz noch aufgenommen wird.

Prüfung. Die Knochenkohle ist beim Einkauf sorgfältig zu prüfen, denn es kommt nicht nur vor, dass eine durch fehlerhafte Bereitung unwirksam gewordene oder unerwünschte Wirkungen zeigende Kohle in den Verkehr gebracht wird, sondern es erfolgen auch Verfälschungen durch bereits im technischen Betriebe gewesene Kohle, ferner durch Kohle aus Knochen der Leinwandereien (denen der Leim durch Auskochen mit Wasser entzogen worden ist), endlich durch verkohlte Braunkohle u dgl.

1) Sie sei von mattem tiefem Schwarz, auf dem Bruche matt schwarz, sammetartig, nicht glänzend braunliche oder rötlich schwarze Färbung weist darauf hin, dass die Kohle nicht gar gebrannt ist, bläulichgraue oder weisslichgraue Färbung macht es wahrscheinlich, dass die Kohle zu stark erhitzt wurde, also arm an Kohlenstoff ist — Zeigen sich bei Betrachtung mit der Lupe die Ecken und Kanten stark abgeschliffen, so ist die Kohle wahrscheinlich schon einmal im Betrieb gewesen 2) Wassergehalt 5 g einer fein gepulverten Durchschnittsprobe der Knochenkohle werden in flacher Schale eine Stunde bei 120° C getrocknet, dann gewogen. Der Gewichtsverlust soll nicht mehr als 5 Proc betragen 3) Kohlenstoff und Sand. Man übergiesst in einem Becherglase 5 g Knochenkohle mit 50 ccm Wasser, setzt allmählich 50 ccm Salzsäure zu und erhitzt einige Zeit zum Sieden. Man lässt absetzen, dekantiert durch ein bei 100° C gewogenes Filter, kocht nochmals mit salzsäurehaltigem Wasser aus, bringt den gesamten Rückstand auf das Filter und wäscht ihn erst mit heissem salzsäurehaltigem Wasser, dann mit reinem heissem Wasser aus, trocknet bei 100° C und wägt. Dann verascht man Filter und Inhalt. Zieht man dieses den Sand darstellende Gewicht von demjenigen des Gesamtückstandes ab, so erhält man das Gewicht des Kohlenstoffes 4) Man füllt ein Litermaass gerüttelt voll mit der Kohle und stellt das Gewicht fest. Beträgt es mehr als 800 g, so liegt bereits gebrauchte Kohle vor, deren Ltergewicht bis auf 1000 g steigen kann 5) Wird Kohle mit 8procentiger Kalilauge erhitzt, so muss die Flüssigkeit nach dem Absetzen farblos erscheinen. Braune Färbung beweist, dass noch mangelhaft verkohlte organische Substanz zugegen ist. Eine solche Kohle entfärbt nicht, ertheilt vielmehr den betreffenden Substanzen braune Färbung, was zu ganz unangenehmen Weiterungen führen kann 6) Das Entfärbungsvermögen prüft man meist empirisch, indem man zu Rothwein, Caramel Lösung und ähnlichen gefärbten Lösungen etwas Knochenkohle giebt und zusieht, ob und innerhalb welcher Zeit Entfärbung eintritt.

Gepulverte Knochenkohle. In der gepulverten Knochenkohle (dem Spodium) können die oben angeführten Verunreinigungen bez Verfälschungen sehr viel schwieriger nachgewiesen werden. Zur Darstellung der gepulverten Knochenkohle geht man daher stets von der gekörnten Knochenkohle aus.

III. Carbo Ossium depuratus. Carbo animalis depuratus. Carbo animalis purificatus (U-St.) Charbon animal purifié (Gall.) Gereinigte Knochenkohle. Gereinigte Thierkohle. Mit den vorstehenden Namen wird diejenige Kohle bezeichnet, welche der Chemiker im Laboratorium als Entfärbungsmittel bei analytischen und synthetischen Arbeiten benutzt.

1000 Th gekörnte Knochenkohle guter Qualität werden in einem Glaskolben oder in einem Porcellangefäss oder in einem glasurten irdenen Topfe mit 3000 Th heissem Wasser angestellt, worauf man in mehreren Antheilen 1000 Th Salzsäure von 25 Proc zugeht. Nachdem die Gasentwicklung im wesentlichen vorüber ist, digerirt man die Masse etwa 6 Stunden unter Umrühren auf dem Wasserbade, und lässt noch 24 Stunden an einem warmen Orte stehen. Nach dieser Zeit entnimmt man eine Probe der Kohle, wäscht sie mit Wasser vollständig aus und stellt fest, ob sie an Salzsäure von 6 Proc noch etwas Lösliches abgibt. Der salzsäure Auszug darf durch Uebersättigen mit Ammoniak nicht getrübt werden. Ist dieses der Fall, so kühlt man die Kohle ab, wäscht sie 3 bis 4mal mit Wasser aus und wiederholt das oben beschriebene Ausziehen mit Wasser und Salzsäure noch einmal.

Ist der Kohle alles entzogen, was durch Salzsäure in Lösung geht, so kühlt man sie ab, wäscht sie solange, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt und auch durch

Silbernitrat nicht mehr getrubt wird. Dann trocknet man sie erst im Wasserbade, schliesslich einige Zeit im Luftbade bei 150° C und bewahrt sie in gut verschlossenen Gefässen auf. Einige Chemiker bewahren die ausgewaschene Kohle auch im feuchten Zustande auf.

Hat man ein nicht verunreinigtes fliessendes Gewässer in der Nahe, so vollzieht sich das Auswaschen auch grosserer Mengen sehr rasch, wenn man die Kohle, in einen Beutel eingebunden, einige Zeit in den Wasserlauf einhängt und schliesslich mit destillirtem Wasser zu Ende wascht.

Prüfung 1) Man kocht 1 g der Kohle mit 50 ccm Wasser aus. Das Filtrat sei neutral, farblos und werde weder durch Silbernitrat noch durch Baryumchlorid verändert. Färbt man 10 ccm des Filtrates mit Indigolösung deutlich blau und lässt alsdann ein gleiches Volumen reiner Schwefelsäure zufließen, so darf Entfärbung nicht eintreten. 2) Wird 1 g der Kohle mit einer Mischung von 40 ccm Wasser und 10 ccm Salzsäure ausgekocht, so darf das Filtrat durch Uebersättigen mit Ammoniak nicht blau (Kupfer) werden, auch keine braune Färbung (Eisen) zeigen. Die ammoniakalische Lösung darf weder durch Ammoniumoxalat (Kalk), noch durch Ammoniumsulfid (Eisen) verändert werden.

IV Carbo animalis e sanguine Blutkohle. Blutlaugenkohle. Ist eine thierische Kohle, welche in ihren physikalischen Wirkungen die vorerwähnte gereinigte Knochenkohle um vieles übertrifft. Sie wird daher für Arbeiten des kleinen chemischen Laboratoriums verwendet. 1000 Th frisches Blut werden mit 125 Th gereinigter Pottasche (oder 280 Th krystallisirtem Natriumkarbonat) gemischt und in einem eisernen Kessel unter Umrühren zur Trockne eingedampft. Die trockene Masse wird in einen Gluthiegel eingeschichtet, so dass dieser nur zu einem Drittel angefüllt ist, der Tiegel mit einem irdenen Deckel bedeckt und so lange erhitzt, als Dämpfe hervortreten. Die rückständige Kohle wird gepulvert, zuerst mit heissem destillirtem Wasser, dann erst mit verdünnter reiner Salzsäure und zuletzt mit destillirtem Wasser bis zur Chlorfreiheit ausgewaschen, schnell trocken gemacht und in gut verkorkten Flaschen aufbewahrt.

V Carbo animalis ex albumine Albuminkohle. Fein gepulverte Knochenkohle wird mit soviel Hühnereweiss gemischt, dass eine Pasta entsteht, welche zertheilt und scharf getrocknet in einem bedeckten Tiegel gegluht, dann gepulvert mit verdünnter Salzsäure und Wasser behandelt wird, wie bei Darstellung der gereinigten Knochenkohle angegeben ist.

Diese Albuminkohle wird zur Klärung des Bieres und Weines gebraucht, und kommt der Blutlaugenkohle eingermessen in der Wirkung nahe.

VI Carbo Spongiae Spongiae ustae. Eponge torréfiée (Gall) Schwammkohle. Meerschwämme (und zwar Abfälle derselben) werden durch mechanisches Auslesen von den beigemengten Konchylien, ferner durch Klopfen und Schütteln in einem Gazenetz vom Staub und von beigemengtem Sande befreit, hierauf in einem lose bedeckten Tiegel oder in einer Kaffeetrommel solange erhitzt, bis brennbare Dämpfe nicht mehr entweichen. Nach dem Erkalten reibt man die Schwammkohle unter gelindem (!) Druck durch ein feines Sieb, so dass die unorganischen Verunreinigungen, wie Sand und Steinen etc., möglichst zurückbleiben. Ausbeute 20—25 Proc. Feines, schwarzes oder braunschwarzes Pulver entweder geruchlos oder von nur schwach brenzlichem Geruch und von salzigem Geschmack, zwischen den Fingern zart, nicht sandig anzufühlen. Es giebt an Wasser lösliche Bestandtheile ab, reichlichere Mengen werden unter Aufbrausen von Salzsäure gelöst. Es enthält einige Procente Natriumjodid. Beim Glühen an der Luft hinterbleibt eine weissliche Asche, welche in Salzsäure fast vollständig löslich ist, ohne erhebliche Mengen Sand zu hinterlassen.

Anwendung der Thierkohle. Wie schon erwähnt, wird die thierische Kohle wegen ihrer Absorptionsfähigkeit in den Gewerben und in der Technik angewendet. Das Absorptionsvermögen der einzelnen Kohlesorten ist nun je nach der Art der Kohle recht verschieden. Im allgemeinen kann man annehmen, dass — gute Sorten vorausgesetzt — 1 Theil Blutkohle die gleiche Wirkung ausübt wie 4 Theile gereinigte Knochenkohle oder

40 Theile Holzkohle — Um die Wirksamkeit der Kohle möglichst auszunutzen, wendet man sie in Pulverform an und erwärmt die zu entfärbenden Flüssigkeiten auf 40—70° C

1) Absorbirende Kraft für Gasarten Wie andere poröse Körper hat die Kohle in ausgezeichnetem Grade die Eigenschaft, Gase zu absorbiren. 1 Volum frisch ausgeglühter Buchsbaumkohle vermag z B 90 Vol Ammongas, 55 Vol Schwefelwasserstoffgas, 35 Vol Kohlensäure, 10 Vol Sauerstoff zu absorbiren Ist die Kohle schon mit einem Gase gesättigt, so nimmt sie kaum noch etwas von einem anderen Gase auf Eine mit Luft gesättigte Kohle muss daher, um sie zur Absorption anderer Gase, ubler Gerüche etc fähig zu machen, unter Luftabschluss frisch gegluht werden Durch Absorption von Wasserdampf vermag sie ihr Gewicht um 12—20 Proc zu vermehren Die Absorption des Wasserdampfes geschieht unter Wärmeentwicklung Bei der Verdichtung der Gase durch Kohle findet oft eine solche Wärmeentwicklung statt, dass die Kohle sich entzündet

2) Absorbirende Kraft für Riechstoffe Diese Kraft ist der vorerwähnten nahestehend und zugleich die Ursache, faulnisswidrig und desodorirend zu wirken Organische Stoffe, welche zur Faulniss neigen, halten sich in Kohlenpulver gehüllt lange Zeit unverändert Uebelriechendes oder fauliges Wasser durch Kohlen filtrirt wird wieder trinkbar Ueberhaupt findet die Kohle häufige Anwendung, Flüssigkeiten von riechenden Stoffen zu befreien Dieses Geruchlosmachen geschieht durch Maceration und Digestion der Kohle mit der Flüssigkeit Derselbe Eigenschaft macht die Kohle auch zu einem nützlichen Material, damit ubelriechende Gefässe, Gerathschaften, wie Morser, Flaschen, Pillenmaschinen etc abzuscheuern und zu reinigen

3) Absorbirende Kraft für Farbstoffe. Die Kohle hat ferner die Eigenschaft, Farbstoffe auf sich niederzuschlagen oder mit anderen Worten zu entfärben. Diese Eigenschaft gehört vorzugsweise der sogenannten Blutlaugenkohle oder animalischen Kohle an Gefärbte Salzlösungen werden entweder durch Digestion oder durch Kochen mit Kohle entfärbt Selbst Mutterlangen, welche unaussehnliche Krystalle liefern, geben häufig nach der Digestion mit Kohle schone und farblose Krystalle aus Viele der von der Kohle aufgenommenen Farbstoffe können wieder durch chemische Agentien davon getrennt werden Eine Kohle, welche Ammongas kondensirt hat, hat erfahrungsgemäss eine erheblich geringere Entfärbungskraft Setzt man die Entfärbungskraft der gewöhnlichen Knochenkohle gleich 1, so ist dieselbe Kraft der Blutlaugenkohle gleich 40—50

4) Absorbirende Kraft für chemisch indifferente Stoffe, Bitterstoffe, Glukoside, Kohlehydrate etc Die Kohle, welche sich mit Wasser gesättigt hat und dann mit Lösungen der vorerwähnten Körper digerirt wird, giebt einen Theil des absorbirten Wassers ab und nimmt dafür entsprechende Mengen der erwahnten Substanzen auf Mehrere dieser Stoffe lassen sich, wenn sie leicht in Weingeist löslich sind, alsdann durch Digestion oder Kochung mit Weingeist der Kohle entziehen

5) Absorbirende Kraft für neutrale, aber schwerlösliche Salze der Erden, sowie für in Lösung befindliche Oxyde der Schwermetalle und Schwermetallsalze Die Entfernung aller dieser Substanzen aus Flüssigkeiten, welche oft nur durch längere chemische Operationen zu erreichen ist, wird durch Blutlaugenkohle und Digestion oder Kochung erreicht Z B bei Darstellung von Bittersalz enthält die Krystallisationslange gewöhnlich Calciumsulfat Durch Digestion mit gereinigter Knochenkohle lässt sich dieses schwerlösliche Salz vollkommen auf die Kohle niederschlagen Enthält die Pottasche Oxyde des Eisens und Mangans, so genügt eine Digestion mit gereinigter Knochenkohle, beide Oxyde vollständig zu entfernen Bleisalze, Kupfersalze, auch Zinksalze und Antimonsalze als Verunreinigungen von Säuren und Salzen lassen sich in gleicher Weise beseitigen und stets verhältnissmässig um so leichter, wenn die Salze in Wasser mehr oder weniger schwer löslich sind. Das Metallsalz wird entweder unverändert von der Kohle aufgenommen, oder es wird zersetzt und das Metalloxyd resorbirt oder selbst reducirt Metallsäuren, welche schwerlöslich sind oder in einen schwerlöslichen Zustand übergehen können, wie Wolframsäure, Antimonsäure, Molybdänsäure, vermag die Kohle selbst aus ihren Salzverbindungen abzuschneiden und auf sich niederzuschlagen

0) Absorbirende Kraft für alle Alkalien und alkalischen Erden, Carbonate derselben und für Alkaloide. Es findet stets ein Verlust statt, wenn man Alkaloidlösungen mit Kohle zu entfarben sucht. Eine Entfärbung derselben sollte immer nur in einer sauren Lösung vorgenommen werden. Brunnenwasser, welches von Chloriden ziemlich frei ist, kann durch Schütteln und Digestion mit animalischer Kohle in ein eben so reines oder noch reineres Wasser verwandelt werden, als durch Destillation. Kalkcarbonat, Ammonkarbonat, Kalksulfat, Kohlensäure und organische Stoffe, welche in dem Brunnenwasser vorhanden sind, werden durch Digestion mit gereinigter Thierkohle von dieser vollständig absorbiert. Ist der Gehalt an Chlornatrium nur ein geringer, so wird auch dieses absorbiert, und das Filtrat durch reines Fliesspapier erweist sich gegen Barytnitrat, Silbernitrat, Quecksilberchlorid, Bleisubacetat, Kaliumpermanganat indifferent. Die Carbonate der alkalischen Erden und der Alkalien werden im ganzen von der Kohle energischer absorbiert als die atzenden Hydrate dieser Basen. Die durch die Kohle absorbierten alkalischen Stoffe können derselben durch Säuren, wie Schwefelsäure und besser Salzsäure, entzogen werden.

Wiederbelebung gebrauchter Kohle. Kohle, welche zur Entfärbung, Entfäulung, Fällung chemischer Stoffe gebraucht wurde, ist für den ferneren Gebrauch untauglich. Sie erlangt jedoch ihre früheren Eigenschaften mehr oder weniger wieder, wenn die von ihr aufgenommenen Stoffe je nach der Natur derselben durch Glühen, durch Behandeln mit Säuren oder Alkalien, durch Gährung etc. zerstört oder entfernt werden.

Die feingepulverte Knochenkohle ist die Basis der sogenannten Wichse, Stiefelwichse (Coreamentum), welche mitunter in den Apotheken gesucht wird.

1 Gewöhnliche Wixse. A Ein inniges Gemisch aus 200,0 feingepulverter Knochenkohle, 100,0 Indischem Sirup, 20,0 Fischthran, 500,0 Wasser wird zunächst mit 35,0 Englischer Schwefelsäure, dann mit 20,0 roher Salzsäure und 6,0 gepulvertem Eisenvitriol versetzt. Statt des Indischen Sirups wird auch roher Sirup aus der Rübenzuckerfabrikation genommen, mitunter auch eine geringe Menge Arabisches Gummi zugesetzt.

B Indischer Sirup 300,0, Bein-schwarz 450,0, Eisenvitriol 4,0, englische Schwefelsäure 112,0, Baumöl 60,0, heisses Wasser 200,0.

2 Flüssige Wixse. 200,0 feingepulverte Knochenkohle, 25,0 gebrannter Kienruss, 50,0 Zucker, 75,0 Arabisches Gummi werden zu einem feinen Pulver gemischt, dann zunächst mit 25,0 Rüböl und 40,0 Englischer Schwefelsäure, zuletzt mit 1 Liter einer guten Gallustinte und soviel Wasser versetzt, dass eine sirupdicke Flüssigkeit entsteht.

3 Wixse (Schwärze) für Pferdegeschirr. 100,0 feingepulverte Knochenkohle und 20,0 gebrannter Kienruss werden mit 150,0—200,0 Terpentinöl zu einem höchst zarten Brei zerrieben und dann mit einer lauwarmen Lösung von 500,0 Wachs in 5 Litern Terpentinöl vermischt und bis zum Erkalten agitiert.

Plastische Kohle ist ein Material für Gefässe verschiedener Form, welche als dauernde Filter im Gebrauch sind. Die plastische Kohle wird zusammengesetzt aus 60 Th Koks, 20 Th Knochenkohle, 10 Th Holzkohle, 10 Th Thon und der genügenden Menge Melasse oder aus 10 Th Koks, 30 Th Knochenkohle, 10 Th Thon, 40 Th kurzfasrigem Asbest und der genügenden Menge Melasse. Die einem steifen Breie ähnliche Mischung wird in Formen gepresst, getrocknet und in Muffeln unter Abschluss des Luftzutritts gebrannt. Dann werden die Kohlegefässe mit 5 procentiger Salzsäure ausgelaugt, mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und nochmals in gleicher Weise bis zur Rothglut erhitzt.

Oncoplasma carbonaceum		Emplastrum ad repturas nigrum	
		Emplastrum oxycroceum nigrum	
		Schwarzes Bruchpflaster Schwarz-	
		Stiktikumpflaster	
Rp	Carbonis ossium pulverat 100,0	Rp	Resinae Pini 200,0
	Gummi arabici 5,0		Cerae flavae 100,0
	Glycerini 20,0		Piceae nigrae 50,0
	Aquae q s		Schi taurini 30,0
			Colephoni 10,0
Zum Verbands stinkender, Wunden und Geschwürs		Eboris usti optimi pulverat 25,0	
flächen		Das Pflaster ist mit Hilfe von Wasser zu malaxiren	

Epilepsiepulver des Grafen DUPLESSIS PARSCHAU, WIEDEBACH's, SCHLEMMER's, der Dresdner Diakonissen etc besteht aus verkohlten und gebrannten Thieren (Maulwurf, Ratte, Maus, Kröte, Erdchse) Diese Pulver werden ersetzt durch eine Mischung aus 1 Th Knochenkohle und 9 Th präparirten Austerschalen

Putzmittel für Maschinentheile. Terpentinöl 5,0, Stearinöl (Acidi oleici crudi) 25,0, Poliröl 25,0, Feinste Thierkohle 45,0 Mit Spiritus zu einem dünnen Brei anzureichen

Carbo mineralis.

I Graphites Plumbago. Carbo mineralis. Graphit. Reissblei. Wasserblei (Eisenschwärze). Pottlosh. Crayon de mine Black lead. Wird im Urgebirge, nur selten krystallin (in Formen des hexagonalen Systems), meist in derben schuppigen oder dichten Massen eingesprengt, häufig gefunden (Bohmen, Mähren, Bayern) Künstlich entsteht er beim Ausmelzen des Eisens aus den Erzen (Hochofengraphit) Am schönsten und reinsten ist der, welcher zu Keswick in der Grafschaft Cumberland gegraben wird und als englischer Graphit in den Handel kommt, ebenso der brasilianische Graphit von Barreros, der ceylonische und der sibirische Er besitzt einen schwachen Metallglanz, fühlt sich zart und fettig an, ist undurchsichtig, auf dem Bruche muschelrig oder körnig, und giebt auf Papier einen grauschwarzglänzenden Strich Die Härte ist 0,5—1,0 Sein spec Gew varirt zwischen 1,8 und 2,2 Er ist unschmelzbar und selbst im Sauerstoff strom schwer verbrennlich, dagegen ein guter Leiter der Elektrizität Er wird hauptsächlich zur Fabrikation der Bleistifte und der Passauer oder Ypser Schmelztiegel, zum Schwärzen der Eisenwaaren, zum Einreiben der Raderzapfen in Maschinen (um die Reibung zu mindern) etc gebraucht Die schlechten Graphitsorten sind mit Eisen, Kupfer, Titan, Antimon, Sand etc verunreinigt Das kaufliche geschlammte Wasserblei ist sehr unrein und darf in der Medicin nicht verwendet werden Das englische, welches aus circa 96 Th Kohlenstoff und 4 Th Eisen besteht, eignet sich allein zum Arzneigebrauch Ist diese Sorte nicht zu erlangen, so muss man Graphit in ganzen Stücken beschaffen, aus denen sich die reineren aussuchen lassen Der Graphit besteht im allgemeinen in 100 Th aus 75—97 Th Kohlenstoff, 2—6 Th. Kieselsäure, 1—4 Th Eisen, Mangan, Kalk erde, Thonerde, Wasser Dem Graphit gehen die absorbirenden Eigenschaften der animalischen und vegetabilischen Kohle gänzlich ab

Prüfung. Ein mit Schwefelantimon verunreinigter Graphit entwickelt vor dem Löthrohre Schwefeligsäure und erzeugt einen weissen Beschlag Kieselsäure bleibt beim Verbrennen als Asche zurück, ebenso die verunreinigenden Metalle Das Verbrennen geschieht in einem flachen Platinblech oder auf einem Platinblech Der Graphit muss hierzu höchst fein zermieben und in äusserst dünner Schicht ausgebreitet sein Der Werth des Graphits für die technische Verarbeitung hängt von seinem Kohlenstoffgehalt ab Eine einfache und leicht ausführbare Methode ist, höchst feines Graphitpulver bei circa 200° C zu trocknen, dann 1,0 desselben mit 1,0 Kalinitrat und 4,0 wasserfreiem Natriumkarbonat innig zu mischen und das Gemisch bis zur Schmelzung und dann zur schwachen Rothgluth zu erhitzen Die Schmelze behandelt man mit Wasser, lässt die Graphitkohle absetzen, sammelt sie nun in einem Filter, digerirt sie hierauf einen halben Tag bei gelinder Wärme in 25 procentiger Salzsäure, welche mit wenig Salpetersäure versetzt ist, wäscht

sie hierauf mit Wasser aus, trocknet und wägt sie Ihr Gewicht mit 1,05 multiplicirt entspricht annähernd dem wirklichen Kohlenstoffgehalt In der Lösung der Schmelze und der Samen kann die Art der Verunreinigungen des Graphits bestimmt werden

Genauer wird die Kohlenstoff-Bestimmung in der Weise ausgeführt, dass man etwa 0,2 g Graphit, der vorher durch Ausziehen mit heisser Salzsäure von löslichen Karbonaten befreit, gewaschen und wieder getrocknet war, der nassen Elementar-Analyse nach ULLMANN unterwirft, d. h. mit einem Gemisch von Chromsäure und Schwefelsäure oxydirt und die entstehende Kohlensäure wie bei einer Elementar-Analyse auffängt und wägt

In den Apotheken wird der kaufliche geschlammte Graphit vorrathig gehalten Eiserne Geräthschaften, Windofen, eiserne Ofenthüren werden mittelst einer Bürste mit dem mit Wasser zum Brei angeriebenen Graphit eingerieben und nach dem Trocknen mit derselben Bürste blank gegeben

Man verwechsle nicht den Graphit mit dem bleigrauen Molybdänglanz (Schwefel molybden), welcher auch im Handel unter dem Namen Wasserblei vorkommt

II Graphites depuratus (Ergänz.) Graphites elutriatus Gereinigter Graphit ist die für den Arzneigebrauch bestimmte Sorte

Darstellung 5 Th geschlammter Graphit werden 1 Stunde lang (unter Umrühren) mit 20 Th. Wasser ausgekocht und nach Abgiessen des letzteren mit einer Mischung aus 1 Th Salpetersäure (von 25 Proc) und 3 Th Wasser 24 Stunden lang unter öfterem Umschütteln bei 35–40° C stehen gelassen, hierauf mit Wasser solange gewaschen, bis das ablaufende blaues Lackmuspapier nicht mehr rothet, schliesslich getrocknet. (Ergänz.)

Ein feines, schwarzgraues, schlupfrig anzufühlendes Pulver, welches auf Papier abfärbt, beim Erhitzen auf Platinblech nicht schmilzt und nur schwieg verbrennt Es ist in den gewöhnlichen Lösungsmitteln sowie in Säuren unlöslich, an Aetzlaugen giebt es meist etwas Kieselsäure ab

Mit Graphit erwärmte, verdünnte Salzsäure soll nach dem Filtriren beim Verdampfen einen nichtflüchtigen Rückstand nicht hinterlassen

Anwendung Der Graphit wird als Antihæreticum und als austrocknendes Mittel angewendet Innerlich giebt man ihn mehrmals täglich zu 0,5–1,0–1,5 g, äusserlich in Salben 5,0–10,0 auf 25,0 Fett

III Retorten-Graphit Gaskohle. Lagert sich in den oberen Wölbungen der Retorten der Steinkohlen-Gasanstalten als ein, ziemlich starke erlangender Ueberzug ab, der gelegentlich abgeklopft werden muss, und ist das Produkt der Zersetzung der Kohlenwasserstoffe durch sehr hohe Temperatur

Graue, metallglänzende, meist gewölbte Massen, dem dichten Koks ähnlich Sie leiten Wärme und Elektrizität gut, und sind sehr schwer verbrennlich Dichte Gaskohle giebt am Stahl Funken, hat das spec Gew 2,356 und ist frei von Wasserstoff, minder dichte hat ein niedrigeres specifisches Gewicht und enthält einige Procente Wasserstoff Die Gaskohle wurde bis vor wenigen Jahren ausschliesslich zur Herstellung der Kohle-Pole für galvanische Elemente (z. B. LÉCLANCHÉ-Elemente) verwendet Gegenwärtig werden diese Gegenstände künstlich hergestellt

Kohle für elektrische Zwecke Die Herstellung von Kohlestiften für elektrische Bogenlichter, von Kohle Polen und Diaphragmen etc für elektrolytische Apparate geschieht gegenwärtig im grossen Maassstabe durch besondere Fabriken

Anthracit wird gepulvert und mit Steinkohlen-Theer zu einer plastischen Masse verarbeitet Diese wird, in Kohlepulver eingebettet, unter Luftabschluss geglüht, bis alle gasförmigen Produkte ausgetrieben sind Nach dem Erkalten wird die so erhaltene Kohlemasse wiederum gepulvert, das Pulver nochmals mit Theer zu einer plastischen Masse verarbeitet und diese durch Pressen in die gewünschte Form gebracht Die geformten Gegenstände werden alsdann, in Kohlepulver eingebettet, nochmals bei Luftabschluss durchgeglüht

Die für elektrisches Bogenlicht bestimmten Kohlestifte müssen namentlich möglichst frei von Kieselsäure sein, weshalb alles kieselsäurehaltige Material bei der Fabrikation auszuschliessen ist

IV. Lithanthrax. Anthracites Carbo fossilis Steinkohle. Die beste Steinkohle ist der Anthracit, welcher aber auch durch jede andere gute Steinkohle ersetzt werden kann. Die Steinkohle unterscheidet sich von der Braunkohle durch ihre Schwarze und dadurch, dass das Pulver, in einem Probeylinder erhitzt, ammoniakalische Dämpfe (die Braunkohle aber saure Dämpfe) ausgiebt, und dass ihre Asche nicht oder höchst schwach alkalisch reagirt. Neben Kohle enthält die Steinkohle kleine Mengen Eisen, Mangan, Schwefel, Jod u dgl.

Die Steinkohle hat an und für sich auf DRES Empfehlungen therapeutische Anwendung gefunden (innerlich zu 1,0—2,0—3,0 auf den Tag) bei Rhachitis, Scrophulosis, Scorbut, Wurmliden etc. Auch liefert sie das Material zu zwei Präparaten, welche vor etwa 50 Jahren von einem ungarnschen Arzte POLYA angepriesen wurden. Diese Präparate sind

V Anthrakokali (simplex). Lithanthrakokali. In einem eisernen Gefasse bringt man 10 Th. Kali causticum fusum zum Schmelzen und mischt 7 Th. höchst fein gepulverte Steinkohle unter Umrühren mit einem eisernen Spatel dazu. Die erstarrte Masse wird in einem erwärmten Mörser sofort zu Pulver zerrieben und in dicht mit Kautschukstopfen geschlossener trockener Flasche aufbewahrt. Es ist ein braunschwarzes, hygroskopisches, etwas atzendes Pulver.

Anthrakokali sulfuratum wird wie das vorige Präparat dargestellt, nur wird an Stelle des Steinkohlenpulvers dem geschmolzenen Aetzkali ein feinpulveriges Gemisch aus 7 Th. Steinkohle und 1,5 Th. gewaschenen Schwefelblumen zugesetzt. Es ist ebenfalls ein hygroskopisches und dabei übelriechendes, grünlich braunschwarzes Pulver.

Da sich nach POLYA's Angabe diese Präparate leicht in Wasser lösen und eine filtrirte braunschwarze Lösung geben sollen, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Kohle, welche POLYA zu seinen Präparaten benutzte, eine schwarze Art Braunkohle gewesen sein mag. Er verwendete angeblich die bei Funfkirchen in Ungarn geförderte Steinkohle.

Das eine wie das andere Präparat sollten wahre Specifica gegen Flechten, Herpes, Lupus, Skropheln sein. CLARUS und Andere konnten damit keine Heilerfolge erzielen. Dosis 0,15—0,3—0,5 drei- bis viermal täglich in Verbindung mit Sussholzpulver, Magnesia etc. In Salben 1 auf 10—20 Fett als Einreibung bei chronischen Erythemen.

Das Fuligokali dürfte ein besserer Ersatz dieser Präparate sein. Vergl. unter Fuligo splendens.

Carbolein, von WESCHENIAKOFF in Petersburg in den Handel gebracht, waren (nach KANER) Stücken, bestehend aus 92 Proc. Steinkohle und 8 Proc. Fett.

Ein **Pulver zum Ausstopfen der Leichname** ist ein Gemisch von gebranntem Gips, grob gepulverter Holzkohle und grob gepulverter Steinkohle zu gleichen Theilen.

Oelpulver des Uhrmachers OSKAR LANGE in Mählsberg a. E., als Geheimmittel zum Schmieren von Maschinentheilen etc. in den Handel gebracht, ist fein geschlämmter Graphit.

Graphit-Oele zum Schmieren von Maschinentheilen etc. bestehen aus fein geschlämmtem Graphit, welcher mit Fetten, fetten Oelen oder Mineralölen angerieben ist.

Fluxiren von Bleistiftzeichnungen. Dieses erfolgt entweder durch Auftragen von abgerahmter Milch oder einer filtrirten, dünnen Erweisslösung (1 flüssiges Erweiss, 6 Wasser).

Graphit-Tiegel, Fassauer Tiegel, Ybbser Tiegel. Sie werden aus einer plastischen Mischung von feuerfestem Thon und Graphit geformt, an der Luft getrocknet, schliesslich entweder frei oder in Kapseln gebrannt. — Sie widerstehen der Hitze, ohne zu verbrennen oder zu springen, und leiten die Wärme besser als gewöhnliche Thontiegel.

Graphit-Bad. Ist an Stelle des Sandbades als Erwärmungs-Medium empfohlen worden, weil Graphit die Wärme besser leitet als Sand.

Tintenstifte. Diese behebten Stifte, welche auch ein Kopiren der mit ihnen hergestellten Schriftzüge gestatten, werden wie folgt hergestellt:

	sehr weich	weich	hart	sehr hart
Theorfarbstoff, wasserlöslich	50,0	46,0	30,0	25,0
Graphit geschlammmt	37,5	34,0	30,0	25,0
Kaolin geschlammmt	12,5	20,0	40,0	50,0

Die Masse wird feingerieben, mit Wasser angefeuchtet und in die Form dünner Stängelchen gebracht

Carbo vegetabilis.

Carbo Ligni (Brit. Helv. U-St.) **Carbo Ligni pulveratus** (Germ.) **Carbo Ligni depuratus** (Austr.) **Charbon végétal** (Gall.) **Carbo. Gepulverte Holzkohle. Kohle. Wood Charcoal.**

Das stellung. Zur Darstellung des Kohlepulvers für den Arzneigebrauch wird die gewöhnliche, auf den Markt gebrachte Holzkohle, welche meist Fichtenholzkohle ist, verwendet. Da jede gute Holzkohle, wie sie im Laboratorium zur Heizung verwendet wird, Feuchtigkeit, Ammoniak, Kohlensäure auf ihrer Oberfläche verdichtet hat, auch nicht immer durch die ganze Masse ihrer Stücke gehörig durchgebrannt, vielmehr stellenweise die Verkohlung eine unvollständige gewesen ist, so ist ihre nochmalige Durchglühung erforderlich.

Das officinelle Holzkohlepulver wird dadurch hergestellt, dass man den Windofen mit faustgrossen Holzkohlen füllt und diese anzündet. Sobald sich die Kohlen in Gluth befinden, bedeckt man den Ofen mit einer eisernen Sturze (Deckel). Wenn dann weder Dampf noch Rauch aus den glühenden Kohlen aufsteigen, wird entweder der Luftzug abgeschlossen oder es werden die Holzkohlen herausgenommen und auf kalten metallenen Platten oder kalten Steinen aneinandergelegt oder auch in irdene Töpfe, welche dicht verschlossen werden, geschichtet, damit sie verlöschen. Hierauf bläst man mittelst eines Blasebalges die Asche von ihrer Oberfläche weg und zerstösst die noch warmen Kohlen im Mörser zu einem mittelfeinen Pulver, welches ohne Verzug in gut zu verschliessenden Glasgefassen aufbewahrt wird. Durch Beuteln erhält man aus diesem mittelfeinen Kohlepulver das höchstfeine Pulver. Zu Zahnpulvermischungen verwendet man nur das mittelfeine Pulver.

Das Erkaltenlassen der glühenden Kohlen, das Pulvern und Beuteln derselben und das Unterbringen des Pulvers in Glasflaschen muss rasch hintereinander geschehen, weil die Kohle Feuchtigkeit, Kohlensäure, Ammoniak und andere Gase allmählich aus der Luft aufnimmt und auf ihrer Oberfläche verdichtet.

Bestandtheile. Die Holzkohle ist nicht reiner Kohlenstoff, sondern sie enthält noch die Aschenbestandtheile des Holzes, wie Kali, Kalkerde, Kieselsäure, Phosphate etc. (siehe unter Pottasche). Ausser diesen Bestandtheilen finden sich in ihr immer noch kleine Mengen Verbindungen des Kohlenstoffs mit geringen Mengen Wasserstoff und Sauerstoff, und endlich die absorbirten Gase aus der atmosphärischen Luft, wie Sauerstoff, Stickstoff, Kohlensäure, Ammoniak. Der Aschengehalt beträgt im Durchschnitt etwa 2 Proc.

Prüfung. Dass die Holzkohle eine nochmalige Glühung erfahren hat, ergibt sich daraus, dass 8proc. Aetznatron- oder Aetzkalklösung, welche mit etwas Kohlepulver aufgekocht worden ist, ein farbloses Filtrat liefert.

Carbo Tiliae, Lindenholzkohle, Carbo Populi, Pappelholzkohle, Carbo Belloei werden in den Apotheken verlangt und durch die vorbemerkte gepulverte Kohle, **Carbo pulveratus**, ersetzt.

Carbo Panis, Brotkohle, wird zu Zahnpulvern gebraucht, jedoch nur selten in der Apotheke gesucht. Die Bereitung geschieht in der Art, dass man Brot in Scheiben schneidet, scharf trocknet oder rostet, zu grobem Pulver stösst, dieses in Kaffeestrommeln oder zugedeckten eisernen Töpfen brennt, bis keine brennbaren Gase mehr hervortreten, und dann in ein mittelfeines Pulver verwandelt.

Fuligo usta, Fuligo o taeda usta, gebrannter Kienruss, ist zwar eine sehr fein zertheilte zarte Kohle, wird aber nur als schwarzfarbende Substanz für technische Zwecke angewendet. Es darf diese Kohle nicht mit der als Medikament gebrauchten *Fuligo splendens*, Glanzruss (siehe d. A.), verwechselt werden. Der Kienruss wird oft vorthellhaft durch Frankfurter und Pariser Schwarz ersetzt.

Die Chinesische Tusche wird aus gebranntem Kienruss bereitet. 5 Th. Fischleim werden in 20 Th. Wasser gelöst und die Kolatur mit 2 Th. Lakritzensaft, gelöst in 4 Th. Wasser, und 15 Th. gebranntem Kienruss gemischt, im warmen Mörser höchst fein präparirt, dann zur Extraktstärke abgedampft und in Formen gebracht.

GAFFARD's unauslöschliche Tinte ist ein inniges Gemisch aus 1 Th. gebranntem Kienruss, 12 Th. Kaliumwasserglas und 1 Th. Salmiakgeist.

Anwendung. Die gepulverte Holzkohle verdankt ihre therapeutische Anwendung den Eigenschaften, welche der Kohle überhaupt zukommen (s. oben S. 610), namentlich der Fähigkeit, Gase zu absorbiren. Hiernach zählt sie zu den mechanisch wirkenden Mitteln und wird sie als ein desinficirendes, antiputrides und absorbirendes Mittel innerlich bei Flatulenz, stinkenden diarrhoischen Dejekten, stinkendem Athem, ausserlich auf schlecht und stinkend eiternde Wunden und Geschwürsflächen und auch ganz unpassend als Dentifricum angewendet. Dosis 0,5–1,0–2,0 und mehr emige Male des Tages in Pulvern, Trochisken, Latwergen (mit Glycerin), ausserlich fast in allen Arzneiformen.

Die Anwendung der Kohle als Desinficiens und Desodoraans, ferner der Verbrauch derselben in der Technik ist bekannt. Für das chemische und pharmaceutische Laboratorium bereitet man daraus die

Sprengkohle 100 Th. Kohlepulver, 5 Th. gepulverter Kalisalpeter, 2,5 Th. Benzoe-pulver werden mit Tragantenschleim zur Masse gemacht, Stäbe von der Dicke einer Gänsefeder daraus geformt und dann getrocknet. Um Glaszylinder, Kolbenhalse, Retortenschnäbel etc. abzusprengen, wird ein Stäbchen der Sprengkohle angezündet und damit die Stelle des Glases schnell berieben, wo die Theilung vor sich gehen soll. Die auf diese Weise erhitzte Glasstelle wird sofort mit kaltem Wasser übergossen.

Carbo ligniteus, Lignum fossile, Lignite, Braunkohle, Lignit, die fossile braune Kohle, welche in ihrem Gefüge noch einige Holzstruktur aufweist und frei von Metallsulfiden ist. Ihre Asche enthält geringe Mengen Alkali (und ist daher ein ganz vorzügliches Putzpulver für metallene Gegenstände).

Die Bestandtheile der Braunkohle sind nicht genau bekannt, sie enthält aber Extraktivstoff und einen dem Catechin verwandten Stoff. Dies mag auch der Umstand sein, weshalb sich das Pulver der Braunkohle gegen Diarrhoe nützlich erweist. In einigen Gegenden gebrauchen die Landleute dieses Pulver zu diesem Zwecke, machen aber aus Unkenntnis zwischen Steinkohle und Braunkohle keinen Unterschied. Steinkohlepulver ist ohne Wirkung. Aus der Braunkohle werden auch Haarfärbemittel hergestellt. Andererseits dient sie als ein bequemes Fälschungsmittel des Schnupftabaks und des Cichorienkaffees.

Seetangkohle, besonders die Kohle von *Laminaria digitata* (sehr häufig an den westlichen Küsten der Hebriden). Die fleischigen Stengel werden getrocknet und verkohlt. Die absorbirende Kraft dieser Kohle ist nach STANFORD eine weit grössere als die der Knochenkohle, die Kohle selbst zum halben Preise herzustellen. Sie würde ein ganz vortreffliches Desinficiens sein. Nach STANFORD enthält sie an 40 Proc. mineralische Stoffe. Er fand sie bestehend in Procenten aus 50 Kohle, 4 Kalkphosphat, 20 Kalkkarbonat, 8 Magnesiakarbonat, 5 Kieselsäure, 2 Alaunerde, 5 Kalksulfat, 5 Natriumchlorid, 1,25 Ammoniumchlorid. Lufttrocken enthält sie bis 15 Proc. Wasser.

Desinficirendes Kohlepapier, Papier carbonifère, von der Firma PICHOT et MALAPERT in Poitiers als Specialität in den Handel gebracht und zum Verbands jeder Wunde, besonders aber putriden Wunden, theils zur Desinfektion, theils zur Förderung der Vernarbung derselben, empfohlen. Das Papier wird mit Kreosotwasser befeuchtet und auf die Wunde gelegt. Dieses Papier ist durch einfache Pressung einer dünnen Holz-

kohlepulverschicht zwischen zwei Blättern höchst feinen Fließpapiers dargestellt, so dass eine solche Papiertafel die Dicke eines starken grauen Löschpapiers hat. **LE PÉNDRIEL's compresses désinfectantes** sind ein ähnliches Fabrikat.

Carbo vegetabilis granulatus
Granulated charcoal

Rp	Carbonis vegetabilis subtl pulver	100,0
	Sacchari albi pulverati	10,0
	Gummi arabici pulverati	2,5
	Tincturae Benzoe	1,0
	Aquae q s	

Man stößt zur derben Masse an und granuliert diese durch Durchreiben durch einen Durchschlag (Bei Halitus foetidus und Dyspepsia)

Moxae carbonaceae

Kohlen-Moxen Brennstifte Glühstifte

Pp	Carbonis vegetabilis	25,0
	Kali nitrici	1,0
	Tragacanthae	3,0
	Aquae q s	

Man bereite 2 Stäbchen von 6–10 cm Länge und trocken sie

Pulvis antipyreticus HENR

Rp	Carbonis vegetabilis	25,0
	Ligni Quassiae	
	Magnesiae subcarbonice aa	4,0

M f pulvis

D 8 Mehrmals täglich einen Esslöffel (gegen Sodbrennen)

Pulvis dentifricius MAURY

Rp	Carbonis vegetabilis	25,0
	Corticis Chiniae	12,5
	Sacchari	25,0
	Olei Menthae piperitae	40,0
	Olei Cinnamomi	20,0
	Tincturae Ambræ	20,0

Pulvis dentifricius MOGALLA,
MOGALLA's Zahnpulver

Rp	Carbonis vegetabilis	80,0
	Rhizomatis Calami	15,0
	Olei Bergamottae	
	Olei Caryophyllorum	
	Olei Citri aa gtt 10	

Pulvis dentifricius niger

Schwarzes Zahnpulver

Rp	Carbonis vegetabilis	100,0
	Rhizomatis Calami	20,0
	Lapidis Pumicis	
	Catechu	aa 10,0
	Olei Bergamottae	
	Olei Caryophyllorum aa gtt 30	

Pulvis dentifricius WELPER

Rp	Carbonis vegetabilis	40,0
	Catechu	
	Myrrhae	
	Tarhani depurati	aa 5,0
	Olei Bergamottae	gtt 15
	Olei Caryophyllorum	gtt 25

Pulvis desinfectorius dejectorum sellariorum
Desinfektionspulver für Choleradejekte,
Nachstühle und Closets

Pp	Carbonis ligni	150,0
	Gipsi pulverati	1000,0
	Vitrioli Martis	50,0
	Petrolæ Americanæ	50,0

Pulvis hæmostaticus BONAPOLX

Rp	Carbonis vegetabilis	
	Gummi arabici	aa 5,0
	Colophoni	20,0

Pulvis pyrius medicinalis

Schiesspulver für den medicinischen Gebrauch

Rp	Carbonis vegetabilis	100
	Kali nitrici	80,0

M f pulvis

(Wird von den Landleuten in den Apotheken gefordert und bei entzündlichen Krankheiten der Hausthiere angewendet)

Species ad Cataplasma Carbonis

Rp	Specierum ad Cataplasma	
	Carbonis pulverati	aa 50,0

M

Trochisci Carbonis BELLOC

Pp	Carbonis vegetabilis pulverati	100,0
	Mucilaginem s Tragacanthae	1,0 paratam
	Aquae q s	

Fiant trochisci centum (100)

Trochisci Carbonis vegetabilis

Rp	Carbonis vegetabilis	25,0
	Massae cacaoinae	75,0

In pulverem subtiliorem redacta fiant trochisci centum (100)
(Gegen Halitus foetidus)

Desinfektionsschwärmer von **MAGNUS** in **Ulm** sind fingerlange, kleinfingerdicke Cylinder von steifem Papier, gefüllt mit einem Gemisch aus 60 Th Kalisalpeter, 84 Th Schwefel und 6 Th Kohle (**WITTSTEIN, Analyt**)

Epilepsiepulver von **WELPER** in **Berlin** Verkohlter und gepulverter eisenhaltiger Hanfzwirn (Eisengarn) 8 Grm in 7 Kapseln vertheilt kosteten 15 Mark (**HAGER, Analyt**)

Tablettes de charbon A (Gall) Kohle-Tabletten Carbonis Ligni pulverati loti, Sacchari aa 200,0, Mucilaginis Tragacanthae 50,0, fiant pastilli a 1,0 g

B Carbonis Ligni pulverati subtilissime 250,0, Sacchari 350,0, Massae Cacao 400,0
Fiant pastilli 1000

Kohle-Biscuits sind wohlgeschmeckende Biscuits nach Art der englischen Biscuits mit einem Zusatz von Kohlepulver

Carboneum chloratum.

Carboneum tetrachloratum. Carboneum chloratum. Tetrachlorkohlenstoff. Kohlenstofftetrachlorid. Perchlor-Methan. CCl_4 . Mol. Gew. = 154. Nach der älteren Anschauung, welche der Verbindung die Formel $\text{CCl}_2(\text{C}=\text{S})$ beilegte, führt diese Verbindung auch noch die Namen: Carboneum dichloratum, Zweifach-Chlorkohlenstoff. Man hat ein reines und ein technisches Produkt zu unterscheiden.

1. † Carboneum tetrachloratum purum. Reiner Tetrachlorkohlenstoff.

Darstellung. In einen Kolben *A*, der einerseits mit einem senkrecht stehenden Rückflusskühler *B*, andererseits mit einem Chlor-Entwicklungs-Apparat so verbunden ist, dass bei *C* ein ausgiebiger Chlorstrom eintreten kann, bringt man eine beliebige Menge Chloroform und löst in diesem eine kleine Menge Jod (welches als Chlorüberträger wirkt) auf. Dann erhitzt man unter sehr guter Kühlung das Chloroform im Wasserbade *D* zum Sieden und leitet womöglich unter Besonnung solange durch konc. Schwefelsäure getrocknetes Chlorgas ein, als aus dem Kühler noch Chlorwasserstoff entweicht. — Ist dieses nicht mehr der Fall, so lässt man erkalten, wäscht alsdann das Reaktionsprodukt mehrmals mit dünner Sodälösung (1 + 9), schliesslich einmal mit Wasser, trennt mittelst Scheidetrichters das Reaktionsprodukt ab, entwässert es durch 1–2tägiges Maceriren mit geschmolzenem Calciumchlorid und destillirt es alsdann aus einer Retorte mit in die Flüssigkeit eingesenktem Thermometer (s. S. 190). Aufzufangen sind die bei 77–78° C. übergelenden Antheile. $\text{CHCl}_3 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{CCl}_4$.




Fig. 155.

Die Verbindung gleicht in den meisten Eigenschaften, insbesondere auch in ihrem Auflösungsvermögen gegenüber Fetten u. dergl., dem Chloroform. Durch nascenten Wasserstoff wird sie successive zu Chloroform, Methylenchlorid, Methylehlorid, ja zu Methan reducirt.

Durch Einwirkung von alkoholischem Kali tritt Spaltung unter Bildung von Kaliumchlorid und Kaliumcarbonat ein. Beim Erwärmen mit alkoholischem Kali und Anilin entsteht wie beim Chloroform Isocyanphenyl (Isonitril-Reaktion).

Prüfung. 1) Er sei farblos, klar und habe bei 15° C. das spec. Gew. 1,599. 2) Schüttelt man 5 cem mit 5 cem konc. Schwefelsäure, so färbe sich diese nicht dunkel (fremde Chlorverbindungen). 3) Schüttelt man 5 cem mit 10 cem Wasser, so reagire das abgehobene Wasser nicht sauer und werde durch Silbernitrat nicht getrübt (chlorhaltige Zersetzungsprodukte, z. B. Salzsäure).

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt.

Anwendung. Der Tetrachlorkohlenstoff wurde zeitweise als Anästheticum sowohl bei äußerer Anwendung, als für Inhalationen dem Chloroform vorgezogen, weil er sicherer

wirken solle. Er hat indessen das Chloroform nicht verdrängen können und gilt wegen seines grosseren Chlorgehaltes nach den heutigen Anschauungen auch für gefährlicher als Chloroform, ob mit Recht, bleibe dahingestellt.

II † Carboneum tetrachloratum technicum Technischer Tetrachlorkohlenstoff. Katharin

Darstellung Man sättigt Schwefelkohlenstoff, dem man (als Chlor-Uebertrager) etwas Jod oder 0,5 Proc gepulvertes Antimon zugesetzt hat, mit trockenem Chlorgas. Man benutzt hierzu eiserne Kessel, welche inwendig mit Blei ausgefüttert sind. Arbeitet man unter Erwärmen, so muss der Kessel mit Rückflusskühlung versehen sein.

Nachdem die Flüssigkeit etwa das dreifache Gewicht an Chlor aufgenommen hat, ist die Chlorirung beendet. $\text{CS}_2 + 4\text{Cl}_2 = 2\text{SCL}_2 + \text{CCl}_4$. Man giebt nunmehr etwa halb soviel Schwefel zu, als man Schwefelkohlenstoff angewendet hatte, und erzielt damit, dass das leicht flüchtige Schwefeldichlorid SCL_2 in das höher siedende Schwefelmonochlorid umgewandelt wird.

Nunmehr trennt man den Tetrachlorkohlenstoff durch Destillation ab und sammelt die bis etwa 120°C übergelenden Theile — Das Destillat wird mit Kalkmilch behandelt, alsdann mit Wasserdampf destillirt und nochmals fraktionirt, wobei man die von $75\text{--}80^\circ \text{C}$ siedenden Theile auffängt.

Der bei der ersten Destillation erhaltene Rückstand wird weiter destillirt und giebt das bei $135\text{--}139^\circ \text{C}$ übergelende Schwefelmonochlorid, welches von Fabriken für Kautschukwaren abgenommen wird.

Eigenschaften Farblose, specifisch schwere, nach Rettig und Chloroform riechende Flüssigkeit, spec Gew bei $15^\circ \text{C} = 1,599\text{--}1,600$. Siedep $75\text{--}80^\circ \text{C}$. Es enthält etwas Schwefelkohlenstoff, dessen Anwesenheit sich zu erkennen giebt dadurch, dass auf Zusatz von alkoholischem Kali Ausscheidung von Kaliumxanthogenat erfolgt.

Davon abgesehen besitzt das technische Präparat alle Eigenschaften des reinen. **Aufbewahrung** Vorsichtig, vor Licht geschützt. **Prüfung** Es sei klar, farblos, neutral, von nicht gar zu widerlichem Geruche, habe das spec Gew von rund 1,600 und destillire, ohne einen erheblichen Rückstand zu hinterlassen, bei $75\text{--}80^\circ \text{C}$ über.

Anwendung Der technische Tetrachlorkohlenstoff dient sowohl in der Technik als auch in der Analyse als Extraktionsmittel für Fett und kann mit Vortheil überall da angewendet werden, wo man bisher Aether, Benzin, Benzol, Amylalkohol, Schwefelkohlenstoff u. dergl. verwendet. Voraussichtlich wird er sich auch als Wanzennittel bewahren. Der wesentliche Vortheil des Präparates vor den genannten Extraktionsmitteln liegt darin, dass es nicht feuergefährlich ist, indem es weder selbst leicht entzündlich ist, noch seine Dämpfe mit Luft explosive Gemische geben.

Katharin, Phönixin, SPINDLER'S unentzündbares Fleckenwasser, sind technischer Tetrachlorkohlenstoff.

Bezugsquellen für das technische Präparat: MÜLLER & DUBOIS in Rheinan b Mannheim und Chemikalienfabrik Griessheim b Mainz.

III Carboneum trichloratum. Carboneum sesquichloratum. Hexachlorathan. Perchloräthan C_2Cl_6 . Mol. Gew = 287. Nach der älteren Anschauung, welche der Verbindung die Formel CCl_3 ($\text{C} = 6$) beilegte, führt diese Verbindung auch die Namen Kohlenstoffsesquichlorid und Dreifach-Chlorkohlenstoff.

Das stellung Man leitet in Äthylenchlorid oder Äthylidenchlorid, welche in Sandbade zum Sieden erhitzt werden, unter Rückflusskühlung und möglichst unter Besonnung, solange trockenes Chlor ein, bis keine Entwicklung von Chlorwasserstoff mehr stattfindet. Als Apparat kann der auf S 630 angegebene benutzt werden unter Ersetzung des Wasserbades durch ein Sandbad.

Beim Erkalten erstarrt die Masse krystallinisch. Man presst sie zunächst zwischen Filtrirpapier ab und krystallisirt sie aus Alkohol um.

Eigenschaften Das Hexachlor-Äthan bildet farblose oder weisse, harte, leicht zu Pulver zerreibliche, aromatisch kampherartig riechende, fast geschmacklose, rhombische

Kristalle, welche bei 185° C sieden und sublimiren, in Wasser unloslich, in Weingeist, Aether, fetten und flüchtigen Oelen leicht loslich sind und ein spec Gew von circa 2,000 haben

Man bewahrt sie in dicht verkorkter Glasflasche

Anwendung Man hat das Hexachlorathan hauptsächlich bei asiatischer Cholera mit einigem Erfolge angewendet und zwar in Gaben zu 0,2—0,3—0,5 allein oder mit Kampher kombiniert

Mixtura Carbonel trichlorati KINE
Rp Carbonel trichlorat 5,0 (ad 3,0)
Magnesia subcarbonicae 7,5
Mixturae camphoratae (s S 585) 250,0
2—4stündlich zwei bis drei Esslöffel voll zu nehmen
(bei asiatischer Cholera)

Unguentum Carbonel trichlorati MIALHE
Rp Carbonel trichlorat 5,0
Aetheris 10,0
Adipis sulis 20,0
Einreibung, als lokales Anästheticum

Carboneum sulfuratum.

I. Carboneum sulfuratum (Ergänz.) Sulfure de carbone (Gall) Carbonis Bisulphidum (Brit) Carbonel Disulphidum (U-St.) Alkohol Sulfuris Schwefel kohlenstoff Kohlensulfid Schwefelalkohol Xanthogen CS_2 Mol Gew. = 76
Wird in grossen Mengen durch die Grosstechnik dargestellt

Darstellung Holzkohle wird in eisernen Cylindern zum Gluhen erhitzt, worauf man durch besondere Vorrichtungen Schwefel in diese Cylinder hineinbringt. Der Schwefel vergast, die Schwefeldämpfe verbinden sich mit dem glühenden Kohlenstoff zu Schwefel kohlenstoff $C + S_2 = CS_2$, welcher in Kondensationsvorlagen verdichtet und aufgefangen wird.

Der so dargestellte Schwefelkohlenstoff ist nicht rein, sondern durch Schwefel, Schwefelwasserstoff und fremde organische Schwefelverbindungen verunreinigt, welche ihm einen widerlichen Geruch ertheilen. Zur Reinigung wird der Schwefelkohlenstoff destillirt, man leitet die Dämpfe hintereinander durch Kalkmilch, dünne Kalilauge, Lösungen von Eisenvitriol, Kupfersulfat, auch durch Bleisalzlosungen. Es gelingt hierdurch, den Schwefel und den Schwefelwasserstoff zu beseitigen. Um auch die fremden organischen Schwefelverbindungen herauszuschaffen, schüttelt man den wie angegeben vorgereinigten Schwefelkohlenstoff mit metallischem Quecksilber oder mit $\frac{1}{2}$ Proc Quecksilberchlorid, und rektifizirt ihn alsdann über etwa 2—5 Proc fettem Oel oder Paraffin oder weissem Wachs. Diese Rektifikation kann mehrmals wiederholt werden.

Eigenschaften In den Apotheken halt man einen verhältnissmässig reinen Schwefelkohlenstoff vorrätig. Dieses verhältnissmässig reine Präparat ist eine farblose, leicht bewegliche, sehr flüchtige, das Licht stark brechende Flüssigkeit von eigenthümlichem, durchdringendem, aber nicht gerade unangenehmem (an Rettig erinnernden) Geruch und scharfem, aromatischem Geschmack.

Das spec Gewicht bei 15° C ist 1,272, der Siedepunkt liegt gegen 46—47° C. In dieser Beziehung werden folgende Angaben gemacht:

	Brit.	Ergänz.	Gall.	U-St.
Spec Gewicht bei 15° C	1,268—1,269	1,272	1,271	1,268—1,269
Siedepunkt	46—47°	46°	46°	46—47°

In Wasser ist Schwefelkohlenstoff nur sehr wenig (1 : 550) löslich, ebenso ist er fast unlöslich in Alkohol von 45 Volum-Proc. Dagegen ist er löslich in 18—20 Theilen Alkohol von 90 Volum-Proc. Mit wasserfreiem Alkohol, mit Aether, fetten Oelen und den meisten ätherischen Oelen lässt er sich in jedem Verhältniss mischen. Der Schwefelkohlenstoff selbst ist ein vorzügliches Auflösungsmittel für Jod, Schwefel, Phosphor, Guttapercha, Kautschuk, Wachs, Paraffin, viele Harze und Balsame. Er erstarrt bei —116° C zu einer festen Masse, die bei —110° C schmilzt. Schwefelkohlenstoff ist leicht flüchtig, bringt man einige Kubikcentimeter davon in ein Schälchen und bläst auf

die Oberfläche einen starken Luftstrom, so wird eine erhebliche Verdunstungskälte erzeugt. Gleichzeitig wird der in der Umgebung (d. h. in der Luft) befindliche Wasserdampf kondensiert und man erhält Krystalle eines Schwefelkohlenstoffhydrates, welche indessen schon bei -3°C wieder in Schwefelkohlenstoff und Wasser zerfallen bez. schmelzen.

Schwefelkohlenstoff ist leicht entzündlich, entzündet verbrennt er mit schön bläulicher Flamme zu Kohlendioxyd und Schwefligsaureanhydrid $\text{CS}_2 + 3\text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2$. Seine Dämpfe sind leicht entflammbar und geben mit Luft oder Sauerstoff gemengt explosive Gemische von hoher Energie. Lässt man Schwefelkohlenstoff in nur theilweise gefüllter Flasche im Sonnenlichte stehen, so nimmt auch ein ursprünglich farbloses Präparat gelbe Färbung und zugleich wieder den unangenehmen Geruch des rohen Präparates an. Bisweilen scheiden sich auch braune Flocken von Einfach-Schwefelkohlenstoff CS ab, während freier Schwefel in Lösung geht. Ein solches Präparat reinigt man gewöhnlich durch einfache Rektifikation oder durch das Verfahren, wie es unter Darstellung angegeben ist.

Man erkennt den Schwefelkohlenstoff mit ziemlicher Sicherheit am Geruch. Ist der chemische Nachweis zu führen, so verfährt man wie folgt:

1) Vermischt man einen oder mehrere Tropfen Schwefelkohlenstoff mit der fünffachen Menge starken alkoholischen Ammoniaks und erhitzt die Mischung zunächst einige Zeit in einem verschlossenen Gefäss, so besteht der beim Verdampfen im Wasserbade erhaltene Rückstand aus Rhodanammonium $4\text{NH}_3 + \text{CS}_2 = \text{SCN}(\text{NH}_3) + \text{S}(\text{NH}_4)_2$. Seine Lösung in Wasser wird nach dem Ansäuern mit etwas Salzsäure durch wenig verdünnte Ferrichloridlösung blutroth gefärbt. Durch Schütteln mit Aether geht der Farbstoff in diesen über.

2) Vermischt man Schwefelkohlenstoff mit der dreifachen Menge einer Lösung von Aetzkali in Alkohol, mischt gut durch und fügt nach einiger Zeit ein gleiches Vol. Aether zu, so erhält man das prachtvoll krystallisirende xanthogensaure Kalium. 8 dieses.

Prüfung. 1) Er sei farblos, klar, von nicht widerlichem Geruch. 2) Schüttelt man 10 ccm Schwefelkohlenstoff mit 5 ccm Wasser, so darf dieses blaues Lackmuspapier nicht rothen (Schwefelsäure) oder entfärben (Schweflige Säure) und beim Durchschütteln mit Bleiessig sich nicht braunen (Schwefelwasserstoff). 3) Werden 1–2 ccm Schwefelkohlenstoff in einem trocknen Probirglase mit einem Tropfen blanken metallischen Quecksilbers geschüttelt, so darf das letztere sich nicht mit einer dunklen, pulverigen Haut überziehen (Schwefelwasserstoff, bez. fremde organische Schwefelverbindungen). 4) Lässt man 5 ccm Schwefelkohlenstoff in einem Glasschälchen freiwillig abdunsten, so soll kein oder nur ein sehr geringer Rückstand (von Schwefel) hinterbleiben. Hierzu ist zu bemerken, dass Spuren von Schwefel zugleich mit dem Schwefelkohlenstoff verdunsten.

Aufbewahrung Handhabung. Man bewahrt den Schwefelkohlenstoff in starkwandigen Glasflaschen, welche entweder mit gut eingeschliffenen Glasstopfen oder mit Korkstopfen verschlossen sind, an einem kühlen Orte, also im Keller auf. Die Stopfen sind zweckmässig mit Leder zu überbinden. Die Aufbewahrung erfolge vor Licht geschützt. — In der Officin halte man überhaupt keinen Vorrath, weil bei Temperaturschwankungen die Gefässe gewöhnlich einen unangenehmen Geruch verbreiten, der leicht falsch gedeutet werden kann. Der früher übliche Gebrauch, den Schwefelkohlenstoff mit einer Schicht Wasser zu bedecken, um das Verdunsten zu verzögern, empfiehlt sich nicht, weil das Präparat unter diesen Umständen ganz besonders zur Zersetzung neigt.

Muss man grössere Vorräthe halten, so vertheile man diese in mehrere Flaschen von 1–2 Liter Fassungsraum. Verschluss durch Kautschukstopfen ist natürlich wegen der Auflöslichkeit des Kautschuks in Schwefelkohlenstoff ausgeschlossen.

Die grösste Beachtung erfordert indess die Feuergefahrlichkeit des Schwefelkohlenstoffs. Einmal ist er selbst sehr leicht entzündlich, ferner besitzt er eine hohe Dampfspannung (hohe Dampftension). Infolgedessen erfolgt eine ziemlich rasche Vergasung der Flüssigkeit, so dass durch Vermittelung der Dämpfe flüssiger Schwefelkohlenstoff auch von einer ziemlich entfernt brennenden Flamme — und hierzu ist schon das Feuer einer

biennenden Cigarre ausreichend — entzündet werden kann. Endlich ist zu berücksichtigen, dass Schwefelkohlenstoff mit Luft gemengt Gemische von hoher Explosionsenergie giebt.

Alle diese Momente fordern zur dringendsten Vorsicht beim Umgehen mit Schwefelkohlenstoff auf. Man vermeide es, denselben bei Licht einzufüllen. Gefässe, welche Lösungen in Schwefelkohlenstoff (behufs Krystallisation) zum freiwilligen Abdunsten enthalten, stelle man so auf, dass nach menschlicher Voraussicht die Dämpfe mit Flammenlicht in Berührung kommen können. Man fülle die Gefässe nicht zu mehr als $\frac{1}{4}$ ihres Rauminhaltes an und beachte, dass in einem solchen Gefässe, wenn es in der Kälte gestanden hat, bei eintretender Erwärmung ganz bedeutende Dampfspannung auftritt, kann.

Diesen letzteren Umstand sollten ganz besonders die chemischen Fabriken und die Drogisten beherzigen.

Man beachte endlich, dass für die Lagerung grösserer Mengen von Schwefelkohlenstoff die etwa erlassenen Polizeiverordnungen streng zu befolgen sind. (Vergl. auch unter Aether S. 170).

Anwendung. Schwefelkohlenstoff erzeugt ausserlich bei der Verdunstung auf der Haut das Gefühl intensiver Kälte. Daher benutzt man ihn als Kalte Anästheticum zur Ausführung kleinerer Operationen (Vorsicht wegen Feuersgefahr!). Bringt man ihn auf Watte geträufelt auf die Haut und verhindert die rasche Verdunstung durch Ueberdecken mit Taffet, so erfolgt starke Hautreizung, und schon nach 30 Sekunden tritt heftiges Brennen der Haut ein. Daher wendet man ihn an zu ableitenden Einreibungen, z. B. hinter die Ohren gegen Kopfschmerz, ferner an Stelle von Senfteigen, als Rubefaciens, wo er sich aber nicht eingebürgert hat, auch in Salbenform bei Drüsengeschwülsten. Eingethmet erzeugt der Dampf des Schwefelkohlenstoffs Bewusstlosigkeit und allgemeine Anästhesie, daher hat man ihn als Inhalations-Anästheticum empfohlen. Innerlich bewirkt der unverdünnte Schwefelkohlenstoff in Gaben von 10—25 Tropfen Erbrechen und Diarrhoe. Dagegen kann die gesättigte wässrige Lösung in grossen Mengen ohne Schaden genommen werden. In dieser Form empfiehlt DUJARDIN-BEAUMETZ ihn bei Magenerweiterung zur Verhinderung putriden Zersetzung, bei infektiösen Diarrhoen sowie bei Typhus abdominalis. — Die längere Zeit fortdauernde Einathmung kleiner Mengen Schwefelkohlenstoffdämpfe (mit Luft gemischt), wie sie in den Kautschukfabriken erfolgt, hat eine chronische Vergiftung zur Folge. Für niedere Thiere ist Schwefelkohlenstoff ein Gift. Deshalb ist er auch in gewissem Sinne als Antisepticum und Desinficiens aufzufassen. Er dient deshalb auch unter Umständen zum Tödteten von Wanzen, Motten, Flöhen und anderen Schädlingen (Reblaus), wobei jedoch immer die leichte Entzündlichkeit zu berücksichtigen ist.

Technisch findet der Schwefelkohlenstoff ausgedehnte Verwendung in den Gewerben bez. Fabriken, z. B. zur Extraktion von Fetten aus Knochen und Samen, zum Entfetten der Wolle, zum Extrahiren des Schwefels aus Erzen, zum Vulkanisiren des Kautschuks, zur Konservirung von Nahrungsmitteln (Fleisch) und vielen anderen Zwecken.

In der Analyse gebraucht man ihn besonders zum Extrahiren von Schwefel. Zu diesem Zwecke sollte stets eine gute Sorte in frisch destillirtem Zustande verwendet werden.

Aqua Carbonis sulfurati DUJARDIN-BEAUMETZ. Rp Carbonis sulfurati 25,0, Olei Menthae piperitae 2,0, Aquae 500,0. Man schüttelt tüchtig durch und giesst nach dem Absetzen die klare Flüssigkeit ab. Auf den Rückstand kann man noch mehrmals hintereinander 500 ccm Wasser gessen und wie vorher verfahren. Man giebt es zu 4—10 Esslöffel täglich am besten in Milch.

Wanzen-Aether der Berliner Drogisten ist Schwefelkohlenstoff, natürlich eine unreine, technische Sorte.

SELL'sche Lampe heisst eine Lampe mit Rundbrenner, in welcher mittelst Docthes Schwefelkohlenstoff verbrannt wird, während gleichzeitig in den Innenraum des Flammenkegels ein Strom von Stickoxyd zugeführt wird. Dadurch wird eine glänzende, blaue Flamme erzeugt, welche reich an chemisch wirksamen Lichtstrahlen ist, daher zu photographischen Aufnahmen benutzt werden kann.

Unimentum Carbonis sulfurati, WUTZER. Rp Carbonis sulfurati 10,0, Vini camphorati 150,0, Olei Olearum 100,0. Fiat unimentum. Zum Einreiben bei Rheumatismus, Gicht.

II Kalium xanthogenicum Xanthogensaures Kali. Aethylxythiokohlensaures Kalium. Aethylxanthogensaures Kalium $\text{CS}_2\text{K OC}_2\text{H}_5$ Mol Gew = 160

Darstellung Man löst 100 Th festes Aetzkali in 300 Th Alkohol von 90 Proc, fügt zu dieser Lösung 150 Th Schwefelkohlenstoff, schüttelt um und stellt die Mischung in die Kälte. Nach kurzer Zeit hat sich ein gelblicher Krystallbrei gebildet $\text{CS}_2 + \text{KOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = \text{H}_2\text{O} + \text{CS}_2\text{K OC}_2\text{H}_5$. Man sammelt die Krystalle in einem Trichter, wäscht sie nach dem Abtropfen mit etwas Aether, saugt sie auf poröser Unterlage ab und lässt sie bei gewöhnlicher Temperatur trocknen.

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche, seidenglanzende Krystallnadeln, leicht löslich in Wasser, schwer löslich in Alkohol, unlöslich in Aether, von eigenartigem Geruch und starkem, schwefelartigem Geschmack. Beim Erwärmen mit wenig Wasser auf 80–90° C wird es zersetzt unter Bildung von Aethylalkohol, sulfokarbonsaurem Kalium CS_2K_2 , Schwefelwasserstoff und Kohlensäureanhydrid. Die nämliche Zersetzung erfolgt langsam schon bei gewöhnlicher Temperatur durch Einwirkung feuchter Luft. Mineralsauren scheiden aus dem Salz die freie Xanthogensäure als ein farbloses Öl ab, welches schon bei 24° C in Schwefelkohlenstoff und Alkohol zerfällt. — Versetzt man die wässrige Lösung des Kaliumxanthogenats mit einem Cuprisalz, so scheidet sich zunächst braunes Cuprixanthogenat aus, welches sehr bald in eisgelbes Cuproxanthogenat übergeht.

Anwendung Das Kaliumxanthogenat ist ein kräftiges Antisepticum, welches Faulnis und Gährung unterdrückt, auch ein Gift für Mikroorganismen und kleine Thiere ist. Man hat es daher u. a. in Mischung mit Milchsücker (1:50) zu Einblasungen bei Diphtherie angewendet. Die Verwendung zur Konservierung von Nahrungsmitteln scheiterte an dem für die meisten Personen unangenehmen Geruch. Die wichtigste Anwendung ist die zur Vertilgung der Reblaus (*Phylloxera*). Es soll hier den Schwefelkohlenstoff ersetzen, und zwar nahm man an, dass es selbst auf die Reblaus giftig wirkt und dass es im Erdboden zum Theil in Schwefelkohlenstoff umgewandelt wird. Natürlich wird hierzu ein reines Präparat verwendet.

Kalium amyloxanthogenicum. Amylxanthogensaures Kalium. $\text{CS}_2\text{K. OC}_2\text{H}_{11}$. An Stelle des Aethylrestes im xanthogensauren Kalium können andere Alkohol-Radikale eingeführt werden dadurch, dass man an Stelle von Aethylalkohol andere Alkohole (Methyl, Butyl-, Amylalkohole, Glycerin) in die oben angegebene Vorschrift einsetzt.

Das amyloxanthogensaure Kalium wird bereitet durch Mischen von 90 Th Amylalkohol, 180 Th Kalilauge von 1,33 spec Gew und 80 Th Schwefelkohlenstoff.

III Kalium sulfocarbonicum Kaliumsulfocarbonat. Schwefelkohlenstoffsaures Kalium. Thiokohlensaures Kalium. $\text{CS}_2\text{K}_2 + x \text{ aqua}$

Zur Darstellung bereitet man aus 150 Th festem Kalihydrat die entsprechende Menge Kaliumsulfid (K_2S), löst in der concentrirten wässrigen Lösung 100 Th Schwefelkohlenstoff auf und fällt die concentrirte Lösung durch Alkohol.

Man erhält das Salz als gelbe, wasserhaltige, zerfließliche Krystalle. Durch Säuren wird aus dem Salze die freie Sulfokohlensäure CS_2H_2 als schwere, ölige, dunkelgelbe Flüssigkeit abgeschieden, welche leicht in Schwefelwasserstoff zerfällt.

Hierauf beruht die Anwendung des Präparates als Mittel gegen die Reblaus.

IV Carboneum oxysulfuratum Kohlenstoffoxydsulfid. Carbonylsulfid COS Mol. Gew. = 60. Entsteht durch direkte Vereinigung von Kohlenoxyd mit Schwefeldampf in der Hitze. Ferner durch Erhitzen von 50 ccm einer kalt gesättigten Lösung von Rhodankalium mit einer erkalteten Mischung von 800 ccm conc. Schwefelsäure und 400 ccm Wasser.

Farbloses, leicht entzündliches Gas von unangenehm schwefelartigem Geruch. 1 Vol. Wasser von 15° C löst 1 Vol. des Gases. Die wässrige Lösung zersetzt sich bald unter Bildung von Kohlensäureanhydrid und Schwefelwasserstoff $\text{COS} + \text{H}_2\text{O} = \text{SH}_2 + \text{CO}_2$. Dieses Gas ist wahrscheinlich in vielen Grundwassern enthalten, welche nach „Schwefel“ riechen.

Cardamomum.

I. Elettaria Cardamomum White et Maton. Familie der Zingiberaceae — Zingiberaceae. Heimisch im südlichen Theile der Westküste Vorderindiens (Malabarküste), dort und auf Ceylon kultivirt. Die Kulturen in anderen Gegenden der Tropen sind über das Versuchstadium noch nicht hinausgekommen. — Verwendung finden die Früchte mit




Fig. 155. Querschnitt d. Sem. Cardamomi. 160 mal vergr. a Epidermis. gu Quersellen. st Palissaden. p Oelzellen. e Perisperm. (Nach Moellan.)

den Samen: Fructus Cardamomi (Austr. Germ. Helv.). Cardamomum (U-St.). Cardamomi Semina (Brit.). Cardamomum minus s. Malabaricum. Semen Cardamomi minoris. — Kardamomen. Kleiner oder Malabarischer Kardamomen. Malabar-samen. — Cardamome du Malabar (Gall.). Cardamom Seeds.

Beschreibung. Die Frucht ist eine rundliche oder längliche, im Querschnitt dreikantige Kapsel, an der Spitze mit einem

kurzen Röhrchen, dem Reste des Perigons, am Grunde zuweilen mit dem kurzen Fruchtsiel; die Seiten sind längestreifig, die Farbe strohgelb. Jedes der drei Fächer enthält 5–8 Samen. Diese sind rötlichbraun, bis 3 mm lang, unregelmässig kantig, grob quergerunzelt. Auf der einen Seite verläuft in einer Furcha die Raphe, nicht ganz bis zur Spitze. Der Same ist in ein zartes Häutchen, den Arillus, eingehüllt. In der Droge betragen die Schalen 25–40 Proc., die Samen 60–75 Proc. Das Gewebe der Fruchtwand besteht aus Parenchym, in dem einzelne, kleinere bis 50 μ grosse Zellen gelbe oder bräunliche Harzkümpen enthalten. In der Epidermis Ansatzstellen früher vorhanden gewesener Haare. Die das Parenchym durchziehenden, zarten Gefässbündel haben einen Faserbelag aus schwach verdickten, ziemlich kurzen Fasern. Auf sie und auf die Harzzellen ist zu achten, wenn es sich um den Nachweis der Elemente des Pericarps im Pulver handelt.




Fig. 157. Elemente des Samens. 160 mal vergr. Beschlagnungen wie Fig. 156. am Stärke. (Nach Moellan.)

Der Same enthält innerhalb der Samenschale ein starkes Perisperm, darin ein schwaches Endosperm mit dem Embryo, der vor dem Embryo gelegene Theil der Samenschale ist zu einem Deckelchen umgewandelt, welches das Austreten der Radicula erleichtert. Die Samenschale (Fig. 156) besteht zunächst aus einer Epidermis kürzerer, gruppenweise zusammengelegter Zellen. Dann folgt eine dünne Schicht, deren Zellen sich im wesentlichen mit denen der Epidermis kreuzen. Die nächste Schicht besteht aus grossen, zarten Zellen, die das ätherische Oel, dem die Droge Geruch und Geschmack verdankt, enthalten, dann folgt eine dünne Parenchymschicht und darauf als letzte: kurze, an der Innenwand und den Seitenwänden sehr stark verdickte Palissaden, die einen unregelmässig geformten Körper einschliessen, der im wesentlichen aus Kieselsäure besteht. Diese Palissaden in der Epider-

mis sind im Pulver am leichtesten aufzufinden. Innerhalb der Oelzellenschicht verläuft die Raphe. Die Zellen des Perisperms sind dicht erfüllt mit ganz feinkörniger Stärke, deren Könnchen höchstens 4μ messen, in jeder Zelle liegen ausserdem einige kleine Oxalathrysalte, von einer zarten Haut umschlossen. Im Endosperm wenig differenziertes Aleuron.

Im Pulver fällt zunächst die Stärke des Perisperms auf, nach deren Entfernung Fetzen der Epidermis der Samenschale und Zellen oder Bruchstücke solcher aus der Palisadenschicht.

Bestandtheile

Nach KONTIG

	Wasser	Stückstoff- haltige Sub- stanz	Ätherisches Oel	Fett	Zucker	Stärke	Stückstoff- freie Ex- traktstoffe	Rohfaser	Asche	In der Trockensubstanz				
										Stückstoff- haltige Substanz	Ätheri- sches Oel + Fett	Stärke		
Procent														
Samen	11,25	14,77	3,83	1,73	0,64	81,73	8,76	16,89	10,60	16,64	6,26		35,75	
Fruchtschalen	9,51	7,64	0,13	2,56	1,16	20,80	14,39	29,98	11,89	8,44	2,94		22,98	

Das ätherische Oel, Oleum, Cardamomi, von dem die Samen 3—5 Proc. enthalten, löst sich in 10 Theilen 90proc. Alkohol nicht ganz klar auf, es beginnt bei 164°C zu sieden, die Hauptmenge geht bei $170\text{--}220^{\circ}\text{C}$ über. Enthält ein Terpen $\text{C}_{10}\text{H}_{18}$ und vielleicht Terpineol $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$. Der Vorlauf bei der Destillation enthält Ameisensäure und Essigsäure.

Die Asche enthält wie bei vielen Zingiberaceen Mangan.

Einverkauf. Nach dem Wortlaute der verschiedenen Arzneibücher sind nur die ganzen Kapseln officinell, mithin die den letzteren entnommenen Samen (Semen Cardamomi excoctatum der Drogisten) vom Einkauf und Vorrathighalten ausgeschlossen. Die Vorschrift ist nothwendig, weil die aus den Schalen genommenen Samen leicht mit denen weniger aromatischer verwandter Pflanzen verfälscht werden können.

Aufbewahrung. Anwendung. Man bewahrt die ganzen Früchte in gut verschlossenen Hafengläsern oder Blechbüchsen, das mittelfeine Pulver in braunen Stopf-
gläsern auf. Letzteres bereitet man nach Germ. Helv. und U-St. aus den ganzen Früchten, woraus auch das käufliche Cardamomenpulver besteht. 100 Th. lufttrockene Kapseln geben 88—90 Th. mittelfeines Pulver. Austr. Gall. und Brit. bestimmen ausdrücklich, dass nur die Samen verwendet werden dürfen, im Geltungsbereiche dieser Pharmacopöen wird man also zur Darstellung von Präparaten und des Pulvers die Fruchtschale zuvor beiseitigen. Dieses Pulver darf nur ein grobes sein.

Cardamomen dienen als gewürzhafter Zusatz zu Tinkturen und Pulvern, besonders aber als Küchengewürz. Neuerdings gegen Diarrhoen empfohlen.

Tinctura Cardamomi. Cardamomentinktur. — Tincture of Cardamom. Durch Perkolat. mittelst q. a. verdünntem Weingeist sind nach Helv. aus 200 g Cardamomenpulver 1000 g, nach U-St. aus 100 g Pulver 1000 cem Tinktur zu bereiten.

Tinctura Cardamomi composita (Brit. U-St.) Compound Tincture of Cardamom

a. Brit.	
Ep. Semin Cardamomi contus.	12,5 g
Fructus Carvi contus.	12,5 „
Corticis Cinnamomi contus.	25,0 „
Coccinellae pulveratae.	68 „
Passular major a semin. liberat.	100,0 „
Espiritus (60%).	1000 cem.

Durch Maceration zu bereiten.

b. U-St.	
Ep. Fructus Cardamomi	20,0 g
Corticis Cinnamomi	20,0 „
Fructus Carvi	10,0 „
Coccinellae	5,0 „
Glycerini	50 cem.
Spiritus diluti q. s.	

Man sammelt l. a. durch Perkolat. 950 cem und fügt dann das Glycerin zu.

Balsamum Gileadense Salomon, ein englisches Mittel, ist eine Tinktur aus Cardamomen, Zimmt, Kantharden, Mekkabalsam und Zucker.

Beize für Tabakblätter. Cardamomen, Zimmt ää 60,0, Vanille 35,0, Thee 15,0, Salpeter 125,0, Zucker 250,0, Süsswein 5 l., ausreichend für 40—50 kg.

Neben den Malabar- oder kultivirten Ceylon-Cardamomen sind die grosseren Ceyloncardamomen oder langen Cardamomen zu nennen, die von einer früher für eine besondere Art (*Elettaria major* Smitt) gehaltenen Varietät der *E. Cardamomum* abstammen. Die Früchte sind bis 4 cm lang, etwas gekrümmt, mehr grüngelb. Samen grösser wie bei I, Geschmack weniger fein und scharfer. Die Epidermiszellen sind stärker verdickt wie bei I und spiralig gestreift, Palissaden noch stärker verdickt wie bei I, die Grenzen der einzelnen Zellen kaum zu erkennen — Sie werden zuweilen dem Pulver von I beigelegt.

II Ausser den genannten liefern noch eine Anzahl verwandter Pflanzen aromatische Samen, die als *Cardamomum*, *Amomum* etc, zuweilen nach Europa kommen. Es sind zu nennen 1) Siam-Cardamomen, *Cardamomum rotundum*, *Amomum verum* von *Amomum Cardamomum* L. in Siam, Java, Sumatra 2) Wilde oder Bastard-Cardamomen von *Amomum xanthioides* Wallich in Hinterindien 3) Schwarze Cardamomen, Bitter seeded *Cardamomum*, vielleicht von *Amomum globosum* in China 4) Korarima-Cardamomen oder *Cardamomum major* von unbekannter Abstammung aus Ostafrika. Alle unterscheiden sich im Geschmack deutlich von den officinellen.

III Unter den Namen Samen Paradisi, Grana Paradisi, Paradies-Körner, Melegueta-Pfeffer, Grains de Paradis, Grains of Paradise kommen seit Alters aus Westafrika Samen in den Handel, die jetzt wohl nur noch als Gewürz Verwendung finden. Als Stammpflanze gilt *Amomum Melegueta* Roscoe, vielleicht auch *Amomum Hookeri*.

IV Seit wenigen Jahren gelangt aus Kamerun eine Cardamomensorte in den Handel, deren Kapseln von rothbrauner Farbe, bis 7 cm lang, am unteren, aufgetriebenen Ende bis 2 cm dick sind. Die unregelmässig-eiförmigen Samen sind bis 5 mm lang, bis 2 mm dick. Sie stammen wahrscheinlich von *Amomum angustifolium* Sonnerat (A. Danielli Hook f, A. Clusi), einer in Afrika weit verbreiteten Pflanze, die auch Grosse Madagaskar Cardamomen liefert. Sie enthalten 1,6 Proc eines ätherischen Oeles, das für Parfümeriezwecke und zur Seifenfabrikation empfohlen wird.

Carex.

Gattung der Cyperaceae — Cariceae.

Carex arenaria L. Heimisch in ganz Europa und Nordamerika auf sandigen Stellen. Liefert *Rhizoma Caricis* (Erganzb.) *Radix Caricis* s. *Sarsaparillae Germanicae* *Radix Graminis major* s. *rubra*. Sandriedgraswurzel. Rothe Quecke. Deutsche Sarsaparille. Seggenwurzel. — Chiendent rouge. Lâche des sables. — Sea sedge root.

Beschreibung. Die langen Rhizome sind 2—4 mm dick, aussen gelbgrau, an den Knoten mit fast das ganze Internodium verhüllenden, glänzend braunen, faserig zerschlitzten Niederblättern und an deren Insertionsstellen mit Büscheln von Wurzeln.

Der Querschnitt lässt in der Rinde einen Kranz grosser Luftflücken erkennen, die Endodermis besteht aus nach innen stärker als nach aussen verdickten Zellen. Innerhalb derselben 3 Kreise konzentrischer Gefässbündel.

Bestandtheile. Spuren von ätherischem Oel, Weichharz, Gummi, Stärke etc.

Einsammlung. Man sammelt das Rhizom im Frühjahr, schneidet es nach Entfernung von Stengelresten und Wurzeln in frischem Zustande 5 Th. geben nach dem Trocknen 2 Th.

Verwechslungen. An Stelle von *Carex arenaria* wird häufig das Rhizom von *Carex hirta* L., das keine Luftflücken hat, oder das von *Carex disticha* Huds., das auch an den Internodien Wurzeln trägt, gesammelt.

Anwendung. Als Diureticum und Diaphoreticum an Stelle der Sarsaparilla bei Syphilis, chronischem Rheumatismus, Gicht in der Form des Dekokts.

Carica.

I. Carica Papaya L. Gattung der Caricaceae. Melonenbaum. Mamoeiro. Mammona. Heimisch in Mexiko, aber im wilden Zustand nicht bekannt und wahrscheinlich durch Kreuzung wilder Arten entstanden, als Obstbaum überall in den Tropen kultivirt.

In allen Theilen der Pflanze finden sich anastomosirende, gegliederte Milchsafschläuche, die einen weissen Milchsaft enthalten, der bitter schmeckt, Entzündungen des Darmkanals hervorruft kann und als Anthelminticum dient. Er enthält bis zu 50 Proc. Fermente, die verdauend wirken (vergl. Papayotin).

Hauptsächlich die Blätter enthalten ein Alkaloid: Carpain $C_{11}H_{25}NO_2$ (die jungen getrockneten Blätter 0,25 Proc.), das als theilweiser Ersatz der Digitalis empfohlen wird. Mit Kaliumchlorat und concentrirter Schwefelsäure wird es grün.

Die Samen haben einen scharfen, an Kresse erinnernden Geschmack. Auch die Wurzel enthält ein Ferment, ähnlich dem Myrosin und ein Glucosid, ähnlich dem Kaliummyronat, sie liefert daher bei der Destillation eine nach Senföl riechende Flüssigkeit.

Papayotin (Ergänzb.) u. Papain: die Eigenschaft aller Theile der Pflanze, Fleisch, wenn es damit zusammen gekocht wird, in kurzer Zeit mürbe zu machen, ist seit lange bekannt. 1874 wurde empfohlen, diese Eigenthümlichkeit medicinisch nutzbar zu machen und seit 1879 datiren darauf bezügliche Versuche.

Es sind seit dieser Zeit eine grosse Anzahl von Präparaten empfohlen und in den Handel gebracht worden, bei denen man mit der Nomenklatur oft recht willkürlich umgegangen ist, so dass aus dem Namen nicht ohne weiteres ein Schluss zu ziehen ist auf die Beschaffenheit und die Eigenschaften des Präparates.

Nach Einschnitten in die verschiedenen Theile des Baumes, besonders reichlich des Stammes und der Frucht, fliesst der Milchsaft aus, der an der Luft aus einem farblosen Serum eine weisse, dickliche Masse (Papayotin) abscheidet, die das Ferment enthält.

Oder man scheidet aus dem frischen oder aus dem mit Aether oder Chloroform versetzten Saft das rohe Ferment mit Alkohol ab, oder extrahirt aus den in Glycerin konservirten Blättern das Ferment oder concentrirt einfach den frischen Milchsaft. Neuerdings gewinnt man das rohe Ferment, indem man den frischen Saft zur Abscheidung harziger Körper mit Wasser verdünnt und dann mit Alkohol bis zum Beginn einer Fällung versetzt. Der filtrirten Flüssigkeit wird dann 90 proc. Alkohol zugegossen, der sich abscheidende Körper wird gesammelt, abgepresst, getrocknet und durch Behandeln mit Knochenkohle gereinigt. Das so gewonnene Ferment enthält noch Eiweisskörper. Oder man fällt das Ferment mit Alkohol aus, sammelt den Niederschlag und löst ihn wieder bei einer Temperatur von 36–40° C.

Ausser durch Alkohol ist das Ferment auch durch Salpetersäure fällbar, auch Sublimat, Bleiacetat und Silbernitrat geben Niederschläge.




Fig. 158. Schnitt durch das Fruchtfleisch der Feige.
160 mal vergrössert. (Nach MOELLER.)
m Milchsafschläuche, g Gefässe, K Oxalatdrusen.

Im allgemeinen hat sich der Gebrauch eingebürgert, mit dem Namen Papain der mehr oder weniger rohen Milchsafft der Pflanze (*Succus Papayae*) und mit Papayotin das möglichst rein dargestellte Ferment zu bezeichnen, doch wird, wie schon angedeutet, von den Fabriken, die im übrigen über die Darstellung ihrer Präparate im allgemeinen naturgemäss nichts verlauten lassen, gegen diese Regel häufig verstossen, wozu noch kommt, dass solche Präparate häufig noch Pepsin enthalten. Diese letzteren lösen Eiweiss




Fig. 159. Epidermis der Feige.
160 mal vergrössert. (Nach MOELLER.)
H Haar. h Narben von Haaren.

in saurer Lösung, wogegen Papayotin in neutraler und alkalischer Lösung wirkt, (während also das Pepsin im Magen wirkt, wirkt das Papayotin im Darm), von Salzsäure wird es gefällt und der Niederschlag löst sich erst wieder in so erheblichen Ueberschuss von Säure, wie er für die Praxis nicht in Betracht kommt.

Zur Prüfung des Papayotins verwendet man Blutfibrin, in Wasser vertheilt, giebt auf 100 cem Wasser 1 cem Natronlauge zu, ferner das Präparat und lässt bei 45–50° C. 4–5 Stunden stehen. Ein gutes Präparat hat dann 200–250 Th. Fibrin gelöst.

Man löst 0,2 g Papayotin in 4 cem Wasser, fügt 1 cem Salpetersäure (spec. Gew. 1,153) hinzu und filtrirt nach einstündigem Stehen ab. Das Filtrat darf dann von Tanninlösung (1:20) nicht bis zur Undurchsichtigkeit getrübt werden.

Die einzelnen *Handelssorten* sind sehr verschieden, ihre Farbe wechselt von fast weiss bis hellbraun, im allgemeinen kann man sagen, dass je weniger gefärbt ein Präparat ist, um so besser ist es. Die von E. MACK in Darmstadt und die von GEHE & Co. in Dresden hergestellten Präparate wirken am besten in alkalischer Lösung, die von BOHRINGER und von FINKLER hergestellten in saurer Lösung.

Anwendung. Innerlich in Pulver, Pillen oder weiniger Lösung zu 0,1–0,5. Aeusserlich zur Lösung diphtheritischer Beläge auf den Mandeln in 5% wässriger Lösung. Bei Anfertigung der letzteren giebt man die ganze Wassermenge auf einmal in das Gefäss und löst das Papayotin durch Schütteln. Die Flüssigkeit schäumt ausserordentlich.




Fig. 160. Zellformen aus der Fruchtschale der Feige. 180 mal vergr. (Nach MOELLER.)
ep Epidermis. st Steinzellen. p Parenchym.

Elixir Papaini, Papainelixir. 11,0 Papayotin, 0,4 Saccharin, 60,0 Glycerin, 150 Sherry, 390,0 Chloroformwasser (1:200). Nach 7 tägigem Stehen zu filtriren.

Papayafleischpepton, OBOLS, wird durch Behandeln von Muskelfleisch mit Papayotinlösung gewonnen.

Carica quercifolia St. Hilairo, heimisch in Paraguay und Argentinien, wirkt ähnlich wie vorige, dient auch als Wurmmittel. Die Blätter werden wie Seife zum Waschen benutzt.

II. Ficus Carica L. Familie der Moraceae — Artocarpoidae — Ficoae. Ursprünglich wohl im östlichen Mittelmeergebiet heimisch, durch die Kultur weit verbreitet.

Verwendung finden die Sammelfrüchte (*Syncarpien*): *Caricae* (Ergänz.). *Fructus Caricae*. *Caricae pingues*. *Ficus* (Brit. U-St.) — Feigen. — *Figues* (Gall.). — *Figs*.

Beschreibung. Dieselben bestehen aus einem birnförmigen, hohlen, auf dem Scheitel mit enger Oeffnung versehenen Receptaculum. Die Oeffnung ist mit dicht gestellten Deckblättern umgeben. In der Höhlung zahlreiche, kleine, hartschalige Früchte, die etwa 2 mm lang und von gelblicher Farbe sind. Nur die beiden innersten Schichten, eine einfache, dünnwandige und eine aus mehreren Lagen sklerotischer Zellen bestehende ist noch an

der Frucht vorhanden. Die Fruchtschale umschliesst den gekrümmten Embryo und spärliches Endosperm.

Das Receptaculum, das die Hauptmasse der Droge ausmacht, ist von einer Epidermis bedeckt mit wenig Stomatien und kurzen, geraden, einzelligen Haaren, von denen man in der trocknen, reifen Frucht in der Regel nur noch die Narben findet (Fig 159). Das übrige Gewebe besteht im wesentlichen aus zartem Parenchym mit reichlichen Milchsaftschläuchen und Oxalatdrüsen, die indessen zuweilen auch zu fehlen scheinen (Fig 158).

Wenn es sich um den *Nachwuchs* von Feigen handelt, so fallen zunächst (z. B. im Feigenkaffee) die unverletzten oder wenig zertrümmerten Fruchtkerne auf. Es ist notwendig, sich durch Anfertigung von Querschnitten zu überzeugen, dass es sich wirklich um Feigenfrüchte handelt, da als Feigenkaffee Cichorien mit darunter gemengten Cruciferensamen vorgekommen sein sollen. Im Gewebe des Receptaculums sind die Milchsaftschläuche, die Oxalatdrüsen und die Epidermis mit den Haaren oder den Narben solcher charakteristisch.

Bestandtheile nach KÖNIG: 31,20 Proc. Wasser, 1,34 Proc. Stickstoffsubstanz, 1,44 Proc. Fett, 1,21 Proc. freie Säure, 49,79 Proc. Zucker, 4,51 Proc. sonstige stickstofffreie Stoffe, 4,48 Proc. Holzfaser, 2,86 Proc. Asche. Die Feigen enthalten ein peptonisirendes Ferment *Cradin*, das in alkalischen und sauren Flüssigkeiten wirksam ist.

Aufbewahrung. Anwendung. Bei geringem Verbrauch sind die Vorräthe häufig zu besichtigen, da dieselben einen günstigen Boden für Milben und Schimmelpilze bilden. Am haltbarsten sind die auf gespaltene Halme gereihten sogenannten Kranzfeigen, *Caricae in coronis*, man bewahrt diese Kranze, in Pergamentpapier gehüllt, in Holzkästen auf und entnimmt denselben nur nach Bedarf die einzelnen Früchte. Von Milben befallene Feigen setzt man einige Stunden Ätherdämpfen aus und reinigt sie dann mit einem Borstenpinsel.

Die Feigen dienen, nach vorherigem Einweichen in Milch, zum Reifen von Zahngeschwüren, nur selten werden sie zu Theemischungen oder Abkochungen gebraucht. Getrocknet, geröstet und grob gepulvert liefern sie den Feigen- oder Gesundheitskaffee (*Caricae tostae*), woraus auch im wesentlichen das beliebte Karlsbader Kaffee gewürz besteht (vergl. *Coffea*).




Fig. 161. Aus den Samen der Feigen 160 mal vergrößert (Nach MOELLER). a farbloses b braungefärbtes Parenchym. E Endospermgewebe c Gewebe des Embryo.

Fructus pectorales (s. bechiel)
Espèces pectorales (avec les fruits)
Fructus pectoraux (Gall.)
 Rp. *Caricarum*
Dactylorum s. nucleis lib
Pasualarum minor
Jujubarum R.

Gargarisma emolliens.
 Rp. *Caricarum cond.* 50,0
Radialis Althaeae 20,0
Lactis vaccini 1000,0
Boracis 5,0

Nach 1stündigem Digeriren im Wasserbade durchsiehen

Ptilana de fructibus (Gall.)
Tisane de fruits pectoraux.
 Rp. *Fructuum pectoralium* 50,0
Aquae destillatae q. s.

Durch halbstündiges Kochen und Durchsiehen bereitet man 1 l Flüssigkeit.

Carlina.

Gattung der Compositae — Cynarene — Carlininae

I Carlina acaulis L. Heimisch in Mittel- und Sudemopa

Liefert Radix Carlinae (Erganzb) Radix Apii s Cardopatiæ Chamæleonis, Eberwurz. Amberwurz. Attigwurz. Karlsdistel. Kraftwurz Rosswurz Racine de Carline

Beschreibung. Sie ist einfach, seltener mehrköpfig, von Stengel- und Blattresten beschofft, 10—15 cm lang, 2 cm dick, aussen graubraun, runzelig, oft zerklüftet, bruchig, von charakteristisch aromatischem Geruch und Geschmack. In den Markstrahlen des Holzes und der Rinde zahlreiche schizogene Sekretbehälter. Im Parenchym reichlich Inulin und Kalkoxalat.

Bestandtheile. 1,5—2,0 Proc braunes ätherisches Oel vom spec Gewicht 1,038—1,036, 22 Proc Inulin, Harz etc

Sammlung Anwendung. Noch hier und da als Bestandtheil von Viehpulvern im Gebrauch. Man gräbt sie im Herbst und trocknet sie bei gelinder Wärme, gesondert von andern Arzneistoffen. Man hält sie geschnitten und als grobes Pulver vorrätig. 4 Th frische Wurzeln liefern 1 Th trockene.

Verwechslung. Als solche kommt die Wurzel von *Carlina vulgaris L.* vor, früher als *Radix Carlinae silvestris* im Gebrauch. Sie ist holziger und hat keine Sekretbehälter, riecht und schmeckt daher nicht aromatisch.

II Carlina acanthifolia All. liefert die entsprechende Wurzel der französischen Apotheken.

Caro.

Caro. Fleisch. Viande. Meat.

Allgemeines. Unter Fleisch als Nahrungsmittel versteht man vorzugsweise das Muskelfleisch, d. h. die Masse der quergestreiften Muskeln, ausserdem aber noch das Gewebe der grossen Unterleibsdrüsen Leber und Niere, ferner das Blut, die Milz, die Thymusdrüse, das Gehirn der Säugethiere.

Nach dem Schlachten der Thiere treten in den Muskeln nachweisbare, chemische Veränderungen auf. Unmittelbar nach dem Schlachten ist die Reaktion des entbluteten Fleisches neutral oder amphoter mit Hinneigung zur alkalischen Reaktion. 4—6 Stunden nach dem Tode tritt saure Reaktion auf, welche durch Monokaliumphosphat und das Auftreten freier Milchsäure bedingt wird. Zugleich erfolgt Gerinnung des Muskelerweisses (des Myosins) als deren Folge die „Todtenstarre“ zu bezeichnen ist. — Wenn die Todtenstarre einige Zeit gedauert hat, wird sie wieder gelöst und der Muskel wird weicher. Dies kann durch Vermehrung der auftretenden Milchsäure, aber auch durch beginnende bakterielle Prozesse verursacht werden. In diesem Stadium ist das vorher starre Fleisch wieder murbe. Man sucht daher in der Praxis diesen Zustand herbeizuführen durch das „Abhängen“ des Fleisches, ferner durch Klopfen und endlich durch Einlegen in Essig oder saure Milch.

Chemische Bestandtheile des Muskelfleisches. Die chemischen Bestandtheile des von Fett, Sehnen und Knochen befreiten möglichst „todtenstarrten“ Muskelfleisches sind folgende ¹⁾

1) Wasser. Im Muskelfleisch erwachsener Säugethiere zu etwa 72—78 Proc enthalten. Es kann im embryonalen Fleisch bis zu 98 Proc sein. Im Fleisch niederer Wirbelthiere, z. B. der Fische, beträgt der Wassergehalt 79—82 Proc.

2) Stickstoffhaltige Verbindungen. a) Aus der Gruppe der Proteinstoffe Muskelfaser mit dem Myosin (18—18 Proc), Muskelalbumin, Serumalbumin, Globuline,

¹⁾ Unter Benutzung der „Vereinbarungen deutscher Nahrungsmittel Chemiker“ etc.

Blutfarbstoff (Oxyhaemoglobin) und Nucleine, ferner das leumgebende oder Bindegewebe (2—5 Proc)

b) Die nicht erweissartigen stickstoffhaltigen Bestandtheile setzen sich zusammen aus Antipepton oder Fleischsaure, Kreatin, Kreatinin, Hypoxanthin (Sarkin), Xanthin, Harnstoff etc. Letzterer tritt besonders im Rochen- und Haifischfleisch in grosserer Menge auf

3) Fett Dieses tritt auch in dem mechanisch von Fett befreiten Fleische in Mengen von 0,5—4,0 Proc auf

4) Stickstofffreie Bestandtheile Sie bestehen vorwiegend aus Glykogen (besonders im Pferdefleisch und im embryonalen Kalbfleisch) und dem aus dem Glykogen gebildeten Zucker, aus Fleischmilchsäure und kleinen Mengen anderer organischer Säuren. Doch ist der Gesamtgehalt an diesen Stoffen nur gering

5) Mineralstoffe (etwa 1—2 Proc) Diese bestehen grösstentheils aus Kaliumphosphat, daneben sind Calcium- und Magnesiumphosphat sowie Natriumchlorid vorhanden

Die drüsigen Organe, Leber, Niere u. s. w., unterscheiden sich von den Muskeln hauptsächlich durch den grösseren Gehalt an Nucleinstoffen. Blut enthält nur wenig Nuclein, aber viel Blutfarbstoff. Reich an Blutfarbstoff und an Nuclein ist die Milz. Im fibrigen enthalten die drüsigen Organe globulinartige Eiweissstoffe, Glykogen und andere Kohlehydrate, Lecithin, Fett, Cholesterin, in geringen Mengen Inosit, Amidosäuren, Salze des Kalium, Eisen, Calcium, Magnesium als Phosphate und Chloride

Die nervösen Organe enthalten in reichlicher Menge Lecithin und Cholesterin, sowie Protogen und seine Derivate (Cerebroside) neben Eiweissstoffen und anorganischen Salzen

Qualität und Nährwerth Der Wert des Fleisches als Nahrungsmittel beruht darauf, dass es einen hohen Gehalt an Eiweiss besitzt, und dass dieses Eiweiss sehr leicht verdaulich ist, weil es nicht, wie z. B. das Eiweiss der Hulsefruchte, in pflanzliche Membranen eingeschlossen ist. Das Eiweiss des Fleisches kann unter günstigen Bedingungen bis zu 97 Proc verdaut werden. — Gleichfalls von Bedeutung für die Ernährung sind die im Fleische enthaltenen anorganischen Salze, welche zur Versorgung des Blutes, der Gewebe und des Knochengerüsts mit den in ihnen enthaltenen Stoffen verbraucht werden. Allerdings wird den unter 2b aufgeführten stickstoffhaltigen Bestandtheilen (welche nicht zur Eiweissgruppe gehören) ein eigentlicher Nährwerth zur Zeit nicht zugeschrieben. Dagegen gelten sie als wichtige, anregende Stoffe, etwa dem Coffein vergleichbar. Ueber diejenigen Stoffe, welche den Geruch und Geschmack des zubereiteten Fleisches bedingen, ist so gut wie nichts bekannt. Zur menschlichen Nahrung dient vorzugsweise das Fleisch der Pflanzenfresser, da dasjenige der Fleischfresser, von einigen Ausnahmen abgesehen, dem menschlichen Geschmacke nicht zusagt.

Das äussere Aussehen des Fleisches ist vorwiegend abhängig von der Gattung, aber auch vom Alter des Thieres. Rindfleisch ist von rother, ins Braunkliche spielender Farbe, doch wechselt diese mit dem Alter der Thiere. Junge Rinder von $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Jahren haben blassrothes, Ochsen von $\frac{1}{2}$ —5 Jahren hellrothes bis ziegelrothes Fleisch. Kalbfleisch ist blassroth bis graurothlich. Hammel-, Schaf-, Schöpfenfleisch wechseln in der Farbe je nach dem Alter der Thiere zwischen hellziegelroth und dunkelbraunroth. Schweinefleisch ist blassroth, rosaroth, auch grauroth. Doch bemerkt man an dem nämlichen Fleischstück heller oder dunkler gefarbte Parthien. Pferdefleisch erscheint dunkelroth bis braunroth. Wildpret hat in der Regel dunkle, braunrothe Färbung, die theils durch den Mangel an eingelagertem Fett, theils dadurch bedingt wird, dass die erlegten Thiere mehr wie die gewerbegerecht geschlachteten Hausthiere genügend ausgeblutet haben.

Jedes Fleisch, welches der Luft ausgesetzt wird, nimmt an den äusseren Parthien gesättigtere rothe Färbung an, während frische Schnittflächen mehr violettroth aussehen. Dies kommt daher, dass der mit der Luft in Berührung stehende Fleischfarbstoff der äusseren Flächen sich in Oxyhaemoglobin verwandelt, während in den inneren Parthien der Fleischfarbstoff mehr zu Haemoglobin reducirt wird.

Ueber den Nährwerth der wichtigsten Fleischsorten machen wir die nachstehenden Angaben, in denen lediglich die Nährwerth Elemente ohne Berücksichtigung ihrer näheren Bestandtheile aufgeführt sind.

Zusammensetzung der wichtigsten Nahrungsmittel
(nach KONTA)

	Wasser	Stoff- substanz	Fett	N freie Ex- traktstoffe	Asche	Nährstoff- gehalt (N-frei) wie 1	1 kg enthält Nährwert- einheiten	1 kg kostet Pfg (zu demselb.)	Für 1 Mk. erhält man Nährwert- einheiten
	Procent								
Ochse, Fleisch sehr fett	55,42	17,19	26,38	—	1,08	2,6	1651	168	988
" " mittelfett	72,25	20,91	5,18	0,48	1,17	0,5	1206	163	740
" " mager	76,71	20,78	1,50	—	1,18	0,1	1084	175	619
Kuh, Fleisch mager	75,35	20,54	1,78	0,01	1,32	0,2	1081	162	667
Kalb, Fleisch fett	72,31	18,88	7,41	0,07	1,33	0,7	1167	160	729
" " mager	78,84	19,84	0,82	—	(0,50)	0,1	1017	165	616
Lamm, Fleisch sehr fett	47,91	14,80	26,39	0,05	0,85	4,3	1836	152	1208
" " halbfett	75,99	17,11	5,77	—	1,33	1,6	1029	144	714
Schwein, " fett	47,40	14,54	37,34	—	0,72	4,5	1847	154	1200
" " mager	72,57	20,25	6,81	—	1,10	0,6	1217	188	882
Pferd	74,27	21,71	2,55	0,46	1,01	0,2	1167	80	1945
Blut	80,82	18,12	0,18	0,08	0,85	0,0	912	—	—
Lachs oder Salm	74,36	15,01	6,42	2,85	1,36	0,9	972	400	243
Flussaal	57,42	12,83	28,37	0,53	0,85	3,9	1498	—	—
Hering (frisch)	80,71	10,11	7,11	—	2,07	1,2	719	—	—
Schellfisch	80,97	17,09	0,34	—	1,64	0,0	865	75	1153
Karpfen	76,97	20,61	1,09	—	1,33	0,1	1036	—	—
Austern	39,69	4,95	0,37	2,62	2,37	0,7	285	2000	14
Hering (eingesalzen)	46,23	18,90	16,89	1,57	16,41	1,6	1467	105	1400
Sardellen	51,77	22,80	2,21	0,45	38,27	0,2	1181	400	295
Stockfisch	16,16	72,91	0,78	2,63	1,52	0,0	3995	180	3078
Bücklinge (geräuch Hering)	69,49	21,12	8,51	—	1,24	0,7	1811	170	771
Sprotten (Kieler)	59,89	22,78	15,94	0,98	0,46	1,3	1625	840	478
Hase	74,16	23,34	1,13	0,19	1,18	0,1	1208	240	501
Haushuhn, Fleisch mager	76,22	19,71	1,42	1,27	1,37	0,2	1041	—	—
Hühnerer	73,67	12,55	12,11	0,55	1,12	1,7	996	160	586
Hühnereweiss	85,75	12,67	0,25	(0,74)	0,59	0,6	648	—	—
Hühnergelb	50,82	16,24	31,75	0,12	1,09	3,4	1766	—	—
Frauenmilch	87,02	2,36	3,94	8,23	0,45	5,6	299	—	—
Kuhmilch	87,42	3,41	3,65	4,81	0,71	3,4	328	16	2050
Rahm	65,51	3,61	26,75	3,52	0,61	13,9	1018	—	—
Butter (Markt-)	14,49	0,71	88,27	9,58	0,95	205,9	2539	230	1104
Käse, Rahm- (d h überfetter)	38,01	16,28	41,22	1,90	2,59	45,5	2070	300	690
" Fett-	39,09	25,09	29,05	2,22	4,55	2,1	2148	190	1131
" Mager-	43,87	34,99	11,37	5,40	4,37	0,7	2145	105	2042
Abgerahmte Milch	90,66	3,11	0,74	4,75	0,74	2,3	222	9	2502
Buttermilch	90,27	4,06	0,93	4,07	0,67	1,4	272	—	—
Gerelatwurst	37,37	17,65	39,76	—	5,44	3,9	2075	370	581
Blutwurst	56,92	10,87	10,17	20,32	1,72	8,6	1052	160	657
Leberwurst	47,80	12,89	25,10	12,00	2,21	4,4	1518	130	1168

Wie aus der obigen Zusammenstellung ersichtlich ist, ist der Nährwerth des Fleisches bei dem nämlichen Thiere auch abhängig von den Körpertheilen, denen das Fleisch entnommen wurde. Ausserdem wechselt er mit der Raasse, welcher das Thier angehörte, und wird überdies bedingt durch den Gesundheitszustand und durch das Futter. Zweckmässig gemastetes Vieh giebt Fleisch von grösserem Nährwerth als solches, welches in knappem Futter steht. Vieh, welches reichliche Körnernaehrung erhält, giebt ein Fleisch von grösserem Nährwerth als solches, welches stark wässrige Nahrung, z. B. Rubenschnittel oder Schlempe erhält.

Zubereitung. Nur ein geringer Theil des Fleisches wird im rohen Zustande verzehrt, der weitaus grössere Theil wird im zubereiteten Zustande genossen. Das Kochen des Fleisches kann verschiedene Zwecke verfolgen. a) Um eine gute Fleischbrühe zu erhalten setzt man das in kleine Stücke zertheilte Fleisch mit kaltem Wasser an, erhitzt es langsam zum Sieden und erhält es einige Zeit darin. Das in dieser Weise gekochte Fleisch

stellt im wesentlichen geronnenes Eiweiss dar, das indessen seiner Riech- und Schmeckstoffe (auch Salze) fast völlig beraubt ist. b) Um ein saftiges Stück gekochtes Fleisch zu erhalten, bringt man grössere Fleischstücke sofort in siedendes Wasser, so dass an den äusseren Flächen die Eiweissstoffe gerinnen und den Austritt des Fleischsaftes in das Wasser verhindern. Hält man das Fleisch etwa 8 Minuten in siedendem Wasser, so dass die Temperatur im Innern des Fleisches 70–80° C erreicht, so ist das Fleisch auch gar. Man muss alsdann die Temperatur des Kochtopfes + Inhalt durch Zugiessen von kaltem Wasser oder durch Entfernen vom Feuer auf 70–80° C herabmassigen. Lässt man das Fleisch nämlich über die genannte Zeit hinaus in siedendem Wasser, so schrumpft es ein und wird wieder zähe. Es kann allerdings durch fortgesetztes weiteres Kochen wieder erweicht werden, erlangt aber niemals wieder den vorher bereits gehabtten guten Zustand.

Das Braten des Fleisches. Hierbei wird das Fleisch ohne Wasser aber in Fett erhitzt. Es bildet sich an den äusseren Parthien ein Ueberzug von geronnenem Eiweiss, welcher den Austritt des Fleischsaftes hindert. Ueber die Dauer des Bratens gilt das Nämliche wie beim Kochen Gesagte. — Das Pökeln besteht darin, dass die Fleischstücke mit Salz eingegeben und in Fässer oder Bottiche geschichtet werden. Sehr häufig macht man dem Salze auch Zusätze von Salpeter oder Zucker. Die Rothe des Fleisches verschwindet zunächst, später erfolgt wiederum das Auftreten einer rothen Färbung „Salzungsrothe“, wenn genügend lange gepökelt wurde. Ungenügend lange gepökelt Fleisch ist im Innern grau. Beim Kochen behält das gepökelte Fleisch seine rothe Farbe, während nicht gepökelt Fleisch grau wird. — Der Raucherung wird in unseren Gegenden nur gepökelt Fleisch unterzogen. Dieselbe erfolgt in besonderen Raucherkammern durch Einwirkung des Rauches von Holz. Das Fleisch giebt dabei einen Theil seines Wassergehaltes ab und nimmt brenzliche Bestandtheile des Holzrauches (Kreosot etc.) auf, welche konservirend wirken. Die jetzt übliche Schnellraucherung, welche im Bestreichen der Fleischstücke mit rohem Holzeisig besteht, kann die gewerbegerechte Raucherung nicht ersetzen.

Untersuchung des Fleisches. Mit Rücksicht auf die vielen Fragen, welche sich bei der Untersuchung des Fleisches aufwerfen, ist es nothwendig, dass der Sachverständige darüber klar ist, welche Fragen in seine Kompetenz fallen. Er muss wissen, welche Fragen überhaupt nicht mit Sicherheit beantwortet werden können, welche in den Wirkungskreis des Veterinär-Arztcs fallen, und wo der chemische Sachverständige einzutreten hat.

1) **Abstammung des Fleisches.** Die Frage, welcher Thiergattung ein gegebenes Fleisch entstammt, ist namentlich wenn es sich um schon zubereitetes Fleisch handelt, häufig überhaupt nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Die mikroskopische Untersuchung der Fleischfasern lässt bei dem gleichen anatomischen Bau derselben meist im Stich. Dagegen ist bisweilen aus dem Bau der Knochen ein Urtheil möglich. Diese Art der Untersuchung würde dem Veterinärarzte zufallen. Ferner ist es möglich, durch den Nachweis bestimmter eigenartiger Bestandtheile bestimmte Fleischarten nachzuweisen, z. B. durch den Nachweis des Glykogens den Nachweis von Pferdefleisch zu führen. Endlich ist es häufig möglich, durch die nähere Untersuchung des Fettes bestimmte Fragen zu beantworten, doch muss alsdann das Fett in unvermishtem Zustande vorliegen. In Mischungen mit anderen Fetten schrumpft diese Möglichkeit in der Regel sehr zusammen.

2) **Genussfähigkeit des Fleisches.** Unmittelbar nach dem Schlachten ist die Reaktion des Muskelfleisches amphoter bez. schwach alkalisch. Später tritt deutlich saure Reaktion auf. Damit das Fleisch zum Genuss geeignet wird, muss das Schlachtthier gehörig ausbluten, ferner muss das Fleisch etwa 24 Stunden an einem kühlen Orte aufgehängt werden (Abhängen), damit es „reif“ oder „mürbe“ wird. Demgemäss ist genussfähiges Fleisch von saurer Reaktion, ferner zeigt es an den äusseren Flächen keine schmierige Beschaffenheit, während es wohl vorkommen kann, dass diese Flächen etwas trocken aus sehen. — Betastet man die äusseren Flächen mit den Fingern, so bleiben Fingereindrücke nicht bestehen. Sollte dies der Fall sein, so ist dies ein verdächtiges Zeichen.

Ist das Fleisch über eine gewisse Zeit hinaus oder unter ungünstigen Verhältnissen aufbewahrt worden, so können Zersetzungen eintreten

A. Faulige Zersetzung Das Fleisch nimmt widerlichen Fäulnisgeruch an, die Reaktion wird neutral bis alkalisch. Unter den Zersetzungsprodukten ist freies Ammoniak nachzuweisen. Nach ESER ist das Vorhandensein von freiem Ammoniak ein sicheres Anzeichen von Fäulnis. Der Nachweis geschieht in folgender Weise

Reagens für die Salmiak Fäulnisprobe 1 Th Salzsäure (von 25 Proc), 3 Th. Al Lohol (von 96 Proc), 1 Th Aether werden gemischt

Man bringt in eins der hier gezeichneten Probegläser soviel von dem Reagens, dass der Boden des Gefässes etwa 1 cm hoch bedeckt ist. Man verschliesst alsdann das Glas mit dem soliden Gummistopfen a (Nr I) und dreht es, indem man es in einem Winkel von 45° neigt, so, dass die Wandungen etwa 1 cm hoch über dem Flüssigkeitsspiegel benetzt werden. — Dann bringt man von dem Objekte eine kleine abgeschabte Probe an den Glasstab bei d (Nr II), nimmt den soliden Stopfen a vorsichtig ab und verschliesst nunmehr das Glas mit dem den Glasstab + Fleischobjekt tragenden Stopfen b, so dass das Ende des Stabes etwa 1—2 cm vom Flüssigkeitsspiegel entfernt bleibt. Bei Gegenwart von freiem Ammoniak treten weisse, graue, bis rauchblaue Nebel auf. — Hat man sich so durch mindestens 5—6 Proben von der Beschaffenheit der Fleischoberfläche überzeugt, so entfernt man die obere Schicht, führt einen Schnitt in das Innere des Fleischstückes und entnimmt dort weitere Proben zur Untersuchung auf Reaktion und Ammoniak mit der Vorsicht, dass nichts von der Oberfläche an die Partikel aus der Tiefe gelangt. Die Probe leistet in vielen Fällen gute Dienste




Fig 162

Die Hauptprobe besteht aber darin, dass man das Fleisch, bez einen Theil desselben kuchenmassig zu bereiten lässt und nun feststellt, ob es geniessbar ist oder nicht. Dabei ist eine geringe Veränderung der Aussenflächen, welche sich noch leicht beseitigen lässt, namentlich in der warmen Jahreszeit, zu vernachlässigen.

B Saure Gährung Diese schliesst sich in kühle hydratreichen Organen, z B der Leber, an die normale saure Gährung des Fleisches an, wenn genügend Wasser vorhanden ist. Ihre Ursachen sind unbekannt. Sie erreicht in grossen Fleischstücken zuweilen einen hohen Grad. Blaues Lackmuspapier wird ziegelroth gefärbt. Freies Ammoniak tritt nicht auf, ebenso nicht Schwefelwasserstoff. Der Geruch ist angenehm säuerlich. Die als „nicht stinkende saure Gährung“ bezeichnete Veränderung macht Fleisch noch nicht untauglich zum Genuss.

C Stinkende saure Gährung Diese verläuft u A in der Muskulatur von Wild, welches lebend warm in grossen Massen verladen ist. Die stinkenden Produkte enthalten viel Schwefelwasserstoff, der Muskelfarbstoff nimmt an frischen Schnittflächen graugrün bis laubgrünen Ton an. Das Unterhautzellgewebe (subcutis) ist grün verfärbt durch Bildung von Sulfhämoglobin (s Sanguis), die Cutis mürbe, so dass sich die Haare büschelweis ausrupfen lassen (bei Geflügel desgl die Federn). Händler nennen Wild in dieser Form der Zersetzung „verhitzt“.

Die Reaktion des Fleisches ist stark sauer, es ist ekelhafter Geruch vorhanden. Schwefelwasserstoff lässt sich nachweisen. Fleisch in diesem Stadium der Zersetzung ist verdorben.

Zur Prüfung auf Schwefelwasserstoff bringt man das zu prüfende Fleisch bez einen Theil desselben in ein Becherglas oder eine flache Glasdose und bedeckt die Öffnung mit einem Stück Filtrirpapier, an dessen unterer Fläche ein Tropfen Bleessig aufgetragen ist. Man beobachtet von 5 zu 5 Minuten durch Unterhalten eines Spiegels. Ist nach 15 Minuten deutliche Bildung von Schwefelblei wahrnehmbar, so ist Schwefelwasserstoff in reichlicher Menge anwesend.

D Stinkende Fäulnis Erreicht die Zersetzung durch Fäulnis einen so hohen Betrag, dass das Fleisch Gestank auf grössere Entfernung verbreitet, z B ein ganzes Zimmer sogleich verpestet, so bedarf es eigentlich keiner weiteren Untersuchung. Doch muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass selbst unter diesen Umständen freier Schwefelwasserstoff zwar vorhanden sein, aber auch fehlen kann.

Nachweis von Pferdefleisch. Pferdefleisch ist von dunkelrothbrauner Farbe, das dabei befindliche Fett ist ziemlich stark gelb gefärbt.

A. Nach BRAUTIGAM und EDELMANN. 50 g Fleisch werden möglichst zerkleinert und mit 200 ccm Wasser eine Stunde lang gekocht. Die so erhaltene Fleischbrühe wird nach dem Filtriren und Erkalten in der später anzugebenden Weise mit Jodwasser geprüft. Tritt die später anzugebende Reaction nicht oder unsicher ein, so erhitzt man das schon extrahirte Fleisch oder eine neue Fleischprobe von 50 g mit einer Lösung von 1,5 g Aetzkali in 200 ccm Wasser im Wasserbade bis zum Zerfall der Muskelfasern.

Man coürt, engt die Kolatur im Wasserbade auf 100 ccm ein, säuert nach völligem Erkalten (1) mit 10 procent Salpetersäure an, filtrirt und schichtet über das Filtrat in einem Reagirglase vorsichtig Jodwasser¹⁾. Bei Gegenwart von Pferdefleisch tritt an der Berührungsstelle beider Flüssigkeiten ein burgunderrother Ring auf.

Die Reaction beruht auf dem Nachweis des Glykogens. Sie kann indessen nur als orientirende Probe gelten. Denn einerseits kann unter Umständen das Glykogen im Pferdefleisch bereits zersetzt sein, andererseits kommt Glykogen vor in den Feten von Rindern, Schafen und Kaninchen.

B. Nach HASTEBLICK. 200–300 g feingehacktes Fleisch wird getrocknet und mit Petroläther extrahirt. Man bestimmt die Jodzahl des nach dem Trocknen hinterbleibenden Fettes. Diese ist bei Rindfleisch 49,7–53,5, bei Pferdefleisch 79–85,6. Setzen an einem Fleischstück Fetttheile an, so extrahirt man natürlich diese.

Das Verfahren ist zur reinen Untersuchung von Rindfleisch oder Schweinefleisch und Pferdefleisch zu empfehlen, kann aber im Stiche lassen, sobald Gemische vorliegen.

Nachweis von Konservierungsmitteln. a) Salicylsäure. Man digerirt etwa 20–50 g des zerkleinerten Fleisches mit 50 procent Alkohol, versetzt das Filtrat mit etwas Kalkmilch und verjagt im Wasserbade den Alkohol. Man schüttelt den wasserigen Rückstand, zunächst 1–2 mal mit Aether aus, dann säuert man ihn mit verdünnter Schwefelsäure an und schüttelt neuerdings mit Aether aus. Dieser letztere Auszug hinterlässt beim Verdunsten die vorhandene Salicylsäure, die nach S. 100 zu prüfen ist.

b) Salpeter, Borax, Borsäure. Man entfettet 20–50 g des zu prüfenden Fleisches mit Aether oder Petroläther und kocht alsdann hinreichend lange mit Wasser. In dem Filtrat weist man die angegebenen Konservierungsmittel wie folgt nach.

1. Einige Tropfen des Filtrates werden zu einer Lösung von Diphenylamin in concentrirter Schwefelsäure gebracht. Blaufärbung zeigt Salpeter an.

2. Man macht einen aliquoten Theil, z. B. 50 ccm, des Auszuges mit Natriumcarbonat deutlich alkalisch, dampft zur Trockne und verascht. Die Asche wird in wenig Salzsäure gelöst, mit dieser Lösung befeuchtet man einen Streifen Kurkumapapier, welchen man bei 100°C trocknet. Entsteht auf den befeuchteten Stellen braunrothe Färbung, welche durch Betupfen mit Ammoniak in Blauschwarz übergeht, so ist Borsäure oder Borax zugegen.

c) Schweflige Säure. Man zieht 10–20 g Fleisch mit Wasser aus. Der mit Schwefelsäure angesäuerte Auszug wird mit metallischem Zink versetzt. Färbt der entwickelte Wasserstoff ein mit Bleiessig befeuchtetes Papier dunkel, so ist schweflige Säure zugegen. Ist die vorhandene Menge schwefliger Säure einigermaßen erheblich, so hat das Fleisch eine scharlachrothe Färbung, auch ist die schweflige Säure in dem durch Phosphorsäure angesäuerten wässrigen Auszuge schon am Geruche zu erkennen.

Zur Bestimmung der schwefligen Säure destillirt man 50–100 g Fleisch unter Zusatz von Phosphorsäure im Kohlensäure-Strom. Das Destillat wird (am besten mittels Pélignot-Rohres) in Jod-Jodkalium-Lösung aufgefangen. Diese Lösung wird nach beendigter Destillation mit Salzsäure versetzt, zum Sieden erhitzt und mit Baryumchlorid gefällt. $\text{BaSO}_4 \times 0,2747 = \text{SO}_2$.

¹⁾ Jodwasser. Feingeriebene Jod wird mit Wasser angerieben, die Mischung erwärmt und nach dem Erkalten filtrirt.

d) Formaldehyd. Man zieht 50 g Fleisch mit 150 ccm Wasser aus - Von dem Auszuge destillirt man 40 ccm ab 10 ccm des Destillates werden mit 2 Tropfen ammoniakalischer Silberlösung (s S 379) versetzt Eine nach mehrstündigem Stehen im Dunkeln entstandene dunkle Färbung zeigt Formaldehyd an (Vergl auch Formaldehydum)

Werthbestimmung. Für die Probenahme ist zu beachten, dass das Objekt, am besten in einer Fleischhackmaschine möglichst zerkleinert und in eine vollkommen gleichmässige Masse verwandelt wird Die für jede einzelne Bestimmung zu verwendende Substanzmenge ist so abzuwägen, dass Wasserverlust möglichst vermieden wird

1) Wasser 5 g Substanz werden zunächst im Dampftrockenschranke, später bei 105°C bis zum konstanten Gewicht getrocknet In gewissen Fällen kann es sich empfehlen, eine grössere Menge vorerst im Dampftrockenschranke so lange einzutrocknen, bis die Substanz lufttrocken geworden ist Man lässt sie alsdann zum Ausgleich der Feuchtigkeit etwa 2 Stunden an der Luft liegen, stellt den Gewichtsverlust fest, pulvert, mischt und führt in einer Substanzmenge von 5 g die Trockenbestimmung bei 105°C zu Ende. Das Ergebniss der zweiten Trocknung ist auf die Gesamtmenge zu berechnen

2) Mineralstoffe Der getrocknete Rückstand sub 1, welcher einer bekannten Substanzmenge entspricht, wird in einer Platinschale bei mässiger Hitze verascht Wenn die Veraschung nicht mehr weiter fortschreitet, so lässt man erkalten, zieht die Kohle mit Wasser aus, filtrirt durch ein aschefreies Filter und wäscht aus Dann bringt man Filter und Kohle in die Platinschale zurück, trocknet und verascht in massiger Hitze Wenn die Asche weissgebrannt ist, lässt man erkalten, dann bringt man das vorher erhaltene Filtrat hinzu, dampft zur Trockne und erhitzt den Salzlückstand in massiger Hitze bis zum gleichbleibenden Gewichte Man vermeide zu starke Hitze, da sonst leicht Kalisalze verflüchtigt werden

3) Fett 10—80 g Fleisch werden getrocknet, darauf im Soxhlet'schen Extraktions Apparat mit wasserfreiem Aether extrahirt Nach 2—3 Stunden unterbricht man die Extraktion, verreibt den Rückstand mit Seesand und setzt die Extraktion bis zur völligen Erschöpfung fort Die ätherische Extraktionsflüssigkeit wird filtrirt, worauf man die Menge des erhaltenen Fettes in bekannter Weise feststellt.

4) Eiweiss Die Bestimmung des Eiweisses erfolgt durch die Bestimmung des Stickstoffes nach KJELDAHL 0,5 g des luftgetrocknenen Durchschnittsmusters (s sub 1) werden mit 20 ccm konc Schwefelsäure sowie 1 Tropfen Quecksilber im KJELDAHL-Kolben wie üblich verbrannt (s Nitrogenium) Durch die Multiplikation der gefundenen Stickstoffmenge mit 6,25 erhält man die Menge der vorhandenen Eiweisssubstanz (des Proteins) Da man jedoch bei der Addition der so gefundenen Zahl zu den übrigen Bestandtheilen des Fleisches meist eine die Zahl 100 übersteigende Summe erhält, so empfiehlt es sich, unter Vernachlässigung des durchweg geringen Gehaltes an stickstofffreien Extractstoffen, die Differenz der Summe von Wasser und Fett und Mineralstoffen von 100 als Stickstoffsubstanz (Protein) und den direkt gefundenen Stickstoff als solchen anzugehen

5) Extraktivstoffe, Bindegewebe, Muskelfaser

a) Extraktivstoffe 50 g vom Fett möglichst befreites, zerkleinertes Fleisch werden wiederholt mit kaltem Wasser extrahirt, worauf man das Filtrat auf 1000 ccm anfüllt

In aliquoten Theilen dieses Filtrates bestimmt man

α) die gesammte Menge der Extraktivstoffe durch Eindampfen und Trocknen bei 105°C bis zu gleichbleibendem Gewicht,

β) die Mineralstoffe durch Eindampfen des Rückstandes von α, wobei auf 2 dieses Abschnittes Rücksicht zu nehmen ist,

γ) den Gesamtstickstoff, indem man einen aliquoten Theil im Kjeldahl-Kolben eindunstet und dann wie unter 4 die Stickstoffbestimmung nach KJELDAHL ausführt,

δ) Eiweisstickstoff Man kocht eine aliquote Menge des obigen Filtrates einige Zeit, filtrirt das abgeschiedene Eiweiss durch ein getrocknetes und gewogenes, aschefreies Filter wäscht mit Wasser aus, trocknet, wägt und verbrennt schliesslich Filter und Niederschlag nach KJELDAHL $N \times 6,25 = \text{Protein}$,

a) Nicht Eiweisstickstoff Die Menge desselben ergibt sich aus der Differenz von Gesammtstickstoff minus Eiweisstickstoff

b) Bindegewebe Der beim Ausziehen mit kaltem Wasser (sub a) erhaltene Rückstand wird wiederholt längere Zeit mit Wasser gekocht Die Auszüge werden auf 1000 cem gebracht und filtrirt Man bestimmt alsdann in aliquoten Theilen den Gesammt-rückstand wie unter 5aa und den Gesammtstickstoff wie unter 4 und 5ay

Unter der Annahme von 18 Proc Stickstoff im Bindegewebe berechnet man die Menge des letzteren durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffes mit 5,55

c) Muskelfaser Die als Rückstand der Auskochung unter b erhaltene Muskelfaser wird auf gewogenem Filter gesammelt, zur Entfernung des Wassers mit warmem Alkohol und darauf zur Entfernung des Fettes mit Aether extrahirt, getrocknet und nach dem Wägen verascht Trockenrückstand minus Asche ergibt die Menge der Muskelfaser

Nachweis fremder Farbstoffe in Fleisch und Wurst Fleisch und Wurst werden, um ihnen den Anschein einer besseren Beschaffenheit zu geben, häufig mit rothen Farbstoffen, namentlich Cochenille, Karmin oder Theerfarbstoffen nachgefarbt Der exakte Nachweis ist, wenn nur kleine Mengen Farbstoffe angewendet werden, häufig nicht möglich, weil die animalische Faser die meisten Farbstoffe sehr festhält

Nachweis und Bestimmung des Fuchsin nach FLECK Die zu untersuchende Fleischwaare wird hinreichend zerkleinert und so lange mit Amylalkohol digerirt, als letzterer noch gefärbt abläuft Die filtrirten Auszüge werden bis auf $\frac{1}{10}$ ihres Volumens abdestillirt, der Destillationsrückstand im Wasserbade zur Verflüchtigung des Amylalkohols eingedampft und der fettige Rückstand in Petroläther gelöst Die erhaltene rothbraune Lösung wird mit absolutem Alkohol unter Zusatz einiger Tropfen verdünnter Schwefelsäure (1 + 4) geschüttelt Hierbei scheidet sich der Petroläther mit dem Fett über die alkoholische Fuchsinlösung Letztere wird so oft (4—5 mal) mit Petroläther ausgeschüttelt, bis dieser keinen Rückstand von gelöstem Fett mehr hinterlässt, sodann im Scheidetrichter vorsichtig abgezogen und mit überschüssiger Ammoniaklösung versetzt Das sich abscheidende Ammoniumsulfat wird durch Filtration der Flüssigkeit entfernt und das entfärbte oder schwach gelblich gefärbte Filtrat in einer tarirten Platin- oder Glasschale zur Trockne verdunstet Nach FLECK sollen so 80—85 Proc des tatsächlich angewendeten Fuchsin wiedergefunden werden

Nachweis von Theerfarbstoffen überhaupt Die zerkleinerte Substanz wird mit Aethyl- oder Amylalkohol ausgezogen Ist die Lösung deutlich roth gefärbt, so ist Farbstoff verwendet worden Die filtrirte Lösung versetzt man mit 10 cem einer 10proc Kalumbisulfalösung und kocht längere Zeit einen Wollfaden darin, färbt sich dieser roth, so ist die Anwesenheit eines Theerfarbstoffes erwiesen

Nachweis von Karmin (Cochenillefarbstoff) Dieser sehr häufig dem Fleische zugesetzte Farbstoff wird dem Fleische durch Digeriren mit Ammoniak entzogen und aus dieser Lösung durch Alaunlösung als rothgefärbter Lack niedergeschlagen

Nach H BREMER lässt sich das Karmin nicht immer durch Alkohol oder Amylalkohol oder Alkohol + Glycerin ausziehen Wohl aber gelingt die Ueberführung in Lösung durch eine schwach angesäuerte Mischung von gleichen Theilen Glycerin und Wasser Die gelbgefärbte Lösung wird auf Zusatz von Ammoniak wieder karmoisinroth Nach vorherigem Zusatz von Alaun lässt sich aus der Lösung das Karmin fallen

Bestimmte Anweisungen lassen sich für den Nachweis von Farbstoffen schon deswegen nicht geben, weil jedes Jahr neue Farbstoffe für Fleisch und Wurst in Verkehr kommen Man ist genöthigt, die verschiedensten Lösungsmittel mit und ohne Zusatz von Alkalien oder Säuren zu versuchen Von Wichtigkeit ist es jedoch, dass man die schliesslich erhaltene Farblösung vor dem Spektroskop prüft und feststellt, ob sie nicht etwa doch das Spektrum des Blutfarbstoffes giebt

Veterinärärztliche Untersuchung. Die Untersuchung des Fleisches auf Trichinen, Finnen, Echinococcen, Leberegel, Tuberkulose, ferner die Beurtheilung von verendeten Thieren oder solchen, die an einer Infektions-Krankheit gelitten haben, gehört in das Gebiet der regelmässigen und durch Thierärzte ausgeübten Fleischnau

Die Untersuchung des Fleisches von Thieren, welche an Milzbrand, Wuth, Rotz, Maul- und Klauenseuche, Eiter- und Jauchevergiftung gelitten haben, ist ebenfalls Aufgabe des Thierarztes, oder vielmehr eines speciell bakteriologisch vorgebildeten Sachverständigen

Fleisch- und Wurstgift Es steht fest, dass durch bakterielle Zersetzung im Fleische und in Fleischwaaren giftige Stoffe auftreten, welche zu den Ptomainen, d. h. Fäulnisbasen zu rechnen sind. Die näheren Bedingungen, unter denen diese Produkte auftreten, sind noch nicht näher bekannt, doch nimmt man an, dass besonders leicht wasserreiche Würste dieser Zersetzung unterliegen. Nach VAN ERMINGEM wird die Zersetzung verursacht durch einen Mikroorganismus, den *Bacillus botulinus*. — Die chemische Untersuchung bietet zur Zeit keine Aussicht, den Giftstoff zu isoliren, demnach wurde die Untersuchung eines solchen giftigen Nahrungsmittels in den Wirkungskreis des Bakteriologen fallen.

Leuchtendes Fleisch Frisches Fleisch nimmt während der Aufbewahrung bisweilen die Eigenschaft an, im Dunklen zu leuchten (phosphoresciren). Diese Erscheinung wird durch die Thätigkeit verschiedener Mikroorganismen verursacht. Eine gesundheitsschädigende Einwirkung solchen Fleisches ist bisher nicht beobachtet worden.

Bestimmung der Starke in Wurstwaaren. Nach J. MAYRHOFER werden 10–20 g Wurst je nachdem die Jodreaktion grossere oder kleinere Starkemengen anzeigt, mit 50 ccm 8 procentiger alkoholischer Kalilauge übergossen, das Gefäss mit einem Uhrglase bedeckt auf ein kochendes Wasserbad gestellt. Nach Auflösung verdünnt man mit heissem 50 procentigen Alkohol, lässt absetzen und filtrirt durch ein starkefreies Filter, wascht etwa 2mal mit heisser alkoholischer Kalilauge und schliesslich mit Alkohol nach, bis das Filtrat auf Zusatz von Saure nicht mehr getrübt wird. Das einen Theil des ungelösten Rückstandes der Wurstmasse enthaltende Filter giebt man in das ursprünglich zum Lösen angewandte Gefäss zurück und erwärmt mit 60 ccm wässriger Kalilauge auf dem Wasserbade $\frac{1}{2}$ Stunde. Nach dem Erkalten säuert man mit Essigsäure an, bringt das Volumen der Lösung auf 100 ccm, filtrirt und fällt in einem aliquoten Theile der Lösung die Starke mit Alkohol aus. Der durch Alkoholzusatz entstandene Niederschlag wird auf einem gewogenen Filter gesammelt und mit 50 procentigem Alkohol so lange gewaschen, bis das Filtrat beim Verdampfen auf einem Uhrglas keinen Rückstand mehr hinterlässt. Man verdrängt schliesslich den verdünnten Alkohol mit absolutem und diesen mit Aether, trocknet bei 100° C bis zum konstanten Gewicht und wägt. Die Ausfällung der Starke ist voll kommen, wenn man zur wässrigen Lösung eine gleiche Menge 95 procentigen Alkohols zugeibt.

Extractum carnis (Erganzb.) **Fleischextract.** — **Extrait de boeuf.** — **Extract of meat.**

Mit dem Namen Fleischextract bezeichnet man Präparate, welche erhalten werden, indem man möglichst fettfreies Fleisch mit Wasser auszieht. Die wässrigen Auszüge werden zur Abscheidung von coagulbarem Eiweiss erhitzt, dann von diesem und etwa noch vorhandenem Fett durch Filtration befreit und nunmehr durch Verdampfen in die Form dicker Extrakte gebracht, zum Theil auch in mehr flüssiger Form in den Handel gebracht. — Die grössten Mengen Fleischextract werden nach dem LIEBIG'schen Verfahren von der Liebig-Compagnie zu Fray Bentos (Uruguay) und der Compagnie Kemmerich zu St. Elena (Argentinien) aus Rindfleisch dargestellt. Neben diesen beiden renommirtesten Fabriken bestehen zur Zeit in Amerika und Australien noch verschiedene andere, ausserdem ist zu bemerken, dass auch, namentlich in Australien, nicht unbedeutliche Mengen Fleischextract aus Hammelfleisch dargestellt werden.

Darstellung. Rindfleisch, welches von Knochen, Sehnen und Fett sorgfältig befreit ist, wird zu einem feinen Fleischbrei zerkleinert, worauf dieser unter Heizung mit Dampf bei einer bestimmten Temperatur mit Wasser ausgezogen wird. Die so erhaltene Fleischbrühe wird abgezogen, von dem auf ihr schwimmenden Fett getrennt, zur Abscheidung coagulbaren Eiweisses kräftig gekocht, durch Filterpressen filtrirt, worauf das Filtrat — am besten im Vacuum — auf die gewünschte Konsistenz eingedampft wird. 100 Kilo Fleisch ergeben etwa 8 Kilo dickes Fleischextract.

Eigenschaften. Ein braunes dickes Extract, von angenehmem, fleischartigem Geruch und Geschmack. In Wasser löst es sich zu einer klaren Flüssigkeit, die nach Zusatz von etwas Kochsalz den Geschmack von Rindfleischbrühe zeigt.

Die wichtigsten Bestandtheile des Fleischextraktes sind ausser Wasser 1. Stickstoffhaltige Substanzen, und zwar vorwiegend die Fleischbasen Kreatin $C_4H_7N_3O_2 + H_2O$, Kreatinin $C_4H_7N_3O_2$, Xanthin $C_5H_4N_4O_2$, Sarkin (Hypoxanthin) $C_5H_4N_4O$, Carnin $C_7H_8N_4O_2 + H_2O$ etc., neben welchen grossere oder geringere Mengen löslicher Eiweisskörper (Albumosen) und geringe Mengen von Ammoniumsalzen vorkommen, ferner Phosphorfleischsaure

2. Stickstofffreie Extraktstoffe, unter ihnen vorwiegend Milchsäure und Glykogen — 3. Mineralstoffe, welche der Hauptsache nach aus Phosphaten und Chloriden der Alkalien bestehen

Die Eiweissstoffe des Fleischextraktes besitzen allerdings einen gewissen Nährwerth, indessen kommt derselbe für die Verwendung des Fleischextraktes wohl überhaupt nicht in Betracht

Prüfung. Wirkliche Fälschungen von Fleischextrakt kommen wohl kaum vor, bei Verwendung renommirter Marken ist man vor ihnen völlig geschützt. Gelegentlich ist im Fleischextrakt Fleischpulver aufgefunden worden, den zu Suppenzwecken in den Handel gebrachten Präparaten wird häufig ein Zusatz von Gelatine (Leim) gemacht. Ueber die Untersuchung von Fleischextrakt ist in den letzten Jahren viel gearbeitet worden, gleichwohl kann man auch heute noch das von LIEBIG angegebene Untersuchungsverfahren nicht ganz entbehren

A) Nach LIEBIG

α) Mineralstoffe 1 g Fleischextrakt wird in einer Platinschale verkohlt und weiss gebrannt. Macht das Weissbrennen Schwierigkeiten, so kann es durch Auslaugen der Kohle nach S 648 befördert werden. Man erhält in der Regel 22—23 Proc Mineralstoffe, als Minimalgehalt an Mineralstoffen werden 18 Proc gefordert. Die Asche muss der Hauptsache nach aus Phosphaten und darf nur etwa zum $\frac{1}{8}$ Theil aus Natriumchlorid bestehen.

β) Wasser. Man bringt in eine Platinschale etwa 10 g gewaschenen Seesand und ein kleines Glasstäbchen, glüht gut durch und wägt nach dem Erkalten. Auf diesen Sand giebt man eine Auflösung von 2 g Fleischextrakt, welchen man in einer zweiten Schale abgewogen und mit Wasser aufgeweicht hatte. Man verrührt die Lösung mit dem Sande, dampft zunächst auf dem Wasserbade unter gelegentlichem Rühren ein und trocknet schliesslich im Wasserbadtrockenschranke (6—8 Stunden) bis zum gleichbleibendem Gewicht. Fleischextrakt soll nicht mehr als 22 Proc Wasser enthalten.

γ) Fett. Der sub β erhaltene Trockennückstand wird mit noch etwa 10 g Sand verrieben, getrocknet und mit wasserfreiem Aether extrahirt. Nach dem Verdunsten des Aethers dürfen nur Spuren von Fett (nicht mehr als 1,5 Proc) zurückbleiben.

Fleischextrakte, welche sich im Wasser klar auflösen, enthalten kein Fett, bei diesen kann daher die Fettbestimmung unterbleiben.

Alkohol-Extrakt 2,0 g Fleischextrakt werden in einem Becherglase abgewogen, in 2,0 ccm Wasser gelöst und darauf mit 50 ccm Weingeist von 98 Vol. Proc gemischt. Der sich bildende Niederschlag setzt sich für gewöhnlich fest an das Glas an, so dass man die klare Lösung in eine vorher gewogene Schale abgessen kann. Der Niederschlag wird noch 2—3 mal mit Alkohol von 80 Vol. Proc ausgezogen, man giebt diese Auszüge zu dem ersten Auszuge zu, verdunstet die Gesamtlosung und trocknet den Rückstand im Wasser-trockenschranke bis zum gleichbleibenden Gewicht. Es sollen mindestens 60 Proc in 80 procentigem Weingeist lösliche Bestandtheile erhalten werden, d. h. der Trockenrückstand aus 2 g soll mindestens 1,2 g betragen.

δ) Der Stickstoffgehalt, welcher in 0,5—1,0 g Substanz nach KJELDAHL zu bestimmen ist, soll 8,5—9,5 Proc betragen.

Davon abgesehen, soll das Fleischextrakt nur Spuren von Fett und Leim und keine durch Kochen der wässrigen Lösung coagulirbaren Eiweissstoffe enthalten.

Die vom Kaiserlichen Gesundheitsamte veranlassten „Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln“ geben folgenden modernen Untersuchungsgang für das Fleischextrakt an:

Vorbemerkungen Für die Analyse der Fleischextrakte und -Peptone empfiehlt es sich, falls die Präparate nur geringe Mengen von in kaltem Wasser unlöslichen Bestandtheilen enthalten, von festen und sirupösen Präparaten 10–20 g, von flüssigen 25–50 g in kaltem Wasser zu lösen, darauf durch ein aschefreies Filter zu filtriren und das Filtrat auf 500 ccm aufzufüllen —

Von diesem klaren Filtrate dienen aliquote Theile zur Bestimmung der einzelnen Bestandtheile. Nur für die Bestimmung des Gesamtstickstoffs, sowie der Mineralstoffe verwendet man bei festen und sirupösen Präparaten vorthellhaft auch vielfach die unveränderte Substanz. Ebenso muss man die letztere verwenden zur Bestimmung des Wassers und des Stickstoffs, falls ein Theil der Substanz in kaltem Wasser unlöslich ist.

Bestimmung des Wassers. Man trocknet in einer mit Sand etc. besackten Platinschale einen aliquoten Theil obiger Lösung, oder, falls ein Theil der Substanz in kaltem Wasser unlöslich ist, soviel von der ursprünglichen Substanz, die man in warmem Wasser gelöst hat, ein, als 1–2 g Trockenrückstand entspricht, und verfährt im übrigen nach S. 648.

Bestimmung des Gesamtstickstoffs und der einzelnen Verbindungsformen des Stickstoffs

a) **Bestimmung des Gesamtstickstoffs.** Man bestimmt in 0,5 bis höchstens 1,0 g der ursprünglichen Substanz oder in einem diesem Gewicht entsprechenden aliquoten Theil der Lösung den Stickstoff nach Kjeldahl.

b) **Stickstoff in Form von Fleischmehl oder unveränderten Eiweissstoffen und coagulirbarem Eiweiss (Albumin)**

Enthalten die Fleischpräparate in kaltem Wasser unlösliche Substanzen (Fleischmehl etc.), so löst man, wie oben unter „Vorbemerkungen“ angegeben, bei festen oder sirupösen Präparaten 10–20 g in kaltem Wasser oder verdünnt bei flüssigen Präparaten 25–50 g mit 100–200 ccm, unter Umständen auch mehr kaltem Wasser, filtrirt nach dem Absetzen des Unlöslichen durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt, wäscht mit kaltem Wasser hinreichend nach und verbrennt das Filter + Inhalt nach KJELDAHL. Die so gefundene Stickstoffmenge minus dem Stickstoffbetrage des Filters mit 6,25 multiplicirt, ergibt die Menge der vorhandenen unlöslichen Eiweissstoffe, bez. des Fleischmehls, das etwaige Vorhandensein des letzteren ist durch mikroskopische Untersuchung nachzuweisen.

Das Filtrat, oder, wenn die Substanz in kaltem Wasser vollständig löslich ist, die wässrige Lösung der Substanz wird mit Essigsäure schwach angesäuert und gekocht. Scheidet sich hierbei coagulirbares Eiweiss (Albumin) in Flocken ab, so wird dasselbe ebenfalls durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt abfiltrirt, mit Wasser gewaschen, getrocknet und nach KJELDAHL verbrannt. Die gefundene Stickstoffmenge, abzüglich des Filterstickstoffs, mit 6,25 multiplicirt, ergibt die Menge des vorhandenen coagulirbaren Eiweisses (Albumin).

Wenn die Fleischpräparate nur geringe Mengen unlösliches und gerinnbares Eiweiss enthalten, so ist eine Trennung derselben nicht erforderlich.

c) **Bestimmung des Albumosenstickstoffs.** 50 ccm der klaren Substanzlösung (s. Vorbemerkungen) werden mit Schwefelsäure schwach angesäuert, darauf mit feingepulvertem Zinksulfat in der Kälte gesättigt. Wenn sich die ausgeschiedenen Albumosen an der Oberfläche der Flüssigkeit abgesetzt haben, während am Boden des Gefässes noch geringe Mengen ungelösten Zinksulfates vorhanden sind, werden die Albumosen abfiltrirt, mit kaltesättigter Zinksulfatlösung hinreichend nachgewaschen und nach KJELDAHL verbrannt. Durch Multiplication der gefundenen Stickstoffmenge abzüglich des Filterstickstoffs mit 6,25 erhält man die dem gefundenen Stickstoff entsprechende Menge der Albumosen.

Da Fleischextrakte und -Peptone in der Regel nur wenig Ammoniakstickstoff zu enthalten pflegen und bei Gegenwart geringer Mengen von Ammoniaksalzen in einer mit Zinksulfat gesättigten Lösung kein unlösliches Doppelsalz von Ammonsulfat mit Zinksulfat sich abscheidet, so kann von einer Bestimmung des Ammoniakstickstoffs in der Zinksulfatlösung bei der Bestimmung der Albumosen abgesehen werden.

Sind dagegen nennenswerthe Mengen Ammoniak in den Präparaten vorhanden, so werden weitere 50 ccm der ursprünglichen Substanzlösung (s. Vorbemerkungen) in der nämlichen Weise mit Zinksulfat gefällt. In dem Niederschlage wird nach e der Gesamtstickstoff bestimmt und letzterer von dem Gesamtstickstoff des Zinksulfat-Niederschlages abgezogen.

d) **Bestimmung des Pepton- und Fleischbasenstickstoffs.** Enthalten die zu untersuchenden Fleischpräparate neben Peptonen auch noch Fleischbasen, so ist eine Trennung derselben bis jetzt unmöglich. Wenn dagegen durch qualitative Reaktionen die Abwesenheit von Peptonen nachgewiesen ist, oder die Peptone frei von Fleischbasen und anderen Alkaloiden sind, so geschieht die Fällung und Bestimmung der Peptone oder der Fleischbasen am besten durch Phosphorwolframsäure oder durch Phosphormolybdänsäure.

Für den qualitativen Nachweis von Pepton empfiehlt sich die Biuret-Reaktion nach dem von R. NEUMEISTER empfohlenen Verfahren.

Man verwendet hierzu zweckmässig das Filtrat der Zinksulfatfällung oder sättigt einen neuen Antheil der Substanzlösung mit Zinksulfat wie oben angegeben ist. Darauf wird filtrirt, das Filtrat mit soviel konz. Natronlauge vermischt, bis das anfänglich sich ausscheidende Zinkhydroxyd wieder vollständig gelöst ist, zu der klaren Lösung werden einige Tropfen einer 1procentigen Kupfersulfatlösung zugesetzt. Rothviolette Färbung zeigt Pepton an — Hierzu ist zu bemerken, dass bei dunkelgefärbten Präparaten (Liebig's Fleischextrakt) wegen der erforderlichen starken Verdünnung sich geringe Mengen von Pepton dem Nachweise entziehen.

Für den qualitativen Nachweis der Fleischbasen neben Pepton versetzt man einen neuen Antheil der klaren Substanzlösung (s. Vorbemerkungen) mit überschüssigem Ammoniak bis zur deutlich alkalischen Reaktion, filtrirt von dem etwa entstehenden Phosphatniederschlag ab und fugt zu dem Filtrat eine Lösung von 2,5 g Silbernitrat in 100 ccm Wasser hinzu. Der entstehende Niederschlag enthält die Silberverbindung der Xanthinbasen und beweist die Anwesenheit von Fleischbasen¹⁾.

Die quantitative Fällung der Peptone, sowie der Fleischbasen geschieht in folgender Weise:

Das Filtrat der Zinksulfatfällung (sub c) wird stark mit Schwefelsäure angesäuert und mit der Lösung des phosphorwolframsauren Natriums²⁾, zu der man auf 3 Raumtheile = 1 Raumtheil verdünnte Schwefelsäure (1:3) hinzusetzt, so lange versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht. Der Niederschlag wird durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt filtrirt, mit verdünnter Schwefelsäure (1:3) ausgewaschen, sammt Filter noch feucht in einen Kolben gegeben und der Stickstoffgehalt nach KJELDAHL ermittelt. Durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffgehaltes mit 6,25 erhält man die Menge des vorhandenen Peptons.

Bei Gegenwart von Fleischbasen neben Pepton oder von Fleischbasen allein ist eine Berechnung des Gehaltes von Pepton + Fleischbasen, bez. der Fleischbasen allein wegen des hohen Stickstoffgehaltes der letzteren durch Multiplikation des Stickstoffs mit 6,25 nicht angängig. Es empfiehlt sich in solchen Fällen nur die Angabe der in Form von „Pepton + Fleischbasen“ und ev. von Ammoniak vorhandenen Stickstoffmenge.

Statt Fleischbasen und Pepton im Filtrat der Zinksulfatfällung zu bestimmen, kann man diese auch zusammen mit den Albumosen in der ursprünglichen wässrigen Lösung in der angeführten Weise mit Phosphorwolframsäure fällen, in diesem Falle ist der durch Zinksulfat fällbare Stickstoff von der gefundenen Stickstoffmenge in Abzug zu bringen und der Rest als Pepton- + Fleischbasenstickstoff zu bezeichnen.

Die Fleischbasen werden durch Phosphorwolframsäure zum Theil erst allmählich gefällt, es empfiehlt sich daher bei der Fällung, etwa in Fleischextrakten, die Reaktionsflüssigkeit einige Tage stehen zu lassen.

Da durch Phosphorwolframsäure auch der Ammoniakstickstoff gefällt wird, so ist bei der Berechnung des Pepton- + Fleischbasenstickstoffs der nach e gefundene Ammoniakstickstoff von der durch Phosphorwolframsäure gefällten Stickstoffmenge in Abzug zu bringen. — Empfehlenswerther ist es jedoch, in einer zweiten Phosphorwolframsäurefällung den Ammoniakstickstoff durch Destillation mit Magnesia nach e zu bestimmen und in Abzug zu bringen.

e) Bestimmung des Ammoniakstickstoffs. Manche Fleischextrakte liefern bei der Destillation mit Magnesia oder Baryumkarbonat nicht unbeträchtliche Mengen Ammoniak. Ob dieses als Ammoniaksalz fertig gebildet vorhanden ist, oder aus anderen organischen Verbindungen erst bei der Destillation abgespalten wird, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Man verfährt wie folgt: 100 ccm der klaren Substanzlösung (s. Vorbemerkung) werden mit 100 ccm Wasser verdünnt, aus dieser Lösung wird das Ammoniak durch Destilliren mit Magnesia oder Baryumkarbonat abgeschieden.

f) Aus der Differenz zwischen dem Gesamtstickstoff und der Summe der unter b bis e bestimmten Stickstoffmengen ergibt sich der Gehalt des Präparates an „sonstigen Stickstoffverbindungen“, d. h. Stickstoffverbindungen unbekannter Natur.

g) Bestimmung des Leimstickstoffs. Enthält das zu untersuchende Präparat Leim, so findet man diesen nach den vorstehenden Methoden als Albumosen. — Eine Trennung des Leimes von den Albumosen oder des Leimpeptons von den Eiweisspeptonen ist mit einiger Genauigkeit nicht möglich. A. STUTZER hat für diesen Zweck ein Verfahren angegeben, welches in FRESSENIUS, Ztschr. analyt. Chemie 1895, 508 veröffentlicht worden ist.

¹⁾ Eigentlich nur die Anwesenheit von Hypoxanthin und Xanthin. Weil diese aber in allen Fleischsorten und Fleischzeugnissen in geringerer Menge vorkommen als Kreatin und Kreatinin etc., mindestens letztere stets begleiten, so kann aus dem erhaltenen Niederschlag auch auf die Anwesenheit der anderen Fleischbasen geschlossen werden.

²⁾ 120 g phosphorsaures Natrium und 200 g wolframsaures Natrium werden in 1 l Wasser gelöst.

Die Bestimmung des Fettes und des Alkohol-Extraktes erfolgt in der auf S 651 schon angegebenen Weise

Fleischextrakte dürfen keine oder nur Spuren unlöslicher (Fleischmehl etc) oder coagulirbarer Eiweissstoffe (Albumin) oder Fett enthalten — Von dem Gesamtstickstoff dürfen nur massige Mengen in Form von durch Zinksulfat ausfällbaren, löslichen Eiweissstoffen vorhanden sein — Fleischextrakte dürfen nur geringe Mengen Ammoniak enthalten — Fleischextrakte, welche in der Asche einen über 15 Proc Chlor entsprechenden Kochsalzgehalt haben, sind als mit Kochsalz versetzt zu bezeichnen

Die Grenzwerte bezüglich des Wassergehaltes und des Gehaltes an Kochsalz beziehen sich natürlich nur auf solche Präparate, welche den Anspruch erheben, dem Liebig'schen Extrakte gleichwertig zu sein. Auf die zur Zeit im Handel befindlichen zahlreichen flüssigen Extrakte und Würzflüssigkeiten lassen sie sich nur als Werthmesser anwenden

Zusammensetzung einiger Fleischextrakte des Handels.

Nach dem LIEBIG'schen Verfahren untersucht

	Wasser	Mineralbestandtheile	Organische Substanz	Stickstoff	In Alkohol von 80 Vol Proc löslich	Chlorgehalt der Asche in	Analytiker
	Procent						
PASTORIS Fleischextrakt	15,50	26,23	58,27	—	61,74	—	R SENDTNER
PISONIS Extrakt of meat	17,74	19,68	62,58	—	64,68	—	
KEMMERICH's argent Fleischextrakt	18,88	19,46	61,66	—	59,06	—	
GIBL's Extractum Carnis	19,41	26,44	54,15	—	62,87	21,32	
LIEBIG's Fleischextr (Mittel aus 170 Analysen)	18,79	23,02	58,19	8,000	61,85	10,00	
Saladero Concordia	21,88	15,85	62,27	9,642	58,29	—	
Peptone de viande KEMMERICH	34,27	7,71	58,07	9,365	28,40	—	
GIBL's Hermanos (flüssig)	64,18	18,29	17,58	2,100	34,28	44,45	
KOCH's Peptonbouillon	59,58	15,88	24,54	3,657	32,78	43,19	
KEMMERICH's condensirte Fleischbouillon	62,59	17,06	20,35	3,187	29,32	41,97	
MAGGI's Bouillonextrakt	68,64	23,80	7,56	1,293	25,79	57,23	Nach KÖNIG
Bouillon conc MORRIS, CANNING & Co	64,24	18,41	22,86	—	29,87	—	
LIEBIG's Fleischextr (Mittel aus 14 Analysen)	22,49	17,43	60,08	7,360	59,91	—	
BUSCHENTHAL's Fleischextrakt	16,91	19,39	63,70	—	69,11	—	
KEMMERICH's Fleischextrakt	16,21	20,59	63,20	8,960	70,34	—	
Deutsches Fleischextrakt	29,24	15,48	55,38	8,700	64,47	—	
Schafffleischextrakt (Australien)	29,20	10,82	60,48	8,680	—	—	
Pferdefleischextrakt	18,00	23,10	58,90	—	—	—	
JOHNSTON's Fluid Beef	36,09	12,40	51,51	6,570	17,00	69,19	

Ueber die Zusammensetzung der Stickstoffsubstanzen machen KÖNIG und BÖHM (Fresen, Ztschr anal. Chemie 1895, 560) folgende Angaben

	v LIEBIG's Fleischextrakt in Procenten		KEMMERICH's Fleischextrakt in Procenten		KEMMERICH's Fleischpepton in Procenten		GIBL's Fleischextrakt in Procenten	
	der Substanz	des Stickstoffs	der Substanz	des Stickstoffs	der Substanz	des Stickstoffs	der Substanz	des Stickstoffs
Gesamt-Stickstoff	9,28	100	9,14	100	10,08	100	2,77	100
Davon in Form von								
1 Löslichem Eiweiss	Spur	Spur	0,08	0,87	0,06	0,59	Spur	Spur
2 Stickstoffverbindungen, in 60—64proc. Alkohol unlöslich	0,21	2,26	0,33	3,61	1,86	13,49	0,25	9,02
3 Albumosen	0,96	10,34	1,21	13,24	4,15	41,17	0,70	25,27
4 Pepton	0 bis	Spur	0 bis	Spur	0	0	0	0
5 Fleischbasen	6,81	73,38	5,97	65,32	3,97	39,38	1,56	56,31
6 Ammoniak	0,47	5,06	0,41	4,49	0,29	2,88	0,09	3,25
7 Sonstige Stickstoffverbindungen	0,83	8,98	1,14	12,47	0,25	2,49	0,17	6,15

Die Zusammensetzung der Mineralbestandtheile (Reinasse) ist nach J. KÖNIG im Mittel folgende

In Procenten

Kal	Natron	Kalk	Magnesia	Eisenoxyd	Phosphorsäure	Schwefelsäure	Kieselsäure + Sand	Chlor
42,46	12,74	0,62	3,15	0,28	30,59	2,08	0,81	9,63

LEUBE ROSENTHAL'sche Fleischsolution 1000 g fettreiches, feingehacktes Rindfleisch werden in einem Porcellangefäss mit 1 Liter Wasser und 20 g Salzsäure (1,125 spec Gew.) angerührt. Dieses Porcellangefäss wird in einen PAPIN'schen Topf eingesetzt und 12–15 Stunden (während der ersten Zeit unter bisweiligen Umrühren) gekocht. Nach dieser Zeit wird die Masse im Mörser zerrieben, bis sie emulsionsartig aussieht, dann mit Natriumkarbonat fast neutralisirt, nochmals 12–15 Stunden im PAPIN'schen Topf gekocht, dann zur Breikonsistenz abgedampft, in Blechbüchsen abgefüllt, welche sterilisirt und verlöthet werden. Enthält in Procenten 67,2–80,4 Wasser, 9,0–11,0 Albumin, 1,8–6,5 Pepton, 5,6–7,6 sonstige Stickstoffverbindungen, 0,5 Kochsalz und 0,8–1,4 sonstige Salze. Wird als Ernährungsmittel bei Magengeschwüren, chronischer Dyspepsie, akutem Magenkatarrh etc. angewendet, ist aber wenig haltbar.

Beef-tea Von Knochen, Fett und Sehnen befreites (mageres) Rindfleisch wird feingeschabt, in eine Flasche gebracht, welche man verkorkt. Der Stopfen wird fest zugebunden, darauf stellt man die Flasche in einen Topf mit Wasser und erhitzt 2 Stunden zum Kochen. Nach dem Erkalten presst man den ausgeschiedenen Sift ab und colirt oder filtrirt ihn. Er ist bald zu verbrauchen.

Bovril, ein Fleischextrakt, welches feingehacktes Fleisch enthält und angeblich nur den halben Werth von gutem Fleischextrakt hat.

Bouillon-Wurzfett Man digerirt im Wasserbade 700 Th frisches Rinderfett und 300 Th frisches Schwanzfett mit 50 Th Bouillongewurz (der Hannover'schen Cakes Fabrik) 1 Stunde lang und filtrirt im Dampftrichter.

Bouillontafeln zur raschen Herstellung von Bouillon früher sehr beliebt und im Haushalt in grösseren Küchen selbst dargestellt. Fein gehacktes mageres Rindfleisch (ev. unter Zusatz von Hühnerfleisch und etwas Schinken) wird mit Kalbsfüssen zusammen eingekocht, die vom Fett durch Abschöpfen befreite Brühe soweit eingedampft, dass sie in der Kälte gelatinirt, schliesslich in Tafeln gegossen.

Carniferrin. Das Eisensalz der Phosphorfleischsäure. Man versetzt die wässrige Lösung des Fleischextraktes mit Barythydrat, bis in einem Probefiltrat ein weiterer Zusatz von Barythydrat keinen Niederschlag mehr erzeugt. — Das nöthigenfalls durch Einleiten von Kohlensäure vom überschüssigen Barythydrat befreite Filtrat wird hierauf mit unorganischen oder organischen Eisensalzen gekocht, wobei sich das Eisensalz der Phosphorfleischsäure ausscheidet. D. R. P. 77136. Neuerdings soll es auch aus Molken dargestellt werden.

Rothbraunes, geschmackloses Pulver, 30 Proc Eisen enthaltend, löslich sowohl in verdünnten Säuren als auch in Alkalen. Es soll leicht resorbierbar sein und wird Erwachsenen zu 0,5 g, Kindern zu 0,2–0,3 g täglich gegeben.

Carnit, Präparat zum Rothfärben von Fleisch und Wurst, ist ammoniakalische Karminlösung.

Carno Mit Kochsalz versetzter und eingedickter Fleischsaft, saupfick, von dunkelbraunrother Farbe. Die wässrige Lösung ist neutral und zeigt das Spektrum des Oxyhaemoglobins. Bestandtheile: Wasser 56,74 Proc, Mineralstoffe 19,93 Proc, Ammoniak 0,28 Proc, Fett 0,29 Proc, Eiweisskörper 10,84 Proc, sonstige organische Substanzen (wie Fleischbasen) 11,92 Proc.

COLEMAN-LIEBIG's Extract of meat and Malt-wine. Angeblich Portwein, in welchem LIEBIG's Fleischextrakt und Malzextrakt gelöst ist. Nach TRILLICH Portwein mit sehr wenig Fleischextrakt.

Deutsches Fleischwasser. Ist eine 20proc Lösung von Natriumbisulfit.

Extractum Carnis frigide paratum LIEBIG. (Hamb V) **Infusum Carnis frigide paratum**. LIEBIG'scher Fleischsaft (Hamb V) 60,0 g fettfreies, fein zerkleinertes Rindfleisch werden mit einer Mischung aus 5 Tropfen Salzsäure, 1,0 g Chlornatrium und 120,0 g Wasser, 1 Stunde unter bisweiligem Umrühren macerirt, ausgepresst, filtrirt und mit Wasser auf 100,0 g gebracht.

Flaschenbouillon von Dr. UFFELMANN in Rostock. Man bringt 250–500,0 g feinzerkleinertes Fleisch in eine Flasche, verkorkt diese, stellt sie in ein Gefäss mit Wasser und erhält letzteres etwa 45 Minuten nahe dem Siedepunkte. Die ausgeschiedene Flüssigkeit ist die Flaschenbouillon. Sie wird aus Rindfleisch und aus Kalbfleisch bereitet. Vergl. Beef-tea.

Fleischsaft-Gefrorenes. Ist gefrorener Fleischsaft. Er wird wie Speiseeis bereitet und besitzt den Vorzug, dass der für viele Patienten unangenehme Blutgeschmack nicht hervortritt.

Fleischextraktwein mit Chinin Extracta Carnis 15,0, Chinini sulfurici 10, Acidi citrici 0,85, Aquae fervidae 80,0, Vini Xerensis detannati 500,0

Fleischpulver. Mageres Rundfleisch wird in Streifen geschnitten, diese werden einige Minuten in heissem Fett gehalten, dann im Ofen langsam getrocknet und auf der Kaffeemühle gepulvert (Munch med Wochenschr) Zur Ernährung Kranker

Futtermehl für Forellen und Karpfen von Louis Groos in Heidelberg Fleischmehl 30—35 Th., Raps- und Leinsamenmehl 9—10 Th., Mais 18—22 Th., Erbsen, Wicken, Saubohnen 18—22 Th., Getreidemehl und Hafer 18—22 Th., Kochsalz 1—2 Th

Maceratio Carnis (Ergänzb.), Fleischauszug, Succus Carnis recens 500 Th feingehacktes von Sehnen und Fett befreites Ochsenfleisch werden mit einer Mischung von 625,0 Th Wasser und 1,0 Th Salzsäure übergossen, unter Umrühren 1 Stunde an einem kühlen Orte (Eisschrank) stehen gelassen Man trennt durch Filtration von der Fleischfaser und fügt 6 Th Natriumchlorid zu Stets frisch zu bereiten

Nutricine von MORIÉ in Paris Wird aus rohem Fleische und nicht zu frischem Brote durch Mischen, Trocknen und Pulvern und nachheriges Formen in Tafeln bereitet

Nutrin-Stroschein soll ähnlich wie WYTH'S Beef juice, s dieses, durch Ein-trocknen von Fleischsaft dargestellt werden und 83,5 Proc Eiweiss, 6,1 Proc Fett, 4,9 Proc Nährsalze und 5,5 Proc Wasser enthalten

QUAGLIO's Bouillonkapseln Fleischextrakt 100,0, Tomatensaft frisch gepresst 50,0, Selleriepulver 5,0, Kochsalz 70,0 werden im Dampfbade sorgfältig durchmischt und zur Extraktthoke eingedampft Man füllt mit diesem Extrakt (2,5 g) den unteren Theil einer Gelatinekapsel, während man in den oberen Theil 0,5 g Bouillonwurzelt bringt, und schiebt beide Hälften übereinander

Rozellina, Fleisch- und Wurstfarbe von C H Ross-Hamburg Uhlenhorst Carmin 25,0, Acidi borici 20, Aquae 805,0

BARFF's Kreechyle (liquid meat) Enthält 95 Proc Wasser, 1 Proc Fleischbasen, 0,75 Proc Eiweiss und Pepton (STUTZER)

BERGER's peptonised beef jelly. Hat 90 Proc Wasser, 9 Proc organische Stoffe, theilweise aus Pepton bestehend (STUTZER)

BRAND & Co, Essence of beef. Enthält 90 Proc Wasser, 6 Proc Pepton, 2 Proc Eiweiss (STUTZER)

Carne pura, Patent-Fleischpulver. Ist getrocknetes, gesalzenes und gemahlenes Fleisch mit 68 Proc Proteinstoffen Wird zu Fleischzwieback, Fleischnudeln, Fleisch-maccaroni, Fleischkakao, Fleischchocolade verarbeitet, um den nicht angenehmen Geschmack des getrockneten Fleisches zu verdecken (STUTZER)

CARRICK's beef peptonoids ist getrocknetes, gemahlenes und entfettetes Fleisch, mit Zusatz von Weizenkleber und Milch hergestellt Enthält Pepton (STUTZER)

Golden-Liquid Beef Tonic von Ohr M CARTTENTON in New-York Besteht aus Fleischextrakt, Cognak, Eisenextrakt, Chinarindenextrakt und anderen Bitterstoffen

JOHNSTON's Fluid Beef. Enthält 50 Proc Wasser, 45 Proc organische Stoffe, 5 Proc Salze. Die organischen Stoffe bestehen aus 17 Proc fein zerhacktem Muskelfibrin, 17 Proc Pepton und aus Fleischbasen (STUTZER)

LIEBIG's aufgeschlossenes Dünge-Fleischmehl. Die bei der Fabrikation des Fleischextraktes sich ergebenden Abfälle werden mit Schwefelsäure aufgeschlossen und in 2 Nummern in den Handel gebracht. Nr. I. Gesamtposphorsäure 11,0 Proc, in Wasser lösliche Phosphorsäure 10,0 Proc, Stickstoff 5,0 Proc Nr. II. Gesamtposphorsäure 9 Proc, in Wasser lösliche Phosphorsäure 8 Proc, Stickstoff 7 Proc

MURDOCK's liquid food. Enthält 88 Proc Wasser, 13 Proc Albuminate, Spuren von Pepton und Fleischbasen (STUTZER)

Pepton CHAPEAUT Enthält 20 Proc. Pepton, 8 Proc Eiweiss Bei der Fabrikation scheint eine tiefgreifende Zersetzung der stickstoffhaltigen Bestandtheile eingetreten zu sein In noch höherem Masse ist dies der Fall bei Peptone DUFRESNE (STUTZER)

SAVOY and MOORE's fluid beef Enthält 27 Proc Wasser, 60 Proc organische Stoffe Fast soviel Fleischbasen enthaltend wie Liebig's Fleischextrakt, ist diesem überhaupt ähnlich (STUTZER)

STENHOUSE GROVE's fluid meat mit 28—27 Proc Pepton Ist dem Pepton Koch und Pepton KEMMERICH ähnlich, indessen wurde von RUBNER die sehr wechselnde Beschaffenheit des Präparates getadelt (STUTZER)

VALENTINE's meat juice. Enthält 59 Proc Wasser, 5 Proc Pepton, 2 Proc Eiweiss (STUTZER)

Vlande FAYROT ist getrocknetes, fein gemahlenes und entfettetes Fleisch mit 85 Proc verdaulichem Fibrin, Spuren von Fleischbasen Pepton ist nicht vorhanden (STUTZER)

WIRTH's Beef juice Scheint durch Einengen reinen, kochsalzhaltigen Rundfleischsaftes im Vacuum bei möglichst niedriger Temperatur gewonnen zu sein Soll alles Eiweiss des Fleisches in gelöster Form, ferner das Hämoglobin in unverändertem Zustande

enthalten Mit Wasser verdünnt, zeigt der Saft röthlichbraune Färbung, die beim Kochen infolge Coagulation des Eiweisses verschwindet Theelöffelweise in kaltem oder lauem Wasser

Vinum Carnis (Nat Form)	
Wine of Beef	Beef and Wine
Pp	Extracti Carnis 35,0
	Aquae fervidae 60,0
	Vini Xerensis q s ad 1 l

Vinum Carnis et Ferri (Nat Form)	
Wine of Beef and Iron	Beef, Wine and Iron
Pp	Tincturae Ferri atri chloridi
	Extracti Carnis 35,0
	Aquae fervidae 60,0
	Vini Xerensis q s ad 1 l

Caroba.

Folia Carobae, Carobenblätter sind die Blätter einer Anzahl von **Bignoniaceen** aus Mittel- und Sudamerika, die als Diuretica und Sudorifica besonders gegen Syphilis empfohlen werden, nämlich *Jacaranda procera* Spr, *J lancifolia* (?), *J subrhombica* DC, *J oxyphylla* Cham, *Bignonia quinquefolia* Vahl, *B purgans* (?), *B nodosa* Mans, *Sparattosperma lithontripticum* Mart, *Kordelestris syphilitica* Arruel Die Abbildungen zeigen Blätter erstgenannter Art

Bestandtheile der *Jacaranda* Arten
0,162 Proc eines Alkaloides Carobin, 3,3 Proc Carobaharz, 0,0516 Proc Carobasäure, 0,1 Proc Steocarobasäure etc

Anwendung 1—3 g 3—4 mal täglich

Balsamum Henriene, Henriettenbalsam gegen Zahnschmerzen, ist eine concentrirte alkoholische Tinktur der Blätter

Unter dem Namen Caroba gehen auch die Hülzen von *Ceratonia Siliqua* und die grossen hohlen Gallen auf *Pistacia Terebinthus*, die von *Pemphigus cornicularius* erzeugt werden



Fig 163



Fig 164



Fig 165

Carrageen.

Carrageen (Austr Germ Helv) *Chondrus* (U-St) **Caragaheen**. *Alga s. Fucus s. Muscus s. Lichen Caragen*. Irändisches Moos. **Karragaheen** Perlmoos. **Knorpeltang**. Seemoos. *Mousse d'Irlande* Goémon. *Mousse perlée* — Irish Moss **Pearl-moss** Wird geliefert von zwei Algen aus der Reihe der *Florideae*, Familie der *Gigartinaeae* *Chondrus crispus* Lyngbye (*Sphaerococcus crispus* Agardh) und *Gigartina mammillosa* J G Agardh (*Sphaerococcus mammillosus* Agardh), beide an den Küsten der alten Welt von Gibraltar bis zum Nordkap und an der atlantischen Küste von Nordamerika Die erstgenannte fehlt im Mittelmeer und in der Ostsee, die zweite kommt auch im stillen Ocean vor, in der Droge tritt sie quantitativ ganz zurück

Beschreibung Beide Arten besitzen einen am Grunde stielartigen Thallus, der mit einer scheibenförmigen Verbreiterung auf der Unterlage befestigt ist und sich nach oben wiederholt gabelig theilt Die Aeste sind besonders bei *Chondrus* recht vielgestaltig, flach, gelappt, stielartig, am Rande oft gekrümmelt, jedenfalls sind sie bei hinreichender Breite immer flach, bei *Gigartina* rinnenförmig aufgebogen An zahlreichen Exemplaren findet man die durch einen Geschlechtsakt entstandenen Fortpflanzungsorgane, die *Cystocarpia*, die bei *Chondrus* halb eiförmig aus dem Gewebe des Thallus hervorragen, bei *Gigartina* stielartig oder sitzenförmig hervortreten — Beide sind im frischen Zustande schwarzroth oder grünroth — Der Querschnitt lässt unter dem Mikroskop eine dichte Rinden- und eine lockere Markschicht erkennen

Bestandtheile. Bis 80 Proc Carrageenschleim (Pararabin) $C_6H_{10}O_6$, bis 9,4 Proc Proteinsubstanzen, in geringer Menge Jod und Brom, feiner an Farbstoffen Phyco-Erythrin und Chlorophyll. Der Aschengehalt beträgt 14 Proc. Die Asche ist reich an Sulfaten.

Einsammlung und Zubereitung. Man sammelt die durch Springfluthen an das Ufer geworfenen Algen oder zieht sie mit Rechen aus dem Wasser im Norden und Nordwesten Irlands, in geringer Menge auch in Nordfrankreich, die Hauptmenge liefert die Grafschaft Plymouth an der Küste von Massachusetts. — Die frisch schwarzrothen Algen werden durch wiederholtes Befeuchten und Trocknen an der Sonne gebleicht, dann in Fässern mit Wasser gerollt und noch einmal getrocknet. Die ursprünglich schlupfrig-weichen Pflanzen sind nun steif, knorplig und weissgelb.

Prüfung. Bei der Methode des Einsammelns ist es unvermeidlich, dass auch fremde Algen, Korallen, Schnecken, Muscheln, Steinchen mit gesammelt werden. Von diesen wird die Droge durch Auslesen möglichst befreit. — Mit Wasser übergossen wird die Droge schlupfrigweich und liefert damit beim Kochen einen nach Erde schmeckenden, in der Kälte ziemlich dicken Schleim, der mit Jod nicht blau, sondern höchstens rothlich wird. Eine im Handel vorkommende, besonders helle Sorte ist mit schwefliger Säure gebleicht, trocknet man solche Waare stark in der Wärme, so wird sie braun infolge des Gehaltes der durch Oxydation der schwefligen Säure entstandenen Schwefelsäure.

Aufbewahrung. Man entfernt so viel als möglich fremde Algen, Korallenreste und missfarbige Theile und zerkleinert die scharf nachgetrocknete Droge im Mörser, oder man feuchtet dieselbe mit Wasser an, schneidet mittels eines Wiege- oder Stampfessers und trocknet sie wiederum sorgfältig. Das durch ein grobes Specieessieb getriebene Carrageen wird, durch Abgießen vom Pulver befreit, an einem trockenen Orte aufbewahrt.

Anwendung. Als Nahrungsmittel bei Schwindelkranken, schwächlichen Kindern, bei Katarrhen der Respirationswege und des Darmkanals. In Theegemischen, in Abkochungen (1—2 100), in Form einer Gallerte. Carrageenschleim dient zur Bereitung haltbarer Leberthranemulsionen, zum Glätten der Haare, zum Klären trüber Flüssigkeiten (Bier, Honig etc.).

Gelatina Carrageen (Ergänzb.)
Irländisch-Moos-Gallerte

Rp Carrageen concisi 1,0
Aqua 40,0
Man erhitzt $\frac{1}{2}$ Stunde im Dampfbade, presst gelinde, fügt Sacchar 2,0

hinsu u. dampft ab, bis nach Entfernung des Schaumes 10,0 bleiben. Nur auf jedesmalige Verordnung zubereiten.

Pasta Cacao carragenata
Carrageen-Chokolade

Rp Massae Cacao
Saccharolati Carrageen 83.

Bereitung: unter Chokolade, S 586

Saccharolatum Carrageen
Carrageenzucker

Rp 1 Carrageen 100,0
2 Aqua 8000,0
3 Sacchar 500,0

Man kocht 1 u. 2 $\frac{1}{2}$ Stunde, löst in der Seiflüssigkeit 3 und dampft unter Abschäumen zur Extraktstärke ein. Die Masse wird scharf getrocknet und gepulvert.

Brustbonbons von STOLLWERK in Köln sollen mittels einer Abkochung von Carrageen, Irländischem Moos, Eibischwurzel, Süßholz, Souchongthes u. a. bereitet werden.

Cataplasma artificiale s. instantaneum, von LELIÈVRE und von VOLKHAUSEN, ist als Ersatz für Leinsamenmehl- und Breiumschläge seiner einfachen und sauberen Anwendung wegen sehr beliebt. Es sind mit Carrageenabkochung getränkte Wattetafeln, denen man durch Pressen und Trocknen das Aussehen einer dünnen Pappe giebt. Zum Gebrauch lässt man sie in heissem Wasser aufquellen.

Kräuterthee von O. LITKE in Kolberg besteht aus Carrageen, Ehrenpreis, Lungenflechte, Bittersüss, Lindenblüthe.

Lebenstrank der Frau NEUMANN in Berlin, besteht im wesentlichen aus Carrageenabkochung.

Moospflanzenzeltchen von J. SEIGHEER in Rognan sind Tafeln aus gezuckertem, roth gefärbtem Carrageenschleim.

Végétaline naturelle von COMPÈRE & Co, ein Kesselsteinmittel aus Meeresalgen.

Carthamus.

Gattung der Compositae — Cynareae — Centaureinae.

Carthamus tinctorius L. Heimath unbekannt, als Farbpflanze vielfach in wärmeren Gegenden, selten in Mitteleuropa kultivirt.

Verwendung finden die Blüten: Flores Carthami. Flores Cnici, s. Croci hortensis. Safflor. Bastardsafran. Deutscher, Falscher oder Wilder Safran. Carthame. Safranon. Safflower.

Beschreibung. Die beim Beginn des Welkens aus den Blütenkörbchen herausgezupften, rothen oder orangeröthen Blüten sind zwittrig. Die Röhre ist etwa 25 mm lang, sie theilt sich in 5 lineale, 6 mm lange Lappen (Fig. 166). Die Antherenröhre ist gelb. Die Pollenkörner sind bis 0,07 mm gross, gezackt, dreiporig. Die vierkantig gerippten Achänen ohne Pappus. Der Fruchtknoten wird gewöhnlich abgerissen, findet sich aber auch noch häufig unter der Droge, ebenso die schmalen, weissen, seidig glänzenden Spreublättchen.

Bestandtheile. Safflorgelb, gelber in Wasser löslicher Farbstoff, und ein rother Farbstoff Carthamin (cf. unten), in Wasser schwer, in Alkohol und Alkalien leichter löslich.

Zubereitung, Anwendung, Nachweis. Die gesammelten Blüten werden entweder einfach an der Luft getrocknet (5 Th. frische geben 1 Th. trockene), oder vorher zerquetscht, in jedem Falle aber mit Wasser extrahirt, um das werthlose Safflorgelb zu entfernen. Dann trocknet man sie locker oder in kleinen Kuchen. — Findet in der Pharmacie Verwendung zur Herstellung feiner Räucherspecies, in der Technik als Färbematerial für Seide, dessen Bedeutung aber gegenwärtig abnimmt gegenüber den Anilinfarben (Safranin), auch als Malerfarbe und zum Schminken und zur Verfälschung von Safran oder als dessen Surrogat.

Im unzerkleinerten Safran leicht zu erkennen, wenn man eine Probe aufweicht, an der ganzen Form der Blüten; im Pulver werden die stacheligen resp. warzigen Pollenkörner



Fig. 165. Einzelblüthe v. Carthamus tinctorius.




Fig. 167. Fragment eines Spreublättchens. 800 mal vergr. qu Querswände. (Nach MOELLER.)




Fig. 168. Griffelende der Safflorblüthe. 800 mal vergr. p Pollenkörner. (Nach MOELLER.)



Fig. 169. Blumenblatt des Safflor. 800 mal vergr. ep Epidermis. p Papillen. sp Spiralgefässe. s Sekretschläuche. (Nach MOELLER.)

auf die richtige Spur führen, ferner ist auf die abweichenden Gewebe des Griffels und der Antheren zu achten. Safflor färbt sich mit konc. Schwefelsäure roth (cf. Crocus).

Carthaminum $C_{14}H_{14}O_6$, der rothe Farbstoff des Safflor.

Darstellung. Die mit Wasser (cf. oben) ausgezogenen Blüten extrahirt man mit 15proc. Lösung von Na_2CO_3 . Aus der rothen Lösung schlägt man das Carthamin mit Essigsäure auf Baumwolle nieder; entzieht derselben den Farbstoff von neuem mit 5proc. Lösung von Na_2CO_3 und schlägt ihn daraus mit Citronensäure in Flocken nieder. Der gesammelte und getrocknete Niederschlag wird in Alkohol gelöst und dieser verdunstet.

Eigenschaften Schwarzgrünes Pulver, in Wasser schwer, in Alkohol, in atzenden und kohlensaurer Alkalien mit rother Farbe löslich, aus diesen Lösungen durch Säuren fallbar. In Aether unlöslich. Mit concentrirter Schwefelsäure sich roth lösend, aus dieser Lösung auf Wasserzusatz nicht wieder ausfallend. Beim Schmelzen mit KOH entstehen Oxalsäure und p-Oxybenzoesäure.

Carum.

Gattung der Umbelliferae — Apioidene — Ammineae.

I Carum Carvi L. Heimisch durch fast ganz Europa bis nach Tibet und in Sibirien. Vielfach kultivirt. Liefert Fructus Carvi (Austr. Germ. Helv.) Carui Fructus (Brit.) Carum (U-St.) Semen Carvi. Semen Cumini pratensis. — Kummel. Kümmelsamen. Garbe. Kramkummel — Carvi (Gall.) Semences de carvi. Cumin des prés. — Caraway. Caraway Fruit.

Beschreibung Die ganze Spaltfrucht ist eiförmig, von den Seiten zusammengedrückt, oben vom Stempel und den Resten des Griffels gekrönt, ungefähr 5 mm lang, kahl, meist in die etwas sichelförmigen Theilfrüchtchen zerfallen. — Die Theilfrucht im Querschnitt fast regelmässig fünfeckig mit 5 hervortretenden Ecken, dazwischen in den Theilen je ein Oelstrichen, auf der Fugenfläche zwei. Das Endosperm im Querschnitt schwach funfklappig. — Im Bau ist die Frucht kaum von denen anderer Umbelliferen unterschieden, das Pulver charakterisirt sich durch folgende Merkmale: Haare fehlen, ebenso Netzfaserzellen (vergl. Foeniculum), die Querschnitte sind auffallend breit (15–24 μ bei 45–75 μ Länge), ziemlich reichlich isodiametrische oder fast isodiametrische Steinzellen, schlanke Tracheiden.




Fig. 170
Querschnitt durch die ganze Frucht von Carum Carvi.

Bestandtheile 3–7 Proc. ätherisches Oel (vergl. unten), 12,69 Proc. Fett, 3,12 Proc. Zucker, 19,74 Proc. stickstoffhaltige Substanz, 4,53 Proc. Stärke, 16,51 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, 20,09 Proc. Rohfaser, 14,55 Proc. Wasser, 6,01 Proc. Asche.

Verwechslungen und Verfälschungen. Den Früchten sollen zuweilen die von Aegopodium Podagraria L. beigemengt sein, die dunkler gefärbt und ohne Oelstrichen sind. — Häufig ist eine Verfälschung mit Kümmelfrüchten, denen das ätherische Oel durch Destillation schon entzogen ist. Sie sind ganz oder fast geruch- und geschmacklos. Vorkommendenfalls giebt eine Extraktbestimmung Anhaltspunkte, guter Kummel giebt etwa 15 Proc. Extrakt.

Aufbewahrung. Die zur Reifezeit gesammelte Frucht wird getrocknet, gereinigt und in Holz-, besser in Blechgefäßen aufbewahrt. Einen kleinen Vorrath an grobem Pulver hält man für Veterinarzwecke. Für das feine Pulver wählt man braune Stöpselgläser. Vor dem Pulvern trocknet man den Kummel entweder einige Zeit über Aetzkalk oder einen Tag bei gelinder Wärme. Bei Verarbeitung der Früchte zu Pulver entsteht durch Trocknen und Verstäuben 10–12 Proc. Verlust.

Anwendung. Als Stomachicum und Carminativum bei Blähungen und Kolik 0,5–2,0 g mehrmals täglich als Pulver oder Infusum. Beliebtes Küchengewürz.

Aqua carminativa		Fructus Carvi	
Windwasser		Fructus Corandri	
a Ph. Austr.		Fructus Foeniculi	ss 80,0
Rp	Florum Chamomillae Romanae	werden zerschnitten und zerstoßen mit	
	Corticis Fruct. Aurantii	Aquae	4000,0
	Corticis Fruct. Citri		
	Foliorum Menthae crispae	24 Stunden macerirt, dann destillirt man ab 2000,0	

b Münch Apotheker-Verein.
 Rp Olei Aurantii cordidis
 Olei Carvi
 Olei Citri
 Olei Comandri
 Olei Foeniculi
 Olei Menthae piperitae M 1,0
 Spiritus 100,0
 Aquae Chamomillae 500,0

c Badische Erg Taxe

Rp Florum Chamomillae 5,0
 Foliorum Menthae crispae conc.
 Fructus Carvi contusi
 Fructus Foeniculi contusi
 Corticis Fructus Citri conc.
 Corticis Fructus Aurantii conc. M 2,0
 Spiritus 15,0
 Man lässt 24 Stunden stehen und destil-
 liert ab 100,0

Aqua Carui (Brit.)

Ist wie Aqua Anethi (vergl S 809) zu bereiten I x
 tempore Olei Carvi gtis 3 Aquae tepidae 100,0

Emplastrum Carvi.

Rp Cerati Resinae Pin. 25,0
 Cerae flavae
 Fructus Carvi pulverati M 5,0
 Olei Carvi 1,25

Brust- und Blutreinigungsthee von ZORFEL. Malvenblätter, Kümmel, Süßholz, Guajakholz, Sassafras

Brust- und Lungenthee, ZEEH'scher ist dem vorigen ähnlich

Heilschnaps, bitterer, von JOHANNA GERLITZ, wird aus Kümmel, Fenchel, Mar-
 blumenwurzel, Orangenschale u a mit verdünntem Weingeist bereitet

Mittel gegen Magenleiden von HEINRICH Kümmel, Sennesblätter, Schafgarbe,
 Tausendgüldenkraut, Saefmutterchen, Eibisch, Petersilie, Waldmeister

II. Carum Ajowan Benth et Hook (Ptychotis coptica DC)

In Ostindien, Permen und Aegypten kultivirt. Liefert in den Früchten: **Fructus**
Ajowan, Semen Ajovae, Adjowanfrüchte, Ajowan, True Bishops seed Ammi offi-
cinale Ajowan (Gall)

Beschreibung. Die Früchte sind breitenförmig, bis 3 mm lang, Aussenseite papillös
 hockering, in jedem Thälchen ein Oelströmen, auf der Fugenfläche zwei

Bestandtheile Sie enthalten 3—4 Proc eines farblosen oder schwach gelblichen
 atherischen Oeles vom spec Gew 0,90—0,93, das Cymol und Thymol enthält Die
 Früchte sind das Hauptmaterial zur Gewinnung des letzteren

III Die knollig verdickten Wurzeln amerikanischer Arten, von **Carum Gairdneri**
Benth et Hook und **C Kelloggii A Gr** werden gegessen

IV Unter dem Namen „Kümmel“ gehen hier und da im Handverkauf andere
 Früchte, so die Früchte von **Cuminum Cyminum L.** (vergl Cuminum), als romischer
 Kümmel, die Samen von **Nigella sativa L.** als Schwarzkümmel und Kreuzkümmel,
 mit welchem Namen auch die Samen von **Datura Stramonium L.** bezeichnet werden

Oleum Carvi (Germ, Austr, Helv, Gall) **Oleum Cari** (U-St) **Oleum Carui**
 (Brit) **Carvolum. Oleum Carvi concentratum. Kümmelöl, Karvol, Carvon Essence**
de Carvi. Oil of Caraway.

Es ist zu beachten, dass Austr, Helv, Gall, Brit, U-St unter „Oleum Carvi, Cari“
 oder „Carui“ normales oder fast normales Kümmelöl verstehen, während Germ mit
 Oleum Carvi nur den sauerstoffhaltigen Antheil, das Carvon bezeichnet

Gewinnung. Durch Dampfdestillation der zerkleinerten Kümmelfrüchte Zur
 Oelgewinnung wird hauptsächlich norwegische oder holländische Waare verwendet. (Aus-

Flaeosaccharum Carvi
Oléosaccharure de carvi
 Germ Austr Helv Gall
 Rp Olei Carvi 1,0 1,0
 Sacchari pulver 50,0 20,0

Guttas carvolutae

Weisse Magenkrampftropfen.

Rp Carvuli 20,0
 Olei Menthae piperitae 2,0
 Spiritus 75,0
 Aquae destillatae 5,0

Species carminativae (Gall)

Espèces (semences) carminatives

Rp Fructus Anisi
 Fructus Carvi
 Fructus Comandri
 Fructus Foeniculi M

Spiritus Carvi (Austr),

Kümmelgeist,
 Ist aus Kümmelfrüchten wie Spiritus Anisi (S 816)
 zu bereiten

Ex tempore Olei Carvi 1,0
 Spiritus 70,0
 Aquae 29,0

Vet **Pulvis galactapoeus vaccorum**
 Milchpulver

Rp Fructus Carvi pulv 40,0
 Rhizomatis Calami pulv 40,0
 Natrii chlorati 15,0
 Sulfuris sublimati 5,0

Mit Warmbeer täglich 2mal 2 Esslöffel

bente 4—6,5 Proc) Seltener wird deutscher Kümmel destillirt, da dieser einen geringeren Oelgehalt (3,5—5 Proc) hat. Zuweilen werden die Früchte auch unzerkleinert destillirt und nach dem Trocknen zu betrügerischen Zwecken verkauft. Das so gewonnene Oel ist jedoch ärmer an Carvon und deshalb minderwerthig. Zur Darstellung des Carvons unterwirft man Kümmelöl der fraktionirten Destillation mit Wasserdampf. Hierbei geht das Limonen (Carven) zuerst über und wird von dem später überdestillirenden Carvon getrennt.

Eigenschaften. Normales Kümmelöl ist eine wasserhelle oder hellgelbe Flüssigkeit vom Geruch und Geschmack des Kümmels. Spec Gew 0,905—0,915, (0,91—0,92 U St, Brit 0,91 Austr 0,90—0,91 Helv) Drehungswinkel (100 mm-Rohr) +70 bis +80° Löslich in 3—10 Th 80 proc Alkohol und in gleichen Theilen 90 proc Alkohol. Es siedet von 175—230° C.

Carvon (Oleum Carvi des Arzneibuches) (Carvol), der eigentliche Träger des Kümmelgeruchs, ist etwas dickflüssiger als Kümmelöl und hat das spec Gew 0,963—0,966 und das Drehungsvermögen +57 bis +60° im 100 mm-Rohre. 1 Th löst sich in 20 Th 50 proc, und in 2 Th 70 proc Alkohol auf. Mit 90 proc Alkohol ist es in jedem Verhältniss mischbar. Löst man 1 ccm Kümmelöl oder Carvon in 1 ccm Spiritus auf, so entsteht auf Zusatz von einem Tropfen einer sehr verdünnten Eisenchloridlösung meist eine violettrothe Färbung, die auf Zusatz von mehr Eisenchlorid wieder verschwindet (Germ, Austr). Zum Gelingen der Reaktion ist eine starke Verdünnung des officinellen Liquor Ferri sesquichlorati erforderlich. Durch welchen Vorgang die Färbung veranlasst wird, ist unbekannt. Irgendwelchen praktischen Nutzen hat die Reaktion nicht.

Bestandtheile. Normales Kümmelöl enthält annähernd gleiche Theile Carvon, $C_{10}H_{14}O$, und Rechts-Limonen (Carven), $C_{10}H_{16}$. Reines aus der Schwefelwasserstoffverbindung, $C_{10}H_{14}O, H_2S$, durch alkoholisches Kali abgeschiedenes Carvon siedet bei 229—230° C (Quecksilberfaden ganz im Dampf) und hat das spec Gew 0,964. Das spec Drehungsvermögen $[\alpha]_D = +62^\circ$. Limonen siedet von 175—176° C und hat das spec Gew 0,946 bei 15° C, $[\alpha]_D = +123^\circ 40'$.

Prüfung. Die Bestimmung des spec Gew ist wichtig, weil sich daraus direkt die Menge des in einem Oele enthaltenen Carvons berechnen lässt, vorausgesetzt natürlich, dass das Oel nicht durch Spiritus verfälscht ist. Ein Kümmelöl ist um so besser, je höher sein spec Gew ist. Soll Carvon zur Darstellung von Kümmel-Liqueuren benutzt werden, so ist auf die oben erwähnte Löslichkeit in Alkohol von 50 Vol Proc zu achten. Verfälschungen mit Spiritus machen sich durch die Erniedrigung des spec Gew bemerkbar. In Wasser fallende Tropfen eines spiritushaltigen Oeles bleiben nicht klar, sondern erscheinen nach kurzer Zeit milchig getrübt.

Anwendung. Man gebraucht das Kümmelöl als Stimulans und Carminativum, bei Appetitlosigkeit, Magenkrampf, Flatulenz innerlich zu 0,1—0,2—0,3 g (3—6—10 Tropfen), auch äusserlich in Salben, Linimenten und Pflastern. Klystieren wird es in der 50fachen Menge Weingeist gelöst zugesetzt.

Die grösste Menge Kümmelöl wird in der Liqueurfabrikation zur Herstellung von Kümmelschnäpsen und -Liqueuren gebraucht. Für die besseren Sorten (Gülke, Allasch) findet ausschliesslich das Carvol Verwendung.

Kümmel Brantwein		
Rp	Carvol	2,5 g
	Spiritus (95%)	8 l
	Aquae	7 "
	Sirupsimplicis	80 g

Kümmel Liqueur		
Rp	Carvol	2,5 g
	Spiritus (95%)	8 l
	Sacchari	1000,0
	coct cum Aquae	1000,0
	Aquae	5,6 l

Eiskümmel-Liqueur. 8 g Carvol, 4 Liter Spiritus (95 Proc) werden einer Auflösung von 7 Kilo weissem ungebläuten Candiszucker in 2,4 Liter Wasser zugesetzt.

Den Zucker kocht man in einem irdenen oder emaillirten Gefässe, füllt den Liqueur nach Fertigstellung noch warm in die Flaschen und bewahrt diese bei mässiger Temperatur aufrecht stehend auf, damit sich der ausscheidende Zucker krystallklar auf dem Boden und an den Wandungen der Flaschen absetzt.

Caryophylli.

I. Caryophylli sind die Blütenknospen der *Eugenia caryophyllata* Thunberg (syn. *Caryophyllus aromaticus* L., *Jambosa Caryophyllus* Niedenzu) Familie der *Myrtaceae* — *Myrtoideae*. Die Pflanze soll ursprünglich heimisch sein auf der Molukken-Insel Makian, findet sich aber anscheinend wild auch auf andern Molukken und auf den Philippinen. Kultivirt auf den Uliasser-Inseln, auf der Insel Amboina, in grossem Umfange in Sansibar und Pemba, wenig in Westindien.

Namen. Caryophylli (Austr. Germ.); *Caryophyllum* (Brit.); *Caryophyllus* (Helv. U-St.). *Caryophylli aromatici*. Flores Caryophylli. — Gewürznelken. Kreidenelken. Nügelchen. — Girofles (Gall.). Clous de girofle. — Cloves.

Beschreibung. Die Droge besteht aus dem gerundet vierkantigen, 10–15 mm langen, bis 4 mm dicken, brannen Fruchtknoten, der oben die vier dreieckigen Kelchblättchen trägt, welche die kugelig zusammenneigenden Blumenblätter einschliessen. Man kann die letzteren mitsamt den zahlreichen, gebogenen Staubblättern abheben, worauf der einfache Griffel sichtbar wird. Im Querschnitt durch den oberen Theil des Fruchtknotens werden die beiden Fächer desselben mit zahlreichen Samenanlagen sichtbar, von denen aber nur eine zur Entwicklung gelangt.




Fig. 171. Epidermis der Gewürznelken. A vom Unterkelch, B von der Aussen- und C von der Innenseite des Kronblattes mit durchschimmernden Sekretbehältern und mit Oxalatdrüsen. st Stomaten. 160 mal vergr. (Nach MOELLER.)

Der Querschnitt zeigt innerhalb der mit dicker Cuticula bedeckten Epidermis Parenchym und in demselben einen mehrfachen Kreis grosser schizogener Sekretbehälter, in denen sich das ätherische Oel findet. In der Mitte des Querschnittes folgt ein Kreis kleiner Gefässbündel mit einigen Bastfasern, die bis $400\ \mu$ lang, bis $45\ \mu$ dick und ziemlich stark verdickt sind. Das daran sich nach innen anschliessende Gewebe ist ausserordentlich lückig, dann folgt wieder ein Kreis von Gefässbündeln, der ein kleines centrales Parenchym umschliesst. Im ganzen Parenchym häufig Oxalatdrüsen. — Im Nelkenpulver fallen auf: die erwähnten Bastfasern, die tetraedrischen Pollenkörner, die zahlreichen kleinen, aber häufig zertrümmerten Oxalatdrüsen, Fetzen der Epidermis mit der dicken Cuticula und mit Stomaten (Fig. 171). Mit Eisenchlorid werden alle Elemente schwarzblau (Eugenol), mit Kalilauge behandelt, krystallisirt leicht Eugenol-Kalium aus.

Bestandtheile. 9–20 Proc. ätherisches Oel, 13 Proc. Gerbstoff (?). Ferner nach KOENIG: 8,04 Proc. Wasser, 5,92 Proc. Stickstoffsubstanz, 9,1 Proc. Fett, 45,2 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, 8,45 Proc. Holzfaser, 7,42 Proc. Asche.

Handelssorten. 1) Die besten sind die ostindischen Molukken-, Amboina-, englischen Compagnienelken. Verhältnissmässig hellfarbig, besonders die Kronblätter deutlich heller wie der Kelch und Fruchtknoten. Oelgehalt 19–20 Proc. 2) Sansibar- oder afrikanische Nelken, dahin auch die Madagaskarnelken. Etwas dunkler. Oelgehalt 16–18 Proc. Die Hauptsorte des Handels. 3) Amerikanische oder Antillanelken von geringem Oelgehalt, ganz minderwerthig.

Verfälschungen Solche der unzerkleinerten Nelken sind selten, doch sind künstliche Nelken aus Thon oder Holz, die mit Nelkenöl imprägniert waren, ferner solche aus Weizenmehl, Eichenrinde und wenig echten Nelken vorgekommen — Häufiger ist die Beimengung solcher, denen das ätherische Öl entzogen ist und denen man dann durch Abreiben mit fettem Öl wieder ein gutes Aussehen gegeben hat (Gute Nelken geben durchbrochen und mit der Bruchstelle auf Papier gedruckt einen Öalfleck und lassen beim Drucken mit den Fingern Öl heraustreten) Schüttelt man eine Probe verdächtiger Nelken einige Male mit Wasser von 15–20°C und überlässt sie dann der Ruhe, so sinken die guten Nelken zu Boden oder schwimmen senkrecht, bereits extrahierte oder „taube“ schwimmen wagerecht. Schwimmen mehr wie 8 Proc wagerecht, so soll man die Probe beanstanden. Gute Nelken geben mindestens 80 Proc alkoholisches Extrakt, taube geben 7–10 Proc, extrahierte 2–5 Proc.

Schwieriger ist der Nachweis von Verfälschungen im Nelkenpulver.

1) Am häufigsten kommen solche vor mit den Nelkenstielen (*Stipites* seu *Festucæ Caryophyllorum*, vgl S 669). Diese sind im Pulver charakterisiert durch reichliche Frag-




Fig 172 Aus den Nelkenstielen.
g Gefässe b Fasern st Steinzellen der Rinde.
160 mal vergr. (Nach MOKILLAN)

mente von Treppen- und Netzgefässen, während die Gewürznelken nur Spiralgefässe enthalten, ferner durch zahlreiche kurze, stark verdickte und poröse Steinzellen, die der Rinde entstammen, durch Kalkoxalat in Drusen und Einzelkrystallen (Fig 172). — Das „ganz vereinzelte“ Vorkommen dieser Elemente im Pulver berechtigt nicht, von einer absichtlichen Verfälschung zu sprechen, da einzelne Stiele aus Versehen mit vermahlen werden können.

2) Ferner werden als Verfälschung die Mutternelken (*Anthophylli*), die Früchte der Pflanze, angeführt. Diese Verfälschung ist ziemlich unwahrscheinlich, da die Mutternelken theurer bezahlt zu werden pflegen als die Gewürznelken. Vorkommenden Falles sind sie zu erkennen an dem reichlich vorhandenen Starkmehl, dessen Körnchen bis 45 μ gross, eiförmig, bis nierenförmig, an einem Ende oft abgestutzt sind. Sie entspringen den Keimblättern. Ferner sind leicht aufzufinden gestreckte, knorrige, stark verdickte Steinzellen (Fig 173 u 174).

3) Andere Verfälschungen, wie Mehl, gepulvertes Backwerk, Stärke, sind leicht durch das Mikroskop zu ermitteln, solche unorganischer Natur durch die Aschenbestimmung.

Aufbewahrung. In Porcellan- oder Glasgefässen (nicht in Blech!) Die Nelken sind wegen des hohen Gehaltes an flüchtigem Öl schwer zu pulvern, man trocknet sie am besten längere Zeit über Aetzkalk, verwandelt sie in ein mittelfeines Pulver und bewahrt dasselbe in nicht zu grosser Menge in gutschliessenden, gelben Hafenglasern auf. Die Ausbeute wird 82–88 Proc der lufttrocknen Droge betragen.

Anwendung und Wirkung. Sie wirken antiseptisch. Man benutzt sie als Zusatz zu desinfectirenden und aromatischen Mundwässern, aromatischen Tinkturen. Kamittel bei übelriechendem Athem. Innerlich als appetitanregendes Mittel bei Verdauungsstörungen, Blähungen etc. Hauptsächlich als Küchengewürz.

Oleum Caryophyllorum (Germ Austr Brit. Gall. Halv U-St.) Nelkenöl. Essence de Girofle. Oil of Cloves.

Darstellung. Das Nelkenöl wird aus den Gewürznelken — meist ostafrikanischen — durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute 15–19 Proc. Das zuerst übergelende Öl schwimmt auf dem Wasser und besteht aus Caryophyllen, das später

überdestillirende Eugenol sinkt in Wasser unter. Durch Zusammenmischen beider Bestandtheile erhält man das normale Nelkenöl.

Eigenschaften. Frisch destillirtes Nelkenöl ist ein fast farbloses oder gelbliches, am Licht oder durch Berührung mit der Luft bald gelb bis röthlichbraun werdendes Oel, das den starken Geruch der Gewürznelken und einen brennenden aromatischen Geschmack besitzt. Es siedet bei 250—260° C., wobei die grösste Menge zwischen 250 und 251° C. überdestillirt, und dreht den polarisirten Lichtstrahl sehr schwach nach links.

Das spec. Gew. schwankt je nach der Darstellungsweise des Oels von 1,045—1,070.

	Austr.	Brit.	Germ.	Helv.	U-St.
Spec. Gew.	1,040—1,060	>1,050	>1,060	1,055—1,065	1,060—1,067.

In Spiritus und Aether löst sich Nelkenöl in jedem Verhältnisse, von Spiritus dilutus sind etwa zwei Theile zur klaren Lösung erforderlich. Schwefelkohlenstoff, Benzin und Chloroform geben trübe Mischungen.

Eine Lösung von 1 Vol. Oel in 2—3 Vol. Weingeist färbt sich durch Eisenchloridlösung (Germ.) blau bis blaugrün. Verdünnte Eisenchloridlösung (1:20) ruft eine blaue, bald durch roth in gelb übergehende Färbung hervor (Germ.). Mit Kali- oder Natronlauge oder mit Aetzammoniak geschütteltes Nelkenöl gesteht nach kurzer Zeit zu einer gelb gefärbten Masse (Eugenolkalium etc.). Beim Schütteln von Nelkenöl mit Kalkwasser bilden sich flockige, an den Wänden des Gefässes anhaftende Abscheidungen von Eugenolcalcium (Germ.). Breitet man an den Wänden eines Reagiroylinders einige Tropfen Nelkenöl in dünner Schicht aus und lässt Bromdämpfe einfallen, so entsteht eine weissliche, später gelbe bis gelbrothe Färbung.

Mit Wasser geschütteltes Nelkenöl, auch ganz frisch destillirtes, ertheilt diesem in Folge eines geringen Gehaltes an Essigsäure eine schwach saure Reaction.

Bestandtheile. Ausser geringen Mengen Essigsäure, Methylalkohol, Furfurol, und Aceteugenol und (in alten Oelen) Spuren von Vanillin besteht Nelkenöl aus Caryophyllen und Eugenol.

Caryophyllen, ein Sesquiterpen $C_{15}H_{24}$, bildet eine farblose bei 258—260° C. siedende Flüssigkeit von schwachem, durchaus nicht an Nelken erinnerndem Geruch. Spec. Gew. 0,9085 bei 15° C.

Eugenol, $C_6H_4 - C_2H_5 [1] - OCH_2 [8] - OH [4]$ oder p-oxy-m-Methoxyallylbenzol ist, wenn ganz frisch destillirt, eine farblose, stark lichtbrechende, optisch inaktive Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,072 bei 15° C. Ueber freiem Feuer siedet es nicht ganz unzersetzt bei 252—254° C. (Thermometer ganz im Dampf), unter vermindertem Luftdruck ohne Zersetzung bei 12—13 mm von 128—129° C. Eugenol ist in Wasser schwer löslich, leicht




Fig. 178. Aus den Mutternelken. ep Epidermis mit Spaltöffnung. p Parenchym der Fruchtwand. sp Spiralgefässe. st Steinzellen und Fasern. 160 mal vergr. (Nach MOELLER.)




Fig. 174. Aus den Keimblättern der Mutternelken. am Stärkekörnchen. E Parenchym. ep Epidermis der Keimblätter. 160 mal vergr. (Nach MOELLER.)

löslich in Alkohol, Aether, Petroläther und Essigsäure. Die alkoholische Lösung färbt sich auf Zusatz von Eisenchlorid blau bis blaugrün.

Als Phenol vereinigt sich das Eugenol mit kautischen Alkalien und alkalischen Erden zu salzartigen Verbindungen unbeständiger Natur, die durch schwache Säuren, schon durch die Kohlensäure der Luft zerlegt werden.

Zur Reindarstellung von Eugenol schüttelt man Nelkenöl mit einer überschüssigen Menge dünner Natronlauge (von etwa 5—10 Proc) aus, trennt mittelst eines Scheidetrichters die Lösung des Eugenolnatriums von dem aufschwimmenden Sesquiterpen, schüttelt die Salzlösung wiederholt mit Aether aus und scheidet daraus mit verdünnter Schwefelsäure das Eugenol ab, welches man nun zur Entfernung von Schwefelsäure mit Sodalösung auswäscht und dann im Vacuum oder mit Wasserdämpfen destilliert.

Durch Kochen von Eugenol mit Acetylchlorid oder Essigsäureanhydrid entsteht das bei 80—81° C schmelzende Acet-Eugenol, durch gleiche Behandlung mit Benzoylchlorid oder Benzoesäureanhydrid, Benzoyleugenol, vom Schmelzpunkt 69 bis 70° C. Beide Verbindungen eignen sich zur Identificirung des Eugenols.

Prüfung. Im Handel wird vielfach das bedeutend billigere Oel der Nelkenstiele als Nelkenöl verkauft. Man erkennt dieses an seinem weniger feinen Geruch bei Vergleichung mit einem echten Oele. Die Ermittlung des spec Gew ist von Wichtigkeit, da fast alle in Betracht kommenden Verfälschungsmittel (mit Ausnahme des Sassafrasöls resp. Safrols) ein niedrigeres spec Gew besitzen. Falls ein zu niedriges spec Gew gefunden wird, ist eine Siedepunktsbestimmung zu empfehlen. Hiandurch wurde sich bei spielsweise Terpentinalöl verrathen (Siedepunkt 160° C).

1 Th Nelkenöl soll sich mit 2 Raumtheilen verdünntem Weingeist klar mischen. Sassafrasöl und die meisten Verfälschungsmittel wurden durch ihre schwere Löslichkeit erkannt werden. 1 cem Nelkenöl wird mit 20 cem heissem Wasser geschüttelt, das nach dem Erkalten der Mischung erhaltene Filtrat soll mit Eisenchlorid keine Blaufärbung annehmen (Karbolsäure).

In zweifelhaften Fällen ist die quantitative Eugenolbestimmung nach Troms, bei der man das in Benzoyleugenol übergeführte Eugenol zur Wagung bringt, zu empfehlen.

Zur Ausführung der Bestimmung verfährt man folgendermassen:

In einem ca 150 cem fassenden, tarirten Becherglas werden 5 g Nelkenöl mit 20 g Natronlauge (15 Proc NaOH haltend) übergossen und 6 g Benzoylchlorid hinzugefügt.

Man schüttelt kräftig um, bis das Reaktionsgemisch gleichmässig vertheilt ist. Nach dem Erkalten fügt man 50 cem Wasser hinzu, erwärmt, bis der krystallinisch erstarrte Ester wieder ölförmig geworden ist, und lässt abermals erkalten. Man filtrirt nun die überstehende klare Flüssigkeit ab, übergiesst den im Becherglase zurückgehaltenen Krystallkuchen von neuem mit 50 cem Wasser, erwärmt bis zum Schmelzen des Esters wiederum auf dem Wasserbade, filtrirt nach dem Erkalten und wiederholt das Auswaschen in gleicher Weise nochmals mit 50 cem Wasser. Das überschüssige Natron, sowie das Natriumsalz ist dann entfernt.

Nachdem etwa auf das Filter gelangte Krystallblättchen in das Becherglas zurückgebracht worden sind, wird das noch feuchte Benzoyleugenol sogleich mit 25 cem Alkohol von 90 Gewichtsprocent übergossen, auf dem Wasserbade unter Umschwenken erwärmt, bis Lösung erfolgt ist, und das Umschwenken des vom Wasserbade entfernten Becherglases so lange fortgesetzt, bis das Benzoyleugenol in klein krystallinischer Form auskrystallhart ist. Das ist nach wenigen Minuten der Fall. Man kühlt sodann auf eine T von 17° C ab, bringt den krystallinischen Niederschlag auf ein Filter von 9 cem Durchmesser und lässt das Filtrat in einen graduirten Cylinder einlaufen. Es werden bis gegen 20 cem desselben mit dem Filtrate angefüllt werden, man drängt die auf dem Filter noch im Krystallbrei vorhandene alkoholische Lösung mit so viel Alkohol von 90 Gewichtsprocent nach, dass das Filtrat im ganzen 25 cem beträgt, bringt das noch feuchte Filter mit dem Niederschlag in ein Wägegläschen (letzteres war vorher mit dem Filter bei 101° C ausgetrocknet und gewogen) und trocknet bei 101° C bis zum konstanten Gewicht. Von 25 cem 90 procentigen Alkohols werden bei 17° C = 0,55 g reines Benzoyleugenol gelöst, welche Menge dem Befunde hinzugezählt werden muss.

Bezeichnet a die gefundene Menge Benzoesäure-Ester, b die angewandte Menge Nelkenöl (gegen 5 g), und filtrirt man 25 cem alkoholischer Lösung vom Ester unter den

oben erläuterten Bedingungen ab, so findet man den Procentgehalt des Nelkenöls an Eugenol nach der Formel

$$\frac{4100(a + 0,55)}{67b}$$

Gutes Nelkenöl hat einen Eugenolgehalt von etwa 70—80 Procent.

Aufbewahrung An einem kühlen, dunklen Orte, in kleinen, ganz angefüllten Flaschen

Anwendung Nelkenöl ist ein kräftiges Aromaticum, das man in Verdünnung zu 0,01—0,05—0,1 ($\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ —3 Tropfen) innerlich anwendet. Aeusserlich mit Weingeist ver dünnt, dient es als Roborans und Reizmittel gegen Schwache in den Gliedern, Augenschwache (um das Auge herum einzureiben), Zungenlahmung (auf die Zunge einzureiben, mit Weingeist und Glycerin verdünnt), Unterleibsschwache etc. Wegen seiner desinfi cirenden Eigenschaften ist es als Zusatz zu Zahnpulvern und Mundwässern sehr beliebt. In der mikroskopischen Technik wird es zum Aufhellen von Präparaten gebraucht.

Nelkenstielöl wird aus den Nelkenstielen, die bei der Destillation 5—6 Proc. Aus beute geben, gewonnen. In seinen Eigenschaften ist es dem Nelkenöl sehr ähnlich, riecht jedoch weniger angenehm wie dieses. Spec. Gew. 1,040—1,065. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) bis —1°10'. Löslich in 2 Th. Spiritus dilutus. Die Bestandtheile sind, abgesehen von Acet Eugenol, das im Stielöl fehlt, dieselben wie im Nelkenöl.

Acetum aromaticum Germ.
Aromatischer Essig, Vierräuberessig,
Pestessig — Vinaigre des 4 voleurs
Rp. 1 Olei Caryophyllorum
2 Olei Citri aa 20
3 Olei Cinnamomi
4 Olei Junperi
5 Olei Lavandulae
6 Olei Menthae piperitae
7 Olei Rosmarini aa 10
8 Spiritus (90%) 450,0
9 Acidi acetici diluti 850,0
10 Aquae destillatae 1900,0
1—7 in 8 zu lösen, 9 und 10 zufügen, nach 8 Tagen
filtriren

Aqua Anhaltina
Spiritus Anhaltinus Anhaltgeist
Rp. Olei Caryophyllorum
Olei Cinnamomi
Olei Foeniculi
Olei Maeridis
Olei Rosmarini aa 5,0
Tincturae Moschi 20
Spiritus 600,0

Aqua Caryophyllorum
Rp. Olei Caryophyllorum gtt. 3
Aquae destillat. tepidae 100,0
Schütteln, erkaltet filtriren

Aqua dentifricia Botolli (Eig'nz.)
BOTOLLI'S Wasser Eau de Botolli
Rp. Caryophyllorum
Corticis Cinnamomi
Fructus Anisi aa 30,0
Coccinellae 20,0
Spiritus (90%) 2000,0
Nach 8 tägigem Stehen filtrirt man und löst
Olei Menthae piperitae 15,0

Aqua dentifricia Boas (Apoth.-Zeitg.)
Rp. Caryophyllorum
Corticis Cinnamomi aa 10,0
Fructus Anisi 15,0
Coccinellae 7,5
Spiritus 1200,0
Olei Menthae piperitae
Tincturae Ambrac aa 5,0

Balsamum Caryophyllorum
Nelkenbalsam
Rp. Olei Caryophyllorum 50
Olei Nucis aa 15,0
Guttae odontalgicae
(Auf 7 alte in die hohlen Zähne zu bringen.)
a nach BOREM
Rp. Olei Caryophyllorum 5,0
Camphorae 1,0
Spiritus 10,0
b nach DIETRICHI
Rp. Olei Caryophyllorum
Olei Cayeputi aa 1,0
Chloroformii 2,0

Rp. Olei Caryophyllorum
Tincturae Cannabis indae
Chloroformii aa 2,0
Rp. Morphinii hydrochlor 0,5
Cocaini hydrochlor 1,5
Spiritus (90%) 60,0
Man löst und fügt hinzu
Olei Caryophyllorum
Mentholi aa 10,0
Chloroformii 18,0

c nach GAWALOWSKI
Rp. Olei Caryophyllorum
Olei Sativae aa 1,0
Olei Ligni santalin
Chloroformii aa 20
Kreosol 4,0
Alcohol absolut 200,0

d nach MERCK
Rp. Olei Caryophyllorum
Olei Menthae piperitae
Kreosoti aa

Infusum Caryophylli (Brit.)
Infusion of Cloves.
Rp. Caryophyllorum contus 250
Aquae destillat. ebullient 1000,0

Linimentum Rosae (Gall)
Liniment de Rose
 Rp 1 Olei Nucistae
 2 Olei Caryophyllorum aa 50
 3 Spiritus Junperi 900
 Man erwärmt 1, fügt 2, dann nach und nach unter
 Schütteln 3 hinzu. Einreibung für schwächliche
 Kinder

Liquor aromaticus (n. HAGRI)
 Rp Olei Caryophyllorum
 Olei Cinnamomi
 Olei Citri
 Olei Lavandulae
 Olei Thymi aa 1,0
 Olei Bergamottae 3,0
 Spiritus (90%) 260,0
 Gegen Gliederreissen, Haarschwind etc 1 Thee-
 löffel mit 1 Löffel lauwarmen Wasser zu Wasch-
 ungen bei Augenschwäche

Nettenpulver (n. SCHÜTZE)
 Rp Caryophyllorum 50,0
 Ligni Quassiae
 Piperis nigri aa 100,0
 Rhizomatis Indis
 Ammonii carbonici aa 20,0
 Camphorae 5,0
 Olei Bergamottae
 Olei Cinnamomi aa 2,0

Mückenstifte
 Rp 1 Paraffini solidi 50,0
 2 Paraffini liquidii 40,0
 3 Olei Caryophyllorum 10,0
 Man schmilzt 1 und 2, fügt 3 zu und giesst in
 Scheibchen oder in Formen für Mentholstifte
 aus Zum Bestreichen des Gesichts und der
 Hände

Pilulae odontalgicae
Zahnpillen
 Rp Caryophyllor pulv
 Olei Cinnamomi aa 1,0
 Piperis nigri
 Natrii chlorati
 Gummi arabici aa 4,0

M. f. pilul pond 0,1

Anthosenz von Dr Hess Nelkenöl, Palmarosöl, Ananasessenz, Spiritus, mit Al-
 kanna gefärbt

Brama-Elixir von RAMA AYEN, ist ein weingeistiger Auszug aus Nelken, Ingwer,
 Zimmt, Kardamom und anderen Gewürzen

Cherry Tooth Paste von GOSNELL, besteht aus Nelken, Zimmt, Veilchenwurzel,
 Kreide, Bimstein, Nelkenöl, Honig, Karmin

Circassia-Wasser von RVOFF enthält Perubalsam, Nelken- und andere ätherische
 Oele in Weingeist gelöst

Deutsche Siegestropfen von SCHMIDT ist ein versüßter, weingeistiger Auszug aus
 Nelken und Orangenschalen

Esprit des cheveux, Vegetabilischer Haarbalsam, von HUTTEN, ist eine verdünnte
Mixtura oleoso-balsamica

Illodin-Zahnwasser nach TORBER Alkoholsche Lösung von Nelken, Pfefferminz,
 Rosen-, Anisöl, Menthol, Salol, mit Cochenille gefärbt

Odontine, Zahntropfen, die im wesentlichen Nelkenöl, daneben Cayeput, Wacholder,
 Sandelholz- und andere ätherische Oele enthalten

Pain-Expeller (amerik. Vorschr.) Nelkenöl 60,0, Zimmtöl 30,0, Sassafrasöl 250,0,
 Terpentanöl 180,0, Salmiakgeist (trip.) 30,0, Chloroform 125,0, Alkohol q s zu 4 1/2 Liter
 (Pharm Record)

Roche's Liniment, englisches Hustenmittel, ist mit Nelken-, Kümmel- und Berga-
 mottöl versetztes Olivenöl

Stomachin von SMITH, ist ein stärkeres Chokoladenmehl mit Nelken, Zimmt
 und Sandelholz

Svenska tanddroppar von GRAEFSTRÖM, enthalten Nelkenöl, Cayeputöl, Pfeffer-
 minzöl, Chloroform, Essigäther, Kampher

Zahnmundwasser von HUCKSTAEDT Mischung aus Aether, Kampher, Nelkenöl

Zahnschmerzmittel, Kölner, Nelkenöl 2 g, Aether 8 g

Pulvis sternutatorius HUFELAND
HUFELAND'scher Augentabak

i p Caryophyllorum
 Corticis Cinnamomi
 Florum Lavandulae aa 10,0
 Foliorum Rosmarini
 Foliorum Salviae aa 50
 Corticis Cascarillae 80,0
 Macidis 1,5
 Herbae Origanii 2,5
 Olei Bergamottae, Citri, Rutae q s
 Als Schnupfmittel bei Augenleiden

Spiritus aromaticus (Ergänzb.)

Rp Caryophyllorum
 Corticis Cinnamomi ceylanici
 Herbae Majoranae
 Seminis Myristicae aa 25,0
 Fructus Coriandri 50,0
 Spiritus (90%) 750,0
 Aquae 850,0

Man lässt 24 Stunden stehen und destillirt dann
 ab 1000,0

Spiritus crinalis LANDERER
**LANDERER'S oder Holländischer Haar-
 balsam**

Rp Caryophyllorum 10,0
 Foliorum Lauri 20,0
 Spiritus 200,0
 Aquae Rosae 100,0
 Glycerini 10,0
 Aetheris 15,0
 Olei Lavandulae gttis 5

Zum Einreiben der Kopfhaut

Tinctura Caryophyllorum (Gall)
Teinture ou Alcoolé de girofle
 Rp Caryophyllor contus 20,0
 Spiritus (80%) 100,0

II Anthophylli Fructus Caryophylli — Mutternelken. Königsnelken Die Frucht von *Eugenia caryophyllata* Thunberg.

Beschreibung Eine einsamige, langgestreckte Beere mit derber Fruchtwand, vom Kelch gekrönt. Das zweite Fach des Fruchtknotens im Querschnitt oft noch andeutungsweise zu sehen. Der Samenkern besteht aus den zwei dicken, hartfleischigen, braunen Cotyledonen, von denen der grössere um den kleineren herumgebogen ist, und der Radicula, die zwischen ihnen eingeschlossen ist. Ueber den Bau etc. vergl. oben. Sie enthalten 4,6 Proc. Asche. Man verlangt sie zuweilen im Handverkauf in Theenuschungen oder zu Augewässern.

III Stipites seu Festucae Caryophyllorum seu Fusti Nelkenstiele, Nelkenholz Die Fruchtstiele und jungen Zweige von *Eugenia caryophyllata* Thunberg.

Sie enthalten 5,5—6,0 Proc. ätherisches Öl vom spec. Gew. 1,040—1,065, das wie das Nelkenöl wenig links dreht. Vergl. über dasselbe oben, ebenso über den Bau der Nelkenstiele.

Cascarilla.

Cortex Cascarillae (Austr. Germ. Hely.) Cascarilla (Brit. U. St.) Cort. Crotonis s. Eluteriae s. Eleutheriae. Cort. peruvianus spurius s. griseus. — Kaskarillrinde. Kaskarille. Graue Fiebersrinde. Ruhrrinde. Schakarille. — Ecorce de cascarille (Gall.) — Sweet wood bark.

Stammt ab von **Croton Eluteria (L.) Benn.**, Familie der Euphorbiaceae-Crotonae. Angeblich nur auf den Bahamas-Inseln heimisch, soll aber auch auf Cuba, im Süden des nordamerikanischen Festlandes und in Südamerika vorkommen.

Beschreibung. Verwendung findet die Rinde dünner Zweige in federkiel- bis bleistiftdünnen und bis 10 cm langen Stücken, häufig auch die ganzen Zweigstücke. Aussen mit hellgrauem oder gelblichweissem Kork bekleidet, der leicht abblättert. Unter dem Kork ältere Stücke dunkelbraun, ganz junge oft etwas grünlich. Der Kork ist durch Längs- und Querrisse oft in quadratische Felder getheilt, und trägt schwarze oder weisse, punktförmige Flechten. — Unterseite hellbraunlich und eben. Bruch uneben. Der Querschnitt lässt mit der Loupe drei deutliche Schichten erkennen, die verbreiterten Mark- und die entsprechend verschmalerten Baststrahlen geben der inneren Hälfte ein deutlich strahliges Aussehen (Fig. 175). Im Bast erkennt man unter dem Mikroskop einzelne deutlich geschichtete sekundäre Fasern, an der Aussenseite der Baststrahlen kleine Gruppen primärer Fasern. Im Parenchym häufig Oxalat in Drüsen und Einzelkrystallen, ferner Harz in dunklen Klumpen und ätherisches Öl. Stärke reichlich. — Charakteristisch sind im Pulver die dunklen Harzklumpen und die Fasern, deren Schichtung auch in der Längsansicht deutlich ist. — Geruch aromatisch. Geschmack aromatisch-bitter.




Fig. 175. Querschnitt durch Cortex Cascarillae. Lupenbild.

Bestandtheile. 1,5—3,0 Proc. ätherisches Öl vom spec. Gew. 0,89—0,93, das (100 mm-Bohr) + 5° dreht, enthält ein Terpen $C_{10}H_{16}$. Ferner Cascarillin $C_{16}H_{14}O_5$. Schmelzpunkt 208,5° C, mit Schwefelsäure roth, dann grün, mit Salzsäure rosa-roth, später blau. Frühere Formel des Cascarillin $C_{12}H_{18}O_4$, soll zum Theil als Ester in der Rinde sein. Ferner 15 Proc. Harz und Spuren von Gallussäure.

Die Rinde giebt 9—10 Proc. trocknes wässriges Extrakt.

Verwechslungen Als solche wird die Copalchin-Rinde von *Croton Pseudochina* Schlechtendahl und wohl noch andere Crotonrinden (*C. lucidum*) beobachtet. Die

Stücke der ersteren sind derber, grösser wie die der echten Rinde, sie enthält in der primären Rinde Gruppen von Steinzellen

Anwendung. In kleinen Dosen als appetiterregendes Mittel (0,5—2,0 mehrmals täglich in Pulver oder Infusum) bei Dyspepsie, grössere Dosen erzeugen leicht Erbrechen, Schlaflosigkeit und Kopfschmerz — Auch zu Räuchermitteln verwendet, ferner zu Schnupfpulvern, Zusatz zum Tabak und in der Likörindustrie

Aufbewahrt wird die von beigemengten Holz und Zweigstücken befreite Rinde als feine Species in Blechgefassen, das Pulver in gelben Hafenglasern

Extractum Cascarillae Germ 1 Th Rindenpulver (IV) übergiesst man mit 5 Th siedendem Wasser nach 24 Stunden presst man ab, wiederholt das Verfahren und dampft zum dicken Extrakt ein Ausboute 13—16 Proc, n Destillation 8—9 Proc (Die ausgezogene Rinde liefert bei der Destillation noch 1 Proc ätherisches Oel) — Helv Rindenpulver 2 Th mit Wasser und Weingeist ää 3 Th, dann noch einmal ää 2 Th je 48 Stunden digeriren, filtrirte Auszüge zum dicken Extrakt eindampfen

Tinctura Cascarillae Grob gepulverte Rinde 1 Th, verdünnter Weingeist 5 Th, 3 Tage digeriren (Austr) oder 8 Tage maceriren (Ergh) — Brit Helv Rinde 20 Th, verd Weingeist (70 proc) q s, durch Verdrängung 100 Th Tinktur — Gall Rinde 1 Th Weingeist (80 proc) 5 Th 10 Tage maceriren

Aqua Cascarillae
Rp Corticis Cascarillae 20,0
durch Destillation gewinnt man 1000
Rx tempore
Olei Cascarillae gtt 5
Aqua destill servid. 1000
Extractum Cascarillae solidum (Diet)
Wie Extr Uvae Ursi sol (S 363), doch mit $\frac{1}{2}$ des dort vorgeschriebenen Wassers zu bereiten

Infusum Cascarillae (Brit)
Rp Corticis Cascarillae 50,0
Aqua destillat ebullientis 1000,0
Mixtura antasthenica GRAVES.
Rp Infusi Cascarillae 150,0
Chinini sulfurici 0,5
Acidi sulfurici 2,0
Extracti Hyoscyami 0,5
Sirupi Aurantii Cort 40,0
Gegen Nachschweiss bei Schwindsucht, Lungenleiden.

Tinctura anticholerica (sine Opio)

Rp Olei Menthae piperitae 8,0
Tincturae Cascarillae
Tincturae Chinae
Tincturae Castorei ää 30,0
Aetheris 40,0
Tincturae Ratanhiae 60,0
Tincturae Valerianae aeth 120,0

Tinctura antidiarrhoica (Form Berol.)

Rp Tincturae Strychni 8,0
Tincturae Opi simplicis 8,0
Tincturae Cascarillae 10,0
D S 8 Mal täglich 15 Tropfen

Vinum Cascarillae

Rp Corticis Cascarillae gross plv 100,0
Vini Hispanici 1600,0
Durch Digestion zu bereiten

Caseinum.

I. Caseinum purissimum Casein. Käsestoff. Milchcasein.

Als „Casein“ bezeichnet man einen im Pflanzen- und Thierreiche vorkommenden, zur Gruppe der „Albuminate“ gerechneten Eiweissstoff, welcher den Charakter einer in Wasser unlöslichen Säure hat, mit Alkalien und Erdalkalien in Wasser lösliche Verbindungen eingeht, die gegen Phenolphthalein theils neutral, theils sauer sind. Das am leichtesten zugängliche Casein ist das Casein der Kuhmilch. Unter dem Namen „Casein“ schlechthin ist daher stets das Casein der Kuhmilch zu verstehen.


Darstellung. 400 ccm mit der Centrifuge möglichst entfetteter Kuhmilch werden mit 4 Liter Wasser verdünnt (um das Ausfallen des Caseins in Klumpen zu verhindern) und nun bei 35—40° C entweder mit Labessenz behandelt oder mit etwa 85 ccm auf das Zwanzigfache verdünnter Essigsäure (von 30 Proc) versetzt — Das Casein fällt in grossen Flocken aus, welche sich leicht absetzen und erst durch Dekanthiren, später nach sorgfältigem Zerreiben mit Wasser auf dem Filter mit Wasser ausgewaschen werden. Man löst den Niederschlag alsdann unter Umrühren in möglichst wenig 0,1 procentiger Natronlauge auf, wobei die Flüssigkeit nicht alkalisch werden darf, filtrirt durch Filter aus mehrfacher Lage Filtrirpapier, säuert das Filtrat mit sehr verdünnter Essigsäure an, wodurch das

Casein wiederum gefällt wird und wiederholt diese Fällung und Auflösung mindestens 3—4 Mal — Dann presst man den ausgewaschenen Niederschlag nicht zu stark aus, zerreibt ihn mit 97procentigem Alkohol, wäscht ihn zunächst mit Alkohol, dann mit Aether bis zur völligen Entfettung aus, lässt ihn zunächst an der Luft, später im Trockenschranke trocknen und pulvert ihn

Eigenschaften. Das reine Casein (*Caseinum purissimum*) stellt im feuchten Zustande weisse, flockige Massen dar, welche beim Eintrocknen schwach gelbliche Färbung und hornähnliche, durchscheinende Beschaffenheit annehmen. Das Pulver ist weiss, mit einem Stich ins Gelbliche, fast ohne Geruch und Geschmack. Es ist unlöslich in Wasser, in Kochsalzlösung, in Alkohol und in Aether, beim Kochen mit Wasser oder mit Alkohol dagegen wird es zersetzt.

In Wasser, welches Alkalien enthält, löst es sich auf, ebenso ist es löslich in nicht zu stark verdünnter Salzsäure. Die alkalischen Lösungen des Caseins gerinnen beim Erhitzen nicht, es scheidet sich auf der Oberfläche — wie bei der Milch — lediglich eine unlösliche Haut ab — Aus kalksalzfreien Lösungen wird das Casein durch Labferment nicht als Coagulum abgeschieden. Diese Abscheidung tritt erst ein, wenn die Caseinlösungen genügende Mengen von Calciumphosphat oder eines anderen Calciumsalzes enthalten. Streut man Casein auf feuchtes blaues Lackmuspapier, so färbt es dieses an den betroffenen Stellen roth, der wässrige Auszug des Caseins aber reagirt nicht sauer.

Nach HAMMARSTEN ist die Zusammensetzung des Caseins



Giesst man eine alkalische Caseinlösung in überschüssige starke Mineralsäure, so scheidet sich Acidcasein ab, eine Verbindung von Casein mit Mineralsäure, welche in viel Wasser löslich ist — Das Casein der Frauenmilch ist wahrscheinlich nicht identisch mit demjenigen der Kuhmilch. Demjenigen der Frauenmilch stehen näher die Caseine der Stutenmilch und der Eselinnen-Milch.

Prüfung. 1) Casein sei ein fast weisses Pulver mit nur schwach gelblichem Schein und zeige weder kaseartigen (pikanten) Geruch noch desgleichen Geschmack. 2) Es sei ein trockenes Pulver und nicht zu Klumpen zusammengeballt oder zusammengeflossen. 3) Wird 1 g Casein mit 10 cem Wasser angeschlammt und durchgeschüttelt, so darf das Filtrat weder blaues Lackmuspapier rothen, noch rothes Lackmuspapier bläuen, auch nach dem Verdampfen (Pepton) und Glühen einen wagbaren Rückstand nicht hinterlassen. 4) Das gleiche Verhalten müssen die alkoholischen (Milchzucker) und ätherischen (Fett) Auszüge zeigen. 5) Der Aschengehalt soll nicht wesentlich mehr als 1% betragen. 6) An der Luft in dünner Schicht ausgebreitet, darf Casein nach Verlauf einiger Stunden weder feucht werden, noch einen widerlichen Geruch annehmen.

Aufbewahrung. In wohlverschlossenen Gefässen, vor Feuchtigkeit und fremden Gerüchen geschützt.

Anwendung. Das reine Casein ist von SALKOWSKI als ernährendes Präparat empfohlen worden. Es wird vom Magen und Darne der Kranken und Rekonvalescenten gut ausgenutzt, ohne, wie die Peptone, den Verdauungskanal zu reizen — Man giebt es 1) in Form von Cakes. 2) In flüssiger Form mit Natriumphosphat. Man versetzt 20,0 g trockenes Casein mit 2,0 g krystall. Natriumphosphat und 200,0 cem Wasser und erhitzt einige Zeit auf dem Wasserbade. Man erhält eine milchweiss filtrirende Flüssigkeit von theils gelbem, theils gequollenem Casein, welche ca 9 Proc Eiweiss enthält. Man fügt Zucker und Vanillin oder Chokolade hinzu, worauf die Flüssigkeit wie Milch genossen werden kann. 3) Als Zusatz zu Fleischbrühe und heissen Suppen, weil es in ihnen nicht gerinnt.

Caseinum technicum. Technisches Casein. Erheblicher als in der Therapie ist der Verbrauch des Caseins in der Technik. Ein Casein für technische Zwecke erhält man, indem man möglichst stark entrahmte Milch (Centrifugen-Magermilch) mit Essigsäure ansäuert, das ausgeschiedene Casein mit Wasser wäscht, bis das ablaufende nicht mehr sauer reagirt, alsdann trocknet. Es ist ein schwach gelbes, schwerer und unvollkommener als Casein

reines lösliches Pulver mit einem Aschengehalt von 5–6 Proc. Die Verwendung ist mannigfacher Art, es dient z. B. zur Herstellung feuer- und wasserbeständiger Anstrichfarben. In der Wärme und unter Druck wird Casein in Wasserglas gelöst und daraus mit Farbstoffen beschwert (D. P. 72801). Caseinalkalien und -Erdalkalien werden in der sogenannten Caseinmalerei verbraucht (D. P. 85057). Zum Leimen von Papier dient in der Papierfabrikation Casein-Ammoniak (D. P. 25757). Die Entstehung von Caseincalcium aus ammoniakalischem Caseinleim und Kalkmilch benutzt man gleichfalls mit Vortheil zum Kitten und Leimen (D. P. 66202). Bei der Wichsefabrikation soll Casein-Borax- oder Casein-Sodalösung ein säurefreies Produkt liefern, welches das Leder schont und demselben einen hohen Glanz verleiht (D. P. 52588). Sägespäne und andere Holzabfälle, mit Caseinlösung imprägnirt, erhitzt und in Platten von jeder beliebigen Form gepresst, haben ein dauerhaftes und leichtes Wärme-Isolungsmaterial gegeben (Fußbodenplatten) (D. P. 73072). Die Eigenschaft des Caseins, bei dem Coaguliren Farbstoffe, Fette, Öle etc. mit niederzureissen, macht es in manchen Fällen zu einem ausgezeichneten Klärmittel.

II Casein-Natrium Nutrose. Natrium caseinicum. Ist das für Phenolphthalein saure Natriumsalz des Milchcaseins und wird fabrikmässig durch die Höchster Farbwerke dargestellt (D. R.-P. 85057).

Darstellung. Man bereitet, wie unter Casein angegeben ist, aus Magermilch Casein, wäscht es aus und stellt durch Titration fest, wie viel Natronhydrat dieses noch feuchte Casein zur Bildung des gegen Phenolphthalein neutralen Salzes (d. h. Phenolphthalein als Indikator) verbraucht. Man löst nun das Casein in ein wenig mehr als der Hälfte dieser Menge Natronhydrat-Lösung auf (d. h. man setzt soviel Natronhydrat hinzu, als gerade zur Auflösung nöthig ist), und kann nun nach zwei Verfahren das trockene Präparat gewinnen. A. Man dampft die Lösung im Vakuum zur Trockne, pulvert den Rückstand und zieht ihn mit Alkohol aus zur Beseitigung etwa überschüssig vorhandenen Alkalis. B. Man fällt die konc. wässrige Lösung mit Aceton. Der sich flockig abscheidende Niederschlag wird mit Alkohol und Aether gewaschen und getrocknet.

Eigenschaften. Ein amorphes, weisses, fast geruch- und geschmackloses Pulver, welches in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leicht löslich ist. In Alkohol und in Aether ist es unlöslich. Es ist gegen Lackmus neutral, gegen Phenolphthalein aber sauer. Beim Erhitzen stösst es unangenehm riechende Dämpfe aus, verkohlt und verbrennt schliesslich unter Hinterlassung einer alkalisch reagirenden Asche, welche neben Spuren von Eisen vorzugsweise Natriumkarbonat enthält. Nach AURACHER ist die Zusammensetzung der Nutrose

Erweissesubstanz	65,2	Mineralstoffe	4,15
Wasser	10,5	Stickstofffreie Substanz	20,15

Die Nutrose ist nach RÖHMANN die zur Ernährung geeignetste Caseinverbindung, sie wird im Darm verarbeitet, ohne denselben zu reizen, und vermag den zur Ernährung erforderlichen Stickstoff vollständig zu liefern. Man giebt sie in Wasser, Milch, Cacao, Bouillon, ohne den Geschmack und das Aussehen dieser Lösungsmittel wesentlich zu beeinflussen.

III. Eucasinum Eucasin. Casein-Ammoniak. Casein Ammonium.

Darstellung. Man leitet über feingepulvertes, trockenes Casein Ammoniakgas, welches unter Selbsterwärmung aufgenommen wird. Sobald das Casein in Wasser sich fast klar auflöst, wird die Einleitung unterbrochen, wozu übrigens bei dem hohen Molekulargewicht des Caseins nur wenig Ammoniak erforderlich ist.

Man kann auch das Casein in Alkohol, Aether, Benzin und dgl. vertheilen und in dieser Mischung die Sättigung des Caseins mit Ammoniakgas ausführen.

Eigenschaften. Weisses oder schwach gelblich-weisses, fast geruch- und geschmackloses, bez. schwach käseartig riechendes Pulver, das in warmem Wasser zu einer milchigen Flüssigkeit auflöslich ist. Beim Erwärmen mit Natronlauge wird Ammoniak in Freiheit gesetzt.

Anwendung Nach SALKOWSKI u. A. ist es ein leicht verdauliches, denkbarst konzentriertes Kraftigungsmittel für Bleichsüchtige, Magen- und Lungenleidende, Genesende, da es leicht und ziemlich vollständig verarbeitet wird, Magen und Darm nicht reizt und keine Diarrhoen erzeugt. Man giebt es 2–4 Mal täglich zu je 1 Esslöffel in heißen Getränken (Kaffee, Chokolade) oder in Suppen (Bouillon, Mehlsuppen, Haferschleim). Da es keine Nucleinverbindungen enthält, so eignet es sich besonders auch zur Ernährung bei gerichtlichen Processen. Mit Wein und Bier verträgt sich das Präparat nicht.

IV Caseojodin Durch Erwärmen eines Gemisches von 80 Th Casein und 20 Th Jod unter Umrühren bei Wasserbadtemperatur und Extrahieren des Produktes mit Aether hat LIEBRECHT ein von ihm „Perjodcasein“ genanntes Produkt als gelbes Pulver erhalten, welches lufttrocken einen Gehalt von 17,8 Proc Jod hat. In diesem Perjodcasein ist ein Theil des Jods fester, ein anderer Theil locker gebunden.

Behandelt man dieses Produkt mit Natriumthiosulfat, so wird es entfärbt. Wascht man es nunmehr mit Wasser aus und trocknet es durch Behandeln mit Alkohol und mit Aether, so resultirt ein Jodcasein, welches im Durchschnitt 5,7 Proc Jod in fester Bindung enthält.

Das Präparat ist noch nicht recht über das Versuchsstadium hinausgekommen.

Alkaloid-Casein-Verbindungen Die Darstellung von Verbindungen, welche Alkaloide und Casein enthalten, geschieht, indem man die Lösung eines Alkaloides auf Casein einwirken lässt bei Gegenwart eines Alkali (E. THOMAS-Aachen, Amerik. Patent 626110).

Argonin L. Während das gewöhnliche Argonin (s. S. 381) nur durch kochendes Wasser gelöst werden kann, löst sich dieses von den höchsten Farbwerken neuerdings in den Handel gebrachte Präparat schon in kaltem Wasser, und die Lösungen sollen Monate lang unverändert bleiben. Der Gehalt an Silber beträgt 10 Proc. Zur Anwendung gelangt Argonin L. in 1 procentiger Lösung.

Caseinum tannicum, Tannocasinum, empfiehlt G. ROMMEL als Ersatz von Tannalbum, Tannigen, Tannoform und anderer Darmadstringenten der letzten Jahre.

Zur Darstellung wird 1 k gereinigtes Casein mittels Natriumkarbonat in 10 Litern Wasser gelöst und unter Umrühren mit einer Lösung von 700 g Tannin und 100 ccm Formaldehyd in 3 Litern Wasser versetzt. Das Gemisch wird mit stark verdünnter Salzsäure übersättigt, der dadurch entstandene Niederschlag abgepresst, durch Erwärmen gehärtet und getrocknet. — Das so erhaltene Produkt ist von hellgrauer Farbe und lässt sich leicht pulvern. Es widersteht der Magenverdauung und wird erst durch die Darmverdauung in Lösung gebracht.

Caseinfirmisse. Deckende Arzneiformen zur Aufnahme von Arzneistoffen. A. Boracasin-Firmis nach BEIERSDORF: 5 Th Casein, 0,6 Th Borax und 25 Th Wasser werden unter Erwärmen zu einem Firmis gelöst. B. Glycerin-Casein-Firmis nach BEIERSDORF: 1 Th Casein wird in der Kälte in 3–3½ Th stärkstem Ammoniak (von 25 Proc.) gelöst. Man erwärmt alsdann diese Lösung mit 1 Th Glycerin und verflüchtigt das Ammoniak. Die zurückbleibende Masse löst sich in 2 Th kochendem Wasser im Dampfbade zu einer schönen Emulsion, aus welcher sich pulverförmige Zusätze nicht leicht abscheiden.

Casein-Leim. A. Trockenes Casein wird mit verdünnter Borax-Lösung oder mit Ammoniak u. s. bis zur schwach alkalischen Reaktion behandelt. B. Frisch gefälltes Casein 100,0 Th werden mit 8 Th gelöschem Kalk in Lösung gebracht und mit 20 bis 30 Th Wasserglas versetzt. Beide Leime sind bald zu verarbeiten.

Casein-Porcellan-Kitt. Man löst 1 Vol frisch gefälltes Casein in 3 Vol Natron-Wasserglaslösung.

Gummi arabicum-Ersatz, bei den hohen Preisen der natürlichen Gummisorten zu technischen Zwecken vielfach angewendet, sind Lösungen von frisch gefälltem Casein in wässriger Boraxlösung.

Oberflächenglanz Kitt für Leder, Borax-Casein-Kitt. Ist eine Auflösung von frisch gefälltem Casein in wässriger Boraxlösung.

Sanatogen ist ein aus Milcheasein dargestelltes glycerinphosphorsaures Casein-Natrium. Das Präparat ist in Wasser leicht löslich, und ist vor dem Vermengen mit Suppen etc. mit Wasser anzurühren.

Trockene Casein-Salben nach O. TROLOWITZ (D. R.-P. 79118). Gereinigtes, getrocknetes und zerkleinertes Casein wird in einer Mischung von Ammoniak und Glycerin 5:5 gelöst. Nach Verjagung des Ammoniak durch Erhitzen giebt die Lösung mit

Fetten Emulsionen, welche auf die Haut gestrichen in kurzer Zeit zu elastischen Ueberzügen eintrocknen

Unguentum Caseini Unna. Caseini sicc. 14,0, Alkal. (aus 4 Th Kalihydrat und 1 Th Natronhydrat) 0,43, Glycerini 7,0, Vaselini 21,0, Antisepticum 1,0, Aquae 56,57 Alkalisches Zusatz, z. B. Sapo kalmus, verdicken die Konsistenz der Salbe. Noch stärker wirken die Ichthyol Salze, weshalb diese mit Wasser zu verdünnen sind. Rosorein, Pyrogallol und Zinkoxyd vermindern dagegen die Konsistenz — Caseinsalben sollen wegen der starken Wasser-Verdunstung am besten in Zinntuben abgegeben werden

Cassia.

Gattung der **Cassalpinaceae**—**Cassiaceae**.

I Mehrere Arten liefern die Sennesblätter (vergl. Senna)

II Andere Arten finden wegen des reichen Gehaltes an Gerbstoff technische Verwendung, so die Rinde von **C. auriculata L.** aus Ostindien mit 20 Proc. Gerbstoff, die von **C. florida Vahl** mit 4 Proc., die von **C. Roxburghii D. C.** mit 6 Proc., die von **C. grandis L.** f. etc.

III Zahlreiche Arten finden arzneiliche Verwendung, so von **C. alata L.** die Blätter und Blüten gegen Hautkrankheiten (Herpes), von **C. occidentalis L.** die Blätter gegen Erysipelas, **C. Tora L.** die Samen gegen Hautkrankheiten und gegen Augenleiden etc.

IV Die Samen von **C. occidentalis L.**, sowie die von **C. Sophora L.** liefern Kaffeesurrogate (vergl. Coffea)

V. Cassia fistula L. (syn. *Bactrylobium fistula* Willd.), heimisch im tropischen Asien, in Amerika und Afrika kultivirt. Mit langer, hängender, stielrunder Hülse, quer gefächert, in jedem Fach ein Same in einem süßen Fruchtmus, das ähnlich wie das von Tamarindus verwendet wird. Es enthält bis 70 Proc. Zucker und bis 3 Proc. Gerbstoff.

Ausser dieser Art werden die Hülsen verwandter Arten (wie die von **C. grandis L.** f. „Casse du Brésil“ Gall.) ebenso verwendet. Die Blüten wirken abführend, die Rinde wird des Gerbstoffgehaltes wegen, ebenso das Holz technisch verwendet.

Fructus Cassiae Fistulae (Austr. Helv.) **Cassia Fistula** (U-St.) **Röhrenkassie.** **Purgirkassie.** **Casse** (Gall.) **Purgung Cassia.** Beim Einkauf prüfe man, ob der Fruchtbrei nicht zu sehr ausgetrocknet, nicht schimmelig und von Insekten zerfressen ist.

Pulpa Cassiae Fistulae (Austr.) **Cassiae Pulpa** (Brit.) **Cassienmus, Kassienmark, Cassia Pulp, Pulpe de Casse** (Gall.)

Fruchtmus, Querwände und Samen werden den Früchten entnommen und wie Pulpa Tamarindorum (siehe dort) zu einem Mus verarbeitet. Dasselbe soll honigartig riechen und angenehm süß schmecken. Auch hier ist das von DIETZICH für Tamarindenmus empfohlene Beschleunigungsverfahren anwendbar.

Ausbeute 120—130 Proc. der ganzen Röhrenkassie. Wie die folgenden in Porcellan- oder Steingutgefäßen zu verarbeiten und aufzubewahren.

Conserva Cassiae. **Conserve de Casse** (Gall.) **Cassienmus** 50 Th. erweicht man im Wasserbade mit destill. Wasser 50 Th., fügt Zuckerpulver 125 Th. hinzu und dampft ein auf 200 Th.

Extractum Cassiae, Extrait de Casse (Gall.) **Röhrenkassie, Kaltes destill. Wasser** gleiche Theile. Man erweicht den Inhalt der Früchte in Wasser, seht ohne zu pressen durch, wäscht mit Wasser nach und dampft zu einem weichen Extrakt ein.

Tisane de Casse (Gall.) **Cassienmus** 20 g, siedendes Wasser 1000 g, nach 1 Stunde durchseihen.

VI Flores Cassiae, Clavelli Cassiae, Zimtblüthen, Caneelblüthen, Zimtnägeln sind die abgeblühten und vertrockneten Blüten einer Cinnamomumart, vielleicht von **C. Cassia Blume** oder **C. Loureirii Nees**. Sie sind keulenförmig, bis 12 mm lang, zum Theil gestielt, hart, fast holzig, grobrunzelig, graubraun oder schwarzbraun. Jedes Stück besteht aus dem becherförmigen Untertheil des Kelches, der nach abwärts

stielartig verschmälert ist, und nach oben in den undeutlich sechstheiligen Saum ausläuft, der den Fruchtknoten umschliesst — Geruch und Geschmack nach Zimmt

Für den Nachweis des Pulvers kommen in Betracht die einzelligen, dickwandigen Haare

Sie enthalten bis 1,9 Proc ätherisches Oel vom spec Gew 1,031 und mit einem Gehalt von 80,4 Proc Zimmtaldehyd Die Blütenstiele liefern 1,7 Proc ätherisches Oel vom spec Gew 1,046 mit 92 Proc Zimmtaldehyd

Man verwendet sie hier und da als Gewürz, in der Heilkunde sind sie obsolet

VII Cassia caryophyllata, Cortex Caryophyllati, Nelkenzimmt, Nelkenkassie, ist die Rinde des zu den Lauraceae—Persoidae gehörigen **Dicypellum caryophyllatum (Mart) Nees**, heimisch in Brasilien

Sie bildet lange, 2 Finger dicke Cylinder, die aus mehreren in einander gesteckten Röhren bestehen Die Rinde ist bis 2 mm dick, dunkel rothbraun Im Allgemeinen vom Bau der Lauraceenrinden (vergl Cinnamomum), aber im Bast keine Fasern, nur zuweilen Gruppen von Steinzellen Geruch und Geschmack nach Nelken und Zimmt.

Dieser echten Rinde werden andere Lauraceenrinden von ähnlichem Geruch und Geschmack substituirt, eine genauer untersuchte, wohl von einer Cinnamomumart abstammend, enthielt im Bast Fasern.

Castanea.

Gattung der Fagaceae.

I. Castanea vulgaris Lam (syn. *C vesca* Gärt.) Edelkastanie. Echte Kastanie. Maronenbaum. Castanier. Châtaignier Marronier d'Europe. Heimisch in den Mittelmeerländern, durch Kultur weit verbreitet.

Medicinische Verwendung finden die Blätter, **Folia Castaneae** (Ergänzb), Edelkastanienblätter. Sie sind länglich-lanzettlich, lang-zugespitzt, am Rande gesägt, etwas ledrig

Extractum Castaneae fluidum (Ergänzb) Aus 100 Th grob gepulverter Blätter und einer Mischung aus 3 Th Weingeist und 7 Th Wasser bereitet man durch Verdrängung 100 Th. Fluidextrakt Innerlich 2—3 stündlich 0,5—2,0 g als krampfmilderndes Mittel bei Keuchhusten

Keuchhustenmittel.

I	
Rp	Extracti Castaneae fluidi
	Sirupi Senegae aa.
II	
Rp	Extracti Pulsatillae
	Extracti Hyoscyami aa 1,0
	Aquae Amygdalarum amar
	Extracti Castaneae fluidi aa 10,0
	Infusi Ipecacuanhae 1,0 100,0
	Morphini hydrochloridi 0,02
	Sirupi Althaeae 50,0
Täglich 3—5 Theelöffel voll	

Keuchhustenmittel des Apothekers NAUMANN.

Rp	Tartari stibiat	0,06
	Aquae destill	500
	Sirupi Sacch	100
signa No I		
Rp	Extracti Castaneae fluidi	
	Sirupi Sacchari aa 30,0	
signa No II		
Zweistündlich 1 Theelöffel voll im Wechsel —		
Kindern unter 1 Jahr nur No II, zweistündlich		
¼ Theelöffel voll		

Sirupus pectoralis

Hustensaft für Kinder (Vomáška).

Rp	Ammonii chlorati	10,0
	Ammonii bromati	3,0
	Extr Castaneae fluidi	40,0
	Sirupi Ananassae	100,0
	Sirupi Senegae	80,0
	Glycerini purissimi	67,0
	Sirupi Sacchari	200,0

Thymobromal von Dr BLOCH, ein Sirup gegen Keuchhusten enthält Extr Castan. veso, Extr Thymi frigid par und Bromalhydrat

Die Früchte, Maronen, sind ein im Süden viel verwandenes Nahrungsmittel

Sie enthalten nach KOENIG

	Wasser	Stickstoff- haltige Sub- stanz	Rohfett	Stickstoff- freie Ex- traktstoffe	Rohfaser	Asche	In der Trockensubstanz		
							Stick- stoffsub- stanz	Stick- stofffreie Extrakt- stoffe	Stickstoff
Procent									
Nicht geschält	89,82	3,8	2,49	43,71	8,09	2,09	6,31	72,61	1,01
Geschält	7,34	10,76	2,9	73,04	2,99	2,97	11,61	78,82	1,86

Der Gehalt an Stärke beträgt durchschnittlich 29 Proc, der an Fett 1,7 Proc. Die Stärkekornchen sind bis 20 mm gross, meist einfach, sehr mannigfach gestaltet, Schichtung kaum zu sehen, häufig mit Spalt im Centrum. Die in Nordamerika heimische Varietät *pumila* hat 36 Proc Stärke und 7 Proc Fett. Die Rinde enthält 4—12 Proc Gerbstoff.

II Castanea dentata Marshall

Castanea, Chestnut (U St)

Die im September—Oktober gesammelten Blätter dienen zur Bereitung des *Extractum Castaneae fluidum* (U-St). 1000 g Blätterpulver (No 30) übergiesst man mit 5 l sied. Wasser, presst nach 2 Stunden aus, erschöpft im Perkolator mittels Wasser, dampft die vereinigten Auszüge auf 2000 ccm ein, fügt 600 ccm Spiritus zu, filtrirt, dampft auf 700 ccm ein und stellt durch Glycerin 100 ccm, Spiritus q s 1000 ccm Extrakt her.

III Castanea javanica Blume, hat purgirend wirkende Früchte

IV *Aesculus Hippocastanum* L. (Hippocastanaceae) Rosskastanie. Heimisch in Nordgriechenland. Durch die Kultur weit verbreitet.

Liefert *Cortex Hippocastani*, die vor Entwicklung der Blätter gesammelte Rinde der dünnen Zweige. Aussen graubraun, auf dem Bruch fast fleischfarbig, oft mit den halbkreisförmigen Narben der abgefallenen Blätter.

Bastfasern in spärlichen Bündeln, von Steinzellen umlagert, die auch selbständige Gruppen bilden. Oxalat in Einzelkrystallen und Drüsen. Markstrahlen einreihig.

Enthält Aesculin, Aesculetin, 2 Proc Kastaniengerbsäure, und einen dem Morin ähnlichen Körper.

Früher als Fiebermittel im Gebrauch, jetzt ziemlich obsolet. Die Frucht, *Fructus Castaneae equinae* enthält nach KOENIG Wasser 14,88 Proc, Stickstoffhaltige Substanz 6,83 Proc, Rohfett 5,14 Proc, Stickstofffreie Extraktstoffe 68,25 Proc, Rohfaser 2,78 Proc, Asche 2,22 Proc.

Von intensiv bitterem Geschmack, weshalb die Nutzbarmachung der Stärke auf Schwierigkeiten stösst. Es soll möglich sein, sie mit Sodaauflösung zu entbittern.

Hin und wieder als Zusatz zu Schnapppulvern.

Tinctura Hippocastani concentrata ist als Mittel gegen Haemorrhoiden empfohlen worden (Pharm. Zeitung 1896, pag 254).

Oleum Hippocastani, *Antigoutteux Gènevoix*. Mittel gegen Rheumatismus. Die gepulverten Samen werden mit Aether extrahirt und dieser dann verjagt.

Pulvis cosmeticus WIGLES

Rp Sem. excorticat Hippocastani	1000,0
Amygdal am	500
Rhin. Ind pulv	40,0
Natr carbon alcc	10,0
Ol. Bergamott	2,0

Zum Waschen gegen raube Hände

Antiarthrinipillen von L. SALL in Kempten, gegen Gicht, bestehen aus Rosskastanienextrakt, Salicin, Salganin, Salzsäure, Dextrose (E. MERCK).

Kastanienextrakt aus Esseg gegen Kesselstein, ist aus Rosskastanien bereitet.

Castoreum.

Castoreum (Anstr. Helv. Ergänzb. Gall.) **Bibergeil.** **Castor.**

Beschreibung Das Bibergeil ist ein Sekret, welches sich in eigenthümlichen Beuteln des Bibers **Castor Fiber L.** (Abtheilung der Nagethiere **Rodentia**, Familie der **Castoridae**) befindet, die mit dem Geschlechtsapparate in Verbindung stehen. Es ist also gebräuchlich, unter diesem Namen „die Beutel mit dem Sekret“ zu verstehen. Sie finden sich bei beiden Geschlechtern (gewöhnlich kommen aber nur die grösseren männlichen in den Handel) paarweise unter der Haut und stehen durch einen gemeinschaftlichen Ausführungsgang mit dem Vorhautkanal des Männchens und mit der Scheide des Weibchens in Verbindung. Sie sind birnförmig, bis 12 cm lang, bis 4 cm dick, die Haut ist geschichtet. Der Inhalt ist im frischen Zustand flüssig, gelblich, in den trockenen, meist im Rauche getrockneten Beuteln ist er spröde, dunkelbraun glänzend, von charakteristischem Geruch und bitterlich starkem Geschmack. Die Beutel hängen meist noch paarweise zusammen.

Man unterscheidet zwei Sorten. 1) Sibirisches Bibergeil, **Castoreum Sibiricum**, **Castoreum Moscoviticum** aus Sibirien, zu dem auch etwa vorkommendes europäisches Bibergeil gerechnet wird. Diese Sorte ist ausserordentlich selten und theuer. Sie wird nur dispensirt, wenn sie ausdrücklich verlangt wird. 2) Canadisches Bibergeil, **Castoreum Canadense**, **Castoreum Americanum**, **Castoreum Anglicum**, abstammend von der amerikanischen Varietät des Bibers, die von manchen für eine besondere Art **Castor Americanus Cuvier** gehalten wird, gegenwärtig hauptsächlich aus den westlichen Staaten von Nordamerika, weniger aus Labrador und Neufundland in den Handel kommend. Die gewöhnliche, officinelle Sorte. Die Beutel sind aussen schwarzbraun, grobrunzlig, der Inhalt reichlich von Hautlamellen durchsetzt.

Heisses Wasser nimmt nur wenig auf, die Lösung wird beim Erkalten weisslich-trübe, beim Erwärmen wieder klar und gelblich. Mit Eisenchlorid färbt sich die Lösung schmutzig-grünlich. Aether und Alkohol lösen den grössten Theil, die Lösung ist tiefgelb bis braun und giebt auf Wasserzusatz reichliche, weisse Fällung.

Bestandtheile. Wenig bekannt. Enthält bis zu 2 Proc. ätherisches Oel, etwas Phenol (vielleicht vom Ranchern herrührend). Aus der heiss bereiteten alkoholischen Lösung scheidet sich beim Erkalten eine krystallinische wachsartige Substanz ab (Castorin), während ein Harz (Castoreum-Resinoid) in der Lösung bleibt (in Cast. Moscovit 58,5 Proc. und Cast. Canad. 12 Proc.). Ferner Benzoesäure, Salicin und Salicylsäure und angeblich ein Glukosid. Endlich Calciumphosphat 1,4 Proc. und Calciumkarbonat bis 33 Proc.

Aufbewahrung Frische, dem getödteten Biber entnommene Beutel verlieren beim Trocknen an der Luft bis 65 Proc. an Gewicht.

Die Beutel werden sorgfältig, doch ohne Anwendung künstlicher Wärme, nachgetrocknet, da sie sonst leicht schimmeln, und in dicht verschlossenen Glasgefässen aufbewahrt. Das Pulver bereitet man aus dem nöthigenfalls über Aetzalk getrockneten Bibergeil, halt davon aber nur einen geringen Vorrath und vor Licht geschützt¹⁾ — Da man beim Nachtrocknen der Beutel über H_2SO_4 bis zu 40 Proc. Gewichtsverlust beobachtet hat, so darf beim Einkauf dieser theuern Waare der Feuchtigkeitsgehalt nicht unberücksichtigt bleiben.

Verfälschungen kommen vor, indem man die Beutel öffnet, ihnen den Inhalt theilweise entnimmt, dafür getrocknetes Blut, Sand, Sagespähne, Harz, getrocknetes Fleisch hineinthat und sie wieder zunäht oder verklebt. Solche Beutel sind schon äusserlich leicht zu erkennen — Solche, die faulig riechen, sind zu verwerfen.

¹⁾ Gall lässt bei 25°C trocknen, die äusseren und inneren Haute verwerfen.

Zuweilen kommen kleinere Beutel mit gelbem, öligem Inhalt vor. Das sind die sogen. Oelsäcke, die der Biber neben den Castoreumbuteln führt. Sie sind natürlich ebenfalls nicht zu verwenden.

Anwendung. In Pillen oder Pulvern zu 0,2–1,0 g, als Tinktur, selten im Klystier zu 1,0–4,0, oder in Suppositorien.

Tinctura Castorei. Austr. Bibergeil 2, Verd. Weingeist (60 proc.) 10. Ergänzt Helvet. Bibergeil 1, Weingeist 10. Gall. Bibergeil 10, Weingeist (80 proc.) 100. — Wird durch reichlichen Wasserezusatz milchig-lehmfarbig, scheidet mit NH_3 unlösliches Harz ab. — Bei Hysterie zu 1–3 g.

Tinctura Castorei aetherea. Ergänzt Bibergeil 1, Aether 2,5, Weingeist 7,5. Gall. (Teinture étherée de Castoreum, *Ethérolé de Castoreum*) Bibergeil 10,0, Aether (spec. Gew. 0,758) 100.

Tinctura Castorei Sibirici. Ergänzt Sibirisches Bibergeil 1, Weingeist 10. — Soll durch Wasserezusatz nur opalisierend werden, mit NH_3 klar ohne Harzabscheidung.

Tinctura Castorei Sibirici aetherea. Ergänzt Sibir. Bibergeil 1, Aether 2,5, Weingeist 7,5.

Aqua Castorei (Pruus. Taxe 1897)

Rp Castorei grosso in pulv.	1,0
Spiritus	1,0
Aquae	12,0

Nach 12stündigem Digeriren werden 8,0 abdestillirt.

Ellixir uterinum CAOLLIUS

Rp. Tincturae Castorei Canad.	15,0
Tincturae Absinthii	
Tincturae Croci	aa 5,0
Olei Anisi	guttae X

Guttas antihystericae LEBERT

Rp. Tincturae Castorei Canad.	
Tincturae Valerianae aeth.	aa 10,0
Tincturae Opii crocatae	5,0

Liquor anodynus TRILLER.

Rp. Tincturae Castorei Canad.	
Liquoris Ammonii vinosi	
Tincturae aromaticae	
Tincturae Croci	aa 5,0
Olei Macidis	1,25
Aquae aromaticae	30,0
Spiritus absoluit	10,0

Mixtura antispasmodica SYDENHAM

Rp. Tincturae Valerianae	
Tincturae Castorei Canad.	aa 5,0
Spiritus aetherei	gtta. XV
Aquae Foeniculi	100,0

Krampftropfen, Königsseer. Spirit. aether. 10,0, Spirit. Aetheris nitros. Tinct. Castorei, Tinct. Opii, Tinct. Valerian. aa 2,0.

Marderwitterung. Tinct. Castorei Canadensis 2,0, Tinct. Moschi 1,0, Olei Anisi 1,0 oder Castorei 0,1, Radic. Valerian. 2,5. Auf die Falle zu legen.

Mutterkolik-Essenz, Königsseer ist eine Tinktur aus Bibergeil, Safran, Nelken, Rhabarber, Zimmt, Pomeranzen, Zitwer- und Schlangenzwurzel.

Pilulae antispasmodicae RAYNE.

Rp. Assae foetidae	
Castorei	
Extracti Valerianae	
Galbani	aa 1,0

M. f. pilul. 20. 3 Mai. 3g. 1 Pille.

Suppositoria antispasmodica BOUCHARDAT

Rp. Castorei Canad. subit. pulv.	10,0
Olei Cacao	50,0

M. f. supposit. 5.

Tinctura Castorei camphorata

Rp. Tincturae Castorei Canad.	5,0
Spiritus camphorati	4,0

Tinctura Castorei composita

Rp. Castorei Canadensis	
Assae foetidae	aa 5,0
Liquoris Ammonii caust.	20,0
Spiritus	50,0

Tinctura axeltiana (Form mag. Berol.).

Rp. Tincturae Castorei	5,0
Tincturae Valerianae	10,0

D. S. 2stündl. 10 Tropfen.

Witterung für Bauwüchter Nach DISTENHOF

Rp. Castorei Canadensis	5,0
Moschi	0,5
Zibethi	0,2
Olei Cascariillae	
Olei Valerianae	
Olei Angelicae	
Olei Patchouli	aa guttae V
Amyli Tridici	100,0

Das Pulver darf nicht mit den Händen berührt werden.

Catechu.

Catechu (Austr. Germ. Hely. U-St.) *Catechu nigrum*. Terra Japonica. *Extractum* s. *Succus Catechu*. — *Acacien-Catechu*. Kutsch. *Pegu-Catechu*. — *Cachou de Pégu*. *Caschuttie* (Gall.) *Terre du Japon*. — *Black Catechu* (*Catechu Ph. Brit.* siehe unter *Gambir*). Germ. fasst unter dem Namen *Catechu* dieses und *Gambir* zusammen.

Beschreibung. Man gewinnt das Catechu durch Auskochen des Holzes der *Acacia Catechu* Willd., heimisch in Vorder und Hinterindien und auf Ceylon, und der *Acacia Suma* Kurz, heimisch in Vorderindien und im tropischen Ostafrika. Das zer kleinerte Holz wird in Töpfen mit Wasser ausgekocht, der Auszug eingedickt, worauf man ihn an der Sonne völlig eintrocknen lässt. Kommt in verschiedenen Sorten aus Vorder und Hinterindien in den Handel.

1) Pegu- oder Bombay-Catechu, die gebräuchlichste Sorte. Undurchsichtige, dunkelbraune bis lederfarbige Masse von meist glänzendem, muschligem oder scharfkantigem Bruch, zuweilen im Innern noch weich. Kommt meist in grossen, von Blättern (*Dipterocarpus*) durchsetzten und darin eingebüllten Blöcken, seltener in kleinen Kuchen in den Handel.

2) Bengalisches C bildet schmutzig graubraune Klumpen von kastanienbraunem Bruch.

3) C von Malacca, in quadratischen Tafeln, aussen braun, innen hell-zimmtfarben.

4) Kamaon C (Pale Cutch), schmutzig-graubraune, poröse, erdige Würfel.

Unter dem Mikroskop erscheint Catechu meist amorph (speziell die 1 Sorte), doch kommen auch reichlich krystallinische Sorten vor (so die 4 Sorte). Behandelt man eine kleine Probe mit Essigsäure und untersucht den unlöslichen Rückstand unter dem Mikroskop, so findet man an pflanzlichen Resten besonders Bruchstücke von Gefässen und Holzfasern (Unterschied von Gambir).

Bestandtheile 2—10 Proc Catechin $C_{15}H_{11}O_6$, [25—48 Proc Catechugerbsäure $C_{25}H_{34}O_{16}$, wenig Quercetin, 20—29 Proc Pflanzenschleim, 2,0—2,8 Proc Asche, 12,0—15,8 Proc Wasser.

Prüfung: 1) unter dem Mikroskop, wie oben angegeben — 2) 3 Tropfen des alkoholischen Auszuges (1:10) werden mit 10 cem Weingeist und einigen Tropfen Eisenchlorid gemischt. Die Lösung färbt sich grünlich. Bei Anwendung concentrirter Lösung entsteht eine chromgrüne Färbung und allmählich ein braunlicher Niederschlag, der auf Zusatz von Alkalien purpurn wird — 3) Alkohol soll etwa 80 Proc lösen, ebensoviel siedendes Wasser, die Lösung reagirt sauer.

Verfälschungen Catechu soll in Indien mit Extrakten des Holzes von *Terminalia*, *Xylia*, *Lagerstroemia* verfälscht werden, auch solches, das reichlich Stärke enthält, ist vorgekommen.

Anwendung Selten innerlich zu 0,1—0,3 g, äusserlich als Bestandtheil blutstillender Pulver, in Zahntinkturen, Mund- und Gurgelwässern, Einspritzungen und Verbandswässern.

Extractum Catechu (Ehghanzb.) Durch 2 maliges, je 8 tägiges Ausziehen von Catechu 1 Th mit Wasser 5 Th und Eindampfen zur Trockne zu bereiten. Ausbeute etwa 75 Proc.

Extractum Catechu spirituosum Catechu depuratum Catechu 100 Th, Weingeist (90 proc), Wasser aa 150 Th, nach 8 tägigem Ausziehen wird filtrirt und zur Trockne eingedampft. Ausbeute etwa 70 Proc.

Tinctura Catechu (Austr. Gall. Germ. Helv.) Catechu 1 Th, Verdünnter Weingeist 5 Th.

Tinctura Catechu composita (U-St.) Catechu 100 g, Zimmt 50 g, Verdünnter Weingeist (41 proc) q s. Durch Verdrängung bereitet man 1000 cem.

Aqua gingivalis. Tincturae Catechu 20,0, Tincturae Cinnam 10,0, Aquae Menth spirit 150,0. Mit Wasser verdünnt zum Mundauspülen.

Cachou aromatique, C. de Bologne. Pastilles pour les fumeurs, Grains de Cachou Catechu 80,0, Extr. Liquirit 90,0, Sacchari 80,0, Tragacanth 15,0, Olei Caryophyll 3,75, Olei Cassiae 2,0, Olei Macidis gutts X, Tinct. Ambrae gutts XII. Man stösst mit Aqua Neroli zur Masse, formt entweder Pillen von 0,1 g oder Tabletten und versilbert.

Electuarium Catechu. Diascordium Fracastorii Catechu 15,0, Cort Cinnamon 1,5, Sem. Myristic 1,0, Opii 0,2, Mellis rosati 40,0. Bei veraltetem Durchfall thecölöffelweise.

Essentia dentifricia JEANNEL Tinct Catechu 50,0, Tinct Benzoes 10,0, Spiritus dilut 40,0, Glycerin 20,0, Ol Menth pip 1,0. Zusatz zum Mundspülwasser.

Pasta haemostatica ASTLEY COOPER Catechu 5,0, Argillae albae 5,0, Aluminis usti 20,0, Tinct Opi 2,5, Spiritus q s ut f pasta

Pulvis Catechu ferratus Poudre de Marseille ou de Provence Catechu, Ferri pulverat, Sacchari aa 10,0 Divide in p aeq 30 Bei Bleichsucht, Magenleiden, Blutspenien

Sirupus Catechu Tinct Catechu 15,0, Sirupi Sacchari 85,0

Tabellae cum Catechu Tablettes de Cachou Catechu plv 50, Sacch plv 400, Mucilago Tragacanthae 50 Daraus Pastillen à 1,0

Tinctura antiscorbutica COPLAND Tinct Catechu 25,0, Tinct Myrrhae 15,0, Tinct Oliniae 10,0, Balsam Peruvian 1,5, Spirit Cochlear 10,0, Spirit dilut 20,0 Bei Blutungen des Zahnfleisches

Tinctura haemostatica, Anhaltstropfen Tinct Catechu, Tinct Cinnamomi aa

Trochisci Catechu (U-St) Troches of Catechu Catechu 6 g, Sacchari 65 g, Tragacanth 2 g, Aq Neroli conc q s Man formt 100 Zeltchen

Antikesselsteinmittel Folgende enthalten Katschu als Hauptbestandtheil LEYES quiz s, Desincrustant von L CONSTANT & Co, NEDDERMANN's, Harburger, KOLFER's, Halo quin von FIERMANN, Lepidolyd von KOLKER, Inthoréactif von RAILLARD & Co

Elixir de sante de Bonjean Enthält Katschu, Orangenschalentinktur, Minzen, Kümmel, Anisöl, Thecaufguss, Aether, Zucker

Zahnbalsam, HOFFMANN's Tinct Catechu 2, Ol Caryophyllor i

Cautschuc.

Cautschuc. Gummi cayennense s elasticum. Resina elastica. — Kautschuk Federharz Ledergummi. Speckgummi — Caoutchouc (Gall) Gomme élastique — Elastica (U-St) India-rubber.

Abstammung Einen kautschukhaltigen Milchsaft führen eine grosse Anzahl von Pflanzen, besonders in den Familien der Euphorbiaceen, Apocynaceen, Asclepiadaceen, Moraceen, Campanulaceen Ausgebeutet werden hauptsächlich *Hevea brasiliensis* Müll Arg (Euphorbiaceae), am Amazonenstrom, liefert Para-Kautschuk, *Manihot Glaziovii* Müll Arg (Euphorbiaceae), hauptsächlich im nordöstlichen Brasilien, liefert Ceara-Kautschuk; *Ficus elastica* Roxb (Moraceae), in Sudamerika, auch kultivirt, *Landolphia comorensis* (Boj) K Sch (Apocynaceae) in Westafrika, *L. owarensis* Beauv. in Ostafrika, *L. Kirkii* Thist Dyer, *L. Petersiana* (Kl) Thist Dyer, beide in Afrika, *L. gummifera* (Lam et Pois) K Sch Ferner aus der selben Familie die Gattungen *Urceola*, *Willoughbya* in Ostindien, *Parameria* in Cochinchina, *Tacazzea* und *Clitandra* in Afrika, *Hancornia* in Amerika

Gewinnung Man gewinnt den Milchsaft, in dem der Kautschuk in Form kleiner Kügelchen vertheilt ist und den die Pflanzen in Milchsaftschläuchen enthalten, indem man Einschnitte in die Rinde macht, worauf der Milchsaft ausfliesst Diesen bringt man dann auf verschiedene Weise zum Gerinnen, wobei sich der Kautschuk von den übrigen Bestandtheilen trennt. Man streicht ihn in dünnen Lagen auf Holz oder Thonformen und räuchert ihn, wobei er bald erstarrt, und wiederholt diese Operation Die ursprünglich weisse Substanz wird dabei braun bis schwarz Oder man streicht ihn in dünner Lage aus und lässt ihn durch Verdunsten erhärten. Oder man bringt den Saft zur Coagulation, indem man ihm Säuren (Citronensaft) oder Salze (Kochsalz oder Alaun) zusetzt — Zusatz von Ammoniak verhindert die Coagulation

Beschreibung Spec Gew 0,98—0,96 Er ist elastisch und meist weich, wenn man frisch durchschnittenen Stücke fest zusammenlegt, so haften sie aneinander Seine Elasticität verliert er bei 0°, bei 50° C wird er weich und bei 120° C schmilzt er zu einer flüssigen oder halbflüssigen Masse, die nach dem Erkalten schwer wieder fest wird und immer schmierig bleibt. Er ist porös. Er absorbiert leicht Sauerstoff und wird dadurch

spide, besonders am Licht. Kautschukrohren und -Stopfen werden daher am besten unter Wasser in einem undurchsichtigen Gefass aufbewahrt. Hart gewordene Gegenstände bringt man auf einige Zeit in eine Schwefelkohlenstoffatmosphäre und dann in Glasgefasse, in denen sich ein Gefass mit Petroleum befindet.

Reiner Kautschuk löst sich in Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl, geschmolzenem Naphtalin, besonders leicht in einem Gemisch von 6—8 Th absolutem Alkohol und 100 Th Schwefelkohlenstoff, ferner leicht löslich im sogen. Kautschuköle, das man bei der trockenen Destillation des Kautschuks gewinnt.

Bestandtheile Rohor Kautschuk enthält etwas Eiweissstoffe, Fett, athenisches Oel und Farbstoffe, von denen er durch aufeinander folgende Behandlung mit Wasser, Alkohol und Aether grossentheils befreit wird. Das ungelöst bleibende wird durch Lösen in Chloroform und Ausfällen mit Alkohol gereinigt. Dann entspricht es der Formel $C_{10}H_{16}$. Bei der trockenen Destillation liefert er Isopren C_5H_8 , Cinen (Kautschin) $C_{10}H_{16}$ und Heveen $C_{15}H_{24}$. Im Gabonkautschuk ist Inositdimethylather $C_6H_{10}O_6(CH_3)_2$, im Bornckautschuk dasselbe und Inositmonomethylather und in dem von Madagaskar Pinit enthalten.

Anwendung Innerlich selten in Pillen zu 0,1—0,2 mehrmals täglich bei Schwindel (wirkungslos, da Kautschuk im Körper nicht verändert wird). Aeusserlich zur Bereitung wasserdichter Pflaster und ähnlicher Arzneimitteln, Collempastra, Pflastermull, Senfpapier. Die ausgedehnteste Verwendung findet Kautschuk in reinem oder vulkanisirtem Zustande bei Herstellung chirurgischer Gerathe, wasserdichter Unterlagestoffe, von Luftkissen, Eisbenteln, Gummischläuchen und -pfropfen sind im chemischen Laboratorium, Hartgummiflaschen zur Aufbewahrung der Flusssäure unentbehrlich.

Vulkanisirter Kautschuk Kautschuk auch innerhalb weiter Temperaturgrenzen elastisch zu halten, „vulkanisirt“ man ihn, indem man ihm Schwefel einverleibt. Das geschieht, indem man ihn bei höherer Temperatur direct mit Schwefel durcharbeitet oder indem man ihn mit Schwefelverbindungen (Schwefelkalkum, Schwefelantimon), oder mit einer Lösung von Chlorschwefel in Schwefelkohlenstoff oder Petroleum behandelt. Solchem vulkanisirten Kautschuk setzt man dann häufig noch Kreide, Thon, Zinkweiss, Eisenoxyd etc. zu, um ihn für bestimmte Zwecke geeignet zu machen, um ihm eine bestimmte Farbe zu geben, oder auch um das Gewicht zu vermehren.

Entschwefelter Kautschuk ist vulkanisirter Kautschuk, dem man seinen Schwefel gehalt ganz oder theilweise durch Kochen mit Natronlauge wieder entzogen hat, der aber noch die physikalischen Eigenschaften des vulkanisirten Kautschuks besitzt.

Ebonit, hornisirter Kautschuk, Hartgummi enthält 30—40 Proc. Schwefel, ferner Kreide, Zinkweiss, Bleiweiss, Schellack.

Vegetabilisches Elfenbein,¹⁾ durch Mischen von Kautschuklösung mit Magnesia unter hydraulischen Druck gewonnene Masse, dient zur Herstellung von Billardkugeln u. dgl.

Kautschuc terebinthinatum Klein geschnittenen Kautschuk 10 Th löst man in verschlossenem Gefasse in rectif. Terpentinöl 20 Th bei gelinder Wärme.

Collempastrum adhaesivum, Kautschukheftpflaster (n. DIETREICH) Veilchenwurzelpulver 38 Th, Sandarakpulver 20 Th, Salicylsäure 6 Th mischt man, fugt Aether 150 Th, Harzöl 20 Th zu und ruht allmählich Kautschukpflasterkörper 800 Th darunter.

Collempastra Americana, Amerikanische Kautschukpflaster, sind gestrichene, durchlochte Pflaster, welche aus bestem, gereinigtem Parakautschuk, Iriswurz, Wachs, Harz, Pech und etw. arzneilichen Stoffen fabrikmässig hergestellt werden. Ihnen nachgebildet ist YORK's Kautschukpflaster von KAHNEMANN, welches frei von hautreizenden Eigenschaften sein soll.

Glühlichtkörper-Tinktur, bestimmt, die Glühkörper unterwegs vor Bruch zu schützen, ist eine Auflösung von 2 g Kautschuk in 100 ccm Petroleumbenzin (B. FISCHER). Zweckmässiger ist verdünntes Kollodium.

Gummikitt für Fahrräder. 1) Kautschuk 16 Th, Guttapercha 10 Th, Hausenblase 4 Th, Schwefelkohlenstoff 70 Th. Die sorgfältig gereinigten Risse werden mit dem Kitt ausgefüllt, die Theile bis zum Erhärten durch Bindfaden zusammengehalten. Auch als Lederkitt verwendbar.

¹⁾ Unter dieser Bezeichnung kommen auch die Nüsse von *Phytelephas macrocarpa* in den Handel.

2) Kautschuk, klein geschnitten, 30 Th schmilzt man mit Fichtenharz 12 Th, fügt venetian Terpentin 5,4 Th zu, löst in Terpentinöl 110 Th und vermischt mit einer Lösung von Kautschuk 30 Th in Chloroform 600 Th. Auch für Gummischuhe, Regenröcke u dgl

Kautschuk-Firniss Leinölfirniss 5 Th Kautschuk-Benzol-Lösung 1—2 Th giebt nach Zusatz von q s Graphit metallähnliche Ueberzüge

Kautschukkitte 1) Kautschuk 125 Th, Harz, Leinöl je 60 Th, Schellack 80 Th schmilzt man zusammen

2) Kautschuk 20 Th, Mastix 180 Th, Chloroform 800 Th Kalt zu lösen (Buchh) Für Glas, zum Befestigen von Glasbuchstaben

3) Kautschuk 10 Th in leichtem Kampheröl oder Schwefelkohlenstoff 90 Th gelöst, wird mit Asphaltlack q s verdickt Für Gummischuhe

4) Benzol-Kautschuklösung 10 Th, Paraffin 2 Th zur Hälfte verdunstet, werden mit gut getrocknetem Schwerspath und Bolus zur knetbaren Masse gemacht Für Laugen-gefäße (Für heisse Lauge wird Paraffin durch Copal ersetzt)

5) Kautschuk 100 Th, Talg 8 Th schmilzt man und mischt mit gebranntem, zerfallenem Kalk 8 Th Soll der Kitt bald erhärten, so setzt man noch Mennige 20 Th zu (Buchh) Für Sauregefäße

6) Kautschuk, in heissem Wasser erweicht, wird durch vorsichtiges (!) Kochen in Theer gelöst Ledersohlen wasserdicht zu machen

Kautschukmasse zum Einfetten von Glashähnen an Büretten, Vakuumapparaten u s w 1) Kautschuk 70 Th, Wachs 25 Th, Vasoline 5 Th — 2) Kautschuk 70 Th, Gelbes Wachs 30 Th Man schmilzt zuerst den Kautschuk und mischt dann die anderen Stoffe zu Beide Mischungen sind durchsichtig und durch Salpetersäure und Wasser leicht vom Glase zu entfernen

Kleidungsstücke werden wasserdicht, indem man sie mit Kautschuklösung tränkt und Schwefelchloriddämpfen aussetzt (D.R.P. 2265)

Lack, biegsamer Asphalt 100 Th in Benzol 150 Th gelöst, Elemi, Copaivabalsam je 4 Th in Benzol gelöst, mischt man mit q s Benzol Kautschuklösung (Bayer Ind- und Gew.-Bl)

Liquor Caoutchouc. Solution of India-rubber (Bmt) Fein zerschnittener Kautschuk 50 g, Benzol, Schwefelkohlenstoff je 500 com Man löst unter häufigem Schütteln im Kühlen aufzubewahren! Feuergefährlich!

Massa Colleplastri. Corpus ad Colleplastrum Kautschukpflaster körperl (DIETERICH) Harzöl 30,0, Copaivabalsam (Maracaibo), Gelbes Kolophonium je 40,0, Larchenterpentin 20,0, Gelbes Wachs 12,0 schmilzt man, sieht durch in eine geräumige, weitmündige Blechflasche, setzt Aether 600,0 zu, löst durch Umrühren, fügt Blätterkautschuk (Resina elastica in folis No 12—18 von GEBE & Co in Dresden) 100,0, in kleine Stücke zerschnitten, hinzu, ruht 6 Stunden lang und stellt verschlossen 1 Tag bei 15—20° C bei Seite Dann wird das Rühren 6 stündlich wiederholt, bis die Masse völlig gleichmässig ist und zuletzt durch q s Aether deren Gesamtgewicht auf 800,0 gebracht

Solutio Resinae elasticae aetherea. Aetherische Kautschuklösung (Diet) Kautschuk in Blättern (s vorig) 50,0, Oelsäure 2,0, Aether 500,0 Nach 3 Tagen wird bis zur Gleichmässigkeit durchgearbeitet, Aether 500,0 zugefügt und unter öfterem Schütteln bis zur Lösung bei Seite gestellt Die weiter verdünnte Lösung lässt sich filtriren

Solutio Resinae elasticae benzolica. Benzol-Kautschuklösung Kautschuk in sehr kleinen Stücken wird 14 Tage bei 30—40° C getrocknet, bei derselben Wärme in der 6 fachen Menge Benzol gelöst und durch q s Benzol eine dickflüssige Masse hergestellt

Vernix ad Cereolos elasticos Bongies-Lack. Kautschuk, fein zerschnitten, Bernsteinkolophon je 10,0, Leinölfirniss 9,0, Terpentinöl 15,0

Vernix ad ligna, tela etc. Kautschukfirnisse für Holzwerk, Gewebe u dergl Gut getrockneter Kautschuk 1 Th wird im Wasserbade in Steinkohlentheeröl 8 Th gelöst, dann fetter Kopalfirniss 2 Th. zugefügt (Gummi-Ztg)

Wasserdichte Lederschuhe. Kautschuk, Schwefelkohlenstoff je 100 Th lässt man einige Tage stehen, fügt Petroleum 100 Th, Methylalkohol 300 Th, fein gepulv Schellack 400 Th zu, löst bei 50—52° C und giebt Beinschwarz 200 Th hinzu (Scient Amer)

Kautschuk befestigt man auf Metall mittels einer Lösung von gepulvertem Schellack in 10 Th starkem Ammoniak (deren Anfertigung aber längere Zeit beansprucht)

Kautschukabfälle lassen sich verwerten, indem man sie mit Leinöl erhitzt, bis eine gleichmässige Masse entstanden ist und diese mit der 20 fachen Menge siedenden Theers mischt Man erhält so einen wetterfesten Anstrich für Zäune, Pappdächer u dergl

Schilder für Vorrathsgelasse in Kellern und feuchten Räumen erhält man sehr dauerhaft aus dünnstem Gummibuch (einseitig gummirte Bettunterlage), man befestigt dieselben mittels Etiquettenlack, Leim oder Wasserglas und überzieht nach dem Trocknen die Schriftseite mit einem geeigneten Lack

Electuarium e Cautschuc HANNON
 Rp Cautschuc terebinthinati 5,0
 Succ. Sambuci inspiss 50,0
 Olei Amygdalarum amar gutta 7
 3--4 Mal täglich 1 Theel

Electuarium e Cautschuc VARIOL CAIVER
 Rp Cautschuc minutim concis 2,5
 Olei Terebinthinae rectif. 5,0
 Solve leni calore, adde
 Sacchari pulverati 45,0
 Mellis depurati 75,0

Emplastrum Resinae Pini cum Resina elastica LAVIGNE

Pp Resinae elasticae conc. 35,0
 Aetheris Petrolei 15,0
 Leni calore solutus adde
 Resinae Pini 300,0
 Cerne flavae 25,0
 Glycerini 5,0

Pilulae Resinae elasticae
 Benzol Kautschuklösung wird zum Sirup eingedampft, mit Bolus Armenus zur weichen Masse angestossen, diese ausgekollt und auf der erwärmten Pillenmaschine scharf abgeschnitten, sodass die Pillen keiner weiteren Abrundung bedürfen.

Alma von E. MÜLLER, ein Hühneraugenmittel, ist Kautschukheftpflaster mit einer Salicylpasta.

ALLCOCK's poröses, stätkendes Pflaster ist ein durchlohtes Kautschukpflaster
Corn-Extirpators sind Hühneraugenpflaster aus dünnen Kautschukscheiben

Heveaoid von **HENRY GERNER**, eine pat. Kautschukmasse, besteht aus Kautschuk, Kampher, Schwefel und wenig Kalk oder Glycerin (Ind.-Bl.)

Künstlicher Kautschuk (**FENTON's** Patent) wird aus leicht oxydierbaren Ölen (Lein-, Baumwollsamendöl), Theer und verd. Salpetersäure, durch Erhitzen u. s. w., erzeugt. Kautschukähnliche Masse, die sich vulkanisieren lässt.

MATHEW's Anstrich für Holz und Metalltücher soll Kautschuk, Leinöl und Graphit enthalten.

Paraplaste nach **UNNA**, von **BEIERSDORF** in Hamburg, ist eine neue Art wasserdichter Pflaster, deren Grundlage aus einseitig mit Kautschuklösung bestrichenem, vulkanisierten Baumwollstoff besteht.

Protectin, sterile, wasserdichte Wundvorlage, ist dünnes, mit Kautschuklösung getränktes Seidenpapier.

Rostschutzmittel von **BECHERT** wird aus Kautschuk und den aus Braunkohlen, Torf etc. destillierten Rohölen hergestellt.

Weisses Kautschukheftpflaster von **BEIERSDORF**, von besonderer Klebkraft, enthält 40 Proc. Zinkoxyd.

Centaurea

Gattung der **Compositae** — **Cynareae** — **Centaureinae**.

Centaurea Cyanus L. (Kornblume, Roggenblume, Bluet, Blue battle).

Im Orient und in Europa, besonders in Kornfeldern.

Verwendung finden die aus den Köpfchen genommenen Einzelblüthen von schöner, blauer Farbe. Die grösseren Randblüthen meist geschlechtslos, grösser, strahlend, die Scheibenblüthen zwittrig. Antheren ungeschwänzt.

Die getrockneten Blüthen (**Flores Cyani**, **Capitula de Bluet**, **Capitula de Barreau** [Gall.]) werden kaum als Arzneimittel, sondern zur Verschönerung von Species benutzt.

Centaurea Jacea L. liefert **Flores**, **Herba** und **Radix Jaceae nigrae seu Carthami silvestris**.

Centaurea Calcitrapa L. liefert **Herba**, **Radix** und **Fructus Calcitrapae seu Candui stellatae**.

Centaurea montana L. liefert **Flores Cyani majoris**.

Centaurea Centaurium L. vergl. **Centaurium**.

Centaurea solstitialis L. liefert **Radix Spinae solstitialis**.

Centaurea Behen L. liefert die im Orient hochberühmte wasse Behenwurzel, die gegenwärtig zuweilen nach Europa kommt.

Centaurium.

I. Herba Centaurii (Germ. Helv.). *Hb. Centaurii minoris* (Austr.). *Hb. Chironiae*. — Tausendgüldenkraut. Erdgallenkraut. Fieberkraut. Christikreuzthée. *Bother Aurin*. — *Petite centaurée* (Gall.). — *Centauri tops*, ist das blühende Kraut der zu den *Gentianaceae* — *Gentianeae* — *Erythraeinae* gehörigen **Erythraea Centaurium** (L.) Pers., heimisch in Europa (bis 59° n. Br.), durch den Orient bis Persien, in Nordafrika, auch in Nordamerika. In Algier kultivirt.




Fig. 177.




Fig. 176.

Beschreibung. 1–2-jähriges Kraut mit doldig erscheinender Rispe, schön rosenrothen, fünfzähligen Blüten. Korolle mit cylindrischer Röhre und trichter- oder tellerförmig ausgebreiteten Zipfeln, die sich nach der Blüthe über der Kapsel zusammendrehen. Die Antheren drehen die Staubbeutel nach dem Verstäuben nach rechts spiralig zusammen (Fig. 176). Die verkehrt-eiförmigen, ganz kurz gestielten, ganzrandigen Grundblätter bilden eine Rosette. Stengelblätter kleiner, sitzend, gegenständig (Fig. 177).

Die ganze Pflanze ist kahl, die Epidermiszellen der Oberseite der Blätter sind vorgewölbt und mit radial vom Gipfel herablaufenden Cuticularleisten versehen. Die Epidermiszellen der Aussenseite des Kelches mit starken Ausstülpungen und ebenfalls kräftigen Leisten.

In die Ausstülpungen setzen sich die Zell-Lumina als enger Kanal fort. Von stark bitterem Geschmack.

Bestandtheile. $\frac{1}{30}$ Proc. *Erythrocentaurium* $C_6H_{14}O_6$, farb- und geschmacklos, krystallinisch, am Lichte sich röthend, von glykosidischem Charakter, Bitterstoff, Harz, Wachs, Pflanzenschleim etc., 6 Proc. Asche.

Verwechslungen und Verfälschungen. *Erythraea litoralis* Fries, in Norddeutschland und Holland, mit gezähnt-rauhen Stengelblättern, die fein gewimpert sind.

Erythraea pulchella Fries. Ohne grundständige Blattrosette. Von ähnlicher Verbreitung wie vorige.

Beide schmecken ebenfalls bitter und dürften in der Wirkung von der officinellen Pflanze kaum differiren.

Einsammlung. Man sammelt das im Juli und August blühende Kraut und trocknet es entweder in Bündchen, oder man schneidet das frische Kraut, nach Beseitigung der Wurzeln, und trocknet alsdann: 4 Th. frisches Kraut liefern 1 Th. trockenes.

Anwendung. Als magenstärkendes Mittel im Aufguss, als Pulver, in Theemischungen oder Tinkturen zu 1,0–2,0 mehrmals täglich. Früher Fiebermittel. Die Tausendgüldenkrauttinktur des Pfarrers Kneipp wird aus dem frischen Kraut bereitet (s. *Tinctura Bursae pastoris* S. 604).

Ähnlich verwendet werden: *Erythraea chilensis* Pers. in Chile, „*Canchalagua*“, auch als Anthelminticum, *Erythraea australis* R. Br. in Neusüdwaes, *Chlora perfoliata* L., „*Herba Centaurei lutei*“.

Extractum Centaurii minoris. Austr.: Durch je 2ständiges Ausziehen von 1 Th. zerschnittenem Kraut mit 6, dann mit 2 Th. heissem dest. Wasser, Aufkochen der Pressflüssigkeiten und lege artis Eindampfen. — Gall. lässt je 12 Stunden ausziehen. — Ergänzb.: Durch 6, dann 3ständiges Ausziehen von 1 Th. Kraut mit je 5 Th. sied. Wasser und Eindampfen. Ausbeute 22–24 Proc. Dick, in Wasser trübe löslich.

Pilulae stomachicae TROACHIM
 Rp Extincti Centaurii 5,0
 Myrrhae pulvrat 10,0
 Balsami peruviani 2,0
 Radicis Gentianae q s
 Fiat pilulae ponderis 0,15

Pulvis antarthriticus amarus
 Pulvis Duas Portland Poudre du
 Prince de la Mirandole
 Rp Herbae Centaurii
 Herbae Chamuedryos
 Radicis Gentianae
 Radicis Aristolochiae
 Foliorum Salviae
 Foliorum Trifoli aa 10,0
 D S 3—4 mal täglich 1 Theelöffel

Tisane de Centaurée petite (Gall)
 Rp Herbae Centaurii 10,0
 Aquae destill ebullientis 1000,0
 Nach $\frac{1}{2}$ Stunde durchsieben.

Species ad clyisma digestivum KAMPFER
 Rp Herbae Centaurii
 Radicis Saponariae
 Radicis Faraxae
 Rhizom Graminis aa 75,0
 Divide in partes X. 1 Dosis mit $\frac{1}{4}$ l Wasser auf
 $\frac{1}{4}$ l eingekecht zum Klyster

Species amaricautes s stomachicae Dr DIPTL
 Rp Corticis Cinnamomi gr pulv
 Follor Menth pip conc. aa 25,0
 Herb Centaurii conc 50,0

Species antarthriticae PORTLAND
 Rp Herbae Centaurii
 Herbae Chenopod. ambros
 Lepi Guajaci
 Radicis Asari
 Radicis Gentianae 25

Cholera-Essenz von KANTOROWITZ Ein weingeistiger, mit wenig Ol Absinthii aeth versetzter Auszug aus Herb Centaurii und Rhiz Zingiberis

Dauids-Thee von FRÄGNER, gegen Lungenleiden Herb Centaurii, Hyssopi, Scandic odorat, Marrubii, Cardui benedict, Fior Millefol, Lichen Island aa

Dauids-Thee, echter Karolinenthaler, von KRAE, hat dieselben Bestandtheile in etwas anderen Verhältnissen

Magenkrampf-Elixir von P SEIDL Weingeist Auszug aus Herb Centaurii, Herb Artemisiae, Fol Trifol fibr, Herb Veronicae u s w mit etwas Kochsalz

II Herba Centauri majoris ist das Kraut von **Centaurea Centaurium L.**

Cera.

Als „Wachs“ bezeichnete man früher lediglich das Bienenwachs. Zur Zeit versteht man darunter Substanzen, welche bezüglich bestimmter physikalischer Eigenschaften Schmelzbarkkeit, Brennbarkeit, Elasticität, Klebkraft, Mischbarkeit mit anderen Stoffen, dem Bienenwachs sich ähnlich verhalten und deshalb als Surrogate des Bienenwachses angesehen werden. Chemisch sind diese Substanzen nicht streng charakterisirt. Sie sind zwar z Th Aether von Säuren mit hochmolekularen Alkoholen, wie z B das chinesische Wachs und das Carnaubawachs, doch bezeichnet man auch Gemische von Kohlenwasserstoffen als Wachs, wie z B das Erdwachs.

Unter „Wachs schlechthin“ hat man jedoch lediglich das Bienenwachs zu verstehen.

I **Cera flava** (Austr, Brit, Germ, Helv, U-St) **Cire jaune** (Gall.) **Cera citrina**. **Cera**. Gelbes Wachs **Bienenwachs** **Yellow Wax** **Yellow Beeswax**.

Dasselbe ist ein Verdauungsprodukt der geschlechtslosen Arbeitsbienen (*Apis mellifica* L., die Honigbiene, Familie der Hymenopteren oder Hautflügler), das sie auf den Wachshäuten ihrer vier letzten Bauchringe abscheiden und zum Aufbau der aus den bekannten Zellen bestehenden „Waben“ benutzen. Die Waben, die im „Stoock“ senkrecht stehen, werden an die Wand des Stockes mit dem harzartigen, in Weingeist löslichen „Vorwachs“ (*propolis*) befestigt. Im Herbst werden die Stöcke von den Bienenwirthen (Imker oder Zeidler) gezeidelt, indem man den grössten Theil der Waben herausnimmt. Nach Entfernung des Honigs (durch Auslaufenlassen, Auspressen oder Centrifugiren) werden die Waben in Wasser geschmolzen, wobei sich die Unreinigkeiten zu Boden setzen und das Wachs sich an der Oberfläche des Wassers sammelt. Bevor es in den Handel kommt, wird es gewöhnlich noch einmal umgeschmolzen.

Es empfiehlt sich, das für pharmaceutische Zwecke bestimmte Wachs sogleich nach dem Einkauf zu schmelzen und im Warmwasser-Trichter zu filtriren

Wachs wird in allen europäischen Ländern producirt, ausserdem aus Afrika (Marokko), Südamerika und Westindien eingeführt, wo es zum Theil von anderen Honigbienen erzeugt wird. Diese fremden Wachsorten sind bezüglich ihrer chemischen Zusammensetzung nicht so gut durchuntersucht als die europäischen. Es scheint sogar, als ob diese fremden Wachsorten kleine Unterschiede gegenüber dem europäischen Wachs aufweisen.

Beschreibung Das Bienenwachs ist, von der Nahrung des Insektes abhängig, von heller oder dunkler gelber Farbe. Ein besonders helles Wachs (Jungfernwachs) stammt von jungen Stocken, es ist von schmutzig weisslich gelber Farbe. Afrikanische und amerikanische Sorten sind oft braun, indische graubraun, sie lassen sich schwer bleichen. Der Geruch ist angenehm honigartig, der Geschmack ist schwach balsamisch. Beim Kauen darf es nicht an den Zähnen haften (mit Harz verfälschtes klebt leicht an). In der Kälte ist es spröde, auf dem Bruch körnig, es nimmt dann leicht einen Kradestrich an (was bei Talgzusatz nicht der Fall ist). Durch die Wärme der Hand erweicht es und wird knetbar. Löslich beim Erwärmen in Chloroform, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl und vielen ätherischen und fetten Ölen. In kaltem Alkohol ist Wachs unlöslich. Sie dender Alkohol löst nur einen Theil — Cerin — auf, während ein anderer Theil — das Myricin — ungelöst bleibt. In etwa 300 Th Alkohol von 91–92 Proc löst es sich bei mehrstündigem Kochen fast vollständig auf. Weingeistfreier Aether löst bei mittlerer Temperatur nur die Hälfte des Gewichtes des Waxes auf, Benzol oder Petroleumbenzol lösen bei 15° höchstens 20 Proc des Waxes, der Rückstand ist weisslich. Die Lösung in 20 Th Benzin, gleichen Theilen Benzol und 90 Proc Alkohol, und in Chloroform lässt nach dem Verdunsten krystallinische Struktur des Waxes erkennen. Nach Long entstehen, wenn man einen Tropfen einer Chloroformlösung des Waxes unter dem Deckgläschen verdunsten lässt, feine federartige Krystallnadeln, die sich zu haufelförmigen Aggregaten an einander legen. Ein Zusatz von 20 Proc Paraffin zum Wachs scheint die Krystallbildung ganz zu verhindern, bei Gegenwart von Talg sind dessen charakteristische Krystalle zu erkennen. Das nicht filtrirte Wachs enthält immer Pollenkörner der Blüthen, mit denen die Bienen in Berührung gekommen sind, es ist dieser Umstand wohl zu beachten, wenn es sich um Nachweis des Bienenwaxes handelt.

Chemische Zusammensetzung. Das Wachs ist keine einheitliche Substanz, sondern ein Gemenge verschiedener Verbindungen. Seine wesentlichen Bestandtheile sind freie Cerotinsäure (sog Cerin) $C_{22}H_{44}O_2$. Dieselbe bildet den in heissem Alkohol löslichen, beim Erkalten sich wieder ausscheidenden Antheil des Waxes. Ferner Palmitinsäure-Melissyläther (sog Myricin) $C_{16}H_{34}O_2$, $C_{16}H_{32}$ (Nach SCHWALB $C_{16}H_{32}O_2 \cdot C_{21}H_{42}$). Letzteres und Cerotinsäure sind im Wachs im Verhältniss 86:14 vorhanden. Neben Cerotinsäure findet sich Melissinsäure $C_{30}H_{60}O_2$ oder $C_{31}H_{62}O_2$, ferner Cerylalkohol $C_{22}H_{44}OH$ und ein zweiter Alkohol, endlich geringe Mengen ungesättigter Fettsäuren und Kohlenwasserstoffe, wie Heptacosan $C_{27}H_{56}$ und Hentriacontan und eine riechende, klebrige Masse vom Schmp 22° C Cerolin. Die Angaben über den Gehalt an Kohlenwasserstoffen schwanken von 5–6 Proc (SCHWALB) bis zu 12,9–13,9 Proc. (BOUSSIN). Ausserdem Farbstoffe von nicht näher bekannter Zusammensetzung.

Prüfung Die Prüfung des Waxes auf Verfälschungen ist unerlässlich. Die Verhältnisse liegen gegenwärtig eigenthümlicher Weise so, dass es kaum noch möglich ist, ein garantiert unverfälschtes Wachs im Handel zu bekommen. Nur wenn man in der Lage ist, Wachs von wilden Bienen zu sammeln oder mit einem zuverlässigen Imker bestimmte Abmachungen zu treffen, kann man sicher sein, ein unverfälschtes Wachs zu erhalten. Ist dies nicht möglich, so muss man stets gewärtig sein, dass selbst Wachs aus anscheinend zuverlässiger Quelle fremde Beimengungen enthält. Dies kommt daher, dass die Imker gegenwärtig zur Vermehrung der Honigansbeute den Bienen künstliche Waben (aus Ceresin) in die Stöcke stellen. Bei der Honigernte haben die Imker meist vergessen, in welche Stöcke sie die künstlichen Waben gebracht haben. Infolge dessen werden dann auch ohne

unlautere Absicht Naturwaben und Kunstwaben zur Gewinnung des Waxes zusammen geschmolzen

Die Untersuchung einer Wachsprobe auf Reinheit ist keine ganz einfache Aufgabe. Sie setzt eine Menge Erfahrungen und Umsicht voraus, man verfährt zweckmässig wie folgt:

1) Bestimmung des Schmelzpunktes

Man bringt in ein auf die Hälfte seiner Länge verjüngtes und am verjüngten Ende zugeschmolzenes Glasrohr 2—3 Tropfen des geschmolzenen Waxes, sammelt sie durch Neigen unmittelbar über der Verengungsstelle, wie bei *a*, und lässt vollständig erkalten (Fig 178). Man lässt so dann das Röhrchen mehrere Tage liegen, da die Fette und Wachsorten ihren normalen Schmelzpunkt erst nach längerer Zeit wieder erlangen, stellt dann das Röhrchen in ein mit kaltem Wasser gefülltes Becherglas, in welches man zugleich ein Thermometer eintaucht und erwärmt mit einer kleinen Flamme langsam, bis das Tropfen herabzufließen beginnt („Anfangspunkt des Schmelzens“). Der herabfließende, noch trübe Tropfen nimmt dann die Form in *b* an. Man erwärmt dann weiter, bis er völlig durchsichtig ist, und notirt diese Temperatur („Endpunkt des Schmelzens“).




Fig 178

Unter Einhaltung dieser Bedingungen lässt sich annehmen, dass normales gelbes Wachs den Schm-P von 62—64°C zeigt, d. h., dass das Schmelzen bei 62°C beginnt und bei 64°C beendet ist, doch kommen namentlich bei ausländischen Wachsorten kleine Abweichungen vor, indem der Anfang des Schmelzens zu 61,5°C, das Ende des Schmelzens bis 65°C beobachtet worden ist. Die Pharmacopoen machen folgende Angaben:

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U-St.
Schmelz Punkt	63—64°C.	62,5—63,9°C.	—	63—64°C.	ca. 64°C	63—64°C
Spec Gewicht bei 15°C	—	0,960—0,970	—	0,962—0,966	0,962—0,966	0,955—0,967

Die Bestimmung des Schmelzpunktes hat nur bei ganz groben Fälschungen Werth, denn HAGER fand *z* B den Schmelzpunkt eines mit 13 Proc Talg versetzten Waxes zu 63°C

2) Die Bestimmung des specifischen Gewichtes. Dasselbe erfolgt in der von HAGER angegebenen Weise dadurch, dass man eine Mischung von Weingeist mit Wasser herstellt, bei welcher das Wachs gerade „schwimmt“, d. h., welche das nämliche spec Gew hat wie das Wachs. Stellt man demnach das spec Gew dieser Mischung fest, so hat man zugleich das spec Gew des Waxes. Zur Erlangung vergleichbarer Zahlen muss die nach stehende Anweisung genau eingehalten werden.

Am Rande einer nicht zu grossen Weingeistflamme erhitzt man ein grösseres Stück Wachs bis zum Abschmelzen eines Tropfens. Diesen lässt man in ein flaches, mit kaltem Weingeist gefülltes Schälchen fallen, wobei man das Wachstück dem Niveau des Weingeistes soviel als möglich nähert, weil das Herabfallen aus grösserer Höhe ein Elnschossen von Luft in die Perle mit sich bringen könnte. Man stellt von jedem Wachs Brot 10 bis 12 Perlen her, legt dieselben auf Fließpapier und lässt sie 8—24 Stunden liegen. Man mischt nun 8 Proben Weingeist zum spec Gew 0,960, 0,961 bis 0,967 bei 15°C, bringt die Wachperlen der Reihe nach in jede dieser Flüssigkeiten bei 15°C und beobachtet, in welcher der Mischung sie schweben. Einzelne lufthaltige Perlen, welche sich von den übrigen dadurch unterscheiden, dass sie auf allen diesen Flüssigkeiten schwimmen, sind zu entfernen. Als „Schweben“ bezeichnet man die Erscheinung, dass die Wachperlen in einer Flüssigkeit in jedem Theile der Flüssigkeitssäule sich im Gleichgewicht befinden, d. h. dass sie an jedem Theile der Flüssigkeitssäule schwimmen, also weder zu Boden sinken, noch in die Höhe steigen. — Das spec Gew derjenigen Alkohollösung, in welcher das „Schweben“ der Wachperlen stattfindet, ist als spec Gew des Waxes anzunehmen (DISTERICH).

Diese Bestimmung des spec Gew ist sehr wichtig, da die meisten der in Frage kommenden Beimischungen das spec Gew merklich beeinflussen. Normales Wachs hat bei 15°C das spec Gew 0,960—0,970 (Die niedrigste Angabe in der Litteratur ist 0,956, die höchste 0,975). Dagegen zeigte *z* B eine Mischung aus gleichen Theilen Wachs und Paraffin das spec Gew 0,916—0,919, eine solche aus gleichen Theilen Wachs und Harz 0,978—0,976, eine andere aus 2 Th Wachs und 1 Th Ceresin 0,942—0,943. Jedenfalls

wird man, wenn das spec Gew einer Wachsorte ein nichtnormales ist, darauf aufmerksam gemacht, dass irgend etwas an dem Wachs nicht richtig ist

Bei dieser Bestimmung des spec Gew muss die Temperatur genau eingehalten werden, ferner muss man die Mischung von Alkohol und Wasser solange stehen lassen, bis alle Luftblasen daraus entwichen sind. Die Probeflüssigkeit kann man herstellen durch Vermischen von 1 Th Spiritus von 0,830 spec Gew mit 8 Th Wasser

Helv schreibt folgende, rasch orientierende Probe vor: Wachs soll in 10proc Ammoniakflüssigkeit von 15° C unter sinken. Schwimmt es auf derselben, so kann es mit Ceresin, Paraffin oder Talg verfälscht sein

3) Wird 1,0 g Wachs mit 20 g Weingeist während einiger Minuten gekocht, und die Flüssigkeit während einiger Stunden zum Erkalten bei Seite gestellt, so soll das Filtrat fast ungefärbt sein (deutliche Gelbfärbung = fremde Farbstoffe, z. B. Cereuna), Lackmuspapier nicht oder nur sehr schwach rothen und durch Zusatz von Wasser nur schwach opalisirend getrübt werden. Eine starke Trübung weist auf Zusatz von Stearinsäure oder Harz hin

4) Wird 1 g gelbes Wachs mit 10 ccm Wasser und 8 g krystall Natriumcarbonat $\frac{1}{4}$ Stunde zum Sieden erhitzt, so muss sich beim Erkalten das Wachs über der Salzlösung wieder abscheiden und letztere darf nur opalisirend trübe erscheinen. Tritt diese Erscheinung nicht ein, sondern behält die Reaktionsflüssigkeit das Aussehen einer Emulsion, so kann Stearinsäure, Pflanzenwachs oder Talg zugegen sein

Die angegebenen Prüfungen sind bezüglich ihres Werthes nicht zu unterschätzen. Sie geben häufig wichtige Fingerzeige dafür, ob ein Wachs rein oder verfälscht ist. Von ausschlaggebender Bedeutung aber ist die Feststellung der Säurezahl, der Esterzahl und der Verhältnisszahl nach KÖRSTEN-HERZL

5) Prüfung nach HÜBL

Man wägt 3–4 g geschmolzenes und filtrirtes Wachs (genau gewogen!) in ein 150 ccm-Kölbchen ein, übergiesst mit 25 ccm säurefreiem Alkohol von 95 Proc., erhitzt unter Erwärmen am Rückflusskühler bis zum Schmelzen, fügt einige Tropfen Phenolphthalein-Lösung hinzu und titirt, indem man das Kölbchen in einem Gefasse mit warmem Wasser bewegt, mit $\frac{1}{2}$ -normaler alkoholischer Kalilauge bis zur Rothfärbung (Säurezahl). — Alsdann giebt man 20 ccm der nämlichen Lauge hinzu, verseift durch 1–2 stündiges Erhitzen im Sandbade am Rückflusskühler und titirt den Ueberschuss der Kalilauge mit $\frac{1}{2}$ -normaler Salzsäure zurück. Die zuletzt verbrauchten Kubikcentimeter Kalilauge dienen zur Versetzung (Verseifung) der vorhandenen Ester (Esterzahl)

Die für 1 g Wachs zur Sättigung der freien Säure verbrauchten Milligramme KOH nennt man die Säurezahl, die zur Zerlegung der Ester in 1 g Wachs verbrauchten Milligramme KOH sind die Esterzahl (Säurezahl + Esterzahl = Verseifungszahl). Für reines Wachs wurden bisher gefunden

Säurezahl 19–21, Esterzahl 73–76

Wichtig ist für die Beurtheilung des Wachses noch die Berechnung des Verhältnisses der Säurezahl zur Esterzahl, die sog. Verhältnisszahl, z. B.

$$19-21 : 73-76 = 1 : x.$$

Dieses Verhältniss schwankt bei reinem Wachs zwischen 1 : 3,6 und 1 : 3,8

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, ändert ein Zusatz der in Frage kommenden Verfälschungsmittel mindestens eine dieser Daten, meist alle zusammen

	Säurezahl	Esterzahl	Verhältnisszahl	Verseifungszahl
Gelbes Bienenwachs	20	75	3,75	95
Japanwachs	20	200	10	220
Carnaubawachs	4	75	18,75	79
Paraffin, Ceresin	0	0	0	0
Harz (Colophonum)	180	10	0,056	190
Talg	4	191	48	195
Stearinsäure	195	0	0	195
Chinesisches Wachs	Spur	63	63	63

Aus den erhaltenen Daten ist man berechtigt, folgende Schlüsse zu ziehen. Findet man die Verseifungszahl unter 92 und ist zugleich die Verhältnisszahl diejenige des reinen

Wachses, so ist Ceresin oder Paraffin beigemischt — Ist die Verhältnisszahl grösser als 3,8, so ist wahrscheinlich Japanwachs, Carnaubawachs oder Talg zugesetzt Ist die Verhältnisszahl kleiner als 3,8, so ist Stearinsäure oder Harz zugegen

Diese Methode der Untersuchung hat sich vorzüglich bewahrt Indessen ist über Wachse Mittheilung gemacht worden, welche sich nur schwer vollständig verseifen lassen deshalb unter Umständen nicht ganz richtige Zahlen liefern Namentlich ceresinhaltige Wachse liefern zu niedrige Verseifungszahlen Man hat zur Erreichung völliger Verseifung vorgeschlagen, die Verseifung im Sandbade anstatt auf dem Wasserbade auszuführen Ferner ist empfohlen worden, zwischen Verseifungskolben und Rückflusskühler einen mit Alkohol gefüllten MULLER'schen Extraktor einzuschalten und das Erwärmen mit einer kleinen, direkten Flamme auszuführen Durch das Zwischenschalten des MULLER'schen Extraktors wird die Kondensation und das Zurücktropfen des Alkohols sehr gleichmässig, das Niveau des Alkohols im Kolben bleibt stets das gleiche, und die Verseifung ist in einer Stunde sicher beendet

Um dem genannten Uebelstande zu begegnen, ist ferner die HÜBL'sche Methode von BENEDIKT und MANGOLD wie folgt abgeändert worden

Diese bestimmen einerseits die Säurezahl in der von HÜBL angegebenen Weise, an Stelle der Verseifungszahl aber die Gesamtsäurezahl, das ist diejenige Menge Kalihydrat in Zehntelprocenten, welcher die Mischung aus Fettsäuren und Fettalkoholen zur Neutralisation bedarf, die man erhält, wenn man das Wachs verseift und die Seife durch Kochen mit verdünnter Salzsäure zerlegt Diese Mischung wird von ihnen „aufgeschlossenes Wachs“ genannt

Zur Bestimmung der „Gesamt-Säurezahl“ löst man 20,0 g Kalihydrat in einer halbkugelförmigen Porcellanschale von 400—500 ccm Fassungsraum in 15 ccm Wasser, erhitzt auf einem Drahtnetze zum beginnenden Sieden und fügt etwa 20 g des filtrirten und geschmolzenen Wachses unter Umrühren hinzu Das Erhitzen wird mit kleiner Flamme unter beständigem, lebhaftem Umrühren noch 10 Minuten fortgesetzt Man verdünnt alsdann mit 200 ccm heissem Wasser, erwärmt und säuert mit 40 ccm Salzsäure, die vorher mit Wasser verdünnt wurde, an Man kocht, bis die aufschwimmende Schicht vollständig klar ist, lässt erkalten und reinigt den Wackakuchen durch dreimaliges Auskochen mit Wasser, dem man das erste Mal etwas Salzsäure zusetzt. Zuletzt wird der Kuchen abgehoben, mit Filtrirpapier abgewischt, im Trockenschranke geschmolzen und filtrirt Das filtrirte, noch flüssige Fett wird auf ein Uhrglas ausgegossen und nach dem Erkalten in Stücke gebrochen

6—8 g des in dieser Weise erhaltenen „aufgeschlossenen Wachses“ werden mit 30 ccm säurefreiem Alkohol übergossen, auf dem Wasserbade zum Schmelzen erhitzt und darauf nach Zusatz von einigen Tropfen Phenolphthalein-Lösung unter Bewegen in einem Gefässe mit warmem Wasser mit $\frac{1}{2}$ -normaler Kalilauge bis auf Roth titirt Die Verseifung ist selbst bei grossem Ceresingehalte stets eine vollkommene

Bezeichnet man mit s die Säurezahl, mit S die Gesamtsäurezahl und mit a die Aetherzahl, so ist $a + s$ die Verseifungszahl nach v. HÜBL, und ferner

$$a = \frac{56100 (S-s)}{56100 - 18 S} \quad \text{und} \quad S = \frac{56100 (a+s)}{56100 + 18 a}$$

Für die mittlere Säurezahl ($s = 20$) haben z. B. die Verseifungszahlen ($a + s$) und die Gesamtsäure-Zahlen (S) folgende zusammengehörige Werthe

a	$a + s$	S	S	a	$a + s$
69	89	87,07	87	68,91	88,91
70	90	88,02	88	69,96	89,96
71	91	88,97	89	71,02	91,02
72	92	89,92	90	72,08	92,08
73	93	90,87	91	73,14	93,14
74	94	91,82	92	74,19	94,19
75	95	92,77	93	75,25	95,25
76	96	93,72	94	76,30	96,30
77	97	94,67	95	77,36	97,36
78	98	95,61	96	78,41	98,41

Bildet man die Verhältnisszahl nicht aus der Aetherzahl und Säurezahl, sondern aus der Gesamtsäurezahl und der Säurezahl, so erhält man für von HÜBL's normales Wachs mit der Verseifungszahl 95 die Verhältnisszahl $S - s = 72$, $77 - 20 = 3,64$

Diese Verhältnisszahl wurde als die normale anzusehen sein. Erhebliche Abweichungen von derselben wurden auf eine Verfälschung des Waxes schliessen lassen.

Zum Nachweis von Fichtenharz ist die von DONATH angegebene Prüfung in der Modifikation von E. SCHMIDT zu empfehlen, welche auf der Bildung von Nitroderivaten aus dem Harz beruht.

5 g Wachs werden in einem Kolben mit der 4—5fachen Menge roher Salpetersäure (von 1,33—1,33 spec Gew) zum Sieden erhitzt und eine Minute im Sieden erhalten. Dann fügt man ein gleiches Volumen kaltes Wasser und unter Umschütteln soviel Ammoniakflüssigkeit hinzu, dass die Flüssigkeit deutlich danach riecht. Die ammoniakalische Flüssigkeit wird in ein cylindrisches Glasgefäss abgegossen. Bei reinem Wachs ist sie nur gelb gefärbt, bei Harzgehalt mehr oder weniger rothbraun. (Zeigt noch 1 Proc Harz an.)

Zusammenfassung. Bei einer Untersuchung von Wachs wird man 1) das spec Gew bestimmen, 2) die Methode von HUBL anwenden. Geben beide Verfahren normale Werthe, so kann man das Wachs als normal bezeichnen. Fallen die erhaltenen Zahlen ausserhalb der Norm, so wird man 3) die BENEDIKT-MANGOLD'sche Methode anzuschliessen haben. Beim Einkauf von Wachs bringt man zweckmässig Stichproben einerseits in Wasser, andererseits in Ammoniakflüssigkeit von 15° C. Auf ersterem müssen sie schwimmen, in letzterem untersinken. — Ausserdem wird man gut thun, falls das Wachs von unbekannten Producenten (Bauern) gekauft wird, jedes Wachsbrod durchzuschlagen, damit man nicht etwa alte Hufeisen und dergl. als Wachs bezahlt.

Einkauf, Aufbewahrung. Um reines Wachs zu erhalten, wendet man sich am besten an bekannte, zuverlässige Bienenzüchter oder Bienenzuchtvereine und macht darauf aufmerksam, dass man ein absolut reines Wachs haben will, dass also das Wachs aus Stöcken stammen muss, in welche Kunstwaben nicht gebracht worden sind. Man achte ferner darauf, dass die Böden der Wachsbrode nicht dicke Schichten von Unreinigkeiten enthalten. Am zweckmässigsten ist es, die Wachsbrode sofort zu schmelzen, das Wachs im Dampftrichter zu filtriren und in Formen zu gessen. — Die Aufbewahrung des gelben Waxes erfolgt in Holzkasten an einem trockenen Orte. An einem feuchten Orte überzieht es sich mit Schimmelwucherungen. Während des Lagerns trocknet es aus und kann etwa bis 8 Proc an Gewicht verlieren. Man wird also gut daran thun, bei der Kalkulation auf einen Gewichtsverlust von etwa 10 Proc zu rechnen.

II Cera alba (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.) *Cire blanche* (Gall.) **Weisses Wachs.** Gebleichtes Wachs. **White wax.** White Bees-wax. Das weisse Wachs wird durch verschiedene Bleichverfahren aus dem gelben Bienenwachs dargestellt.

Bei der Rasenbleiche wird das geschmolzene gelbe Wachs auf holzerne Walzen gegossen, welche etwa bis zu ihrer Hälfte in kaltem Wasser rotiren, und dadurch in die Form von dünnen Bändern gebracht, oder man bringt es in die Form von dünnen Fäden, oder man stäubt es unter Druck aus Cylindern in kaltes Wasser. In diesem Zustande ferner Vertheilung wird es alsdann (namentlich während der warmen Jahreszeit) auf Leinwandtüchern unter häufigem Benetzen mit Wasser, bisweilen auch unter Zusatz von Terpentinol der Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt. Wenn der Bleichprocess ein gewisses Stadium erlangt hat, wird das Wachs wieder geschmolzen, in Bänder gegossen und weiterhin dem Sonnenlichte ausgesetzt. Ein Zusatz von etwa 5 Proc Talg hat zur Folge, dass der Bleichprocess rascher verläuft und das Endprodukt weisser ausfällt, auch vermindert dieser Zusatz, dass das Wachs zu spröde wird.

Bei chemischer Bleiche wird das Wachs durch Einwirkung von Chlorkalk oder Wasserstoffsuperoxyd oder durch Kaliumpermanganat oder durch Kaliumbichromat und Schwefelsäure entfärbt. Doch werden durch die Einwirkung dieser Chemikalien die physikalischen Eigenschaften des Waxes merklich verändert. Endlich kann man das gelbe Wachs auch durch Thierkohle entfärben.

Bisweilen sollen die Wachsbleicher dem Wachs, um es weisser zu machen oder weisser erscheinen zu lassen, auch Zusätze von Weinstein, Alaun, Arsenik (?), Bleiweiss,

Schwerspath oder Gips machen, alle diese Zusätze wurden sich schon beim Schmelzen des Waxes im Probirglase zu erkennen geben

Helv schreibt vor, dass das zum Gebräuche für Salben bestimmte weisse Wachs dadurch gereinigt werden soll, dass man 1 Th weisses Wachs mit 10 Th Wasser bis zum Schmelzen des ersteren erhitzt und die Mischung einige Zeit unruhrt. Nach dem Erkalten wird der Wachs Kuchen abgehoben und getrocknet.

Eigenschaften Das weisse Wachs kommt in den Handel in Form runder, dünner Scheiben oder in Form von Tafeln. Es besitzt den eigenartigen Wachsgeruch in geringerem Grade wie das gelbe Wachs, gleichzeitig ist meist auch schwach ranziger Geruch wahrnehmbar. Es ist weiss oder schwach gelblich weiss, etwas durchscheinend, gleichzeitig etwas harter als das gelbe Wachs. Der Bruch ist nicht körnig wie beim gelben Wachs, sondern schwach glänzend.

Der Schmelzpunkt wird durch den Bleichprocess wenig beeinflusst, dagegen wird das spec Gewicht etwas erhöht, allerdings durch den üblichen Zusatz von Talg um fast ebensoviel wieder herabgesetzt.

Konstanten Spec Gew bei 15° C = 0,960—0,970 Schm P etwa 64° C Saurezahl 17,2—25,0 Esterzahl 70—79,8 Verseifungszahl 90,4—98,47

Die Prüfung und Beurtheilung des weissen Waxes erfolgt in der nämlichen Weise, wie für das gelbe Wachs angegeben.

	Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U-St
Schmelzpunkt	ca 64° C	—	—	ca 64° C	—	ca 65° C
Spec Gewicht bei 15° C.	0,965—0,970	—	—	0,966—0,970	0,968—0,970	0,965—0,975

Anwendung Das Wachs findet, wie die Fette, bisweilen als einhüllendes, reizmilderndes Mittel Verwendung in Form von Emulsionen (wozu man als das bessere, gelbes Wachs verwendet, welches gleichfalls eine weisse Emulsion liefert). Ferner bildet es einen Bestandtheil vieler Pflaster und Salben. Zu technischen Zwecken wird es vielfach benutzt, sehr bedeutend ist sein Verbrauch zu Wachskerzen für den katholischen Gottesdienst. Da hier ausdrücklich Bienenwachs vorgeschrieben ist, kann der Apotheker leicht in die Lage kommen, nach dieser Richtung zu Untersuchungen in Anspruch genommen zu werden.

Das gelbe Wachs ist dem weissen überall da vorzuziehen, wo es seiner Farbe wegen nicht stört. Das weisse Wachs ist durch den Bleichprocess insofern verändert worden, als es selbst schon etwas ranzig ist und Fetigemische zum Ranzigwerden mehr disponirt als das gelbe Wachs.

Jungfernwachs (*Cera virginica*) ist das Wachs aus jungen Bienenstöcken. Es hat eine schmutzigweisse oder gelblichweisse Farbe und ersetzt vortheilhaft das weisse Wachs. Amerikanisches und afrikanisches Bienenwachs haben gewöhnlich eine stark braune Farbe und werden deshalb in der Pharmacie nicht angewendet.

Oleum Cerae Wachsöl. Gleiche Theile gepulverter Aetzkalk oder Ziegelsteinstückchen und geschabtes gelbes Wachs werden gut gemischt und in eine gläserne Retorte gegeben der trocknen Destillation unterworfen. Das in der Vorlage gesammelte butterartige Öl wird nochmals über seine 5fache Menge gepulverten Aetzkalk oder Ziegelsteinstückchen rectificirt. Frisch ist es wasserhell und dünnflüssig, von brenzlich-ätherischem Geruche und Geschmacke. Bei längerer Aufbewahrung bräunt und verdickt es sich. Es wurde vor Zeiten zu Einreibungen bei gichtischen Leiden gebraucht.

Emulsio Cerae. Wachsemlusionen werden wie Oeulemlusionen dargestellt, je doch unter Anwendung von geschmolzenem gelbem Wachs und einem Emulsionsmörser, welcher zunächst auf 65° C erwärmt, dann bei 40—50° C warm erhalten wird. Die Ausführung ist folgende:

Rp	Cerae flavae	10,0
	Gummi Arabici q s	
	Aquae destillat	100,0
	Sirupi Aurant. flor	20,0

M f emulsio

In einen Mixturmörser mit starker Reibkeule giebt man 10,0 Wachs und 10,0 Gummipulver und erwärmt den Mörser im Wasserbade bis zum Schmelzen des Wachses. Das Pistill wird für sich bis zu gleicher Temperaturhöhe erwärmt. Dann reibt man (nach Entfernung des Mörsers aus der Wärme des Wasserbades) Gummi und Wachs zusammen und setzt auf einmal 15,0–16,0 kochend heisses Wasser unter Fortsetzung des Agitirens hinzu. Man agitiert, bis das Ganze auf 35–40° C abgekühlt und eine weisse, gleich mässige Emulsion entstanden ist. Dann setzt man in kleinen Portionen die übrigen 85,0 Wasser von gewöhnlicher Temperatur unter fleissigem Agitiren hinzu, zuletzt den Sirupus.

III. Cera chinensis Chinesisches Wachs. Insektenwachs. *Cire d'insectes* Chinese wax. Diese Wachsort wird von der auf der chinesischen Esche *Fraxinus Chinensis* ROXBOROUGH, lebenden Wachsschildlaus, *Coccus ceriferus* FABR oder *Coccus Pe-la* WESTWOOD ausgeschieden.

Die mit einem Wachsüberzuge überkleideten Baumzweige werden im August abgeschnitten und zur Gewinnung des Wachses mit Wasser ausgekocht. Das aufschwimmende Wachs wird nach dem Erkalten abgehoben, umgeschmolzen und geklärt. Es kommt in grossen runden Broten in den Handel, ist rein weiss bis gelblich, ohne Geschmack, und besitzt einen an Talg erinnernden Geruch. Es stellt eine durchscheinende, krystallinische, harte Masse dar.

Konstanten. Schm-P 81–83° C Erstarrp 80,5–81° C Spec Gew bei 15° C = 0,970 (nach GENE & Co = 0,926), bei 99° C (Wasser von 15,5° C = 1,0) = 0,810 Säurezahl 0,0 Verseifungszahl 63,0 (ALLEN), 77,9 (HERRIG).

Es enthält keine freie Säure und besteht aus fast reinem Cerotinsäure Cerylather $C_{27}H_{54}O_2$, $C_{37}H_{74}$, ausserdem sind noch einige nicht näher bekannte Säureester in kleinen Mengen zugegen. Dieses Wachs ist schwer verseifbar, es wird in China und Japan zur Kerzenfabrikation, auch zum Glanzendmachen von Leder und dergl. verwendet.

IV Cera japonica Japanwachs. Japantalg. Japanisches Wachs. Vegetabilisches Wachs. Sumachwachs. *Oleum Rhois succedaneae*. *Cire de Japon* Japan wax.

Das sogen Japanwachs ist kein Wachs, sondern ein Fett. Es wird aus den Steinfrüchten mehrerer Sumacharten (vornehmlich *Rhus succedanea* L., ausserdem noch *R. vernicifera* DC, *R. sylvestris* Sieb und Zucc.) in Japan und Kalifornien gewonnen.

Das rohe Wachs kommt in Form kleiner Scheiben oder viereckiger Tafeln in den Handel. Es wird durch Schmelzen und Filtriren gereinigt und an der Sonne gebleicht. Das gereinigte Japanwachs ist blassgelb, fast weiss, hart (bei +8 bis 10° C sogar spröde), von muscheligem, etwas glanzendem Bruche. Bei längerer Aufbewahrung wird es gelber, und die Oberfläche bedeckt sich mit einem weissen Anfluge (es sieht aus, als ob das Wachs verwittert wäre), welcher aus prismatischen, mikroskopischen Krystallen besteht. In der Wärme der Hand wird es knetbar, beim Kauen klebt es nicht an den Zähnen, dagegen macht sich dabei eine gewisse Ranzigkeit durch Kratzen im Schlunde bemerkbar. Der Geruch ist etwas talgartig, schwach ranzig.

In siedendem Alkohol von 96 Proc. ist es ziemlich leicht löslich, die Lösung erstarrt beim Erkalten zu einer körnig krystallinischen Masse. Aether, Benzin und Petroleumäther lösen es leicht auf. Es ist bis auf einen geringen Rest von etwa 1 Proc leicht verseifbar und besteht der Hauptmenge nach aus Glycerinpalmitat und 9–13 Proc freier Palmitinsäure, enthält auch kleinere Mengen der Glycerinather der Stearinsäure und Arachinsäure und nach ALLEN 8,4 Proc lösliche Fettsäuren, auf Caprylsäure berechnet. Der Glycerin Gehalt wird sehr hoch, nämlich zu 11,6–14,7 Proc angegeben. Der Aschengehalt beträgt 0,02–0,08 Proc, der Gehalt an Wasser 2–4,0 Proc.

Konstanten. Schm-P 52–54° C Säurezahl 18,6–22,4 Esterzahl 190,7–206,3 Verseifungszahl 217,17–225,0 Jodzähl 4–5,0

Nach KLEINSTRÜCK ist das spec Gew des Japanwachses bei 16–18° C = demjenigen des Wassers. Bei niedrigeren Temperaturen wird es höher, bei höheren Temperaturen niedriger.

riger als dasjenige des Wassers (von gleicher Temperatur) Umgeschmolzenes und wieder erstarrtes Japanwachs hat zunächst ein höheres spec Gewicht, beim Lagern nimmt es wieder normale Dichte an

Eine Verfälschung durch Talg würde sich durch die Erhöhung der Jodzahl zu erkennen geben

Das Japanwachs wird zur Kerzenfabrikation, auch zur Darstellung von Pomaden und Salben an Stelle des weissen Bienenwachses angewendet

Neuerdings ist das Japanwachs von FURSTEL als Ersatz des weissen Wachses in Salben etc sehr warm empfohlen worden P giebt folgende Formeln an

Adeps benzoatus			Unguentum leniens		
Rp	Adipis benzoati	97,0	Rp	Cetacei	12,5
	Cerae japonicae	3,0		Cerae japonicae	10,0
				Olei Amygdalarum	57,0
				Aquae Rosae	19,0
				Boracis	0,5
Ceratum Cetacei			Unguentum simplex		
Rp	Cetacei	10,0	Pp	Adipis	85,0
	Cerae japonicae	25,0		Cerae japonicae	15,0
	Olei Olivarum	65,0			

V Cera Carnaubae Carnauba-Wachs. Ceara-Wachs Cire de Carnauba Cire de Carnahuba. Carnauba wax.

Dieses Wachs scheidet sich an der Oberfläche der Blätter der Wachspalme, *Corypha cerifera* L (*Copernicia cerifera* Mart) aus

Das rohe Wachs ist schmutzig grünlich oder gelblich, dem Aussehen nach gleicht es etwa dem gekochten Terpentin (*Terebinthina cocta*), ziemlich hart und spröde, so dass es sich sogar zu Pulver reiben lässt, von einem eigenthümlichen Glanze, etwa wie Meer schaum Es schmilzt bei 84—86° C, ohne aber eine völlig klare Flüssigkeit zu geben, vielmehr ist die geschmolzene Masse trübe, braun, schaumig, infolge Wassergehaltes, dick flüssig — Es löst sich in Aether und in siedendem Alkohol, auch in heissem Terpentinöl vollständig auf, die Lösungen erstarren beim Erkalten unter Abscheidung einer bei 105° C schmelzenden, krystallinischen Masse Beim Verbrennen hinterlässt es etwa 0,5 Proc Asche, in welcher häufig Eisen enthalten ist

Konstanten Schm-P 84—86° C Spec Gew bei 15° C = 0,995—1,000, bei 98—99° C (bezogen auf Wasser von 15,5°) = 0,842 Verseifungszahl = 80—94 Saure zahl 4—8 Aetherzahl = 76,0 Jodzahl = 13,5

Die Zusammensetzung des Carnaubawachses ist noch nicht endgültig festgestellt Es besteht der Hauptsache nach aus Cerotinsäure Myricyläther, etwas freier Cerotinsäure und Myricylalkohol, welcher durch kalten Alkohol dem Wachs entzogen werden kann, daneben noch einige andere Körper von geringerem Interesse Es ist schwer ver seifbar

Carnaubawachs erhöht schon in einer Menge von 5—10 Proc den Schmelzpunkt derjenigen Fette etc erheblich, denen es zugesetzt wird Man benutzt es daher in der Kerzenfabrikation Ferner wird es zur Darstellung von Wachsfrüssen und als Schuster wachs verwendet, auch zur Darstellung von Bohnermassen und von Petroleumseifen, weil Petroleum sich in solchen Seifen löst, welche unter Zusatz von Carnaubawachs dargestellt werden Carnaubawachs kann kaum verfälscht werden, ohne sein Aussehen merklich zu ändern Ein Zusatz von gekochtem Terpentin würde den Schmelzpunkt erniedrigen, die Saurezahl aber erhöhen

VI Adipocire Fettwachs. Leichenfett. Leichenwachs

Der Name ist aus *Adeps* und *Cera* gebildet und bezeichnet eine im wesentlichen aus Fettsäuren oder Seifen bestehende Substanz, welche bei der Zersetzung von Leichen in sehr feuchtem Boden oder unter Wasser, höchstwahrscheinlich infolge mangelnden Luftzutrittes, entsteht

Es ist aussen meist dunkelbraun, von anhaftenden humusartigen Substanzen, innen weiss oder gelblich-weiss, hart, brockelig Es besteht in den meisten Fällen aus Oelsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure und deren Oxyssäuren, bezw aus den Ammoniak- und Kalksalzen dieser Säuren

Das Leichenwachs soll u. a. in den Gebirgsgegenden Schlesiens von Kurpfuschern (Totentgräbern) als Halmittel und zwar mit heissem Wein als schweisstreibendes Mittel gegeben werden

Autographische Tinte 4 Th gelbes Wachs und 3 Th Talg werden geschmolzen, 13 Th venetianische Seife, möglichst fein zerschnitten, nach und nach zugesetzt und ebenfalls zum Schmelzen gebracht, dann werden 6 Th Schellack ebenfalls in kleinen Antheilen zugegeben und geschmolzen, hierauf das Ganze höher erhitzt, bis es weisse Dämpfe ausstösst. Man entzündet diese, erstickt das Feuer nach 2 Minuten (!) durch Auflegen eines gut passenden Deckels und rührt 3 Th Lampenruss in die heisse Masse

Bolnermasse für Linoleum I. Man schmilzt 7 Th gelbes Wachs (oder Ceresin) auf dem Wasserbade und rührt 3 Th Terpentinöl hinzu

II. 1 kg gelbes Wachs, 1,5 kg Terpentinöl, 10,0 g Lavendelöl

III. Man schmilzt 100 Th Carnaubawachs, 900 Th Japanwachs, 600 Th Paraffin (Schmelzpunkt 40°C) zusammen und rührt 2000 Th Terpentinöl hinzu

Braune Wichse für Sommerschuhe. 300,0 g gelbes Wachs werden geschmolzen und mit 1 l Terpentinöl vermischt. Zur fast erkalteten Masse rührt man eine Lösung von 120,0 g venetianischer Seife in 1 l Wasser, sowie eine Auflösung von 25,0 g Nanking Gelb (oder eines anderen passenden Farbstoffes) und rührt das Ganze bis zum Erkalten

Brunolin (Brunolein) Mattlack für Holz zum Einlassen heller Naturholzgegenstände, um dunkle Eiche zu imitiren Gelbes Wachs 75,0, Siocatif 325,0, Terpentinöl 600,0, Goldocker oder Umbrabraun q. s.

Cearin nennt ISSLIS eine neue Salbengrundlage, die aus 1 Th weissem Carnaubawachs (durch Zusammenschmelzen von 25 Th natürlichem Carnaubawachs und 75 Th Ceresin und Rasenbleiche der Mischung hergestellt) und 4 Th flüssigem Paraffin (Germ) durch Schmelzen im Wasserbade und Kaltrühren gewonnen wird, und sich durch ihre Eigenschaft, grössere Flüssigkeitsmengen (bis zu 18 Proc) aufzunehmen, vor der officinellen Paraffinsalbe auszeichnet

Cerotine, Polirmittel für Brandmalerei I Weisses Wachs 1 Th, Terpentinöl 2 Theile II. Carnaubawachs 1 Th, Terpentinöl 5 Th

Einlasswachs. Wird erhalten durch Zusammenschmelzen von 85 Th rohem filtrirten Erdwachs und 15 Th Carnaubawachs

Farbenstifte für Glas und Porcellan. Schwarz 10 Th Lampenruss, 40 Th Wachs, 10 Th Talg Weiss 40 Th Kremsner Weiss, 20 Th weisses Wachs, 10 Th Talg Blau 15 Th Berlinerblau, 5 Th weisses Wachs, 14 Th Talg Man schmilzt die Masse, presst in runde Stifte und trocknet an der Luft

Fussboden-Wichse Man löst 160,0 g Pottasche in 4 l Wasser, setzt 40—60,0 g Orlean allmählich hinzu, kocht und löcht die Kolatur mit 1400,0 g gelbem Wachs und 40 g japanischem Wachs, sowie 90,0 g Kaliseife Nach dem Erkalten verdünnt man mit 12 l Wasser Für braune Wichse ist Umbrabraun nach Bedarf zuzusetzen

Hutglanz, zum Glänzendmachen von Filzhüten, ist eine Lösung von 1 Th Carnaubawachs in 1000 Th Benzin. Sie wird mittels einer Bürste aufgetragen

Lederfett (Stiefelschmiere) Gelbes Wachs 10 Th, Kolophonium 2 Th, Räböl nach Belieben.

Lederglanz. Borax 40 Th, Carnaubawachs 120 Th, Wasser 800,0 Th werden zum Lack gekocht. — Diese Mischung kann als Fussboden-Einlass, als Mattlack für Naturholz u. dergl. verwendet werden. Zur Benutzung als Lederlack löst man in ihr noch 10 Th Nigrosin auf

Modellir-Wachs. I. Gelbes Wachs 1000 Th, Lärchen-Terpentin 130 Th, Schweine schmalz 65 Th, Bolus 725 Th Die noch flüssige Mischung wird in laues Wasser gegossen und geknetet, bis eine plastische Masse erhalten ist II Sommer Modellirwachs Weisses Wachs 20 Th, gemeiner Terpentin 4 Th, Sesamöl 1 Th, Cinnober 2 Th III. Winter-Modellirwachs Weisses Wachs 20 Th, gemeiner Terpentin 6 Th, Sesamöl 2 Th, Cinnober 2 Th Bereitung wie bei I

Moulage-Masse zur Herstellung anatomischer Präparate, namentlich dermatologischer Präparate Gleiche Theile Japanwachs und Carnaubawachs werden zusammengeschmolzen und im Dampftrichter filtrirt Dieser Mischung werden verschiedene Farben, z. B. Zinkoxyd, Bleiweiss u. dergl. zugesetzt

Siegellack, in Weingeist unlöslicher. 5 Th gelbes Wachs, 1 Th Carnaubawachs, 1 Th Paraffin schmilzt man, trägt nach und nach 5 Th Mennige, mit 2 Th Schlamm kriebe gemischt, ein und erhitzt bis zur Dickflüssigkeit Dient zum Versiegeln von Spiritusfässern u. dergl

Stärkeglanz, zum Plätten. 2 Th. Japanwachs, 3 Th bestes Stearin

Tannarin ist ein Schuhwachs aus 1 Th. Carnaubawachs und 3 Th Terpentinöl. Diese Lösung kann durch Theerfarben nach Belieben gelb, braun oder schwarz gefärbt werden

Wichse für gelbe Schuhe I. Gelbes Wachs 25 Th, Terpentinöl 30,0 Th, Talg-Natronseife 2,0 Th, heisses Wasser 25 Th II Gelbes Wachs 20,0 Th, Gelbes Vaseline 80,0 Th
Wasserdichtmachen von Leder Das Leder wird mit einer gesättigten Lösung einer Mischung von 1 Th Wallrath und 9 Th gelbem Wachs in erwärmtem Benzin eingeschmiert

Kühlwachs von Ed HEGEN in Jauer, gegen Brand-, Frost-, Schnitt- und andere Wunden Eine kleine Holzschachtel mit Harzcerat oder gelbem Cerat 0,25 Mark (HAGEN, Analyt)

LAUTEBACH'S Hühneraugenseife besteht aus gelbem Wachs 28,0, Fett 55,0, Salicylsäure 17,0 und kleinen Mengen Perubalsam und atherischen Oelen

Heilsalbe des Apothekers MAAS in Muskau Cerae flavae 15,0, Argenti nitrici 1,75, Adipis 74,0, Balsami peruviani 10,0

Mustache-Balsam zur Beförderung des Haarwuchses Ist eine Mischung von Fett, Wachs und Parfüm

Pflaster von A. SCHRADER in Stuttgart Drei Sorten, empfohlen Nr 1 gegen Knochenfrass und Knochenkrankheiten etc, No 2 gegen Gicht und rheumatische Schmerzen, No 3 gegen Salzfluss, entzündete und offene Brüste, Wunden aller Art Sammtliche 3 Nummern in ausserer Form und Zusammensetzung ziemlich übereinstimmend 16 cm lange, fast 2,5 cm dicke Stangen, bestehend aus 35 Proc Fettmasse, Baumöl und Wachs, 1 Proc Bleiglatte, 20 Proc Knochenasche, 42 Proc Sand, 32 Proc Gyps, Thonerde, Eisenoxyd und Magnesia 120 g, ohne Unterschied der Nummer, = 3,4 Mark (WITTESTEIN, Analyt)

Ricord-Tinktur, gegen veraltete syphilitische Ausschläge, von FR SCHWARZLOSE in Berlin Eine Salbe aus gelbem Wachs, Fett und Provenceroil 40 g = 6 Mark (HAGEN, Analyt)

Salbe der Abbaye Du Bec und die des Abbé PRON entsprechen dem Unguentum basilicum

Salbe von HOLLOWAY, für alle Zwecke dienend, wird bereitet aus 10 Th Cera flava, 10 Th Cera alba, 25 Th Resin pin. alba, 50 Th Adeps suillus und 75 Th Öl Ohvar — Nach DORVAULT ist es ein Gemisch von 125 Th Cera alba, 30 Th Cera flava, 30 Th Terebinthina, 250 Th Resina alba, 30 Th Cetaceum, 500 Th Adeps, 625 Th Öl Ohvae

Salbe, gelbe, von DELORT entspricht dem Unguentum Althaeae

Tegmin, ein Deckmittel für die Haut, ist eine im Verhältniss von 1 2 8 bereitete Emulsion von Wachs, Gummi und Wasser mit 5 Proc Zinkoxyd und wenig Lanolin

Universal-Seife von OSCHINSKY 35 g einer Mischung aus 10 Proc Seife, 8 Proc Wachs, 5 Proc Harz, 70 Proc Fett, vorzugsweise Palmöl, 7 Proc Wasser und Spuren von Lavendel- und Rosmarinöl 1 Mark (HAGEN, Analyt)

Cera benzoinata

ad usum cosmeticum.

Rp	1. Cerae flavae	1000,0
	2. Olei Cacao	200,0
	3. Benzoes pulv	50,0
	4. Alcohol absoluti	80,0

Man schmilzt 1 und 2, rührt 3 später 4 darunter, erhitzt im Wasserbade bis zur Verflüchtigung des Alkohols und filtrirt im Dampftrichter

Cera nigra dura

Ceratum nigrum Schwarz-Wachs

I		
Rp	1. Cerae flavae	200,0
	2. Lathargyn laevigati	20,0
	3. Fuliginis e tecta ustae	6,0

Man kocht 1 mit 2 bis zu einem dunklen Pflaster, rührt 3 darunter und giesst in Formen aus

II

Rp	Mini pulverati	500,0
	Cerae flavae	2000,0
	Fuliginis	120,0

Cera politoria

Politur-Wachs

Rp	1. Ceresini	1000,0
	2. Cerae Carnaubae	800,0
	3. Olei Terebinthinae	500,0

Man schmilzt 1 und 2 und rührt 3 darunter Mit dieser salbenförmigen Mischung, welche mit Terra di Siena, Ocker oder Umbraun gefärbt werden kann, wird das Holzwerk eingegeben, und einige Zeit darauf durch Reiben eine blanke Politur erzeugt S die folgende Vorschrift

Cera politoria liquida DREIERICH

Weiche Möbelpolitur

Rp	1. Cerae flavae	100,0
	2. Aquae	500,0
	3. Kali carbonici	10,0
	4. Olei Terebinthinae	10,0
	5. Olei Lavandulae	5,0

Man kocht 1 mit 2 und 3, nimmt vom Feuer, setzt 4 und 5 zu, rührt bis zum Erkalten und ergänzt mit Wasser auf 1000,0 Die Politur wird mit einem wollenen Lappen ohne Druck aufgetragen und mit Leinwandbausch bis zu starkem Glanze verrieben

Cera rubra

Ceratum rubrum Roth-Wachs

Rp	Cerae flavae	100,0
	Resinae Pini	50,0
	Terebinthinae communis	85,0
	Cinnabari laevigati	
	Mini laevigati	25 6,0

In Tafelform auszugossen

Ceratum arborum

Baumwachs

Rp	Cerae flavae	750,0
	Resinae Pini	1250,0
	Terebinthinae	960,0
	Olei Rapae	120,0
	Sebi ovuli	60,0
	Rhizomatis Curcumae pulverati	60,0

Ceratum arborum liquidum.

Flüssiges Baumwachs

Rp	Colophonii	1250,0
	Pice solidi	200,0
	Olei Linl	120,0
	Terebinthinae communis	50,0
	Cerae flavae	180,0

Werden geschmolzen und unter Umrühren erkalten gelassen. Wenn die Masse anfängt dicklich zu werden, rührt man 400 ccm Brennspritus (90 proc.) darunter und rührt bis zum Erkalten weiter Aufbewahrung in gut verschlossenen Gefässen

Ceratum ad barbam

Bartwachs

I

Rp	Cerae flavae	50,0
	Sebi taurini	20,0
	Adipis	25,0
	Olei Bergamottae	50 gtt.
	Olei Citronellae	5 gtt.

Die Mischung ist in Stangenform zu gießen. Zum Färben setzt man folgende Substanzen zu für Blond 5,0 g Goldocker, für Braun 5 g Umbra, für Schwarz 10 g feinsten Kienruss. Die Farben sind vorher mit etwas Olivenöl fein anzureiben

II

Rp	Cerae benzoinatae	60,0
	Sebi taurini	10,0
	Adipis	20,0

Parfüm und Farbe ad libitum

Ceratum ad barbam Hungaricum

Ungarische Bartwachs Pâte Henri IV

Rp	1 Cerae flavae	10,0
	2 Saponis medicati pulv	10,0
	3 Glycerini	2 ½
	4 Gummi arabici pulv	7 ½
	5 Aquae Rosae calidae	(25,0)
	6 Olei Rosae	gtt 2

Man schmilzt 1 in einem Porzellanmörser im Wasserbade, rührt 2, später 3 und 4 darunter bereitet mit 5 eine steife Emulsion und giebt 6 dazu. In weithalsigen Gläsern abzugeben.

Ceratum ad capillos

I

Stangenpomade nach Dr B Fischer.

Rp	Olei Olivarum	90,0
	Cerae flavae	70,0
	Ostacei	10,0
	Olei Bergamottae	2,0
	Olei Citronellae	0,5

Kann beliebig gefärbt oder parfümiert werden und ist eine der besten Stangenpomaden, die es giebt.

II

Rp	Cerae benzoinatae	100,0
	Sebi taurini	300,0
	Olei odoriferi	15,0
	Olei Amygdalarum	15,0

Ceratum divinum.

Corinum divinum Psau divina

Rp	Cerati Resinae Pini	20,0
	Resinae Pini	10,0

Ceratum pro epistomis

Hahn-Wachs.

Rp	Cerae flavae	ss
	Sebi ovilis	ss

Ceratum flavum (Gall)

Cérat jaune (Gall)

Rp	Cerae flavae	100,0
	Olei Amygdalarum	350,0
	Aquae	250,0

Ist schaumig zu rühren

Ceratum fricatorium

Bohnerwachs, Bohnwachs

I

Rp	1 Cerae flavae	
	2 Ceretini flavi	ss 1000,0
	3 Terrae Sienae ustae	250,0
	4 Vernisii Linl	40,0
	5 Olei Terebinthinae	1200,0

Man schmilzt 1 und 2 rührt 3, welches mit 4 abgerieben ist, dazu und mischt, wenn die Masse halb erkaltet ist, noch 5 darunter

Die durch Erwärmen halb flüssig gemachte Masse wird mit einer Bürste auf das Holzwerk eingerieben und nach dem Abtrocknen mit Bürsten frotiert.

II

Rp	1 Kali carbonici crudi	120,0
	2 Oleum	180,0
	3 Aquae	6 l
	4 Cerae flavae	500,0
	5 Kali carbonici	250,0
	6 Aquae destillatae	500,0

Man kocht 1—3 etwa $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde, kolirt und mischt die Kolatur unter fleissem Umrühren in kleinen Antheilen einer salbenförmigen Seife zu, die aus 4—6 gekocht worden ist, und erhitzt, bis die Masse gleichmässig ist

Ceratum Galeni (Gall)

Cérat de Galien (Gall), Ceratum cum aqua

Rp	Cerae albae	100,0
	Olei Amygdalarum	400,0
	Aquae Rosae	800,0

Ist schaumig zu rühren

Ceratum nigrum militum

Schwarze Lederwachs Militär-Lederwachs Taschenwachs

Rp	Cerae Carnauba	1,0
	Olei Terebinthinae	10,0

Die Lösung ist zu filtrieren und durch Zusatz einer hinreichenden Menge, 0,5—1,0 g, öllichen Nigrosins (Anilinschwarz) zu färben

Ceratum Resinae Pini (Ergänzb)

Emplastrum Ceræ Emplastrum sticticum Emplastrum basilicum Ceratum citrinum Ceratum resinosum Lothring. ger Pflaster Harzpflaster Harzcerat.

Rp	Cerae flavae	200,0
	Resinae Pini	100,0
	Terebinthinae communis	
	Sebi ovilis	ss 50,0

Ceratum simplex

Cérat simple (Gall)

Rp	Cerae flavae	100,0
	Olei Amygdalarum	800,0

Bis zum Erkalten zu rühren.

Ceratum Uvaram

Unguentum de Uvis. Traubenpomade

Rp	Adipis suill	200,0
	Paraffini solidi	50,0
	Olei Bergamottae	
	Tincturae Benzoes	ss 5,0

Unter dem Namen „Trauben-Pomade“ versteht das Publikum *Unguentum pomadinum*

Linteum majale

Sparadrape de cire (Gall)	Toile de mai.
Toile Dieu. Toile souveraine.	
Rp Cerae albae	200,0
Olei Amygdalarum	100,0
Terebinthinae venetae	25,0

Man taucht entweder in die geschmolzene, nicht zu warme Mischung Taffelhänder ein und streicht den Ueberschuss durch Hindurchziehen zwischen zwei erwärmten Eisenlinealen ab, oder man bestreicht die Bänder mittels einer Pflasterstreich-Maschine nur einseitig. Die Grösse der Bänder wird 100×15 cm gewählt.

Pasta Cerafa SCHLEIER**Ceral Wachspaste.**

Rp Cerae flavae	27,0
Olei Coccos	8,0
Lanolini	4,0
Boracis	1,0
Aquae destillatae	60,0

Sparadrapum rubrum

Rp Cerae flavae	100,0
Terebinthinae venetae	50,0
Cinnabaris laevigati	5,0

Taffelhänder werden wie bei Linteum majale mit der Masse bestrichen.

Unguentum anglicum

Rp Cerae flavae	
Cetacei	aa 10,0
Olei Amygdalarum	80,0

Unguentum adhaesivum**Lanolin-Wachspaste (SERR)**

Rp Cerae flavae	40,0
Lanolini anhydrici	40,0
Olei Olivarum	20,0

Unguentum basilicum (Germ)

Unguentum Terebinthinae resinosaum.
Unguentum tetrapharmacum KÖNIGS
salbe Basilicumsalbe Harzsalbe Zug-
salbe

I Germ.

Rp Olei Olivarum	9,0
Cerae flavae	
Colophoni	
Sebi ovilis	aa 3,0
Terebinthinae	2,0

Unguentum leniens (Germ) **Unguentum emolliens (Austr)** **Unguentum**
Aquae Rosae (Brit U-St) **Unguentum refrigerans (Helv)** **Cold-Cream (Gall)**
Crème céleste **Cerat cosmetique**

	Austr	Brit.	Gall	Germ	Helv	U-St.
Cerae albae	10,0	45,0	30,0	4,0	5,0	120,0
Cetacei	20,0	45,0	60,0	5,0	10,0	125,0
Olei Amygdalarum	80,0	270,0	215,0	32,0	60,0	600,0 ccm
Aquae Rosae	20,0	210,0	60,0	16,0	25,0	190,0
Boracis pulv	—	—	—	—	—	5,0
Olei Rosae	—	0,6 ccm	gtt X	gtt i	—	—
Tincturae Benzoes	—	—	15,0	—	—	—

Unguentum leniens**pro usu mercatorio**

Rp Olei Coccos	92,5
Aquae Rosae	7,5
Olei Rosae	gtt. X

Unguentum simplex (Austr)**Einfache Salbe (Austr)**

Rp Adipis	200,0
Cerae albae	50,0

II ad usum veterinarium

Rp Olei Rapae	400,0
Cerae flavae	100,0
Colophoni	150,0
Sebi taurini	200,0
Terebinthinae	50,0

Unguentum Cerae compositum (Hamb Vorschr)

Zusammengesetzte Wachssalbe. Londoner Salbe Unguentum Cetacei Unguentum album Londinense Unguentum Spermatii Cetii.

Rp Cerae albae	1,0
Cetacei	1,0
Olei Olivarum	4,0

Unguentum cereum**Wachssalbe (Unguentum simplex)**

	Germ	Helv
Rp Cerae albae	—	3,0
Cerae flavae	3,0	—
Olei Olivarum	7,0	7,0
Benzoes	—	0,2

Unguentum flavum (Erglinsb)

Unguentum Althaeae. Unguentum Foeni Graeci compositum Unguentum resinosaum (Helv) Gelbe Salbe (Helv). Althaeasalbe Gelbe Heilsalbe

I Germ

Rp 1 Rhizomatis Curcumae pulv	10,0
2 Adipis	500,0
3 Cerae flavae	
4 Resinae Pini	aa 30,0

Man digerirt 1 mit 2 $\frac{1}{2}$ Stunde im Dampfbade, setzt 3 und 4 hinzu, erhitzt bis zum Schmelzen und seigt durch oder filtrirt am besten.

II Helv

Rp Olei Olivarum	65,0
Cerae flavae	17,0
Colophoni	
Terebinthinae venetae	aa 9,0

Cerasus.

Prunus Cerasus L. (syn. *Cerasus Caproniana* D. C.), die Sauerkirsche. Familie der Rosaceae-Prunoidene, wahrscheinlich in Kleinasien heimisch, durch die Kultur weit verbreitet. Verwendung finden die einsamigen Steinfrüchte, *Fructus Cerasi nigri*. *Cerasa*. *Cerasa acida*. — Morellen. Sauerkirschen. Weichselkirschen. — *Corises* (Gall.) mit saftigem Fruchtfleisch, hartem Endocarp und amygdalinhaltigem Samen. Die letzteren machen 5 Proc. vom Gewicht der Frucht aus.




Fig. 179. Gährfass.

Bestandtheile. Der frischen Früchte: Wasser 80,49 Proc., Zucker 8,77 Proc., freie Säure 1,28 Proc., Eiweissstoffe 0,79 Proc., Asche 0,56 Proc.

Anwendung. Die frischen, im Juli reifenden Früchte dienen roh, gedörrt oder in Zucker eingemacht, als Genussmittel. Beim Pressen liefern sie gegen 60 Proc. sauren, purpurrothen Saft, welcher etwa 2,3 Proc. Säure (Weinsäure) und 10 Proc. Zucker enthält.

Pedunculii s. Stipites Cerasorum, Kirschenstiele, *Queues de cerise* (Gall.), die getrockneten Fruchtstiele, welche bisweilen als harntreibendes, katarrhwidriges Mittel verlangt und in geschnittenem Zustande (als Aufguss) angewendet werden.

Aqua Cerasorum. Kirschwasser, s. unter *Amygdalus*, S. 282.


Sirupus Cerasorum (Germ.). Sirupus *Cerasi*. Kirschensirup. Kirschsirup. — *Sirap de cerises* (Gall.). — Cherry-syrup.

Frische, saftreiche Sauerkirschen werden von den Stielen befreit und sammt den Kernen zerquetscht, indem man sie durch ein Walzwerk gehen lässt, oder indem man durch Abreiben auf einem groben Haarsiebe oder durch Pressen in einem weitmäsligen Sack das Fleisch von den Steinkernen trennt und letztere für sich stösst. Den Fruchtbrei lässt man unter öfterem Durchrühren in einem bedeckten Steingefäss bei etwa 20°C. gähren, bis 1 Raumth. einer abfiltrirten Probe sich mit $\frac{1}{2}$ Raumth. Weingeist ohne Trübung mischen lässt, presst aus und stellt den Saft einige Tage im kühlen, dunkeln Raume zur Klärung bei Seite. Alsdann filtrirt man durch Fließpapier und verkocht 7 Th. des Filtrats mit 18 Th. Zucker zu 20 Th. Sirup. Derselbe ist dunkelpurpurroth und muss sich mit 2 Raumth. Weingeist ohne gallertartige Abscheidungen klar mischen lassen. Die Ausbeute beträgt bis zu 200 Proc. der entstieltten Kirschen. Nach dem Erkalten füllt man den Sirup auf sorgfältig gereinigte, völlig trockene Flaschen, verschliesst dieselben mit neuen Korkstopfen und bewahrt sie im Keller, vor Licht geschützt, auf.

Ph. Gall. schreibt für die Fruchtairupe eine Dichte von 1,83 vor und berechnet dementsprechend bei einem spec. Gew. des geklärten Saftes von

1,087	die Zuckermenge für je 1000 g Saft auf	1746 g
1,014	" " " " " " "	1692 "
1,022	" " " " " " "	1638 "
1,029	" " " " " " "	1584 "
1,036	" " " " " " "	1530 "
1,044	" " " " " " "	1476 "
1,052	" " " " " " "	1422 "
1,060	" " " " " " "	1368 "
1,067	" " " " " " "	1314 "
1,075	" " " " " " "	1260 "

Bei der Bereitung von Kirsch-, Himbeer- und anderen Fruchtsäften sind Geräthe aus Eisen oder Zinn durchaus zu vermeiden, da sonst Farbe und Geschmack leicht ver-

ändert werden! Es ist für die Haltbarkeit des Sirups ferner unbedingt notwendig, dass die Gährung bei der vorgeschriebenen Wärme und vollständig zu Ende geführt wird, man lässt sie deshalb bei Darstellung grösserer Mengen in einem geschlossenen Fasse (Fig 179) sich vollziehen, in dessen Spund ein nicht zu enges, entweder zweimal knieförmig gebogenes, mit dem kürzeren Schenkel in ein Gefäss mit Wasser tauchendes, oder ein  förmig gebogenes Glasrohr luftdicht befestigt ist, welches man durch wenig Glycerin gegen die äussere Luft abschliesst. Die Gährung ist beendet, sobald keine Gasblasen mehr entweichen. Als das zweckmässigste Verfahren beim Filtriren gilt im allgemeinen, den Saft abseihen zu lassen und dann aufs Filter zu bringen, sodass der Bodensatz zurückbleibt, es wird aber auch empfohlen, gerade den Bodensatz, nachdem man ihn von dem geklärten Saft getrennt und gut durchgeschüttelt hat, zuerst auf das befeuchtete Filter zu geben und den dünnen Saft nachzufüllen. Bei schwieriger Filtration thut ein Zusatz von abgerahmter Milch oder Fließpapierschutzel und kräftiges Schütteln behufs schneller Klärung oft gute Dienste. Beim Einkochen des Saftes ist sodann darauf zu achten, dass der Zucker bei gelinder Wärme gelöst wird, dass der Sirup weiterhin nicht mehr umgerührt, sondern unter allmählicher Verstärkung des Feuers zum Sieden erhitzt und darin solange erhalten wird, bis das anfangs heftige Schäumen nachgelassen hat. Den hierbei gebildeten, zähen Schaum schöpft man mittels eines durchlöchernten Porcellanöffels ab. Man kocht die Fruchtsäfte in völlig blanken, kupfernen Kesseln und bringt sie alsbald auf Sehtächer aus Flanell. Auf keinen Fall darf man sie in den Kochgeräthen erhalten lassen, sie würden hierbei Kupfer auflösen, missfarbig und unverwendbar werden!

Mixturen mit Alkalien oder Metallsalzen und Kirschsirup gehören zu den unverträglichen Arzneimischungen.

Succus Cerasi **Succus Cerasorum** **Succus e fructu Cerasi** Kirschsafft **Suc de cerise** (Gall.) Der frische Saft (* oben) lässt sich auch ohne Einkochen mit Zucker längere Zeit aufbewahren, wenn man dem Fruchtsaft etwa 2 Proc Zucker zusetzt und den filtrirten Saft nach vollendeter Gährung auf Flaschen füllt, diese lose verkorkt und, mit Holzwole umhüllt, in einem Kessel mit Wasser allmählich bis nahe zum Siedepunkt erhitzt, bei dieser Temperatur 1 Stunde erhält und nun die Flaschen dicht verkorkt. Auch Sättigen mit Kohlensäure bei 2 Atm Druck sichert dem frischen, filtrirten Saft längere Haltbarkeit. Nach Vorschrift der Gall setzt man den Sauerkirschen 10 Proc Süßkirschen zu und lässt nicht den Fruchtbrei, sondern den daraus gepressten Saft bei 12—15° C vergähren.

Der Kirschsafft des Handels ist in der Regel mit Zusätzen (Alkohol oder Salicylsäure) versehen und für pharmaceutische Zwecke nicht geeignet.

Kirsch, **Kirschwasser**, **Kirschbranntwein**, **Bau de cerises**, wird in Südwestdeutschland (Schwarzwald) und der Schweiz (Zug) aus zerstampften Sauerkirschen, die man der freiwilligen Gährung überlässt und dann der Destillation über freiem Feuer, seltener mit Wasserdämpfen unterwirft, dargestellt. Hier und da gewinnt man ein ähnliches Destillat durch Destillation von Branntwein über zerstoßene Kirschkerne oder durch Mischen von Alkohol mit Bittermandelwasser.

Der Kirschbranntwein enthält 47—64 Proc Alkohol, 2—17 mg Blausäure pro Liter, geringe Mengen Kupfer aus den Destillationsgefässen herrührend, Spuren Kalk aus dem zum Verdünnen benutzten Brunnenwasser herrührend, 0,24—1,6 g pro Liter. Man betrachtet den Nachweis des Kupfers (mit Ferrocyankalium oder mit Guajakttinktur) als Beweis für echtes Kirschwasser, es versteht sich aber von selbst, dass man in jedem künstlichen die Echtheit durch Zusatz einer Spur Kupfer vortäuschen kann, was den Fabrikanten künstlichen Kirschwassers wohl bekannt ist.

Geratonia.

Gattung der Caesalpinaceae — Cassieae. Einzige Art

Ceratonia Siliqua L. Johannisbrothbaum, Karobenbaum, Caroubier. Wahrscheinlich heimisch im östlichen Mittelmeergebiet, durch Kultur verbreitet und aus derselben oft verwildert. Die Rinde dient zum Gerben, sie soll 50—55 Proc Gerbstoff enthalten.

Ausgedehnt ist die Verwendung der Hülse, **Fructus Ceratoniae** **Caroba**, **Siliqua dulcis**. — **Johannisbrod** **Bockshorndl**, **Karoben**, **Soodbrod**, — **Caroube** (Gall.) **Carronge**. — **Johnsbread**, **Locust bean**.

Beschreibung. Die Frucht ist eine mit kurzem Stiel versehene gerade oder wenig gebogene Hülse von dunkelbrauner Farbe. Die Länge der kultivirten Frucht be-

trägt bis 25 cm, die Breite bis 4 cm; wilde sind viel kleiner. Die Ränder sind wulstig verdickt, die Seiten eingesunken, fein gerunzelt. Sie enthalten bis 14 Samen in flachen, elliptischen Fächern. Die Samen sind flach, breit eiförmig, bis 5 mm lang, glänzend rothbraun mit dünnem Funikulus. Sie enthalten im grau gefärbten Endosperm den Embryo mit dicken, gelben Kotyledonen. — Die Epidermis des Pericarp ist mit einer deutlichen Cutikula bedeckt, in ihr finden sich Stomatien (Fig. 180 *s*), darauf folgen rundliche, gerbstoffreiche Zellen (Fig. 180 *rp*) und darauf Gefäßbündel mit ansehnlichen Faserbündeln, die von Kammerfasern begleitet sind (Fig. 180 *b* u. *k*). Das übrige Gewebe besteht vorwiegend aus dünnwandigem Parenchym, die Samen-Fächer sind von Faserzellen ausgekleidet. In den Parenchymzellen liegen querfaltige, hohle, sackartige, farblose, gelbliche, oder schwach kupferrothe Massen (Fig. 180 *z*), die mit Eisensalzen schwarzblau, mit Kalilauge blau, mit Vanillin und Salzsäure schön roth werden. Auf diese Massen ist in erster Linie zu achten, wenn es sich um den Nachweis von Ceratoniafrüchten, z. B. im Kaffee handelt. In dessen ist daran zu denken, dass dieselben auch in einigen anderen Früchten, z. B. in




Fig. 180. Aus dem Gewebe der Frucht *Ceratonia*. 180 Mal vergr. *ep* Epidermis mit Spaltöffnung *s*, *rp* Braunes Parenchym unter der Epidermis, *b* Faserbündel mit Steinzellen *st* und Krystallkammerfasern *k*, *sp* Spinalgefäße, *z* Die sackartigen Inhaltkörper. (Nach MOZLER.)

den Datteln vorkommen. Es sind daher, wenn sie aufgefunden sind, auch die Faserbündel der Fibrovasalstränge mit ihren Kammerfasern zur endgültigen Identifizierung aufzusuchen.

Die Samenschale ist nach dem allgemeinen Typus der Leguminosen mit Palissaden und Trägerzellen gebaut. Das Endosperm ist ausgezeichnet durch starke Verquellung der Membranen.

Bestandtheile. Sie enthalten im Durchschnitt: Wasser 14,96 Proc., Stickstoffsubstanz 5,86 Proc., Fett 1,28 Proc., Kohlehydrate 68,98 Proc., Holzfaser 6,39 Proc., Asche 2,58 Proc. Der Zuckergehalt beträgt 80–46 Proc. Ferner enthalten sie etwas Buttersäure (bis 1,5 Proc.), der sie den charakteristischen Geruch verdanken. Die Frucht enthält 90–88 Proc. Pericarp und 10–12 Proc. Samen. Die Samen enthalten ein Kohlehydrat Carubin, ein Ferment Carubinase und einen Zucker Carubinose, der durch Einwirkung des Fermentes auf das Carubin entstehen soll.

Anwendung. Die Hülsen finden im Süden ausgedehnte Verwendung als Viehfutter und als Nahrung der ärmeren Klassen. In Portugal, auf den Azoren und in Triest macht man Alkohol daraus, hier und da auch Sirup. Ferner dienen sie bei der Bereitung von Tabakssaucen und geröstet als Kaffeesurrogat (vergl. Coffea). Arzneilich verwendet man sie hier und da in Theegemischen.

Aus den Samen macht man einen Klebstoff, indem man sie spaltet, den Embryo entfernt und dann mit Wasser von 70—82° C digerirt. Der Schleim wird dann mit Mehl und etwas Salzsäure zur Appretur von Geweben benutzt.

Lactina ist ein Mehl aus Johannisbrod, Weizen, Gerste, Eibischwurzel und Bockshornsamensamen.

Als *Sherry-Essenz* kommt im Handel ein mit Nelken und Zimmt gewürzter, weingeistiger Auszug aus Johannisbrod (und anderen zuckerhaltigen Früchten) vor.

Viehpulver, *Thorleys Food for cattle*, ist aus Mais, Leinsamen, Johannisbrod und Bockshornsamensamen zusammengesetzt.

Cerefolium.

Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm. Familie der Umbelliferae—Apioidae—Scandicinae. Wahrscheinlich heimisch im südöstl. Russland und im westlichen Asien, vielfach für Küchenzwecke kultivirt und verwildert.

Beschreibung. Die Wurzel ist dünn, spindelförmig, der Stengel bis 70 cm hoch, gestreift, über den Knoten behaart. Die Blätter sind dreifach-fiederspaltig, unterseits glänzend, an den Nerven zerstreut behaart, die Fiedern sind fast fiederspaltig oder dreilappig, gewimpert, in eine Borste auslaufend, die Blätter am Grunde mit hautig gerandeter Scheide. Blüten in Doppeldolden, Döldchen mit Involucellum.

Von charakteristisch-aromatischem Geruch und Geschmack. Man verwendet das blühende Kraut.

Herba Cerefolii. Hb. Cerefolii sativi. Hb. Chaerophylli. Hb. Scandicis. — Echter Kerbel. Gartenkerbel. Körbelkraut. Suppenkraut. — Cerfeuil (Gall.) — Garden Chervil.

Einsammlung. Anwendung. Die Pflanze wird während der Blüthe gesammelt und getrocknet. Mit 5 Proc. Wasser gequetscht und ausgepresst liefert sie den *Succus Cerefolii recens*, 10 Th. desselben, auf 85° C erhitzt, nach dem Erkalten durchgeseiht, mit 3 Th. Weingeist versetzt und filtrirt, geben mit 18 Th. Zucker den *Sirupus Cerefolii*.

Tisane d'oseille composée.

Tisane d'oseille composée. Bouillon aux Herbes (Gall.)

Ep	1.	Fol. Rumicis Acetosae	40,0 g
	2.	Fol. Lactucæ capitæ	20,0 „
	3.	Fol. Cerefolii	10,0 „
	4.	Salis marini	2,0 „
	5.	Butyri recentis	5,0 „
	6.	Aquæ destillatæ	1000,0 „

Man kocht 1, 2, 3 mit 6 ½ Stände, fügt 4 und 5 hinzu und seigt durch.

Herba Cerefolii hispanici ist das Kraut von *Myrrhis odorata* Scop.

Cereoli.

Wundstäbchen. Heilstäbchen. Bacilli medicinales. Bougies.

Zur Einführung in Kanäle des Leibes bestimmte, auf verschiedene Weise hergestellte, meist nach dem einen Ende hin verjüngte, selten starre, in der Regel biegsame oder elastische runde Stäbchen, welche bald in ihrer ganzen Masse, bald nur in deren äußerer Schicht Arzneimittel eingebettet enthalten oder mit solchen überzogen sind.

Antrophore sind Wundstäbchen, welche in ihrem Innern der Länge nach von einem federnden Drahtgewinde durchzogen sind.

Der Name „Cereoli“ stammt von „cera = Wachs“ und wurde für wachsstockartige Präparate benutzt, die insbesondere zur Einführung in die Harnröhre bestimmt waren. Die französische Bezeichnung ist „Bougies“.

Sie wurden ursprünglich in der Weise hergestellt, dass man Leinwandstreifen von 80 cm Länge und 4—5 cm Breite in ein geschmolzenes Gemisch von 100 Th Wachs und 10 Th Olivenöl tauchte, diese Streifen zu festen Cylindern von der Stärke eines Ganseskiels zusammenrollte und alsdann durch Rollen mit dem Pflasterrollbrett glättete.

Ähnlich wurden Darmsaiten, ferner auch Dochtbäden, mit der gleichen Wachsoelmischung überzogen und gleichfalls zum Einführen in die Harnröhre verwendet. An Stelle der Wachsoelmischung benutzte man auch Mischungen von Wachs mit Bleiesig. Diese Formen sind heute vollständig veraltet.

Germ umfasst als „cereoli“ alle die zur Einführung in Körperhöhlungen, insbesondere aber in die Harnröhre, bestimmten Arzneistäbchen. Der deutsche Name „Wundstäbchen“ ist nicht ganz zutreffend, weil der Arzt unter Umständen auch die Absicht verfolgen kann, einen Arzneistoff von der nicht wunden Schleimhaut resorbieren zu lassen. Als zweckmassiger ist der Name „Heilstäbchen“ vorgeschlagen worden.

Die Grundmasse aller sogen. Bougies besteht entweder aus Kakaoöl oder Gelatine oder arabischem Gummi.




Fig 181

A. Bougies aus Kakaoöl. Man stösst feingeriebenes Kakaoöl mit $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{15}$ Th Lanolin zu einer plastischen Masse an, arbeitet die medikamentöse Substanz legeteils darunter und rollt die Masse mit Hilfe von etwas Talcum oder Lycopodium auf einer Glasplatte oder Marmorplatte oder auf Wachspapier zu Stängelchen von der geforderten Länge und Dicke aus. Bisweilen empfiehlt es sich auch, die Masse in Glasröhren oder Metallformen auszugliessen und die Stängelchen nach dem Erstarren durch Ausstossen zu gewinnen. Alsdann kann man das Ausstossen der Stangen durch kurzes Durchziehen der Glasröhren durch eine Flamme erleichtern. Die durchschnittliche Länge dieser Stäbchen beträgt etwa 10—12 cm.

Im Grossbetriebe presst man die Stängelchen auch mit Hilfe von Pflasterpressmaschinen aus und verwendet alsdann Kakaoöl ohne Zusatz von Lanolin.

Derartige kleine, sog. Bougiepressen sind gegenwärtig von Rob. Liebau in Chemnitz zu ziemlich wohlfeilem Preise zu beziehen, ihre Anschaffung ist zu empfehlen. Bei etwas Geschick kann man auch eine gewöhnliche Zinnspritze zur Bougiespritze umwandeln, indem man das verjüngte Ende passend kurz abschneidet und die Oeffnung erweitert. Die ausgetretenen Stäbchen müssen alsdann auf einer Glasplatte gerade gerollt werden.

Kakaoöl als Grundmasse lässt sich nahezu für alle Arzneisubstanzen anwenden.

Auf 1 Stäbchen aus Kakaoöl rechnet man bei 10 cm Länge und 2 mm Dicke = 0,3 g Kakaoöl. Wächst die Dicke um je 1 mm bei gleicher Länge, so braucht man 0,7 bis 1,25 bis 2,0 bis 2,9 bis 4,0 bis 4,75 g (= 8 mm dick).

Excelsior-Bougies von Sauter in Genf sind Kakaoöl Bougies, welche verschiedene Arzneistoffe enthalten. Ein mittels besonderer Maschine hergestellter fester, biegsamer Fettkern wird mit einer Schicht Kakaoöl und Lanolin, welcher die Arzneistoffe beigemischt sind, überzogen. Die weiche Umhüllung schmilzt, sobald sie mit den Schleimhäuten in Berührung kommt, und die örtliche Arzneiwirkung beginnt sofort, während der Kern nach zwei Minuten allein herausgezogen wird.

B. Bougies aus Gelatine. Sie werden in der Weise hergestellt, dass man 2 Th feingeschnittene Gelatine mit 1 Th Wasser erweicht, sodann bis zur Auflösung erwärmt und 4 Th Glycerin hinzufügt. Nachdem nun noch die Arzneistoffe hinzugesetzt worden sind, giesst man die Masse in erwärmte und mit Oel schwach (!) ausgeriebene Metallformen aus, die man rasch auf Eis abkühlt. Nach dem Erkalten nimmt man die Stäbchen heraus.

und lässt sie an einem warmen Orte etwas übertrocknen, worauf man sie in Kästen zwischen Wachspapier einpackt.

Die Pharm. Italica giebt folgende Vorschrift: Man löst 6 Th. Hausenblase in 20 Th. Wasser, fügt 3 Th. Glycerin hinzu, dampft bis auf 23 Th. ein und setzt die Arzneisubstanz hinzu.

Nicht geeignet zum Zusammenmischen mit dieser Grundsubstanz sind Arzneistoffe, welche Gerbsäure und Metallsalze, die mit Leim Fällungen geben (Silber-, Quecksilber-, Thonerdesalze) in grösseren Mengen enthalten. Die durchschnittliche Länge dieser Stäbchen beträgt etwa 10 cm.

C. Bougies mit arabischem Gummi. Man stellt sie dar, indem man feingepulvertes arabisches Gummi und das Arzneimittel (event. unter Zusatz von etwas Zuckerpulver) mit einer Mischung aus gleichen Theilen Gummischleim und Glycerin zu einer plastischen Masse anstösst, welche in dünne Stangen ausgerollt wird. Als Beispiel geben wir nachfolgende Vorschriften:

Rp. Jodoformli	10 g	Rp. Bismuti subnitrici	1 g
Gummi arabici	5 g	Gummi arabici	5 g
Glycerini		Sacchari albi	1 g
Mucilag. Gummi arab.	aa q. s.	Glycerini	
ut fiant cereoli No. 20.		Mucilag. Gummi arab.	aa q. s.
		ut fiant cereoli No. 10.	

Sämmtliche sub A bis C aufgeführten Bougies müssen bei Körpertemperatur schmelzbar bez. in den Sekreten der Schleimhäute löslich sein. Die unter B und C zusammengefassten sollen ausserdem auch elastisch sein. Die durchschnittliche Länge dieser Stäbchen beträgt 10–15 cm.

Die gebräuchlichsten Stärken werden durch nebenstehende Nummern angegeben:




Fig. 182.

Anthrophore sind 1886 von STEPHAN konstruierte Bougies. Ihr Kern ist eine Metallschleife aus Kupferdraht oder vernickeltem Kupferdraht.

Diese Schleife ist zunächst mit einem dünnen Kautschukschlauch überzogen und alsdann durch mehrfaches Eintauchen in die betr. flüssigwarmer Masse mit einer Gelatinemasse überzogen, welche die Arzneisubstanz entweder suspendirt oder gelöst enthält.

Die dünneren Sorten werden in der Länge von 22 cm, die dickeren in derjenigen von 10 cm hergestellt.

Anthrophore dienen zur Einführung von Arzneisubstanzen in sonst schwer zugängliche Körperhöhlen, z. B. in die Harnröhre und in die Nase.

Urethral-Anthrophore sind 14–22 cm lang.

Prostata-Anthrophore sind von gleicher Länge, enthalten die arzneiliche Substanz nur im vorderen $\frac{1}{4}$ Theil ihrer Länge, der übrige Theil dieser Anthrophore besitzt lediglich einen Gelatine-Ueberzug, der durch Behandeln mit Gerbsäure unlöslich gemacht ist.

Uterin-Anthrophore sind 8–12 cm lang.

Nasal-Anthrophore, zum Einführen in die Nase bestimmt.

Cereoli Acidi tannici, Gerbsäure-Stäbchen (Ergänzb.). 10 Th. Gerbsäure und 10 Th. fein gepulverte Borsäure werden mit einer Mischung aus gleichen Theilen Gummischleim, Glycerin und Wasser zu einer bildsamen Masse angestossen und daraus cylindrische Stäbchen geformt.

Cereoli Acidi tannici elastici. Elastische Gerbsäure-Stäbchen (Ergänzb.). Gelatinae 10,0, Glycerini, Aquae aa 20,0 werden im Dampfbade geschmolzen; der heissen Masse wird eine Lösung von Acidi tannici 0,5 in Aquae 0,5 zugemischt und die flüssige Mischung in Metallformen, welche mit Paraffinöl schwach ausgerieben sind, ausgegossen. Man bilde 6 cm lange Stäbchen.

Cereoli Jodoformli elastici. Elastische Jodoform-Stäbchen. (Ergänzb.). Gelatinae concisae, Aquae, Glycerini aa 3,0. Man lässt $\frac{1}{2}$ Stunde quellen, schmilzt unter vorsichtigem Erhitzen und Ergänzung des etwa verdampften Wassers im Wasserbade,

mischt 1 Th Jodoform sublt pulv hinzu und saugt die Mischung in gut geölte Glasröhren auf. Nach dem Erkalten stösst man die Stäbchen mit Hilfe eines Korkes aus.

Cereoli Jodoformii Jodoform-Stäbchen (Erganzb.) Jodoform sublt pulverat 10,0, Olei Cacao 9,0, Olei Amygdalarum 1,0 werden im schwach erwärmten Porcellanmörser gemischt. Die halb erkaltete Masse wird in Glasröhren von 3 mm Lichtweite aufgesogen, worauf man diese in kaltes Wasser stellt. Die Stäbchen werden nach dem Erkalten ausgestossen und in 6 cm lange Stücke geschnitten. — Man kann sie auch durch Ausgiessen in stark abgekühlte Höhlensteinformen darstellen.

Jodoform Stäbchen mit grösserem Jodoformgehalt und von festerer Beschaffenheit erhält man, wenn man 92 Th Jodoform mit 5 Th gepulvertem arabischen Gummi und einer Mischung aus gleichen Theilen Wasser und Glycerin zu einer bildsamen Masse anstösst und die durch Ausrollen geformten Stäbchen bei 40–50° C trocknet.

Antiseptische Stäbchen nach ADRIAN. Als Grundmasse dient eine Mischung aus 50 Th Talcum venetum pulv und 3 Th Tragacantha pulv, die mit einer Mischung aus gleichen Theilen Wasser und Glycerin angestossen wird. Die antiseptischen Stoffe werden vorher mit dem Talcum gemischt.

Cereus.

Gattung der Cactaceae — Cereoidae — Echinocactaeae.

I Cereus grandiflorus Mill Königin der Nacht, Night blooming Cereus, Cirio de flor grande. Heimisch in Mexiko und auf den Antillen.

In den Handel gelangen Abschnitte der Achse und die Blüthen. Die ersteren bestehen aus 1½–2 cm dicken Stücken von verschiedener Länge mit 5–7 Ecken, an denen in Abständen von 2 cm Büschel von 6–8 Dornen sitzen. Im Parenchym grosse Krystalle und Sphärite von Oxalat, wie häufig bei den Cactaceen.

Die Pflanze enthält als wirksamen Bestandtheil ein auf das Herz wirkendes Alkaloid und Glykoside, die alle noch nicht genauer studirt sind.

Man empfiehlt sie bei Herzkrankheiten als Ersatz von Digitalis und Strophanthus. Der frische Saft ruft auf der Haut Jucken und Pusteln hervor, im Munde Brennen und Uebelkeit, endlich Erbrechen und Dysenterie.

Die Blüthen sollen im Handel mit den unwirksamen Blüthen der *Opuntia decumana* Haw verwechselt werden.

II Cereus peruvianus (L.) Haw., heimisch in Sudamerika.

Enthalt ein krampfzeugendes Alkaloid.

III Cereus Bonplandii Parm, heimisch in Brasilien und Argentinien, soll wie I wirken.

IV Cereus giganteus Englm und **Cereus Thurberi Englm** liefern durch Gährung ein alkoholhaltiges Getränk.

Carevisia.

Carevisia. Bier. Bière. Beer (engl.)

Bier ist ein aus Gersten (Weizen-)Malz durch Vermaischung mit Wasser bereitetes, mit Hopfen gekochtes und durch Hefe in Gährung versetztes Getränk, dessen Extraktbestandtheile theilweise vergohren sind, und das sich noch im Zustande einer gewissen Nachgährung befindet.

Eine für das gesammte Deutsche Reich gültige gesetzliche Definition des Begriffes „Bier“ existirt nicht. Für Bayern ist eine Bestimmung vorhanden, dass zur Bereitung von Bier lediglich Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ausschliesslich aller Surrogate verwendet werden dürfen.

Obergährige Biere sind solche, bei denen die Gährung nicht bei niedriger Temperatur gehalten wird. Die Gährung verläuft infolge dessen sehr rasch, aber die so erzeugten Biere sind im allgemeinen weniger haltbar, sie müssen rasch konsumirt werden. Zu diesen Bieren, welche sich durch einen hohen Gehalt an Kohlensäure auszeichnen, gehört z. B. das sogen. Jungbier, Fassbier, Hausbier, aber auch das Grätzer Bier.

Untergährige Biere sind solche, bei denen die Gährung durch Einhaltung niedriger Temperatur langsam verläuft. Diese Biere sind von grösserer Haltbarkeit und können eingelagert werden.

Lagerbiere, Schankbiere, die Bayerischen, Pilsener Biere sind untergährige Biere, Porter und Ale sind aus sehr starken Würzen hergestellte obergährige Biere. Weissbier und Gose sind obergährige, meist noch im Zustande stürmischer Gährung an die Konsumenten abgegebene Biere. Bockbiere, Salvatorbiere sind besonders stark eingebraute, untergährige Biere.

Die Farbe des Bieres hängt in erster Linie von der verwendeten Malzsorte ab. Zu ganz hellen Bieren wird sogen. Lichtmalz, zu dunkleren Bieren starker gedörrtes Malz (Farbmalz) verwendet. Gewisse, ganz dunkle Biersorten werden auch mit Zuckerhouleur gefärbt (Kulmbacher Biere).

Die Untersuchung der Biere erfolgt nur in Ausnahmefällen in der Absicht, eine Verfälschung nachzuweisen. Eine solche erfolgt gewöhnlich nicht durch den Bierbrauer, sondern durch Zwischenhändler. Da unsere grösseren Brauereien ein ausserordentlich gleichmässiges Bier brauen, so lässt sich in solchem Falle eine stattgehabte Verfälschung bisweilen durch vergleichende Untersuchung des betreffenden normalen und des verdächtigen Bieres nachweisen.

Gegenwärtig erfolgt die Untersuchung der Biere in der Regel unter dem Gesichtspunkte der Werthbestimmung, d. h. um verschiedene Biersorten ihren Eigenschaften nach mit einander zu vergleichen.

Im Nachstehenden geben wir eine Anweisung zur Ausführung der wichtigeren Bestimmungen im Bier nach den „Vereinbarungen der freien Vereinigung bayerischer Vertreter der angewandten Chemie“.

1) Bestimmung des specifischen Gewichtes. Da die zu den einzelnen Bestimmungen dienenden Biermengen nicht gewogen, sondern gemessen werden, die Resultate aber in Gewichtsprocenten anzugeben sind, so ist die Bestimmung des specifischen Gewichtes jeder Biersorte erforderlich, nachdem dieselbe von der gelösten Kohlensäure thunlichst befreit ist.

Zu diesem Zwecke bringt man das Bier in einen nur zur Hälfte anzufüllenden Kolben und schüttelt, sobald das Bier Zimmertemperatur angenommen hat, solange kräftig, bis beim wiederholten Schütteln des mit der Hand verschlossenen Kolbens kein Druck mehr wahrnehmbar ist. Hierauf filtrirt man das Bier durch ein trockenes Faltenfilter.

Die Bestimmung des spec. Gewichtes erfolgt bei 15° C mittels Pyknometers oder einer grossen Westphal'schen Wage unter Benutzung eines Reiters für die vierte Decimale.

2) Bestimmung des Extractes (Extraktrestes). 75 ccm Bier, deren Gewicht auf der Wage zuvor genau (!) festgestellt worden ist, werden in einem Schälchen oder Bechergläschen auf der Asbestplatte unter Vermeidung des Kochens (!) auf 25 ccm eingedampft und nach dem Erkalten genau (!) auf das ursprüngliche Gewicht (!) gebracht. — Von der sorgfältig gemischten Flüssigkeit wird das spec. Gewicht wie unter 1) genommen. Aus dem erhaltenen spec. Gewicht ist der Extraktgehalt nach der „Tafel zur Ermittlung des Zuckergehaltes wässriger Zuckerlösungen aus der Dichte bei 15° C von Dr. C. Winkisch“ (s. Saccharum) zu berechnen.

Der Destillationsrückstand von der Alkoholbestimmung darf zur Extraktbestimmung nicht verwendet werden, weil er gewöhnlich Ausscheidungen enthält, welche das spec. Gewicht beeinflussen.

3) Bestimmung des Alkohols. Der Alkohol wird durch Destillation des Bieres bestimmt. Als Vorlage benutzt man ein langhalsiges Pyknometer für 50 ccm mit einer

Skala am Halse Der Rauminhalt des Pyknometers muss für jeden Grad der Skala genau ausgewogen worden sein

Von 75 ccm des von Kohlensäure befreiten Bieres wird soviel in dieses Pyknometer überdestillirt, bis das Destillat in dem Halse ungefähr in die Mitte der Skala reicht, dann wird auf 15° C temperirt, gewogen und aus dem hiernach berechneten spec Gewichte des Destillates der Alkoholgehalt aus der „Tafel zur Ermittlung des Alkoholgehaltes von Alkoholwassermischungen aus dem spec Gewichte von Dr C WINDISCH“ entnommen s Spiritus

Bezeichnet man mit D das Gewicht des alkoholischen Destillates, mit d dessen Alkoholgehalt in Gewichtsprocenten, mit G das Gewicht des angewendeten Bieres und mit A den Alkoholgehalt des Bieres in Gewichtsprocenten, so verhält sich

$$100 \quad d = D \quad x \quad x = \frac{D \quad d}{100}$$

$$G \quad \frac{D \quad d}{100} = 100 \quad A \quad A = \frac{D \quad d}{D}$$

Da jedesmal 75 ccm Bier verwendet werden, so ist $G = 75 \times \text{spec Gew (s)}$, und man erhält nun, diesen Werth in die letzte der Gleichungen eingesetzt

$$A = \frac{D \times d}{75 \times s}$$

Der Alkoholgehalt des Bieres ist in Gewichtsprocenten anzugeben. — Hat man das spec Gewicht des Bieres im ursprünglichen und entgasteten Zustande festgestellt, so lässt sich der Alkoholgehalt auch berechnen (s Vinum), doch ist diese Berechnung nur zur Kontrolle für die gewichtsanalytische Bestimmung zulässig

Saure Biere sind vor der Destillation zu neutralisiren, obwohl der bei Unterlassung dieser Maassregel begangene Fehler nicht gross ist.

4) **Ursprünglicher Extraktgehalt der Würze** Da der Zucker bei der Gährung etwa 50 Proc Alkohol und 50 Proc Kohlensäure giebt, so ist also etwa die doppelte Menge des gefundenen Alkohols ursprünglich als Zucker vorhanden gewesen

Man findet demnach den ursprünglichen Extraktgehalt E der Würze, wenn man die gefundenen Gewichtsprocente Alkohol A verdoppelt und hierzu die Gewichtsprocente des gefundenen Extraktgehaltes s addirt. Dann ist

$$E = s + 2 A$$

Diese Formel ist indessen nicht genau, weil eben nicht genau 50 Proc Alkohol und 50 Proc Kohlensäure aus 100 Th Zucker bei der Gährung entstehen. Deshalb soll der Extraktgehalt aus der folgenden Formel

$$\frac{100 (E + 2,0665 A)}{100 + 1,0665 A}$$

berechnet werden. Unter allen Umständen aber ist in jedem Falle anzugeben, welche Formel bei der Umrechnung benutzt worden ist

5) **Vergährungsgrad der Würze** Man bezeichnet als Vergährungsgrad die von 100 Gewichtstheilen des ursprünglichen Wurzenextraktes durch Hefe vergohrene Extraktmenge

Der Vergährungsgrad V ergibt sich aus dem nach 4) berechneten ursprünglichen Extraktgehalt der Würze E und dem nach 2) ermittelten Extraktrest des Bieres e

$$\frac{E - e - s = 100 \quad V_1}{V_1 = 100 \frac{(E - e)}{E}} = 100 \left(1 - \frac{e}{E} \right)$$

6) **Bestimmung des Zuckers** (Werth für Zucker und Reduktionswerth der Dextrine)

Die Bestimmung ist in dem von Kohlensäure befreiten (s oben 1) und entsprechend (1·5) verdünnten Bier nach dem von E WEIN zur Bestimmung der Maltose angegebenen Verfahren auszuführen. D h., man bringt in eine Porcellanschale 50 ccm Fehling'sche

Lösung, erhitzt zum Sieden, lässt alsdann aus einer Pipette 25 ccm des 1 5 (oder anderweit passend) verdünnten Bieres zufließen und erhält die Mischung genau 4 Minuten (!) im Sieden. Das ausgeschiedene Kupferoxydul wird in einem Asbest-Filterrohrengesammelt, gewaschen, getrocknet und im Wasserstoffströme zu metallischem Kupfer reducirt. Aus dem Gewicht des metallischen Kupfers findet man die diesem entsprechende Menge Maltose aus der Tabelle von WEIN. Ueber die Einzelheiten des Verfahrens siehe unter Saccharum.

7) Bestimmung der Dextrine. Man versetzt dreimal je 200 ccm des 1 5 verdünnten Bieres mit 20 ccm Salzsäure vom spec. Gew. 1,125 und erhitzt diese Mischungen am Rückflusskühler im Wasserbade verschiedene Zeit lang 1 bzw. 2, bzw. 3 Stunden. Dann kühlt man die Lösungen rasch ab, neutralisirt mit Natronlauge und verdünnt so weit, dass sie höchstens 1 Proc. Dextrose (!) enthalten. In je 25 ccm jeder dieser Lösungen wird der Dextrosegehalt bestimmt. Das höchste Resultat, welches von den drei Lösungen erhalten wurde, wird als das zutreffendste angenommen.

Von dem so erhaltenen Dextrosewerth ist der nach 6) erhaltene Reduktionswerth, auf Dextrose umgerechnet, in Abzug zu bringen. Der verkleinerte Rest giebt, mit dem Osr'schen Faktor 0,925 multiplicirt, die Menge des Dextrins.

8) Bestimmung des Stickstoffes. Die Bestimmung erfolgt nach dem Verfahren von KJELDHAL. 20—25 ccm Bier werden im KJELDHAL-Kolben mit 2—3 Tropfen conc. Schwefelsäure versetzt und eingedampft. Zum Verdampfungsrückstand fügt man alsdann 15 ccm conc. reine Schwefelsäure sowie 2 Tropfen metallisches Quecksilber, zerstört wie üblich und bestimmt die Menge des vorhandenen Ammoniaks. Ueber die Einzelheiten s. unter Nitrogenum.

9) Säurebestimmung. a) Bestimmung der Gesamtacidität.

Die Acidität des Bieres rührt her von primären Phosphaten, nichtflüchtigen und flüchtigen organischen Säuren und wird im normalen Biere etwa zur Hälfte von primären Phosphaten bedingt.

Der Säuregehalt wird nach PRIOR mit $\frac{1}{10}$ Normallauge unter Verwendung von rothem Phenolphthalein (s. Phenolphthalein) als Indikator bestimmt. Die Acidität ist entweder in cem-Normallauge oder in Gewichtsprocenten Milchsäure anzugeben.

Das vom grössten Theile der gelösten Kohlensäure nach 1) befreite Bier wird im bedeckten Becherglase $\frac{1}{2}$ Stunde bei 40° C gehalten, dann nochmals filtrirt.

Zur Ausführung der Bestimmung verwendet man 25 oder 50 ccm des so vorbereiteten Bieres. Dunkle Biere verdünnt man vorher mit dem doppelten Volum kohlensäurefreien (!) destillirten Wassers. Von dem rothen Phenolphthalein bringt man mittels eines Glasstabes einen grossen Tropfen in eine der napfförmigen Vertiefungen einer weissen Porcellanplatte. Die Titration ist beendet, wenn 6 Tropfen der Flüssigkeit zu 1 Tropfen des Indikators gegeben und vermischt, die Rothfärbung nicht zum Verschwinden bringen.

b) Bestimmung flüchtiger Säuren.

Diese erfolgt nach dem unter „Wein“ angegebenen Verfahren durch Destillation einer gemessenen Menge Bier im Wasserdampfströme. S. Vinum.

10) Mineralstoffe. 30—50 ccm Bier werden in einer geräumigen, tarirten Platinschale eingedampft und vorsichtig, bei nicht zu hoher Temperatur, eingeäschert. — Noch genauer fällt diese Bestimmung aus, wenn man den Verdampfungsrückstand nur bis zur vollständigen Verkohlung erhitzt, alsdann die Kohle mit Wasser auszieht, durch ein asche-freies Filter filtrirt und nun zunächst in der vorher benutzten Platinschale Filter + Kohle verascht, das Filtrat dazu bringt, eindampft etc.

11) Phosphorsäure. Man dampft 50—100 ccm Bier unter Zusatz von etwas Aetzbaryt ein und äschert den Verdampfungsrückstand in einer Muffel ein. — In der salpetersauren Lösung ist die Phosphorsäure nach der Molybdän-Methode zu bestimmen.

Man kann auch die sub 10) erhaltene Asche zu dieser Bestimmung verwenden, wenn man diese Asche dreimal mit je 10 ccm Salpetersäure auf dem Wasserbade eindampft, wodurch alle Phosphorsäure in den Zustand der Orthophosphorsäure übergeführt wird.

12) **Schwefelsäure und Chlor** Die direkte Bestimmung ist nicht zulässig. Die Bestimmung ist vielmehr in der durch Einsichern mit Soda und Salpeter bereiteten Asche in üblicher Weise auszuführen, s S 126. Für ganz genaue Bestimmungen der Schwefelsäure sind Weingeistflammen anzuwenden.

13) **Glycerin** 50 ccm Bier werden mit etwa 3 g Aetzkalk versetzt, zum Sirup eingedampft, dann mit 10 g grob gepulvertem Marmor oder Seesand vermischt und zur Trockne gebracht. Der ganze Trockenrückstand wird zerrieben, in eine Kapsel von Filtrirpapier gebracht, diese in einen Extraktionsapparat eingeführt und 6—8 Stunden mit höchstens 50 ccm starkem Alkohol ausgezogen. Zu dem gewonnenen, stark gefärbten Auszuge wird mindestens das gleiche Volumen wasserfreier Aether hinzugefügt, und die Lösung nach einigem Stehen in ein gewogenes Kölbchen abgegossen oder durch ein kleines Filter filtrirt und mit etwas Alkoholather nachgewaschen. — Nach Abdunstung des Aetheralkohols wird der Rückstand im Trockenschranke bei 100—105° C im lose bedeckten Kölbchen bis zum gleichbleibenden Gewichte getrocknet.

Bei sehr extraktreichen Bieren kann noch der Aschengehalt des gewogenen Glycerins bestimmt und in Abzug gebracht werden. Bei etwaigem Zuckergehalte des Glycerins ist dieses nach Wein (s S 706) zu bestimmen und ebenfalls in Abrechnung zu bringen.

14) **Hopfensurrogate** werden nach dem Verfahren von DRAGENDORFF (s S 212) aufgesucht. Auf Pikrinsäure ist nach FLECK zu prüfen.

Man dampft 200—300 ccm Bier mit gewaschenem Seesand zur Trockne, extrahirt mit Alkohol, verdunstet das Filtrat und kostet den Rückstand. Bei Anwesenheit von Pikrinsäure schmeckt derselbe intensiv bitter. Alsdann erwärmt man den Rückstand mit einigen Kubikcentimeter reiner 10 proc Salzsäure. Hierdurch wird Pikrinsäure sogleich entfärbt. Nach dem Erkalten legt man ein Stückchen Zink in die Schale und lässt bei gewöhnlicher Temperatur einige Stunden stehen. Innerhalb zwei Stunden spätestens hat sich bei Anwesenheit von Pikrinsäure der Inhalt des Schälchens schön blau gefärbt.

Die Untersuchung auf Alkaloide (z B Strychnin) ist in jedem Falle vergleichend durchzuführen, d. h. die nämlichen Reaktionen müssen mit den Ausschüttelungsrückständen von reinem Biere durchgeführt werden. Uebrigens sind der Gesundheit schädliche Ersatzmittel für Hopfen, Alkaloide und Bitterstoffe in deutschen Bieren bisher mit Sicherheit überhaupt noch nicht nachgewiesen worden.

15) **Schweflige Säure Salze**, z B Calciummonosulfit. 200 ccm Bier werden nach Zusatz von etwas Phosphorsäure im Kohlensäurestrom in eine Vorlage von Jod-Jodkaliumlösung bis auf $\frac{1}{2}$ abdestillirt.

Das noch durch freies Jod braungelb gefärbte Destillat wird mit Salzsäure angesäuert, erwärmt, und die gebildete Schwefelsäure mit Baryumchlorid quantitativ bestimmt.

Bei der Beurtheilung hat man zu beachten, dass geringe Mengen von Baryumsulfat auch im Destillat reiner Biere erhalten werden, weil bei Verwendung von geschwefeltem Hopfen aus diesem schweflige Säure in das Bier übergeht, und die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass auch durch Zersetzung normaler Bierbestandtheile bei der Destillation flüchtige, oxydirbare, schwefelhaltige Produkte entstehen.

16) **Salicylsäure** Nach RÖSE werden 100 ccm Bier mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzt und mit dem gleichen Volumen eines aus gleichen Theilen Aether und Petroläther bestehenden Gemisches im Scheidetrichter kräftig durchgeschüttelt. Nach dem Abfließen der wässrigen Flüssigkeit filtrirt man die ätherische Schicht durch ein kleines trockenes Filter in ein trockenes Kölbchen, destillirt den grössten Theil der Aethermischung ab, versetzt den noch heissen Rückstand unter Umschwenken mit 3—4 ccm Wasser und fügt einige Tropfen ganz verdünnte Ferrichloridlösung zu.

Behufs Entfernung der gebildeten, in Petroläther mit tiefgelber Farbe gelösten Eisenoxyd-Hopfenharzverbindung filtrirt man durch ein angefeuchtetes Filter.

Das Filtrat ist bei Anwesenheit von Salicylsäure violett gefärbt, anderenfalls fast wasserhell mit einem Stich ins Gelbliche. — Nach ROSE kann mittels dieser Methode noch $\frac{1}{10}$ Milligramm Salicylsäure in 1 Liter Bier nachgewiesen werden.

Zu beachten ist, dass das von BRAND in gewissen Farbmälzen aufgefundenene „Maltol“ mit Ferrichlorid eine ähnliche Reaktion (Violettfarbung) wie Salicylsäure giebt. Es ist deshalb die Identität der Salicylsäure durch MILLON's Reagens, welches auf Maltol nicht reagirt, festzustellen.

17) Borsäure und deren Salze. Man macht 100 ccm Bier mit verdünnter Kalilauge deutlich alkalisch, dampft in einer Platinschale ein und erhitzt bis zur Verkohlung. Die erhaltene Kohle wird mit Wasser ausgelaugt, der Auszug filtrirt und in einer Platinschale auf 1 ccm eingedampft. Diesen Rückstand übersättigt man alsdann mit verdünnter Salzsäure, bringt einen Streifen frisch bereitetes Kurkumapapier dazu und verdampft im Wasserbade. Bei Anwesenheit von Borsäure ist der getrocknete Streifen da, wo er mit der sauren Lösung in Berührung war, braunroth gefärbt, die Färbung geht durch Betupfen mit Ammoniak in Schwarzblau über.

Für die Beurtheilung ist zu beachten, dass nach BRAND kleine Mengen Borsäure auch im Hopfen enthalten sind, so dass also Borsäure zu den normalen Bierbestandtheilen zu rechnen ist.

Zur quantitativen Bestimmung der Borsäure kann das von ROSENBLATT abgeänderte GOOCH'sche Verfahren (Ztschr. analyt. Chem. 1897 568) dienen, welches auf der Bildung von Borsäuremethylester beruht. Die Borsäure im Destillate ist nach THADDEFF in Borfluorkalium überzuführen und als solches zu wägen (FRESSENIUS, Zeitschr. analyt. Chemie, 1897 568). Man verwende hierzu die Asche von 200—300 ccm Bier.

18) Fluorverbindungen. Nach HEFELMANN und MANN werden 500 ccm Bier mit 1 ccm einer Mischung, bestehend aus gleichen Theilen 10 procentiger Calciumchlorid- und Baryumchloridlösung, ferner 0,5 ccm Essigsäure von 20 Proc. und 500 ccm Alkohol von 90 Proc. versetzt und nach dem Durchmischen 24 Stunden in der Kälte zum Absetzen des gebildeten Fluorcalciums und Kieselfluorbaryums stehen gelassen.

Den Niederschlag filtrirt man durch ein Filter von 4 cm Durchmesser und trocknet ihn sammt Filter, ohne vorheriges Auswaschen, in einem Platintiegel.

Durch Zusatz von 1 ccm conc. Schwefelsäure und Erwärmen auf 100° C. wird Fluorwasserstoff entwickelt, den man auf ein mit Wachs überzogenes Uhrglas, in dessen Ueberzug Zeichen eingritzelt werden, einwirken lässt. Damit das Wachs nicht schmelze, giebt man kaltes Wasser in das Uhrglas.

Nach diesem Verfahren lassen sich noch 7 Milligramme Fluor in 1 Liter Bier nachweisen.

19) Süsstoffe. a) Saccharin. 500 ccm Bier werden nach SPÄETH zur Bindung der bitter schmeckenden Hopfenbestandtheile mit einigen Krystallen Kupfernitrat eingedampft, mit grobem, ausgewaschenem Sande und einigen Kubikcentimetern Phosphorsäure versetzt und mit Aether-Petroläther ausgezogen. Der mit ein wenig einer verdünnten Lösung von Natriumkarbonat aufgenommene Rückstand lässt noch 0,001 Proc. Saccharin am süssen Geschmack erkennen. — Der Nachweis des Saccharins in dem mit Sodaauszug aufgenommenen Verdampfungsrückstande der Aether-Petrolätherlösung kann auch noch auf folgende Weise geführt werden.

a) Man bringt zur Trockne und trägt die Masse in kleinen Portionen in geschmolzenen Salpeter ein. Die Schmelze wird in Wasser gelöst, die Lösung mit Salzsäure angesäuert, wenn nöthig eingeeengt und mit Baryumchlorid auf Schwefelsäure geprüft. Das Verfahren eignet sich auch zur quantitativen Bestimmung des Saccharins. S. dieses.

β) Man schmilzt die eingetrocknete Flüssigkeit mit wenig Aetznatron, löst die Schmelze in Wasser, säuert die Lösung mit Salzsäure an, schüttelt sie mit Aether aus und prüft den Verdunstungsrückstand des Aethers durch Ferrichlorid auf Salicylsäure. — Diese Reaktion ist nur bei Abwesenheit von Salicylsäure und Tannin anwendbar.

γ) Durch Erhitzen des Rückstandes mit Resorcin und Schwefelsäure erhält man eine Flüssigkeit, welche nach dem Verdünnen mit Wasser und nach dem Uebersättigen mit Natronlauge im durchfallenden Lichte eine röthliche Färbung, im auffallenden Lichte grüne Fluorescenz zeigt.

Es empfiehlt sich, stets mehrere Reaktionen nebeneinander, und vor allem auch die Geschmackprobe mit dem ätherischen Verdunstungsrückstande auszuführen

b) Dulcin (Phenetolkarbamid) 500 ccm Bier werden unter Zusatz von Bleikarbonat eingeengt. Der mit Sand vermischte und eingetrocknete Rückstand wird wiederholt mit Alkohol von 90 Proc ausgezogen. Die alkoholischen Flüssigkeiten dampft man zur Trockne und behandelt den Rückstand mit Aether, worauf filtrirt wird. In dem nach Verdunsten des Aethers hinterbleibenden Rückstand wird das Dulcin in folgender Weise nachgewiesen:

a) Nach Berlinerblau. Man erhitzt den Rückstand des Aetherauszuges mit Phenol und etwas conc. Schwefelsäure. Nach Zusatz von einigen Kubikcentimeter Wasser lässt man erkalten und überschichtet die braunrothe Flüssigkeit in einem Reagirglase mit Ammoniak oder Natriumkarbonatlösung. Bei Anwesenheit von Dulcin entsteht an der Berührungsstelle beider Flüssigkeiten eine blaue Zone.

β) Nach Jorisson. Als Reagens dient eine Lösung von Mercurinitrat, welche durch Auflösen von 1—2 g frisch gefälltem Quecksilberoxyd in Salpetersäure und Zusatz von Natriumhydroxyd, bis der entstehende Niederschlag sich nicht mehr ganz löst, bereitet wird. Die Flüssigkeit verdünnt man auf 15 ccm, lässt absetzen und filtrirt.

Das extrahirte Dulcin (s. unter a) wird in 5 ccm Wasser suspendirt, mit 2 bis 4 Tropfen des Reagens versetzt und das Gläschen 5—10 Minuten in siedendes Wasser getaucht, wobei eine schwach violette Färbung eintritt. Auf Zusatz einer geringen Menge Bleisuperoxyd entsteht eine prachtvoll violette Färbung. Die Reaktion ist bei 0,01 g Dulcin noch sehr deutlich, bei 0,001 g sehr schwach.

Beurtheilung. Normales, gut vergohrenes Bier muss vollständig klar und reich an Kohlensäure sein, sowie angenehmen, erfrischenden Geschmack besitzen. (An gewisse Special-Biere, wie z. B. Weissbier, kann die Forderung des Klarseins natürlich nicht gestellt werden.)

Lagerbiere sollen einen Vergährungsgrad von mindestens 40 Proc haben, doch kann ein niedrigerer Vergährungsgrad keinen Anlass zu einer strafrechtlichen Verfolgung darstellen. (Die Vereinbarungen verlangen für Bayern 44—48 Proc Vergährungsgrad.)

Im Verkehr nicht zulässig sind:

1) Saure Biere. Als sauer ist ein Bier zu bezeichnen, wenn zur Sättigung der gesammten Säure für 100 ccm mehr als 3 ccm Normal-Alkali, entsprechend einem Gehalte von 0,27 Proc Milchsäure erforderlich sind.

2) Trübe Biere, und zwar, wenn die Trübung durch Bakterien verursacht wird, in jedem Falle. Wird die Trübung durch geringe Mengen Hefe (Schleier) bedingt, nur in dem Falle, wenn der Vergährungsgrad unter 40 Proc liegt.

3) Biere, welche einen Ekel erregenden Geschmack oder Geruch besitzen.

Im Verkehr noch zulässig sind:

Nicht vollkommen klare, d. h. staubig oder schleierig erscheinende Biere, wenn die Trübung a) durch Eiweiss- (Glutin-) Körperchen, oder b) durch Dextrine, oder c) durch Ausscheidung von Hopfenharz, oder d) durch Hefe bei einem Vergährungsgrad von 40 Proc und darüber verursacht wird.

Der Glyceringehalt der Biere beträgt in der Regel nicht mehr als 0,25 Proc, eine wesentliche Ueberschreitung dieser Zahl wurde auf Zusatz von Glycerin schliessen lassen.

Konservierungsmittel, wie Borsäure, Salicylsäure, Benzoesäure, Calciumbisulfit u. dergl. darf Bier nicht enthalten ¹⁾ — Der Gehalt an schwefliger Säure darf 10 Milligramm SO₂ im Liter nicht übersteigen.

Die Verwendung künstlicher Süsstoffe bei der gewerbmässigen Herstellung von Bier ist nach § 3 des Gesetzes vom 6. Juli 1898 verboten.

¹⁾ Das für die Tropen bestimmte Bier wird in der Regel mit Konservierungsmitteln versetzt. Auf 100 l Bier rechnet man, um es für 3—4 Monate zu konserviren, 4 g Benzoesäure oder 6 g Salicylsäure, bei einer Konservirung für längere Zeit 6 g Benzoesäure oder 10 g Salicylsäure.

Cerevisia antiscorbutica Bière antiscorbutique (Gall) Brutole antiscorbutique Sapinette Rp Turnonum Pini, Foliorum Cochleariae recentium $\bar{a}\bar{a}$ 30,0, Radicis Armoraciae recentis 60,0, Cerevisiae (mit 3 Proc Alkoholgehalt) 2 l Man macerirt 4 Tage im geschlossenen Gefäße, presst ab und filtrirt

China-Eisen-Bier von STROSCHEIN Ein stark eingebrantes, 20 Proc Extrakt enthaltendes Bier, welches neben dem wässerigen Auszug von 10 Proc Chinarinde, Pomeranzenschale, Zimmt, Cardamomen, Vanille noch 2 Proc Ferrobikarbonat enthalten soll 1 Fl = 75 Pfg

Condensed Beer der Concentrated Produce Company in London, welches wegen der mild narkotischen Wirkung des angeblich verwendeten Arizona Hopfens als mildes Schlafmittel empfohlen wurde, hat sich als ein Schwindel entpuppt Es war ein stark gespritzter, mit Salcylsäure versetzter Malzextrakt-Lukör

Karlsbader Mineralbier Ist ein Bier, welches die natürlichen Salze der Karlsbader Quellen gelöst enthalten soll

Maltol Ist die aus Karamel-Farbmalz durch Aether ausziehbare Substanz, welche mit Eisenchlorid die Salcylsäure Reaktion giebt Mit MILLON's Reagens reagirt es nicht

Theobiom Angeblich ein aus Zuckerrüben hergestelltes, bierähnliches Getränk (LEFEBRE)

Cerium

Cerium, Cer. Atomgew. = 141 Dieses Element kommt in der Regel mit Lanthan und Didym zusammen in einigen seltenen Mineralien vor, z B als Silicate im Cerit, als Phosphate im Monacit

Zur Abscheidung der Cerverbindungen ruhrt man den fein gepulverten Cerit mit konz Schwefelsäure zu einem Brei an, erhitzt denselben bis zum beginnenden Glühen, zieht mit Wasser aus, filtrirt von Kieselsäure ab und fällt aus der Lösung, welche durch Neutralisation mit Natriumkarbonat von Eisen und mittels Schwefelwasserstoff von anderen Metallen befreit worden ist, die drei Elemente Cer, Didym und Lanthan durch Zusatz von Oxalsäure als Oxalate

Die Reindarstellung des Cers aus diesem Gemisch erfolgt zur Zeit nach komplirten, von den betr Fabriken geheim gehaltenen Verfahren

Systematisch steht das Cer dem Aluminium besonders nahe Man kennt zwei Oxyde des Cers, nämlich

Ce_2O_3	CeO_2
Ceriumoxydul	Ceroxyd
Cer sesquioxyd	Cer-dioxyd

In der Nomenklatur dieser Oxyde und der von ihnen sich ableitenden Salze herrscht eine ziemliche Verwirrung

† **Cerium bromatum** Ceriumbromur. Cerobromid (CeBr_3). Ceroxalat wird in einem flachen Porcellanfass unter Umrühren erhitzt, bis es in ein gelbbraunes Pulver umgewandelt ist Dieses wird unter Erhitzen in Salzsäure unter Zusatz von etwas Weingeist gelöst und nun mit Natriumkarbonatlösung bis zum geringen Ueberschuss versetzt Den daraus hervorgehenden Niederschlag versetzt man nach dem Auswaschen mit Wasser nach und nach mit Bromwasserstoffsäure, bis eine farblose Lösung erfolgt Die Lösung wird an einem schattigen Orte unter Umrühren und bisweiligem Zusatz von Bromwasserstoffsäure zur Trockne eingedampft und in gut verstopfter Flasche vor Sonnenlicht geschützt in der Reihe der stark wirkenden Arzneistoffe aufbewahrt

Es ist das Präparat (Oxybromur) ein hygroskopisches Pulver von graubraunlicher Farbe, und giebt mit Wasser und Weingeist eine etwas trübe Lösung Der Geschmack ist anfangs süsslich, hinterher stark styptisch

† **Cerium nitricum** Cernitrat. Ceronitrat. Salpetersaures Cerium $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew. = 435

Zur Darstellung wird frisch gefälltes Cerohydroxyd ($\text{Ce}(\text{OH})_3$) in Salpetersäure gelöst, und diese Lösung durch Eindampfen zur Trockne gebracht

Farblose Salzmassen von saurer Reaktion und süsslich adstringirendem Geschmack, in Wasser leicht löslich. Der Glührückstand beträgt 38—40 Proc.

Dieses Salz wird vorzugsweise zur Darstellung von Glühstrumpfen verwendet. Um es auf seine Brauchbarkeit hierzu zu prüfen, wird es 1) in einer Platinschale gegluht, worauf ein beim Erkalten ganz hell kanariengelb aussehender Rückstand zurückbleiben muss, der nicht alkalisch reagieren darf (Kalk). 2) Empfiehlt es sich, einen Probe Glühstrumpf herzustellen und diesen zu versuchen, s weiter unten

† **Cerium oxalicum** (Halv Ergänzb) Ceroxalat Ceroxydoxalat Oxalsaines Ceroxydul Cern Oxalas (U-St) $\text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 + 9\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew = 708

Die Darstellung der Verbindung erfolgt durch Fällung der schwach salzsauren Certrichloridlösung mit Ammoniumoxalat. Das Ceriumoxalat fällt zunächst als käsiger Niederschlag, der bald körnig wird und nach dem Auswaschen zu trocknen ist

Ein weisses, körniges, luftbeständiges Pulver ohne Geruch und Geschmack, in Wasser, Weingeist oder Aether unlöslich, in Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure ohne Aufbrausen löslich. — Beim Erhitzen auf Rothgluth wird es zersetzt unter Abgabe von Kohlenoxyd und Kohlensäure unter Hinterlassung eines in der Kälte hell kanariengelben Rückstandes (Braunfärbung des Rückstandes würde die Gegenwart von Didym anzeigen). — Kocht man das Salz mit Natron- oder Kalilauge, so wird Ceriumhydroxyd ($\text{Ce}(\text{OH})_3$) unlöslich abgeschieden, während die Oxalsäure in Lösung geht. Das durch Essigsäure angesäuerte Filtrat giebt demnach mit Calciumchlorid einen weissen, in Essigsäure unlöslichen, in Salzsäure aber löslichen Niederschlag.

Löst man den beim Erhitzen des Salzes hinterbleibenden gelben Rückstand in concentrirter Schwefelsäure und bringt zu dieser Lösung ein kleines Kryställchen Strychnin, so entsteht eine tief blaue Färbung, welche bald in Purpur und Roth übergeht.

Prüfung 1) Das Salz muss sich in Salzsäure ohne Aufbrausen zu einer Flüssigkeit lösen (Karbonate), welche durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert wird (fremde Metalle). 2) Das nach dem Kochen mit Natronlauge erhaltene Filtrat darf weder durch überschüssige Ammoniumchloridlösung (Aluminiumverbindungen) noch durch Schwefelwasserstoff (weisse Fällung = Zink) gefällt werden. 3) Der durch Glühen des Salzes erhaltene Rückstand darf dem damit geschüttelten Wasser keine alkalische Reaktion ertheilen (Calciumoxalat). 4) 1 g des Salzes muss 0,484 g eines hellgelben, in Salzsäure vollkommen löslichen Rückstandes hinterlassen.

Aufbewahrung Vorsicht, da Cersalze als giftig anzusehen sind.

Anwendung. Innerlich zu 0,05—0,10 g zwei- bis dreimal täglich in Pulverform gegen Magen- und Darmkatarrhe, Dyspepsie, namentlich auch gegen das Erbrechen der Schwangeren. Höchste Gaben 0,3 *pro dosi*, 1,0 *pro die* (Ergänzb.)

Glühlicht-Körper. Die sog Glühstrümpfe für die Auer'schen Incandescenz-Brenner werden unter Verwendung von Lösungen des Thoriumnitrates und Cernitrates hergestellt.

Als Imprägnierungsmittel verwendet man die 33procentige wässrige Lösung einer Mischung von 99 Th Thoriumnitrat und 1 Th Cerniumnitrat. Mit einer solchen Lösung tränkt man Baumwollgewebe (Strümpfe), lässt sie dann durch eine Wring-Maschine gehen und trocknet sie über Formen. Die Strümpfe werden alsdann im oberen Theile mit Asbestfaden genäht, durch die Asbestschlinge fixirt und nun von oben abgebrannt. Das Gewebe verbrannt und hinterlässt ein aus Ceroyd und Thoriumoxyd bestehendes Skelett.

Wendet man reines Thoriumnitrat an, so hat der Glühkörper fast gar keine Leuchtkraft, man bekommt ein Licht etwa wie eine dunkelviolette Kaliflamme. Ist dem Thoriumoxyd etwa 1 Proc Ceroyd beigemengt, so erhält man einen Glühkörper von der glänzendsten Lichtwirkung. Bleibt man unter 1 Proc Ceroyd, so wird das Licht zwar weisser, aber die Leuchtkraft geringer. Erhöht man dagegen den Cer Zusatz erheblich über 1 Proc, so wird das Licht gelber und die Lichtintensität gleichfalls geringer.

Thoriumnitrat Das zur Fabrikation der Glühstrümpfe dienende Thoriumnitrat soll ziemlich rein sein. Es soll alkalifrei sein, darf nur Spuren von Eisen enthalten und muss sich beim Glühen im Tiegel stark aufblähen, da ein solches Präparat einen weichen,

elastischen und haltbaren Glühkörper liefert. Die Asche des Nitrats muss, auf der oberen Handfläche verrieben, unfühlbare sein. Der Gehalt an Thoriumdioxid ThO_2 soll 48–50 Proc betragen. Sehr wichtig ist auch der Glühstrumpf-Versuch. Ein mit einer 33 proc Lösung von reinem Thoriumnitrat bereiteter Strumpf giebt ein schwelendes, violettes Licht. Ist das Licht weiss, so ist das Thoriumnitrat nicht rein, sondern wahrscheinlich cerhaltig. Glüht der Strumpf aber mit schwachem violettem Lichte und erhält man durch Zusatz von 1 g Cerinitrat zu 100 g Thoriumnitrat ein schön weisses Licht, so ist das Thoriumnitrat rein.

Leuchtflüssigkeit für Glühkörper. Als die beste gegenwärtig bekannte Mischung ist folgende anzusehen: Thoriumnitrat 33,0, Ceriumnitrat 0,3, Aquae q s ad 100,0. Manche Fabrikanten setzen dieser Mischung auch noch Ammoniumnitrat hinzu, um das Abbrennen des Strumpfes zu beschleunigen, indessen ist dies nicht erforderlich. Das Abbrennen der Strümpfe erfolgt mit „Pressgas“ und erfordert eine besondere Übung.

Glühlichtkörper-Tinktur, um die Glühkörper auf dem Transport vor Bruch zu schützen, ist a) eine Lösung von 2 Th Kautschukpapier in 100 Th Benzin, oder b) verdünntes Kollodium.

Reaktionen. Die Lösungen der Salze des Cers zeigen gegen Reagentien folgendes Verhalten:

1) Kalihydrat fällt weisses Cerhydroxyd Ce(OH)_3 , welches an der Luft durch Aufnahme von Sauerstoff gelb wird. Der Niederschlag löst sich im Ueberschusse des Fällungsmittels nicht auf. 2) Ammoniumkarbonat fällt weisses, im Ueberschuss des Fällungsmittels etwas lösliches Cerkarbonat. 3) Oxalsäure fällt weisses, anfangs amorphes, später krystallinisch werdendes Cerumoxalat. Die Fällung ist auch aus massig sauren Lösungen vollständig. 4) Eine gesättigte Lösung von Kaliumsulfat fällt auch aus etwas sauren Lösungen weisses krystallinisches Cer-Kaliumsulfat $\text{Ce(SO}_4)_2\text{K}$. 5) Natriumthiosulfat fällt beim Kochen auch sehr concentrirte Lösungen nicht.

Cetaceum.

Cetaceum (Germ Austr. Helv. Brit. U-St.) *Adipocera cetosa*. *Albumen Ceti*. *Ambra alba*. *Spermaceti*. *Succinum marinum* — Walrat. Weisses Amber. — Blanc de baleine, Blanc de cachelot. Cétine (Gall.)

Abstammung und Gewinnung. Der Walrat wird von verschiedenen Fischsaugethieren der Gattungen *Catodon* und *Physeter*, besonders von *Catodon macrocephalus* Gray, dem Potfisch, Potwal, Sperm-Wale geliefert. Derselbe trägt den Walrat in zwei besonderen, 1–2 m hohen Behältern, die in einer muldenförmigen Aushöhlung der Schnauze und des Schädels unter der äusseren Kopfhaut und einer dicken Speckschicht liegen. Ein anderer Behälter zieht sich, sich verengernd, vom Kopf nach dem Schwanz. Der Inhalt dieser Behälter besteht aus einer gelblichen, flüssigen Masse, die sich an der Luft in einen flüssigen Antheil, das Walrat- oder Spermacetöl, und einem festen, den Walrat, der etwa $\frac{1}{4}$ ausmacht, trennt. — Man befreit den Walrat vom Oel zunächst durch Koliren, dann durch Abpressen in hydraulischen Pressen, kocht ihn in Wasser zur Entfernung von Unreinigkeiten und endlich in schwacher Potaschelauge zur Verseifung der letzten Spur Oel.

Beschreibung. Er bildet eine schneeweisse, halbdurchscheinende, perlmutterglänzende, fettig anzufühlende, grossblättrig-krystallinische, zerbrechliche Masse von milchigem Geschmack und schwachem, eigenthümlichem Geruch. Spec. Gew. 0,940–0,960. Schmelzpunkt 43–47°C. Verseifungszahl 108–128. Saurezahl 0,7–5,17 (mit dem Alter nimmt die Saurezahl zu, ganz frischer soll säurefrei sein). Brennt mit hellleuchtender, geruchloser Flamme. Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und in heissem Alkohol, wenig löslich in Benzin und Petroläther. Aus den Lösungen krystallisiert er leicht. — Nach längerem Liegen an der Luft wird er gelb, nimmt ranzigen Geruch und saure Reaktion an (vergl. oben). Durch Waschen des geschmolzenen

Walrats mit verdünnter Lauge kann ihm der Geruch und die saure Reaktion wieder genommen werden

Bestandtheile. Der Hauptbestandtheil ist das Cetin, der Palmitinsäure Getylather, ferner enthält er Aether der Laurin-, Stearin- und Myristinsäure mit anderen, höheren Alkoholen, auch mit Glycerin — Das Cetin kann durch Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhalten werden, Schmelzpunkt desselben 48—49° C. Es giebt beim Erhitzen keinen Akroleingernuch, wie der Walrat. Durch alkoholisches Kali wird der Walrat leicht verseift, beim Verdünnen mit Wasser fällt Cetylalkohol aus.

Verfälschungen. Diese kommen selten vor, da durch dieselben meist das grossblättrige Gefüge kleinblättrig oder körnig wird. Zu beachten ist, dass Cetaceum in 90 proc Alkohol unlöslich und in 98 proc kaltem Alkohol auch nur wenig löslich ist.

Zum Nachweis von Stearinsäure kann man den Walrat in einer Porcellanschale schmelzen, einige Augenblicke mit etwas Ammoniakflüssigkeit durchrühren, dann erkalten lassen, den erstarrten Kuchen abheben und die untenstehende Flüssigkeit mit Salzsäure ansäuern. Stearinsäure fällt dann aus. Noch 1 Proc nachweisbar.

Aufbewahrung, Pulverung. Man bewahrt den Walrat in möglichst unversehrten Blocken in gut schliessenden Blechbüchsen an einem kühlen Orte, verbraucht die beim Zerkleinern abfallenden Bruchstücke zuerst und trägt Sorge, den Vorrath öfter zu erneuern. In Pulverform erhält man ihn entweder durch Zerreiben in einem Porcellanmörser unter Besprengen mit starkem Weingeist, oder durch Schmelzen und Rühren mittels einer Keule bis zum Erkalten.

Anwendung. Sehr selten innerlich als Pulver oder Emulsion (in erwärmtem Mörser aus geschmolzenem Walrat wie Oelemulsionen zu bereiten), häufiger zu Salben, Ceraten, Pomaden. Technisch zur Kerzenfabrikation (Normalkerzen aus Walrat dienen zur Bestimmung der Lichtstärke des Leuchtgases), und als Bestandtheil der meisten Wasche- glanzmittel.

Cetaceum saccharatum (Ergänz.) **Cetaceum cum Saccharo** **Cetaceum praeparatum seu tritum** Walratzucker **Präparirter Walrat**

Walrat 1 Th. schmilzt man im Wasserbade, fügt mittelfein gepulverten Zucker 3 Th. hinzu und verreibt die erkaltende Masse zu einem feinen Pulver. In gelber Stöpselflasche nur in kleiner Menge vorrätig zu halten oder frisch zu bereiten. Theelöffelweise bei Katarrh.

Ceratum Cetacei (Aust. Ergänzb. Helv. U. St.) **Ceratum labiale album** **Emplastrum Spermat. Cet.** **Unguentum Cetacei** (Brit.) — Walratcerat **Walratpflaster** oder -salbe **Milchverzehrpflaster** — **Cérat de blanc de baleine** — **Spermaceti Cerate** **Spermaceti Ointment**.

Aust. Walrat, weisses Wachs, Mandelöl aa.

Brit. Walrat 20, weisses Wachs 8, Mandelöl 72, Benzöl 2¹⁾

Ergänz. Walrat, weisses Wachs je 25 g, Mandelöl 50 g, Rosenöl 1 Tropfen

Helv. Walrat 20, weisses Wachs 10, Mandelöl 70, Benzöl 2¹⁾

Hung. Walrat, weisses Wachs je 8, Schweinefett 9

U.-St. Walrat 10, weisses Wachs 35, Olivenöl 55

Das Cerat wird in Formen gegossen.

Ceratum Cetacei rubrum (Ergänz.) **Rothes Walratcerat** **Rothes Lippenpomade** Walrat 5, gelbes Wachs 35, Mandelöl 60, schmilzt man und setzt zu Bergamottöl 0,5, Citronenöl 0,5, Alkanin 0,1. Ein für Tuben geeignetes Cerat erfordert 80 Mandelöl. Nach Vomačka Butter 500, Kakaofett 300, Walrat 60, Alkanin 1, Borsäure 10, fettes Jasminöl 10.

Brillantine, feste. Walrat 8 g, Oliven- oder Ricinusöl 80 g, Bergamottöl 10 Tropfen, Citronenöl 5 Tropfen, Palmarosaöl 1 Tropfen.

Ceratum Cetacei salicylatum **Salicyl-Lippenpomade** Nach Ergänzb. mit 0,5 Proc. Salicylsäure.

Crème des Indes Walrat 2 Th., weisses Wachs 3 Th., Olivenöl 20 Th., Alkanin q. s. Man schmilzt, fügt etwas Lavendelöl und Ambratinktur hinzu und rührt kalt (Ap.-Ztg.)

Emplastrum Cetacei **Empl. emolliens** (DIETZICH) Walrat, Bleipflaster, Benzöl fett je 20 Th., Benzösalg 40 Th. Ersatz für Unguentum diachylon.

¹⁾ Vergl. unter *Adeps benzoïnatus* und *benzoatus* S. 159

Haut-Crème (VOMAČKA) Walrat, Wachs je 28, fettes Veilchenöl 100, Olivenöl 400, Borax 50 in Neroliwasser 500 gelöst, Bittermandelöl q s Rosa gefärbt in Tuben zu füllen

Honig Cream (Nat Drugg) Walrat 60 g, Mandelöl 480 g, Guttä 3,75 g erhitzt man 20 Min im Wasserbade, seht durch, fügt Verbenöl 10 Tr, Zimmtöl 20 Tr, Bergamott- und Rosenöl je 3 Tr zu und füllt in erwärmte Gläser

Lustrine Alsacienne, von HUDDINGSFELD Walrat, Borax, Gummi arabicum je 50, Glycerin 125, Wasser 725, kocht man bis zur vollständigen Lösung 200 g hiervon rechnet man auf 1 l gekochte Stärke (Industriebl)

Pomata crystallina Espomade Pommade glaciale 1) Walrat 18, Rausöl 50, Kionenöl 88, wohlriechende Öle q s, man schmilzt und lässt, in warmes Wasser gestellt, langsam einkalten (VOMAČKA) 2) Walrat 26 g, Olivenöl 150 g, Citronenöl 3,5 g, Bergamottöl 1,5 g, Neroliöl, Rosenöl je 5 Tropfen

Wäscheglanzpulver Walrat 20, Borax 20, Gummi arabicum 10 1 Th. auf 4 Th Stärke (Drog Ztg)

Unguentum pomadinum Linden. Dr LINDEN's Haarpomade (Königsberg Vorscheft) Rp Cerae japonicae 50,0, Olei Olivar prov 300,0, Cetacei 25,0, Aquae Rosae 25,0, Aquae Aurant flor 25,0, Oleiodoriferi (LINDEN) 25,0

Flechtenmittel, Pariser 1) Waschwasser aus 1½ Proc Schwefelsäure 2) Salbe aus Walrat, Schweinefett und 4 Proc Kalomel

Starkeglanz, flüssiger, entspricht obiger Lustrine Alsacienne

Oleum Cetacei Walratöl. Spermacetiöl. Huile de Cachetot Huile de Spermaceti. Spermin oil

Wird wie oben geschildert gewonnen Es ist hellgelb, dünnflüssig, in seinen besseren Sorten fast geruchlos Spec Gew 0,875—0,884 Sanrezahl 0,92—0,93 Esterzahl 126,47 bis 127,82 Verseifungszahl 123—147 Jodzahl 79,5—84,0

Bestandtheile Es besteht zum grossten Theil aus Estern einatomiger Fettalkohole (Getylalkohol und Dodekatylalkohol) mit einer Saure der Oelsäurereihe (Physetölsäure) Enthält ferner Spuren von Glycerin und Valeriansäure.

Chamomilla.

L. Matricaria Chamomilla L. — Compositae — Anthemideae-Chrysantheminae Heimisch in Europa, Kleinasien, Sibirien In Nordamerika und Australien eingebürgert Zum Arzneigebrauch zuweilen kultivirt

Beschreibung Einjährige, bis 60 cm hohe Pflanze mit doppelt oder einfach fiederspaltigen Blättern, deren Abschnitte lineal und flach sind Blüthenköpfchen mittelgross, langgestielt, aus 12—18 weissen, 9 mm langen, breitlanzettlichen, vorn schwach dreizahnigen, viernervigen, weiblichen Strahlblüthen (Fig 184), und zahlreichen, nach oben gelbgefärbten, 2 mm langen, zwittrigen Scheibenblüthen mit glockigem Saum (Fig 183) bestehend Die Fächer der Staubblätter sind am Grunde spitz ausgezogen, das Konnektiv nach oben stumpf dreieckig verlängert Die Blüthen sind einem nackten, kegelförmigen, hohlen Blüthenboden eingesenkt Der Hüllkelch besteht aus zahlreichen, langlichen, trockenrandigen, kahlen Blättchen An den Fruchtknoten und der Blumenkronröhre befinden sich olführende Drüsenhaare mit zweizelligem Köpfchen, im Gewebe des Blüthenbodens ebenfalls olführende, schizogene Sekretbehälter — Geruch angenehm aromatisch, Geschmack schwach bitter

Die getrockneten Blüthenköpfe liefern Flores Chamomillae (Germ Helv) Flores Chamomillae vulgaris (Austr) Matricaria (U-St) — Kamillen Echte oder gemeine




Fig 183
Scheibenblüthe
von Matricaria Chamomilla




Fig 184
Randblüthe

Kamillen. Feldkamillen Kamillenthee. Romy. — Camomille commune ou d'Allemagne (Gall) — German Chamomile. Camomile-ten.

Bestandtheile Aetherisches Oel aus deutschen Blüthen 0,13—0,24 Proc, aus ungarischen 0,13—0,3 Proc, aus russischen 0,15 Proc (vergl unten) Ferner nach älteren Angaben 2,2 Proc Gerbstoff, 0,5 Proc Fett, 5,9 Proc Harz etc

Verwechslungen Beim Einsammeln von wildwachsenden Pflanzen wird die Droge leicht mit den Blüthenköpfen anderer Kompositen mit weissen Strahl- und gelben Scheibenblüthen verwechselt — Es kommen hauptsächlich in Betracht

Anthemis arvensis L, Hundskamille Blüthenköpfe grösser, geruchlos Blüthenboden nicht hohl und mit Spieublättchen besetzt

Anthemis Cotula L, Stinkkamille und wie die vorige Hundskamille Blüthenköpfchen grösser, stinkend Blüthenboden mit Spreublättchen besetzt, nicht hohl

Chrysanthemum Leucanthemum L, Dickkopf, Johannisblume etc, Blüthenköpfe 2—3 mal grösser wie bei der Kamille, geruchlos Blüthenboden nackt, aber nicht hohl

Einsammlung Aufbewahrung Die Blüthenköpfchen werden von den vom Mai bis zum August blühenden Pflanzen, besonders in Deutschland und Ungarn, bei recht trockenem Wetter möglichst kurzstielig gepflückt, ohne Verzug in dünner Schicht auf einem luftigen Trockenboden ausgestreut und, sobald sie genügend trocken sind, in dicht schliessende Blechgefässe ohne zu drücken, eingefüllt 5 Th frische Kamillen geben 1 Th trockene

Beim Einkaufe frischer Blüthen ist darauf zu achten, dass dieselben weder zu feucht noch zu weit entwickelt sind, da sie sonst beim Trocknen missfarbig werden oder zerfallen, auch dürfen sie nicht zu lange in Säcken oder Körben stehen oder in Haufen liegen bleiben, in welchem Falle sie durch Selbsterhitzung leicht verderben können, vielmehr ist das Trocknen zu beschleunigen und nöthigenfalls durch künstliche Wärme zu unterstützen

Bei längerer Aufbewahrung werden die Kamillen unansehnlich, man pflegt deshalb den Vorrath jährlich zu erneuern

Anwendung Innerlich zu 1,0—5,0 mehrmals täglich in Theemischungen, als Aufguss 1 Esslöffel voll auf 3 Tassen Wasser Aeusserlich zu Bädungen, warmen Umschlägen, Gurgelwässern, Kräuterkissen Für Klystiere benutzt man Kamillenthee gern als Träger wirksamer Arzneistoffe Die Homöopathen geben Chamomilla besonders Kindern, die während des Zahnens an Durchfällen leiden, ferner bei Zahnweh, sowie reizbaren Frauen Wirkung Aeusserlich schwach reizend, innerlich gelinde krampfstillend

Aqua Chamomillae, Kamillenwasser (Austr Ergänzb) Kamillen 1 Th, Wasser 80 Th, 10 Th abzudestilliren

Aqua seu Hydrolatum Chamomillae. Eau distillée de Camomille (Gall) Kamillen 1 Th, Wasser q s, mittels Dampf 4 Th abzestilliren

Aqua Chamomillae concentrata (Erganzb), Aqua Chamomillae decemplex. Zu frischem Kamillenwasser 100 Th. fügt man Weingeist 2 Th und destillirt ab 10 Th — Zum Gebrauch mit 9 Th Wasser zu mischen

Extractum Chamomillae. Kamillenextrakt 1) Ergänzb Kamillen 2 Th werden mit einer Mischung aus Weingeist 4 Th, Wasser 6 Th, dann aus Weingeist 2 Th, Wasser 3 Th, je 4 Tage ausgezogen, die Pressflüssigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft Harzausscheidungen löst man durch wenig Weingeist Ausbeute 28—30 Proc 2) Gall. Weiches Extrakt, wie Extr Centauri (S 684) zu bereiten

Oleum Chamomillae infusum (Erganzb) wird genau wie Ol Absinthi infus (S 408) bereitet Gelbgrünes Oel

Oleum Chamomillae terebinthinatum Aus Kamillen 1000 Th, mit Terpentinöl 15 Th übergossen, durch Destillation erhaltlich

Sirupus Chamomillae, Kamillensaft 1) Ergänzb Kamillen 10 Th, Weingeist 5 Th, Wasser 50 Th Nach 24 Stunden abpressen und filtriren Filtrat 40 Th giebt mit Zucker 60 Th Sirup 100 Th — Ueber Sirupus Chamomillae simplex s S 231 2) Sirup de Camomille (Gall) Kamillen 100 g, siedendes Wasser 1500 g, nach 6 Stunden abpressen, in 100 g Flüssigkeit löst man Zucker 180 g

Tinctura Chamomillae, Kamillentinktur (Austr.). Aus Kamillen 20 Th., verdünntem Weingeist (60 proc.) 100 Th. durch 3tägige Digestion.

Oleum carminativum.
Kolik-Oel.
Rp. Olei Chamomillae infusi 20,0
Olei Carvi
Olei Cumini
Olei Foeniculi 33 gtt. X
Olei Menthae piperitae 1,2
Innerlich 15–30 Tropfen. Den Unterleib einzu-
reiben.

Oleum nervinum.
Anwachsöl, Beekööl.
Rp. Olei Chamomillae infusi 200,0
Olei Carvi 5,0
Olei Rosmarini
Olei Thymi 33 10,0.
Aeusserlich bei Gicht, Kolik.
Rotulae Chamomillae (Dietrich).
Kamillen-Kücheln.
Rp. Sacchari subtt. pulverati 95,0
Amyli Tridici 5,0
Tragacanthae 0,5
Olei Chamomillae aether. gtt. V.
Sirupi Chamomillae q. a.
Bereitung wie bei Rotul. Althaeae (S. 232).

Species ad Clyisma viscerale. KAEMPFER.
Rp. Florum Chamomillae
Herbae Marrubii
Herbae Taraxaci
Radice Taraxaci
Radice Valerianae
Rhizom. Graminis 33.
Species Balneorum.
Badekräuter.
Rp. Florum Chamomillae
Foliorum Menthae piperitae
Foliorum Salviae
Foliorum Rosmarini
Herbae Thymi 33 100,0.
Staubfrei und mit Weingeist befeuchtet abzugeben.

Species resolventes (Ergänzb.).
Zertheilende Kräuter.
Rp. Florum Chamomillae
Florum Lavandulae
Florum Sambuci 33 2,0
Foliorum Melissae
Herbae Origanii 33 7,0.
Grob geschnitten zu mischen.

Spiritus Chamomillae.
(Ead. Ergänzb.-Taxe)
Rp. Olei Chamomillae aetheri 2,5
Spiritus 97,5.

Tisane de Camomille (Gall.).
Rp. Infus. Florum Chamomillae
5,0 : 100,0.

Vet. Potus antidiarrhoeus.
Rp. Infusi Florum Chamomillae 5,0 : 100,0
Acidi hydrochlorici 5,0.
6stündlich die Hälfte. Bei Durchfall der Säugethiere.

Vet. Potus antispasmodicus.
Rp. Infusi Flor. Chamomill. 330,0
Spiritus aetheri 10,0
Tincturae Opi simplicis 5,0.
Auf einmal zu geben. Bei Kolik und Krämpfen
der Pferde und Rinder.

Vet. Pulvis anticolicus.
Kolikpulver (Dietrich).
Rp. Saponis domestici 5,0
Florum Chamomillae
Fractus Foeniculi
Placent. Semin. Lini 33 10,0
Natrii sulfurici 80,0.
Divide in part. 4. 2stündl. 1 Pulver mit warmem
Wasser und 1 Esslöffel Leinöl. Bei Kolik der
Schafe, infolge Uebersättzungs.

Flechtenmittel von NEEB. 1) Thee aus Kamillen, Malvenblüthen, Wallnussblättern, Sassa, Guajak, Sandel-, Sassafrasholz, Fenchel, Kalmus u. s. w. 2) Salbe aus Fett, Terpentinöl und Kadeöl.

Gehörbalsam, BOZEM's. Aetherisches Kamillenöl, Asant- und Bibergeiltinktur, Perubalsam, Zwiebelsaft, Balsamum tranquillans.

Pulsey-flowers ist eine in England gebräuchliche Kräutermischung zu erweichenden Umschlägen (Flores Chamomillae, Sambuci, Folia Menthae piperitae etc.).

Thee von ANNA CSILLAG, zum Kopfwaschen, besteht aus Kamillenblüthen.

Tsa-Tsin des Dr. SCHÖFFER. Die geschnittenen Blätter von Anthemis nobilis.

II. Anthemis nobilis L. — Compositae — Anthemideae — Anthemidinae. Heimisch in Westeuropa, zum arzneilichen Gebrauch häufig kultivirt.

Beschreibung. Perennirende, behaarte Pflanze mit kurzem Stämmchen, aus dem sich zahlreiche, bis 80 cm hohe, blühende Äeste erheben. Blätter doppelt fiedertheilig, Abschnitte einfach, zwei- oder dreispaltig. Blütenköpfchen gestielt, bis 3 cm breit. Hüllkelch aus ovalen, am Rande gesägten und trockenhäutigen Blättern bestehend. 12–18 Strahlblüthen, zungenförmig, vorn dreizählig, viernervig, weiblich, Scheibenblüthen gelb, zwittrig, mit röhrig-glockiger Blumenkrone, in der Achsel von am Rande gesägten Spreublättern (Fig. 185). Antheren am Grunde nicht geschwänzt, das Konnektiv oben in eine kurze, eiförmig-längliche Schuppe verlängert. Blütenboden kegelförmig, markig. Von stark aromatischem Geruch und Geschmack. Bei der kultivirten Pflanze.



Fig. 185.
Scheibenblüthe
von Anthemis
nobilis.

deren Blüthenköpfchen meist gesammelt werden, werden die Scheibenblüthen durch die Randblüthen größtentheils verdrängt

Die Blüthenkörbchen liefern Flores Chamomillae romanae (Austr Ergänzb Helv) Anthemidis Flores (Brit) Anthemis (U-St) Flores Chamomelis a Leucanthemi romani — Römische Kamillen Bertramblumen. Edler Romey — Camomille romaine (Gall) — Chamomile Flowers

Bestandtheile 0,6—1,0 Proc athenisches Oel (vergl unten), ferner Quercitrin, einen Bitterstoff Anthemissäure, Asche 6 Proc

Einsammlung Aufbewahrung Man sammelt die Blüthenköpfe im Juli und August bei sonnigem Wetter, trocknet sie schnell und bewahrt sie in dicht geschlossenen Blechbüchsen auf Die gefüllten Blüthen der angebauten Pflanze sind allein officinell, die nicht gefüllten der wildwachsenden Pflanze schmecken bitterer und sollen leicht brechen-erregend wirken 4 Th frische Blüthen geben 1 Th trockene

Anwendung Die römische Kamille ist ein Bestandtheil blähungtreibender Mittel, sie wird in Deutschland fast nur im Handverlauf zu Aufgüssen verlangt, ist dagegen in England allein gebräuchlich, Austr, Gall, Helv, U-St haben beide aufgenommen Anwendung wie bei I

Extractum Anthemidis (Brit) Extr Chamomillae romanae Extract of Chamomile 1000 g Blüthen werden mit 10 l destill Wasser bis zur Hälfte eingekocht, ausgepresst, filtrirt, das Filtratengt man zu einem dicken Extrakt ein, dem gegen Ende des Eindampfens noch 2 cem athenisches Kamillenöl zugefügt werden — Innerlich zu 0,1 bis 0,5 g

Oleum Anthemidis (pingue) Huile de Camomille (Gall) Aus röm Kamillen 1 Th., Olivenöl 10 Th durch 2stündiges Erhitzen im Wasserbade, Auspressen und Filtriren zu bereiten

Oleum Anthemidis camphoratum. Huile de Camomille camphrée (Gall) Kampher 1 Th, röm Kamillenöl 9 Th

Oleum Chamomillae aethereum Kamillenöl (Ergänzb Gall Helv) Essence de Camomille Oil of Chamomile German.⁴⁾

Eigenschaften Das durch Destillation aus den Blüthen der gemeinen Kamille in einer Ausbeute von 0,2—0,36 Proc gewonnene Kamillenöl ist tiefdunkelblau gefärbt und bei mittlerer Temperatur ziemlich dickflüssig Es hat einen kräftigen, charakteristischen Geruch und einen etwas bitteren, aromatischen Geschmack Spec Gew 0,980—0,940 Beim Abkühlen scheidet es Krystalle ab und erstarrt bei 0° C zu einer ziemlich festen, butterartigen Masse Infolge seines Paraffingehaltes löst sich das Oel erst in ziemlich viel 80procentigem Alkohol klar auf Verseifungszahl ca 45

Bestandtheile Der einzig sicher nachgewiesene Bestandtheil des Kamillenöls ist ein bei 53—54° C schmelzendes Paraffin, durch dessen Gegenwart das Festwerden bei niedriger Temperatur bedingt wird Ferner sind aufgefunden, der Capronsäureester eines unbekannten Alkohols, sowie ein hochsiedender, blauer, „Azulen“ genannter Körper, der noch wenig untersucht ist

Prüfung. Verfälschung des Kamillenöls mit Cedernholzöl, die mehrfach beobachtet worden ist, erkennt man durch Geruchsvergleichung mit einem echten Oele, sowie durch die Verminderung der Erstarrungsfähigkeit Oele mit Cedernholzzusatz werden bei 0° C nicht fest

Aufbewahrung. Da Kamillenöl durch Licht und Luft grün bis braun gefärbt wird, so muss man es in kleinen, ganz gefüllten Flaschen bei Lichtabschluss aufbewahren.

Oleum Chamomillae citratum, citronenölhaltiges Kamillenöl (Ergänzb) wurde früher durch Destillation von Citronenöl über Kamillen gewonnen Jetzt wird es gewöhnlich durch Mischen gleicher Theile Citronen- und Kamillenöl dargestellt

Oleum Chamomillae romanae Oleum Anthemidis (Brit) Römisch Kamillenöl. Essence de Camomille Romain. Oil of Chamomile.

⁴⁾ Mit „Oil of chamomile“ bezeichnet Brit das römische Kamillenöl von Anthemis nobilis L (siehe dieses)

Helblancae Oel, das durch Luft und Licht allmählich grün bis braungelb wird. Es hat einen angenehmen, starken Geruch und brennenden Geschmack Spec Gew 0,905—0,915 (Brit) Drehungswinkel (100 mm Rohr) $+1$ bis $+3^{\circ}$ C Verseifungszahl 250—300 Es löst sich in der Regel in 6 Th Spiritus dilutus Es enthält verschiedene Alkohole und zwar, Isobutyl-, Amyl-Hexyl-(Methyl-Propyl-)Alkohol und Anthemol $C_{16}H_{34}OH$ theilweise frei, theilweise an Angelika- und Tiglinsäure gebunden Ein weiterer Bestandtheil ist ein bei $63-64^{\circ}$ C schmelzendes Paraffin

Charta.

Papier (Charta) findet abgesehen davon, dass es als Verpackungsmittel häufig angewendet wird, in der Pharmacie auch als Träger von Arzneistoffen und als Reagens im chemischen Laboratorium Verwendung

Charta cerata Wachspapier Wird durch Tränken von Schreibpapier mit weissem oder gelbem Wachs hergestellt Man bereitet es, indem man Papier auf einer erwärmten Unterlage (Metallblech) ausbreitet, etwas Wachs darauf bringt und dieses durch Ausstreichen mit einem Zeug-Bausch auf dem Bogen gleichmassig vertheilt — Das mit gelbem Wachs hergestellte Wachspapier ist von vornherein gelb gefärbt, das mit weissem Wachs hergestellte ist zwar ursprünglich weiss, es färbt sich aber im Verlaufe der Aufbewahrung gelblich und nimmt auch ranzigen Geruch an Aus diesem Grunde und wegen der hohen Wachspreise ist der Gebrauch des wirklichen Wachspapieres ziemlich verlassen worden An seine Stelle sind die Paraffin-Papiere getreten

Charta paraffinata Paraffinpapier Ist ein in gleicher Weise wie das Wachspapier hergestelltes, aber mit Paraffin getränktes Schreibpapier Wählt man das Paraffin sorgfältig aus, benutzt man also ein gutes Ceresin, so erhält man ein Papier ohne jeden Geruch, von unbegrenzter Haltbarkeit

Fabrikmassig erfolgt die Darstellung des Paraffinpapieres, indem man Schreibpapier durch eine erwärmte Lösung von Paraffin in Benzin hindurchzieht und den Ueberschuss des Tränkungsmitteis durch Hindurchführen des Papieres zwischen erwärmten Walzen wegnimmt. — Je nach der ungeeigneten Auswahl von Paraffin und Benzin kann es vorkommen, dass das hergestellte Paraffinpapier einen scharfen Geruch nach Petroleum besitzt

Das Paraffinpapier wird in der Pharmacie zu Pulverkapseln, zum Verbinden von Salbentopfen, zum Einhüllen und Bedecken der Pflaster, auch zum Einhüllen von Substanzen gebraucht, welche einen gewissen Grad Feuchtigkeit oder andere flüchtige Substanzen zurückhalten sollen oder hygroskopisch sind Auch der Arzt bedient sich des Paraffinpapieres, welches er zwar immer noch mit Wachspapier oder Charta cerata zu bezeichnen pflegt, zum Verbaude oder zum Bedecken von Wunden, applicirter kaustischer Pasten und Pflaster oder als Unterlage für Kranke Es ist deshalb angezeigt, grössere Stücke Paraffinpapier vorrathig zu halten

Charta oleosa MAC-GHIE'S Oelpapier 95 Th Leinölfirnis werden mit 5 Th. gelbem Wachs unter Erhitzen gemischt Durch die heisse Mischung wird dünnes Seidenpapier gezogen und vom Ueberschuss des Tränkungsmitteis mechanisch befreit Das Papier wird mehrere Tage an die Luft gehangen, bis es soweit trocken ist, dass es beim Zusammenfalten oder Einrollen nicht mehr zusammenbackt

Charta pergament. Pergamentpapier Vegetabilisches Pergament. Papyrene. Wurde 1846 von FIGUERE und POUJANÉDE zuerst dargestellt.

Fabrikmassig wird es erhalten, indem man ungeleimtes Papier durch eine erkaltete Mischung von 4 Vol konc Schwefelsäure und 1 Vol. Wasser hindurchzieht (die Dauer der Einwirkung dieses Bades beträgt 5—20 Sekunden) Das aus dem Bade austretende Papier wird sogleich in Gefässen mit vielem Wasser, später in verdünntem Ammoniak, zum Schluss wieder mit Wasser völlig ausgewaschen und über erwärmten Walzen getrocknet Durch

die Behandlung mit Schwefelsäure wird die Cellulose (Pflanzenfaser, und zwar am raschesten die Baumwolle) zunächst in Amyloid, Hydrocellulose, verwandelt, bei längerer Einwirkung sogar zu Dextrin aufgelöst

Bei der Darstellung des gewöhnlichen Pergamentpapiers geht also die Absicht dahin, die Cellulose nur soweit in Amyloid zu verwandeln, dass dieses die Zwischenräume zwischen den noch unveränderten Fasern ausfüllt und diese gleichsam verkittet. Demnach besteht das gewöhnliche Pergamentpapier aus unveränderter Cellulose, welche durch Amyloid zusammengehalten wird.

Pergamentpapier besitzt in einem gewissen Maasse Eigenschaften, die sonst dem thierischen Gewebe zukommen, es ist daher in betreff seiner Dichte, Kohäsion und Biegsamkeit und seines Verhaltens zum Wasser in vielen Fällen geeignet, die Stelle des Pergaments und der thierischen Blase zu ersetzen. Dabei ist es lange Zeit konservirbar. Durch Maceration in Wasser wird es weich und schlaff, ohne an seiner Festigkeit Einbusse zu erleiden, auch unterliegt es, im Wasser längere Zeit liegend, keiner Veränderung, Gährung oder Faulniss, es lässt sich auch nicht zerfasern. Es findet daher in der Technik und den Gewerben eine mannigfaltige Verwendung. In der Pharmacie findet es in allen den Fällen Verwendung, in welchen früher die Thierblase herangezogen wurde, z. B. zum Tektiren von Topfen mit Latwergen, Extrakten, Sirupen, beim Lütren der Destillationsapparate, Gasapparate. In der Chemie ersetzt es die thierische Blase im Dialysator, s. w. unten, in der Chirurgie die Leinwand, das Wachstuch und die Guttapercha beim Verbande, es dient auch zur Herstellung wohlfeiler Eisbeutel.

Wird Pergamentpapier in feuchtem Zustande ausgespannt, so stellt es nach dem Trocknen eine etwa wie ein Trommelfell straff gespannte Fläche dar. — Durch Zusatz von Glycerin oder Magnesiumchlorid oder Calciumchlorid kann man dem Pergamentpapier eine gewisse Geschmeidigkeit geben. Ein solches Pergamentpapier wird man natürlich mit besonderer Vorsicht beim Annässen zu behandeln haben. — Da Hydro-Cellulose grosse Verwandtschaft zu Farbstoffen hat, so erklärt es sich hieraus, dass Pergamentpapier Theerfarbstoffe leicht annimmt. Dagegen lässt es sich nur schwierig mit gewöhnlicher Drucker-schwarze bedrucken.

Das Leimen von Pergamentpapier erfolgt, falls die Verbindung nicht wasserdicht zu sein braucht, mit gewöhnlichem Tischlerleim. Soll die Verbindung aber wasserdicht sein, so benutzt man Chromleim (aus 100 Th. gutem Leim unter Zusatz von 8 Th. Kaliumdichromat zu bereiten). Das Leimen hat alsdann bei rothem oder gelbem Lichte zu erfolgen und die geleimten Gegenstände sind hierauf zu belichten, wodurch der Leim in Wasser unlöslich wird. S. Gelatine.

Osmose-Papier. Das zum Dialysiren der Melasse (Osmose-Verfahren) in den Zuckerfabriken gebrauchte Pergamentpapier (Osmose-Papier) muss möglichst vollständig pergamentirt sein und möglichst wenig unveränderte (Leinen-) Fasern enthalten. Es sei ausdrücklich bemerkt, dass man zum Dialysiren nicht jedes beliebige Pergamentpapier anwenden kann, sondern „Osmose-Papier“ anwenden muss.

Pergamentpapier, imitirtes. Ist ein nach dem Mitscherlich'schen Sulfit-Cellulose-Verfahren hergestelltes Cellulose-Papier, welches äusserlich dem Pergamentpapier ähnlich ist. Indessen kann es durch genügend langes Einweichen in Wasser erweicht und ausserdem zerfasert werden. Es wird zum Einpacken von Esswaaren u. dergl. gebraucht.

Charta bibula. Fliesspapier. Filtrirpapier. Man versteht hierunter ungeleimtes Papier, welches zum Filtriren, d. h. zur Scheidung fester Stoffe von Flüssigkeiten dient. Die gröbste Sorte, welche heute nur noch ausnahmsweise im Grossbetriebe Verwendung findet, ist das graue Löschpapier. In der Pharmacie findet ausschliesslich das aus gebleichtem Zeng hergestellte weisse Filtrirpapier Verwendung.

Man verlangt von gutem Filtrirpapier, dass es Flüssigkeiten möglichst rasch durchlasse und in diesen suspendirte Stoffe möglichst vollständig zurückhalte. Ob dies der Fall ist, lässt sich durch Probefiltrationen ermitteln. Ausserdem aber stellt man durch Betrachtungen einer grösseren Anzahl von Bogen gegen das Licht (d. h. im durchfallenden

Lichte) fest, ob die einzelnen Bogen gleichmässig hergestellt sind, d. h. ob in ihnen nicht dicke Stellen und dünne Stellen abwechseln, was natürlich für die Verwendung nicht vorthellhaft wäre.

Die Art des Stoffes, aus welchem das Filtrirpapier hergestellt wurde, ergibt sich am sichersten aus der mikroskopischen Untersuchung. Die billigsten, spröde anzufühlenden Sorten werden unter Zuhilfenahme von Holzstoff hergestellt. Diese geben beim Betupfen mit Anilinsulfat eine gelbe, beim Betupfen mit Phloroglucin-Salzsäure eine rothe Färbung. Die besten Filtrirpapiere sind natürlich die ohne Holzschliff oder Holzcellulose lediglich aus Lumpen hergestellten.

An ein für pharmaceutische und die gewöhnlichen chemischen Zwecke bestimmtes Filtrirpapier sind folgende Anforderungen zu stellen:

1) Destillirtes Wasser, welches durch ein Filter gelaufen ist, darf beim Verdampfen keinen Rückstand hinterlassen. 2) Durch Schwefelammonium darf das Filtrirpapier weder geschwärzt noch nachgedunkelt werden. 3) Gesättigte Salicylsäurelösung, durch das Papier filtrirt, darf sich nicht rüthlich färben, sonst enthält das Papier Eisen. 4) Der mit verdünnten Säuren erhaltene Auszug darf beim Uebersättigen mit Natriumcarbonat sich nicht trüben (Kalk, Magnesia, Baryt, Thonerde). 5) Ausserdem ist der Aschengehalt in einer grösseren Durchschnittsprobe zu bestimmen und bei der Beurtheilung zu berücksichtigen.

Analytisches Filtrirpapier. Sog. schwedisches Filtrirpapier. Papier de Berzelius. Um für analytische Zwecke ein möglichst aschearmes Filtrirpapier zu erhalten, zog man früher die aus einer guten Sorte Filtrirpapier gefalteten glatten Filter zweimal hintereinander je 24 Stunden lang mit 10procentiger Salzsäure aus, wusch sie alsdann bis zur völligen(!) Chlorfreiheit und trocknete sie an der Luft, auf Filtrirpapier ausgebreitet. Der Aschengehalt eines so behandelten Filters von 9 cm Durchmesser betrug in der Regel im Durchschnitt etwa 0,001 g.

Gegenwärtig werden diese Filter fabrikmässig hergestellt. Man benutzt bestes Filtrirpapier, welches durch Ausfrieren von gelösten Stoffen möglichst befreit ist, zieht dieses mit Salzsäure und Fluorwasserstoffsäure aus, wäscht den Ueberschuss der Säuren vollständig aus und trocknet die Filter. Der Aschengehalt dieser Filter ist durch Versaschen von etwa 12 Stück derselben zu bestimmen und beträgt für ein Filter von 9 cm Durchmesser im Durchschnitt 0,0001 g und noch weniger. Er kann für gewöhnlich vernachlässigt werden.

Man prüfe diese Filter ausserdem noch darauf, ob sie nach 6stündigem Trocknen bei 100° C. spröde werden oder nicht. Sind sie das, so eignen sie sich für analytische Arbeiten nicht. Die in Deutschland von SCHLEICHER & SCHÜLL in Düren, sowie von MAX DREWIERHOFF in Dresden hergestellten Filter dieser Art sind den schwedischen „Marke Berzelius“ mindestens gleichwerthig.

Charta medicamentosa gradata. Gegittertes Heilpapier. Feines Fliesspapier mit einem bestimmten Gehalt an Arzneisubstanz und durch gedruckte oder mit Bleistift gezeichnete Linien in Quadracentimeter, und jeder Quadracentimeter in 10 gleiche Theile getheilt, wie die beistehende Figur angiebt. Hätte man z. B. Atropinpapier mit 0,001 Atropinsulfat pro Quadracentimeter darzustellen, so wird man auf 100 qcm 0,1 Atropinsulfat in 0,5 destill. Wasser (oder in 9 Tropfen) lösen und damit die Tränkung ausführen. 100 qcm des schwedischen Fliesspapiers bedürfen nämlich zur richtigen und geeigneten Anfeuchtung circa 0,5 Wasser. Dieses Maass ist natürlich für das zu verwendende Papier zuvor genau zu erforschen, denn würde man das Papier mit einem Ueberschusse der Lösung tränken, so würde sich auch infolge der Capillarität und der stattfindenden Konzentration der Lösung während des Abtrocknens an den Rändern, wo die Ver-




Fig. 186. Gitter für Charta medicamentosa, 25 Quadracentimeter enthaltend.

dunstung am stärksten ist, eine grössere Menge des in Lösung befindlichen Salzes oder Extraktes ansammeln. Die gleichmässige Vertheilung der medicamentösen Substanz wäre in der Papierschicht von 100 qcm Ausdehnung nicht zu erreichen.

Man legt das Papier auf eine Glasscheibe und tropft die Lösung (mit einem SALLERON'schen Tropfglas) in regelmässigen Distanzen in der Art auf die Papierfläche, dass anfangs in der Richtung der Diagonalen je 3 Tropfen liegen. Dann giebt man noch je einen Tropfen zwischen die Schenkel der von den Diagonalen gebildeten 4 Winkel. In Summa kommen also 9 Tropfen zur Vertheilung. Dann legt man die Ecken des Quadrats nach der Mitte um, so dass sie sich mit den Spitzen berühren, und presst das Ganze sanft mit einer darauf gelegten Glasscheibe. Das Trocknen des Papiers geschieht in einem dunklen Orte ohne Anwendung von Wärme.

In betreff der Ordination gilt der Quadratcentimeter als Einheit.

Rp Chartae med c Atrop sulf (0,001)
Centum quadr 2
D S Zum äusserlichen Gebrauch
Der Pharmaceut hat also 2 Quadratcentum des
Atropinpapiers (in einer Kapsel aus Paraffin-
papier) abzugeben, welches im Quadratcentim
1 Milligr Atropinsulfat enthält.

Rp Chartae med c. Zincu sulf (0,01)
Centum quadr 4
D S etc
Es sind also 4 Quadratcentum des Papiers zu dis-
pensiren, von welchem jeder Quadratcentimeter
0,01 Zincum sulfuricum enthält.

Die Augenheilkunde bedient sich in Sonderheit dieser Papiere und lässt solche bereiten aus Kupfersulfat, Kadmiumsulfat, Kaliumjodid, Silbernitrat, Morphin-, Atropin-salzen, Belladonna-, Opium-, Kalabarbohnen Extrakt etc.

Charta japonica Japanisches Pflanzenfaserpapier **Usago Usuyo**. Dieses nach ULOTH von dem japanischen Strauche *Wickstroemia canescens* Meisn., Familie der Thymeliaceae, abstammende Papier kommt in 50 > 36 cm grossen, unbeschnittenen Bogen in den Handel. Es ist von gleichmässig gelblich-weisser Farbe, von seidenartigem Glanz und so dünn und zart, dass man die feinste Druckschrift durchlesen kann, andererseits aber ist es von erstaunlicher Festigkeit und nur schwierig zerreissbar. Das Gewicht des einzelnen Bogens beträgt noch nicht 2 g, der Aschegehalt ist = 1 Proc. — Die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass das Papier aus einem Netzwerk von unregelmässig, kreuz und quer verlaufenden, äusserst dünnwandigen fadenförmigen Bastfasern besteht. Nach REIN wird dieses Papier, welches eine überraschende Zähigkeit und Geschmeidigkeit besitzt und die Weichheit des Seidenpapiers mit der Festigkeit eines gewebten Zeuges verbindet, in Japan auch als Verbandmaterial gebraucht.

Nach Europa ist es 1890 eingeführt und als Einhüllungsmittel — etwa wie die Stärke-Oblaten — für Arzneimittel vorgeschlagen worden.

Zur Einhüllung eines gewöhnlichen Arzneipulvers im Gewicht von 0,5 g bedarf man ein quadratisches Stückchen von 6 > 6 cm Grosse zum Preise von etwa 0,02 Pfg.

Das betreffende Pulver wird auf die Mitte des Papierblättchens möglichst eng zu sammengeschüttet. Dann werden die vier Zipfel an den Ecken in die Höhe gehoben und durch Zusammendrehen zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zu einem kleinen Stränge fest vereinigt, wobei jedes feste Zusammendrücken des Packchens und alles unnötige Zerknittern des Papiers zu vermeiden ist. Dicht am Uebergang in das das Pulver enthaltende Beutelchen wird der Strang durch einen Scheerenschnitt abgetrennt. Das so hergestellte Beutelchen wird nun auf die Zunge gelegt und mit etwas Wasser hinuntergeschluckt.

Oleum Chartae, Liqueur pyroleosus e cellulosa vegetabili, Pyrothonid, Rag-oil. In einen innen glasurten eisernen Topf werden wenige Papierschutzel, Leinwandlappen, farblose baumwollene Lappen locker eingelegt, nach dem Trocknen derselben eben solche trockne Stücke angezündet und brennend in den Topf geworfen. Die aus der unvollkommenen Verbrennung entstandene, an der Wandung des Gefässes hangende pyroge Flüssigkeit wird mittels Weingeist aufgenommen, filtrirt und in einer Wärme von höchstens 50° C abgedunstet (RANQUE 1827).

Das Pyrothonid ist eine klare bräunlichgelbe oder bräunliche, sirupdicke, in Wasser und Weingeist lösliche Flüssigkeit von eigenthümlichem säuerlich brenzlichem Geschmack und entsprechendem Geruche. Es wird seit Einführung des Kreosot und der Karbolsäure

in den Arzeneischatz kaum noch gebraucht. Man hat es als Mittel gegen Schmerz kariöser Zähne, zum Einreiben der Kniegelenke mit Wasser verdünnt (als Adstringens), zu Augewässern, Einspritzungen in die Urethra und Vagina etc. empfohlen. Johnson empfiehlt ein paar Tropfen der Flüssigkeit auf die Zunge zu streichen, um die Geschmacksempfindlichkeit für schlechtschmeckende Medicamente abzustumpfen.

Charta ad cauteria

Papier à cautère (Gall)

Rp	Resinae Pini Burgundici	450,0
	Cerae albae	600,0
	Terebinthinae venetae	100,0

Man schmilzt, kocht, streicht über Papier wie ein Sparadrap u. theilt es in Rechtecke von 6<10 cm

Charta antarthritica flava

Gelbes Gichtpapier

Rp	Resinae Pini	200,0
	Paraffini solidi	50,0
	Terebinthinae venetae	25,0
	Balsami Tolutani	10,0

Man schmilzt u. streicht es mittels breiten Pinsels auf erwärmtes dünnes Schreibpapier

Charta antarthritica fusca

Charta resinosa (Germ. I. Hamb. Vorschr.)
Charta piceata Emplâtre de pauvre homme Braunes Gichtpapier

Rp	Picis nigrae	
	Terebinthinae ss	90,0
	Cerae flavae	60,0
	Colophoni	150,0

Wie das vorige zu bereiten

Charta ad fonticulos

Fontanell-Papier

Rp	Emplastri Lithargyri	75,0
	Resinae Pini	7,5
	Olei Ricini	5,0
	Cerae flavae	5,0
	Terebinthinae	7,5

Wie die vorhergehenden zu bereiten.

Charta antasthmatica

Asthma-Papier (Erglanab)

Rp	Kali nitric	17,0
	Extracti Stramonii	10,0
	Sacchari	20,0
	Aquae fervidae	100,0

Man löst, trinkt mit der Lösung weisses Filtrirpapier und trocknet es

Charta arsenicalis

Papier arsenical (Gall)

Rp	Natrii arsenici cryst.	1,0
	Aquae	20,0

Man trinkt mit der Lösung weisses Filtrirpapier, trocknet u. schneidet es in 20 gleiche Stücke. Jedes Stück enthält 0,05 g Natriumarsenat. Zum Rauchen in Hülisen von Cigaretten-Papier

Charta carbolicata.

Karboll-Papier

Rp	Paraffini solidi	75,0
	Acidi carbonici crystall.	25,0

Dünnes Papier wird mit der geschmolzenen Mischung getränkt. Zur äusserlichen Anwendung.

Charta chemica.

Papier dit chimique (Gall.) Papier de Fayard et Blayn, Papier de Madame de Pouplier

Rp	1. Olei Olivae	2000,0
	2. Mumi pulverat	1000,0
	3. Cerae flavae	60,0

Man kocht 1 u. 2 zum Pflaster, löst in diesem 3 auf und streicht die noch warme Mischung auf die eine Seite eines Seidenpapiers, welche durch nachstehende Mischung wasserdicht gemacht worden ist.

Fp	1. Olei Lini	1000,0
	2. Bolbi Allii sativi conc.	100,0
	3. Olei Terebinthinae	800,0
	4. Capiti mortuum	400,0
	5. Cerussae	150,0

Man kocht 1 mit 2, bis das Wasser verflüchtigt ist, und kocht. Dann kocht man einige Zeit mit 4 und 5, welche mit etwas Oel angerieben sind, lässt halb erkalten u. mischt 3 hinzu. Die gut durchgerührte Mischung trägt man mit einem Schwamm auf das Seidenpapier auf und lässt dieses alsdann etwa 14 Tage trocknen.

Man kann dieses umständliche Verfahren dadurch ersetzen, dass man Seidenpapier durch geschmolzenes Emplastrum fuscum (sine Camphora) hindurchzieht und den Ueberschuss zwischen zwei erwärmten Linolen abstreift.

Charta antasthmatica crassa.

Carton fumigatoire (Gall)

Rp	Chartae bibulae	123,0
	Kali nitric pulverat	60,0
	Foliorum Belladonnae pulv	
	Foliorum Stramonii pulv	
	Foliorum Digitalis pulv	
	Foliorum Lobeliae pulv	ss 5,0
	Myrrhae pulveratae	
	Olibani pulverat	ss 10,0
	Fructus Phellandri aquat	5,0

Man zerreisst das Papier in kleine Stücke u. weicht es mit heissem Wasser, bis es einen Brei darstellt. Von diesem lässt man das Wasser der Hauptsache nach abtropfen. Dann arbeitet man die Pulver gleichmässig darunter, drückt die Masse etwa 3 mm hoch möglichst gleichmässig in Formen von Weissblech ein und lässt sie in diesen bei mässiger Wärme trocknen. Den so erhaltenen Carton schneidet man in 20 gleiche Rechtecke.

Im geschlossenen Zimmer, in welchem der Asthmakranke sich befindet, wird ein Stück angezündet und dem Verglimmen überlassen. Entweder jeden Abend einmal, oder wenn ein Anfall sich einstellt.

Charta balsamica nitrata

Rp Charta nitratae q s

Tincturae Benzoes q s

Man bestreicht das Salpeterpapier mit Benzoe-tinktur und lässt es trocknen. Gebrauch wie Salpeterpapier.

Charta epispastica.

Vergl. S 599

Charta fumalis

Räucherpapier

Man trinkt ungeleimtes Papier mit einer dünnen Salpeterlösung, trocknet es und trinkt es mit einer der nachfolgenden Tinkturen.

I

Rp	Moschi	0,2
	Olei Rosae	1,0
	Benzoes	100,0
	Myrrhae	12,0
	Rhizomatis Iridis	250,0
	Spiritus (30 Proc.)	500,0

46*

II.

Rp	Benzoë	80,0
	Balsami toluani	
	Storacis	
	Ligni Santali	33 20,0
	Myrrhae	10,0
	Corticis Cascarillae	20,0
	Moschi	0,2
	Spiritus	200,0

Charta haemostatica Pagliani

Pagliani's blutstillendes Papier

Rp	Alumini sulfurici	10,0
	Liquoris Ferri sesquichlorati	30,0
	Acidi benzoici	
	Alumini hydrati	33 5,0
	Aquae destillatae	20,0

Man misst die Mischung unter gelegentlichem Umrühren 24 Stunden lang in der Kälte stehen, kocht, trinkt mit der Kolatur nicht zu dünnes Filtrirpapier und trocknet dieses an der Luft

Charta Hydrargyri bichlorati et Natrii chlorati

Papier au chlorure mercurique et au chlorure de sodium (Gall)

Rp	Hydrargyri bichlorati corrosivi	
	Natrii chlorati	33 5,0
	Aquae destillatae	15,0

Für 20 Blätter Man zieht bestes Filtrirpapier zuerst mit einer Mischung von 1 Th Salzsäure in 1000 Th. Wasser aus, wäscht es dann mit reinem Wasser bis zur Chlorfreiheit und trocknet es. Man schneidet alsdann rechteckige Blätter, betropft jedes mit 25 Tropfen der obigen Lösung und trocknet bei 30°C

Jedes Blatt soll mit 1 Liter Wasser eine blaue Lösung geben, welche 0,25 g Quecksilberchlorid enthält. Behufs der Färbung erhält jedes Blatt einen (vorher anzubringenden) Aufdruck mit Indigokarmin

Quecksilbersublimat 0,25 g

+++ Gift +++

In 1 Liter Wasser zu lösen Aufbewahrung vor Licht geschützt

Charta mezerata mitior

Papier au Garou Seidelbastpapier No I

Rp	1 Extracti Mezerei	15,0
	2 Spiritus (90 Proc)	50,0
	3 Cerae flavae	20,0
	4 Cetacei	90,0
	5 Olei Olivae	110,0
	6 Terebinthinae venetae	30,0

Man schmilzt 3—6 rührt 1 und 2 darunter und erhitzt, bis der Spiritus verdampft ist. Die kolirte Mischung wird in einem flachen Gefäße flüssig gehalten, wofür man Papierstreifen so über die Oberfläche der Masse zieht, dass sie nur einseitig überzogen werden

Zur Darstellung der Charta mezerata fortior, Seidelbastpapier No II, wird die Menge des Extractum Mezerei um 5,0 erhöht

Charta nitrata

Charta nitrosa Salpeterpapier

Rp	Kali nitrid puri	20,0
	Aquae destillatae	80,0

Mit dieser Lösung trinkt man Filtrirpapier und trocknet es

Ein Bogen wird in 12 Teile geteilt. Es wird zu Morax, besonders aber gegen Asthma gebraucht. Entweder wird der Dampf des glühenden Papiers bei Beginn des Asthmaanfalls eingeathmet oder das Papier wird zu einer Cigarette aufgerollt und geraucht

Charta piceata.

Papier goudronné Emplâtre du pauvre

Rp	Colophoni	300,0
	Piceis liquidae	200,0
	Cerae flavae	100,0

Die geschmolzene und kolirte Mischung wird mit der Pflasterstreichmaschine auf Schreibpapier gestrichen

Charta pyroxylixa

Salon Feuerwerk Düppel-Papier

Rp	Chartae scriptoriae	
	Acidi nitrici fumantis	

Man taucht das Papier einen Augenblick in die Säure, wäscht es dann mit Wasser völlig aus und trocknet es. Damit das Papier mit feurigem Lichte verbrennt, trinkt man es vor dem Trocknen mit Lösungen von Strontiumnitrat, bez. Baryumnitrat, bez. Cuprumnitrat

Charta vesicatoria HANUSLFR

Rp	Cerae flavae	90,0
	Olei Olivae	80,0
	Cetacei	50,0
	Terebinthinae venetae	12,5
	Cantharidum grosse pulv	15,0

Man digerirt 2 Stunden im Dampfbade, kocht und streicht die halberkaltete Mischung, in nicht zu dünner Schicht über geleimtes Papier

Charta resinosa (Ergluzb)

Gichtpapier

Rp	Resinae Piceis Burgundicae	
	Piceis navalis	
	Cerae flavae	
	Terebinthinae	33 20,0

Das geschmolzene Gemisch wird durchgeseiht und mittels der Pflasterstreichmaschine auf Schreibpapier gestrichen

Papier d'Arménie

Ist mit einer gesättigten alkoholischen Benzoesäurelösung getränktes Filtrirpapier. Es dient zur Desinfection von Wohnräumen, in denen man Benzoesäure durch Erwärmen zum Sublimiren bringt.

Charta vernicea

Rp	Paraffini solidi	75,0
	Vernisii Lini	20,0

Mit der geschmolzenen Mischung wird Seidenpapier getränkt. Dient als wasserdichtes Verbandmaterial

Papier chinique antiasthmaticum de Ricou, Charta nitrata mit weingeistigem Lobeliaauszuge getränkt 100 Stück $\frac{1}{8}$ Bogen = 10 Mark (HAGER, Analyt)

Pflanzenpapier, ostindisches, wurde von Gummi als Klebpapier und Ersatz des englischen Heftpflasters in den Handel gebracht. Seine Darstellung soll folgende gewesen sein: 12 Th Gelatine werden in 1 Th Sirupus Sacchari und 50 Th destillirtem Wasser gelöst, die Kolatur mit 30 Th verdünntem Weingeist vermischt und mit dem lauwarmen Gemisch feines Velpapier überzogen. Nach dem Trocknen wird die Rückseite des Papiers mit Collodium lentescens bestrichen

Chelidonium.

Gattung der Papaveraceae — Papaveroideae — Chelidoneae.

Einzige Art *Chelidonium majus* L. Heimisch in Europa, Mittel- und Nordasien in Nordamerika eingeschleppt

Beschreibung Perennirende, bis 1 m hohe Pflanze, alle Theile rothgelben Milchsaft in gegliederten Milchrohren enthaltend Stengel zu mehreren aus einem Rhizom aufsteigend, stumpfkantig, knotig gegliedert, zerstreut weich behaart Blätter abwechselnd, leierförmig, zottig behaart, schlaff, oberseits hellgrün, unterseits blaugrün Die Grundblätter in einer Rosette, langgestielt, 5 paarg. gefiedert-fiederspaltig, Stengelblätter kurz gestielt, 2—3 paarg. Die gelben Blüten stehen in end- und seitenständigen, gestielten, 3—8 strahligen Dolden, sie haben 2 hinfällige Kelchblätter, 4 Blumenblätter, zahlreiche Staubblätter, einen oberständigen Fruchtknoten mit kurzem Griffel und schwach zweilappiger Narbe Frucht eine schotenförmige Kapsel, die zweiklappig von unten nach oben aufspringt, wobei die Placenten in der Mitte stehen bleiben Samen schiefeiförmig, braun mit kummartiger Caruncula — Die Pflanze riecht beim Zerreiben eigenthümlich widerlich und schmeckt scharf, brennend und bitter

Das frische Kraut liefert *Herba Chelidonii* (Erganzb.) *Herba Chelidonii majoris* Hb *Hirundinariae*. *Chelidonium* (U-St.) — Schöllkraut Schellkraut Schwalbenkraut Augenkraut Malkraut. Gottesgabe — Chelidone. — Celandine Goume

Bestandtheile Alkaloide Chelidonin, $C_{20}H_{19}NO_6$, H_2O α -Homochelidonin, $C_{21}H_{21}NO_6$, krystallmisch β -Homochelidonin $C_{21}H_{21}NO_6$, krystallmisch Chelerythrin $C_{21}H_{21}NO_6$, krystallmisch Protopin $C_{20}H_{17}NO_6$, krystallmisch (vergl. unten) Ferner werden angegeben Chelidysin und Chelidoxanthin, in Aether unlöslich, in Alkohol schwer löslich Ferner Chelidonsäure (Pyrondicarbonsäure) $C_7H_4O_6$, Chelidoninsäure (ist Bernsteinsäure), Citronensäure, Äpfelsäure An der giftigen Wirkung der Pflanze soll ausser den Alkaloiden noch ein im Milchsaft, der in der frischen Pflanze 25 Proc. beträgt, enthaltenes Harz theilhaftig sein

Anwendung findet nur das frische Kraut, man sammelt es entweder zu Anfang der Blüthe, oder zur Zeit der Fruchtentwicklung, während welcher es am alkaloidreichsten sein soll, und verarbeitet es sofort zu Extrakt oder zu Tinktur Des frischen Saftes bedient man sich selten zu 1—2 g in Verbindung mit Löwenzahn und anderen Kräutersäften zu Frühlingskuren, ausserlich dient derselbe als Volksmittel zum Vertreiben von Warzen doch ist seiner atzenden Eigenschaften wegen hierbei Vorsicht geboten Das Kraut wirkt abführend und diuretisch

† *Extractum Chelidoni* Schöllkrautextrakt (Erganzb.) Wie *Extract Belladonnae* Germ (S. 469) zu bereiten Ausbeute 3,5—4 Proc. Dick, in Wasser trübe löslich Gabe 0,4 bis 1,5 g mehrmals täglich in Pillen Vorsichtig aufzubewahren Wird neuerdings gegen Aussatz und Krebs empfohlen

Tinctura Chelidoni Rademacheri (Erganzb.) *Rademacher's* Schöllkraut-tinktur Frisches, zerquetschtes Schöllkraut 5 Th., Weingeist (90proc.) 6 Th. — *Ex tempore* *Extractum Chelidoni* 8,0, *Aquae* 20,0, *Spiritus* 77,0 Filtrat Bei Leberleiden 5—20 Tropfen mehrmals täglich

Mixtura antidiarrhoea GUTTORFF
Rp *Tincturae Chelidoni* gtt. X
 Mucilaginis Tragacanthae 80,0
Bei Durchfall der Säuglinge

Pillulae hepaticae
Rp *Extractum Chelidoni* 10,0
 Gummi Ammoniac 15,0
 Saponis medicati 5,0
f. pilul. 200 Tägl. 2—3 mal 3—4 Pillen.

Herba Chelidoni minoris ist das Kraut von *Ranunculus Ficaria* L.

Chelidonium $C_{20}H_{19}NO_6$, H_2O (identisch mit *Stylophorin*), krystallmisch, löslich in Alkohol, unlöslich in Wasser Schmelzpunkt $180^\circ C$ Wird mit Guajakol in Schwefelsäure karminroth, mit einer Lösung von tellursaurem Ammon in Schwefelsäure nach 3—4 Minuten grün

Wirkt ähnlich narkotisch wie Morphin, doch ohne Reflexsteigerung hervorzurufen, wird zum Theil durch den Urin unzerstört abgeschieden. Wird in Form seiner Salze als schmerzlinderndes Mittel bei Magen- und Darm Schmerzen verwendet.

Chelidonium hydrochloricum $C_{20}H_{19}NO_5 \cdot HCl$ In Krystallen erhalten. Wenig löslich in Wasser und Alkohol.

Chelidonium phosphoricum, krystallinisches Pulver, löslich in Wasser.

Chelidonium sulfuricum $(C_{20}H_{19}NO_5)_2 \cdot H_2SO_4$ Krystallinisch, löslich in Wasser. Als mildes Narcoticum in der Kinderpraxis empfohlen. Dosis 0,05–0,2 g.

Chelidonium tannicum. Gelblich weisses Pulver, in Wasser fast unlöslich. Verwendung wie beim vorigen.

Chelerythrinum $C_{21}H_{17}NO_4 \cdot H_2O$ Rothgelbes Pulver, löslich in Alkohol und Aether. Ein Herzgift.

Protopinum $C_{20}H_{17}NO_5$ (identisch mit Macleyin) Löslich in Chloroform und heissem Alkohol. Schmelzpunkt $201^\circ C$.

Chenopodium.

Gattung der Chenopodiaceae — Cyclolobaeae — Chenopodieae.

I. Chenopodium ambrosioides L. Im tropischen Amerika heimisch, zum Arznei-gebrauch angebaut und aus den Kulturen häufig verwildert.

Beschreibung. Bis 60 cm hohes, zerstreut kurzhaariges Kraut mit kurzgestielten, entfernt buchtig gezahnten Blättern, die oberen fast ganzrandig. Die knäuel- förmigen Inflorescenzen bilden behaltene Scheinföhren. Geschmack bitter und brennend aromatisch. Geruch kampherartig. Liefert *Herba Chenopodii* (Aust.) *Hb. Chenopodii ambrosioides* (Ergänzb.) *Hb. Botrys mexicanae*. *Thea mexicana*. — Mexikanisches Traubenkraut. Gansfußkraut. Ambrosiakraut. Pimentkraut. Karthausenthe. Jesuitenthe. ¹⁾ Mexikanischer oder Spanischer Thee. — Ambrosie du Mexique (Gall.) Thé du Mexique. — Ambrose.

Bestandtheile. Aetherisches Oel in den Früchten 1,08 Proc. vom spec. Gew. 0,9, dreht $-18^\circ 55'$, in 10 Th. Alkohol (70 proc.) klar löslich. In den Blättern 0,35 Proc., spec. Gew. 0,879, dreht $-32^\circ 55'$, in 10 Th. Alkohol (70 proc.) unlöslich.

Einsammlung, Aufbewahrung. Das Kraut wird von Juni bis September mit den Blüthen gesammelt, von den dickeren Stengeltheilen befreit und getrocknet. Es findet zu Aufgüssen, 1–2 g mehrmals täglich, Anwendung. Man bewahrt es in Blechbüchsen auf.

Anwendung. Das Kraut wurde früher als Stomachicum und Nervinum, bei Ver- stauung, gegeben. Man verwendet es hier und da in der Volksmedizin bei Krämpfen, Hysterie und Menstruationsbeschwerden, ferner als Wurmmittel, in Amerika wie den chinesischen Thee.

Tinctura Chenopodii ambrosioides. Aus 1 Th. Kraut mit 5 Th. verdünntem Weingeist durch Digestion zu bereiten.

In Nordamerika sind auch die Früchte *Fructus Chenopodii ambrosioides*, *American Wormseed*, und das ätherische Oel *Oleum Chenopodii*, *Oil of Chenopodium*, *Oil of American Wormseed*, officinell.

II. Chenopodium anthelminticum L. Goose foot. Wormseed. Ansérine vermifuge (Gall.) Ebenfalls in Amerika heimisch. Das Kraut enthält etwa 2 Proc. ätherisches Oel. Dieses oder die Früchte verwendet man in Amerika als Wurmmittel.

Ebenfalls als wurmwidrig gelten *Chenopodium hircinum* Schrad., das 2,9 Proc. ätherisches Oel enthält und *Chenopodium Botrys* L.

¹⁾ Unter diesem Namen versteht man auch den Maté-Thee von *Ilex paraguayensis*.

III Chenopodium Vulvaria L. Vulvaire (Gall.) Heimisch in Europa. Die Blätter und das Kraut verwendet man gegen Hysterie und Rheuma. Enthält Trimethylamin, dem es den unangenehmen Geruch verdankt.

IV Chenopodium mexicanum Moqu. liefert „mexikanische Seifenwurzel“. Die Pflanze soll Saponin enthalten.

V Chenopodium album L. Die jungen Blätter werden hier und da als Gemüse genossen. Sie enthalten 80,81 Proc. Wasser, 3,94 Proc. Stickstoffsubstanz, 0,76 Proc. Fett, 8,93 Proc. stickstofffreie Extraktivstoffe, 3,82 Proc. Holzfaser, 3,94 Proc. Asche.

VI Chenopodium Quinoa L. Reismelde. In Mittel- und Sudamerika. Vor Ankunft der Spanier neben dem Mais das einzige Getreide besonders in höher gelegenen Gegenden der Anden, jetzt anscheinend nur noch in wenigen Gegenden Chiles in Kultur.

Die Früchte enthalten 16,0 Proc. Wasser, 19,18 Proc. stickstoffhaltige Substanz, 4,81 Proc. Rohfett, 47,78 Proc. stickstofffreie Extraktivstoffe, 7,99 Proc. Rohfaser, 4,23 Proc. Asche.

Auch anderwärts werden zu Zeiten Früchte von Chenopodiumarten zu Brot verbacken in Zeiten der Hungersnot (Russland), oder solche Früchte gelangen in grosserer Menge aus Nachlässigkeit unter das Getreide. Diese Beimengung gilt als gesundheits-schädlich. Solches Mehl liefert mit salzsaurehaltigem Alkohol in der Wärme behandelt, einen blassrothen bis tiefrothen Auszug. Da eine solche rothe Farbe auch andere Verunreinigungen des Getreides geben können, so ist daneben der mikroskopische Nachweis unerlässlich.

China.

Cortex Chinae (Austr. Germ.) **Cortex Cinchonae** (Helv.) **Cinchonae rubrae** **Cortex** (Brit.) **Cinchona** (U-St.) — Chinarinde. Fiebertinde. — Quinquina (Gall.) **Écorce de Quina ou de Quinquina.** — **Cinchona Bark**

Abstammung. Die Chinarinden stammen von verschiedenen Arten der Gattung **Cinchona**, Familie der Rubiaceae — **Cinchonoideae** — **Cinchoneae** ab. Die Cinchonon sind heimisch auf den Cordillären Südamerikas, wo sich ihr Verbreitungsgebiet etwa vom 10° n Br. bis zum 22° s Br. in einem gegen den Ocean konvexen Bogen von etwa 500 Meilen Länge erstreckt. Sie steigen bis auf eine Höhe von 3400 m und gehen bis auf 1200 m (ausnahmsweise vom Aequator entfernter auf 800 m) Meereshöhe hinab. Die unterhalb dieser Region („der Augenbraue des Gehirges, Ceja de la montaña“) vorkommenden Cinchonon liefern nur minderwerthige Rinden.

Durch die von jeher gebräuchliche, unrationelle Gewinnung der Rinden, bei der die Bäume einfach gefällt wurden, ohne dass man für einen Ersatz sorgte, sind werthvolle Cinchonon in ihrer Heimath sehr selten geworden und ihre Rinden kommen für den Handel eigentlich gar nicht mehr in Betracht.

Seit dem Anfang der fünfziger Jahre hat man angefangen, die Cinchonon ausserhalb ihrer Heimath zu kultiviren, und aus solchen Kulturen stammen die jetzt in den Handel gelangenden Rinden. Von grösster Bedeutung sind die Kulturen der Holländer in Java, dann die der Engländer in Ceylon, in den Nilagiris im südlichen Vorderindien und in Sikkim in den Vorbergen des Himalaya. Auch in der Heimath der Cinchonon hat man seit einer Reihe von Jahren angefangen, sie zu kultiviren, und es gelangen schon jetzt von dort zuweilen ansehnliche Quantitäten in den Handel.

Wie viele Arten die Gattung **Cinchona** umfasst, darüber gehen die Ansichten der Botaniker weit auseinander, die Arten sind schwer auseinander zu halten, da sie leicht Bastarde bilden. Howard (1876) beschreibt 38 Arten, Kuntze (1878) will sie auf folgende 4 reduciren: **Cinchona Weddelliana** Kuntze, **C. Pavoniana** Kuntze, **C. Howar-**

diana Kuntze, **C Pahudiana Howard**, und erklärt alle übrigen für Bastarde. Die Arzneibücher bedienen sich durchweg der alten Namen, es sollen denselben hier aber die Kuntze'schen Bezeichnungen beigelegt werden.

Germ verlangt Rinden kultivirter Pflanzen, vorzugsweise von **Cinchona succirubra Pavon** (nach KUNTZE **C. Howardiana** und **C Howardiani-Pahudiana**)

Helv die Rinden kultivirter Cinchonon, namentlich **C succirubra Pavon**, **C Ledgeriana Moens**, **C Calisaya Weddell** (nach KUNTZE **C Weddelliana**)

Austr Kulturrinden, besonders von **C succirubra Pavon**

Brit^m schreibt ausschliesslich **C succirubra Pavon** vor

U-St **C. Calisaya Weddell**, **C officinalis L** (nach KUNTZE **C Pavoniana-Weddelliana**), Bastarde dieser und anderer Arten, ferner als Red Cinchona **C succirubra Pavon**

Gall schreibt die Rinden wild wachsender und kultivirter Cinchonon vor in folgenden 3 Sorten

1) Graue Loxa-Rinden von **C officinalis L** und **C crispa Tafalla** (nach KUNTZE identisch mit **C. officinalis**), ferner graue Huanucorinden von **C micrantha Ruiz et Pavon** (nach KUNTZE vielleicht **C. Howardiani-Pavoniana**), **C nitida Ruiz et Pavon** (nach KUNTZE vielleicht **C Pavoniana**), **C peruviana Howard** (nach KUNTZE ebenfalls **C. Pavoniana**)

2) Gelbe Königschina von **C Calisaya Weddell**, worunter auch **C Ledgeriana** und **C javanica** verstanden werden, ferner **C lancifolia Mutis** (nach KUNTZE **Howardiani-Weddelliana**) und **C Pitayensis Weddell**

3) Rothe Chinarinde von **C succirubra Pavon**

Gewinnung In Sudamerika war es gebräuchlich, die Bäume zu fällen und zu entrinden, auch wohl mit der Wurzel auszuoden, um die besonders werthvolle Wurzelrinde zu erhalten. In Indien befolgt man verschiedene Methoden, durch welche Rinden ganz verschiedenen Charakters gewonnen werden. 1) *Mossing*. Man schält Streifen der Rinde vom Baum, zwischen denen man andere Streifen unversehrt stehen lässt und die Wunden mit Moos, Lehm oder Alang-Alanggras verbindet. Von den stehen gebliebenen Rändern aus regenerirt sich dann die Rinde und ist meist alkaloidreicher als die ursprüngliche. 2) *Schaven*. Die Rinde wird mit Schonung des Cambiums in kleinen Stücken abgeschabt und erneuert sich leicht. 3) *Uprooting*. Der ganze Baum wird ausgerodet, also vernichtet, wobei man aber die werthvolle Wurzelrinde gewinnt. 4) *Coppicing*, entspricht unserem Schälwaldbetrieb, der Baum wird gefällt und entrindet, aus dem Stumpf entwickeln sich Schösslinge, von denen man einige stehen lässt. Gegenwärtig verfährt man auf Java so gut wie ausschliesslich nach dem letzteren Verfahren.

Die für Apotheken bestimmten, sogen „*Diogistenrinden*“ bilden ausgewählte lange Röhren, welche man in Kisten verpackt, die für die Chininfabriken bestimmten „*Fabrik-rinden*“ stampft man in Ballen zusammen.

Beschreibung. Die indischen Kulturrinden kommen in bis 50 cm langen und noch längeren Röhren in den Handel, die bis 4 cm Durchmesser haben, meist von beiden Seiten eingerollt sind und aufgerollt einem Rindenstreifen bis 25 cm Breite entsprechen. Die Farbe ist aussen grau, oft durch Flechten verdeckt, innen mehr oder weniger gelbbraun bis rothbraun. Die nach der Gall noch officinellen Loxa- und Huanucorinden sind dünnere Rinden jüngerer Zweige. Uebrigens bezeichnet man gegenwärtig als Loxa in Java einfach dünne Zweigrinden ohne jede Rücksicht auf die Abstammung. Von der ebenfalls in der Gall. officinellen Königschina ist die sogenannte „*flache unbedeckte Königschina*“ (*Cortex Chinae regius seu planus seu sine epidermide*) zu erwähnen, die die Rinde dickerer Stämme bildete, aus flachen Platten bestand und von gelbbrauner Farbe

war. Die Borke war abgekratzt, so dass die Droge meist nur vom Bast gebildet wurde. Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass gegenwärtig aus Südamerika wieder flache Rinden, entweder unter dem Namen Calisaya oder Cochabamba u. s. w. in den Handel kommen, die der alten Königschina äusserlich ausserordentlich gleichen, aber durchaus minderwerthig sind, so dass man dieser früher am höchsten geschätzten Sorte jetzt mit berechtigtem Misstrauen gegenübertritt.

Bau der Rinde (Fig. 187). Bei der Handelswaare ist die Epidermis wohl kaum jemals erhalten, in der ersten unter derselben gelegenen Parenchymschicht entsteht der Kork, der die Bedeckung bildet; er besteht aus flachen unverdickten Zellen. Bei jüngeren Zweigrinden ist nur dieser oberflächliche Kork vorhanden, bei älteren findet sich Borke-




Fig. 187. Querschnitt durch die Rinde von *Cinchona succubra*. 80 mal vergrössert.

K Krystallsandzellen. P Parenchym der primären Rinde. M Milchsafschläuche, einer mit Füllzellen. F' primäre Bastfasern. F'' sekundäre Bastfasern. Ph primäres Phloem. M Markstrahlen. B Baststrahlen.

bildung, insofern der Kork in Streifen in die Rinde eindringt und Parthien derselben abtrennt. Unter dem Kork liegt die primäre Rinde oder Mittelrinde, aus tangential gestrecktem Parenchym bestehend, die Zellen führen meist mehr oder weniger lebhaft braunen Inhalt, auch ihre Wände sind braun gefärbt. Nicht selten führen einzelne Zellen ein feines Krystallmehl von Kalkoxalat, das sich auch im Parenchym des Bastes findet. Bei manchen Arten sind diese Parenchymzellen in grösserer oder geringerer Anzahl zu gewöhnlich nicht sehr stark verdickten Steinzellen umgewandelt, die unter Umständen auch im Bast noch auftreten können. Weiter nach innen tritt ein einfacher oder ausnahmsweise doppelter Ring weiter Milchsafschläuche mit braunem Inhalt auf, die in alten Rinden zusammengedrückt oder mit Parenchym ausgefüllt sein können. Innerhalb der Milchsafschläuche fallen im Parenchym zuweilen vereinzelt dünne primäre Bastfasern auf. Die primären Phloëmttheile sind selten noch deutlich zu erkennen. Die Hauptmasse der Rinde macht der Bast aus; die Markstrahlen sind




Fig. 188.

Bastfasern der *Cinchona succirubra*.

1—4 Zellreihen breit, sie verbreitern sich gegen die primäre Rinde, ihre Zellen sind grösser wie die des Parenchyms. Die Baststrahlen setzen sich zusammen aus Siebröhren, Cambiform, Parenchym und stark verdickten sklerotischen Zellen. Die Siebröhren sind auch in älteren Rinden auf Längsschnitten unschwer aufzufinden, sie haben geneigte Endflächen mit einer einfachen, oft mit Callus bedeckten Siebplatte. Die sklerotischen Bastzellen sind spindelförmig, die Enden spitz, meisselartig zugeshärft oder abgestutzt, sie sind auf dem Querschnitt deutlich geschichtet, oft radial gestreckt, das Lumen ist meist (abgesehen von den innersten, jüngsten Theilen) auf einen engen Kanal oder Spalt reducirt, die Wand links-schief getüpfelt.

Für die Charakteristik der einzelnen Arten können folgende Momente in Betracht kommen:

Steinzellen in der Mittelrinde und im Bast fehlen bei *C. succirubra*, *C. Ledgeriana*, *C. officinalis*, *C. micrantha*,¹⁾ *C. Pitayensis*; sie sind vorhanden (können aber in ganz jungen Rinden fehlen) bei *C. lancifolia* und vereinzelt bei *C. Calisaya*.

Die Milchsafschläuche sind in der Handelswaare zu erkennen bei *C. succirubra*, *C. Calisaya*, *C. micrantha*; bei *C. officinalis* zweifelhaft.

Die sklerotischen Zellen des Bastes erreichen folgende Dimensionen:

	<i>C. succirubra</i>	<i>C. Calisaya</i>	<i>C. Ledgeriana</i>	<i>C. officinalis</i>	<i>C. micrantha</i>	<i>C. lancifolia</i>	<i>C. Pitayensis</i>
Länge . .	1255 μ	950 μ	1135 μ	1175 μ	1590 μ	1185 μ	1162 μ
Dicke ²⁾ . .	77 μ	72 μ	65 μ	68 μ	77 μ	79 μ	61 μ

Bestandtheile. Die Chinarinden verdanken ihre Wirksamkeit in erster Linie einer Anzahl von Alkaloiden. Es sind davon die folgenden bekannt: Formel $C_{19}H_{23}N_2O$: Cinchonin, Cinchonidin, Homocinchonidin. $C_{19}H_{24}N_2O$: Cinchotin, Hydrocinchonin, Hydrocinchonidin, Ginchonamin. $C_{19}H_{24}N_2O_2$: Chinamin, Conchinamin. $C_{20}H_{24}N_2O_2$: Chinin, Conchinin. $C_{20}H_{26}N_2O_3$: Hydrochinin, Hydrochinidin. $C_{23}H_{26}N_2O_4$: Cheiramin, Cheiramidin, Concheiramin, Concheiramidin. $C_{23}H_{26}N_2O_4$: Aricin, Cusconin, Concusconin, Concusconidin. $C_{38}H_{44}N_4O_9$: Dicinchonin. $C_{40}H_{46}N_4O_9$: Homocinchin. $C_{40}H_{46}N_4O_9$: Dichinidin; ausserdem eine Anzahl zweifelhafter Alkaloide.

Der Alkaloidgehalt ist ein ausserordentlich schwankender; die Kulturrinden sind im allgemeinen reicher daran, als die von wilden Cinchonon (man hat Ledgerianarinden mit 13 Proc. Chinin gewonnen). Die durch den Mossingprocess gewonnenen, erneuerten Rinden (renewed bark) sind im allgemeinen alkaloidreicher als die ursprünglichen (z. B. 1,25 Proc. Chinin in ursprünglichen zu 2,5—3,9 Proc. in erneuerter Rinde). Ferner lässt sich

¹⁾ Nach BERG kommen hier zuweilen Steinzellen vor; ich habe sie nicht gefunden.

²⁾ Die Dicke ermittelt man im Querschnitt:

radialer Durchmesser + tangentialer Durchmesser.

im allgemeinen sagen, dass die Rinden dünner Zweige am alkaloidarmsten, die Wurzelrinde am reichsten ist und dass Stammrinde und solche von dicken Aesten etwa in der Mitte zwischen beiden steht

Der Alkaloidgehalt einer und derselben Art ist abhängig vom Substrat (Boden, Düngung), Beschattung, Seehöhe, Klima, Regenmenge, Alter des Baumes, den Theilen desselben, angeblich auch dem Grade der Bastardirung, der Art der Trocknung. Durch Feuchtigkeit, Schimmel etc. leidet der Alkaloidgehalt, ob auch durch längeres Liegen bei sonst guten Verhältnissen erscheint zweifelhaft

Der Sitz der Alkaloide in der Rinde ist das Parenchym, die Siebrohren, Fasern, auch die Zellen mit Oxalatsand sind frei davon. Daraus erklärt es sich, dass parenchymreiche Rinden, wie solche z. B. durch den Mossingprocess gewonnen werden, alkaloidreicher sind als faserreiche ursprüngliche Rinden

Die von den verschiedenen Pharmakopöen angegebenen Cinchona-Arten bilden bezüglich des Alkaloidgehaltes etwa folgende Reihenfolge: *Ledgeriana*, *Calisaya*, *Succirubra*, *Micrantha*, *Lancifolia*, *Officinalis* etc.

Auch die anderen Theile der Cinchonen, Blätter, Blüthen, Holz des Stammes und der Wurzel enthalten geringe Mengen von Alkaloiden. Die Samen sind frei davon

(Vergl. die einzelnen Artikel)

Ausserdem enthalten die Rinden folgende Säuren, an welche die Alkaloide gebunden sind: Chinassäure $C_7H_{12}O_6$, Chinagerbsäure $C_{14}H_8O_6 \cdot 2H_2O$ (*C. succirubra* 3,18 Proc., *C. Calisaya* 2,1–3,3 Proc.) von glukosidischem Charakter, liefert Chinarothe $C_{26}H_{32}O_{14}$, Chinovagerbsäure $C_{14}H_{18}O_8$, ebenfalls von glukosidischem Charakter, liefert Chinovarothe, Chinovassäure $C_{20}H_{32}O_{11}$, in javanischen Kulturinden gefunden, α -Chinovin $C_{30}H_{48}O_8$ (β -Chinovin findet sich in der Cuprearinde. Es liefert dieselben Spaltungsprodukte) wird durch verdünnte Säuren in Chinovazucker $C_6H_{14}O_6$ und Chinovasaure gespalten, Chinovit $C_8H_{11}O_6$, C_2H_5 , Cinchoi $C_{20}H_{44}O \cdot H_2O$, dem Cholesterin nahe stehend

Untersuchung und Werthbestimmung. Die Untersuchung muss eine doppelte sein, eine mikroskopische und chemische. Bei unzerkleinerten Rinden tritt die erstere gegenwärtig mehr in den Hintergrund, es genügt, durch Untersuchung einiger Querschnitte festzustellen, dass eine Chinarinde vorliegt und dass die Merkmale (vergl. oben) einer der von den Arzneibüchern zugelassenen Arten entsprechen.

Die Herstellung der Querschnitte ist oft nicht ganz leicht, da die Rinden beim Schneiden leicht bröckeln. Meist gelangt man zum Ziel, wenn man Stücke der Rinden mehrere Tage in Wasser oder in einem Gemenge gleicher Theile Wasser, Alkohol und Glycerin einweicht und dann zum Schneiden ein recht scharfes und etwas kräftiges Rasirmesser verwendet. Bröckeln die Rinden trotzdem, so kann man auf die Querschnittsfläche trockener Rindenstücke wiederholt dicken Gummischleim, dem man etwas Glycerin zugesetzt hat, aufstreichen. Man wiederholt dann das Aufstreichen, nachdem die zuerst aufgestrichene Masse eingezogen ist. Man schneidet vor dem völligen Trocknen. Da die Schnitte meist ziemlich dunkel und unübersichtlich sein werden, belgt man sie auf, indem man sie mehrere Tage in ein Glasschälchen mit ganz konzentrierter Chloralhydratlösung (3–2 Aq.) legt, auswäscht und dann untersucht, oder indem man sie auf dem Objektträger mit alkoholischem Ammoniak (*Liquor Ammonii caustici spirituosus*) behandelt, wodurch ebenfalls die Farbstoffe gelöst werden.

Unerlässlich ist die mikroskopische Prüfung tertig gekauften Pulvers, wenn es der Apotheker nicht vorzieht, dasselbe aus zuverlässiger Rinde selbst herstellen zu lassen. Da (vergl. unten) die Anforderungen der Arzneibücher bezüglich des Alkaloidgehaltes sehr mässige sind, und da im Handel reichlich Rinden mit höherem Alkaloidgehalt zu haben sind, so liegt die Versuchung nahe, solche gehaltreiche Rinden mit minderwerthigen zu verdünnen, wohl gar dazu fremde Rinden, z. B. die sogen. falschen Chinarinden, zu verwenden. Bei der Prüfung des Pulvers ist besonders auf die spindelförmigen, skleroti-

schen Zellen des Bastes zu achten, die keiner Chinarinde fehlen und die auch im feinen Pulver leicht unverletzt oder in grosseren Bruchstücken aufgefunden werden. Z. B. *Succirubra* darf keine anderen sklerotischen Elemente enthalten. Ausserdem können noch die Steinzellen der Mittelrinde vorkommen. Andere sklerotische Elemente dürfen nicht vorkommen. Es ist mit Sandelholz verfälshstes Chinarindenpulver vorgekommen, solches lässt unter dem Mikroskop Elemente des Holzes erkennen und färbt beim Schütteln mit Aether diesen orange-gelb.

Die GRAHE'sche Probe, die auch heute als eine vorläufige nicht überflüssig ist, hat den Zweck, festzustellen, dass eine vorliegende Chinarinde eine gute ist. Sie beruht darauf, dass Rinden, die Chinin, Cinchonidin etc. enthalten, beim Erhitzen im Probirrohr rothe Dämpfe entwickeln, die sich an kalten Stellen des Rohres zu einem karminrothen Theer verdichten. Andere Rinden geben einen braunen Theer. Man erhitzt dazu in einem Probirrohr 0,1–0,3 g kleiner Stücke der Rinde, indem man dem Cylinder eine fast horizontale Lage giebt. Soviel wir wissen, geben alle guten Chinarinden die Reaktion, aber auch manche geringwerthigen, so dass wohl aus ihrem Fehlen, nicht aber aus ihrem Auftreten weitere Schlüsse gezogen werden können.

Feststellung des Alkaloidgehaltes. Bei den indischen Kulturrinden wird bezüglich der Prüfung gegenwärtig im Handel das Hauptgewicht auf den Alkaloidgehalt gelegt und nach dem Aussehen, der sonstigen Beschaffenheit etc. wenig gefragt, wie ja auch die für die Fabriken bestimmten Rinden zu einem höchst unansehnlichen Gemenge zu samengepresst werden. Man handelt in Holland die Rinde nach dem „Unit“, womit man die Preiseinheit für je 1 Proc. Chininsulfat in 1 Pfd. (holl.) Rinde bezeichnet.

Bei den anderen (z. B. den südamerikanischen Kulturrinden) findet die Beurtheilung mehr wie in früherer Zeit nach dem äusseren Aussehen etc. statt, und es sind daher solche Rinden, wenn sie ohne garantirten Alkaloidgehalt in die Hände des Apothekers gelangen, stets mit besonderer Sorgfalt (auch mikroskopisch) zu untersuchen. Die z. B. neuerdings vorkommende Cochabambarinde, die im Aeusseren der „unbedeckten Calisayarinde“ ausserordentlich ähnlich sieht, ist ganz minderwerthig, eine andere, ganz kurzlich vorgekommene Rinde von garantirt 8 Proc. Alkaloidgehalt enthielt 4,5 Proc. und bestand aus einem Gemenge verschiedener Chinarinden und einer falschen Chinarinde (Ladenbergia).

Den Minimalgehalt an Alkaloiden normiren die Pharmakopoen wie folgt: Germ 5 Proc., Chinin wird darin nur qualitativ nachgewiesen. Austr. $3\frac{1}{2}$ Proc. Helv. 5 Proc., davon mindestens 1 Proc. Chinin. Brit. 5–6 Proc., davon die Hälfte Chinin und Cinchonidin. U.-St. 5 Proc., davon die Hälfte Chinin. Gall. Für graue Rinde, mindestens 1,5 Proc., davon $\frac{1}{10}$ Chinin, für gelbe Rinden 2,5 Proc. Chininsulfat, für rothe Rinden 3 Proc. Sulfate der Alkaloide, davon $\frac{2}{3}$ Chininsulfat. — Es ist nicht schwer, Rinden in ausreichender Menge, die den Anforderungen an den Gehalt an Gesamtalkaloiden entsprechen, zu beschaffen, hoch erscheint die Forderung der Brit. und der Gall. für rothe Rinden bezüglich des Chinin gehaltes im Verhältniss zur Menge der Gesamtalkaloide.

Zur Feststellung des Gehaltes an Gesamtalkaloiden verfährt man nach KELLER folgendermassen. In ein trockenes Glas von 200 ccm Inhalt bringt man 12 g trockenes Rindenpulver (Sieb V–VI d. Helv.), übergiesst mit 90 g Aether und 80 g Chloroform und schüttelt während 5 Minuten öfter um. Hierauf setzt man 10 ccm Ammoniakflüssigkeit (10 proc.) hinzu, agirt sofort kräftig, wiederholt das öfter während einer halben Stunde, dann giebt man bei *Succirubra* 10 ccm, bei *Calisaya* 12–15 ccm Wasser zu und schüttelt kräftig, bis sich das Pulver mehr oder weniger zusammengeballt und die Flüssigkeit geklärt hat. Dann wägt man 100 g des Chloroform-Aetherauszugs ab (= 10 g Rinde), lässt 1–2 Stunden verschlossen stehen und giesst von ausgeschiedenen Wassertropfen und Rindentheilchen klar in einen Scheidetrichter ab, in dem man dreimal mit 30, 20 und 10 ccm 1 proc. Salzsäure ausschüttelt, oder so lange, bis eine kleine Probe der letzten sauren Ausschüttelung mit Kaliumquecksilberjodidlösung keine Trübung mehr giebt. Die sauren Ausschüttelungen bringt man neuerdings in einen Scheidetrichter, macht mit Am-

moniak deutlich alkalisch und schüttelt mit Aether-Chloroform (9 1) aus, so lange, bis eine kleine Menge der letzten Ausschüttelung auf dem Uhrglaschen verdunstet, mit 1 proe Salzsäure aufgenommen, mit Kaliumquecksilberjodidlösung keine Trübung mehr giebt. Man wird gewöhnlich 100 g Aether-Chloroform verbrauchen. Die Lösung wird durch ein kleines mit Aether benetztes Filter in einen gewogenen Erlenmeyer gebracht, Aether und Chloroform abdestillirt und der Rückstand bei 80—90°C getrocknet und gewogen. Er stellt die Alkaloide aus 10 g Rinde dar. Da die letzten Reste Chloroform oft schwierig weggehen, so ist es angezeigt, den anscheinend trocknen Rückstand noch einige Male mit einer kleinen Menge (1 ccm) Aether zu übergießen und diesen im Wasserbade wegzukochen. Bei sorgfältigem Arbeiten wird man nach diesem Verfahren die Alkaloide stets in genügender Reinheit erhalten.

Eine recht befriedigende Methode zur Bestimmung des Chinins fehlt noch. Indessen kann man folgendermassen verfahren: 1) Man nimmt die nach dem oben genannten Verfahren erhaltenen Alkaloide mit 20 ccm Schwefelsäure (10 proe) unter Erwärmen im Wasserbade auf, giebt ev. neue Schwefelsäure zu, bis alle Alkaloide in Lösung gegangen sind, filtrirt vom ungelöst Gebliebenen durch ein kleines Filter ab, bringt das Filtrat auf das kochende Wasserbad und versetzt anfangs mit concentrirter, später mit verdünnter Ammoniakflüssigkeit bis zur schwach sauren Reaktion. Nach dem Erkalten scheidet sich alles Chinin als basisches Sulfat ab. Man sammelt die Krystalle auf einem kleinen, bei 100°C getrockneten und gewogenen Filter, lässt abtropfen, wäscht mit sehr wenig Wasser nach, entfernt letzteres nach Möglichkeit durch Absaugen, trocknet bei 100°C und wägt das basische Sulfat, das man dann wieder in Lösung bringen kann, aus der man das reine Chinin ausfällt, sammelt, trocknet und wägt.

Das nach dieser Methode abgeschiedene Chinin enthält aus Rinden, die reich daran sind, auch immer etwas Cinchonin und Cinchonidin. — Noch weniger genau, aber für viele Zwecke der Praxis ausreichend, ist es, die nach dem KELLER'schen Verfahren gewonnenen Alkaloide mit 15 ccm Aether portionsweise zu extrahiren. Es soll nicht mehr als die Hälfte ungelöst bleiben. Der Aether nimmt Chinin und Chinidin auf.

2) Bestimmung als Chininoxalat. 0,5 g des obigen Alkaloidgemenges werden in ein Becherglas mit Hilfe von möglichst wenig Essigsäure in 40 ccm Wasser bei gelinder Wärme gelöst, vom Ungelösten in ein tarirtes Becherglas abfiltrirt, das Filter nachgewaschen, das Filtrat genau mit verdünnter Natronlauge neutralisirt, von etwaigen Ausscheidungen abfiltrirt und mit 5 ccm einer bei 18°C gesättigten Natriumoxalatlösung versetzt. Nachdem auf dem Wasserbade auf 10 g Rückstand eingedampft und eine sich etwa ausscheidende schmierige Masse durch Zusatz von etwa 10 g Wasser wieder in Lösung gebracht ist, sammelt man nach mehrstündigem Stehen das ausgeschiedene Chininoxalat auf einem Filter, wäscht mit gesättigter Chininoxalatlösung aus, trocknet und wägt. Die Vorsicht gebietet, das Filter mit dem noch feuchten Niederschlag auch vor dem Trocknen zu wägen und für je 1 g Trockenverlust von der erhaltenen Menge trockenen Oxalates noch die Korrekturzahl 0,00069 abzuziehen, da dieser Werth dem hinzugebrachten Oxalat entspricht. Dann ist 1 g Chininoxalat = 0,878 Chinin.

Da das nach dieser Methode gewonnene Oxalat sehr unrein zu sein pflegt, so kann man es in Essigsäure lösen, mit Calciumchlorid und Kaliumacetat in Chlorid überführen, dann mit Ammoniak das Chinin ausfällen und mit Aether-Chloroform ausschütteln. Weil hierbei mit dem Wasser etwas Calciumchlorid in die Ausschüttelung übergeht und als Chinin mitgewogen wird, so empfiehlt es sich, das Chinin völlig anzutrocknen, mit wasserfreiem Aether von neuem zu lösen, zu verdunsten, zu trocknen und zu wägen.

Zum qualitativen Nachweis des Chinins übergiesst man die Alkaloide mit frisch bereitetem Chlorwasser und dann mit Ammoniak. Es muss eine schön grüne Färbung auftreten (vergl. Chinin).

Wirkung. Dieselbe wird bedingt durch die Alkaloide, die Chinasäure, Chinagerbsäure und das Chinovin, sie ist daher neben der antipyretischen der Alka-

loide eine adstringierende, tonisierende und antiseptische. Daher liegt es auf der Hand, dass die Rinde für viele Zwecke nicht durch die Alkaloide ersetzt werden kann.

Anwendung. Aeusserlich als Pulver, Extrakt oder Tinktur bei schlaffen, schlecht eiternden Geschwüren, bei Gangrän, Dekubitus, bei skorbutischem Zahnfleisch und bei Haarkrankheiten in Form von Pomaden. Als Streupulver rein oder mit Kohle, Myrrhe etc. Zu Umschlagen, Gurgelwassern, als Dekokt 1:10, als Zahnpulver mit Kohle, Myrrhe und aromatischen Substanzen.

Chinadekotte werden in Porcellanbüchsen angesetzt, heiss durchgeseiht und, da sie einen Bodensatz bilden, mit der Aufschrift „Vor dem Gebrauche umzuschütteln!“ versehen, mit 3—5 Th verdünnter Salzsäure auf 25 Th Rinde bereitet sind sie bedeutend alkaloidreicher. Eine solche Abkochung mit Säurezusatz hält bis 74 Proc, ohne Säure nur etwa 42 Proc der wirksamen Bestandtheile in Lösung.

Die Homöopathen gebrauchen China bei Schwäche und Bleichsucht. Zu vermeiden ist, die Chinarinde zusammen zu verwenden mit Gerbsäure, Alkalien, Leim, Eiweiss, Metallsalzen und auch mit Eisen. Man gebe an Stelle der letzteren Kombinationen Chinum-Ferro citricum.

Aufbewahrung. Im unzerkleinerten Zustande trocken und vor Licht geschützt aufbewahrt, halten sich die Chinarinden jahrelang im wesentlichen unverändert, eine Verminderung des Alkaloidgehaltes, wie sie nach älteren Angaben bei längerem Lagern eintreten soll, wird durch neuere Erfahrungen nicht bestätigt.

China-Extrakte

Extractum Chinae Austr. Zerstossene Chinarinde 100 Th, destill. Wasser 1200 Th, 24 Stunden stehen lassen, 1 Stunde kochen, abseihen, Rückstand dreimal mit je 1200 Th dest. Wasser auskochen, die Seihflüssigkeiten vereinigen und zur Trockne verdampfen. Ausbeute 10—12 Proc.

Extractum Chinae aquosum Germ. Grob gepulverte Chinarinde 1 Th zieht man zweimal mit je 10 Th Wasser je 48 Stunden lang aus, presst ab, dampft auf 2 Th ein, filtrirt und verdampft zu einem dünnen Extrakt. In Wasser trübe löslich, wie das folgende Ausbeute 12—15 Proc.

Extractum Chinae spirituosum Germ. Grob gepulverte Chinarinde 1 Th wird mit verdünntem Weingeist (60proc) je 5 Th zuerst 6, dann 3 Tage lang ausgezogen, die Pressflüssigkeiten zur Trockne eingedampft. Ausbeute 11—13 Proc.

Extractum Cinchonae fluidum Helv. Chinarinde (V) 100 Th werden mit Glycerin 20 Th, verdünnter Salzsäure, Wasser je 15 Th befeuchtet im Perkolator mit Wasser q s erschöpft.¹⁾ I. Auszug 70 Th giebt mit dem auf 20 Th eingedampften II. Auszug und Weingeist 10 Th = Extrakt 100 Th.

Extractum Cinchonae spirituosum s. siccum Helv. Chinarinde (V) wird im Perkolator mit verdünntem Weingeist (62,5proc) erschöpft, man destillirt den letzteren ab und verdampft zur Trockne.

Extractum Cinchonae liquidum Brit. Chinarinde (pulv. No 60) 640 g, Salzsäure 20 ccm, Glycerin 80 ccm, destill. Wasser q s. Durch Verdrängung mittels Wasser sammelt man 9600 ccm und dampft bei höchstens 82° C auf 640 ccm ein. Nach Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird durch Eindampfen, bezw. Verdünnen und Zusatz von Weingeist das Extrakt so eingestellt, dass es in 100 ccm 5 g Alkaloide und 12,5 ccm Alkohol enthält.

Extractum Cinchonae U-St. Calisayarinde (pulv. No 60) 1000 g, Alkohol (91proc) 3000 ccm, Wasser 1000 ccm. Durch Verdrängung, zuletzt mittels verdünntem Alkohol (41proc) q s, sammelt man 4000 ccm, zieht den Weingeist ab und dampft zu einem dicken Extrakt ein.

Extractum Cinchonae fluidum U-St. Calisayarinde (pulv. No 60) 1000 g, Glycerin 200 ccm, Alkohol (91proc) 800 ccm. Durch Verdrängung sammelt man, weiterhin mittels q s einer Mischung von Alkohol 800 ccm, Wasser 200 ccm, 750 ccm Perkolat, erschöpft die Rinde und bringt I a auf 1000 ccm Extrakt.

Extractum Cinchonae. *Extrait de Quinquina Gall.* Graue Chinarinde 1000 Th wird zuerst mit 8000, dann mit 4000 g siedendem Wasser übergossen, je 24 Stunden stehen gelassen. Die Pressflüssigkeiten werden, jede für sich, eingeeengt, vereinigt, dann zu einem weichen Extrakt eingedampft. Auf Platten gestrichen und eingetrocknet, liefert dasselbe das *Extrait sec de quinquina*.

¹⁾ Die Rinde ist erschöpft, sobald die Thalleiochinprobe (vergl. S. 745) versagt.

Extractum Cinchonae Calisayae, **Extrait de Quinquina jaune** Gall Calsayarinde 1000 g wird mittelst Alkohol (60proc) 8000 g perkolirt, der letztere abdestillirt, der Rückstand in destillirtem Wasser 1000 g gelöst und das Filtrat zur Trockne eingedampft. Ebenso bereitet man das **Extractum Chinae rubrae**, **Extrait de Quinquina rouge** Gall.

Extractum Chinae spirituosum s. alcoole paratum Gall. **Extrait alcoolique de Quinquina gris, jaune, rouge** werden alle drei wie **Extractum Digitalis** alcohol Gall (siehe dort) bereitet.

Extractum Chinae liquidum de Vrij wird aus einer 6 Proc Alkaloide enthaltenden Rinde dargestellt, indem man 25 Th davon mit 3 Th verdünnter Salzsäure (12 $\frac{1}{2}$ proc) und 122 Th Wasser 12 Stunden bei Seite stellt, 5 Th Glycerin zufügt, perkolirt, bis NaOH keinen Niederschlag mehr giebt und im Vacuum auf 25 Th eindampft. Ein solches Extrakt soll 5 Proc Alkaloide enthalten und sich besonders zur Darstellung haltbarer Chinaweine eignen.

Extractum Chinae frigide paratum Ph. Germ. L. Braune Chinarinde 1 Th wird mit destillirtem Wasser 6, dann 3 Th je 2 Tage lang ausgezogen, die Pressflüssigkeit eingeeengt, filtrirt und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 9—10 Proc.

Extractum Chinae fuscae Ph. Germ. I. Braune Chinarinde 1 Th je 24 Stunden mit verdünntem Weingeist 4, dann 2 Th ausziehen und 1 a zum dicken Extrakt eindampfen.

Extractum Chinae detannisatum Meaenox wird durch Behandeln einer weingeistigen Lösung von Chinaextrakt mit feuchtem Eisenoxydhydrat bereitet.

Bei der Bereitung von Chinaextrakten sind Metallgeräthe zu vermeiden!

Sirupus Chinae **Sirupus Cinchonae** **Chinasirup** **Sirap de Quina** oder **de Quinquina** 1) Ergänzb. Chinarinde (IV) 8 Th, Zimmt 2 Th, Rothwein 50 Th, lässt man 2 Tage stehen, presst und löst im Filtrat 40 Th, Zucker 60 Th zu Sirup 100 Th. 2) Helvet. Chinafluidextrakt 10 Th, Zuckersirup 90 Th. 3) Gall. Calsayarinde 100 g wird durch Verdrängung mittelst Alkohol (30proc) 1000 g, dann Wasser q s zu 1000 g Auszug erschöpft, der Alkohol abdestillirt, im Filtrat Zucker 1000 g zu Sirup 1525 g gelöst. Ebenso aus grauer Rinde der Sirup de Quinquina gris. 4) **Extracti Chinae de Vrij** 10,0, **Sirupi Auranti cort** 90,0, **Sirupi simpl** 100,0. 5) (a) Bull. de Ph.) Chinarindenpulver 100,0, Salzsäure 5,0, Wasser von 80° C q s. Durch Verdrängung sammelt man 550,0 und löst darin Zucker 950,0 zu Sirup 1500,0.

Tinctura Chinae (Germ.) **Tinctura Cinchonae** (Brit., Helv., U-St.) **Tinctura Chinae simplex**. — Chinatinktur — **Teinture de Quinquina** (Gall.) ou **de Quina**. — **Tincture of Cinchona**.

Germ. Chinarinde, grob gepulvert 1 Th, verdünnter Weingeist (60proc) 5 Th. Rothbraune Tinktur, die beständig Bodensätze bildet. — Brit. Aus 200 g Rindenpulver (No 40) sammelt man durch Perkolation mittelst Alkohol (70proc) 700 ccm, presst aus, mischt die Flüssigkeiten und fügt soviel Alkohol zu, dass 100 ccm Tinktur 1,0 g Alkaloide enthalten. — Helv. Aus Chinarinde (V) 20 Th. und verdünntem Weingeist (62proc) gewinnt man durch Verdrängung Tinktur 100 Th. — U-St. Calsayarinde (pulv. No 60) 200 g zieht man im Perkolator mittelst einer Mischung aus Glycerin 75 ccm, Alkohol (91proc) 675 ccm, Wasser 250 ccm durch Verdrängung zuletzt mittelst einer Mischung aus Alkohol und Wasser (675 250) aus und bereitet Tinktur 1000 ccm. — Gall. Aus grauer, gelber oder rother Chinarinde 100 g werden 500 g der entsprechenden Tinkturen durch 10tägiges Ausziehen mittelst Alkohol (60 proc) hergestellt.

Vinum Chinae. **Vinum Cinchonae** **Chinawein**. — **Vin de Quinquina**, **Vin de Quina** — **Cinchona Wine** — Austr. Chinarinde, Cognac je 25,0, Malagawein 500,0. 8 Tage maceriren — Ergänzb. Feinster, weisser Leim 1 Th in Wasser 10 Th gelöst, wird noch warm in Süßwein 1000 Th eingetragen, grob gepulverte Chinarinde 40 Th zugefügt, nach 8 Tagen abgepresst, Zucker 100 Th, Pomeranzentinktur 2 Th zugesetzt und nach 14tägigem Stehen im Kühlen filtrirt. — Helv. Chinafluidextrakt 2 Th, Marsala- oder auf ärztliches Verlangen ein sonstiger Wein (Malagawein, Rothwein, Weisswein etc.) 98 Th. Nach 8 Tagen filtriren. — Gall. Chinarinde 50,0 lässt man 24 Stunden mit Alkohol (60proc) 100,0 stehen, fügt Rothwein 1000,0 zu, presst nach 10 Tagen und filtrirt. Bei Verwendung von Liqueurweinen fällt der Alkohol fort. — **Dietrich** a) unversüßte Gelatine 1,0 in Wasser 10,0 gelöst, Xeres oder Rothwein 800,0, Chinatinktur 200,0, nach 8 Tagen (kalt stellen) filtriren, b) versüßt wie a, doch nur 600,0 Wein und dafür weissen Sirup 200,0. — **FRAGNER** **Extracti Chinae de Vrij** 20,0, **Mellis depurati** 40,0, **Tinct. Aurant. cort** 5,0, **Cognac** 20,0, **Vini albi seu rubri** 340,0, **Sacchari** 75,0. — **WEINERDEL** Chinarinde 500 g, Salzsäure 80 g, Wasser 600 g, Weingeist 400 g erhitzt man 24 Stunden im Dampfbade, bringt in einen Perkolator, fügt Weingeist 500 g hinzu, verdrängt nach 6 Tagen mit Sherry 5000 g, worin Citronensäure 15 g gelöst, setzt zum Perkolat Malaga 5000 g, Zuckersirup 1500 g, Pomeranzentinktur 50 g, Cognak 500 g, stellt kalt und filtrirt nach 3 Wochen. — Aufbewahrt wird Chinawein vor Licht geschützt an einem mässig warmen, Temperaturschwankungen möglichst wenig ausgesetzten Orte.

Cataplasma antipodagricum PRADIER.
 Pp Tincturae antipodagricae Pradier 100,0
 Aquae Calcariae 200,0
 Placentae seminis Lini q s
 Bei Podagra, warm anzuwenden

Chinabitter Extract. PRUYS
 Ep Corticis Chinae
 Corticis Auranti exp aa 60,0
 Cardamom minor 8,0
 Caryophyllorum 12,0
 Fructus Coriandri 40,0
 Corticis Cinnamomi 60,0
 Rhizom Graminis 120,0
 Spiritus (90 %) 2000,0
 Aquae destillatae 2500,0
 filtra et adde
 Sirupi Cerasorum 500,0
 Aquae Amygdalar amar 60,0

Decoctum Chinae
 Form mag Berol
 Pp Decocti Corticis Chinae 10 170,0
 Acidi hydrochlorici 2 1,0
 Sirupi simplicis 29,0
 2 stündlich einen Esslöffel

Eau de Quinine
 nach HISSRICH
 Rp Spiritus Vini Gallici 2000,0
 Spiritus Colonienis
 Spiritus (85 %) aa 250,0
 Spiritus saponis 100,0
 Tincturae Chinae 50,0
 Balsam. peruvian 20,0
 Olei Bergamottae 10,0
 Olei Aurantii dulc 10,0
 Olei Ceraui 3,0
 Tincturae Cantharidum 25,0
 Tincturae Colicellae q s

Electuarium antidiarrhoeum FRANKL
 Conservae Rosae 10,0
 Calci phosphoric 10,0
 Corticis Chinae pulv aa 5,0
 Corticis Aurantii fruct 2,0
 Sirupi Catechu q s
 3—4 mal täglich 1—2 Theelöffel

Electuarium dentifricium roborans
 Rp Corticis Chinae
 Rhizomat Indis flor aa 20,0
 Sanguinis Draconis
 Corticis Cinnamomi aa 5,0
 subtilis pulveris adde
 Mixturae odoriferae q s
 Aquae Rosae et Glycerini q s
 Zum Einreiben des Zahnfleisches

Elisir antarthriticum VILLETTE
 Rp Corticis Chinae 20,0
 Florum Rhoeados 10,0
 Ligni Sassafras 5,0
 Ligni Guajacae 15,0
 Spiritus Vini Gallici 900,0
 Colaturae adde
 Sirupi Sarsaparillae 200,0

Elisir balsamicum WERLEHOF
 Rp Corticis Chinae
 Corticis Aurantii aa 50,0
 Croci 5,0
 Kali carbonici 15,0
 Myrrhae 10,0
 Vini Hispanici 600,0
 In colatura solve
 Extracti Cardui benedicti
 Extracti Gentianae aa 10,0

Elisir Calisayae
 (Form amene)
 Rp 1 Cortic. Chinae Calisayae
 2 Cortic. Aurantii aa 45,0
 3 Fructus Cardamomi 18,0
 4 Corticis Cinnamomi 2,0
 5 Glycerini 54,0
 6 Alcohol q s ad 4,5 l
 7 Olei Neroli gtt 1
 8 Olei Aurantii cort gtt X
 9 Sacchari 100,0
 10 Aquae destillatae 400,0
 1—4 mittelst 5—6, wohn 7—8 gelöst, zu perkolieren
 und mit 9, in 10 gelöst, zu mischen

Elisir Chinae Calisayae
 I Badischer Apoth - Verein
 Rp Fructus Coriandri 1,0
 Fructus Cardamomi 1,5
 Caryophyllorum
 Florum Aurantii
 Ligni Santali aa 2,0
 Fructus Anisi stellati 3,0
 Corticis Cinnamomi 12,0
 Corticis Aurantii fruct 15,0
 Corticis Chinae Calisayae 36,0
 Spiritus diluti (80 %) 400,0
 Aquae destillatae aa 400,0
 Man digerirt 14 Tage, preest und fügt hinzu
 Sirupi simplicis 400,0
 Saccharini 0,2
 Nach 8 Tagen filtriren

II. Hamburg Apoth - Verein
 Rp 1 Corticis Chinae Calisayae 200,0
 2 Corticis Aurantii fruct recent No 7 1/2
 3 Fructus Anisi stellati
 4 Cortic. Cinnamomi zeyl
 5 Fructus Coriandri
 6 Fructus Calvi aa 45,0
 7 Coccinellae 10,0
 8 Aquae destillatae 6100,0
 9 Spiritus (90 %) 2000,0
 10 Sacchari 2000,0
 1—7 werden mit 8—9 perkolirt, Auszug auf 8000,0
 gebracht und darin 10 gelöst

Gargarisma adstringens BRANDE
 Pp Decoct cort Chinae
 Infusi Florum Rosae aa 100,0
 Tincturae Myrrhae 10,0
 Acidi hydrochlorici 25%, 1,0
 Zum Gurgeln bei Rachentzündung

Infusum Chinae acidum
 Acid Infusion of Cinchona (Brit)
 Rp Corticis Chinae succubri 50 g
 Acidi sulfurici aromatis 12,5 ccm
 Aquae destillatae euhiens 1000 ccm
 Nach einer Stunde abpressen

Infusum Cinchonae
 Infusion of Cinchona (U St)
 Rp Corticis Chinae Calisayae 60 g
 Acidi sulfurici aromatis 10 ccm
 Aquae destillatae q s
 Durch Verdrängung (im gläsernen Perkolator)
 sammelt man 1000 ccm

Mixtura alcoholica s Aqua Vitae
 (Form mag Berlin)
 Rp Spiritus (90 %) 40,0
 Tincturae Chinae compositae 3,0
 Aquae destillatae 157,0
 Zweistündl einen Esslöffel

Mixtura antiseptica RAYER

Rp	Decocti Chinae regiae	250,0
	Chinini sulfurici	
	Tincturae Aconiti	33 2,0
	Mixturae sulfuricae acidae	4,0
	Sirupi Aurantii corticis	60,0

Stündl einen Esslöffel

Mixtura Chinae WOLFF

Rp	Extracti Chinae frigide parati	80
	Aquae Cinnamomi spirit.	15,0
	Aethers	3,0
	Decocti corticis Chinae	180,0

Zweistündl 1 Esslöffel

Mixtura Chinae acida

(Münch Nosokom-Vorsch.)

Rp	Decocti cort Chinae	15,0	130,0
	cum Acidi hydrochlorici	3,0	parati
	Sirupi simplicis	20,0	

Mixtura Chinae vinosa JACCOUD

Rp	Extracti Chinae	8,0—4,0
	Vini rubri	100,0
	Spiritus Vini Gallici	500—1000
	Tincturae Cinnamomi	8,0
	Sirupi Aurantii corticis	80,0

Mixtura stomachica FOXSSA-GRIEVE.

Rp	Extracti Chinae	5,0
	Sirupi Aurantii corticis	50,0
	Vini rubri	250,0
	Tincturae Strychni	0,5

Mixtura vinosa (Form mag Berol)

Rp	Tincturae Chinae comp	4,0
	Sirupi simplicis	
	Spiritus (87 proc.)	33 25,0
	Aquae destillatae	146,0

Zweistündlich einen Esslöffel voll

Oleum erinale cum China.

China-Haaröl.

I nach DIERICH

Rp	1 Olei Olivarum benzoati	200,0
	2 Olei Amygdalar (s Arachidis)	800,0
	3 Balsami peruviani	20,0
	4 Olei Jasmini puguis	15,0
	5 Olei Millefoliorum	2,0
	6 Acidi salicylici	0,0
	7 Cumarini	0,05
	8 Alkannini	0,0
	9 Chlorophylli	2,0

6—9 mit 1 verreiben, 2—5 zumischen, nach 3 Tagen zu filtriren

II nach VOMÁČKA

Rp	Chinini oleumol	1,0
	Olei Arachidis benzoati	100,0
	Alkannini	
	Chlorophylli	33 q s ad color fusa.

Pasta Cacao cum China

Chinachokolade

Rp	Massa Cacao	200,0
	Sacchari	180,0
	Corticis Chinae pulverati	
	Corticis Cinnamomi	33 10,0
	Balsami peruviani	2,0

Man schmilzt und gießt in Formen

Pasta Chinae terebinthinata LOKART

Rp	Corticis Chinae pulverati	
	Olei Terebinthiniae	33 20,0

Handb d pharm Praxis I

Pomata antalopecalaca. KRAUS

Pp	Extracti Chinae	10,0
	Tincturae Cantharidum	5,0
	Olei cadini	2,5
	Olei Bergamottae	1,25
	Adipis suilla	75,0

Gegen das Ausfallen der Haare.

Pomata cum China.

Chinapomade

Rp	1 Extracti Chinae spirituos	150
	2 Extracti Ratanhiae	3,0
	3 Spiritus diluti	45,0
	4 Tincturae Cantharidum	25,0
	5 Cerae albae	
	6 Ceteol	33 30,0
	7 Adipis suilli	500,0
	8 Mixturae odoriferae	300
	9 Olei Amygdalar amar aeth	gt XX

Man schmilzt 5—7, mischt Lösung von 1—2 in 8—4, zuletzt 8—9 hinzu

II nach DIERICH

Rp	Cerae albae	
	Adipis benzoati	33 200,0
	Olii Olivarum	600,0
	Balsami peruviani	20,0
	Extracti Chinae spirituos	10,0
	Alkannini	0,5
	Chlorophylli	2,5
	Olei Bergamottae	0,5
	Olei Amygdalar amar aether	0,1
	Cumarini	0,03

Das Extrakt wird in Weingeist gelöst.

III nach LASSAR.

Rp	Chinini hydrochlorici	4,0
	Eilocarpi hydrochloric	1,0
	Balsam peruvian.	20,0
	Sulfur praecipit	10,0
	Medullae ossium	100,0

Pulvis dentifricus HUFELAND.

Rp	Corticis Chinae	30,0
	Ligni Santali rubri	60,0
	Aluminis crudi	8,0
	Olei Bergamottae	
	Olei Caryophyllorum	33 1,0

M. f. pulvis subtilissimus

Pulvis dentifricus alkalinus**Dentifricium alkalinum** Poudre dentifrice alcaline (Gall)

Rp	Corticis Chinae pulverati	100,0
	Calci carbonici praecipitati	100,0
	Magnesi carbonici pulverati	100,0
	Olei Menthae piperitae	10

Pulvis dentifricus cum Carbone et Cinchona (Gall)**Poudre dentifrice au charbon et quina.**

Rp	Carbonis vegetabilis pulv	2000
	Cort. Chinae pulv	100,0
	Oli Menthae	1,0

Pulvis dentifricus cum China.

China-Zahnpulver (DIETRICH)

Rp	1 Tincturae Catechu	1750
	2 Liquoris Ammonii caustici	850
	3 Calci carbonici praecipitati	700,0
	4 Corticis Chinae pulverati	150,0
	5 Sacchari Lactis pulverati	100,0
	6 Lapidis Pumicis sub pulverati	30,0
	7 Saccharini	0,2
	8 Olei Menthae piperitae	10,0
	9 Olei Aurantii corticis	
	10 Olei Caryophyllorum	33 2,5

M. n. verreibt 1 und 2 mit 3, trocknet zuerst bei gewöhnlicher Temperatur, dann im Trockenschrank, mischt 4—10 hinzu und treibt durch ein feines Sieb

Pulvis dentifricius niger (Aust.).**Schwarzes Zahnpulver**

Rp Corticis Chinae pulv
Fohorum Salviae pulv
Carbonis Ligni pulv aa

Pulvis febrifugus DUCLOS

Rp Corticis Chinae regiae 20,0
Pulveris aromatici 2,0

In der feberfreien Zeit theelöffelweise

Sirupus Chinae ferratus**Sirupus de Cinchona cum Citrate ferrico****Sirop de Quinquina ferriqueux (Gall)**

Rp Ferri citrici ammoniaci 10,0
Aquae destillatae 200
Sirupi Cinchonae cum vino parati 970,0

Sirupus Chinae ferratus DIETZICH

Rp Ferri oxydati saccharati (5 %) 10,0
Sirupi simplicis 30,0
Tincturae Chinae 10,0

Sirupus Chinae ferratus LERDORF

Rp Vini Chinae 400
Sacchari albi 600
Ferri citrici ammoniaci 1,0

Sirupus Chinae ferratus GRIMAULT

Rp Ferri citrici ammoniaci 1,5
Tincturae Chinae rubrae 10,0
Sirupi Sacchari 90,0

Sirupus Cinchonae cum Vino paratus**Sirop de Quinquina au vin (Gall)**

Rp Extracti Chinae flavae 10,0
Vini de Grenache 430,0
Sacchari albi 560,0

Sirupus tonicus BOURGOGN

Rp Sirupi Chinae
Sirupi Aurantii corticis
Sirupi Aurantii florum
Vini Hispanici aa 2^o o.

Bei Durchfall der Kinder theelöffelw. isa.

**Spiritus cinalis
Haarspiritus.**

Rp Balsami peruviani 5,0
Tincturae Chinae 15,0
Spiritus Vini Gallici 80,0

Tinctura antipedagrica. PRABIER.

Rp Balsami de Mecca 7,0
Croci 5,0
Corticis Chinae rubrae
Herbae Salviae
Radices Sarsaparillae aa 10,0
Spiritus diluti 400,0

Tinctura Chinae composita

Tinct. Cinchonae composita. Elixir roborans stomachicum Whyttii. Tinctura roborans Whyttii. Zusammengesetzte Chinatinktur ROBERT WYTT Silber-tropfen für Fieber Whytt'sche Tropfen
Teinture de Quina composé Compound Tincture of Cinchona

Pharm Austr

Rp Corticis Chinae gr pulv 60,0
Radices Gentianae conc. 20,0
Corticis Aurantii fruct conc. aa 20,0
Aquae Cinnamomi simplicis 120,0
Spiritus diluti (50 %) 360,0

Pharm Brit

Rp 1 Corticis Aurantii fructus 50 g
2 Rhizomatis Serpentinae 25 g
3 Coccionellae pulveratae 32 g
4 Croci 63 g
5 Tincturae Cinchonae 500 cem
6 Spiritus (70 %) q s

1—4 werden mit 500 cem von 6 während 7 Tagen ausgezogen, abgepresst, mit 5 vermisch und mit q s von 6 auf 1000 cem gebracht

Pharm Germ

Rp Corticis Chinae gr pulv 6,0
Corticis Aurantii fruct conc
Radices Gentianae concis aa 2,0
Corticis Cinnamomi gr pulv 1,0
Spiritus diluti (80 %) 50,0

Durch 3 tägiges Ausziehen zu bereiten

Pharm Helvet

Rp Corticis Chinae (V) 10,0
Radices Gentianae (V) 4,0
Corticis Aurantii fruct. (IV) 4,0
Corticis Cinnamomi (V) 2,0
Spiritus diluti (62 %) q s

Durch Verdrängung bereitet man

Tinktur 100,0

Pharm U-St

Rp 1 Corticis Chinae succubris 100 g
2 Corticis Aurantii fructus 80 g
3 Rhizomatis Serpentinae 20 g
4 Glycerini 75 cem
5 Spiritus (91 %) q s
6 Aquae destillatae aa q s

1—3 zieht man in einem gläsernen Perkolator mit einer Mischung aus 4, 5 (850 cem) und 6 (75 cem) aus und sammelt mittels einer Mischung aus 5 und 6 (850 75 cem) 1 a Tinktur 1000 cem

Tinctura Chinae crocata**Elixir alexipharmacum s febrifugum****HUXHAM****Rhd Ergänz-Taxe****Safranhaltige Chinatinktur**

Rp Corticis Chinae gr pulv 60,0
Corticis Aurantii fruct conc 10,0
Rhizomatis Serpentinae virg 12,0
Croci 4,0
Coccionellae 2,5
Spiritus diluti (60 %) 1000,0

Tinctura dentifricia roborans**Stärkende Zahntinktur**

Rp Tincturae Chinae
Tincturae Calami
Tincturae Cinnamomi aa 20,0
Tincturae Santali rubri 10,0
Spiritus diluti (60 %) 50,0
Balsami peruviani
Acidi benzoici aa 1,0
Olei Citri gtt V
Olei Menthae pipermintae gtt X

Zusatz zum Mundspülw. er

Tinctura stomachica**Müch. Nosokom.-Vorschr**

Rp Tincturae Chinae compositae
Tincturae Rhei vinosae aa

Tisana Chinae**Tisane de Quinquina (Gall)**

Rp Corticis Chinae concisi 20 g
Aquae destillatae ebullientis 1000 g

Nach zwei Stunden durchsehen

Vinum Chinae aromaticum

Rp Tincturae Chinae 20,0
Tincturae Cinnamomi 5,0
Tincturae Aurantii corticis
Tincturae aromaticae aa 2,5
Vini Hispanici 100,0

Vinum Chinae cacaotinatam

Vin toni-nutritif au quinquina et au cacao de BUGEAUD

Rp	1	Seminum Cacao (Caracas)	100,0
	2	Spiritus Vini Gallici	400,0
	3	Corticis Chinae regiae	120,0
	4	Corticis Cinnamomi	10,0
	5	Sirupi Sacchari	200,0
	6	Vini Hispanici	2000,0

1 frisch geröstet und gepulvert mit 2 zwei Tage digieren, dann mit 3—6 acht Tage macerieren, Stärkungsmittel für Genesende

Vinum Chinae ferratum

Chinaeisenwein.

I Ergänzb

Rp	Ferri citrici ammoniati	5,0
	Vini Chinae	1000,0

Nach 8 Tagen filtriren Mässig warm aufzubewahren

II nach MASTUS

Rp	1	Corticis Chinae	90,0
	2	Radix Gentianae	80,0
	3	Vini Malacensis	500,0
	4	Tincturae Aurantii cort.	270,0
	5	Solut Ferri sulfurici (10 %)	540,0
	6	Liquoris Ammonii caustici q s.	
	7	Ferri citrici	50,0
	8	Sacchari albi	500,0

1 und 2 werden 6 Tage mit 3—4 macerirt, 5 durch 6 gefüllt, der Niederschlag gewaschen, der Tinktur zugesetzt und diese solange stehen gelassen bis eine abfiltrirte Probe durch Eisenchlorid nicht mehr gefüllt wird. Dann löst man 7 und 8 ohne Erwärmen.

Vinum Chinae marifatam

Vin ou Oenolé de Quinquina ferrugineux (Gall)

Rp	Ferri sulfurici cristall.	
	Acidi citrici	2,0
	Aquae destillatae calidae q s. ad solut.	(10,0)
	Vini Cinchonae (griseae, au grenache)	990,0

Ague-Cure von AYER und Ague-Cure von JAYNE sind in der Hauptsache versüßte Chinamarindenauszüge

Ague-Mixture von CHRISTIE ist eine Chinatinktur mit Capsicumpulver

Butterzeugungspomade von ROYER & Co ist Chinapomade

Chinaeisenbier von STROSCHEIN in Berlin. Stark eingebräutes Bier mit einem Auszug aus Chinarinde, Orangenschalen, Zimmt, Kardamom, Vanille und 2 Proc Eisenkarbonat

China Eisenbitter von E. MECHLING in Mülhausen. Bier aus Chinarinde, Pomeranzenschalen, Muskatblüthen u s w mit Goldmalaga bereiteter Wein mit 0,5 Proc Eisenammoniumcitrat

Chinapellen, Dr. SEYFERTH's, Kugeln mit je 1,3 g Chinaalkaloiden, sollen, in Wasser gelöst, eingestellte Blumen lange frisch erhalten

Cinchonatabletten, PETZOLD's, enthalten jede 0,016 Cinchonin und 0,042 Koffein

Eau dentifrice des Cordilleres ist eine mit ätherischen Ölen versetzte Chinatinktur

Eau de Quinine von HEINRICH. Eine Mischung aus Perubalsam, Ricinusöl, Rum, Wasser, Chinatinktur

Eau de Quinine von PINAUD enthält keine Bestandtheile der Chinarinde, ebenso wenig Metallsalze, Gerbstoffe, Canthariden, Salicylsäure

Elixir antifébrile d'Evangelista besteht aus Chinatinktur, Zucker und Elixir ad longam vitam

Elixir toni-fébrifuge au Quinquina et Café, von DESLAURIERS, ist ein versüßter, weiniger Auszug aus Königschina, brauner Chinarinde und geröstetem Kaffee

Gichtessenz, Liquor antineuralgicus BATTLE, mit Zucker und Glycerin versetzter, weingeistiger Chinaauszug

Haarbalsam, Mailändischer, von KRELLER, ist eine Rindermarkpomade mit Chinaextrakt

Vinum Chinae phosphoratum ROBIN

Rp	Kali phosphoricum neutral	15,0
	Aquae destillatae	20,0
	Vini Chinae	450,0
	Sirupi Chinae	50,0
	Acidi phosphorici	gtt I

Vinum digestivum MALHERBE.

Rp	Vini Chinae	200,0
	Sirupi opii	50,0
	Acidi hydrochlorici diluti	6,0

Bei Verdauungsschwäche esslöffelweise.

Vinum subrifugum SEGUIN

Rp	Corticis Chinae regiae	50,0
	Corticis Angusturae	15,0
	Ligni Quassiae	10,0
	Opi pulverati	1,0
	Vini Hispanici	
	Vini Gallici albi	25 1625,0

Vinum stomachicum

Magenwein

Rp	Tincturae aromaticae	5,0
	Tincturae Chinae compositae	20,0
	Sirupi simplicis	30,0
	Vini generosi albi	145,0

Verordnungen nach HUSEMANN

Rp	Corticis Chinae pulverati	
	Carbonis pulverati	25 100,0

D S Stauipulver (Bei fauligen und brandigen Geschwüren)

Rp	Corticis Chinae	25,0
	Acidi hydrochlorici diluti	5,0
	Coque c Aq coam q s. ad solut	200,0
	Sirupi Cinnamomi	25,0

Dreistündlich 1—2 Esslöffel bei Wechselfieber

Rp	Corticis Chinae pulverati	20,0
	Carbonis pulverati	5,0

S Zahnpulver

Rp	Extracti Chinae spirituosus	8,0
	Aquae Aurantii florum	
	Aquae Cinnamomi	
	Sirupi Aurantii corticis	25 80,0

¼ stündlich esslöffelweise (Bei Wechselfieber)

- Haarerzeugungstinktur**, KNEIFEL's, Chinatinktur, Lebensbalsam und Zwiebelsaft
Haaressenz von MORAS, ist ein parfümiertes Gemisch aus Chinatinktur, Ricinusöl, Weingeist
Haarwuchssalbe von OTTO SELLE Wachssalbe mit Chinaextrakt, Catechutinktur und Perubalsam
Influenzin der Auerbacher Fabrik soll ein neuer, aus Chinarinde hergestellter neutraler Körper sein (1890)
KAPLICK's Migränemittel. 1) Chinatinktur, 2) aromatische Essentinktur, 3) Schlüsselblumen
Mundwasser von PFEFFERMANN Tinktur aus Sternanis, Nelken, Chinarinde mit Pfefferminzöl
Quina Laroche ferrugineux ist ein Chinawein mit 1 Proc. Eisenpyrophosphat und Ammoniumcitrat
Raphael Quinquina von LANIQUE ist ein Wein mit Spuren von Chinin
Reparateur à base de Quinquina, von F. CAUCQ, ist ein bleibhaftiges Haarfarbe mittel ohne Chinabestandtheile
Roborirendes Pulver, SIMON's, enthält Chinarinde, Kalkhydrat, Rhabarber, Eisenkarbonat
Tanno Quinine, Haarwuchssensenz, ist eine Tinktur aus Chinarinde, Gallapfehl, Bergamottöl und Nerchöl
Tinct Stomachica comp. „Tablets“ von BURROUGHS, WELLCOME et Co enthalten je 5 Tropfen Tinctura Chinae comp, Rhei vinosa und aromatica
Trunksuchtmittel von KEELEY, enthalten Goldchlorid, Atropin, Strychnin, Hydrastinin, Chinaflüextrakt
Vin de Fordyce ist ein weiniger Auszug aus Königsechina und Nelken
Vin de Vasseur Ein arsenhaltiger, aromatischer Chinawein
Vin de Vial Calcu lactophosphoric 10,0, Ferri citric ammon 3,0, Extract Carni 3,0, Extract Chinae 10,0, Vini Xerensis et Malacensis aa 250,0
Zahnpulver, MILLER's Chinarinde 60,0, präcipit kohlen-saurer Kalk 120,0, Auster schalen 60,0, Myrrhe 35,0, Minzenöl 15 Tropfen

Chinidinum.

Diese mit dem Chinin isomere Base wurde 1838 von HENRY und DELONDRE beobachtet, von ihnen aber für Chininhydrat gehalten Als besondere Base wurde sie dann durch VAN HELMINGEN 1848 festgestellt Die Base hat im Verlaufe der Zeit eine grosse Anzahl von Namen erhalten, und zwar die folgenden β -Chinin, β -Chinidin, Conchinin, Chinotin, Cinchotin, Pitayin, krystallisirtes Chinoidin In manchen Preislsten wird sie heute noch als Chinidinum I. aufgeführt.¹⁾ Dazu kommt noch, dass das später zu beschreibende Alkaloid „Cinchonidin“ von HESSE und Anderen früher als Chinidin bezeichnet worden ist. — Aus allen diesen Gründen wird man sich namentlich bei älteren Angaben stets die Frage vorzulegen haben, welche Base eigentlich gemeint ist

Das Chinidin ist in der Mehrzahl in der zur Chininfabrikation dienenden Chinarinden enthalten, ferner in einer auf Java kultivirten Calisaya, auch in Cinchona amygdalifolia und pitayensis, besonders reichlich aber ist es in der von einer Remigia (pedunculata) Kolumbiens abstammenden China cuprea enthalten

I Chinidinum Freies Chinidin. Conchinin. Quinidine. Quinidina $C_{20}H_{24}N_2O_2$
 Mol. Gew. = 324 Die Darstellung erfolgt in der Regel aus dem Chinoidin

Darstellung Man extrahirt Chinoidin mit Aether Der nach dem Abdestilliren des Aethers hinterbleibende Rückstand wird in verdünnter Schwefelsäure gelöst und mit Ammoniak genau neutralisirt. Man setzt alsdann zu der Flüssigkeit solange gesättigte Seignettesalzlösung hinzu, als noch ein Niederschlag entsteht. In dem so erzeugten Niederschlage befinden sich die Tartrate des Chinins und des Cinchonidins Man filtrirt nach einigem Stehen, entfärbt das Filtrat mit Thierkohle und fügt Kaliumjodidlösung hinzu Hierdurch scheidet sich das Chinidin als jodwasserstoffsaurer Salz ab Man filtrirt dieses

¹⁾ Während das Cinchonidin als Chinidinum II. bezeichnet wird

nach einigem Stehen ab, wäscht es aus, zerlegt es durch Ammoniak und löst das in Freiheit gesetzte und gewaschene Chinidin in verdünnter Essigsäure. Diese Lösung wird nochmals mit Thierkohle entfärbt, alsdann fällt man das freie Chinidin durch Uebersättigen mit Ammoniak, wäscht es aus, presst es ab und krystallisiert es aus siedendem Alkohol ein.

Dr. Verrill benutzte die Schwerlöslichkeit des Chinidinbitartrats in Wasser zur Abscheidung des Chinidins aus dem Chinoidin. 100,0 Chinoidin werden unter gelindem Erwärmen in einer Lösung von 50,0 Weinsäure in 200,0 Wasser aufgelöst, hierauf stark umgerührt, wobei die Wände des Glases mit dem Glasstabe gerieben werden, und dann der Ruhe überlassen. Enthält, wie meistens der Fall ist, das Chinoidin Chinidin, so gesteht die Masse in wenigen Tagen zu einem dünneren oder dickeren Krystallbrei, der auf ein Leinentuch gebracht wird. Nachdem die sirupartige, braune Flüssigkeit so viel wie möglich abgelaufen, wird der Rückstand gelinde gepresst, um die anhängende Flüssigkeit zu entfernen, in dem 14fachen Gewichte heissem Wasser aufgelöst und dann die Lösung heiss filtrirt. Beim Abkühlen scheidet sich das Chinidinbitartrat in Krystallen ab, welche durch Umkrystallisiren farblos gemacht werden. Die Abscheidung der freien Base und die weitere Reinigung derselben erfolgt wie oben angegeben. Das Chinoidin enthält 20—60 Proc. Chinidin.

Eigenschaften. Das Chinidin krystallisiert aus Alkohol in glänzenden, vierseitigen Prismen mit 1 Mol. Krystallalkohol. Diese Krystalle werden an der Luft unter Abgabe von Alkohol undurchsichtig, aber erst bei 120°C alkoholfrei, und zwar, ohne dass dabei Schmelzen stattfindet. Das von Wasser und von Alkohol freie Chinidin schmilzt bei 168°C . — Aus Aether krystallisiert es in Rhomboedern, aus siedendem Wasser in Form zarter Blattchen mit $1\frac{1}{2}$ Mol. Wasser. Diese, $1\frac{1}{2}$ Mol. Wasser enthaltenden Krystalle verwittern nicht an der Luft.

Das wasserfreie Chinidin löst sich in 2000 Th. Wasser von 15°C , oder in 750 Th. siedendem Wasser, auch in etwa 30 Th. Weingeist von 90 Proc., oder in 22 Th. Aether. Von siedendem Alkohol braucht es 4 Th. zur Auflösung, in siedendem Chloroform ist es leicht, in Petroleumäther nur wenig löslich.

Bei der Salzbildung spielt das Chinidin die Rolle einer zweisäurigen Base, insofern reagiren die im chemischen Sinne neutralen Salze sauer, die im chemischen Sinne basischen Salze dagegen sind neutral, was zu einer gewissen Verwirrung in der Nomenklatur geführt hat.

Die Lösungen des Chinidins reagiren schwach alkalisch, sind von stark bitterem Geschmack und optisch rechts drehend. Für eine Auflösung in 97 proc. Alkohol ist nach Hesse $[\alpha]_D = +236,77$ (Eine alkoholische Chininlösung dreht im Gegensatz hierzu links.)

Seinen chemischen Eigenschaften nach zeigt das Chinidin fast das gleiche Verhalten wie das Chinin. Die Uebereinstimmung kommt z. B. in folgenden Thatsachen zum Ausdruck:

1) Die mit sog. Oxysäuren, z. B. Schwefelsäure, angesäuerten Lösungen fluoresciren blau ebenso wie diejenigen des Chinin. — 2) Löst man etwas Chinidin in starkem Chlorwasser, so wird diese Lösung durch Zuträufeln von Ammoniak smaragdgrün gefärbt (Thalliochin-Reaktion). — 3) Mit Jod geht es dem Herapathit ähnliche Verbindungen ein.

Dagegen weicht es ab 1) im Schmelzpunkt. Wasserfreies Chinin schmilzt bei 175°C , wasserfreies Chinidin bei 168°C . 2) Es giebt ein schwerlösliches saures Tartrat und ein schwerlösliches Jodhydrat (s. unten). 3) Endlich ist die alkoholische Lösung rechtsdrehend, während diejenige des Chinins linksdrehend ist.

II Chinidinum sulfuricum (Erganzb.) Sulfate de Quinidine basique (Gall.) **Quinidinae Sulfas** (U.-St.) Chinidinsulfat. Schwefelsaures Chinidin $(\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{N}_2\text{O}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 782. Das von den Pharmakopoen aufgenommene Salz ist durchweg das dem gewöhnlichen Chininsulfat entsprechende basische Chinidinsulfat, welches ebenso wie das Chininsulfat seiner neutralen Reaktion wegen in der Regel als das neutrale Salz bezeichnet wird. Es ist zweckmässig als gewöhnliches Chinidinsulfat zu bezeichnen.

Darstellung. Die Darstellung des Chininsulfats erfolgt in der nämlichen Weise wie diejenige des Chininsulfats. Man löst 6,5 Th Chinidin (auf die wasserfreie Base berechnet) in 1 Th konc Schwefelsäure und 100 Th Wasser, unter Erwärmen, entfärbt die neutral gemachte Lösung durch Thierkohle und bringt sie zur Krystallisation (vergl. S. 757).

Eigenschaften. Weisse, seidenglanzende, nadelförmige Krystalle, löslich in etwa 100 Th kaltem oder 10 Th siedendem Wasser, zu klaren, neutralen Flüssigkeiten von stark bitterem Geschmack. Löslich auch in 20 Th kaltem oder 10 Th siedendem Chloroform, in siedendem Alkohol ist es leicht, in Aether nur wenig löslich. In der wässrigen oder alkoholischen Lösung ruft verdünnte Schwefelsäure blaue Fluoreszenz hervor.

Fügt man zu 5 Th der kalt gesättigten wässrigen Chinidinlösung 1 Th starkes Chlorwasser, so entsteht auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit smaragdgrüne Färbung (Thaliochin-Reaktion, die auch beim Chinin eintritt) — Die wässrige, mit einigen Tropfen Salpetersäure angesäuerte Chinidinsulfatlösung wird durch Baryumnitratlösung gefällt, durch Silbernitratlösung dagegen nicht verändert.

Prüfung. 1) Das Chinidinsulfat darf durch Trocknen bei 100° C nicht mehr als 4,7 Proc Gewichtsverlust erleiden. Das Salz obiger Formel besteht rechnerisch aus 82,86 Proc Chinidin, 12,54 Proc Schwefelsäure und 1,6 Proc Wasser. Ein höherer Wassergehalt würde wahrscheinlich auf eine Beimischung von Chininsulfat zurückzuführen sein, welches bekanntlich mit 7 Mol Wasser krystallisiert. 2) Beim Durchfeuchten mit konc Schwefelsäure oder Salpetersäure färbt Chinidinsulfat sich höchstens gelblich. Die gelbe Färbung mit Schwefelsäure wird durch fremde organische Substanzen bewirkt, welche nur in Spuren zugelassen sind. Bei Anwesenheit von Zucker würde intensive Braunung erfolgen. Entsteht durch Salpetersäure Rothfärbung, so konnte diese durch Bicuin oder Morphin verursacht sein. 3) 0,2 g verbrennen bei Luftzutritt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen (Mineralische Verunreinigungen). 4) 0,5 g Chinidinsulfat sollen sich in 10 g Chloroform vollständig auflösen. 5) Erwärmt man 0,5 g Chinidinsulfat mit 10 cem Wasser auf etwa 60° C, so erfolgt Auflösung. Fügt man zu der Lösung 0,5 g Kaliumjodid unter Umschwenken, so erfolgt Abscheidung des schwerlöslichen Chinidinjodhydrates. Der Niederschlag ist zunächst käsig und wird allmählich körnig. Man lässt 1—2 Stunden unter öfterem Umrühren stehen und filtrirt alsdann ab. Das Filtrat werde auf Zusatz eines Tropfens Ammoniakflüssigkeit nicht, oder nur sehr schwach getrübt (Chinin). 6) Lost man 0,5 g Chinidinsulfat mit Hilfe von etwas Schwefelsäure in 10 cem Wasser, übersättigt mit Ammoniak und schüttelt mit 15 cem Aether, so sollen zwei, auch nach längerem Stehen klar bleibende Schichten sich bilden. Eine Trübung deutet auf Cinchonin. 7) Wird zu 3 cem einer bei 15° C gesättigten Lösung von Chinidinsulfat eine kleine Menge Ammoniak zugesetzt, so scheidet sich ein weisser Niederschlag von reinem Chinidin ab, zur Auflösung desselben sind mehr als 30 cem Ammoniakflüssigkeit erforderlich, wenn grössere Mengen anderer Alkaloide nicht zugegen sind.

Aufbewahrung. Da das Salz nur verhältnissmässig selten gebraucht wird, so empfiehlt sich die Aufbewahrung unter Lichtschutz.

Anwendung. Das Chinidinsulfat wird unter den gleichen Indikationen und in den gleichen Gaben angewendet, wie das Chininsulfat. Es wirkt etwas schwächer (ist die Wirkung des Chinins = 10, so ist diejenige des Chinidins = 9), als das Chinin, dafür aber soll es auch weniger unangenehme Nebenwirkungen besitzen.

III. Chinidinum bisulfuricum. Saures schwefelsaures Chinidin $C_{20}H_{24}N_2O_7$, $H_2SO_4 + 4H_2O$. Mol. Gew. = 494. Nach den heutigen Auffassungen eigentlich das neutrale Sulfat des Chinidins.

Zur Darstellung löst man in einer Mischung von 10 Th konc Schwefelsäure und 50 Th Wasser, 32,5 Th wasserfreies Chinidin und dunstet die Lösung bis zur Krystallisation ab — Oder man übergiesst 10 Th. des neutralen Chinidinsulfates mit 40 Th Wasser, löst durch Zusatz von 1,3 Th konc Schwefelsäure (mit etwas Wasser verdünnt) auf und dunstet bis zur Krystallisation ab.

Farblose, lange Säulen, in 8 Th Wasser von 15° C zu einer bläulich fluoresciren den Flüssigkeit löslich. Giebt mit Jod mehrere als „Chinidin-Herapathite“ bezeichnete Verbindungen

Chinidinum hydrochloricum Chlorwasserstoffsäures Chinidin $C_{20}H_{24}N_2O_4 \cdot HCl + H_2O$ Mol. Gew. = 378,5 Zur Darstellung löst man a) 10 Th wasserfreies Chinidin in 200 Th Wasser und 4,5 Th Salzsäure (von 25 Proc HCl) und dunstet die Lösung zur Krystallisation ein, oder b) man setzt 100 Th krystallisiertes Chinidinsulfat $(C_{20}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot H_2SO_4 + 2H_2O$ (a dieses Salz) in wässriger Lösung mit 31 Th krystallisiertem Baryumchlorid $BaCl_2 + 2H_2O$ um, verfährt im übrigen genau, wie unter Chininum hydrochloricum angegeben ist

Farblose, asbestartige Prismen, löslich in etwa 50 Th. Wasser von 15° C, leicht löslich in Weingeist, fast unlöslich in Aether

Chinidinum bhydrochloricum. Saures salzsaures Chinidin $C_{20}H_{24}N_2O_4 \cdot 2HCl + H_2O$ Mol. Gew. = 415 Dieses Salz wird erhalten, indem man 10 Th. des vorigen $(C_{20}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot H_2SO_4 + 2H_2O$ mit 50 Th Wasser und 4 Th Salzsäure (von 25 Proc HCl) in Lösung bringt und die Lösung zur Krystallisation eindunstet

Chinidinum hydrojodicum Jodwasserstoffsäures Chinidin $C_{20}H_{24}N_2O_4 \cdot HJ$ Mol. Gew. = 452. Man löst 10 Th des krystallisierten Chinidinsulfates in 300 Th Wasser von etwa 50° C und fällt unter Umrühren mit einer Lösung von 4,5 Th Kaliumjodid. Der ursprünglich kasige, später körnig werdende, weisse Niederschlag wird gewaschen und dann getrocknet. Die Operationen sind möglichst rasch und vor Licht geschützt, aus zuführen

Weisses, körnig krystallinisches Pulver, in 1250 Th Wasser, sehr schwer in Alkohol löslich. Vor Licht geschützt aufzubewahren

Chinidinum tannicum. Conchium tannicum Gerbsäures Chinidin. Gerbsäures Conchium Chinidintannat. Zur Darstellung werden 100 Th. des officinellen Chinidinsulfats $(C_{20}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot H_2SO_4 + 2H_2O$ in 3000 Th kochend heissem Wasser gelöst und in einem geräumigen Gefäss (von ca 5000 Vol.-Th Inhalt) mit $\frac{1}{2}$ Vol. einer kohlten, kalten, aus 180 Th Gallusgerbsäure und 1400 Th. Wasser dargestellten Lösung versetzt. Nach dem Umrühren lässt man sofort gleichzeitig das letzte $\frac{1}{2}$ Volumen der Gerbsäurelösung und 40 Th 10proc. Aetzammon, verdünnt mit 360 Th. Wasser, hinzufliessen, während die Fällungsflüssigkeit agitiert wird. Nach einstündigem Stehen wird der Niederschlag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, mit kaltem Wasser abgewaschen, ausgedrückt, in nur lauer Wärme am schattigen Orte ausgetrocknet, endlich zu Pulver zerrieben und an einem schattigen Orte in dicht geschlossenem Glasgefäss aufbewahrt. Ausbeute 220—230 Th

Zur Darstellung darf unbedingt nur destillirtes Wasser in Anwendung kommen, überhaupt sind eiserne Gerathschaften sorgfältig zu vermeiden. Aus der Fällungsflüssigkeit ist der Chinidinrest durch Ansäuern mit Schwefelsäure etc. auszuschcheiden. Die Wärme zum Trocknen überschreite nicht 40° C

Ein weissliches, in Wasser und Aether unlösliches, in Weingeist und verdünnten Säuren lösliches Pulver. Die verdünnte Lösung in verdünnter Schwefelsäure schmeckt sehr bitter und fluorescirt wie eine Chininlösung. Alkaloidgehalt mindestens 33,3 Proc. Behufs Abscheidung und Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird das Tannat mit dem 15fachen Gewicht Bleioxyd und Wasser gemischt, langsam bei einer 40° C nicht übersteigenden Temperatur eingetrocknet, dann mit Weingeist extrahirt, der Auszug eingetrocknet und gewogen. Eine Formel lässt sich nicht angeben.

Das Präparat findet hauptsächlich in der Kinderpraxis, an Stelle des Chinintannates Verwendung als Antipyreticum, bei Diarrhöen und Keuchhusten in Gaben von 0,1—0,2 g mehrmals täglich. Gegen Dyspepsie, Diarrhöe, Nephritis, Albuminurie Erwachsener 0,1—0,3 g zweimal täglich, in der Veterinärpraxis gegen das Erysipel der Schweine 1,5 g dreimal täglich

Chinidinum glycyrrhinatum purum. **Chininum dulce** Sweet Quinine
Süßes Chinin Ist ein mit Glycyrrhizin verbundenes Chinidin. Zu seiner Darstellung werden 100 Th Glycyrrhizin mit 300 Th destilliertem Wasser und 45 Th 10proc Aetzammon gemischt und im Wasserbade erwärmt. In die ungerührte Mischung wird eine heisse Lösung von 40 Th gewöhnlichem Chinidinsulfat in 500 Th lauwarmem Wasser und 17,5 Th verdünnter Schwefelsäure (1,115 spec. Gew.) gegossen. Die unter Umrühren im Wasserbade erhaltene, dann erkaltete Mischung wird zwei Tage beiseite gestellt, dann der Bodensatz gesammelt, mit etwas kaltem Wasser ausgewaschen und bei gelinder Wärme getrocknet. Der Chinidinhydratgehalt beträgt 80 Proc.

Ein gelbbraunes Pulver, nur wenig löslich in Wasser, von bitterlich süßem Geschmack.

Das rohe Glycyrrhizin-Chinidin, rohes Süß Chinin, stellt man dadurch her, dass man nach der Bereitung des *Succus Liquiritiae depuratus* den Rückstand und die Bodensätze mit ammoniakalischem Wasser extrahiert, den filtrierten Auszug zur Trockne eindampft, zu Pulver zerreibt, hierauf 120 Th desselben mit 110 Th Wasser und 45 Th 10proc Aetzammon mischt, dann mit einer heissen Lösung von 40 Th Chinidinsulfat in 300 Th Wasser und 17,5 Th verdünnter Schwefelsäure versetzt und endlich das Gemisch zur Trockne abdampft und zu Pulver zerreibt. 1 g entspricht = 0,25 g Chinidinsulfat. Es ist ein braunes, süßlich schmeckendes Pulver. Dieses Präparat ist zu dispensieren, wenn das obige reine (*purum*) nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Chinidinum ureato-hydrochloricum **Chinidinum bismuriaticum carbamidatum.**
Chinidin-Harnstoff Chlorhydrat. Wird aus 380 Th **Chinidinum hydrochloricum**, 300 Th verdünnter Salzsäure (von 12,5 Proc HCl) und 60—61 Th reinem Harnstoff in der nämlichen Weise dargestellt, wie das *Chininum ureato hydrochloricum* s. dieses S 754.

Pilulae antikatarrhales HAGER
HAGER's Katarrh-Pillen (Hamb. Vorschr.)

Rp.	1	Chinidini sulfurici	
	2	Cinchonidini sulfurici	
	3	Tragacanthae pulveratae	
	4	Radici Gentianae pulv.	
	5	Sacchari albi pulv.	5,0
	6	Radici Althaeae pulv.	3,0
	7	Aquae	2,0
	8	Acidi hydrochlorici (25 %)	
	9	Glycerini	5,0

Die Mischung von 1—6 ist mit der Mischung aus 7—9 zu 200 Pillen zu verarbeiten, welche mit Zimmtpulver zu bestreuen sind.

Pulvis antiphlogisticus infantum
Kinderpulver mit Chinidintannat.

I

Rp.	Chinidini tannici	5,0
	Magnesi carbonici	0,5
	Sacchari albi	20,0
	Elaeosacchari Foeniculi	10,0

1—2 stündlich eine starke Messerspitze während des Zahneins, bei heissem Kopf, Durchfall, Katarrh, Husten.

II

Rp.	Chinidini tannici	2,0
	Magnesi carbonici	0,2
	Sacchari albi	5,0

Divide in partes decem
1 bis 2 stündlich $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ Pulver

Pulvis contra Hemigraniam
HAGER's Migraine-Pulver

Rp.	Chinidini sulfurici	1,5
	Coffeini	

Acidi tartarici	5,0
Morphini puri	0,05
Sacchari albi	10,0

Divide in partes quinque
Morgens u. Abends 1 Pulver

Pulvis pro Infantibus **BISMARCK**
BISMARCK'sches Kinderpulver

Rp.	Chinidini tannici	5,0
	Magnesi carbonici	0,5
	Sacchari albi	20,0
	Elaeosacchari Foeniculi	5,0
	Radici Liquiritiae	1,0

Messerspitzenweise zu geben

Trochisci roborantes
Kraftbrötchen Kraftpastillen Blutund-eisenbrötchen

Rp.	1	Chinidini tannici	20,0
	2	Pulveris aromati	5,0
	3	Cortidis Auranti fructus	2,5
	4	Vanillae saccharatae	5,0
	5	Tragacanthae	20,0
	6	Sacchari albi	200,0
	7	Magnesi carbonici	2,5
	8	Ligni Santali rubri	5,0
	9	Aquae Auranti florum	50,0
	10	Glycerini	20,0
	11	Ferri oxydati fusi	20,0
	12	Magnesi carbonici	2,5
	13	Sacchari albi	50,0
	14	Glycerini	10,0
	15	Aquae destillatae	5,0

Man mischt einerseits 1—10, anderseits 11—15, vereinigt beide Mischungen u. formt 300 Pastillen
Täglich 2—6 Stück bei chlorotischen und neurasthenischen Zuständen aller Art

Trochisci roborantes infantum
Kraftbröckchen für Kinder

Rp	Chinidini tannici	20,0	Ferri oxydati fusi	20,0
	Magnesi carbonici	2,5	Glycerini	80,0
	Tragacanthae	20,0	Aquae destillatae	40,0, vel q s
	Sacchari albi	300,0	Zu 800 Pastillen zu formen 1—4 Pastillen täglich	
	Ligni Santali rubri	5,0	bei Keuchhusten u Erkrankungen des Verdauungsorgans	
	Pulveris aromatici	2,0		

Febriline, Geheimmittel, angeblich geschmackloses Chinin. Ist ein säurefreier Citronensirup mit einem mässigen Gehalt an Chinidin.

Chininum.

Chininum Chinin. Quinine Quinina. Die wasserfreie Base hat die Zusammensetzung $C_{20}H_{24}N_2O_2$. Mol. Gew. = 324 Die wasserhaltige Base entspricht der Formel $C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$ Mol. Gew. = 378.

I Chininum hydratum Chininum (Helv) Quinine hydraté (Gall.) Quinina (U-St) Chininhydrat. $C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$ Mol. Gew. = 378

Darstellung Man löst 100,0 g gewöhnliches Chininsulfat in 2 Liter Wasser unter Zufugung von 112 g verdünnter Schwefelsäure (von 10 Proc) und versetzt diese, wenn nöthig filtrirte Lösung unter Umrühren mit 240,0 g Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc) Man lässt das Ganze unter gelegentlichem Umrühren in einem bedeckten Gefasse 24 Stunden stehen, dann filtrirt oder kocht man ab, wäscht bis zum Verschwinden der Schwefelsäure-Reaktion aus und lässt den Niederschlag auf poröser Unterlage bei 15—25° C an der Luft trocknen

Eigenschaften. Ein weisses, mikrokrySTALLINISCHES Pulver ohne Geruch, von sehr bitterem Geschmack, welches im befeuchteten Zustande empfindliches rothes Lackmuspapier blaut und Curcumapapier bräunt, aber Phenolphthalein nicht röthet (Atropin würde Phenolphthalein röthen) In kaltem Wasser ist es sehr schwer (1 1670) löslich, gleichfalls schwer löslich in kaltem Benzol oder Petroläther Dagegen löst es sich in 6 Th Weingeist oder in 5 Th Chloroform, oder 200 Th Glycerin, auch in rund 20 Th. Aether Von siedendem Wasser bedarf es 900 Th zur Lösung — Die Lösungen des Chinins lenken die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab, während Chinidin rechtsdrehend ist. (Siehe S 741)

Ueber Schwefelsäure oder an trockner Luft giebt das Chininhydrat 2 Mol (= 9,5 Proc) Wasser ab, es hinterbleibt die Verbindung $C_{20}H_{24}N_2O_2 + H_2O$ Diese wird erst durch Trocknen bei 100° C völlig wasserfrei Der Wassergehalt des Chininhydrates $C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$ beträgt rechnerisch 14,28 Proc

Wird das Chininhydrat erhitzt, so schmilzt es bei 57° C, bei weiterem Erhitzen wird es unter Wasserabgabe und Uebergang in wasserfreies Chinin wieder fest und schmilzt alsdann bei 175° C Bei weiterem Erhitzen wird es vollständig zersetzt unter Abscheidung einer schwerverbrennlichen Glanzkohle, die schliesslich vollständig verbrennt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen

In wässrigen Oxydsäuren, z B Schwefelsäure, Essigsäure, Weinsäure, löst es sich mit bläulicher Fluorescenz auf Diese wird unterdrückt durch Ferricyankalium, Rhodankalium, Natriumthiosulfat und durch die Fluoride, Chloride, Bromide und Jodide der Metalle, ausgenommen Mercurichlorid, Mercuribromid, Mercuricyanid, Fluorwasserstoff und Ammoniumfluorid.

Charakteristisch ist für das Chinin die Thalleiochin-Reaktion Löst man 0,1 g Chinin in 20 cem starken Chlorwassers, so entsteht auf Zutropfen von Ammoniakflüssigkeit eine smaragdgrüne Färbung Indessen giebt auch das Chinidin die gleiche Reaction, s S 741

Prüfung 1) Es sei rein weiss und verbrenne auf dem Platinbleche zwar schwierig, aber ohne einen Rückstand zu hinterlassen (Mineralische Beimengungen) 2) In konc Mineralsäuren, auch in konc Schwefelsäure, löse es sich entweder ohne Färbung oder mit nur schwach gelblicher Färbung auf (Dunkle Färbung wurde Zucker anzeigen) 3) Beim Erhitzen mit Natronlauge entwickle es keinen Ammoniakgeruch (Ammoniaksalze) 4) 1 g Chinin soll sich in einem Gemisch von 6 cem absolutem Alkohol und 3 cem Aether bei leichter Erwärmung vollständig auflösen, und die Lösung soll nach dem Erkalten klar bleiben (Fremde China Alkaloide, besonders Cinchonin) 5) Die Prüfung auf fremde China-Alkaloide erfolgt zweckmässig in der Weise, dass man eine grössere Menge, z B 10 g, mit verdünnter Schwefelsäure genau neutralisirt, das neutrale (basische) Chininsulfat abscheidet und dieses, wie unter Chininum sulfuricum angegeben, auf Nebenalkaloide prüft 6) Es verliere durch Trocknen bei 100° C nicht mehr als 14 Proc an Gewicht (Beschweimung mit Wasser, der theoretische Wassergehalt beträgt 14,28 Proc)

Aufbewahrung Vor Licht geschützt, da es im direkten Lichte braunlich wird

Anwendung Das Chininhydrat dient vorzugsweise zur Darstellung einiger seltener gebrauchter Chininsalze. **BERNATZIK** empfahl eine 50 procentige aetherische Auflösung des Chininhydrates zu subkutanen Injektionen. Zu diesem Zwecke werden 5,0 Chininhydrat in 15,0—20,0 Aether gelöst und die Lösung abgedunstet, bis sie das Gewicht 10,0 hat. Ueber die Wirkung und Anwendung der Chininsalze s. unter Chininum sulfuricum.

II Chininum anhydricum Wasserfreies Chinin $C_{20}H_{24}N_2O$ Mol. Gew. = 324. Ist die freie wasserfreie Chinabase. Man erhält sie aus dem wasserhaltigen Chinin, indem man dieses zunächst im luftverdünnten Raume über Schwefelsäure vortrocknet und dann die Trocknung bei 125° C zu Ende führt. Weisses, krystallinisches Pulver von den Eigenschaften des vorigen, Schmelzp 175° C.

Das wasserfreie Chinin scheidet sich auch aus der bei Siedehitze gesättigten wässrigen Lösung aus, ferner wenn man die wässrige Lösung bis zur Salzhaut eindampft, endlich aus der alkoholischen Lösung unter bestimmten Bedingungen.

Chininum crudum **Chininum LABARRAQUE'sches** **Quininum Extractum polychrestum Chinae** Grobgepulverte Chinarinde, in welcher Chinin zu Cinchonin dem Gewichte nach wie circa 2 : 1 vertreten ist, wird mit dem halben Gewicht Kalchhydrat gemischt, mit Weingeist in der Wärme erschöpft und der weingeistige Auszug durch Destillation und Abdampfen zur Trockne gebracht. Es ist eine amorphe braunliche bröcklige Masse.

Pilulae Quinini

Rp Chinini crudi 15,0

Man erweicht dasselbe in mässiger Wärme und formt daraus 100 Pillen. Zweimal des Tages in der fieberfreien Zeit zehn Pillen.

Vinum Quinini

Rp Chinini crudi 5,0
Acidi citrici 1,0
Vinum albi 1000,0
Spiritus Vini 45,0

Macerate saepius agitando et filtra

D S 100,0 als Febrifugum, 30,0 als Roborans

Chininum dulcificatum, versüsstes Chinin, versuchte man vor längerer Zeit in den Handel zu bringen. Man bereitete es aus gelöstem Lakritzensaft, welcher mit Ammon schwach alkalisch gemacht war, durch Versetzen mit Chinoidinlösung und Trocknen des Niederschlags.

Quinetum ist die Bezeichnung für ein Alkaloidgemisch, welches von C. H. Wood in Bengal aus der Rinde der dort angepflanzten *Cinchona succirubra* nach DE VRIJ's Verfahren dargestellt wird und wenigstens aus vier Alkaloiden Chinin, Cinchonidin, Cinchonin und amorphem Alkaloid besteht. In Bengal hat man dieses Präparat „*Cinchona febrifuge*“ getauft.

Ähnliche Präparate sind **Chinoquinine**, das Gemisch sämtlicher fallbarer Basen aus *Cinchona succirubra*, an Salzsäure gebunden, ferner **Calisagaine**, die amorphen, rohen, gefällten Chinabasen, also eine Art Roh Chinin.

Chinobalsamum. GOSSELINI.

Quinobaume de Gosselini

Rp Resinae Balsami Copaivae 5,0
Chinini puri 2,0

Fiant pilulae No 100 Gegen Gonorrhoe

Oleum Jecoris Aselli cum Chinino

Chinin-Leberthran

Rp 1 Chinini puri 2,0
2 Alcohol absoluti 6,0
3 Olei Jecoris 300,0

Man löst 1 in 2, fügt 3 zu u erwärmt, bis 2 verflüchtigt ist.

Chininum citricum.

I Chininum citricum Chinincitrat. Citronensaures Chinin Citrate de Quinine Quininae Citrias $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 \cdot C_6H_8O_7 + 7H_2O$ Mol. Gew = 966

Zur Darstellung lost man 1 Th krystallisierte Citronensaure in 100 Th. destillirtem Wasser, setzt 3,086 Th wasserfreies oder 3,6 Th krystallisiertes Chininhydrat hinzu und kocht, bis die Saure gesattigt ist, filtrirt und setzt zur Krystallisation zur Seite

Weisse, nadelfoimige Krystallnadeln in etwa 900 Th kaltem oder 30 Th siedendem Wasser, oder in 45 Th kaltem oder in 3 Th siedendem Alkohol loslich, von bitterem Geschmack — Die heiss bereitete wasserige Losung, mit frisch bereitetem Kalkhydrat bis zur alkalischen Reaction geschuttelt und nach dem Erkalten (?) filtrirt, muss eine klare Flussigkeit geben, welche beim Erhitzen bis zum Sieden milchig getrubt wird, die Trubung verschwindet beim Erkalten wieder (Calcumcitrat) Das Salz giebt die Thallerochin-Reaction — Die wasserige Losung darf, nach dem Ansauern mit Salpetersaure, durch Baryumchlorid nicht getrubt werden Ex tempore lasst sich 1,0 des Salzes durch Mischung von 0,75 Chininhydrat und 0,4 Citronensaure darstellen

Das Chinincitrat soll weniger energisch auf Gehirn und Magen wirken, auch ein Antisepticum und Tonicum sein Dosis 0,05—0,3—0,6—1,0 Es wird nur selten gebraucht

Sirupus Chinini citrici MAGENDIE, eine Losung von 0,65 Chinincitrat und 0,5 Citronensaure in 100,0 Sirupus Sacchari Taglich 1—2 Loffel voll als Antiscorbuticum und Antisepticum von MAGENDIE empfohlen

II Chininum-Ferro citricum Chininum citricum martiatum Chinin-Eisencitrat. Die unter diesem oder ahnlichen Namen von den verschiedenen Pharmakopoen aufgenommenen Preparate sind keine einheitlichen Verbindungen, ubrigens auch von verschiedener Zusammensetzung

Chininum-Ferro citricum (Austr Germ) Eisenchinincitrat Citronsaures Eisenchinin Die Germ giebt eine Vorschrift zur Darstellung nicht, doch kann das Preparat nach der von der Austr angegebenen Vorschrift (welche der Germ II entstammt), hergestellt werden

Darstellung. Man losse 6 Th Citronensaure in 500 Th. destillirten Wassers und fuge 8 Th gepulvertes Eisen hinzu Hierauf erhitze man unter haufigem Ruhren auf dem Dampfbade Diese Operation fuhre man in einer flachen Porcellanschale aus, damit durch genugenden Luftzutritt das zuerst entstehende schwerer losliche krystallinische Ferro-citrat in das amorphe, leichter losliche Ferro-Ferri-citrat ubergehe, welches zur Darstellung des Chinindoppelsalzes nothig ist Nachdem die anfangliche Wasserstoff-entwicklung beendet ist, digerire man daher die Mischung unter bestandigem Einsetze des verdampften Wassers so lange, bis die Losung rothbraun geworden ist Hierauf filtrire man dieselbe durch ein leinenes Filtertuch und verdampfe die klare Flussigkeit bis zur dunnen Sirupsdicke

Der kalten Eisencitratlosung wird noch feuchtes, frisch gefalltes und ausgewaschenes Chininhydrat zugefugt, welches aus 1,33 Th Chininsulfat (durch Fallung mit Natronlauge dargestellt ist) Das Chinin wird mit der Eisenlosung innig gemischt, ehe man behufs der Losung gelinde erwarmt Wenn man das Chinin in die heisse Eisenlosung eintragt, so bilden sich Klumpchen, welche sich sehr schwer losen Nachdem die Losung des Chininhydrats eine vollstandige geworden ist, streiche man die, dunne Sirupkonsistenz zeigende Flussigkeit auf Glastafeln und trockne bei massiger Warme, bis sich das Preparat mit einem Messer leicht von den Glastafeln abstossen lasst Die Ausbeute betragt 10 Th Die Darstellung im Laboratorium bietet keine Vortheile

Eigenschaften Das nach Austr und Germ officinelle Chinineisencitrat bildet glanzende, fast durchscheinende, dunkelrothbraune Lamellen, von bitterem, hinternach massig eisenartigem Geschmack, welche sich in Wasser ausserst leicht, dagegen schwer in Weingeist losen Das in dem Doppelsalze enthaltene Eisencitrat ist ein Oxyduloxysalz

nicht ein reines Oxydsalz des Eisens. Die mit Salzsäure angesäuerte wässrige Lösung giebt daher sowohl mit Kaliumferrocyanid- als auch mit Kaliumferricyanidlösung tiefblaue Fällungen. Mit Kaliumjodidlösung giebt sie eine braune Fällung von Jodchinin.

Aufbewahrung. Um eine Reduktion des Chinin-Ferricitrates, welche durch das Tageslicht eintritt, zu verhindern, bewahre man das Salz in einer dicht geschlossenen Flasche vor Licht geschützt auf.

Prüfung. Man löse 0,5 g des Salzes in 50 ccm destillirten Wassers. Man erhält eine klare Lösung, welche man mit etwas Salzsäure ansauert.

1) 10 ccm dieser Lösung geben mit Ferrocyanidkaliumlösung eine blaue Fällung (Anwesenheit von Ferrisalz). — 2) 10 ccm der nämlichen Lösung geben mit Ferricyanidkaliumlösung eine blaue Fällung (Anwesenheit von Ferrosalz). — 3) 10 ccm derselben Lösung geben mit volumetrischer Jodlösung eine braune Fällung (von Jodchinin). — 4) 10 ccm der Lösung verdünne man mit destillirtem Wasser auf 1 Liter. Die so erhaltene Lösung von 1 : 10000 gebe mit Ferro- als auch mit Ferricyanidkaliumlösung Bläunungen und mit Jodlösung noch eine Trübung. — 5) Man löst 1 g des Salzes in einem ca 20 ccm fassenden graduirten Cylinder in 4 ccm Wasser, versetzt die Lösung bis zur stark alkalischen Reaction mit Natronlauge und fügt sofort 7 ccm Aether hinzu. Hierauf entzieht man der alkalisch wässrigen Mischung das ausgefallene Chinin durch Schwenken und leichtes Schütteln derselben mit dem Aether. Man vermeide hierbei zu heftiges Schütteln, da sonst das Ganze emulgirt. Nach dem Absetzen laße man die ätherische Lösung mit einer Pipette ab und verdampfe die Lösung in einem tarirten Schälchen. In gleicher Weise mache man zwei weitere ätherische Auszüge. Der Gesammtrückstand der drei Auszüge gebe, bei 100°C getrocknet, mindestens 0,09 g (Germ).

Zur Beurtheilung der Reinheit des in dem Chinineisenextrakt enthaltenen Chinins löse man 20 g Chinineisenextrakt in 80 ccm Wasser und verfähre zur Isolirung des darin enthaltenen Chinins in derselben Weise wie oben angegeben weiter. Das erhaltene Chinin löse man unter mäßigem Erwärmen in der 20fachen Menge Weingeist auf und neutralisire die Lösung genau mit verdünnter Schwefelsäure. Hierauf verdunste man den Weingeist und verfähre mit dem im Rückstande bleibenden Chininsulfat, wie unter Prüfung von *Chininum sulfuricum* angegeben (s. S. 760).

Anwendung. Das Chinineisenextrakt wird als Roborans, Stomachicum und die Bluthbereitung verbesserndes Mittel angewendet. Man giebt es zu 0,05–0,2 g 2–4 mal täglich in Wein gelöst oder in Pillen, bei Chlorose in doppelt so starker Dosis.

Chinino-Ferrum citricum (Helv). 26 Th Citronensäure werden in 50 Th Wasser bei 30–40°C gelöst. Diese Lösung werde unter häufigem Umrühren mit frischbereitetem Ferrihydroxyd (welches aus 48 Th. Ferriehloridlösung von 1,28–1,29 spec Gew mittels Ammoniakflüssigkeit gefällt und genügend ausgewaschen ist) digerirt. In der sauren Lösung des Ferricitrates löse man durch Digestion 5,5 Th Chininhydrat $C_{20}H_{24}N_2O_8 + 3H_2O$ (s. S. 745), worauf die Flüssigkeit sorgfältig bis zur Syrupconsistenz eingedunstet und auf Glasplatten gestrichen und bei einer 50°C nicht übersteigenden Wärme getrocknet wird.

Gelb- bis rothbraune Blättchen, in Wasser löslich. Die Lösung reagirt sauer. Der Gehalt an wasserfreiem Chinin betrage mindestens 10 Proc. Ueber die Bestimmung s. oben.

Ferri et Quinae Citras (U-St). Iron and Quinine Citrate. 85 Th Ferricitrat werden in 160 Th Wasser unter Erwärmen im Wasserbade auf nicht über 60°C gelöst. In diese Lösung bringe man eine Anreicherung von 12 Th wasserfreiem Chinin $C_{20}H_{24}N_2O_8$ (s. S. 746) und 3 Th Citronensäure mit 20 Th Wasser. Man rührt um, bis völlige Auflösung erfolgt ist, dampft bei 60°C zum Syrup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet ihn bei 50–60°C.

Rothbraune Blättchen, löslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol. Es soll mindestens 11,5 Proc wasserfreies Chinin enthalten.

Ferri et Quinae Citras solubilis (U-St). Soluble Iron and Quinine Citrate. Man löst 85 Th Ferricitrat in 160 Th Wasser bei 60°C, rührt eine Anreicherung von 12 Th wasserfreiem Chinin mit 3 Th Citronensäure und 20 Th Wasser darunter, und wenn völlige Auflösung erfolgt ist, rührt man in kleinen Antheilen (1) 50 Th Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc NH_3 oder soviel als nöthig, mit der Vorsicht darunter, dass man einen neuen Zusatz erst dann macht, wenn der durch den vorhergehenden Zusatz entstandene Niederschlag von freiem Chinin wieder in Lösung gegangen ist und die Flüssig-

keit eine grünlichgelbe Färbung angenommen hat. Dann dunstet man zum Sirup bei 60° C ab, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei 50—60° C.

Grünlichgelbe Blättchen, an feuchter Luft zerfließend, sehr leicht in kaltem Wasser, in Alkohol nur theilweise löslich. Das Präparat besteht aus Ferricitrat, Chinincitrat und Ammoniumcitrat. Es enthält etwa 11 Proc wasserfreies Chinin.

Ferri et Quininae Citras (Brit.) Iron et Quinine Citrate (Brit.) Man fällt aus 180 ccm Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew 1,441) durch Ammoniak das Ferrihydroxyd und wäscht dieses genügend aus. Andererseits löst man 40 g gewöhnliches Chininsulfat in 320 ccm Wasser unter Zusatz von 50 g verdünnter Schwefelsäure (von 16 Proc H_2SO_4) und fällt aus dieser Lösung das freie Chinin durch Zugabe von Ammoniak in mäßigem Ueberschuss. Man sammelt den Niederschlag und wäscht ihn mit 1200 ccm Wasser aus. Dann löst man 123 g Citronensäure in 190 ccm Wasser, erwärmt die Lösung im Wasserbade und giebt das vorher gut abgetropfte Ferrihydroxyd unter Umrühren dazu. Wenn das Ferrihydroxyd gelöst ist, bringt man das Chinin hinzu und rührt um, bis auch dieses in Lösung gegangen ist. Man lässt alsdann erkalten, setzt unter Umrühren in kleinen Antheilen 60 ccm Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc) hinzu, welche mit 80 ccm Wasser verdünnt sind, mit der Vorsicht, dass ein neuer Ammoniakzusatz erst dann erfolgt, wenn das durch den vorhergegangenen Zusatz ausgeschiedene Chinin wieder in Lösung gegangen ist. Man filtrirt, dunstet die Lösung zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei 38° C.

Grünlichgelbe Blättchen. Das Präparat besteht aus Ferricitrat, Chinincitrat und Ammoniumcitrat und entspricht bis auf den etwas höheren Chinin Gehalt dem Ferri et Quininae Citras solubilis der U St-Ph. Es enthält 15 Proc wasserfreies Chinin.

Das nach Brit oder U St hergestellte Präparat wird in Deutschland bisweilen unter dem Namen Chininum Ferro-citricum viride oder Chininum Ferro-citricum ammoniatum verordnet.

Pulvis Ferri et Quininae Citratis effervescent (Nat form) Effervescent Powder of Citrate of Iron and Quinine. Effervescent Citrate of Iron and Quinine (Nat form). Rp Chinini Ferri citrici solubilis (U St) 10,0, Sacchari albi 285,0, Acidi tartarici 334,0, Natri bicarbonici 372,0.

Vinum Ferri amarum (U St) Rp Chinini Ferro citrici solubilis 50,0, Vini albi 500 ccm. Solve! Tincturae corticis Citri Auranti (Apfelsimentinktur) 150,0, Sirupi Sacchari 300 ccm, Vini albi q s ad 1 Liter.

Chininum hydrobromicum.

I. Chininum hydrobromicum. (Helv Ergänzb.) Chininhydrobromid Bromwasserstoffsäures Chinin. Bromhydrate de Quinine basique (Gall) Quininae Hydrobromas (U-St) $C_{20}H_{24}N_2O_4 \cdot HBr + H_2O$. Mol Gew = 423

Zur Darstellung werden 100 Th gewöhnliches Chininsulfat in 800 Th Wasser unter Erhitzen bis zum Sieden gelöst, alsdann fugt man zu der im Sieden zu erhaltenden Flüssigkeit in kleinen Antheilen unter Umrühren eine Lösung von 38 Th krystallisiertem Baryumbromid in 250 Th Wasser, lässt kurze Zeit sieden und alsdann erkalten. Man prüft die abgesetzte Flüssigkeit, ob sie gelbtes Baryumsalz enthält, und stellt sie in der auf S 750 angegebenen Weise so ein, dass sie eher eine kleine Menge Chininsulfat, keinesfalls aber Baryumsalz in Lösung enthält. Man filtrirt, wäscht das auf dem Filter hinterbleibende Baryumsulfat mit wenig Wasser nach, dunstet das Filtrat bei 60° C ab und lässt es in der Kälte krystallisiren. Die Krystalle werden nach dem Abtropfen auf Filtrirpapier gebracht und an der Luft getrocknet.

Feine, seidenartig glänzende, concentrisch gruppirte Nadeln, löslich in 60 Th kaltem Wasser, in 1 Th siedendem Wasser, auch in 10 Th Chloroform, in 0,7 Th Weingeist, in Glycerin in jedem Verhältnisse. Die wässrige Lösung ist neutral oder sehr schwach, alkalisch und darf durch Zusatz von verdünnter Schwefelsäure nicht getrübt werden (Baryumsalz). Das Salz enthält 76,6 Proc Chinin $C_{20}H_{24}N_2O_4$ und 4,25 Proc Wasser. Die wässrige Lösung fluorescirt nicht.

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung des Salzes (1 50) werde durch Baryumnitrat nur wenig (Spuren von Schwefelsäure sind zuzulassen), durch verdünnte Schwefelsäure aber gar nicht getrübt (Barytverbindungen, welche auch in Spuren nicht zugegen sein

dürfen) 2) 0,05 g einer guten Durchschnittsprobe, mit 10 Tropfen conc Schwefelsäure und 1 Tropfen Salpetersäure gemischt, zeigen keine rothe Färbung (Brucin, Morphin) 3) Das Salz verliere bei 100° C nicht mehr als 4,5 Proc an Gewicht 4) Prüfung auf Nebenalcaloide 2 g Chininbromhydrat werden in einem erwärmten Mörser in 20 ccm heissem Wasser gelöst (1), die Lösung wird mit 1 g zerriebenen, unverwittertem Natriumsulfat versetzt und die Masse gleichmässig durchgearbeitet Nach dem Erkalten bleibe die Masse, unter zeitweiligem Umrühren, $\frac{1}{2}$ Stunde bei 15° C stehen, hierauf werde durch ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser filtrirt Von dem 15° C zeigenden Filtrate werden 5 ccm mit Ammoniakflüssigkeit (Spec Gew 0,96) von 15° C versetzt, bis der entstandene Niederschlag wieder gelöst ist Hierzu dürfen nicht mehr als 4 ccm Ammoniakflüssigkeit verbraucht werden

II Chininum bihydrobromicum Saures Chininbromhydrat. Saures bromwasserstoffsäures Chinin. Bromhydrate de Quinine neutre (Gall) $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot 2HBr + 3H_2O$ Mol. Gew. = 540.

Zur Darstellung lost man 100 Th gewöhnliches Chininsulfat in 800 Th Wasser, welches mit 67,5 Th verdünnter Schwefelsäure (sp G 1,11—1,14) angesäuert ist Zu dieser siedenden Lösung fügt man unter Umrühren und ohne das Sieden zu unterbrechen, in kleinen Antheilen eine Lösung von 76,0 Th krystallisiertem Baryumbromid in 200 Th Wasser Wenn alles zugegeben ist, lässt man noch einige Augenblicke sieden, dann absetzen und stellt fest, ob in der klaren Flüssigkeit durch Schwefelsäure noch eine Trübung erfolgt, ob also Baryumsalz noch in Lösung ist Sollte dies der Fall sein, so fällt man das Baryumsalz durch Zugabe kleiner Mengen des Chininum bisulfuricum aus, so dass von letzterem nur ein sehr geringer Ueberschuss vorhanden ist Dann filtrirt man ab, wäscht das auf dem Filter hinterbleibende Baryumsulfat mit heissem Wasser nach, dunstet das Filtrat bei 60° C bis zum Gewicht von 300 Th ab und lässt es in der Kälte krystallisiren Die Krystalle werden nach dem Abtropfen auf Filtrirpapier an der Luft getrocknet

Farblose prismatische Krystalle, löslich in 7 Th. kaltem Wasser, sehr leicht löslich in siedendem Wasser, auch in Alkohol Die wässrige Lösung rothet blaues Lackmuspapier, sie darf durch verdünnte Schwefelsäure nicht getrübt werden (Baryumsalze) Das Salz enthält 60 Proc Chinin und 10 Proc Wasser

Die mit starkem Chlorwasser versetzte wässrige Lösung des Salzes giebt auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit eine smaragdgrüne Färbung (Thalleochein Reaction) Silbernitrat ruft in der wässrigen, mit Salpetersäure angesäuerten Lösung eine blassgelbe Fällung von Silberbromid hervor

Chininum hydrochloricum.

I. Chininum hydrochloricum (Austr Germ Helv) Chlorhydrate de Quinine basique (Gall) Quininae Hydrochloridum (Brit) Quininae Hydrochloras (U-St) Chininhydrochlorid. Chininchlorhydrat. Chlorwasserstoffsäures Chinin. Chininum muriaticum. Salzsäures Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl + 2H_2O$ Mol. Gew. = 396,5 Dieses Salz wird mit Vortheil nur in grossem Maassstabe, d. h. in chemischen Fabriken, dargestellt

Darstellung. 1) Dieses Salz wird fabrikmässig durch Umsetzung von reinem Chininsulfat mit Baryumchlorid hergestellt. Man fügt zu 1 Th Chininsulfat 15 Th. destillirtes Wasser und 0,28 Th Baryumchlorid und erwärmt unter beständigem Umrühren bis auf 60° C. Wenn die Umsetzung in Baryumsulfat und Chininchlorhydrat beendet ist, filtrirt man ein kleines Probenchen durch ein Papierfilterchen und prüft das Filtrat auf Baryum und Schwefelsäure Im Falle ersteres noch vorhanden ist, fügt man eine weitere kleine Menge von Chininsulfat zu der warmen Lösung, bei einer belangreicheren Schwefelsäurereaction giebt man noch etwas Baryumchlorid hinzu Wenn schliesslich die Lösung

so eingestellt ist, dass das Filtrat kein Baryumsalz und kein oder wenig Sulfat mehr enthält, so fugt man etwas Thierkohle zu und filtrirt die durch Dekanthiren ziemlich geklärte, noch heisse Flüssigkeit durch Papierfilter. Nach mehrtägigem Stehen wird das aus krystallisirte Chininchlorhydrat von der Lauge getrennt und bei gelinder Wärme getrocknet. Die Lauge kann auf verschiedene Weise weiter verarbeitet werden, z. B. durch Wiederverwendung derselben bei einem neuen Ansätze oder durch Eindampfen derselben im Vacuum, um durch Erzielung von concentrirteren Lösungen weitere Krystallisationen von Chininchlorhydrat zu erlangen.

2) Im pharmaceutischen Laboratorium bereitet man es am bequemsten und vortheilhaftesten direkt aus Chininhydrat und Salzsäure.

Aus dem Chininsulfat durch Natriumkarbonat abgeschiedenes, noch feuchtes Chininhydrat wird in annähernd ausreichender Menge in eine 25procentige Salzsäure, welche mit der 1-fachen Menge destill. Wasser verdünnt und auf höchstens 80° C erwärmt ist, auf einmal eingetragen. Nach 15 Minuten langem Stehen an einem lauwarmen Orte wird die Mischung bis auf circa 60° C erwärmt und entweder etwas Chininhydrat oder verdünnte Salzsäure dazu gegeben, bis die Flüssigkeit völlig neutral geworden ist oder eine sehr schwache Alkalität erlangt hat. Dann setzt man zur Krystallisation bei Seite. Um dem erzeugten Chininchlorhydrat volle Krystallisationsfähigkeit zu erhalten, darf die erwähnte Temperatur von 60° C nicht überschritten werden. Auf 10 Th. jener 25procentigen Salzsäure ist das Chininhydrat aus 30 Th. Chininsulfat ausreichend. Die Ausbeute beträgt dann annähernd 28,5 Th. Die Mutterlauge lasse man langsam, vor Staub geschützt, bei einer Temperatur von höchstens 45° C abdunsten. Sollte sie keine Krystalle ausgeben wollen, so ist es am besten, das Chinin daraus als Hydrat mittels Natriumkarbonat auszufällen.

Eigenschaften. Das Chininchlorhydrat bildet weisse, seidenglanzende, häufig zu Büscheln vereinigte, nadelförmige Krystalle, welche bei gewöhnlicher Temperatur beständig sind, bei massiger Wärme verwittern und bei 100° C ihr ganzes Krystallwasser verlieren. Es ist neutral, geruchlos, von sehr bitterem Geschmack, löslich in 34 Th. Wasser von 15° C, in 25 Th. von 20° C und in 2 Th. von 100° C, in 3 Th. Weingeist und in 9 Th. Chloroform (Chininsulfat ist in Chloroform fast unlöslich). Die Lösungen fluoresciren im concentrirten Zustande überhaupt nicht. Stark verdünnte Lösungen zeigen die Andeutung einer schwachen Fluorescenz, die jedoch auf Zusatz von Salzsäure verschwindet.

Die Formel des Salzes ist $C_{20}H_{21}N_2O_4 \cdot HCl + 2H_2O$. Mol. Gew. = 398,5. Dieser Formel entsprechend besteht das Salz aus 81,72 Proc. Chinin, 9,20 Proc. Chlorwasserstoff und 9,08 Proc. Krystallwasser.

Prüfung. Bezüglich der Prüfung ist des Näheren auf das unter „Prüfung des Chininsulfats“ Gesagte zu verweisen. Man löse 0,2 g. des Salzes in 100 ccm. destillirtem Wasser. 1) 50 ccm. der Lösung werden mit 20 ccm. Chlorwasser versetzt und 20 ccm. Ammoniak hinzugefügt. Die Flüssigkeit färbt sich smaragdgrün (Identitätsreaktion bez. Thalleiochinreaktion). — 2) 10 ccm. der Lösung geben mit Salpetersäure angesäuert auf Zusatz von Silbernitratlösung einen weissen Niederschlag von Chlorsilber (Identitätsreaktion). — 3) 10 ccm. der Lösung werden auf Zusatz einiger Tropfen verdünnter Schwefelsäure gar nicht, dieselbe Menge auf Zusatz einiger Tropfen Baryumnitratlösung nur sehr wenig getrübt. Eine Trübung mit Schwefelsäure deutet auf einen von einer wenig sorgfältigen Darstellung des Salzes herrührenden Gehalt von Chlorbaryum hin, eine geringfügige Trübung mit Baryumnitratlösung ist auf einen zulässigen Gehalt von Chininsulfat zurückzuführen. — 4) 0,05 g. des Salzes mit 10 Tropfen Schwefelsäure und 1 Tropfen Salpetersäure gemischt, zeigen keine rothgelbe Färbung. Bei Ausföhrung der Reaktion füge man zuerst die Schwefelsäure zu und warte mit dem Zusatz des Tropfens Salpetersäure so lange, bis die Chlorwasserstoffentwicklung aufgehört hat. Es entsteht bei reinem Chininchlorhydrat eine gelbe Lösung (Morphin giebt bei dieser Reaktion eine Rothfärbung, Strychnin eine Orangefärbung, Salicin giebt schon mit Schwefelsäure allein eine Rothfärbung, Zucker und andere organische Verunreinigungen geben eine Braunfärbung). — 5) Eine kleine Menge auf dem Platinblech verbrannt, hinterlasse keinen Rückstand (anorganische Verunreinigungen). — 6) 1 g. des Salzes werde bei

100° C ausgetrocknet. Es verliere dabei nicht mehr als 0,09 g (Das unverwitterte Salz enthält 9,08 Proc Krystallwasser) 7) Es sei nochmals eindringlich auf die specielle Prüfung des Chininchlorhydrats auf Morphin hingewiesen, nachdem im Jahre 1872 in der Schweiz und in Oesterreich durch Chininchlorhydrat zahlreiche Vergiftungen vorgekommen sind, welche durch die durch einen Irrthum bedingte Vermischung dieses Salzes mit Morphinchlorhydrat entstanden.

Man verdünnt circa 5 cem einer gesättigten Ferricyankaliumlösung mit 20—25 cem destillirtem Wasser, giebt dazu 10—15 Tropfen Ferrichloridlösung und 5 Tropfen reiner Salzsäure. Ist die Mischung eine klare bräunliche oder gelbgrünliche Flüssigkeit, so kann sie sofort als Reagens verbrannt werden. Ist sie wie gewöhnlich trübe oder dunkel gefärbt, so muss man sie filtriren.

Von dem Chininchlorhydrat oder einem anderen Chininsalze, welches man auf einem glatten Bogen Papier zuvor sorgfältig durchmischt hat, nimmt man 0,05—0,1 g in kleineren Partikeln und giebt es in einen Reagircylinder, in welchem man es mit mehreren Cubikcentimetern des Reagens übergiesst und nach dem Durchschütteln, wenn nicht als bald Blauung eintritt, 5 Minuten bei Seite stellt. Nach dieser Zeit ist die Flüssigkeit, falls Morphin oder eine andere reducierende Substanz gegenwärtig war, blau gefärbt.

Die blaue Farbenreaktion gehört dem Morphin nicht allein an, auch einige andere Stoffe, welche auf Ferricyankalium reducierend wirken, erzeugen mit dem Reagens eine ähnliche Reaction, keine aber so schnell wie Morphin.

Untersuchung auf Nebenalcaloide. Für die Prüfung auf Nebenalcaloide ist das unter Chininsulfat Ausgeführte in gleicher Weise massgebend.

a) Die Probe der Germ III. Dieselbe bezweckt eine Umsetzung der Alkaloidchlorhydrate in Sulfate mit Hilfe von Natriumsulfat und eine Trennung der leichter löslichen Sulfate von Hydrochinin, Cinchonidin, Chinidin und Cinchonin vom schwerer löslichen Chininsulfat auf der Grundlage der KERNER'schen Probe (Siehe diese unter *Chinum sulfuricum*).

2 g Chininchlorhydrat werden in einem erwärmten Mörser in 20 cem Wasser von 60° C gelöst. Die Lösung werde mit 1 g zerriebnem, unverwittertem Natriumsulfat versetzt und die Masse gleichmässig durchgearbeitet. Nach dem Erkalten bleibe die Masse, unter zeitweiligem Umrühren, eine halbe Stunde bei 15° C stehen. Hierauf werde durch ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser filtrirt und von dem 15° C zeigenden Filtrate 5 cem in einem trockenen Probirrohre mit Ammoniakflüssigkeit von 15° C versetzt, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelöst ist. Die hierzu erforderliche Menge Ammoniakflüssigkeit darf nicht mehr als 4 cem betragen.

Chemisch reines Chininchlorhydrat braucht bei dieser Probe 8,4—8,8 cem Ammoniakflüssigkeit.

Ein grosser Uebelstand bei dieser Probe ist der, dass man aus der breiförmigen Masse, welche man nach der Umsetzung des Chlorhydrats mit Natriumsulfat erhält, nur mit Mühe die zur Probe nöthigen 5 cem herausbekommt. Man muss, um dieses zu erreichen, den auf dem Filter befindlichen Brei mit einem kleinen Pistill etwas pressen. Da bei dieser Manipulation leicht das Filter reisst und dadurch kleine Kryställchen in das Filtrat kommen, empfiehlt es sich, an Stelle der in dem Arzneibuche vorgeschriebenen 2 g Chininchlorhydrat 3 g zu dieser Probe zu verwenden. Der Wasser- und Glaubersalzzusatz ist in diesem Falle um die Hälfte zu vermehren. Man erhält so die 5 cem Filtrat auf leichtere Weise.

Bei Ausführung dieser Probe ist grosse Sorgfalt auf die gleichmässige innige Durcharbeitung des Chininsulfatbreies zu verwenden. Man nehme hierzu stets ein Pistill, ein Glasstab ist nicht ausreichend. Bei Ausserachtlassung dieser Vorsicht kann es sich ereignen, dass geringe Mengen von Chininchlorhydrat sich der Umsetzung entziehen, was einen zu grossen Ammoniakverbrauch bedingt.

Wenn man neben diesen Uebelständen noch das unter Chininsulfat über die Empfindlichkeit der Probe von KERNER und WALLER und die Papierfiltration Gesagte in Betracht

zieht, so ergibt sich, dass diese Probe unter ungünstigen Umständen zu abweichenden Ergebnissen führen kann

Einfacher auszuführen, weniger Substanz erfordernd, dabei empfindlicher gegen Nebenalkaloide ist

b) **SCHAEFFER'S Oxalatprobe** (Das Nähere siehe *Chininum sulfuricum*) 0,9 g Chininchlorhydrat werden in ein kleines tarirtes Kochkölbchen gebracht und in 35 ccm destillirtem Wasser bei Siedehitze aufgelöst. Hierauf wird eine Lösung von 0,3 g neutralem krystallisirten Kaliumoxalat in 5 ccm Wasser hinzugefügt und der Kolbenninhalt durch Zusatz von destillirtem Wasser auf 41,3 g gebracht. Man stellt das Kölbchen unter bis weiligem Umschütteln in ein Wasserbad von 20° C, filtrirt nach Verlauf von 1/2 Stunde durch ein Glaswollbauschchen ab und fügt zu 10 ccm des Filtrates einen Tropfen Natronlauge. War das untersuchte Chininchlorhydrat rein, so darf im Verlaufe von einigen Minuten keine Trübung entstehen (Eine solche deutet auf Hydrochinin, Cinchonidin, Chinidin oder Cinchonin. Die Probe zeigt Spuren von Chinidin oder Cinchonin, ferner einen 2 Proc übersteigenden Gehalt an Cinchonidin plus Hydrochinin an.)

Aufbewahrung. Das Chininchlorhydrat muss in einem gut geschlossenen Glasgefäß im Dunkeln aufbewahrt werden. In der Wärme verliert es einen Theil seines Krystallwassers, am Tageslichte nimmt es einen gelben Stich, bei längerem Stehen sogar eine braunliche Färbung an. Ein solches Salz giebt gefärbte Lösungen.

Anwendung. Das Chininchlorhydrat wird unter den gleichen Indikationen und in den nämlichen Gaben angewendet wie das Chininsulfat. Es besitzt vor dem letzteren den Vorzug, dass es an der Luft nicht so leicht verwittert, und dass es leichter löslich in Wasser ist. Aus letzterem Grunde wird es auch im Magen leichter resorbirt, ferner kann es deshalb auch zu subkutanen Injektionen benutzt werden. Doch ist für diesen Zweck ganz besonders die Harnstoff-Doppelverbindung im Gebrauche.

BACCELLI'S intravenöse Injection
Rp Chinini hydrochlorici 1,0
Natrii chlorati 0,75
Aquae destillatae 10,0
Die Lösung ist bei Blutwärme (37° C) klar

Injectio Chinini BOKRY
Rp Chinini hydrochlorici 1,0
Acidi hydrochlorici (25%) 0,4
Aquae destillatae 5,0

Zu subkutanen Injektionen bei asiatischer Cholera

Injectio Chinini JOUSSER
Rp Chinini hydrochlorici 0,6
Acidi hydrochlorici gtt. 2
Aquae destillatae 5,0

Zur Injection (in die Trachea) bei perniciossem Wechselfieber, Cholera, Hydrophobie, Tetanus

Liquor Chinini hydrochlorici BINZ
Rp Chinini hydrochlorici 1,0
Aquae 100,0

Kleinen Kindern 2—3stündlich 1 Theelöffel, grösseren Kindern 1 Esslöffel

Pilulae Brocquii
Rp Chinini hydrochlorici
Extracti Scaevola cornuti aa 0,15
Extracti Belladonnae 0,003
Pulveris Liquiritiae
Glycerini aa q s

Fiant pilulae 30 Täglich 6—16 Pillen gegen Urticaria auf nervöser Grundlage

Pilulae Ferri nervinae.
Rp Chinini hydrochlorici 2,0
Massae Valerii 5,0
Extracti Gentianae 5,0
Glycerini gtt. 5
Radix Liquiritiae q s

Fiant pilulae 120

Pilulae Chinini hydrochlorici.
Rp Chinini hydrochlorici 5,0
Acidi hydrochlorici gtt nonnullas

Fiant pilulae 20 Jede Pille enthält 0,25 g Chininchlorhydrat. Die Pillen sind weiss, werden bald hart, lösen sich aber leicht.

Solutio Chinini hydrochlorici KÖRNER
Rp Chinini hydrochlorici 0,5—1,0
Glycerini
Aqua aa 2,0

Zur subkutanen Injektion Die Zugabe von Säure zum Zweck der Auflösung ist nicht gestattet

Solute de chlorhydrate basique de Quinine pour injections hypodermiques (Gall)
Chinopyrin nach SANTesson u. LAYEBAU
Rp Chinini hydrochlorici 5,0
Antipyrini 2,0
Aquae destillatae sterilisatae q s (circa 6 g) ad 10 ccm.

1 ccm = 0,8 Chininchlorhydrat. Die Lösung bläut Lackmuspapier schwach.

II. Chininum bihydrochloricum Saures Chininchlorhydrat. Saures chlorwasserstoffsaurer Chinin. Quininae Hydrochloridum acidum (Brit.) Chininum bismuriaticum. Chlorhydrate neutre de Quinine (Gall.) $C_{20}H_{21}N_2O_2 \cdot 2HCl$. Mol. Gew. = 397. Diese Verbindung wird erhalten durch Umsetzung von Chininsulfat mit Baryumchlorid. Man löst 10 Th Chininsulfat in 50 Th Wasser, andererseits 4,45 Th.

krystall Baryumchlorid in 50 Th Wasser, mischt beide Lösungen, sorgt in der bei Chininum hydrochloricum, S 750, angegebenen Weise dafür, dass unter keinen Umständen Baryumsalz, sondern dass eher eine kleine Menge Schwefelsäure in Lösung ist und dunstet das Filtrat bei einer 60° C nicht übersteigenden Hitze ab, bis es krystallisirt — Man kann auch 10 Th gewöhnliches Chininchlorhydrat unter Zusatz von 3,7 Th Salzsäure (von 25 Proc) in 20 Th Wasser auflösen und die filtrirte Lösung über Calciumchlorid zur Krystallisation abdunsten lassen

Kleine, farblose Säulen, löslich in 0,7 Th Wasser, leicht löslich in Alkohol, schwer löslich in verdünnter Salzsäure, schwerlöslich in Chloroform Die wässrige Lösung ist von saurer Reaction

Wird besonders für subkutane Injektionen angewendet

III Chininum bihydrochloricum carbamidatum Chinin-Harnstoff-Chlorhydrat Chininum ureato-hydrochloricum Salzsäures Harnstoff-Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_4 \cdot CON_2H_4 \cdot 2HCl + 5H_2O$. Mol. Gew = 547.

Darstellung. 400 Th Chininchlorhydrat werden in 300 Th verd Salzsäure (1,061 spec Gew) gelöst, mit 60—61 Th völlig reinem Harnstoff versetzt, bis zur Lösung erwärmt, durch Glaswolle filtrirt und zur Krystallisation bei Seite gestellt (Den Harnstoff reinigt man nöthigen Falles durch Umkrystallisiren aus 95 Proc Alkohol oder aus absolutem, falls der Harnstoff feucht ist) Die nach 24 Stunden gebildeten Krystalle bringt man auf einen Trichter, lässt abtropfen, wäscht mit destillirtem, möglichst kaltem Wasser nach, breitet sie auf flachen Tellern aus und trocknet bei Zimmertemperatur Die Mutterlauge wird eingedampft (die Verbindung des Chinins mit Harnstoff erleidet in wässriger Lösung beim Kochen keine Zersetzung oder Farbenveränderung, auch ist das Sonnenlicht ohne Einfluss auf eine concentrirte Lösung) und wiederum zur Krystallisation hingestellt Die letzte, braungefärbte Mutterlauge überlässt man in einer Schale der freiwilligen Verdunstung, wobei alles Chinindoppelsalz allmählich herauskrystallisirt und entfernt werden kann

Eigenschaften. Das Chininum humiaticum carbamidatum krystallisirt aus heissen Lösungen in harten, weissen, zusammenhängenden, vierseitigen Prismen Bei freiwilligem Verdunsten einer concentrirten Lösung entstehen sehr grosse, häufig durch die ganze Schale sich erstreckende, durchsichtige Prismen Das Salz löst sich bei gewöhnlicher Temperatur in seinem gleichen Gewicht Wasser, eine etwas dickflüssige, am Licht sich nicht verändernde Flüssigkeit von strohgelber Farbe bildend Während des Auflörens findet eine bedeutende Temperaturniedrigung statt

Es ist nicht hygroskopisch und verwirrt nicht, nur beim Erwärmen werden die Krystalle trübe und gelblich. Bei 70—75° C schmelzen sie unter Verlust von 10 Proc Wasser zu einer gelblichen Flüssigkeit, welche nach dem Erkalten zu einer gelblichen Masse erstarrt. Lässt man die Masse an der Luft stehen, so zieht sie nach einigen Tagen die ganze Menge des verloren gegangenen Wassers an und wird wieder weiss Löst man das geschmolzene Salz in Wasser, so lässt es sich vollständig in Krystallen wieder gewinnen Auch in Weingeist ist es löslich, durch Aether wird aus dieser Lösung ein Salz von etwas abweichender Zusammensetzung ausgefällt

Anwendung. Das Salz findet besonders Anwendung zu subkutanen Injektionen Es eignet sich hierfür namentlich deswegen, weil es leicht löslich ist und an der Applikationsstelle nur geringe Reizerscheinungen verursacht

Chininum-Ferri chloratum. Eisen-Chininchlorid Man löst 10 Th Chininchlorhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_4 + 8H_2O$) in 14,8 Th Ferrichloridlösung (spec Gew = 1,282) in der Kälte auf Die Lösung ist dunkelrothbraun und geseht bei längerem Stehen zu einem Brei, welcher bei gelinder Wärme und unter Luftabschluss ausgetrocknet, eine harte, dunkelbraune Masse von harzigem Bruch darstellt Man zerreibt es, trocknet es nochmals über Schwefelsäure oder über Aetzkalk nach und bewahrt es in gut verschlossenen Gefässen vor Licht geschützt auf — Es löst sich leicht in Wasser oder in Alkohol, weniger in Aether und schmeckt bitter adstringirend

KERSON empfiehlt es äusserlich als blutstillendes Mittel. Es wirkt im Gegensatz zu Eisenchlorid schmerzlos und nicht ätzend. Innerlich giebt er 10 Tropfen der 10 procentigen Lösung in Wasser gegen Blutungen verschiedener Art und als Roborans.

Solutio Chinini hydrochlorici pro injectione STOFFELLA 2 g Chininchlorhydrat werden unter Erwärmen in 10 cem destillirtem Wasser gelöst. Die Lösung krystallisirt unterhalb 32° C, bei Bluttemperatur aber ist sie flüssig und kann alsdann bei dieser Temperatur verwendet werden. Sie darf nicht sauer, sie soll vielmehr schwach alkalisch reagiren.

Chininum hydrochlorico-phosphoricum **Chininum muratico-phosphoricum.** $C_{20}H_{21}N_2O_2 \cdot HCl + 2[PO_4H_2] + 3H_2O$ Mol Gew. = 610,5. Fällt allmählich aus einer Lösung von 35 Th Chininchlorhydrat in einer schwach erwärmten Mischung von 70 Th Phosphorsäure (1,154 spec Gew.) und 9 Th verdünnter Salzsäure (von 12,5 Proc HCl) in Krystallen aus. Löslich in 2 Th. Wasser, die Lösung reagirt sauer. Das Salz enthält rund 53 Proc Chinin und fand erfolgreiche Anwendung bei Malaria und nervosem Kopfschmerz.

Chininum hydrochlorico-sulfuricum **Chininum muratico-sulfuricum** $[C_{20}H_{21}N_2O_2]_2 \cdot H_2SO_4 + 2HCl + 3H_2O = 873$. Wird erhalten, indem man 10 Th gewöhnliches Chininsulfat in 3,5 Th Salzsäure (von 25 Proc HCl) auflöst und die Lösung an einem warmen Orte, vor Staub geschützt, der freiwilligen Verdunstung überlässt. Farblose, in 1 Th Wasser lösliche Krystalle. Wird von GRIMAUD und LABORDRE zur subcutanen Anwendung empfohlen. Rp Chinini hydrochlorico sulfurici 5, Aquae destillatae 6,0 1 cem der Lösung = 0,5 g des Salzes. Das Salz enthält 74,2 Proc Chinin.

Sanochinol-Langheld Ein von Dr. ERICH LANGHELD dargestelltes Chinin-Präparat. Es wird erhalten durch Einwirkung von Ozon auf wässrige alkoholische Lösungen von Chininsalzen. Das gegenwärtig im Handel befindliche Präparat ist die mit Ozon behandelte Lösung des salzsauren Salzes. Sie soll in 100 cem = 4 g Chininchlorhydrat bez dessen Umwandlungsprodukte enthalten.

Gelbe bis bräunliche oder blassgelbe, nach Aldehyd riechende saure Flüssigkeit, welche durch Natronlauge nicht gefällt wird. Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Das Sanochinol wird gegen Tuberkulose und gegen Malaria angewendet. Der Erfinder stellt sich vor, dass durch die Behandlung mit Ozon aktiver Sauerstoff in die Blutbahn eingeführt wird und dort Mikroorganismen schwächt oder tödtet.

Zur Zeit werden auch andere Salze, z. B. das schwefelsaure und das arsensaure Chinin der Behandlung mit Ozon unterworfen.

Chininum salicylicum.

Chininum salicylicum (Helv. Ergänzb.) **Chininsalicylat.** **Salicylsaures Chinin.** **Salicylate de Quinine basique** (Gall.) $C_{20}H_{21}N_2O_2 \cdot C_7H_5O_2 + \frac{1}{2}H_2O$. Mol Gew. = 471.

Zur Darstellung löst man 3,89 Th Natriumsalicylat in 120 Th Wasser, erhitzt zum Sieden und setzt alsdann sogleich unter Umrühren 10 Th officinelles Chininsulfat hinzu. Es bildet sich unter diesen Umständen sogleich das schwerlösliche Chininsalicylat, welches sich als Niederschlag ausscheidet. Die Umsetzung ist nach wenigen Augenblicken des Siedens beendet. Man lässt erkalten, bringt den Niederschlag auf ein Filter, wäscht ihn mit kaltem destillirtem Wasser, bis das Ablaufende durch Baryumchlorid nicht mehr getrübt wird, und trocknet an der Luft auf poröser Unterlage. — Bei der Darstellung sind alle eisenhaltigen Materialien, auch eisenhaltiges Filterpapier u. dergl. mit Sorgfalt auszuschliessen.

Farblose, leicht etwas röthlich werdende Krystallnadeln, löslich in etwa 230 Th Wasser von 10° C, löslich auch in 25 Th Weingeist, besonders leicht löslich in Chloro-

form Es enthält 68,70 Proc Chinin $C_{20}H_{24}N_2O_2$ und 1,91 Proc Wasser, welches bei $100^\circ C$ vollständig entweicht

Fügt man zur kalt gesättigten wässrigen Lösung etwas stark verdünnte Eisen chloridlösung hinzu, so tritt violette Färbung auf Versetzt man 10 ccm der gesättigten wässrigen Lösung mit 3 ccm starkem Chlorwasser, so tritt auf Zusatz von Ammoniak smaragdgrüne Färbung auf (Thalleoquin-Reaktion) — Verdünnte Schwefelsäure bringt in der wässrigen Lösung blaue Fluorescenz hervor

Prüfung. 1) Das Salz verliert bei $100^\circ C$ höchstens 2 Proc an Gewicht 2) Löst man 0,5 g Chininsalicylat unter Zufügung einiger Tropfen Salpetersäure in 25 ccm destillirtem Wasser, so darf die von der Salicylsäure abfiltrirte Lösung weder durch Silber nitrat noch durch Baryumnitrat merklich getrübt werden (Chlor, bez Schwefelsäure, von denen Spuren zuzulassen sind)

Prüfung auf Nebenalcaloide 2 g Chininsalicylat werden in 10 ccm Wasser suspendirt, die Mischung werde mit Natronlauge stark alkalisch gemacht und wiederholt mit Aether ausgeschüttelt Den Verdunstungsrückstand der abgehobenen Aetherschichten löse man in der 20fachen Menge Weingeist, neutralisire diese Lösung genau mit verdünnter Schwefelsäure und verdünne die Mischung im Wasserbade Den zerniebten Verdunstungsrückstand übergiesse man alsdann in einem Probirröhrchen mit 20 ccm Wasser und stelle das Ganze $\frac{1}{2}$ Stunde lang, unter häufigem Umschütteln, in ein auf $60-65^\circ C$ erwärmtes Wasserbad Hierauf setze man das Probirrohr in Wasser von $15^\circ C$ und lasse es unter häufigem Schütteln 2 Stunden lang darin stehen Als dann filtrire man durch ein aus bestem Filterpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser, bringe 5 ccm des $15^\circ C$ zeigenden Filtrates in ein trocknes Probirrohr und mische allmählich Ammoniak flüssigkeit von $15^\circ C$ hinzu, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelöst ist Die hierzu erforderliche Menge Ammoniakflüssigkeit darf nicht mehr als 4 ccm betragen

Chininum salicylicum cum Antipyrino. Ist ein Gemenge gleicher Theile Chininsalicylat und Antipyrin Bei Neuralgien in Gaben von 0,5—1,0 g gebraucht

Influenza von E SCHNEIWEID Elberfeld ist eine Mischung von Phenacetan, Coffein, Chininsalicylat und Natriumchlorid

Chininum sulfuricum.

I. Chininum sulfuricum (Austr Germ Helv) **Chininum sulfuricum basicum.** Sulfate de Quinine basique (Gall) **Quininae Sulphas** (Brit U St.) **Chininsulfat** (basisches oder neutrales). Gewöhnliches oder officinelles Chininsulfat. Schwefelsaures Chinin. $(C_{20}H_{21}N_2O_2)_2 \cdot H_2SO_4 + 8H_2O$. Mol. Gew = 800.

Nach der Auffassung der modernen Chemie ist das vorstehend angeführte Salz das basisch-schwefelsaure Chinin. Da aber seine Reaktion neutral ist, so wird es in der Regel als neutrales Chininsulfat bezeichnet. Da es endlich das am meisten angewendete Chinin salz ist, so wird es auch das „gewöhnliche oder officinelle Chininsulfat“ genannt

Darstellung. Die lohnende Darstellung des Chinin's ist nur in besonders hierfür eingerichteten Fabriken möglich. Dieselbe ist in ihren Grundzügen die folgende

Die in feines Pulver verwandelten Chinarinden werden mit Kalkmilch alkalisch gemacht, um das Chinin und die anderen Alkaloide, welche in den Rinden an verschiedene Säuren gebunden sind — die wichtigsten der letzteren sind die Chinsäure, die Chinagerbsäure und die Chinovsäure — in Freiheit zu setzen

Die Extraktion der Alkaloide wird nun nach zwei verschiedenen Methoden ausgeführt

a) Beim Dekanthirverfahren werden die alkalisch gemachten Rinden in Apparate mit rotirenden Rührwerken gebracht Sie werden in denselben mit erwärmten, hoch siedenden Mineralölen, z B Paraffinöl, durchrührt, welche die Alkaloide aufnehmen Nach einiger Zeit lässt man die Rinden sich absetzen, zieht hierauf die klare Oellösung ab und entzieht derselben durch Schütteln mit verdünnter Schwefelsäure die Alkaloide In gleicher Weise macht man mehrere Auszüge bis zur Erschöpfung der Rinden

b) Beim Deplacirverfahren werden die alkalisch gemachten Rinden in cylindrischen, mit Senkhöden versehenen Gefässen mit erwärmten Mineralölen oder Weingeist bis zur Erschöpfung ausgezogen. Die Alkaloide werden dem Extraktionsmittel entweder mit verdünnter Schwefelsäure entzogen (bei Verwendung hochsiedender Oele) oder dieses abdestillirt (bei Verwendung von Weingeist, oder von niedrigsiedenden Oelen) und aus dem in der Destillirblase zurückbleibenden Harze die Alkaloide mit verdünnter Schwefelsäure ausgezogen.

Die nach der einen oder anderen Methode erhaltene saure Lösung enthält je nach der Natur der verschiedenen Chinarinden neben Chinin die folgenden Alkaloide

Hydrochinin $C_{20}H_{26}N_2O_2$,	Cinchonin $C_{19}H_{21}N_2O$,
Cinchonidin $C_{19}H_{21}N_2O$,	Cinchotin $C_{19}H_{21}N_2O$,
Hydrocinchonidin $C_{19}H_{21}N_2O$,	Chinamin $C_{19}H_{21}N_2O$,
Chinidin $C_{19}H_{21}N_2O_2$,	Chinamidin $C_{19}H_{21}N_2O_2$,
Hydrochinidin $C_{20}H_{26}N_2O_2$	Chinuin $C_{20}H_{24}N_2O_2$ u s w

Diese schwefelsaure Alkaloidlösung wird in der Hitze mit Soda neutralisirt, es krystallisirt beim Erkalten die Hauptmenge des Chinins als unreines Sulfat aus. Aus der Lauge wird das Chinin vollends durch Seignettesalz als schwer lösliches Tartrat abgeschieden. Die so gewonnenen, Chinin enthaltenden Gemenge werden in den verschiedenen Fabriken nach besonderen, als Geheimniss bewahrten Verfahren auf reines Chinin verarbeitet, welches sodann als Sulfat unter Zusatz von Thierkohle aus Wasser umkrystallisirt wird. Es wird so zunächst das gewöhnliche Chininsulfat erhalten, welches zwar den Ansprüchen früherer Pharmakopöen genügt, dabei jedoch noch mehrere Procente Hydrochinin und Cinchonidin enthält.

Seit etwa 15 Jahren wird ein besonderer Werth darauf gelegt, ein von Nebenalkaloiden möglichst freies Chininsulfat anzuwenden. Die Trennung des Cinchonins vom Chinin gelang schon früher in zufriedenstellender Weise. Dagegen verursachte zunächst Schwierigkeiten die Trennung des Chinins vom Cinchonidin und Hydrochinin, welche beiden letzteren Basen man gewöhnlich als „Nebenalkaloide des Chinins“ bezeichnet. Diese Schwierigkeit beruht darauf, dass das Chininsulfat die hartnackige Neigung hat, mit dem Cinchonidinsulfat und Hydrochinsulfat zusammen zu krystallisiren, und gerade diese zusammenkrystallisirten Gemenge stellen die beliebte leichte wollige Form des Chininsulfats dar. Andererseits stösst die Prüfung solcher zusammenkrystallisirten Gemenge auf Schwierigkeiten, diese zusammenkrystallisirten Gemenge verhalten sich bei einigen Prüfungsmethoden wesentlich anders, als durch blosses Zusammenreiben erhaltene Mischungen. — Die Darstellung eines reinen oder doch fast reinen (d. h. von Nebenalkaloiden freien) Chininsulfats gelingt indess, wenn man das Chinin vorher in das Chinin-bisulfat verwandelt.

Darstellung des reinen, von Nebenalkaloiden freien Chininsulfats. Man stellt zunächst in der auf S 768 angegebenen Weise durch Auflösen von gewöhnlichem Chininsulfat in verdünnter Schwefelsäure das reine Chininbisulfat dar. Alsdann löst man 1 Th desselben in 80 Th heissem destillirten Wasser und neutralisirt die Lösung mit einer filtrirten Lösung von krystall Soda, bis sie weder blaues noch rothes Lackmuspapier verändert. Hierauf durchrührt man die noch heisse Lösung mit etwas Thierkohle und filtrirt noch heiss. Das nach dem Erkalten auskrystallisirte Chininsulfat wird gesammelt und bei gelinder Wärme rasch getrocknet.

Diese Darstellung beruht darauf, dass das Chininbisulfat nicht mehr die Neigung hat, mit dem Cinchonidinbisulfat und Hydrochininbisulfat zusammen zu krystallisiren. Es gelingt demnach, das Chininbisulfat frei von Nebenalkaloiden zu erhalten, worauf alsdann die Ueberführung in das gewöhnliche Chininsulfat keine Schwierigkeiten verursacht.

Im Jahre 1891 ist es GRIMAUD und ARNAUD gelungen, durch Einwirkung von Brommethyl auf eine Lösung von Cuprein und Natrium in Methylalkohol das Cuprein ($C_{19}H_{23}N_2O_2$) in Chinin überzuführen. Damit ist bewiesen, dass das Chinin die Oxymethylgruppe OCH_3 enthält.

Eigenschaften des Chininsulfats. Das reine Chininsulfat bildet weisse, zarte, lockere, biegsame, seidenglanzende Nadeln oder harte prismatische Nadeln, welche dem monoklinen System angehören. Es ist geruchlos und besitzt anhaltend bitteren Geschmack. Es braucht bei $15^\circ C$ etwa 800 Th, bei $100^\circ C$ etwa 25 Th Wasser zur Lösung. Es ist ferner in etwa 90 Th. kaltem und 6 Th. siedendem Weingeist löslich, etwas löslich

(1 40) in Glycerin, fast unlöslich in weingeistförmigem Aether und in (1 700) Chloroform. Es löst sich ziemlich leicht in einem Gemisch von 2 Raumtheilen Chloroform und 1 Raumtheil Alkohol. Die Lösungen sind neutral. Unter Zusatz von verdünnten Säuren ist es im Wasser leicht löslich. Die Lösung in schwefelsaurehaltigem Wasser fluorescirt bläulich.

Das Salz entspricht in unverwittertem Zustand der Formel

$2 [C_{20}H_{24}N_2O_2] \cdot H_2SO_4 + 8 H_2O$ mit dem Mol Gewicht 890 und enthält in diesem Zustande 72,81 Proc. freie trockene Base, 11,01 Proc. Schwefelsäure, 16,18 Proc. Wasser.

Es verwittert sehr rasch an der Luft und verliert alsdann bei längerem Liegen 6 Mol. Krystallwasser, so dass ein Salz mit der Formel $2 C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot H_2SO_4 + 2 H_2O$ zurückbleibt. Dasselbe enthält noch 4,6 Proc. Krystallwasser. Dieses entweicht vollends bei $100^\circ C$. Das völlig ausgetrocknete Chininsulfat zieht an der Luft sehr rasch wieder Wasser an, bis es die 2 Mol. Krystallwasser entsprechende Menge wieder enthält.

Bei stärkerem Erhitzen schmilzt es, bei weiterem Erhitzen wird es roth und verbrennt auf dem Platinblech, ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Aufbewahrung. Das Chininsulfat wird am besten in gut verschlossenen Glasgefässen vor Licht geschützt aufbewahrt. In Papierschachteln verliert es mit der Zeit bis zu $\frac{1}{4}$ seines Krystallwassergehalts, ja selbst in Blechdosen giebt es je nach der Art und Weise des Verschlusses bei langem Stehen einen grösseren oder kleineren Gewichtsverlust. Auch in Glasgefässen tritt eine Verwitterung des Salzes ein, wenn der Stopfen derselben häufig gelüftet wird.

Prüfung. Die Prüfung des Chininsulfats hat unter folgenden wichtigen Gesichtspunkten zu geschehen: 1) Ist das Präparat überhaupt Chininsulfat? 2) Ist es frei von groben absichtlichen (Salicin, Zucker, Gips) Beimengungen und liegt auch keine Verwechslung mit anderen, toxisch wirkenden Alkaloiden (Morphin, Strychnin) vor? 3) Bewegt sich der Wassergehalt in den zulässigen Grenzen? 4) Ist der Gehalt an Nebenalkaloiden ein zulässiger?

I. Identitätsreaktionen. Man schüttle 0,1 g. des Salzes mit 100 ccm. destillirtem Wasser, man erhalte eine klare, nicht oder sehr schwach fluorescirende, bitter schmeckende Lösung.

a) 10 ccm. der Lösung geben, mit einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure versetzt, eine blaue Fluorescenz. — b) 10 ccm. der Lösung geben, mit einigen Tropfen Ammoniak oder Natronlauge versetzt, eine milchige Trübung, aus welcher sich nach einigen Stunden ein wasser-, flockiger Niederschlag absetzt. — c) 10 ccm. der Lösung werden mit 2 ccm. kräftigem Chlorwasser versetzt und 2 ccm. Ammoniak hinzugefügt. Die Flüssigkeit färbt sich smaragdgrün (Thalleiochinreaktion). Beim Uebersättigen der Lösung mit verdünnter Salzsäure schlägt die Farbe in rothbraun um. — d) 5 ccm. der Lösung werden mit destillirtem Wasser auf 100 ccm. verdünnt (Konzentration 1:20000). Diese Lösung werde auf Zusatz von 2 Tropfen Bromwasser und einigen Tropfen Ammoniak smaragdgrün gefärbt. — e) 10 ccm. der Lösung werden mit 2 ccm. Chlorwasser, hierauf mit 0,5 ccm. gesättigter Ferrocyankaliumlösung und mit 1 Tropfen Ammoniak versetzt. Es entsteht eine prächtig rothe Färbung (Voegen), welche rasch braun und missfarbig wird. — f) Einige ccm. der Lösung werden durch Baryumnitrat, nicht dagegen durch Silbernitrat getrübt (Unterschied von Chininchlorhydrat).

II. Fremde Stoffe. a) Chloroform-Alkoholprobe. 1 g. des Salzes löse sich in 7 ccm. eines Gemisches von 2 Raumtheilen Chloroform und 1 Raumtheil absolutem Alkohol beim Erwärmen auf 40 bis $50^\circ C$ völlig auf. Die Lösung bleibe auch nach dem Erkalten klar. (Ammonsulfat und andere anorganische Salze, viele organische Stoffe bleiben ungelöst.) — b) Eine kleine Menge, auf dem Platinbleche verbrannt, hinterlasse keinen Rückstand (unorganische Verunreinigungen). — c) 0,1 g. des Salzes, mit 2 bis 3 ccm. konc. Schwefelsäure übergossen, sollen eine gelbliche Lösung geben. Eine braune Farbe deutet auf fremde organische Stoffe, wie z. B. Zucker. Eine Rothfärbung auf Salicin, Gips und andere anorganische Stoffe bleiben unauflöslich und sind im Glührückstande aufzusuchen. — d) 0,1 g., mit 2 bis 3 ccm. konc. Salpetersäure von 1,185 spec. Gewicht

übergossen, sollen eine schwachgelbliche Lösung geben. Eine Braunfärbung deutet auf organische Beimengungen, Rothfärbung auf eine solche von Morphin, Brucin.

III. Wassergehalt. Die Mehrzahl der Pharmacopöen verlangt ein etwas verwitertes Chininsulfat und lässt höchstens 15 Proc Wassergehalt zu. Dies entspricht einem Salze mit 7 bis $7\frac{1}{2}$ Mol Krystallwasser.

Es schreiben als zulässigen Wassergehalt (Gewichtsverlust bei 100°C) vor in Procenten

Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U St
15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,2

Ein Chininsulfat z. B. mit der Formel $2[\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_4] \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ gedacht, enthält, 74,81 Proc freie Base und 14,45 Proc Wasser.

Bei der mit 1 g Chininsulfat auszuführenden Wasserbestimmung muss der Eigenschaft des völlig entwässerten Chininsulfats, aus der Luft sehr rasch Wasser anzuziehen, Rechnung getragen werden. Man sorgt daher, dass das Erkalten des ausgetrockneten Salzes und das Wägen in getrockneter Luft vorgenommen wird.

IV. Prüfung auf Nebenalkaloide. Die Ansprüche an die Reinheit des Chininsulfats haben sich mit Recht in den letzten Jahren erheblich verschärft. Früher war man zufrieden, wenn das Chininsulfat LIEBIG's Aetherprobe aushielt.

I LIEBIG's Probe. Diese Probe, welche zum Nachweis kleiner Beimengungen von Cinchonin leicht brauchbar ist, wird in folgender Weise ausgeführt: 1 g Chininsulfat wird in einem dickwandigen Probiröhrchen mit 10 ccm Aether vom spec Gewicht 0,728 und 2 ccm Ammoniak übergossen, hierauf das Röhrchen gut verkorkt und die Mischung kräftig durchgeschüttelt. Es sollen zwei, auch bei längerem Stehen völlig klar bleibende Schichten resultiren. Eine Trübung deutet auf Cinchonin.

Bei einem nicht zu geringfügigen Cinchonidingehalt des untersuchten Chininsulfats tritt je nach der Menge bald oder später eine Ausscheidung oder Auskrystallisation von (Chinin haltigem) Cinchonidin ein.

Immerhin kann ein Chininsulfat, welches 15–20 Proc Cinchonidin + Hydrochinon enthält, dieser Probe noch Genüge leisten.

Schärfer als diese Probe ist die in die Pharm. Germ. I und II aufgenommene.

II KERNER'sche Probe. 2 g Chininsulfat schüttelt man bei 15°C mit 20 ccm destillirtem Wasser und filtrirt nach einer halben Stunde 5 ccm in ein Probiröhrchen. Hierauf mischt man allmählich Ammoniak zu, bis das ausgeschiedene Alkaloid wieder aufgelöst ist. Es wurde hierbei die Bedingung gestellt, dass ein zulässiges Chininsulfat nicht mehr als 7 ccm Ammoniak erfordere.

Diese Probe beruht auf folgenden Thatfachen. Die verunreinigenden Nebenalkaloidsulfate sind in kaltem Wasser sehr viel leichter löslich als Chininsulfat. Diese kalt gesättigte Lösung eines durch Nebenalkaloidsalze verunreinigten Chininsulfates enthält also grössere Alkaloidmengen in Lösung als die bei der nämlichen Temperatur bereitete Lösung von reinem Chininsulfat. Wird einer solchen Lösung Ammoniakflüssigkeit hinzugefügt, so scheiden sich zunächst die freien Alkaloide unlöslich aus. Zu ihrer Wiederauflösung bedarf es einer bestimmten Menge von Ammoniakflüssigkeit, welche um so grösser ist, je mehr Alkaloidsulfate vorher in Lösung gegangen waren.

Diesen Zweck erreicht jedoch das Probe in höchst unvollkommener Weise. Allerdings erfordert das Filtrat von chemisch reinem Chininsulfat nur 3,5–3,8 ccm Ammoniakflüssigkeit zur Lösung, ferner steigt der Ammoniakmehrerverbrauch in ziemlich proportionaler Weise, wenn zunehmende Quantitäten von Nebenalkaloidsulfaten mechanisch dem Chininsulfat beigemischt werden. Wenn jedoch die fremden Alkaloidsulfate mit dem Chininsulfat zusammenkrystallisirt sind, so geht in den zur Titration gelangenden wässrigen Auszug nur ein kleiner Theil derselben über. Unter solchen Umständen war es möglich, dass die Probe in obiger Fassung ein Chininsulfat zuliesse, welches bis zu 12 Proc Nebenalkaloide enthält.¹⁾

DE VRIJ und SCHAEFER wiesen 1886 auf den hohen Nebenalkaloidgehalt des der KERNER'schen Probe entsprechenden, in den Handel gelangenden Chininsulfates hin und theilten einige neue exakte Prüfungsvorschriften für Chininsulfat und Vorschläge zu zweckdienlichen Modifikationen der KERNER'schen Probe mit.

KERNER und WELLER liessen darauf die Abänderung der KERNER'schen Probe folgen,²⁾ welche die Germ. III aufgenommen hat. Der Grundgedanke dieser modificirten Prüfungs-

¹⁾ Vgl. L. SCHAEFER, Arch. Pharm. 1886, S. 344, Das 1887, S. 64.

²⁾ G. KERNER u. A. WELLER, Arch. Pharm. 1887, S. 723.

methode ist der, dass durch die Verwitterung des Chininsulfates die Nebenalkaloidsulfate für Wasser leichter ausziehbar werden

III Probe von KERNER und WELER (Arzneibuch f. d. Deutsche Reich) 2 g Chininsulfat, welches bei 40–50° C völlig verwittert ist, übergiesse man in einem Probirrohre mit 20 ccm destillirtem Wasser und stelle das Ganze eine halbe Stunde lang, unter häufigem Umschütteln, in ein auf 60–65° C erwärmtes Wasserbad. Hierauf setze man das Probirrohr in Wasser von 15° C und lasse es unter häufigem Schütteln 2 Stunden lang darin stehen. Alsdann filtrire man durch ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser, bringe 5 ccm des 15° C zeigenden Filtrates in ein trockenes Probirröhrchen und mische allmählich Ammoniakflüssigkeit von 15° C zu, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelöst ist. Die hierzu erforderliche Menge Ammoniakflüssigkeit darf nicht mehr als 4 ccm betragen.

Der Maximalammoniakverbrauch von 4 ccm, welchen diese Probe vorschreibt, ist so knapp bemessen, dass man daraus wohl die Absicht der Autoren des Arzneibuches erkennen kann, nur noch ein völlig reines Chininsulfat als officinell zuzulassen, obwohl man angesichts der folgenden Thatfachen an der praktischen Verwirklichung dieser Idee in der vorgeschriebenen Probe etwas zu zweifeln geneigt ist.

Ein chemisch reines Chininsulfat, welches aus einem mehrmals umkrystallirten Bisulfat hergestellt ist, liefert mit dieser Probe ein Filtrat, von welchem je nach der Natur des Filtrirpapiers die ersten 5 ccm 3,3–3,8 ccm Ammoniak zur Klarlösung gebrauchen. Die zweiten 5 ccm erfordern schon 3,8–4,1 ccm Ammoniak.

Wie erklärt sich dieses? Chininsulfat wird von Filtrirpapier je nach dessen Dicke oder Filtrirfähigkeit aus wässrigen Lösungen in wechselnder Weise absorhirt. Aus den zweiten 5 ccm des Filtrats nimmt das mit Chinin aus den ersten 5 ccm theilweise gesättigte Filtrirpapier weniger Chinin auf und steigt infolge dessen der Ammoniakverbrauch der ersten, und zwar, was für die Pharmakopöe-Probe bedenklich ist, bisweilen über die Maximalzahl hinaus.

SCHAEFFER, welcher auf dieses Verhalten zuerst hinwies,¹⁾ zeigte, dass eine gesättigte Chininsulfatlösung beim Filtriren durch ein mehrfach gelegtes Filter sogar alles Chinin verlieren kann, so dass das Filtrat mit einem Tropfen Ammoniak nicht einmal mehr eine Trübung giebt. Derselbe empfiehlt zu solchem Zwecke die gegen Alkaloidsalze völlig indifferente Glaswolle als Filtrirmaterial zu verwenden.

Bei Verwendung von Glaswolle braucht das Filtrat obiger Probe bei chemisch reinem Sulfat 4–4,8 ccm Ammoniak. Solche Schwankungen deuten auf geringe, nach dem zweistündigen Abkühlen der Chininsulfatlösungen noch verbleibende Uebersättigung.

Es wäre wohl zweckmässiger gewesen, bei dieser Probe Filtration durch Glaswolle und einen Maximalammoniakverbrauch von 4,5 ccm vorzuschreiben.

Man achte bei dieser Probe ferner genau auf die Abkühlungstemperatur von 15° C. Eine Erhöhung der Temperatur von 1° C kann einen Mehrverbrauch an Ammoniak von 0,2–0,8 ccm bedingen.

Den erwähnten, bisweilen einen grossen Ausschlag im Ammoniakverbrauch der Probe hervorruhenden Umständen steht eine ziemlich schwach ausgeprägte Empfindlichkeit derselben gegen kleine Cinchonidinbeimengungen gegenüber. Die ersten Procente in das Chininsulfat einkrystallisirten Cinchonidin's werden bei der Probe so gut wie gar nicht angezeigt.

Immerhin ist die Probe mit genauer Berücksichtigung des oben Gesagten wesentlich schärfer als die der früheren Pharmakopöe.

Da sich bei allen Prüfungsmethoden des Chininsulfats, welche auf der Basis der KERNER'schen Probe stehen, zusammen gemischte Gemenge der Sulfate von Chinin, Cinchonidin und Hydrochinin völlig anders verhalten wie zusammenkrystallisirte, so haben die Proben, bei welchen während des Untersuchungsanges eine völlige Auflösung der Alkaloidsulfate eintritt, wesentliche Vorzüge vor den ersteren, weil sich deren Empfindlichkeit gegen Nebenalkaloide durch Gemische chemisch reiner Sulfate der genannten Alkaloiden jeweils kontrolliren lässt. Von solchen Proben seien hier die Oxalat- und die Chromatprobe angeführt.

IV SCHAEFFER's Oxalatprobe²⁾ Dieselbe beruht darauf, dass Chininoxalat in Wasser viel schwerer löslich ist, wie die Oxalate der anderen Chinnalkaloide.

Chininoxalat	löst sich bei 15° C in 1340 Theilen Wasser,
Hydrochininoxalat	do 509 „
Cinchonidinnoxalat	do 140 „

1 g Chininsulfat, kryet (resp. 0,85 g völlig ausgetrocknetes Sulfat) wird in ein kleines tarirtes Kochkölbchen gebracht und in 85 ccm dest. Wasser in der Siedehitze aufgelöst.

¹⁾ Pharm. Zeitzg 1887, 320 Arch. Pharm. 1887, 1041

²⁾ Arch. Pharm. 1887, S. 1040

Hierauf wird eine Lösung von 0,8 g neutralem kryst. Kaliumoxalat in 5 ccm Wasser hinzu gefügt und der Kolbeninhalt durch Zusatz von destillirtem Wasser auf 41,3 g gebracht. Man stellt das Kolbchen unter bisweiligem Umschütteln in ein Wasserbad von 20° C, filtrirt nach Verlauf von 1/2 Stunde durch ein Glaswollbäuschchen ab und fügt zu 10 ccm des Filtrates einen Tropfen Natronlauge. Es darf im Verlaufe von einigen Minuten keine Trübung entstehen, wenn das untersuchte Sulfat rein war.

Ein Chininsulfat, welches durch Ueberführung von gewöhnlichem Chininsulfat in Bisulfat und Verwandlung des letzteren in Neutralsulfat dargestellt ist (siehe oben S. 757) entspricht der Probe.

Auf Zusatz von 1 Proc. Cinchonidinsulfat zu solchem Chininsulfate entsteht im Filtrate mit Natronlauge eine Trübung.

1 1/2 Proc. Cinchonidinsulfatbeimischung werden auf gleiche Weise bei einem Chininsulfate erkannt, welches durch zweimalige Krystallisation von Bisulfat gereinigt war.

2—2 1/2 Proc. Beimischung rufen dieselbe Reaktion bei einem Chininsulfat hervor, welches aus einem viermal umkrystallisirten Bisulfat gewonnen war.¹⁾

Man ersieht hieraus:

a) wie schwierig die letzten Nebenalkaloidbeimengungen aus dem Chininsulfat zu beseitigen sind und

b) dass ein Chininsulfat, welches der Oxalatprobe genügt, im Maximum 2 Proc. Nebenalkaloide (Hydrochinin + Cinchonidin) enthält.

V. DE Vau's Chromatprobe. Diese Probe basirt auf demselben Princip wie die Oxalatprobe. Die Sulfate werden mit Kaliumchromat in die Chromate übergeführt. Das durch seine Schwerlöslichkeit im Wasser sich auszeichnende Chininchromat krystallisirt aus, die Chromate der anderen Alkaloide gehen in die Mutterlauge.

1 g Chininsulfat wird in 45 ccm kochenden Wassers gelöst und 0,25 g reines neutrales Kaliumchromat zugefügt. Die Flüssigkeit wird auf 15° C abgekühlt. Nach einer Stunde wird das auskrystallisirte Chininchromat auf einem Filter gesammelt, mit wenig Wasser nachgewaschen, bis das Filtrat 45 ccm beträgt. Zu 10 ccm der abfiltrirten Lauge füge man 1 Tropfen Natronlauge oder so viel, dass die Mischung gegen Phenolphthaleinpapier alkalisch reagirt.

Es soll eine klare Lösung entstehen, welche sich auch nicht trübt, wenn dieselbe auf 50° C erwärmt wird. Eine Trübung deutet auf Verunreinigungen mit Nebenchininalkaloiden der Chinarrinde.

Die Empfindlichkeit dieser Probe ist wohl annähernd dieselbe wie die der Oxalatprobe.

Zur Isolirung des reinen Cinchonidins aus dem mit Hilfe der Aether-, Oxalat-, Chromat- oder Bisulfatprobe von DE Vau²⁾ aus Cinchonidin enthaltendem Chinin abgeschiedenen chininhaltigen Cinchonidin benützt man:

VI. SCHAEFER's Tetrasulfatprobe³⁾. Diese Probe beruht darauf, dass Cinchonidin ein in Alkohol viel schwerer lösliches Tetrasulfat bildet als Chinin (Hydrochinin), und dass auch die Tetrasulfate dieser Alkaloide eine ähnlich geringe Neigung zu Doppelsalzbildungen zeigen, wie die Bisulfate derselben.

1 g des Gemenges der freien Basen (Cinchonidin mit Chinin und Hydrochinin) werde in 9 g absolutem Alkohol und 3 g 5procentiger Schwefelsäure in einem kleinen Pulverglase gelöst. Das Auskrystallisiren des in der überschüssigen Säure schwer löslichen Cinchonidinsalzes wird durch öfteres Umschütteln und Abkühlen der Mischung unterstützt. Nach eintägigem Stehen wird abfiltrirt, die Lauge mittels einer Saugpumpe abgesaugt und mit wenig absolutem Alkohol tropfenweise nachgewaschen. Das ausgewaschene Salz wird an der Luft getrocknet und gewogen. Dasselbe entspricht der Formel $C_{19}H_{22}N_2O \cdot 2H_2SO_4 + 2H_2O$. Von reinem Cinchonidin gehen bei diesem Verhältnisse 0,05 g freie Base in die Lösung über.

Aus dem bei dieser Probe erhaltenen Cinchonidintetrasulfat kann man durch Ausfällung der wässrigen Lösung des Salzes mit Natronlauge chemisch reines Cinchonidin vom Schmelzpunkt 139° C gewinnen.

VII. KUBLI's Wasserprobe und Carbo-dioxydprobe.

A) Die Wasserprobe. Diese Probe beruht auf folgenden Ueberlegungen: die Sulfate der sog. „Nebenalkaloide“ sind in Wasser sehr viel leichter löslich als das Chininsulfat. Bei den freien Basen ist das Umgekehrte der Fall, d. h. das freie Chinin ist in Wasser sehr viel leichter löslich als die freien Nebenalkaloide. KUBLI bringt das Chininsulfat in Lösung, kühlt diese Lösung rasch auf 19—20° C ab, lässt sie 1/2 Stunde bei

¹⁾ Pharm. Zeitg. 1887, No. 100.

²⁾ Arch. Pharm. 1886, 848.

³⁾ Pharm. Zeitg. 1887, 97.

20° C stehen und filtrirt. Das Filtrat wird mit genügenden Mengen Natriumkarbonatlösung versetzt, um die in Lösung befindlichen Basen zu fällen, und es werden alsdann diejenigen Mengen Wasser ermittelt, welche erforderlich sind, um die ausgeschiedenen Basen wieder in Lösung zu bringen. Die Probe soll nach KUNLI nicht bloß geeignet sein festzustellen, ob ein Chininsalz probemässig ist oder nicht, sondern sie soll auch über die Menge der Verunreinigungen genügend genaue Auskunft geben, weil die Zunahme der zur Auflösung der ausgeschiedenen Basen erforderlichen Wassermenge den vorhandenen Verunreinigungen proportional ist. Die genauere Anweisung zur Ausführung der Wasserprobe lautet:

1,793 g (rund 1,8 g) Chininsulfat, welches bei 40–50° C völlig verwittert ist, [bez. 1,8 g lufttrockenes Chininchlorhydrat mit 0,975 g chemisch reinem, wasserfreiem Natriumsulfat] übergiesse man in einem tarirten Glaskölbchen mit 60 g destillirtem Wasser, erhitze unter Umschwenken zum Sieden, erhalte darin 5 Minuten und bringe dann auf der Waage durch vorsichtigen Zusatz von destillirtem Wasser auf das Gesamtgewicht von 62 g. Das Kölbchen verstopfe man jetzt, kühle unter einem kalten Wasserstrahl bei beständigem Schütteln auf 19–20° C, ab, setze darauf in ein Wasserbad von genau 20° C und lasse hier unter häufigem Schütteln $\frac{1}{2}$ Stunde stehen. Man filtrire jetzt durch ein trocknes Filter von schwedischem Filtrirpapier, dessen Durchmesser 9 cm beträgt, bringe 5 ccm des 20° C zeigenden Filtrates in einen trockenen Glaszylinder von 25 bis 30 ccm Inhalt, tröpfe hierzu mittels des Tropfglases 3 Tropfen Natriumkarbonatlösung — bestehend aus 1 Th chemisch reinem, wasserfreiem (!) Natriumkarbonat und 10 Th Wasser — und mische dann allmählich destillirtes Wasser von 20° C hinzu, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelöst ist — Die hierzu erforderliche Menge Wasser darf nicht mehr als x ccm betragen (Dieses x ist im Sinne des Germ III = 12 ccm, nach Ross IV = 13 ccm).

B) Die Carbo-dioxydprobe beruht auf folgenden Beobachtungen. Wenn man aus einer bei gewöhnlicher Temperatur gesättigten neutralen Lösung von Chininsulfat das Chinin durch Natriumkarbonat fällt, so löst sich das ausgeschiedene Chinin sehr leicht in einer Natriumbikarbonatlösung auf. Leitet man in eine solche Lösung Kohlensäure, so scheidet sich das Chinin (unter dem Mikroskop beobachtet) in prachtvollen, meist zu Büscheln vereinigten Nadeln aus. Diese stellen das neutrale Karbonat des Chinins dar. Die Gegenwart von Cinchonin, Cinchonidin und Chinidin, einzeln oder gemengt, vermehrt anfänglich, vermindert und verzögert darauf, oder verhindert, wenn die Menge der Nebenalkaloide einen gewissen Betrag übersteigt, auch ganz die Ausscheidung eines solchen Niederschlages, während Hydrochinin, wenn es allein im Chininsulfat vorkommt, die Menge des aus letzterem zu erzielenden Chininkarbonats um 0,1–0,2 ccm verringert, wobei es gleich ist, ob die Beimengung des Hydrochinins 1 Proc oder bis 10 Proc beträgt. Die Anweisung zur Ausführung dieser Probe lautet:

Die Vorschrift zur Darstellung der Chininlösung ist die nämliche wie für die Wasserprobe.

In einen trockenen Glaszylinder von 25–30 ccm Fassungsraum bringt man 5 ccm obiger Chininlösung, tröpfele hierzu 3 Tropfen Natriumkarbonatlösung (s. Wasserprobe), um das Chinin zu fällen, füge alsdann 5 ccm einer frisch und kalt bereiteten Lösung von reinem Natriumbikarbonat (8–50) hinzu, worauf sich das gefällte Chinin wieder klar auflösen muss. Die Lösung bringe man auf 15° C, setze sie darauf in ein Wasserbad von der gleichen Temperatur und leite nun in die Lösung 30 Minuten luftfreie und trockene Kohlensäure ein.

Während des Einleitens der Kohlensäure hat man zu beobachten, wann die ersten unzweifelhaften Spuren einer Ausscheidung in der Chininlösung erfolgen, welche Form die Flocken bei mikroskopischer Betrachtung allmählich annehmen, ob dieselben dem Anschein nach amorph bleiben (reines $-\frac{1}{2}$ Proc Verunreinigung enthaltendes Chininsulfat) oder theilweise (1 Proc Verunreinigungen) oder gänzlich (2–5 Proc Verunreinigungen) körnige Beschaffenheit annehmen, in welchem Maasse sich der Niederschlag vermehrt, oder ob im Verlaufe von 30 Minuten gar keine Ausscheidung erfolgt (mehr als 10 Proc Verunreinigungen).

Bei Chininsulfat bez. Chininchlorhydrat (Germ III) entsteht eine reichliche, die ganze Flüssigkeit erfüllende Krystallisation von Chininkarbonat.

Beide Proben sollen einander ergänzen, d. h. die nach der Wasserprobe erhaltenen Resultate sollen in Uebereinstimmung stehen mit den nach der Carbo-dioxydprobe sich ergebenden. — Indessen sind die KUNLI'schen Angaben nicht ohne Widerspruch geblieben,

anch liegen noch nicht hinreichende praktische Erfahrungen über diese neuen Prüfungsmethoden vor

Die unter I bis VI aufgeführten älteren Prüfungsmethoden spiegeln sich in den nachstehenden Anforderungen der verschiedenen Pharmakopoen bezüglich der Prüfung des Chininsulfats auf Nebensalkaloide wieder

Austr 2 g Chininsulfat werden mit 20 ccm destilliertem Wasser übergossen und, unter fortwährendem Umschütteln, im Wasserbade bis auf 80° C erwärmt. Die Mischung wird dann 1 Stunde bei Seite gestellt, hierauf $\frac{1}{2}$ Stunde lang auf 15° C gehalten und durch ein trockenes Filter filtriert. — 5 ccm des Filtrates werden nach und nach mit 7,5 ccm Ammoniakflüssigkeit (0,980 spec G) versetzt. Der anfänglich entstehende Niederschlag soll sich vollständig auflösen, so dass die Flüssigkeit klar wird und nicht ungelöste Flocken zurückbleiben

Germ 2 g Chininsulfat, welches bei 40—50° C völlig verwittert ist, wird im Probirrohr mit 20 ccm destilliertem Wasser übergossen. Man stelle das Ganze $\frac{1}{2}$ Stunde lang, unter Umschütteln, in ein auf 60—65° C erwärmtes Wasserbad. Hierauf bringe man das Probirrohr in Wasser von 15° C und lasse es darin, unter häufigem Schütteln 2 Stunden lang stehen. Dann filtrire man durch ein Filter von 7 cm Durchmesser aus bestem Filterpapier, bringe 5 ccm des 15° C zeigenden Filtrates in ein trockenes Probirrohr und mische allmählich Ammoniakflüssigkeit von 15° C hinzu, bis der entstehende Niederschlag wieder gelöst ist. Die hierzu erforderliche Menge Ammoniakflüssigkeit darf nicht mehr als 4 ccm betragen

Helv 2 g zuvor bei 50° C verwittertes Chininsulfat digerirt man nach sorgfältigem Zerreiben mit 20 g Wasser während 1 Stunde unter öfterem Agitiren, lasse das Gemenge weitere 2 Stunden lang bei 15° C stehen, wobei zuweilen umgerührt wird, und filtrire sodann durch ein Filter von 7—8 cm Durchmesser. 5 ccm des Filtrates sollen mit 6 ccm Ammoniak von gleicher Temperatur unter Schütteln gemischt, eine klare Flüssigkeit liefern

Gall 2 g Chininsulfat werden in einem verkorkten Probirglase mit 20 ccm destilliertem Wasser gemischt und, unter öfterem Umschütteln, $\frac{1}{2}$ Stunde in diesem Wasser gelassen. Man lässt alsdann an der Luft vollständig erkalten und bringt das Gefäß in ein Wasserbad von 15° C, in welchem man es unter häufigem Umschütteln $\frac{1}{2}$ Stunde belässt. Man filtrirt und mischt 5 ccm des Filtrates mit 7 ccm Ammoniakflüssigkeit von 0,980 spec Gew. Die Mischung muss klar sein und während 24 Stunden klar bleiben. — Man ver-

dampft andere 5 ccm des Filtrates in einer gewogenen Schale und trocknet bei 100° C bis zum konstanten Gewicht. Das Gewicht des Trockenrückstandes darf nicht mehr als 0,015 g betragen

U St Lässt man 2 g Chininsulfat bei 100° C völlig verwittern, und wird der Trockenrückstand alsdann mit 20 ccm Wasser $\frac{1}{2}$ Stunde bei 15° C unter gelegentlichem Umschütteln macerirt, die Mischung als dann durch Glaswolle filtrirt, so sollen 5 ccm des Filtrates mit 7 ccm Ammoniakflüssigkeit von 0,980 spec Gew eine klare Flüssigkeit geben. Bei 15° C können 7,5 ccm, bei 17° C können 8 ccm Ammoniakflüssigkeit erforderlich sein.

Brit (Prüfung auf Cinchonidin und Cinchonin) Man löst 4 g Chinarsulfat in 120 ccm siedendem Wasser und kühlt die Lösung unter Umrühren auf 30° C ab. Alsdann filtrirt man das durch Kristallisation gereinigte Chinarsulfat ab. Das Filtrat konzentriert man durch Abdampfen auf 10 ccm und bringt es in ein kleines Gefäß und schüttelt in diesem mit 10 ccm Aether und 5 ccm Ammoniakflüssigkeit (spec G = 0,953). Man stellt die Mischung für mindestens 24 Stunden ins Kalte. Dann sammelt man die aus Cinchonidin, Cinchonin und Chinin bestehenden Krystalle auf einem gewogenen Filter, wäscht mit etwas Aether und trocknet bei 100° C. Das Gewicht der Krystalle soll nicht mehr als 0,12 g betragen

Prüfung auf Chinidin Man löst 1 g Chininsulfat in 30 ccm siedendem Wasser, lässt erkalten und filtrirt. Zum Filtrat gibt man eine Lösung von Kaliumjodid und etwas Alkohol (von 90%) um die Fällung von amorphen Jodiden zu verhindern. Man sammelt das ausgeschiedene Chinidinjodid, wäscht es mit wenig Wasser, trocknet und wägt es. Sein Gewicht entspricht ungefähr dem gleichen Gewicht von Chinidinsulfat

Prüfung auf Cinchonin und amorphe Alkaloide Man löst 1 g Chininsulfat in 30 ccm siedendem Wasser und mischt 1 g Kalium-Natriumtartrat dazu. Man kühlt unter Umrühren vollständig ab und filtrirt. Wird das Filtrat auf ein kleines Volumen eingedampft, so soll auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit kein, oder nur ein sehr geringer Niederschlag entstehen

Dispensation Ueber die Dispensation des Chininsulfats und die technischen Rezepturverhältnisse war Folgendes zu erwähnen. Verschreibt der Arzt eine Mixtur aus Chininsulfat und wässriger Flüssigkeit bestehend, ohne den Zusatz von verdünnter Schwefelsäure zu bemerken, so ist es allgemeiner Gebrauch, das Chininsulfat in klarer Lösung zu verabfolgen und zwar auf je 0,05 g Chininsulfat einen Tropfen verdünnter Schwefelsäure, auf 0,5 g Chininsulfat 8 Tropfen, auf 1 g nur 15 Tropfen dieser Säure zuzusetzen. Treten in die Mischung saure Zuckersäfte ein, so genügt auch wohl die Hälfte der verdünnten Säure. Hierbei ist zu beachten, dass man die Säure nicht direkt auf das in die Flasche eingetragene Chininsalz auftröpfelt, sondern dieses zuvor mit etwas Wasser oder dem vorgeschriebenen Sirup zu durchmischen hat. Im anderen Falle bildet sich aus dem Chininsalz und der Säure eine feste Masse, welche oft eine halbe Stunde Zeit beansprucht, um in das später zugesetzte Wasser in Lösung überzugehen.

Wird das Chininsulfat mit *Succus Lagurthae*, Schleimsubstanzen (Tiaganth, Salep), gerbstoffhaltigen Substanzen in Mixturen verordnet, so ist es nothwendig, das Lösungsmittel in zwei Hälften zu verwenden, mit der einen Hälfte das Chininsalz unter Beihülfe der verdünnten Säure zu lösen, mit der anderen Hälfte des Lösungsmittels

die vorerwähnten Substanzen zu vermischen und dann beide Flüssigkeiten zu vereinigen. Im anderen Falle bilden sich gewöhnlich klumpige oder zähe oder flockige oder faden-ähnliche, höchst unappetitliche Abscheidungen.

In Pulvern wird Chininsulfat gemeinlich mit Zucker vermischt. Hierbei ist es notwendig, die Mischung unter nur leisem Drucke des Pistills auszuföhnen. Bei starkem Druck setzt sich das Chinin mit dem Zucker wie Harz an die Reibfläche und ist dann schwer von dieser abzustossen.

In Pillen mit Extrakten resultirt in den allermeisten Fällen eine bröckelige Masse, aus welcher sich Pillen kaum formiren lassen. Dieser Uebelstand wird leicht gehoben durch Zusatz einer geringen Menge Säure, z. B. auf 1,0 g Chininsulfat circa 5 Tropfen Salzsäure oder 0,3 g Weinsäure. Ausserdem ist ein Zusatz von einigen Tropfen Glycerin sehr geeignet, der Masse Plasticität zu verleihen. Auf 10,0 g Pillenmasse nehme man 5 Tropfen Glycerin.

Das beste Geschmackskorrigens für Chinin ist Kaffeeaufguss oder Chloroform.

Die hypodermatische Anwendung ist vielfach versucht worden, jedoch erfolgt in vielen Fällen Schmerzhaftigkeit der Injektionsstelle, nicht selten auch Entzündung und Abscedirung oder Schorfbildung derselben. Die Injektionslösung besteht aus 1,0 g Chininsulfat, 9,0 g destill. Wasser und soviel (5) Tropfen Salzsäure, als innerhalb 5 Minuten ausreichen, das Chininsalz in Lösung zu bringen. Zu diesen hypodermatischen Injektionen ist *Chininum hydrochloricum* viel geeigneter und zuträglich.

Dosen für Klyema sind in Grammen 0,2—0,5—1,0 für ein Suppositorium 0,25—0,5 (Ol. Cacao 4, Cera flava 1), gegen Askariden besonders hilfreich. Zu Einspritzungen in die Nase (bei Heufieber) 1,0 auf 500,0 Wasser.

Wenn „Chininum sulfuricum“ oder „Chininsulfat“ schlechthin verordnet ist, so ist stets das im Vorstehenden beschriebene basische Chininsulfat der Formel $(C_{20}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot H_2SO_4 + 8H_2O$ abzugeben.

Wirkung, Anwendung und Dosis. Chinin ist ein heftiges Gift für die niedersten thierischen Organismen (Infusorien). Es wirkt toxisch auf Insekten und kleinere Thiere, tödtet auch Spermatozoen.

Chinin hat ferner fäulnisswidrige, gährungshemmende Eigenschaften, doch ist seine Wirkung gegen Bakterien und Gährungspilze eine verhältnissmässig schwächere als gegen animalische Organismen. Es hemmt die Weiterentwicklung von Pilzvegetationen in Lösungen, welchen 1—8 pro Mille Chininsalz beigemengt ist.

Beim Menschen bewirken kleine Gaben innerlich vermehrte Sekretion des Magensaftes, dieser Beförderung der Verdauung. Ferner wird durch dieselben Steigerung des Blutdrucks herbeigeföhrt. Grössere Gaben bewirken Herabsetzung der Körpertemperatur, und zwar tritt die antipyretische Wirkung viel leichter beim fieberkranken als beim gesunden Menschen ein. Grössere Chinin Gaben rufen Verkleinerung der Milz hervor, sie wirken ferner auf das Gehirn, indem sie einen Zustand veranlassen, welchen man als „Chininrausch“ bezeichnet. Dieser zeigt sich in Schwindel, Ohrensausen, Betäubung und Schlafsucht.

Grosse Chinin Gaben wirken auf das Herz und zwar blutdruckvermindernd. Nach dem Gebrauche von Chinin bemerkt man häufig Schweisse und Hautausschläge. Solche Ausschläge zeigen sich besonders häufig in Chininfabriken bei Arbeitern, welche mit chinalkaloidhaltigen Dämpfen, Lösungen oder Staub in Berührung kommen. Diese Exantheme beginnen gewöhnlich mit einer Knötchenbildung im Gesichte und an den Armen und einer Anschwellung der Augenheder und Genitalien. Bei der Weiterentwicklung solcher, oft langwieriger Ausschläge bilden sich Krusten oder Schrunden.

Die ausgezeichneten Erfolge des Chinins bei einer grossen Anzahl von Krankheiten und die verhältnissmässig geringe Giftigkeit desselben räumen diesem Medikamente eine der ersten Stellen im Arzneischatze ein.

Seine Hauptanwendung findet es bei Malaria-krankheiten, und ist das Chinin bis jetzt das einzige Mittel geblieben, welches eine spezifische, heilende Wirkung bei Sumpf-

und Wechselfiebern zeigt — Auch gegen die Nachkrankheiten des Wechselfiebers (Milztumoren) wird Chinin mit bestem Erfolge gegeben. Eine grosse Beachtung hat das Chinin in den letzten Jahren als prophylaktisches Mittel gegen die Malaria gefunden.

Die therapeutische Anwendung des Chinins erstreckt sich weiterhin auf eine ganze Reihe von krankhaften Zuständen. Bei allen Krankheiten, welche mit Fieber verbunden sind, wird es als Antipyreticum verwendet, besonders bei Typhus, Puerperalfieber, hektischem Fieber, Pneumonien u. a. m. Dosis pro die 0,75—1,5 g und mehr. Es findet ferner Verwendung als antiseptisches Mittel bei Halsentzündungen, Diphtherie, Augenentzündungen, ferner als Mittel gegen Parasiten.

Als Tonicum wird es meistens in Form des Tannates angewendet.

Aqua carbonica febrifuga

(Franz's Spezialität)

Rp Chinini bisulfurici 1,0

Aquae destillatae 60,0

1 Theelöffel voll auf 1 Glas Sodawasser

Balsamum febrifugum

Rp Mixturae oleoso-balsamicae 50,0

Chinini sulfurici 1,0

Zum Einreiben des Rückgrats bei Kindern, welche Chinin per os nicht nehmen

Elixir aloetico febrifugum RÉCAMIER.

Rp 1 Tincturae Alois

2 Tincturae Myrrinae aa 15,0

3 Spiritus (80 Vol %) 50,0

4 Aquae destillatae aa 35,0

5 Chinini sulfurici 8,0

6 Acidi sulfurici diluti 3,0

7 Tincturae Opii crocatae 1,0

Man mischt 1—4, filtrirt und fügt 5—7 zu Erwachsenen täglich 1—2 Esslöffel als Fiebermittel und bei Neuralgien.

Elixir Quininae compositum (Nat. Form)

Compound Elixir of Quinine (Nat. Form)

Rp Chinini sulfurici 8,0

Cinchonidini sulfurici 1,0

Cinchonini sulfurici 1,0

Elixir aromatici (U. St.)

q s ad 1 Liter

Elixir Quininae et Phosphatum compositum (Nat. Form)

Compound Elixir of Quinine and Phosphates (Nat. form)

Rp Chinini sulfurici 4,0 g

Ferri phosphoricum solubilis (U. St.)

Kali citrici aa 17,5 g

Syrupi Calcii lactophosphoricum (U. St.) 20,0 cm

Aquae destillatae 30,0

Elixir aromatici (U. St.) q s ad 1 Liter

Enema febrifugum

Rp Chinini sulfurici 0,5—1,0

Aquae destillatae

Aceti (6 %) aa 25,0

Mit gleichviel lauwarmem Wasser gemischt zum Klyster bei Intermitteuz, auch gegen Askniden

Injectio Chinini subcutanea SHARP

Rp Chinini sulfurici 1,0

Aquae destillatae 3,0

Acidi lactici gtt X

Aquae destillatae q s ad cm 40

Natrii bisulfurosi 0,03

Linimentum antiperiodicum SCHLATER

Rp Chinini sulfurici 2,0

Extracti Opi 0,5

Tartari sublati 0,1

Spiritus camphorati 100,0

Zum Einreiben auf den Unterleib

Injectio antigonorrhoeica HABERKORN

Rp Chinini sulfurici 2,0

Aquae destillatae 150,0

Acidi hydrochlorici q s

Glycerini 50,0

Zur Injektion bei Tripper

Linimentum trichopathicum

Rp Olei Ricini 100,0

Chinini sulfurici 1,0

Acidi aceticum diluti (80 %)

Acidi carbonici liquifacii aa gtt XXV

Glycerini 30,0

Mixturae oleoso-balsamicae 20,0

Fint agitando linimentum Umgeschüttelt zum Einreiben des Haupthaars gegen das Spalten desselben

Mixtura antirheumatica LEMPER

Rp Chinini sulfurici 2,0

Kali jodati

Acidi sulfurici diluti aa 1,0

Aquae destillatae 175,0

Syrupi Sacchari 45,0

Bei akutem Gelenkrheumatismus 2—3mal täglich 1 Esslöffel

Mixtura contra malariam BACCELLI

Rp Chinini sulfurici 3,0

Ferro-Kali tartarici 7,0

Aquae destillatae 500,0

Liquoris Kali arsenicosi gtt XXV

1—3 Esslöffel im Tage

Mixtura Chinini sulfurici dulcificata

Rp Chinini sulfurici 1,0

Infusi Coffeae tostae 100,0

Syrupi Chloroformii 50,0

Das Chininsulfat ist mit dem Syrup und dem erkalteten Aufguss anzureiben. Die Mixtur schmeckt nur wenig bitter.

Mixtura contra cholerae Asiaticum.

DE LOYIGNAC

Rp Chinini sulfurici 8,0

Ferri jodati 1,5

Syrupi gummosi 35,0

Aquae destillatae 150,0

Misce agitando Bei Choleraanfall zwei Esslöffel auf einmal, dann stündlich einen Esslöffel (Sobald Durchfall und Erbrechen aufhören, der Körper warm wird, sollen auf den Kopf Umschläge gemacht und dem Kranken kaltes Wasser gegeben werden.)

Mixtura splenetica (Nat. Form)

Spleen-Mixture GODSEN'S Mixture

Rp Ferri sulfurici crystallisati

Chinini sulfurici aa 14,0

Acidi nitrici (25 %) 54,0

Kali nitrici 42,0

Aquae destillatae q s ad 1 Liter

Pilulae antineuralgicæ LABORDE

Rp Chinini sulfurici 2,0
Tincturae Aconiti 1,0
Radici Althaeae pulveratae 2,5 vel q s

M f pilulae quinquaginta (50)

D S Vier bis fünf Pillen den Tag über (bei Prosopalgie, Hemicranie und anderen Neuralgien mit intermittierendem Charakter)

Pilulae Chinini cum Ferro HAEGER

Rp Chinini sulfurici 10,0
Liquoris Ferri sesquichlorati 3,0 (gtt I)
Acidi hydrochlorici gtt. XX
Extracti Trifolii 8,0
Glycerini gtt XXX
Rad. Althaeae pulv 1,0
Pul Gentianae pulv q s

Fiant pilulae ducentae (200)

Cortice Cinnamomi Cassiae pulverato consperguntur
als Cholera und Typhusprophylacticum täglich 2 bis 3mal zwei Pillen, bei Appetitlosigkeit 2- bis 3mal eine Pille, bei Neuralgien alle zwei Stunden 3 Pillen

Pilulae antineuralgicæ GROSS (Nat Form)

GROSS' antineuralgic Pills (Nat Form)

Rp Chinini sulfurici 13,0
Morphini sulfurici 0,32
Strychnini puri 0,22
Acidi arsenicosi 0,32
Extracti Aconiti folii 8,2

Fiant pilulae 100

Pilulae Chinini cum Ferro (Form Berol)

ip Chinini sulfurici 1,5
Ferri reducti 5,0
Radici Gentianae pulv 0,5
Extracti Gentianae 2,5

Fiant pilulae 60 Dreimal täglich zwei Pillen.

Pilulae Metallorum amararum (Nat Form)

Bitter metallic pills (Nat Form)

Rp Chinini sulfurici
Ferri reducti ss 0,5
Strychnini puri 0,32
Acidi arsenicosi 0,32

Fiant pilulae 100

Pilulae tonicæ ATKEN (Nat Form)

ATKEN's tonic pills (Nat Form)

Rp Ferri reducti 4,5
Chinini sulfurici 6,5
Strychnini puri 0,13
Acidi arsenicosi 0,13

Fiant pilulae 100

Pilulae quadruplices (Nat Form)

Quattuorpillae. Pilulae Ferri et Quininae compositae (Nat Form)

Rp Ferri sulfurici sicc
Chinini sulfurici
Aloës depuratae ss 6,5
Extracti Strychni (U-St.) 1,6
Extracti Gentianae q s

Fiant pilulae 100

Pilulae tonicæ BELL

BELL's tonic pills

Rp Extracti Hyoscyami
Aloës ss 2,5
Chinini sulfurici 1,25
Ferri sulfurici 1,0

Fiant pilulae 60

Pomata contra alopeciam STROMER

Rp Chinini sulfurici 0,5
Tannini
Spiritus odorati ss 1,0
Unguenti odorati 80,0

M f unguentum Das Chininsalz ist mit einigen (10) Tropfen Mandelöl zu zerreiben, ehe es mit dem Tannin gemischt wird. (Wang wirksam)

Pomata contra alopeciam cum Chinino

Rp Chinini sulfurici 1,0
Aque destillatae
Acidi acetic diluti ss gtt X
Unguenti odorati 100,0

M f unguentum Zum Einreiben der Kopfhaut.

Pulvis Tabaci cum Chinino

Rp Chinini sulfurici 0,5
Acidi citrici 0,25
Pulvis Tabaci sternutatori 5,0

Misce, ut fiat pulvis

D S Schnupfpulver auf einen Tag (bei Gesichtsschmerz)

Pulvis erribinus antiprosopalgicus SCHREFFENAVO ist ein Gemisch aus 1,0 Chininsulfat und 0,5 Schnupftabak

Pulvis Tabaci cum Chinino RADUIS ist aus 0,5 Chininsulfat und 15,0 Schnupftabak zusammengesetzt

Pulvis dentifricus cum Chinino (DIETRICH).

Chinin-Zahnpulver

Rp Calcii carbonici 825,0
Rhizomatus Iridis pulv
Sacchari Lactis ss 100,0
Saccharini 0,25
Lapidis Pumicis pulv
Magnesi carbonici ss 25,0
Tannini 20,0
Chinini hydrochlorici 5,0
Olei Rosae 1,0
Olei Menthae piperitae 5,0
Olei Annonae odoratissimae gtt V
Olei Amygdalarum aetheri gtt V

Sirupus Chinini sulfurici

Sirup de sulfate de Quinine (Gall)

Rp Chinini sulfurici 0,5
Acidi sulfurici diluti (16 %) 0,4
Aque 42
Sirupi Sacchari (spec Gew 1,82) 95,0

Sirupus febrifugus infantum

Rp Snupi Coffeae tostae 00,0
Chinini sulfurici 1,0
Acidi citrici 2,5

Täglich viermal 1 Theelöffel bis 1 Esslöffel in der fieberhaften Zeit

Suppositoria Chinini.

Rp Chinini sulfurici 15
Olei Cacao 10,0

Fiant suppositoria No 3

Tinctura Chinini aloetica

Tinctura antifebrilis RIEGLER.

Rp Tincturae Aloës 5,0
Tincturae Auranti corticis 30,0
Spiritus camphorati 2,0
Chinini sulfurici 4,0
Acidi sulfurici diluti 3,0
Tincturae Opul simplicis 1,0
Spiritus diluti 70,0

Tinctura Chinini composita

Rp Chinini sulfurici 2,0
Tincturae Auranti corticis 100,0

Tinctura febrifuga WARBURG

WARBURG's Fiebertinktur

Rp Radici Angelicae
Rhizomatus Zingiberis
Aloës ss 4,0
Camphorae
Croci ss 0,5
Spiritus diluti 100,0

Digere, in colatura solve
Chinini sulfurici 2,0

Täglich 4-6 Theelöffel. Gegen Malaria, Fieber, Influenza, besonders auf den Südsee Inseln beliebt

Unguentum febrifugum BOUDIN
 Pp Chinini sulfurici 10
 Mixturae sulfurico-acidae gtt λ
 Adipis suilli 40
 (Wird auf die Schamleisten oder in die Achselhöhlen eingegeben.)

Unguentum febrifugum BOUCHARLAT
 Rp Chinini stearici 3,0
 Adipis suilli 4,0

Unguentum febrifugum SPINELLI
 Rp Chinini sulfurici 1,0
 Opi pulverati 0,1
 Acidi acetici diluti gtt λ
 Adipis suilli 20,0

In den Rücken einzureiben (Die Original-Vorschrift lässt noch 0,1 Ferrum oxydatum fuscum zumischen)

Vinum Carnis, Ferri et Cinchonae (Nat Form)
 Wine of Beef, Iron et Cinchona (Nat Form)

Pp Extracti Carnis 35,0 g
 Tincturae Ferri citro-chloridi 30 ccm
 Chinini sulfurici 20 g
 Cinchonidini sulfurici 1,0 g
 Acidi citrici 0,75 g
 Aquae ferivinae 60 ccm
 Anglica Wine q s ad 1 Liter

Vinum Chinini DIETZICH

Rp 1 Gelatinæ albae 0,5
 2 Aquae destillatae 10,0
 3 Vini Xerensis 970,0
 4 Chinini hydrochloridi 1,0
 5 Aquae destillatae 20,0
 6 Acidi hydrochlorici gtt λ

Man mischt die Lösung von 1 in 2 zu 3, fügt die Lösung von 4–6 hinzu, lässt 8 Tage stehen und filtriert

Antidyspepticum, Mittel gegen Seekrankheit, ist ein Gemisch aus Tartarus natronatus, Natrium bicarbonicum, Magnesium carbonicum, Ammonium chloratum, Chininum sulfuricum.

Eau de Quinine Von dieser französischen Specialität, welche ein beliebtes Heilpflagemittel ist, werden eine Anzahl von Vorschriften angegeben, welche mehr oder weniger den Anspruch erheben, ein dem Original ähnliches oder gleichkommendes Präparat zu ergeben

I. Chinini sulfurici 1,0, Aquae Coloniensis 10,0, Rum 100,0, Spiritus 100,0, Glycerini 100,0, Aquae Rosae 600,0, Alkanami q s II Chinini sulfurici 0,2, Tincturae Cantharidum 2,0, Glycerini 15,0, Spiritus diluti 100,0, Spiritus Lavandulae 10,0, Tincturae Ratanhiae 4,0 Diese Vorschrift soll dem PRINCE'Schen Eau de Quinine nahe kommen III Spiritus Vini Gallici 200,0, Aquae Coloniensis, Spiritus (95 Vol Proc) aa 25,0, Spiritus saponata 10,0, Tincturae Chinae 5, Balsami peruviani 2,0, Olei Bergamottiae, Olei Auranti dulcis aa 1,0, Olei Gerani 0,3, Tincturae Cantharidum 1,0

Eau de Quinine-Öl wird von SCHIMMEL & Co in Leipzig in den Handel gebracht und dient zur Bereitung des Eau de Quinine

Kaskine, in Amerika als Chinin-Ersatz in den Handel gebracht, hat sich als granulierter Zucker herausgestellt

Katarrh-Pillen I. Nach HAGEN Chinidini sulfurici 1,0, Radices Althaeae 1,0, Radices Gentianae 8,0, Tragacanthae 2,5, Ligni Santalini rubri 1,0, Glycerini 8,0, Acidi hydrochlorici 4,0 Werden zu 200 Pillen verarbeitet Die Masse ist anfänglich sehr weich, wird sie aber aufs Neue angestossen, so ergibt sich gute Pillenconsistenz Die Pillen werden mit Zimmt konspergiert Nach 1–2tägigem Liegen an der Luft sind sie so trocken, dass sie in Glasgefäßen aufbewahrt werden können

II Voss'sche Katarrhpillen Diese sollen die gleiche Zusammensetzung haben wie die HAGEN'schen, nur sollen sie an Stelle von Chinidinsulfat Cinchonidinsulfat enthalten, ausserdem sind sie mit Kakao überzogen (Vergl auch S 744)

Kopfwelpulver (Wiener Specialität) Chinini bisulfurici 0,2, Natrii salicylici, Pastae Guaranæ pulveratae aa 0,5 Dosis 1, — ad capsulam amylaceam

Wohlgeschmeckende Chinin-Präparate von Prof Dr CASPARI, von J D RIEDEL-Berlin dargestellt Chinin-Fralinés, aus Chokolade mit einem Geschmackskorrigens bereitet, enthalten je 0,1 g Chinin

Zymoidin von Dr ROSENBERG gegen Gonorrhoe soll unter Verwendung von Wismutoxyd, Zinkoxyd, Aluminiumoxyd, Jod, Borsäure, Karbolsäure, Gallussäure, Salicylsäure, Chinin hergestellt werden und wird in Form von Pulvern, Salben, Lösungen und als Bougies angewendet

II. Chininum bisulfuricum (Austri. Helv. Ergänzb.) Sulfate de Quinine neutre (Gall.) Quininae Bisulfas (U-St.) Chininbisulfat. Saures schwefelsaures Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot H_2SO_4 + 7 H_2O$. Mol. Gew. = 548.

Das vorstehend aufgeführte Salz ist nach den Anschauungen der modernen Chemie das neutrale Chininsulfat Nach dieser modernen Nomenclatur ist es von der Gall als „Sulfate de Quinine neutre“ aufgenommen Da es aber stark sauer reagiert, so wird es in der Praxis, und namentlich auch von der Mehrzahl der Arzneibücher, als Chininbisulfat bez. saures schwefelsaures Chinin bezeichnet

Darstellung 10 Th gewöhnliches krystallisirtes Chininsulfat werden unter Erwärmen im Dampfbade in einer Mischung aus 15 Th destillirtem Wasser und 6,85 Th verdünnter Schwefelsäure (spec Gew = 1,110—1,114) gelöst, wobei man darauf zu achten hat, dass die Temperatur der Flüssigkeit nicht über 60° C hinausgeht, damit Zersetzungen des Chinins vermieden werden. Man filtrirt die noch warme Lösung durch Papier und lasse sie erkalten. Nach eintägigem Stehen in der Kälte ist das reine Chininsulfat auskrystallisirt. Man giesst die Mutterlauge ab und befreit das Salz von der noch anhaftenden Lauge durch Absaugen oder Abschleudern.

Die Mutterlauge kann auf verschiedene Weise verwerthet werden. Man verdünnt sie z. B. mit Wasser, neutralisirt die erwärmte Lösung mit Soda und krystallisirt das beim Erkalten sich abscheidende gewöhnliche Chininsulfat unter Zusatz von etwas Thierkohle um. Oder man fällt mit Ammoniak oder Natronlauge die freie Chininbase. Jedenfalls ist wegen der leichten Löslichkeit des Salzes und der damit verbundenen Konzentration des Mutterlaugen die Klendarstellung des Chininsulfats vom Geldpunkte betrachtet, nicht lohnend.

Eigenschaften. Farblose, glänzende, an der Luft verwittrnde, am Licht sich gelb färbende Prismen, welche mit 11 Th Wasser oder 32 Th Weingeist Lösungen geben, welche sauer reagiren und bitter schmecken. Die wässrige Lösung fluorescirt bläulich. Verdünnt man eine der genannten Lösungen mit etwa 200 Th Wasser und 50 Th Chlorwasser, so entsteht auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss eine smaragdgrüne Färbung (Thalleiochin-Reaktion, welche die Gegenwart von Chinin oder Chinidin anzeigt). — Die wässrige, mit einigen Tropfen Salpetersäure angesäuerte Lösung des Salzes wird durch Baryumnitratlösung gefällt, dagegen durch Silbernitratlösung nicht getrübt (Unterschied vom Chininchlorhydrat). Im Glasröhrchen erhitzt, schmilzt das Chininsulfat bei 80° C, bei 100° C wird es vollständig wasserfrei, wobei es rechnerungsmässig 22,99 Proc Wasser verliert.

Prüfung 1) Nach dem Trocknen bei einer allmählich (l) bis auf 100° C gestiegenen Temperatur müssen mindestens 77 Proc wasserfreies Salz (s oben) zurückbleiben. —

2) Bei Luftzutritt entzündet, verbrennt es, ohne einen Rückstand zu hinterlassen (Mineralische Verunreinigungen). 3) Mit konc Schwefelsäure oder Salpetersäure durch feuchtet, färbt es sich höchstens gelblich (Morphin, Brucin, s S 759). 4) Prüfung auf Nebenkalkalöide. 2,0 g Chininsulfat löse man durch gelindes Erwärmen in einem Probirrohre in 20 ccm Wasser auf, neutralisire diese Lösung genau mit Normal-Kalilauge und stelle das Ganze $\frac{1}{2}$ Stunde lang, unter häufigem Umschütteln, in ein auf 60—65° C erwärmtes Wasserbad. Hierauf setze man das Probirrohr in Wasser von 15° C und lasse es unter häufigem Umschütteln 2 Stunden lang darin stehen. — Alsdann filtrire man durch ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 ccm Durchmesser, bringe 5 ccm des 15° C zeigenden Filtrates in ein trockenes Probirrohr und mische allmählich Ammoniakflüssigkeit von 15° C hinzu, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelöst ist. Die hierzu erforderliche Menge Ammoniakflüssigkeit darf nicht mehr als 4,0 ccm betragen (s Seite 760).

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt. Damit die Krystalle nicht verwittrern, sind sie in einem gut geschlossenen Glasgefäße aufzubewahren.

Anwendung. Das Chininsulfat weicht in seiner Wirkung qualitativ von dem gewöhnlichen Chininsulfat nicht ab, doch enthält es etwas weniger Chinin als dieses. Man rechnet 8 Th gewöhnliches Chininsulfat als gleichwerthig mit 10 Th. Chininsulfat. Dagegen ist es durch seine leichtere Löslichkeit ausgezeichnet. — In Frankreich wird es gewöhnlich in 2procentiger wässriger Lösung theelöffelweise mit Selterswasser genommen.

Chininum tannicum.

1 **Chininum tannicum** (Austr Germ Helv) Chinintannat, Gerbsaures Chinin, Tannate de Quinine (Gall) Tannate of Quinia Fällt man Lösungen von Chininsalzen mit Gerbsäure, so erhält man Niederschläge von gerbsaurem Chinin, und zwar können diese recht verschiedene Zusammensetzung haben, weil der durch Zusatz einer gewissen Menge von Gerbsäure gebildete Niederschlag von Chinintannat die Fähigkeit hat, weitere Mengen Gerbsäure auf sich niederschlagen, also gleichsam saure gerbsaure Salze zu bilden. Um demnach ein Chinintannat von bestimmter Zusammensetzung zu erhalten, muss die zu dieser Verbindung führende Vorschrift genau eingehalten werden

Darstellung 1) **Germ** giebt keine Vorschrift, das von ihr geforderte Präparat ist wie folgt zu bereiten 1 Th gewöhnliches Chininsulfat werde in 30 Th kaltem destillirtem Wasser, welchem man etwas Essigsäure zusetzt, gelöst In diese Lösung wird in dünnem Strahle eine solche von 1,8 Th Tannin in 18 Th kaltem destillirten Wasser eingerührt Es werde hierauf der grössere Theil der überschüssigen Säure durch sehr langsamen Zusatz von Ammoniak unter beständigem Rühren abgestumpft Dann lasse man die Mischung an einem kalten Orte stehen, damit der Niederschlag sich absetze Diesen sammle man auf einen Filter und wasche ihn wiederholt mit einer kleinen Menge kaltem Wasser Hierauf wird der Niederschlag abgepresst und bei gelinder Wärme getrocknet Bei einer Wärme von über 40° C tritt leicht eine Schmelzung des feuchten Tannats ein, wodurch dasselbe braun wird Das getrocknete Chinintannat wird zu feinem Pulver zerrieben

2) **Austr** 10 Th gewöhnliches Chininsulfat werden in 6,2 Th verdünnter Schwefelsäure (von 16,0 Proc H_2SO_4) und 300 Th destillirtem Wasser gelöst Die filtrirte Lösung ist mit einer ebenfalls filtrirten Lösung von 23 Th Gerbsäure in 150 Th destillirtem Wasser zu mischen Nach dem Absetzen des Niederschlages an einem kühlen Orte filtrirt man ab, wäscht den Niederschlag mit wenig destillirtem Wasser aus und trocknet ihn bei nicht über 30° C

3) **Helv** Man löst bei gewöhnlicher Temperatur 9 Th. gewöhnliches Chininsulfat in 255 Th Wasser und 10 Th verdünnter Schwefelsäure (von 16 Proc H_2SO_4) und fügt zu der filtrirten Lösung eine kalt bereitete Lösung von 21 Th Gerbsäure, 3,5 Th Natriumbikarbonat und 250 Th Wasser unter lebhaftem Umschwenken zu Der Niederschlag wird mit kleinen Mengen Wasser gewaschen, bis das Filtrat, nach dem Ansäuern mit Salpetersäure, durch Baryumchlorid nicht mehr getrübt wird, dann bei nicht über 30—35° C getrocknet und gepulvert

4) Man löst Chininhydrat in soviel 30proc Essigsäure, dass die Lösung nur schwach sauer reagirt, verdünnt mit Wasser und fügt soviel Gerbsäurelösung hinzu, dass der entstehende Niederschlag sich wieder auflöst, und neutralisirt alsdann mit Natriumbikarbonat Der nunmehr entstehende Niederschlag wird abfiltrirt, getrocknet, gepulvert, hierauf mit destillirtem Wasser gewaschen und aufs neue getrocknet (Gall)

Eigenschaften Das Chinintannat der verschiedenen Pharmacopoen ist ein gelblich-weisses, amorphes, geruchloses Pulver von schwach bitterlichem, etwas adstringirendem Geschmack Es ist in kaltem Wasser nur sehr wenig (etwa 1 : 800), etwas reichlicher in siedendem Wasser (etwa 1 : 50) löslich Von kaltem Weingeist bedarf es etwa 50—60 Th., von siedendem Weingeist etwa 5—6 Th zur Lösung Von Aether und Chloroform wird es schwer und spärlich aufgenommen, dagegen löst es sich in 100 Th kaltem oder in 10 Th heissem Glycerin Die Lösungen werden nach dem Verdünnen, ebenso wie die kalt gesättigte wasserige Lösung durch stark verdünnte Fernchloridlösung blau oder grauschwarz gefärbt — Chinintannat giebt beim Erhitzen im Glasrohr purpurrothen Theer Der Gehalt des Chinintannats an wasserfreiem Chinin wird von den verschiedenen Pharmacopoen verschieden normirt Es verlangen

	Austr	Gall.	Germ	Helv
Proc wasserfreies Chinin	—	20—21	30—32	30—35
Handb d pharm Praxis I				49

Prüfung 1) Zu 1 g Chinintannat füge man 50 ccm destillirtes Wasser und 10 Tropfen Salpetersäure. Man schüttelt einige Zeit und fügt einigen ccm des Filtrats eine entsprechende Menge Schwefelwasserstoffwasser bez Silbernitrat bez Baryumnitratlösung zu. Schwefelwasserstoffwasser darf keine Veränderung bewirken (Abwesenheit gewisser Metalle, Verunreinigungen des Präparats mit Kupfer- oder Bleisalzen z. B. geben zu schwarzen Färbungen oder Fällungen Veranlassung). Silbernitratlösung soll höchstens eine Opalescenz hervorrufen. Eine leichte Trübung auf Zusatz von Baryumnitratlösung ist zulässig.

2) 1 g Chinintannat werde auf dem Platinbleche verbrannt. Es darf kein wagbarer Rückstand bleiben (anorganische Beimengungen).

3) Man suspendire 1 g Chinintannat in einem hohen, graduirten Cylind. in 4 ccm Wasser. Hierauf versetze man mit 2 ccm Natronlauge, sowie mit 7 ccm Aether und durchschüttle die Mischung. Nach der Trennung der beiden Schichten hebe man mittels einer Pipette die obere ab und verdunste dieselbe in einem tarirten Schälchen. In gleicher Weise mache man 2 weitere atherische Auszüge mit je 7 ccm Aether¹⁾. Den Rückstand der 3 Aetherauszüge trockne man bei 100° C aus, derselbe wiege mindestens 0,3 g. Nach Helv 0,3—0,35, nach Gall 0,20—0,21.

Zur Beurtheilung der Reinheit des in dem Tannat enthaltenen Chinins nehme man eine etwas grössere Menge von Chinintannat, etwa 6 g, in Arbeit und verfähre zur Isolirung des darin enthaltenen Chinins genau nach obigen Verhältnissen. Das dabei erhaltene Chinin löse man unter massigem Erwärmen in der 20fachen Menge Weingeist auf und neutralisire die Lösung genau mit verdünnter Schwefelsäure. Hierauf verdunste man den Weingeist und verfähre mit dem im Rückstande bleibenden Chininsulfat, wie bei *Chininum sulfuricum* unter Prüfung angegeben.

Aufbewahrung Das Präparat soll bei einer 35° C nicht übersteigenden Wärme gut ausgetrocknet, hierauf gepulvert werden. Es empfiehlt sich, das Pulver nochmals über Schwefelsäure oder im Kalktrockenschranke (s. S. 546) nachzutrocknen, alsdann in die erhalteten, aber völlig trockenen Standgefässe zu bringen. Die Aufbewahrung erfolgt an einem trockenen, nicht zu warmen Orte.

Anwendung. Das Chinintannat vereinigt in sich die Wirkungen des Chinins und der Gerbsäure, lässt aber die des Chinins nur langsam sich entwickeln. Daher eignet sich diese Chininverbindung da, wo man eine allmähliche, also roborirende Wirkung des Chinins beabsichtigt. In Fällen, in welchen eine schnelle Chininwirkung erwünscht ist, wird es nicht gegeben. Als Roborans, bei Diarrhoe, gegen Nachtschweiss, giebt man es zu 0,2—0,5 g dreimal täglich in Pulvern oder Pillen. Ausserlich hat es in Haarpomaden als Mittel gegen das Haaransfallen Anwendung gefunden.

II Chininum tannicum insipidum Rozsnyay Rozsnyay's geschmackloses Chinintannat. Vorschrift der Pharm. Hungar. 40 Th gewöhnliches Chininsulfat werden in 1200 Th destillirtem Wasser und der nöthigen Menge verdünnter Schwefelsäure (wozu aber nicht mehr als höchstens 35 Th einer 16proc. Säure Germ. III gebraucht werden dürfen) gelöst. Der filtrirten Lösung wird unter beständigem Umrühren allmählich zu gefügt eine Auflösung von 80 Th Gerbsäure in 560 Th destillirtem Wasser. Alsdann wird in die so erhaltene Flüssigkeit unter beständigem Umrühren eine weitere Lösung eingetragen aus 20 Th Gerbsäure, 320 Th destillirtem Wasser und 20 Th Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc. NH₃). Der Niederschlag wird nach 24stündigem Absetzen auf ein Filter gebracht, mit 400 Th destillirtem Wasser ausgewaschen, darauf durch leichtes Pressen von dem Ueberschuss an Wasser befreit. Den abgepressten Niederschlag erwärmt man als

¹⁾ Helv lässt mit Chloroform ausschütteln. Sie schreibt vor, 1 g Chinintannat mit 10 g Wasser anzureiben, mit 10 g (?) Acetnatron zu versetzen, $\frac{1}{2}$ Stunde auf dem Wasserbade zu digeriren und die Mischung nach dem Erkalten zweimal mit je 15 ccm Chloroform auszuschütteln. Bei der Angabe betr. die Gewichtsmenge des Acetnatrons scheint ein Druckfehler vorzuliegen.

dann mit 200 Th destillirtem Wasser, bis er zu einer durchsichtigen, gelblichen, harzigen Masse schmilzt. Diese wird nach dem Austrocknen in Pulverform gebracht.

Ein gelbliches, fast geschmackloses Pulver, welches in Wasser kaum, dagegen in 40 Th Spiritus löslich ist und 80—82 Th wasserfreies Chinin enthält. Gehaltsbestimmung s. oben.

Pulvis antirachiticus LOREY. Chinini tannici 1,0, Calci phosphorici 5,0, Sacchari Lactis 5,0. Viermal täglich 1 Messerspitze.

Chininum valerianicum.

Chininum valerianicum (Ergänzb. Helv.) Chininvalerianat. Valeriansaures Chinin. Baldriansaures Chinin. Valérianate de Quinine (Gall.) Quininae Valerianas (U-St.) $C_{20}H_{24}N_2O_3 \cdot C_8H_{10}O_2$. Mol. Gew. 420.

Darstellung. 40 Th Chininsulfat werden in einer Mischung aus 600 Th destillirtem Wasser und 35 Th verdünnter Schwefelsäure gelöst, die Lösung, wenn nothwendig, durch ein mit Wasser zuvor durchfeuchtetes lockeres Glaswollebüschchen filtrirt, mittelst eines Ueberschusses Natriumkarbonatlösung ausgefällt, der aus Chininhydrat bestehende Niederschlag mit kaltem Wasser ausgewaschen, noch feucht mit 100 Th Weingeist gemischt und unter gelinder Erwärmung gelöst, die Lösung dann mit einem Gemisch aus 11 Th officineller Valeriansäure und circa 20 Th Weingeist oder mit soviel jener Säure versetzt, dass eine neutrale oder ganz schwach saure Reaktion resultirt. Nachdem noch 100 Th warmes destillirtes Wasser hinzugesetzt sind, giesst man die noch warme Flüssigkeit auf Porcellanteller in 1 cm hoher Schicht aus und überlässt sie, mit Papier überdreht, an einem staubfreien, circa 25°, höchstens 30° C warmen Orte der freiwilligen Verdunstung. Das Chininvalerianat hinterbleibt je nach der Dauer der Verdunstung in zarten nadelartigen, prismatischen oder schief rhombischen tafelförmigen Krystallen. Die Ausbeute beträgt circa 30 Th. Die Krystalle enthalten kein Krystallwasser und sind an der Luft beständig.

Beim Abdampfen concentrirter Chininvalerianatlösungen bei einer Wärme von circa 60° C scheidet sich das Chininvalerianat nicht in Krystallen ab, sondern schmilzt im Augenblicke der Ausscheidung zu einer klaren Flüssigkeit, welche in Tropfen theils auf der Oberfläche der Lösung schwimmt, theils sich harzähnlich an die Wandung des Abdampfgefässes ansetzt. Dieses amorphe Valerianat ist von derselben Zusammensetzung wie das krystallisirte Salz, also nur geschmolzenes Valerianat. Das Abdampfen der Lösungen in der Wärme vermeidet man deshalb.

Eigenschaften. Schuppige, glänzende, weisse Krystalle oder ein weisses mikrokrySTALLINISCHES Pulver von deutlichem Geruche nach Baldriansäure und von bitterem Geschmack. Es löst sich in 60 Th kaltem Wasser und in etwas weniger als 1 Th Weingeist. Es schmilzt, nachdem es über Schwefelsäure völlig ausgetrocknet worden war, bei 90° C, nicht völlig wasserfreie Präparate besitzen niedrigeren Schmelzpunkt. Die wässrige Lösung ist gegen Lackmus neutral oder sie reagirt nur ganz schwach alkalisch. Sie giebt die Thalleiochin-Reaktion und nimmt auf Zusatz von verdünnter Schwefelsäure blaue Fluorescenz an.

Prüfung. Die wässrige Lösung (1 = 20) sei neutral und werde durch Baryumnitratlösung (Schwefelsäure) und Silbernitratlösung (Chlor) nicht, oder nur ganz unbedeutend getrübt. Beim Durchfeuchten mit Schwefelsäure werde es nur gelblich (dunkle Färbung = Kohlehydrate), mit Salpetersäure nicht deutlich gelb oder roth (Morphin, Brucin) gefärbt. — Bei mehrstündigem Trocknen bei 100° C soll es nicht mehr als 5 Proc an Gewicht (Wasser) verlieren. — 2 g Chininvalerianat werden mit 1 g Ammoniumsulfat innig gemischt, die Mischung wird mit 20 g Wasser von höchstens 40° C angerieben und 2 Stunden lang bei 40° C stehen gelassen. Nachdem die erkaltete Mischung noch 1 Stunde lang bei 15° C

gestanden hat und mehrmals umgerührt worden ist, wird sie durch ein Filter von 7 cm Durchmesser gegossen 5 ccm des Filtrates (welches eine gesättigte Lösung von Chininsulfat darstellt), in ein trockenes Probirrohr gebracht, sollen, mit 4 ccm Ammoniakflüssigkeit gemischt und geschüttelt, eine klare Lösung geben. (Prüfung auf unzulässigen Gehalt von Neben-Alkaloiden, vergl. Chininum sulfuricum)

Anwendung Innerlich in Gaben von 0,05—0,5 g bei intermittierenden Neuralgien namentlich auf hysterischer Grundlage und bei febris intermittens mit grosser Reizbarkeit des Magens Nicht in Lösung, sondern in Form von Pulvern oder Pillen

Chininum valerianicum cum Antipyrino Antipyrin-Chininvalerianat Man löst gleiche Theile Antipyrin und Chininvalerianat unter Erwärmen in Weingeist und überlässt diese Lösung in einem flachen Gefässe, durch Ueberdrehen mit Papier vor Staub geschützt, der Verdunstung an einem warmen Orte Weisses krystallinisches Pulver

Elixir Ammonii Valerianatis et Quininae (Nat form) Elixir of Ammonium Valerianate et Quinine (Nat form) Chinini hydrochlorici 4,25, Elixir Ammonii valerianici (Nat form) q s ad 1000,0 ccm

Elixir Ammonii valerianici U St Rp Ammonii valerianici 35,0 g, Chloroformi 0,8 ccm, Tincturae Vanillae U-St, Tincturae Personis (Cudbear) aa 16,0 ccm Liquefis Ammonii caustici q s ad reactionem alcalinam, Elixir aromatici (U St) q s ad 1 Liter

Elixir Quininae Valerianatis et Strychninae (Nat form) Elixir of Chinine Valerianate and Strychnine (Nat form) Rp Chinini valerianici 17,5, Strychnini sulfurici 0,175, Tincturae Personis (Cudbear) compositi 15 ccm, Elixir aromatici (U-St) q s ad 1 Liter

Tinctura Personis. Tincture of Cudbear (Nat form) Orseille pulv 125,0 wird mit einer Mischung von 1 Vol Alkohol (95 Vol Proc) 2 Vol Wasser zu 1 Liter Tinktur perkohrt

Tinctura Personis composita. Compound Tincture of Cudbear (Nat form) Orseille pulv 20,0, Caramel 100,0 Wird mit einer Mischung aus 1 Vol Alkohol (95 Vol Proc) und 2 Vol. Wasser zu 1 Liter Tinktur verarbeitet.

Chinini salia varia.

Im Nachstehenden sollen eine Anzahl von Chininsalzen und anderen Verbindungen besprochen werden, welche gelegentlich einmal therapeutisch angewendet werden, oder welche mit Rücksicht auf ihre sonstigen Eigenschaften analytisch von Wichtigkeit sind

I Chininum aceticum Basisches Chininacetat $C_{20}H_{24}N_2O_3 \cdot C_2H_4O_2$ Mol Gew. = 384. Bildet lange, farblose, seidenglänzende Nadeln Man stellt es dar durch Fallen einer warmen Lösung von 10 Th Chininsulfat in 500 Th Wasser mit einer gleichfalls warmen Lösung von 4 Th kryst Natriumacetat in 50 Th Wasser Die nach dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle werden durch Umkrystallisiren gereinigt und bei 25° C. getrocknet Ausbeute 8 Th Es ist in circa 600 Th kaltem, 20 Th heissem Wasser und in 7 Th Weingeist löslich Bei 100° C verliert es etwas Essigsäure Es wurde von HARLESS wegen der mildernden Wirkung auf den Magen empfohlen

Es wird therapeutisch kaum angewendet, entsteht aber gelegentlich einmal bei Anstellung von Reaktionen

Wird freies Chinin oder das Chininacetat in überschüssiger Essigsäure aufgelöst, so krystallhant beim freiwilligen Verdunsten das neutrale Chininacetat $C_{20}H_{24}N_2O_3 \cdot 2(C_2H_4O_2) + 3H_2O$ in glänzenden Nadeln aus

II Chininum albuminatum (hydricum) Chininalbuminat Es wurde von TAROZZI durch Umsetzung der Lösungen von Chininsulfat mit Natriumalbuminat (Hühner-eiweiss) erhalten und soll aus 54 Th. Chinin und 46 Th. wasserhaltigem Albumin bestehen

Ein weisses, amorphes, sehr bitter schmeckendes Pulver, in heissem Wasser leichter löslich als in kaltem Noch löslicher ist es in Wasser, welches mit Milchsäure oder mit Salzsäure angesäuert ist oder in künstlichem Magensaft Es soll vom Magen aus resorbiert

werden und vor anderen Chininsalzen den Vorzug haben, dass es von den Körpersäften nicht zersetzt wird

III †† **Chininum arsenicicum** Arsensaures Chinin. Chininarseniat $2[C_{20}H_{24}N_2O_2] H_3AsO_4 + 8H_2O$ Mol Gew = 934. Ist bereits auf S 396 abgehandelt worden

IV †† **Chininum arsenicosum** Chininarsenit. Arsenigsaures Chinin $H_3AsO_4 \cdot 3[C_{20}H_{24}N_2O_2] + 4H_2O$. Mol Gew = 1170

Diese Verbindung kann nicht durch Neutralisiren von Chinin mit arseniger Säure und Abdampfen der Lösung, sondern muss durch Umsetzen von Silberarsenit mit Chininchlorhydrat dargestellt werden. Man bringt in einen Kolben eine Mischung aus 100 Th Silberarsenit ($As_2O_3Ag_2$) mit 226 Th Chininchlorhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl + 2H_2O$), übergiesst mit einer hinreichenden Menge verdünntem Weingeist (von 70 Vol Proc) und erhitzt längere Zeit am Rückflusskühlen. Beim freiwilligen Verdunsten des Filtrates hinterbleibt das obige Salz in langen, seidenglänzenden, concentrisch gruppirten Nadeln, welche schwer in kaltem oder heissem (1:150) Wasser löslich, leicht löslich dagegen in Alkohol, Aether oder Chloroform sind. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

Das Chininarsenit des Handels ist häufig nur ein Gemenge von Chinin mit arseniger Säure, man prüfe es durch das Mikroskop und stelle fest, ob es in Alkohol, Aether und Chloroform leicht und ohne Rückstand löslich ist.

V **Chininum benzoicum** Chininbenzoat. Benzoesaures Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_7H_5O_2$ Mol Gew = 446

Zur Darstellung lost man 10 Th Benzoesäure (s *Toluol* s S 15) in 60 Th Alkohol und neutralisirt diese Lösung durch Zufugung von 26,6 Th wasserfreiem Chinin oder 31,0 Th Chininhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$). Die neutrale, alkoholische Lösung wird, vor Staub geschützt, an einem warmen Orte zur Verdunstung gebracht.

Kleine, weisse Prismen, in etwa 350 Th Wasser löslich. Die Lösung wird durch Ferrichlorid rothbraun gefärbt (Ferribenzoat), sie giebt ferner die Thalliochin Reaction.

VI **Chininum boricum** Chininborat. Borsaures Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot BO_3H_2$ Mol. Gew = 386. Zur Darstellung fällt man mittels Natronlauge aus 10 Th officinellen Chininsulfat das Chinin als Chininhydrat aus, wäscht es mit kaltem Wasser vollständig aus, rührt es mit einer kalt gesättigten Lösung von 1,4 Th Borsäure an, trocknet die Mischung an einem warmen Orte aus und zerreibt den hinterbleibenden Rückstand. Gelblich-weißes Pulver. Dieses Präparat kann ersetzt werden durch eine Mischung von 10 Th wasserfreiem Chinin ($C_{20}H_{24}N_2O_2$) mit 1,91 Th Borsäure.

VII **Chininum camphoricum** Kamphersaures Chinin. Chinincamphorat. $[C_{20}H_{24}N_2O_2]_2 \cdot C_{16}H_{16}O_4$ Mol. Gew = 848

Wird gewonnen durch Eindunsten einer alkoholischen Lösung aus 10 Th Kamphersäure und 37,8 Th Chininhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$). Weisses Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol. Wird wie das Chininsulfat angewendet.

VIII † **Chininum carbolicum** Phenol-Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_6H_5O$ Mol Gew. = 418. Man trägt in eine heisse Auflösung von 34,4 Th wasserfreiem Chinin in 100 Th Weingeist 10 Th krystallisirtes Phenol ein. Die obige Verbindung scheidet sich beim Erkalten in zarten weissen Nadeln aus. Man kann auch die alkoholische Lösung an einem warmen Orte freiwillig abdunsten lassen und den Rückstand austrocknen und pulvern.

Löslich in 400 Th Wasser und in 80 Th Alkohol. Dosis 0,2—0,5 g drei- bis viermal täglich.

IX **Chininum carbonicum** Chininkarbonat Kohlensaures Chinin $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot H_2CO_3 + H_2O$ Mol Gew. = 404. Dieses Salz kann durch Umsetzen von Chininsalzlösungen mit Alkalikarbonaten nicht dargestellt werden, da sich hierbei unter Entweichen von Kohlensäure Chininhydrat ausscheidet. Man erhält es, indem man frisch gefälltes und gut ausgewaschenes Chininhydrat in Wasser vertheilt und in die Flüssigkeit gewaschene Kohlensäure bis zur völligen Auflösung des Chininhydrates einleitet. Aus der Lösung

scheidet sich allmählich das Chininkarbonat in feinen weissen Nadeln aus. Das Chininkarbonat ist ziemlich löslich in Wasser zu einer alkalisch reagierenden Flüssigkeit, die nicht so stark bitter schmeckt als die gewöhnlicher Salze. Auch in Alkohol ist es löslich. Indessen ist das Salz von nur beschränkter Haltbarkeit, da es allmählich in Kohlensäure und Chinin zerfällt. In Säuren löst es sich unter Aufbrausen.

X Chininum chinicum Chinasäures Chinin Chininchinat $C_{20}H_{24}N_2O_2$
 $C_7H_{12}O_6 + 2H_2O$ Mol Gew = 552 Zur Darstellung mischt man eine alkoholische Lösung von 10 Th. Chininhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$) mit einer alkoholischen Lösung von 5,1 Th. Chinasäure und überlässt die Flüssigkeit an einem warmen Orte der Verdunstung. Kleine weisse Nadeln, in etwa 3 Th. Wasser oder in 10 Th. Alkohol löslich.

XI † Chininum chromicum Chininchromat. Chromsäures Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2$
 $\cdot H_2CrO_4 + 2H_2O$ Mol Gew = 478

Zur Darstellung löst man 10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. Wasser und vermischt diese Lösung mit einer zweiten Lösung aus 2,5 Th. neutralem Kalumchromat in 60 Th. Wasser unter Umrühren. Der sich ausscheidende gelbe Niederschlag wird gesammelt, mit kaltem Wasser gewaschen und aus siedendem, verdünntem Alkohol umkrystallisiert. Glänzende, gelbe Nadeln, in 2400 Th. kaltem oder 160 Th. siedendem Wasser löslich.

XII Chininum ferrocyanatum Ferrocyanwasserstoffsäures Chinin Eisenchlansäures Chinin Ferrocyanhydrate de Quinine (Gall) $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot Fe(CN)_4H_4 + 2H_2O$. Mol Gew = 576

Die Darstellung dieses Salzes erfolgt, indem man alkoholische Lösungen von 10 Th. Chininhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$) und 5,71 Th. Ferrocyanwasserstoffsäure (s. bei Kalium ferrocyanatum) mischt und der freiwilligen Verdunstung überlässt. — Man erhält es so in gelben, nadelförmigen Krystallen, während es sich beim Verdampfen der Lösungen in der Hitze als amorphe harzige Masse abscheidet.

Es ist kaum löslich in Wasser, leicht löslich dagegen in Alkohol, besonders beim Erwärmen, es verwittert an der Luft und ist von bitterem Geschmack. Es enthält 56,25 Proc. Chinin und 6,25 Proc. Wasser.

Beim Verbrennen hinterlässt es eine kleine Menge Eisenoxyd, welches frei ist von löslichen Salzen. Die wässrige Lösung werde durch Baryumchlorid nicht getrübt (Chininsulfat).

XIII Chininum glycerino-phosphoricum Glycerinphosphorsäures Chinin $PO_4H_3(C_2H_5O_2)(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2 + 4H_2O$. Mol. Gew = 892

Zur Darstellung setzt man eine wässrige Lösung von 10 Th. Calciumglycerophosphat (s. S. 96) in 300 Th. Wasser mit einer Lösung von 34,3 Th. Chininchlorhydrat in 1000 Th. Wasser um. Der entstehende Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser gewaschen und nach dem Absaugen getrocknet.

Feine weisse Krystallnadeln, äusserlich an das gewöhnliche Chininsulfat erinnernd, sie sind geruchlos, von bitterem Geschmack, aber nicht so stark bitter wie Chininsulfat. Löslich in 200 Th. kaltem oder in 100 Th. siedendem Wasser, löslich in 40 Th. kaltem Alkohol, leicht löslich in siedendem Alkohol, auch löslich in concentrirtem Glycerin, unlöslich in Aether. Schm.-P. 145° C.

Löst man das Salz in Chlorwasser, so wird die Lösung auf Zusatz von überschüssiger Ammoniakflüssigkeit grün gefärbt (Thalleiochin-Reaktion). Dagegen ist die Phosphorsäure erst nach Zerstörung des Moleküls nachzuweisen. Vergl. S. 95.

Prüfung. Zur Wasserbestimmung wird eine gewogene Menge des Salzes bei 100° C. getrocknet. Darauf löst man den Rückstand in salzsaurem Wasser, fällt das Chinin mit Natronlauge, sammelt es auf einem Filter, wäscht es aus, trocknet und wägt es. — Das Filtrat wird eingedampft und nach Zusatz von Kaliumcarbonat + Kaliumnitrat versächt. Die Asche wird mit salpetersäurehaltigem Wasser aufgenommen, man fällt und bestimmt die Phosphorsäure nach der Molybdän-Methode, s. S. 92.

XIV Chininum hydrojodicum Chininhydrojodid. Chininjodhydrat Jodwasserstoffsäures Chinin $C_{20}H_{21}N_3O_2$ HJ. Mol Gew = 452. Zur Darstellung löst man 10 Th Chininchlorhydrat in 300 Th warmem destillirten Wasser und versetzt diese Lösung unter Umrühren mit einer anderen, aus 6 Th Kaliumjodid mit 12 Th destillirtem Wasser bereiteten (Gegenwart von Säure ist auszuschließen, weil sonst braune Niederschläge ausfallen) Der sich nach einigen Stunden in der erkalteten Flüssigkeit absondernde, gelbliche, harzige Niederschlag wird an einem lauwarmen Orte ausgetrocknet, zu Pulver zerrieben und in einer Glasflasche vor Sonnenlicht geschützt aufbewahrt Ausbeute 20–21 Theile Es ist in kaltem Wasser sehr schwer, in kochendem Wasser leicht, auch in Weingeist und Aether löslich

Das Chininhydrojodid wurde gegen Intermitteas bei Skrophulosen empfohlen und zu 0,2–0,3–0,5 g gegeben Es dürfte dieses Salz durch einfache Mischung vollständig ersetzt werden Zur Darstellung von 1,0 Chininhydrojodid *ex tempore* genügen 0,95 Chininsulfat und 0,4 Kaliumjodid

XV Chininum hydrojodicum ferratum Ferro-Chininum hydrojodicum. *Jodure de Fer et de Quinine.* 10,0 Chininsulfat werden in 90,0 Weingeist gelöst und mit einer kalten Lösung von 6,3 Kaliumjodid in 17,5 frischbereiteter Ferrojodidlösung versetzt Nach halbstündiger Digestion wird die heisse Flüssigkeit filtrirt, das Filtrat mit etwas heissem Weingeist nachgewaschen und das Filtrat ein bis zwei Tage bei Seite gestellt Die abgeschiedenen gelbgrünlichen Krystalle werden ohne Warmanwendung so schnell als möglich trocken gemacht und in gut verstopftem Glasgefasse vor Licht und Luft geschützt aufbewahrt Dieses Präparat ist sehr leicht zersetzlich, so dass es BOUCHARDAT, der Urheber dieses Präparats, obgleich er es von vorzüglicher Wirkung bei Chlorose, Intermitteas und Scrophulosis findet, dennoch zu extemporiren vorschlägt

Pillulae Chinini hydrojodici ferrati		Sirupus Chinini hydrojodici ferrati	
BOUCHARDAT		BOUCHARDAT	
Rp	Ferri protojodati 5,0	Rp	Jodi 5,0
	Chinini sulfurei		Ferri pulverati 2,0
	Mellis 33 1,0		Aquae 20,0
	Radici Liquiritiae pulveratae q s	Digere per aliquot momenta, cum liquorem coloris viridulum commisce cum Sirupi Sacchari 1120,0	
Fiant pilulae 50		Deinde adde liquorum paratum a	
2–6 Pillen täglich (bei Chlorosis, die Dosis allmählich steigend) oder 12–18 Pillen täglich (bei Intermitteas)			Chinini sulfurei 1,0
			Acidi sulfurici gtt 15
			Aquae destillatae 10,0
		Wird kistelförmig bei Scrophulosis genommen	

† **Chininum jodo-hydrojodicum** Jod-jodwasserstoffsäures Chinin $C_{20}H_{21}N_3O_2$ J. J. H. Mol Gew. = 579

Wird durch Fällen einer Chininsalzlösung (z. B. Chininum hydrochloricum) mit Jodkaliumlösung erhalten Der entstandene Niederschlag wird mit kaltem Wasser gewaschen und auf porösen Unterlagen bei 25–30° C getrocknet

Kermesbraunes, in Wasser unlösliches, in Alkohol lösliches Pulver Der Jodgehalt beträgt 43,8 Proc Es wurde neuerdings von ASSAKY als Jodpräparat bei syphilitischen Erkrankungen empfohlen Rp Chinini jodo-hydrojodici 10,0, Kaolini puri 2,0, Mucilaginis Gummi arabici q s fiant pilulae 80, conspurgendae Talco veneto

XVI Chininum hypophosphorosum (falschlich Chininum hypophosphoricum). Chininhypophosphit Unterphosphorigsäures Chinin $C_{20}H_{21}N_3O_4$ $H_2P_2O_6$ Mol. Gew. = 390 — 5 Th Calciumhypophosphit (s S 561) werden in 120 Th Wasser gelöst und mit einer Lösung von 25 Th Chininsulfat in 400 Th Weingeist durchmischt Nach mehrmaligem Umrühren und einstündiger Digestion wird filtrirt und das Filtrat durch Abdampfen um $\frac{2}{3}$ seines Volumens vermindert zur Krystallisation bei Seite gestellt etc Das durch gelindes Pressen zwischen Filtrpapier zum Theil entfeuchtete Salz wird an einem kaum lauwarmen Orte trocken gemacht Ausbeute 17–18 Th

Es ist ein farbloses, lockeres, aus sehr kleinen Prismen bestehendes Salz, löslich in 60–70 Th. kaltem, 15 Th kochendem Wasser, leicht löslich in Weingeist

Das Chininhypophosphit wurde von LAWRENCE SMITH als Mittel bei Lungenphthisis, Cachexie, Skropheln empfohlen und von ihm Hypophosphate of Quinia genannt. Dosis 0,05—0,1—0,15 täglich drei- bis viermal. Dieses kaum in Anwendung kommende Salz lässt sich durch Mischung extemporieren. Für 1,0 desselben sind 1,0 Chininchlorhydrat und 0,24 Calciumhypophosphit erforderlich.

XVII Chininum lacticum Chininlactat. Milchsäures Chinin. Lactate de Quinine (Gall.) $C_{10}H_{14}N_2O_2 \cdot C_3H_5O_2$ Mol. Gew. = 414. Zur Darstellung vertheilt man 10 Th Chininhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_4 + 3H_2O$) in etwa 150 Th Wasser und neutralisirt unter Erwärmen durch Zugabe einer hinreichenden Menge (3,2 Th) Milchsäure von 75 Proc. — Die neutrale Flüssigkeit wird noch warm filtrirt, bei nicht über 60° C eingedunstet und über Schwefelsäure zur Krystallisation gebracht.

Farblose, prismatische Nadeln ohne Krystallwasser, dem officinellen Chininsulfat ähnlich. Löslich in 3 Th kaltem oder in weniger als 1 Th siedendem Wasser zu einer neutralen Flüssigkeit, sehr leicht löslich in Alkohol von 90 Proc, fast unlöslich in Aether. Das Salz enthält 78,26 Proc. Chinin.

Chinum ferro-lacticum Chininum lacticum martiatum. Chinineisenlactat, ein Gemisch aus Chininlactat und Ferrilactat, entsprechend dem Chinineisencitrat. Es wird wie dieses aus 10,0 Chininhydrat, 5,0 oder der genügenden Menge Milchsäure, 80,0 Ferrilactat (Ferrum lacticum oxydatum in hellbraunen Lamellen) und der genügenden Menge Wasser gemischt, so dass eine sirupdicke Flüssigkeit entsteht, welche auf Glas tafeln ausgestrichen und am schattigen Orte getrocknet wird. Es bildet bitter-eisenhalt schmeckende braune Lamellen mit etwa 10 Proc Chinin Gehalt.

XVIII Chininum oleicum Oleatum Quininae (Nat Form) Oleate of Quinine Man reibt 25,0 Th bei 100° C völlig ausgetrocknetes, wasserfreies Chinin mit 75,0 Th möglichst reiner Oelsäure an und erwärmt die Mischung, bis das Chinin gelbst ist. Es ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch von etwa 50 Proc Chininoleat mit etwa 50 Proc freier Oelsäure. Es löst sich in Alkohol, in Aether und in fetten Oelen und wird innerlich als Antipyreticum und Antiperiodicum, äusserlich in Salbenform angewendet.

XIX † Chininum oxalicum Chininoxalat. Neutrales (basisches) oxalsaures Chinin. $[C_{10}H_{14}N_2O_2]_2 \cdot C_2O_4H_2 + 6H_2O$ Mol. Gew. = 846.

Man löst 10 Th gewöhnliches Chininsulfat in 350 Th siedendem destillirten Wasser auf und mischt eine heisse Lösung von 3 Th neutralem Kaliumoxalat in 50 Th Wasser hinzu. Die nach dem Erkalten ausgeschiedenen Krystalle werden mit wenig Wasser gewaschen und an der Luft rasch getrocknet. Farblose, lange, leicht verwitternde Prismen, in etwa 1400 Th Wasser löslich.

XX Chininum phosphoricum Chininphosphat. Phosphorsaures Chinin $[C_{10}H_{14}N_2O_2]_2 \cdot H_3PO_4 + 8H_2O$ Mol. Gew. = 890.

Neutralisirt man heisse verdünnte Phosphorsäure mit freier Chininbase, so krystallisiren aus der Lösung Nadeln der Zusammensetzung $3[C_{10}H_{14}N_2O_2] \cdot 2[PO_4H_2]$ bald mit 5, bald mit $12H_2O$. Das Salz obiger Zusammensetzung erhält man wie folgt.

Man löst 10 Th Chininchlorhydrat in 300 Th Wasser und fällt diese Lösung mit einer anderen aus 4,6 Th kryst. Natriumphosphat ($Na_2HPO_4 + 12H_2O$) in 100 Th Wasser. Der entstandene Niederschlag wird aus siedendem Wasser umkrystallisirt. Farblose, seiden glänzende, lange Nadeln, in etwa 700 Th Wasser löslich.

Nach HARLESS und PEREIRA soll es besser vertragen werden als das Chininsulfat. Sie empfehlen es besonders bei lentesirenden Fiebern, atonischen Gichtfebern mit coll quativen Schweissen, atonischer Leucorrhoe und atonisch cachectischer Chlorose. Dosis wie vom Chininsulfat.

XXI. † Chininum picricum Chininpikrat. Pikrinsaures Chinin Wird erhalten, wenn man eine Lösung von Chininchlorhydrat mit einer wässrigen Pikrinsäure-

lösung, welche im massigen Ueberschuss zuzusetzen ist, fällt. Durch freiwilliges Verdunsten der alkoholischen Lösung erhält man gelbe, nadelförmige Krystalle.

Gelbes, krystallinisches Pulver, in Wasser fast unlöslich.

XXII Chininum saccharinum FAHLBERG's Saccharin-Chinin. Zur Darstellung werden 64 Th wasserfreies Chinin mit 36 Th Saccharin vermischt, mit verdünntem Weingeist zum Brei angerührt, den man unter Umrühren zum Trocknen verdunstet. Weisses Pulver von nur schwach bitterem Geschmack. Dieser kann durch Vermischen des Präparates mit gleich viel Saccharin noch vollständiger beseitigt werden. Es ist in kaltem wie in heissem Wasser nur wenig löslich und eignet sich deshalb besonders für Pulvermischungen.

XXIII Chininum sulfo-aethylicum Chininum aethylosulfuricum. Chininum sulfovinicum (?). Aethylschwefelsaures Chinin. Chininäthylsulfat ($C_{10}H_{21}N_2O_2$). $SH[C_2H_5]O_4$. Mol. Gew. = 450. Wird durch Doppelersetzung aus 100 Th saurem Chininsulfat und 35,7 Th trockenem oder 39 Th krystall. Baryumäthylsulfat dargestellt. Baryum- und Chinarsalz werden in der geringsten Menge heissen Weingeistes gelöst und gemischt, ein Ueberschuss des einen oder des anderen Salzes ausgeglichen, das Filtrat durch Abdampfen bei gelinder Wärme eingetrocknet und der Rückstand ausgetrocknet. Ausbeute circa 100 Th.

Das Chininäthylsulfat enthält 72 Proc. trocknes Chinin und bildet ein weisses krystallinisches, sehr bitteres, in gleichviel Wasser, leicht in Weingeist, nicht in Aether lösliches Pulver. Die wässrige Lösung ist nicht fluorescierend und reagirt schwach alkalisch.

Dieses in Wasser sehr leicht lösliche Salz ist von JAILLARD zu hypodermatischen und auch anderen Injektionen empfohlen worden, und sollen bei der hypodermatischen Anwendung die örtlichen Nachwirkungen nicht eintreten, insofern es sich gegen die Albuminkörper und das organische Gewebe indifferent verhält.

XXIV Chininum sulfophenicum Chininum sulfocarboicum Phenolsulfosaures Chinin. Carbolschwefelsaures Chinin. Carbolsulfosaures Chinin ($C_{10}H_{21}N_2O_2$) ($C_6H_4[OH]SO_3H$). Mol. Gew. = 408.

Zur Darstellung löst man 10 Th. Phenolsulfosaures Baryum (über die Bereitung des selben s. S. 87) in 80 Th. Wasser und setzt es unter Erhitzen mit einer heissen Lösung von 16,6 Th gewöhnlichem Chininsulfat in 800 Th Wasser so um, dass unter keinen Umständen Baryumsalz, sondern eher eine kleine Menge unorganischer Schwefelsäure in Lösung ist. Man lässt absetzen, filtrirt, dunstet das Filtrat bei mässiger Wärme ein und setzt das Trocknen im Wasserbadtrockenschranke, schliesslich im Vakuum Exsikkator fort.

Gelblichweisse, harzartige, in der Wärme erweichende Masse, schwerlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol.

XXV Chininum stearicum Chininum stearicum. Chininstearinat. Chininstearat. Talgsaures Chinin. 30 Th Chininsulfat, gelöst in 300 Th destillirtem Wasser und 20 Th verdünnter Schwefelsäure, werden mit einer wässrigen Lösung von 23 Th trockenem Natriumstearat in 300 Th heissem Wasser gemischt, die entstandene breiige Masse den folgenden Tag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, ausgepresst und an einem lauwarman Orte getrocknet. Man kann auch 10,0 Chininhydrat und 7,5 Stearinsäure in 50,0 absolutem Weingeist unter Digestionswärme lösen und die Lösung im Wasserbade eintrocknen. Erkalte wird es zu einem Pulver zerrieben.

Es ist ein weisses, in Wasser kaum lösliches Pulver von weit weniger bitterem Geschmacke als das Chininsulfat. Dosis 0,1—0,3—0,6. Es ist nur selten versucht worden, heute wohl nicht mehr im Gebrauch.

XXVI Chininum tartaricum. Chinintartrat neutrales bez. basisches Weinsaures Chinin [$C_{10}H_{21}N_2O_2$], $C_4H_6O_6 + 2H_2O$. Mol. Gew. = 334. Wird als weisser krystallinischer Niederschlag erhalten, wenn man eine lauwarm bereitete Lösung von 15 Th Chininsulfat mit einer Lösung von 4 Th neutralem Kaliumtartrat fällt. In Wasser sehr schwer löslich.

Chininum bitartaricum, saures weinsaures Chinin, scheidet sich in Krystallen $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_4H_4O_6 + H_2O$ ab, wenn man eine alkoholische Lösung von 10 Chininhydrat ($C_{20}H_{24}N_2O_2 + 3H_2O$) und 4 Th Weinsäure der freiwilligen Verdunstung überlässt

Chininum tartarico-sulfuricum. **Chininum sulfurico-tartaricum** Sulfotartrate de Quinine. Ist eine Mischung aus 2 Th. gewöhnlichem Chininsulfat und 1 Th Weinsäure

XXVII. Chininum uricum **Chininum uranicum**. **Chininurat** Harnsaures Chinin. Das aus 12,5 Chininsulfat durch Natriumkarbonat abgeschiedene und noch feuchte Chininhydrat wird mit 5,0 Harnsäure und 100,0 heissem destilliertem Wasser gemischt und im Wasserbade zur Trockne eingedampft. Will man es in zarten farblosen Krystallen gewinnen, so löst man es in kochendem Weingeist und bringt die Lösung zur Krystallisation. Dosis auf den Tag 0,2–0,8. Es wurde von PEREYRE empfohlen, ist aber, wie es scheint, nicht in den Gebrauch gekommen. Der Gebrauch beim niederen Volke, den eigenen Harn gegen Intermittens zu trinken, soll PEREYRE (1860) auf den Gedanken gebracht haben, das Chininurat in den Arzneischatz einzuführen. Er behauptet, dass es in weit kleineren Gaben Hilfe leistet als das Chininsulfat, und nicht die unangenehmen Nebenwirkungen des Chinins offenbare.

Chinaphtholum β -Naphthol α -monosulfosaures Chinin. $C_{20}H_{24}N_2O_2 [C_{10}H_6(OH)SO_3H]_2$. Mol. Gew. = 772.

Wird durch Fällen einer Lösung von Chininchlorhydrat mit einer Lösung von β -Naphthol- α monosulfosaurem Natrium erhalten. Gelbes, krystallinisches, bitterschmeckendes, in kaltem Wasser nicht, aber in heissem Wasser, sowie in Alkohol etwas lösliches Pulver. Schmelzpunkt 185–188° C. Es enthält 42 Proc Chinin. Bei Typhus abdominalis, Darmtuberkulose, Dysenterie, akutem Gelenkrheumatismus, in Gaben von 0,5–3,0 g pro die.

Chininum anisatum Anethol-Chinin $[C_{20}H_{24}N_2O_2]_2 \cdot C_{10}H_{12}O + 2H_2O$. Mol. Gew. = 832.

Man löst 5 Th Chininhydrat in 100 Th siedendem Alkohol und fügt zur Lösung 1 Th Anisöl (Anethol). Beim Erkalten scheidet sich obige Verbindung in glasglänzenden Rhombenoktaedern aus, welche kaum in Wasser oder kaltem Weingeist löslich sind, dagegen von Aether oder heissem Weingeist leicht gelöst werden. Durch Salzsäure wird die Verbindung zerlegt unter Bildung von Chininchlorhydrat und Anethol.

Chininum eugenolicum Eugenol-Chinin Nelkensaures Chinin $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{12}O_2$. Mol. Gew. = 498. Wird in gleicher Weise wie das Anethol Chinin dargestellt unter Ersatz des Anisöls durch Nelkenöl oder Eugenol.

† **Chloral-Chinin** $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot CCl_2CHO$. Mol. Gew. = 471,5. 324 Th wasserfreies Chinin werden in Chloroform gelöst. Diese Lösung wird mit Aether verdünnt und in ihr werden 147,5 Th wasserfreies Chloral (nicht Chloralhydrat!) aufgelöst. Die sich massenhaft ausscheidenden Krystallwarzen erscheinen nach dem Waschen mit Aether und Trocknen über Schwefelsäure als amorphe leichte Masse von bitterem Geschmack, die sowohl in angesäuertem Wasser, als auch in Weingeist löslich ist.

Chinoral. Soll als ölige, dickliche Flüssigkeit durch Kombination von Chinin mit Chloral erhalten werden und als Antisepticum Verwendung finden. Hersteller Apotheker K. MEYER in Apolda.

Chinin-Urethan Ist eine Mischung von 2 Th Chininum hydrochloricum und 1 Th Urethan. Dieses Gemisch, welches natürlich nicht vorrätig gehalten werden braucht, ist in Wasser sehr leicht löslich und wird von GAZIO an Stelle anderer Chininsalze zu subkutanen Injektionen empfohlen. Dosis 1,5 g Salz + 1 ccm Wasser.

Chinoidinum.

I. Chinoidinum. (Erganzb.) Chinoidin. Chinioideum. Chininum amorphum fuscum. Ein Nebenprodukt bei der Darstellung des Chinins aus den Chinurinden, welches besonders früher, als die Chinin-Preise sehr hoch waren, eine bedeutende Wichtigkeit hatte

Gewinnung. Die Mutterlaugen von der Chininfabrikation, aus denen die krystallisirbaren China-Alkaloide nach Möglichkeit abgeschieden sind, werden mit Natronlauge gefällt. Der harzartige Niederschlag wird zur Entfernung des Natrons und von Farbstoffen mit heissem Wasser geknetet.

Im Handel unterscheidet man ein rohes, gereinigtes und höchst gereinigtes Chinoidin (Chinoidinum crudum, depuratum, purissimum). Das letztere ist das Chinoidin des Ergänzungsbuches. Es wird aus dem rohen Chinoidin durch zweimaliges Auflösen in Salzsäure und Fällung, das erste Mal mittels Natriumkarbonat oder Natronhydrat, das andere Mal mit Ammoniak abgeschieden. Der Niederschlag wird schliesslich mit heissem Wasser ausgeknetet, bei gelinder Wärme geschmolzen, in Form von Tafeln oder cylindrischen Stangen gebracht und diese über Aetzkalk ausgetrocknet. Die einzelnen Stücke werden meist in Paraffinpapier eingehüllt.

Eigenschaften. Braune oder braunschwarze, harzartige Massen in der Form von Tafeln oder Stangen, leicht zerbrechlich, mit glänzendem, muscheligen Bruche. In Wasser ist es fast unlöslich, in siedendem Wasser schmilzt es. In (mit Salzsäure oder Essigsäure oder verdünnter Schwefelsäure) angesäuertem Wasser, in Weingeist und in Chloroform ist Chinoidin leicht löslich zu sehr bitter schmeckenden Flüssigkeiten. Die Lösungen in Alkohol und in Chloroform blauen rothes Lackmuspapier. Das Chinoidin giebt ebenso wie das Chinin und das Chinidin die Thalleiochin-Reaktion, d. h. Versetzt man die verdünnte salzsäure Lösung mit einer genügenden Menge starken Chlorwassers, so wird die Lösung auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss smaragdgrün gefärbt.

Das gegenwärtig im Handel befindliche Chinoidin besteht, abgesehen von kleinen Mengen Mineralstoffen (Natron), deren Anwesenheit sich aus der Art der Darstellung ergibt, fast ausschliesslich aus amorphen Chinabasen. Nach Hesse besteht die Hauptmenge aus einem Gemenge von amorphen Diconchinin und Diinchonin. Ausserdem sind wechselnde Mengen von Chinoin und Cinchonoin, den amorphen Umwandlungsprodukten des Chinins, Chinidins, Cinchonins und Cinchonidins, welche im Verlaufe der Fabrikation aus den krystallisirenden Basen entstehen, vorhanden.

Prüfung. 1) 1 g Chinoidin löse sich in einer Mischung von 1 ccm verdünnter Essigsäure (von 30 Proc) und 9 ccm Wasser klar oder doch nahezu klar auf. Ein erheblicher unlöslicher Rückstand würde zeigen, dass eine nicht oder nur mangelhaft gereinigte Sorte vorliegt. 2) In 10 ccm kaltem, verdünntem Weingeist sei 1 g Chinoidin klar löslich (wie sub 1). 3) Beim Verbrennen soll das Chinoidin nicht mehr als 0,6 Proc Asche hinterlassen (Mineralische Verunreinigungen). Die Lösung der Asche in schwach salzsauerm Wasser soll durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert werden (Dunkelfärbung — Blei oder Kupfer).

Aufbewahrung. Man schlägt die Tafeln bez Stangen des Chinoidins in Wachspapier ein und bewahrt sie in der Officin in Porcellanbüchsen, grössere Vorräthe in Blechgefassen an einem trocknen, kühlen Orte, am besten über Aetzkalk auf. — Beim Zerreiben im Porcellanmörser wird das Chinoidin elektrisch, das Pulver backt leicht zusammen. Durch Zerreiben im eisernen Mörser kann das Elektrischwerden vermieden werden.

Anwendung. Das Chinoidin wird in weingeistiger Lösung, in Pillen und Pulvern zu 0,2—0,5—1,0 g 2—4mal täglich in Stelle des Chinins gebraucht. In Säuren gelöst, sowie mit aromatischen Mitteln kombiniert, wird es vom Magen gut vertragen. In starken Gaben wird es nicht selten wieder ausgebrochen, weniger in saurer Lösung. Es ist für die Kinderpraxis von vielem Werthe, weil es, gröblich zerrieben und mit Butter gemischt,

auf Brod von Kindern, die nichts Bitteres einnehmen wollen, gegessen wird. Auch kann es als grobes Pulver, in eine gekochte Backpflaume gehüllt, den Kindern beigebracht werden. Die Dosis für 2 bis 6jährige Kinder ist 0,1—0,3—0,4 g.

Es ist zu beachten, das das Chinoidin nur als Fiebermittel und in kleinen Dosen als Stomachicum verwendbar ist, als Roborans kommt es dem Chinin kaum nahe. In starken Dosen (1,0—1,5) mit Säure verbunden, bewirkt es nach 20—30 Stunden gelind und schmerzlos klopösen Stuhlgang, ohne den Körper bemerkbar zu schwächen.

Chinoidinum citricum, Chinoidinitrat. Zur Darstellung sättigt man eine wässrige 16procentige Citronensäurelösung bei Digestionswärme mit Chinoidin. Die eingedampfte Lösung liefert ein trockenes amorphes, in dünnen Schichten durchsichtiges, bräunlich gelbes Salz. In analoger Weise werden dargestellt *Chinoidinum aceticum, Chinoidinum hydrochloricum* und *Chinoidinum sulfuricum*.

II Chinoidinum tannicum (Ergänzb.) Chinoidintannat. Chinoidintannat Gerbsaures Chinoidin

Zur Darstellung lost man 10 Th. Chinoidin unter Zugabe von 7,5 Th. Salzsäure (25 Proc.) in 500 Th. Wasser, vermischt diese Lösung mit einer kalten Lösung von 40 Th. Gerbsäure in 400 Th. Wasser und fügt eine Lösung von 20 Th. krystall. Natriumacetat in 200 Th. Wasser hinzu, wodurch zu dem zuerst ausgeschiedenen Niederschlage eine weitere Menge ausgefällt wird. Man sammelt den Niederschlag, wäscht ihn mit Wasser und trocknet ihn über Aetzkalk, Calciumchlorid oder Schwefelsäure.

Eigenschaften. Ein amorphes, bräunliches Pulver, von zusammenziehendem und zugleich bitterem Geschmacke, kaum löslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol, vollständig löslich in säurehaltigem Alkohol. — Die alkoholische Lösung des Chinoidintannates wird durch Ferrichloridlösung blauschwarz gefärbt (Reaktion der Gerbsäure). Das Präparat enthält die unter Chinoidin angegebenen amorphen Chinabasen an Gerbsäure gebunden.

Prüfung. 1) Wird 1 g Chinoidintannat in 4 cem Wasser suspendirt, die Mischung mit Natronlauge bis zur stark alkalischen Reaktion versetzt und mit 7 cem Chloroform ausgeschüttelt, so hinterbleibt nach dem Verdunsten der Chloroformschicht ein Rückstand, dessen Lösung in der 200fachen Menge saurehaltigen Wassers auf Zusatz von $\frac{1}{4}$ Volum Chlorwasser und überschüssige Ammoniakflüssigkeit grün gefärbt wird (Thalleiochin-Reaktion, s. S. 745). 2) Der unter Zusatz von Salpetersäure durch Schütteln und darauf folgendes Filtriren bereitete wässrige Auszug (1:50) werde durch Silbernitrat oder Baryumnitrat nicht sofort getrübt. 3) Chinoidintannat soll nicht mehr als 0,5 Proc. Asche enthalten. Die Asche ist in Salpetersäure zu lösen und abzdunsten, der in Wasser gelöste Verdampfungsrückstand ist mit Schwefelwasserstoffwasser auf Kupfer und Blei zu prüfen.

Mixtura Chinoidini.

Rp.	Tincturae Chinoidini	25,0
	Tincturae aromaticae	3,0
	Aquae Menthae piperitae	75,0

Morgens, Mittags und Abends einen halben Esslöffel voll.

Rp.	Pilulae contra febres recidivas	
	Chinoidini	15,0
	Acidi tartarici	5,0
	Aloës	0,5
	Liquoris Ferri sesquichlorati	7,5
	Extracti Gentianae	
	Glycerini	ss 5,0
	Pulveris aromatici q s	

Fiant pilulae 250, Cassia cinnamomea pulverata conspergendae.

Täglich des Morgens beim Frühstück und vor dem Abendbrod 4—5 Pillen (um die Wiederkehr des Wechselhebers zu verhüten).

Pilulae febrifugae Fieberpillen.

Rp.	Chinoidini	15,0
	Acidi tartarici	
	Pulveris aromatici	ss 5,0

Aloës 0,5

Extracti Gentianae q s

Fiant pilulae ducentae (200), Cassia cinnamomea pulverata conspergendae.
D S Morgens und Abends in der fieberfreien Zeit je 4—5 Pillen.

Pulvis febrifugus

Rp.	Chinoidini	10,0
	Corticis Chinae	15,0
	Corticis Cinnamomi Cassiae	
	Acidi tartarici	ss 5,0

Fiat pulvis Divide in partes aequales triginta (30) In der fieberfreien Zeit Morgens und Nachmittags ein Pulver mit Kaffee zu nehmen.

Sirupus febrifugus Sirupus amarus

Rp.	Chinoidini	2,0
	Acidi citrici	1,0
	Spiritus Vini	7,0

Contendendo mixtus adde
Sirupi Coffeae tostae 80,0.

Täglich zwei- bis dreimal einen bis zwei Theelöffel in der fieberfreien Zeit (für Kinder der Armen).

Tinctura Chinoidini (Germ II, Ergänz.-B.,
Hamb.-Vorsch.)
Chinoidintinktur Fiebertropfen
Rp Chinoidini 30
Spiritus diluti (70 Vol %) 17,0
Acidi hydrochlorici (25 %) 1,0
Tinctura Chinoidini composita
Tinctura febrifuga
Rp Chinoidini
Tincturae aromaticae aa 100,0

Acidi hydrochlorici 50,0
Spiritus Vini diluti 1000 0
Olei Cassiae cinamomeae 3 0
Macerando, saepius agitando fiat tinctura. In der
hiesigen Zeit alle drei bis vier Stunden einen
Theelöffel voll
Vut Vomacka's Rothsaufmittel
Rp Acidi hydrochlorici (25 %) 5,0
Chinoidini 1,0
Liquoris Subli chlorati 1,0

Chinolinum

! † Chinolinum (Ergänzb) Chinolin. Quinoline. Chinoline. C_9H_7N . Mol.
Gew = 129 Wurde durch Schmelzen von Chinin mit Kalihydrat (daher Chinolin, von
Oleum Chinae) erhalten, auch im Steinkohlentheer aufgefunden Das gegenwärtig in der
Therapie verwendete Chinolin wird jedoch ausschliesslich synthetisch nach dem von SKRAUP
angegebenen Verfahren dargestellt

Darstellung Man mischt 24 Th Nitrobenzol mit 33 Th Anilin, 120 Th. Glycerin
und 100 Th. konc Schwefelsäure, erhitzt anfangs vorsichtig, da sonst eine sehr stürmische
Reaktion eintritt, dann erhitzt man noch einige Stunden am Rückflusskühler, verdünnt
hierauf mit Wasser, destillirt das Nitrobenzol ab, giebt schliesslich zum Rückstand Natron-
hydrat bis zur stark alkalischen Reaktion und destillirt im Wasserdampfstrom ab Zur
Reinigung wird das gewonnene Chinolin fraktionirt und dann durch Lösen in 6 Th Alkohol
und Zufügen von 1 Mol H_2SO_4 als saures Chinolinsulfat niedergeschlagen (Anilinsulfat
geht in Lösung), oder aber man kocht es mit Chromsauremischung, welche nur beigemengtes
Anilin angreift

Die Vorgänge, welche sich bei diesem synthetischen Process abspielen, lassen sich
wie folgt interpretiren Durch Einwirkung der Schwefelsäure auf das Glycerin bildet sich
Acrolein $CH_2=CH-CHO$

Das Acrolein verbindet sich mit dem Anilin wahrscheinlich zunächst zu Acrolein-
Anilin $C_6H_5-N=CH-CH=CH_2$, und aus diesem entsteht alsdann durch Abspaltung von
2 H-Atomen das Chinolin Der zur Oxydation der Wasserstoffatome erforderliche Sauerstoff
wird von dem vorhandenen Nitrobenzol geliefert — Es werden etwa 60 Proc der theoretisch
möglichen Ansbeute erhalten

Eigenschaften In reinem Zustande — und frisch destillirt — bildet das Chinolin
eine fast farblose Flüssigkeit, welche ein erhebliches Lichtbrechungsvermögen und einen
charakteristisch aromatischen, auf die Dauer unangenehmen Geruch besitzt Der Siedepunkt
liegt bei 227—228° C (unkorrigirt), das spec Gewicht ist bei 15° C = 1,093—1,096 In
einem Kältegemisch aus fester Kohlensäure und Aether erstarrt es krystallinisch — In
Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin ist es leicht löslich, sehr wenig löslich
dagegen ist es in Wasser Indessen zeigt das Chinolin doch die Neigung Wasser aufzunehmen
es ist hygroskopisch Lässt man es längere Zeit in einer feuchten Atmosphäre stehen, so
entspricht seine Zusammensetzung dem Hydrate $C_9H_7N + 1\frac{1}{2}H_2O$ Dieses Hydrat trübt sich
beim Erwärmen auf 40° C Chinolin besitzt alkalische Reaktion

Unter dem Einfluss des Lichtes und der Luft bräunt sich ursprünglich ganz farb-
loses Chinolin sehr bald und ziemlich intensiv Um ein so verändertes Präparat wieder
in ungefarbten Zustand überzuführen, muss es mit etwas festem Kali- oder Natronhydrat
geschüttelt und langsam rektifizirt werden

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Chinolin eine Verbindung, in
welcher je ein Benzolkern und ein Pyridinkern zu einem einheitlichen Ganzen zusammen-
geschweisst sind

Das Chinolin ist eine Base, es verbindet sich mit den Säuren, ähnlich dem Am-
moniak, durch direkte Addition zu Salzen Bei der Salzbildung zeigt es zumeist den

Zur Darstellung neutralisirt man 10 Th Chinolin mit einer wässrigen Lösung von 16 Th Weinsäure (Theoretisch sind nur 15,5 Th Weinsäure erforderlich, man setzt aber absichtlich einen kleinen Ueberschuss zu), wobei letztere in kleinem Ueberschuss zugesetzt wird, dampft zur Trockne und krystallisirt das trockene Salz aus Alkohol in der Wärme um

Eigenschaften Farblose, luftbeständige, glänzende, nadelförmige Krystalle, die sich in 70–80 Th Alkohol, schwierig in Aether lösen. Die wässrige Lösung ist neutral oder reagirt nur sehr schwach sauer. Das Salz enthält 60,8 Proc Chinolin und 39,2 Proc Weinsäure. Die gesättigte wässrige Lösung scheidet auf Zusatz von Kaliumacetatlösung + Essigsäure einen bei längerem Stehen krystallinisch werdenden Niederschlag von Kalium bitartrat ab, durch Zusatz eines gleichen Volumens Alkohol kann die Ausscheidung dieses Niederschlages beschleunigt werden (Nachweis der Weinsäure).

Aufbewahrung Vor Licht geschützt, vorsichtig aufzubewahren.

Prüfung 1) 20 ccm einer 1 procentigen wässrigen Lösung müssen auf Zusatz von 2 ccm Kalilauge eine rein weisse, milchige Trübung zeigen (Färbung würde Verunreinigung durch heterogene Basen anzeigen). Beim Erwärmen dieser Flüssigkeit mit Ammoniumchlorid muss die Trübung verschwinden. 2) 0,5 g müssen, auf dem Platinblech erhitzt, ohne Rückstand verbrennen (unorgan. Verunreinigungen). — 3) 20 ccm der 1 procentigen Lösung dürfen durch Chlorkalklösung nicht gefärbt werden (Anilinsalze).

Anwendung Das Chinolintartrat wird bei verschiedenen fieberhaften Zuständen, auch bei Keuchhusten gegeben. Die Dosis bei Erwachsenen ist 0,5–1,0 g, drei- bis viermal täglich, am besten in Oblatenpulvern, Kinder erhalten $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ dieser Dosis. Aeusserlich wirkt es antiseptisch.

Aqua dentifricia Chinolini SCHEFF

Chinolin Mundwasser

Rp	Chinolini tartarici	1,0
	Aquae destillatae	150,0
	Spiritus (90 Vol %)	30,0
	Coccionellae	0,5
	Olei Menthae pip gtt	V

Digere, filtra. Mit der 5–8fachen Menge Wasser vermischt zu gebrauchen.

Pasta dentifricia Chinolini

Chinolin Zahnpasta

Rp	Ossis Sepiae	20,0
	Chinolini tartarici	0,5
	Saponis medicati	5,0
	Phloxinal	q s.
	Glycerinal	q s.
	Olei Geranii	
	Olei Menthae pip	xx gtt. VIII.

Ueber die Darstellung vergl. S 554.

† **Chinolinum salicylicum** Chinolinsalicylat. Salicylsaures Chinolin C_9H_7N . $C_9H_7O_2$. Mol Gew = 267.

Zur Darstellung neutralisirt man 10 Th Chinolin mit 11 Th Salicylsäure in wässriger alkoholischer Lösung, so dass die Reaktion schwach sauer wird, und krystallisirt das Salz aus siedendem Wasser um.

Ein weissliches krystallinisches Pulver, löslich in 80 Th kaltem Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol, Vaseline, fetten Oelen und Fetten, auch in Glycerin löslich.

Die 1 procentige wässrige Lösung wird durch Kalilauge unter Abscheidung von Chinolin milchig getrübt. — Dieselbe Lösung wird durch Ferrichlorid violett gefärbt, auf Zusatz von Salzsäure scheidet sich aus ihr Salicylsäure in Krystallen aus. 0,5 g des Salzes müssen auf dem Platinblech erhitzt verbrennen, ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Prüfung, Aufbewahrung und Anwendung wie Chinolinum tartaricum

† **Chinolinum rhodanatum** Chinolindrhanid Chinolinum sulfocyanatum. Rhodan (wasserstoffsäures) Chinolin Sulfocyanwasserstoffsäures Chinolin. C_9H_7N HCSN. Mol Gew = 188. Die Darstellung dieses Salzes erfolgt durch Umsetzung von Chinolinchlorhydrat mit Kaliumrhodanid.

Zur Darstellung bereitet man sich zunächst eine Lösung von Chinolinchlorhydrat, indem man 12,9 g Chinolin in 14,6 g Salzsäure (von 25 Proc) oder in soviel dieser Salzsäure auflöst, dass die Flüssigkeit gegen Methylorange neutral ist. Diese Lösung vermischt man alsdann mit einer Lösung von 9,7 Th Rhodankalium in 40 g Wasser. Man dunstet diese Flüssigkeit auf dem Wasserbade so lange ein, bis sie sich in eine schwere wässrige Schicht und eine über dieser schwimmende ölige Schicht scheidet. Alsdann stollt man zum Erkalten zur Seite. Die abgeschiedene ölige Schicht schiesst in Krystallen an

(event fñgt man einen kleinen Krystall zu), die man abpresst und durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser reinigt. Man halte bei der Darstellung jede Verunreinigung durch Eisen, auch durch eisenhaltiges Filtrirpapier fern.

Fast farbloses oder gelbliches Krystallpulver, aus säulenförmigen Krystallen bestehend, bei 137—138° C zu einer gelben Flüssigkeit schmelzend. In kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser und in Weingeist ziemlich leicht, weniger in Aether löslich. Die wässerige Lösung ist neutral und wird durch Natronlauge unter Abscheidung von freiem Chinolin milchig getrübt, Ferrichlorid ruft in der wässrigen Lösung blutrothe Färbung hervor. Vor Licht geschützt vorsichtig aufzubewahren.


Anwendung Nach EDINGER ist das Chinolinrhodanid durch antiseptische Eigenschaften ausgezeichnet, die nicht bloß auf die Anwesenheit des Chinolins, sondern ganz besonders auf diejenige der Rhodanwasserstoffsäure zurückzuführen sind. LITZEN hat die 1 procentige Lösung zu Injektionen bei Gonorrhoe angewendet, die Heilung erfolgte angeblich schnell und ohne Schmerzen.

Chinolinum-Bismutum rhodanatum Chinolin-Wismut-Rhodanid $\text{Bi}(\text{SCN})_3$
 $+ (\text{C}_9\text{H}_7\text{N} \cdot \text{HSCN})_3$ Mol. Gew. = 758.

Zur Darstellung zerreibt man 48,5 Th krystallisirtes Wismutnitrat $[\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 5\text{H}_2\text{O}]$ mit 30 Th Kaliumrhodanid und fügt vorsichtig (!) nur soviel Wasser (40 bis 60 cem) hinzu, dass man eine rothgelbe Lösung ohne Niederschlag erhält. Diese Lösung giesst man tropfenweise unter Umrühren in eine kalt bereitete Lösung von 88 Th Chinolinrhodanid in etwa 1000 Th Wasser ein. — Der entstehende Niederschlag wird nach kurzem (!) Absetzen abfiltrirt, mit wenig kaltem Wasser ausgewaschen und auf porösen Unterlagen an der Luft getrocknet.

Grobkörniges, rothgelbes Pulver, von etwas scharfem Geruche, bei 70° C schmelzend. In Wasser, Alkohol oder Aether ist es unlöslich, doch wird es durch längere Einwirkung von Wasser unter Abscheidung basischer Verbindungen, welche heller gefärbt sind, zersetzt.

Es ist von FORCHHEIMER mit gutem Erfolge bei Krampfadergeschwüren und luetischen Geschwüren angewendet worden. Der Verbandwechsel soll alle 4—6 Tage erfolgen, nach dem ein Fuss oder Vollbad genommen worden ist, welches die Verbandabnahme erleichtert. Vor Luft geschützt aufzubewahren.



† Acetorthoamidochinolin $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}(\text{NH} \cdot \text{CH}_3\text{CO})$ Mol. Gew. = 186. Zur Darstellung wird Ortho-Nitrochinolin durch Zinn und Salzsäure zu Ortho-Amidochinolin reducirt und dieses mit Acetylchlorid oder Essigsäureanhydrid acetylirt.

Das Präparat ist ein Analogon des Acetanilids. Farblos, bei 102,5° C schmelzende Krystalle, Siedep. oberhalb 300° C. Durch ätzende Alkalien oder conc. Salzsäure wird es beim Erhitzen in Orthoamidochinolin und Essigsäure gespalten. — Es wurde vorübergehend als Antipyreticum empfohlen, hat sich aber nicht einzubürgern vermocht.

† Diaphtherinum. Diaphtherin Oxychinaseptol $(\text{C}_9\text{H}_6\text{N} \cdot \text{OH})_2$ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH}) \cdot \text{SO}_3\text{H}$ = 464. Diese Substanz ist eine Verbindung von 1 Mol. Orthophenolsulfosäure mit 2 Mol. Ortho-Oxychinolin.

Die Darstellung erfolgt durch Sättigung von Ortho-Phenolsulfosäure mit berechneten Mengen Ortho-Oxychinolin.


Aus Wasser krystallisirt bernsteingelbe, durchsichtige, dem hexagonalen System angehörende, sechseckige Säulen, im Handel meist ein krystallinisches Pulver, schwach nach Safran und Phenol riechend, von stechendem, salzigem Geschmack, in kaltem Weingeist ist das Diaphtherin schwer, in heissem Weingeist leichter löslich, in Wasser ist es fast in jedem Verhältniss löslich. Schmelzp. 85° C.

Die wässerige Lösung ist gelb gefärbt und wird durch Zugabe von Natronlauge zunächst getrübt. Auf Zugabe von mehr Natronlauge erfolgt Auflösung, allmählich scheidet sich alsdann o-Oxychinolin in Krystallen aus, wobei die Färbung der Flüssigkeit heller wird.

Durch Ferrichlorid wird die wässrige Lösung blaugrün gefärbt, durch Bleiacetat entsteht in ihr ein citronengelber, durch Baryumchlorid ein hellgelber Niederschlag

Das Diaphtherin ist von EMMERICH und KRONACHER als Antisepticum in 0,5 bis 1,0 procentiger wässriger Lösung empfohlen worden. Es ist relativ ungiftig und soll doch den Phenol-Antiseptics wie Phenol, Kresol, Lysol mindestens gleichwerthig sein. Zum Desinficiren nicht vernickelter Instrumente ist es unbrauchbar, weil diese in Berührung damit schwarz anlaufen. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren.

† Diaphtholum, Chinaseptol, Ortho Oxychinolin-meta Sulfosäure $C_9H_7N(OH)SO_3H = 225$



Die Darstellung erfolgt fabrikmässig durch Einwirkung concentrirter Schwefelsäure auf o-Oxychinolin.

Ein gelbliches Krystallpulver, in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leichter (1:35) löslich. Die wässrige Lösung ist gelb gefärbt, von saurer Reaktion und wird durch Ferrichlorid blaugrün gefärbt. Durch Baryumchlorid entsteht in der wässrigen Lösung keine Fällung, ebenso nicht durch Silbernitrat, dagegen entsteht durch Bleiacetat Ausfällung eines hellgelben Bleisalzes. Der Schmelzpunkt liegt bei $295^{\circ}C$.

Es wurde von GUINARD wegen seiner antiseptischen und nicht reizenden Eigenschaften besonders zur Desinfektion der Harn- und Geschlechtswege empfohlen und wird in gleicher Weise wie das Asseptol (s. S. 86) angewendet. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren.

II † Chinosolum, Oxychinolin-Kaliumsulfat, Oxychinolinschwefelsaures Kali. Oxychinolin Alkali $C_9H_7N \cdot OSO_3K + aqua$

Darstellung. Dasselbe erfolgt durch Kochen von o-Oxychinolin in alkoholischer Lösung mit Kalumpyrosulfat. Demgemäss verhält sich das Chinosol allen seinen Reactionen nach wie eine Doppelverbindung von Oxychinolinsulfat mit Kaliumsulfat.

Uebrigens wird der Wassergehalt verschieden angegeben und zwar zu 1) $C_9H_7NO \cdot SO_3K + H_2O$ und 2) $C_9H_7NOSO_3K + \frac{1}{2} H_2O$.

Eigenschaften. Ein krystallinisches gelbes Pulver, von saffranartigem Geruch und adstringirendem, aromatischem Geschmack. Von Wasser wird es fast in jedem Verhältnisse zu einer gelben Flüssigkeit gelöst, welche noch bei einer Verdünnung von 1:1000 durch Eisenchlorid lebhaft blaugrün gefärbt wird. Die wässrige Lösung giebt mit Baryumchlorid, Bleiacetat und Quecksilberchlorid unlösliche Verbindungen, durch Zinksulfat und Aluminiumsulfat wird sie nicht gefällt.

Zum Unterschied vom Diaphthol und Diaphtherin hinterlässt Chinosol beim Erhitzen auf dem Platinblech nach dem völligen Verbrennen der Kohle etwa 27 Proc. aus Kalisalzen bestehende Asche, während die erstgenannten Präparate ohne Hinterlassung von Asche verbrennen.

Prüfung. Der Wassergehalt des Chinosols ist kein ganz fester, aus diesem Grunde empfiehlt sich die Bestimmung des Oxychinolins. Man bringt in einen graduirten Glas cylinder mit Glasstopfen 1 g Chinosol, füllt mit Wasser zu 10 ccm auf, setzt hierauf eine Lösung von 1 g Natriumacetat zu 15 ccm unter Schütteln auf einmal zu, giesst nun 15 ccm Aether hinzu und schüttelt einige Zeit, bis das ausgeschiedene Oxychinolin vom Aether aufgenommen ist. Die sich absetzende Aetherschicht wird durch weiteren Aetherzusatz auf 20 ccm gebracht. Dann entnimmt man mittels einer Pipette 10 ccm der gemischten Aetherschicht, lässt diese im gewogenen Schälchen freiwillig abdunsten und trocknet bei sehr gelinder Wärme oder über Calciumchlorid. Das Gewicht des trockenen Rückstandes soll 0,25 g betragen, entsprechend dem ca. 50 Proc. betragenden Oxychinolingehalt des Chinosols.

Aufbewahrung. Vorsichtig. **Anwendung.** Das Chinosol ist nach KOSSMANN u. A. ein vorzügliches Antisepticum, welches Sublimat, Karbolsäure, Lysol, Kreolin bei weitem übertrifft, da es mindestens ebenso wirksam ist wie diese, aber relativ ungiftig.

ist und in tiefere Gewebsschichten eindringt. Es fällt Erweiss nicht und wirkt nicht ätzend. Man benutzt zur Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes wässrige Lösungen (1:1000), auf frische Wunden, Brandwunden (1:500), bei Gonorrhoe (1:500 bis 250). Die Chinol-Verbandstoffe sind sterilisierbar. — Zur Desinfektion stählerner Instrumente eignet es sich nicht. — Es kommt als Pulver und in Form von Pastillen in den Handel.

Man beachte, dass Chinol mit eisenhaltigem Wasser grüne Färbung, mit kalkhaltigem Wasser Trübungen giebt.

Chinol Bleiwasser (Frostwasser)

Rp	Chinoli	1,0
	Aquae destillatae	97,0
	Liquoris Plumbi subacetici	2,0

Chinol Gaze (10 %)

Rp	Chinoli	12,0
	Aquae destillatae	80,0
	Glycerini	10,0
	Spiritus	46,0
	Gaze	100,0

Chinol Gelatinstifte. Für Wundkanäle

Rp	1. Gelatinae albae	8,0
	2. Aquae destillatae	32,0
	3. Glycerini	8,0
	4. Chinoli	2,0

Man löst 1 in 2 und 3, fügt 4 hinzu und giesst zu Stäbchen aus, welche übertrocknet oder in Glycerin aufbewahrt werden.

Chinol Mundwasser

Rp	Chinoli	0,25
	Aquae destillatae	250,0
	Spiritus Amk	50,0

Chinol Salbe

Brandsalbe, Salbe gegen das Aufliegen

Rp	Chinoli	1,0
	Unguenti ceri	45,0
	Liquoris Plumbi subacetici	4,0

Chinol Schnupfpulver

Rp	Chinoli	1,0
	Mentholi	2,0
	Acidi borici	20,0
	Sacchari albi	17,0
	Sacchari Lactis	60,0

Chinol Streupulver

A. Gegen Fusschweiss

Rp	Chinoli	2,0
	Amyli Tridici pulv	10,0
	Talci veneti pulv	88,0
	(vel Terrae siliceae calcinatae 88,0)	

B. Kinder-Streupulver

Rp	Chinoli	0,5
	Amyli Tridici	19,5
	Lycopodii	80,0

Chinol Talg

Bei Wundsein, Wolf, erfrorenen Gliedern.

Rp	Chinoli	3,0
	Aquae destillatae	6,0
	Sebi ovina	41,0

Chinol Verbandwasser

Bei frischen Wunden, Brandwunden, gegen Fusschweiss

Rp	Chinoli	1,0
	Aquae destillatae	0,5—1,0 L


Chinol Watte (10 %)

Rp	Chinoli	12,0
	Aquae destillatae	80,0
	Glycerini	10,0
	Gossypii depurati	100,0

Chinol Zahnpulver

Rp	Chinoli	5,0
	Calci carbonici	70,0
	Magnesi carbonici	25,0
	Eucalyptoli	
	Mentholi	aa 0,5

III † Analgenum (Ergänzb.) Benzanalgen. o-Aethoxy-ana-Monobenzoylamido-chinolin. Labordin $C_6H_5(OC_2H_5)(NHCOC_6H_5)N$ Mol Gew = 292



Unter dem Namen Analgen wurde zunächst die Acetylverbindung o-Aethoxy-ana-monoacetylamidochinolin $C_6H_5(OC_2H_5)NH(CH_2CO)N$ beschrieben. Die hier zu besprechende Benzoylverbindung hiess damals „Benzanalgen“. Später wurde die Acetylverbindung fallen gelassen und so wurde der Name Analgen für die Benzoylverbindung angenommen.

Darstellung. Wird o-Oxychinolin mit Kalihydrat und Bromäthyl in alkoholischer Lösung erhitzt, so entsteht o-Aethoxychinolin $C_6H_5(OC_2H_5)N$, welches durch Behandeln mit Salpetersäure in o-Aethoxy-ana-Nitrochinolin $C_6H_5(NO_2)(OC_2H_5)N$ übergeht. Durch Reduktion des letzteren mit Zinn und Salzsäure erhält man o-Aethoxy-ana-Amidochinolin $C_6H_5(NH_2)(OC_2H_5)N$. Durch Erhitzen dieser Verbindung mit Essigsäureanhydrid oder mit Eis

essig kann der Acetylrest, durch Erhitzen mit Benzoylchlorid kann der Benzoylrest eingeführt werden (D R P 60308).

Eigenschaften. Weisses, in Wasser fast unlösliches, vollkommen geschmackloses, neutrales Pulver, in kaltem Alkohol ist es schwer löslich, leichter löslich in heissem Alkohol, auch in verdünnten Säuren. Der Schmelzpunkt liegt bei 208° C.

Die kalt gesättigte Lösung wird durch Eisenchlorid in der Kälte nur gelblich, beim Erwärmen braunroth gefärbt — Von Salpetersäure (25 Proc.) wird es mit gelblicher Farbe gelöst, welche Lösung beim Verdunsten auf dem Wasserbade einen orangerothen Rückstand hinterlässt. Konc. Schwefelsäure nimmt das Präparat zu einer hellgelb gefärbten Flüssigkeit auf, beim Verdünnen mit Wasser scheidet sich ein citronengelber Niederschlag ab — Schüttelt man etwa 0,1 g des Präparates mit 6–8 ccm Wasser an, so nimmt dasselbe auf Zusatz von Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure citronengelbe Färbung an. Beim Erwärmen der Flüssigkeit tritt Lösung ein, beim Erkalten krystallisirt die gelbgefärbte Verbindung aus.

Prüfung. Die kaltgesättigte wässrige Lösung reducirt Silbernitrat weder in der Kälte noch in der Wärme. Das Präparat schmelze bei 208° C und hinterlasse beim Verbrennen keinen Rückstand.

Aufbewahrung. Vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung. Das Präparat wurde v. G. LOEBELL, TREUPPEL, KNUST und KROLL auf Grund seiner antifebrilen und antineuralgischen Eigenschaften empfohlen. Sie wandten es an gegen verschiedene Arten von Nervenschmerzen, Cephalaea, Migräne, Trigeminus-Neuralgie und gegen die im Gefolge von Tabes, Alkoholismus, Hysterie auftretenden Beschwerden, Gicht und Muskelrheumatismus. Dosis 0,5 g bis zu Tagesdosen von 3–5 g. Unangenehme Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Die antifebrile Wirkung ist von Schweißen begleitet. Höchstgaben *pro dosi* 1,0 g, *pro die* 3,0 g (Ergänzb.).

Im Organismus soll die Verbindung durch den Magensaft gelöst und zum Theil in Benzoesäure und o-Aethoxy ana-Amidochinolin gespalten werden. Der Urin nimmt unter dem Gebrauche des Mittels blutrothe Färbung an, die durch Kalilauge oder Natriumkarbonat in Gelb umschlägt (Unterschied von Blut).

o-Aethoxy ana-acetylamidochinolin $C_9H_7(OC_2H_5)NH(CH_3CO)N$, schmilzt bei 155° C

Chiniodin wurde als Antisepticum empfohlen. Es soll ein Chlor- und Jodadditionsprodukt sein, im Geruch dem Chinolin, im Aussehen dem Jodoform ähnlich sein. Zusammensetzung angeblich C_9H_7NJCl . Unlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol und in Aether. Zur therapeutischen Anwendung wird es in Mischung mit Talcum, als Salbe mit Vaseline als Pulver, mit Kolloidum angeschüttelt, als Paste mit Wasser angerührt empfohlen.

Chinotoxin. Dichinolylin-Dimethylsulfat, von OSTERMAYER dargestellt, ist von HOPPE-SYLER auf Grund von Thierversuchen als Ersatzmittel für Opium empfohlen worden.

Jodolin ist Chinolinchlormethylat-Chlorjod. Man stellt zunächst aus Chinolin und Jodmethyl das Chinolinjodmethylat her, welches sich durch direkte Vereinigung der angegebenen Substanzen bildet, und setzt zu der salzsauren Lösung eine Lösung von Chlorjod in Salzsäure. Es fällt nun zunächst Jod aus unter Bildung von Chinolinchlormethylat und wenn keine Jodfällung mehr, sondern ein gelber Niederschlag entsteht, filtrirt man ab und fällt dann aus dem Filtrate durch weiteren Zusatz von Chlorjod die gelbe Doppelverbindung, welche sich aus Salzsäure umkrystallisiren lässt.

Thermifugin. Unter diesem Namen ist eine kurze Zeit hindurch besonders in Amerika das Methyltrihydroxychinolin-karbonsäure Natrium $C_9H_7(H_3)N(CH_3)(OH)CO_2Na$ als Antipyreticum empfohlen worden, ohne sich jedoch einzubürgern.

IV Kresochin der Firma FRANZ FRITSCH & Co in Hamburg ist ein Desinfektionsmittel für Instrumente und für die grobe Desinfektion. Es besteht aus neutralem trikresylsulfosaurem Chinolin und einer losen Verbindung von Chinolin mit Trikresol. Es enthält 33 Proc. Chinolin und 17 Proc. Trikresol.

Zur Bestimmung der wirksamen Bestandtheile verfährt man wie folgt: 100 ccm des Kresochin werden in einem Scheidetrichter mit 100 ccm Wasser verdünnt, mit verdünnter Schwefelsäure stark angesäuert und mit etwa 100 ccm Aether wiederholt ausgeschüttelt. Die ätherische Lösung wird filtrirt und abgedunstet. Der Rückstand vergegenwärtigt die Trikresole, welche wenigstens 17 Proc. des Kresochins ausmachen müssen und

bei 185 bis 210° C sieden — Die verbleibende wässrige Lösung wird mit Kahlauge stark alkalisch gemacht, wobei sie sich blau färbt, und wiederum mehrere Male mit Aether ausgeschüttelt. Nach dem Verdunsten des Aethers hinterbleibt das Chinolin, welches mindestens 33 Proc vom Kresochin ausmachen und bei 227—237° C sieden muss — Die Blaufärbung der alkalischen wässrigen Lösung rührt von der Bildung indulinartiger Farbstoffe her, welche bei der gleichzeitigen Anwesenheit geringer Spuren stickstoffhaltiger Basen und Phenole durch Oxydation mittels des Luftsauerstoffes entstehen.

Das Kresochin charakterisiert sich den bekannten Seifenkresollösungen gegenüber dadurch, dass es keine Alkalien enthält. Das Präparat macht nicht schlüpfzig wie die Seifenpräparate, atzt und reizt nicht, und löst sich zu 5 Proc in Wasser, auch in kalkhaltigem auf.

Chirata.

Swertia Chirata Ham Familie der Gentianaceae — **Gentianeae**. Heimisch im Himalaya. Mit gegenständigen, zugespitzten, ei- oder herzförmigen, 5 bis 7 nervigen Blättern. Blüten klein, gelb, vierzählig, in lockeren Trugdolden. Verwendung findet das ganze, bitter schmeckende Kraut.

Herba Chiratae s. Chiretiae s. Chiraytae. Herba Cherettiae Indicae **Stipites Chiratae Chirata** (Brit U St)

Bestandtheile. Opheliasäure $C_{16}H_{20}O_{10}$, ein Glukosid Chiratin $C_{26}H_{46}O_{15}$.

Verwechslungen und Verfälschungen. Andere Swertia-Arten, *Slevogtia orientalis* Griseb (Gentianaceae), *Rubia cordifolia* (Rubiaceae), *Andrographis paniculata* Nees (Acanthaceae), für die Erkennung der letztgenannten Pflanze kommen die in den Blättern und in der Rinde vorkommenden Cystolithen in Betracht.

Anwendung. Wie *Radix Gentianae* und *Herba Centaurii*. Soll auch als Hopfensurrogat benutzt werden.

Extractum Chiratae fluidum (U St). Aus gepulverter Chirata (No 30) 1000 g und q s einer Mischung von Alkohol (91 proc) 600 cem und Wasser 300 cem bereitet man durch Verdrängung Extrakt 1000 cem.

Infusum Chiratae Infusion of Chiretta (Brit) wie Infus Uvae Ursi (S 363).

Liquor Chiratae concentratus Concentrated Solution of Chiretta (Brit). Aus Chirettapulver (No 40) 500 g und Alkohol (20 proc) 1250 cem oder q s sammelt man durch Verdrängung 1000 cem Flüssigkeit.

Tinctura Chiratae Tincture of Chiretta (Brit U-St). Aus 100 g Chiretta und q s Alkohol (60 proc) stellt man durch Verdrängung 1000 cem Tinktur dar.

Saccharum Cherettiae s. chiratinatum, Chiratina saccharata ist eine Verreibung von 1 Th Chiratin mit 9 Th Zucker. Wird gegen Wechselfieber angewendet.

Wahrscheinlich hierher gehört ein als Ersatz des Chinins empfohlenes Präparat *Haliva*, das aus einer indischen Pflanze *Agathotes* (syn mit *Swertia*) oder *Kreat* (Bezeichnung von *Swertia Chirata* in manchen indischen Sprachen) hergestellt werden soll.

Chloralum.

Unter dem Namen „Chloral“ ist streng genommen nur die wasserfreie Verbindung, das Trichloraldehyd CCl_3CHO , zu verstehen. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch, besonders aber in der medicinischen Literatur, versteht man unter Chloral fast ausnahmslos das Chloralhydrat $CCl_3CH(OH)_2$.

I. † Chloralum anhydricum Chloral. Wasserfreies Chloral Trichloraldehyd CCl_3CHO Mol. Gew. = 147,5

Darstellung Man leitet getrocknetes Chlorgas in absoluten Alkohol, und zwar zunächst unter guter Kühlung, um die anderenfalls eintretende stürmische Reaktion zu


massigen Das Chlor wirkt auf den Alkohol unter Freimachen von Salzsäure ein, welche in einem vorgelegten Absorptionsgefäße durch Auffangen in Wasser unschädlich gemacht wird. Man setzt das Einleiten von Chlor in der Kälte so lange fort, bis Salzsäure nicht mehr entweicht. Sobald dieser Punkt eingetreten ist, wird die Einleitung von Chlor unter allmählicher Steigerung der Temperatur, zuletzt bis auf fast 100° C, wobei nun wiederum Salzsäure entweicht, so lange fortgesetzt, bis das Reaktionsprodukt sich fast klar in Wasser auflöst. Das Einleiten von Chlor muss ohne Unterbrechung geschehen und dauert auch bei kleineren Mengen mehrere Tage.

Beim Erkalten erstarrt die Flüssigkeit zu einem Brei von Chloralalkoholat, welches sich durch Vereinigung des gebildeten Chlorals mit noch vorhandenem, unverändertem Alkohol gebildet hatte.

Man behandelt (schüttelt) dieses Produkt wiederholt mit konzentrierter Schwefelsäure, welche den Alkohol aufnimmt, und gewinnt durch Destillation das bei 94,5° C siedende wasserfreie flüssige Chloral, welches durch Rektifikation über Calciumkarbonat entsäuert bez. rein erhalten wird.

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche, stechend riechende und ätzend wirkende Flüssigkeit, welche bei 94,5° C siedet und bei 18° C ein spezifisches Gewicht von 1,502 besitzt. Im Verlaufe der Aufbewahrung wandelt es sich nach kurzer oder längerer Zeit freiwillig, rascher unfreiwillig durch Schütteln mit dem mehrfachen Volumen konc. Schwefelsäure in die sog. porcellanartige Modifikation (Parachloral, Metachloral, Trichloral $(\text{CCl}_3\text{CHO})_3$) um, welche in Wasser, Alkohol und Äther unlöslich ist, bei der Destillation aber wieder in das gewöhnliche Chloral übergeht.

Das wasserfreie Chloral hat ein bemerkenswertes Additionsvermögen. Es addiert Wasser, Alkohol, Ammoniak, Formamid, Cyanwasserstoff, unter Bildung neuer Verbindungen, welche durchweg therapeutisch von Wichtigkeit sind.



Aufbewahrung. In mit Glasstopfen gut verschlossenen Glasgefäßen an einem Orte mittlerer Temperatur, vorsichtig. — Das wasserfreie Chloral findet als solches therapeutische Anwendung nicht, dagegen ist es das Ausgangsmaterial zur Darstellung einer Reihe interessanter Derivate, welche meist Additionsprodukte darstellen.

II † Chloralum hydratum (Austr. Germ. Helv.) Chloral (U-St.) Chloral Hydras (Brit.) Chloral hydrate (Gall.) Chloralhydrat. Trichloraldehydhydrat. (Chloral.) Hydras Chloralis. $\text{CCl}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 165,5

Die Darstellung dieser Verbindung setzt die vorherige Bereitung des reinen, wasserfreien Chlorals voraus (s. vorher sub I). Die Darstellung kleinerer Mengen Chloralhydrat aus käuflich bezogenem wasserfreiem Chloral zu Übungszwecken ist zu empfehlen.

Darstellung. Zu 100 Th. wasserfreiem Chloral fügt man unter Umrühren in mehreren Theilen rasch hintereinander 12,2 Th. Wasser hinzu. Das Wasser wird unter erheblicher Selbsterwärmung vom Chloral aufgenommen unter Bildung von Chloralhydrat. Man gießt die noch warme Flüssigkeit in dünner Schicht auf Porcellanteller (oder Porcellanovetten oder Glasovetten) und lässt sie in diesen erstarren, wobei man die Gefäße mit Glasplatten bedeckt, um Verluste durch Verdampfen zu vermeiden. — Die schliesslich erhaltene Krystallmasse verwandelt man durch Umkrystallisiren aus Benzol in die beheizten trockenen Krystalle.

Eigenschaften. Das officinelle Chloralhydrat bildet luftbeständige, trockne, farblose durchsichtige, rhomboidale Krystalle von aromatischem, wenig stechendem Geruche

und bitterlichem, etwas unangenehm, atzendem Geschmacke. Es löst sich leicht in Wasser ($1\frac{1}{2}$ Th.) ohne vorübergehende Veränderung seiner Form, es löst sich auch leicht in Amylalkohol, Weingeist und Aether, weniger leicht, bez. nur unter Erwärmen, in Petroläther, Benzol, Schwefelkohlenstoff, ist langsam löslich in 5 Th. kaltem Chloroform,¹⁾ fast unlöslich in Terpentinöl. Mit Kampher gemischt, geht es mit diesem eine dickflüssige, in Wasser unlösliche Verbindung ein. Bei etwa 58° C. schmilzt es zu einer klaren, farblosen Flüssigkeit (von circa 1,575 spec. Gewicht), welche bis auf 30° C. abgekühlt Krystalle abscheidet, weiter erkaltet zu einer festen weissen krystallinischen, dem Walrat ähnlichen Masse erstarrt. Bei $96-98^{\circ}$ C. beginnt es unter Zerfall in Chloral und Wasser zu siedend und verflüchtigt sich vollständig. Mit verdünnter Aetzkalklösung geschüttelt, trennt sich die Mischung in 2 Schichten, von welchen die untere aus Chloroform (71—72 Proc.), die obere, allmählich klar werdende, aus Natrium- oder Kaliumformiat, in Wasser gelöst, besteht. Die wässrige Lösung unterliegt einer allmählichen Zersetzung in Salzsäure und Dichloraldehyd. Daher reagieren die wässrigen Chloralhydratlösungen kurze Zeit nach ihrer Darstellung sauer. In der weingeistigen Lösung bildet sich allmählich Chloralalkoholat, welches eine abweichende physiologische Wirkung aussert. Ein an der Luft feucht werdendes Chloralhydrat ist meist mit Schwefelsäure verunreinigt. Während das Chloralhydrat sich, ohne seine Form zu ändern, in Wasser löst, wird Chloralalkoholat zunächst ölähnlich flüssig und löst sich erst dann im Wasser.

Aufbewahrung und Dispensation. Da das im Tages- und Sonnenlichte aufbewahrte Chloralhydrat eine saure Reaktion annimmt, da es ferner schon bei mittlerer Temperatur einigermaßen flüchtig ist, so ist seine Aufbewahrung in gut geschlossenen Glasgefässen und am schattigen Orte nothwendig. Da Korkstopfen zerfressen werden, so sind als Aufbewahrungsgefässe Gläser mit Glasstopfen zu wählen. Werden vom Arzte wässrige Lösungen verordnet, so dürfen dieselben nie mit warmem Wasser hergestellt werden, weil warmes Wasser stärker zersetzend einwirkt. Ebenso dürfen aus den angeführten Gründen keine wässrigen, und niemals weingeistigen Lösungen des Chloralhydrats vorrätig gehalten werden. Lösungen von Chloralhydrat mit Borax in Wasser müssen ohne Erwärmung bereitet werden. Die Aufbewahrung erfolge vorsichtig.

Prüfung. Als Identitätsreaktion ist anzuführen, dass die Krystalle des Chloralhydrates beim Erwärmen mit Natronlauge eine trübe, unter Abscheidung von Chloroform sich klärende Lösung geben. Diese Erscheinung tritt natürlich auch in der wässrigen Lösung ein, ausserdem aber kann die Zersetzung des Chlorals nicht nur durch atzende Alkalien, sondern auch schon durch kohlensäure Alkalien, ja sogar durch Borax bewirkt werden. — Eine andere Identitätsreaktion beruht auf der Bildung eines Silberspiegels. Man vermischt in einem Probirrohre 10 Tropfen Silbernitratlösung mit 15 ccm Wasser, fügt etwa 0,1 g Chloralhydrat hinzu, löst und mischt durch sanftes Schwenken und setzt nun eine Spur Ammoniak hinzu. Zieht man das Rohr jetzt einige Male durch eine Flamme, so scheidet sich ein prachtvoller Silberspiegel ab. (Die gleiche Erscheinung zeigen zwar auch andere Aldehyde, aber nicht in der leichten und sicheren Weise wie das Chloralhydrat.)

1) Die Lösung von 1 g Chloralhydrat in 10 ccm Weingeist darf blaues Lackmuspapier erst beim Abtrocknen schwach röthen und durch Silbernitrat nicht sofort verändert werden. Wässrige Chloralhydratlösungen zeigen stets schwach saure Reaktion, daher wird die Prüfung auf Säuren (Salzsäure, Trichloressigsäure) in der alkoholischen Lösung vorgenommen. Tritt in der alkoholischen Lösung durch Silbernitrat sofort eine Veränderung (weisliche Trübung oder bräunliche Reduktion) ein, so liegen zersetzte Präparate vor.

2) Erhitzt, sei Chloralhydrat flüchtig, ohne leicht entzündliche Dämpfe zu entwickeln. Diese Prüfung richtet sich gegen eine Verunreinigung durch Chloralalkoholat oder

¹⁾ Die Angabe über die Unlöslichkeit des Chloralhydrats in Chloroform der Pharm. Germ. II, war unzutreffend.

Urethan, welche beide beim Erhitzen leicht brennbare Alkoholdämpfe abgeben. Zweckmassiger ist folgende Prüfung: Wird 1 g Chloralhydrat in 6 ccm Wasser gelöst, mit 0,5 Aetzkali versetzt und erwärmt, dann filtrirt und mit einer wasserigen Jodjodkaliumlösung bis zur starken Gelbfärbung versetzt, so sollen sich nach einstündigem Stehen Krystalle von Jodoform nicht ausscheiden.

Wirkung und Anwendung. Chloralhydrat wirkt gährungs- und faulniswidrig. In der 5procentigen wasserigen Lösung lassen sich Pflanzen oder Thiere ansgezeichnet konserviren. In Substanz oder concentrirter Lösung wirkt es reizend, auf Wunden und Schleimhaute ätzend.

Innerlich (am besten in verdünnter Lösung, welche keine Magenbeschwerden verursacht) bewirkt es in Gaben von etwa 2 g beim Menschen ruhigen Schlaf. Der Schlaf wird erzwungen, daher ist Chloralhydrat ein Narcoticum. Bei Herzkranken sind grosse Dosen von Chloralhydrat, bez. dieses überhaupt zu vermeiden. Grösste Einzelgabe 3,0 g. Grösste Tagesgabe 6,0 g. (Aust. Germ. Helv.)

Nach toxischen Dosen erfolgt der Tod schliesslich durch Herzlähmung. Antidot: Excitantien (Kaffee, Cognac etc.), künstliche Respiration, Hautreize, subkutan Strychnin.

Die Ausscheidung des Chlorals erfolgt durch den Urin und zwar — ob zum Theil oder gänzlich, ist noch unentschieden — als Urochloralsäure $C_2H_3Cl_3O_6$, der Harn ist infolge der Anwesenheit der letzteren linksdrehend und reducirt die Fehling'sche Lösung.

Der Apotheker hüte sich, infolge mangelhafter Verschreibung (als *Hydr chlor* = Hydras chlorahs) Chloralhydrat und Hydrargyrum chloratum mit einander zu verwechseln.

Chloralum hydratum fusum. Geschmolzenes Chloralhydrat. Erwärmt man Chloralhydrat zum Schmelzen und giesst es dann in $\frac{1}{4}$ cm hoher Schicht in eine Glas-cuvette aus, so erhält man krystallinische Tafeln von walratartigem Aussehen. Diese Form des Chloralhydrates scheint eine isomere Modifikation zu sein. Sie wirkt energischer wie das krystallisirte Chloralhydrat, ist übrigens nach dem Wortlaute der Arzneibücher nicht officinell.

Chloralhydratlösung zum Aufhellen mikroskopischer Präparate. 30 Th Chloralhydrat, 20 Th Wasser. Diese Lösung wird namentlich zum Aufhellen solcher Präparate verwendet, welche vorher mit Säuren behandelt worden waren.

Nachweis von Chloralhydrat in forensischen Fällen. Das Untersuchungs-objekt wird mit Wasser ausgezogen und die Lösung auf ihre Reaction geprüft. Ist diese stark sauer, so stumpft man mit Magnesiumkarbonat ab und macht mit Weinsäure schwach sauer, ist sie alkalisch, so fügt man Weinsäure bis zur deutlich sauren Reaction hinzu — Alsdann setzt man eine kleine Menge Alkohol (10—15 ccm) hinzu und unterwirft das Ganze der Destillation unter guter Kühlung. Die Destillation ist lange fortzusetzen.

Das Chloralhydrat geht in das Destillat über — In diesem Destillate I kann man den qualitativen Nachweis des Chloral's wie folgt führen:

1) Versetzt man eine Probe des Destillates (namentlich der ersten Antheile) mit einer Lösung von Calciumsulfhydrat, so entsteht bei Anwesenheit von Chloralhydrat nach kurzer Zeit eine rothe Färbung.

2) Man erhitzt einige Tropfen des Destillats mit einem Tropfen Anilin und etwas alkoholischer Kalilauge. Bei Anwesenheit von Chloralhydrat wird dieses in Chloroform gespalten, und letzteres giebt unter diesen Umständen widerlich riechendes Isomitil. (Die Reaction weist also eigentlich Chloroform nach.)

3) Erwärmt man die zu prüfende Flüssigkeit mit einer Auflösung von β -Naphthol in Kalilauge, so tritt Blaufärbung auf. Auch diese Reaction weist das Vorhandensein von Chloroform nach.

Um den Nachweis des Chloralhydrats mit Sicherheit zu führen, muss man daher neben dem als Spaltungsprodukt auftretenden Chloroform auch noch das andere Spaltungsprodukt, die Ameisensäure nachweisen.

Man kocht also das vorher erhaltene Destillat zunächst etwa $\frac{1}{2}$ Stunde mit einem kleinen Ueberschuss von Magnesiumoxyd am Rückflusskühler (!), dann kehrt man den Kühler um und destillirt nochmals ab. In diesem zweiten Destillat weist man das in ihm enthaltene Chloroform wie oben angegeben nach.

Die im Kolben hinterbliebene Flüssigkeit enthält Magnesiumformiat. Man kann sie filtriren und im Filtrat die Ameisensäure nach den üblichen Reaktionen (s. S. 48) nachweisen. Bisweilen kann es auch nothwendig werden, die Salzlösung mit Phosphorsäure zu destilliren und die in das Destillat übergehende freie Ameisensäure nachzuweisen.

Zur quantitativen Bestimmung versetzt man das zuerst erhaltene Destillat (Destillat I) mit überschüssiger, chlorfreier Kalilauge, erhitzt die Flüssigkeit einige Zeit ($\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunde) am Rückflusskühler (!) zum Sieden, verjagt später den Alkohol und bestimmt alsdann das gebildete Chlor gewichtsanalytisch oder nach VOLHARD (s. S. 58). 106,5 Gewichtstheile Chlor entsprechen = 165,5 Gewichtstheile Chloralhydrat.

Liegt Chloralhydrat in Substanz oder in einer Lösung vor, welche ausser Chloralhydrat keine Substanzen enthält, welche auf Alkali einwirken, so kann man eine gewogene oder gemessene Menge mit einem Ueberschuss Normal Kalilauge versetzen, gelinde erwärmen und den Ueberschuss in Kalilauge durch Saure (Phenolphthalein als Indikator) wieder zurücktitriren. Da diese Reaktion nach der Gleichung $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})_2 + \text{KOH} = \text{CCl}_3\text{H} + \text{HCO}_2\text{K} + \text{H}_2\text{O}$ verläuft, so zeigt jeder verbrauchte cem Normal Kalilauge = 0,1655 g Chloralhydrat an.

III † Chloralalkoholat. Chloraläthylalkoholat. $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})\text{OC}_2\text{H}_5$. Mol Gew. = 193,5.

Es entsteht als Zwischenprodukt bei der Darstellung des Chloralhydrates und kann in kleinen Mengen erhalten werden, wenn man 100 Th. wasserfreies Chloral mit 32 Th. Alkohol mischt.

Krystalle oder krystallinische Massen, welche bei 46°C schmelzen und bei 115°C sieden, etwas feucht aussehen, im übrigen denen des Chloralhydrats sehr ähnlich sind. Die beim Erhitzen des Präparates auftretenden Dämpfe sind leicht entzündlich. Es löst sich auf gleiche Weise in Wasser, als Chloralhydrat, aber schwieriger als dieses. Uebergiesst man es mit dem doppelten Volumen Wasser und erwärmt, so schmilzt das Alkoholat zu einer öligen, beim Erkalten krystallinisch erstarrenden Flüssigkeit. Bei der Zersetzung mittels wässriger Alkalien liefert es neben Chloroform und ameisen-saurem Salz auch noch Aethylalkohol. — Beim Mischen mit konz. Schwefelsäure färbt es sich braun und bei Erwärmen mit konz. Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. tritt eine stürmisch verlaufende, von Entwicklung braunrother Dämpfe begleitete Reaktion ein.

IV † Amylenchloralium. Chloral-Amylenhydrat. Dormiol. $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})\text{OC}_5\text{H}_{11}$. Mol Gew. = 235,5.

Die Darstellung erfolgt durch Zusammenmischen von 100 Th. wasserfreiem Chloral mit 60 Th. Amylenhydrat (s. S. 292). Farblose, ölige, mit kaltem Wasser nicht mischbare Flüssigkeit von kampferartigem Geruche, kühlend brennendem Geschmacke, und dem spec. Gew. 1,24. In Alkohol, Aether, Aceton, fetten Oelen löst es sich in jedem Verhältnisse auf, in siedendem Wasser ist es nur unter Zersetzung löslich.


Die Darstellung der Verbindung geschah zu dem Zwecke, das Chloral in eine Form zu bringen, in welcher es langsamer vom Organismus resorbiert wird, die also weniger stürmisch wirkt wie das Chloralhydrat. Bei Kaninchen und Hunden erfolgte bald ruhiger tiefer Schlaf. Zu subkutanen Injektionen lässt es sich nicht gut verwenden, weil es an der Einstichstelle Reizerscheinungen verursacht. Dagegen würde es mit Oel gemischt in Gelatinekapseln sich darreichen lassen. Vorsichtig aufzubewahren.

V † Chloralammonium. Chloralammoniak. Chloralamid. $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})\text{NH}_2$. Mol. Gew. = 164,5. Wurde von NESTLÉ als Schlafmittel bez. als Ersatz des Chlorals empfohlen.

Dasselbe entsteht, wenn man in eine Lösung von wasserfreiem Chloral in Chloroform trocknes Ammoniak einleitet (Schriff). Beim Abdunsten des Chloroforms krystallisiert das Chloralammonium in feinen weissen Nadeln aus, welche bei $82-84^{\circ}\text{C}$ schmelzen. Es ist in kaltem Wasser nahezu unlöslich und wird durch heisses Wasser in Chloroform und ameisensaures Ammoniak zerlegt. In Alkohol und Aether ist es leicht löslich. Therapeutisch soll es die Vorzüge des Chlorals und Urethans in sich vereinigen, d. h. ein gutes Hypnoticum und Analgeticum sein, ohne die Herzthätigkeit in dem Maasse wie Chloralhydrat schädlich zu beeinflussen. Die hypnotische Gabe beträgt 1–2 g. Vorsichtig aufzubewahren.


VI † Chloralimid $\text{CCl}_3-\text{CH}=\text{NH}$ Mol. Gew. = 146,5. Wird erhalten durch Erhitzen von Chloralammoniak auf 100°C , oder indem man Chloralhydrat mit trockenem Ammoniumacetat bis zum Sieden erhitzt. Beim Eingiessen des Reaktionsproduktes in kaltes Wasser scheidet sich das Chloralimid als krystallinischer Niederschlag aus. Farblose, geruchlose, lange Krystallnadeln vom Schmelzpunkt 166°C , wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether. Durch Mineralsäuren wird es zerlegt in Chloral und die Ammoniaksalze der betreffenden Säuren.

Die Verbindung ist entstanden zu denken durch Wasserabspaltung aus dem Chloralammoniak



Anwendung Als Hypnoticum in Gaben von 1–4 g wie Chloralhydrat. Ausscheidung als Urochloralsäure.

VII † Chloral-Urethan Uralium Uraline Chloral (oder geschmolzenes Chloralhydrat) löst das Urethan schon bei gewöhnlicher Temperatur auf. Setzt man einer solchen Lösung conc. Salzsäure zu, so erstarrt sie innerhalb 24 Stunden zu einer in Wasser unlöslichen Masse. Dieselbe wird zunächst mit conc. Schwefelsäure behandelt, dann mit Wasser gewaschen, wobei ein Oel resultiert, das später krystallin wird. Der chemische Vorgang ist ein sehr einfacher. Es verbinden sich je 1 Mol. Chloral und 1 Mol. Urethan unter einfacher Addition.



Das Chloral-Urethan ist in kaltem Wasser unlöslich, in kochendem unter Spaltung in Chloral und Urethan zersetzbar. Alkohol und Aether lösen es leicht, durch Wasser wird es aus diesen Lösungen wieder abgeschieden. Der Schmelzpunkt wurde bei 108°C beobachtet, doch zersetzt sich die Verbindung schon bei 100°C theilweise in Chloral und Urethan.

C. HUBNER und G. STICKER haben das Chloral-Urethan untersucht und dasselbe in seiner Wirkung ähnlich dem Aethyl-Urethan befunden, doch schien die hypnotische Wirkung weniger zuverlässig und nachhaltig. — Dagegen rühmt es neuerdings POPPER (unter dem Namen Uralium oder Uralin) sehr. Es soll eben so sicher wirken wie Chloralhydrat, aber besser als dies, sogar bei Herzkrankheiten, vertragen werden.


VIII † Chloralcyanhydratum Chloralcyanhydrat. Chloralcyanhydrin. Blausäure-Chloral. $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CN}$. Mol. Gew. = 174,5.

Diese 1872 von HAGEMANN zuerst dargestellte Verbindung wurde 1887 von HERMES als geeigneter Ersatz des Bittermandelwassers empfohlen.

Darstellung. 40 Th. conc. wässrige Blausäure von etwa 45% werden mit 60 Th. Chloralhydrat gemischt und am Rückflusskühler bei $60-70^{\circ}\text{C}$ etwa 8 Stunden lang erwärmt. Alsdann verdunstet man die überschüssige Blausäure auf dem Wasserbade, worauf der Rückstand krystallinisch erstarrt. Man krystallisiert ihn alsdann entweder aus Wasser

oder aus Schwefelkohlenstoff um — Die zur Darstellung nöthige Blausäure bereitet man sich durch Destillation von 100 Th gelben Blutlaugensalzes mit einem Gemisch von 70 Th engl. Schwefelsäure mit 160 Th Wasser, und zwar destillirt man bei eingeschaltetem Rückflussrohr 40 Th ab. Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises darauf, dass sämtliche Operationen, bei denen sich Blausäure entwickelt, also hier die Destillation, die Digestion und das Abdampfen, unter einem gut wirkenden Abzuge oder im Freien auszuführen sind. Ueber die nach der Gleichung $\text{CCl}_3\text{CHO} + \text{HCN} = \text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CN}$ verlaufende Reaktion siehe oben S 789.

Eigenschaften. Das Chloralcyanhydrat bildet weisse, krystallinische, dem Chloralhydrat ähnlich riechende Massen oder — aus Wasser oder Schwefelkohlenstoff krystallisirt — dünne rhombische Tafeln, welche bei etwa 60° C schmelzen und unter geringer Zersetzung bei 215–220° C sieden. In Wasser, Alkohol und Aether ist die Verbindung leicht löslich, genaue Angaben über die Löslichkeit im Wasser lassen sich deshalb nicht machen, weil das Präparat durch kaltes Wasser allmählich, schneller noch beim Erwärmen in Chloral-



(hydrat) und Blausäure gespalten wird. Durch wässrige Alkalien, z. B. Kali- oder Natronlauge, erfolgt Zersetzung in Blausäure, Ameisensäure und Chloroform. Beim Kochen mit Salzsäure entsteht Trichlormilchsäure $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CO}_2\text{H}$ — Silbernitrat erzeugt in der frisch bereiteten wässrigen Lösung zunächst keinen Niederschlag, ein solcher tritt erst beim Erhitzen der Lösung auf. — Aus heisser Fehling'scher Lösung wird durch genügende Mengen von Chloralcyanhydrat kein rothes Kupferoxydul abgeschieden, sondern die Flüssigkeit wird entfärbt unter Bildung des farblosen Doppelsalzes Kupfercyanid-Natriumcyanid $\text{Cu}(\text{CN})_2 \cdot 2\text{NaCN}$.

Prüfung. Fügt man zu einer Mischung aus 2 ccm Natronlauge und 3 ccm Wasser etwa 0,1 g Chloralcyanhydrat, 0,2 g Ferrisulfat und 1 Tropfen Ferrichlorid und lässt unter bisweiligem Umschütteln einige Minuten stehen, so entsteht beim Uebersättigen mit Salzsäure ein blauer Niederschlag (Blausäure). Wird 1 g Chloralcyanhydrat mit 3–5 ccm Natronlauge schwach erwärmt, so scheiden sich Tröpfchen von Chloroform ab (Chloralderivat).

Zur Beurtheilung der Reinheit eignet sich die Bestimmung des Schmelzpunktes nicht, da derjenige des Chloralhydrates (57° C) dem des Chloralcyanhydrates zu nahe kommt. Es ist daher am zweckmässigsten, eine Bestimmung des Blausäuregehaltes, als des wesentlichsten Bestandtheiles, auszuführen. Zu diesem Zwecke zersetzt man 1–2 g Chloralcyanhydrat mit 4–8 g Kalilauge von 33½ Proc und dampft unter Zusatz von 4 bis 8 g Natriumthiosulfat auf dem Wasserbade zur Trockne. Der Rückstand wird in Wasser gelöst, mit Schwefelsäure schwach gesäuert und die Lösung mit einer hinreichenden Menge Kupfersulfatlösung erhitzt. Es fällt weisses Kupferrhodanur, welches nach dem Trocknen bei 110° C die Zusammensetzung $\text{Cu}_2(\text{CNS})_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ besitzt, aus. Man erhält direkt das Gewicht der Blausäure, wenn man das Gewicht des getrockneten Kupferrhodanurs mit 0,2077 multiplicirt (Kaiser und Schiess).

Handelt es sich um den Nachweis freier Blausäure in einer frisch bereiteten oder älteren, dissociirten wässrigen Lösung, so fügt man von der letzteren einige Tropfen zu der Schön-Schoenbein'schen¹⁾ Guajakkupferlösung. Chloralcyanhydrat als solches wirkt auf das Reagens nicht ein, bei Gegenwart von freier Blausäure jedoch entsteht Blaufärbung.

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefässen und in trockenem Zustande, vorsichtig.

Anwendung. Das Chloralcyanhydrat wurde von Hermes als Ersatz des Bittermandelwassers empfohlen. Die Vorzüge, welche es dem letzteren gegenüber bieten soll, bestehen darin, dass es eine konstante chemische Verbindung ist, welche in trockenem Zustande sich unbegrenzte Zeit, in Lösung immerhin einige Zeit unzersetzt aufbewahren

¹⁾ Man versetzt eine zweckmässig im Dunkeln aufzubewahrende Lösung von 1 Reins Guajaci in 100 absolut. Alkohol mit wenigen Tropfen einer schwachen Kupfersulfatlösung (1 6000 bis 1 10000 Wasser), die Mischung darf auch bei leichter Erwärmung keine Blaufärbung annehmen.

lässt Nach HERMES soll ihm reine Blausäurewirkung zukommen Die Entscheidung, ob diese letztere den Heilwerth des Bittermandelwassers bedinge, muss den Pharmakologen von Fach überlassen bleiben, immerhin scheint das Präparat Beachtung gefunden zu haben

Für die Dosirung ist zu bemerken, dass 6,46 g Chloralcyanhydrat = 1,0 g wasserfreie Blausäure enthalten Um also ein Präparat von gleichem Blausäuregehalt wie das Bittermandelwasser zu erzielen, müsste man rund 0,08 Chlorcyanhydrat in 10 Wasser auflösen

0,01 g Chloralcyanhydrat enthalten gleich viel Blausäure als 1,57 g Bittermandelwasser — Durch den Urin wird das Präparat als Urochloralsäure ausgeschieden

IX Chloralum formamidatum (Germ) Chloralformamid $\text{C Cl}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH})\text{NH} \cdot (\text{HCO})$. Mol. Gew. = 182,5 Dieses Präparat wurde ursprünglich unter dem nicht zu treffenden und bereits vergebenen Namen „Chloralamid“ zur therapeutischen Verwendung empfohlen Sollte demnach „Chloralamid“ verordnet werden, so vergewissere man sich, welche Verbindung thatsächlich gemeint ist


Darstellung Diese erfolgt durch direkte Vereinigung von wasserfreiem Chloral und Formamid und kann sehr wohl im pharmaceutischen Laboratorium zu Uebungszwecken ausgeführt werden

Man mischt bei kleineren Mengen in einem Krystallisirschälchen, bei grösseren Mengen in einer Porcellanpfanne 147 Th wasserfreies Chloral und 45 Th Formamid bei gewöhnlicher Temperatur zusammen Beide Flüssigkeiten zeigen zunächst keine Neigung, sich mit einander zu verbinden, nach kurzem Umrühren jedoch wird die Mischung unter erheblicher Selbsterwärmung klar Man stellt sie nun wohlbedeckt einige Zeit zur Seite

Ist sie nach dem Erkalten auf mittlere Temperatur nicht freiwillig krystallinisch erstarrt, so zwingt man sie zum Krystallisiren durch Reiben („Kitzeln“) mit einem Glasstabe Hat man krystallisiertes Chloralformamid zur Hand, so kann man das Krystallisiren durch Eintragen eines kleinen Krystälchens sehr beschleunigen. Auch das Festwerden der flüssigen Mischung erfolgt unter Abgabe von Wärme Die völlig erkaltete und fest gewordene Masse krystallisirt man schliesslich aus Wasser oder 30 procentigem Alkohol mit der Vorsicht um, dass man eine Erwärmung über 60°C hinaus sorgfältig vermeidet

Die Darstellung im pharmaceutischen Laboratorium ist nicht rentabel wegen der in den Mutterlaugen verbleibenden beträchtlichen Antheile Sie empfiehlt sich jedoch zu Uebungszwecken In diesem Falle sollte man aber, da das wasserfreie Chloral doch bezogen werden wird,¹⁾ gleich auch andere Derivate, z. B. Chloralhydrat, Chloralalkoholat u s w darstellen.

Der chemische Vorgang besteht einfach darin, dass sich Chloral und Formamid unter Auflösung der doppelten Bindung des Sauerstoffatoms zu Chloralformamid vereinigen




Eigenschaften Das Chloralformamid bildet schneeweisse, glänzende, weisse Kryställchen. Es schmilzt bei $114\text{--}115^\circ \text{C}$ und zerfällt bei dem Versuche, es zu destilliren, in seine Komponenten, d. i. Chloral und Formamid Es löst sich langsam in etwa 20 Th kalten Wassers, rascher in etwa 1,5 Th Alkohol Das Auflösen in Wasser darf höchstens durch sehr mässige Erwärmung unterstützt werden, da die wässrige Lösung schon wenig über 60° hinaus unter Rückbildung von Chloral und Formamid zerlegt wird

Eine eigentliche Identitätsreaktion für dieses Präparat giebt es zur Zeit noch nicht Die Angabe der Germ III „Die Krystalle geben beim Erwärmen mit Natronlauge eine trübe, unter Abscheidung von Chloroform sich klärende Lösung“ trifft auch für das Chloralhydrat zu, welches sich übrigens durch seinen eigenthümlichen Geruch und durch die leichte Löslichkeit in Wasser von dem Chloralformamid unterscheidet. Durch

¹⁾ Man halte das wasserfreie Chloral nicht längere Zeit vorrätig, sondern verarbeite es bald, da es — bisweilen sehr rasch — in die „porcellanartige Modifikation“ übergeht

diese Reaktion wird daher lediglich die Gegenwart von Chloral in irgend einer Form nachgewiesen. Dagegen fehlt es an einem einfachen Hilfsmittel, das Vorhandensein des Ameisensäurerestes festzustellen. Von anderer Seite ist in dieser Beziehung mit Unrecht Werth darauf gelegt worden, dass bei dem Erwärmen mit Natronlauge zugleich Ammoniak in Freiheit gesetzt wird, als Zersetzungsprodukt des zurückgebildeten Ammoniumformiates. Ammoniakentwicklung tritt unter diesen Bedingungen auch bei anderen — und gerade als Schlafmittel empfohlenen — Chloralderivaten, z. B. bei dem Chloralamid und dem Chloralammonium ein. Ein sichereres Kennzeichen wäre die Entwicklung von Kohlenoxyd beim Erwärmen mit konc. Schwefelsäure.

Das Charakteristische des Chloralformamides besteht eben darin, dass es eine (ziemlich lose) Verbindung von Chloral mit Formamid ist. Alle Veränderungen, welche für das Chloral und das Formamid bekannt sind, werden daher auch für die Verbindung beider zutreffen. Dahin gehören z. B. die leichte Spaltbarkeit des Chlorals in Chloroform und die Ueberführung des Formamides in Ammoniumformiat unter dem Einflusse von ätzenden Alkalien.



Das Chloralformamid enthält nach seiner Bereitung und nach seiner Formel 76,6 Proc. wasserfreies Chloral und 23,4 Proc. Formamid.

Prüfung. 1) Das Formamid bildet weisse, geruchlose Krystalle, welche in etwa 20 Th. kaltem Wasser löslich sind. (Chloralhydrat bildet durchsichtige Krystalle, welche stechend riechen und sehr leicht in Wasser löslich sind.)

2) Die Lösung von Chloralformamid in 9 Th. Weingeist darf blaues Lackmuspapier nicht röthen (freie Ameisensäure, Salzsäure als Zersetzungsprodukte des Präparates). Die wässrige Lösung reagirt ganz schwach sauer.

3) Die nämliche alkoholische Lösung soll sich auf Zusatz von Silbernitratlösung nicht sofort verändern. Eine weisse Trübung könnte von Salzsäure (in einem zersetzten Präparate), aber auch von freiem Formamid herrühren, doch würde sich diese Verunreinigung schon durch das Sinken des Schmelzpunktes zu erkennen geben. Die Beobachtung ist sofort anzustellen, da nach einiger Zeit in der mit Silbernitrat versetzten alkoholischen Lösung auch bei reinen Präparaten eine röthliche Färbung infolge Reduktion des Silbernitrates eintritt.

4) Erhitzt, sei Chloralformamid flüchtig (Rückstand unorganische Verunreinigungen), ohne leicht entzündliche Dämpfe zu entwickeln. Diese Prüfung bezieht sich auf eine Verwechslung mit Chloralalkoholat, oder Urethan, welche beide beim Erhitzen Weingeist abspalten und daher leicht entzündliche Dämpfe von Alkohol abgeben.

Aufbewahrung. Vorsichtig! Gegen Licht ist das Chloralformamid, soweit die Erfahrungen bis jetzt reichen, nicht empfindlich.

Anwendung. Chloralformamid wird als Schlafmittel benutzt. Seine Wirkung beruht auf dem Umstande, dass es in der Bluthahn in Chloral und Ammoniumformiat gespalten wird. Als Vorzug vor dem Chloralhydrat wird ihm nachgerühmt, dass es die Athmung und Herzthätigkeit nicht beeinflusst, den Blutdruck nicht herabsetzt und die Verdauung nicht stört, was jedoch nach LANGGAARD nur in bedingtem Maasse der Fall ist. Die schlafbringende Dosis ist 1—2—3 g. Höchstgaben *pro dosi* 4,0 g, *pro die* 8,0 g (Germ.)

Ausgeschieden wird das Chloralformamid, ebenso wie das Chloralhydrat, als Urochloralsäure, s. unter Chloralhydrat.


Lösungen von Chloralformamid in Wasser sind aus den oben angeführten Gründen ohne Erwärmung darzustellen.

X. † Chloralose Anhydroglucochloral $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{O}_6$. Mit dem Namen „Chloralose“ bezeichnen HANRIOT und RICHET das schon 1889 von A. HEFFTER dargestellte Anhydroglucochloral.

Darstellung Man erhitzt im geschlossenen Rohr ein Gemisch gleicher Theile wasserfreien Chlorals und trockner wasserfreier Glucose (Traubenzucker) eine Stunde lang auf 100° C behandelt die Reaktionsmasse nach dem Erkalten mit wenig Wasser, dann mit siedendem Aether, und bringt die atherischen Auszüge zum Verdunsten. Der Verdunstungsrückstand wird mit Wasser aufgenommen und solange mit Wasserdampf destillirt, bis alles Chloral vertrieben ist. Die nunmehr hinterbleibende Substanz kann man durch successive Krystallisation in einen α -Körper, welcher in kaltem Wasser wenig, in warmem Wasser sowie in Alkohol ziemlich löslich ist, und in einen β Körper trennen, welcher auch in heissem Wasser schwer löslich ist.

Der soeben angeführte leichter lösliche α -Körper ist die Chloralose, die schwerer lösliche β Substanz nennen HANRIOT und RICHET „Parachloralose“. Die Ausbeute an ersterer beträgt nur 3%.

Die Chloralose bildet farblose, feine Nadeln, welche bei 184 bis 186° C schmelzen. Sie löst sich in 170 Th. Wasser von 15° C, leichter in heissem Wasser, sehr leicht in Alkohol, Aether und Eisessig. Die Krystalle schmecken bitter.



Die Chloralose ist ein Hypnoticum und steigert die Erregbarkeit des Rückenmarkes. Die Wirkung ist nicht lediglich dem in der Verbindung vorhandenen Chloral zuzuschreiben, da man schon mit 0,5 g mehrstündigen, ruhigen, tiefen Schlaf erzeugen kann, selbst bei Personen, bei denen andere Schlafmittel unwirksam sind. Als Einzelgabe soll man über 1,0 g nicht hinausgehen. Vorsichtig aufbewahren.

† Parachloralose hat die gleiche empirische Zusammensetzung wie Chloralose, nämlich $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}_3\text{O}_6$ und ist mit dieser entweder isomer oder polymer. Farblose, perlmutterartig glänzende Blättchen, in kaltem Wasser gar nicht, in heissem Wasser wenig löslich, leicht löslich in heissem Alkohol, Aether und Eisessig. Schmelzpunkt 229° C.

Ähnliche Verbindungen sind Arabino-Chloralose, aus Chloral + Arabinose, Galacto-Chloralose (Galaktochloral) aus Chloral + Galaktose, Laevulo-Chloralose (Laevulo Chloral) aus Chloral + Laevulose und Xylo-Chloralose (Xylochloral) aus Chloral + Xylose dargestellt. Indessen werden dieselben α Z therapeutisch kaum verwendet.

† Chinoral. Ein angeblich aus Chinin und Chloral dargestelltes Additions- oder Kondensationsprodukt. Eine olige, dickliche und sehr bitter schmeckende Flüssigkeit, welche weder die Reizwirkung des Chinins, noch diejenige des Chlorals besitzen und auf die Herzthätigkeit ohne Einfluss sein soll. Seine Verwendung ist vornehmlich als antiseptisches Mittel gedacht, indem es als solches sogar das Quecksilberchlorid übertreffen soll. — Innerlich werden 0,05–1,0 g als Einzelgabe angegeben, während zur schlafbringenden Wirkung des Mittels grössere Gaben erforderlich sind.

† Coffein Chloral, Chloral-Coffein entsteht durch Zusammenbringen von 10 Th. Coffein mit 7,8 Th. Chloralhydrat in konc. wässriger oder alkoholischer Lösung und Verdunsten der klaren Lösung bei massiger Wärme.

Farblose, glänzende, in Wasser und in Alkohol leicht lösliche Blättchen. Beim Erwärmen mit Alkalien spalten sie sich in Coffein und Chloroform. Die wässrige Lösung spaltet sich beim Erwärmen in ihre Komponenten.

Die Verbindung wird bei hartnäckiger Verstopfung subkutan als leichtes Abführmittel und als Beruhigungsmittel bei Reizung des peripherischen Nervensystems angewendet. Dosis 0,2–0,4 g — 0,9 g pro die.

† Chlorobrom. Eine Lösung von 6 Th. Kalumbromid und 6 Th. Chloralformamid in 58 Th. Wasser. Schlafmittel. Dosis 1 Esslöffel voll.

† Jodo-Pheno-Chloral. Eine Mischung aus gleichen Theilen Jodtinktur, Karbolsäure und Chloralhydrat. Braune Flüssigkeit zum Aufpinseln bei parasitären Hauterkrankungen angewendet.

† Somnal. Eine Auflösung von Chloralhydrat und Urethan in Alkohol. Lediglich eine Mischung, kein chemisches Präparat.

† **Chloralum camphoratum.** Chloral-Kampher Kampher-Chloral Gleiche Theile Chloralhydrat und Kampher werden im erwärmten Mörser zusammengerieben, bis sie sich vollständig verflüssigt haben Als hautreizende Einreibung angewendet Bei mittlerer Temperatur aufzubewahren

† **Chloral-Acetophenonoxim** $(C_6H_5)(CH_3)C=NO \cdot CH_3(OH)CCl_3$ Zur Darstellung werden molekulare Mengen wasserfreies Chloral und Acetophenonoxim bei niedriger Temperatur und zwar zweckmässig bei Gegenwart eines Verdünnungsmittels wie Benzol zusammengebracht

Farblose, bei 81° C schmelzende, in Alkohol und Aether leicht lösliche Prismen Durch Säuren, leichter noch durch Alkalien, erfolgt Spaltung in die Komponenten

An Stelle des Chloralhydrats, dessen unangenehme Nebenwirkungen es nicht besitzen soll, bei Kramp fzuständen, wie Epilepsie, Eklampsie und Tetanus — Vorsichtig aufzubewahren

Captolum Captol Ein Kondensationsprodukt von Chloral und Gerbsäure

Zu einer heissen wässrigen Lösung von Tannin fügt man Schwefelsäure und nach Abscheidung des Tannins eine konc Lösung von Chloralhydrat Das Ganze wird bis zur Bildung einer Pasta erhitzt. Der Niederschlag wird abfiltrirt, gewaschen und getrocknet. (Engl. Patent 2882)

Granbraunes, amorphes Pulver, welches in heissem Wasser löslich ist, beim Erkalten sich aber zum Theil wieder abscheidet In Alkohol ist es leicht löslich, die wässrige Lösung giebt mit Eisenchlorid eine olivgrüne Färbung, die auf Zusatz von Säuren, z B Salzsäure oder Oxalsäure, wieder verschwindet. Beim Erhitzen des Captols mit Anilin + Kalilauge tritt starker Isonitri-Geruch auf. — In den Handel gelangt eine 10procentige alkoholische Captol-Lösung

Nach EICHENHOFF ist das Captol ein ausgezeichnetes Mittel bei Seborrhoea capitis, die sich in Schnuppen- und Schinnenbildung mit allmählichem Haarausfall aussert Man reibt die erkrankte Kopfhaut morgens und abends mit einer 1—2procentigen alkoholischen Captollösung ein, wobei Seife, Pomade, Salben auszuschliessen sind Etwaige Flecke in der Wäsche lassen sich durch verdünnte Salzsäure oder durch Oxalsäure entfernen

Spiritus Captoli Captol-Haarspiritus Rp Captoli, Chlorali hydrati, Acidi tartarici $\bar{a}\bar{a}$ 1,0 Olei Ricini 0,5, Spiritus (65 Vol Proc) 100,0, Parfum ad libitum

Spiritus Captoli compositus Rp Captoli, Acidi tartarici, Resorcini $\bar{a}\bar{a}$ 1,0, Acidi salicylici 0,7, Olei Ricini 0,5, Spiritus (65 proc) 100,0, Parfum ad libitum

Liquor erinalis. Chloral-Tannin-Haaröl, Glycerin, Aqueae destillatae $\bar{a}\bar{a}$ 40,0, Chlorali hydrati, Acidi tannici $\bar{a}\bar{a}$ 10,0 Gegen Haarerkrankungen, welche durch Mikroben veranlasst werden

Enema Chlorali hydrati WALDENBURG.

Rp Chlorali hydrati	2,5
Aqueae destillatae	
Mucilaginis Gummi arabici $\bar{a}\bar{a}$ 50,0	
S. Zum Klystier	

Emplastrum Chlorali hydrati

Rp 1 Chlorali hydrati pulv	10,0
2. Cerae flavae	80,0
3. Sibi ovis	20,0

Man löst 1 in der geschmolzenen Mischung von 2 und 3, und bringt in Stangenform.

Linctus Chlorali hydrati

(Münch Ap V., Nosokom Vorschr.)

Pp Chlorali hydrati	8,0
Sirupi Aurantii corticis	
Aqueae destillatae $\bar{a}\bar{a}$ 15,0	

Linimentum Chlorali hydrati.

Rp Chlorali hydrati pulverati	10,0
Olei Amygdalarum	50,0

Solve Zum Einreiben der schmerzhaften Stellen.

Liquor Chlorali bromatus FELLNER.

(Münch A V) loco Bromidii

Rp Chlorali hydrati	8,0	g
Kalii bromati	6,0	"
Extracti Hyoscyami	0,8	"
Extracti Cannabis Indicae	0,048	"
Aqueae Menthae piperitae	4,0	"
Aqueae Aurantii Corticis	50,0	"
Chloroformi	gitt V	
Tincturae Zingiberis	3,0	"
Sirupi Liquiritiae	45,0	"
Aqueae destillatae	52,0	"

Mixtura anodyna LIEBRICH.

Rp Chlorali hydrati	2,5
Aqueae destillatae	
Sirupi Aurantii corticis $\bar{a}\bar{a}$ 15,0	
Als Sedaticum 1 Theelöffel bis $\frac{1}{2}$ Esslöffel.	
Als Hypnoticum auf einmal zu nehmen	

Mixtura Chlorali hydrati

(Münch A V, Nosokom. Vorschr.)

Rp Chlorali hydrati	5,0
Aqueae	75,0
Sirupi Sacchari	20,0

Mixtura Chlorali hydrati composita

loco Bromidia (Hamb. Verschr.)

Rp	1 Extracti Hyoscyami	1,0
	2 Kali bromati	
	8 Chlorali hydrati	aa 100,0
	4 Aquae	300,0
	5 Tincturae Quillajae	30,0
	6 Extracti Cannabis Indicae	1,0
	7 Spiritus (80 Vol. Proc.)	20,0
	8 Aquae	q s ad 600,0

Man löst 1—4 und filtrirt, fügt 5 zu, hierauf die filtrirte Lösung von 6 in 7, schliesslich 8 q s

Mixtura Chlorali et Potassii Bromidi composita
(Nat. Form.)

Compound Mixture of Chloral and Potassium Bromide Bromidia

Rp	Chlorali hydrati	200,0 g
	Kali bromati	250,0 "
	Extracti Cannabis Indicae (U-St.)	2,0 "
	Extracti Hyoscyami (U-St.)	2,0 "
	Spiritus (85 Vol. Proc.)	60 ccm
	Tincturae Quillajae	65 "
	Aquae	q s. ad 1 Liter

Mixtura hypnotica WALDENBURG

Rp	Chlorali hydrati	3,0
	Kali bromati	5,0
	Aquae destillatae	100,0
	Sirupi Aurantii corticis	50,0

Abends den $\frac{1}{4}$ Theil auf einmal zu nehmen**Mixtura sedativa JASTROWITZ**

Rp	Chlorali hydrati	10,0
	Morphini hydrochlorici	0,1
	Infus. Althaeae frigidae parati	150,0
	Succi Liquiritiae depurati	10,0

1 bis 2 stündlich 1 Esslöffel als Sedativum bei Gichteskranken

Oleum Jecoris chlorallatum.

Rp	Chlorali hydrati	10,0
	Olei Jecoris	190,0

Abends 1 Esslöffel für Phthisiker

Sirupus Chlorali (Gall).**Sirap de Chloral (Gall.)**

Rp	Chlorali hydrati	50,0
	Aquae destillatae	45,0
	Sirupi Sacchari (spec. G = 1,32)	400,0
	Spiritus Menthae	5,0

Suppositoria Chlorali hydrati WALDENBURG**I**

Rp	Chlorali hydrati	4,0
	Saponis medicati	2,5
	Mellis q s	

Fiant suppositoria No 2

II

	Cerae flavae	5,0
	Olei Cacao	12,0
	Chlorali hydrati	3,0

Fiant suppositoria No 3

Vet. Mixtura sedativa pro canibus

Rp	Chlorali hydrati	10,0
	Gummi arabici	
	Sirupi Sacchari aa	10,0
	Aquae communis	150,0

Stündlich einen Esslöffel Für einen Hund mit nächtlichem Heulen

Unguentum pomadinum Captoli, Captol Pomade Rp Captoli, Acidi tartarici 1—2,0, Lanolini 5,0, Vaselini 90,0, Parfum ad libitum

Chloroformium.



I † Chloroformium (Austr. Germ.) **Chloroformum** (Brit. Helv. U-St.) **Chloroforme officinal** (Gall.) **Chloroform** **Trichlormethan** **Formylam** (Formyle) **trichloratum** **Formylechlorid**. CHCl_3 Mol. Gew. = 119,5 Die Hauptmengen dieses Präparates werden auch heute noch durch Einwirkung von Chlorkalk auf Weingeist oder Aceton dargestellt. Nicht unbedeutende Mengen werden ferner durch Zersetzung von Chloralhydrat gewonnen. Ausserdem aber kommen noch eine grosse Anzahl Specialmarken im Handel vor.

Darstellung. 1) Aus Weingeist und Chlorkalk. 20 Th. Chlorkalk von 30 Proc. Chlorgehalt werden in einer geräumigen Destillirblase mit 80 Th. Wasser angerührt und mit 4 Th. fuselfreiem Weingeist von 86 Proc. vermischt. Nachdem die Blase gehörig gedichtet und mit der Kühlvorrichtung in Verbindung gebracht worden ist, erwärmt man den Blaseninhalt auf 45—50° C. durch Einlassen von Dampf. Sobald diese Temperatur erreicht ist, stellt man den Dampf ab, da sonst die Reaktion zu stürmisch und unter Bildung anderer Produkte verlaufen würde. Unter freiwilliger Erwärmung beginnen nun Chlorkalk und Weingeist auf einander einzuwirken, und es destillirt eine Mischung von Wasser, Alkohol und Chloroform über. Wenn die Reaktion nachlässt, kann man sie durch weiteren, vorsichtigen Zutritt von Dampf auf's neue hervorrufen.

Nach Beendigung der Operation bildet das Destillat zwei Schichten, von denen die untere, spec. schwerere, aus Rohchloroform, die obere, spec. leichtere, aus einer wässrig-alkoholischen Auflösung von wenig Chloroform besteht, aus welcher man durch Verdünnen mit Wasser das in Lösung gehaltene Chloroform abscheiden kann.

Man trennt nun das Rohechloroform von der wässrigen Flüssigkeit, wäscht es zu nachst mehrmals mit Wasser und behandelt es alsdann mehrere Tage unter häufigem Umschütteln mit concentrirter Schwefelsäure, um die gebildeten chlorhaltigen Nebenprodukte zu entfernen. Diese Behandlung ist so oft zu wiederholen, bis die Schwefelsäure durch das Chloroform nicht mehr geschwärzt bez gebräunt wird. Das so gereinigte Chloroform wird hierauf von der Schwefelsäure getrennt, mit einer Lösung von Natriumkarbonat, später mit Wasser gewaschen, alsdann durch Maceration mit geschmolzenem Chlorcalcium oder gegläuthter Pottasche (oder zum Schluss mit Phosphorsäureanhydrid) entwässert, hierauf der Rectifikation bez Destillation aus dem Wasserbade unterworfen, wobei die ersten, in der Regel trübe übergehenden Antheile gesondert aufgefangen und nur die bei 59–62° übergehenden Antheile als Chloroform aufgefangen werden. Durch Zusatz von fuselfreiem absoluten Alkohol wird das reine Chloroform alsdann auf das geforderte spec Gewicht gebracht.

2) Aus Aceton und Chlorkalk. Seit etwa 20 Jahren wird Chloroform auch aus dem bei der Holzessigfabrikation abfallenden Roh-Aceton dargestellt. Man mischt 270 Th Chlorkalk (von 33 Proc Chlorgehalt) mit 800 Th Wasser und lässt ein Gemisch von 32 Th Aceton und 70 Th Wasser zufließen. Die Bildung des Chloroforms erfolgt freiwillig und wird später durch schwache Erwärmung unterstützt.



Das als Nebenprodukt entstandene Calciumacetat kann auf Essigsäure oder durch trockene Destillation wieder auf Aceton verarbeitet werden.

3) Chloroform aus Chloral. Wasserfreies Chloral oder Chloralhydrat werden mit Natronlauge von 1,1 spec Gewicht einige Zeit digerirt, alsdann destillirt und das gewonnene Chloroform schliesslich, wie sub 1) angegeben, gereinigt.

Auf die Darstellung von Chloroform durch Elektrolyse einer massig starken alkoholischen Lösung von Calciumchlorid (analog dem Jodoform) ist zwar ein Patent genommen worden, doch ist das Produkt selbst im Handel anscheinend noch nicht zu haben.

Das von den Pharmakopöen recipirte Chloroform ist nicht reines Chloroform, viel mehr haben die officinellen Chloroform-Sorten, um ihre Haltbarkeit zu erhöhen, Zusätze von Alkohol erfahren. Eine Ausnahme hiervon macht die Gall.

Eigenschaften. A) des reinen Chloroforms. Dasselbe hat im übrigen die noch zu besprechenden Eigenschaften des officinellen Chloroforms, doch ist sein spec Gewicht bei +10° C=1,5088, bei 15° C=1,502, bei 17,75° C=1,497, bei 20° C=1,4936. Der Siedepunkt liegt unter dem normalen Barometerdrucke bei 62° C. Das reine Chloroform hat die Eigenschaft, sich unter dem Einflusse von Luft und Licht (bei direkter Besonnung schon nach einigen Stunden, im zerstreuten Tageslichte nach Tagen oder Wochen) zu zersetzen. Im Verlaufe dieser Zersetzung tritt zunächst freies Chlor auf, dann entstehen Phosgen (s. S. 36), welches an seinem widerlichen Geruch kenntlich ist, Wasser, schliesslich Salzsäure. 1) $2\text{CHCl}_3 + 3\text{O} = 2\text{COCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}$. 2) $\text{COCl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + 2\text{HCl}$. Diese Fähigkeit des Chloroforms, durch Licht zersetzt zu werden, ist eine Eigenschaft des reinen Chloroforms und kann diesem durch einen verhältnissmässig kleinen Zusatz von Alkohol genommen werden. Durch diesen Zusatz von Alkohol werden spec Gewicht und Siedepunkt etwas beeinflusst. Nach Biltz ist

Bei einem	das spec Gewicht	der
Alkohol Zusatz von	bei 15° C	Siedepunkt ° C
0,25 Procent	1 4977	61,8 —61,9
0,50 "	1 4939	61,07—61,8
1,0 "	1 4854	60,27—61,6
2,0 "	1 4705	59, 0—61,2

Durch Abkühlen auf niedrige Temperatur erstarrt das reine Chloroform zu Krystallnadeln, welche bei etwa -70°C schmelzen

B) des officinellen Chloroforms Dieses ist eine klare, farblose, leicht flüchtige Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruche und süßlichem Geschmacke In Wasser ist es nur wenig (1:200) löslich, ertheilt demselben aber seinen specifschen Geruch und Geschmack Mit Weingeist, Aether, fetten und aetherischen Oelen ist es in jedem Verhältnisse mischbar Nicht mischbar ist es mit konc Schwefelsäure oder mit Glycerin Es ist ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für eine Anzahl sonst schwerlöslicher Stoffe So löst es z. B. Jod (mit violetter Färbung), Schwefel, Phosphor, Paraffine, Fette, Harze, Alkaloide, Kautschuk Auf die Haut gebracht, verursacht es infolge seiner Verdunstung zunächst Kaltegefühl, alsdann bewirkt es Brennen und Röthung der Hautstelle Nach wiederholter ausserer Anwendung von Chloroform stösst sich die Haut an den betreffenden Stellen ab Chloroform ist nicht leicht entzündlich, sein Dampf aber verbrennt mit grüner Flamme, ohne jedoch mit Luft explosive Gemenge zu geben

Konc Schwefelsäure oder Salpetersäure greifen Chloroform bei mittlerer Temperatur nicht an, dagegen führt es ein Gemisch von konc Schwefelsäure und rauchender Salpetersäure beim Erwärmen in Nitrochloroform (=Chlorpikrin CCl_2NO_2) über, eine ölige, bei 112°C siedende Flüssigkeit von heftig reizendem Geruche Alkoholische Kali- oder Natronlauge wirken zersetzend auf Chloroform unter Bildung von Alkalichlorid und Alkaliformat $\text{CHCl}_3 + 4\text{KOH} = 3\text{KCl} + \text{HCO}_2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O}$ Auf dem Auftreten von Ameisensäure bei dieser Reaktion beruht die Thatsache, dass Chloroform aus Fehling'scher Lösung beim Erhitzen Kupferoxydul abscheidet

Eine weitere, sehr wichtige Reaction ist die Isonitrilreaction oder Carbylaminreaction (A. W. v. Hofmann) Diese besteht darin, dass Chloroform beim Erhitzen mit (weingeistiger) Kalilauge und irgend einem primären Amin die ausserordentlich widerlich riechenden Isonitrile giebt Benutzt man als primäres Amin = das Anilin erhitzt man also das letztere mit (weingeistiger) Kalilauge und etwas Chloroform, so bildet sich Phenylcarbylamin oder Isocyanphenyl $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{CCl}_3\text{H} + 3\text{KOH} = 3\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O} + \text{C}_6\text{H}_5\text{NCO}$

Von Farbreaktionen sind einige von Interesse, welche Chloroform mit mehreren Phenolen bei Gegenwart von ätzenden Alkalien giebt

- a) Beim Erwärmen von Chloroform mit Resorcin und 88 proc Kalilauge entsteht gelb rothe Färbung mit grüner Fluorescenz
- b) Beim Erwärmen von Chloroform mit Naphthol und konc Kalilauge entsteht blaue Färbung, an der Luft in Grün, dann Braun übergehend

Das spec Gewicht und die Siedetemperatur des officinellen Chloroforms werden von den hier berücksichtigten Pharmakopoen wie folgt angegeben

	Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U-St
Spec Gewicht bei 15°C	1,485—1,50	1,49—1,496	1,50	1,485—1,489	1,485—1,49	>1,49
Siede-Temperatur $^{\circ}\text{C}$	60—62,0	60—62,0	60,8	60—62	60—62	60—61
Hiernach Gehalt an Alkohol in %	0,25—1,0	0,4—0,7	—	0,7—1,0	0,7—1,0	0,5—1,0

Ein Gehalt von 1,0 Procent absolutem Alkohol ist bei sonst zweckmässiger Aufbewahrung im Stande, das Chloroform jahrelang vor Zersetzung zu schützen Bei einem Gehalt von 0,25 Proc dauerte die konservirende Wirkung mehrere Wochen, bei 0,5 Proc 11 Monate Wie man sich diese Wirkung des Alkohols vorzustellen hat, ist noch nicht aufgeklärt Ueber die Bestimmung des Alkohols im Chloroform s. Pharm. Centralh. 1897, 647

Prüfung Dass eine Flüssigkeit Chloroform ist, erkennt man an dem eigenthümlichen Geruche, ferner an dem zutreffenden spec Gewichte und am Siedepunkte Die Isonitril-Reaction ist für die Bestimmung der Identität allein nicht hinreichend, denn sie ist so scharf, dass sie in einer Flüssigkeit mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften wie Aethylenchlorid und Aethyldichlorid auch noch wenige Procente Chloroform erkennen lassen würde Die angegebenen Farbreaktionen treten auch mit Chloral, Bromal, Bromoform und Jodoform ein Die Prüfung auf Reinheit hat sich auf folgende Punkte zu erstrecken

1) Es sei klar, farblos und zeige das vorgeschriebene spec Gewicht und gehe in seiner ganzen Menge bei 60—62° C über. Bei der Bestimmung der Siedetemperatur wende man eine grössere Menge Chloroform (100—200 ccm) an und destillire diese aus einem Fraktionskölbchen, welches in ein Wasserbad eingehängt wird. Die Temperatur des als Wärmequelle dienenden Wassers soll 70° C nicht erheblich übersteigen.

2) Der Geruch sei charakteristisch, nicht unangenehm erstickend (Phosgen). Werden etwa 5 ccm Chloroform auf gutem Filtrirpapier der freiwilligen Verdunstung überlassen, so soll sich kein fuseliger oder anderer unangenehmer Geruch wahrnehmen lassen.

3) Man schüttelt in einem sauberen Stopfengläse 20 ccm Chloroform mit 10 ccm vorher ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser eine halbe Minute kraftig durch. Nach dem Absetzen des Chloroforms wird die wässrige Schicht mittels einer Pipette abgehoben. Sie darf a) empfindliches blaues Lackmuspapier (Marke-Helfenberg) nicht röthen (bez. durch neutrale Lackmustinktur nicht roth gefärbt werden), andernfalls ist freie Salzsäure als Zersetzungsprodukt des Chloroforms (oder freie Schwefelsäure, oder Essigsäure etc.) vorhanden, b) vorsichtig auf eine Mischung von je 2,5 ccm Wasser und Silbernitratlösung geschichtet, an der Berührungsstelle eine Trübung nicht hervorrufen. Eine weisse Trübung würde auf Gegenwart von Salzsäure zurückzuführen sein, eine gelbliche oder röthliche Trübung könnte von Anwesenheit arseniger Säure oder Arsensäure herrühren, über deren Vorkommen im Chloroform Scholvin (Apoth-Ztg 1887, 92) berichtete.

4) Werden 5 ccm Chloroform mit 5 ccm Zinkjodidstärkelösung (oder Cadmiumjodidstärkelösung Heiv) geschüttelt, so darf weder eine Blaufärbung derselben, noch eine röthliche Färbung des Chloroforms eintreten. Beide Erscheinungen wurden durch in Freiheit gesetztes Jod bewirkt werden. Als Verunreinigung, welche das Jod aus dem Zinkjodid in Freiheit setzt, gilt freies Chlor, man nimmt an, dass auch dieses ein Zersetzungsprodukt des Chloroforms ist.

5) 20 ccm Chloroform sollen bei häufigem Schütteln mit 15 ccm Schwefelsäure in einem 8 cm weiten, vorher mit Schwefelsäure gespülten weissen Glase mit Glasstopfen innerhalb einer Stunde die Schwefelsäure nicht färben. Hierzu wäre folgendes zu bemerken: Chloroform wird von concentrirter Schwefelsäure nicht angegriffen, es ist gegen Schwefelsäure „parum affinis“. Wohl aber werden von der Schwefelsäure angegriffen unter Dunkel- bis Schwarzfärbung, die das Chloroform verunreinigenden fremden Chlorprodukte, insbesondere Aethylidenchlorid und gechlorte Amylverbindungen, letztere aus fuselhaltigem Alkohol herrührend.

Lässt sich ein Chloroform, welches diese Probe nicht hält, durch blosse Rectifikation in ein probefähiges umwandeln, so sind die Verunreinigungen wahrscheinlich erst im Verlaufe der Aufbewahrung aus Korkstopfen etc. in das Chloroform gelangt. Rühren sie dagegen von fremden Chlorprodukten her, so lässt sich das Chloroform durch einfache Rectifikation von ihnen nicht befreien und muss alsdann dem weiter unten angegebenen Reinigungsverfahren unterworfen werden.

Aufbewahrung Wie schon bemerkt wurde, ist absolut reines Chloroform nicht gut haltbar. Seine Haltbarkeit wird jedoch erhöht durch einen geringen Weingeistzusatz. Aus diesem Grunde enthält das Chloroform der Pharmakopöen einen Zusatz von 0,5—1 Proc Weingeist. Weiterhin hat man die Erfahrung gemacht, dass das Tageslicht die Zersetzung des Chloroforms begünstigt, daher ist die Aufbewahrung unter Lichtabschluss zu empfehlen. Wegen seiner narkotischen Eigenschaften ist Chloroform endlich vorsichtig aufzubewahren.

Für die Praxis sind folgende Regeln aufzustellen: das Chloroform werde in gelben (anaktinischen) Flaschen mit gut eingeriebenen Glasstopfen (!) an einem kühlen Orte des Kellers aufbewahrt. Korkstopfen sind nicht zu empfehlen, weil sie an das Chloroform Extraktivstoffe abgeben, in folgedessen dann das Chloroform die Schwefelsäureprobe nicht hält.

Die Gefässe fülle man mit dem Chloroform fast völlig an und wähle sie je nach dem Bedarf so gross, dass sie nicht zu oft geöffnet werden brauchen

Wirkung und Anwendung Auf der Haut erzeugt Chloroform beim Verdunsten Kältegefühl, Brennen, Röthung, Herabsetzung der Sensibilität der betreffenden Stelle, auf Schleimhäuten Wärmegefühl und lokale Anästhesie. In grosser Verdünnung, z. B. als Chloroformwasser, ist Chloroform ein ausgezeichnetes Antisepticum, z. B. zur Konservirung von Extraktlösungen etc. empfohlen worden.

Man wendet Chloroform äusserlich an unverdünnt oder mit verschiedenen Oelen und alkoholischen Flüssigkeiten kombiniert zur Linderung verschiedener schmerzhafter Affektionen: Neuralgien, rheumatischen Schmerzen, Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen, wobei es zugleich als Anästheticum und Rubefaciens wirkt.

Innerlich gegeben, wird Chloroform resorbirt, und es kommt zu einer entfernten allgemeinen Wirkung, doch ist dieselbe weniger sicher als nach Einathmung von Chloroformdämpfen. — Die Hauptanwendung findet Chloroform als Anästheticum bei chirurgischen Operationen. Man lässt es zu diesem Zwecke mittels vor den Mund gehaltener, mit Chloroform getränkter Tücher (auch Chloroform-Masken) einathmen unter genauer Beobachtung von Puls und Respiration des zu Chloroformirenden. Es folgt zunächst ein Stadium der Erregung (Excitationsstadium), sodann vollständige Bewusst- und Empfindungslosigkeit. — Der Tod erfolgt nach übermässiger Einathmung von Chloroform durch Herzlähmung. Bisweilen tritt der Tod schon nach wenigen Zügen durch Herzlähmung ein. — Da in der Chloroformnarkose die Muskeln erschlaffen, so wird die Einrichtung von Verrenkungen durch Anwendung der Chloroformnarkose ungemein erleichtert.

In der Analyse wird das Chloroform namentlich als Auflösungsmittel verwendet zum Nachweis von Jod und Brom, ferner zum Ausschütteln von Alkaloiden (s. S. 210 f.), auch kann man es zur Trennung von festen Substanzen benutzen, deren spec. Gewicht höher oder geringer ist als das des Chloroforms. Schüttelt man z. B. Gewürze, Mohnsamen u. dergl. mit Chloroform, so sinken Sand und Steinchen zu Boden, während die Mohnsamen etc. auf dem Chloroform schwimmen.

In der Technik dient es namentlich als Lösungsmittel für Kautschuk und Gutta-percha. — Die Mischung von Chloroform mit Wasser ist durch einen kleinen Zusatz von Saponin möglich.

Chloroform ist auch das beste Mittel, um Theerflecke aus Zeugstoffen zu entfernen.

Chloroforme rectifié du commerce. (Gall.) Ist ein Handelschloroform mit rund 1 Proc. Alkohol, welches nach Gall zu medicinischem Gebrauche erst verwendet werden darf, nachdem es einem von ihr speciell angegebenen Reinigungsverfahren unterworfen worden ist.

Reinigung des Chloroforms Obgleich das Chloroform des deutschen Handels zur Zeit von grosser Reinheit ist, so halten es viele Operateure und Apotheker doch für geboten, dasselbe noch einer Reinigung zu unterwerfen. In gleicher Weise wurden auch Chloroformsorten zu reinigen sein, welche aus irgend einem Grunde einer Reinigung bedürftig erscheinen.

1 Liter Chloroform giesst man in eine starkwandige weisse Flasche mit Glasstopfen, fügt 100 ccm farblose conc. Schwefelsäure hinzu und schüttelt die Mischung kräftig durch. Dieses Durchschütteln wiederholt man während eines Tages $\frac{1}{2}$ stündlich, bewahrt aber während der Pausen die Flasche an einem dunklen Orte auf. Nach dem Absetzen scheidet man das Chloroform von der Schwefelsäure und schüttelt es mit einer neuen Menge von 50–60 ccm Schwefelsäure durch und wiederholt diese Behandlung, bis die Schwefelsäure nicht mehr merklich gefärbt wird. Ist dieser Punkt erreicht, so trennt man das Chloroform von der Schwefelsäure, wäscht es zunächst zweimal mit je 100 ccm Wasser, dann lässt man es zweimal 12 Stunden unter gelegentlichem Umschütteln mit 100 ccm einer dünnen Sodaauslösung (1:10) in Berührung, wäscht nochmals mit Wasser und sammelt das gewaschene Chloroform. Alsdann macerirt man es 12–24 Stunden unter gelegentlichem Umschütteln über geschmolzenem Calciumchlorid, giesst es ab und rectificirt es aus dem Wasserbade, am besten aus einer Retorte (s. Fig. S. 190) mit eingesetztem Thermometer. Man fängt die ersten, gewöhnlich etwas trübe übergelenden 5 Proc. gesondert auf, dann als Chloroform etwa 90 Proc., und die letzten 5 Proc. sammelt man wieder besonders

Zum Schluss mischt man dem Chloroform das erforderliche Quantum absoluten, reinen Alkohol zu

Die Gall. schreibt vor, die Rektifikation unter Zusatz einer kleinen Menge Mandelöl auszuführen, ein früher häufig geübter, nicht unrationeller Kunstgriff, durch welchen riechende Verunreinigungen zurückgehalten werden sollen, der in Deutschland aber in Vergessenheit gerathen zu sein scheint

Todesfälle in der Narkose. Die Fälle, dass während der Chloroformnarkose der Tod eintritt, ohne dass das klinische Krankheitsbild und die später folgende Sektion eine greifbare Todesursache erkennen lassen, sind nicht sehr selten. In der Regel wird zunächst die Beschaffenheit des Chloroforms für den Unglücksfall verantwortlich gemacht und zwar in der Regel zu Unrecht. Es ist noch kein Fall bekannt geworden, in welchem ein Todesfall in der Chloroformnarkose mit Sicherheit auf die mangelhafte Beschaffenheit des verwendeten Chloroforms hatte zurückgeführt werden können.

Zu dieser irrigen Ansicht hat sehr viel beigetragen die Beobachtung, dass während Narkosen, welche bei künstlicher Beleuchtung ausgeführt werden, Dämpfe aufstiegen, welche zum Husten reizen und erstickend wirken. Diese Dämpfe, welche im wesentlichen aus Salzsäure bestehen, ausserdem auch Phosgen enthalten, entstehen durch Verbrennen des Chloroformdampfes an den offenen Flammen, ihr Auftreten hat mit der Reinheit des Chloroforms nichts zu thun — Es ergibt sich indessen daraus, dass Narkosen bei offenen Flammen thunlichst zu vermeiden sind und dass die geeignetste Beleuchtung zur Ausführung von Chloroformnarkosen diejenige durch elektrisches Glühlicht ist.

Manche Aerzte schreiben, um sich vor unerwarteten Todesfällen bei der Narkose zu schützen, vor, dass der Apotheker das Chloroform vor der Abgabe frisch rektifiziren solle. Dieser Forderung hat der Apotheker unweigerlich nachzukommen. Thut er es nicht, so kann er unter Umständen wegen fahrlässiger Tödtung zur Rechenschaft gezogen werden.

Forensischer Nachweis. Ist der Nachweis einer Chloroformvergiftung zu führen, so werden die mit Weinsäure schwach angesäuerten Objekte nach Zusatz einiger Kubikcentimeter Alkohol der Destillation im Wasserdampfstrom unterworfen. Arbeitet man mit einem aufsteigenden (Mitscherlich'schen) Kühler, so ist alles Chloroform in den zuerst übergelhenden Antheilen enthalten, wesshalb man die zuerst übergelhenden Antheile für sich auffängt. Mit dem Destillate stellt man an 1) die Isomiryl Reaktion, bei welcher man sich durch den Geruch des Anilins nicht täuschen lassen darf, 2) die oben angegebenen Farbreaktionen, d. h. man lost etwa 0,1 g β -Naphthol in Kalilauge, erwärmt auf etwa 50° C und setzt einige Tropfen des Destillates hinzu. Bei Anwesenheit von Chloroform tritt vorübergehende Blaufärbung auf. Man setzt ferner zu einer Auflösung von 0,1 g Resorcin in 1—2 ccm Wasser einige Tropfen des ersten Destillates, dann einige Tropfen Natronlauge (von 15 Proc NaOH) und erhitzt zum Sieden. Bei Anwesenheit von Chloroform färbt sich die Flüssigkeit gelbroth mit grüner Fluorescenz.

Die quantitative Bestimmung führt man am sichersten und einfachsten nach Ludwig aus.

Das Objekt (Blut, Gehirn, Organtheile) wird in einen Kolben, mit doppelt durchbohrtem Stopfen gebracht. Durch die eine Bohrung führt ein bis fast an den Boden des Kolbens reichendes Glasrohr, durch die andere Bohrung ein Gasableitungsrohr. Letzteres steht in Verbindung mit einem in einem Verbrennungsöfen ruhenden Verbrennungsrohr, welches mit Stücken von Kaliglas gefüllt ist. An das Verbrennungsrohr ist ein mit Silbernitratlösung beschicktes Peligot-Rohr angeschlossen. Zur Ausführung des Versuches drückt oder saugt man mit Hilfe eines Gasometers, während der Kolbeninhalt auf dem Wasserbade auf 60—70° C erwärmt wird, einen Luftstrom, welcher durch Kalilauge gewaschen wird. Dieser führt etwa vorhandenes Chloroform mit sich und verbrennt es in dem zum Glühen erhitzten Glasrohre zu Chlorwasserstoff, welcher in der vorgelegten Silbernitratlösung als Chlorsilber gefällt wird. Nach beendigten Versuche, d. h. nach 1—2stündigem Durchleiten von Luft und Glühen bestimmt man das Gewicht des ausgeschiedenen Chlorsilbers (s. S. 363). 100 Th. Chlorsilber AgCl entsprechen = 27,75 Th. Chloroform CHCl_3 .

Es ist nothwendig, dass man vorher durch einen gleichlange Zeit andauernden blinden Versuch sich davon überzeugt, dass ohne Einschaltung des Untersuchungsobjectes

keine Trübung in der Silbernitratlösung erfolgt. Ferner ist darauf aufmerksam zu machen, dass andere flüchtige Chlorverbindungen, z. B. Methylchlorid, Äthylchlorid, Äthylidenchlorid u. s. w. bei dieser Methode mit bestimmt werden. Will man die Fehlerquelle vermeiden, dass etwa vorhandene freie Salzsäure als Chloroform mit bestimmt wird, so kann man diese durch Zugabe einer genügenden Menge von reinem Calciumkarbonat neutralisieren.

In den meisten Fällen wird man nach Chloroform-Todesfällen durch Inhalation nur Centigramme oder gar Milligramme Chloroform finden (in Blut und Gehirn). Vergiftungen durch Einnehmen von Chloroform *per os* sind selten, und auch in diesen Fällen erhält man aus dem Mageninhalt wegen der leichten Flüchtigkeit des Chloroforms nur geringe Mengen.

Chloroformium e Chloralo hydrato (Ergänzb.) **Chloralchloroform.** Dieses Chloroform verdankt seine Darstellung und Anwendung dem Bestreben, eine möglichst reine Chloroformsorte zur Anästhesie zu verwenden. Wesentlich ist für dasselbe, dass zu seiner Darstellung ein reines krystallisiertes Chloralhydrat und nicht etwa Mutterlaugen von der Chloraldehyd-Darstellung verwendet werden. Diese Gewähr erhält man dadurch, dass man eine zuverlässige Marke (z. B. die von SCHERRING) einkauft. Ohne Zusatz von Alkohol hält sich dieses Chloroform keineswegs besser als gewöhnliches, gutes Chloroform, dagegen erhält es seine Haltbarkeit genau wie dieses durch einen genügenden Zusatz von Alkohol. Das spec. Gewicht dieses Chloroforms ist etwa 1,4874 bei 15° C.

Chemisch ist es von gutem Chlorkalk-Chloroform nicht zu unterscheiden. Für seine Prüfung und Aufbewahrung gilt das auf S. 802 Gesagte.

Chloroformium medicinale Pictet **Eischloroform.** Durch Abkühlen auf -100° C kann das Chloroform in farblosen nadelförmigen Krystallen erhalten und dadurch von nicht krystallisierenden chlorhaltigen Nebenprodukten getrennt werden. Die ursprüngliche Annahme, dass dieses Chloroform auch ohne Alkoholzusatz unbegrenzt haltbar sein werde, hat sich nicht bestätigt, es hat sich vielmehr ergeben, dass es ohne Alkoholzusatz ebenso leicht zersetzlich ist als gewöhnliches Chloroform, dass es aber durch Zusatz von Alkohol entsprechend konserviert wird. Das spec. Gewicht dieser Chloroformsorte wurde bei 15° C zu 1,4863 bestimmt.

Salicylid-Chloroform (ANSCHUTZ). Das Salicylid $(C_6H_4O \cdot CO)_4$ s. S. 106, hat die Eigenschaft, mit Chloroform eine krystallisierende Verbindung einzugehen. Löst man daher Salicylid in Roh-Chloroform auf und überlässt die Flüssigkeit einige Zeit sich selbst, so krystallisiert Salicylid-Chloroform $(C_6H_4O \cdot CO)_4 + 2CHCl_3$ aus, während die Verunreinigungen des Chloroforms in der Mutterlauge bleiben. Lässt man die Krystalle an der Luft liegen, so verlieren sie das aufgenommene Chloroform allmählich. Rascher geben sie das Chloroform beim Erwärmen ab. Man kann also das Chloroform von den Krystallen aus dem Wasserbade abdestillieren. Hierdurch ergibt sich einerseits die Möglichkeit, das Chloroform auf Grund dieser Tatsache zu reinigen, andererseits es in festen Zustand zu bringen, was unter Umständen erwünscht sein kann. Auch dieses Chloroform bedarf zu seiner Haltbarkeit eines Zusatzes von etwa 1,0 Proc. absolutem Alkohol.

Zusammenfassung. Die leichte Zersetzlichkeit durch Licht und Luft ist eine Eigenschaft des reinen absoluten, alkoholfreien Chloroforms. Diese Zersetzlichkeit kann durch einen Zusatz von 1 Proc. absolutem, reinem Alkohol auf Jahre hinaus zurückgehalten werden. Die Aufbewahrung unter Lichtschutz ist zu empfehlen. Die im Preise hoch stehenden Chloroformsorten wie Chloralchloroform, Chloroform Pictet, Salicylid-Chloroform, bieten gegenüber guten Sorten von Chlorkalk-Chloroform keine wesentlichen Vorzüge. Sie sind aber zu dispensieren, sobald sie vom Arzte verordnet werden. Eine gute Sorte Chlorkalk-Chloroform ist unter anderen das Chloroform E. H. von EDUARD HEUBE in Cotta bei Dresden. — Chloroform, welches schon irgend einen chemischen Process durchgemacht hat, sollte wesentlich auch nach erfolgter Reinigung niemals zur Inhalations-Anästhesie verwendet, sondern zu Einreibungen u. dergl. verbraucht werden.

Die zahlreichen Specialmarken von Chloroform, wie z. B. das sog. englische Chloroform von verschiedenen Firmen (z. B. von SALAMON Co., G. DUMONTIERS-Paris), haben

den guten deutschen Handelssorten gegenüber keine Vorzüge, stehen aber im Preise vielfach höher

Mischungen für Anästhesie Von den Mischungen für Inhalations-Anästhesie welche den Zweck haben, die Gefahren bez. Unannehmlichkeiten des reinen Chloroforms zu mildern, geben wir im Nachstehenden die folgenden, wichtigeren an

BILLROTH's Mischung für Kriegs Chirurgie. Chloroformu 3,0, Alkohol 1,0, Aetheris 1,0

DONICH's Chloroform - Aether - Mischung. Chloroformu 10,0, Aetheris 15,0, Mentholi 1,0

Englische Mischung 1) Chloroformu 2,0, Alkohol absoluti Aetheris $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
2) A C E -Mixtur. Alkohol 1 Vol, Chloroformu 2 Vol, Aetheris 2 Vol

Methylen, in Amerika benutzte Mischung Alkohol methylici 1 Vol, Chloroformu 4 Vol.

NUSBAUM's Chloroform Mischung Chloroform, parfümirt mit etwas Nelkenöl, um den stichlichen Geruch abzuschwächen

RADESTOCK's Mischung für Kriegs Chirurgie. Chloroformu 2,0, Aetheris 3,0

SCHLEICH's Mischungen für allgemeine Anästhesie. Mischung I für Operationen von kurzer Dauer Chloroformu 45,0, Aetheris Petrolei (Siedepunkt 60—65°C) 15,0, Aetheris 180,0 (Siedepunkt der Mischung = 88°C) Mischung II für Operationen von langer Dauer oder für Eingriffe bei fiebernden Patienten Chloroformu 45,0, Aetheris Petrolei (Siedep 60—65°C) 15,0, Aetheris 150,0 (Siedepunkt der Mischung = 40°C) Mischung III Ebenfalls für Operationen von langer Dauer und für Eingriffe bei fiebernden Patienten Chloroformu 30,0, Aetheris Petrolei (Siedep = 60—65°C) 15,0, Aetheris 80,0 (Siedep der Mischung = 42°C)

Wiener Mischung. Chloroformu 1,0, Aetheris 3,0 Oder Chloroformu 3,0, Aetheris, Alkohol absoluti $\bar{a}\bar{a}$ 1,0

Aqua Chloroformii (Ergänzb Hamb Vorschr) Chloroformwasser Aqua Chloroformi. (Brit Ergänzb) 1) Ergänzb und Hamb Vorschr Chloroform 1,0 wird in 200,0 Wasser gelöst Vor Licht geschützt aufzubewahren 2) Brit 2,5 ccm Chloroform werden in 1000 ccm Wasser unter Schütteln gelöst 3) U-St Ein Ueberschuss von Chloroform wird mit Wasser geschüttelt und das gesättigte Wasser nach völligem Absetzen klar abgossen

Antidot von OTTO KRETSCHMAR in Berlin, Zahnschmerzmittel, ist eine Mischung von Chloroform, Essigäther und Alkohol, mit Fuchsin gefärbt

Bor-Chloroform-Alkohol nach UNNA Rp Acidi borici 1,0, Spiritus 100,0, Chloroformu 5,0 Haarwaschmittel.

Chloroformium ammoniacale, ammoniakalisches Chloroform, zum Ausziehen von Alkaloiden etc aus Objekten Chloroform, welches unter Abkühlung mit trockenem Ammoniakgas gesättigt ist

Chlorodine. (Pharm Hungar) Rp Extracti Cannabis Indicae 0,1, solve in Aetheris acetici gtt 30, Syrupi Auranti cortici 5,0, Tincturae Zingiberis 10,0, Aetheris acetici 5,0, Chloroformu 5,0 Vor dem Gebrauche umzuschütteln Höchstgaben *pro dosi* 1,5 g, *pro die* 6,0 g

English Odontine Chloroformu 20,0, Camphorae 2,5 Auf Watte in den hohlen Zahn einzuführen.

Feytonia. Mittel gegen Schmerz cariöser Zähne Chloroformu 20,0, Olei Cajuputi 10,0, Camphorae 5,0 Olei Caryophyllorum gtt 3

Gicht- und Rheumatismusbalsam von GUSTAV BACKER in Berlin Enthält Kampher spiritus, HOFFMANN'schen Lebensbalsam und Chloroform

Mixtura Chloroformii et Cannabis Indicae composita (Nat Form) Compound Mixture of Chloroform and Cannabis Indica Chloroform anodyne Rp Chloroformu 125 ccm, Aetheris 35 ccm, Tinctura Cannabis Indicae (U St) 125 ccm, Tincturae Capsici (U-St) 65 ccm, Morphini sulfurici 2,5 g, Olei Menthae piperitae 2,0 ccm, Glycerini 125 ccm, Aquae 65 ccm, Spiritus q s ad 1000 ccm

Schmerzstillende Einreibung. (Wiener Specialität) Rp Mixturae oleosae balsamicae, Spiritus camphorati, Spiritus saponati, Chloroformu $\bar{a}\bar{a}$ 20,0 Spiritus aetherei, Tincturae Arnicae, Liquoris Ammonii caustici (0,96) $\bar{a}\bar{a}$ 10,0

St. JAKOB's Oel Rp Camphorae, Aetheris, Chlorali hydrati, Chloroformu $\bar{a}\bar{a}$ 100,0, Olei Sassafras Olei Origan, Tincturae Opi simplicis $\bar{a}\bar{a}$ 60,0, Spiritus (90 Vol Proc.) 10 Later

Anodynum Anglorum

Rp	Chloroformi	80,0
	Morphini hydrochlorici	0,1
	Acidi acetici diluti (30 Proc)	gtt VIII
	Spiritus (90 Vol Proc)	20,0

Chloroformium benzoatum seu benzoicum**Benzoë-Chloroform**

Rp	Acidi benzoici	8,0
	Chloroformii	97,0

Dient ausserlich als faulnisswidriges Mittel.

Chloroformium gelatinatum**Chloroformium albuminatum**

Rp Chloroformii
Albuminis ovi recentis aa Volumina
Werden zusammengeschüttelt, bis eine gleichmässige Masse entstanden ist

Elisir Chloroformi compositum**Compound Filixir of Chloroform (Nat Form)**

Rp	Tincturae Opii (U-St)	
	Spiritus camphorati (U-St)	
	Spiritus Ammoniae aromatici (U-St)	
	Chloroformii	aa 180 cem
	Alkohol (95 Vol. Proc)	235 cem
	Olei Cinnamon Cassiae	5 cem

Spiritus Ammoniae aromaticus (U-St)

Rp	Ammonii carbonici	340 g
	Liquoris Ammonii caust (10 Proc)	900 cem
	Olei Cetri	100 "
	Olei Lavandulae	
	Olei Macidis	aa 1,0 "
	Alkohol (96 Vol Proc)	700 "
	Aquae q s	ad 1 Liter

Emulsium Chloroformi (U-St.)

Rp	Chloroformii	40 cem
	Olei Amygdalarum	60 cem
	Tragacanthae pulv	15,0 g
	Aquae q s	ad 1000 cem

Enema chloroformiatum ARAN

Rp	Gummi arabici	
	Aquae destillatae aa	10,0
	Vitellum ovi unius	
	Chloroformii 1,0 (gtt 40)	
	Aquae destillatae	110,0

Zu einem Klyster (bei Bleikolik und Koliken andrer Art)

Essentia gingivalis anodyna SCHAFFER**Essentia antigingivitis SCHAFFER.****SCHAFFER'S Zahn- und Mundessenz.**

Rp	Chloroformi	20,0
	Olei Menthae piperitae gtt.	10
	Spiritus Vini	180,0

Einen halben Esslöffel mit 2-3 Esslöffel lauem Wasser gemischt zum Mundauspülen (bei Gingivitis, Zahnnekrose, blossliegenden Halsen der Zähne, Zahnschmerz, Zahnfleischschmerz)

Glycerinum chloroformiatum

Rp	Chloroformii	10,0
	Spiritus Saponis	20,0
	Glycerini	20,0

Glycerinum crocato chloroformiatum DEBOUT

Rp	Chloroformii	
	Tincturae Croci aa	1,0
	Glycerini	30,0

Zum Bereiben des Zahnfleisches (beim ersten Zahnen der Kinder)

Guttae anodynae Reginae**Schmerz und Krampf stillende Königin-Tropfen**

Rp	Chloroformii	10,0
	Tincturae Valerianae aetherae	20,0
	Morphini acetici	0,1
D S	80 Tropfen zu nehmen (1-3mal täglich bei eintretendem Schmerz Krampf Kopfschmerz, bei Hysterie etc. Bei Kopfschmerz soll zugleich das Reichen an den Tropfen gute Dienste leisten)	

Linimentum Aconiti et Chloroformi (Nat. Form.)

Rp	Tincturae Aconiti (U-St)	
	Chloroformii	aa 120,0 cem
	Linimenti Saponis	750,0 cem

Linimentum antirheumaticum SCHÜTT (Hamb. Vorstr.)

Rp	Camphorae	
	Chloroformii aa	30,0
	Opodeldok	140,0

Linimentum Chloroformii**I Formul Herol**

Rp	Chloroformii	20,0
	Linimenti ammoniaci	80,0

II Liniment au Chloroform (Gall.)

Rp	Olei Amygdalarum	90,0
	Chloroformii	10,0

III Linimentum Chloroformi (Brit)

Rp	Linimenti Camphorae (Brit.) s S 51	
	Chloroformii aa	50 cem

IV Linimentum Chloroformi U-St.

Rp	Chloroformii	300,0 cem
	Linimenti Saponis	700,0 cem

Linimentum sedativum RICORD

Rp	Chloroformii	
	Extracti Belladonnae	
	Tincturae Opii simplicis	
	Camphorae	aa 1,0
	Olei Hyoscyami	50,0

Schmerzstillende Einreibung bei Neuralgien und chronischem Rheumatismus

Liquor Chloroformii compositus Anglorum**Mixtura anodyna chloroformiata.**

Rp	Chloroformii	10,0
	Aethers	2,0
	Spiritus Vini	20,0
	Olei Menthae piperitae	gtt. III
	Aquae Amygdalarum amararum	15,0

Mixtus adde

Extracti Liquiritiae	5,0
Morphini hydrochlorici	0,05

soluta in

Sirupi Sacchari	50,0
Sirupi communis (Theriacae, Treacle)	200

Diese Mixtur ist in England ein beliebtes Mittel, selbst Hausmittel hysterischer Frauen wird auch bei allen krampfartigen Zufällen, Kolik, Leibscherzen, Migräne angewendet Dosis 1-2-3 Theelöffel

Mixtura anaesthetica GUÉNEAU de MUSSY

Rp	Chloroformii	10,0
	Tincturae Aconiti	40,0
	Aquae Coloniensis	20,0

Als schmerzstillende Einreibung

Mixtura anticholerica DESPREZ.

Rp	Chloroformii	1,0
	Spiritus	8,0
	Ammonii acetici	10,0
	Aquae destillatae	110,0
	Sirupi Morphini hydrochlorici	40,0

Halbstündlich 1 Esslöffel voll

Oleum Chloroformii**I Ergänzb**

Rp Chloroformii
Olei Olivarum aa

II Form Berol

Rp Chloroformii 20,0
Olei Rapae 80,0

III Hamb Vorschr

Rp Chloroformii 10,0
Olei Olivarum 20,0

IV Pharm. Helv

Rp Chloroformii 10,0
Olei Olivarum 80,0

Opodeldoc chloroformiatum

Rp Saponis butyracel concisi 2,5
Solve digerendo in
Spiritus Vini 40,0
tum admisce
Chloroformii 8,0
Suppone vase clauso, ut refrigerando congelent

Pommade au Chloroforme (Gall).

Rp Chloroformii 10,0
Cerae albae 5,0
Adipis 85,0

Sirapus chloroformiatus.**Sirupus Chloroformii**

Rp Chloroformii gtt XX
Spiritus Vini 5,0
Sirupi Sacchari 95,0

Ist hauptsächlich Geschmackscorrigens bitterer Stoffe.

Spiritus Chloroformii**I Form Berol**

Rp Chloroformii 80,0
Spiritus camphorati 80,0

II Brit.

Rp Chloroformii 50 cem
Spiritus (90 Vol Proc.) 950 cem.

III U-St.

Rp Chloroformii 80 cem
Spiritus (95 Vol Proc.) 940 cem.

Tinctura Chloroformii composita.

Rp Chloroformii 10,0
Spiritus Vini 25,0
Tincturae aromaticae 30,0

20—60 Tropfen (bei Krampf, Kolik, Migräne, Neuralgien etc.)

Tinctura odontalgica.**Hamburger Vorschriften.****No I.**

Rp Kreosoti 1,0
Olei Caryophyllorum
Olei Cajeputi aa 2,0
Tincturae Opi simpl. 5,0
Chloroformii 40,0
Alkohol absoluti 50,0

No II.

Rp Olei Cajeputi
Olei Organi aa 2,5
Camphorae 5,0
Chloroformii 40,0
Spiritus (90 Vol. Proc.) 50,0

No III

Rp Camphorae 8,0
Olei Caryophyllorum
Olei Cajeputi aa 16,0
Chloroformii
Aetheris aa 30,0

Tinctura odontalgica LINCK**LINCK's Zahntropfen (Hamb V)**

Rp Chloroformii 50,0
Tinct. Ligni Santali rubri 7,0
Tinct. Lavandulae comp. 80,0
Spiritus (90 Vol. Proc.) 118,0

Tinctura odontalgica WILHELM.**Wilhelmstropfen (Hamb V)**

Rp Spiritus camphorati
Tincturae Myrrinae aa 12,0
Olei Caryophyllorum 18,0
Chloroformii 54,0
Spiritus aetheris 104,0

Unguentum Chloroformii

Rp Unguenti cerei 20,0
Chloroformii 5,0

Zum Einreiben (bei Hautjucken) Diese Salbe wird in der Weise bereitet, dass man in einem Opodeldokgläschen, die Ceratmasse schmilzt, und wenn sie bis auf circa 45°C abgekühlt ist, mit dem Chloroform versetzt, die Flasche mit einem Kork schließt und nun die Mischung durch Schütteln bewirkt

Vinum chloroformiatum**Chloroformwein.**

Rp Vini albi generosi 500,0
Spiritus Chloroformii (1 10) 40,0

Ofters am Tage ein Spitzglas zu nehmen (Chloroform soll Cholestein lösen und dieser Wein sich daher bei Nierenstein, Leberkolik, ikterischer Hautfarbe bewähren)

Vet.

Rp Chloroformii 4,0
Olei Ricini 50,0

In zwei Hälften zu geben Für einen Hund mit Bandwurm

Vet.

Rp Infusi flor Chamomillae 25,0 500,0
Chloroformii 25,0
Olei Crotonis gtt. XV

Auf zweimal für ein Pferd mit Wurmlik.

II † Bromoformium (Ergänzb) Bromoform. Tribrommethan. Formylum (Formyle) tribromatum. CHBr₃. Mol.-Gew. = 253.

Darstellung 1) Man destilliert Bromalhydrat (s S 505) mit Kali- oder Natron lange 2) Eine Lösung von 71,5 Th Kaliumbromid in 150 Th Wasser wird mit 60 Th. Chlorkalk (von 35 Proc. Cl), welcher mit Wasser zu einem Brei angerührt ist, versetzt und unter Zugabe von 12 Th. Aceton im Wasserdampfstrom destilliert Wenn obige Tröpfchen nicht mehr übergehen, so lässt man auf 40—50°C erkalten, fügt nochmals 60 Th Chlorkalk sowie 9 Th. Aceton zu und destilliert nochmals Man wiederholt nach jedesmaligem Erkalten die Destillation noch dreimal unter jedesmaligem Zusatz von 60 Th. Chlorkalk und 6 Th. Aceton Die gesammten Destillate werden nunmehr zunächst mit

Wasser behandelt, dann wird die gesammelte Bromoformschicht wiederholt längere Zeit (s Chloroform, S 800) mit conc Schwefelsäure geschüttelt, im Scheidetrichter abgetrennt, mit Wasser gewaschen, durch Sodaauslösung entsäuert, mit geschmolzenem Calciumchlorid getrocknet, schliesslich rektifizirt und die bei 149—150° C übergehenden Antheile gesammelt. Es soll sich so fast das gesammte Brom in Bromoform überführen lassen (FROMM)

Eigenschaften. A) Das reine, absolute Bromoform hat nach VULPIUS bei 15° C das spec Gewicht 2,904 Der Siedepunkt liegt bei 148°—149° C, der Erstarrungspunkt bei + 8° C Da das alkoholfreie Bromoform sich leicht zersetzt, so wird dem officinellen Bromoform ein Zusatz von Alkohol gemacht Durch einen Zusatz von 1 Proc Alkohol sinkt das spec Gewicht auf 2,885 bei 15° C

B) Das officinelle Bromoform des Ergänzb ist eine farblose, chloroformartig riechende Flüssigkeit von süsslichem Geschmack. Sie ist in Wasser nur wenig löslich, dagegen leicht löslich in Alkohol und in Aether Sie erstarrt beim Abkühlen mit Eis krystallinisch, die Krystalle schmelzen bei + 7° C wieder vollständig Der Erstarrungspunkt des Bromoforms des Handels liegt bei etwa + 7° C Da das Bromoform durch Luft und Licht noch leichter gespalten wird wie Chloroform, so hat das Ergänzb ein alkohalhaltiges Bromoform aufgenommen. Dem vom Ergänzb vorgeschriebenen spec Gewicht 2,82—2,84 bei 15° C, sowie der Siedetemperatur 144—150° C entspricht ein Zusatz von etwa 4 Proc Alkohol Ein solcher Zusatz ist — bei sonst zweckmässiger Aufbewahrung — geeignet, das Bromoform monatelang zu konserviren Ohne diesen Zusatz zersetzt es sich besonders bei Zutritt von Luft und Licht sehr leicht unter Freiwerden von Brom, wobei es gelbröthliche Färbung annimmt

Prüfung. 1) Werden 2 ccm Bromoform mit 2 ccm Wasser, 0,1 ccm Zehntel-Normal-Kalilauge und 8 Tropfen Lackmustinktur geschüttelt, so muss die Flüssigkeit blau gefärbt bleiben, wird sie roth, so ist der Säuregehalt (HBr) des Präparates zu gross 2) Eine Emulsion von 2 ccm Bromoform, 2 ccm Wasser, 0,5 Jodzinkstärkelösung und 0,1 ccm Zehntel-Normal Natriumthiosulfatlösung darf sich nicht sofort bläulich färben. Tritt sogleich Blaufärbung ein, so ist mehr freies Brom zugegen, als zugelassen werden soll 3) Werden 2 ccm Bromoform mit 2 ccm conc Schwefelsäure in einem zuvor mit Schwefelsäure gespülten Glase mit Glasstöpsel geschüttelt, so dürfen sie sich innerhalb 10 Minuten nur gelblich färben Dunkle Färbung könnte von fremden Bromderivaten, aber auch von zersetzten Präparaten herrühren. Eine längere Einwirkung der Schwefelsäure ist nicht auszuführen, weil allmählich auch reine Präparate durch conc Schwefelsäure zersetzt werden.

Aufbewahrung Vorsichtig, vor Licht geschützt, in völlig angefüllten Gefässen, welche man zweckmässig nicht zu gross wählt

Anwendung. Inhalirt wirkt das Bromoform bei Thieren anästhesirend wie das Chloroform Innerlich wird zu 20—50 Tropfen *pro die* als Sedativum bei Delirien und Erregungszuständen von Geisteskranken gegeben Die eigentliche Anwendung aber ist die gegen Keuchhusten der Kinder Man giebt 3—4 Mal täglich 2—5 Tropfen in einem Theelöffel Wasser, aber niemals in den ganz leeren Magen Die Wirkung soll sich schon am zweiten Tage deutlich zeigen. Man giebt

Kindern bis zu 2 Jahren	0,05—0,1 g
„ von 2—4 „	0,1 —0,15 „
„ „ 4—8 „	0,15—0,3 „

Älteren Kindern in fortschreitenden Mengen Erwachsenen 1,0—1,5 g

Höchstgaben *pro dosi* 0,5, *pro die* 1,5 g (Ergänzb) Nach grösseren Bromoformgaben wird nach OLIVIERO der Harn grün gefärbt, er reducirt alsdann Fehling'sche Lösung, polarisirt aber nicht — In der Analyse bedient man sich des Bromoforms bisweilen zur Trennung spec leichterer fester Körper von spec schwereren

Spiritus a Saccharo bromoformatus
 Bromoform-Rum Nach Gay
 Rp Bromoformi 12
 Chloroformi 0,8
 Rum 1200
 Die Mischung soll von Kindern gut vertragen
 werden

Sirupus bromoformi VOISEN
 Münch Ap V

Rp Bromoformi 1,75
 Tincturae Grindellae
 Tincturae Strychni aa 0,75
 Tincturae Aconiti 1,0
 Tincturae Bryoniae 0,5
 Spiritus (90 Proc.) 25,0
 Sirupi opii 50,0
 Sirupi Acoralli corticis 105,0

Mixtura Bromoformii GAY

Rp Bromoformi 1,20
 Olei Amygdalarum 15,0
 Gummi arabici 10,0
 Sirupi Sacchari 30,0
 Aquae 65,0

Ein Kaffeelöffel enthält ca. 0,95 g Bromoform

Sirupus Bromoformii BRUNNEN

Rp Bromoformi 50
 Spiritus (25 Vol Proc.) 450
 Glycerin 1500
 Sirupi Sacchari 800,0

Aqua bromoformata. 8 g Bromoform werden mit 1 Liter destillierten Wassers geschüttelt. An Stelle des unverdünnten Bromoforms zu gebrauchen

Chlorum.

! Chlorum Chlor Chlorgas Freies Chlor Chlorine. Cl Atomgew = 35,5

Das zu den Nicht-Metallen gehörende Element „Chlor“ ist bei gewöhnlicher Temperatur und unter normalem Drucke ein grüngelbes Gas von erstickendem Geruche. Bei -40°C kann es unter gewöhnlichem Drucke oder bei $+15^{\circ}\text{C}$ durch einen Druck von 6 Atmosphären zu einer grünlich gelben, mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeit verdichtet werden (flüssiges Chlor), welche bei -102°C zu einer gelben, krystallinischen Masse erstarrt. Das spec Gewicht des Chlors ist auf Luft = 1 bezogen = 2,45, auf Wasserstoff = 1 bezogen = 35,5 — 1 l Chlorgas wiegt bei 0°C und bei 760 mm B = 3,17344 g. Das Chlor ist nicht brennbar. In Wasser ist Chlorgas löslich, und zwar lost Wasser von

10°C = 2,585 Vol Chlor	25°C = 1,950 Vol Chlor
15°C = 2,368 „ „	30°C = 1,750 „ „
20°C = 2,156 „ „	40°C = 1,365 „ „

Das Maximum (Optimum) der Auflöslichkeit in Wasser liegt bei $9-10^{\circ}\text{C}$. Oberhalb aber auch unterhalb dieser Temperatur nimmt die Auflöslichkeit des Chlors in Wasser beträchtlich ab. Bei 100°C ist sie gleich Null. Gegen 0°C vereinigt sich das Chlor mit Wasser zu dem krystallisierenden Chlorhydrat $\text{Cl}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$, wodurch natürlich seine Auflöslichkeit in Wasser ganz beträchtlich reducirt wird, dieses Hydrat zerfällt bei zunehmender Temperatur wieder in Chlor und in Wasser.

Im unverdünnten Zustande eingeathmet kann Chlor blitzschnell den Tod herbeiführen. Aber auch noch im Zustande erheblicher Verdünnung mit Luft wirkt es heftig reizend auf die Schleimhäute der Athmungsorgane und kann heftigen Schnupfen, Katarrh des Rachens und der Bronchien, ja selbst schwere Beschädigungen der Lungen hervorbringen. Gegenmittel gegen eingeathmetes Chlorgas ist Alkohol, und zwar athmet man diesen in Dampfform ein und nimmt ihn zugleich *per os* als Lakor, auch kann man Aetherweingeist einathmen und als Tropfen trinken.

Das Material zur Darstellung des Chlors im Laboratorium ist die Salzsäure (Chlorwasserstoff, HCl), welcher zur Ueberführung in Chlor nur das Wasserstoff-Atom (durch Oxydation) entzogen zu werden braucht. Dies geschieht dadurch, dass man Substanzen, welche leicht Sauerstoff abgeben, auf die Salzsäure einwirken lässt. An Stelle von Salzsäure kann man auch Gemische von Kochsalz und Schwefelsäure verwenden.

Die wichtigsten Verfahren, nach welchen die Darstellung des Chlors im pharmaceutischen Laboratorium geschieht, sind folgende

1) 40 Th trocknes Kochsalz (rohes Natriumchlorid), 50 Th grobgepulverter Braunstein, 100 Th Englische Schwefelsäure, verdünnt mit 100 Th Wasser Ausgabe 23—24 Th Chlorgas

Das Kochsalz und der Braunstein werden gemischt zuerst in einen Kolben gegeben und nach Zusammenstellung des Gasentwicklungsapparates mit der verdünnten Schwefelsäure übergossen. Die Gasentwicklung geht sofort vor sich und wird später durch gelinde Erwärmung im Sandbade im Gange erhalten.

2) Salzsäure und ein grosser Ueberschuss Braunstein in hasel und wallnuss grossen Stücken. Die Chlorentwicklung erfolgt bei Anwendung von concentrirter Salzsäure zunächst bei gewöhnlicher Temperatur, alsdann wird sie durch gelinde Erwärmung auf dem Sandbade oder Wasserbade unterstützt. Nach beendeter Gasentwicklung wird die Flüssigkeit von dem Braunsteinüberschuss abgossen, der Braunstein mit Wasser abgewaschen und für eine spätere Darstellung aufbewahrt. Diese Methode der Chlordarstellung ist die bequemste und leichteste. Hierbei geben aus

100 Th	Salzsäure von	1,180 spec Gew	fast 18 Th	Chlor
100 "	"	" 1,170 "	"	"
100 "	"	" 1,160 "	"	"
100 "	"	" 1,150 "	"	"
100 "	"	" 1,140 "	"	"
100 "	"	" 1,130 "	"	"
100 "	"	" 1,124 "	"	"
100 "	"	" 1,120 "	"	"

3) Es werden übergossen 10 Th Kaliumdichromat in kleinen Stücken mit 58 Th Salzsäure von 1,160 spec Gewicht. Die Gasentwicklung erfordert ein Erwärmen, und zwar kann dies über einem Drahtnetz mittels kleiner Flamme erfolgen. Es kann auch eine concentrirtere oder dünnere Salzsäure genommen werden.

Salzsäure	spec Gew	Kaliumdichromat	Chlor
100 Th von	1,180	erfordern 21,8 Th	und geben aus circa 15,4 Th.
100 "	1,170	" 20,6 "	" " " 14,4 "
100 "	1,160	" 19,4 "	" " " 13,5 "
100 "	1,150	" 18,2 "	" " " 12,7 "
100 "	1,140	" 17,0 "	" " " 11,9 "
100 "	1,130	" 15,8 "	" " " 11,0 "
100 "	1,124	" 15,0 "	" " " 10,5 "
100 "	1,120	" 14,6 "	" " " 10,2 "

4) Ueber die Chlordarstellung aus Kaliumchlorat + Salzsäure siehe weiter unten


Flüssiges Chlor wird gegenwärtig fabrikmässig dargestellt und in druckfesten, eisernen, inwendig verbleiten Gefässen in den Handel gebracht. Völlig trockenes Chlor greift nicht an Gusseisen, Schmiedeeisen, Stahl, Phosphorbronze, Messing, Kupfer, Zink, Blei. Diese Verhältnisse ändern sich sofort, sobald das Chlor Feuchtigkeit enthält.

Chemie Man erkennt das freie Chlor im concentrirten Zustande an seiner gelb grünen Farbe und auch noch im stark verdünnten Zustande an dem eigenthümlichen Geruche. Davon abgesehen an folgenden Reactionen. 1) Es bleicht, namentlich bei Gegenwart von Wasser Pflanzenfarbstoffe wie Lackmus, Indigoblau wird in eine gelb gefärbte Verbindung übergeführt. 2) Es setzt aus Kaliumjodid Jod in Freiheit, färbt also Jodkalium Stärkepapier blau (diese Reaction tritt aber auch ein mit Brom, Ozon, salpetriger Säure, Ferrichlorid). 3) Durch Schütteln mit metallischem Quecksilber wird das Chlor zu Mercurchlorid gebunden. 4) Aus Schwefelwasserstoff scheidet es Schwefel aus. 5) In wässriger Flüssigkeit löst es Goldblatt allmählich auf. 6) Es färbt Stärkelösung nicht.


Man bestimmt das freie Chlor 1) indem man einen Ueberschuss und zwar eine gewogene Menge reines, trocknes Mercurchlorid (Calomel), mit der wässrigen Chlorklösung

schüttelt. Der Gewichtsverlust des mit Weingeist gewaschenen Mercurchlorids mit 0,1507431 multiplicirt ergibt die Menge des vorhanden gewesenen freien Chlors. Die Ergebnisse sind jedoch nur annähernde.


II) Maassanalytisch. A) Die Methode beruht darauf, dass Chlor aus Metalljodiden, z. B. Kaliumjodid, äquivalente Mengen Jod in Freiheit setzt, welche durch Natriumthiosulfat bestimmt werden.



Man benutzt in der Regel eine $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung, welche 24,8 g reines, krystallisiertes Natriumthiosulfat in 1 l enthält (s. Reagentien, Band II). 1 ccm dieser Lösung bindet 0,0127 g Jod und zeigt 0,00355 g Chlor an. B) Die *Pénot'sche* chlorometrische Methode. Diese Methode beruht darauf, dass arsenige Säure sowohl durch Chlor als auch durch Jod unter bestimmten Bedingungen zu Arsensäure oxydirt wird.



Diese Ueberführung der arsenigen Säure erfolgt in saurer Lösung nur unvollständig, quantitativ aber in alkalischer Lösung. Für den letzteren Fall würde also die Umsetzungsgleichung lauten:




Stöchiometrisch sagen beide Formeln das Gleiche, nämlich 198 Th. Arsenigsäureanhydrid werden durch 142 Th. Chlor oder durch 508 Th. Jod zu Arsensäureanhydrid oxydirt. — Man bedarf zu dieser Bestimmung:

$\frac{1}{10}$ -Kaliumarsenitlösung. 4,95 g reines Arsenigsäureanhydrid (genau gewogen), wird mit 5–10 g Kaliumbikarbonat und etwa 200 ccm Wasser auf dem Wasserbade erwärmt. Wenn sich der grösste Theil aufgelöst hat, giesst man die klare Lösung in einen 1-Literkolben mit Marke ab, bringt zu dem Rückstand noch 2–5 g Kaliumbikarbonat + Wasser, erhitzt von neuem, giesst wieder klar ab und setzt dies fort, bis alles Arsenigsäureanhydrid in Lösung übergeführt ist. Dann fügt man zur Lösung noch etwa 20 g Kaliumbikarbonat, und füllt nach völligem Erkalten mit Wasser bis zur Marke auf.

$\frac{1}{10}$ -Jodlösung. 12,7 g reines, trocknes Jod werden mit Hilfe von etwa 20 g reinem, jodsäurefreiem Kaliumjodid in Wasser zu 1 l gelöst (vergl. Reagentien).

Sind beide Lösungen mit reinen Chemikalien genau bereitet, so verbraucht 1 ccm Jodlösung genau 1 ccm der Kaliumarsenitlösung zur Entfärbung und 1 ccm Kaliumarsenitlösung zeigt 0,0127 g Jod oder 0,00355 g Chlor an. — Bei diesen Bestimmungen ist der Titer der Jodlösung zu Grunde zu legen, welches in der unter Reagentien angegebenen Weise gegen die Natriumthiosulfatlösung ermittelt wird.

C) Die *Graham Otto'sche* Methode. Diese Methode beruht auf der Oxydation von Ferrisalzen durch Chlor zu Ferrosalzen nach der Gleichung:



Als Ferrosalz, welches oxydirt wird, benutzt man eine mit Schwefelsäure oder Salzsäure stark angesäuerte Lösung von Ferroammoniumsulfat $\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ und lässt von der freien Chlor enthaltenden Flüssigkeit soviel zufließen, bis alles Ferrosalz zu Ferrisalz übergeführt ist. Den Endpunkt der Reaktion erkennt man daran, dass die Reaktionsflüssigkeit durch Ferricyankalium nicht mehr gebläut wird (Tupfelprobe).

II *Aqua chlorata* (Germ.) *Aqua Chlori* (Austr. U.-St.) *Chlorum solutum* (Helv.) *Liquor Chlori*. *Solution of Chlorine* (Brit.) *Chlore dissous* (Gall.) *Chlorwasser*. *Aqua oxymuriatica*. Von den genannten Pharmakopöen führt es die Brit. nur unter den Reagentien auf, die übrigen haben es im Text aufgenommen. Die Selbst-

darstellung dieses wichtigen Präparates ist dringend zu empfehlen, da das vom Drogisten bezogene häufig zersetzt ist, woraus übrigens dem Drogisten ein Vorwurf nicht gemacht werden darf.

Darstellung. Ein starkwandiger Stehkolben *a*, der unter der Bezeichnung „Chlorgaskolben“ in der Reihe der anderen gläsernen Apparate zur Hand steht, wird bis zu $\frac{3}{4}$ seines Rauminhaltes mit ungefähr haselnussgrossen und durch Absieben vom Pulver befreiten Braunsteinstücken gefüllt, auf ein Drahtnetz oder in ein Sand- oder Wasserbad gestellt, mit einer angemessenen Menge¹⁾ roher Salzsäure beschickt, mit einem Stopfen, dem ein gläsernes Gasleitungsrohr *c* und ein Sicherheitsrohr *b* eingesetzt ist, geschlossen.

Das entwickelte Chlorgas wird, um mitübergangene Salzsäure zu beseitigen, zuerst in einer wenig Wasser enthaltenden Waschflasche *d* gewaschen, sodann zur Absorption in destillirtes Wasser *e* geleitet.

Da das Einathmen von Chlor schädlich ist, so nehme man die Operation unter einem gut wirkenden Abzuge oder im Freien vor. Da das Chlorwasser durch direktes Sonnenlicht, ebenso durch zerstreutes Tageslicht Zersetzung erfährt, so stelle man die Absorptionsflasche in eine Papphülse oder umwickle sie mit einem Tuche.

Wird eine Salzsäure mit einem Gehalte von 30—35 Proc. Chlorwasserstoff angewendet, so geht die Chlorentwicklung längere Zeit ohne künstliche Erwärmung vor sich. Sobald die in dem Absorptionswasser aufsteigenden Gasblasen spärlich auftreten,




Fig. 189. Apparat zur Chlorgasdarstellung aus Braunstein und Salzsäure.

wird der Kolben gelinde erwärmt. Eine Temperatur von 50—70° C. genügt. Hat man kein zu grosses Entwicklungsgefäß und hat man dieses auf ein Drahtnetz gestellt, so genügt die kleine Flamme einer Weingeistlampe, es darf aber die Flamme das Drahtnetz (oder den Kolbenboden) nicht berühren, weil eine starke örtliche Erhitzung am Kolbenboden ein Zerspringen desselben herbeiführen könnte. Zur Darstellung von 3 l Chlorwasser genügt ein Kolben von 500 cem Rauminhalt, welcher bis dicht unter den Stopfen mit Braunsteinstücken und mit 200—250 g einer rohen 29 bis 30 procentigen Salzsäure beschickt wird. Zwei Flaschen I und II von weissem Glase und mit Glasstopfen versehen, jede nur bis zur Hälfte ihres Rauminhaltes mit ausgekochtem und wieder erkaltetem destillirtem Wasser beschickt und durch eine Hülle vor Tageslicht geschützt, stehen zur Hand. In das Wasser der einen Flasche I lässt man nun durch das Gasleitungsrohr das Chlorgas hineintreten, so lange, bis sich der Raum über dem Wasser mit dem grünlichgelben Chlorgase angefüllt zeigt. Man nimmt alsdann diese Flasche fort und legt die andere Flasche II vor, jene aber verschliesst man mit dem Stopfen sofort und schüttelt sie kräftig. Das Wasser ab-

¹⁾ Der Braunstein muss noch in einer 5—10 cm hohen Schicht aus der Salzsäure herausragen.

sorbirt das Gas, und wenn man die Flasche dann öffnet, so strömt mit Gewalt die äussere Luft hinein. Ist der leere Raum der Flasche II mit Chlorgas gefüllt, so nimmt man sie fort, verschliesst sie mit dem Stopfen und legt wieder die Flasche I vor. Die von der Gasleitungsröhre weggenommene Flasche wird ebenfalls geschüttelt. Dieses Wechseln der Flaschen und das Schütteln geschieht so oft, bis das Wasser Chlorgas nicht mehr absorbirt, bis also nach dem Schütteln der leere Raum der Flasche mit gelbgrünlichem Gase gefüllt bleibt und beim Aufheben des Stopfens ein Eindringen der Luft nicht bemerkbar ist. Mit dem auf diese Weise dargestellten Chlorwasser, welches bei der später vorzunehmenden Prüfung den richtigen Gehalt zeigte, werden dunkle Flaschen von 200 cem Rauminhalt mit gut eingeriebenen Glasstopfen bis zur Mündung angefüllt, die Glasstopfen aufgesetzt, mit kaltem Wasser die Flaschen abgespült, mit einem Tuche abgetrocknet, dann sogleich mit feuchtem Pergamentpapier dicht taktirt und nun alsbald in den Kellerraum gebracht. Diese Operationen geschehen an einem luftigen Orte,

und man hütet sich immer sorgsam, Chlorgas einzuatmen. Sollte letzteres dennoch geschehen sein, so gebrauche man sofort die oben Seite 810 angegebenen Gegenmittel.

Nach Beendigung der Darstellung wird der Kolben, sobald er erkaltet ist, geöffnet, die Flüssigkeit in eine Kloake gegossen und das zurückbleibende Mangansuperoxyd einige Male durch Eingiessen von Wasser und Ausgiessen abgewaschen. (Vorsicht wegen Einathmens von Chlor!) Nachdem man alles Wasser aus dem Kolben hat abtropfen lassen, schliesst man ihn wieder mit dem Stopfen und dem Gasleitungsrohr und hebt ihn für eine spätere Operation auf.

Darstellung grösserer Mengen Chlorwasser. Die Zerbrechlichkeit der gläsernen Kolben, die Erneuerung der durch das Chlorgas zerstörten Korkstopfen sind sehr




Fig. 190. Thonkolben zur Chlorgasentwicklung.

unangenehme Umstände, welche man so viel als möglich zu vermeiden sucht. Man hat daher Kolben von feuerfestem Thon, die auf specielles Verlangen mit eingeriebenen und durchbohrten Stopfen aus gebranntem Thon oder aus Talkstein versehen werden, als Chlorgasentwicklungsgefässe angefertigt. Sollte das Gasleitungsrohr nicht dicht die Bohröffnung schliessen, so nimmt man etwas Siegellack zu Hilfe. Der Kolben hat eine Tabulatur zur Aufnahme eines Trichterrohres, welches zugleich als Sicherheitsrohr dient. Man füllt den Kolben mit den Braunnesteinstücken, setzt das Gasleitungsrohr auf (macht den Stopfen erforderlichen Falles mit Kitt dicht) und giesst durch das Trichterrohr, welches bis auf den Boden des Kolbens reicht, die Säure.

Wie in der Abbildung ersichtlich, ist dem Kolben ein Gasleitungsrohr aufgesetzt. Dieses Rohr hat in der Mitte des aufsteigenden Theiles *r* eine kugelförmige Erweiterung, in welcher sich etwa infolge der Gasentwicklung fortgerissene Theilchen des Kolbeninhaltes neben Feuchtigkeit ansammeln und daraus bei grösserer Anhäufung in den Kolben zurückfliessen können. (Fig. 190.)

Die Darstellung von Chlor aus Chlorkalkwürfeln im Krrp'schen Apparate ist für chemische Laboratorien ganz zweckmässig, zur Erzeugung von Chlorwasser im pharmaceutischen Laboratorium aber bieten diese Würfel keinen Vortheil.

Da Wasser von $+9$ bis $+10^{\circ}\text{C}$ die grösste Menge Chlorgas absorbiert, so empfiehlt es sich, das mit Chlor zu sättigende Wasser auf dieser Temperatur zu erhalten, im Sommer durch Einstellen der Absorptionsgefässe in Eiswasser, im Winter durch Einstellen in erwärmtes Wasser. Letztere Vorsichtsmassregel verabsäume man im Winter unter keinen Umständen, da sich sonst bei $+1$ bis $+3^{\circ}\text{C}$ Krystalle von Chlorhydrat $\text{Cl}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ bilden, welche in der Regel die Glasrohren verstopfen. Ein bei 10°C gesättigtes Wasser kann 0,7—0,8 Proc., ein bei 20°C gesättigtes immer noch 0,5 Proc. Chlor enthalten.

Eigenschaften. Völlig gesättigtes Chlorwasser ist eine klare, blass-grünlich-gelbliche Flüssigkeit von schwach styptischem, etwas scharfem Geschmacke und erstickendem Chlorgeruche. Lackmusfarbstoff und andere organische Farben werden durch dasselbe gebleicht. Der Luft ausgesetzt, stösst es Chlorgas aus, und unter dem Einflusse des Tageslichtes zersetzt es sich, indem das Chlor mit einer entsprechenden Menge Wasserstoff des Wassers Chlorwasserstoffsäure bildet und Sauerstoff frei wird: $\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 = 2\text{HCl} + \text{O}$. Es muss mindestens 0,4 Proc. freies Chlor enthalten.

Es fordern	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U.-St.
(Ges. = Gesättigt)	Ges.	Ges.	Ges.	> 0,4 %	> 0,4 %	> 0,4 %

Aufbewahrung. Da das Wasser nur zwischen 8 — 12°C die grössere Menge Chlor absorbiert, so wird auch das bei dieser Temperatur gesättigte Chlorwasser bei höheren Temperaturen mehr oder weniger Chlorgas entweichen lassen. Unsere Keller, welche durchschnittlich eine Temperatur von $+12^{\circ}\text{C}$ haben, eignen sich also am besten als Aufbewahrungsort des Chlorwassers. Als Aufbewahrungsgefässe passen starkwandige, gelbe oder blaue Flaschen von 100—200 cem Rauminhalt mit etwas konischen Glasstopfen, welche Flaschen bis unter den Stopfen mit dem Chlorwasser angefüllt, mit Pergamentpapier tektirt werden. Schwarze oder sogenannte Hyalithgläser haben das Unangenehme, dass sie nicht durchsichtig sind. Sie sind auch zwecklos, wenn man die mit Chlorwasser gefüllten Flaschen in einen mit Deckel versehenen Holzkasten oder in Blechbüchsen einstellt. Die Hauptsache ist, dass in den Flaschen keine atmosphärische Luft vorhanden ist. Bei einer solchen Aufbewahrung, geschützt vor Licht und Luft, bleibt das Chlorwasser monatelang von untadelhafter Beschaffenheit. In dem Dispensirlokale hält man ein Gefäss mit Chlorwasser nicht gern zur Hand, sondern holt den jedesmaligen Bedarf aus dem Keller.

Bei **Dispensation** des Chlorwassers vergesse man nicht, dass dieses stets Chlor abgibt und daher, in eine Flasche gegossen, diese mit Chlorgas füllt. Giesst man nun aus einem anderen Gefässe Flüssigkeit dazu, so steigen die Chlordämpfe in dieses auf und ertheilen dem Inhalte Chlorgeruch. Das Chlorwasser wird daher stets den Mixturen zuletzt zugesetzt. Die Mixturen dispensirt man in gelben Gläsern, obgleich das freie Chlor in Arzneimischungen kaum eine Stunde frei bleibt und gewöhnlich gebunden wird. Mischungen aus Chlorwasser mit schleimigen Flüssigkeiten, Altheesirup, Altheeaufguss, gefärbten Zuckersäften etc. verlieren in wenigen Minuten ihren Chlorgeruch oder ihr freies Chlor. Gefärbte Säfte werden ganz oder theilweise entfärbt. Wird Chlorwasser in einer Mischung abgegeben, in welcher eine Zersetzung oder Bindung des Chlors nicht zu erwarten ist, so sind metallene Löffel zum Einnehmen nicht zu verwenden oder es sind dieselben nach dem Einnehmen sofort in Wasser zu stellen. Vor dem Riechen an der Mischung ist zu warnen.

Prüfung. 1) Chlorwasser sei völlig flüchtig. Einige Gramme in einem Glas-schälchen verdampft, sollen keine Spur eines fixen Rückstandes hinterlassen.

2) Es soll von Chlorwasserstoff möglichst frei sein. Man schüttelt ca. 30,0 des Chlorwassers mit 5,0—8,0 reinem Quecksilber kräftig durcheinander, bis der Chlorgeruch verschwunden ist, filtrirt und prüft mit Lackmuspapier. Eine ausserst schwache Rothung macht das Präparat nicht verwerflich, da fast ein jedes einige Zeit aufbewahrte Chlorwasser diese Reaktion giebt. Silbernitratlösung erzeugt in dem Filtrat gemeiniglich eine Trübung, nur soll sie eine sehr schwach opalisirende sein. Diese Spur Salzsäure ist auf das Chlorwasser als Medikament ohne allen Einfluss.

3) Gehaltsbestimmung. 25 ccm Chlorwasser werden in ein, eine konc. Auflösung von 1 g Kaliumjodid enthaltendes ERLENMEYER'sches Kölbchen gegossen. Zu der durch ausgeschiedenes Jod braun gefärbten Flüssigkeit lässt man so viel $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung zulaufen, dass die Flüssigkeit nur noch schwach gelb gefärbt erscheint. Dann fügt man etwas Stärkelösung hinzu und titirt die blaugefärbte Flüssigkeit mit der $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung bis zur eben eintretenden Farblosigkeit.

Hierzu sollen nach Germ. mindestens 28,2 ccm, nach Helv. 30,0 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein. Da 1 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung = 0,00355 g Chlor entspricht (s. S. 812), so werden bei dieser Prüfung nach Germ. = 0,40044 Proc., nach Helv. = 0,426 Proc. freies Chlor nachgewiesen.

Anwendung. Das Chlorwasser wirkt wegen seines Gehaltes an freiem Chlor desinficirend und wird innerlich zu 0,5–1,5–3,0 g, mit ca. der 10fachen Menge Wasser verdünnt, bei fieberhaften und entzündlichen Krankheiten mit dem Charakter der Blutzersetzung, bei Scharlach, Blattern, Erysipel, Typhus, Ruhr, beginnender Asiatischer Cholera, mercurieller Stomatitis, Vergiftung mit Wurst-, Käsegift gegeben, äusserlich gegen Biss- und Stichwunden giftiger oder wüthender Thiere, zur Desinfektion jauchiger Wunden, zu Gurgelwässern, zu Umschlägen bei Leberkrankheiten gebraucht. In der Technik und in der Oekonomie benutzt man es als Bleichmittel, in der Chemie als Oxydationsmittel.

Chlor und Chlorwasser zu Desinfektionszwecken. Letzteres bereitet man billig und bequem (selbst im Wohnzimmer, ohne der geringsten Belästigung durch Chlorgas ausgesetzt zu sein) in folgender Weise.



Fig. 191.




Fig. 192.

Eine Flasche *a* wird halb mit Wasser gefüllt und ihr ein Kork mit 2 starken Glasröhren dicht aufgesetzt, von welchen das Rohr *d* die Stelle eines Ventils vertritt, denn es ist unten geschlossen und nicht weit von dem geschlossenen Ende mittelst einer runden Feile unter Beihilfe von Petroleum durchbohrt. Durch Auf- und Abwärtsschieben dieses Ventilrohres kann man beliebig den inneren Raum der Flasche *a* mit der äusseren Luft in Kommunikation setzen oder davon abschliessen. Das andere Glasrohr *c* ist von starkem

Glas, an dem einen Ende, welches bis auf den Boden der Flasche hinabreicht, zu einer offenen Spitze *c* ausgezogen, so dass das durch diese ca. $\frac{1}{2}$ mm weite Oeffnung austretende Gas nur kleinere Blasen bildet. Der aus dem Kork nach aussen austretende Theil dieses Glasrohrs *c* ist gebogen und an seinem Ende mit einem Kork armirt, welcher als Schluss eines kleinen Kolbens *b* mit angelegtem Rande (Wulstrand) dient. In den Kolben giebt man zuerst Salzsäure, dann schüttet man das nöthige Kaliumchlorat dazu und legt ihn fest an das Rohr *c* an. Die Chlorentwicklung beginnt sofort, im übrigen sehr ruhig. Anfangs schiebt man das Ventil *d* abwärts und setzt das Innere der Flasche mit der äusseren Luft in Kommunikation, schliesst es aber, sobald sich ein Austreten von Chlor bemerkbar macht. Die Gasentwicklung wird später spärlicher. Ein Erwärmen des Kölbchens *b* darf nicht stattfinden, die Flasche selbst hat man auch nicht nöthig zu schütteln, sondern man lässt sie ruhig an einem schattigen Orte stehen. Um ein Wasser von dem Chlorgehalt des officinellen Chlorwassers darzustellen, giebt man in das Kölbchen auf je 1000,0 vorgelegten Wassers 2,5 Kaliumchlorat, 25,0 25 procentige Salzsäure oder auf 10000 Th. Wasser 25 Th. Kaliumchlorat und 250 Th. 25 procentige Salzsäure.

Ein solches Chlorwasser benutzt man in Fällen, wo die Anwendung von Chlorkalk gern gemieden wird, z. B. zum Waschen von Geweben aus thierischer Faser, von Bettstellen, Möbeln, Paneelen. Das Bestreichen mit diesem Chlorwasser wird mit einem Borstenpinsel oder einem Schwamme, an einen Stiel befestigt, ausgeführt. Zur Desinfektion

der Wasche von Cholera-kranken, Blatternkranken etc wird das Chlorwasser mit einem gleichen bis doppelten Volum Wasser verdünnt

Zur Desinficirung der Aborte hängt oder stellt man von einander entfernt 2 Kölbchen mit Chlorentwicklungsmischung aus Kaliumchlorat und Salzsäure abends in die Gruben hinein Auf Gruben für 25 Menschen reichen pro Tag im Sommer, von einem Abend zum andern, 5 g Salz und 50 g bis auf einen Gehalt von 25—30 Proc verdünnter roher Salzsäure vollständig aus Der Materialwerth beträgt 4—5 Pfg Das Chlorgas entwickelt sich allmählich und verbreitet sich über die Oberfläche der Fäkalmasse und steigt nur in unbedeutender Menge nach oben Vor neuer Beschickung der kleinen Desinfektoren giesst man den Inhalt derselben in die Grube und spült mit Wasser nach.


III Calcaria chlorata (Germ Helv) **Calcium hypochlorosum** (Austr) **Calx chlorinata** (Brit) **Calx chlorata** (U-St) **Chlorure de chaux sec** (Gall) **Calx chlorata**. **Calcaria hypochlorosa** **Calcaria oxymuriatica**. **Calciumhypochlorit**. **Unterchlorigsaurer Kalk** **Chlorkalk**. **Bleichkalk** Ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch verschiedener Verbindungen Er wird in chemischen Fabriken durch Sattigung von Kalkhydrat mit Chlorgas erzeugt Das zu dem Process nothwendige Chlor gewinnt man nach verschiedenen Verfahren (von WELDON, HUNTER-DEACON und WELDON PECINNY), welche in Band I des Kommentars von HAGEN FISCHER HARTWICH unter *Calcaria chlorata* näher beschrieben sind und sammtlich bezwecken, den theuren Braunstein bei der Chlorbereitung entweder völlig auszuschliessen oder zu regeneriren Diesen Verfahren wird in dessen schon heute eine beachtenswerthe Konkurrenz gemacht durch die elektrolytische Darstellung des Chlors aus Kochsalz, bei welcher als zweites Produkt Natronhydrat bez. Natriumkarbonat erhalten wird

In den Handel gelangt der Chlorkalk in verschiedenen Sorten, welche in Deutschland nach Procenten wirksamen Chlors (s w u) bezeichnet werden. Die Austr verlangt einen Chlorkalk mit 20 Proc, andere Pharmakopöen verlangen einen solchen mit 25 und mehr Proc wirksamen Chlors, doch ist die Technik im Stande, Chlorkalk mit einem Gehalt von rund 40 Proc wirksamem Chlor darzustellen

Eigenschaften. Der Chlorkalk bildet ein weisses oder fast weisses, krumeliges, trockenes Pulver von eigenthümlich chloralalichem Geruche, unangenehm zusammenziehendem Geschmacke und von alkalischer Reaktion Durch Behandeln mit 10—11 Th Wasser werden ihm das Calciumhypochlorit und das Calciumchlorid entzogen, während das Calciumhydroxyd ungelöst bleibt, und zwar wird durch Behandeln mit wenig Wasser zunächst vorzugsweise das Calciumchlorid, durch Behandeln mit mehr Wasser alsdann auch das Calciumhypochlorit in Lösung übergeführt


Durch Einwirkung von Licht und Wärme werden aus dem Chlorkalk allmählich Sauerstoff und Chlor abgegeben, wobei schliesslich ein Gemisch von Calciumchlorat [chlor saurem Calcium $\text{Ca}(\text{O}_2\text{Cl})_2$] und Chlorcalcium CaCl_2 hinterbleibt

Mit einem Ueberschuss von Säure behandelt, giebt er seinen gesammten Chlorgehalt in Form von freiem (wirksamem) Chlor ab, d. h. je 1 Mol. Calciumhypochlorit Calciumchlorid liefert 4 Atome Chlor




Die Entbindung von Chlor aus dem Chlorkalk erfolgt schon durch die Einwirkung von Essigsäure, ja sogar von Kohlensäure

Seiner chemischen Zusammensetzung nach kann der Chlorkalk praktisch betrachtet werden als eine Verbindung von Calciumhypochlorit mit Calciumchlorid und Calciumhydroxyd in unbestimmten Verhältnissen also



Für die Praxis ist der wesentliche Bestandtheil das Calciumhypochlorit $\text{Ca}(\text{OCl})_2$, denn nur dieses, nicht aber auch das Calciumchlorid ist im Stande mit Säuren, z. B. Salzsäure, freies Chlor zu bilden



Daher gilt denn auch der Procent-Gehalt an Chlor, welcher unter diesen Bedingungen aus dem Chlorkalk in freiem Zustande abgespalten werden kann, als Maassstab für die Bewerthung des Chlorkalk (über die französische Bewerthung s. w. u.) Man wird also als 20 procentig einen solchen Chlorkalk zu bezeichnen haben, der beim Zusammenbringen mit Salzsäure 20 Proc seines Gewichtes an freiem Chlor entbindet etc. Es verlangen Procente wirksames Chlor

Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U St
20 ^o / _o	33 ^o / _o	28,62 ^o / _o ¹⁾	25 ^o / _o	25 ^o / _o	35 ^o / _o

Prüfung 1) Der Chlorkalk soll ein trockenes, weisses Pulver darstellen, nicht eine schmierige feuchte Masse sein, was darauf hinweisen würde, dass er bereits in Zersetzung begriffen ist 2) 0,5 g einer dem Inneren des Vorrathes entnommenen Durchschnittsprobe werden in einem Erlenmeyer'schen Kolbchen mit 100 ccm Wasser angeschüttelt, dann mit einer Lösung von 1 g Jodkalium in 20 ccm Wasser gemischt und diese Flüssigkeit mit 20 Tropfen Salzsäure angeäuert. Das durch das freie Chlor in Freiheit gesetzte Jod färbt die Flüssigkeit rothbraun. Man lässt nun soviel $\frac{1}{10}$ Normal-Natriumthiosulfatlösung zufließen, bis die Färbung nur noch hellgelb ist, dann fügt man etwas Stärkelösung hinzu und titirt die durch Bildung von Jodstärke blaufarbte Flüssigkeit bis zur gerade eintretenden Farblosigkeit. Hierzu sind bei einem 25 procentigen Chlorkalk mindestens 35,2 ccm $\frac{1}{10}$ Normal Natriumthiosulfatlösung erforderlich.

Ein Chlorkalk von 20 Proc beansprucht unter den nämlichen Bedingungen 28,2 ccm, ein solcher von 33 Proc = 46,5 ccm, ein solcher von 35 Proc = 49,5 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal Natriumthiosulfatlösung.

Aufbewahrung Durch Einwirkung von Licht und Wärme erleidet der Chlorkalk, wie schon erwähnt, unter Abgabe von Chlor und Sauerstoff eine Zersetzung in chloresäures Calcium und Chlorecalcium. Ein solches Gemisch ist sehr hygroskopisch, daher weist schmierig und entbehrt die Fähigkeit, in der Kalte mit verdünnten Säuren Chlor zu entbinden. — Es empfiehlt sich, grössere Vorräthe von dem Chlorkalk in Fässern an einem kühlen Orte, vor Licht möglichst geschützt aufzubewahren.

Wiederholt wurde beobachtet, dass festgeschlossene Flaschen mit Chlorkalk explodirten. Als Ursache für diese Explosionen nimmt man die durch Wirkung des Sonnenlichtes erfolgende Zersetzung in dem vorher erwähnten Sinne an. Die sich daraus ergebende Schlussfolgerung ist, Chlorkalkgefässe nicht zu dicht zu verschliessen. Uebrigens sind solche Explosionen namentlich bei hochprocentigen Sorten beobachtet worden.

Aber selbst trotz möglicher Vorsicht bei der Aufbewahrung geht der Gehalt des Chlorkalks an wirksamem Chlor allmählich zurück, im Monat durchschnittlich um 0,6 Proc. — Chlorkalklösungen sind wegen der Möglichkeit des Ueberganges in chloresäures Calcium durch Anreiben des Chlorkalks im Mixturmörser mit kaltem Wasser unter Anschluss jeder Erwärmung zu bereiten und stets filtrirt abzugeben.

Die Abgabe des Chlorkalks in Substanz erfolgt in Thonkrufen mit aufgelegter Pappscheibe, bei grösseren Mengen empfiehlt sich das Auflegen eines Deckels von Holz.

Wirkung und Anwendung Chlorkalk hat wegen seiner Fähigkeit, Chlor abzugeben, desinficirende Eigenschaften, ausserdem wirkt er örtlich ätzend, adstringirend, austrocknend. Kleine Gaben sind innerlich ohne erhebliche Wirkung, grössere Gaben wirken ätzend, erzeugen Erbrechen, Durchfall. Innerlich findet der Chlorkalk nur selten Anwendung (in Gaben von 0,1—0,2—0,4 g) bei Typhus, Dysenterie, skrophulösen Drüsenschwellungen, Lungentuberkulose, dagegen häufig äusserlich als Desinfektionsmittel,

¹⁾ Die Gall verlangt einen Chlorkalk von mindestens 90° GAY-LUSSAC. Vergl. S. 820.

als Einstreupulver, in Lösung (1 auf 20–25 Wasser) zum Hinaufziehen in die Nase, zu Gurgelwassern, Einspritzungen, Verbandwassern etc. In Mischung mit Pflanzenschleim, Zuckersirup und anderen organischen Stoffen geht das wirksame Chlor des Chlorkalks mehr oder weniger schnell verloren. Chlorkalklösungen werden stets durch Anreiben des Chlorkalks im Porcellanmörser mit kaltem Wasser bereitet und filtrirt dispensirt. In der Technik wird der Chlorkalk als Bleichmittel, ferner in der Farberei, zum Entfäulen des Weingeistes etc. gebraucht. Fakalien werden behufs Desinfektion mit dem Chlorkalk bestreut.

Chlorkalkwürfel zur Darstellung von Chlor bestehen aus einer Mischung von Gips und Chlorkalk, welche durch starken Druck in Formen gebracht wurde.

Dispensation. Mischungen des Chlorkalks mit brennbaren Stoffen erhitzen sich und explodiren nicht selten. Solche Mischungen bestehen z. B. aus 1) Chlorkalk, Schwefel — 2) Chlorkalk, Schwefel, Salmiak — 3) Chlorkalk, Salmiak (hier wird selbst Gelegenheit zur Bildung von Chlorstickstoff gegeben, welcher schon in minimalen Mengen heftige Explosionen bewirkt) — 4) Chlorkalk, flüchtige Oele, Benzin, Petroleum.

Mischungen von Chlorkalk mit Salmiak muss der Apotheker als gefährlich herzustellen zurückweisen.

Technische Werthbestimmung. Obgleich die im Vorstehenden angegebene Werthbestimmung des Chlorkalks nach den Pharmakopoen ganz befriedigende Resultate giebt, so erfolgt die Werthbestimmung in der Technik doch nach anderen Methoden und zwar entweder nach PENOT oder nach PENOT MOHR. Von Wichtigkeit ist zunächst die Vorbereitung des Chlorkalks zur Analyse.

Man reibt 10 g Chlorkalk im Augussmörser mit Wasser fein an, setzt nach und nach mehr Wasser zu und schlamm den Chlorkalk damit in einen 1-Liter Kolben, reibt den Rückstand wieder mit Wasser an, spült alles sorgfältig in den Kolben, füllt in diesem bis zur Marke auf und mischt durch Umschütteln. Zur Gehaltsbestimmung nimmt man nun nicht etwa die klar abgesetzte oder gar filtrirte Lösung, sondern man misst die zu entnehmenden Mengen der gut umgeschüttelten milchähnlichen Flüssigkeit wie sie ist ab. Man erhält so konstantere und richtigere Resultate, als wenn man die klar abgesetzte Flüssigkeit bestimmen würde, weil nämlich in dem nicht gelösten Rückstande noch aktives Chlor enthalten ist.

A. Nach PENOT. Man misst 50 ccm der wie oben angegeben bereiteten, wohl-durchgemischten Chlorkalkmilch ab, bringt sie in ein Becherglas und lässt nun aus einer 50 ccm fassenden Burette von der auf S 812 angegebenen Kaliumarsenitlösung unter stetem Umrühren langsam, zuletzt tropfenweise zufließen, bis 1 Tropfen der Reaktionsflüssigkeit, auf frisch bereitetes Jodkaliumstärke-Papier gebracht, dieses nicht mehr blau färbt. [Man rührt 3 g Kartoffelstärke mit 250 ccm kaltem Wasser an, kocht unter Umrühren, fügt eine Lösung von 1 g Kaliumjodid und 1 g krystallisirtem Natriumkarbonat hinzu, füllt auf 500 ccm auf, tränkt damit Filtrirpapierstreifen und trocknet diese.] Dieser Punkt ist leicht und sicher zu treffen, da die allmählich schwächer werdende Färbung des Reagenspapiers darauf hinweist, dass derselbe bald erreicht ist, und dass man somit die Probediagnose nur noch tropfenweise setzen darf.

Multipliziert man die Menge der verbrauchten ccm $\frac{1}{10}$ -Kaliumarsenitlösung mit 0,00355 g, so erhält man die in 0,5 g Chlorkalk enthaltene Menge aktiven Chlors.

B. Nach PENOT-MOHR. Man bedarf hierzu der auf S 812 angegebenen Lösungen von Kaliumarsenit und Jod.

Man bringt 50 ccm der oben erwähnten Chlorkalkmilch in einen Kolben, lässt einen Ueberschuss von Kaliumarsenitlösung zufließen, [so dass also 1 Tropfen Jodkaliumstärke-Papier nicht mehr bläut]. Alsdann verdünnt man mit 150–200 ccm Wasser, fügt etwas kalt bereitete Lösung von Ammoniumbikarbonat, sowie etwas Stärkelösung hinzu und titrirt mit der Jodlösung auf Blau. Die blaue Färbung muss beständig bleiben, auch wenn noch etwas Ammoniumbikarbonatlösung zugesetzt wird.

Sind beide Titrirlösungen [Kaliumarsenitlösung und Jodlösung] genau $\frac{1}{10}$ normal, stehen sie also genau aufeinander ein, so zieht man einfach die verbrauchten Kubikcentimeter Jodlösung von den zugesetzten Kubikcentimetern Kaliumarsenitlösung ab. Multipliziert man den verbleibenden Rest der Kubikcentimeter mit 0,00355 g, so erhält man die in 0,5 g Chlorkalk enthaltene Menge wirksames Chlor.

Beispiel Angewendet 50 ccm der Lösung (= 0,5 g Chlorkalk) Zugesezt = 50 ccm Kaliumarsenlösung Zurücktirt = 5,3 ccm Jodlösung 50,0 ccm minus 5,3 ccm = 44,7 ccm $44,7 \times 0,00355 = 0,158685$ g Chlor

Da diese Menge Chlor in 0,5 g Chlorkalk enthalten ist, so enthält der Chlorkalk = 31,74 Proc wirksames Chlor

Französische Werthberechnung Chlorometrische Grade. GAY-LUSSAC'sche Grade. Nach dieser Art der Deklaration wird angegeben, wieviel Liter Chlorgas aus 1 kg Chlorkalk entwickelt werden Das Gewicht des Liters Chlorgas wird dabei zu 3,18 g angenommen Ein 100gradiger oder 100proc Chlorkalk nach GAY-LUSSAC ist demnach ein solcher, von welchem 1 Kilo = 100 Liter, d i 318 g Chlorgas ergeben Mit anderen Worten Der 100gradige Chlorkalk nach GAY-LUSSAC entspricht einem Chlorkalk, welcher nach der üblichen Decimal-Rechnung = 31,8 Proc Chlor ausgiebt

Man kann daher die GAY-LUSSAC'schen Grade leicht in Gewichtsprocente Chlor um rechnen, wenn man die Zahl der GAY-LUSSAC-Grade mit 0,318 multiplioirt (s S 818)

$$90^{\circ} \text{ GAY-LUSSAC} \times 0,318 = 28,62 \text{ Proc Chlor}$$

Umgekehrt kann man die Gewichtsprocente Chlor in GAY-LUSSAC'sche Grade um rechnen, wenn man die Procente durch 0,318 dividirt

$$\frac{28,62 \text{ Proc Chlor}}{0,318} = 90^{\circ} \text{ GAY-LUSSAC}$$

Man wird es nicht auffällig finden, dass es nach dieser Art der Deklaration Chlorkalk giebt, welcher mehr als 100 Procent Chlor enthält, bez mehr als 100gradig ist

Soluté d'hypochlorite de chaux (Gall) Chlorkalklösung 100,0 g Chlor kalk (von 28,6 Proc) werden allmählich mit 4500,0 g kaltem Wasser angerieben und aufgeschlämmt Die Lösung ist zu filtriren Die Lösung soll ihr doppeltes Volumen an Chlor entwickeln, d h. sie soll 2 chlorometrische Grade nach GAY-LUSSAC oder 0,636 Gewichtsprocente Chlor enthalten

IV Liquor Natru hypochlorosi (Ergänzb) **Natrium hypochlorosum solutum** (Helv) **Chlorure de soude liquide** (Gall) **Liquor Sodae chlorinatae** (Brit) **Liquor Sodae chloratae** (U-St) Die unter den vorstehenden Namen von den einzelnen Pharmakopöen aufgenommenen Präparate sind wässrige Lösungen von Natriumhypochlorit und etwas Natriumkarbonat sowie Natriumchlorid Der Gehalt an wirksamem Chlor ist verschieden Technisches Synonym = Eau de Labarraque

Darstellung. Um gute Präparate zu erhalten, ist der Chlorkalk mit kaltem Wasser möglichst fein anzureiben und abzuschlemmen Jede Erwärmung muss bei der Darstellung vermieden werden, weil durch sie das Natriumhypochlorit mehr oder weniger in Natriumchlorat übergeht

Ergänzb und Helv 20 Th Chlorkalk werden allmählich mit 400 Th kaltem Wasser in einem Mörser angerieben, bez angeschlämmt Als dann mischt man hierzu eine kalte Lösung von 25 Th krystall Soda in 200 Th Wasser Nach dem Absetzen des entstandenen Niederschlages wird die klare Flüssigkeit abgehoben bez abfiltrirt

Bei Verwendung eines 25proc Chlorkalks kann diese Lösung etwa 0,8 Proc wirksames Chlor enthalten Ergänzb schreibt einen Minimalgehalt von 0,5 Proc Chlor vor, die Helv dagegen, drückt sich aber bezüglich dieser Forderung etwas unklar aus

Gall 100 Th Chlorkalk von 28,62 g wirksamem Chlor, 200 Th krystall Soda, 4500 Th Wasser Die Flüssigkeit soll ihr doppeltes Volumen an wirksamem Chlor enthalten, entsprechend 2 chlorometrischen Graden nach GAY-LUSSAC = 0,636 Gew Procenten

Brit 400 Th Chlorkalk von 33% wirksamem Chlor, 600 Th krystall Soda, 4000 Th Wasser Die Lösung soll etwa 2,5 Proc wirksames Chlor enthalten

U-St 75 Th Chlorkalk von 35 Proc wirksamem Chlor, 150 Th krystall. Soda, Wasser q s, so dass 1000 Th klare Flüssigkeit erhalten werden Die Lösung soll etwa 2,6 Proc aktives Chlor enthalten

Eigenschaften Klare, farblose oder schwach gelblich-grüne Flüssigkeit von schwachem Chlorgeruche, welche rothes Lackmuspapier erst bläut, dann entfärbt Sie werde durch Natriumkarbonatlösung nicht mehr getrübt, enthalte also keine fallbaren Kalksalze mehr Auf Zusatz von Säuren, z B Salzsäure, entwickelt sie sichtbare Mengen Chlor

Gehaltsbestimmung (Ergänzb Helv) Man bringt zu einer Lösung von 1,0 Kaliumjodid in 20 ccm Wasser zunächst 20 ccm des Liquors und sauert mit 20 Tropfen Salzsäure an. Zu der entstandenen rothbraunen Flüssigkeit, die noch mit etwa 50 ccm Wasser zu verdünnen ist, lässt man $\frac{1}{10}$ Normal Natriumthiosulfatlösung zufließen, bis die Flüssigkeit nur noch hellgelb gefärbt ist. Dann fügt man einige Tropfen Stärfelösung hinzu und titirt, bis die entstandene Blaufärbung gerade in Farblos übergegangen ist. Hierzu sollen nach Ergänzb mindestens 28 ccm ($28 \times 0,00355$, entsprechend 0,497 Proc Chlor) nach Helv mindestens 30 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein ($30 \times 0,00355$, entsprechend 0,5825 Proc Chlor). Nach Gall wurden unter den gleichen Bedingungen 35,8 ccm $\frac{1}{10}$ Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden.

Brit U-St 5 ccm werden zu einer Lösung von 2 g Kaliumjodid in 20 ccm Wasser gebracht. Man sauert mit 3—5 ccm Salzsäure an, verdünnt mit 100 ccm Wasser und titirt wie vorher. Es werden gebraucht zur Bindung des ausgeschiedenen Jod nach Brit = 35,2 ccm, nach U-St = 36,6 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Natriumthiosulfatlösung.

Aufbewahrung In mit Glasstopfen gut geschlossenen Glasflaschen vor Licht geschützt.

Anwendung In der Chemie gebraucht man die Natriumhypochloritlösung als ein kräftig oxydrendes Mittel und zur Unterscheidung von Antimon- und Arsenflecken, welche letztere davon aufgelöst werden, in der Technik zum Entfernen von Obst- und Weinflecken aus Weisszeug, zum Bleichen etc. In der Medicin wird sie meist mit der gleichen bis doppelten Menge Wasser verdünnt gegen brandige, krebsartige, syphilitische, stinkend eiternde Wunden, gegen stinkenden Athem, Mercurialsalivation, Verbrennungen, Panaritien etc., in Waschungen, Einspritzungen (1 auf 25—30 Wasser), Klystieren 2,0—5,0—10,0 auf 120 Wasser), Gurgelwassern etc., innerlich zu 5—20 Tropfen mit Wasser verdünnt in typhösen Fiebern bei stinkendem Athem etc. angewendet. — In der Mikroskopie dient sie als vorzügliches Entfärbungsmittel gefärbter pflanzlicher Objekte.

Die Wascherinnen bedienen sich dieser Bleichflüssigkeit im Uebermaass, und zwar als Reinigungsflüssigkeit zur Abkürzung der Mühe des Waschens. Sie besprengen die Wasche damit und lassen sie in dieser Verfassung länger als eine Viertelstunde liegen. Die Folge davon ist eine Lockerung der Zeugfaser und früher oder später ein Ausfallen des benetzt gewesenen Theiles unter Hinterlassung eines Loches. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein 15 Minuten übersteigendes Benetztsein mit der Bleichflüssigkeit eine Zerstörung des Zuges zur Folge hat. Die zerstörende Wirkung des Chlors wird durch Natriumthiosulfat (Antichlor) aufgehoben.

V Liquor Kali hypochlorosi Liquor Kali hypochlorosi. Aqua JAVELLE Chlorkaliflüssigkeit. JAVELLE'sche Lauge JAVELLE'sche Bleichflüssigkeit Eau de JAVELLE (Fleckwasser) wird wie Liquor Natri hypochlorosi dargestellt, nur dass an Stelle von 100 Th krystallisiertem Natriumkarbonat 55 Th gereinigte trockne Potasche genommen werden. Sie ist heute nicht mehr im Gebrauch und wird durch den billigeren Liquor Natri hypochlorosi ersetzt.

Cataplasma chlorinatum

Rp Argillae albae pulveratae 100,0
Liq Natri hypochlorosi 20,0
Aquae q s.
Fiat pasta mollis.

Collyrium chloratum VARLEZ.
Rp Calcariae chloratae 1,0 (ad 8,0)
Aquae destillatae 25,0
Conterendo mixta filtra.
S Augenwasser Dreistündlich mit einem Pinsel auf die Conjunctiva aufzutragen (bei Ophthalmia purulenta).

Enema chloratum

Rp Liquoris Calcariae chloratae 20,0
Aquae destillatae 100,0
Zu zwei Klystieren, vorher mit einem gleichen Volumen warmem Wasser zu mischen.

Fumigatio Chlori

I Fumigatio fortis (Pharmacopoeae Germanicae)
Rp Salis culinariae
Mangani hyperoxydati nativi aa 100,0
Grosso modo pulverata et mixta dentur ad chartam.
Una dispensentur
Acidi sulfurici Anglici 200,0
antea diluta.
Aquae communis 100,0
D S Zur Räucherung (für 100—150 Kubikmeter Raum).

II Fumigatio mitis (Pharmacopoeae Germanicae)
Rp Calcariae chloratae 100,0
D ad ollam Una dispensentur
Aceti crudi 500,0
S Zur Räucherung für circa 200 Kubikmeter Raum).

III Fumigation de chlore (Gall. Nachtrag) (Fumigation Guytonienne)

- Rp 1 Salis cuinaris
2 Mangani hyperoxydati nativi aa 250,0
3 Acidi sulfurici anglicl 700,0
4 Aquae destillatae 500,0

Man mischt 1—3 und fügt schliesslich 4 hinzu
Für einen Raum von 100 Kubikmetern

Globuli chlorophori

Chlore en baules Chlorkugeln.

- Rp Boll albas
Sals cuinaris
Mangani hyperoxydati nativi
Vitrioli Martis aa 1000

Man stösst die Pulver mit Hilfe von Wasser zur
dicken Paste an und formt 10 Kugeln daraus
§ Zur Chlorirucherung auf glühende Kohlen zu
werfen (Nicht mehr gebräuchlich)

Liniamentum contra perniones TESTELIN

- Rp Tincturae Jodi 5,0
Liquoris Natrii hypochlorosi 15,0

Zum Bestreichen der Frostbeulen

Liquor Calcariae chloratae

Liquor Calcis chlorinatae

- Rp Calcariae chloratae 100

Inter terendum in mortario porcellaneo misce cum
Aqua 100,0

Tum filtra Colaturae sint 100,0 Faretur ex
tempore

Lotio desinfectoria medicorum

- Rp Liquoris Natrii hypochlorosi
Aqua aa 100,0

§ suo nomine (für Aerzte und Chirurgen zum
Waschen der Hände nach Operationen, Obdu-
tionen)

CHOUVEILLE's oder RAMSAY's Bleichflüssigkeit wird durch Zersetzen von Chlorkalk mit Bittersalzlösung hergestellt (s. oben Magnesia hypochlorosa) und ist ein energisches Bleichmittel. Bei ihrer Anwendung zum Bleichen zarter Stoffe soll sie vor Chlorkalk den Vorzug haben, dass die Nebenwirkung des atzenden Erdalkalis fehlt.

HERMITE's Bleichlösung wird erhalten durch Elektrolyse einer Lösung von Magnesiumchlorid und Natriumchlorid und enthält demnach Natriumhypochlorit und Magnesiumhypochlorit.

VARBENTRAPP's Bleichsalz ist Zinkhypochlorit und wird dargestellt durch Umsetzung von Chlorkalk und Zinksulfat.

WILSON's Bleichflüssigkeit ist eine Lösung von Aluminiumhypochlorit, die man durch Zersetzen einer filtrirten Chlorkalklösung mit konzentrierter Aluminiumsulfatlösung und Abfiltriren des abgeschiedenen Calciumsulfats erhält. Die Wirkung beruht auf der Abgabe von Sauerstoff unter gleichzeitiger Bildung von Aluminiumchlorid.

Radirtinte, um Tintenschrift zu entfernen. Besteht aus zwei Flaschchen, von denen das eine Eau de Javelle, das andere eine 2procentige Essigsäure enthält. Man bestreicht die Tintenschrift mit Eau de Javelle, darauf mit der Essigsäure und trocknet mit einem Löschblatt ab.

Magnesia chlorata

Magnesia hypochlorosa Chlormagnesia.

- Rp 1 Calcariae chloratae 25,0
2 Aquae destillatae 150,0
3 Magnesiae sulfuris 50,0
4 Aquae destillatae frigidae 300,0

Man reibt 1 mit 2 an, löst anderseits 3 in 4 und
vermischt beide Lösungen. Die klare Flüssig-
keit wird nach dem Absetzen abgehoben.

Mixtura chlorata.

- Rp Aquae chloratae 25,0
Sirupi Sacchari 50,0

§ Alle zehn Minuten 1—2 Theelöffel (bei Asi-
tischer Cholera im ersten Stadium, nebeher Dar-
reichung von Eisstücken)

Pastilli Calcariae chloratae DESCHAMPS

- Rp Calcariae chloratae 10,0
Sacchari albi 200,0
Tragacanthae 0,25
Cocconellae 0,2
Aqua q. s.

Fiant pastilli quinquaginta (50)

(Eine Zusammensetzung, deren wirksames Chlor
schon in einigen Stunden verloren geht.)

Pneumatokatharterion CHEVALLE.

- Rp Liquoris Calcariae chloratae 100,0
Olei Caryophyllorum gtt XIII
Spiritus Vini 50,

§ Einen bis zwei Theelöffel mit einem Wein-
glase Wasser gemischt zum Mundausspülen

Pulvis desinfectorius COLLIN

- Rp Calcariae chloratae 40,0
Aluminis usui pulverati 20,0

Das Pulver wird auf Tellern ausgestreut an den
betroffenen Ort gestellt. Langsame Chlorent-
wicklung.

Unguentum Calcariae chloratae BINZ

- Rp Calcariae chloratae 1,0
Unguenta Paraffini 9,0

Auf Frostbeulen, um das Vereitern derselben zu
verhüten.

Chromium oxydatum.

I. Chromium oxydatum hydratum. Chromsesquihydroxyd. Chromhydrat
 $\text{Cr}_2(\text{OH})_6 + 4 \text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 278

Darstellung 50,0 Chromalaun werden in 500,0 destillirtem Wasser gelöst
und in diese völlig kalte Lösung unter Umrühren 110,0 eines 5procentigen Salmiak-
geistes nach und nach eingetragen und einige Stunden bei Seite gestellt. Dann wird

der hellgrüne Niederschlag gesammelt und nach dem Auswaschen mit Wasser an einem mässig warmen Orte getrocknet. Ausbeute circa 23,0

Man kann es auch aus der Chromsulfatlösung mit Ammoniak fällen. Eine Lösung dieses Chromsalzes stellt man aus Chromsaure dadurch her, dass man 10,0 Chromsaure in 15,0 konzentrierter Schwefelsäure löst, welche mit 80 Th Wasser verdünnt ist. In diese kalt gehaltene Flüssigkeit lässt man nach und nach Weingeist tropfenweise fallen. Nachdem die Reduktion der Chromsaure vollendet ist, verdünnt man mit einem Mehrfachen Wasser und fällt unter denselben Bedingungen, wie in der vorhergehenden Vorschrift angegeben ist, mit 105,0 eines 5procentigen Salmiakgeistes. Ausbeute an Chromoxydhydrat circa 12,0

Eigenschaften. Das Chromoxydhydrat ist ein mehr oder weniger gesättigt grünes Pulver, ohne Geruch und Geschmack. Es muss mit 4 Th einer 25procentigen Salzsäure eine klare grüne Lösung geben, welche durch Schwefelwasserstoff keine Veränderung, besonders keinen Niederschlag geben darf.

Aufbewahrung. In geschlossener Glasflasche am schattigen Orte.

Anwendung. Es darf das Chromoxydhydrat nicht mit dem Chromgrün oder dem grünen Zinnober verwechselt werden. Es ist von amerikanischen Aerzten als Tonicum (?) und Adstringens bei Diarrhoe der Kinder und anderen Affektionen der Verdauungswega empfohlen worden. Dosis für Kinder 0,05—0,1—0,15, für Erwachsene 0,15—0,3—0,5 einige Male des Tages.

II Chromium oxydatum. Chromium oxydatum viride. Chromsesquioxyd. Chromoxyd. Chromoxyd. Grüner Zinnober. Cr_2O_3 . Mol. Gew. = 152

Man versteht hierunter eine grüne Malerfarbe, welche in chemischen Fabriken in sehr verschiedenen Nuancen dargestellt wird. Zum Unterschiede von dem vorigen Chromhydroxyd ist das stark gegluhte Chromoxyd praktisch vollständig unlöslich in Säuren. Das Chromoxyd gehört an sich zu den unschädlichen Farben. Zur Hebung der Nuance wird das Chromoxyd aber mit sehr verschiedenen Substanzen, z. B. mit Bleichromat, Kaliumchromat und Kupferverbindungen, Schweinfurter Grün etc., versetzt und muss alsdann je nach den gemachten Zusätzen als giftig erklärt werden.

Will man Chromoxyd zur Färbung von Pomaden verwenden, so bereite man es am besten durch Glühen von Ammoniumchromat.

GUIGNET's Grün ist eine lebhaft grüne Malerfarbe, welche besonders das Schweinfurter Grün zu ersetzen geeignet ist. Sie ist ein Chromoxyd oder Chromoxydhydrat $2\text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ oder $\text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{Cr}_2(\text{OH})_6$ und wird gewonnen durch Glühen gleicher Moleküle Kaliumdichromat und Borsäure und Auslaugen des Glührückstandes mit Wasser. Es wird zunächst borsaures Chromoxyd gebildet, welches durch das Auslaugen mit Wasser in Borsäure und Chromhydroxyd zerfällt.

Chromoxyd zur Basis haben auch ARNOTTON's, PANNETIER's, PLESSY's Grün, Neapel grün, Laubgrün, Oelgrün, Jungferngrün, Mittlergrün, Smaragdgrün u. a., aber keine dieser Farben ist reines Chromoxyd.

III Chrom-Alaun. Alumen chromicum. Chromkalium-Alaun. Chromkaliumsulfat. $\text{Cr}(\text{SO}_4)_2 \cdot \text{K} + 12\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 409

Diese in der Technik in grossen Mengen verbrauchte Verbindung wird in der Regel als Nebenprodukt bei Oxydationen organischer Verbindungen, z. B. des Anthracens zu Anthrachinon u. a. m. erhalten. Sie ist im Handel in ziemlicher Reinheit und zu wohlfeilen Preisen zu haben. Will man sie gelegentlich einmal darstellen, so verfährt man wie folgt.

Darstellung. Man löst 10 Th Kaliumdichromat in 40 Th Wasser, säuert mit 14 Th konc. Schwefelsäure an und leitet in die Lösung aus welcher sich kein Salz ausscheiden darf (sonst ist Wasser zuzugeben), schweflige Säure im Ueberschuss ein. Man achte darauf, dass die Temperatur der Lösung nicht über 40°C hinausgeht. War die Temperatur über 40°C hinausgegangen, so erhält man eine grüne Lösung, aus welcher sich erst nach längerem Stehen violette Krystalle abscheiden.

Eigenschaften. Dunkelviolette, grosse, oktaëdrische Krystalle, in 5 Th Wasser löslich. Die Lösung ist bläulichviolett gefärbt. Wird sie auf etwa 75°C erhitzt, so

nimmt sie grüne Färbung an und ist dann nicht mehr krystallisationsfähig. Nach längerem oder kürzerem Stehen wird die grüne Lösung wieder violett und ist alsdann auch wieder krystallisationsfähig. Aus der wässerigen Lösung wird durch Ammoniak blaugrünes Chromhydroxyd gefällt. Durch Schmelzen mit Soda und Salpeter wird chromsaures Kali bez. Natron gebildet.

Anwendung. Als Beize in der Färberei, zur Erzeugung von chromgarem Leder, zur Herstellung von Tinten.

Basischer Chromalaun. Wird die konzentrierte, kochendheiss gemachte, grüne Chromalaunlösung mit Weingeist versetzt, so scheidet sich eine grüne, zähe Masse aus, welche sich zum Grünfärben der Oelfirnisse, Kautschukmassen etc., in wässriger Lösung zu grüner Tinte eignet.

Chrysarobinum.

Gewinnung. Chrysarobin ist ein Produkt der zu den Papilionaceae—Dalbergieae—Geoffraeinae gehörigen *Andira Araroba* Aguiar, eines starken Baumes in Brasilien, besonders der Provinz Bahia. Das Holz des Baumes durchziehen lange Spalten und Höhlungen, die ein glanzloses, gelbes, an der Luft bald leberbraun bis violett werdendes Pulver enthalten. Dasselbe entsteht zuerst in den Zellen (Holzparenchym, Gefässe und Libriform), worauf bald eine Desorganisation der Zellwände eintritt, die an der Bildung des Sekrets




Fig. 193.
Chrysarobin aus Benzol krystallisiert.




Fig. 194. Chrysarobin aus 2 Th. Benzol und
1 Th. absol. Alkohol.

100—150 mal vergrößert.

theilnehmen. Die Bäume werden gefällt, zersägt und zerspalten, um die Höhlungen blosszulegen, aus denen man das Pulver dann herauskratzt; es ist reichlich mit Holztheilen vermengt und führt die Namen *Araroba*, *Arariba*, *Goaspulver*¹⁾, *Po de Bahia*. Man liest größere Holzstücke etc. aus und schlägt das Pulver durch ein Sieb. Dieses Produkt kommt dann als *Araroba depurata* oder *Araroba pulv. subtl.* in den Handel, es enthält durchschnittlich 70 Proc. der chemischen Verbindung Chrysarobin.

Es wird weiter gereinigt, indem man es meist mit kochendem Benzol oder Chloroform behandelt und das Filtrat eindampft. Dieses Präparat führt nun den Namen: *Chrysarobinum* oder *Acidum chrysophanicum crudum*, welche letztere Bezeichnung, wie man

¹⁾ Weil es aus Portugiesisch-Indien zuerst 1864 europäischen Aerzten bekannt wurde.

sehen wird, wissenschaftlich falsch ist Zur weiteren Reinigung wird das mit Benzol gewonnene Präparat aus Eisessig umkrystallisirt Vergl S 40

Germ Helv U St verlangen nur ein gereinigtes Präparat ohne nähere Angaben, Austr verlangt ein mit heissem Benzol, Brit ein mit heissem Chloroform extrahirtes Präparat


Germ Helv Brit U-St nennen es Chrysarobinum, Austr Araroba depurata.

Beschreibung Das durch Extraktion mit Benzol oder Chloroform gewonnene Chrysarobin bildet ein mattes, heller oder dunkler gelbes Pulver vom spec Gew 0,920—0,922 Unter dem Mikroskop erweist es sich zum grossten Theil aus feinen Krystallnadeln bestehend, die zu rundlichen Aggregaten vereinigt sind (Fig 193 und 194) Schmelzpunkt 170 bis 178° C Geruch und Geschmackslos


Löslich in 30 Th Benzol, etwa ebenso viel Amylalkohol, 230 Th Schwefelkohlenstoff, 150 Th heissem Weingeist, ferner löslich in Chloroform, schwer löslich in Aether, fetten und ätherischen Oelen Mit 2000 Th Wasser gekocht, ist es nicht völlig löslich und scheidet sich im Filtrat beim Erkalten wieder zum Theile aus Es ist sublimirbar und bildet dabei kleine Mengen eines Körpers $C_{15}H_{12}$ In verdünnter Kalilauge unlöslich, löst es sich in concentrirter Kalilauge mit gelber Farbe mit grüner Fluorescenz Kalkwasser färbt sich nach dem Schütteln mit Chrysarobin im Laufe eines Tages violettroth Von concentrirter Schwefelsäure wird es mit blutrother Farbe gelöst, von kochend heisser Salpetersäure (spec Gew 1,185) wird es mit rothgelber Farbe gelöst

Bestandtheile Das mit Benzol oder Chloroform gereinigte Präparat enthält etwa 90 Proc Chrysarobin $C_{30}H_{26}O_7$

Chrysarobin entsteht aus Chrysophansäure durch Aufnahme von Wasserstoff unter Austritt von Wasser



Durch Schütteln der alkalischen Lösung des Chrysarobin mit Luft wird wieder Chrysophansäure gebildet.



Prüfung. 1) Das Präparat muss sich in 30 Th Benzol lösen Das rohe Präparat löst sich nicht völlig (vgl. oben) — 2) Erhitzt, verbrenne es ohne Rückstand — 3) 0,001 g Chrysarobin auf einige Tropfen rauchende Salpetersäure gestreut, färben dieselbe roth, breitet man diese Lösung in dünner Schicht aus, so wird sie beim Betupfen mit Ammoniak violett Chrysophansäure wird nicht violett

4) Ebenso färbt Chrysophansäure damit geschütteltes Kalkwasser gelb und nicht violettroth (vergl oben)

Aufbewahrung Die kaufliche Droge wird nöthigenfalls durch ein feines, bedecktes Sieb (Vorsicht! Schutzbrille!) geschlagen und in gelben Stöpselgläsern aufbewahrt. Beim Arbeiten mit Chrysarobin vermeide man, da dasselbe heftig die Schleimhäute angreift, jede Staubeentwicklung und entferne auch Spuren davon von den Händen durch Waschen

Anwendung und Wirkung. Chrysarobin erzeugt auf der Haut und besonders auf den Schleimhäuten Rothung, Schwellung und selbst Pusteln Es wird von der Haut aus resorbirt. Bei Anwendung auf grösseren Flächen kann Albuminurie eintreten — Innerlich erzeugt es Erbrechen, Durchfall und Nierenentzündung (schon bei 0,2 g) —

Man verwendet es gegen Psoriasis, Herpes tonsurans, Ekzema marginatum etc. Die auf der Haut zurückbleibenden Flecke können mit Benzol entfernt werden

Collemplastrum Chrysarobini	Chrysarobini subtile pulv	150
Chrysarobin-Kautschukpflaster 5%.	Sandaracae	200
	Olei Resinae	250
Rp Massae ad Collemplastrum 800,0	Aethera	150,0
Rhizomatis Iridis pulver 57,0	Bereitung wie bei Collemplastrum Arnicae (S 835)	

Collodium chrysarobinatum ADAMS.
 Collodium cum Araroba.
 Rp Chrysarobini 2,0
 Collodii 18,0

Zum Bepinseln der Haut

Emplastrum Chrysarobini DREIERICH
 Rp Olei Olivarum 20,0
 Colophonii 20,0
 Cerae flavae 40,0
 Ammoniaci 2,0
 Terebinth. laticum 2,0
 Chrysarobini 12,0

Man schmilzt und giesst in Tafeln aus

Gelatina Chrysarobini UYNA (5%)
 Rp 1 Gelatinae albae 5,0
 2 Aquae destillatae 50,0
 3 Glycerini 80,0
 4 Chrysarobini sublt. plv 5,0

Man löst 1 in 2, fügt 3 hinzu, dampft auf 30,0 g ein u mischt mit 4

Glycerinum saponatum cum Chrysarobino
 Rp Glycerini saponati (92 proc.) 90,0
 Chrysarobini 10,0

Lanollimentum Chrysarobini extensum
Chrysarobin-Lanolin-Salbenmull (10%)
 Rp 1 Cerae flavae 2,0
 2 Sebi benzoati 13,0
 3 Chrysarobini 10,0
 4 Lanolini 70,0

Man schmilzt 1 mit 2, fügt 3 mit 4 verrieben hinzu, und streicht auf unappretirten Mull.

Linimentum antiherpeticum chrysarobinatum
 Rp Acidi benzoici 2,5
 Chysarobini 5,0
 Glycerini 10,0
 Alcohol absoluti 40,0
 Benzoli 60,0

Man löst in der Wärme und filtrirt durch Glas wolle Gegen Herpes, Krätze

Oleum Chrysarobini
 Rp 1 Chrysarobini 1,0
 2 Chloroformi 7,0
 3 Olei Lini 7,0

Man löst 1 in 2 und fügt 3 hinzu Mit einem Borstenpinsel aufzutragen

Stilus Chrysarobini
Chrysarobinstift.
 Rp 1 Resinae Pini 5,0
 2 Cerae flavae 35,0
 3 Olei Olivarum 80,0
 4 Chrysarobini 80,0

Man schmilzt 1 u 2 mit 3, fügt der halberkalteten Masse nach und nach 4 hinzu und giesst in Formen

Chrysarobin-Paraplaste BECKSDORFS ist ein wasserdichtes Pflaster mit 40 Proc Chrysarobin (vergl S 832)*

Chrysarobinpulverseife ist Sapo medicatus mit 10 Proc Chrysarobin

Chrysarobinpflaster. Mit Oel verriebenes Chrysarobin wird einer mit Benzin flüssig gemachten Lanolinkautschukmasse zugesetzt

Salbe gegen Hautausschlag des Drogisten NAEDELER in Berlin ist eine Chrysarobinsalbe

Als ebenso wirksam wie Chrysarobin, doch leichter löslich und weniger hautreizend werden neuerdings empfohlen

Eurobinum, ein triacetylirtes Chrysarobin

Rp Eurobini 2,0
 Eucalioli 10,0
 Acetoni 10,0

Rp Eurobini 0,5—5,0
 Solut. Saligalioli 5,0—80,0
 Acetoni q s ad 50,0

Rp Eurobini 1,0—5,0
 Pastae Zinci q s ad 100,0
 Bei Schuppenflechte, Salzfluss

Stilus Chrysarobini unguens (Diet)
Chrysarobin-Salbenstift (80%)
 Rp Chrysarobini 30,0
 Cerae flavae 20,0
 Adipis Lanae puri 50,0

Stilus Chrysarobini salicylatus (Diet)
 Rp Chrysarobini 10,0
 Acidi salicylic 20,0
 Cerae flavae 20,0
 Adipis Lanae puri 50,0

Traumatikum Chrysarobini
 (Münch Apoth V)
 Rp Chrysarobini 1,0
 Traumaticini 10,0

Unguentum Acidi chrysophanici NEUMANN
 Rp Chrysarobini 10,0
 Unguenti lenientis 40,0

Unguentum Acidi chrysophanici SQUIER
 Rp 1 Chrysarobini 10,0
 2 Benzoli 15,0
 3 Adipis suilli 40,0

Man löst 1 in 2 in der Wärme, seigt durch, eizhtzt mit 3 im Wasserbade, bis 2 verdampft ist, und rührt kalt

Unguentum Chrysarobini
Chrysarobin Ointment.
 1 Ph. Brit

Rp Chrysarobini 2,0
 Adipis benzoati 48,0

Man schmilzt und rührt kalt

2 Ph. U-St.
 Rp Chrysarobini 5,0
 Adipis benzoati 25,0

werden gemacht

Unguentum Chrysarobini LASSAR
Psoriasismittel von Prof LASSAR
 Rp Chrysarobini 20,0
 Lanolini 75,0

Unguentum Chrysarobini compositum nach U...
 Rp Chrysarobini 5,0
 Ammonii sulfocichthyolici 5,0
 Acidi salicylici 2,0
 Vaselinii flavi 88,0

Unguentum Chrysarobini extensum
Chrysarobin-Salbenmull
 Rp Adip. benzoati 20,0
 Sebi benzoati 70,0
 Chrysarobini 10,0

Man schmilzt, mischt und streicht auf Mull

Unguentum psoriaticum ROSENBERG
 Rp Chrysarobini 50,0
 Ammonii sulfocichthyolici 20,0
 Unguenti Zymoidini (25%) 80,0

Bei Schuppenflechte Das Chrysarobin wird mit etwas Glycerin angerieben

Lenirobium, ein tetraacetylirtes Chrysarobin

Rp Lenirobium 5,0—20,0
 Pastae Zinci q s ad 100,0
 Anwendung wie bei vorigem

Rp Lenirobini
 Eucalloli aa 5,0—20,0
 Chloroformii 50,0

Cibotium.

Verschiedene Arten dieser zu den Filicales-Cyatheaceae gehörigen, im ostindischen Archipel und auf Inseln des Stillen Meeres heimischen Gattung und verwandter Gattungen sind auf dem Rhizom und an den Wedelbasen mit einem dichten Filz haarartiger, weicher, seidig wolliger, goldgelb bis brauner, schon glänzender Spreuhaare bedeckt, welche Verwendung finden

Man unterscheidet folgende Sorten


1) Pakoe Kidang von *Alsophila lurida* Bl, *Balanium chrysotrichum* Hasskarl u a auf Java

2) Penghawar Djambi von *Cibotium Barometz* Kz, *Cibotium glaucescens* Kz u a auf Sumatra

3) Palu von *Cibotium glaucum* Hook u a auf den Sundwicks Inseln. — Neuerdings gelangen solche Spreuhaare auch aus Vorderindien, Mexico und Honduras in den Handel

Beschreibung Jedes Haar besteht aus einer einfachen bis 9 cm langen Reihe dünnwandiger, bis 2 mm langer, bis 100 μ dicker Zellen, die flach gedrückt und zuweilen um einander gedreht sind (Fig 195). Sie enthalten geringe Reste brauner Massen und einzelne sehr kleine Stärkekörnchen. Zuweilen flächenartig ausgebildete Spreuschuppen anderer Farne sind nicht zu verwenden, ebenso die aus Mexiko gekommene Wolle von den Zapfenschuppen von Cycadeen

Anwendung Man verwendet die Haare *Pili Cibotii s stypticae*. *Palaeo haemostatica* (Austr) Farnhaare Farnkrautwolle Blutstillende Spreuhaare als blutstillendes Mittel vermöge ihrer grossen Aufsaugefähigkeit für das Blutserum. Ihre erhebliche Wirkung steht ausser Zweifel, es ist aber zu bedenken, dass sie häufig ziemlich unrein (Staub) sind, so dass es gewagt erscheinen muss, sie auf offene Wunden zu bringen. — Technisch benutzt man sie in grosser Menge (besonders in Nordamerika) als Stopf- und Polstermaterial.



Cib

Fig 195

Cichorium.

Gattung der Compositae—Cichorieae—Cichorinae.

I. Cichorium intybus L Cichorie. Wegwarte. Verfluchte Jungfer. Sonnenwedel. Handleuchte — Chicorée — Succory. Durch Europa und das gemässigte

Asien verbreitet, vielfach zur Gewinnung der Wurzel (besonders in Mittelddeutschland) kultivirt Sperrigastiges Kraut mit blauen Blütenköpfen Hüllkelch zweireihig, die 5 inneren Blätter am Grunde verwachsen Blüten mehrreihig, zungenförmig Achenen fast fünfkantig, kahl mit 1—3 reihigem Pappus Blütenboden nackt oder in der Mitte mit Borsten Verwendung finden

a) die Blätter oder das Kraut Folia oder Herba Cichorii. Cichorienblätter. Cichorienkraut Feuilles de Chicorée (Gall.) Succory Leaves

Beschreibung Die unteren Blätter sind gestielt, schrotsägeförmig, die oberen lanzettlich, sitzend

Die frischen Blätter dienen bisweilen noch zu laxirenden Kräutersäften, werden auch als Salat gegessen, die getrockneten zum Bereiten des

Sirop d'Erysimum composé, Sirop des Chantres (Gall.), derselbe enthält als Hauptbestandtheil das Kraut von *Sisymbrium officinale*, daneben Folia Boraginis, Cichorii,




Fig 196 (Nach MÖLLER)

Längsschnitt durch die Rinde der Cichorienwurzel. 160 mal vergrößert. rp Rindenparenchym s Siebröhren. sch Milchsaftschläuche m Markstrahl




Fig 197 (Nach MÖLLER)

Längsschnitt durch das Holz der Cichorienwurzel 160 mal vergr. g Gefäße hp Holzparenchym l Holzfasern m Markstrahl

Capilli, Rosmarini, Flores Stoechados, Fructus Anisi, Radix Heleni, Laquirinae, Passulae, Hordeum mundatum, Mel und Saccharum.

Extractum Cichorii Extrait de Chicorée (Gall.) aus trockenen Blättern wie **Extractum Centaurii** (Gall.) (S 684) zu bereiten.

Succus ex Herbis commixtis Suc d'Herbes (Gall.) Frische Blätter von Cichorienkraut, Kresse, Erdrauch, Gartenlattich aa werden gequetscht, ausgepresst und der Saft filtrirt.

Tisane de Chicorée (Gall.) wie Tisane de Buchu (S 511)

b) Die Wurzel. **Radix Cichorii**. **Radix solstitialis** Cichorienwurzel. Wegwartwurzel. **Racine de Chicorée** (Gall.) **Succory Root**.

Beschreibung. Die Wurzel ist spindelförmig, wenig verästelt, frisch derbfleischig und beim Anschneiden milchend, getrocknet runzelig, hornartig hart. Auf dem Querschnitt erkennt man eine schmale Korkzone, eine dünne, weisse Rinde, die den hellen oder gelblichen Holzkörper umschliesst, der durch die Markstrahlen fein radialstreifig erscheint, welche letzteren auch in der Rinde mit der Lupe leicht zu sehen sind

Der Kork besteht aus wenigen Reihen mässig flacher, zarter, brauner Zellen, in der Rinde fehlen sklerotische Elemente völlig, es fallen aber hier die gegliederten Milchröhren als charakteristisches Element im Querschnitt und noch mehr im Längs-

schnitt auf, ihr Inhalt erscheint körnig. Im Längsschnitt sind auch die Siebrohren leicht zu sehen (Fig 196)

Die Gefässe des Holzes bestehen aus verhältnissmässig kurzen (etwa 200 μ langen) Gliedern, die 20—50 μ weit und quergetüpfelt sind. Sie sind zu kleinen Bündeln vereinigt. Die Parenchymzellen des Holzes sind dicht porös, die Holzfasern sind schwach verdickt mit schiefen Spalten (Fig 197). Die Markstrahlen sind bis dreireihig.

Die Wurzel enthält keine Stärke, sondern Inulin.

Bestandtheile der frischen Wurzel nach KOENIG: Wasser 75,69 Proc., Stickstoffsubstanz 1,01 Proc., Fett 0,49 Proc., Zucker 3,44 Proc., Inulin etc 17,62 Proc., Holzfaser 0,97 Proc., Asche 0,78 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 4,18 Proc., Zucker 14,97 Proc., Inulin etc 71,96 Proc. Die Asche enthält: Kali 38,3 Proc., Natron 15,68 Proc., Kalk 7,02 Proc., Magnesia 4,69 Proc., Eisenoxyd 2,51 Proc., Phosphorsäure 12,49 Proc., Schwefelsäure 7,93 Proc., Kieselsäure 0,91 Proc., Chlor 8,04 Proc.

Verwendung. Zuweilen als Laxans, hauptsächlich als Kaffeesurrogat (vergl unten).

Sirupus Cichorii compositus, siehe unter Rheum.

Brutolicolor, ein Bierfarbemittel, ist Cichorienwurzel-Extrakt.

Kaffee-Surrogat von Pisoni, ist trockenes Cichorienextrakt.

Kräuter-Extrakt von Mayer. Honig mit einer starken Abkochung von Cichorienkaffee.

Sirop magistral. Tinctura Ferri tartarici 2,0, Sirupus Cichorii comp 98,0.

In grossem Maassstabe wird die Wurzel als „Kaffeesurrogat“ verwendet. Zu diesem Zwecke wird sie in Streifen geschnitten und getrocknet, dann eingefettet, geröstet und gemahlen.

Bestandtheile der gerösteten Wurzel: Wasser 18,16 Proc., stickstoffhaltige Substanz 6,58 Proc., Fett 2,74 Proc., Zucker 17,89 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 41,42 Proc., Rohfaser 12,07 Proc., Asche 6,19 Proc., wasserlösliche Stoffe in der Trockensubstanz 70,50 Proc.

In Belgien darf als Kaffeesurrogat zubereitete Cichorienwurzel 15 Proc Wasser, 50 Proc Trockensubstanz beim Erschöpfen mit heissem Wasser, gepulvert 10 Proc., gekörnt 8 Proc Asche haben. Fett und Zucker dürfen zu 2 Proc zugesetzt werden.

Die Cichorie spielt weniger eine Rolle zur Verfälschung echten, gerösteten und gemahlenden Kaffees, sie kommt meist allein unter ihrem eigenen Namen in den Handel oder führt andere Namen. Löwen-, Dom-, Stern-, Germania-, Frank-, Völkerhauswald-, Zatzkas Spar-Kaffee. Ganz unzulässig sind Bezeichnungen wie Feinster Mokka-, Bester Java, Feinster orientalischer Mokka-Kaffee etc. Cichorie unterliegt selbst wieder Verfälschungen mit andern Wurzeln, wie Taraxacum officinale, Beta vulgaris, Brassica Rapa, Daucus Carota. Am häufigsten verwendet man die Rubenschnitzel der Zuckerfabriken (also von Beta vulgaris).

Nachweis. Wenn es sich darum handelt, Cichorie oder ein anderes aus Wurzeln hergestelltes Surrogat im gemahlenden Kaffee nachzuweisen, so erleichtert es den Nachweis, eine Probe der Substanz in Wasser zu schütten. Kaffee schwimmt verhältnissmässig lange oben, Surrogate aus Wurzeln sinken meist schneller zu Boden. — Diesen Bodensatz oder die ursprüngliche Substanz bringt man, um sie anzuhellen, zweckmässig einige Tage in starke Chloralhydratlösung (3 Chloral 2 Wasser). Fallen dann bei der Untersuchung unter dem Mikroskop die Bruchstücke „grosser“ Tüpfelgefässe auf, so liegt Verdacht auf eine Wurzel vor. Um Cichorie nachzuweisen, hat man noch die Milchsaftschläuche aufzusuchen. Sind sie gefunden, so kann neben Cichorie noch Taraxacum in Betracht kommen. Bei letzterem sind die Gefässe bis 80 μ weit, ihre Tüpfel schmal und langgestreckt. Bei Cichorie sind die Glieder der Gefässe auffallend kurz, sie sind bis 50 μ weit. Die Tüpfel sind rundlicher wie bei Taraxacum. Ausserdem enthält die Cichorie wenig verdickte, schief getüpfelte Holzfasern, die aber schwer anzufinden sind.

Fehlen Milchsaftschläuche (aber lange und sorgfältig danach suchen!), so liegt eine andere Wurzel vor. Die Wurzel von Brassica hat vereinzelte Zellen mit Oxalatsand.

Die Gefässe von *Brassica* sind auffallend kurzgliederig, die Glieder oft nur doppelt so lang wie breit, die Wände netzartig verdickt. Die Gefässe von *Beta* sind langgliederig, die Maschen der netzartigen Verdickung weiter wie bei *Brassica*.

Die Gefässe von *Daucus* sind langgliederig mit schmalen, langgestreckten Tupfeln.

Vorkommenden Falls hat man sich zum Vergleich Präparate aus den betr. Wurzeln anzufertigen.

Cigarettae.

Cigarettae. Cigarren. Cigaretten. Sind eine in vielen Fällen nützliche Arzneiform. Sie werden je nach dem zur Anwendung kommenden Arzneistoff und je nach der Art des Gebrauchs verschieden angefertigt.

I Cigarren Hierunter versteht man solche Arzneiformen, welche hergestellt werden, indem man schwach salpetersirte Arznei-Blätter (z. B. *Belladonna*, *Stramonium*) in die Form einer Cigarre bringt und diese mit einem Deckblatt von Tabak umwickelt. — Werden diese Cigarren verlangt, so muss man sie von einem Cigarrenmacher wickeln lassen. Zu diesem Zwecke würden demselben die präparierten Arznei-Blätter zu übergeben sein, welche aus ausgesuchten schönen Exemplaren bestehen sollten. Auf 1 Cigarre rechnet man 8,0 g trockne Blätter.

II Cigarettae Diese werden in zwei Formen hergestellt.

A. Cigarettae herbatiae, Kräuter-Cigaretten, werden dargestellt, indem man medicinale Kräuter (*Herba Belladonnae*, *Digitals*, *Hyoscyami*, *Stramonii*, *Lobeliae*, *Salviae*) fein schneidet und zunächst präpariert. Zu diesem Zwecke werden 100,0 g des Vegetabilis mit einer Lösung von 20 g Kaliumnitrat in 15,0 g Wasser und 10,0 g Weingeist bespiengt und wiederum getrocknet. Diese präparierten Vegetabilien oder Vegetabilienmischungen, welche je nach Vorschrift noch mit Extraktlösungen u. dergl. getränkt und wieder getrocknet werden, werden alsdann am besten mittels einer sogen. „Stopfmaschine“ in die leicht zu beschaffenden „Cigarettenhülsen mit Mundstück“ gestopft und die fertigen Cigaretten wie üblich geraucht. Oder man verwendet dünnes Fliesspapier, welches zunächst mit einem Auszug der zu verwendenden Arzneimischung und etwas Kaliumnitrat getränkt und wieder getrocknet ist. Das Zukleben erfolgt mit Stärkekleister.

Cigarettes indiennes de Grimaud
sollen angeblich nur aus *Herba Cannabis Indicae* bestehen, thauähnlich aber enthalten sie nur wenig davon, ausserdem *Belladonna*, *Nicotiana* etc.

Cigarettes de Belladonna (Gall)
Kleingeschnittene *Belladonna*-Blätter werden in Cigarettenhülsen gestopft. Jede Cigarette enthält 1 g der Species. In gleicher Weise sind zu bereiten: C de *Digitale*, C de *Eucalyptus*, C de *Jusquiame*, C de *Nicotiane*, C de *Stramoine*.

Cigarettes de Troussau
bestehen aus *Stramonium*-blättern, welche mit Opiumextrakt getränkt sind.

B. Cigarettae chartaceae, Cigaretten aus medicamentösem Papier, aus Papier mit Extraktlösungen, Salzlösungen, Tinkturen werden in der Weise bereitet, dass man schwach salpetersirtes Papier entweder (bei Darstellung weniger Cigaretten) mit einem Tropfglase, in grösserem Maassstabe vermittelst einer Spritzflasche mit der medikamentösen Lösung anfeuchtet, aber niemals in dem Maasse netzt, dass die Flüssigkeit an dem senkrecht gehaltenen Papier herabläuft. Die Papierrechtecke werden nach dem Trocknen zu je einer Cigarette locker zusammengerollt und mittelst Stärkekleisters (nicht Gummiarabicumsschleim) geschlossen.

Die Cigaretten dieser Art werden gewöhnlich mit Beihülfe eines Mundstücks aus Glas, Holz, Rohr (Cigarrenspitze) gebraucht und in der bekannten Weise geraucht, bald mehr, bald weniger, oder auch nicht den Dampf einziehend, je nach Anordnung des Arztes.

Das vorstehend erwähnte salpetersaure Papier, Charta parca nitrata, wird in der Weise bereitet, dass man 3 Bogen Fliesspapier übereinanderlegt und mittelst Spritzflasche mit der angegebenen Salpeterlösung besprengt, so dass der obere Bogen gerade befeuchtet erscheint. Dann wendet man die untere Seite der Schicht von 3 Bogen nach oben und besprengt auch diese in derselben Weise. Dann lässt man die Schicht trocknen und nimmt die drei Bogen von einander und schneidet sie in Rechtecke von 10×7 cm Fläche.

Zu dieser Art Cigaretten gehören solche, welche aus Fliesspapier hergestellt sind, das mit einer Pflanzenabkochung bereitet ist, aber auch die mit Salzlösungen oder dergl. getränkten, z. B. Cigarettae arsenicatae Boudin S 392 und Cigarettae antiphthisicae Trousseau S 397.

Cigarettes antiasthmiques. Man bereitet eine Abkochung aus Foliorum Belladonnae, Foliorum Stramonii, Foliorum Digitalis, Foliorum Salviae aa 5,0 in 1000,0 Wasser. In der Colatur löst man 75,0 Kalisalpeter und fügt 40,0 Benzostinktur zu. In diese Flüssigkeit legt man für 24 Stunden (Blatt für Blatt) Filterpapier ein. Man trocknet es alsdann und schneidet es in Rechtecke von 10×7 cm, welche dann zu Cigarettenröhren geformt werden. Man disponiert letztere in Schachteln zu je 40 Stück.

III Siphonetae Siphoncigaretten. Sind circa 10 cm lange, offene Röhren aus Glas, harter Pappe, Rohr, Federkielen, welche mit einer Patrone irgend eines flüchtigen Arzneistoffes, z. B. Kampfer, Jodoform, Menthol, beschickt sind. Die Patrone ist ein Cylinder aus dichter Gaze und nach der Natur des Arzneistoffes auch wohl mit Fliesspapier umschlossen. Diese Patrone wird in das circa 7 mm weite Glasrohrstück, welches mit einem Mundstück, einem Federkiel versehen ist, eingeschoben. Der Patient zieht nur die durch die Patrone gesogene Luft ein. Diese Cigaretten werden also nicht geraucht.

Cimicifuga.

Cimicifuga racemosa Barton (jetzt *Actaea racemosa* L.) Ranunculaceae—Helleboreae. Heimisch in Nordamerika von Canada bis Florida und den atlantischen Staaten der Union, in Europa (England) hier und da verwildert. Die Pflanze ist der bei uns heimischen *Actaea spicata* L. ähnlich, aber grösser mit doppelt gefiederten Grundblättern.

Verwendung findet das Rhizom mit den Wurzeln.

Rhizoma Cimicifugae (Brit.) *Cimicifuga* (U-St.) *Radix Actaeae* s. *Cimicifugae racemosae*. *Radix Christophoriana americanae*. *Radix Cimicifugae Serpentariae*. — Schwarze Schlangenzwurzel. Klapperschlangenzwurzel — Black Snakeroot. Bugbane. Black Cohosh.

Beschreibung. Die Droge besteht aus einem kurzen, wagerechten Rhizom mit querringelten Aesten von heller Farbe und zahlreichen Wurzeln. Das Rhizom und seine Aeste mit Reiten von Niederblättern, ähnlich wie das Galgantrhizom. Im Querschnitt des Rhizoms ein starkes Mark mit schmalem Gefässbündelring, von Markstrahlen durchzogen.

Die Droge riecht eigenartig und ist von scharfem, unangenehmem Geschmack.

Bestandtheile. Scharf schmeckende Harze, theilweise in Alkohol und in Aether löslich. Ein Gemenge derselben ist als *Resina Cimicifugae*, *Cimicifugin*, *Macrotin* im Gebrauch. Ferner enthält sie einen krystallisirenden, gelben Körper von scharfem Geschmack.

Wirkung und Anwendung. Man empfiehlt die Droge und das daraus dargestellte Harz gegen Asthma und Brustleiden, auch als Antipyreticum, sie soll in der Wirksamkeit der Digitalis nahe stehen. Die Droge giebt man zu 0,5–4,0 als Pulver oder Abkochung, die Tinktur (1:10) zu 80–60 Tropfen mehrmals täglich.

Extractum Cimicifugae. Extract of *Cimicifuga* (U-St.) Gepulverte Wurzel (No 60) wird mit q. s. Alkohol (91 Proc.) im Perkolator erschöpft, der Auszug zu einem dicken Extrakt eingedampft.

Extractum Cimicifugae fluidum (U-St.) s. **liquidum** (Brit.). **Liquid or fluid Extract of Cimicifuga or of Actaea racemosa.**

Aus gepulverter Wurzel (No. 60) 1000 g und q. s. Alkohol (90 Proc.) bereitet man durch Verdrängung l. s. 1000 ccm Extrakt. Gabe 0,3–1,5 g. Nach Hamb. Vorschr. Aus der gepulverten Wurzel wie **Extractum Hydrastis fluidum** Germ. III zu bereiten.

Tinctura Cimicifugae. **Tinct. Actaeae racemosae.** Brit. lässt aus 100 g gepulverter Cimicifuga (No. 40) mit q. s. Alkohol von 60 Proc., U.-St. aus 200 g des Rhizoms mit Alkohol von 91 Proc. durch Verdrängung 1000 ccm Tinktur bereiten.

† **Resina Cimicifugae.** **Cimicifugin.** **Macrotin.** Darstellung wie bei **Podophyllin** (s. dort). Unter den starkwirkenden Mitteln aufzubewahren. Man giebt es zu 0,06–0,4 täglich.

Rp. **Extracti Cimicifugae fluidi** 25,0

Mentholi 0,1.

D. S.: 3mal täglich 10 Tropfen bei Ohrenleiden.


Cina.

Flores Cinae (Austr. Germ.). **Flos Cinae** (Helv.). **Semen Cinae Levanticum.** **Anthodia Cinae.** **Semen contra s. sanctum s. Santonid.** **Semen Zedoarine.** — Wurm-samen. Zittwersamen. Zittwerblüthen. Sebersaat. — **Semencina.** **Barbotine** (Gall.). — **Santonica.** **Levant Wormseed** (U-St.)

Die Blüthenköpfchen einer Varietät der *Artemisia maritima* L., wahrscheinlich der *A. maritima* var. *Stechmanniana* Besser (*A. Cina* Berg), Familie der Compositae—Anthemideae—Chrysantheminae, heimisch in den Steppen von Turkestan im Gebiete des Arys. Die Pflanze beginnt infolge der rücksichtslosen Ausbeutung, der Benutzung der Steppe als Viehweide und der häufigen Brände selten zu werden; man ist daher bemüht, sie im transkaspischen Gebiete und in Transkaukasien einzubürgern.

Beschreibung. Die Droge besteht aus den 3–4 mm langen Blüthenköpfchen. Jedes Köpfchen hat 12–18 locker zusammenschliessende Hüllblättchen mit grünem Mittelstreif und häutigem Rande, sie schliessen 3–5 Einzelblüthen mit glockenförmigem Saum ein, der letztere ist im frischen Zustande schön roth, im trocknen braun. Sie sind in der Droge häufig nicht mehr deutlich zu erkennen. (Fig. 198.)

Die Epidermis der Hüllblättchen besteht aus langgestreckten Zellen und trägt Stomata, einzelne lange, dünne, einfache Haare und längs des Kieles kurzgestielte Oeldrüsen mit zweizelligem Köpfchen. Die Angabe mancher Pharmakopöen, dass die Droge kahl ist, ist also nicht korrekt. Im Mesophyll liegen Oxalatdrüsen. Beim Auseinanderzapfen findet



Fl. Cin.
Fig. 198.

man einzelne Krystalle, vielleicht Santonin, und Pollenkörner.

Geruch charakteristisch, Geschmack widerlich bitter, etwas kühlend, gewürzhaft.

Beschreibung. Der die wurmwidrigen Eigenschaften besitzende Stoff der Droge ist das Santonin, etwa zu 2½ Proc. darin enthalten (vergl. besonderen Artikel). Sie enthält ferner Artemisin ($\text{Oxysantonin } \text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_4$). Dasselbe ist krystallinisch, schmilzt bei 200°C., löst sich in gleichviel Wasser und Schwefelsäure farblos, mit Eisenchlorid wird die Lösung gelbbraun. Artemisin mit wässriger Lösung von Natriumkarbonat gekocht, wird karminroth (Unterschied von Santonin). Den Geruch verdankt die Droge einem ätherischen Oel, von dem sie 2 Proc. enthält. Dasselbe hat das spec. Gewicht 0,93–0,935; es enthält Cineol und Dipenten. Ferner sind aufgefunden 0,5 Proc. Betain, 0,1 Proc. Cholin und ein harzartiger Bitterstoff. Asche 6,5 Proc., davon 18 Proc. Kieselsäure. Wassergehalt 10,6 Proc.

Quantitative Bestimmung des Santonins. Grob gepulverte Cinablüthen werden im Soxhlet mit Aether 12–18 Stunden extrahirt. (Das Quantum des Pulvers ist

abhängig von der Grösse des Apparates) Der Aether wird verdunstet und der Rückstand mit frisch bereiteter Kalkmilch eine Stunde lang gekocht. Der Kalkbrei wird dann zweimal mit Wasser ausgekocht und heiss filtrirt. Das Filtrat wird mit Aluminiumacetat versetzt, einmal zum Aufkochen gebracht, auf dem Wasserbade stark concentrirt, Magnesiumoxyd im Ueberschuss zugesetzt und zu einem gleichmassigen Brei durchgearbeitet, dieser zum Trocknen eingedampft und bei 105° C 2—3 Stunden ausgetrocknet. Der gepulverte Rückstand wird dann im Soxhlet mit wasser- und saurefreiem Aether extrahirt (4—5 Stunden) und der Aether verdunstet. Das Santonin bleibt dann wenig gefärbt zurück — Es ist nothwendig, bei der Lichtempfindlichkeit des Santonins, den Kolben durch gelbes Papier vor dem Tageslicht zu schützen.

Handelssorten Die officinelle ist die turkestanische oder levantinische Cina, sie kommt gegenwärtig allein im Handel vor. Eine früher zuweilen vorkommende Cina indica sollte an der Wolga bei Sarepta und Saratow gesammelt sein. Nach direkt eingezogenen Erkundigungen ist dort niemals Cina gesammelt, und es handelt sich anscheinend um die gewöhnliche Sorte, die von einer in den genannten Orten domicilirten Handelsgesellschaft exportirt wurde.

Eine früher zuweilen vorkommende Cina barbarica aus dem nordwestlichen Afrika und vielleicht von *Artemisia ramosa* Smith. stammend, die kein Santonin enthielt, ist aus dem Handel verschwunden.

Einsammlung Aufbewahrung Officiell sind die im Juli und August gesammelten, noch geschlossenen Blütenköpfchen. Für den pharmaceutischen Gebrauch eignen sich nur die von Staub und fremden Pflanzentheilen befreiten Flores Cinae depurati, die man sorgfältig nachtrocknet und in Blechkasten aufbewahrt. Für das Pulver, welches man aus der über Aetzkalk oder bei höchstens 25° C (Gall.) getrockneten Droge bereitet, wählt man gelbe Stöpselgläser. Aus 100 Th. Blüten erhält man etwa 94 Th. Pulver.

Wirkung Anwendung Die Droge ist ein starkes Gift für Spulwürmer, bei Bandwürmern ist die Wirkung unsicher. Sie kommt in erster Linie dem Santonin, dann aber auch dem ätherischen Oel zu. In Pulverform zu 2,0—8,0 g mit Honig oder Sirupus communis nur noch selten angewendet, obschon die Wirkung sicherer sein soll, wie die des Santonins oder der mit Zucker überzogenen Blütenköpfchen, Confectio Cinae, Samen Cinae conditum, ein Handverkaufsartikel, zu 5—10 g. Einige Stunden nach dem Einnehmen verabreicht man Ricinusöl. Der Gebrauch erheischt Vorsicht. Man giebt

Kindern von 2—3 Jahren morgens	1,5 g
„ „ 4—5 „ „	3,0 g
„ „ 6—8 „ „	4,0 g
„ „ 9—11 „ „	5-6 g
„ „ 12—14 „ „	7-8 g

und wiederholt die Gabe nöthigenfalls am andern Tage.

Nach unvorsichtigem Gebrauch entstehen Erbrechen, Mydriasis, Kopfweh, Krämpfe, Bewusstlosigkeit. Schon bei gewöhnlichen Dosen kann Gelbsehen entstehen, der Urin ist gelb mit einem Stich ins Grünliche und wird auf Alkalizusatz purpurroth. — In Deutschland sind Flores Cinae dem freien Verkehr entzogen.

Extractum Cinae. Extractum Cinae aethereum Extractum Santonini Wurmsamenextrakt. Extrait (oléo-résineux) de Semen-contra.

Ergänzb. Wurmsamen, grob gepulvert, 2 Th. werden mit 6, dann nochmals mit 4 Th. einer Mischung aus Aether und Weingeist ää je 3 Tage ausgezogen, die Pressflüssigkeiten zu einem dünnen Extrakt emgedampft. Dunkelgrün, in Wasser nicht löslich. Aus beute 22—28 Proc. Nach Diersrich genügt die Hälfte des Lösungsmittels. — Gall. Wurmsamen, mittelfein gepulvert 1 Th. zieht man durch Verdrängung mit Aether (Spec. Gew. 0,724) 2 Th. aus, filtrirt in geschlossenem Gefäss, destillirt den Aether ab und verjagt den Rest desselben im Wasserbade. — In gelben, dichtschiessenden Gläsern im Kühlen aufzubewahren. Vor der Abgabe gut umzuschütteln (!) Gabe 0,3—0,5—1,0, am besten in Gelatinekapseln. Kindern die Hälfte mehrmals täglich.

Sirupus Cinae Wurmsaft. Cinablüthen 1 Th. werden mit heissem Wasser 10 Th. ausgezogen, das Filtrat 8 Th. giebt mit Zucker 12 Th. = Sirup 20 Th.

Electuarium anthelminticum HUFELAND

Rp	Radicia Valerianae	8,0
	Tuberum Jalapae	4,0
	Florum Cinae	16,0
	Kali tartarici	8,0
	Oxymellis Scillae	24,0
	Sirupi communis q s	(42,0)

Electuarium anthelminticum SELLE

Rp	Florum Cinae	7,5
	Ferri sulfurici	2,0
	Extracti Cinae	2,0
	Sirupi Cinnamomi q s	

Electuarium anthelminticum STORCK**Electuarium Cinae compositum**

Rp	Florum Cinae	16,0
	Radices Valerianae	8,0
	Tuberum Jalapae	2,0
	Kali sulfurici	10,0
	Oxymelhs Scillae	70,0

Pilulae Cinae

Rp	Extracti Cinae	2,0
	Florum Cinae q s	

1 pilul XX

Species anthelminticae

Ph. Franco Gallicae

Rp	Herbae Absinthii	
	Florum Chamomillae	
	" Cinae	
	" Tanacetii aa	

Vet Pilulae anthelminticae pro canibus

Wurmpillen für Hunde (Vom)

Rp	Florum Cinae	
	Tuberum Jalapae	aa 3,0
	Magnesi sulfurici	1,5
	Olei Valerianae	3,5
	Gelatinae glycerinatae q s	

M 1 pilul XII

Vet Pulvis anthelminticus pro equis

Wurmpulver für Pferde

Rp	Florum Cinae pulver	
	Fructum Boenicii pulv	aa 100,0
	Tuberum Jalapae	80,0
	Natrii sulfurici pulv	200,0

Stündlich 3 Löffel voll

Vermifuge, SWARM's Ein Aufguss aus Wurmsamen, Lärchenschwamm, Rhabarber, Baldrian, mit einigen Tropfen Rainfarn- und Nelkenöl in Weingeist gelöst

Wurmmittel, GARBILLON's Flores Cinae 100, Aloe 12, Farina Amygdalarum 10

Wurmpastillen, KLUG's, sind rothgefärbte Santoninpastillen

Wurmpatronen, Wurmkuchen, KLUG's, enthalten als wirksamen Bestandtheil Extract. Cinae aethereum

Oleum Cinae Wurmsamenöl. Das ätherische Oel des Wurmsamens (Ausbeute 2—3 Proc) ist eine gelbe Flüssigkeit von nicht sehr angenehmem, kampherähnlichem Geruch Spec Gew 0,915—0,940, optisch ist es schwach linksdrehend. Es besteht hauptsächlich aus Cineol (Eucalyptol) $C_{10}H_{18}O$. Früher wurde es als Nebenprodukt bei der Santoninfabrikation gewonnen, findet aber jetzt kaum irgend eine Verwendung

Cinchonidinum.

I Cinchonidinum Cinchonidin. Cinchonidine (franzos.) Cinchonidina (engl.). $C_{19}H_{21}N_2O$ Mol. Gew. = 294. Dieses mit dem Cinchonin isomere Alkaloid kommt in den zur Zeit verarbeiteten Kultur Rinden in erheblicherer Menge vor als in den früheren Rinden und ist namentlich auch deswegen bemerkenswerth, weil es sich nur schwierig vom Chinin trennen lässt (s. S. 757). In der Nomenklatur dieser Base herrschte früher eine ziemliche Verwirrung. Sie wurde zuerst von WINKLER 1847 abgeschieden und Chinidin genannt. Den Namen Cinchonidin gab ihr PASTEUR. Ausser diesem führt sie heute noch die Bezeichnungen Chinidinum II, α -Chinidin (vergl. S. 740) und Cinchovatin.

Darstellung. Das Cinchonidinsulfat bleibt beim Auskrystallisiren des Chinarsulfats in den Mutterlängen (s. S. 757). Durch Zusatz concentrirter Lösungen von Seignette-Salz fällt man es als rohes Cinchonidintartrat aus. Man löst das letztere in verdünnter Salzsäure, fällt die Lösung mit Ammoniak und zieht den erhaltenen Niederschlag so lange mit Aether aus, bis er (d. h. der Niederschlag) nach dem Auflösen in Chlorwasser durch Zusatz von Ammoniak nicht mehr grün gefärbt wird (Thalleiochin-Reaktion), also frei von Chinin oder Chinidin ist. Man löst den Niederschlag alsdann in Salzsäure, fällt die freie Base nochmals mit Ammoniak aus, wäscht sie mit Wasser und krystallisirt sie aus verdünntem Weingeist mehrmals um.

Eigenschaften. Je nach der Concentration der krystallisirenden Lösung kleine Blättchen oder grosse, glänzende Säulen, farblos, bei $202,5^\circ C$ schmelzend und bei $190^\circ C$ wieder erstarrend. Es blüht im feuchten Zustande rothes Lackmuspapier, schmeckt intensiv

bitter und lenkt in Lösung die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab (Chinidin dreht rechts, Chinin ist optisch inaktiv (s S 741))

Es löst sich in etwa 1800 Th kaltem Wasser, ferner in etwa 20 Th Alkohol oder in rund 200 Th Aether [Die Lösungsverhältnisse werden indessen auch anders angegeben.] In Chloroform ist es leicht löslich. Es giebt nicht die Thalleiochin-Reaktion, seine Lösungen in Oxyssäuren fluoresciren auch nicht. Vergl S 741

Es ist wie das Chinin eine zweisäurige Base und giebt mit Säuren neutrale, saure, auch übersaure Salze, bezüglich deren wissenschaftlicher und praktischer Nomenklatur die gleichen Abweichungen bestehen wie beim Chinidin und Chinin

$(C_{19}H_{23}N_2O)_2 \cdot H_2SO_4$	$C_{19}H_{23}N_2O \cdot H_2SO_4$
wissenschaftlich Basisches Cinchonidinsulfat	Neutrales Cinchonidinsulfat
praktisch Cinchonidinum sulfuricum	Cinchonidinum bisulfuricum.

Die Salze des Cinchonidins lenken in Lösung die Ebene des polarisirten Lichtstrahls nach links ab

II Cinchonidinum sulfuricum Dieses Salz krystallisirt aus verdünnter wässriger Lösung mit 6 Mol Wasser, aus konc wässriger Lösung mit 3 Mol Wasser, aus Alkohol mit 2 Mol Wasser

Cinchonidinum sulfuricum (Erganzb) Cinchonidinae Sulfas (U-St) Cinchonidinsulfat Basisches Cinchonidinsulfat Gewöhnliches (neutrales) Cinchonidinsulfat. $(C_{19}H_{23}N_2O)_2 \cdot H_2SO_4 + 3H_2O$ Mol Gew. = 740. Die U-St und das Ergänzb haben das mit 3 Mol. Wasser krystallisirende Sulfat aufgenommen

Darstellung Man übergießt 10 Th. Cinchonidin mit 150 Th Wasser neutralisirt unter Erwärmen genau mit verdünnter Schwefelsäure, wozu etwa 10,5 Th (vom spec. Gew 1,112) erforderlich sind, dunstet auf etwa 100 Th. ab und lässt krystallisiren.

Eigenschaften Weisse, glänzende Nadeln oder harte, glänzende Prismen, an der Luft beständig, in etwa 100 Th kaltem oder 5 Th siedendem Wasser zu einer nicht fluorescirenden, neutralen, bitter schmeckenden Flüssigkeit löslich. Löslich in 70 Th Alkohol oder in etwa 1800 Th. Chloroform. In einer zur Auflösung ungenügenden Menge Chloroform quillt es gallertartig auf. Das Salz wird bei 100° C wasserfrei und schmilzt alsdann bei 215° C. In Aether ist es fast unlöslich.

In der kalt gesättigten wässrigen Cinchonidinsulfatlösung erzeugt Kaliumnatriumtartrat einen weissen, krystallinischen Niederschlag, die wässrige, mit einigen Tropfen Salpetersäure angesäuerte Lösung des Salzes (1 : 50) wird durch Baryumnatriumlösung gefällt, durch Silbernitratlösung aber nicht verändert

Prüfung. 1) Die kalt gesättigte wässrige Lösung des Cinchonidinsulfats zeige auf Zusatz von verdünnter Schwefelsäure keine Fluorescenz (Chinin, Chinidin). Fügt man zu 5 Th derselben 1 Th Chlorwasser, sowie hierauf Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss, so trete keine Grünfärbung auf (Chinin, Chinidin). 2) Beim Durchfeuchten mit Schwefelsäure und Salpetersäure färbt sich Cinchonidinsulfat höchstens gelblich (fremde Alkaloide s S 758 und fremde organische Beimengungen wie Zucker). 3) Beim Trocknen bei 100° C hinterlasse 1 g Cinchonidinsulfat mindestens 0,925 g Trockenrückstand. Die obige Formel verlangt 0,927 g — Beim Verbrennen auf dem Platinbleche hinterlasse es keinen feuerbestandigen Rückstand (Mineralische Verunreinigungen). 4) 1 g Cinchonidinsulfat sei in 8 ccm eines Gemisches aus 2 Raumtheilen Chloroform und 1 Raumtheil absolutem Alkohol vollständig löslich. 5) 0,5 g Cinchonidinsulfat werden mit 20 ccm Wasser bei 60° C digerirt. Zu der Lösung werde 1,5 g Kaliumnatriumtartrat gegeben, die Mischung darauf unter häufigem Umschütteln erkalten gelassen und nach einstündigem Stehen bei 15° C von dem entstandenen Niederschlage abfiltrirt. Fügt man alsdann zu dem Filtrat einen Tropfen Ammoniakflüssigkeit, so trete keine oder doch nur eine sehr schwache Trübung ein. (Mehr als Spuren von Cinchoninsulfat oder Chinidinsulfat)

Aufbewahrung Vor Licht geschützt. **Anwendung** Das Salz wird in den nämlichen Gaben und unter den nämlichen Indikationen angewendet wie das gewöhnliche

Chininsulfat Es soll ebenso sicher wirken wie dieses, aber weniger unangenehme Nebenwirkungen zeigen

Sulfate de Cinchonidine basique (Gall) $(C_{19}H_{23}N_2O)_2 \cdot H_2SO_4 + 6 H_2O$ Mol Gew. 794. Dieses Salz krystallisiert aus der stark verdünnten wässrigen Lösung und stellt glänzende, weisse, an der Luft leicht verwitternde Krystallnadeln dar. Der Wassergehalt beträgt 13,60 Proc., der Gehalt an Cinchonidin = 74,06 Proc.

Im Nachfolgenden geben wir zunächst die Original-Vorschriften zu den drei Sorten HAGER's Katarrhpillen wieder und verweisen bezüglich der von Hamburg Vorschr. aufgenommenen auf S. 744

Pilulae antiphlogisticae HAGER I
HAGER's Katarrhpillen No I
Universal-Hustenpillen No I
Rp Cinchidini sulfuri 10,0
Tragacanthae 7,0
Radix Althaeae
Radix Gentianae 33 3,0
Ligni Santali rubri 1,0
Glycerini
Acidi hydrochlorici (25 Proc.) 33 7,5
Plant pilulae 200, conspergendae cortice Cinnamomi
Dentur ad vitrum

Pilulae antiphlogisticae HAGER. No II.
HAGER's Katarrhpillen No II
Universal Hustenpillen No II
Rp Cinchidini sulfuri
Cinchonidini sulfuri 33 5,0
Tragacanthae 7,0
Radix Althaeae
Radix Gentianae 33 3,0
Ligni Santali rubri 1,0
Glycerini
Acidi hydrochlorici (25 Proc.) 33 7,5
Plant pilulae 200, conspergendae cortice Cinnamomi

Pilulae Cinchonidini HAGER
HAGER's Katarrhpillen No III
Rp Cinchonidini sulfuri 10,0
Tragacanthae 5,0
Radix Althaeae 2,0

Radix Gentianae 5,0
Ligni Santali rubri 1,0
Glycerini 7,5
Aqua destillatae 2,0
Acidi hydrochlorici (25 Proc.) 5,0
Plant pilulae 200, conspergendae cortice Cinnamomi

Trochisci antichlorotici.
Bleichsuchtpastillen Rothebackenbröthen.
Rp Cinchonum tannici 20,0
Magnesi carbonici
Pulveris aromatici 33 2,0
Tragacanthae 8,0
Sacchari albi 50,0
Aqua Aurantii florum
Glycerini 33 6,0
Mixtis et in massam redactis immisce massam paratam e
Ferri oxydati fusci 40,0
Magnesi carbonici 1,0
Tragacanthae 5,0
Sacchari albi 100,0
Corticis Aurantii 5,0
Aqua Aurantii florum
Glycerini 33 10,0

Plant trochisci 200
Je nach dem Alter der Person 2—3—5 Stück den Tag über und 2—4 Wochen hindurch zu nehmen

Cinchonidinum bisulfuricum Saures Cinchonidinsulfat. Saures schwefel-saures Cinchonidin (Neutrales Cinchonidinsulfat.) $C_{19}H_{23}N_2O \cdot H_2SO_4 + 5 H_2O$ Mol Gew. = 482.

Zur Darstellung löst man 10 Th. gewöhnliches Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H_2O) in 40 Th. Wasser unter Zusatz von 8,1 Th. verdünnter Schwefelsäure (spec. Gew. 1,112) und überlässt diese Lösung in flachen, mit Papier überdeckten Gefässen an einem warmen Orte der freiwilligen Verdunstung.

Lange, farblose, leicht verwitternde Prismen, in Wasser und in Alkohol leicht löslich. Die wässrige Lösung reagiert sauer. Die Krystalle strahlen beim Zerreiben im Dunklen blauviolette Licht aus. Mit Jod giebt das Salz dem Herapathit ähnliche Verbindungen.

III Cinchonidinum hydrobromicum Bromhydrate de Cinchonidine basique (Gall.) Basisches oder gewöhnliches oder neutrales Cinchonidinbromhydrat $C_{19}H_{23}N_2O \cdot HBr + H_2O$. Mol Gew. = 393

Zur Darstellung trägt man in eine siedende Lösung von 10 Th. Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H_2O) in 60 Th. Wasser eine gleichfalls heisse Lösung von 4,5 Th. krystall. Baryumchlorid in 40 Th. Wasser ein. Wenn es nöthig sein sollte, stellt man die Flüssigkeit durch Zugabe kleiner Mengen einer verdünnten Cinchonidinsulfatlösung so ein, dass sie eher etwas Schwefelsäure, aber keinesfalls gelöstes Baryumsalz enthält (vgl. S. 751). Man filtrirt, engt durch Eindunsten ein, lässt krystallisiren und trocknet die Krystalle an der Luft.

Farblose, lange Nadeln, löslich in 40 Th kaltem Wasser, leicht löslich in siedendem Wasser. Die wässrige Lösung (1:50) darf durch verdünnte Schwefelsäure nicht getrübt werden (Baryumsalz). Das Salz enthält 74,81 Proc Cinchonidin und 4,58 Proc Wasser. Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Cinchonidinum hydrobromicum acidum Bromhydrate de Cinchonidine neutre (Gall). Saures, bromwasserstoffsaures Cinchonidin. Neutrales Cinchonidinbromhydrat $C_{19}H_{23}N_2O \cdot 2HBr + 2H_2O$. Mol. Gew. = 492.

Zur Darstellung lost man 10 Th Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H_2O) in 50 Th. Wasser unter Zufugung von 8,1 Th verdünnter Schwefelsäure (spec. Gew. 1,112), erhitzt die Lösung zum Sieden und bringt in dieselbe eine zweite heisse Lösung ein aus 9,0 Th. kryst. Baryumbromid in 25 Th. Wasser. Man verfährt wie bei dem vorigen Präparat, d. h. fällt etwa noch in Lösung befindliches Baryumsalz durch eine Lösung von Cinchonidinsulfat aus, filtrirt, wäscht aus, dunstet das Filtrat bis auf 40 Th. ein, lässt in der Kälte krystallisiren und trocknet die Krystalle an der Luft.

Lange, schwach gelbliche, prismatische Krystalle, löslich in 8 Th. kaltem Wasser. Die wässrige Lösung werde durch Schwefelsäure nicht getrübt (Baryumsalze). Das Salz enthält 59,75 Proc. Cinchonidin und 7,32 Proc. Wasser.

IV Cinchonidinum hydrochloricum Cinchonidinchlorhydrat $C_{19}H_{23}N_2O \cdot HCl + H_2O$. Mol. Gew. = 348,5. Dieses Salz wird in der nämlichen Weise wie das Cinchonidinum hydrobromicum dargestellt aus 10 Th. Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H_2O) und 3,3 Th. krystall. Baryumchlorid.

Krystallisirt in glasglänzenden, monoklinen Doppelpyramiden, welche wasserfrei in etwa 20 Th. kaltem Wasser, leicht löslich in siedendem Wasser, auch in Alkohol und Chloroform löslich sind.


Cinchonidinum hydrochloricum acidum Saures Cinchonidinchlorhydrat. $C_{19}H_{23}N_2O + 2HCl + H_2O$. Mol. Gew. = 385. Wird wie das Cinchonidinum hydrobromicum acidum aus 10 Th. Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H_2O), 8,1 Th. verdünnter Schwefelsäure (spec. Gew. 1,112) und 6,6 Th. krystall. Baryumchlorid dargestellt. Man überlässt die konc. wässrige Lösung in flachen Gefässen der freiwilligen Verdunstung. — Es kann auch erhalten werden durch Auflösen von 10 Th. des Cinchonidinum hydrochloricum in 4,2 Th. Salzsäure (von 25 Proc.) und freiwilliges Verdunsten der Lösung.

V Cinchonidinum salicylicum Cinchonidinsalicylat. Salicylsaures Cinchonidin. $C_{19}H_{23}N_2O \cdot C_7H_5O_2$. Mol. Gew. = 432. Das aus 100 Th. schwefelsaurem Cinchonidin mittelst Natronlauge abgeschiedene Cinchonidin wird ausgewaschen und in einem Glaskolben noch feucht mit 35 Th. Salicylsäure und 2000 Th. destill. Wasser gemischt, bis auf 100° C. erhitzt und unter bisweiligem Umrühren 12 Stunden hindurch bei dieser Temperatur erhalten. Dann wird die trübe Flüssigkeit in eine porcellanene Schale ausgegossen und an einen kalten Ort gestellt. Nach zwei Tagen sammelt man das inzwischen krystallisirte Salz in einem Colatorium, presst es aus und trocknet es. Durch Eindampfen der Mutterlauge und Beisetzen mit weiteren Portionen des Salzes gewonnen. Das Cinchonidinsalicylat ist ein in Wasser schwer lösliches Salz.

Ex tempore kann man 10,0 des Cinchonidinsalicylats darstellen aus 9,2 Cinchonidinsulfat und 3,9 salicylsaurem Natron, welche gemischt mit etwas Wasser übergossen im Wasserbade erwärmt werden. Soll es als Pulver in Anwendung kommen, so benetzt man das Gemisch mit verdünntem Weingeist und trocknet es im Wasserbade aus.

Cinchonidinum tannicum. Cinchonidintannat. Gerbsaures Cinchonidin wird in ähnlicher Weise wie das Chinidintannat dargestellt.

Cinchonidinum chlorocarbonicum, der Chlorkohlensäureäther des Cinchonidins, wird von Zimmer & Co (D. R.-P. 93698) durch Einwirkung von Phosgen auf Cinchonidin dargestellt.



Farblose, vollkommen geschmacklose Nadeln, welche bei 191°C schmelzen. Es reagirt neutral und löst sich in Säuren. Die schwefelsaure Lösung fluorescirt nicht und giebt nicht die Thalleiochin-Reaktion.

Quinin. Amerikanisches Arzneimittel, Chininersatz, enthält Nebenalkaloide der Chinarrinde und zwar besonders Cinchonidin neben wenig Chinin.

Cinchoninum.

I Cinchoninum Cinchonin. Cinchonine Cinchonina (U-St.) $\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}$
Mol. Gew. = 294

Diese mit dem Cinchonidin isomere Base kommt neben dem Chinin in den Chinarrinden vor und wird als Nebenprodukt bei der Chinin-Fabrikation gewonnen. — Nachdem das Chininsulfat auskrystallisirt ist und das Cinchonidin durch Natrium-Kaliumtartrat abgeschieden ist (s. S. 834) fällt man zunächst das Chinidin durch Zusatz von Kaliumjodid als Chinidinhydrojodid. Versetzt man alsdann das hierbei erhaltene Filtrat mit Natronlauge, so fällt ein das Cinchonin enthaltender harziger Niederschlag aus. Man führt die Base durch Neutralisation mit verdünnter Schwefelsäure in das Sulfat über, krystallisirt dieses nochmals um und scheidet aus diesem die freie Base nochmals durch Ammoniak ab. Durch mehrfache Krystallisation aus heissem Alkohol wird das Cinchonin völlig rein erhalten.

Eigenschaften. Luftbeständige, weisse, glänzende Prismen oder Nadeln ohne Geruch, welche anfänglich fast geschmacklos sind, alsbald aber stark bitter schmecken. Sie erweichen bei etwa 240°C und schmelzen unter theilweiser Zersetzung gegen 258°C zu einer braunen Flüssigkeit. Sie lösen sich in etwa 8800 Th. Wasser oder in 120 Th. kaltem oder 30 Th. siedendem Alkohol, in etwa 370 Th. Aether, auch in 230 Th. Chloroform. Bringt man Cinchonin auf feuchtes, rothes Lackmuspapier, so bläut es dieses. — Charakteristische Reactionen für das Cinchonin fehlen.

Cinchonin ist eine zweisäurige Base, welche mit Säuren basische und neutrale Salze eingeht, über deren Nomenklatur das schon S. 835 Gesagte zu wiederholen ist.

Prüfung. 1) Die Lösung von 0,1 g Cinchonin in 1 cem verdünnter Schwefelsäure und 100 cem Wasser soll höchstens ganz schwach bläulich fluoresciren (Chinin, Chinidin). 2) Löst man 0,1 g Cinchonin in 5 cem kalter, concentrirter Schwefelsäure, so soll höchstens eine schwache gelbliche Färbung zu beobachten sein (fremde Alkaloide, organische Verunreinigungen). 3) 0,5 g Cinchonin sollen auf dem Platinbleche verbrennen, ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

II. Cinchoninum sulfuricum Sulfate de Cinchonine basique (Gall.) Cinchoninae Sulfas (U-St.) Cinchoninsulfat $(\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O})_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 722

Dieses als das gewöhnliche oder officinelle Cinchoninsulfat zu bezeichnende Salz ist das neutral reagirende Sulfat, welches nach den modernen Anschauungen als das „basische Sulfat“ zu bezeichnen sein würde.

Darstellung. Man neutralisirt 10 Th. reines Cinchonin bei Gegenwart von etwa 200–300 Th. Wasser unter Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure, wozu etwa 10 Th. von einer Säure vom spec. Gew. 1,112 erforderlich sind, und lässt die filtrirte Lösung in der Kälte krystallisiren.

Eigenschaften. Harte, weisse, glänzende, prismatische Krystalle, ohne Geruch, von stark bitterem Geschmack, luftbeständig. Sie lösen sich bei 15°C in 66 Th. kaltem oder in 15 Th. siedendem Wasser, auch in 10 Th. kaltem oder 3,3 Th. siedendem Alkohol, dagegen sind sie fast unlöslich in Aether. — Bei 100°C wird das Salz wasserfrei, erlangt alsdann die Fähigkeit im Dunkeln zu leuchten und schmilzt gegen 120°C , auch löst sich das wasserfreie Salz in etwa 60 Th. Chloroform.

Die wässrige Lösung schmeckt stark bitter, ist neutral oder von sehr schwach alkalischer Reaktion, rechtsdrehend, nicht fluorescirend. Sie giebt die Thalleiochin-Reaktion nicht. Das Salz enthält 81,44 Proc Cinchonin und 4,99 Proc Wasser

Prüfung 1) Die mit etwas verdünnter Schwefelsäure angesäuerte wässrige Lösung (1 1000) soll nicht oder nur ausserst schwach fluoresciren (mehr als Spuren von Chinin oder Chinidin) 2) Wird 1 g des Salzes bei 100° C getrocknet, so muss der Trockenrückstand mindestens 0,95 g betragen 3) 0,5 g sollen, auf dem Platinbleche erhitzt, ohne Rückstand verbrennen 4) 1 Th des wasserfreien Salzes löse sich in 80 Th Chloroform ganzlich oder fast ganzlich auf (Chinin-, Chinidinsulfat) 5) 0,1 g sollen sich in 5 cem konc Schwefelsäure lösen, wobei nur schwach gelbliche Färbung eintreten darf (fremde Alkaloide, organische Verunreinigungen s S 758)

Cinchoninum bisulfuricum Cinchoninbisulfat. Saures schwefelsaures Cinchonin Sulfate neutre de Cinchonine $C_{19}H_{23}N_2O \cdot H_2SO_4 + 4H_2O$ Mol Gew = 464 Das sauer reagirende, aber nach der modernen Auffassung neutrale Cinchoninsulfat, in der Praxis als Cinchoninbisulfat bezeichnet

Zur Darstellung löst man 10 Th. kryst Cinchoninsulfat in 8,4 Th verdünnter Schwefelsäure (1,112 spec Gew) und überlässt die Flüssigkeit in flachen Gefässen, an einem warmen Orte der freiwilligen Verdunstung

Farblose, rhombische Oktaeder, löslich in 0,5 Th Wasser zu einer nicht fluorescirenden Lösung von saurer Reaktion

Anwendung Das Cinchonin und die Cinchoninsalze haben etwa die gleiche tonisirende und roborirende Wirkung wie das Chinin und seine Salze, nur pflegt man 1 Th Chinin als gleichwerthig mit 1,5 Th Cinchonin anzunehmen Dagegen soll die antifebrile (antipyretische) Wirkung ganz wesentlich geringer sein als diejenige des Chinins Bei den niedrigen Preisen des Chinins liegt zur Zeit ein Bedürfniss für den Ersatz des Chinins durch andere Alkaloide nicht vor

III † Antiseptolum Antiseptol. Cinchoninum jodosulfuricum Cinchonin-Herapathit Von Yvon 1891 als Ersatz des Jodoforms empfohlen. Man versetzt eine Lösung von 25,0 Cinchoninsulfat in 2000,0 Wasser langsam unter Umrühren mit einer zweiten Lösung aus 10,0 Jod und 10,0 Kaliumjodid in 1000,0 Wasser Man lässt absetzen, wäscht aus, bis das Ablaufende Jod nicht mehr enthält und trocknet bei mässiger Wärme

Hat je nach der Bereitungsweise verschiedene Zusammensetzung, entspricht aber der allgemeinen Formel $x C_{19}H_{23}N_2O \cdot y H_2SO_4 \cdot n JH + n J + aqua$ Das nach obiger Vorschrift dargestellte Präparat ist ein leichtes, zartes, rothbraunes Pulver, in Wasser unlöslich, dagegen löslich in Alkohol und in Chloroform Es enthält etwa 50 Proc Jod.

Von Yvon ausserlich als Ersatz des Jodoforms empfohlen

Cinchona-Tabletten von Apotheker PETZOLD I) Rp Sacchari albi 70,0, Coffeini 3,5, Cacao exoleati 16,0, Corticis Chinae 10,0, Cinchonum hydrochlorici 1,25 fiant tablettae 100 II) Nach DIETTERICH Coffeini 1,35, Cinchonum hydrochlorici 0,54, Sacchari vanillinati 2,7, Corticis Cinnamomi Ceylanici 0,4, Cacao exoleati 8,5, Sacchari 13,81, Tragacanthae 0,1, Aquae glycerinatae q s fiant pastilli 27

Pilulae catarrhales Voss	
Voss'sche Catarrhpillen	
Rp	Cinchonini sulfurici 7,5
	Rhizomatis Zingiberis
	Rhizomatis Calami
	Radix Gentianae
	Radix Althaeae
	Radix Liquiritiae
	Tragacanthae aa 0,5
	Acidi hydrochlorici (25 %) 0,5
	Glycerini 1,0
Fiant pilulae No. 40 D ad vitrum	

Pilulae Cinchonini acidae	
Pilulae antioctarrhales pauperum	
Rp	Cinchonini sulfurici 6,0
	Tragacanthae 3,5
	Radix Althaeae
	Radix Gentianae aa 2,0
	Ligni Santali rubri 1,0
	Glycerini 4,5
	Acidi hydrochlorici (25 %) 4,0
Fiant pilulae 120 D ad vitrum	
Zweistündlich 2—3 Pillen (wenn der Fieberzustand gehoben ist, 4—5 stündlich 2—3 Pillen)	

Cinnamomum.

Gattung der Lauraceae—Persoideae—Cinnamomeae. Heimisch im südöstlichen Asien, nördlich bis Japan, südlich bis Australien. Eine Anzahl Arten der Gattung liefern in ihrer Rinde den als Gewürz, seltener als Heilmittel benutzten Zimmt.

a) **Cinnamomum Cassia (Nees) Blume.** Heimisch im südöstlichen China und in Cochinchina, kultivirt in den chinesischen Provinzen Kwangsi und Kwangtung; ferner in geringem Umfange auf Java, Sumatra, Ceylon und Malabar. Die Rinde dickerer Aeste liefert den chinesischen Zimmt *Cortex Cinnamomi* (Germ. Austr.). *Cortex Cinnamomi chinensis* (Helv.). *Cortex Cinnamomi Cassiae*. *Cinnamomum Cassia* (U-St.). *Cassia Cinnamomea*. *Cinnamomum anglicum* seu *chinense* seu *indicum*. *Cortex Cassiae*.

Cassia lignea. Zimintrinde. Zimmt. Kaneel. Zimmtkassie. Cannelle de Chine. Cassia bark. Cassia Cinnamon. (U-St.).

Gewinnung. Man lässt in China die Bäume sechs Jahre alt werden und schält von März bis Mai die Rinde von etwa 2 cm dicken Zweigen. Man entfernt die Blätter und kleineren Zweige, macht 2 Längsschnitte, in 45–50 cm Entfernung Querschnitte und löst die Rinde mit einem Hornmesser ab. Dann legt man die frischen Streifen mit der Innenseite nach aussen, kratzt die äusseren Theile ziemlich nachlässig ab, lässt 24 Stunden trocknen und bindet in Bündel zusammen. Wird meist über Canton ausgeführt.

Beschreibung. Bildet einseitig gerollte Röhren oder Halbröhren von etwa 50 cm Länge und 0,5–3,0 cm Durchmesser. Die Stücke sind 1 bis 3 mm dick. Da das Schälen in China ziemlich nachlässig betrieben wird, sind noch leicht




Fig. 199. (Nach MOELLER.)

Querschnitt durch chinesischen Zimmt. 180 mal vergrössert.

K Kork. pr Parenchym der primären Rinde mit Steinzellen. pt gemischter sklerotischer Ring. b sekundäre Bastfasern. sch Schleimzellen. s Siebröhren. m Markstrahlen.

Reste des Korkes von grauer Farbe aufzufinden. Wo er fehlt, ist die Aussenseite rothbraun (zimmetbraun) und meist längsgestreift. Die Innenfläche ist dunkler gefärbt, matt und eben. Der Bruch ist korkartig glatt, selten innen etwas splitterig. Geruch und Geschmack charakteristisch gewürzhaft, zugleich etwas adstringirend und schleimig.

Auf dem Querschnitt ist die Rinde, besonders wenn die äusseren Theile reichlich erhalten sind, durch eine helle Zone in einen inneren, breiten und äusseren, schmalen Theil getrennt.

Der letztere lässt an Stellen, wo nichts abgeschält ist, zunächst Kork erkennen, der aus dünnwandigen und an der Innenseite verdickten Zellen geschichtet ist. Im Parenchym der Mittelrinde Steinzellen, häufig nach innen stärker verdickt. Die helle Zone

ist ein aus primären Bastfasern und Steinzellen gebildeter, sogen. gemischter sklerotischer Ring. Im Bast fallen auf die höchstens drei Reihen breiten Markstrahlen, ihre Zellen führen, wie zuweilen auch das Parenchym des Bastes, nadeiförmige Oxalatkristalle, ferner die Baststrahlen mit etwas zusammengefallenen Siebröhren und einzeln oder in kleine Gruppen gestellt, die spindelförmigen, sekundären Bastfasern, von gerundet rechteckigem Querschnitt, dicker Wandung und ohne Poren. Im Parenchym Stärke in meist zusammengesetzten Körnern, die Theilkörnchen mit deutlichem Kern und 8—20 μ gross. — Zahlreiche Zellen des Parenchyms sind zu Oel- oder Schleimzellen umgewandelt. Der Inhalt der letzteren bildet einen strukturlosen Klumpen, der bei vorsichtigem Aufquellen Schichtang erkennen lässt. (Fig. 199.)

Bestandtheile nach Kozm. Wasser 10,40 Proc., Stickstoffsubstanz 3,04 Proc., ätherisches Oel 2,21 Proc., Fett 2,27 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 60,70 Proc., Rohfaser 18,59 Proc., Asche 2,79 Proc. Die Asche enthält 5,11 Proc. Manganoxyduloxyd. (Ueber das ätherische Oel vergl. unten).

b) **Cinnamomum zeylanicum** Breyn. Heimisch auf Ceylon, in fast allen Tropen als Strauch kultivirt. Die Rinde dünner Aeste liefert den Ceylon-Zimmt: *Cortex Cinnamomi zeylanici* (Ergänz.). *Cortex Cinnamomi zeylanici* (Helv.). *Cinnamomi cortex* (Brit.). *Cinnamomum zeylanicum* (U-St.). *Cinnamomum acutum* seu *orientale*. Ceylonzimmt. Echter, feiner holländischer oder orientalischer Zimmt. Echter Kaneel. Ceylon Cinnamon (U-St.). Cinnamon bark. Cannelle de Ceylan (Gall.).

Gewinnung. Im Mai und Juni, sowie im November und December wird die Rinde von 1½—2 Jahre alten Wurzelschösslingen der strauchig gehaltenen Pflanze gesammelt, indem man sie abschält, sauber die äusseren Parthien (Kork und Mittelrinde) abschabt, 8—10 Röhren in einander steckt, diese zu Stücken von bestimmter Länge schneidet und im Schatten trocknet.

Beschreibung. Bildet zweiseitig gerollte Röhren, die zu 8—10 in einander gesteckt sind und bis 2 cm Durchmesser haben. Die Stücke sind bis 0,7 mm dick. Die Aussenfläche ist blass gelbbraun, eben, glanzlos, mit zarten, hellen Längsstreifen, die Innenfläche etwas dunkler. Bruch etwas faserig und splitterig. Geruch feuriger und gewürzhafter wie bei a, nicht adstringirend und nicht schleimig. Der Bau ist im wesentlichen derselbe wie bei a (vergl. aber unten), doch fehlt ausnahmslos der Kork und die Mittelrinde, so dass die Stücke nach aussen im wesentlichen durch den sklerotischen Ring begrenzt werden. Die oben erwähnten Längsstreifen sind die Bündel primärer Fasern.

Bestandtheile nach Kozm. Wasser 8,94 Proc., stickstoffhaltige Substanz 3,66 Proc., ätherisches Oel 1,85 Proc., Fett 2,00 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 48,62 Proc., Rohfaser 31,39 Proc., Asche 3,74 Proc. Auffallend ist der hohe Gehalt an Rohfaser.

c) **Cinnamomum Saigonicum.** Saigon Cinnamon (U-St.). Nach Angabe der U-St. von einer unbekannten Species abstammend, nach anderen Angaben von einer Varietät von *Cinnamomum Cassia*.




Fig. 200. (Nach MOELLER.)
Zimmpulver, 160 mal vergrößert. bf sekundäre Bastfasern.
pr Parenchym mit Stärke. st Steinzellen.

Beschreibung Bildet bis 15 cm lange, 10—15 mm dicke Röhren, die Stücke bis 2—3 mm dick. Die Stücke sind aussen grau oder graubraun mit weissen Flecken, auch mit Querrissen und Längsrünzeln. Innen sind sie zimmtbraun, körnig oder gestreift. Bruch kurz, körnig. — Geruch brennend, Geschmack süß aromatisch, etwas adstringierend.

Aufbewahrung Die Bundelwaare des Handels bewahrt man in Blechkästen, das Pulver in Stöpselgläsern auf. Die für Tinkturen nöthigen Zerkleinerungsformen werden je nach Bedarf frisch hergestellt. 100 Th Zimmt liefern ca. 95 Th feines Pulver.

Anwendung Zimmt gehört zu den die Esslust und Verdauung anregenden Mitteln. Häufig wird er als geschmackverbessernder Zusatz, besonders zu Eisenmitteln, benutzt, als Pulver zum Bestreuen von Pillen. Zu diesem Zwecke hält man ein sehr feines Pulver in einer kleinen Streubüchse zur Hand, sehr sauber und zweckmässig sind die HAMMER'schen Gläschen mit Metallverschraubung und Rührchen im Deckel.

Andere Sorten und Verfälschungen Ausser den oben genannten, officinellen Zimmtinden finden noch andere Verwendung als Gewürz. Unter dem Namen *China Cinnamon* gelangt (besonders nach England) ein vorzüglicher, ungeschalteter Zimmt in den Handel, aussen mit grauem Kork bedeckt. Er soll von dickeren Zweigen von *C. Cassia* gesammelt werden.

Die beim Abschaben, besonders des Ceylon-Zimmtes, gewonnenen Abfälle, ferner zerbrochene Stücke, bilden unter dem Namen *Cinnamon Chips* einen Handelsartikel. Sie dienen zur Destillation von Oel, werden aber auch gepulvert und dienen dann dazu, das aus minderwerthiger Waare hergestellte Pulver aufzubessern. Für die Beurtheilung des Pulvers ist daran zu erinnern, dass die Chips häufig Theile des Holzes enthalten.

Ferner kommen als chinesischer Zimmt oder unter solchem zuweilen die Rinden von *C. Burmanni* Bl. und *C. Tamala* Nees et Eberm. vor, seltener die von *C. obtusifolium* Nees, *C. iners* Reinw. und *C. pauciflorum* Nees. Grössere Bedeutung haben sie zur Herstellung von Pulver, welches man, wie gesagt, da diese Rinden meist von wenig angenehmem und schwächerem Geschmack sind, oft mit Chips aufbessert.

Sonst sind Verfälschungen des unzerkleinerten Zimmtes selten, kommen bei dem so sorgfältig bearbeiteten Ceylon-Zimmt wohl überhaupt nicht vor. Beim chinesischen Zimmt ist es gebräuchlich, dass die Bündel aussen aus schönen, gleichmassigen Röhren und innen aus minderwerthiger, zerbrochener Waare bestehen.

Zimmpulver. Für pharmaceutische Zwecke sollte der Apotheker die kleine Menge, die gebraucht wird, selbst herstellen. — Das im grossen hergestellte Pulver für Küchenzwecke etc. ist häufigen Verfälschungen ausgesetzt. Solche Verfälschungen können sehr leicht, unter Umständen auch sehr schwer oder gar nicht nachweisbar sein, besonders wenn es sich um eine Vermengung mit minderwerthigen Zimmtinden handelt.

Es können folgende Anhaltspunkte gegeben werden:

1) Für die Erkennung von Zimmpulver überhaupt kommen die kurzen Bastfasern oder ihre Bruchstücke, die häufig einseitig verdickten Steinzellen, die Stärkekörnchen und die feinen Oxalatkryställchen in Betracht, welche letzteren aber recht schwer im Pulver aufgefunden werden (Fig. 200).

2) Ist zur Herstellung des Pulvers Rinde verwendet, der das Oel durch Destillation entzogen worden, so sind die Stärkekörnchen mindestens theilweise verkleinert. Natürlich giebt in diesem Fall die Oel- resp. Extraktbestimmung weiteren Aufschluss.

3) Die Unterscheidung der beiden wichtigsten Arten im Pulver ist meist unmöglich. Zu bemerken ist, dass bei *C. Cassia* die Bastfasern relativ spärlich vorhanden sind, und dass die Oelzellen 60—100 μ erreichen, die von *C. zeylanicum* 50—60 μ , sie sind im Pulver aber sehr selten intakt.

4) Befinden sich Chips im Pulver, so wird man Holzbestandtheile auffinden, also besonders Gefässe, und zwar selten Spiralgefässe von 80 μ , häufiger grössere getüpfelte Gefässe mit meist grossen rundlichen oder ovalen Tüpfeln oder mit Hoftüpfeln. Häufig werden die Leiterperforationen der einzelnen Gefässglieder aufgefunden. Am reichlichsten

werden 13—17 μ breite Lubriformfasern gefunden, ferner achte man auf die getüpfelten Zellen der Markstrahlen und das Holzparenchym, dessen Zellen zuweilen sklerotisch sind. Es ist notwendig, die gefundenen Holzreste genau zu studiren, da auch andere Hölzer unter das Zimmpulver gemahlen werden. Als solches spielte wenigstens früher das von einer *Cedrela* stammende Holz der Cigarrenkisten eine Rolle. Seine Gefäße haben sechseckig behobte Tupfel, es enthält reichlich ausnehnlche Einzelkrystalle von Kalkoxalat.

5) Ebenfalls schwierig nachzuweisen sind die Rinden anderer *Cinnamomum*-Arten. Keine Nadeln, sondern tafelförmige Krystalle von Oxalat haben *C. Burmanni* Bl. und *C. Tamala* Nees et Eberm. und *C. pauciflorum* Nees.

Leichter sind die folgenden Verfälschungen beim Vergleich mit selbst hergestelltem Zimmpulver aufzufinden.

6) Als solche spielt eine Rolle die „Zimtmatta“ gemahlene Hirsekleie mit einem mineralischen Farbstoff braungefärbt.

7) Oelkuchen, z. B. vom Mohn. Sie sind leicht nachzuweisen, da die Samengewebselemente ganz andere sind, wie die der Rinden.

8) Starke und Getreidemehl vergl. S. 294.

9) Mineralische Stoffe Sand, Bolus, Ocker. Ausser dem mikroskopischen Nachweis ist hier die Aschenbestimmung von Wichtigkeit.

Im allgemeinen lässt sich sagen, dass Verfälschungen mit ferner liegenden Stoffen gegenwärtig relativ selten vorkommen, aber doch immer hier und da beobachtet werden, dass dagegen solche mit minderwerthigen Zimmrinden ganz an der Tagesordnung sind.

Aqua Cinnamomi (Brit.) Ceylonzimmt 500 g, Wasser 10 Liter. Man destillirt ab 5 Liter.

Aqua Cinnamomi (Germ. Helv.) **Aqua Cinnamomi spirituos** (Austr.) Zimmtwasser. Geistiges Zimmtwasser. Germ. Helv. Grob gepulverten ohne Zimmt 1 Th, Weingeist (Germ. 87, Helv. 94 proc.) 1 Th lässt man mit q. s. Wasser 12 Stunden stehen und destillirt ab 10 Th. Anfangs milchig trübe, später klar. Austr. Rinde 2 Th, Verdünnter Weingeist (61 proc.) 2,5 Th, Wasser 40 Th, Destillat 10 Th. Theelöffelweise bei Magenkrampf, Kolik u. dergl., als Zusatz zu bitteren oder eisenhaltigen Arzneimischungen.

Aqua Cinnamomi (U-St.) **Aqua Cinnamomi simplex** (Austr. Ergänzb.) — Einfaches Zimmtwasser — Eau de cannelle — Cinnamon Water. Austr. Ergänzb. Grob gepulverten chinesisches Zimmt 1 Th übergiesst man mit Wasser 20 Th und destillirt nach 12 Stunden ab 10 Th. Trübe, später klar. U-St. Zimmtöl 2 ccm verreibt man mit präcipitirtem Calciumphosphat 4 g, fügt allmählich destillirtes Wasser q. s. zu 1000 ccm hinzu und filtrirt.

Hydrolatum Cinnamomi. Eau distillée de cannelle (Gall.) Ceylonzimmt 1 Th, Wasser q. s. Nach 12 Stunden destillirt man ab 4 Th.

Sirupus Cinnamomi. Zimmtsirup. Sirop de cannelle. Austr. Grob zerstoßene Zimmrinde 25 Th, Weingeistiges Zimmtwasser 125 Th werden 24 Stunden digerirt, in der Siedflüssigkeit 100 Th, löst man unter Aufkochen Zucker 160 Th und filtrirt. Germ. Grob gepulverten chinesisches Zimmt 1 Th lässt man 2 Tage mit Zimmtwasser 5 Th stehen, löst im Filtrate 4 Th Zucker 6 Th und filtrirt. Helv. Zimmt (IV) 1 Th macerirt man 2 Tage mit Weisswein 5 Th, presst, filtrirt und löst im Filtrate 4 Th Zucker 6 Th.

Gall. Zucker 18 Th löst man ohne Wärmeanwendung in Zimmtwasser 10 Th und filtrirt.

Sirupus Cinnamomi decemplex: vergl. *Sirupi concentrati* S. 281.

Tinctura Cinnamomi Zimmttinktur (Anhaltstropfen Koliktropfen Herztinktur Muttertropfen). Austr. Aus grob zerstoßenem ohne Zimmt 2 Th und verdünntem Weingeist (60 proc.) 10 Th durch dreitägiges Digeriren. Germ. Durch acht tägige Maceration ebenso. Helv. Aus chinesischem Zimmt wie Tinct. Calami (Helv.) (S. 537).

Tinctura Cinnamomi (Brit. Gall. U-St.) **Tinctura Cinnamomi zeylanici** (Ergänzb.) Ceylonzimmttinktur — Alcoolé de cannelle Teinture de cannelle — Tincture of Cinnamon.

Ergänzb. Aus grob gepulvertem Ceylonzimmt, wie Tinct. Cinnamomi (Germ.) Brit. Aus Ceylonzimmpulver (No. 40) 200 g und q. s. Alkohol (70 proc.) durch Verdünnung 1000 ccm Tinctur.

Gall. Ceylonzimmt, grob gepulvert, 200 g zieht man mit Alkohol (80 proc.) 1000 g 10 Tage aus, presst und filtrirt. U-St. Ceylonzimmt (Pulver No. 40) 100 g zieht

man im Perkolator mit einem Gemisch aus Glycerin 50 ccm und q s einer Mischung aus Alkohol (91proc) 750 ccm und Wasser 200 ccm aus und sammelt Tinktur 1000 cm

Extractum aromaticum fluidum. Aromatic Fluid-Extract (U-St) Aus Pulvis aromaticus (U-St) 1000 g durch Perkolation mit Alkohol (91proc) Man befeuchtet mit 350 ccm, sammelt zuerst 850 ccm, erschöpft mit Alkohol und stellt 1 a 1000 ccm Extrakt her

Pulvis aromaticus (Ergänzb Helv U-St) **Pulvis Cinnamomi compositus** (Brit) — Aromatisches Pulver — Poudre aromatique — Aromatic Powder Compound Powder of Cinnamon Ergänzb Chinesischer Zimmt 5,0, Kardamomen 3,0, Ingwer 2,0 Brit Ceylonzimmt, Kardamomen¹⁾, Ingwer aa Helv Chinesischer Zimmt, Kardamomen, Ingwer aa U-St Ceylonzimmt, Ingwer je 35 g, Kardamomen¹⁾, Muskatnuss je 15 g

Spiritus Cinnamomi. Spirit of Cinnamon Brit Ceylonzimmtöl 100 ccm, Alkohol (90proc) 900 ccm U-St, Aus Cassiaöl ebenso

Tinctura aromatica (Germ Helv) **Tinctura Cinnamomi composita.** **Tinctura regia Essentia dulcis** — Aromatische Tinktur Gewürztinktur Edelherztropfen Rothe Muttertropfen Germ Chinesischer Zimmt 10,0, Ingwer 4,0, Galgant, Gewürznelken, Kardamomen je 2,0, Verdünnter Weingeist (60proc) 100,0 Helv Aus Ceylonzimmt und Weingeist von 62,5 Proc ebenso

Tinctura aromatica acida (Ergänzb) **Elixir Vitrioli Mysiense.** **Acidum sulfuricum aromaticum** **Elixir aromaticum acidum** **Elixir Vitrioli compositum** — Saure aromatische Tinktur **Mysiense's Elixir** Volksthümlich Rothe saure Tropfen, Saure Nerventropfen Wundertropfen Chines Zimmt 5,0, Ingwer 2,0, Galgantwurzel, Gewürznelken, Kardamomen je 1,0, Verdünnter Weingeist (60proc) 50,0, Reine Schwefelsäure 2,0 — Ex tempore durch Mischen von Aromatischer Tinktur 96 Th mit reiner Schwefelsäure 4 Th zu bereiten

Tinctura aromatico-amara (Ergänzb) Aromatisch-bittere Tinktur **Tinctura aromatica, Tinctura amara** aa

Oleum Cinnamomi (Germ Austr Helv U-St) Zimmtöl. **Cassiaöl.** **Chinesisches Zimmtöl** Zimmtblüthenöl. **Oleum Cassiae** **Essence de Cannelle de Chine** **Oil of Cinnamon** (U-St) **Oil of Cassia.**

Cassiaöl wird im südlichen China aus den Blättern des chinesischen Zimmtstranches *Cinnamomum Cassia* Bl, durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Es kommt in bleiernen, aussen mit Papier beklebten Kanstern von 7,5 kg Inhalt von Hongkong und Kanton aus in den Handel

Eigenschaften. Gelbe bis bräunliche Flüssigkeit von zimmtartigem, anfangs intensiv süßem, hintennach brennend scharfem Geschmack und wenig angenehmem Geruch. Spec Gewicht 1,055—1,065 (Germ U-St), 1,055 (Austr), 1,05—1,06 (Helv) Optisch inaktiv oder sehr schwach links- oder rechtsdrehend. Löslich in 1—2 Th 80 Vol —procent Spiritus Bei der Destillation im Fraktionskölbchen geht Cassiaöl grösstentheils von 240—260° C über, im Rückstande bleiben nicht mehr als 8 Proc (10 Proc > Helv) einer dicken, breiartigen, nicht spröden Masse Das Oel erstarrt beim Schütteln mit concentrirter Natriumbisulfatlösung 4 Tropfen Cassiaöl, auf 0° abgekühlt und dann mit 4 Tropfen rauchender Salpetersäure versetzt, geben ein krystallinisches, unbeständiges Additionsprodukt von Zimmtaldehyd und Salpetersäure $C_9H_8O \cdot NO_3H$ (Germ, Helv, U-St) Mit reinem Zimmtöl geschütteltes Wasser giebt mit Bleiessig eine Trübung, bei Gegenwart von Nelkenöl oder ceylonischem Zimmtblätteröl aber Gelbfärbung (Germ U-St) Verdünnt man 4 Tropfen Cassiaöl mit 10 ccm Weingeist, so darf durch 1 Tropfen Eisenchloridlösung nur eine braune, nicht aber eine grüne oder blaue Farbe hervorgerufen werden (Eugencihaltige Oele wie Nelkenöl etc) (Germ Austr Helv U-St)

Bestandtheile Gutes Cassiaöl enthält mindestens 75 Proc Zimmtaldehyd $C_9H_8O = CH = CHO$ Zimmtaldehyd ist eine gelbe, stark lichtbrechende, optisch inaktive Flüssigkeit, die bei 252° C nicht ohne theilweise Zersetzung siedet, ein spec Gewicht von 1,064 hat, und einen ganz intensiven rein süßen Zimmtgeschmack besitzt Wie alle Aldehyde, geht der Zimmtaldehyd mit sauren schwefligsauren Alkalien Verbindungen ein Beim Schütteln von Zimmtaldehyd mit concentrirter Natriumbisulfatlösung entsteht zunächst das

¹⁾ Die Samen ohne die Fruchtschale!

im Wasser nicht lösliche zimmtaldehydschweflige saure Natrium $C_6H_5 - CH = CH - COH - NaHSO_3$. Dieses geht durch Einwirkung von überschüssiger heisser Natriumbisulfatlösung in ein wasserlösliches Doppelsalz aus Natriumbisulfit mit hydrozimmtaldehydsulfosaurem Natrium $[C_6H_5 - CH_2 - CH(SO_3Na) - COH - NaHSO_3]$ über.

Dies Verhalten wird zur quantitativen Bestimmung des Zimmtaldehyds in ätherischen Oelen benutzt. Näheres siehe unter Prüfung.

Der zweite Hauptbestandtheil des chinesischen Zimmtöls ist Essigsäure Zimmtester $C_6H_5 - CH = CH - CH_2O - CH_3CO$, eine Flüssigkeit von äusserst unangenehmem, kratzendem Geschmack. Wahrscheinlich ist ferner die Anwesenheit von Essigsäure-Phenylpropylester. Endlich finden sich immer, und zwar nicht nur im alten Oele, geringe Mengen von Zimmtsäure. Bisweilen ist die Ausscheidung eines in grossen sechseckigen Platten krystallisirenden Körpers, des sogenannten Cassiastearoptens, beobachtet worden. Dasselbe besteht aus Orthocumaraldehydmethyläther.

Prüfung. Cedernöl und fette Oele, die manchmal dem Cassiaöl zugesetzt werden, erkennt man durch die Erniedrigung des spec. Gewichts und die Unlöslichkeit in 80 Proc. Alkohol. Vor mehreren Jahren war nur ein bis zu 40 Proc. mit Kolophonium und Petroleum verfälschtes Öl am Markte. Ausserlich ralt ein solches Öl durch seine dunkle Farbe und dickere Konsistenz auf. Das spec. Gewicht zeigt hingegen nichts Abweichendes. Destillirt man es mit Wasserdämpfen oder über freiem Feuer, so hinterbleibt ein hartes sprödes Harz. Reines Öl hinterlässt bei der Destillation zwar auch einen Rückstand, dieser ist jedoch dickflüssig, und seine Menge beträgt bis höchstens 10 Proc. Ein Öl, welches bei der Destillation mehr als 10 Proc. eines nach dem Erkalten hart und spröde werdenden Rückstandes hinterlässt, ist daher als verfälscht zu betrachten.

Die Destillation führt man mit einer Menge von 20—50 g in einem tarirten, mit Thermometer versehenen Fraktionskölbchen aus, und unterbricht sie, wenn der Inhalt des Kölbehens sich zu zersetzen beginnt, was am Auftreten weisser Dämpfe zu sehen ist, oder wenn das Thermometer auf etwa 235° C gestiegen ist.

Weniger Untersuchungsmaterial erfordert die von Hirschmann angegebene Probe zum Nachweis von Kolophonium. Eine Lösung von 1 Th. Zimmtöl in 3 Th. Spiritus dilutus wird tropfenweise bis zu einem halben Volumen mit einer bei Zimmertemperatur gesättigten und frisch bereiteten Lösung von Bleiacetat in Spiritus dilutus versetzt. Es darf kein Niederschlag entstehen, anderenfalls ist Kolophonium oder ein ähnliches Harz zugegen.

Den besten Anhalt über den Werth des Zimmtöles giebt die Bestimmung des Zimmtaldehydgehaltes (Bericht von Schramm & Co., Oktober 1890). Nothwendig hierzu ist ein besonderes Glaskölbchen von ungefähr 100 ccm Inhalt mit einem etwa 13 cm langen Halse von 8 mm innerer Weite, der in Zehntel-Kubikcentimeter eingetheilt ist. In dieses Kölbchen misst man mit einer Pipette 10 ccm des zu untersuchenden Oeles, setzt etwas von einer ungefähr 30 procentigen Lösung von saurem schweflige sauren Natron (wie sie im Handel zu haben ist) hinzu, schüttelt um und setzt es in ein siedendes Wasserbad. Nach Flüssigwerden des anfangs entstandenen Gerinnsels fügt man nach und nach so viel Natriumbisulfatlösung hinzu, dass das Kölbchen zu stark $\frac{3}{4}$ angefüllt ist. Nun erwärmt man unter häufigem Umschütteln noch einige Zeit im Wasserbade, bis das Gerinnsel völlig gelöst, der Geruch nach Zimmtaldehyd verschwunden ist, und auf der Salzlösung ein ganz klares Öl schwimmt. Nach dem Erkalten füllt man das Kölbchen mit Natriumbisulfatlösung, so dass das gesammte Öl in den Hals steigt, und die untere Grenze der Oelschicht mit der untersten Marke auf dem Flaschenhalse abschneidet. Die Menge des Oeles, also die nicht aldehydischen Bestandtheile, sind nun auf der Skala einfach abzulesen und von 10 ccm abzunehmen. Genau genommen erhält man auf diese Weise Volumen- und nicht Gewichtsprocente, da jedoch die specifischen Gewichte der aldehydischen und der nicht aldehydischen Bestandtheile fast ganz dieselben sind, so werden praktisch die gleichen Resultate erhalten.

Ein gutes Cassia-Zimmtöl soll mindestens 75 Proc. Zimmtaldehyd enthalten.

Anwendung. Cassiaöl dient meist als Geschmackskorrigens, wozu es jedoch wegen seines nicht sehr angenehmen Geschmackes viel weniger geeignet ist, als Ceylonzimmtöl. Die Dosis ist 2—10 Tropfen. Da das Cassiaöl meist bleihaltig ist (von dem Transport

in den Bleikanistern), so sollte zum innerlichen Gebrauch nur rektifiziertes Oel verwendet werden.

Ausser zu medicinischen Zwecken findet es zum Parfümiren ordinärer Seifen Verwendung. Für Liqueure wird Ceylonzimmtöl vorgezogen. Neuerdings wird Cassiaöl vielfach durch den in grosser Reinheit im Handel befindlichen synthetischen Zimmtaldehyd ersetzt.

Oleum Cinnamomi zeylanici (Brit. Gall. Ergänzb.) **Oleum Cinnamomi acenti** Ceylonzimmtöl **Oil of Cinnamon**. **Cinnamon Bark Oil** **Essence de cannelle de Ceylan**.

Gewinnung. Zur Destillation des Oeles werden die beim Schälen und Verpacken des Ceylonzimmts abfallenden Spahne, die als „Chips“ in den Handel kommen, verwendet. Die Oelausbeute beträgt 0,5—1 Proc.

Eigenschaften. Hellgelbe Flüssigkeit von angenehmem, aromatischem Geruch und gewürzhaftem, süßem, brennendem Geschmack, der viel feiner ist, als der des chinesischen Zimmtöles. Specifisches Gewicht 1,024—1,040 (1,025—1,035 Brit.) Optische Drehung schwach nach links, bis -1° im 100 mm-Rohre. Löslich in 3 Th. 70procent. Alkohols. 1 cem Oel in 5 cem Spiritus gelöst, soll mit Eisenchlorid eine blassgrüne, nicht aber eine blaue Färbung geben (Zimmtblätteröl) (Brit.)

Bestandtheile Ceylonzimmtöl enthält 65—75 Proc. Zimmtaldehyd C_9H_8O , (dessen Eigenschaften siehe bei Cassiaöl), 4—8 Proc. Eugenol, $C_{10}H_{12}O_2$, sowie geringe Mengen Phellandren, $C_{10}H_{16}$. Der den charakteristischen Geruch des Oeles bedingende Bestandtheil ist noch nicht isolirt.

Prüfung Das Hauptverfälschungsmittel des Oeles ist das Zimmtblätteröl, besonders das auf Ceylon dargestellte Oel scheint stets grössere oder kleinere Zusätze davon zu enthalten. Das Blätteröl erhöht das specifische Gewicht und ist durch die unter „Eigenschaften“ angegebene Reaction mit Eisenchlorid, die durch den höheren Eugenolgehalt dieses Oeles hervorgerufen wird, zu erkennen. Sicherer geschieht der Nachweis, indem man den Zimmtaldehyd (siehe unter „Cassiaöl“), und in dem vom Aldehyd befreiten Oele nach der bei Nelkenöl beschriebenen Methode von Thoms, das Eugenol quantitativ bestimmt. Enthält das Oel weniger als 60 Proc. Zimmtaldehyd und mehr als 10 Proc. Eugenol, so ist es als verfälscht anzusehen.

Anwendung Ceylonzimmtöl wird in allen den Fällen angewandt, wo ein feines Zimmtparfüm erwünscht ist, also in der Liqueurfabrikation und der Parfümerie. Auch in der Pharmacie sollte es dem ordinaren Cassiaöl vorgezogen werden.

Zimmtliqueur

Rp. Ol. Cinnamomi zeylan.	4,0 g
Spiritus	3,5 l
Sirup simpl.	2700 g
Aquae destill.	4600 g

Schwach mit Zuckercouleur zu färben.

Oleum foliorum Cinnamomi Zimmtblätteröl **Essence de feuilles de Cannelle de Chine**. **Cinnamon leaf Oil** Das aus den Blättern des Ceylonzimmtstrauches destillirte Oel riecht nach Nelken und Zimmt. Es hat das specifische Gewicht 1,044—1,065 und giebt in der Regel mit 3 Th. 70procent. Alkohols eine klare Lösung. Den Hauptbestandtheil (70—90 Proc.) bildet Eugenol, daneben sind geringe Mengen Zimmtaldehyd und Safrol nachgewiesen worden. Es findet in der Seifenindustrie Verwendung und wird vielfach zum Verfälschen des Ceylonzimmtöles benutzt.

Aqua Carmelitatum

Karmelitergeist Eau de Carmes.

Rp. Olei Cinnamomi Cassiae	
„ Caryophyllorum	
„ Citri	
„ Coriandri	
„ Macidis	
„ Melissae	aa gtt. v
Spiritus diluti	1000,0

Als Magenmittel theelöffelweise.

Aqua cephalica Caroli quinti

Kaiser Karls Haupt- und Schlagwasser
Schwindelwasser

Rp. Olei Cinnamomi	3,0
„ Macidis	1,5
„ Caryophyllorum	1,5
Spiritus (87 %)	300,0
Aquae aromaticae	694,0

Bei Kopfschmerz, Migräne, Ohnmacht theelöffelweise, auch äusserlich auf Stirn und Schläfe.

Aqua Vitae Gedanensis
Danziger Goldwasser
 Rp Olei Cinnamomi
 " Citri
 " Macidis ss gtt IV
 Tincturae Croci gtt V
 Spiritus (90 Vol Proc) 875,0
 Sirupi Aurantii florum 800,0
 Aqua Rosae 825,0
 Man fügt der Mischung einige Flitter reines Blattgold hinzu

Aqua Vitae mullerum BOKKLER
Frauenaquavit
 Rp Tincturae Cinnamomi 15,0
 " aromaticae 5,0
 Olei Anisi gtt VI
 Spiritus (90 Vol Proc) 800,0
 Aquae Rosae 180,0
 Sirupi simplicis 500,0

Balsamum Cinnamomi.
Zimmtbalsam
 Rp Olei Cinnamomi 25,0
 " Myristicae 75,0
 Zum Einreiben der Magengegend

Elaeosaccharum Cinnamomi
Zimmtöl Zucker
 I Austr Germ Heiv
 Rp Olei Cinnamomi 0,2 (=gtt V)
 Sacchari pulverati 10,0

II Oleosaccharum Cinnamomi.
Oleosaccharum de cannelle (Gall)
 Rp Olei Cinnamomi 0,5
 Sacchari albi 10,0

Electuarium aromaticum RALPHS.
 Rp Corticis Cinnamomi 2,0
 Seminis Myristicae 2,0
 Caryophyllorum 1,0
 Fructus Cardamomi 0,5
 Croci 2,0
 Calci carbonici 15,0
 Sacchari albi 25,0
 Aquae calidae q s
 f electuarium.

Elixir Jacobinorum
Elixir antiapoplectique des Jacobins de
Rouen.
 Rp Tincturae Cinnamomi 250,0
 " aromaticae 125,0
 Ligni Santali rubri 25,0
 Olei Juniperi fruct. gtt XXV
 " Anisi stellati 2,5
 Spiritus diluti 500,0
 Sirupi Liquiritiae 27,5

Elixir Vitae MATTHEIOLUS
 Rp Elaeosacchari Anisi stellati
 " Foeniculi
 " Macidis
 " Menthae pip ss 2,5
 Aquae aromaticae
 " Cinnamomi spirit. ss 40,0
 Tincturae aromaticae
 " Cinnamomi ss 5,0

Essentia cephalica BONFERME.
Essd'Armagnac. Migrännetropfen. Kopf-
und Herzensenz.
 Rp Tincturae Cinnamomi 50,0
 " aromaticae
 Sirupi Chamomillae ss 25,0

Mixtura Stockesii
 (Münch. Nosokom.-Vorschrift.)

I Aeltere Vorschrift.
 Rp Vitella ovorum duorum
 Aquae Cinnamomi 100,0
 Spiritus (90%) 50,0
 Sirupi simplicis 20,0

II Vorschrift von 1888
 Rp Vitellum ovi unius
 Sirupi simplicis 20,0
 Spiritus e Vino 50,0
 Aquae destillatae q s ad 150,0

Mundwasser VIAU'S
 Rp Acidi salicylici 0,5
 Chloroformii
 Tincturae Benzoes
 " Cinnamomi ss 5,0
 Spiritus aromaticus 80,0
 2 Kaffeelöffel auf 1 Glas Wasser

Potio cardiaca.
Potion cordiale (Gall)
 Rp Tincturae Cinnamomi 10,0
 Sirupi Aurantii corticis 40,0
 Vinum de Banyuls 110,0

Potion de Todd (Gall)
 Rp Tincturae Cinnamomi 5,0
 Sirupi simplicis 30,0
 Spiritus e Vino s Rhum 40,0
 Aquae destillatae 70,0

Pulvis ad Apes
Bienenpulver
 Rp Corticis Cinnamomi 20,0
 Caryophyllorum
 Fructuum Amomi
 Macidis
 Rhizomatis Galangae
 " Zedoariae
 " Zingiberis ss 5
 Fructuum Cardamomi min. 3,0
 Sacchari albi 47,0
 Soll mit spanischem Weine gemischt auf die Bienenanregend wirken.

Pulvis aromaticus ruber
Pulvis jovialis Trages aromatica
 Neuerlei Gewürz Pfeffernuss- und
 Kuchengewürz, Magenschrot Stollen-
 gewürz.

I
 Rp Corticis Cinnamomi 90,0
 Caryophyllorum
 Macidis
 Rhizomatis Zingiberis ss 15,0
 Ligni Santali rubri 45,0
 Sacchari albi 820,0
 f. pulvis subtilis

II
 Rp Fructus Anisi 60,0
 Corticis Cinnamomi 15,0
 Caryophyllorum 10,0
 Corticis Aurantii fruct. 10,0
 Fructus Cardamomi min. 5,0
 M. f. pulvis grossus

Pulvis Kurri
Ragoutpulver Curry-powder
 Rp Fructus Amomi
 " Capsici annui
 " Cardamomi min
 Rhizomatis Zingiberis ss 10,0
 Piperis nigri 15,0
 Corticis Cinnamomi 20,0
 Fructus Coriandri 25,0
 Mittelfein gepulvert zu mischen

Species stomachicae DIETL

DIETL's Magenthee

Rp	Corticis Cinnamomi Cass	30,0
	Fellorum Menthae piperit	30,0
	Herbae Centauri minor	40,0

Spiritus carminativus STYLVS.

Spiritus aromaticus

Rp	Olei Cinnamomi	
	" Caryophyllorum	
	" Coriandri	
	" Macidis	
	" Majoranae aa gtt. VI	
	Spiritus (87%)	100,0

Spiritus balsamicus (Helv.).

Balsamum Fioravanti

Spiritus polyaromaticus Fioravanti-

Balsam Alcoolat de Fioravanti (Gall)

Alcoolat de Térébenthine composé

Baume de Fioravanti:

	Helvet	Gall.
1 Aloës (III)	4,0	50,0
2 Elemi	4,0	100,0
3 Galbani (III)	4,0	100,0
4 Myrrhae (III)	4,0	100,0
5 Styracis	4,0	100,0
6 Radicis Angelicae	2,0	—
7 Cort. Cinnam chin.	2,0	zeyl 50,0
8 Rhizom Galangae	2,0	50,0
9 Caryophyllorum	2,0	50,0
10 Rhizom Zingiberis	2,0	50,0
11 " Calami	2,0	—
12 Semin. Myristicae	2,0	50,0
13 Rhizom Zedoariae	2,0	50,0
14 Terebinthinae venetae	80,0	500,0
15 Tacamahacae		100,0
16 Succum		100,0
17 Fructuum Lauri		100,0
18 Herbae Dictamnii cretici		50,0
19 Spiritus (84%)	95,0 (80*)	3000,0
20 Aquae	20,0	

Helv. 1—13 mit 19 vier Tage digeriren, 14 dann auflösen und nach Zusatz von 20 im Wasserbade abdestilliren 100 Th

Gall. 7—10, 12—13, 17—18 vier Tage mit 19 maceriren, 1—5, 14—16 auflösen, nach zwei Tagen im Wasserbade abdestilliren 25000

Spiritus MATTHIOLI.

Rp.	Aquae Cinnamomi spir
	" aromaticae
	" Coloniensis

Spiritus Rosmarini aa.

Tinctura anticholerica SCHAEFER.

SCHAEFER's Cholera-tropfen.

Rp	Tincturae aromaticae	75,0
	Mixtur oleos.-balsami C	15,0
	Aetheris scedici	10,0
	Olei Calami	gtt. X

Halbstündlich zwanzig Tropfen.

Tinctura apoplectica rubra

Rothe Krampftropfen Herzstärkungstropfen Belebungstropfen.

Rp	Tincturae Cinnamomi	10,0
	" aromaticae	5,0
	Catechu	4,0
	Chloroformal	1,0
	Spiritus diluti	40,0
	Spiritus aetherei	40,0

1—3 Theelöffel auf einmal

Tinctura dentifrida aromatica.

Aromatische Zahntinktur

Rp	Tincturae Cinnamomi	350,0
	Tincturae Catechu	100,0
	Spiritus diluti	540,0
	Tincturae Vanillae	10,0
	Olei Aurantii florum	
	Olei Rosae	aa gtt. X
	Olei Menthae piperitae	2,0

Tinctura prophylactica MARCHOWSKI

Rp	Tincturae aromaticae	50,0
----	----------------------	------

" Aurantii pomor

" Calami

" Cascarillae

" Absinthii aa 10,0

Olei Menthae piperitae gtt. XV

Bei herrschender Cholera mehrmals täglich 30—50

Tropfen in Rothwein

Unguentum pomadinum aromaticum UNNA.

Rp	Tincturae aromaticae	20,0
----	----------------------	------

Unguenti cerei 80,0

Im erwärmten Mörser zu bereiten

Unguentum pomadinum cum Gelantho UNNA.

Rp	Tincturae aromaticae	
----	----------------------	--

Gelanthi aa 20,0

Unguenti cerei 80,0

Bei gleichzeitigem Gebrauch von seifenhaltigen

Kopfwaschwässern sind die Haare nach jeder

Waschung mit verdünntem Citronensaft oder

Citronensaft-Brillantine zu behandeln.

Vinum Hippocraticum

Hippocras Vinum cordiale

Rp	Tincturae aromaticae	25,0
	Cinnamomi	25,0

Sirupi Sacchari 100,0

Vini rubri Gallici 850,0

Vinum prophylacticum

Cholera-Wein

Rp.	Tincturae amarae
-----	------------------

" aromaticae

" Aurantii pomor aa 10,0

" Cinnamomi 20,0

Vini Hispanici 800,0

Sirupi simplicis 150,0

Täglich mehrmals ein Weinglas voll.

Vet.

Pulvis cervinus

Brunstpulver

Rp	Pulveris aromatici
----	--------------------

Fungi cervini pulv aa 15,0

Mit Kleie und Wasser zur Latwerge gemacht auf einmal einzugeben Für Stuten und Kühe.

Aromatique von ALBIN MÜLLER ist ein Likör aus Zimmt, Nelken, Galgant, Zittwerwurzel, Angelika.

Christoffa Magenwein, aus Zimmt, Nelken, bittern Mandeln mit Weisswein, Zucker und Weingeist bereitet.

Fumigator, FERRIN's Besteht aus Sägemehl, Zimmt, Nelken, Piment und Salpeter

Hamburger Magenbitter. Hamburger Magen-Drops von WUNDERAM ist eine Mischung aus Tinctura aromatica, Tinctura amara, Spiritus aethereus und Oleum Menthae ppp

Herztinktur, Königseer, ist eine mit schwachem Weingeist bereitete, mit Sandelholz gefärbte Tinct. aromatica

Kräuter-Magen-Präservativ nach Dr. BORHAY ist eine Tinctura Aloës comp mit aromatischen Zusätzen

Lebensessenz von CONDOBY Ein mit Zimmpulver versetzter Süsswein

Likör von Mme AMPHOUX besteht aus Zimmtwasser, Weingeist und Zucker

Cortex Canellae albae Canella alba seu dulcis. Costus arabicus seu corti cosus **Cortex Winteranus spurius** Weisses Caneel. Weisses Zimmt. Süsser Costus. Cannelle blanche (Gall)

Die Rinde von **Winterana Canella L.** (Canella alba Murr), Familie der Winteranaceae Heimisch auf den Antillen und in Florida.

Bildet Röhren oder rinnenförmige Stücke, die bis 15 cm lang sind und bis 4 cm im Durchmesser haben. Dicke der Rinde 1—4 mm Blassroth bis gelbbraunlich mit weich schwammigem Kork Innen gelblich weiss, Querschnitt deutlich radial gestreift mit gelben Punkten

Im Phelloderm nach innen stark verdickte und getupfelte Zellen In den Markstrahlen Oxalatdrüsen Die Siebröhren des Bastes zu tangentialen Bändern zusammengefallen Im Parenchym reichlich grosse Oelzellen

Geruch nach Nelken und Zimmt Geschmack aromatisch-bitterlich, schleimig

Enthält 0,75—1,00 Proc ätherisches Oel vom spec Gewicht 0,920—0,935, welches schwach rechts dreht. Es enthält Pinen, Caryophyllen, Cineol, Eugenol. Die Rinde enthält ferner Mannit und einen Bitterstoff.

Citrus.

Gattung der Rutaceae—Aurantioidae—Aurantieae. Heimisch im indisch-malaysischen Gebiet, einige Arten seit langer Zeit in Kultur und dadurch sowie wahrscheinlich durch Bastardirung in zahlreiche Formen etc. gespalten.

Verwendung finden die folgenden 1) **Citrus Aurantium L.** (*C. vulgaris* Risso), mit hellgrünen Schösslingen, weissen Blüten und meist kugligen oder etwas niedergedrückten, meist orangefarbenen Früchten. Subspecies **amara L.** (*C. Bigaradia* DuRoi) Pomeranze, Orange, Bigaradier, the bitter Orange mit aromatisch riechenden Blättern mit geflügeltem Blattstiel, mit weissen Blüten, kugligen Früchten mit bitterer Fruchtschale und saurer Pulpa Wahrscheinlich im südöstlichen Asien (Cochinchina) heimisch Liefert die Fruchtschale **Cortex Aurantii fructus** (Germ) **Cortex fructus Aurantii** (Austr) **Cortex Aurantii** (Helv) **Cortex Aurantii recens et siccatus.** **Flavedo Aurantii.** Pomeranzenschale, Orangenschale **Fresh and dried Bitter-Orange peel** (Brit.) **Bitter-Orange peel** (U-St.) **Ecorce d'orange amère ou de Curaçao** (Gall)

Die ganze, reife Frucht **Orange amere ou Bigarade** (Gall.) Die unreife, getrocknete Frucht **Fructus Aurantii immaturus** (Germ) Die unreife, frische Frucht **Orangette ou petit grain** (Gall.) Die getrockneten Blätter **Folia Aurantii** (Austr Helv) **Feuille d'oranger** (Gall.) Die Blüten **Flores Aurantii** (Ergänz.) **Fleur d'oranger** (Gall.) Ätherisches Oel vergl. unten.

Subspecies **Bergamia** (Risso et Poiteau) **Wight et Arn.** (*C. Limetta* var *D C*) **Bergamotte** mit kugligen oder birnförmigen, glattschaligen, blassgelben Früchten mit säuerlicher Pulpe Liefert ätherisches Oel der Fruchtschalen vergl. unten, ferner die Fruchtschale **Epicarpe ou Zeste de la bergamote** (Gall)

Subspecies **sinensis** (*C. Aurantium* var *dulcis* L.) **Orange**, Apfelsine, **Oranger**, **Sweet orange**, **Arancio dolce**, **Portogallo** mit schwach aromatischen Blättern und geflügeltem Blattstiel, mit grossen weissen Blüten, mit meist kugligen orangefarbenen,

salten gelben Früchten mit süßser oder schwach säuerlicher Pulpa. Liefert die Fruchtschale *Cortex Aurantii dulcis*, Sweet-Orange peel (U-St), die frische Frucht *Fruit récent d'oranger vrai à fruit doux* (Gall.) Das ätherische Oel vergl. unten

2) *Citrus medica* L. mit rötlichen Sprossen, kahlen Blättern, meist rötlichen Blüten, mit kugligen, eiförmigen oder länglichen, in der Regel sitzenförmig endigenden Früchten. Subspecies *Bojoura Bonavia* Cédraier. Cedro liefert *Epicarpe ou Zeste du fruit de Cédraier* (Gall.) Subspecies *Limonum* (Risso) Hook r Citrone, Limonier, Citronnier mit schwach gefügeltem oder nur berandetem Blattstiel, mit gelben, dünnchaligen Früchten und saurer Pulpa. Liefert die getrocknete Fruchtschale *Cortex Citri fructus* (Germ.) *Cortex fructus Citri* (Austr.) *Cortex Citri* (Helv.) *Limonis cortex* (Brit. U-St.) *Écorce de citron ou limon* (Gall.) Die ganze frische Frucht *Fructus Citri* (Ergänzb.) *Pomum citreum*. Citrone. Limone Citron Limon (Gall.) Lemon Ätherisches Oel vergl. unten

1a) Die Blüten von *Citrus Aurantium* L. Subspecies *Bigaradia* Duhamel *Flores Aurantii* (Ergänzb.) *Flores Naphae* — Pomeranzenblüthen. Nerolibluthen Orangenblüthen. — *Fleur d'oranger* (Gall.) — Orange flowers.

Beschreibung Fast immer die nicht geöffneten Knospen mit kleinem, undeutlich fünfzähligen Kelch von 5–6 mm Durchmesser. Die aussen kahlen, fleischigen Blumenblätter sind in der Knospe zusammengeneigt, getrocknet gelbbraunlich. Sie umschließen 20–25 Staubblätter, die in Bündel vereinigt sind, und den dicken Griffel mit keulenförmiger Narbe, der dem meist 8theiligen Fruchtknoten und dieser einem Discus, aufsitzt. — Im Gewebe der Blumenblätter, der Fruchtknotenwand etc. schizolysogene Oelbehalter, die schon auf der Aussenseite der Blumenblätter mit bloßem Auge zu sehen sind. Geruch sehr angenehm, Geschmack bitterlich.

Bestandtheile 0,1 Proc. ätherisches Oel (vergl. unten)

Verwendung Meist nur noch in der Volksmedizin

Aqua Aurantii Florum (Austr. Brit. Ergänzb.) *Aqua Aurantii* (Ergänzb.) *Aqua Naphae* (U-St.) *Aqua Aurantii* (Helv.) *Aqua Naphae* (U-St.) *Aqua Neroli* *Aqua florum Naphae*. *Hydrolatum floris Citri Aurantii*. — Orangen- oder Pomeranzenblüthenwasser. Neroliwasser. — *Eau distillée de fleur d'oranger* (Gall.) — Orange flower Water.

Austr. Brit. Ergänzb. Helv. haben die Handelswaare aufgenommen, die in der Regel als triplex bezeichnet wird, nach Helv. ist dieselbe ohne Verdünnung, nach U-St. mit gleichen Raumth., nach Brit. mit 2 Raumth. Wasser gemischt, abzugeben. Klare, angenehm riechende Flüssigkeit, die durch H₂S und Schwefelammonium nicht verändert werden darf und vor Licht geschützt kühl aufbewahrt wird. Eine ex tempore durch Schütteln von 2 Tropfen bestem Neroliöl mit 1 l heissem, destillirtem Wasser bereitete Mischung kann das Destillat nur im äussersten Nothfalle ersetzen.

Aus 1000 g frischen Orangenblüthen erhält man (Gall.) 2000 g Neroliwasser.

Hinsichtlich der Einkaufszeit ist zu bemerken, dass die frischen Destillate gewöhnlich im Mai auf den Markt kommen.

Aufbewahrung. In möglichst kleinen, ganz gefüllten gelben Gläsern an einem kühlen Orte.

Sirupus Aurantii Florum (Ergänzb. Helv. Brit. U-St.) *Sirupus cum Aqua floris Aurantii*. — Pomeranzenblüthen-sirup — *Sirup de fleur d'oranger* (Gall.) — *Sirup of Orange Flowers*.

Ergänzb. Zucker 6 Th. kocht man mit Wasser 2 Th. zum Sirup und fügt nach dem Erkalten hinzu Pomeranzenblüthenwasser 2 Th. — Helv. Pomeranzenblüthenwasser 36 Th., Zucker 64 Th. werden kalt gelöst und filtrirt. — Brit. Zucker 600 g löst man in 200 ccm kochendem destillirtem Wasser, fügt Orangenblüthenwasser 100 ccm und kochendes Wasser q. s. zu 900 g hinzu. — Gall. Zucker 180 Th. löst man kalt in Orangenblüthenwasser 100 Th. — U-St. Zucker 850 g, Orangenblüthenwasser q. s. zu 1000 ccm. Hier ist auch das Verdrängungsverfahren anwendbar.

Maraschino

Bp	Aquae Aurantii florum	70,0
	Aquae Rosae	70,0
	Aquae Rubi Idaei concentr.	80,0
	Aquae Amygdalar amar. dilut.	180,0
	Spiritus	800,0
	Sirupus Sacchari	400,0

Petio simplex (Gall.)

Julap simple.

Bp	Aquae Aurantii flor.	30,0
	Sirupi simplici	80,0
	Aquae destillatae	100,0
	Extrait de Nérol.	
Bp	Olei Aurantii florum	1,0
	Spiritus diluti	99,0

Oleum Aurantii florum (Austr Gall Helv U-St Ergänzb) **Orangenblüthenöl**. **Neroliöl**. **Oleum florum Naphae** **Oleum Naphae** **Oleum Neroli**
Essence de Nérolí. **Essence de Nérolí Bigarade** **Essence de fleurs d'oranger amer**.
Oil of Neroli

Gewinnung. Orangenblüthenöl wird in Südfrankreich durch Destillation der Blüten der bitteren Orange, *Citrus Bigaradia* Risso, gewonnen. Die Ausbeute beträgt etwa 0,1 Proc. Meist wird das Öl als Nebenprodukt bei der Darstellung des Orangenblüthenwassers dargestellt.

Eigenschaften. Gelbliche, am Licht braunroth werdende, schwach fluorescirende Flüssigkeit von bitterlichem, aromatischem Geschmack und dem höchst angenehmen Geruch der frischen Blüten. Spec. Gewicht 0,870—0,880 (0,890 Austr, 0,870—0,890 U-St.) Klar mischbar mit 90proc. Alkohol (Helv). Löslich in gleichen Theilen 90proc. Alkohol (U-St). Von 80proc. Alkohol sind $1\frac{1}{4}$ —2 Vol. zur Lösung erforderlich, bei weiterem Alkoholzusatz trübt sich diese durch Anscheidung von Krystallfitterchen. Die alkoholische Lösung des Oeles zeigt eine prachtvolle violette Fluorescenz, die auch sehr schön hervortritt, wenn man etwas Alkohol auf das Öl schichtet. Verseifungszahl 20—52. Drehungswinkel im 100 mm-Rohr $+1^{\circ}30'$ bis $+5^{\circ}$. Beim Schütteln mit Natriumbisulfid entsteht eine schöne purpurrothe Färbung (U-St).

Bestandtheile. Neroliöl enthält Links-Linalool, $C_{10}H_{18}O$, Geraniol, $C_{10}H_{18}O$, und die Essigester dieser beiden Alkohole, ferner Anthranilsäuremethylester, $NH_2 \cdot C_6H_4 \cdot CO \cdot OCH_3$. Das in der Kälte auskrystallisirende Stearopten, früher Nerolikapther oder Aurade genannt, besteht aus einem Paraffin.

Prüfung. Die hauptsächlichsten Verfälschungsmittel, Bergamottöl und Petitgrainöl sind an der Erhöhung des specifischen Gewichts und des Estergehalts zu erkennen. Orangenblüthenöle mit einer höheren Verseifungszahl als 55 sind verdächtig.

Anwendung. Neroliöl wird in der feineren Parfümerie, besonders zur Fabrikation von Eau de Cologne gebraucht.

1b) Die unreifen Früchte von *Citrus Aurantium* L. Subspecies *Bigaradia* DuRoi. **Fructus Aurantii immaturi** (Germ.) **Aurantia immatura**. **Baccae a. Mala s. Poma Aurantii immatura** — Unreife Pomeranzen. Grüne Orangen. — **Orangette** **Petit grain** (Gall.) — **Orange pease**.

Beschreibung. Kuglig, 0,5—2,0 cm im Durchmesser, am Grunde mit der hellen Ansatzstelle des Stieles, an der Spitze mit der kleinen, hellgelblichen Stempelnahe. Aussen uneben, runzelig, mit zahlreichen vertieften Punkten, braun, innen heller. Der Querschnitt zeigt in der Mitte eine dicke, durch die dort zusammentreffenden 8—12 Carpell gebildete Mittelsäule, in jedem Carpell die Ovula in 2 Reihen, das Ganze umschlossen von dem dicken Pericarp, von dessen Wand Papillen in die Fächer hineinragen. In der äusseren Partie des Pericarps werden schizo-lyngene Sekretbehälter schon bei schwacher Vergrößerung sichtbar. Im Parenchym Hesperidin in unregelmässigen Klumpen. Geruch aromatisch. Geschmack bitterlich-aromatisch. Kommen meist aus Südfrankreich in den Handel.

Bestandtheile. Aetherisches Öl (vergl. unten), 10 Proc. Hesperidin, Citronensäure, Äpfelsäure, ein Bitterstoff Aurantidin (nicht identisch mit dem glykoidischen Aurantidin oder Naringin in den Blüten von *Citrus decumana*).

Verwechslungen. kommen vor mit jungen Citronen, die zugespitzt sind. Man findet sie nicht selten unter der Droge.

Anwendung. Als Amarum und Stomachicum. Kleine Stücke werden hier und da noch als Fontanellkugeln verwendet.

Tinctura Aurantii Fructus immaturi (Ergänzb.) **Pomeranzen-tinktur** aus unreifen Früchten. Grob gepulverte Pomeranzen 1 Th., verdünnter Weingeist (60 proc.) 5 Th.

Oleum Petitgrain **Petitgrainöl**, **Essence de Petit-grain** **Oil of Petitgrain** wird aus den Blättern, jungen Zweigen und unreifen Früchten des bitteren Orangenbaumes

destillirt Der Geruch ist dem des Nerohöles ähnlich, aber viel weniger angenehm Spec Gew 0,887—0,900 Optisch schwach links- oder rechtsdrehend Das Oel löst sich in 2 Theilen 80 procentigen Alkohols klar auf und hat eine Verseifungszahl von 110—245, entsprechend einem Gehalt von 38,5—85 Proc Linalylacetat Ausser diesem Ester enthält das Oel sehr wenig Limonen, ferner freies Linalool und Geraniol.

Aqua Vitae aromatica.			Species amarae ad Aquam Vitae		
Aromatique			Thee zum Magenbitter		
Rp	1	Corticis Citri fructuum recent No 4	Rp	Fruct Aurantii immat	50,0
	2	Corticis Cinnamomi zeyl		Radice Gentianae	25,0
	3	Fructuum Aurant. immat.		Radice Angelicae	5,0
	4	Caryophyllorum		Rhizom Galangae	5,0
	5	Spiritus		Rhizom Zedoariae	5,0
	6	Vini rubri		Corticis Cinnamomi	5,0
	7	Sacchari albi		Corticis Citri	4,0
	8	Aquae destillatae		Caryophyllorum	1,0
Man zucht 1—4 mit 5 acht Tage lang aus, setzt 6—8 zu und filtrirt, sobald 7 gelöst ist			Für 2 l Brantwein.		

1c) Die Fruchtschalen der reifen Früchte von **Citrus Aurantium L**
 Subspecies **Bigaradia Duhamel** **Cortex Aurantii** (Helv) **Cortex Aurantii Fructus** (Austr Germ) **Aurantii cortex siccatus** (Brit) **Aurantii amari cortex** (U-St.) **Cortex Aurantii expulpatas s mundatus Flavado Aurantii Cortex Pomorum Aurantii Pericarpium Aurantii.** — Pomeranzenschale Orangenschale. — Ecorce d'orange amère ou de Curaçao. Écorce de bigarade (Gall) Zeste d'orange. — Dried Bitter Orange peel.

Beschreibung Die Schale der reifen Beerenfrüchte wird entweder in Längs-
 quadranten oder in einer Spirale abgetrennt. Bildet im ersteren, häufigeren Fall spitz-
 elliptische, meist nach aussen gewölbte Stücke, die 4—5 mm dick, bis 9 cm lang, bis 5 cm
 breit sind. Aussen gelb- bis lebhaft rotbraun, grubig-höckerig oder runzelig, innen
 schmutzig-weiss und schwammig. In der äusseren dunkleren, festeren Schicht zahlreiche
 Oelräume, in der inneren, helleren, Hesperidin

Bestandtheile. 1—2 Proc ätherisches Oel, Hesperinsäure $C_{23}H_{35}O_7$,
 Aurantiamarinsäure $C_{30}H_{43}O_8$, Aurantiamarin, Hesperidin und Isohesperidin
 Asche 3,90 Proc

Handelssorten Die am meisten verwendete Sorte ist die Malagasorte, die
 der obigen Beschreibung entspricht. Eine zweite Sorte ist die Curaçaosorte, von einer
 in Westindien kultivirten Varietät, die verhältnissmässig dünn und von brauner oder grün-
 licher Farbe ist. Man substituirt ihr zuweilen die Schale unreifer Pomeranzen. Ita-
 lienische Schalen kommen in langen, bandförmigen Streifen in den Handel, die sehr
 aromatisch sind

Verarbeitung. Zum pharmaceutischen Gebrauch werden die Schalen 15 Minuten
 in kaltem Wasser eingeweicht, nach Abgessen desselben einen Tag an einem kühlen Orte
 bei Seite gestellt, hierauf von dem schwammigen Mark bis auf die durchschimmernden
 Oeldrüsen befreit, noch feucht in gleichmässige Täfelchen zerschnitten, durch ein Theesieb
 geschlagen und bei mässiger Wärme getrocknet. Ausbeute etwa 50 Proc. Ein feines
 Pulver für die Rezeptur bereitet man aus der über Aetzkalk getrockneten Schale. Die
 Ausbeute beträgt ungefähr 85 Proc.

Die **Cortex Aurantii Gallicus s sine parenchymate citrinus** des Handels,
 welche durch Abschälen der Früchte in der Form schmaler, dünner Bänder gewonnen
 wird, ist der expulpirten Waare nicht gleichwerthig, lässt sich aber für Handverkaufs-
 zwecke verwenden.

Das beim Expulpiren abfallende Mark, die **Albedo fructus Aurantii**, eignet
 sich in feiner Speciesform vortrefflich als Grundlage für Riechkissen, Räucherpulver u. dergl.

Aufbewahrung Die unzerkleinerte Droge in Blechkästen, die geschnittene und
 gepulverte in Stöpselflaschen aus gelbem Glase

Anwendung. Als Bittermittel bei Verdauungsschwäche, selten zu Theemischungen,
 häufig in den verschiedenen Zubereitungen.

Confectio s. Confectum Aurantii Conditum Aurantium Kandirte oder überzuckerte Pomeranzenschalen Curassaoschalen weicht man 2 Stunden in warmem Wasser ein, bringt sie nach Abgossen desselben für 2 Tage in concentrirten Zuckersirup, dann auf einen Durchschlag, lässt den Sirup 15 Minuten kochen, wiederholt das Verfahren noch einmal und trocknet die mit Zuckerpulver bestreuten Schalen in der Wärme

Wird wie Confectio Citri verwendet

Alcoolatura Aurantii (Gall.) **Alcoolature d'orange** **Essentia Aurantii corticis** **Tinctura Aurantii corticis recentis** wird wie **Alcoolatura Citri** Gall (S 861) bereitet

Extractum Aurantii Corticis (Ergänz.) **Pomeranzenschalenextrakt** **Pomeranzenschalen** (II) 2 Th zieht man 4 Tage mit einem Gemisch aus Weingeist 4 Th, Wasser 6 Th, dann 24 Stunden mit einem Gemische aus Weingeist 2 Th, Wasser 3 Th aus, presst aus, filtrirt und dampft zu einem dicken Extrakt ein Ausbeute etwa 80 Proc Aus dem Pressrückstand kann man mittels Dampfstrom noch atherisches Oel gewinnen

Extractum Aurantii amari fluidum (U St) **Fluid Extract of Bitter Orange peel** Aus 1000 g Orangenschale (No 40) und einer Mischung von Alkohol (91 proc) 600 ccm und Wasser 300 ccm im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 350 ccm, sammelt zuerst 800 ccm, alsdann 1 a soviel, dass man 1000 ccm Extrakt erhält Es sind etwa 4000 g des Lösungsmittels erforderlich

Oleosaccharum Aurantii (Gall.) **Oleosaccharure d'orange** bereitet man wie **Oleosacch. Citri** Gall. (S 861)

Spiritus Aurantii. **Spirit of Orange** (U St) Eine Mischung aus **Oleum Aurantii corticis** 50 ccm, Alkohol (92,5 proc) 950 ccm

Spiritus Aurantii compositus (U St) **Compound Spirit of Orange** **Pomeranzenschalenöl** 200 ccm, Citronenöl 50 ccm, Corianderöl 20 ccm, Anisöl 5 ccm, Alkohol (92,5 proc) q s zu 1000 ccm

Sirupus Aurantii (Brit) **Sirupus Aurantii Corticis** (Germ Austr Helv) **Sirupus Corticium** **Sirupus de cortice Citri vulgaris** — **Pomeranzenschalen-sirup** — **Sirup d'écorce d'orange amère** (Gall) — **Syrup of Orange** Austr Orangenschalen, verdünnter Weingeist je 45 Th, destillirtes Wasser 450 Th digerirt man über Nacht, presst aus und kocht die Kolatur von 375 Th mit Zucker 600 Th zum Sirup, dem nach dem Erkalten Orangenschalentinktur 45 Th zugesetzt werden — Germ **Pomeranzenschalen** 5 Th zieht man 2 Tage lang mit Weisswein 45 Th aus, 40 Th Filtrat bringt man mit 60 Th Zucker zum Sirup — Helv Ebenso, doch mit 50 Th Weisswein, statt 45 Th. — Brit. **Pomeranzentinktur** 80 ccm, **Zuckersirup** 210 ccm — Gall **Pomeranzenschalen** 100 g, macerirt man 12 Stunden mit 100 g Alkohol (60 proc), fügt 1000 g destillirtes Wasser von 80° hinzu, seht nach 6 Stunden durch und bringt 100 Th Flüssigkeit mit 180 Th Zucker im Wasserbade zum Sirup

Tinctura Aurantii (Brit Germ Helv) **Tinctura Aurantii corticis** (Austr) **Tinctura Aurantii amari** (U-St) **Pomeranzentinktur** **Orangenschalentinktur** **Bischoffessenz** **Milzessenz** — **Alcoolé d'orange amère (aeste)** (Gall) **Tincture d'orange** — **Tincture of Bitter Orange peel** — Austr **Orangenschalen** 20 Th, verdünnter Weingeist 100 Th Drei Tage lang digerren — Germ Helv Im gleichen Verhältnisse durch Maceration — Gall mit Alkohol von 80 Proc ebenso — Brit Aus frischen Orangenschalen 250 g und Alkohol (90 proc) 1000 ccm durch Maceration. — U-St Aus 200 g Orangenschalen (Pulver No 30) und q s einer Mischung aus Alkohol (91 proc) 600 ccm und Wasser 400 ccm bereitet man 1 a im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur

Vinum Aurantii (Brit) **Pomeranzwein** **Orange Wine** Ein aus Zuckerlösung durch Gährung mit frischen Orangenschalen gewonnener Wein

Aqua Aurantii Corticis
Rp Olei Aurantii Corticis gtt I
Aque destillatae fervidae 100,0.
Man mischt durch Schütteln.

Aqua Vitae aromatica.
1 Aromatique. Curaçao
Rp 1 Corticis Aurantii Curassao 250,0
2 Corticis Cascarillae 25,0
3 Corticis Cinnamomi 100,0
4 Fructus Cardamomi 25,0
5 Cubebae 10,0
6 Caryophyllorum 75,0
7 Radicis Gentianae 50,0
8 Spiritus (80%) 4 l
9 Sirupi simplicis 6 l

Man digerirt 1–8, filtrirt und vermischt mit 9

2 Curaçao Hollandica
Rp Tincturae Aurantii cort 80,0
Tincturae Aurantii pomor. 80,0
Olei Aurantii corticis 1,0
Spiritus 889,0
Aque destillatae 800,0
Sirupi simplicis 800,0

Citronensaft-Brillantine UNNA.

Rp Succ Citri
Glycerini 25 10,0
Spir. diluti vel.
Aq. Colonensis 80,0

Elixir amarum RAULIN
Rp Elixir ad longam Vitam
Elixir Aurantior comp
Tincturae Rhei aquosae 57

Elixir amarum venale

Pomeransenelixir Wiener Magenelixir

Rp	Tincturae Aurantii pomorum	50,0
	Tincturae Cinnamomi	50,0
	Olei Aurantii corticis	2,0
	Olei Citri	1,0
	Spiritus notheri	50,0
	Spiritus (90 Vol. Proc.)	400,0
	Aquae Cinnamomi spir	200,0
	Kalki carbonici	10,0
	Extracti Trifolii	40,0
	Extracti Gentianae	20,0
	Aquae destillatae	177,0

Elixir aromaticum (U-St.)

Aromatic Elixir

Rp	1 Spiritus Aurantii comp	12 cem
	2 Sirupi simplici	875 cem
	3 Calci phosphorici praecipit	15 g
	4 Alcohol deodorat	
	5 Aquae destillatae	aa q s

Man löst 1 in 338 cem von 4, fügt nach und nach unter Schütteln 2, dann 375 cem von 5 hinzu, mischt mit 3 und bringt aufs Filter. Man lässt das Filtrat solange zurück, bis es klar abfließt und wäscht das Filter mit q s einer Mischung von Alcohol deodor 1, Wasser 3 Raumth aus bis die Gesamtflüssigkeit 1000 cem beträgt

Elixir Aurantiorum compositum (Germ.)

Elixir viscerale Hoffmanni. Elixir balsamicum Vinum amarum. Vinum Aurantii compositum (Helv) Pomeransenelixir Wiener Magentropfen Teinture d'Orange composée

Germ

Rp.	1 Corticis Aurantii conc.	20,0
	2 Corticis Cinnamomi	4,0
	3 Kalki carbonici	1,0
	4 Vini Xerensis	100,0
	5 Extracti Gentianae	2,0
	6 Extracti Absinthii	2,0
	7 Extracti Trifolii	2,0
	8 Extracti Cascariillae	2,0

1—4 acht Tage stehen lassen, die Pressflüssigkeit mit 4 auf 92 Th bringen, 5—8 darin lösen nach dem Absetzen filtriren

Helv

Rp	1 Corticis Aurantii (II)	12,0
	2 Corticis Cinnamomi (IV)	4,0
	3 Natrii carbonici	2,0
	4 Spiritus (94 %)	8,0
	5 Vini Maluensis	100,0
	6 Extracti Cardui benedicti	2,0
	7 Extracti Cascariillae	2,0
	8 Extracti Gentianae	2,0
	9 Extracti Absinthii	2,0

Man macerirt 1—5 acht Tage lang, presst, löst 6—9 und filtrirt nach 8 Tagen. Klare, braune, aromatisch und bitter schmeckende Flüssigkeit.

Elixir carminativum Thullen

Rp	1 Tincturae Aurantii cort	50,0
	2 Tincturae aromaticae	20,0
	3 Aquae Menthae pip spir	20,0
	4 Elaeosacch. Foeniculi	5,0
	5 Elaeosacch. Carvi	5,0

Elixir viscerale Klum

Rp	Extracti Cardui benedict	25,0
	Extracti Cascariillae	10,0
	Extracti Centaurii min	10,0
	Extracti Myrrhae	5,0
	Aquae destillatae	275,0
	Vini Hispanici	275,0
	Tinctur Aurant cort.	100,0
	Liquoris Kali acetici	50,0
	Sirupi simplici	50,0

Essentia episcopalis

Bischof-Essenz

I nach DREIERICH

Rp	1 Corticis Aurant Curassao	100,0
	2 Fruct Aurant, immat	50,0
	3 Corticis Cinnamomi	5,0
	4 Caryophyllorum	5,0
	5 Spiritus (90 %)	500,0
	6 Aquae destillatae	500,0
	7 Olei Aurantii cort gtt	XXX
	8 Olei Citri gtt	X

Man macerirt 1—6 acht Tage, presst, löst 7—8 und filtrirt 1 Esslöffel nebst 70—80 g Zucker auf 1 Fl Rothwein zu „Bischof“ 20 Tropfen nebst 50 g Zucker auf 1 Fl Weisswein zu „Kardinal“

II

Rp	Cort. Aurantii recentis	100,0
	Cort Citri recentis	10,0
	Aquae Aurantii florum	50,0
	Vini Gallici albi	500,0
	Spiritus (90 Vol Proc.)	600,0

III.

Rp	Tinct. Aurantii cort	250,0
	Aquae Amygdalar amar	
	Tincturae Cinnamomi	5,0
	Aquae Aurantii flor	355,0
	Spiritus	375,0

Essentia episcopalis saccharata.

Bischof Extrakt (Diet.)

Rp	Essentiae episcopalis	100,0
	Sirupi simplici	200,0

150 cem auf 1 Fl Rothwein.

Infusum Aurantii (Brit.)

Infusion of Orange Peel.

Rp	Corticis Aurantii conc.	50,0
	Aquae destillatae ebull	1000,0

Nach $\frac{1}{4}$ Stunde wird abgepresst

Infusum Aurantii compositum (Brit.)

Compound Infusion of Orange Peel.

Rp	Corticis Aurantii concusi	25,0
	Corticis Citri recentis	12,5
	Caryophyllorum	5,20
	Aquae destillatae ebull	1000,0

Nach $\frac{1}{4}$ Stunde wird abgepresst

Potus a Succo Aurantii.

Orangeade

Rp	Succi Aurantii fructus	7,5
	Aquae destillatae	80,0
	Sirupi simplici	12,5

Pulvis stomachicus Voer

Corticis Aurantii

Rp	Calci carbonici praecip	
	Rhizom Rhei	aa 5,0
	Rhizomatis Calami	
	Elaeosacchari Carvi	aa 7,5.

Sirupus aromaticus (Brit.)

Aromatic Sirup

Rp	1 Tincturae Aurantii (Brit)	
	2 Aquae Cinnamomi	aa 250 cem
	3 Sirupi Sacchari	500 cem.

Man schüttelt 1 und 2 mit wenig Taik, filtrirt und fügt 3 hinzu.

Teinture d'Essence d'orange (Gall).		Vinum Aurantii corticis	
Alcoolé d'Essence d'orange Esprit		Pomeranzen-Wein	
d'orange		Rp Corticis Aurantii fruct. 50,0	
Rp Olei Aurantii cort. 2,0		Vini Hispanici 1000,0	
Alkohol (90%) 99,0			
Ebenso aus Oleum Neroli Esprit de Neroli		Nach stägigem Stehen presst man aus und filtrirt	
(Gall.)		Vinum Aurantii ferratum	
		Eisen-Pomeranzenwein	
		Rp Extracti Ferri pomad. 10,0	
		Vini Aurantii corticis 990,0	
		Man stellt einige Tage kühl und filtrirt.	

Oleum Aurantii corticis amari (Gall. U St¹) **Ergänzungsb.) Bitter Pomeranzen-schalenöl** Oil of Bitter Orange. Essence d'Orange Bigarade Das bittere Pomeranzen-schalenöl unterscheidet sich von dem süßsen nur durch seinen bitteren Geschmack Alle sonstigen Eigenschaften sind dieselben, doch ist das Drehungsvermögen manchmal etwas niedriger und schwankt (100 mm-Rohr) von 92 bis + 98° C

1d) Die Blätter von **Citrus Aurantium L. Subspecies Bigaradia DuRoi** **Folia Aurantii** (Austr. Helv.) **Orangen- oder Pomeranzenblätter.** Feuilles d'oranger (Gall.)

Beschreibung. Die Droge besteht aus dem aus einem gefiederten Blatt entstandenen, auf das Endblättchen reduzierten Blatt, das am geflügelten Blattstiel sich befindet Die Breite des Flügels am Blattstiel beträgt jederseits 5—8 mm Das Blatt selbst ist 8—10 cm lang und 4,5 cm breit, eiförmig länglich oder breit elliptisch, zugespitzt, am Rande mit entfernt stehenden Korbzähnen Kahl, drüsig punktiert.

Das Blatt hat nur auf der Unterseite Spaltöffnungen, die von 4—5 Nebenzellen umgeben sind An der Oberseite 2—3 Reihen kurzer Palissaden, zahlreiche Zellen derselben sind ausgeweitet und enthalten einen grossen Oxalathkrystall in einer an der Zellwand befestigten Tasche Ferner Sekrethälter mit ätherischem Öl.

Bestandtheile. $\frac{1}{2}$ Proc ätherisches Öl

Verwechslungen und Verfälschungen. Die Blätter von **C. Aurantium L. Subsp. Bergamia** haben einen weniger breit geflügelten Blattstiel, diejenigen von **C. medica L.** sind flügellos

Verwendung Als wenig benutztes aromatisches Mittel

Tisane d'oranger (Gall.) **Ptisana de foliis Citri aurantii.** Orangenblätter 5 g, siedendes destillirtes Wasser 1000 g Nach $\frac{1}{2}$ Stunde durchzusehen

1e) Die Frucht der Bergamotte **Citrus Aurantium L. Subspecies Bergamia** **Wight et Arn.**

Oleum Bergamottae **Bergamottöl** (Austr. Ergänzb. Helv. U-St.) **Essence de Bergamote.** Huile volatile de bergamote (Gall.) **Oil of Bergamot**

Gewinnung **Citrus Bergamia** **Risso**, der Bergamotbaum (Familie der Rutaceae) wird auf der Südspitze des italienischen Festlandes (auf Sicilien wachsen Citronen und Pomeranzen aber keine Bergamotten) kultivirt. Zur Gewinnung des Oeles werden die Fruchtschalen entweder mit der Hand (*Processo alla Spugna*) oder neuerdings mit Maschinen ausgepresst. In diese werden die in Rotation versetzten, mit Stacheln angerissenen Früchte gegen einen Schwamm, der das Öl aufnimmt, gedrückt Reggio di Cal und Messina sind die Hauptstapelplätze, von wo aus das Öl in kupfernen Bannieren von 50 kg Inhalt in den Welthandel kommt.

Eigenschaften. Gelb bis bräunlichgelb oder grünlich gefärbte Flüssigkeit von angenehmem, eigenthümlichem, starkem Geruch und bitterem, aromatischem Geschmack Beim längeren Stehen scheidet es einen gelben Bodensatz (Bergapten) ab Spec. Gew. 0,882—0,886 (0,880—0,885 U-St. 0,88—0,89 Helv.) Der Drehungswinkel, der wegen der dunklen Farbe des Oeles meist in einem 20 mm langen Rohre bestimmt werden muss,

¹) Das **Oleum Aurantii corticis** der U-St darf sowohl aus den Fruchtschalen der süßen wie der bitteren Orange gewonnen sein

schwankt von (100 mm Rohr) + 8 bis + 20° C Mit $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Vol Spiritus giebt das Oel eine klare Lösung

Rektificirtes Bergamottöl ist farblos oder hellgelb und hat das spec Gew 0,870—0,880 Da bei der Destillation stets eine grössere oder kleinere Menge des werthvollen Esters zerstört wird, so ist die Rektifikation als unrationell zu bezeichnen


Austr verlangt rektificirtes Oel und das spec Gew 0,860 Dieser Anforderung kann aber nur ein ausgebig mit Terpentinöl oder rektificirtem Citronenöl verfälschtes Oel entsprechen Auch riecht Bergamottöl durchaus nicht nach Citronen, wie Austr angiebt

Zusammensetzung Hauptträger des Geruchs und deshalb der charakteristischste Bestandtheil des Bergamottöls ist der Essigester des Linalools oder Linalylacetat $C_{10}H_{17}O$ CH_3CO Je mehr das Oel von diesem enthält, um so werthvoller ist es (näheres s unter Prüfung) Ausserdem kommt im Oele auch freies Links-Linalool $C_{10}H_{18}O$, sowie Rechts-Limonen $C_{15}H_{24}$, letzteres nur in kleinen Mengen, vor Das Linalylacetat des Bergamottöls ist linksdrehend, siedet im Vacuum ohne Zersetzung bei 18 mm Druck von 101—103° C Spec Gew 0,898 Linalool siedet bei gewöhnlichem Luftdruck von 197—199° C und hat das spec Gew 0,870—0,875

Prüfung Die Reinheit des Bergamottöls kann nicht durch die physikalischen Eigenschaften allein festgestellt werden Hierzu ist eine quantitative Bestimmung des Estergehalts durch Verseifen unerlässlich.

Die Verseifung, die zugleich Auskunft über die Qualität des Oeles giebt, führt man in einem 100 ccm haltenden, werthsaligen Kölbchen aus Kahlgas aus Ein etwa 1 m langes, durch einen durchbohrten Stopfen gestecktes Glasrohr, dient als Rückflusskühler In ein solches Kölbchen wägt man etwa 2 g Oel auf 1 cg genau ab und fügt 10 bis 20 ccm alkoholische Halbnormalkalilauge hinzu Man erhitzt das Kölbchen mit aufgesetztem Kühlrohr eine halbe bis eine Stunde auf dem Dampfbade, verdünnt nach dem Erkalten den Kolbenninhalt mit etwa 50 ccm Wasser, und titirt den Ueberschuss von Lauge mit Halbnormale Schwefelsäure zurück, wobei man Phenolphthalein als Indikator benutzt

Die Reaktion verläuft nach der Gleichung



Das Molekulargewicht des Linalylacetats ist 196 Der mit x bezeichnete Estergehalt

des Oeles in Procenten ausgedrückt, ergibt sich durch die Formel $x = \frac{19,6 \frac{y}{2}}{g}$, wobei y die verbrauchten ccm Halbnormalkalilauge und g das Gewicht des zur Verseifung verwandten Oeles bezeichnet. Gutes Bergamottöl enthält mindestens 36 Proc Ester

Da die Verseifungszahl durch fettes Oel bedeutend erhöht wird, so ist, um Tauschungen zu vermeiden, das Bergamottöl auf eine etwaige Verfälschung mit fettem Oel durch Bestimmen des Verdampfungsrückstandes zu untersuchen. Hierzu wiegt man 5 g Bergamottöl in ein tarirtes Glas- oder Porcellanschälchen und erwärmt dies so lange auf dem Wasserbade, bis der Inhalt geruchlos geworden ist Reines Bergamottöl hinterlässt einen Rückstand von 5—8 Proc, bleibt mehr zurück, so liegt Verfälschung mit fettem Oele vor Man mit 10 Procent Olivenöl verfälschtes Bergamottöl giebt einen Rückstand von 15 bis 16 Procent

Citronen Limonade-Sirup

4 g Citronenöl (oder besser 0,2 g Citronenöl „SCHIMMEL & Co“ extrastark, womit man einen klaren Sirup erzielt)
30 g Spiritus (90%)
500 g Citronensäurelösung 1:2
9½ l Zuckersirup hergestellt durch Kochen von 2 Theilen Zucker mit 1 Theil Wasser

Eau de Cologne

Rp	Olei Citri	10,0
	Olei Aurant. flor.	2,0
	Olei Bergamottae	2,0
	Olei Aurant. cortic.	1,0
	Olei Lavandulae	1,0
	Olei Petitgrain	1,0
	Olei Rosmarini gall.	0,2
	Spiritus (95%)	900,0
	Aqu. dest.	83,0

Eau de Cologne

Rp.	Eau de Cologne Oel-SCHIMMEL & Co	20,0
	Spiritus (95 %)	900 0
	Aqu. dest.	80,0

Eau de Millefleurs

Rp.	Olei Bergamottae	25,0
	Olei Citri	6,0
	Olei Lavandulae	3,0
	Olei Rosae German.	1,0
	Olei Caryophyllorum	1,0
	Olei Aurantii flor.	3,0
	Olei Cinnam. zeylan.	0,5
	Tinct. Moschi	1,0
	Balsam. Peruv.	0,5
	Aetheris acetic.	0,5
	Spiritus (95%)	960,0

Pau de Toilette de Lubin

Rp	Olei Iridis	0,5
	Olei Caryophyllor	0,2
	Olei Bergamottae	5,0
	Olei Lavandulae	3,0
	Tinct. Moschi	3,0
	Tinct. Balsami Tolutani	70,0
	Spiritus	500,0

Eau Bouquet.

Rp	Olei Mandarinae	6,0
	Olei Aurant cort	6,0
	Olei Bergamottae	15,0
	Olei Iridis	2,0
	Olei Jasmini „SCHIMMEL & Co“	3,0
	Olei Neroli „SCHIMMEL & Co“	3,0
	Olei Ylang-Ylang	1,0
	Olei Citri	6,0
	Olei Rosae	1,0
	Olei Patchouli	0,4
	Linalooli	1,0
	Vanillini	0,1
	Tinctura Ambræ	12,0
	Tinctura Moschi	24,0
	Tinctura Zibethi	24,0
	Extrait à la Cassie	60,0
	Spiritus (95%)	1888,0

Extrait Verbena.

Rp	Olei Lemongras	20,0
	Olei Citri	22,0
	Olei Aurant flor	2,0
	Spiritus (95%)	950,0

Extrait d'Héliotrope

Rp	Heliotropini	10,0
	Olei Aurant flor	0,3
	Tinct. Moschi	2,0
	Spiritus (90%)	1000,0

Floridawasser

Rp	Olei Bergamottae	2,0
	Olei Lavandul.	2,0
	Olei Citri	2,0
	Olei Aurant. flor	0,06
	Olei Rosae	0,01
	Spiritus (85%)	1000,0
	Aqua Rosae	
	Aqu. Aurant. flor	22 450,0

Rp	Florida Wasser Oel „SCHIMMEL & Co“	50,0
	Spiritus	900,0
	Aqu. dest.	50,0

Haaröl Parfüm

Rp.	Olei Bergamottae	30,0
	Olei Aurant cort.	20,0
	Olei Neroli „SCHIMMEL & Co.“	5,0
	Olei Caryophyllorum	2,0
	Olei Cassiae	1,0
	Olei Lavandulae	3,0

10–20 g auf 1 kg Olivenöl

Haaröl Parfüm

Rp	Olei Bergamottae	30,0
	Olei Lavandulae	5,4
	Olei Cassiae gtt.	15,0
	Olei Lemongras gtt.	10,0
	Olei Aurant. flor gtt.	5,0

Kaiserwasser

Rp	Spiritus aromatici	30,0
	Olei Bergamottae	12,5
	Olei Auranti flor	0,5
	Olei Citri	2,0
	Olei Rosmarini	15,0
	Spiritus (70%)	940,0

Makassar Pomade (DIETRICHL)

Rp	Olei Vasellini flavi	750,0
	Cerasini	250,0
	Alkanami	1,5
	Mixturae odoriferae	3,0

Mixtura odorifera

Oleum Milleflorum Wohlriechende Oele

Rp	Olei Bergamottae	60,0
	Olei Citri	30,0
	Olei Lavandulae	15,0
	Olei Cinnamomi	2,0
	Olei Caryophyllorum	2,0
	Olei Gaultheriae	1,0
	Cumarini	0,5

Mixtura odorifera optima (DIETRICHL)

Rp	Olei Bergamottae	40,0
	Olei Citri	30,0
	Olei Lavandulae	18,0
	Olei Neroli	5,0
	Olei Cinnamomi zeyl.	3,0
	Olei Caryophyllorum	2,0
	Olei Gaultheriae	1,0
	Olei Unonae odoratiss.	0,5
	Heliotropini	0,5
	Cumarini	0,1

Man lässt einige Tage absetzen und filtrirt

Orangenblüthenpomade

Rp	Olei Aurant. flor	3,0
	auf 1000 g Pomadenfett	

Pomade au Bouquet.

Rp	Olei Petigrain	2,5
	Olei Aurant. flor	0,5
	Olei Geranii	0,5
	Olei Rosae	0,5
	Olei Cinnam. zeylan.	0,25
	Balsam Peruvian.	0,25
	Tincturae Moschi	0,05

Auf 1000 g Pomadenfett.

Pomade au Portugal.

Rp	Olei Bergamottae	15,0
	Olei Aurant. cort	22,5
	Adipis	1000,0

Pomade phloccome

Rp	Cerae albae	10,0
	Olei Olivarum	89,0
	Olei Bergamottae	1,0

Pomaden-Parfüm

Rp	Olei Bergamottae	5,0
	Olei Cassiae	2,0
	Olei Citri	2,0
	Olei Lavandulae	2,0
	Olei Aurant cort	10,0
	Olei Caryophyllor	2,0

Tincture d'Essence de Bergamote (Gall.)

Wird wie Tinct. d'Essence de Citron bereitet

Unguentum pomadinum optimum.

Rp	Cetacei	75,0
	Adipis nullis	900,0
	Acidi benzoici	10,0
	Spiritus Violarum	10,0
	Olei Bergamottae	5,0
	Olei Geranii	1,0
	Cumarini	0,5
	Tincturae Moschi gtt.	Y

Unguentum pomadinum ordinariam

Familienpomade.

Rp	Olei Vasellini flavi	740,0
	Cerasini	250,0
	Mixturae odoriferae	10,0

1f) Die Frucht von *Citrus Aurantium* L. Subspecies *sinensis*

Oleum Aurantii corticis (Austr Gall U-St.¹⁾ **Oleum Aurantii dulcis** Apfel sinenschalenöl. Süß Pomeranzenschalenöl. Süß Orangenschalenöl. Portugalöl. Oil of Sweet Orange. Essence d'orange Portugal.

Gewinnung. Das süsse Pomeranzenschalenöl wird aus den Fruchtschalen der Apfelsine, *Citrus Aurantium* Bisso, durch Pressung auf dieselbe Weise gewonnen wie Citronen- und Bergamottöl.

Eigenschaften Gelbe bis gelbbraune Flüssigkeit von angenehmem Apfelsinengeruch und mildem, aromatischem, nicht bitterem Geschmack. Spec Gew 0,848—0,852 (0,860¹ Austr.) Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 96 bis + 98° bei 20° C (Nicht unter + 95° U-St.) Es ist häufig, aber nicht immer in 5 Th. 90 procent. Alkohols klar löslich. Beim Aufbewahren setzt es wie alle durch Pressung gewonnenen Öle einen gelblich-weißen Bodensatz ab.

Rektificirtes Pomeranzöl ist farblos, jedoch sehr wenig haltbar, da es schon nach kurzer Zeit verdorbt und einen faden, unangenehmen Geruch annimmt. In 5 Th. 90 procent. Alkohols ist es klar löslich.

Bestandtheile Mindestens 90 Proc des Oeles bestehen aus Rechts-Limonen, $C_{10}H_{16}$. Von sauerstoffhaltigen Körpern sind Citral, $C_{15}H_{14}O$, Citronellal, $C_{10}H_{18}O$, sowie andere, noch unbekannte Aldehyde zugegen.

Prüfung. Die Reinheit des Pomeranzöls wird durch das hohe Drehungsvermögen und das niedrige specifische Gewicht erkannt. Alle in Betracht kommenden Verfälschungsmittel würden die Dichte erhöhen und den Drehungswinkel verkleinern. In Ermangelung eines Polarisationsapparates kann Terpentinöl durch seinen niedrigeren Siedepunkt — 160° C nachgewiesen werden. Pomeranzöl enthält keine unter 175° C siedenden Bestandtheile.

Anwendung. In der Parfümerie- und Lökfabrikation.

Essentia ad Limonadum Aurantii Apfelsinen-Limonadenessenz. Citronensäure 10,0, verdünnter Weingeist 90,0, Apfelsinenöl 5 Tropfen.

Essentia ad Limonadum Aurantii saccharata Apfelsinen-Limonaden-Extrakt. Apfelsinen-Limonaden-Essenz 20,0, weisser Sirup 100,0.

Zur Bereitung von 1 Liter Limonade.

Sirupus Aurantii Sirup of Orange (U-St.) Frische, vom weissen Mark möglichst befreite, fein zerschnittene Apfelsinenschale 50 g stellt man in einem lose verschlossenen Kolben mit 80 ccm Alkohol (91 proc) ins Wasserbad, lässt 5 Minuten sieden, bringt nach dem Erkalten auf ein Filter und sammelt unter Auswaschen mit Alkohol 100 ccm Filtrat. Man verreibt dasselbe mit einer Mischung von 50 g präcipitirtem Calciumphosphat und 150 g Zucker, fügt nach und nach 300 ccm Wasser hinzu, klärt durch Filtriren, löst 550 g Zucker und wäscht mit soviel Wasser nach, dass man 1000 ccm Sirup erhält.

Succus e fructu Aurantii dulcis, Suc d'orange douce (Gall.) bereitet man wie den Suc de citron (Gall.) S. 860.

Tinctura Aurantii dulcis (U-St.) Tincture of Sweet Orange Peel. Frische, vom Mark möglichst befreite, fein geschnittene Apfelsinenschale 200 g zieht man 24 Stunden mit 800 ccm Alkohol (91 proc) aus, bringt in den Perkolator und sammelt mittelst q s Alkohol 1000 ccm Tinktur.

2) Die Frucht von *Citrus medica* L. Subspecies *Limonum* (Risso) Hook. f., die Citrone, von bekanntem Aussehen.

Bestandtheile. 1,06 Proc Invertzucker, 0,41 Proc Rohrzucker, 4,706 Proc Asche. Der Saft enthält 7,201 Proc Citronensäure, 0,002 Proc Schwefelsäure, 9,222 Proc Trockensubstanz, 0,419 Proc Asche, diejenige der Limette enthält 6,822 Proc Citronensäure, 0,002 Proc Schwefelsäure, 8,597 Proc Trockensubstanz, 0,259 Proc Asche.

Aufbewahrung An Orten, in denen frische Citronen nicht jederzeit zu haben sind, bewahrt man einen kleinen Vorrath in einem kühlen Raume in Kochsalz eingebettet.

¹⁾ Das *Oleum Aurantii corticis* der U-St. darf sowohl aus den Fruchtschalen der süssen wie der bitteren Orange gewonnen sein.

auf, so dass die einzelnen Früchte sich nicht berühren, vorher wird die Anheftungsstelle des Stieles mit geschmolzenem Paraffin überzogen. Man bestreicht wohl auch die ganzen Citronen mit wenigstiger Schellacklösung, oder taucht sie in geschmolzenes und halberkaltetes Paraffin. Man bevorzugt die grosseren Früchte von 100 g Gewicht und darüber.

Oleum Citri (Germ. Austr. Helv.) **Oleum Limonis** (Brit. U-St.) **Oleum de Cedro** **Essence de citron** (Gall.) **Oil of Lemon**. Citronenöl.

Gewinnung. Das Citronen- oder Limonenöl wird auf Sicilien, in der Umgebung von Messina, Catania und Palermo, sowie im südlichen Theile Calabriens, ausschliesslich aus den Fruchtschalen der Limone, *Citrus Limonum* Risso, gewonnen.

Die Gewinnung geschieht folgendermassen:

Die vom Fruchtfleisch befreite Schale der in vier Theile geschnittenen Limone wird zusammengefaltet und mit der linken Hand fest gegen einen Schwamm gedrückt, den der Arbeiter in der rechten Hand hält. Die auf der Oberfläche der Schale befindlichen ölführenden Zellen platzen und gehen ihr Öl an den Schwamm ab, der von Zeit zu Zeit in einen irdenen Topf ausgepresst wird. Nach dem Absetzen des Wassers trennt man das obenschwimmende Öl und klart es durch Filtriren.

Die ausgepressten Schalen, die noch immer bedeutende Mengen Öl enthalten, werden mit Wasserdampf destillirt. Das so gewonnene Öl wird, mit gepresstem vermischt, als geringere Sorte in den Handel gebracht.

Die Citronen sind im halbreifen Zustande am ölreichsten. Mit zunehmender Reife nimmt der Ölgehalt ab, denn während man Anfangs December zu 1 kg Öl 1200 bis 1800 Früchte braucht, sind hierzu im März und April etwa 3000 Stück notwendig.

Eigenschaften. Das durch Pressung gewonnene Citronenöl ist eine gelbe Flüssigkeit von dem angenehmen Geruche der frischen Citronen und von mildem, hintennach nur wenig bitterem Geschmacke, die beim Stehen häufig einen gelblich weissen Bodensatz abscheidet. Citronenöl hat eine begrenzte Haltbarkeit, verändert die eben angeführten Eigenschaften mit der Zeit und sollte deshalb nicht länger als höchstens zwei Jahre aufbewahrt werden, altes Öl nimmt einen unangenehmen, terpeninartigen Geruch, sowie einen kratzenden Geschmack an und reagirt stark sauer. Das spec. Gewicht des Citronenöles liegt zwischen 0,858—0,861.

(Brit. 0,857—0,860, Austr. 0,850 (l), U-St. 0,858—0,859, Helv. 0,85—0,86.) Drehungswinkel (100 mm-Rohr + 58 bis + 64° C (Brit. nicht unter + 59° C, U-St. nicht unter + 60° C). Wegen der wachsartigen und schleimigen Bestandtheile ist Citronenöl meist in Spiritus nicht klar löslich. Rectificirtes Öl lost sich jedoch klar in 5 Th. Spiritus.

Absoluter Alkohol, ebenso wie Aether, Chloroform, Benzol und Amylalkohol lösen Citronenöl in jedem Verhältniss. Schwefelkohlenstoff und Benzin geben mehr oder weniger trübe Mischungen.

Bestandtheile. Die Hauptmenge besteht aus Rechts-Limonen, $C_{10}H_{16}$ (Sdp 175—176°), dem kleine Mengen von Phellandren, $C_{10}H_{14}$, beigemischt sind. Finen ist (was für den Nachweis von Terpentinöl wichtig ist) kein Bestandtheil des Citronenöles. Hauptträger des Geruchs sind die Aldehyde Citral, $C_{10}H_{16}O$ (Sdp 228—229), Citronellal, $C_{10}H_{18}O$ (Sdp 205—208° C). Vermuthlich enthält das Citronenöl auch wenige Procente Linalool, $C_{10}H_{18}O$ und Geranylacetat, $C_{10}H_{17}OCH_2CO$.

Prüfung. Die häufigste Verfälschung des gepressten Citronenöles, das Verschnitten mit destillirtem Oele, wodurch die Haltbarkeit erheblich beeinträchtigt wird, ist bis jetzt mit Sicherheit noch nicht nachweisbar. Andere Zusätze sind süsses Pomeranzenschalenöl (Aptelenenschalenöl), Terpentinöl, fettes Öl und Spiritus. Während Terpentinöl das optische Drehungsvermögen des Citronenöles vermindert, erhöht Pomeranzenschalenöl dasselbe und erniedrigt dabei gleichzeitig das spec. Gewicht. Die Bestimmung des Rotationsvermögens ist gerade bei Citronenöl von allergrösster Wichtigkeit, und sollte, wenn möglich, nicht unterlassen werden.

Zur Erkennung von Gemischen von Terpentinöl mit Pomeranzenöl, die sich durch ihr Drehungsvermögen nicht von reinem Citronenöl unterscheiden, destillirt man von 25 ccm Oel die Hälfte ab und prüft die Drehung des Destillats, die bei reinen Oelen stets höher ist, als die des ursprünglichen Oeles. Ist sie niedriger, so ist Terpentinöl zugegen. Oder, destillirt man von 100 Th 10 Th ab, so soll der Drehungswinkel des Destillats nicht mehr als 2° von dem des ursprünglichen Oeles abweichen (Brit.)

Weingeist und fettes Oel verrathen sich durch das spec Gewicht. Ersterer setzt es herab, letzteres erhöht es. Wird fettes Oel vermuthet, so bestimme man den bei 100° C verbleibenden Rückstand, der in diesem Falle beträchtlich mehr als 5 Proc betragen wird. Auf Weingeist prüft man durch Erhitzen des Oeles bis zum beginnenden Sieden. Mit den ersten Tropfen geht der Alkohol über und kann durch die Jodoformreaktion nachgewiesen werden. Weingeisthaltiges Oel wird, auf Wasser getropft, trübe. Annähernd quantitativ ermittelt man den Weingeistgehalt durch Schütteln des Oeles mit Glycerin, das sich in diesem Falle besser als Wasser eignet, in einem graduirten Cylinder, wobei die Grösse der Zunahme der Glycerinschicht die Weingeistmenge anzeigt.

Aufbewahrung. Der Aufbewahrung des Citronenöles muss ganz besondere Sorgfalt gewidmet werden, da durch Zutritt von Licht und besonders von Luft das Oel sehr schnell verdorbt. Man bewahre es daher in kleinen, ganz angefüllten Flaschen an einem dunklen Orte im Keller auf.

Anwendung. Medicinisch wird das Citronenöl nur als Aromaticum und als Geschmackskorrigens gebraucht. Ausgedehnte Verwendung findet es in der Parfümerie, der Lakör- und Limonadenfabrikation, sowie im Haushalt zum Backen etc.

Succus Citri (Ergänz.) Succus Citri recens Succus Limonis (Brit U St) Succus e fructu Citri Limonis (Gall.) — Citronensaft. Frischer Citronensaft — Suc de Citron — Lemon juice

Zur Bereitung des Saftes im Kleinen schneidet man die Frucht quer durch und presst den flüssigen Inhalt mittelst eines porcellanen oder gläsernen Citronenquetschers, wie solche im Haushalte gebräuchlich sind, heraus. Bei Darstellung grösserer Mengen werden die Citronen geschält, zerdrückt und nach Entfernung der Samen in leinenen Pressbeuteln ausgepresst. Der frische Saft wird durchgeseiht oder (Gall.) erhitzt und nach dem Erkalten filtrirt. Schütteln mit Talkum und Absetzen lassen erleichtert das Filtriren. Eine Citrone giebt 20–30 g Saft. Derselbe ist gelblich und schmeckt stark, doch angenehm sauer. 10 ccm müssen wenigstens 10 ccm Normal-Kohlauge sättigen. Spec Gewicht etwa 1,040.

haltbarer Citronensaft. Frischer Saft wird durchgeseiht, mit $\frac{1}{4}$ seines Volumens gepulvertem Talk eine Viertelstunde geschüttelt, nach halbstündiger Ruhe nochmals geschüttelt, bei Seite gestellt, durch Papier filtrirt und mit 10 Proc Zucker aufgekocht. Man hält Flaschen, die mit Wasser gefüllt in kochendem Wasser stehen, bereit, entleert dieselben schnell, füllt sie mit dem siedenden Saft und verschliesst sofort mit Korken, die in geschmolzenes Paraffin getaucht sind (Apoth-Zeitg.) — Citronensaft ist, mit Wasser vermischt, ein vorzügliches, dursilöschendes Erfrischungsmittel. Innerlich wird derselbe bei Gicht und Gelenkrheumatismus von 1 Citrone bis zu 15–20 Stück *pro die* steigend, ferner gegen Erbrechen, als Gegenmittel bei Vergiftungen mit ätzenden Alkalien, äusserlich bei Sonnenstich, auf Watte geträufelt gegen Nasenbluten angewendet. Unverdünnt in Mengen von 100 g und darüber genossen, kann der Citronensaft bedenkliche Folgen nach sich ziehen.

In der Pharmacie dient der Citronensaft als geschmackverbesserndes Mittel (bei Rheumamixturen zu vermeiden!) und zur Bereitung von Sätturationen.

10,0 g	Succus Citri recens	sättigen	0,74 g	Ammonium carbonicum,
10,0 g	"	"	0,86 g	Kalium carbonicum,
10,0 g	"	"	1,25 g	Kalium bicarbonicum,
10,0 g	"	"	0,58 g	Magnesium carbonicum,
10,0 g	"	"	1,79 g	Natrium carbonic. cristall.
10,0 g	"	"	1,05 g	Natrium bicarbonicum.

Es erfordern zur Sättigung

10,0 g	Ammonium carbonicum	135,2 g	Succus Citri recens,
10,0 g	Kalium carbonicum	116,0 g	"
10,0 g	Kalium bicarbonicum	80,0 g	"

10,0 g Magnesium carbonicum	171,6 g Succus Citri recens
10,0 g Natrium carbon cristall	56,0 g " " "
10,0 g Natrium bicarbonicum	95,2 g " " "

20 g Liquor Kali carbonici (Germ.) geben mit 80 g Succus Citri recens (in Ermangelung frischer Citronen mit einer Lösung von 6,3 g Acidum citricum in 74 g Wasser) 100 g Saturated. Mit $\frac{1}{4}$ seines Gewichts Wasser verdünnt, entspricht der frische Citronensaft an Sättigungsvermögen einem 6proc Essig.

Wird eine „Saturatio“ ohne nähere Angabe der Bestandtheile verordnet, so ist (Germ.) stets Rivier'scher Trank (s. S. 35) abzugeben.

Citronensaft von Dr. FLEISCHER & Co. in Rossau a. Elbe zeichnet sich durch lange Haltbarkeit und billigen Preis aus, er bietet einen Ersatz für frische Citronen.

Sirupus Citri (Aust. Ergänzb. Helv.) Sirupus Succo Citri. Sirupus aceto-sitatus Citri. Sirupus Acidi citrici (U-St.) Sirupus Limonis (Brit.) Citronensirup. Syrup of Lemon. Aust. Frischer, filtrirter Citronensaft 40 Th., Zucker 64 Th. Man löst durch einmaliges Aufkochen und seigt durch — Ergänzb. Ebenso, doch im Verhältnisse 4:6 — Helv. Citronensäure 2 Th., Wasser 88 Th., Zucker 64 Th., man löst unter Kochen und fügt nach dem Erkalten Citronengeist 1,5 Th. hinzu — Brit. Frische Citronenschale 20 g, Alkohol (90 proc.) 30 ccm, man macerirt 7 Tage, presst, bringt mit Alkohol auf 40 ccm und vermischt mit einem Sirup aus 500 ccm geklartem Citronensaft und 760 g Zucker — U-St. Citronensäure 10 g, in 10 ccm Wasser gelöst, mischt man mit 500 ccm Zuckersirup, fügt Citronengeist 10 ccm und Zuckersirup q. s. zu 1000 ccm hinzu.

Confectio Citri Caro s. Conditum Citri Succata — Citronat. Kandirte Citronenschale. Suckade. Dient als Zusatz zu Morsellen und ähnlichem Naschwerk.

Alcoolatura Citri. Alcoolatura de citron (Gall.) Tinctura Citri corticis recentis. Essentia Citri corticis. Frische Citronenschalen 1 Th., Alkohol (80 proc.) 2 Th. Nach 8 Tagen auspressen und filtriren.

Limonaden-Essenz. Esprit de Grénadine (Buchh.). Die fein zerschnittene Schale von 50 Citronen und 50 Apfelsinen zieht man 8 Tage mit $\frac{7}{10}$ l Spiritus aus, destillirt ab, mischt das Destillat mit 3 l Wasser und destillirt 6 l Essenz ab — Ein aus den Schalen von 20 Citronen mit Weingeist von 70 Proc. q. s. zu 1 l bereiteter Auszug dürfte in vielen Fällen genügen.

Limonaden-Sirup. 5 kg Zuckersaft (Zucker 2, Wasser 1), 2 g Ananissäther, 8 Tropfen Citronenöl in 2,5 g Weingeist gelöst, 25 g Citronensäure in 100 g Wasser gelöst, Zuckercouleur q. s. 50 g dieses Saftes auf $\frac{1}{3}$ Seltersflasche voll kohlensaures Wasser (ohne Salze).

Oleosaccharatum Citri. Oléosaccharure de citron (Gall.) Eine frische Citrone wird mit 10 g Stöckenzucker abgerieben, bis die gelbe Schicht entfernt ist, die erhaltene Masse mischt man sorgfältig in einer Reibschale. Nur bei Bedarf zu bereiten.

Potio Rivieri cum Succo Citri (Ergänzb.). Mit Citronensaft bereiteter Rivier'scher Trank. In einer Mischung aus frisch ausgepresstem Citronensaft 60 Th., Wasser 135 Th. löst man 9 Th. Natriumkarbonat in kleinen Krystallen unter mäßigem Umschwenken.

Spiritus Citri. Spiritus Limonis. Citronengeist. Esprit de citron. Spirit of Lemon. Essence of Lemon. Helv. Die äussere, fein zerschnittene Schale von 12 Citronen macerirt man 3 Tage mit 1 kg Weingeist, destillirt im Dampfbad zur Trockne, mischt das Destillat mit 200 g Wasser und rektificirt, bis 1 kg übergegangen ist. — U-St. Aus Citronenöl 50 ccm, frisch geschabter Citronenschale 50 g bereitet man durch 24stündige Maceration mit q. s. Weingeist von 92,5 Proc. (Alcohol deodoratus) 1000 ccm Essenz.

Tinctura Limonis. Tincture of Lemon (Brit.) Aus frischer Citronenschale 250 g und Alkohol (90 proc.) 1000 ccm durch Maceration zu bereiten.

Aqua Citri

1. nach DIETZELICH.

Rp. Corticis Citri recentis contusi	50,0
Mittelst Dampfstrom destillirt man über 100,0	

2. Ex tempore

Rp. Olei Citri	gtt. III
Aquae destillatae calidae	100 g.
Man schüttelt kräftig und filtrirt.	

Aqua divina

Aqua Vitae citrata.

Rp. Olei Citri	1,0
Spiritus	874,0
Aquae Aurantii florum	100,0
Sirupi simplicis	525,0

Baume de Milano

Mailänder Balsam

Rp. Aquae Coloniensis cum Moscho	98,0
Tincturae Vanillae	2,0

Eau de Légalis.

Eau de senteur

Rp. Olei Citri	5,0
Olei Rosae	gtt. X
Tincturae Benzoe	40,0

Moschi

Ambrae griseae

xx 0,1

Mixture oleoso-balsam

255,0

Kosmetikum. Zusatz zum Mund- und Wasch-

wasser

Eau de Portugal.

Eau de Lisbonne

Rp	Olei Aurant cort Portugal	25,0
	Olei Citri	13,5
	Olei Rosae	1,5
	Spiritus (80%)	960,0

Elaeosaccharum Citri

(Anstr. Germ. Helv)

Rp	Olei Citri	0,2 (gtt. V)
	Sacchari albi	10,0

Florida-Water

Rp.	Olei Citri	5,0
	Olei Bergamottae	5,0
	Olei Lavandulae	2,0
	Olei Caryophyllorum	gtt. V
	Olei Aurantii florum	gtt. X
	Spiritus	890,0
	Aquae destillatae	100,0

Kaisergewürz

Rp	Corrida Citri fructus	45,0
	Semina Sinapis	10,0
	Fructuum Amomi	5,0
	Semina Myristicae	5,0
	Natrii chlorati	15,0
	Fructus Piperis nigri	10,0
	Rhizomatis Zingiberis	5,0
	Fructuum Capsici annui	2,0

Limonada Citri

Citronen-Limonade.

Rp	Acidi citrici	5,0
	Elaeosacchari Citri	2,0
	Sirupi Sacchari	100,0
	Aquae destillatae	893,0

Limonade commune

Potus citratus (Gall).

Rp	1 Fructus Citri recentes No. 2.	
	2 Sacchari albi in frustis	70,0 g
	3 Aquae destill. ebull.	1000,0 g.

Man reibt mit 2 die Schale von 1 ab, preest den Saft aus letzteren, fñgt die Zuckermasse und 3 hinzu und seigt nach $\frac{1}{2}$ Stunde durch.

Mosellesirup

Rp	Acidi citrici	
	Angosturbitter (S. 308)	25 5,0
	Essentiae Citri	
	Sacchari tost.	25 50,0
	Tincturae Vanillae	25,0
	Sirupi Sacchari	885,0

Mundtabletten.

Rp	Olei Anisi	gtt. IV
	Olei Cinnamomi	gtt. I
	Olei Citri	gtt. V
	Olei Laurocerasi	gtt. I
	Olei Caryophyllor	gtt. IV
	Olei Menthae pip.	gtt. V
	Tincturae Moschi	gtt. X
	Gummi arabici pulv.	5,0
	Sacchari pulver.	25,0

Man preest ohne weiteren Zusatz zu Tabletten.
Gegen überfließenden Athem.

Oleum odoriferum LINDNER.

Rp	Olei Bergamottae	43,0
	" Citri	35,0
	" Caryophyll.	15,0
	" Cinnamomi	5,0
	" Aurant. flor.	2,0

Rotulae Citri (DIETRICH).

Citronen-Kücheln.

Rp.	Sacchari albi pulv.	93,0
	Amyli Tritici	5,0
	Acidi citrici	2,0
	Olei Citri	gtt. V
	Sirupi Sacchari	q s

Bereitung wie bei Rot. Allhaene S 282 Durst-
Eschendes Mittel für Touristen und Radfahrer

Saturatio succi Citri recens

Julapium salinum.

Rp	1 Acidi citrici	3,2
	2 Sirupi succi Citri	25,0
	3 Aquae destillatae frigidae	90,0
	4 Liquoris Kali carbonici	10,0

Man bringt in der angegebenen Reihenfolge in das
Gefäß, schüttet dieses sofort und mischt durch
sanftes Umschwenken

Sirupus Citri corticis

Rp	1 Corticis (Flavendinis) Citri	50,0
	2. Spiritus	50,0
	3 Aquae destillatae	400,0
	4. Sacchari albi	600,0

Man digerirt 1—3 eine Stunde lang, filtrirt und
bereitet mit 4 = 1000 g Sirup

Spiritus Colonienensis (Ergänzb.)

Spiritus Citri compositus Tinctura s
Aqua Colonienensis Kölnisches Wasser
Teinture d'Essence de citron composée
(Gall.) Alcoolé d'essence de citron com-
posé. Eau de Cologne

I Ergänzb

Rp	Olei Bergamottae	10,0
	Olei Citri	10,0
	Tincturae Moschi	2,5
	Olei Aurantii florum	1,0
	Olei Cinnamomi	0,5
	Olei Caryophyllorum	0,5
	Olei Rosae	0,5
	Spiritus (87%)	900,0
	Aquae destillatae	75,0

Nach Stägigem Stehen filtriren

II Gall.

Rp.	Olei Bergamottae	10,0
	Olei Portugal	10,0
	Olei Citri	2,0
	Olei Aurantii florum	2,0
	Olei Rosmarini	2,0
	Alcohol (90%)	1000,0

III. Buchh

Rp	Olei Citri	12,0
	Olei Bergamottae	9,0
	Olei Lavandulae	1,0
	Olei Aurantii flor.	1,0
	Olei Rosmarini	gtt. IV
	Olei Mellissae	gtt. I
	Olei Menthae pipent	gtt. VII
	Olei Thymi	gtt. IV
	Olei Rosae	gtt. I
	Spiritus	897,0
	Aquae Aurantii florum	80,0

Tinctura cum oleo volatil Citri.

Teinture d'essence de citron (Gall.)

Alcoolé d'essence de citron. Esprit de
citron.

Rp	Olei Citri	2,0
	Alcohol (90%)	98,0

Blüthenthau, von Rau's Erben, ist eine weingeistige Lösung von Bergamott-,
Citronen-, Rosen- und Neroliöl

Boonckamp of Maagbitter. Ein Lakör aus Pomeranzen, Enzian, Cascabelle, Kur-
kuma, Zimmt, Nelken, Rhabarber und Anisöl

Carbolic-Salbe von HENRY, für Wunden aller Art, Karbolsäure 0,3, Bergamottöl 2 Trpf., Lavendelöl 1 Trpf., Wachsalsbe 18 g

Cosmeticum, HENRY's, ein Haarmittel, ist ein mit Bergamott-, Citronen-, Rosmarin- und Lavendelöl versetzter Spiritus

Cosmeticum von SIEMERLING Eine Mandelemulsion mit Benzoealkohol und Citronensaft

Eau de Hébé Eine mit Citronen- und Rosenöl parfümierte Mischung aus Lavendelöl und Citronensaft

Essentia dulcis besteht aus einer mit Zucker versüßten Pomeranzenschalen- und Fencheltinktur

Gesundheits-Ratafia von KRAFFT gegen alle möglichen Leiden ist ein süßer Schnaps aus Pomeranzen, versetzt mit Gewurztinktur, Wermuthalkohol, Pfefferminzöl und Essigäther

Haartinktur, JOH. SEBALD'S Ein weingeistiger Orangenschalenauszug mit 5 Proc. Resorcin und 3 Proc. Perubalsam Der Gebrauch hat mehrfach üble Folgen gehabt

Kräuterelixir, LAMPE'S Tinktur aus unreifen Pomeranzen, Kalmus, Enzian, Cassia, Kurkuma, Rhubarber

Krauter-Essenz von DIETZE Ein versüßter Schnaps aus Pomeranzen, Kalmus, Angelika, Wermuth, Enzian

Krauteressenz von PLEINE, ein Haarspirit, versetzt mit Olivenöl, Bergamottöl und andern ätherischen Ölen

Kraftliker von ENGELHOFER Ein mit Honig und Zucker versüßter Likör aus Anis, Ingwer, Zimmt, Nelken, Enzian, Pomeranzen

KRONHOLZ' Magenlikör, enthält Anisöl, Kümmelöl, Pomeranzen, Gewurz-, Kalmus- und Zimmtalkohol, Cochemille, Pottasche, Zucker

Magenbitter von BERGEL Ist ein Likör aus Pomeranzenschalen, Citronenschalen, Heidelbeeren, Enzian, Paradieskörnern, Kardamomen, Muskatnuss, Nelken, Galgant, Zimmtblüthen

Magenessenz, Aqua vitae stomachica Cujavica. Fruct. Aurant. immat. 150,0, Cort. Aurant. 50,0, Rad. Gentian., Rhizom. Galang. Zedoar. aa 36,0, Cort. Cinnamoni 45,0, Fol. Trifol., Caryophyll., Fruct. Anisi stell. aa 30,0, Fruct. Cardamom., Carvi aa 15, Fruct. Foenicul. 7,5, Sacchari 1,5 kg, Spiritus 4,5 l, Aquae 5,5 l.

Makao-Tropfen, SCHÖFFER'S, ist eine Mischung aus Tinct. Aurant. pomor. 1 und Spiritus aethereus 9

DR. MAMPE'S Magentropfen Eine Tinktur aus Zimmt, Galgant, unreifen Pomeranzen, Orangenschalen, Enzian, Nelken.

Mundwasser, Dr. PRISTLEY'S, ist eine Lösung von Citronen-, Pfefferminz-, Fenchel- und Rosenöl in Weingeist

Parfum Germierde, aus London, besteht aus einer konzentrierten, weingeistigen Lösung von Ol. Citri, Thymi, Lavandulae, Pini sylvestris

Schweizer Kräutersaft von GOLDBERGER. Syrupus Aurant. Florum mit Tinct. Aurant. pomor.

Sirap tonique de Laroze Tinct. Aurant. cort. 15, Syrup. Sacchari 85

TREHMANN'S Pen-tiao-Mittel ist ein weinger Auszug aus unreifen Pomeranzen.

Onicus.

Gattung der Compositae—Cynareae—Centaureinae. **Onicus Benedictus** L. (syn. *Carbema benedicta* Benth. et Hook., *Centaurea benedicta* L.) Hemisch im europäischen Mittelmeergebiet und in Kleinasien, zum arzneilichen Gebrauch vielfach kultiviert.

Beschreibung Einjähriges, distelartiges Kraut, Stengel bis 40 cm hoch, aufrecht, oberwärts gespreizt, ästig, nebst den Blättern klebrig und zottig behaart. Die bodenständigen Blätter werden bis 30 cm lang, sie sind buchtig fiedertheilig mit stacheligen Sägezähnen und gestülptem Blattstiel, die Stengelblätter sind sitzend mit sattelartiger Krümmung des Spreitengrundes. Die Hüllblätter der grossen Bluthenköpfchen gehen in rechtwinkelig zurückgebogene, kammartig mit 4–5 Stachelpaaren besetzte Dornen aus. Blüthen gelb, röhrenförmig, die Randblüthen mit dreispaltigem Saum, unfruchtbar, die

Scheibenblüthen mit fünfspaltigem Saum, zwittrig. Pappus zweireihig. Früchte gerippt. (Fig. 201.)

Auf den Blättern lange Gliederhaare, deren leicht zusammenfallende Zellen nach oben an Breite ab- und an Länge zunehmen, an jüngeren Blättern und den Blättern des Hüllkelches Drüsenhaare, deren Kopf aus 8–10 in 4–5 Etagen angeordneten Zellen besteht.

Bestandtheile. 0,2 Proc. eines Bitterstoffes Cnicin oder Centaurin $C_{26}H_{34}O_{16}$, der in Nadeln von stark bitterem Geschmack krystallisirt. Er wird mit Schwefelsäure roth, auf Zusatz von Wasser violett, mit Salzsäure grün. Ferner 0,3 Proc. ätherisches Oel etc.

Verwendung findet das ganze getrocknete Kraut:

Herba Cardui benedicti (Germ. Helv.). Folia Cardui benedicti. Herba Acanthi germanici. Hb. Cardui s. Cnici sancti. — Cardobenedictenkraut. Benedictenthoe. Kardobenediete. Carbenusthee. Biterdistel. Bernhardinerkraut. Spinnendistel. Heildistel. Magedistel. — Chardon bénit (Gall.). Blessed thistle.

Einsammlung. Aufbewahrung. Das während der Blüthe (Juli bis August) gesammelte Kraut wird, von den dickeren Stengeltheilen befreit, an der Luft getrocknet und in Holzkästen aufbewahrt. 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trockenes.

Verwechslungen werden genannt mit:

Cirsium oleraceum Scopoli. Blätter kahl oder nur zerstreut behaart, schwach stachelig gewimpert, die grösseren fiederspaltig mit spitzen Lappen, die kleineren meist nur gezähnt. Nicht bitter.

Onopordon Acanthium L. Blätter spinnwebig-filzig, buchtig gezähnt.

Sibibum marianum Gärtner. Blätter glänzend kahl, weissfleckig.

Wirkung und Anwendung. Wirkt wegen des bitteren Geschmackes appetitanregend und tonisirend, grössere Dosen rufen Erbrechen hervor; reines Cnicin schon zu 0,3 g, es ist bei Intermittens empfohlen.

Dosis 1–2 g in Pulver, Pillen, Infus oder Dekokt (5,0–10,0:150,0).

Extractum Cardui benedicti (Germ. Helv.). Cardobenedicten-Extrakt. — **Extrait de Chardon bénit** (Gall.). Germ.: Cardobenediktenkraut (II) 1 Th. wird mit siedendem Wasser 5 Th. übergossen, 6 Stunden digerirt, ausgepresst, nochmals mit 5 Th. siedendem Wasser übergossen, 3 Stunden digerirt, die Pressflüssigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft. Harzige Ausscheidungen sind durch vorsichtigen Zusatz von Weingeist zu lösen. — Helv.: ebenso, doch werden zum zweiten Auszuge nur 3 Th. Wasser genommen, die Pressflüssigkeiten auf 2 Th. eingeeengt, mit 1 Th. Weingeist 48 Stunden stehen gelassen, filtrirt und eingedampft. — Gall.: Wie Extractum Centaurii (S. 684) zu bereiten. — Ausbeute nach Germ. etwa 25–35, nach Helv. etwa 16 Proc. Nach anderen Angaben giebt das bei 100° getrocknete Kraut 18–24 Proc. trocknes Extrakt.

Gabe 0,5–1,0 in Pillen oder aromatischen Wassern.

Ptisana de folio Cardui benedicti (Gall.). Tisane de Chardon bénit. Wie Tisane de Buchu (S. 511) zu bereiten.

Herbae amarae.

Bittere Kräuter.

Ep. Herbae Cardui benedicti

Herbae Absinthii

Herbae Centaurii min. 22.

Sirupus Cardui benedicti.

Ep. Extracti Cardui benedicti 2,0

Sirupi simplicis 98,0.

Vinum Cardui benedicti.

Ep. Extracti Cardui benedicti 2,0

Vini Hispanici 98,0.

Kölner Klosterpillen bestehen aus gleichen Theilen Eisenpulver, Cardobenediktenkraut und Fließdermus.

Cobaltum.

Cobalt. Kobalt. Kobalt (engl. u. franz.) **Co** Atomg. = 59. Dieses Element bildet zwei Oxyde Das Kobaltmonoxyd CoO (Kobaltoxydul) und das Kobaltsesquioxyd Co_2O_3 (Kobaltoxyd) Die Mehrzahl der Salze leitet sich zwar von dem Kobaltmonoxyd CoO ab, doch werden wir auch ein von dem Kobaltsesquioxyd sich ableitendes Salz zu besprechen haben Man beachte, dass unter der Bezeichnung „Kobalt“ auch noch das metallische Arsen, d. i. der Scherbenkobalt, verstanden wird. S S 387

Das metallische Kobalt ist ein weisses, glanzendes Metall mit schwach rötlichem Schein, welches das Nickel sowohl an Festigkeit als auch an Glanz und Politurfähigkeit übertrifft Es ist dehnbar und ebenso wie das Nickel magnetisch In kompaktem Zustande verändert es sich an der Luft nicht, beim Gluhen an der Luft überzieht es mit einer Oxydschicht Das spec Gewicht ist 8,5–8,7 Wegen des höheren Preises, welcher durch die schwierige Darstellung bedingt wird, wird es technisch nicht sehr allgemein verwendet, bei billigerem Preise würde es etwa in gleicher Weise benutzt werden wie Nickel, das es in vieler Hinsicht übertrifft

Cobaltum chloratum Kobaltochlorid. Chlorkobalt Kobaltchlorür. $\text{CoCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 238. Zur Darstellung löst man Kobaltoxydul oder Cobaltoxydulhydrat in verdünnter Salzsäure und dunstet die Lösung ein, bis sie Krystalle abscheidet Man erhält alsdann rosenrothe Krystalle $\text{CoCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

Die wasserhaltige Verbindung stellt rosaroth, feucht aussehende Krystalle dar, welche in Wasser leicht zu einer rosarothenen Flüssigkeit, in Weingeist zu einer tiefblauen Flüssigkeit löslich sind

Beim Erhitzen wird die wasserhaltige Verbindung wasserfrei und stellt eine blaue lockere Masse dar, welche sehr hygroskopisch ist und durch Anziehung von Wasser aus der Luft sehr leicht wieder in die rosa gefärbte, wasserhaltige Verbindung übergeht Auf diesem leichten Uebergange des wasserhaltigen Salzes in das wasserfreie und umgekehrt, hez auf dem mit diesem Uebergange verknüpften Farbenwechsel beruhen einige Anwendungen dieses Salzes

Cobaltum nitricum oxydulatum Kobaltonitrat. Salpetersaures Kobaltoxydul. $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew = 291

Zur Darstellung löst man Kobaltmetall oder das Oxydul oder das Hydroxydul oder Karbonat in verdünnter Salpetersäure auf und koncentrirt die Lösung durch Eindunsten Es muss indessen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Salz nur schwierig krystallisirt Bei kleinen Mengen stellt man die konc Lösung daher zweckmässig über Schwefelsäure und sät, wenn sie hinreichend concentrirt ist, einen Krystall ein.

Rothe, monokline Prismen, an trockener Luft haltbar, in feuchter Luft zerfliessend. Sie schmelzen unter 100°C und werden beim Erhitzen auf höhere Temperatur zersetzt unter Abgabe von Wasser, Stickstoffoxyden und Hinterlassung von Kobaltoxyd CoO Das Salz ist leicht löslich in Wasser und in Alkohol Die mit etwas Salpetersäure angesäuerte wässrige Lösung werde durch Baryumchlorid und Silbernitrat nicht getrübt, beim Einleiten von Schwefelwasserstoff scheide sich kein dunkler Niederschlag ab (Kupfer)

Das Kobaltonitrat wird namentlich als Reagens in der Löthrohr-Analyse zum Nachweis von Aluminium, Zink und Magnesia verwendet Ausserdem dient die wässrige Auflösung als sympathetische Tinte Die damit geschriebenen Schriftzüge werden beim massigen Erhitzen pfirsichblüthroth, beim stärkeren Erhitzen braun

Cobaltum sulfuricum Kobaltosulfat. Schwefelsaures Kobalt. Kobalt-Vitriol. $\text{CoSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 281

Zur Darstellung löst man metallisches Kobalt unter Erwärmen in konc Schwefelsäure oder Kobaltkarbonat oder Kobalthydroxyd oder Kobaltoxyd in verdünnter Schwefelsäure Aus der rothen Lösung krystallisirt das Salz $\text{CoSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ — etwas schwierig — in rothen, monoklinen Prismen von den Formen des Eisenvitriols, welche in der Wärme

ihr Krystallwasser abgeben ohne zu schmelzen. Das wasserfreie Salz sieht ebenfalls roth aus und ist löslich in 24 Th. Wasser, in Alkohol ist es unlöslich.

† **Cobalti-Kalium nitrosum purum** Reines Kobalti-Kaliumnitrit. Kobaltid-Kalium nitrosum. Salpetrigsaures Kobaltoxyd Kalium. $\text{CoK}_2(\text{NO})_2 + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
Mol. Gew. = 479.

Darstellung. Man löst 10 Th. Kobaltonitrat in 100 Th. Wasser, filtrirt diese Lösung, vermischt sie mit einer anderen filtrirten Lösung von 25 Th. Kaliumnitrit in 60 Th. Wasser und fügt sogleich unter Umrühren 75—100 Th. Essigsäure von 30 Proc. hinzu. Nach 12—24 stündigem Stehen filtrirt man den ausgeschiedenen kanariengelben Niederschlag ab, wäscht ihn zunächst mit Kaliumacetatlösung, dann mit Weingeist von 80 Proc. und trocknet ihn auf poröser Unterlage an der Luft.

Ist das Filtrat noch deutlich roth gefärbt, so versetzt man es nochmals mit 30 g. Essigsäure. Sollte sich innerhalb 12 Stunden nicht alles Kobalt in Form des Doppelsalzes abgeschieden haben, so fügt man noch eine Lösung von 6 g. Kaliumnitrit hinzu. Bleibt die Lösung auch jetzt noch roth gefärbt, so fällt man zweckmässig das Kobalt mit Natronlauge als Hydroxydul und führt dieses durch Auflösen mit Salpetersäure in Cobaltonitrat über.

Eigenschaften. Ein feines, gelbes, mikrokrySTALLINISCHES Pulver, in kaltem Wasser fast unlöslich, löslich in viel siedendem Wasser zu einer röthlichen Flüssigkeit, aus welcher durch Natronlauge bläuliches Kobaltohydroxyd gefällt wird. Von kalter Salzsäure wird das Kobalti-Kaliumnitrit kaum verändert, in der Wärme wird es zu einer prachtvoll smaragdgrünen Flüssigkeit gelöst. Schüttelt man es mit Wasser an, so wird es auf Zusatz von Schwefelammonium alsbald in schwarzes Kobaltsulfid verwandelt. — Die Phosphorsalzperle oder Boraxperle wird durch das Präparat prachtvoll blau gefärbt.

Anwendung. Wegen seines Gehaltes an salpetriger Säure giebt man es als Antispasmodicum und Antidiagnosticum bei Asthma und Herzkrankheiten, welche mit Dyspnoe einhergehen, in Einzeldosen von 0,015—0,03 g. mehrmals täglich.

Das technische Präparat führt auch noch die Namen **Fischer's Salz**, **St. Evre-Gelb**, **Cobaltgelb**.

Coeruleum, Coelin, Bleu céleste. Ist ein feuer- und luftbeständiger Farbstoff von hellblauer Farbe (Porcellanfarbe zum Malen des Himmels) mit einem Stich ins Grünliche. Es ist Kobaltostannat und besteht aus etwa 20 Proc. Kobaltoxyd CoO , 50 Proc. Zinnsäure und 30 Proc. Gips und Kieselsäure. Die letzteren sind nicht als Verfälschung anzusehen. Hesse Salzsäure löst mit hellblauer Farbe auf, die durch Verdünnung mit Wasser violettroth wird. Keine Salpetersäure löst unter Abscheidung von Zinndioxyd. Essigsäure und Alkalien wirken nicht ein.

Kobaltbrunze ist Kobaltphosphatammoniak, ein metallisch glänzendes, violettes, schuppenförmiges Pulver.

Kobaltrosa, Kobaltroth, Kobaltviolett, $\text{Co}_3\text{P}_2\text{O}_7$, wird durch Erhitzen von Kobaltphosphat erzeugt. Es wird in der Zeugdruckerei und zum Tapetendruck verwendet.

Kobaltgrün, BINMAN'S Grün, Zinkgrün, Sächsisch Grün, grüner Zinnober. Zur Darstellung wird frisch gefälltes basisches Kobaltkarbonat mit Zinkoxyd gemengt, die Mischung getrocknet und geglüht. Auf 10 Th. Zinkoxyd kommen etwa 1,5 Th. Kobaltoxydul. Die Farbe kommt in verschiedenen Nuancen vor.

Kobaltschwärze, schwarzer Erdkobalt ist ein Kobaltoxyd (Co_2O_3) mit verschiedenen mineralischen Verunreinigungen, in welchen Arsen selten ganz fehlt.

(†) **Kobaltultramarin, Bleu Thenard, Leithener Blau** ist ein aus Kobalto-Aluminat bestehender blauer Farbstoff.

(†) **Smalte, Schmalte, Blaufarbe**, ist ein glasiges, fein präparirtes Silikat des Kalis, Natrons und Kobaltoxyduls und besteht aus 65—75 Proc. Kieselsäure, 16—22 Proc. Alkali, 2—8 Proc. Kobaltoxydul nebst kleinen Mengen Thonerde, Arsen, Kohlensäure, Wasser. Das feinere Pulver bezeichnet man mit Farbe, Couleur, Eschel, Fasseschel, das gröbere mit Blausand, Streublau, die kobaltreichste Sorte mit Königsblau, Kaiserblau.

Echte Smalte verändert die Farbe nicht bei Einwirkung der Aetznatronlauge und der Hitze vor dem Löthrohre. Kochende Salzsäure färbt sie grüngelb. Auf einer weissen Glasscheibe mit der Tastseite des ersten Gliedes des Mittelfingers stark gerieben, ritz die Smalte das grüne Fensterglas.

Ein starker Gehalt von Nickeloxydul oder Kupferoxydul stört das Blau der Smalte und nuancirt sie röthlich, Eisenoxyd, Bleioxyd, Wismutoxyd und Kupferoxyd nuanciren grünlich, Eisenoxydul starker grün. Manganoxydul ist ohne Einfluss, hebt aber die Wirkung der Eisenoxyde auf. Geschwächt wird das Blau durch Kalkerde, Thonerde, Natron.

Mit Kobaltoxyd gefarbtcs Glas nennt man Kobaltglas.

Schwarze Schmelzfarbe für Schilder auf Porcellan. Es werden entwässertes schwefelsaures Kobaltoxyd 2 Th., entwässertes schwefelsaures Manganoxydul 2 Th., Salpeter 5 Th. gut gemischt in einem Hesseschen Tiegel gegläht. Die geglähte Masse mit Wasser ausgekocht, hinterlässt ein tiefes schwarzes Pulver. 1 Th. hiervon wird mit $2\frac{1}{2}$ Th. Bleiglas auf einer Glasplatte verrieben. Bleiglas erhält man durch Zusammenschmelzen von 5 Th. Mennige, 2 Th. Sand und 1 Th. calcinirtem Borax.

Barometerpapier nach BERING und GEORGIUS. Dieses wird mit Kobaltorhodanid (Kobaltrhodanür) getränkt. Dieses Salz wird dadurch hergestellt, dass man eine wässrige Lösung von schwefelsaurem Kobalt so lange mit einer alkoholischen Lösung von Rhodankalium versetzt, als sich schwefelsaures Kalium abscheidet. Nach dem Filtriren und Auswaschen mit Alkohol kann man die (etwas eingedampfte) Lösung zum Tränken des Papiers benützen. Das krystallisirte Salz erhält man durch Abdampfen der Lösung im Vacuum in Form schöner dunkel blauvioletter Säulen.

Andere Tinten dieser Art werden nach folgenden Vorschriften zusammengesetzt — 1) 1 Th. Kobaltchromat, 2 Th. Natriumchlorid gelöst in 40 Th. Wasser und 2 Th. Salpetersäure. Farbe gelblich grün. — 2) 1 Th. Kaliumbromid, 1 Th. Kupfersulfat gelöst in 20 Th. Wasser. Farbe braun. — 3) 1 Th. Natriumchlorid, 1 Th. Kupferchlorid in 20 Th. Wasser gelöst. Farbe gelb.

Papierhygrometer. Dieses Hygrometer besteht aus Fliesspapier, welches mit einer Lösung von Kobaltchlorid (CoCl_2), Natriumchlorid, Gummi arabicum, Glycerin oder Calciumchlorid in Wasser getränkt und dann getrocknet ist. Es zeigt feucht eine blasseröthe, beim Trocknen blaueröthe und trocken eine blaue Farbe. Je nach dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft zeigt es eine mehr oder weniger rothe Färbung. In Gegenden mit sehr trockener Atmosphäre ist der Lösung etwas Glycerin oder Calciumchlorid zuzusetzen. Das Maass der Luftfeuchtigkeit wird durch folgende Farben angegeben — Rosenroth Regen — Blassroth Sehr feucht — Blaueröthe Feucht — Lavendelblau Fast trocken — Violett trocken — Blau Sehr trocken —

Jene Lösung wäre zusammenzusetzen aus Kobaltchlorid 10,0, Natriumchlorid 5,0, Gummi arabicum 2,5 Calciumchlorid 1,0—2,0, Wasser 80,0.

Sonnen-Bronze 40—60 Kobalt, 10 Aluminium, 30—40 Kupfer.

Metallin 85 Kobalt, 25 Aluminium, 10 Eisen, 30 Kupfer.

Legirung für Pressglas-Formen. Besteht aus 100 Th. Eisen mit 5—10 Th. Kobalt.

Coca.

I Erythroxylon Coca Lamarck. Gattung der Erythroxylaceae. Hemisph. in Peru, dort und in Bolivia in grossem Maassstabe kultivirt, weniger in Ecuador, Kolumbien, Brasilien und Argentinien. Die Pflanze geht auf den Anden etwa bis 1800 m Höhe, bis zum 11° nördl. Breite, 24° stüdl. Breite, östlich bis zum 64° westl. Länge. Neuerdings Kulturen in Westindien, Ceylon, Java, Sansibar, Australien. Man unterscheidet folgende Varietäten der Pflanze 1) E. Coca Lam., selten, angeblich nicht im Handel, weder in Peru noch auf Java etc. in Kultur. 2) E. Coca var. Novo-Granatense. In Britisch Indien in Kultur. 3) E. Coca var. Spruceanum, hauptsächlich auf Java in Kultur.

Beschreibung. Bis 1,5 m hoher Strauch mit hellrothbrauner Rinde und kleinen gelblichweissen, gestielten Blüten, die einzeln oder in Büscheln blattwinkelständig sind. Korolle mit doppeltspaltiger Lagula, Antheren 10, am Grunde zu einer Röhre verwachsen. Frucht eine kleine, einsamige, rothe Steinfrucht, Samen mit knorpeligem Endosperm und plankonvexen Kotyledonen. Blätter wechselständig, mit kleinen Nebenblättern, die später braun und hart werden. Sie liefern die Droge.

Folia Coca (Austr. Ergänzb.) Folium Cocae (Helv.) Cocae Folia (Brit.) Cocae U-St.) Folia Erythroxyl. Cocae — Coca- oder Kokablätter — Feuille de Coca (Gall.) — Coca Leaves.

Das kurz-gestielte Blatt ist 3–8 cm lang, oval bis elliptisch, 2–4 cm breit, an der Spitze stumpf oder ausgerandet mit kleinem, (in der Droge meist) abgebrochenem Stachelspitzchen, ganzrandig, der Rand etwas nach unten umgerollt, oberseits olivengrün, unterseits dunkelgraugrün. Ziemlich spröde, leicht zerbrechlich. Vom Mittelnerv gehen die Sekundärnerven unter fast rechtem Winkel ab, um zahlreiche zarte Anastomosen zu bilden, zwischen denen etwas derbere (Tertiär-) Nerven in der äußeren Hälfte hervortreten. Neben dem Primärnerv auf der Unterseite des Blattes meist zwei zarte Linien, neben denen selten noch zwei weitere sichtbar werden.

Die Epidermis der Oberseite mit zarten Cuticularzäpfchen, die von oben als feine Körnchen erscheinen, dieselben Zäpfchen auch auf der Epidermis der Unterseite, deren Zellen ausserdem papillös vorgewölbt erscheinen. Stomata mit zwei Nebenzellen nur auf der Unterseite. (Fig. 202, 203.) Der Mittelnerv mit einem Belag von Fasern.

Unter der Epidermis der Oberseite eine Reihe von Palissaden, die zuweilen gefächert sind und in jeder Zelle dann einen Oxalatkrystall enthalten. An den „Linien“ jederseits der Mittelnerven erscheint die Epidermis etwas vorgewölbt, und unter ihr liegt eine kleine Gruppe zuweilen kollenchymatisch verdickter Zellen.




Fig. 202.
Epidermis der Oberseite des Cocablattes
mit anheftenden Palisadenzellen p.
160 mal vergrößert.




Fig. 203.
Epidermis der Unterseite des Cocablattes mit
Spaltöffnungen sp und den deutlich hervor-
tretenden Papillen. 160 mal vergrößert.
(Nach MOELLER, Mikroskopie.)

Das Pulver bietet wenig Charakteristisches: Hin und wieder findet man in demselben, nachdem man es mit Chloralhydrat aufgeheilt hat, Fetzen der Epidermis der Unterseite mit den papillös vorgewölbten Zellen oder Krystalle aus den Palissaden.

Bestandtheile. Alkaloide: $\text{CocaIn } \text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$, anscheinend in allen Cocasorten, fast frei von anderen Alkaloiden in der breitblättrigen peruvianischen und in der bolivianischen Waare. $\text{CinnamylcocaIn } \text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{NO}_4$, reichlich in der Javasoca, oder der aus Britisch-Indien, auch in der Trujillsoca, in kleinen Mengen auch in den beiden bei CocaIn genannten Sorten, $\text{Cocamin } (\alpha\text{-Truxillin}) \text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{NO}_4$, in allen Sorten, $\text{Isococamin } (\beta\text{-Truxillin}) \text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{NO}_4$, anscheinend in allen Cocasorten, namentlich in der Trujillsorte, Homococamin in südamerikanischen Sorten, Homoisococamin , beide letzteren zweifelhaft, $\text{Benzoylpseudotropin } \text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{NO}_4$ in der Javasorte, $\text{Benzoylcocgonin } \text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{NO}_4$, ferner amorphe, nicht flüchtige Basen in der Javasorte; Hygrin, nach neueren Anschauungen nicht einheitlich.

Ferner enthalten die Blätter Methylsalicylat (junge Blätter 0,13 Proc., alte 0,02 Proc.), Conogorsäure $\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{O}_{10} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Cocatin (dem Quercetin ähnlich), $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{O}_{10} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, in der indischen Waare, Carotin in einer Boliviasorte aufgefunden. $\text{Palmityl-}\beta\text{-Amyrin}$ in südamerikanischer und javanischer Waare, $\beta\text{-Cerotin}$ $\text{C}_{55}\text{H}_{105}\text{O}$, ein Keton.

Der Alkaloidgehalt ist ein ausserordentlich wechselnder: junge Blätter sind am reichsten (bis 2,4 Proc.), ältere 0,7–1,75 Proc., nach anderen Angaben kann der Gehalt

auf 0,36 Proc sinken. Es ist daher eine quantitative Bestimmung sehr am Platze. Es scheint, dass die grössere oder geringere Sorgfalt beim Trocknen von Einfluss auf den Alkaloidgehalt ist.

Bestimmung der Alkaloide. Nach KELLER

12 g gepulverte Cocablätter werden in einem Arzneiglase von 250 ccm mit 120 g Aether übergossen, nach 15 Minuten fügt man 10 ccm Ammoniak hinzu und schüttelt wiederholt kräftig. Nach $\frac{1}{2}$ Stunde giebt man 20 ccm Wasser zu und schüttelt wieder kräftig. Das Pulver ballt sich nun zusammen. Man giesst 100 g der ätherischen Lösung (= 10 g Pulver) ab, lässt einige Zeit zum Absitzen stehen und schüttelt dann die klare Lösung im Scheidetrichter mit 50 und 25 ccm 0,5 proc Salzsäure aus, oder so lange, bis sie mit MEYER'schem Reagens keine Trübung mehr giebt. Die saure wässrige Lösung wird nöthigenfalls filtrirt, im Scheidetrichter alkalisch gemacht und zweimal mit je 40 ccm Aether ausgeschüttelt, oder so lange, bis eine Probe der letzten ätherischen Ausschüttelung, auf einem Uhrgläschen verdunstet und mit $\frac{1}{2}$ proc Salzsäure aufgenommen, mit MEYER'schem Reagens keine Trübung mehr giebt. Die ätherische Lösung wird aus einem tarirten Kölbchen abdestillirt, der Rückstand im Wasserbade getrocknet und gewogen. Er giebt die Alkalorde aus 10 g Fol Cocae. Zur Titration löst man den Rückstand in 5 ccm Alkohol, setzt 15 ccm Wasser hinzu, färbt mit einem Tropfen Hämatoxylum (1:100) und lässt $\frac{1}{10}$ N Salzsäure bis zur bleibenden Gelbfärbung hinzufliessen.

1 ccm $\frac{1}{20}$ N HCl = 0,01515 g Cocain

Das Hygrin resp die unter diesem Namen zusammengefassten Körper gehen aus der ammoniakalischen wässrigen Lösung nicht in den Aether über, man kann es mit Chloroform ausschüttein.

Sorten. Man unterscheidet meist zwei Sorten. 1) peruanische Blätter, die kleiner, zarter, und daher häufig zerbrochen und heller sind, 2) bolivianische Blätter, die grösser, dicker und dunkler sind (vergl. S. 870).

Einsammlung, Aufbewahrung. Die Pflanzen gehen je nach der Lage etc. nach $1\frac{1}{2}$ —3 Jahren die erste Ernte, die dann alle 12—14 Monate bis 40 Jahre lang wiederholt wird, günstig gelegene Pflanzungen sollen jährlich drei Ernten gestatten, wo bei die Pflanzen aber bald zu Grunde gehen. — Die gesammelten Blätter werden rasch und sorgfältig getrocknet. Unvorsorgliches Trocknen und Aufbewahren soll den Alkaloidgehalt bedeutend herabmindern. — Man bewahrt die Blätter in Blechkisten, das Pulver in gelben Stüpselgläsern. — Cocablätter sind in Deutschland dem freien Verkehr entzogen.

Wirkung. Vergl. Cocain.

Anwendung. Als Kaumittel, in Pulverform zu 0,3—1,0, als Aufguss oder Abkochung (2,0—8,0 100,0), als Tinktur oder Wein. Diese Arzneiformen werden seit der Reindarstellung des Cocains kaum noch verordnet. Die reichliche Verwendung der Cocablätter in Sudamerika als Genussmittel ist bekannt, man kaut sie allein oder mit Kalk, Tabak oder mit der Asche von *Chenopodium Quinoa*. — Der reichliche Import der Blätter nach Europa, wo man früher die Alkaloide in Deutschland aus den Blättern darstellte, hat aufgehört, seit die Robalkaloide an Ort und Stelle gewonnen werden.

Aqua Cocae ist wie **Aqua Chamomillae** (S. 716) zu bereiten.

Extractum Cocae alcoole puratum (Gall.) **Extrait de Coca alcoolique**, wird wie **Extr. Digitalis Alcoholicae par** (Gall.) bereitet.

Extractum Cocae fluidum (U. St.) **Fluid Extract of Coca**. Aus 1000 g Cocablättern (No. 40) und q s verdünntem Weingeist (41 proc) im Verdrängungswage. Man befeuchtet mit 450 ccm, sammelt zuerst 800 ccm, dann l a soviel, dass man 1000 ccm Extrakt erhält. Die Münchener Vorschrift lässt statt eines 41 proc einen 60 proc Weingeist verwenden.

Extractum Cocae liquidum (Brit.) **Liquid Extract of Coca**. Aus 1000 g Cocablättern (No. 20) und q s Alkohol (60 Vol Proc) im Verdrängungswage. Man mischt mit 2000 ccm, sammelt zuerst 750 ccm und weiter l a soviel, dass man 1000 ccm Extrakt erhält. — Gabe 1—3 ccm.

Sirupus Cocae (Gall.) **Sirap de Coca** wird wie **Sirupus Chamomillae** (S. 716) bereitet.

Tinctura Cocae (Helv.) **Teinture ou Alcoolé de Coca** (Gall.) **Coca-Tinktur** Gall. Aus grob gepulverten Cocablättern 1 Th und Alkohol (60 proc) 5 Th. durch 10tägige Maceration. **Bad. Ergänz.-Taxe** Ebenso Helv. Wie **Tinctura Calami** Helv. (S. 537).

Vinum Cocae (Ergänzb. Helv. Gall.) **Cocawein** Vin de Coca Oenolé de Coca. — Ergänzb. Cocablätter 5 Th, Südwein 95 Th — Helv. Cocablatt (II) 5 Th, Marsalwein 100 Th Nach 8 Tagen auszupressen und zu filtriren — Gall. Cocablätter 6 Th, Wein von Grenache oder Rothwein 100 Th — Bad. Ergänzb. Taxe Coca Fluid extrakt 50 Th dampft man auf 20 Th ein und löst in 80 Th eines süßen Südwines — Pharm. Rundschau Cocablätter 10 Th, Kognak 5 Th, Sherry 80 Th, süßer Ungarwein 20 Th, in 100 Th. Kolatur 0,5 Citronensäure lösen

Zur Bereitung von Cocawein soll sich ein mit 25proc Weingeist durch Reperkolation gewonnenes Fluid-Extrakt wegen seiner Klarfärbbarkeit in Wein besonders eignen

Aqua dentifricia cum Coca
Coca-Zahnwasser (Apoth. Zeitg.).
Rp 1 Folium Cocae 100,0
2 Aluminis 15,0
3 Cocconellae pulver 100,0
4 Spiritus 800,0
5 Olei Menthae piperit. 4,0
6 Olei Caryophyllorum 4,0
7 Olei Rosae 1,0
8 Spiritus Cocchleariae 400,0
9 Saccharini 0,4

Man digerirt 1–4 vier Tage lang und löst 5–8 im Filtrat

Pasta dentifricia cum Coca
Coca-Zahnpasta
Rp Calcii carbonici praecipit 90,0
Saponis medicati 30,0
Ossium Sepiae pulv 15,0
Tincturae Cocae 45,0
Olei Menthae piperit 0,8
Olei Unonae odorat. 0,3
Glycerini 30,0
Phloxinroth q s
Vergl. hierzu die Bemerkungen auf S 554.
Pisana de folio Cocae (Gall.).
Tisane de Coca
Rp Folium Cocae 10,0
Aqua destillatae ebull. 1000,0
Nach 1/2 Stunde durchzuseihen

Acetractum Cocae fluidum. Als Fluid Acetrakte bezeichnet REMINGTON eine neue Arzneiform, welche durch Reperkolation bestimmter Drogen mittelst 10proc Essigsäure hergestellt wird. Besonders eignen sich dafür die narkotischen Pflanzenstoffe, auch die Cocablätter

Celerine ist eine Mischung von Sellerie-, Coca-, Kola- und Viburnum-Fluidextrakt mit Weingeist, Zucker- und Pomeranzen-Essenz

Cocapillen des Dr. ALVARES sind den folgenden ähnlich

Cocapillen des Dr. SAMPSON 1) Pillen aus Cocaextrakt, Cocapulver und Morphin.
2) aus Cocaextrakt und Eisenpulver

Elixir BRAVAIS: Coffein 1,25, Essentia Cocae 0,25, Theobromin, Vanillin äs 0,0025, Natr. benzoic 1,5, Curacao blanc 500 (Wiener Vorschrift.)

Vin BRAVAIS Extr. Cocae 2,5, Extr. Nuc. Kola 10,0, Coffein 1,0, Theobromin, Vanillin äs 0,0025, Natrium benzoic 1,3, Vinum Pedro Ximenez 500 (Wiener Vorschrift.)

Elixir Cocae. 60 g Cocablätter macerirt man 12 Stunden mit 120 g Alkohol (60 proc), fügt 500 g weissen Malagawein zu, presst nach 8 Tagen ab, setzt 350 g Zuckersirup hinzu und erschöpft den Pressrückstand mit q s Wasser, so dass das Ganze 1000 g ausmacht (Pet. Mon. de la Ph.)

II In Britisch-Indien und auf Java befindet sich eine Art in Kultur, die man als **Erythroxylon Bolivianum Burck** bezeichnet. Sie unterscheidet sich von E. Coca durch grössere, mehr elliptische, lederne Blätter, die auf dem Mittelnerv einen eigenthümlichen, scharf hervortretenden Kamm haben. Alkaloidgehalt gering, 0,55 Proc

III. **Erythroxylon pulchrum St Hil** in Brasilien soll 0,005 Proc. Cocaïn enthalten.

IV **Erythroxylon monogynum Roxb** aus Ceylon, deren Blätter auch nach Europa gekommen sind, enthält kein Alkaloid

Cocaïnium.

I † **Cocaïnium.** Cocaïn. **Erythroxylin.** Cocaine (Gall.) **Cocaina** (Brit)
 $C_{17}H_{21}NO_4$ Mol. Gew. = 303.

In den Cocablättern wurden ausser Cocaïn bisher die folgenden wesentlichen Bestandtheile nachgewiesen A. Basen: Cinnamylcocaïn $C_{19}H_{23}NO_4$, γ Isatropylcocaïn (= Truxillin, Truxillcocaïn, Cocamin) $C_{19}H_{23}NO_4$, Benzoylpseudotropeïn (Benzoyl- ψ -Tropeln) $C_{18}H_{19}NO_4$, — letzteres hauptsächlich in der Java-Coca—, Hygrin $C_8H_{11}NO$ (und

$C_{17}H_{21}N_2O$) und einige weitere Basen unbekannter oder zweifelhafter Konstitution. B. als indifferente Bestandtheile: Wachs, in welchem verschiedene Fettsäureester enthalten sind, ferner wurden einige Gerbsäuren in den Blättern gefunden


Darstellung. Die Gewinnung des Cocains erfolgt zur Zeit in der Weise, dass in Amerika die Cocablätter direkt auf Cocain verarbeitet werden. Ein grosser Theil dieses Roh-Cocains gelangt nach Europa, bezw. Deutschland und wird hier auf Rein-Cocain verarbeitet. Die einzelnen Fabriken arbeiten nach geheim gehaltenen Verfahren, welche indessen mehr oder weniger alle nur Abänderungen des im Folgenden beschriebenen sind.

Die fein gepulverten Cocablätter werden mit einer 20 procentigen Sodälösung angefeuchtet, hierauf mit Mineralölen — wie z. B. Benzin, Petroläther, Petroleum — ausgerührt oder ausgeschüttelt. Man verwendet hierzu etwa 10 Th. des Mineralöls auf 1 Th. Blätter. Die in das Oel übergegangenen Cocaalkaloide werden demselben mit verdünnter Schwefelsäure entzogen. In gleicher Weise werden noch einige Oelauszüge bis zur völligen Erschöpfung der Cocablätter gemacht. Die saure Lösung der Alkaloide wird mit überschüssiger Sodälösung versetzt, es fällt Cocain mit Isatropylcocain, Cinnamylcocain und etwas Hygrin aus. In der Länge verbleibt der grössere Theil des Hygrins. Das abfiltrirte und abgepresste Roh-Cocain wird zur Reinigung aus Alkohol umkrystallisirt. Das gewonnene reine Cocain wird zur Ueberführung in das Chlorhydrat in wenig starkem Alkohol gelöst und die Lösung mit alkoholischer Salzsäure neutralisirt. Es krystallisirt alsdann das Chlorhydrat aus.


Eigenschaften des Cocains. Das freie Cocain krystallisirt aus Alkohol in grossen, farblosen, monoklinen, 4–6 seitigen Prismen. Es schmilzt bei $98^{\circ}C$, hat einen bitterlichen Geschmack und macht die Zungennerven vorübergehend gefühllos. Es löst sich in etwa 700 Th. Wasser von $12^{\circ}C$ und ist löslich in 10 Th. Alkohol, 4 Th. Aether, Benzol, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Chlorkohlenstoff, 0,5 Th. Chloroform, 14 Th. Terpentinöl, 12 Th. Olivenöl, Aceton, Essigäther, Petroleum, unlöslich in Glycerin. Die Lösungen drehen die Ebene des polarisirten Lichtes nach links. Die Formel des Cocains ist $C_{17}H_{21}NO_4$. Cocain wird von verdünnten Säuren leicht gelöst und bildet damit meist krystallisirbare Salze. Bei der Salzbildung verhält es sich als einsäurige Base. Die wässrigen Lösungen werden durch Ammoniak, Alkali- oder Alkalikarbonatlösung gefällt.

Saure Cocainlösungen geben mit Kaliumferrocyanid- und Chromsäurelösungen Niederschläge, ferner geben die Cocainsalzlösungen starke Niederschläge mit den allgemeinen Alkaloidreagentien. Charakteristisch für Cocain ist die folgende Reaction. Mischt man einige Tropfen einer Cocainlösung mit 2–3 cem Chlornasser und fügt einige Tropfen einer 5 procentigen Palladiumchlorürlösung hinzu, so entsteht ein schön rother Niederschlag, unlöslich in Alkohol und Aether, löslich in unterschwefligsaurem Natrium. (GRIFFITHS)

Schon beim Kochen mit Wasser, rascher beim Erhitzen mit Salzsäure, verdünnter Schwefelsäure oder Barytwasser wird das Cocain gespalten in Methylalkohol, Benzoesäure und (Links) Ecgonin



Nach dieser Spaltung ist das Cocain aufgefasst worden als der Methyläther des Benzoyl-Ecgonins. Die Richtigkeit dieser Auffassung ist bewiesen worden dadurch, dass es möglich gewesen ist, das Cocain aus Ecgonin durch Benzoylirung und Methylierung desselben synthetisch wieder anzubauen. Da zur Zeit die Konstitutionsformel des Ecgonins



ziemlich aufgeklärt ist, so ist damit auch die Konstitution des Cocains erschlossen. Die erwähnte Synthese hat aber auch eine bedeutende praktische Wichtigkeit. In den Cocablättern kommen in ziemlich erheblicher Menge ausser dem Cocain noch andere Basen vor (Cinnamylcocain, Isatropylcocain, u. a. s. oben), welche zum Theil nicht

krystallisiren, zum Theil unerwünschte Nebenwirkungen besitzen. Diese Basen liefern, so weit sie Egonin-Derivate sind, beim Erhitzen mit Salzsäure etc. (s. oben), Egonin, und dieses kann nunmehr zur Darstellung von synthetischem Cocain verwendet werden. Ausser dem aber ist es möglich, durch Einführung anderer Säure- und Alkoholareste in das Egonin Verbindungen vom Charakter des Cocains darzustellen, welche bisher in der Natur noch nicht aufgefunden worden sind.

† **Cocainum hydrochloricum** (Aust. Germ. Helv.) **Cocainae Hydrochlorias** (U-St.) **Cocainae Hydrochloridum** (Brit.) **Cocainum muriaticum** **Cocainehydrohydrat** **Cocainhydrochlorat**. Salzsäures Cocain. Chlorwasserstoffsäures Cocain $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$. Mol. Gew. = 339,5.

Von den hier berücksichtigten Pharmacopoen haben Austr., Brit., Germ., Helv. und U-St. das wasserfreie Salz obiger Formel aufgenommen. Die Gall. dagegen hat das wasserhaltige Salz recipirt, s. unten.

Darstellung. Die Verfahren zur Darstellung des salzsauren Cocains werden von den einzelnen Fabriken geheim gehalten. Indessen sind die nachstehenden Verfahren thatsächlich im Gebrauche. 1) Man neutralisirt ohne Anwendung von Wärme 100 Th. Cocainbase bei Gegenwart der nothigen Menge von Wasser mit Salzsäure, wozu etwa 48,1 Th. einer 25 procentigen Salzsäure erforderlich sind. Man bringt alsdann die Lösung im Vacuum über Schwefelsäure oder Calciumchlorid zur Trockne und krystallisirt den trocknen Rückstand aus starkem Alkohol in der Hitze um. Wasser lässt sich zum Krystallisiren nicht verwenden, weil man alsdann ein wasserhaltiges Salz erhält und weil ferner durch längere Einwirkung von Wasser und der Wärme theilweise Zersetzung des Cocains eintritt. 2) Man löst die trockene Cocainbase in Aether oder Petroläther und leitet in diese Lösung trockenes Salzsäuregas. Das salzsaure Salz fällt in Form von Schuppchen aus. 3) Man löst das freie Cocain in Alkohol, neutralisirt die Lösung mit alkoholischer Salzsäure und fällt aus der Lösung das Salz mit Aether.

Eigenschaften. Das wasserfreie Cocainhydrochlorid bildet entweder farblose durchscheinende prismatische Krystalle, oder breite Tafeln, oder weisse glänzende Blättchen vom Schmelzpunkt $181,5^{\circ} C$. Es ist indessen hierbei zu beachten, dass der Schmelzpunkt des Präparates wechselt, je nachdem man das Erhitzen bei der Schmelzpunktsbestimmung rasch oder langsam vornimmt. Bei langsamem Erhitzen findet man den Schmelzpunkt bei etwa $180^{\circ} C$, bei raschem Erhitzen kann man ihn über $200^{\circ} C$ finden. Es ist in 0,75 Th. kalten Wassers, leicht in wasserhaltigem, schwer in absolutem Alkohol löslich. Das Salz ist unlöslich in Aether, Petroleum, Benzin, Benzol und Toluol, löslich in Aceton und Chloroform. Die Lösungen reagiren neutral. Aus konc. wässriger Lösung krystallisirt es mit 2 Molekülen Wasser in prismatischen Nadeln, welche ihr Wasser sehr leicht abgeben. Das aus Alkohol krystallisirte Salz ist wasserfrei und nach der Formel $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ zusammengesetzt. Das Molekulargewicht ist 339,5. Es enthält 89,25 Proc. freie Base.

Die Lösungen besitzen einen bitteren Geschmack und rufen auf der Zunge eine vorübergehende Gefühllosigkeit hervor. Die konc. wässrigen Lösungen werden durch Ammoniak und Alkalien gefällt. Kaliumpermanganat giebt in denselben einen krystallinischen violetten Niederschlag von Cocainpermanganat. Pikrinsäure fällt ein gelbes Pikrat. Verdünntere Lösungen geben mit Platin- und Goldchlorid einen gelben, mit Quecksilberchlorid einen weissen, mit Jodlösung einen braunen Niederschlag. Die ziemlich stark mit Salzsäure angesäuerte verdünnte, wässrige Lösung giebt mit Kaliumchromat einen orangegelben Niederschlag.

Die wässrigen Lösungen zersetzen sich in einiger Zeit, und ist es daher rathlich, solche nicht zu lange aufzubewahren.

Das Cocain gehört zu denjenigen Alkaloiden, welche keine Farbenreaktionen geben. Es wird daher nöthig sein, die Reaktionen, an denen man das Cocain und seine Salze erkennen kann, genau zu besprechen.

Identitätsreaktionen. Man bereite eine Lösung von 0,25 g. des Salzes mit 25 ccm. Wasser. Die Lösung muss völlig klar und neutral sein. 1) 5 ccm. dieser Lösung

geben auf Zusatz von einem Tropfen Kalilauge zuerst eine weisse milchige Trübung, aus welcher sich zunächst weisse harzige Klümpehen, später feine, weisse Nadelchen abscheiden

Diese Abscheidung (von freiem Cocain) löse sich sehr leicht in Weingeist und Aether auf 2) Je 5 ccm der gleichen Lösung geben, mit einigen Tropfen Salzsäure angesäuert, auf Zusatz einiger Tropfen Quecksilberchloridlösung einen weissen, flockigen Niederschlag (das Quecksilberdoppelsalz), auf Zusatz von Jodlösung einen braunen Niederschlag 3) Setzt man zu 5 ccm der Lösung 5 Tropfen einer 5 proc Chromsäurelösung, so bildet sich bei jedem einfallenden Tropfen ein deutlicher Niederschlag, welcher sich sofort wieder löst. Fügt man zu der klaren Lösung 1 ccm reine conc Salzsäure, so entsteht sofort ein mehr oder weniger harziger, orangegelber Niederschlag (von Cocainchromat). Bei allmählichem Zusatz der Salzsäure wird der Niederschlag mehr pulverig flockig (K. MEYER) 4) 5 ccm der Lösung geben auf Zusatz von 2 ccm gesättigter Kaliumpermanganatlösung einen violetten Niederschlag (GROSSEL) von Cocainpermanganat 5) Erwärmt man eine kleine Menge des Salzes mit alkoholischer Kalilauge in einem Reagircylinder, so trete alsbald der eigenartige Geruch des Benzoesäureäthylathers auf (Nachweis der Benzoylgruppe im Cocain) 6) Eine Lösung von 0,1 g des Salzes in 1 ccm conc Schwefelsäure (s S 871) gebe, mehrere Minuten im Wasserbade erhitzt, auf Zusatz einiger Cubiccentimeter Wasser eine weisse krystallinische Ausscheidung von Benzoesäure. Nachweis der Benzoylgruppe in Cocain (BIEL) 7) Vermischt man etwas Cocainchlorhydrat mit Kalomel, und macht diese Mischung durch Anhauchen feucht, so färbt sie sich schon im zerstreuten Lichte — rascher im direkten Sonnenlichte — grau infolge Reduktion des Quecksilbersalzes zu metallischem Quecksilber

Prüfung Mit Rücksicht darauf, dass das Cocainchlorhydrat häufig zur Resorption auf Schleimhäute gebracht und auch subkutan injicirt wird, empfiehlt es sich der Prüfung desselben alle Sorgfalt zuzuwenden. Man verfährt zweckmässig wie folgt

Nachweis von Verunreinigungen 1) Eine kleine Probe des Salzes hinterlasse beim Verbrennen auf dem Platinbleche keinen Rückstand (anorganische Stoffe) — 2) 0,1 g des Salzes löse sich in 1 ccm conc Schwefelsäure unter Gasentwicklung (HCl) farblos auf (Eine Gelb- oder Braunfärbung deutet auf mangelhafte Reinigung des Cocains. Eine Beimengung von Zucker oder von anderen organischen Stoffen giebt eine Braunfärbung, eine solche von Salicin eine Rothfärbung) — 3) 0,1 g des Salzes löse sich in 1 ccm Salpetersäure farblos auf (Eine zufällige Verunreinigung mit Morphin giebt eine rothe Färbung) — 4) Permanganatprobe. 0,1 g des Salzes werden in 5 ccm Wasser unter Zusatz von 8 Tropfen verdünnter Schwefelsäure gelöst. Ein Tropfen einer 1 proc Kaliumpermanganatlösung rufe eine Violettfärbung hervor, welche im Laufe einer halben Stunde keine Abnahme zeige. Man achte hierbei darauf, dass kein Staub in die Lösung hineinfalle, welcher event. eine Reduktion der Permanganatlösung bewirken kann.

Diese Probe zeigt Verunreinigungen des Cocains mit Cinnamylcocain an, welches Alkaloid von Kaliumpermanganat vollkommen zerstört wird. Sind grössere Mengen dieser Cocabase in dem Cocain anwesend, so können mehrere Tropfen Permanganatlösung bei dieser Probe reducirt werden. Man kann hierbei annähernd rechnen, dass 1 Tropfen verbrauchter Permanganatlösung = 0,4 Proc. Nebenalkaloidverunreinigung entspricht.

Man kann diese Probe verschärfen, indem man statt eines Tropfens einer 1 proc Permanganatlösung einen solchen einer 1 promilligen Lösung zugeibt. Chemisch reines Cocainhydrochlorid hält diese Probe regelmässig (dasselbe gilt von guten im Handel anzutreffenden Waaren). Um die Färbung bei dieser verschärften Probe deutlicher hervortreten zu lassen, löse man besser 0,1 g des Salzes in 1 ccm Wasser und 1 Tropfen verdünnter Schwefelsäure.

5) MAC LAGAN's Ammoniakprobe. 0,1 g des Salzes werden in 85 ccm Wasser gelöst und 0,2 ccm Ammoniak (0,960) hinzugefügt. Die Lösung bleibe einen Moment lang klar, sie gebe dagegen bei heftigem Rühren mit einem Glasstabe sehr rasch einen krystallinischen

Niederschlag (von freiem Cocaïn) In jedem Falle muss bei einem reinen Cocaïnhydrochlorid bei heftigem Rühren im Laufe von 5 Minuten eine Krystallisation erfolgen

Tritt eine solche nicht ein, so ist das Cocaïnhydrochlorid, von mangelhafter Reinigung herrührend, mit Substanzen verunreinigt, welche die Krystallisation hindern — Eine sofort beim Ammoniakzusatz auftretende milchige Trübung deutet auf eine Verunreinigung mit mehreren Procenten Isatropylcocaïn (welches in Ammoniak schwerer löslich ist als Cocaïn)

Die MAC LAGAN'sche Reaction ist neuerdings von GUNTHER als unzuverlässig bezeichnet worden GUNTHER theilt mit, dass nach seinen Erfahrungen gerade reine Cocaïnchlorhydrate bei der genannten Reaction eine krystallinische Abscheidung nicht geben, dass vielmehr die Krystallisation des Cocains bei der MAC LAGAN'schen Reaction bedingt werde durch die Anwesenheit einer bei 111°C schmelzenden Base $\text{C}_{15}\text{H}_{23}\text{NO}_4$, welche entweder mit Cocaethylin identisch oder isomer sei. — Diese Angaben sind von C F BOHRINGER & SOHN bezweifelt worden Diesen ist es nicht gelungen aus Cocablättern eine Base vom Schmelzpunkt 111°C in irgendwie bemerkenswerther Menge abzuscheiden Dagegen halten sie die MAC LAGAN'sche Probe als eine werthvolle Reaction zur Beurtheilung der Reinheit der Cocainsalze

6) Eine Probe des Salzes, bei 100°C erhitzt, gebe keine wesentliche Gewichtsabnahme (Abwesenheit von Krystallwasser) Vor mehreren Jahren war das bereits erwähnte wasserhaltige Cocaïnchlorhydrat $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4 \cdot \text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ vorübergehend einmal im Handel Es bildet feucht ansehende, völlig durchsichtige Säulen, ist aber nach dem Arzneibuche nicht zugelassen

Aufbewahrung Das Präparat werde in gut verschlossenen Gefässen vorsichtig aufbewahrt

Wirkung, Anwendung und Dosirung. Das Cocaïn zeichnet sich durch seine Eigenschaft aus, die Endigungen der sensiblen Nerven vorübergehend zu lähmen, und zwar werden nur solche Nerventheile durch die Cocaïnwirkung beeinflusst, welche in direkte Berührung mit der Cocaïnlösung gelangen Diese Eigenschaft hat dem Cocaïn seine weitgehende Anwendung als lokales Anästheticum verschafft

Die Schleimhäute resorbiren Cocaïn aus seiner wässrigen Salzlösung mit grosser Leichtigkeit, und werden daher solche sehr rasch anästhesirt Um an anderen Körperstellen eine Gefühllosigkeit hervorzurufen, muss man, da die Epidermis die Einwirkung der auf die Haut gebrachten Cocaïnlösung auf die Nervenendigungen verhindert, die Lösung subkutan injiciren, um sie mit den Nerven in Berührung zu bringen Die Wirkung des Cocaïn's tritt in einigen Minuten ein und hält 10—15 Minuten lang an

Das Cocaïn hat in den wenigen Jahren seiner praktischen Verwendung eine sehr weitgehende therapeutische Bedeutung erlangt. Es findet Anwendung bei chirurgischen Operationen, Zahnextraktionen, zur Beseitigung von Zahn- und Brandwundschmerzen Es ist ein unschätzbares Mittel bei operativen Eingriffen in die Nase, den Rachen, den Kehlkopf, die Urogenitalapparate, wie in der Ophthalmologie geworden — Man verwendet zu Bepinselungen von Schleimhäuten 10—20 procentige Cocaïnhydrochloridlösungen, zu Einträufelungen in das Auge 2—10 procentige, zu Injektionen 5—10 procentige Lösungen

Bei Zahnextraktionen wird das Fleisch des kranken Zahnes zuerst mit der Cocaïnlösung eingerieben, hierauf $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Pravazspritze einer 5 procentigen Lösung eingespritzt Man kann auf solche Weise in den meisten Fällen mit 0,0125—0,025 g Cocaïnchlorhydrat nach 5—10 Minuten eine völlig schmerzlose Extraktion vornehmen

Cocaïn, innerlich genommen, unterdrückt das Hunger- und Durstgefühl Man verwendet es, um den Brechreiz bei Schwangerschaften und bei der Seekrankheit zu beseitigen Es findet ferner Anwendung zur Bekämpfung des Morphinismus Vor dem länger fortgesetzten, regelmässigen Cocaïnegebrauch ist unbedingt zu warnen, da derselbe eine Nervenzerrüttung, entsprechend der chronischen Morphinvergiftung, hervorruft (Cocaïnismus)

Höchste Gaben *pro dosi* 0,05 g Germ Helv (0,1 g Austr) *pro die* 0,15 g Germ Helv (0,3 g Austr) Injektionsdosis Nach Helv *pro dosi* 0,05 g, *pro die* 0,1 g

† Chlorhydrate de Cocaine (Gall) Wasserhaltiges Cocainchlorhydrat. $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl + 2H_2O$. Mol Gew. = 375,5.

Krystallisiert man das salzsaure Salz nicht aus starkem Alkohol, sondern aus stark verdünntem Alkohol oder aus Wasser um so erhält man das Salz der Gall Kurze derbe, durchsichtige, feucht aussehende Prismen, welche an der Luft leicht verwittern, bei 100° C völlig wasserfrei werden und alsdann bei 182° C schmelzen

Das Salz entspricht, abgesehen von seinem Wassergehalte, völlig dem wasserfreien und enthält 80,69 Proc Cocain, 9,72 Proc Chlorwasserstoff und 9,59 Proc Wasser

Cocain-Streupulver-UNNA Rp Cocaini hydrochlorici 0,5—1,0, Magnesi carbonici 10,0

Colloidium Cocaini UNNA Rp Cocaini puri 1,0—2,0, Spiritus aetheris 1,0, Colloidi q s ad 50,0

Cocain-Salbenseife-UNNA. Rp Cocaini puri 1,0, Saponis unguinosi MIREUX 49,0

Cocain-Oel-UNNA. Rp Cocaini puri 1,0, Olei Amygdalarum 49,0

Cocain-Watte. Rp Cocaini hydrochlorici 3,0, Spiritus 50,0, Aquae destillatae 100,0, Gossypii 100,0

Cocain-Morphin-Watte. Rp Cocaini hydrochlorici 3,0, Morphini hydrochlorici 1,5, Spiritus, Aquae destillatae aa 75,0, Gossypii 100,0

Cocain-Bor-Watte nach ELLER Acidi borici 2,0, Glycerini 4,0, Aquae destillatae 30,0, Cocaini hydrochlorici 2,0, Acidi carbonici 1,0, Gossypii 30,0

Dr. HINKLE'S Pastillen gegen Heiserkeit Rp Cubebarum, Acidi benzoici aa 0,15, Cocaini hydrochlorici 0,005, Eucalyptoli 0,075, Tragacanthae 0,075, Succo Liquiritiae 1,5, Sacchari 5,0, Olei Anisi 0,015, Succo Rubium nigrorum q s ad pastillos 100

Odontodol, italienisches Zahnschmerzmittel Rp Cocaini hydrochlorici 1,0, Aquae Lauraceras 1,0, Tincturae Arnicae 10,0, Liquoris Ammonii acetici 20,0

Dehlia, Schnupfenmittel Ist eine Auflösung von Cocainchlorhydrat und Kochsalz in Wasser und Glycerin [AUFRICHT, B FISCHER]

Stimm-Tabletten von EMMEL in München enthalten pro Stück 0,15 Borsäure, 0,15 Kaliumchlorat ($KClO_4$) und 0,001 g Cocainchlorhydrat.

Dentola zum Aufpinseln auf schmerzhaftes bez geschwollenes Zahnfleisch ist eine Auflösung von 1 Th. Cocainchlorhydrat und 10 Th. Kalumbromid in 200 Th Wasser und 200 Th Glycerin

Angina-Pastillen von Dr E BLOCH (St Leonhards-Apotheke) in Basel enthalten per Pastille 0,01 Cocainchlorid, ausserdem Kaliumchlorat, Borax und Zucker

Salia anaesthetica SCHLEICH

SCHLEICH's anaesthetisches Salz I

Rp Cocaini hydrochlorici 0,2
Morphini hydrochlorici 0,025
Natrii chlorati sterilisati 0,2

Für 100 ccm sterilisiertes Wasser

oder

Rp Cocaini hydrochlorici 0,1
Codeini phosphorici 0,06
Natrii chlorati sterilisati 0,5

Für 100 ccm sterilisiertes Wasser

SCHLEICH's anaesthetisches Salz II.

Rp Cocaini hydrochlorici 0,1
Morphini hydrochlorici 0,025
Natrii chlorati sterilisati 0,2

Für 100 ccm sterilisiertes Wasser

oder

Rp Cocaini hydrochlorici 0,05
Codeini phosphorici 0,06
Natrii chlorati sterilisati 0,6

Für 100 ccm sterilisiertes Wasser

SCHLEICH's anaesthetisches Salz III

Rp Cocaini hydrochlorici 0,01
Morphini hydrochlorici 0,005
Natrii chlorati sterilisati 0,2

Für 100 ccm sterilisiertes Wasser

Solutio Cocaini et Hydrargyri bichlorati.

Rp Hydrargyri bichlorati 0,02
Cocaini hydrochlorici 0,1
Aqua 10,0

Soll eine klare Lösung geben [LAMANNA].

II.

Rp Cocaini hydrochlorici 0,1
Hydrargyri bichlorati 0,2
Glycerini 7,0
Natrii chlorati 0,75
Aqua q s ad 20,0

Man löst den Sublimat in der Hälfte des Wassers, fügt das Kochsalz u das Glycerin hinzu, mischt dann die Cocainlösung unter Umschütteln hinzu und giesst den Rest des Wassers zu.

Tablettas Cocaini zur Infiltrations-Anästhesie.

HAUSMANN-CUSTER

I Zur Lösung I, 0,2 procentig.

Rp Cocaini hydrochlorici 0,05
Natrii chlorati 0,05
Morphini hydrochlorici 0,006

Für 25,0 sterilisiertes Wasser

II Zur Lösung II, 0,1 procentig.

Rp Cocaini hydrochlorici 0,05
Natrii chlorati 0,1
Morphini hydrochlorici 0,0125.

Für 50,0 sterilisiertes Wasser

III Zur Lösung III, 0,01 procentig
 Rp Cocaini hydrochlorici 0,005
 Natrii chlorati 0,1
 Morphini hydrochlorici 0,0025
 Für 50,0 sterilisirtes Wasser

Liquores anaesthetici SCHLEICH

I. Starke Lösung zur Infiltrations-Anästhesie.

Rp Cocaini hydrochlorici 0,2
 Morphini hydrochlorici 0,025
 Natrii chlorati sterilisati 0,2
 Aquae destillatae sterilis ad 100,0
 Acidi carbonici (5 proc) gtt II

oder

Rp Cocaini hydrochlorici 0,1
 Codeini phosphorici 0,06
 Natrii chlorati sterilisati 0,6
 Aquae destillatae sterilis ad 100,0
 Acidi carbonici (5 proc) gtt II

II Normal-Lösung zur Infiltrations-Anästhesie.

Rp Cocaini hydrochlorici 0,1
 Morphini hydrochlorici 0,025
 Natrii chlorati sterilisati 0,2
 Aquae destillatae sterilis ad 100,0
 Acidi carbonici (5 proc) gtt II

oder

Rp Cocaini hydrochlorici 0,05
 Codeini phosphorici 0,06
 Natrii chlorati sterilisati 0,6
 Aquae destillatae sterilis ad 100,0
 Acidi carbonici (5 proc) gtt II

III Schwache Lösung zur Infusions-Anästhesie

Rp Cocaini hydrochlorici 0,01
 Morphini hydrochlorici 0,005
 Natrii chlorati sterilisati 0,2
 Aquae destillatae ad 100,0
 Acidi carbonici (5 proc) gtt II

Diese Lösungen bereitet man zweckmässig so, dass man das gelöste Kochsalz in 110 ccm sterillem Wasser löst, diese Lösung auf 110 ccm einkocht (sterilisirt) und nach dem Erkalten in ihr die anderen Bestandtheile auflöst

Liquor anaestheticus FROMMANN

Rp Cocaini hydrochlorici 0,05—0,2
 Morphini hydrochlorici 0,025
 Antipyrini 1—2,0
 Guajacoli 0,1
 Natrii chlorati 0,2
 Aquae sterilisatae 100,0

Als Injektions-Anästheticum in der zahnärztlichen Praxis

† **Cocainum hydrobromicum** Cocainbromhydrat. Bromwasserstoffsäures Cocain $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HBr$ Mol. Gew. = 384.

Die Darstellung erfolgt analog dem Chlorhydrat durch Neutralisation von 10 Th freier Cocainbase mit 10,7 Th Bromwasserstoffsäure von 25 Proc

Das Salz gleicht dem Chlorhydrat, ist aber in den verschiedenen Lösungsmitteln etwas weniger leicht löslich als dieses

† **Cocainum salicylicum.** Cocainsalicylat. Salicylsäures Cocain. $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot C_7H_5O_2$ Mol. Gew. = 441.

Wird durch Neutralisation von 10 Th. freiem Cocain mit 4,55 Th. Salicylsäure wie das Cocainbenzoat dargestellt

Dicke, kurze Tafeln, leicht löslich in Wasser, Alkohol und in Aether

† **Cocainum sulfuricum** Cocainsulfat $(C_{17}H_{21}NO_4)_2 \cdot H_2SO_4$ Mol. Gew. = 704.
 Zur Darstellung neutralisirt man 100 Th freies Cocain mit verdünnter Schwefelsäure, wozu rund 100 Th reiner Schwefelsäure von 1,112 spec Gew erforderlich sind Die Lösung wird an einem warmen Orte oder über Schwefelsäure eingetrocknet Das Sulfat hat nicht das gleiche Krystallisationsvermögen wie das Chlorhydrat

Körniges, weisses Salzpulver, in 3 Th. Wasser löslich, von der Reinheit des Chlorhydrates

Löst man 0,1 g Cocainsulfat in 5 ccm Wasser, fügt 5 Tropfen einer 5 procentigen Salzsäure und 4 Tropfen einer 5 procentigen Mercurichloridlösung hinzu, so entsteht ein leichter, weisser Niederschlag, der auch durch kräftiges Schütteln nicht völlig in Lösung gehen darf Nach Zusatz von 5 ccm Wasser aber muss sich der Niederschlag klar auflösen — Das Salz dient namentlich zur kombinierten Anwendung mit Silbernitrat

† **Cocainum - Aluminium sulfuricum,** Cocain-Aluminiumsulfat Cocain-Alaun $Al(8O_4)_2C_{17}H_{21}NO_4 + 12 H_2O = 738$

Zur Darstellung löst man 10 Th kryst Aluminiumsulfat (s S 249) und 10,6 Th Cocainsulfat in etwa 80 Th Wasser, dunstet die Lösung ein, bis sie eben anfangt, Krystalle abzusetzen, dann fügt man wieder etwas Wasser zu, so dass sie beim Abkühlen noch klar bleibt und bringt einen kleinen Krystall von Kal-Alaun ein Man erhält nun prachtvolle Oktaeder des Cocain-Alauns

† **Cocainum nitricum.** Cocainnitrat. Salpetersäures Cocain. $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HNO_3$ Mol. Gew. = 366.

Man neutralisirt unter Ausschluss von Erwärmung 10 Th in Wasser vertheiltes freies Cocain mit verdünnter Salpetersäure, wozu 8,3 Th Salpetersäure von 25 Proc erforderlich sind, und dunstet die Lösung in flachen Gefässen an einem warmen Orte zur Krystallisation ein

Grosse, tafelförmige Krystalle, leicht löslich in Alkohol und in Wasser, schwer löslich in Aether

Das Salz wird dann angewendet, wo es sich um Kombinationen von Silbernitrat mit Cocain handelt

† **Cocainum boricum**, Cocainborat, borsäures Kokain $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot 2(BO_2H_3)$ = 427 Man löst 10 Th Borsäure und 24,5 Th Cocain in Wasser und dunstet die Lösung auf dem Wasserbade, schliesslich über Schwefelsäure ein Weisses krystallinisches Pulver, in Wasser und in Alkohol löslich Die Lösungen sind haltbarer als die des salzsauren Salzes und werden in der Augenheilkunde, sowie zu subkutanen Injektionen angewendet Der Cocaingehalt beträgt rund 71 Procent

† **Cocainum lacticum**, Cocainlactat, Milchsäures Cocain. $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot C_3H_5O_3$ Mol Gew. = 393

Zur Darstellung löst man in 10 Th. officineller Milchsäure (von 75 Proc Gehalt) 25,3 Th freies Cocain unter gelindem Erwärmen auf und lässt die Lösung über Schwefelsäure austrocknen

Honigartige Masse, leicht löslich in Wasser, namentlich mit Milchsäure kombiniert zu Injektionen bei Blasenleiden angewendet

† **Cocainum citricum** Cocaincitrat Citronensäures Cocain. $(C_{17}H_{21}NO_4)_3 \cdot C_6H_8O_7$ Mol. Gew. = 798

Zur Darstellung löst man 10 Th freies Cocain und 8,47 Th krystallisirte (nicht verwitterte) Citronensäure in möglichst wenig Wasser und dunstet die Lösung an einem warmen Orte ein

Farblose Krystalle, leicht löslich in Wasser Der Cocaingehalt beträgt 75,9 Proc Das Salz findet namentlich Anwendung in der Zahnheilkunde Dosis 0,003—0,06 g

† **Cocain-Aluminiumcitrat**. In welchen Mengenverhältnissen auch eine Lösung von Aluminiumcitrat mit Cocain oder Cocaincitrat zusammengebracht wird, stets bildet sich eine aus 3 Mol Aluminiumcitrat und 1 Mol Cocain bestehende Verbindung, welche sich bei entsprechender Concentration als faserig krystallinischer Niederschlag abscheidet Die Verbindung ist luftbeständig, in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leichter löslich, in Alkohol oder in Aether unlöslich, schmeckt schwach bitter, wirkt zunächst adstringierend und später anästhesierend

† **Cocainum stearinicum**, Cocainstearinat, Stearinsäures Cocain $C_{17}H_{21}NO_4 \cdot C_{18}H_{35}O_2$ Mol. Gew. = 587

Zur Darstellung schwemmt man 5,68 g gepulverte reine Stearinsäure (s S 114) in 50 cem destillirtem Wasser auf, giebt 20 cem Normal Natronlauge zu und erwärmt bis zur Auflösung Hierauf mischt man eine Lösung von 6,8 g Cocainchlorhydrat in 100 cem Wasser dazu, der entstehende Niederschlag wird gewaschen, getrocknet und aus Alkohol umkrystallisirt

Zu Büscheln vereinigte, weisse glänzende Nadeln, welche bei etwa 90° C schmelzen. Sie sind unlöslich in Wasser, dagegen löslich in etwa 100 Th Fett oder fetten Oelen Der Gehalt an Cocain beträgt 51,6 Proc Das Präparat wird namentlich zur äusseren Anwendung in Salben, besonders aber auch in Suppositorien empfohlen

† **Cocainum oleinicum**. Die unter diesem Namen gehenden Präparate sind keine einheitlichen Verbindungen Man löst trockne, freie Cocainbase unter gelindem Erwärmen in reiner Oelsäure, so dass der Gehalt an Cocain 5—10—15—25—50 Proc beträgt Diese Mischungen — deren Stärke vom Arzte anzugeben ist — lösen sich in Alkohol, Oelsäure und fetten Oelen Man gebraucht sie äusserlich zur lokalen Anästhesie, wenn der Gebrauch von Fettsubstanzen angezeigt ist.

†† **Cocainum cantharidatum**, Cocainum cantharidicum, Cocaincantharidat

Zur Darstellung werden 2 Mol Cocainhydrochlorid mit einer Lösung von 2 Mol Kantharidin in 2 Mol Natriumhydroxyd zusammengebracht. Auf geeignete Weise wird das gebildete Natrium abgeschieden und ein Additionsprodukt von Cocain und Kantharidin der Formel $(C_{17}H_{21}NO_4)_2 + C_{16}H_{11}O_4$ erhalten. Die näheren Bedingungen sind bisher nicht mitgeteilt worden.

Sehr vorsichtig aufzubewahren

Amorphes, weisses, geruchloses Pulver, von scharfem pfefferartigem Geschmack, in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leicht löslich.

Nach HENNIG zu 0,1 bis 0,5 Milligrammen mit Chloroformwasser gelöst zu subkutanen Injektionen bei tuberkulösen und syphilitischen Erkrankungen, Ozaena etc. nach der LIEBOWITZ'schen Methode, s. S. 603. Das Präparat soll vor dem kantharidinsäuren Natrium den Vortheil haben, keinerlei Irritationen hervorzurufen und die Injektionen weit weniger schmerzhaft zu machen als sie es mit dem Natriumsalz sind.

† **Cocainum phenylicum** Von diesem Präparat sind mehrere Modifikationen zu unterscheiden

1) **Cocainum phenylicum**, Phenol Cocain MERCK-OFFIZIEL $C_{17}H_{21}NO_4$, C_6H_5O = 397. Zur Darstellung werden 76 Th. freies Cocain in 24 Th. geschmolzenem Phenol aufgelöst. Honiggelbe Masse von Butterkonsistenz, von Krystallen durchsetzt. Fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether. Lokales Anästhetikum, Analgetikum und Sedativum. Subkutan in der Zahnheilkunde, mit Antifebrin gemengt zu Einreibungen in Rachen, Nase und Hals, desgl. mit Menthol. Innerlich 0,005—0,01 g 1—2 Mal täglich in Kapseln. Zur subkutanen Injektion verwendet man Lösungen in 50 procentigem Alkohol 0,007 10,0. 2) **Cocainum phenylicum** POISSOT 1 Th. Phenol, 2 Th. Cocain (freie Base), 40 Th. Vaselinöl und 20 Th. Arachisöl werden unter Erwärmen mit einander verbunden. Kommt in Tuben à 1 g in den Handel. 3) **Cocainum phenylicum** VIAU War eine Mischung von Cocainchlorhydrat mit Phenol, ist aber z. Z. nicht mehr im Handel.

† **Cocainum benzoicum**. Cocainbenzoat. Benzoësaures Cocain. $C_{17}H_{21}NO_4$, $C_7H_5O_2$. Mol. Gew. = 425

Zur Darstellung neutralisirt man bei Anwesenheit einer hinreichenden Menge Wasser 10 Th. Benzoesäure mit rund 25 Th. freiem Cocain und bringt die filtrirte Lösung durch Abdunsten an einem warmen Orte zur Krystallisation.

Farblose, in 15 Th. Wasser lösliche Krystalle. Die Lösung soll sich angeblich besser halten als die des salzsauren Salzes und bei subkutaner Injektion keine Schmerzen verursachen.

† **Cocainum saccharinum**, Cocainsaccharinat $C_{17}H_{21}NO_4$, $C_7H_5SO_3N$ = 486. Man neutralisirt 10 Th. Saccharin mit 16,6 Th. freiem Cocain in verdünnter alkoholischer Lösung und dunstet die Lösung zur Trockne. Weisses, süß schmeckendes Pulver, namentlich zur Kehlkopfbehandlung bei Kindern angewendet. Enthält 62,3 Proc. Cocain.

† **Cocainum phthalicum**, Phthalsaures Cocain. Man löst 64,6 Th. Cocain und 35,4 Th. Phthalsäure in Wasser und dunstet die Lösung ein, zuletzt über Schwefelsäure. Sirupartige Flüssigkeit, welche bisher noch nicht krystallisirt erhalten wurde. Gebrauch subkutan wie das salzsaure Salz.

Cocaprinum. Cocaprin. Ist ein Gemisch von 1 Th. Cocainum hydrochloricum mit 99 Th. Antiprin. Wird in Form von Pastillen von 0,2 g Gewicht bei Halsaffektionen empfohlen. Man läßt 3—4 Pastillen auf der Zunge zergehen.

II **Synthetisches Cocain**. Egoninderivate. Aus dem stickstoffhaltigen Spaltungsprodukte des Cocaïns, dem Egonin, kann auf 2 Wegen Cocain synthetisch dargestellt werden.

1) Man benzoylirt zunächst das Egonin durch Behandlung desselben mit Benzoylchlorid oder Benzoesäureanhydrid und methylirt hierauf das gewonnene Benzoylegonin durch Auflösen desselben in Methylalkohol und Einleiten von Salzsäuregas.

2) Man stellt aus Egonin zunächst durch Auflösen desselben in Methylalkohol und Einleiten von Salzsäuregas den Methylester dar und führt diesen durch Erhitzen mit Benzoylchlorid in das Benzoylderivat des Cocaïns über.

Diese Verfahren werden technisch verwertet, indem aus den in den Cocablättern enthaltenen Egoninderivaten (den sog. „Nebenalkaloiden“ der Coca), dem Cinnamyl- und dem Isatropylcocain, durch Spaltung derselben mit Salzsäure zunächst Egonin und aus letzterem mit Hilfe dieser Methoden künstliches Cocain mit denselben Eigenschaften wie das natürliche gewonnen werden kann. Die bei der Spaltung des Isatropylcocains neben Egonin erhaltene Säure $C_9H_8O_2$ wird Isatropasäure, Cocasäure, Truxillsäure genannt.

Substituiert man in dem obigen Verfahren den Methylalkohol durch andere Alkohole, das Benzoylchlorid durch andere Säurechloride, so erhält man eine ganze Anzahl von alkylirten Acylierungsprodukten des Egonins, welche in ihrer physiologischen Wirkung dem Cocain nahe stehen.

Von solchen Körpern sind unter anderen folgende bekannt:

Cocaeihylin, Aethyl-Benzoyl-Egonin, Homococain, $C_{15}H_{21}NO_4$, wird synthetisch dargestellt, indem man Egonin in den Aethyläther verwandelt und diesen alsdann benzoyliert. Krystallisiert aus Alkohol in farblosen, glänzenden Prismen. Schmelzpunkt $109^{\circ}C$.

Die Base und ihre Salze wirken gleichfalls anästhesierend wie das Cocain selbst, aber quantitativ schwächer. Sie werden deshalb bisweilen — aber selten — bei nervösen Patienten angewendet.

Cinnamylcocain, $C_{16}H_{19}CHO(C_6H_5O)CH_2COOCH_3$, bildet kurze, glänzende, prismatische Krystalle. Schmelzpunkt $121^{\circ}C$. Es ist aus Egoninmethyläther und Cinnamylchlorid synthetisch dargestellt worden und ist auch in den Cocablättern enthalten, aus welchen es mit dem künstlichen völlig identisch isoliert werden kann. Dieses Cocaalkaloid wird durch Kaliumpermanganat sehr leicht oxydirt und können Verunreinigungen des Cocains mit demselben dadurch leicht erwiesen werden.

γ **Isatropylcocain**, $C_{15}H_{21}NO_4$, wurde synthetisch durch Einleiten von Chlorwasserstoff in die methylalkoholische Lösung von γ Isatropylegonin gewonnen, welches am besten durch Einwirkung von γ -Isatropasäureanhydrid $(C_6H_5O)_2O$ auf Egonin dargestellt wird. In den Cocablättern ist dieselbe Base enthalten. Dieses Alkaloid ist amorph und bildet amorphe Salze. Es ist leicht löslich in Alkohol und Aether und unterscheidet sich von Cocain durch seine schwere Löslichkeit in Ligroin und in Ammoniaklösung. Es ist sehr giftig, wird aber durch Kaliumpermanganat nicht oxydirt. S. unter Prüfung.

Benzoyl- ψ -tropin, **Tropacocain**, **Tropsin**, $C_{15}H_{17}NO(C_6H_5O)$. Dieses vorzugsweise in der Java-Coca enthaltene Alkaloid ist von grossem theoretischen Interesse. Das selbe ist nicht nach dem Schema der Cocabasen Alkohol + aromatische Säure + Egonin — Wasser zusammengesetzt, sondern nach dem der Tropaïne aromatische Säure + ψ -Tropin — Wasser. Die Base bewirkt starke lokale Anästhesie, während die mydratische Wirkung unbedeutend ist. Es kann daher dieses Alkaloid als ein weiteres Bindeglied zwischen der Cocain- und Atropingruppe betrachtet werden. — Die freie Base schmilzt bei $49^{\circ}C$, ist optisch inaktiv, äusserst leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und Ligroin und bildet krystallisierte Salze, von denen sich das Bromhydrat $C_{15}H_{17}NO_2 \cdot HBr$ durch Schwerlöslichkeit in Wasser auszeichnet. Durch Erhitzen mit Salzsäure wird die Base in Benzoesäure und ψ -Tropin gespalten.

Rechteegonin, **Rechtscocain**. Erwärmt man Egonin oder Egoninderivate (Benzoyleggonin, Cocain u. a. m.) 24–72 Stunden lang mit einer konzentrierten (30 proc.) Aetzkalilösung, so lässt sich aus dem Reaktionsgemisch eine neue, optisch rechtsdrehende Base, das **Rechts-Egonin** isolieren. Das **Rechts-Egonin** krystallisiert aus Alkohol in tafelförmigen Krystallen vom Schmelzpunkt $254^{\circ}C$ (der Schmelzpunkt des Egonins liegt bei $198^{\circ}C$). **Rechts Egonin** ist in absolutem Alkohol viel schwerer löslich als Egonin.

Aus dem **Rechts Egonin** lassen sich auf dieselbe Weise wie aus dem Egonin alkylirte und acylirte Derivate gewinnen, welche das polarisierte Licht nach rechts drehen und den Linksegoninderivaten analog physiologisch wirken. Ein das meiste Interesse beanspruchender Repräsentant dieser Reihe ist das **Rechts-Cocain**. Dieses Alkaloid kann in prismatischen Krystallen erhalten werden. Schmelzpunkt 43 – $45^{\circ}C$.

Das Chlorhydrat krystallisiert aus Alkohol in grossen (wahrscheinlich monoklinen) Blättern vom Schmelzpunkt $205^{\circ}C$. (Das Links-Cocamechlorhydrat bildet, aus absolutem Alkohol krystallisiert, breite (wahrscheinlich rhombische) Tafeln, Schmelzpunkt $181,5^{\circ}$). Es ist in Wasser viel schwerer löslich als das Chlorhydrat des gewöhnlichen Cocains.

Norcocain ist ein Derivat des Cocains, welches an Stelle einer Methylamidgruppe eine Imidgruppe enthält.


Wirkt stärker anästhesierend, aber auch giftiger als Cocain.

III Aneson Anesin. Zunächst unter dem Namen Anesin, alsdann unter dem Namen Aneson wurde 1897 durch die chemische Fabrik **HOFFMANN, LA ROCHE & Co** in Basel ein Ersatzmittel für das Cocain in den Handel gebracht, welches sich als eine 2proc wässrige Auflösung des von **WILGERODT** zuerst dargestellten Aceton-Chloroform heraus gestellt hat

Aceton-Chloroform $(CH_3)_2CO \cdot CHCl_3$. In eine Mischung von 500 g Aceton und 100 g Chloroform, welche durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser kuhl gehalten wird, trägt man allmählich in kleinen Portionen 300–350 g gepulvertes (!) Aetzkali unter Umschwenken ein. Man regulirt den Zusatz so, dass die Flüssigkeit in nicht zu lebhaftes Sieden geräth. Wenn alles Aetzkali eingetragen ist und die Flüssigkeit sich unter Abscheidung eines pulverigen Salzes geklärt hat, so filtrirt man ab und wäscht den auf dem Filter verbleibenden Rückstand mit Aether nach.

Hierauf destillirt man den Aether aus dem Wasserbade ab und unterwirft die zurückbleibende Flüssigkeit der Destillation über freier Flamme. Es geht zunächst etwas Aceton und Chloroform, dann Wasser über und bei $167^\circ C$ destillirt eine farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit über, das Acetonchloroform. Aus diesem scheiden sich bei längerem Stehen Krystalle ab, welche im wasserfreien Zustande bei $96^\circ C$ schmelzen. Ferner erstarrt das Oel sehr rasch zu Krystallen, wenn man es mit etwas Wasser zusammenbringt. Man erhält alsdann Krystalle, welche bei $80-81^\circ C$ schmelzen und dem Hydrat $(CH_3)_2CO \cdot CHCl_3 + \frac{1}{2} H_2O$ entsprechen.

Ueber die nähere Zusammensetzung des sogen Acetonchloroforms ist man sich noch nicht recht im Klaren. Eine blosse additionelle Verbindung von Chloroform und Aceton ist es wohl nicht. Man nimmt vielmehr an, dass die Krystalle aus festem tertiären Tri-chlorbutylalkohol bestehen, welcher aus dem flüssigen Acetonchloroform durch Umlagerung entstanden ist.



Die Namen Acetonchloroform und tertiärer Trichlorbutylalkohol werden übrigens für die **WILGERODT'sche** Verbindung promiscue gebraucht.

Das Acetonchloroform stellt farblose oder schwach gelbliche Krystalle dar, welche im wasserfreien Zustande bei $96^\circ C$ schmelzen. Infolge Anziehung von Wasser sinkt der Schmelzpunkt ganz erheblich, das schon erwähnte Hydrat mit $\frac{1}{2}$ Mol H_2O schmilzt bei $80-81^\circ C$. Es riecht eigenthümlich kampherartig, besitzt ein sehr hohes Sublimationsvermögen und ist unter gewöhnlichen Umständen so gut wie unlöslich in Wasser, dagegen leicht löslich in Alkohol, Aether und in Aceton.

Uebergiesst man es mit Wasser, schüttelt es mit etwas Jod und fügt Natronlauge zu, so erfolgt momentan die Bildung von Jodoform. Dagegen tritt beim Erhitzen mit Anilin und alkoholischer Kalilauge der Geruch nach Isonitril nicht auf.

Das Aneson ist nun eine 2proc wässrige Lösung des beschriebenen Acetonchloroforms. Ueber die Darstellung dieser Lösung ertheilten uns die Herren **HOFFMANN-LA ROCHE & Co** folgende briefliche Auskunft: „Längere Zeit unter Druck mit überhitzten Dämpfen erhitzt, lässt sich eine wässrige Lösung herstellen, doch ist die Darstellung dieser Lösung in ihren einzelnen Phasen Fabrikgeheimniss der Firma **HOFFMANN-LA ROCHE & Co**“.

Das Aneson ist eine wasserklare, neutrale, kampherartig riechende Flüssigkeit vom spec Gew 1,0, welche durch Silbernitrat anfangs nicht getrübt wird. Bei längerem Stehen wird jedoch Silber ausgeschieden. — Schüttelt man sie mit etwas Jod und fügt Natronlauge hinzu, so erfolgt momentan Ausscheidung von Jodoform, dagegen tritt beim Erhitzen mit Anilin + alkoholischem Kali Geruch nach Isonitril nicht auf. — Erhitzt man Aneson in einem Probirglas oder in einem Kolbchen, so beschlägt sich der kältere Theil des Gefässes (der Gefässhals) mit langen Nadeln von festem Acetonchloroform.

Aneson wurde von **VAMOSSY** als örtliches Anästheticum erkannt, welches sowohl bei der Applikation auf Schleimhäuten als auch bei subkutaner Injektion (**SCHLEICHER'sches** Ver-

fahren) anästhesirend wirkt. Und zwar soll das Aneson etwa ebenso stark wirken, wie eine 2,5 proc. Lösung von Cocaïnchlorhydrat, dabei aber erheblich weniger toxisch sein als diese.

Coccionella.

Coccionella (Ergänzb. Helv.). **Coccus** (Brit. U-St.). **Cochenille** (Gall.). **Alker-meskörner**. **Kaktus-Schildlaus**. **Cochineal**.

Die Droge wird geliefert von den getrockneten, befruchteten Weibchen der Nopalschildlaus **Coccus Cacti** L. (Hemiptera—Coccidae), die auf mehreren Opuntiaarten (Cactaceae) lebt. Heimisch in Mexiko, dort und in Honduras, Guatemala, San Salvador, auf den kanarischen Inseln und auf Java gezüchtet.

Beschreibung. Das Weibchen ist ungefügelt, dunkelbläulichroth, vor der Befruchtung 2 mm lang, eiförmig, der Kopf mit kurzem Saugrüssel und kurzen, seitlich gerichteten, achtgliedrigen Antennen, die drei unmittelbar hinter dem Kopf befindlichen Körpersegmente tragen drei Paare von Beinen. Nach der Befruchtung schwillt das Weibchen um mehr als das Doppelte an. (Fig. 204w)

Die Männchen haben zwei lange, weiss bestäubte Flügel und zwei lange Schwanzborsten. (Fig. 204m.)

In den Kaktusplantagen werden die Weibchen, bevor die Eier völlig entwickelt sind, vorsichtig gesammelt und durch heisse Wasserdämpfe, Schwefel- oder Kohlendunst getödtet, in der Sonne oder in Oefen getrocknet. Die Thiere sind dann linsengross, halbkugelig, auf der Unterseite flach oder vertieft, zusammengeschrunpft, quersförmig, in Wasser schwellen sie wieder auf und lassen die einzelnen Körpertheile erkennen. Aussen sind sie grau oder weisslich bestäubt oder schwarzroth.

Sie lassen sich leicht zu einem dunkelrothen Pulver zerreiben. Geruchlos, Geschmack etwas bitterlich und beim Zerkauen den Speichel intensiv violettroth färbend.

Bestandtheile. Der rothe Farbstoff ist die glukosidische, krystallisirbare Carminsäure oder Carminroth $C_{11}H_{10}O_6$. Gehalt hiervon durchschnittlich 9—10 Proc., aber nach den Sorten sehr schwankend. Nach anderer Angabe ist die Carminsäure ein Gemenge von vier Körpern. Ferner 6—18 Proc. Fett, 4—8 Proc. Wasser und 3—6 Proc. Asche. Der weisse Ueberzug besteht aus einem wachsartigen Körper Coccocerin, er beträgt 0,5 bis 4,2 Proc. und liefert beim Verseifen zwei Körper Coccocerylsäure und Coccocerylalkohol.

Sorten. Die in Oefen getrocknete Cochenille ist am stärksten weiss bestäubt, sie liefert die Silbercochenille (*Grana jaspeada*), die in der Sonne getrocknete ist grau (*Grana renegrida*), die auf Metallplatten getrocknete schwarzroth (*Grana negrilla*). Nach anderen Angaben ist die Behandlung beim Trocknen ohne Einfluss auf das Aussehen: die silbergraue soll aus jungen Weibchen bald nach der Befruchtung bestehen, die schwarzrothe aus Weibchen nach dem Legen der Eier. Jede dieser Sorten zerfällt wieder in zahlreiche Untersorten, deren Benennungen wenig übereinstimmen. — Ausser diesen von gezüchteten Insekten gelieferten Sorten kommt eine Sorte *Granilla* vor, die von wilden Insekten geliefert wird, unter welchen Namen aber auch unentwickelte und zerbrochene Insekten der andern Sorten, die man durch Absieben gewinnt und die daher reichlich mit Resten der Pflanze und mit Erde (Asche bis 50 Proc.) verunreinigt sind, verstanden werden.

Als beste Sorten gelten *Zacatella* (*Sacatilla*) und *Honduras*. Was gegenwärtig im Handel ist, stammt meist von den kanarischen Inseln.

Ausserdem verfälscht man schwarze Sorten mit dunklem Sand und helle mit Schwer-spath, indem man sie aufweicht, mit dem Verfälschungsmittel und einem Klebstoff be-




Fig. 204.

handelt und dann wieder trocknet. Der Gehalt an BaSO_4 ist bis zu 25 Proc gefunden worden.

Werthbestimmung 1) Durch Titration mit Ferrocyankalium in alkalischer Lösung 1 g zerriebene Cochenille wird mit 25 g Kalilauge ($5\text{KOH} + 20\text{H}_2\text{O}$) eine Stunde digerirt, mit Wasser zu 100 ccm aufgefüllt und mit 1proc Ferrocyankaliumlösung solange titirt, bis die rothe Farbe in braunlichgelb übergegangen ist

2) Durch Titiren mit Kaliumpermanganat in saurer Lösung 2 g unzerkleinerte Cochenille werden mit $1\frac{1}{2}$ Liter Wasser eine Stunde gekocht, durchgeseiht und noch einmal mit 1 Liter Wasser $\frac{1}{4}$ Stunden gekocht. Die gesammelten Flüssigkeiten werden nach dem Erkalten zu 2 Liter aufgefüllt und 100 ccm davon mit Indigokarmin versetzt, zu 750 ccm aufgefüllt und mit Chamaeleon titirt. Nach dem Abzug der zur Entfärbung des Indigokarmins verbrauchten Menge, die man vorher bestimmt hat, bleibt die für die Cochenille verbrauchte Menge

In beiden Fällen benutzt man zum Vergleich eine Standardsorte, z B für schwarzrothe Cochenille Zacatalla, für silbergraue Honduras

Pulverung Wegen ihres Fettgehaltes ist die Cochenille schwer in ein feines Pulver zu verwandeln. Man trocknet sie deshalb bei gelinder Wärme und zerreibt sie in einem Porcellanmörser (!) zu einem mittelfeinen Pulver. Entzieht man diesem das Fett durch Aether, so lässt sich daraus ein haltbares Pulvis subtilis deoleatus herstellen, das sich besonders zu längerer Aufbewahrung eignet

Anwendung. Bisweilen noch als Keuchhustenmittel zu 0,1–0,5 mehrmals täglich mit Kaliumkarbonat, als Farbstoff zu Mundwässern, zum Färben von Zahnpulvern, Zahnpasten und Pastillenmassen, doch ist hier ammoniakalische Karminlösung vorzuziehen. Die aus Cochenille bereitete rothe Tinte hat vor einer Anilintinte den Vorzug grosserer Beständigkeit der Schriftzüge

Im allgemeinen wird der Verbrauch der Cochenille durch die Anilinfarben stark beeinträchtigt

Coccionella germanica oder *polonica*, Johannishlut ist die auf den Wurzeln von *Scieranthus*, *Herniaria*, *Hieracium* in Mittel- und Osteuropa lebende *Porphyrophora polonica* Br. *Coccionella armenica*, Cochenille vom Ararat ist die in Armenien auf *Poa pungens* lebende *Porphyrophora Duhameli* Br. Beide sind gegenwärtig ohne pharmaceutische Bedeutung

Tinctura Coccionellae (Ergänzb.) **Tinctura Cocci** (Brit.) Cochenilletinktur **Tinctura de Cochenille** (Gall.) Ergänz. Grob gepulverte Cochenille 1 Th, Verdünnter Weingeist (60proc) 10 Th — Brit. Cochenille 100 g, Alkohol (45 vol %) 1000 ccm — Gall. Cochenille 10 g, Alkohol (80proc) 100 g

Tinctura Coccionellae pro analysi Die als Indikator beim Titiren von Carbonaten dienende Cochenilletinktur bereitet man (Ph. Germ. II) durch Ausziehen von 3 g gepulverter Cochenille mit 50 ccm Weingeist und 200 ccm destillirtem Wasser und Filtriren. Rothgelbe Tinktur, die durch Alkalien violett gefärbt, durch Kohlensäure nicht verändert wird.

Electuarium kermesinum.

Confectio Alkermes. Kermeskonfekt

Rp	Coccionellae	5,0
	Ligni Santali rubri	10,0
	Pulveris aromatici	5,0
	Sacchari albi	20,0
	Sirupi simplicis	q s

Latwerge gegen Keuchhusten der Kinder Haselnussgross mehrmals täglich.

Mixtura contra tussim convulsivam.

Keuchhustenuimixtur

I. nach ABELER

Rp	1 Coccionellae pulv	1,0
	2 Kali carbonici	3,0
	3 Sacchari albi	10,0
	4 Aquae destillatae	86,0

Man verreibt 1.–3 sorgfältig und fügt allmählich

4, hinzu. Theelöffel- bis eßlöffelweise.

II Form Russica.

Rp.	1 Coccionellae	0,6
	2 Kali carbonici	1,2
	3 Aquae destill	120,0
	4. Sirupi Aurantii flor	20,0

Man digerirt 1–3 drei Tage lang, filtrirt und fügt 4 hinzu. Theelöffelweis zu geben

III

Rp	Liquoris Ammonii anisati	10,0
	Kali bromati	5,0
	Tinct. Coccionell. ammon.	
	Aquae destillatae	
	Sirupi simplicis	aa 50,0

Pastilli Coccionellae DREYERICH.

Cochenille-Pastillen

Rp	Coccionellae pulv	50,0
	Sacchari pulv	250,0
	Massae Cacao	200,0

Zu 1000 Pastillen, jede mit 0,05 Cochenille.

Pulvis dentifriculus versicolor		
Rp	Cocconellae	1,0
	Aluminis	2,0
	Rhizom Iridis Florent.	80,0
	Tartari depurati	40,0
	Magnesi carbonici	5,0
	Osmum Sepiae	22,0
	Olei Rosae	gitt. V
Waissee, beim Befechten roth werdendes Pulver		

Pulvis nephriticus RADEMACHER.		
Rp	Cocconellae	5,0
	Magnesia ustae	20,0
2stündlich 1 Theelöffel		

Rubramentum		
Rothe Cochenilletinte.		
Rp	1 Cocconellae	5,0
	2 Kali carbonici	10,0
	3 Aquae destillatae	100,0
	4 Tartari depurati	80,0
	5 Aluminis kalini	2,0
	6 Spiritus (90%)	5,0
	7 Aquae destillatae	10,0
	8 Gummi arabici	5,0
	9 Olei Caryophyllorum	gitt. II
Man verreibt 1 mit 2, macerirt mit 3 zwei Tage, erhitzt mit 4 und 5, solange noch CO ₂ entweicht, fügt 6 hinzu und filtrirt. Das Filtrat wäscht man mit 7 nach, löst unter Schütteln 8 und 9 und bewahrt in kleinen, ganz gefüllten Flaschen liegend auf. Bei der Darstellung sind eiserne Geräthe zu vermeiden!		

Sirupus Cocconellae.		
Sirupus cordialis s. kermesinus (Münch. Vorschr.) Kermessaft Alkermessaft.		
Rp	1 Cocconellae	10,0
	2 Aluminis	0,25
	3 Kali carbonici	0,75

Hausbalsam von HERBST Cochenille 2,0, Kölnisches Wasser 100,0, Melissen-geist 600

Lippenfarbe aus Paris a) Ein glycerinhaltiger Cochenilleauszug b) Mit Rosenöl parfümirte Eosinlösung. Jedes Fläschchen zu 10 g kostet 10 Fr

STEBB'S Brustsaft ist ein mit Cochenille gefärbter Zuckersirup mit einer Spur Vanille

TAYLOR'S rother Trank. Eine mit Anis, Angelika- und Majoranöl versetzte Tinctura Cocconellae

Carminum (Erganzb.) Karminroth. Karmin. Dieser aus der Cochenille gewonnene prachtvolle Farbkörper wird von den einzelnen Fabrikanten nach verschiedenen, von ihnen geheim gehaltenen Verfahren dargestellt, welche nicht alle ein gleiches Produkt ergeben

Man kocht Cochenille mit Wasser aus, versetzt das Filtrat mit Alaunlösung und lässt es in flachen Gefäßen an der Luft stehen. Alsdann schlägt sich allmählich der Farbstoff auf dem Boden nieder und zwar sind die zuerst sich abscheidenden Theile die werthvollsten, die später sich abscheidenden sind minder werthvoll. Oder man kocht die Cochenille mit Natriumkarbonat enthaltendem Wasser aus, fügt Eiweiß- oder Hansenblase- oder Gelatinelösung, hierauf verdünnte Schwefelsäure hinzu, worauf sich der Farbstoff gleichfalls ausscheidet. Der mit Hilfe von Gelatine bereitete soll nicht so gut wie die anderen Sorten sein. Eisen ist bei der Darstellung auszuschließen.

Ueber die Zusammensetzung des Karmins ist etwas Sicheres zur Zeit noch nicht bekannt. Man weiss, dass er aus etwa 17 Proc. Wasser, 20 Proc. stickstoffhaltigen Substanzen, 7 Proc. Asche, 56 Proc. Farbstoff besteht und dass die Karminsäure C₁₁H₁₂O₆ eine Rolle bei der Bildung des Farbstoffes spielt. Wie dies aber geschieht, darüber fehlt ziemlich jede Aufklärung. **LOBBERMANN** nimmt an, dass der Karmin ein Thonerde Kalkaluminat ist und vergleicht ihn mit dem Türkischrothfarblack.

4. Aquae Rosae	175,0
5. Aquae Cinnamomi spirit	125,0
6. Aquae Melissae	125,0
7. Sacchari	500,0
Aus 1-6 stellt man durch einflüssiges Maceriren und Abseihen 400,0 her und löst dann 7	

II.		
Rp	1 Cocconellae pulv	2,0
	2 Kali carbonici	0,5
	3 Aquae destillatae	40,0
	4 Spiritus	5,0
	5 Sacchari	60,0
Man erhitzt 1-4 bis zum Sieden, filtrirt und löst 5		

Sirupus pectoralis		
Hustensaft (Münch. Vorschr.)		
Rp	Sirup Cocconellae	45,0
	Sirup Ipecacuanhae	20,0
	Sirup Senegae	15,0
	Sirup Papaveris	15,0
	Aquae Amygdalar amarar	2,5
	Tincturae Opii benzoe	2,5
60 g dieses Sirups geben mit 20 Tropfen Tinktur des Sirupus pectoralis compositus des Dr. STADLER		

Tinctura Cocconellae ammoniacalis		
Tinct Cocconellae JONAS		
Rp	Cocconellae pulverat.	85
	Liquoris Ammonii caust.	65
	Spiritus diluti (60%)	100,0

Tinctura Cocconellae RADEMACHER.		
Rp	Cocconellae pulv.	10,0
	Spiritus diluti	120,0
RADEMACHER'sches Nierenmittel		

Eigenschaften. Feurig-hochrothe, specifisch leichte Stücke, welche leicht zerreiblich sind und alsdann ein ausserst feines, zartes Pulver liefern. Eine der besten Karminsorten ist die als Naccarat bezeichnete. Karmin ist unlöslich in Wasser und in verdünnten Säuren, dagegen löst er sich auf in Ammoniakflüssigkeit. Die ammoniakalische Lösung ist violettroth gefärbt und hat ein charakteristisches Spektrum, welches man an einer Vergleichslösung kennen lernen muss.

Wegen seines hohen Preises ist der Karmin vielfachen Verfälschungen und Nachahmungen ausgesetzt, welche indessen verhältnissmässig leicht nachzuweisen sind. Namentlich kommen unorganische Substanzen (Thonerde, Baryumsulfat) vor, die mit Theerfarbstoffen, z. B. Eosin, Paeonin und Azofarbstoffen wie Ponceau und Biebericher Scharlach gefärbt sind.

Prüfung. 1) Das Karmin sei zart, leicht zerreiblich und hinterlasse nicht mehr als 9 Proc. Asche. Die Asche besteht im wesentlichen aus Thonerde + Kalk, bisweilen enthält sie auch noch kleine Mengen von Zinndioxyd. — Man achte beim Veraschen auf den Geruch, den die überhitzte Substanz verbreitet. Echter Karmin verbreitet Geruch nach versengten Federn. Die Imitationen mit Eosin lassen deutlichen Bromgeruch und der Paeoninlack deutlichen Geruch nach Phenol erkennen. 2) Er löse sich in verdünnter Ammoniakflüssigkeit fast vollständig nur mit Hinterlassung einiger Fleckchen von Thonerde auf. 3) Man halte sich einen „Typ“ einer guten unverfälschten Karminsorte. Hat man neuen Karmin bezogen, so verreibt man gleiche Mengen des Typs und der neuen Sorte mit je gleichen Mengen Stärke (also z. B. je 0,1 g Karmin mit 10 g Stärke) und vergleicht alsdann die Farb-Intensität und Farb-Nuance beider Mischungen.

Aufbewahrung und Anwendung. Man bewahre den Karmin vor Licht geschützt auf. Verwendung findet er in beschränktem Maasse zur Herstellung rother Tinte, ferner zum Färben von Nahrungs- und Genussmitteln, zur Herstellung von Tinktionsflüssigkeiten für die mikroskopische Analyse, zum Schminken. Für den letzteren Zweck verreibt man ihn zweckmässig mit dem gleichen Gewicht Reisstärke, weil er dann ökonomischer ist und nicht so intensiv färbt. Karmin ist nicht gesundheitsschädlich.

Carminum pro usu mercatorio		Rubramentum carminicum	
Rothe Schminke		Rothe Karminfarbe	
Bp.	Carminum rubrum	Bp.	Carminum rubrum 10,0
	Amyli Oryzae aa		Tincturae Ammoniacae causticae (10 %) 300,0
			Aquae destillatae ss 300,0
	Charta carminica		Gummi arabici pulv. 30,0
Filterpapier, mit einer ammoniakalischen Carminlösung getränkt. Als Reagenspapier.		Die Tinte muss mit Glaseisem geschrieben und stets gut zugestopft gehalten werden.	

Acidum carminicum Karminsäure. $C_{11}H_{14}O_6$. Mol. Gew. = 240. Eine nach kompliziertem Verfahren aus der Cochenille abgeschiedene Säure. — Ein rothes Pulver oder kleine rothe Lamellen, welche sich in 2 Th. Wasser sowie in Alkohol lösen.

Die Verbindung diente bisher namentlich zur Darstellung von Tinktionsreagentien für die mikroskopische Analyse, neuerdings benutzt man die konc. Lösung (1:2) auch zum Nachweis kleinster Mengen gelbster Erweissverbindungen, welche durch die Säure gefällt werden. Es soll sogar möglich sein, einzelne Erweissarten durch dieses Reagens zu unterscheiden.

Karminsaures Ammoniak. 1) Nach Th. HARTIG. Käuflcher, fein geriebener Karmin wird mit Wasser angerührt und dann tropfenweise Ammoniakflüssigkeit zugesetzt, bis vollständige Lösung erfolgt ist. Die Lösung wird darauf filtrirt und zur Trockne verdampft. Das Pulver wird je nach Bedarf in Wasser gelöst. 2) Nach BACHMANN. Man reibe 0,2–0,4 g guten Karmin recht fein, reibe mit 80 ccm destillirtem Wasser an und setze einige Tropfen Ammoniakflüssigkeit dazu. Ein Theil des Karmins löst sich, worauf die Lösung filtrirt und mit 80,0 g Glycerin und 8 ccm Alkohol versetzt wird. Rasch sieht man deutlich nach Ammoniak, so lässt man sie bis zum Verschwinden des Geruches offen stehen.

Borax Karmin. Man löst 4 Th. Borax in 56 Th. Wasser. Hierzu fügt man 1 Th. Karmin und vermischt nun je 1 Volumtheil des Ganzen mit 2 Volumtheilen absolutem Alkohol, worauf man filtrirt.

Alaun-Karmin nach GRENACHER Eine Lösung von 5,0 Alaun in 100,0 destillirtem Wasser wird im Sandbade bis zum Aufkochen erwärmt, worauf man 1 g Karminpulver zufügt, und 20 Minuten kochen gelassen. Nach Hingewegnahme der Flamme ruht man mit einem Glasstabe um, bis die Flüssigkeit Zimmertemperatur angenommen hat, filtrirt und bewahrt in gut verschlossener Flasche auf.

Lithium-Karmin nach ORTÉ In 100,0 einer gesättigten wässrigen Lösung von Lithiumkarbonat trägt man 2,5 Karminpulver unter Umrühren ein und filtrirt.

Pierokarmin nach FREY Man mischt 1 g Karmin, 4 cem Ammoniakflüssigkeit und 200 cem destillirtes Wasser und setzt 5 g Pikrinsäure hinzu. Dann schüttelt man um und lakanthirt, so dass der nicht gelöste Ueberschuss der Pikrinsäure im Glase zurückbleibt. Die abgessene Flüssigkeit wird einige Tage stehen gelassen, wobei man sie öfters umschüttelt. Hierauf bringt man sie in eine flache Schale und setzt sie an der Luft der Verdunstung aus. Es dauert mehrere Wochen, bis die Flüssigkeit verdunstet und ein rothes Pulver zurückgeblieben ist. Dieses wird mit der 50fachen Gewichtsmenge Wasser angerührt und nach einigen Tagen filtrirt. Die Flüssigkeit muss jetzt gelblichroth sein, ohne Geruch nach Ammoniak. Ein Tropfen auf weissem Filterpapier eingetrocknet, muss einen gelben, rothgeränderten Fleck geben. Man konservirt die Flüssigkeit durch einige Tropfen Karbolsäure.

Blauer Karmin, Indigokarmin, ist indigosulfosaures Natrium, s. Indigo.

Karmin-Lacke. Die im Handel als Karminlack, Florentiner Lack, Venezaner Lack, Wiener Lack, Münchener Lack, Pariser Lack, Kugellack vorkommenden Farbkörper sind in der Regel Verbindungen der Karminsäure mit Thonerde oder Zinnoxid, meist gemischt mit überschüssigem Thonerde- oder Zinnoxidhydrat.

Karmin zum Färben der Wurst ist ammoniakalische Karminlösung.

Nail-Powder, zum Färben der Fingernägel, ist eine parfümirte Mischung aus 1 Th Karmin und 100 Th Zinnoxid.

Roselline, von ROSE in Hamburg, eine Fleischfarbe, besteht aus 25 Th rothem Karminlack, 20 Th Borsaure, 850 Th Wasser (Polenske).

Rothe Farbe 1) für Zuckerwaaren, Liköre u. dergl. 10 Th Karmin löst man in einer Porcellanschale (!) in 20 Th Salmiakgeist, fugt 100 Th Glycerin zu, verjagt das Ammoniak durch Erwärmen im Wasserbade und verdünnt mit q s Wasser auf 1000 Th. 2) für Fleisch- und Zuckerwaaren. Carmin 50,0 werden mit Syrupi Sacchari 950,0 ein angerieben. Vor dem Gebrauche umzuschütteln.

Saftroth, Succus ruber, ist entweder eine ammoniakalische, mit Gummi versetzte Karminlösung, oder eine Abkochung von Fernambukholz, die man mit Zinnchlorid fällt, worauf der Niederschlag in Ammoniak gelöst und mit Gummilösung versetzt wird. Für Küchenzwecke giebt es im Handel ein Saftroth in Stängeln.

Cocculus.

1) Gattung der Menispermaceae — Cocculeae — Menispermatae.

Cocculus Leaebe D C Heimisch durch das ganze tropische Afrika. Arzneiliche Verwendung als Diureticum und gegen Fieber findet die Wurzel mit mehreren concentrischen Gefässkreisen. Sie enthält 0,13 Proc Colombin und zwei Alkaloide, das crystallinische Sanguin zu 3,09 Proc und das amorphe Pelosin zu 2,11 Proc — Aus den Früchten bereiten die Araber ein gegohrenes Getränk „Khumm vol majnoon“.

Cocculus laurifolius D C in Hinterindien, enthält ein wie Curare wirkendes Alkaloid Cocclaurin in der Rinde und in den Blättern.

Cocculus filipendula Mart in Brasilien, dient als energisches Diureticum.

2) † **Fructus Cocculi Semen Cocculi indic. Cocculi indic s levantini. Gallae orientales. Baccae piscatoriae.** — Kockelskörner. Kockelsamen. Fischkörner. Tollkörner. Kukukssaat. Lüssesamen. — Coque du Levant (Gall.) — Cockles. Sind die Steinfrüchte der zu den Menispermaceae — Tinosporaceae gehörigen **Anamirta Cocculus (C) Wight et Arn** (syn *Anamirta paniculata* Colebr.), einem in Vorder- und Hinterindien verbreiteten Schlingstrauche mit grossen, ledrigen, arunden, an der Basis gestutzten oder herzförmigen Blättern und kleinen düsschen Blüthen, die grosse Ruspeln bilden.

Beschreibung. Die Früchte sind eiförmig oder fast kuglig-nierenförmig, 1 cm im Durchmesser. Die grosse Narbe des Fruchtsoteles steht etwas seitlich und infolge des nach einer Richtung geförderten Wachstums ist dicht daneben, durch eine seichte Einbuchtung getrennt, die Spitze der Frucht aussen grob-runzelig, schwarzbraun oder graubraun. Die dünne Fruchtschale umschliesst den durch die Wucherung des „Condylus“ halbkugelig ausgehöhlt gestalteten Samen, der aussen bräunlich und runzelig, innen olig fleischig ist. Er besteht aus dem Endosperm, das den Embryo mit zwei flachen, dünnen Kotyledonen umschliesst.

Die Steinschale des Perikarps besteht aus nach verschiedenen Richtungen verlaufenden, ineinander verflochtenen, stark verdickten Fasern. Im Endosperm fettes Öl und Proteinkörner. Im Gewebe zahlreiche nadelförmige oder grössere prismatische Krystalle. Das Pericarp ist geruch- und geschmacklos, die Samen schmecken stark bitter.

Bestandtheile. In den Samen bis 1 Proc. Pikrotoxin (vergl. bes. Artikel) und ungiftiges Pikrotin. Nach anderer Angabe besteht das Pikrotoxin aus einer lockeren Verbindung von Pikrotoxinin und Pikrotin. In der Fruchtschale angeblich zwei nicht giftige Alkaloide Menispermia und Paramenispermia. Die Samen enthalten bis 50 Proc. Fett (Stearin).

Aufbewahrung. Unter den starkwirkenden Arzneimitteln.

Anwendung. In Pulverform gegen Krätze und zur Vertilgung der Läuse, nur mit Vorsicht zu gebrauchen, da bei wunder Haut Vergiftungen vorkommen können. Die Verwendung zum Fischfang ist ein verwerflicher Missbrauch. Man hat beim Menschen nach dem Genuss von zwei Früchten heftige Vergiftungserscheinungen beobachtet, und 2,4 g des Pulvers haben den Tod herbeigeführt. Als Gegenmittel sind bis zum Eintreffen ärztlicher Hilfe Brechmittel angezeigt.

† † **Picrotoxinum** (Brit. U-St. Ergänzb.) **Picrotoxine** (Gall.) **Picrotoxin.** **Cocculin Menispermium.**¹⁾ **Pikrotoxinsäure** $C_{30}H_{44}O_{11}$. Mol. Gew. = 802.

Als Formel für diesen in den Kokkelskörnern enthaltenen Bitterstoff wird der oben angegebene Ausdruck $C_{30}H_{44}O_{11}$ angenommen (Gall. = $C_9H_{10}O_4$). Dieser bezieht sich auf das Präparat, welches zur Zeit als „Pikrotoxin“ im Handel vorkommt. Es kann aber als ziemlich sicher angenommen werden, dass das Pikrotoxin als eine Verbindung zweier verschiedener Körper, Pikrotoxinin und Pikrotin anzusehen ist. Siehe S. 887 unten.

Darstellung. A) Gepulverte Kokkelskörner werden durch heisse Pressung vom grössten Theile des in ihnen enthaltenen Fettes befreit, darauf wiederum zerkleinert und nun dreimal mit siedendem Wasser ausgezogen. Man versetzt die Auszüge mit Bleiacetat im Ueberschuss, filtrirt den entstandenen Niederschlag ab und entbleit das Filtrat durch Sättigen mit Schwefelwasserstoff. Man filtrirt hierauf vom Schwefelblei ab und dampft das Filtrat auf ein kleines Volumen ein. Nach mehrtägigem Stehen in der Kälte sammelt man die ausgeschiedenen Krystalle und krystallisirt sie zunächst aus siedendem Wasser, zum Schluss unter Zusatz von etwas Thierkohle aus siedendem starken Alkohol um (E. Schmidt).

B) Die entfetteten Kokkelskörner werden 2–3 Mal mit heissem Alkohol extrahirt. Man destillirt von den alkoholischen Auszügen den Alkohol ab und entfettet das Extrakt mit Petroläther, worauf man die im Rückstand verbleibenden Krystallmassen durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser und siedendem starken Alkohol reinigt.

Eigenschaften. Die im Handel vorkommenden Präparate zeigen einen von 192–200° C schwankenden Schmelzpunkt. Durch 2–3 maliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser kann man aus den Handelspräparaten in einer Ausbeute von etwa 98 Proc. ein Pikrotoxin erzielen, welches konstant bei 199–200° C schmilzt. Diesen Schmelzpunkt von 199–200° C haben für die von ihnen rezipirten Präparate acceptirt Gall., U-St., Ergänzb., während Brit. den Schmelzpunkt 192,2° C angiebt. Davon ab-

¹⁾ Nicht zu verwechseln mit dem in Amerika gebrauchten „Menispermium“, einem aus dem Rhizom von *Menispermum Canadense* hergestellten Extrakt.

gesehen hat die heute noch als Pikrotoxin bezeichnete Substanz folgende Eigenschaften: Farblose, geruchlose, gegen 200°C schmelzende, nadelförmige, meist sternförmig gruppirte Krystalle (rhombische Prismen) von stark bitterem Geschmack, welche an der Luft unveränderlich sind. Sie lösen sich in etwa 150 Th kaltem, etwa 25 Th. siedendem Wasser, ferner in 10 Th. kaltem oder in 3 Th. siedendem Alkohol. Sie lösen sich ferner leicht in Essessig, schwer dagegen in Aether, Benzol oder Chloroform. Auch Natronlauge und Ammoniak lösen reichliche Mengen, so dass also starken Basen gegenüber das Pikrotoxin die Eigenschaften einer schwachen Säure hat, doch sind die so entstehenden Salze unbeständig und mangelhaft charakterisirt.

Die wässrige Lösung ist neutral und reducirt in der Wärme ammoniakalische Silbernitratlösung und auch Fehling'sche Lösung. Die alkoholische Lösung lenkt die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab.

Aus der ammoniakalischen Lösung wird das Pikrotoxin durch basisches Bleiacetat (Bleessig) gefällt. Von Identitäts Reactionen sind folgende anzuführen:

1) Konc. Schwefelsäure löst das Pikrotoxin mit orangerother Farbe, die durch eine Spur (!) Kaliumdichromat in Violett durch etwas mehr Kaliumdichromat in Braun übergeht. 2) Mischt man das Pikrotoxin mit der dreifachen Menge Kaliumnitrat, durchfeuchtet das Gemenge mit konc. Schwefelsäure und setzt alsdann starke Natronlauge (von 38 Proc. NaOH) im Ueberschuss hinzu, so tritt lebhafte Rothfärbung ein (Langley'sche Reaction). 3) Bringt man auf ein Uhrglaschen ein kleines Körnchen Pikrotoxin, lässt auf dasselbe einen Tropfen einer Lösung von 1 Th. Benzaldehyd in 4 Th. absolutem Alkohol sowie, einen Tropfen konc. Schwefelsäure tropfen (ohne zu schwenken oder zu rühren), so entsteht von dem Pikrotoxin ausgehend prachtvoll karminrothe Färbung. In der Mischung von Benzaldehyd + Alkohol entsteht durch Schwefelsäure nur hellgelbe Färbung, in welcher sich die rothe Färbung gut abhebt. Eine ähnliche Reaction giebt das Cholesterin (Malzan). Codein giebt unter den gleichen Verhältnissen gelbe bis blutrothe Färbung.

Prüfung. Dasselbe kann sich darauf beschränken, das das Präparat farblos ist, den richtigen Schmelzpunkt zeigt und beim Erhitzen auf dem Platinbleche ohne einen Rückstand zu hinterlassen, verbrennt.

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, in der Reihe der direkten Gifte, in der Abtheilung Pflanzengifte bez. Alkaloïdea, obgleich es systematisch nicht zu diesen gehört.

Anwendung. Pikrotoxin gehört zu den heftigsten Giften und erzeugt in grösseren Gaben stupor (Betäubung) und heftige, durch Reizung des Krampfcentrums bedingte Krämpfe. Es ist früher als Ersatz des Strychnins bei Epilepsie und Lähmung empfohlen worden, wird jetzt hier aber nicht mehr gegeben. Aeusserlich in Salben 0,3—0,5 und 25,0 Fett bei chronischen Hautkrankheiten und zur Vertreibung von Kopfschmerzen (nicht zu empfehlen). Innerlich und subkutan in Gaben von 0,001—0,01 in wässriger Lösung gegen die Nachtschweisse des Phthisiker. Es wirkt fast ebenso sicher wie Atropin und kann wegen des Fehlens unangenehmer Nebenwirkungen länger als dieses gegeben werden. — Höchstgaben *pro dos* 0,01 g, *pro die* 0,02 g (Erganzb.)

Das Pikrotoxin ist kein einheitlicher Körper, sondern eine Verbindung zweier Substanzen, des Pikrotoxins $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_4$ und des Pikrotins $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_4$. Es kann in diese beiden Körper schon durch Auskochen mit grösseren Mengen Benzol zerlegt werden und zwar geht hierbei das Pikrotoxin in Lösung, während das Pikrotin zurückbleibt. Löst man ein Gemisch von 54,5 Th. Pikrotoxinin und 45,5 Th. Pikrotin in siedendem Wasser auf, so krystallisirt wieder Pikrotoxin vom Schmelzpunkt $199\text{--}200^{\circ}\text{C}$ aus. Das Pikrotoxinin, welches bei $200\text{--}201^{\circ}\text{C}$ schmilzt, ist der Träger der Giftwirkung der Kokkelskörner und erheblich giftiger als Pikrotoxin, das Pikrotin, welches bei $248\text{--}250^{\circ}\text{C}$ schmilzt, scheint ungiftig oder doch weniger giftig zu sein.

Cochlearia.

Gattung der Cruciferae—Sinapeae—Cochleariinae.

I. Cochlearia officinalis L. Löffelkraut. Scharbockskraut.¹⁾ Herbe aux millers. Scurry grass. Heimisch auf salzhaltigem Boden und an Meeresufern Norduropas, bis weit nach Norden gehend. Häufig zum arzneilichen Gebrauch kultivirt.

Beschreibung. Ein- oder zweijährig, mit aufrechtem, kantig-gestreiftem Stengel. Die bodenständigen Blätter langgestielt, ihre ganzrandige oder geschweifte Spreite ist breit-eiförmig. Die Stengelblätter den Stengel mit herzförmigem Grunde umfassend, ihr Rand eckig-gezähnt. Alle Blätter etwas fleischig. Die weissen, wohlriechenden Blüten haben kurzgenagelte Kronblätter und 6 fast gleichlange Staubgefässe (Fig. 205). Die Frucht ist ein kleines, fast kugelig aufgedunsenes Schütchen mit netzaderigen Klappen (Fig. 206. 207).

Bestandtheile. In der trocknen Pflanze 0,28 Proc. ätherisches Oel (s. S. 890). Es riecht und schmeckt weniger scharf wie das Allylsenöl (vergl. unten). Im trocknen Kraut 20 Proc. Asche.




Fig. 205.

Nähe von *Cochlearia officinalis*.
a Längsschnitt s Kelchblätter.
Perigonblätter. a Staubblätter.
s Narbe. g Fruchtknoten.




Fig. 206.

2. Schütchen von *Cochlearia officinalis* in natürlicher Grösse. 3. Dasselbe viermal vergrössert.




Fig. 207.

4. Schütchen von *Cochlearia officinalis*, aufgesprungen.
5. Same im Querschnitt.

Verwendung findet das frische Kraut *Herba Cochleariae* (Germ.). — Bitterresse. Skorbutkraut. *Cochlearia* (Gall.), das man zur Blüthezeit — Mai bis Juni — ammeilt und sofort verarbeitet. Man verwendet es, gewöhnlich in der Form des Löffelkrautspiritus, zu Mund- und Gurgelwässern bei Erkrankungen des Zahnfleisches; das frische Kraut wird als Salat oder Gemüse gegen Skorbut genossen, der ausgepresste Saft gegen Gicht und Rheumatismus.

Spiritus Cochleariae (Germ. Helv.). Löffelkrautspiritus. *Esprit ou Alcoolat de cochlearia*. Spirit of Scurvy-grass. Frisches, in Blüthe stehendes Löffelkraut 200 Th. wird zerstoßen, mit Wasser und Weingeist je 75 Th. 24 Stunden macerirt, dann 100 Th. abdestillirt. Farblos, riecht eigenthümlich, schmeckt brennend scharf, erbt sich mit alkalischer Bleilösung erhitzt, schwarz. Spec. Gew. im Mittel 0,915. Verliert seine Schärfe mit der Zeit, weshalb man ihn nicht länger als ein Jahr aufbewahren sollte (kühl und vor Licht geschützt). — Der Löffelkrautspiritus des Handels ist häufig eine Mischung aus Weingeist und künstlichem Cochleariöl.

Acetum stomaticum DIETSCHE.	
Acetum dentifricum. Mundessig.	
Zahnessig.	
Rp. Spiritus Cochleariae	200,0
Tincturae Epilanthi comp.	200,0
Tincturae aromaticae	100,0
Aetheris acetic	50,0
Acidi acetic (96 %)	50,0
Acidi salicylic	20,0
Aquae destillatae	400,0
Cocconellae pulverat.	5,0
Olei Salviae	1,0
Olei Menthae pip. Angl.	1,0.

Man erwärmt auf 60° C. und stellt einige Tage kühl. Theelöffelweise dem Mundspülwasser zuzusetzen.

Alcoholatum Cochleariae compositum.	
Alcoolat de cochlearia composé (Gall.)	
Esprit ardent de cochlearia.	
Rp. Herbae Cochleariae recent.	3000,0
Radices Armoraciae recent.	400,0
Alcohol (80 %)	8500,0.
Nach zweitägiger Maceration destillirt man ab 3000,0.	
Aqua Cochleariae.	
I.	
Rp. Herbae Cochleariae recent.	1000,0
Spiritus	100,0
Aquae	q. s.
Man destillirt ab	1000,0.

II. Ex tempore.	
Rp. Spiritus Cochleariae	30,0
Aquae destillatae	80,0

¹⁾ Unter diesem Namen geht auch *Ranunculus Ficaria*.

Aqua gingivalis regia		
Königs Mundwasser		
Rp	Olei Rosae	gtt V
	Olei Citri	1,0
	Olei Cinnamomi	25
	Olei Caryophyllorum	5,0
	Spiritus Cinnamomi	257,0
	Spiritus Cochleariae	700,0
	Chloroformii	5,0

Unverdünnt bei Zahnweh mit Wasser verdünnt als Gurgelwasser

Aqua gingivalis SCHLEICHERI
SCHLEICHER's antiseptisches Mundwasser

Rp	Spiritus Cochleariae	80,0
	Spiritus Melissae comp	80,0
	Tincturae Ratanhae	40,0
	Thymoli	0,3
	Olei Menthae pipentae	0,5
	Olei Caryophyllorum	0,1

Einige Tropfen auf $\frac{1}{4}$ Glas Wasser

Cerevisia antiscorbutica (Gall)
Bière ou Brutolé antiscorbutique

SAPINETTE		
Rp	Herbae Cochleariae recentis	15,0
	Turionum Pini	15,0
	Radix Armoraciae recentis	30,0
	Cerevisiae	1000,0

Man läßt 4 Tage stehen, presst aus und filtrirt.
Wenn dieses Bier vorrätig gehalten werden soll,
so setzt man demselben 10 Proc Löffelkraut-
spiritus zu.

Conserva Cochleariae (Gall.)		
Conserva de Cochlearia.		
Rp	Herbae Cochleariae recentis	250,0
	Sacchari albi	750,0

Man stößt im Marmormörser zu Brei an und
reibt durch ein Haarsieb No 2

Serum Lactis antiscorbuticum		
Rp	1 Acidi tartarici	5,0
	2 Succ recent. herb Cochleariae	100,0
	3 Lactis vaccini caesefacti	800,0

Man läßt 1 in 2, mischt mit 3 und seigt nach
einer Stunde durch.

Sirupus Cochleariae		
Rp	Spiritus Cochleariae	15,0
	Sirupi simplicis	85,0

Sirupus Cochleariae compositus (Helv)
Sirupus antiscorbuticus Sirupus de
Cochlearia armoricae compositus Sirup
de Raifort composé Löffelkrautsirup
Sirup antiscorbutique

		Helv	Gall.
Rp	1 Herbae Cochleariae recentis	100,0	100,0
	2 Herbae Nasturtii offic recentis	100,0	100,0
	3 Radix Armoraciae recentis	100,0	100,0
	4 Foliorum Menyanthis (Trifolii fibrini I)	20,0	10,0
	5 Corticis Aurantii (I)	25,0	20,0
	6 Corticis Cinnamomi zeyl (IV)	10,0	5,0
	7 Vini albi	400,0	400,0
	8 Spiritus (94%)	40,0	—
	9 Sacchari	550,0	500,0

Helv läßt 1—8 fünf Tage maceriren, im Wasser
bade 100 Th abdestilliren, den Rückstand aus-
pressen, die Flüssigkeit nach 6 Stunden klar ab-
gießen, auf 850,0 eindampfen, mit 9 zum Sirup
kochen, und diesem das Destillat zusetzen.

Gall läßt nur zwei Tage maceriren das Destillat
mit 100,0 Zucker im Wasserbade zum Sirup
machen die Pressflüssigkeit mittelst Eiweiss
klären, mit dem Rest des Zuckers zum Sirup
(spec Gew 1,27) kochen, filtriren und die beiden
Sirupe mischen.

Sirupus Cochleariae iodatus
Sirup de raifort iodé

I Helv		
Rp	Tincturae Jodi	10,0
	Sirupi Cochleariae comp	990,0
II Gall		
	Jodi	1,0
	Alcohol (90%)	15,0
	Sirupi Cochleariae comp	985,0

Spiritus Cochleariae compositus
Aqua antiscorbutica SYDENHAM.

Rp	Olei Aurantii cort.	
	Olei Macidis	
	Olei Menthae crisp	
	Olei Salviae	aa gtt III
	Spiritus Sinapis	1,0
	Spiritus Cochleariae	
	Spiritus diluti	aa 50,0

Tinctura Cochleariae composita

Tinctura antiscorbutica		
Rp	Radix Armoraciae recent	50,0
	Acidi salicylici	1,2
	Ammonii hydrochlorici	6,0
	Olei Menthae pip	gtt V
	Spiritus Cochleariae comp	
	Spiritus diluti	aa 50,0

Tinctura gingivalis

Zahn-Tinktur

Rp	Tincturae Catechu	
	Tincturae Myrrhae	
	Tincturae Calami	
	Tincturae Legui Guajac	
	Tincturae Chinae	
	Spiritus Coloniensis	aa 10,0
	Spiritus Cochleariae	40,0
	Olei Menthae pipent gtt. V	

Bei Entzündungen des Zahnfleisches 1 Theel auf
1 Glas Wasser zum Mundauspülen

Vinum antiscorbuticum

Vinum Armoraciae compositum
Skorbutwein Vin ou Oenolé anti-
scorbutique

I Gall		
Rp	Herbae Cochleariae recentis	15,0
	Herbae Nasturtii offic recentis	15,0
	Radix Armoraciae recentis	80,0
	Folior Trifolii fibrini	8,0
	Semin Sinapis nigri pulv	15,0
	Ammonii hydrochlorici	7,0
	Alcoholati Cochleariae comp	16,0
	Vini albi	1000,0

Nach 10tägigem Stehen auszupressen und zu
filtriren

II nach DIERCKHOF

Rp	Natrii chlorati	5,0
	Extract Trifolii fibrini	10,0
	Vini albi	900,0
	Spiritus Sinapis	25,0
	Spiritus Cochleariae	60,0

Eau de Madame de la Vrillière. Ein dem Aqua gingivale regia ähnliches Mundwasser

Sirupus Raphani Rettigsaft, in Italien bei skrophulösen Kindern vielfach angewendet. Cort Auranti 30,0, Cort Cinnamon zeyl 5,0, Herb Cochlear recent, Herb Veronic Herb Beccabung recent, Herb Nasturt offic recent ää 500,0 Contusis admisce Vin Marsala 1500 Macera per dies 2 et cola. Saepius agitando cum Talci venet 50,0, sepono, filtra In liquor filtrat paratib 1500 solve Sacchari 2400 (A. JANSSEN)

Universum, Breslauer, von SILBERSTEIN Ist ein sehr verdünnter Löffelkraut- oder Senfspirtus

Oleum Cochleariae. Löffelkrautöl **Essence de Cochlearia.** Oil of Spoonwort

Darstellung Man lässt das trockene Kraut mit weissem Senfpulver und Wasser stehen und destillirt dann ab

Eigenschaften und Bestandtheile Es ist das Isosulfoeyanat des secundären Butylalkohols $C_4H_9-N=C=S$ Er dreht (100 mm-Rohr) $+55,27^\circ$ Siedepunkt $156-159,9^\circ C$ Spec Gew 0,944 bei $12^\circ C$ Beim Erhitzen mit Ammoniak auf $100^\circ C$ bildet es bei $185^\circ C$ schmelzenden, optisch aktiven Sulfoharnstoff Das im Handel befindliche künstliche Löffelkrautöl ist Isobutylsenföl, es darf zur Herstellung des Spiritus Cochleariae etc nicht verwendet werden

II Cochlearia Armoracia L. Meerrettig. Mährrettig Kren Pfefferwurzel Raifort, Cran de Bretagne Horse-radish In fast ganz Europa an feuchten Orten, doch oft nur verwildert, häufig in Gärten angebaut

Beschreibung. Wurzel und unterirdische Achsen, oft 1 m tief senkrecht hinabsteigend, cylindrisch, bis 6 cm dick Stengel 1 m hoch, ästig Grundständige Blätter, gross, oblong, am Rande gekerbt, langgestielt. Untere Stengelblätter fiederspaltig, obere lanzettlich, gekerbt-gesägt, mit verschmalertem Grunde sitzend

Bestandtheile der Wurzel Sinigrin (cf Sinapis), ferner nach KOHNIG Wasser 76,72 Proc, Stickstoffsubstanz 2,73 Proc, Fett 0,85 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 15,89 Proc, Holzfaser 2,78 Proc, Asche 1,63 Proc In der Trockensubstanz Stickstoffsubstanz 11,60 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 67,99 Proc, Stickstoff 1,86 Proc

Verwendung findet die Wurzel Radix Armoraciae (Brit) Rad Raphani rusticani s marini. — Meerrettig — Racine de raifort (Gall.) R. d'armoise — Horseradish Root

Anwendung. Sehr selten in frischem Zustande mit Wein oder Bier als harntreibendes Mittel, häufig dagegen als Küchengewürz verwendet

Aufbewahrung Im Keller unter Sand

Aqua Armoraciae Destillat aus frischer Wurzel, kann durch eine Lösung von 1 Tropfen ätherischem Senföl in 200 g Wasser ersetzt werden

Cerevisia Armoraciae composita, Cerevisia antiscorbutica, ist ein Auszug von Meerrettig und Fichtensprossen mit gewöhnlichem Bier

Spiritus Armoraciae compositus, Compound Spirit of Horseradish Brit Meerrettig, Orangenschale je 125 g, Muskatnuss 5,15 g, Weingeist 625 ccm, Wasser 750 ccm geben Destillat 1000 ccm

Sirupus Armoraciae compositus, Sirup de Raifort composé, Sirup antiscorbutique (ex tempore par) Senfspirtus, Chinatinktur, Enziantinktur je 5 Th, Löffelkrautspirtus 15 Th, weisser Sirup 170 Th Man erhält hieraus den

Sirupus Armoraciae iodatus, GRAUVAULT, durch Auflösen von Jod und Jodkalkum ää 0,25 g in 200,0 Sirup

Tinctura Armoraciae composita s antiscorbutica. Alcoolé ou Teinture de raifort composée (Gall.). Frischer Meerrettig 100 Th, Senfpulver 50 Th, Salmiak 25 Th, Weingeist (60 proc) 200 Th, zusammengesetzter Löffelkrautspirtus 200 Th. nach 10 Tagen auspressen und filtriren

Vinum Armoraciae compositum enthält ausser den Bestandtheilen des vorigen Bitterklee und Brunnenkresse (vergl. S 880)

Oleum Armoraciae. Meerrettigöl Der scharfe Geruch des Meerrettigs, der sich besonders stark beim Zerreiben der Wurzel entwickelt, ist auf ein dem Senföl identisches ätherisches Öl zurückzuführen. Aus den Untersuchungen GADAMERS geht mit grosser

Wahrscheinlichkeit die Anwesenheit des Glykosids Sinigrin im Meerrettig hervor. Bei der Destillation der Wurzel erhält man 0,05 Proc. eines hellgelben Oels vom spec. Gew. 1,01. Es ist im Geruch nicht vom Senföl zu unterscheiden, und giebt bei der Behandlung mit Ammoniak dasselbe Thiosinamin wie Senföl und besteht demnach wie dieses aus Allylsulfocyanat.

Cocos.

Gattung der Palmae—Ceroxylinae—Cocoinae—Attaleae.

1. *Cocos nucifera* L. Die Kokospalme. Ursprünglich vielleicht im indischen Archipel heimisch, jetzt durch die Tropen der ganzen Erde verbreitet.

Die *medizinische Verwendung* der Pflanze ist ganz unbedeutend, ein Dekokt der frischen Wurzel wird gegen Dysenterie getrunken, die Flüssigkeit im Innern des Endosperms, die Kokosmilch, gegen habituelle Stuhlverstopfung, auch gegen Gonorrhoe. Das feste Endosperm gilt als Bandwurmmittel.

Sehr ausgedehnt und vielseitig ist die *technische Verwendung*, wobei wir von dem vielseitigen Gebrauch, den die Menschen in den Tropen von dieser Palme machen, absehen.

Man verwendet von der einsamigen Steinfrucht:

1) Die faserige Hülle (Roya), deren Fasern als Coir in den Handel gelangen und zur Herstellung grober Teppiche, Bürsten etc. benutzt werden. — Die Faserbündel sind braun, rundlich, sie umschliessen einen Canal, in dem leicht Gefässe erkannt werden. Von aussen sind die Bündel mit kleinen, 15 μ grossen, verkieselten Plättchen (Stegmata) bedeckt.

Die einzelne Faser ist 0,4–1,0 mm (meist 0,7 mm) lang und 12–24 μ (meist 20 μ) dick, ungleichmässig dickwandig, aussen häufig ausgebrechtet oder gezähnt, mit zahlreichen Porenkanälen, verholzt.




Fig. 208. (Nach MOHLER.)

2) Die harte Steinschale, Endocarp, die zu kleinen Drechslerarbeiten (wie Knöpfen), dient. Ihr Gewebe setzt sich vorwiegend aus sehr verschieden gestalteten Steinzellen zusammen, von zahlreichen Gefässbündeln durchzogen. Die Innenseite der Schale ist von zwei dünnen Gewebsschichten ausgekleidet, einer lichtbräunlichen, ziemlich weichen, die wenig verdickte Parenchymzellen enthält und einer innersten schwärzlichen, die wieder aus starkverdickten Steinzellen besteht. Die Asche ist strukturlos. An Stelle der Kokosshalen verwendet man für die gleichen Zwecke oft die Steinschale der *Attalea funifera* Mart., sie enthält stark verkieselte Zellen, deren Skellette sich reichlich in der Asche finden.

3) Das Endosperm des Samens, die Coprah, aus dem man durch Auspressen in der Wärme das Oleum Cocos (Ergänzh.). Oleum Cocos. — Kokosbutter. Kokosöl. Kokosnussöl. Kalappusöl. — Beurre de Cocos. Huile de Cocos. — Cocount-Öl gewinnt. Ueber den Bau vergl. unten bei 4. Bestandtheile der Coprah: Wasser 5,81 Proc., stickstoffhaltige Substanz 8,88 Proc., Fett 67,0 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 12,44 Proc., Rohfaser 4,06 Proc., Asche 1,81 Proc.

Konstanten des Oeles: Spec. Gew. bei 18° C. 0,9250, bei 40° C. 0,9115, bei 99° C. 0,8796. Spec. Gew. der Fettsäuren bei 98–99° C. 0,8854. Schmelzpunkt des Fettes

20—25° C Erstarrungspunkt 19,0—21,85° C (Ein kalt gepresstes Öl, das aber nicht in den Handel kommt, schmilzt schon unterhalb 20° C, erstarrt bei 12—13° C und erwärmt sich dabei auf 15° C) Schmelzpunkt der Fettsäuren 24,6—24,7° C Erstarrungspunkt 19,0—21,85° C Verseifungszahl 257,3—268,4° C REICHERT'sche Zahl 3,70 Jodzahl 8,9—9,35 Jodzahl der Fettsäuren 8,39—9,3

Beschreibung Kokosfett hat die Konsistenz der Butter, es ist weiss oder gelblich, hat im frischen Zustande einen charakteristischen Geruch und Geschmack nach Kokosnüssen und wird leicht ranzig. Es löst sich bei 60° C in 2 Th 90 proc Alkohol, hierdurch, sowie durch die hohe Verseifungszahl ist es besonders charakterisiert.

Bestandtheile Vorwiegend Triglyceride der Myristinsäure und Laurinsäure, ferner diejenigen der Palmitinsäure, Kapronsäure, Kaprylsäure und Kaprinsäure, dienlich 2,96 Proc freie Fettsäuren

Anwendung Aus dem daraus hergestellten Stearin macht man Kerzen, in Amerika dient das Fett als Zusatz zu Kunstbutter, ferner in grosser Menge zur Herstellung „gefüllter Seifen“ (vergl Sapo)

Palmin Unter diesem Namen kommt seit einiger Zeit gereinigtes, völlig geruchloses Kokosöl in Blechbüchsen, welche sich als Vorrathgefässe benutzen lassen, in den Handel. In diesem Zustande ist es ein vorzügliches, dabei billiges Speisefett, das sich immer mehr einbürgert. Es wird an einem kühlen Orte aufbewahrt.

Lac Cocos		
Kokosmilch DIETRICH.		
Rp	1 Boracia	10,0
	2 Saponis medicati	20 0
	3 Aquae	50,0
	4 Olei Cocos	70,0
	5 Aquae Rosae tepid (40° C)	350,0
	6 Olei Bergamotae	gtt. X
	7 Olei Aurantii florum	gtt. V
	8 Olei Gaultheriae	gtt. II
	9 Olei Uncariae odorat.	gtt. I
	10 Olei Amygdali amari aeth.	gtt. I
Man verreibt 1—4 in einer angewärmten Schale		
10 Minuten lang, fügt allmählich 5 hinzu, schüttelt		
und mischt 7—10 zu		

Sapo Cocos		
Kokosseife (Buchh.)		
Rp	Olei Cocos	666,0
	Liquoris Natrii caustici (32—35° B)	834,0
Man schmilzt das Öl und vermischt mit der auf		
40° C erwärmten Lauge. Das Cocosöl ersetzt		
man besser zur Hälfte durch Schmalz oder Talg		
und verdeckt den Geruch durch Myrrasin oder		
Safrol		

Copraol, Grundlage für Stuhlzäpfchen, Vaginalkugeln, Bougies, ist wahrscheinlich ein von den leichter schmelzenden Antheilen befreites Kokosfett.

Laureol, als Butterersatz empfohlen, soll ein Gemisch aus Kokos- und Palmkernfett sein. (Unter demselben Namen kommt ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusammensetzung in den Handel.)

Mollin (*Sapo unguinosus*) ist eine überfettete, glycerinhaltige, weiche Seife, die eine vorzügliche Salbengrundlage bildet (für Salben mit Jod, Quecksilber). Bereitung nach LEBERREICH Fett und Kokosöl je 50 Th, Aetzkalk 20 Th, Wasser 46 Th. Man verseift kalt und setzt der fertigen Seife 17 Th Fett zu.

Nucolin, ein Speisefett, ist gereinigtes Kokosöl.

Suppositorien und Vaginalkugeln aus Kokosöl werden empfohlen, weil das schnelle Erstarren wegen der Arzneistoffe gut suspendirt bleiben, das Öl nimmt auch 50 Proc. Glycerin auf.

Kunst-Kokos-Masse war eine elastische Masse zwischen zwei ziemlich harten Rinden, der Geschmack unangenehm.

4) Die Rückstände von der Ölfabrikation geben unter dem Namen „Punac“ ein gutes Futter- und Düngemittel, sie finden zerkleinert auch Verwendung zur Verflüchtung des Pfefferpulvers, ebenso die nicht entfettete Coprah. — Die Zellen des Endosperm sind grösser, wie die Perispermzellen des Pfeffers, die einzelnen Zellen enthalten formlose Klumpen, aus Fett und Aleuron bestehend, in denen leicht ansehnliche Krystalloide erkannt werden (Fig 208). Um sie von dem ähnlich gebauten Endosperm der Ölpalme zu unterscheiden, ist darauf zu achten, dass die Zellwände der letzteren knotig verdickt sind, die der Kokospalme glatt. (Vgl. Piper.)

Ausser *Cocos nucifera* liefert auch *Cocos butyracea* L. Öl.

5) Aus der Rinde soll ein Gummi „Haari tapan“ und „Taluti“ ausgeschieden werden. Es bildet stalaktitenartige Massen und enthält 70—90 Proc. Bassorin.

6) Aus dem Saft gewinnt man Zucker „Jaggery“, durch Gährenlassen „Toddy“ und einen Arrac. Die jungen Schosse heissen Palmkohl.

II Cocos Mikaniana Mart In Brasilien Den frischen, bitter schmeckenden Palmkohl verwendet man gegen Diarrhoe und Fieber mit Weisswein digerirt als Tonicum Er enthält 12,06 Proc eines Bitterstoffes Pikropatyn Ebenso verwendet man **Cocos oleracea Mart** in Brasilien, sie enthält 0,0067 Proc Pikrococcin

III Cocos Martiana Dr et Glaz In Brasilien Aus dem Saft des Perikarps, das 15,82 Proc Fruchtzucker enthält, bereitet man einen Hustensaft und durch Gährenlassen ein Getränk „Geribada“

IV. Cocos coronata Mart enthält im Stamm starkehaltiges Mark,

Codeinum.

I † Codeinum (Ergänz. Helv.) Codeine (Gall.) Codeina (Brit. U-St.) Codein, Methylmorphin $C_{17}H_{19}(CH_3)NO_3 + H_2O$ Mol. Gew. = 317

Das Codein ist zu 0,5–0,75 Proc im Opium enthalten Es wird als Nebenprodukt bei der Darstellung des Morphins nach der ROBERTSON'schen und von GREGORY modificirten Methode gewonnen Ausserdem wird es gegenwärtig durch Methyliren des Morphins synthetisch dargestellt, wodurch seine Zusammensetzung als Methylmorphin bewiesen ist

Darstellung. Der aus 1000 g Opiumpulver mit kaltem Wasser erhaltene Auszug wird mit 100 g Marmorpulver gemischt, nach dem Absetzen und Dekanthiren zur Sirupsdicke eingedampft, dann in 3 Litern kaltem Wasser gelöst, filtrirt, wiederum bis auf 750 ccm eingedampft und noch heiss mit 50 g reinem Chlorcalcium in concentrirter Lösung und etwa 10 g Salzsäure vermischt, nach einiger Zeit filtrirt, nochmals weiter eingedampft, nach Beseitigung etwa ausgeschiedenen meconsauren Calciums bis zur Sirupsdicke abgedampft und zwei Wochen bei Seite gestellt Nach dieser Zeit findet man in der Flüssigkeit in Gestalt dunkelbrauner Krystallmassen ein Doppelsalz, aus Morphin- und Codeinhydrochlorid bestehend, ausgeschieden Diese Salzmasse wird mit salzsäurehaltigem Wasser gelöst und umkrystallisirt, wiederum gelöst, mit thierischer Kohle entfärbt und die Lösung bis zum geringen Ueberschuss mit Aetzammon versetzt Morphin wird dadurch vollständig ausgeschieden, während Codein in Lösung bleibt Die durch Filtration von dem Morphin befreite Lösung enthält Ammoniumchlorid und Codeinhydrochlorid Sie wird mit etwas Kalilauge versetzt und erwärmt, um einen Theil des Ammoniumchlorids zu zersetzen, dann zur Krystallisation eingedampft Das Codeinhydrochlorid, welches in 20 Th kaltem Wasser löslich ist, krystallisirt zuerst heraus Zwischen Fliesspapier von der Mutterlauge befreit, wird es in 5 Th heissem Wasser gelöst, mit Aetzkalk daraus das Codein (in Gestalt einer öligen oder geschmolzenen Masse) abgeschieden, nach dem Erkalten und Erhärten in verdünnter Salzsäure gelöst, mit thierischer Kohle behandelt, dann wiederum mit Aetzkalk ausgefällt und endlich aus wasserhaltigem Aether umkrystallisirt

Das aus wasserhaltigem Aether krystallisirte Codein ist das der Formel $C_{18}H_{21}NO_3 + H_2O$ entsprechende und von den angeführten Pharmakopöen etc aufgenommen

Eigenschaften A. des nicht officinellen wasserfreien Codeins $C_{18}H_{21}NO_3$ Dasselbe scheidet sich aus bei seiner Auflösung in wasserfreiem Aether oder Benzol in Form kleiner, stark glänzender wasserfreier rhombischer Krystalle, welche bei 155° C schmelzen, im übrigen natürlich die Eigenschaften des folgenden besitzen

B. Des officinellen wasserhaltigen Codeins $C_{18}H_{21}NO_3 + H_2O$ Farblose oder weisse, oft ansehnliche und deutlich oktaëdrische Krystalle, welche mit 120 Th. Wasser eine alkalisch reagirende Lösung von bitterem Geschmack geben Sie schmelzen bei 152 bis 153° C Erhitzt man das Codein indessen mit einer zur Auflösung unzureichenden Menge Wasser zum Sieden, so schmilzt es unter Wasser zu Oeltropfen, welche beim Erkalten wieder krystallinisch erstarren

Die Krystalle verwittern in trockner warmer Luft und werden bei 100° C vollständig wasserfrei Der Gehalt an Krystallwasser beträgt 5,67 Proc


Er löst sich in 120 Th kaltem oder 20 Th siedendem Wasser, ferner in 80 Th. Aether, oder in 2 Th Chloroform, auch in 3 Th Alkohol, sehr leicht löslich ist es in heissem Alkohol. Es löst sich ferner in ca. 85 Th Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc, nicht aber in den Lösungen der ätzenden Alkalien. Die Lösungen des Codeins lenken die Ebene des polarisierten Lichtes nach links ab. Von Säuren wird Codein unter Bildung von Salzen leicht aufgenommen.

Als Identitätsreaktionen werden folgende angegeben: 1) 0,1 g Codein löst sich in 10 ccm konc Schwefelsäure fast ohne Färbung auf, wenn man das Codein allmählich in die Schwefelsäure einträgt unter Vermeidung jeder Erwärmung. Vergl. Pharm. Centr. 1897 160. Verwendet man aber hierzu eine Schwefelsäure, welche in 100 ccm einen Tropfen Eisenchloridlösung enthält, so färbt sich die Lösung blau oder violett. — 2) Löst man Codein in konc Schwefelsäure auf, erhitzt die Lösung kurze Zeit auf 150° C und setzt nach dem Erkalten eine Spur Salpetersäure zu, so tritt blutrothe Färbung auf. — 3) Froehde'sches Reagens (s. S. 207) löst Codein zunächst mit gelblicher Färbung, welche bald in Grün und schliesslich in Blau übergeht. — 4) In einer Lösung von Kaliumferri-cyanid + Ferrichlorid (s. S. 896) bringt Codein nicht alsbald, sondern erst nach mehreren Stunden eine Blaufärbung hervor.


Prüfung. 1) Es schmelze bei 152–153° C und hinterlasse beim Verbrennen auf dem Platinbleche keinen feuerbestandigen Rückstand (Mineralische Verunreinigungen). — 2) Wird 0,1 g Codein unter thunlichster Vermeidung von Erwärmung in 10 ccm konc. Schwefelsäure (welche frei von Salpetersäure und salpetriger Säure sein muss) allmählich unter schneller Vertheilung eingetragen, so soll die zuerst eintretende Rosafärbung nach 1–2 Minuten bei gewöhnlicher Temperatur verschwinden, die sich ergebende Lösung sei farblos (Roth bis rothviolette oder röthlichgelbe Färbung weist auf Narcotin, Papaverin, Narcein, Thebain). — 3) Die Lösung eines Körnchens Kaliumferri-cyanid in 10 ccm Wasser mit 1 Tropfen Eisenchloridlösung versetzt, werde durch 1 ccm einer Codeinlösung, welche durch Auflösen von 0,01 g Codein in 1 ccm normaler Salzsäure erhalten wurde, nicht sofort blau gefärbt (sofortige Blaufärbung würde bei Anwesenheit von Morphin eintreten).

Aufbewahrung. Vorsichtig. **Anwendung.** Codein hat hypnotische Wirkung, aber diese ist schwächer als diejenige des Morphins. Zur Anwendung gelangt die freie Base in Deutschland verhältnissmässig seltener, öfter werden namentlich seit den letzten Jahren die Salze des Codeins angewendet. Höchstgaben *pro dosi* 0,1 g, *pro die* 0,3 g (Ergänzb.) *Helv pro die* 0,5 g.

Synthetisches Codein. Künstlich wird Codein dargestellt durch Einwirkung von Methyljodid oder Methylchlorid auf eine alkalische Morphinlösung (Dorr).



Ferner durch Erhitzen von methylschwefelsaurem Natrium mit alkalischer Morphinlösung (Kroll).



Neuerdings wird es auch von den FARBENFABRIKEN VORL. FR. BAYER & Co in Elberfeld (D.R.P. 92789) dargestellt, indem sie zu einer kühlgehaltenen ätherischen Diazo-Methanolösung die äquimolekulare Menge Morphin in absolut-methylalkoholischer Lösung zufliessen lassen.

† **Codeinum hydrochloricum** (Ergänzb.) **Codeinum muriaticum.** Codeinchlorhydrat. Salzsäures Codein. $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_3 \cdot \text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 371,5.

Zur Darstellung neutralisirt man heisse verdünnte Salzsäure mit Codein, wozu für 10 Th. Salzsäure von 12,5 Proc HCl etwa 10,85 Th. Codein ($\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$) erforderlich sind. Beim Erkalten der Lösung scheidet das Salz in Krystallen an.

Eigenschaften. Weiss, kleine, bitter schmeckende Nadeln, welche sich in 28 Th. kaltem und in weniger als 1 Th. siedendem Wasser zu neutralen Flüssigkeiten lösen. Das

Salz giebt sein Krystallwasser bei 100° C allerdings ab, aber Gewichtskonstanz wird nur sehr langsam erreicht, es ist dazu unter Umständen Trocknen von 100 Stunden erforderlich. Der berechnete Gehalt an Krystallwasser beträgt 9,69 Proc — In der 5proc wässrigen Lösung des Codeinchlorhydrates ruft sowohl Silbernitrat als auch Kalihydrat einen weissen Niederschlag hervor

Prüfung 1) Die Lösung eines Körnchens Kaliumferrocyanid in 10 cem Wasser, mit 1 Tropfen Eisenchloridlösung versetzt, werde durch 1 cem der wässrigen Codeinchlorhydratlösung (1 = 100) nicht sofort blau gefärbt (Morphin) — 2) Die wässrige, mit Salpetersäure angesäuerte Lösung des Salzes (1 = 20) werde durch Baryumchloridlösung nicht sogleich getrübt (Schwefelsäure)

Aufbewahrung Vorsichtig


Anwendung Siehe unter Codeinum phosphoricum Höchstabgaben pro dos 0,1 g, pro die 0,5 g (Ergänzb.)

† Codeinum phosphoricum (Germ. Helv.) Codeinae Phosphas (Brit.) Codeinphosphat Phosphorsaures Codein $C_{18}H_{21}NO_2 \cdot H_3PO_4 + 2H_2O$ Mol. Gew. = 493. Die Brit. giebt die Formel $C_{18}H_{21}NO_2 \cdot H_3PO_4 + 1\frac{1}{2}H_2O$ an, das Mol. Gew. würde alsdann = 424 sein. — Das Codeinphosphat krystallisiert unter verschiedenen Bedingungen mit verschiedenem Wassergehalt. Um das von Germ. und Helv. vorgeschriebene Präparat zu erhalten, hat man wie folgt zu verfahren

Darstellung. Zur Darstellung von Codeinphosphat fugt man zu 10 Th. Phosphorsäure von 25 Proc. H_3PO_4 soviel (8 Th.) Codein, dass die Lösung gerade noch schwach sauer reagiert. Sowohl beim freiwilligen Verdunsten dieser Lösung, als auch beim Fallen derselben mit einem Ueberschuss von starkem Alkohol bei gewöhnlicher Temperatur erhält man das der Germ. und Helv. entsprechende Codeinphosphat von der Zusammensetzung



Wird das officinelle Codeinphosphat der eben angegebenen Zusammensetzung aus verdünntem Alkohol unter Erwärmen umkrystallisiert, so erhält man ein wasserärmeres Präparat



Ausserdem kommen im Handel noch Präparate vor, deren Phosphorsäuregehalt höher ist, als dem Verhältniss $C_{18}H_{21}NO_2 \cdot H_3PO_4$ entsprechen würde (B. Schmidt, Apoth.-Ztg. 1890, S. 366)

Eigenschaften. Feine weisse Krystallnadeln, welche in 4 Th. kaltem Wasser, viel schwieriger in Alkohol löslich sind. Daher wird das Salz aus seiner conc. wässrigen Lösung durch Alkohol gefällt. Die wässrige Lösung schmeckt bitter und reagiert schwach sauer. In der 5proc. wässrigen Lösung des Salzes bringt Silbernitrat einen gelben Niederschlag von Silberphosphat, Kalilauge eine weisse Fällung von freiem Codein hervor.

Bei 100° C. verliert das Codeinphosphat alles Krystallwasser. Der Formel $C_{18}H_{21}NO_2 \cdot H_3PO_4 + 2H_2O$ entspricht ein Krystallwassergehalt von 8,3 Proc., der Formel $C_{18}H_{21}NO_2 \cdot H_3PO_4 + 1\frac{1}{2}H_2O$ entspricht ein solcher von 6,2 Proc. Nach TAMMACH und HENKE entspricht das Codeinphosphat des Handels mehr der Formel $C_{18}H_{21}NO_2 \cdot H_3PO_4 + 1\frac{1}{2}H_2O$

Nach E. SCHMIDT ist es eine charakteristische Eigenschaft des reinen Codeinphosphats, sich beim Trocknen bei 100° C. nicht oder kaum grau zu färben, während unreine Handelspräparate diese Färbung annehmen.

Durch Erhitzen des Codeins mit conc. Salzsäure auf 140° C. wird ebenso wie aus Morphin das Apomorphin gebildet.

Prüfung Als Identitätsreaktion ist das Verhalten der Lösung des Codeins in conc. Schwefelsäure gegenüber oxydierenden Agentien anzusehen. 0,01 g. Codeinphosphat löst sich in 10 cem conc. Schwefelsäure ohne Färbung. Verwendet man hierzu jedoch Schwefelsäure, welche in 100 cem 1 Tropfen Eisenchloridlösung enthält, so färbt sich die Lösung blau oder violett (vergl. hierzu S. 894)

Ueber die Reaction mit Silbernitrat s. unter Eigenschaften

Auf Verunreinigungen ist in folgender Weise zu prüfen. Die Lösung eines Körnchens Kaliumferricyanid in 10 ccm Wasser, mit 1 Tropfen Eisenchloridlösung versetzt, werde durch 1 ccm der wässrigen Codeinphosphatlösung ($1=100$) nicht sofort blau gefärbt. Diese Prüfung fahndet auf eine Beimischung von Morphin. Man wird gut thun sie mit einer Durchschnittsprobe anzustellen. Der Mechanismus der Reaction ist der, dass durch etwa beigemengtes Morphin das Kaliumferricyanid zu Kaliumferrocyanid reducirt wird, so dass alldann „Berliner Blau“ entsteht. Die Beobachtung ist sofort anzustellen. — Die wässrige, durch Salpetersäure angesäuerte (!) Lösung des Codeinphosphates ($1=20$) werde durch Silbernitratlösung nicht verändert (weisse Trübung = Chlor, der Zusatz von Salpetersäure ist nothwendig, um das Silberphosphat in Lösung zu halten), durch Baryumnitratlösung nicht sogleich getrübt. (Spuren von Schwefelsäure sind daher gestattet.)

Um sich ein sicheres Urtheil über den Werth eines Codeinphosphates zu bilden, führt man eine Bestimmung des Codeingehaltes zweckmässig in folgender Weise aus. Man löst 0,2 g Codeinphosphat in 5 ccm Wasser, setzt 3 ccm Kalilauge zu und schüttelt 3mal hintereinander mit je 5 ccm Chloroform aus. Die vereinigten Chloroformauszüge werden in einem Glasschälchen verdunstet, das in Krystallen hinterbleibende Codein bei 120°C getrocknet und gewogen. Der Rückstand muss mindestens 0,13 g (an wasserfreiem Codein) betragen und ist noch auf völlige Flüchtigkeit beim Verbrennen zu prüfen.

Aufbewahrung Vorsichtig. Lichtempfindlich. Ist das Codeinphosphat nicht

Anwendung Codein ist ein Narcoticum, wirkt aber milder als Morphin. Von dem letzteren soll es sich dadurch vorthellhaft unterscheiden, dass es keine üblen Neben- und Nachwirkungen erzeugt, auch Verstopfung nicht verursacht. Es ist daher an Stelle des Morphins namentlich bei Kindern, schwächlicheren und älteren Personen angezeigt.

Die grösste Einzelgabe beträgt 0,1 g, die grösste Tagesgabe 0,4 g (Germ. Helv.).

† **Codeinum sulfuricum** Codeinsulfat. Schwefelsaures Codein ($\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_5$), $\text{H}_2\text{SO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 786.

Zur Darstellung löst man in 10 Th. erwärmter verdünnter Schwefelsäure von 1,112 spec. Gew. 10,3 Th. zerriebenes Codein ($\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_5 + \text{H}_2\text{O}$) auf. Nach dem Erkalten scheidet sich das Sulfat in langen, glänzend weissen, büschelförmig gruppirten Nadeln aus, die durch Umkrystallisiren aus heissem, mit 1 Tropfen verdünnter Schwefelsäure angesäuertem Wasser zu reinigen sind. Das leicht etwas verwitternde Salz enthält 11,45 Proc. Krystallwasser — Löslich in 34 Th. kaltem Wasser.

† **Codeinum hydrobromicum** Codeinbromhydrat. Bromwasserstoffsäures Codein. $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_5 \cdot \text{HBr} + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 416.

Zur Darstellung neutralisirt man ein erwärmtes Gemisch von 10 Th. Bromwasserstoffsäure (25 Proc.) und 40 Th. Wasser mit 9,8 Th. Codein ($\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_5 + \text{H}_2\text{O}$). Nach dem Erkalten scheidet sich das Bromhydrat in weissen Nadeln aus, welche durch Umkrystallisiren aus Alkohol von 70 Proc. zu reinigen sind.

Weisse, glänzende, neutrale Krystallnadeln, ziemlich leicht löslich in Wasser, in verdünntem Alkohol und in 90proc. Alkohol. Der Gehalt an Krystallwasser beträgt 8,65 Proc.

† **Codeinum salicylicum**. Codeinsalicylat. Salicylsaures Codein. $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_5 \cdot \text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2$ Mol. Gew. = 437.

Zur Darstellung kann man 1) eine wässrige Lösung von 10 Th. Codeinchlorhydrat (s. S. 894) mit einer anderen wässrigen Lösung von 4,6 Th. Natriumsalicylat fällen. Der entstandene amorphe Niederschlag ist gut mit Wasser zu waschen, schliesslich zu trocknen. — 2) Eine alkoholische Lösung von 10 Th. kryst. Codein ($\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_5 + \text{H}_2\text{O}$) wird mit einer alkoholischen Lösung (von 4,35 Th.) Salicylsäure genau neutralisirt und die Lösung zur Trockne verdunstet.

Gelblichweisses, amorphes oder krystallinisches Pulver, leicht löslich in Alkohol und in Aether, schwer löslich in Wasser, nicht löslich in Ligroin

Sirupus Codeini	
I Bad Taxe.	
Rp. Codeini phosphoricæ	20
Aquæ destillatæ	30,0
Sirupi Sacchari	988,0

II Münch Ap-V	
Rp. Codeini phosphoricæ	10
Sirupi Sacchari	1000,0

III. Helvetica.	
Rp. Codeini	20
Spiritus	18,0
Sirupi Sacchari	980,0

IV Gall., Elsass Lothr Taxe und Hamb Vorsch.	
Rp. Codeini	2,0
Spiritus	50,0
Sirupi Sacchari	950,0

II † Apocodeinum hydrochloricum. Apocodeinchlorhydrat. Salzsaures Apocodein $C_{15}H_{15}NO_2 \cdot HCl$ Mol Gew = 317,5.

Das Apocodein leitet sich in gleicher Weise vom Codein durch Wasserabspaltung ab wie das Apomorphin vom Morphin. Man stellt es am einfachsten dar, indem man Codeinchlorhydrat mit Zinkchlorid etwa 15 Minuten lang auf $180^\circ C$ erhitzt und die freie Base wie unter Apomorphin S 323 angegeben abscheidet.

Das freie Apocodein bildet braune, harzartige, amorphe Massen, welche sich in verdünnter Salzsäure mit grünlicher Farbe auflösen. Durch Neutralisation der freien Base mit Salzsäure erhält man das salzsaure Salz als gelblichgraues, amorphes Pulver, welches in Alkohol und in Wasser leicht löslich ist und ähnliche Eigenschaften wie das Apomorphin hat.

Es wirkt ähnlich wie das Apomorphin als Expectorans, und zwar giebt man es in Dosen von 0,03—0,04 g und in Tagesdosen von 0,18—0,24 g in Pillenform oder in Lösung Subkutan 0,02—0,05 g. Neuerdings ist es auch als Sedativum und Hypnoticum für die Kinderpraxis empfohlen worden.

Coffea.

Gattung der Rubiacene — Coffeoidae — Psychotriinae — Ixoreae.

I Coffea arabica L. Heimisch in Abyssinien, Angola und den Mozambique-Ländern, durch die Kultur in den Tropen weit verbreitet. Bis 5 m hoher Baum, der aber in der Kultur sträuchig gehalten wird, mit gebuschelten, weissen, 5zähligen Blüten und breitlanzettlichen, dünnledrigen Blättern mit am Grunde ein wenig verbundenen Nebenblättern. Die Frucht ist eine kuglige oder längliche, fleischige Steinfrucht mit zwei Steinen, von denen jeder einen Samen einschliesst. Die Frucht ist erst grün, dann roth, endlich blauschwarz.

Verwendung finden die Samen Semen Coffeae. — Kaffee. Kaffeebohnen. — Café (Gall.) Fèves de café — Coffee-beans.

Zubereitung. Sobald die Samen reif sind, werden sie geerntet, was in der Regel dreimal im Jahre geschieht, und entweder nach der alten Methode verarbeitet, indem man sie so lange trocknet, bis das Pericarp mit der Steinschale und Samenschale bröcklig wird und durch Zerstoßen entfernt werden kann. Oder man wendet die nasse, westindische Methode an, indem die Früchte frisch mittelst einer Maschine („Pulper“) von dem fleischigen Exocarp und Mesocarp befreit werden, also mit der Steinschale, dem Endocarp, bedeckt bleiben. Diesen „Pergamentkaffee“ lässt man einen Gährungsprocess durchmachen, trocknet ihn dann, stösst die Steinschale oder „Pergamenthaut“ ab und entfernt schliesslich noch den grössten Theil der Samenschale, die „Silberhaut oder Schilferhaut“, durch den „Polirapparat“.

Beschreibung. Die Samen sind von hellgelblicher, grünlicher oder bräunlicher Farbe, auf der einen (Rücken-) Seite gewölbt, auf der anderen flach, mit einer tiefen Furche versehen. Sie bestehen zum bei weitem überwiegenden Theil aus dem Endosperm, der kleine Embryo liegt auf der gewölbten Rückenseite am einen Ende, er zeigt eine Radicula und

zwei flache Cotyledonen. Im Querschnitt durch den Samen sieht man, dass das Endosperm an der Bauchseite eingebogen ist, daher die Furche. In der Furche sind stets Reste der dünnen, trocknen Samenschale enthalten, seltener auf der Aussenseite des Samens. Entwickelt sich in der Frucht nur ein Same, so ist derselbe nicht auf einer Seite abgeflacht,




Fig. 200. (Nach MOELLER.)
Samenschale der Kaffeebohne. st Steinzellen. 160mal vergrößert.

sondern auch hier gewölbt, im ganzen also kuglig, eiförmig oder walzenförmig. Solche Samensucht man heraus und bringt sie als besondere Sorte „Perikaffee“ in den Handel.

Die Samenschale, die also im Kaffee nie völlig fehlt, besteht aus dünnwandigen, leeren, zusammengefallenen Zellen und einer nicht dicht zusammenschliessenden Schicht grosser, spindelförmiger oder mehr unregelmässiger Steinzellen, mit ziemlich dicken, reich getüpfelten Wänden (Fig. 209). Diese Zellen sind auf dem Rücken von regelmässigerer Gestalt, als in der Falte des Endosperms. Sie messen bis $500\ \mu$ in der Länge und sind bis $42\ \mu$ breit. Für den Nachweis von Kaffee sind sie von sehr grosser Wichtigkeit (vergl. aber unten).




Fig. 210. (Nach MOELLER.)
Querschnitt durch das Endosperm der Kaffeebohne.
160mal vergrößert.

Die Hauptmasse bildet das Endosperm: Die Zellen sind in der Regel etwas radial gestreckt, ihre Wände erscheinen im Querschnitt knotig verdickt, von der Fläche gesehen mit grossen, länglichen Tüpfeln, deren Konturen wenig scharf sind (Fig. 210). Als Inhalt lässt sich Aleuron und fettes Öl leicht nachweisen. Das Gewebe des Embryo ist zart und dünnwandig, es ist für den Nachweis von Kaffee ohne Belang.

Bestandtheile nach KOZSIG im Durchschnitt: Wasser 11,23 Proc., stickstoffhaltige Bestandtheile 12,07 Proc., Coffein 1,21 Proc., Fett 12,27 Proc., Zucker 8,55 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 38,79 Proc., Holzfaser 18,17 Proc., Asche 3,92 Proc. In der Trockensubstanz: stickstoffhaltige Bestandtheile 13,58 Proc., Coffein 1,38 Proc., Fett 13,81 Proc. Die Asche enthält Kalk 62,47 Proc., Kalk 6,29 Proc., Magnesia 9,69 Proc., Eisenoxyd 0,65 Proc., Phosphorsäure 13,29 Proc., Schwefelsäure 8,30 Proc., Kieselsäure 0,54 Proc.

Nach anderen Angaben enthält die Asche auch geringe Mengen Natrium (0,29 Proc.) und Chlor (0,45 Proc.). Der also unter allen Umständen sehr geringe Gehalt davon ist für die Erkennung havarierten (durch Seewasser minderwerthig gewordenen) Kaffees wichtig. Der Gehalt an Coffein ist bedeutenden Schwankungen unterworfen: 0,75–2,50 Proc. Mittel etwa 1,2 Proc. Es findet sich in der Pflanze nur in der Frucht und den Blättern. Ausser dem Coffein ist neuerdings ein zweites Alkaloid: Coffearin aufgefunden. Von

Kohlenhydraten enthält der Kaffee Rohrzucker, ein Pentosan, ein Galactan und ein Mannan (Mannose-Cellulose oder Paramannan). Das Fett ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, gelb, schwach sauer, es besteht aus viel Olein, wenig Palmitin und Stearin und etwa 7 Proc. freier Oelsäure. Endlich enthält der Kaffee, an Kalk und Magnesia gebunden, Kaffeeeigensäure $C_{15}H_{18}O_8$, die mit Kalklauge einen Zucker $C_6H_7O_4$ und Kaffeesäure $C_8H_6O_4$ liefert. Mit Eisenchlorid giebt sie eine grüne Färbung.

Sorten Von den zahlreichen Sorten sind für Mitteleuropa die wichtigsten Arabien Mokka Indien Java, Ceylon, Menado Amerika 1) Westindien Cuba, Jamaica, Domingo, Portorico 2) Mittelamerika Costarica, Guatemala, Nicaragua 3) Brasilien Santos, Rio. Para etc

Zusammensetzung von Kaffeesorten nach KÖNIG

Bezeichnung	Wasser	Sackstoff-Substanz	Coffein	Fett	Zucker + Gummi + Dextrin	Kaffeinsäure	Rohfaser	Asche
	Procent							
Mexico, gebrannt	1,53	11,75	—	13,63	—	—	—	4,78
Ceylon, gebrannt	1,57	12,31	—	14,88	—	—	—	4,13
Costarica	3,49	13,68	—	11,40	—	—	—	4,29
Ostindischer	3,54	13,37	—	10,63	—	—	27,50	4,08
Jamaica	1,59	14,87	—	10,13	—	—	27,90	4,19
Brasilianischer, ältere Sorte	11,22	(6,96) 1,18	—	14,27	—	—	—	3,51
" " jüngere Sorte	11,65	13,92 1,16	—	14,10	5,96	5,84	—	3,55
Mokka, roh	8,98	9,87 1,08	—	12,60	9,55	0,87	(87,95)	3,74
" " gebrannt	0,63	11,23 0,82	—	13,59	0,43	1,24	(48,62)	4,56
Java, roh	13,31	13,86 1,48	—	12,17	7,40	32,35	16,61	3,98
" " gebrannt	1,92	17,18 1,44	—	16,51	2,45	33,61	18,42	4,91

Rösten des Kaffees: Abweichend von allen anderen, ähnlichen Genussmitteln werden die Samen des Kaffees vor dem Gebrauch einem Röstproceß unterworfen, indem man sie unter beständigem Umrühren auf 200—250° C erhitzt, bis sie eine dunkelbraune Farbe angenommen haben. Die Veränderungen, die hierbei der Kaffee erleidet, sind weitgehende und wichtige.

1) Der Wassergehalt wird sehr bedeutend vermindert (um durchschnittlich 18 Proc)
2) Das Coffein erleidet eine geringe Abnahme 3) Holzfaser, Fett und Zucker, dieser unter Caramelbildung, erleiden tiefgreifende Veränderungen 4) Fett und Salze erleiden einige Abnahme 5) Die Menge der in Wasser löslichen Stoffe nimmt ab 6) Es entwickelt sich beim Rösten das für den Kaffee so charakteristische Aroma Von den Destillationsprodukten sind genauer charakterisirt Aceton, Furfuro, Furfuran, Coffein, Ammoniak, Methylamin, Trimethylamin, Ameisensäure, Essigsäure, Resorcin, Hydrochinon, Pyrrhol, Pyridin, Essigsäure, Kohlensäure, endlich ein Oel Coffeon (Caffeol), das Methylsaligenon sein sollte, was sich neuerdings als irrig herausgestellt hat Es ist zu bemerken, dass sich nicht alle diese Stoffe in den Rostprodukten jedes Kaffees finden Die Gesamtmenge der flüchtigen Stoffe wird auf 0,117 Proc angegeben, sie riechen deutlich und stark nach Kaffee Man hat Vorrichtungen konstruirt, diese Stoffe bei der Röstung in Surrogate zu leiten, um denselben Geruch und Geschmack des Kaffees zu verleihen

Die Veränderungen beim Kosten ergibt auch folgende Zusammenstellung nach Koenig:

	Wasser	Stückstoff-Substanz	Coffein	Fett	Zucker	Sonstige stückstoff-freie Extraktstoffe	Zellgewebe	Asche
	Procent							
Ungebrannter Kaffee	11,23	12,07	1,21	12,27	8,55	83,79	18,17	3,92
Gebrannter Kaffee	1,15	13,95	1,24	14,48	0,66	45,09	19,39	4,75

Es ist vielfach gebräuchlich, wo das Rösten geschäftsmässig im grossen vorgenommen wird, dem Kaffee dabei gewisse Zusätze zu machen, angeblich, um ihn dadurch glänzender und ansehnlicher zu machen und um das Aroma vor Verflüchtigung zu schützen. Dieses Glasiren geschieht durch einen Zusatz von Zucker, der bis 5 Proc betragen kann, oder durch Besprengen mit Vaseline- oder Paraffinöl. Da besonders bei Verwendung von Zucker in Wahrheit eine Gewichtsvermehrung des Kaffees beabsichtigt wird, so ist dieses Verfahren unzulässig. Der „Verband von Kaffee-Grosshändlern“ hat als Grundsatz aufgestellt, dass solche Zusätze nicht mehr als 1 Proc vom Gewichte des Rohstoffes ausmachen sollen.

Ferner ist es gebräuchlich, die Bohnen vor dem Rösten mit einer warmen Lösung von Soda und Potasche zu waschen, „um die Gewebe zu lockern und um den Bohnen gewisse bitter schmeckende Stoffe zu entziehen“. Durch ein solches Verfahren kann ebenfalls eine Gewichtsvermehrung der Bohnen um 5 Proc erzielt werden. Ferner imprägnirt man die Bohnen während des Röstens mit einem Extrakt der Fruchtschalen des Kaffees (vergl S 902), oder der Samenschalen des Cacaos (vergl S 520). Zu diesem Zweck werden die Schalen mit Wasser oder stark verdünnter Salzsäure ausgekocht, die Abkochung durch Natriumkarbonat neutralisirt und durch Eindampfen concentrirt. Auch hier wird eine Gewichtszunahme von etwa 5 Proc beabsichtigt. — Wenn schon es sich in allen diesen Fällen nicht um den Zusatz gesundheitsschädlicher Stoffe handelt und die letztgenannten Zusätze sogar eines Werthes nicht entbehren, so sind doch alle solche Manipulationen als unzulässig zu erachten, da Eigenschaften des Kaffees vergetäuscht werden, die er nicht besitzt. Ferner ist zu beachten, dass durch diese Zusätze vielfach ein genügendes Verdunsten des Wassers beim Rösten verhindert wird. Höchstens wäre gegen einen ganz geringen Zuckerzusatz nichts einzuwenden.

Untersuchung des Kaffees. 1) Chemische Prüfung

Bestimmung des Caffeins 6 g Kaffee, den man 5mal hat durch eine enggestellte Kaffeemühle gehen lassen, werden mit Petroläther entfettet, der Rest des Petroläthers durch Erhitzen auf dem Wasserbade entfernt, dann 120 g Chloroform und 10 g Ammoniakflüssigkeit zugegeben, und während einer Stunde häufig kräftig geschüttelt. Dann lässt man vollständig absetzen, trennt die Chloroformlösung ab, wägt sie, destillirt das Chloroform ab und entfernt die letzten Reste Chloroform durch Erwärmen auf dem Wasserbade und Einblasen von Luft. Der Rückstand wird wieder in einigen Tropfen Chloroform gelöst, 20 g heisses Wasser zugegeben und ohne dabei umzuschütteln das Chloroform weggekocht. Endlich wird filtrirt und das Filtrat eingedampft. Wenn nothig, ist die Reinigung zu wiederholen. Der Rückstand ist Caffein. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass man nicht alles Chloroform vom Kaffee hat abgessen können, sondern in der Regel nur 100 g — 5 g Kaffee.

Zuckerbestimmung Ein Quantum fein gemahlener, getrockneter Kaffee (10 g) wird mit Wasser extrahirt, der Auszug im Wasserbade zur Sirupkonsistenz eingedampft, mit 90—95 proc Alkohol behandelt, filtrirt, der Rückstand auf dem Filter mit Alkohol ausgewaschen, der Alkohol verdunstet, der Rückstand mit Wasser aufgenommen und in der wässrigen Lösung Trauben- und Rohrzucker vor und nach dem Invertiren mit Fehling'scher Lösung bestimmt. — Sollte die wässrige Lösung noch in störender Weise gefärbt sein, so fällt man den Farbstoff mit wenig Bleessig, filtrirt, entfernt das überschüssige Blei mit verdünnter Schwefelsäure und verfärbt mit dem Filtrat wie oben angegeben (vergl. Saccharum).

Extraktbestimmung 10 g fein gemahlener und getrockneter Kaffee werden mit 200 ccm Wasser in einem 350 ccm haltenden Becherglas mit Glasstab gewogen, unter Umrühren, um zu Anfang ein Uebersteigen zu verhüten, zum Kochen erhitzt, 5 Minuten im Kochen erhalten und nach dem Erkalten auf das ursprüngliche Gewicht aufgefüllt. 25—50 ccm des Filtrats werden dann in einer Platinschale eingedampft und zum konstanten Gewicht getrocknet.

Nachweis des Glasirens Das Glasiren mit Vaselineol oder Paraffinol weist man nach, indem man 10 g der unzerkleinerten, gebrannten Bohnen zweimal mit 50 ccm Aether durchschüttelt, filtrirt, mit 50 ccm Aether nachwäscht, verdunstet und den Rückstand auf seine Verseifungsfähigkeit prüft

Um das Glasiren mit Zucker nachzuweisen, schüttelt man 10 g unzerkleinerte Bohnen zweimal mit je 200 ccm Wasser kurze Zeit durch, wäscht mit 100 ccm Wasser nach, bringt das Filtrat auf 500 ccm und bestimmt in 200 ccm den Zucker mit Fehling'scher Lösung und in 300 ccm den Extraktgehalt Ohne Zusatz gebrannte Bohnen geben dabei etwa 5 Proc Extrakt und 0,5 Proc Zucker resp Fehling'sche Lösung reducirende Stoffe — Es ist bei diesen Proben nothwendig, unverdächtige Bohnen daneben zu untersuchen

2) **Mikroskopische Prüfung** Zum Nachweis von Kaffee in gemahlenem und gebranntem Kaffee oder in einem Gemenge von Surrogaten und Kaffee oder in einem andern Pulver, vergleicht man das betr Pulver zunächst makroskopisch mit dem unverdächtigsten Kaffee, sucht verdächtige Partikel heraus und untersucht sie gesondert, indem man, wenn sie gross genug sind, in gewohnter Weise Schnitte macht und diese unter dem Mikroskop untersucht Das übrige Pulver wird im Mörtel noch etwas zerrieben und ebenfalls unter dem Mikroskop untersucht Zum Aufhellen empfiehlt es sich, das Pulver mehrere Tage in Chloralhydratlösung (3 Th. Chloralhydrat und 2 Th. Wasser) einzulegen oder es mit verdünnter Kalilauge (5proc) aufzukochen Zunächst werden die Steinzellen der Samenschale auffallen Der Nachweis von Kaffee ist erst als erbracht zu erachten, wenn daneben auch das Parenchym des Endosperms (vergl S 898) deutlich erkannt ist, da es hier und da vorkommt, dass man Surrogaten die beim Verarbeiten des Kaffees (vergl S 897) in grosser Menge abfallende Samenschale beimengt, um für die mikroskopische Untersuchung Kaffee vorzutäuschen.

Beurtheilung des Kaffees Der Extraktgehalt soll nicht unter 20 Proc. sinken, aber auch nicht erheblich höher sein. Eine Beimengung von bereits ausgezogenem Kaffee (Kaffeesatz) drückt die Extraktmenge herab, einige Surrogate (Cichorie, Feige) geben viel mehr (vergl S 905)

Der Wassergehalt für grünen Kaffee beträgt 12—18 Proc, für gebrannten 2 bis 4 Proc.

Der Aschengehalt soll bei rohem Kaffee 4 Proc, bei geröstetem 5,5 Proc nicht überschreiten, die Hälfte davon soll in Salzsäure löslich sein

Der Coffeingehalt soll mindestens 1,5 Proc betragen

Der Fettgehalt, durch Extrahiren der zerkleinerten Samen mit Petroläther bestimmt, soll bei grünem Kaffee nicht über 14 Proc, bei gebranntem nicht über 15 Proc sein Die unzerkleinerten Bohnen sollen an Aether nicht mehr als 1,5 Proc Fett abgeben, das Fett soll vollkommen versäufbar sein

Der Gehalt an Zucker (Extrahiren mit Alkohol, Invertiren des Rückstandes und Bestimmen mit Fehling'scher Lösung) soll im grünen Kaffee bis 6 Proc, im gebrannten bis 1 Proc betragen.

Der Chlorgehalt soll 0,025 Proc nicht überschreiten Bei havarrtem, durch Seewasser beschädigten Kaffee ist der Chlorgehalt erheblich höher

Anwendung. Von einer arzneilichen Verwendung des Kaffees als anregendes Mittel, bei Vergiftungen etc kann kaum gesprochen werden, sie fällt mit derjenigen als Genussmittel zusammen Zu erwähnen ist die äusserliche Anwendung in Schnupfpulver (vergl. Mentholin) und als desodorirendes Mittel (z B 0,2 g Kaffee auf 1,0 g Jodoform). Sehr ausgedehnt ist die Verwendung als anregendes Getränk, das man herstellt aus 1 Th. gerösteter und gemahlener Bohnen, 10—15 Th. kochenden Wassers in bekannter Weise Hier und da sucht man die Löslichkeit durch den Zusatz einer geringen Menge von Soda zu erhöhen Im Orient ist es gebräuchlich, den Kaffeesatz (die extrahirten Bohnen) mit zu geniessen

Die Gesamtmenge der in Lösung gehenden Stoffe schwankt bei der gewöhnlichen Herstellungsmethode von 21—27 Proc

Nach KÖRNIG

Es lösen sich im Durchschnitt	(Coffein)-Stickstoff	Öel	Stickstoff- freie Ex- traktstoffe	Asche	Darin Kalk	
Procent						
25,5	1,74	0,5	5,18	14,52	4,05	2,40

Wenn der Haupttheil an der anregenden Wirkung des Kaffees auch dem Coffein zugeschrieben werden muss, so ist es doch zweifellos, dass auch andere Bestandtheile, wie die Kaffeegerbsäure und besonders die beim Rösten der Bohnen entstehenden brenzlichen Stoffe dabei mitbetheiligt sind, wodurch es sich erklärt, dass die Wirkung des Kaffees von allen Coffein- resp Theobrominhaltigen Genussmitteln die energischste ist, obschon der Coffeingehalt der Thees z. B. oft ein erheblich höherer ist, und dass derselbe von manchen Personen nicht vertragen wird, die Thee ohne jeden Nachtheil geniessen — Uebermässiger Kaffeegenuss ist unter allen Umständen schädlich, man hat nach dem Genuss von 80 g Kaffee Schwindel, Kopfschmerz, Zittern, Herzklopfen, Brechreiz beobachtet, welche Symptome erst nach mehreren Tagen schwanden.

Surrogate und Verfälschungen des Kaffees

Beide sind an und für sich deutlich verschieden, insofern die Surrogate den Kaffee ersetzen wollen, aber nicht den Anspruch erheben, Kaffee zu sein, was die Verfälschungen thun, freilich verwischt sich die Grenze, wenn die Surrogate unter auf Täuschung des Publikums berechneten Namen in den Handel gebracht werden, es ist in dieser Beziehung zweifelhaft, ob bei solchen Surrogaten die Bezeichnung Kaffee zugelassen werden darf, wenn derselben nicht ganz bestimmt und jeden Zweifel ausschliessend beigelegt wird, aus welchen Substanzen das Surrogat besteht, sodass Bezeichnungen wie Cichorienkaffee, Eichelkaffee, Malzkaffee etc. zulässig sein würden, solche wie „Gesundheitskaffee, Nussbohnenkaffee“ etc. dagegen nicht.

1) *Verfälschungen der ganzen gebrannten Samen.* Es kommen solche nicht häufig, aber doch hin und wieder vor, es handelt sich dann um künstliche Kaffeebohnen, die aus Leguminosenmehl (Lupinus), Getreide, Eichen, Cichorienpulver etc., die man vorher gebrannt, mit einem Bindemittel (Dextrin, Traganth) geformt und dann mit einem glänzenden Ueberzug (Harz oder Zucker etc.) versehen hat. Es soll auch vorkommen, dass man solchen künstlichen Bohnen Coffein (0,5 Proc.) zusetzt. Ihre Form und Farbe ist bei oberflächlicher Betrachtung meist der der echten Bohnen recht ähnlich. Sie sinken meist im Wasser unter, wogegen Kaffee schwimmt. Beim längeren Stehen mit Wasser event. unter Erwärmen zerfallen sie meist leicht, am Harzüberzug wäre vorher mit Alkohol zu lösen, sie können dann der mikroskopischen Untersuchung unterworfen werden. Indessen sind auch künstliche Bohnen vorgekommen (aus einer Kölner Fabrik), die auch nach mehrtägigem Verweilen in heissem Wasser nicht zerfielen. Eine Fabrik in Lille war 1891 im Stande, täglich 40 Kilo künstlichen Kaffee aus Cichorien und altem Mehl zu liefern.

Hierher gehört auch die Vermengung von Kaffee mit gewöhnlichen schwarzen Bohnen. Ferner die Methode, bereits extrahierte Bohnen von neuem zu rösten und zu glasiren. Sie enthalten dann nur 1 Proc. Fett. Endlich hat man havarirten Kaffee (ungebrannt) frisch angefärbt, z. B. mit Bleichromat.

2) *Verfälschungen und Surrogate der gebrannten und gemahlten Bohnen.* a) mit Theilen der Kaffeefrucht. Hierher gehört die Vermengung von Kaffeesurrogaten mit der bei der Zubereitung des Kaffees in grossen Mengen abfallenden Samenschale (vergl. S. 898), um für die mikroskopische Prüfung (vergl. S. 901) Kaffee vorantäuschen.

Ferner sind hier zu nennen die Fruchtschalen des Kaffees, d. h. das fleischige Exo- und Mesocarp, das als sogen. Saccakaffee oder Sultankaffee auch einen besonderen Handelsartikel bildet. Sie sind mikroskopisch nicht leicht nachzuweisen und be-

sonders mit den Früchten von *Ceratonia* (vergl. S. 899) zu verwechseln, doch fehlen ihnen die mit Kali sich violett und mit Vanillin und Salzsäure sich roth färbenden Inhaltkörper. Zu achten ist vorkommenden Falls auf die nach aussen dickwandige Epidermis mit spärlichen Spaltöffnungen, auf das Parenchym, dessen Zellen zuweilen einen




Fig. 211. (Nach MOELLER.)

Epidermis (ep) und Parenchym (p) des Pericarps der Kaffee Frucht. 160 mal vergrössert.




Fig. 212. (Nach MOELLER.)

Elemente aus dem Mesocarp der Kaffee Frucht. sp Gefässe. b Fasern. p Parenchym. bp Bastparenchym. 160 mal vergrössert.

grossen Krystall oder Krystallsand einschliessen (Fig. 211) und auf die starken Fasern der Gefässbündel (Fig. 212). Wenn, was häufig vorkommt, unter den Fruchtschalen sich auch vereinzelt das Endocarp (Pergamentschale, vergl. S. 897) befindet, so fallen dessen nach verschiedenen Richtungen verlaufende, gestreckte, reich getüpfelte Zellen, die bis 40μ dick sind, leicht auf, dürfen aber mit den Steinzellen der Samenschale nicht verwechselt werden.

Die Fruchtschalen enthalten: Wasser 3,64 Proc., Protein 6,56 Proc., Asche 7,8 Proc., Phosphorsäure 0,28 Proc., Rohfaser 15,0 Proc., Fett 2,86 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 84,84 Proc., Kohlehydrate 16,42 Proc. Dass man einen Auszug der Schalen oder der Kakaoschalen zum Imprägniren von Surrogaten benutzt, ist schon erwähnt. Die Blätter des Kaffeebaumes, die bis 1,25 Proc. Coffein enthalten, werden in Afrika und auf Sumatra wie Thee verwendet.

b) mit Theilen anderer Pflanzen.

a) mit anderen Samen. Hier spielen verschiedene Leguminosensamen eine bedeutende Rolle, so die von *Lupinus* (Kraftkaffee, Fruchtkafee), *Cassia occidentalis* L. (Fig. 213), *Cassia Sophora* L. (Mogdad-Kaffee, Neger-Kaffee, Kongo-Kaffee, Stephanie-Kaffee), *Cicer arietinum* L. (deutscher, französischer Kaffee), *Vicia Faba* L., *Parkia*-Arten (Sudan-Kaffee), *Astragalus baeticus* L. (Stragel-Kaffee), *Astragalus ex-capus* L., *Soja hispida* Moench.




Fig. 213. (Nach MOELLER.)

Gewebe der Samenschale von *Cassia occidentalis*, in Wasser gesehen.

s Trägerzellen von oben. cp Cuticula. p Palisaden. c Cuticularstäbchen der Palisaden. Die Wände der Zellen sind dünn mit zahlreichen cuticularisierten Stäbchen. In Wasser verquillt die dünne Membran und es bleiben nur die Stäbchen übrig.

Alle diese Samen sind unter dem Mikroskop schon an den Elementen der Samenschale leicht zu erkennen. Dieselbe besteht aus langgestreckten und meist ziemlich stark verdickten Palisaden und einer darunter gelegenen Schicht flüchtig nebeneinander stehender, in der Mitte eingezogener Zellen, den sogen. Trägerzellen (für die Unterscheidung der

einzelnen Samen vergl. MOELLER, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche 1886, S. 302 ff. und Voelz, die wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel 1899, S. 325 ff.).

Von den genannten Leguminosensamen im Bau verschieden sind diejenigen von *Arachis hypogaea* L. (vergl. S. 360), die als „afrikanischer Bohnenkaffee“ von GERR. SCHMIDT in Bockenheim in den Handel gekommen sind. Es sind die gebrannten, gespaltenen und vielfach zerbrochenen Samen, die, wenn die Hälften gut erhalten sind, Kaffeebohnen nicht unähnlich sehen.




Fig. 214. (Nach MOELLER.)
Querschnitt durch den Samen von *Phytelphas macrocarpa*. S Samenschale. E Endosperm.

Ferner werden angeführt die steinharten Endosperme einzelner Palmen, nämlich die von *Phoenix dactylifera* L. und *Phytelphas macrocarpa* R. et P. Die Samen der letzteren werden in grosser Masse zu Knöpfen etc. verarbeitet und die Abfälle davon sollen zerkleinert und geröstet als Kaffee verwendet werden. Beide sind leicht zu erkennen an den stark verdickten, getüpfelten Zellen des Endosperms, deren Wand wie beim Kaffee aus Cellulose (Reservecellulose) besteht, also mit Jod und Schwefelsäure blau wird. Die Wände sind dicker wie beim Kaffee, die Tüpfel gegen die Wand schärfer abgesetzt und nach innen (gegen die primäre Membran) meist verbreitert (vergl. auch *Phoenix*) (Fig. 214).

Eine ziemlich Rolle spielen die Eicheln, deren zerkleinerte und geröstete Samen allein als Eichelkaffee oder mit Kaffee vermengt in den Handel gelangen (vergl. Quercus). Sie sind mikroskopisch leicht zu erkennen an den Stärkekörnchen,

die von recht unregelmässiger Gestalt, rundlich, länglich, nierenförmig, gerundet-dreieckig, knollig sein können. Daneben kommen aus wenigen zusammengesetzte Körner vor. Alle haben einen deutlichen Kernspalt. Sie messen 15–50 μ (Fig. 215). Auch wenn, wie es zuweilen vorkommt, die Eicheln gebrüht, also die Stärkekörnchen verkleistert sind, ist ihre




Fig. 215. (Nach MOELLER.)
Aus dem Gewebe der Eichel. sp Gefässe. st Stärkekorn.
ep Epidermis. 300mal vergrössert.

Umrissform in den damit erfüllten und oft völlig erhaltenen Zellen noch einigermaßen zu erkennen, doch wird man alsdann das Hauptaugenmerk auf die Elemente der Fruchtschale richten, die oft in Stückchen in den Eichelkaffee gelangt. Es sind in ihr kleine, stark verdickte Steinzellen charakteristisch.

♂ mit Früchten:

Früchte der *Ceratonia Siliqua* L. (vergl. S. 699). Früchte der *Ficus Carica* L. (vergl. S. 641). Ausser den l. c. erwähnten

Oraciferensamen sollen der Cichorie auch Traubenkerne beigelegt werden, um Feigenkaffee vorzutäuschen. Cerealienfrüchte. Für ihren Nachweis wird man sich an die Stärkekörnchen halten (vergl. S. 294), doch ist zu beachten, dass solche Kaffeesurrogate auch aus Malz, also gekeimtem Getreide hergestellt werden, wobei die Stärkekörnchen eine mehr oder weniger weitgehende Veränderung erlitten haben. Es kommen meist die ganzen

Fruchte vor, doch bestehen Kaffessurrogate aus geröstetem Mais und Reis aus grobem Pulver Gedörrte und geröstete Birnen Ihr am meisten charakteristisches Element ist die Oberhaut, deren mit ziemlich dicken Radialwänden versehene Zellen durch zarte Wände in 3—4 Tochterzellen getheilt sind. Ferner kommen die bei den meisten Birnen vorhandenen, im Fruchtfleisch sich findenden Gruppen stark verdickter Steinzellen in Betracht

γ) mit Pflanzenachsen

Als solche werden geröstete und zerkleinerte Kartoffeln genannt Ueber ihr Starkmehl vergl S 294

δ) mit Wurzeln

Cichorien, die Wurzeln kultivirter Pflanzen von Cichorium Intybus (vergl S 829) Es ist hier noch darauf hinzuweisen, dass man die aus Cichorie bestehenden Surrogate wieder verfälscht mit anderen Wurzeln, ebenso wie man Cichorien etc benutzt zum Verfälschen des Feigenkaffees

Mehr als Kuriosität mögen noch folgende Verfälschungen erwähnt werden künstliche Bohnen aus den Samen von Phytelphas, in künstlichem Kaffee Pfefferschalen, Bohnenmehl, Pflaumenkerne etc

Bestandtheile einiger Kaffeesurrogate nach Koenig

	Wasser	Stickstoffhaltige Substanz	Fett (Aetherextrakt)	Zucker	Stickstofffreie Extraktstoffe	Rohsaft	Asche	Extrakt (d. h. in Wasser lösliche Stoffe) in der Trockensubstanz
	Procent							
Cichorien	18,16	6,53	2,74	17,89	41,42	12,07	6,19	70,50
Feigen	12,50	4,57	2,96	82,50	81,92	12,34	8,21	82,50
Johannsbrot	5,35	8,93	3,65	69,83	—	10,15	2,09	63,71
Cerealien (Roggen etc)	12,50	12,15	3,57	4,12	55,66	8,45	3,55	48,53
Malz	7,08	13,05	2,25	15,67	51,74	7,38	2,83	65,00
Congo-Kaffee (roh)	13,72	39,82	1,26	37,09	—	4,41	3,70	—
" " (geröstet)	4,22	27,06	1,19	3,25	39,74	19,28	4,63	22,50
Eicheln, geschält u geröstet	12,50	6,78	4,35	69,27	—	5,02	2,07	28,88
Dattelnkerne	9,27	5,46	8,50	52,36	—	23,97	1,44	12,87

Für die *Beurtheilung der Surrogate* kommen folgende Bestimmungen und Gesichtspunkte in Betracht.

1) Cichorie soll enthalten Wasser nicht über 15 Proc (Schweiz¹⁾ und Belgien²⁾, Fett nicht mehr wie 2 Proc (Belgien, Oesterreich³⁾, Extrakt 60 Proc (Oesterreich), 50 Proc (Belgien), Zufügen von Zucker oft bis zu 2 Proc gestattet (Belgien), Asche 8 Proc (Schweiz), nicht weniger als 4 Proc. (Oesterreich), davon in Salzsäure löslich 2,5 Proc (Schweiz)

2) Feige soll enthalten Wasser nicht über 20 Proc (Schweiz), Fett 2,5 Proc (Oesterreich), Extrakt 70 Proc (Oesterreich), Asche 5 Proc (Schweiz, Oesterreich), davon 1 Proc in Salzsäure löslich (Schweiz)

3) Getreide soll enthalten Wasser nicht über 3 Proc (Schweiz), Fett 2,5 Proc (Oesterreich), Extrakt 25 Proc, Asche 7 Proc (Oesterreich), 4 Proc (Schweiz) und davon 1 Proc in Salzsäure löslich.

4) Malz soll enthalten Extrakt 65 Proc

5) Eicheln sollen enthalten Wasser 3 Proc, Asche 4 Proc., davon 1 Proc in Salzsäure löslich (Schweiz)

6) Rübenschnittzel aus Zuckerfabriken sollen überhaupt nicht zu Kaffeesurrogaten verarbeitet werden (Oesterreich).

¹⁾ Schweizer Lebensmittelbuch 1899

²⁾ Gesetz vom 1 März 1895

³⁾ Vorschläge zum Codex alimentarius austriacus

7) Verdorbene, verschimmelte Surrogate, solche, die Käfer, Milben etc enthalten, sollen nicht verwendet werden

II. Coffea liberica Bull. In den Pflanzungen werden die Kaffeebäume durch einen Pilz *Hemileia vastatrix* Berk et Br sehr geschädigt, und alle Bemühungen seiner Herr zu werden, waren bisher vergeblich. Man hat daher versucht, für die Kultur andere Coffea-Arten ausfindig zu machen, die dem Pilz gar nicht unterworfen sind oder doch widerstandsfähiger gegen ihn sind. Als solche kommt in erster Linie die genannte Art in Betracht. Sie ist heimisch in Ober- und Niederguinea und wird gegenwärtig schon in immer steigendem Umfange kultiviert, so in Ceylon, Java, Hinterindien, Sierra Leone, Deutsch Ostafrika, auch Brasilien. Die Art bietet auch sonst einige Vortheile gegenüber *C. arabica*, insofern die Pflanzen ausserordentlich reichlich tragen, lange tragfähig bleiben und grössere Samen produciren. Ein Nachtheil gegenüber *C. arabica* besteht darin, dass das Pericarp sehr hart ist und durch Gährung erst aufgelockert werden muss.

Die Samen sind etwas grösser wie die von *C. arabica*, aber häufig von unregelmässiger und unansehnlicher Gestalt, auch soll der Geschmack des daraus bereiteten Getränkes zuweilen weniger angenehm und etwas „ölig“ sein. Daher werden sie erheblich niedriger bezahlt. Im gewählten und gebrannten Kaffee kann man *C. liberica* leicht erkennen an den Steinzellen der Samenschale. Sie haben folgende Maasse:

Coffea liberica Länge bis 770 μ , ausnahmsweise bis 880 μ Breite bis 51 μ
Coffea arabica „ „ 480 μ „ „ 41 μ

Man wird also Steinzellen, die länger als 500 μ sind, der *liberica* zuschreiben. In Bruchstücken erkennt man sie daran, dass die innere Kontur der Wand gegenüber dem Lumen stets scharf abgesetzt erscheint, was bei *C. arabica* nicht so der Fall ist. Der Coffeingehalt betrug bei Samen aus Java 1,37 Proc, bei zwei Mustern aus Malakka 1,26 und 1,35 Proc.

III Ebenfalls in Kultur genommen ist *Coffea stenophylla* G Don aus Westafrika, sie ist auch nach Westindien eingeführt. Die Samen sollen schon als „Mokka“ in den Handel kommen.

IV Ibo-Kaffee soll ein Gemenge von Samen mehrerer Arten sein, darunter *C. arabica* und vielleicht *Coffea Zanguebariae* Lour.

V *Coffea laurina* Smeathm, *C. microcarpa* DC, *C. Zanguebariae* Lour werden in ihrer Heimath Ostafrika als Genussmittel verwendet, ebenso *C. mauritiana* Lam (Café marron) auf Bourbon. Die Samen enthalten kein Coffein.

Extractum Coffeae (Ergänzb.) Kaffee-Extrakt. Grob gepulverte Kaffeebohnen 2 Th. zieht man 4 Tage mit einem Gemisch aus Weingeist (87 proc) 4 Th., Wasser 6 Th., dann nochmals 24 Stunden mit Weingeist 2 Th., Wasser 3 Th. aus, presst ab und dampft zu einem dicken Extrakt ein. — Diet Gebrannter, fein gemahlener Kaffee 100 Th. wird zweimal je 3 Tage zuerst mit Weingeist 120 Th., Wasser 180 Th., dann Weingeist 80 Th., Wasser 120 Th. ausgezogen, die filtrirte Pressflüssigkeit auf 20 Th. eingedampft, Weingeist 5 Th. zugesetzt und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 15–16 Th.

Extractum Coffeae fluidum (Ergänzb.) Kaffee-Fluidextrakt. Aus mittelfein gepulverten Kaffeebohnen 100 Th. und q. s. einer Mischung aus Weingeist (87 proc) 5 Th., Wasser 7 Th. im Verdrängungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 25 Th., sammelt zuerst 85 Th. und stellt 1 a. 100 Th. Fluidextrakt her. Man braucht etwa 700 Th. Lösungsmittel. Auf gleiche Weise stellt man aus gerösteten Bohnen ein Extrakt dar, welches zur schnellen Bereitung von Kaffee auf Reisen u. s. w. dient. 2–3 Theelöffel auf eine Tasse heissen Wassers.

Essentia Coffeae saccharata.

Kaffee-Likör (DIETRICHI)

Rp.	1. Seminis Coffeae tostae pulv	500,0
	2. Spiritus Vini Cognac	200,0
	3. Spiritus Aetheris nitrosi	20,0
	4. Spiritus (90proc.)	4,5 l
	5. Aquae	6000,0

6. Sacchari 4500,0

7. Aquae 2000,0

8. Seminis Coffeae tostae pulv 50,0

9. Tincturae Vanillae 10,0

10. Olei Amygdalarum aetheriei gtt. II.

Man macerirt 1–5 24 Stunden, destillirt ab 8000,0
 fügt eine kochend heisse Lösung von 6 in 7 und
 zuletzt 8–10 hinzu und filtrirt nach 24 Stunden

Mixtura amethystea REVELL

REVELL's Mixtur gegen Trunkenheit.

Rp Infusi Coffeae tostae (25,0)	125,0
Natru chlorati	4,0
Liquoris Ammonii acetici	10,0
Sirupi simplicis	30,0

Innerhalb $\frac{1}{2}$ Stunde auf zweimal zu nehmen**Mixtura Coffeae chininata**

Mixtura Chinini sulfurici dulcificata.

Rp Infusi Coffeae tostae (10,0)	100,0
Chinini sulfurici	0,5
Sacchari albi	30,0

Umgeschüttelt 1 Weinglas voll zu nehmen

Mixtura laxativa cum Coffea

Rp 1 Seminis Coffeae tostae	
2 Foliorum Sennae	
3 Sacchari albi	
4 Magnesi sulfurici ss	10,0
5 Aquae ferriadae	150,0

Man übergiesst 1 und 2 mit 5, seht nach $\frac{1}{2}$ Stunde ab und löst 3 und 4.**Morsuli Coffeae s S 284**

Sirupus antarthriticus SEVERIN

Sirop antigoutteux de SEVERIN

Rp 1 Seminis Coffeae grosso modo pulv	1000,0
2 Foliorum Fraxini excelsioris	10,0
3 Sacchari albi	800,0
4 Acidi carbonici liquefacti	gtt V
5 Aquae calidae	q s

Im Verdrängungswege erschöpft man 1 mittelst 5, letztem ersten Auszuge 3, zieht mittelst des zweiten 2 aus, dampft letzteren ein und stellt i n 1000 g Sirup her. Diureticum Gegen Gicht und Rheuma.

Sirupus Coffeae (Diät.)

Kaffeesirup

Rp 1 Seminis Coffeae tostae sub. pulv	200,0
2 Aquae calidae	250,0
3 Spiritus Vinl Cognac	50,0
4 Sirupi simplicis ebullientis	800,0

Cafein, von KÖCKERTZ, BRANDES & Co ist ein entöltter Kaffeeauszug**Kaffee-Konserven, Flüssige.** Wird aus Kaffee pulver gewonnen, indem man dasselbe mittelst heisser, mit 10 Proc Pottasche versetzter Stärke-zuckerlösung, dann nochmals mit kaltem Wasser auszieht und beide Auszüge mischt**Kaffee-Essenz, Holländische**, in Pulverform, besteht aus gebranntem Zucker**Kaffee-Extrakt, Flüssiger**, von GUS & COLE-GRANT Ein mit kaltem Wasser gewonnener Kaffeeauszug wird mit einer Kaffeeabkochung gemischt und zum Extrakt eingedampft**Kaffee glasur**, zum Glänzendmachen des gebrannten Kaffees. Unter dieser Bezeichnung ist ein Paraffinum liquidum vom spec Gew 0,868 angetroffen worden**Kaffee pulver.** S Pulvis Jalapae compositus**Migräneextrakt**, SCHONFELD's, ist ein weingeistiger Auszug aus rohen Kaffeebohnen**Kaffee-Ersatz, Kaffee-Surrogate****Kaffeesurrogat** von BEHR wird aus Weizen, Mais und Gerste bereitet**Kaffeesurrogat** von BERING, BERING's Kraftkaffee, Lupinenkaffee, besteht aus entbittertem und geröstetem Lupinensamen**Kaffeesurrogat**, Approbirtes, aus Köln, ist gebrannter, zum Theil verkohlter Zucker**Kaffeesurrogat**, DOHREN's Getreidekörner werden gedämpft und erhalten vor dem Brennen einen Zusatz von 3 Proc Natrumbikarbonat**Kaffeesurrogat** von GROTHE ist ein Gemisch aus geröstetem Roggenbrot, gerösteten Erbsen und gebranntem Zucker**Kaffeesurrogat** von LEUSMANN & ZABEL ist ein stärkemehlarmes Gemisch mit Spuren von Coffein**Kaffeesurrogat** von PISONI ist Ochorenwurzelextrakt**Asiatischer Kaffee**, ein in Galzien gebräuchliches Surrogat, besteht aus ausgekochtem Kaffee, Ziegelmehl, Bimstein und gebrannten ErdmandelnMan befeuchtet 1 mit 2 und 3, übergiesst mit 4, stellt $\frac{1}{2}$ Stunde warm, lässt 24 Stunden stehen und filtrirt. Dient zur Geschmacksverbesserung von schlecht schmeckenden (Chinin etc) Mixturen**Sirupus Coffeae compositus
Keuchhustensaft**

Rp 1. Seminis Coffeae tostae gr plv	100,0
2 Corticis Chinae gr plv	50,0
3 Coriici Cinnamomi gr plv	
4. Benzoes gr plv	ss 25,0
5 Spiritus (90 proc.)	100,0
6 Aquae	500,0
7 Sacchari	600,0

Man befeuchtet 1—4 mit q s der Mischung 5—6 sammelt durch Verdrängung 400,0 und löst darin 7 kleineren Kindern 1 Theelöffel, grösseren $\frac{1}{4}$ —1 Theelöffel 3mal täglich**Sirupus Coffeae cum Morphino MOUGEOT**

Rp Infusi Coffeae tostae (2,5)	25,0
Sirupi simplicis concentrati	75,0
Morphini hydrochlorici	0,1

Findet Anwendung, wenn man die beruhigende und schmerzstillende Wirkung des Morphins zur Geltung bringen, die schlafbringende aber aufheben will

Sirupus coffeatus DELAHAYE

DELAHAYE's Keuchhustensaft

Rp Extracta Belladonnae	0,2
Sirupi Coffeae	95,0
Tincturae Ipecacuanhae	5,0

Theelöffelweise mehrmals täglich.

Sirupus contra tussim convulsivam GAUDIER.

Rp Cinchonini sulfurici	0,5
Morphini hydrochlorici	0,02
Tincturae Digitalis	
Tincturae Stramonii ss	1,5
Sirupi Coffeae	100,0

Theelöffelweise 3—4mal täglich.

Komprimierter Kaffee von RUCH, CHARTIER & BERLAT Ein durch starken Druck in Tafeln gepresstes Kaffeepulver

Deutscher Natronkaffee von THULO & v. DÖHREN soll aus Cichorien, geröstetem Getreide und Natriumbikarbonat bestehen.

Feigenkaffee, Fugine. Getrocknete und geröstete Feigen

Fruchtkaffee von BUCHMANN sind geröstete Lupinensamen.

Gesundheitskaffee, Homöopathischer, von KREPLIN, ist gebrannter Roggen

Gesundheitskaffee, Homöopathischer, von A. LOTZE erfunden, von Dr. W. SCHWABE verbessert, von L. WILLIG in Othen, soll aus geröstetem Roggen, Mais, Erbsenmehl, Zuckerrüben, Kakao und Salz bestehen

Gesundheitskaffee, Homöopathischer, von MOORE Bestandtheile in Proc (abgerundet) 8,6 Wasser, 3,7 Fett, 12 Protein, 73,2 Kohlehydrate, 2,5 Mineralstoffe

Gesundheitsparkaffee aus Braunschweig besteht aus gerösteten Getreidekörnern
Jamaica Kaffee. Kaffeesurrogate, die aus gerösteten Getreidekörnern, oder Eicheln, Hülsenfrüchten, Bohnenmehl u dergl. bestehen

Kronen Kaffee, ist aus rothen Rüben, Roggen, Cichorien und geröstetem Brod zusammengesetzt

LEIDENFROST'S Surrogat besteht aus Cichorien mit den Destillationsprodukten des Kaffees

Malto-Kaffee von BRENN ist schwach geröstetes Malz mit geröstetem Getreide

Mellotin-Kaffee Gemisch aus Kaffee, Cichorien und Dattelskernen

Malzkaffee, KATHEIMER'S, besteht aus gebranntem Malz mit Kaffee- oder Kakao schalenextrakt behandelt.

Nährkaffee, Dr. BILFINGER'S, ist eine Mischung aus gebrannten Eicheln und gebrannten Getreidekörnern

Saladin-Kaffee von SCHWING in Barmen, ein Kaffeesurrogat, wird durch mehrtägiges Dämpfen und nachheriges Rösten von Maiskörnern bereitet

Sintenis-Mocca-Sacca-Kaffee ist ein geröstetes Gemenge von Gerste und Maté

Coffeinum.

I. Coffeinum (Anstr Germ Hely) Caféine (Gall) Caffaina (Brit U-St) Caffeïn. Kaffein. Thein Guaranin (Psoalein) $C_8H_{10}N_4O_2 + H_2O$ Mol. Gew. = 212

Darstellung. Die Gewinnung des Coffeins erfolgt gegenwärtig fast nur noch aus dem Theestaub bez Theekehlricht, welcher höchstens etwa 1,7 Proc Coffein enthält, übrigens zum Zwecke der Steuerersparniss in denaturirtem Zustande verarbeitet wird. Die Darstellung von Coffein ist zur Zeit höchst unlohnend Während das Kilogramm Coffein vor etwa 30 Jahren noch 200 Mark kostete, stellt es sich jetzt auf 16 Mark.

Die Darstellung von Coffein im pharm Laboratorium ist zwar nicht lohnend, aber zu Übungszwecken zu empfehlen. Sie lässt sich zweckmässig mit einer Bestimmung des Coffeingehaltes im Thee verbinden.

a) **Darstellung kleinerer Mengen** Man zieht 100 g gepulverten chinesischen Thee viermal mit heissem, destillirtem Wasser aus Die filtrirten Auszüge werden eingedampft und schliesslich unter Zusatz von 10—15 g gebrannter Magnesia zur Trockne gebracht Der trockne, gepulverte Rückstand wird alsdann mit Chloroform extrahirt Nach dem Verdampfen des letzteren hinterbleibt in der Regel ein etwas grünlich gefärbtes „Rohcoffein“, welches durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser unter Zusatz von Thierkohle gereinigt wird

b) **Darstellung grösserer Mengen** Die fabrikmässige Darstellung von Coffein erfolgt, wie schon bemerkt, aus dem Theestaube. Man extrahirt denselben mehrmals mit heissem Wasser, bringt die Auszüge durch Eindampfen zur Extraktconsistenz und zieht aus diesem Extrakt, nachdem zur Abscheidung von Gerbsäure etc. Kalkmilch zugesetzt worden ist, das Coffein durch Behandeln mit Weingeist aus Nach dem Abdestilliren des Weingeistes hinterbleibt ein Rohcoffein, welches durch Umkrystallisiren aus Wasser unter Zusatz von Thierkohle gereinigt wird.

In den letzten Mittheilungen, sirupsdicken, stinkenden Flüssigkeiten, hat KOSSEL eine von ihm Theophyllin genannte neue Base gefunden, welche nach seinen Unter-

suchungen der Formel $C_7H_8N_4O_2 + H_2O$ entspricht und = Dimethylxanthin, aber verschieden von Theobromin ist

Eigenschaften. Coffein stellt, aus Wasser krystallisirt, weisse, biegsame, seidenglanzende Nadeln dar, welche in der Regel zu einer wolligen Masse verflzt sind. Es löst sich in etwa 80 Th. Wasser von $15^\circ C$, oder in 2 Th. siedendem Wasser. Diese letztere Lösung erstarrt beim Erkalten zu einem Krystallbrei. Es löst sich ferner in etwa 50 Th. Weingeist von 90 Proc. oder in 150 Th. absolutem Alkohol oder in 9 Th. Chloroform, dagegen ist es weniger löslich in Aether (1:550), und noch weniger in Schwefelkohlenstoff, Benzol oder Petroläther. Das aus Wasser krystallisirte Coffein entspricht der Zusammensetzung $C_8H_{10}N_4O_2 + H_2O$. Das aus absolutem Alkohol oder Aether krystallisirte ist wasserfrei = $C_8H_{10}N_4O_2$. Das wasserhaltige Coffein verliert sein Krystallwasser bei $100^\circ C$ völlig, ein Theil desselben entweicht jedoch schon beim Aufbewahren in trockner Luft, wobei das Coffein einigermaassen ein verwittertes Aussehen annimmt. Beim Erhitzen auf $180^\circ C$ sublimirt Coffein als farb- und geruchloser Dampf, bei weiterem Erhitzen schmilzt es bei $230,5^\circ C$.

Obwohl das Coffein nicht alkalisch reagirt, so ist es doch zu den Basen zu rechnen, da man wohlcharakterisirte Salze desselben mit Säuren kennt. Aus seinen Salzlösungen wird das Coffein durch Ammoniak oder atzende Alkalien nicht leicht gefällt, da es in Alkalien noch leichter löslich ist wie in reinem Wasser. — Die Löslichkeit des Coffeins in Wasser wird noch erheblich gesteigert durch die Anwesenheit gewisser Substanzen, wie Kaliumbromid, Natriumbenzoat, Natriumsalicylat, Natriumcinnamat, Antipyrin.

Die kaltgesättigte wässrige Lösung wird durch Mayer'sches Reagens (s. S. 205) oder durch Jodlösung nicht gefällt, dagegen giebt sie mit Gerbsäure einen weissen, im Ueberschuss des Reagens löslichen Niederschlag.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Coffein ein Derivat des Xanthins und zwar Trimethyl-Xanthin (Theobromin und Theophyllin sind zwei isomere Dimethyl-Xanthine), während das Xanthin selbst in nahen Beziehungen zur Harnsäure steht.

Coffein ist früher durch Methylieren des Theobromins und neuerdings vom Dimethylharnstoff und der Malonsäure ausgehend vollständig synthetisch dargestellt worden.

Identitätsreaktion. Dampft man 0,1 g Coffein mit 10 ccm Chlorwasser in einem Porcellanschalen auf dem Wasserbade zur Trockne ein, so hinterbleibt ein gelbröthlicher Fleck, welcher beim Aufblasen von Ammoniakdämpfen purpurroth wird. Beruht auf der Bildung von Amalinsäure, Ammoniakgas färbt Amalinsäure allmählich roth bis dunkelviolet und die entstandene Verbindung (= Murexoin) löst sich mit purpurrother Farbe in Wasser, ähnliche Reaktionen geben auch Theobromin und Harnsäure = Isopurpur- (Murexid-) Reaktion. Xanthin giebt nach der Oxydation keine Färbung mit Ammoniak, wohl aber mit Kali- oder Natronlauge.

Prüfung. 1) Die kaltgesättigte wässrige Lösung werde durch Jodjodkaliumlösung nicht getrübt (Trübung würde Alkaloide anzeigen, welche mit Jodlösung unlösliche Verbindungen eingehen) und durch Ammoniakflüssigkeit nicht gefärbt (färbende Verunreinigungen). — 2) Schwefelsäure und Salpetersäure sollen mit Coffein keine Färbung geben. Rothfärbung mit Salpetersäure würde auf Morphin oder Brucin hinweisen. Bezüglich der Färbung mit Schwefelsäure ist folgendes zu beachten. Reines Coffein löst sich in Schwefelsäure allerdings ohne Färbung auf. Dunkelfärbung könnte auf Kohlehydrate, z. B. Zucker, eine Röthung auf Salicin hinweisen. Bei den gegenwärtig im Handel befindlichen Coffeinsorten tritt in der Regel eine schwache Gelbfärbung mit Schwefelsäure ein. — Gerbsäurelösung ruft in der wässrigen Coffeinelösung einen starken Niederschlag von Coffeintannat hervor, welches sich aber in einem Ueberschusse von Gerbsäure wieder auflöst. Dieses letztere Verhalten zeigen auch einige andere Alkaloide.

Aufbewahrung Diese erfolgt nach Austr Germ Helv vorsichtig, weil man sich davon überzeugete, dass das Coffein keine ganz harmlose Substanz ist. Ausserdem ist es des leichten Verwitterns wegen in gut geschlossenen Gefässen an einem nicht zu warmen Orte aufzubewahren

Anwendung Kleine Gaben von Coffein wirken anregend auf das Grosshirn, grosse Gaben erzeugen starke Aufregung, Ohrensausen, Beklemmungen, Schlaflosigkeit, Zittern, kurz es tritt das ausgesprochene Bild einer Vergiftung ein, die aber durch Bettwärme, Alkoholica gehoben werden kann

Man giebt es subkutan und innerlich bei Neuralgien, Migräne, bei Herzkranken als Ersatzmittel der Digitalis im Stadium der gestörten Compensation, wo es auch diuretisch wirkt Als Antidot bei Vergiftungen mit Morphin und Curare, sowie curareartigen Substanzen Höchstdosen *pro dosi* 0,5, *pro die* 1,5 (Germ Helv) Nach Austr 0,2 *pro dosi* und 0,6 *pro die*

Die Salze des Coffeins charakterisiren sich im allgemeinen durch ihre geringe Beständigkeit Die meisten derselben werden schon durch Wasser in Coffein und die betreffende Säure zerlegt, sie entstehen also überhaupt nur bei Abwesenheit von Wasser, d h nur mit Coffein und concentrirter Säure Die Salze des Coffeins mit flüchtigen Säuren werden auch durch Erwärmen zerlegt Trocknet man z B das Coffeinhydrochlorid bei 100° C, so geht die Chlorwasserstoffsäure weg und reines Coffein hinterbleibt Da das Coffein nicht alkalisch reagirt, so kann man die Säure der Coffeinsalze titriren, als ob sie in freiem Zustande gegenwärtig wäre

† **Coffeinum citricum** (Helv Ergänzb) **Caffeinae Citras** (Brit) **Caffeina citrata** (U-St) Coffeincitrat Citronensaures Coffein $C_6H_{10}N_4O_7$, $C_6H_8O_7$, Mol. Gew = 380

Die Existenz dieses wiederholt angezweifelte Salzes ist durch E SCHMIDT festgestellt worden

Darstellung. 10 Th Coffein und 10 Th Citronensäure werden in 20 Th Wasser unter Erwärmen auf dem Wasserbade gelöst und diese Lösung dann unter Umrühren im Wasserbade zur Trockne gebracht

Eigenschaften Ein weisses krystallinisches Pulver, welches mit wenig Wasser eine klare, sirupdicke Lösung giebt, aus welcher sich beim Verdünnen mit Wasser Coffein abscheidet. Dieses löst sich bei weiterem Zusatz von Wasser, namentlich beim Erwärmen vollständig wieder auf Die kaltgesättigte Lösung des Coffeincitrates in absolutem Alkohol röthet blaues Lackmuspapier nur schwach (Abwesenheit grösserer Mengen freier Citronensäure) — In der wässrigen Lösung (1=100) erzeugt Kalkwasser, in geringem Ueberschuss zugesetzt, in der Kälte keine Trübung, wohl aber, wenn die Mischung zum Sieden erhitzt wird. Letztere Trübung verschwindet vollständig, wenn die Mischung in einem verschlossenen Gefässe erkaltet (Nachweis der Citronensäure) — Wird 1 Th Coffeincitrat mit 10 Th Chlorwasser auf dem Wasserbade eingedampft, so werde der gelbe Verdampfungsrückstand beim sofortigen Aufblasen von Ammoniakdämpfen purpurroth gefärbt

Das Salz enthält 49,74 Proc wasserfreie Citronensäure und 50,26 Proc wasserfreies Coffein.

Prüfung. 1) Mit Schwefelsäure oder Salpetersäure durchfeuchtet, färbt sich das Coffeincitrat nicht (vergl unter Coffeinum) 2) Bei Luftzutritt erhitzt, verbrennen 0,5 g desselben, ohne einen Rückstand zu hinterlassen (mineralische Verunreinigungen) 3) In einem Gemisch gleicher Theile Chloroform und Weingeist sei es vollständig löslich 4) Die wässrige Lösung (1 = 100) werde weder durch Baryumnitrat-, noch durch Silbernitrat-, noch durch Kaliumoxalatlösung getrübt (Schwefelsäure, Chlor, Kalk), auch nicht durch Schwefelwasserstoffwasser verändert (Braunfärbung = Blei) 5) Wird 1 g Coffeincitrat in 20 ccm siedendem Wasser gelöst, die Lösung mit Natronlauge alkalisch gemacht und nach dem Erkalten dreimal mit je 15 bez 10 bez 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt, so sollen nach dem Verdunsten des letzteren und Trocknen des Rückstandes bei 100° C annähernd

0,5 g Coffein zurückbleiben Ergänzb (Helv schreibt vor, dass mindestens 0,5 und höchstens 0,75 g Coffein erhalten werden sollen)

Aufbewahrung, Anwendung. Nach Helv und Ergänzb vorsichtig aufzubewahren Höchstgaben Helv 0,5 *pro dosi*, 2,0 *pro die* Ergänzb 0,6 *pro dosi*, 2,0 *pro die*

Coffeinum citricum effervescens. Caffeinae Citras effervescens Brit Natru bicarbonici 510,0, Acidi tartarici 270,0, Acidi citrici 180,0, Sacchari 140,0, Coffein citrici 40,0 Caffeina citrata effervescens U-St Caffeinae, Acidi citrici 55 10,0, Natru bicarbonici 330,0, Acidi tartarici 300,0, Sacchari 350,0 Beide Mischungen sind mit einer hinreichenden Menge Alkohol in der Wärme zu granuliren

† **Coffeinum hydrochloricum** Chlorhydrate de Caféine (Gall) Coffein-chlorhydrat Salzsäures Coffein $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot HCl + 2H_2O$. Mol Gew. = 266,5.

Zur Darstellung lost man eine beliebige Menge Coffein unter schwachem Erwärmen in einem mässigen Ueberschuss rauchender (!) Salzsäure (s S 56) auf und überlässt diese Lösung über Aetzkalk der Krystallisation Die ausgeschiedenen Krystalle werden durch Pressen zwischen Filtrirpapier getrocknet

Grosse, durchsichtige, farblose, monokline Krystalle, welche schon beim Waschen mit Alkohol oder Wasser in ihre Bestandtheile zerlegt werden Beim Liegen an der Luft werden sie unter Verlust von Wasser und von Chlorwasserstoff undurchsichtig Beim Trocknen bei 100—110° C geht aller Chlorwasserstoff weg und es hinterbleibt reines Coffein Im gut verschlossenen Gefässe an einem kühlen Orte aufzubewahren Das Salz enthält rund 72,8 Proc wasserfreies Coffein

† **Coffeinum hydrobromicum** Bromhydrate de Caféine (Gall) Coffein-bromhydrat Bromwasserstoffsäures Coffein $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot HBr + 2H_2O$ Mol Gew. = 311.

Wird durch Auflösen von Coffein in einem Ueberschuss von schwach erwärmter Bromwasserstoffsäure in der nämlichen Weise wie das chlorwasserstoffsäure Salz dargestellt.

Grosse, farblose, durchsichtige, wahrscheinlich monokline Krystalle, welche bei Berührung mit Wasser oder Alkohol in Coffein und Bromwasserstoffsäure zerlegt werden Beim Liegen an der Luft entweicht ein Theil des Krystallwassers - Bei 100° C wird es wasserfrei, indem zugleich ein Theil des Bromwasserstoffs weggeht, bei 110° C hinterbleibt reines Coffein Das Salz enthält rund 62,8 Proc wasserfreies Coffein

† **Coffeinum nitricum** Coffeinnitrat Salpetersäures Coffein $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot HNO_3 + H_2O$ Mol. Gew. = 275.

Zur Darstellung bringt man das Coffein mit einer zur Auflösung genügenden Menge farbloser Salpetersäure von 1,4 spec Gew zusammen und überlässt alsdann die erzielte Lösung, vor Licht geschützt, der Krystallisation über Aetzkalk Das Coffeinnitrat scheidet sich langsam in kleinen, dicken, säulenförmigen Krystallen ab, welche durch Pressen zwischen Fließpapier von anhaftender Mutterlauge zu befreien sind

Durch Wasser oder durch Alkohol wird es in Coffein und Salpetersäure zerlegt Wird es bei 100° C getrocknet, so hinterbleibt reines Coffein Das Salz enthält rund 70,5 Proc wasserfreies Coffein

† **Coffeinum sulfuricum** Coffeinsulfat. Schwefelsäures Coffein. $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2SO_4$. Mol Gew. = 292

Zur Darstellung löst man Coffein in etwa der zehnfachen Menge heissem Alkohol, welcher mit 2 Th conc Schwefelsäure versetzt ist, und überlässt alsdann die Lösung an einem kalten Orte der Krystallisation Nach längerem Stehen scheidet sich das Sulfat in Form kleiner, zu Rosetten vereinigter Nadeln ab Diese werden durch Wasser und durch Alkohol in Coffein und in Schwefelsäure zerlegt, lassen sich aber aus schwefelsäurehaltigem Alkohol unverändert umkrystallisiren Das Salz enthält rund 66,4 Proc wasserfreies Coffein

II **Coffein-Doppelsalze** Das Coffein charakterisirt sich durch eine grosse Auflöslichkeit in gewissen Salzlösungen Man nimmt an, dass es mit diesen Salzen sog Doppel-

salze eingeht. Diese Doppelsalze des Coffeins lassen sich namentlich zur subkutanen Anwendung des Coffeins benutzen. Werden dieselben in Lösung verordnet, so wurde es natürlich zulässig sein, sie ex tempore durch Auflösen der einzelnen Bestandtheile darzustellen.

† **Coffeino-Natrium benzoicum** (Germ. Helv.) **Coffein-Natriumbenzoat**. 50 Th. Coffein und 59 Th. Natriumbenzoat werden in 200 Th. Wasser gelöst. Die Lösung ist zu einem trocknen Pulver einzudampfen und auszutrocknen. — Farbloses, amorphes, bitter und aromatisch schmeckendes Pulver, löslich in gleichen Theilen Wasser oder in 80 Th. Weingeist. In der wässrigen Lösung (1 = 20) wird durch Salzsäure eine krystallinische Ausscheidung von Benzoesäure hervorgerufen, mit Ferrichlorid entsteht hellbrauner Niederschlag von Ferribenzoat. Durch Chloroform wird dem Präparate alles Coffein entzogen.

Bestimmung des Coffeingehaltes. A) Wird 1 g des Präparates in 20 ccm Wasser gelöst, mit 2 ccm Natronlauge alkalisch gemacht und die Mischung zweimal mit je 15 g Chloroform je 5 Minuten lang angeschüttelt, so soll die abgetrennte Chloroformlösung beim Verdunsten 0,43—0,46 g bei 100°C getrocknetes, wasserfreies Coffein hinterlassen (Helv.). B) Werden 0,5 g Coffein-Natriumbenzoat wiederholt mit je 5 ccm Chloroform ausgekocht, so soll das abfiltrirte Chloroform nach dem Verdunsten mindestens 0,22 g trockenes Coffein hinterlassen (Germ.).

Vorsichtig aufzubewahren. Höchstgaben *pro dosi* 1,0, *pro die* 3,0 g (Germ. Helv.).

Anwendung. Der wirksame Bestandtheil des Coffein-Natriumbenzoates ist das Coffein, das Natriumbenzoat ist nur das die Auflösung vermittelnde Medium und kommt therapeutisch wenig in Betracht. Man giebt das Präparat daher in jenen Fällen, in denen man früher Coffein verordnete, also bei Neuralgien, Migräne, bei Herzkrankheiten im Stadium der gestörten Compensation als Ersatzmittel der Digitalis. Hier wirkt es auch diuretisch. Man verordnet es innerlich in Form von Pulvern, Mixturen, aber wegen der leichten Löslichkeit des Präparates auch zu subkutanen Injektionen.

† **Coffeino-Natrium salicylicum** (Ergänzb. Helv.) **Coffein-Natriumsalicylat**. 50 Th. Coffein und 55 Th. Natriumsalicylat werden in 200 Th. Wasser gelöst und zu einem trocknen Pulver eingedampft (Helv.). Weisses, geruchloses, amorphes, zugleich bitterlich und süsslich schmeckendes Pulver, in 1 Th. Wasser und in 16 Th. Weingeist löslich. Die wässrige Lösung (1 = 20) giebt auf Zusatz von Salzsäure eine Ausscheidung von krystallinirter Salicylsäure. Sie wird noch in starker Verdünnung durch Ferrichlorid rothviolett gefärbt.

Bestimmung des Coffeingehaltes. A) Ergänzb. Werden 0,5 g des Präparates mit einigen Tropfen Natriumcarbonatlösung befeuchtet, wieder eingetrocknet und dann dreimal mit je 5 ccm Chloroform unter Erwärmen ausgezogen, so soll die abgetrennte Chloroformlösung nach Verdunsten des Chloroforms mindestens 0,2 g wasserfreies Coffein hinterlassen. B) Helv. In gleicher Weise wie *Coffeino-Natrium benzoicum* geprüft, soll das Präparat 43—46 Proc. wasserfreies Coffein ergeben.

Höchstgaben *pro dosi* 1,0, *pro die* 3,0 (Ergänzb. Helv.).

† **Coffeino-Natrium cinnamylum**. **Coffein-Natriumcinnamat**. 50 Th. Coffein und 50 Th. Natriumcinnamat werden in 200 Th. Wasser gelöst und zum trocknen Pulver eingedampft. Weisses, amorphes Pulver, in 2 Th. Wasser oder in 80 Th. Alkohol löslich. Es ergebe in der unter *Coffeino-Natrium benzoicum* angegebenen Weise geprüft 40—45 Proc. wasserfreies Coffein.

† **Coffeino-Natrium citricum**. **Coffein-Natriumcitrat**. 50 Th. Coffein und 50 Th. Natriumcitrat werden in 200 Th. Wasser gelöst und zum trocknen Pulver eingedampft. Es ergebe in der unter *Coffeino-Natrium benzoicum* angegebenen Weise geprüft, 40—45 Proc. wasserfreies Coffein.

† **Coffeino-Ammonium citricum**. **Coffein-Ammoniumcitrat**. 50 Th. Coffein und 50 Th. Ammoniumcitrat werden in 200 Th. Wasser gelöst und zum trocknen Pulver

eingedampft. — Es ergebe, in der unter *Coffeino-Natrium benzoicum* angegebenen Weise geprüft, 40–45 Proc wasserfreies Coffein

† **Coffeino-Kalium bromatum.** Coffein-Kaliumbromid 50 Th Coffein und 50 Th Kaliumbromid werden in 200 Th. Wasser gelöst und zum trocknen Pulver eingedampft — Es ergebe, in der unter *Coffeino-Natrium benzoicum* angegebenen Weise geprüft, 40–45 Proc wasserfreies Coffein

† **Coffeino-Natrium jodatum** Jodocoffein. Coffein-Natriumjodid 7,1 Th Coffein und 2,9 Th. Natriumjodid werden in 20 Th Wasser gelöst und zum trocknen Pulver eingedampft Soll in der unter *Coffeino-Natrium benzoicum* angegebenen Weise geprüft, 60–65 Proc wasserfreies Coffein ergeben

III † **Coffeinum phenylicum** Coffein-Phenol Coffeo-Phenol $C_6H_5N_4O_2$ $C_6H_5O + H_2O$. Mol. Gew. = 306.

Wird erhalten durch Auflösen von 22,6 Th. Coffein in 10 Th geschmolzenem Phenol Weisse oder schwach röthliche, in Wasser leicht lösliche, nicht ätzende, krystallinische Masse Wird zu subkutanen Injektionen angewendet und vereinigt in sich die Wirkung der Karbolsäure und des Coffeins

IV. † **Coffeinum resorcinicum** Coffein-Resorcin. Coffeo-Resorcin $C_6H_5N_4O_2$ $C_6H_5O_2 + H_2O$ Mol. Gew. = 322.

Wird erhalten durch Auflösen von 19,3 Th Coffein in 10 Th. geschmolzenem Resorcin Weisse oder röthliche krystallinische Masse, in Wasser leicht löslich, Anwendung wie Coffeinum phenylicum

V. † **Coffeinum trijodatum** Coffeintrijodid. Jodwasserstoffsäures Dijodocoffein $C_6H_5N_4O_2$ J_2 $HJ + 1\frac{1}{2}H_2O$. Mol. Gew. = 603.

Diese richtiger als „Jodwasserstoffsäures Dijodocoffein“ zu bezeichnende Verbindung entsteht, wenn man eine mit verdünntem Alkohol bereitete Coffeinalösung, mit Jodwasserstoffsäure versetzt, dem Sonnenlichte aussetzt Es scheiden sich alsdann metallglänzende, dunkelgrüne Prismen aus Die Verbindung hat die Zusammensetzung $C_6H_5N_4O_2J_2$ $JH + 1\frac{1}{2}H_2O$ In Alkohol ist sie leicht löslich, beim Schütteln mit Wasser geht Jod in Lösung

Bei Einführung des Coffeintrijodids in den Magen wird Jod abgespalten und dieses leicht resorbiert, ohne die Depressionerscheinungen zu verursachen, wie sie z B die Alkalijodide darbieten GRANVILLE empfiehlt daher das Coffeintrijodid als Jodpräparat.

Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren Man halte keine allzu grossen Vorräthe

VI † **Natrium coffeino-sulfuricum** Coffeinsulfosaures Natrium Symphorol-Na. Symphorol. $C_6H_5N_4O_2$ SO_3Na Mol. Gew. = 296

Zur Darstellung werden 100 Th. Chlorocoffein $C_6H_5ClN_4O_2$ (oder eine entsprechende Menge Bromocoffein) mit 75 Th wasserfreiem Natriumsulfat (Na_2SO_3) und 1000 Th. Wasser 8 Stunden im Autoklaven auf $150^\circ C$ erhitzt. Beim Erkalten scheidet sich das coffeinsulfosaure Natrium fast vollständig aus

Weisses, krystallinisches Pulver, mit etwa 20 Th kaltem Wasser eine stark bitter schmeckende Lösung gebend. Durch Erhitzen der wässrigen Lösung mit Mineralsäuren, z B Salzsäure, wird die Sulfosaure in Coffein und Schwefelsäure gespalten

Symphorol-L ist das Lithiumsalz, Symphorol-Sr (G) ist das Strontiumsalz der Coffeinsulfosaure

Zur therapeutischen Verwendung gelangt meist das Natriumsalz und zwar als sicher wirkendes Diureticum bei den verschiedenen Formen der Wassersucht, auch bei Fettsucht und Fettherz in Tagesgaben bis zu 4–5 g Das Lithiumsalz soll wegen der harnsaure lösenden Wirkung der Lithiumsalze bei Gicht und Harngries verwendet werden, das Strontiumsalz bei verschiedenen Nieren Erkrankungen Durch die Einführung der Sulfogruppe soll die Giftwirkung des Coffeins gemildert werden

II.

Rp. Coffeini	4,0
Natrii salicylic	5,0
Aquae sterilisatæ q. s. (5,0) ad 10,0 cm.	
1 cm = 0,4 g Coffeini.	

Beide Lösungen sind sterilisirt abzugeben. Zu diesem Zwecke bringt man zwischen Deckelstopfen und Glas einen Faden, erhitzt $\frac{1}{4}$ Stunde

in siedendem Wasser, zieht den Faden heraus und lässt erkalten.

Tinctura Coffeini composita.

Rp. 1. Foliorum Theae Pecco	10,0
2. Spiritus diluti	100,0
3. Coffeini	1,0

Man macerirt 1 mit 2 zehn Tage und löst in der Kolatur 3 auf.

Cola.

Gattung der Sterculiaceae—Sterculieae.

Cola acuminata R. Br. (syn. *Sterculia acuminata* Beauv.). Heimisch in den Küstenländern Westafrikas von Sierra Leone bis zum Kongo und Guinea (10° nördl. Br. bis 5° südl. Br.), etwa 600 Meilen weit ins Innere gehend. Durch die Kultur verbreitet in Afrika, Asien (Java, Ceylon, Seychellen etc.), Amerika (Westindien, besonders Jamaika und Südamerika) und aus denselben häufig verwildert (Afrika, Westindien und Südamerika).

Beschreibung. Bäume von mittlerer Grösse, vom Habitus einer Rosskastanie. Blätter wechselständig, einfach bis dreilappig, lanzettlich oder oval, in eine Spitze ausgezogen, bis 20 cm lang und 10 cm. breit. Blattstiel halb so lang. Die Blätter in der Jugend sternhaarig. Blüthen in rispigen Trugdolden. Blüthe mit gelbem, 5—6 zähligen, verwachsen-blättrigen Perigon, entweder diklin oder polygam. Die männlichen Blüthen mit 20 zweifächrigen Staubblättern, die auf kurzen Filamenten in 2 Reihen einer becherförmigen Skule angeheftet sind, die einen Rest des Gynäceums trägt. Die weibliche Blüthe mit 5 zähligen, apocarpen, oberständigen Fruchtknoten, die einzelnen Carpelle eine zurückgebogene Narbe tragend. In jedem Fach eine doppelte Reihe von Ovis. Am Grunde des Fruchtknotens sterile Staubblätter. Die Frucht besteht aus bis 5, meist aber weniger, kurzgestielten, horizontal abstehenden, wenig-samigen Balgkapseln, die bis 13 cm lang werden, bis 7 cm breit und bis 5 cm dick sind. Sie enthalten 2—6 Samen einreihig an der Bauchnaht. Das Pericarp ist dunkelbraun, stark runzelig, lederig oder holzig. Die Samen sind bis 4 cm lang, 3 cm breit und ebenso dick, durchschnittlich 20 g schwer. Die Gestalt ist etwa ei-kegelförmig, aber durch gegenseitigen Druck in der Frucht ziemlich unregelmässig, mindestens etwas abgeplattet. Westindische Samen sollen grösser sein, als afrikanische. Die Samenschale ist pergamentartig, rothbraun. Sie umschliesst den Embryo mit normal 2, ausnahmsweise auch bis 5, dicken Keimblättern, kleiner Plumula und Radicula (Samen mit 2 Keimblättern heissen Gonja, mit 4 Keimblättern Fatak). (Fig. 216.) Der Embryo ist im frischen Zustand weiss oder rosenroth, getrocknet rothbraun. Es sollen rothe und weisse Samen in derselben Frucht vorkommen.




Fig. 216. Kolanuss, aufgespalten.
a Radicula.

Verwendung finden die Samen: Semen Cola (Ergänzb.). Nuces Colae. Nuces Colae siccatae. — Kolanüsse. Kolasamen. Guru- oder Gurranüsse. Bissynüsse. Kokkoruku. — Noix de Kola (Gall. Suppl.). Noix de Gourou ou de Sudan. Semente de Kola. — Cola-nuts. Cola-seed. Die Droge besteht gewöhnlich nur aus dem Embryo ohne Samenschale oder nur aus den getrennten Keimblättern.

Sie sind trocken 2,5—4 cm lang, bis 3 cm breit, bis 8 g schwer, unregelmässig verbogen und abgeflacht, an der Trennungslinie der Keimblätter etwas wulstig aufgetrieben

Das Gewebe besteht aus den etwas radial gestreckten Zellen der Epidermis und einem Parenchym mit spärlichen kleinen Interzellularräumen, dessen an die Epidermis grenzende Lagen meist zusammengefallen sind. Die Zellwände sind dünn, angeblich zuweilen getüpfelt. Einzelne Zellen enthalten einen unregelmässigen Klumpen von brauner Farbe und ausserdem wie die übrigen Zellen des Parenchyms Stärke (Fig 217). Der braune Stoff kommt spärlicher wie in den genannten Zellen auch sonst häufig im Parenchym vor.




Fig 217 Querschnitt durch das Gewebe der Kolyedonen. a Sekretzelle mit braunem Klumpen

Die Stärkekörnchen sind rundlich, eiförmig, bohnenförmig etc, 3–30 μ gross, meist mit Spalt und zuweilen mit deutlicher Schichtung (Fig 218).

Ferner fallen im Gewebe dünne Gefässbündel auf, die, ziemlich weit entwickelt, ein von Markstrahlen durchzogenes Xylem erkennen lassen.

Für die Erkennung der Kolanuss in Pulvermischungen verwertbar sind nur die Stärkekörnchen.

Stärke 33,754 Proc., Gummi 3,04 Proc., Cellulose 29,331 Proc., Gerbstoff 1,618 Proc., Asche 3,395 Proc., Wasser 11,909 Proc. — Der wichtigste Bestandtheil der Kolanüsse ist das Coffein. Nach KNEBEL sollte dasselbe nicht im Samen präexistiren, sondern derselbe sollte frisch ein Glukosid Kolanin enthalten, das durch ein im Samen ent-



Fig 218 Stärke der Kolanuss

haltenes Ferment (Kolazym), durch heisses Wasser, Säuren oder das Ferment des Speichels, ja schon durch das Trocknen des Samens in Coffein, Glukose und Kolaroth $C_{14}H_{19}(OH)_2$ wenigstens theilweise zerfällt. Darauf sollte es zurückzuführen sein, dass der anfangs bittere Geschmack beim Kauen, der dem Glukosid zukomme, in einen süssen, von der freiwerden Glukose herrührend, übergehe.

Die Existenz dieses Glukosids ist mehrfach angezweifelt worden. Nach einer Ansicht soll das Kolanin ein Gemenge der als Spaltprodukte desselben angegebenen Körper sein, andere Forscher erhielten als Kolanin geringe Mengen eines harzartigen Körpers. Neuerdings nimmt man an, dass das Coffein theils frei, theils an den Gerbstoff (Kolatanin) gebunden im Samen vorhanden sei, und die Glukose soll durch Zersetzung des glukosidischen Gerbstoffes entstehen. Jedenfalls steht fest, dass ein Theil des Alkaloids sich nicht im freien Zustande befindet. Endlich hat man behauptet, dass Bakterien, die sich in den, um sie frisch zu erhalten, wiederholt angefeuchteten Samen vorfinden, die Veranlassung zur Bildung des als Kolanin bezeichneten Körpers geben.

Der Gehalt der Samen an Coffein und Theobromin ist ein recht wechselnder. Der Gesamtgehalt in Procenten wird von P. JUAN folgendermassen angegeben.

Kolanüsse aus Japan	1,635	Trockne Nüsse vom Niger B	0,902
„ vom Kongo	1,485	Trockne Nüsse von Sierra Leone A.	2,273
„ „ „ A.	1,170	„ „ „ „ „ B	2,410
„ „ „ B	1,432	Nüsse von der Elfenbeinküste	1,864
FrischeNüsse(57,35% H_2O)	0,624	Havarirte Nüsse	2,170
Trockne Nüsse vom Sudan	1,330	Verschimmelte Nüsse	1,210
„ „ vom Niger A	1,230	„ „	2,029

Es wird vorgeschlagen, Nüsse mit einem Minimalgehalt von 1,7 Proc zu verlangen, jedenfalls sind solche, die weniger wie 1 Proc enthalten, zurückzuweisen.

Ausser dem Coffein und Theobromin ist auch das Kolaroth an der Wirkung wesentlich betheiligt

Werthbestimmung der Kolanuss Dieselbe hat den Gehalt an Coffein und Theobromin zu ermitteln und zwar sowohl die Menge dieser Stoffe im freien wie im gebundenen Zustande, da die letzteren von besonderer Wichtigkeit sind.

Man verfährt nach DIETREICH folgendermassen

a) Bestimmung des Gesamtalkaloids 10 g der feingeraspelten Droge werden mit etwas Wasser befeuchtet, mit 10 g ungeloschem, gekornen Kalk gemischt und im Soxhlet mit Chloroform $\frac{3}{4}$ Stunden extrahirt. Dann spült man mit Chloroform nach und bringt die Lösung annähernd zur Trockne. Den Rückstand nimmt man unter sehr gelindem Erwärmen mit 20 cem N Salzsäure auf und filtrirt unter sorgfältigem Nachwaschen des Filters und des Schälchens, in dem man die Lösung vorgenommen hat, in einen Scheidetrichter von 100 cem Inhalt. Der Inhalt desselben wird mit Ammoniak stark alkalisch gemacht, eine Viertelstunde unter öfterem Umschütteln stehen gelassen und dann dreimal mit je 20 cem Chloroform ausgeschüttelt. Die Chloroformlösung wird verdunstet und bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Der Rückstand $\times 10 =$ Procentgehalt der Nusse

b) Bestimmung des Gehaltes an freiem Alkaloid 10 g der feingeraspelten Droge mischt man ohne Befeuchtung mit 10 g grobem Sand und extrahirt im Soxhlet 2 Stunden mit Chloroform. Die Lösung wird verdunstet und der Rückstand bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Das ist freies Coffein und Fett. Der Rückstand wird mit heissem Wasser ausgekocht, filtrirt und das Filter sorgfältig ausgewaschen. Die wässrige Lösung wird verdampft, das Roh Alkaloid zur Reinigung mit 20 cem N Salzsäure aufgenommen, filtrirt, mit Ammoniak alkalisch gemacht und wie bei a weiter verfahren. Der Rückstand $\times 10$ ist der Gehalt an freiem Alkaloid. Durch Subtraktion erhält man dann den Gehalt an gebundenem Alkaloid

c) Einfacher und weniger umständlich ist folgende Methode zur Bestimmung des Gesamtalkaloids nach SIEDLER, die allerdings ein etwas weniger reines Coffein liefert, aber für die meisten Fälle völlig ausreicht. 10 g Pulver der Droge werden mit 120 g Chloroform und 10 g Ammoniakflüssigkeit im Scheidetrichter während einer Stunde wiederholt kräftig geschüttelt und dann zum Absetzen bei Seite gestellt. Nach einigen Stunden (nach völligem Absetzen) wird die Chloroformlösung in ein tarirtes Kölbchen abgegossen, event indem man sie dabei filtrirt, gewogen und abdestillirt. Der trockne Rückstand wird wieder mit einigen Tropfen Chloroform gelöst, 20 g Wasser zugegeben und auf dem Wasserbade, ohne zu schütteln, das Chloroform weggekocht. Dann wird heiss filtrirt, das Filtrat eingedampft und getrocknet, gewogen und unter Berücksichtigung der oben gewonnenen Menge Chloroformlösung berechnet.

Werthbestimmung der Kola-Präparate (Fluidextrakte, Tinkturen etc)

1) Nach DIETREICH zur Bestimmung des Gesamtalkaloids 20 g des Präparates (z B Fluidextraktes) dampft man zur Sirupskonsistenz ein, jedenfalls bis aller Alkohol entfernt ist und verreibt den Rückstand mit 10 g oder soviel ungeloschem Kalk, dass eine krümelige Masse entsteht, die man in der Patrone im Soxhlet mit Chloroform extrahirt. Man verfährt dann weiter wie oben sub a. Zur Bestimmung des freien Alkaloides dampft man 20 g ebenso ein, verreibt mit Sand, extrahirt ebenfalls im Soxhlet mit Chloroform und verfährt weiter wie oben sub b.

2) Nach SIEDLER Das betr Präparat wird, wie soeben gesagt, eingedampft, mit ammoniakalischem Chloroform, das man durch Einleiten von Ammoniak in Chloroform erhält, ausgeschüttelt und nach c weiter verfahren (s S 806)

Falsche Kolanüsse Es sind im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Samen und Früchten absichtlich oder unabsichtlich an Stelle der Kola in den Handel gekommen. Wir geben nur wenige Bemerkungen über sie, da sie sämmtlich der echten Droge so unähnlich sind, dass eine Verwechslung bei aufmerksamer Betrachtung ausgeschlossen erscheint, sie enthalten sämmtlich kein Coffein.

1) Samen der *Garcinia Kola* Heckel, Familie der *Guttiferae*, Bitter-Kola, männliche Kola, in Sierra Leone, mit dieser vielleicht identisch *Garcinia floribunda* Martens in Lagos, Bitter-Kola

2) Samen der *Hexitiera litoralis* Drvander, Familie der *Stereuliaceae*, Spiegelbaum, Lookingglas-tree Von der Sambesumundung durch Hinterindien bis nach Australien

3) Samen der *Pentadesma butyracea* Sabine, Familie der *Guttiferae*, Butterbaum, Tallow tree, Kanya, in Westafrika (Sierra Leone)

4) Samen von *Lucuma mammosa* Juss, Familie der *Sapotaceae*. Heimisch in Westindien, durch die Kultur verbreitet

5) Samen von *Napoleona imperialis* P. Beauv, Familie der *Leechthidaceae* Heimisch in Benin

6) Samen von *Dimorphandra Mora*, Familie der *Leguminosae*. Heimisch in Guyana und Trinidad Die Samen kamen 1896 nach Europa.

7) Früchte der *Cola edulis* Baill., Familie der *Oleaceae* Heimisch in Westafrika, die Ähnlichkeit des Namens erklärt die Verwechslung

An Stelle der echten Samen gelangen ihnen beigemengt zuweilen die anderer Arten nach Europa *Cola Ballayi* Cornu (Cola v Gabon) mit 1 Proc Coffein, *C digitata* Masters, Ombéné Nipolo, *C. gabonensis* Masters, Orindé, *C sphaerosperma* Heckel

Anwendung. In Afrika finden die Kolanüsse ausserordentlich ausgedehnte Verwendung als anregendes Genussmittel bei den Eingeborenen Man legt dort den grössten Werth darauf, sie frisch (nicht trocken) zu verwenden, und behandelt sie zu diesem Zweck mit grosser Sorgfalt, indem man sie hin und wieder anfeuchtet. In einigen Gegenden scheint es gebräuchlich zu sein, sie vor dem Genuss auskeimen zu lassen Vielleicht ist in den frischen Nüssen die grösste Menge oder sogar die Gesamtmenge des Coffeins und Theobromins im gebundenen Zustande vorhanden, und es wird gerade auf diese Form das grösste Gewicht gelegt Nach vielen vergeblichen Versuchen gelingt es jetzt auch, die Kolanüsse frisch nach Europa zu bringen und so zu verarbeiten Der grösste Theil gelangt aber getrocknet zu uns Hier und da pflegt man sie auch vor der Verwendung oder Verarbeitung zu rösten, da sie hierdurch einen ansprechenden, an Kaffee erinnernden Geschmack bekommen Indessen ist hiermit ein Verlust an Coffein und Theobromin verbunden und ausserdem wird ein grösserer Theil beider Alkaloide aus der Verbindung durch das Rösten in Freiheit gesetzt, als es beim einfachen Trocknen geschieht So erhielt DRETERICH

	Getrocknete Nüsse	Dieselben geröstet.
Gesamt-Rohcoffein	1,982 Proc.	1,675 Proc.
Gesamt-Reincoffein	1,782	1,362
Freies Coffein	1,110 "	0,952 "
Gebundenes Coffein	0,622 "	0,410 "

Die getrockneten Nüsse enthalten rund 64 Proc. freies und 36 Proc gebundenes, die gerösteten Nüsse aber 70 Proc freies und nur 30 Proc gebundenes Coffein Es scheint danach, wenn es sich um eine möglichste Ausnutzung des Coffeins handelt, dass man dann gut thut, auf den angenehmeren Geschmack durch das Rösten zu verzichten — Man versucht, auch bei uns die Kolanüsse als Genussmittel an Stelle von Kaffee und Thee einzuführen, anscheinend bisher mit geringem Erfolge Ausserdem verwendet man sie medicinisch bei Migräne, Neuralgien, gegen Erbrechen, Seekrankheit, Diarrhöen, ferner als stimulierendes Mittel und als Herztonicum meist in Form ihrer Präparate

Ferner hat man mit günstigem Erfolg Futtersuche damit bei Pferden gemacht, indem man ihnen unter Entziehung eines Theiles des gewöhnlichen Futters täglich 40 Kolanüsse verfütterte. Die Pferde blieben in normalem Gesundheitszustande und hatten am Ende des Versuches an Gewicht zugenommen.

Aufbewahrung. Die trocknen Kolanüsse werden an einem trocknen Orte in Holz- oder Blechgefassen aufbewahrt Aus den zerkleinerten und dann bei höchstens

80° C getrockneten Samen bereitet man ein grobes und ein mittelfeines Pulver für Auszüge und ein sehr feines Pulver für Pillen und Pastillen. Letzteres führen die Drogisten auch in entoltem Zustande.

Semen Colae recens Frische Kolanüsse. Um die Anfangs April nach Europa gelangenden Samen möglichst lange frisch zu erhalten, legt man sie entweder in Blechgefäße zwischen feuchte Sägespäne (SCHLOTTERRESCA) oder in Torfmull (BERNEGAV), oder auch nach Art eingemachter Früchte in Zuckersaft, dem etwas Citronensäure zugesetzt ist. Um die frischen Nüsse zu Pulver zu verarbeiten, schneidet man sie zuvor in dünne Scheiben und trocknet diese 24 Stunden bei höchstens 80° C. Das daraus gewonnene Pulver ist alkaloidreicher, als das aus der trocknen Handelswaare bereite, und eignet sich deshalb besonders zur Darstellung der verschiedenen Kolapräparate. Solch ein aus frischen Samen besonders sorgfältig bereitetes Pulver ist die Neo-Kola von CHRISTY & Co in London — Frische Kolanusscheiben werden als wichtiges Genussmittel zum Kauen empfohlen.

Die Hamburg-Altonaer Nahrungsmittel Gesellschaft (BESTHORN & GERDTZEN) bringt frische und trockene Kolanüsse, sowie die verschiedenen Zubereitungen daraus, in den Handel.

Semen Colae tostum Geröstete Kolanüsse werden aus der trocknen Handelswaare in der nämlichen Weise gewonnen, wie die gerösteten Kaffeebohnen. Man bringt die mit einem Tuche abgeriebenen Samen in eine eiserne Trommel, erhitzt sie über freiem Feuer bis weisse Dämpfe auftreten und beschleunigt das Erkalten durch Schwingen in einem Drahtsieb. Die Ausbeute beträgt 70 bis 75 Proc. Aufbewahrung in Blechgefässen.

Verarbeitung. Am rationellsten wird es sein, frische Kolanüsse so zu verarbeiten, dass die Coffeinverbindung nicht getrennt wird. Das beabsichtigt besonders die Methode von BERNEGAV mit Natriumphosphat, Glycerin und Alkohol (vergl. Extractum Colae), ferner die Vorschläge von DIETZICH für die Extraktion Alkohol von verschiedener Stärke, aber keine Alkalien zu verwenden. Die letzten Methoden gestatten allerdings, alles Coffein und Theobromin zu extrahieren, aber nur im freien, nach den jetzt geltenden Anschauungen also weniger wirksamen Zustande. Von anderer Seite wird noch empfohlen, zur Extraktion Alkohol mit 1 Proc. Essigsäure zu verwenden.

Extractum Colae Kolaextrakt. *Extrait alcoolique de noix de kola* (Gall. Suppl.) 1000 g mittelfein gepulverte Kolanüsse erschöpft man im Perkolator mit 6000 g Alkohol (60proc), destillirt den letzteren ab und dampft zu einem weichen Extrakt ein — Dietz lässt 1 Th Kolanusspulver je 2 Tage mit 3 Th Weingeist und 1 1/2 Th Wasser, dann mit 2 Th Weingeist und 1 Th Wasser ausziehen und die Auszüge zur Trockne eindampfen. Ausbeute 8—8,5 Proc.

Extractum Colae fluidum. Kola-Fluidextrakt. *Ergänz.* Wie Extractum Coffeae fluidum (S. 906) zu bereiten — BERNEGAV 1 Kilo Kolanusspulver, aus frischen, zerriebenen und bei 80° C getrockneten Nüssen, wird mit einer Lösung von 25 g Natriumphosphat in 150 g Glycerin und 200 g verdünntem Weingeist (60proc) eine Nacht stehen gelassen, dann im Perkolator mit 10 Kilo verdünntem Weingeist erschöpft, und l. a. 1 Kilo Extrakt hergestellt. Klar, dunkelrothbraun. Spec. Gew. = 1,0102.

Eignet sich besonders zur schnellen Bereitung von Kola-Wein, Kolaalkohol u. dergl. Man wendet es zu 2—4 g mehrmals täglich gegen Migräne und chronische Diarrhoe an.

Extractum Colae solidum. Von 1000 g des vorigen destillirt man den Weingeist ab, fügt 700 g Milchnucker hinzu und bereitet, wie bei Extractum Uvae Ursi solidum (S. 363) angegeben, 1000 g Trockenextrakt, welches also der gleichen Gewichtsmenge Kolanuss entspricht. Auch kann man, um eine genaue Dosirung zu ermöglichen, zuvor den Gehalt des Fluidextraktes an Coffein bestimmen und hiernach den Milchnuckerzusatz so bemessen, dass das fertige Extrakt 1 Proc. Gesamt-Alkaloyde enthält.

Tinctura Colae Kolatinktur. *Teinture de noix de kola* (Gall. Suppl.) Aus 100 Th grob gepulverten Kolanüssen und 500 Th Weingeist (60proc) durch zehntägige Maceration zu bereiten — DIETZICH Kolanusspulver 100 Th, verdünnter Weingeist 1000 Th.

Vinum Colae (Ergänz.) *Vinum de Cola acuminata.* Kola-Wein. *Vin de noix de kola* (Gall. Suppl.) — *Ergänz.* Kolanusspulver 5 Th, Süßwein 95 Th — Gall. Kolanusspulver 6 Th, Wein von Grenache 100 Th. — *Ex tempore* Kolafluidextrakt 5,0, Süßwein 95,0.

Butyrum Colae BERNEGAV

Kola-Butter

Rp. Extracti Colae sicc. 50,0

Vitella ovorum duorum

Lactis vaccini condens. steril. 400

M. f. emulsio. Wird wie Butter auf Zwieback gestrichen. Leicht verdauliches Nähr- und Anregungsmittel.

Elixir Colae (DIETZICH).

Rp. Vanillini 1,0

Tincturae Colae 500,0

Sirupi simplicis 499,0

Essentia Colae.**Kolaessenz.**

Rp	1	Semin Colae gross m pulv	75,0
	2	Confectionis Aurantior	50,0
	3	Fructus Vanilla	2,0
	4	Cort Cinnamom. zeyl.	10,0
	5	Vini Portensis	400,0
	6	Spiritus	500,0
	7	Sacchari albi	250,0
	8	Aquae	400,0

Man zieht 1—4 mit 5 und 6 aus, und mischt das Filtrat mit der heissen Lösung von 7 in 8

Essentia Colae saccharata.**Kola-Likör (Diät)**

Rp	1	Seminis Colae tost pulv	250,0
	2	Coccionellae pulv subit	2,0
	3	Arrac	100,0
	4	Spiritus (90%)	3500,0
	5	Sacchari albi	8000,0—4000,0
	6	Aquae	3500,0
	7	Tincturae Vanilla	5,0
	8	Olei Amygdalar aetherel gtt. III	

1—4 acht Tage digeriren, das Filtrat mit der heissen Lösung von 5 in 6 mischen, zuletzt 7—8 hinzufügen

Extractum Colae cum Malto**Kola-Malsextrakt BERNEGAU**

Rp	1	Extracti Colae solidi	10,0
	2	Aquae destillatae ferv	10,0
	3	Extracti Malti	80,0

Man löst 1 in 2, mischt mit 3 und dampft auf 100,0 ein.

Morsuli Colae.**Kola-Morsellen.**

Rp	Extracti Colae solidi	80,0
	Sacchari albi	600,0
	Aquae Rosae	150,0
	Specier pro morsulis	100,0

f. l. a. morsuli (vgl S 284)

Pastilli Colae (Diät)**Trochisci Colae. Kola-Pastillen.**

Rp	Semin Colae tost pulv	
	Sacchari albi pulv	33 500,0
	Mucilag. Tragacanthae q s	

Man formt 1000 Pastillen.

Pilulae Colae**Kola-Pillen.**

Rp	Semin. Colae pulverati	15,0
	Radici Liquiritiae	
	Succi Liquiritiae	33 2,5
	Mucilaginis Gummi arabici	q s

Man formt 100 Pillen.

Vitellum Colae BERNEGAU**Kola-Eigelb-Emulsion.**

Rp	Extracti Colae solidi	300
	Vitella ovorum duorum	
	Glycose	10,0
	Spiritus e Vino	80,0

M. f. emulsiō Anregungs- und Stärkungsmittel

Saccharum Colae**Granulae Colae Kola-zucker**

Rp	1	Seminis Colae pulverati	1000,0
	2	Spiritus (80%)	q s
	3	Spiritus (70%)	q s
	4	Sacchari granulati	1000,0

Man erschöpft 1 mit 2 im Perkolator, verdampft zur Trockne löst den Rückstand in 3, trinkt mit der Lösung 4 und trocknet bei gelinder Wärme zuletzt unter stetem Umrühren auf dem Wasserbade. Den gekörnten Zucker erhält man durch vorsichtiges Zerkleinern unter öfterem Absieben — Sieb II Germ — in gleichmässigen Stückchen, indem man die feineren Theile mittelst Sieb III trennt 1 Th Kola-zucker entspricht 1 Th Kolasamen

Sirapus Colae**Kolasirup**

Rp	Tincturae Colae	10,0
	Sirup simplex	90,0
	Tincturae Vanilla gtt. X	

Gegen Schlaflosigkeit theelöffelweise

Tabulettae Colae BERNEGAU**Kolatabletten**

Rp	Extracti Colae solidi	50,0
	Sacchari Vanillini	35,0
	Pulveris Chocolateae	15,0
	Amyli pulverati	q s

Man mischt sorgfältig und presst 100 Tabletten.

Tabulettae Colae citratae**Kolacitronensäuretabletten.**

Rp	Extracti Colae solidi	50,0
	Sacchari Vanillini	45,0
	Acidi citrici	5,0
	Olei Citri	gtt. V
	Amyli pulverati	q s

Man presst 100 Tabletten. Oder man stösst mit Tragant schleim zur Masse und sticht 100 Pastillen aus

Tabulettae Colae menthatae**Kolapfefferminztabletten.**

Rp	Extracti Colae solidi	50,0
	Sacchari albi pulv	49,0
	Olei Menthae piperitae	1,0
	Amyli pulverati	q s

Man presst 100 Tabletten. Für Touristen, Radfahrer

Tabulettae Colae cum Pepsino**Kolapepsintabletten**

Rp	Pepsini	10,0
	Acidi hydrochlorici (25%)	2,0
	Sacchari Lactis pulv	35,0
	Extracti Colae solidi	50,0
	Amyli	q s

Man mischt sorgfältig und presst 100 Tabletten, die in Glasgefässen abgegeben werden. Bei Verdauungsstörungen.

Dr. BERGMANN'S Knappräparate. a) Hals-Knappastillen, gegen Rachenkatarrh etc, enthalten ausser den Bestandtheilen der Kolanuss 0,002 Thymol, je 0,02 Natr benzoic und Borax, 0,015 Saccharin

b) Magen-Knaptabletten. Enthalten Kolanuss, phosphorsaure Ammoniakmagnesia, gebrannte Magnesia und aromatische Zusätze

Kola-Kaffee der Dresdener Kaffeesurrogat-Fabrik ist ein wohlgeschmeckender Kaffeesersatz mit Kola und enthält in 100 Th 3,26 Fett, 11,38 Proteinstoffe, 66,21 Kohlehydrate, 6,4 Wasser, 4,0 Mineralstoffe, 8,75 Cellulose, 0,32 Coffein (SOWWEISSNER)

Kolanin KNEBEL. Vom Apotheker KREWEL & Co in Köln wird als „Kolanin Dr KNEBEL“ ein dickes und ein trockenes Extrakt in den Handel gebracht, welches den wirksamen Bestandtheil in möglichst unveränderter Form enthalten sollen, für das letztere, als Rohkolanin bezeichnet, wird ein Gehalt von 80–90 Proc Reinkolanin angegeben 1 Th desselben entspricht 14 Th der frischen Droge

Tinctura Kolanini

Rp Kolanin Knebel (Extr spiss) 10,0
Spiritus dilut (68%) 490,0
D S Mehrmals täglich einen Theelöffel voll in Zuckerwasser zu nehmen.

Elixir Kolanini

Rp Tinctur Kolanini 500,0
Tinctur Chinae comp 10,0
Tinctur Aurant. cort. ää 2,0
Tinctur Vanillae 1,0
Sacchari albi 185,0
Aqua dest 800,0
D S Mehrmals täglich einen halben Esslöffel voll zu nehmen

Vinum Kolanini

Rp Kolanin Knebel (Extr spiss) 5,0
Vini Malacensis 990,0
Tinctur aromatic 2,0
Tinctur Zingiberis 1,0
Tinctur Cinnam 1,0
D S Mehrmals täglich einen Esslöffel voll zu nehmen

Pilulae Kolanini KNEBEL.

Rp Kolanin Knebel (Extr spiss) 10,0
Pulv Cacao deoleat
Sacch lactis ää q s
M f pilul Nr 100 consp cort cinnam
D S Mehrmals täglich 2 Pillen zu nehmen.

Pastilli Kolanini KNEBEL (0,2)

Rp Kolanin Knebel (extr siccum) 10,0
Cort Cinnam pulv sublt. ää 2,5
Rhiz Zingiberis ää 2,5
Cacao deoleat pulv
Sacchar alb pulv ää 17,5
M f pastill Nr 50
Mehrmals täglich eine Pastille zu nehmen.
Tabulettae Kolanini peptonatae
Rp Kolanin Knebel (Extr siccum)
Pepton e carne sicc. (Krewel) ää 20,0
Pulv aromatic 5,0
Cacao deoleat pulv
Sacchar alb pulv ää 27,5
M f tabulettae Nr 100
D S Mehrmals täglich eine Tablette (in Milch oder Wein) zu nehmen.

Colchicinum.

Die Darstellung des Colchicins gründet sich auf die Fähigkeit des Chloroforms, wässrigen Colchicin-Lösungen das Alkaloid zu entziehen, ferner auf die Beobachtung, dass die gefärbte wässrige Lösung der rohen Base an Chloroform, welches in ungenügender Menge zugesetzt wird, wesentlich nur die färbenden Verunreinigungen abgibt, und 3) auf die Eigenschaft des Colchicins, mit dem Chloroform eine krystallisierende Verbindung einzugehen, welche durch Umkrystallisiren gereinigt und durch siedendes Wasser wieder in ihre Bestandtheile zerlegt werden kann

†† **Colchicinum** (Ergänz.) **Colchicin.** **Colchicine** (franz.) **Colchicina** (engl.)
 $C_{25}H_{25}NO_6$. Mol. Gew. = 399.

Darstellung Unzerkleuerter Colchicum-Samen wird mit heissem 90 procentigem Weingeist bis zur Erschöpfung extrahirt. Von den vereinigten alkoholischen Auszügen wird der Alkohol abdestillirt. Den hinterbleibenden Rückstand rührt man mit hinreichenden Mengen Wasser an und filtrirt die Flüssigkeit zur Abscheidung von Fett, Wachs und Harz durch mit Wasser genasste Filter. Das Filtrat wird gründlich mit Chloroform ausgeschüttelt. Von den Chloroform Auszügen wird das Chloroform im Wasserbade abdestillirt und der hinterbleibende nicht flüchtige Rückstand wiederum in Wasser gelöst, diese Lösung filtrirt und nochmals gründlich mit Chloroform ausgeschüttelt. Aus dieser Lösung kann das Colchicin bez das Colchicin-Chloroform nun auf zwei Wegen isolirt werden

A Destillirt man das Chloroform aus dem Wasserbade ab, so scheiden sich aus dem hinterbleibenden sirupösen Rückstande nach einigen Tagen schöne Rosetten und kugelförmige Aggregate nadelförmiger Krystalle ab, welche aus Colchicin-Chloroform bestehen
B Der beim Abdestilliren des Chloroforms hinterbleibende sirupöse Rückstand wird noch warm mit kleinen Mengen absoluten Alkohols so lange versetzt, als sich die hierdurch ausgeschiedenen weisslichen Massen noch lösen. Kühlt man alsdann die Lösung längere Zeit unter 0° ab, so scheidet sich das Chloroform-Colchicin in Krystallen ab

Das auf die eine oder die andere Weise gewonnene Chloroform-Colchicin wird durch Abpressen zwischen Filtrirpapier von der Mutterlauge befreit, alsdann in einem schrag-

gestellten Kolben mit Wasser übergossen und so lange mit Wasserdampf destillirt, bis kein Chloroform mehr übergeht. Die im Kolben hinterbleibende wässrige Lösung des Colchicins wird im Vakuum auf flachen Schalen eingedampft und schliesslich über Aetzkalk im Vakuum getrocknet oder auf Glasplatten gestrichen und in Lamellenform gebracht [ZEISEL].


Eigenschaften. Das ursprünglich firnissartige Colchicin kommt in den Handel als gelbe Blättchen oder als ein weiss gelbes amorphes Pulver, welches sich am Lichte dunkler färbt, bei etwa 145° C schmilzt und sich leicht in Wasser, Weingeist und Chloroform, nur wenig in Aether, fast gar nicht in Petroläther löst. — Die wässrige Lösung des Colchicins ist blassgelb gefärbt, die Färbung wird auf Zusatz von Mineralsäuren intensiver. Die wässrige Lösung des Colchicins besitzt anhaltend bitteren Geschmack, sie ist gegen Lackmus neutral und reagirt gegen Rosolsäure schwach alkalisch. Ferrichlorid verändert die kalte wässrige Lösung nicht, beim Erwärmen tritt jedoch eine braunrothe Färbung auf, welche bald in Schwarzbraun übergeht. In kaltem Wasser löst sich das Colchicin in jedem Verhältnisse, weniger leicht ist es in heissem Wasser löslich. Die Lösungen des Colchicins lenken die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab (1°).

Das Colchicin ist eine Base, aber seine Salze sind nur wenig beständig, indessen giebt es ein gut charakterisirtes Golddoppelsalz.

Durch starkverdünnte Mineralsäuren wird das Colchicin in der Kälte langsam, rascher beim Erwärmen gespalten unter Aufnahme von Wasser in Colchicin und Methylalkohol.



Die nämliche Spaltung erfolgt, wenn das Colchicin mit stark verdünnten Aetzkalken erwärmt wird (kone Aetzkalken verharzen es). — Da sich in dem Colchicin haben vier Methylgruppen nachweisen lassen, so lässt sich die nähere Zusammensetzung desselben durch die bestehende Formel ausdrücken:



Identitäts-Reaktionen. 1) In kone Schwefelsäure löst sich Colchicin mit citronengelber Farbe. Bringt man in diese Lösung eine kleine Menge Salpetersäure von 1,4 spec. Gew., so entsteht prachtvolle grünblaue Färbung, welche durch Himmelsblau in Roth und Gelb übergeht. Uebersättigt man diese gelbliche Lösung mit Kali- oder Natronlauge, so färbt sie sich roth. 2) In Salpetersäure von 1,4 spec. Gew. löst es sich mit schmutzig violetter Farbe, die in Grünlich, schliesslich Gelb übergeht. Kalhydrat färbt die gelbe Lösung in Roth über. 3) Kone Schwefelsäure, der eine geringe Menge Salpetersäure zugesetzt ist, löst Colchicin mit gelbgrüner Farbe, die allmählich durch Grün, Blaugrün, Blau, Violett und Weinroth in Gelb übergeht. 4) Eisenchloridlösung verändert die kalte wässrige Lösung nicht, beim Erwärmen aber tritt eine braunrothe Färbung auf, welche bald in Schwarzbraun übergeht.

Prüfung. 1) Colchicin schmelze nach dem Trocknen über Calciumchlorid bei 145° C und hinterlasse beim Verbrannen keinen feuerbeständigen Rückstand. 2) Wird 0,1 g Colchicin mit 0,5 g chlorfreiem Calciumcarbonat (s. S. 351) gemischt und nach Zusatz von etwas Wasser eingetrocknet und gegläht, so darf die mit Salpetersäure bewirkte Lösung des Rückstandes, nachdem sie mit Wasser bis auf 10 ccm verdünnt und filtrirt worden ist, durch Silbernitrat nicht verändert werden. Eine Trübung wird durch Silberchlorid bedingt, und dessen Bildung ist voraussichtlich darauf zurückzuführen, dass das Präparat noch Colchicin-Chloroform enthält.

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig und vor Licht geschützt, da es, wie bereits bemerkt wurde, unter dem Einflusse des Lichtes dunklere Färbung annimmt.

Anwendung. Colchicin ist ein heftiges Gift. Schon kleine Dosen erzeugen oft Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, grössere Gaben erzeugen heftige Gastroenteritis (Magen-Darmkatarrh) mit heftigen Durchfällen und vollkommener Anästhesie. Die Wirkung tritt bisweilen erst nach mehreren Stunden ein. Der Tod erfolgt durch Lähmung der Athmung. — Man hat das Colchicin an Stelle der Colchicum-Präparate bei Gicht und Rheuma-

tismus empfohlen, ohne dass es sich jedoch besonders eingebürgert hat. Man giebt es in Dosen von 0,0005—0,001—0,002 g zwei- bis dreimal täglich in Pillen oder Lösung. Subkutane Injektionen sind wegen des heftigen örtlichen Reizung nicht zu empfehlen.

Höchste Gaben *pro dosi* 0,005, *pro die* 0,015 g (Erganzb.)

†† **Colchicinum salicylicum**, Colchicinsalicylat, salicylsaures Colchicin.
 $C_{22}H_{25}NO_6$, $C_7H_5O_2$. Mol Gew = 537

Wird dargestellt durch Anfeuchten einer Mischung von 1 Th Colchicin mit 0,35 Th. Salicylsäure und Eindampfen zum trocknen Pulver. Gelbes, amorphes Pulver, in Wasser, Alkohol und Aether löslich. Man giebt es wie Colchicin in Gaben von 0,00075 g täglich vier- bis fünfmal in Form von Oblatenpulvern bei Rheumatismus, Gicht.

Colchisal, wird eine in Gelatinekapseln zu verabreichende Lösung von 0,00025 g Colchicin in 0,2 g Salicylsauremethylester genannt. Die vorstehenden Mengen beziehen sich auf den Inhalt einer Kapsel. Bei Gicht, Rheumatismus 3—4 Kapseln täglich.

Liqueur de Laville. Ueber die Zusammensetzung dieses Geheimmittels existirt eine ganze Litteratur. Nach einer 1893 vom Königl. Sachsischen Landes Medicinal-Kollegium veranlasssten Analyse wurden folgende Daten gefunden. Spec. Gew = 0,9955 bei 15°C. In 100 g sind enthalten: Weingeist 10,88 g, Extrakt 3,94 g, darunter Colchicin 0,081 g, Chinin 0,085 g, freie Säure als Weinsäure berechnet 0,76 g, ferner Mineralbestandtheile 0,53 g, Wasser 84,65 g.

Ferner giebt das Korrespondenzblatt der ärztlichen Kreis- und Bezirks-Vereine in Sachsen 1893, 103 als gebräuchliche Nachahmung des Likörs folgende Vorschrift an: Chinin sulfurici 0,1 g, Extracti Colocynthis 0,05 g, Vinum seminis Colchici 8,0, Tincturae Veratri viridis 12,0 g, Spiritus diluta 12,0 g, Vinum Portensis q. s. ad 100,0 g. Achtstündlich einen Theelöffel, bis reichlicher Stuhlgang erfolgt.

Liquor antigoutteux du Dr. LAVILLE. Rhizomatis Rhei concisi, Rhizomatis Zingiberis concisi aa 150,0 Fructus Cardamomi contusi, Resinae Guajacae, Seminis Colchici contusi aa 75,0, Spiritus diluta 3000, fiat Tinctura (REINCKE).

Colchicum.

Gattung der Liliaceae — Melanthioideae — Colchiceae.

I. Colchicum autumnale L. Herbstzeitlose. Wiesensafran. Herbstlilie. Nachte Jungfer. — Colchique. — Meadow Saffron. Wild Saffron.

Heimisch in Mittel, West- und Südeuropa, sowie in Algier auf Wiesen. Verwendung finden

1) der Knollen † **Bulbus Colchici**. Colchici Cormus (Brit.) Colchici Radix (U-St.) **Tuber Colchici**. — Colchicumzwiebel. Zeitlosenwurzel. Wilde Saffranwurzel. — **Bulbe de Colchique** (Gall.) — Colchicum Corm. Colchicum Root.

Beschreibung. Der Knollen ist im Umriss dick-eiförmig, bis 5 cm lang, bis 4 cm breit, bis 4 cm dick, auf der einen Seite gewölbt, auf der anderen flach und, wenn im Herbst gesammelt, mit einer nicht ganz herabreichenden Längsrinne versehen, im Frühjahr gesammelt, frisch ohne Rinne, die erst beim Trocknen etwas hervortritt und am Grunde derselben mit einem Knospchen. Im Handel findet man meist die Herbstknollen, die im Spätsommer während der Blüthe, oder kurz bevor diese aufbricht, gesammelt werden. Als ganz besonders wirksam gilt diese und die im Frühjahr vor Entwicklung der Frucht gesammelte.

Der Querschnitt lässt gegen das Centrum dunkle Punkte erkennen, kollaterale Gefäßbündel. Sonst besteht das Gewebe aus dünnwandigem stärkereichen Parenchym. Die Stärkekörnchen sind meist zusammengesetzt mit strahligem centralen Spalt. Frisch riecht der Knollen unangenehm, widerlich-scharf, nach dem Trocknen verschwindet der Geruch. Geschmack süßlich, bitterlich, scharf kratzend. Der Sitz des Alkaloids ist die äußere Epidermis der Zwiebelschuppe, des Knollen und das Phloem der Gefäßbündel.

Bestandtheile. Colchicin 0,066—0,085 Proc, Stärke 30 Proc, ferner Zucker, Harz, Fett etc.

Als *Verwechslungen* werden die Zwiebeln von Tulpen genannt

Einsammlung. Aufbewahrung. Man sammelt die Knollen im August, befreit sie von der ausseren, braunen Haut, von Wurzelresten und älteren Knollen und verwendet sie entweder sofort zur Darstellung der verschiedenen Zubereitungen (Gall), oder man schneidet sie der Quere nach in Scheiben, trocknet diese bei höchstens 65° C (Brit) und bewahrt sie vorsichtig und vor Licht geschützt in dicht verschlossenen Gefässen auf 3 Th frische Knollen geben 1 Th trockne

Anwendung. Ausserst selten in Pulverform zu 0,1–0,3 g (Brit), häufiger in Form der verschiedenen Auszüge in den gleichen Fällen wie die Samen (vergl 3)

† **Acetum Colchici cum bulbis recentibus** Acetolés de colchique Vinaigre de colchique (Gall) Aus 200 Th frischen, zerschnittenen Colchicumknollen, 20 Th kono Essigsäure und 980 Th Weinessig (7–8 proc) durch achttägige Maceration zu bereiten

† **Alcoolatura bulbi Colchici** Alcoolature de bulbe de colchique (Gall) Aus gleichen Theilen frischer, während der Blüthe gesammelter Colchicumknollen und Alkohol (90proc) durch zehntägiges Ausziehen zu bereiten

† **Extractum Colchici** Extract of Colchicum (Brit) Frische, geschälte Colchicumknollen quetscht man, presst aus, lässt den Saft absetzen, giesst klar ab, erhitzt bis zum Sieden, seigt durch und dampft bei höchstens 71° C zum weichen Extrakt ein

Dosis 0,015–0,06 g

† **Extractum Colchici radici.** Extract of Colchicum Root (U-St) 1000 g gepulverter Colchicumknollen (No 60) befeuchtet man mit 500 ccm einer Mischung aus 350 ccm Essigsäure (36proc) und 1500 ccm Wasser, erschöpft im Perkolator mit dem Rest des Lösungsmittels, zuletzt mit Wasser und dampft bei höchstens 80° C zur Pellen konsistenz ein

† **Extractum Colchici radici fluidum** Fluid Extract of Colchicum Root (U-St) Aus 1000 g gepulverter Colchicumknollen (No 60) und einer Mischung aus 600 ccm Weingeist (91proc) und 300 ccm Wasser im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 350 ccm, sammelt zuerst 850 ccm und stellt 1 a 1000 ccm Extrakt her

Oxymel Colchici bulbi. Mellite de Vinaigre de colchique 10 Th Acetum Colchici bulbi und 20 Th gereinigter Honig werden auf 20 Th eingedampft

† **Tinctura Colchici bulbi** Aus 1 Th feingeschrittenem Colchicumknollen und 5 Th verdünntem Weingeist

† **Vinum Colchici radici.** Colchicum Wine (Brit) Wine of Colchicum Root (U-St) Vinum de Colchico Vin ou Oenolé de bulbe de colchique (Gall) Brit Aus 200 g Colchicumknollen (No 20) und 1000 ccm Sherry durch Maceration U-St Aus 400 g gepulverten Colchicumknollen (No 30) und einer Mischung aus 150 ccm Weingeist (91proc) und 850 ccm Weisswein im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 100 ccm und sammelt, zuletzt unter Nachgiessen von q s Weisswein, 1000 ccm Flüssigkeit — Gall Aus 100 g frischen, zerschnittenen Colchicumknollen und 1000 g Roussillonwein (Grenache) durch zehntägiges Ausziehen zu bereiten

2) Die Blüthen † **Flores Colchici.** Zeitlosenblumen Fleurs de colchique (Gall)

Beschreibung Die Blüthen erscheinen im Spätsommer und Herbst (ausnahmsweise auch im Frühling), meist nur zu 1–3 an der Pflanze Das Perigon ist trichterig-glockig, mit langer, enger, zum grössten Theil im Boden steckender Rohre, mit 6theiligem Saum aus fast gleichgrossen, eiförmig lanzettlichen, zusammenneigenden Abschnitten Staubblätter 6 (die 3 inneren oft kürzer), dem Schlunde des Perigons eingefügt, mit schaukeln den Beuteln. Fruchtknoten 3fächerig, mit 3 langen, aus der Rohre herausragenden Narben

Bestandtheile. Colchicum 0,01–0,03 Proc

† **Alcoolatura florum Colchici.** Alcoolature de fleur de colchique (Gall) Aus frischen Zeitlosenblumen wie Alcoolatura bulbi Colchici

† **Saccharolatum Colchici.** Saccharure de colchique 10 Th. frischer Saft der Colchicumblüthen werden mit je 25 Th Rohrzucker und Milchezucker gemischt und zur Trockne gebracht

3) Die Samen † **Semen Colchici** (Austr Brit Germ Helv U-St) — Zeitlosensamen. — Semence de colchique (Gall.) — Colchicum Seeds.

Beschreibung. Die im Frühjahr erscheinende Kapsel ist oblong oder kuglig, aufgeblasen, in der oberen Hälfte scheidewandspaltig aufspringend, mit zahlreichen Samen Diese sind rundlich oder wenig eiförmig, durch gegensätzigen Druck in der Frucht oft etwas kantig, mit einer Caruncula versehen, die am frischen Samen weiss, fleischig und

ziemlich gross ist, beim Trocknen zu einem Spitzchen zusammenschrumpft. Aussen dunkelbraun, fein grubig punktiert, wenig runzelig, von ausgeschwitztem Zucker meist etwas klebrig — Im Querschnitt zeigt der Same innerhalb der braunen Samenschale das weissliche Endosperm mit dem kleinen Embryo. In der Samenschale ist eine der tiefer gelegenen Zellschichten Träger des Alkaloids, vielleicht findet sich dasselbe in geringen Mengen auch im Endosperm und Embryo. Die Zellen des Endosperm haben verdickte, grob getupfelte Wände, sie enthalten Aleuron und fettes Öl. Sie sind geruchlos, schmecken aber sehr bitter und kratzend.

Bestandtheile Colchicin 0,2–0,4 Proc., fettes Öl 6–8 Proc., Eiweisssubstanzen 7–20 Proc.

Einsammlung. Aufbewahrung. Man sammelt im Juni und Juli die völlig reifen Samen, trocknet sie an einem schattigen Orte bei gelinder Wärme und bewahrt sie in gelben Glasern oder Blechgefassen vorsichtig — nach Austr. nicht über ein Jahr — auf.

Pulverung Schwierig im Mörser zu zerstossen, man zerkleinert sie am besten zunächst auf einer Pulversirmühle, kleine Mengen auf der in jeder Apotheke vorrathigen Mutterkornmühle, und verwandelt sie dann durch Stossen in die vorgeschriebene Pulverform.

Anwendung. Da die Samen an wirksamen Bestandtheilen reicher sind als die Blüthen und Knollen, so werden fast nur noch die aus ersteren hergestellten Präparate gebraucht. Man wendet sie besonders bei Gicht und Rheumatismus an, auch bei Tripper und Leukorrhoe. Höchste Einzelgabe 0,2 g. Höchste Tagesgabe 1,0 g (Helv.).

† **Acetum Colchici** (Ergänz.) Zeitlosenessig. Aus 10 Th. gequetschten Zeitlosensamen, 10 Th. Weingeist (87 proc.) und 90 Th. Essig (6 proc.) durch achttägiges Ausziehen zu bereiten.

† **Extractum Colchici Seminum** Extr. de semine Colchici. Extrait de colchique (semence) (Ergänz.) 2 Th. grob gepulverte Zeitlosensamen werden 6 Tage mit 15 Th. verdünntem Weingeist (60 proc.), dann 3 Tage mit einem Gemisch aus je 5 Th. Weingeist und Wasser ausgezogen, die Pressflüssigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft. In Wasser trübe löslich. Ausbeute 18–20 Proc. Dosis max. 0,1, pro die 0,2 (n. Lowen). — Gall. Wie Extr. de radice Belladonnae Gall. (S. 469) zu bereiten.

† **Extractum Colchici (seminis) fluidum** Zeitlosen-Fluidextrakt — Extrait fluide de colchique — Fluid Extract of Colchicum Seeds. Helv. 100 Th. Zeitlosensamen (V) werden im Verdrängungswege mit einer Mischung aus gleichen Theilen Wasser und Weingeist (94 proc.) erschöpft¹⁾. Man fängt zuerst 90 Th. auf, dampft die übrigen Auszüge zu einem dünnen Extrakt ein, löst in 40 Th. Wasser, filtrirt, verdunstet auf 10 Th., sodass 1 a im ganzen 100 Th. Fluidextrakt gewonnen werden. Grösste Einzelgabe 0,05 g, grösste Tagesgabe 0,1 g. U-St. Aus 1000 g gepulverten Zeitlosensamen (No. 30) und einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc.) und 300 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 850 ccm und stellt 1 a 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind 6–7000 g Lösungsmittel erforderlich.

† **Extractum Colchici acidum** 100 Th. grob gepulverte Zeitlosensamen digerirt man mit einer Mischung von 100 Th. Weingeist, 100 Th. Wasser und 30 Th. verdünnter Essigsäure (von 30 Proc.), zieht dann mit destillirtem Wasser aus und dampft die Auszüge im Porcellangefäss (I) zu einem dicken Extrakt ein.

† **Tinctura Colchici** (Germ. Helv. Gall.) Tinctura Colchici seminis (Austr. Brit. U-St.) Zeitlosentinktur. Zeitlosensamentinktur — Teinture ou Alcoolé de colchique (semence) — Tincture of Colchicum Seeds. Germ. Wie Tinctura Aconiti (Germ. S. 155). — Helv. Wie Tinctura Capsici (Helv. S. 696). — Austr. Wie Tinctura Aconiti (Austr. S. 155). — Brit. Aus 200 g gepulverten Colchicumsamen (No. 30) und 9 a Weingeist (45 proc.) bereitet man im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur — U-St. Aus 150 g gepulverten Colchicumsamen und einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc.) und 400 ccm Wasser 1000 ccm Tinktur ebenso. — Gall. Wie Tinctura Coccae (Gall. S. 869).

¹⁾ Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es ein Irrthum ist, beim Verdrängungsverfahren aus der Farbe der abtropfenden Flüssigkeit beurtheilen zu wollen, ob eine Droge erschöpft ist oder nicht. Denn einmal kann das Perkolat nahezu farblos abfließen, und doch noch reich an wirksamen Bestandtheilen sein, ein ander Mal trotz deutlicher Färbung nichts von jenen enthalten. Man prüft daher durch den Geschmack oder den Geruch, bei alkaloidreichen Drogen aber mit Mayer's Reagens, Tanninlösung oder einem der sonstigen, allgemeinen Alkaloid-Reagentien (S. 205–216).

Grösste Einzelgabe Austr 1,5 Brit. 0,8—0,9 Germ 2,0 Helv 1,0
Grösste Tagesgabe. „ 5,0 „ — „ 5,0 „ 3,0

Vinum Colchici (Germ Helv) **Vinum Colchici seminis** (Austr U-St) Zeitlosenwein. Zeitlosensamenwein. — Vin ou Oenolé de colchique (semence) (Gall) — Wine of Colchicum Seed Germ. Aus 1 Th grob gepulverten Zeitlosensamen und 10 Th Xereswein durch achtstündiges Ausziehen — Helv 1 Th Zeitlosen-Fludextrakt, 9 Th Marsalawein — Austr Aus 5 Th zerstoßenen Zeitlosensamen und 50 Th. Malagawein durch sechstägiges Digeriren (Hunger hat das Verhältniss 1 5) — U-St 150 g gepulverte Colchicumsamen (No 30) macerirt man 7 Tage mit 900 cem einer Mischung von 150 cem Weingeist (91proc) und 850 cem Weisswein, filtrirt und wäscht den Filterinhalt mit dem Rest der Mischung, dann mit q s Weisswein, bis das Filtrat 1000 cem beträgt — Gall Wie Vinum Cocae (Gall S 870)

Höchstgaben wie bei Tinctura Colchici Tinctura und Vinum Colchici werden zur Vermeidung der drastischen Wirkung häufig mit Opiumtinktur zusammen verordnet

Enema antarthriticum FONTAINE

Rp Tincturae Colchici 5,0
Aque destillatae 150,0

Guttae antarthriticae GIORDANO

Rp Vini Colchici (seminis) 12,0
Tincturae Opii simplicis 2,0

Dreimal täglich 20 Tropfen. Bei Gicht und Rheuma.

Guttae antirheumaticae BLASIUS

Rp Tincturae Colchici seminis
Tincturae Guajaci aa 10,0

Dreimal täglich 20—30 Tropfen Bei chronischem Rheumatismus

Guttae colchice guajacinae

Rp Tincturae Colchici seminis
Tincturae ligni Guajaci aa 10,0

Dreistündlich 10 Tropfen, steigend.

Mel Colchici DIERICK

Mellitum Colchici bulbi. Zeitlosenhonig

Rp 1 Bulbi Colchici gross pulv 10,0
2 Aque destillatae 60,0
3 Spiritus (90%) 25,0
4 Mellis depurati 100,0

Man macerirt 1 mit 2 24 Stunden, presst, kocht auf, setzt 3 hinzu, filtrirt nach 24 Stunden, fügt 4 hinzu, und dampft auf 100,0 ein

Mixtura antarthritica SCUDAMORE

Rp Magnesi carbonici 7,5
Aque Menthae piperitae 100,0
Aceti Colchici 20,0
Sirupi Aurantii corticis 20,0

Dreistündlich einen Esslöffel Gichtmittel

Mixtura diuretica SOBERNHEIM

Rp Kali carbonici 2,5
Aceti Colchici semin. 30,0
Spiritus Juniperi 30,0
Spiritus Aetheris nitrosi 4,0
Aque destillatae 150,0

Alle 2—3 Stunden einen Esslöffel.

Mixtura pectoralis antarthritica.

WEATHERHEAD

Rp Decocti Althaeae radic. (s 10,0) 250,0
Vini Colchici seminis
Vini Ipecacuanhae aa 5,0

1—2stündlich 1 Esslöffel Hustenmittel für Gichtkranke

Oxymel Colchici Ph Germ. I.

Zeitlosen-Sauerhonig

Rp. Aceti Colchici 50,0
Mellis depurati 100,0

mischet man und dampft im Wasserbade ein auf 100,0

Pilulae antarthriticae BROQUEREL

Rp seminis Colchici pulv 1,0
Extracti Digitalis 0,8
Chinini sulfurici 3,0

M f pilulae 20 1—3 Pillen 3—4mal täglich.

Pilulae antarthriticae MAYET

Rp Chinini sulfurici 2,5
Acidi tartarici 1,0
Extracti Colchici 1,5
Foliorum Digitalis 0,1
Glycerini gtt. X
Radici Gentianae q s

F pilulae 50 Morgens und Abends 1 Pile.

Pilulae antarthriticae albae WOLFF

Rp Extracti Colchici acidi
Alota aa 2,0

F pilulae 80 Consperge Magnesia usta

Pilulae anticephalgicae DEBOUR

Rp Extracti Colchici 2,0 (I)
Chinini sulfurici 2,0
Foliorum Digitalis 1,0

F pilul 40 Abends 1 Pille

Sirupus antirheumaticus RIBOND

Rp Tincturae Colchici
Kali jodati aa 5,0
Sirupi Aurantii corticis 250,0

3mal täglich 1 Esslöffel.

Sirupus Colchici

Rp Tincturae Colchici seminis 15,0
Sirupi Sacchari 8,0

Einen bis zwei Theelöffel 3—4mal täglich

Vinum antirheumaticum DELIQUX.

Rp Tincturae Colchici 25,0
Tincturae Aconiti 10,0
Tincturae Digitalis 5,0
Vini albi 950,0

Morgens und Abends ¼ bis 1 Esslöffel

Vinum Colchici WILLIAMS

Rp 1. Vini Colchici seminis 25,0
2 Spiritus q s

Man dampft 1 auf 17,0 ein und fügt 2 q s zu 20,0 hinzu. 3mal täglich 10—20 Tropfen.

Vinum Colchici opiatum EISENMANN

Rp Vini Colchici semin. 18,0
Tincturae Opii crocatae 2,0

3—4stündlich 20—30—40 Tropfen. Bei Asthma, Reizhusten, Rheumatismus

ALBERT'S Remedy, ein Gichtmittel, besteht aus Colchicumtinktur und Opiumtinktur, wovon 9,8 Proc. Jodkalium gelöst sind (**AUFRECHT**)

Athiophorus, ein amerikanisches Mittel gegen Rheumatismus etc, enthält Colchicumextrakt, Morphinum, Guajakharz, Meerzwiebelasf, Kalisalz, Weingeist

Gichtelixir, HEELKOFFER's, Colchicumtinktur, Verdünnter Weingeist ää

Gichtmittel, BEYNOLD's, Antarthritic-Specific, ist ein weiniger Auszug aus Zeitlosenknollen und Klatschrosen

Gichtmittel, WANT's, Medicinal-Water WANT's, ein weingeistiger Auszug aus frischen Colchicumknollen

Gichtpillen von LATITE bestehen aus Colchicumsamen, Zucker und Gummi (24 Stück = 8 Mk), Ersatz dafür nach BOUCHARDAT Pillen aus 2 Th Extract Colocynthis comp, 2 Th Extract Colchici und 1 Th Extract Opi

Gichttropfen HUSSON's, Eau medicinale d'Housson, ist Zeitlosenwein

Gicht- und Rheumatismustropfen von Dr HOFFMANN Zeitlosenwein 45,0, verdünnter Weingeist 15,0

Liquor Colchici comp von Dr MYLIUS in Leipzig ist eine weinige Flüssigkeit mit einem Gehalt von 0,089 Proc Colchicin und 0,082 Proc Chinaalkaloiden

Poudre de Pistoia, gegen Gicht. 365 Pulver zu 2—8 g, welche aus 2 Th Bulb Colchici, 5 Th Herb Betonicae und je 1 Th Rad Bryoniae, Rad Gentianae, Flor Chamomillae bestehen

WILSON's Essence gegen Gicht und Rheuma ist mit 2 Th. Weingeist verdünnter Zeitlosenwein

II Colchicum luteum Baker, C speciosum Stev, C variegatum L

Aus Vorderasien und Indien Die Knollen werden besonders in Indien ähnlich verwendet wie C autumnale Sie führen meist den Namen Swrinjan oder Shamballit.

Collodium.

I. Collodium (Austr Brit Germ Helv U-St.) **Collodion** (Gall) **Collod.** — Die Darstellung des Kollodiums verfallt in die Darstellung der Schiessbaumwolle und in die Auflösung derselben in einer Mischung von Alkohol und Aether Die einzige Schwierigkeit bei der Bereitung des Kollodiums besteht hiernach in der Herstellung einer nitrirten Baumwolle (Schiessbaumwolle), welche in Alkohol-Aether löslich ist

Darstellung. Um eine in Aether-Alkohol lösliche Schiessbaumwolle zu erzeugen, muss man zunächst feststellen, ob die Säuren, welche man verwenden will, die im Nachstehenden vorgeschriebenen Konzentrationen haben Ferner darf die Nitrirung der Baumwolle nicht bei erhöhter Temperatur erfolgen Endlich muss die Zeit abgepasst werden, wenn die Nitrirung der Baumwolle bis zu dem Punkte vorgeschritten ist, dass die gebildete Schiessbaumwolle in Alkohol-Aether löslich ist, was man durch Versuche feststellt Ueberlässt man die Baumwolle über diesen Zeitpunkt hinaus der Einwirkung des Säuregemisches, so wird infolge höherer Nitrirung das ursprünglich in Alkohol-Aether lösliche Produkt wieder darin unlöslich Unter Berücksichtigung dieser Punkte verfährt man zweckmässig wie folgt Man thut gut, das im Folgenden beschriebene Eintragen der Baumwolle in das Nitrirgemisch Abends zu besorgen Das specifische Gewicht der rohen Schwefelsäure, welche verwendet wird, darf nicht unter 1,838 sein, die rohe Salpetersäure darf nicht unter 1,38 schwer sein Benutzt man leichtere Säuren, so kann es vorkommen, dass die ganze Baumwolle in Lösung geht

In einen Topf aus Steingut wägt man 400 Th rohe Salpetersäure ein und giesst zu derselben in dünnem (!) Strahle unter Umrühren 1000 Th konc rohe Schwefelsäure, welche man vorher in einem anderen Gefässe abgewogen hatte

Wenn sich die Mischung der Säuren bis auf 20—15° C abgekühlt hat, so wird in dieselbe entfettete Baumwolle (Watte) allmählich eingetragen Es empfiehlt sich, die Watte zunächst lose aufzuzupfen (!), in das Gemisch hineinzubringen, und wenn sie sich mit der Saure vollgesogen hat, mit Hilfe eines Stabes oder Spatels oder Pistills aus Glas oder Porcellan etwas einzudrücken, sonst hat die vorgeschriebene Menge Baumwolle keinen Platz in der Säuremischung Ein starkes gläsernes Gefäss (z. B ein Zuckerhafen) ist geeigneter zur Durchtränkung, weil sich dieselbe in einem solchen besser beobachten

lasst. Weisse oder opake Stellen sind nicht oder nur mangelhaft mit der Säuremischung durchtränkt

Wenn alle Baumwolle in das Sauregemisch eingetragen ist, so bedeckt man das Gefäss mit einem Deckel und stellt es an einen kühlen und schattigen Ort bei Seite. Nach Verlauf von etwa 10 Stunden prüft man, wie weit die Nitrirung vorgeschritten ist. Hatte man also die Baumwolle Abends in die Säuremischung eingetragen, so nimmt man diese Prüfung sofort am anderen Morgen als erste Arbeit vor. Man entnimmt zu diesem Zwecke mittels zweier Glasstäbe eine Probe der mit Säure getränkten Baumwolle, trägt sie sofort in eine grössere Menge Wasser von 1—2 Liter ein, bewegt sie darin, ergreift sie darauf mit den Fingern und wäscht sie nun unter wiederholtem Wechseln des Wassers solange aus, bis das abgepresste Wasser nicht mehr sauer reagirt, wenn man etwas Lackmusinktur zufügt. Man presst alsdann die Probe mit den Fingern aus, zerzupft sie fein, breitet sie auf Filtrirpapier aus und trocknet sie an einem lauwarmen Orte aus. Sobald sie trocken geworden ist, wägt man sie und stellt fest, ob sie sich in 25 Th. der unten angegebenen Alkohol-Aethermischung klar auflöst. Diese Prüfung wiederholt man, wenn nöthig, von Stunde zu Stunde. Sobald man festgestellt hat, dass die Nitrirung auf den gewünschten Punkt gelangt ist, sobald also die getrocknete Probe in 25 Th. Alkohol-Aethermischung klar oder doch fast klar löslich ist, so schreitet man zur Verarbeitung des ganzen Gemisches.

Man hebt die Wattenmasse, welche einen starren Kuchen bildet, mit zwei Stäben aus Glas oder Porcellan heraus und bringt sie portionenweise sofort in ein möglichst viel kaltes Wasser enthaltendes Gefäss aus Steingut oder Holz. Man rührt um, giesst das Wasser ab und lässt frisches Wasser dazu treten, rührt um und giesst wiederum ab etc. Nachdem man dies zwei- bis dreimal gethan hat, zerzupft man die Kollodiumwolle mit den Händen, und wäscht sie mit gewöhnlichem Wasser bis zum vollständigen Verschwinden der sauren Reaktion des abfließenden Wassers, schliesslich mit destillirtem Wasser aus.

Man presst die Kollodiumwolle stark mit den Händen, zerzupft sie, breitet sie in einem Siebboden auf einer Lage Fliespapier aus und lässt sie an einem lauwarmen Orte trocken werden. Obgleich die Kollodiumwolle erst bei weit über 100° C verpufft, so ist es dennoch rathlich, eine weit unter dieser Temperatur liegende Trockenwärme einwirken zu lassen. Man trocknet zweckmässig bei 25—30° C, am besten in der Sonne.

Das Auswaschen der Kollodiumwolle erfordert einige Aufmerksamkeit, und diese ist besonders auf etwaige härtere Knoten in der Masse der Kollodiumwolle zu richten. Ein nicht genügend ausgewaschenes Produkt wird beim Trocknen stellenweise gelb. Auch giebt nur eine total salz- und säurefreie Kollodiumwolle ein klares Kollodium.

2 Th. der ausgewaschenen und trockenen Kollodiumwolle giebt man in eine Flasche, welche 70—80 Th. Wasser fassen kann, durchfeuchtet sie mit 6 Th. Weingeist und giesst dann 42 Th. Aether hinzu. Die Mischung wird unter gelegentlichem Umschütteln solange zur Seite gestellt, bis die Kollodiumwolle sich fast vollständig gelöst hat. Die Lösung bildet dann eine etwas trübe, sirupdicke Flüssigkeit, in welcher meist noch einige ungelöste Baumwollfasern umherschweben. Man lässt nun das Kollodium bis zur vollständigen Klärung ruhig stehen und giesst es alsdann von dem vorhandenen Bodensatz vorsichtig ab.

Um die Klärung des Kollodiums zu beschleunigen, soll man nach KRAZSFELD das frisch bereitete Kollodium mit gewaschenem und geglühtem Quarzsand schütteln. Letzterer reist die trübenden Antheile mechanisch mit sich nieder, sodass die Klärung binnen wenigen Tagen beendet ist.

Sehr günstige Resultate erhält man auch, wenn man die gewaschene und abgepresste Kollodiumwolle zunächst mit Weingeist entwässert, wiederum abpresst und ohne zu trocknen in Aetherweingeist löst. Da dieses Verfahren eine Trockenbestimmung der Kollodiumwolle voraussetzt, so ist es mehr für den Grossbetrieb zu empfehlen. Löst man

feuchte (wasserhaltige) Kollodiumwolle in Aetherweingeist, so erhält man zwar ein sehr dickes, schleimiges Kollodium, aber dasselbe giebt ein trübes Häutchen

Die von den einzelnen Pharmakopöen zur Bereitung des Kollodiums gegebenen Vorschriften weichen etwas ab

	Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U-St.
Kollodiumwolle	—	100 g	5,0 g	4,0 g	4,0 g	3,0 g
Spiritus	—	120 ccm	20,0 g	12,0 g	12,0 g	25 ccm
Aether	—	880 ccm	75,0 g	84,0 g	81,0 g	75,0 ccm

Chemie. Durch Einwirkung von conc Salpetersäure (in Gemischen von Salpetersäure und Schwefelsäure spielt die letztere lediglich die Rolle eines wasserentziehenden Mittels) auf Cellulose entstehen mehrere Produkte von verschiedener Zusammensetzung und abweichenden Eigenschaften, welche man sich gewöhnt hat, als Nitro-Cellulosen zu bezeichnen. Diese Benennung ist thatsächlich irrig, die entstehenden Produkte sind nach ihren Reaktionen nicht Nitro Cellulosen, sondern Salpetersäureäther der Cellulose

Je nach der Stärke der angewendeten Salpetersäure, der Temperatur, bei welcher die Einwirkung stattfindet, und der Dauer der Einwirkung entstehen verschiedene Cellulosenitratre, welche sich u. a. durch ihre Löslichkeit bez. Nichtlöslichkeit in Alkohol-Aether unterscheiden. — Die in Alkohol-Aether lösliche Kollodiumwolle besteht vorzugsweise aus Cellulosedinitrat $C_6H_7O_2(NO_2)_2$

Eigenschaften. Das Kollodium bildet eine neutrale, sirupdicke, fast klare oder schwach opalisirende, farblose oder kaum blassgelbliche Flüssigkeit, die an freiem Feuer sich leicht entzündet, an der Luft unter Zurücklassung eines Häutchens schnell verdunstet und auf die trockene Haut gestrichen einen fest haftenden, trocknen, harten, firniss- oder glasartigen Ueberzug hinterlässt, der die betreffende Hautstelle jedoch etwas zusammenzieht. Der Verdunstungsrückstand des Kollodiums ist neutral und brennt, wenn er entzündet wird, langsam ab, ohne — wie die Kollodiumwolle — zu explodiren. Dieses Verhalten beruht auf der kompakten Beschaffenheit des Verdunstungsrückstandes

In Wasser und Alkohol ist der Verdunstungsrückstand des Kollodiums unlöslich, dagegen quillt er in Aether langsam auf.

Aufbewahrung. Kollodium wird in mit guten Korken verstopften Glasflaschen an einem kühlen Orte, also im Keller aufbewahrt. Da das Kollodium reichliche Mengen Aether enthält, so werde es bezüglich der Feuersgefahr genau wie dieser behandelt.

Prüfung. Die Güte des Kollodiums ergibt sich aus seiner Farblosigkeit, Klarheit und dem indifferenten Verhalten gegen blaues Lackmuspapier. Auf die trockne Haut gestrichen, muss es nach dem Abtrocknen einen glänzenden festen Ueberzug hinterlassen. Das auf einer trockenen Glasplatte erzeugte Kollodiumhäutchen muss glänzend, und darf nicht trübe sein, andernfalls enthält das Kollodium Wasser und eignet sich nicht zum Gebrauche für Photographen.

Anwendung. Das Kollodium wird mittels eines Pinsels auf die Haut aufgetragen. Es wird gebraucht zur Schliessung von Wunden, zum Bedecken wunder Hautstellen, leichter Brandwunden, gichtiger und hamorrhoidaler Anschwellungen, erysipelatöser Entzündungen, Frostbeulen. Um die Ueberzüge elastischer zu machen, setzt man dem Kollodium etwa $\frac{1}{2}$ Proc Ricinusöl zu, oder man löst $\frac{1}{4}$ Proc Paraffin (durch Schütteln) darin auf. Vergl. *Kollodium elasticum*. Die Kollodiumwolle dient, als lockeres Bauschehen in Filtrirtrichter eingeschoben, zum Koliren oder Filtriren salpetersaurer ätzender Salzlösungen, z. B. des Wismutnitrates u. a.

Kollodium duplex. Das in den Preiskisten der Drogisten als „Kollodium duplex“ aufgeführte Präparat ist nichts anderes als eine brauchbare Sorte Kollodium. Man lasse sich durch diese Bezeichnung nicht etwa verleiten, dasselbe nochmals zu verdünnen.

II Kollodium elasticum (Austr. Germ. Helv.) Kollodium flexile (Brit. U-St.) Kollodium élastique (Gall.) Kollodium tenax.

Das Kollodium, die einfache Auflösung der Kollodiumwolle in Aetherweingeist, hat die Eigenthümlichkeit, beim Eintrocknen sich zusammenzuziehen. Infolgedessen übt es

auf die damit bestrichene Hautfläche eine zusammenziehende Wirkung aus und verursacht eine Spannung der Haut. Eine weitere Folge dieser Kontraktion ist, dass die Kollodiumhaut nach kurzer Zeit Risse bekommt

Diese zusammenziehende Kraft des Kollodiums ist in manchen Fällen, wie beim Schliessen kleiner Wunden, bei Frostbeulen, Erysipelas, Orchitis, Karbunkeln, dem Arzte allerdings erwünscht, in anderen Fällen aber, in welchen es nur darauf ankommt, die Hautfläche mit einer schützenden Decke zu versehen, z B bei Verbrennungen, Hautentzündungen, flechtenartigen Ausschlägen etc durchaus nicht nützlich Für solche Fälle dient das elastische Kollodium

Die Vorschriften der einzelnen Pharmakopöen für dieses Präparat weichen unter einander etwas ab

	Austr	Brit	Gall	Germ	Helv	U-St
Collodii	49,0 g	48 cem	45,0 g	47,0 g	49,0	46,0
Olei Ricini	1,0 „	1,0 g	3,0 „	0,5 „	1,0	1,5
Terobinthinae	—	—	—	2,5 „	—	—
Balsami canadensis	—	2,0 „	—	—	—	2,5

Unter „Kollodium“ ist natürlich stets das Präparat der betreffenden Pharmakopöe zu verstehen, davon abgesehen ist den Vorschriften kaum etwas hinzuzufügen

III Colloxylinum Kolloxylin. Fulmicoton (Gall) Pyroxylin (Brit U-St) Kollodiumwolle. Schliessbaumwolle. Soluble Gun Cotton.

Man pflegt die in Alkohol-Aether lösliche nitrirte Baumwolle als „Kolloxylin“ zu bezeichnen, zum Unterschiede von der in Aether nicht löslichen, welche meist als „Pyroxylin“ bezeichnet wird. Indessen ist man in diesen Bezeichnungen wenig konsequent, versteht z B als Schliessbaumwolle oder als Pyroxylin sowohl das lösliche als das unlösliche Präparat, während man als Kolloxylin allerdings stets nur die lösliche nitrirte Baumwolle bezeichnet

Die Darstellung erfolgt in der Weise, wie sie unter „Kollodium“ angegeben ist. Nur wird natürlich die gewaschene Kollodiumwolle eben nur getrocknet und nicht in Alkohol-Aether gelöst

Sie stellt meist schwach gelbliche, wie gewaschene und wieder getrocknete Watte aussehende Massen dar, welche angefeuchtet blaues Lackmuspapier nicht röthen. In kleineren Mengen und im trockenen Zustande entzündet, brennt die Kollodiumwolle mit grosser Schnelligkeit ab, ohne einen sichtbaren Rückstand zu hinterlassen. Gelangen grössere Mengen zur Entzündung, so können Explosionen von grosser Gewalt erfolgen. Besonders heftig sind die Explosionen, wenn Kollodiumwolle in komprimirtem Zustande zur Entzündung gelangt. Kollodiumwolle muss sich in 20 Th. einer Mischung von 1 Th. Alkohol und 3 Th. Aether fast klar auflösen.

Im Sinne des deutschen Gesetzes über den Verkehr mit Sprengstoffen vom 9 Juni 1884 gehört Kollodiumwolle zu denjenigen Sprengstoffen, welche nicht vorzugsweise als Schiessmittel gebraucht werden

Kollodiumwolle in Mengen von mehr als 200 g werde wie ein Sprengmittel aufbewahrt. Davon abgesehen werde sie in trockenen Glasern und im lockeren Zustande aufbewahrt. Wird Kollodiumwolle feucht in Gefässe gebracht, so schimmelt sie sehr leicht. Beim Verpacken von Kollodiumwolle vermeide man, namentlich bei warmer Temperatur, ein heftiges Zusammenpressen oder Stossen derselben

IV Pyroxylin. Schliessbaumwolle. Man erhält dieses Präparat, indem man in eine 10–15° C zeigende Mischung aus 4 Th. konc Schwefelsäure (spec Gew = 1,84) und 1 Th. Salpetersäure (spec Gew = 1,5) soviel entfettete Baumwolle einträgt, als sich bequem in der Säure unterbringen lässt, und zwar so, dass die Säure noch über der Baumwolle steht — Man lässt 24 Stunden lang einwirken und wäscht und trocknet das Produkt, wie unter Kolloxylin angegeben wurde, aus

Das Pyroxylin ist von etwa den nämlichen Eigenschaften wie das Kolloxylin, aber es ist in Wasser, Alkohol und Aether unlöslich. Mit Aceten übergossen quillt es auf, von

viel Aceton wird es schliesslich gelöst → Es entzündet sich nicht bloss durch direkte Flammen, sondern auch schon durch Druck und Schlag Seine Explosionsenergie ist erheblich heftiger als die des Kolloxylin Es gehört gleichfalls zu den Sprengstoffen im Sinne des Gesetzes vom 9 Juni 1884 (s oben)

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht das Pyroxylin im wesentlichen aus Trinitro-Cellulose $C_6H_7O_2(NO_3)_3$ Verwendung findet das Pyroxylin ziemlich aus schliesslich als Sprengmaterial, z B zum Laden von Torpedos und Seeminen, ferner zur Herstellung des „rauchlosen Pulvers“

Nitrierte Baumwollen Kollutücher werden in chemischen Fabriken zum Kohren von Flüssigkeiten benutzt, welche Schwefelsäure, Salzsäure oder Salpetersäure enthalten

Kollodium ad clares pedum Hühneraugen-Kollodium (Hamb Vorschr)

Rp	1 Extracti Cannabidis Indicae	1,0
	2 Acidi salicylici	10,0
	3 Terebinthinae	5,0
	4 Collodii	82,0
	5 Acidi acetici glacialis	2,0

Man vertheilt 1—3 in 4 und fügt 5 hinzu

Kollodium ad verrucas Warzen Kollodium (Hamb Vorschr)

Rp	Acidi salicylici	
	Acidi lactici aa	1,0
	Collodii	8,0

Kollodium lacto salicylatum Milchsäure-Kollodium (Münch. Vorschr)

Rp	Acidi salicylici	
	Acidi lactici aa	8,0
	Collodii elastici	14,0

Kollodium lentescens

Rp	Collodii	100,0
	Glycerini	1,5

Kollodium plumbeum von ARM.

Rp	Liquoris Plumbi subacetici	1,0
	Collodii	25,0

Kollodium stypticum

Rp	Acidi tannici	5,0
	Collodii elastici	50,0

Diese Vorschrift ist zu benutzen wenn Kollodium stypticum durch Recept verordnet ist

Kollodium tannatum

Tannin-Kollodium (Münch Vorschr)

Rp	Acidi tannici	5,0
	Spiritus (90 Vol. Proc)	15,0
	Collodii	80,0

Aceton-Kollodium. Ist eine Auflösung von 4—5 Th Kollodiumwolle in 94—95 Th Aceton

Alkolen, Ersatz für Kollodium, ist angeblich eine alkoholische Auflösung von Mono- und Dinitro Cellulose d 1 Kollodiumwolle

Camphoid von MARINDALE, Ersatz für Kollodium, ist eine Auflösung von 1 Th Kolloxylin, 20 Th Kampher und 20 Th absolutem Alkohol

Celloidin der chemischen Fabrik auf Aktien vorm E SOERING ist ein sehr konzentriertes Kollodium, welches erhalten wird durch Abdestilliren des Aethers vom Kollodium Die hinterbleibende Masse wird in Tafelform gebracht — Dieses Celloidin ist ein sehr bequemes Material zur Selbstbereitung des Kollodiums Es löst sich leicht in Alkoholäther auf, ist nicht explosiv, sondern brennt entzündet mit langsamer, ruhiger Flamme ab Es enthält 20 Proc trockene Kollodiumwolle

Celluloid Ein zu vielen Zwecken, ursprünglich als Ersatz des Elfenbeins benutztes Material Es wird dargestellt, indem man Nitrocellulose mit Kampher mischt und die Mischung durch Walzen in der Wärme homogen macht Das deutsche Celluloid besteht aus 66,6 Th Nitrocellulose und 33,4 Th Kampher Es ist ursprünglich gelblich weiss, kann aber durch geeignete Farbstoffe leicht und schön gefärbt werden Es ist unlöslich in Wasser, Alkohol, Aether, in Aceton quillt es zunächst auf, schliesslich geht es in Lösung

Celluloid-Kitte 1) Um Celluloid-Gegenstände zu kitten, soll man die Bruchflächen mit Essig bestreichen, nach einiger Zeit zusammenfügen und nach dem Zusammenbinden trocknen lassen 2) Man bestreicht die Bruchflächen mit Chlorhydrin (s Glycerin) und verfährt wie unter No 1 angegeben 3) Man bereitet einen Kitt aus 2 Th Schellack, 3 Th. Kampherspiritus und 4 Th absolutem Alkohol

Celluloid-Lack Man löst 1 Th trockne Kollodiumwolle in 3 Th. Aether und 4 Th Spiritus (95 Proc) und fügt 0,25 Th Kampher hinzu. Ist an Stelle des Zapon Lacks zu gebrauchen

Collostin, Collasin, amerikanische Specialität, ist im wesentlichen eine Auflösung von Kollodiumwolle und Kampher in Aceton (vergl Filmogen) Als Hautfurniss benutzt

Filmogen. Ist eine Auflösung von Kollodiumwolle in Aceton, also etwa Aceton Kollodium

Hornisirtes Pulver ist Schiessbaumwolle, welche durch Tränken mit Essigäther oder Nitrobenzol in eine harte Masse übergeführt ist, welche dann in Körnerform gebracht wird

Hyalodermis, Ersatz für Kollodium, ist entweder mit Camphor oder Collasin identisch.

Krystallin, elastisches, ist eine Auflösung von 4 Th. Kollodiumwolle in 16 Th. Methylalkohol und 80 Th. Amylacetat. Farblose, dicke Flüssigkeit, welche ausserlich wie das Kollodium angewendet wird.

Pegamoid ist ein durch Zusatz eines Erweichungsmittels (Ricinusöl) teigartig gewordenen Celluloid, welches auf Papier oder Gewebe aufgestrichen wird. Pegamoidpapier, d. h. beiderseitig mit Pegamoid bestrichenen Papier, hat hellen Klang und ähnelt thierischem Pergament. Es lässt sich mit Tinte beschreiben und bedrucken. Verwendung für Tapeten und Plakate. Mit Pegamoid bestrichenen Baumwollgewebe giebt nach lederartiger Pressung „Kunstleder“.

Phenolcelluloid ist eine Lösung von Kampher und Kollodiumwolle in Karbolsäure.

Photoxylin. Man versteht hierunter zwei verschiedene Substanzen. A. Eine mit besonderer Sorgfalt bereitete und deshalb in Alkohol-Aether leicht und klar lösliche Kollodiumwolle, welche auch **Mann'sche Kollodiumwolle** genannt wird. Zur Bereitung dieser Kollodiumwolle trägt man in ein auf 38° C. gehaltenes Gemisch von 42 Th. Salpetersäure von 1,424 und 54 Th. konc. Schwefelsäure 8 Th. geklärtes Kaliumnitrat und alsdann sogleich 4 Th. trockne reine Holzwolle ein. Nach 12stündiger Einwirkung wird die nitrirte Holzwolle wie unter Kollodium angegeben weiter verarbeitet. B. Eine Auflösung von 5 Th. dieser Kollodiumwolle in 95 Th. einer Mischung aus gleichen Theilen Alkohol und Aether. Zum Einbetten mikroskopischer Präparate.

Seide, künstliche, von **CHARDONNET**. Dickflüssiges Kollodium wird durch kapillare Oeffnung in Wasser gepresst und der so entstandene Faden aus Nitrocellulose zunächst in Wasser gewaschen, dann mit reducirenden Bädern, schliesslich mit Ammoniumphosphat behandelt. Sie ist von der echten Seide dadurch zu unterscheiden, dass sie durch Erhitzen mit Natronlauge Salpetersäure abspaltet.

Tonit, **Potentit**, **Liverpool Cotton Powder** besteht aus Schiessbaumwolle und Bariumnitrat zu gleichen Theilen.

Zaponlack, **Brassolin**, **Nigrolin**. Sind Auflösungen von Celluloid in einem Gemisch von Aceton und Amylacetat.

Colocynthis.

Citrullus Colocynthis (L.) Schrader, Familie der Cucurbitaceae—Cucurbitaceae—Cucumerinae. Gegenwärtig in Afrika, im Mittelmeergebiet, in Ostindien und Ceylon verbreitet, aber wohl vielfach aus Kulturen verwildert. Verwendung findet die Frucht:

† **Fructus Colocynthis** (Austr. Germ.). **Colocynthis** (Helv. U-St.). **Baccae s. Poma Colocynthis**. **Colocynthis**. — **Koloquinthen**. **Bitteräpfel**. **Bittergurken**. **Purgirgurken**. **Purgirparadiesäpfel**. **Appelquint** (volkstüm.). — **Coloquinthe** (Gall.). — **Colocynth**.




Fig. 219. (Nach HARTMAN.)
Coloquinthe im Querschnitt

Beschreibung. Die beerenartigen Früchte sind mit einer gelben oder grünlichgelben, glatten, feinpunktierten, spröden, lederartigen Haut versehen. Sie sind kuglig und erreichen 5–10 cm Durchmesser. Auf dem Querschnitt fallen drei breite Spalten auf, die die Frucht entsprechend zerlegen. Von dem Schnittpunkt der Spalten gehen zwischen

denselben breite Gewebebalken zur Peripherie. Die die Spalten begleitenden schmälere Gewebepartien biegen an der Peripherie um und tragen die Samen (Fig. 219). Die Grenze der Carpell verläuft nicht in den Spalten sondern in den breiteren Balken. — Die Frucht erscheint demnach unsicht sechsfachzählig. Das weiche, schwammige Gewebe der Frucht be-

steht aus getüpfeltem, dünnwandigen Parenchym mit spärlichem, braunen Inhalt, durchzogen von Gefässbündeln. Die Samen sind spitz-eiförmig, etwas flach gedrückt, gelbgrau oder hellbraun, am spitzen Ende jederseits mit zwei zarten, feinen Ritzten. Die Früchte sind geruchlos, von intensiv bitterem Geschmack.

Sie kommen fast ausschliesslich ohne das gelbe, lederige Epicarp in den Handel und bilden dann weisse oder wassrige, sehr leichte Kugeln.

Bestandtheile. Der wirksame Bestandtheil ist ein Bitterstoff Colocynthin $C_{50}H_{84}O_{18}$, der, zu etwa 0,6 Proc. in der Frucht enthalten, ein gelbes, in Alkohol und Wasser lösliches Pulver darstellt. Er soll in langgestreckten Zellen, die Milchsaftschlauchen ähnlich sind, enthalten sein. — Daneben wird ein zweiter Körper Colocynthidin aufgeführt.

Sie enthalten ferner Cellulose 13,5 Proc., Gummi 9,86 Proc., amyloide Substanz 2,07 Proc., Eiweissstoffe 14,31 Proc., Asche 9,76 Proc. Aether-Chloroformextrakt 3,21 Proc., Alkoholisches Extrakt 16,61 Proc., wässriges Extrakt 31,07 Proc. — Die Samen enthalten fettes Oel 16 Proc., Eiweissstoffe 5 Proc.

Verwechslungen und Verfälschungen. Als solche werden hauptsächlich die Früchte anderer Cucurbitaceen beobachtet, so die von *Cucumis trigonus* Roxb. und *Cucumis Hardwickii* Boyle, *Luffa purgans* Mart., *L. drastica* Mart. („Hill colocynth“), endlich die von *Balanites aegyptiaca* Delile (Zygophyllaceae). Ausserdem sind mehrfach andere Früchte vorgekommen, deren sichere Bestimmung noch aussteht. Alle sind bei aufmerksamer Betrachtung leicht von der echten Droge zu unterscheiden.

Anwendung. Die Koloquinthen dienen als starkes Drasticum 0,05–0,1–0,3 g einige Male täglich in Pulver, Pillen und Abkochung. Dosen von 1,0 g können schon gefährlich wirken. Die Verwendung des Colocynthins (0,005–0,01 g) bietet keine Vortheile.

Im Haushalte als Mittel zur Vertreibung von Wanzen und anderem Ungeziefer, man verwendet eine Koloquinthenabkochung, die der Tünche zugesetzt wird, womit man die Wände bestreicht.

Aufbewahrung. Die Früchte werden unzerkleinert in Holz- oder Blechgefässen an einem trocknen Orte vorsichtig aufbewahrt. Zur Darstellung von Präparaten lässt Germ. die Früchte mit den Samen verwenden, Austr. Helv. Brit. U-St. Gall. schreiben dagegen vor, die Samen zu beseitigen und lediglich das schwammige Fruchtfleisch, die Colocynthidis Pulpa, Colocynth Pulp (Brit.) zu benutzen.

Pulverung. Aus den bei 40–50° C getrockneten Früchten bereitet man ein grobes Pulver für Auszüge und ein feines zur Receptur. Auch hier ist zu beachten, dass das Pulvis Colocynthidis der Germ. aus den Früchten mit den Samen dargestellt wird und deshalb von erheblich schwächerer Wirkung ist, als das nur aus dem Fruchtfleische bereitete der Austr. Brit. Gall. Helv. U-St. (vergl. die Höchstgaben). Es ist daher beim Einkauf des fertigen Pulvers stets anzugeben, ob Pulvis Colocynthidis P. G. III oder Pulvis Colocynthidis sine semine gemeint ist. Die ganzen Koloquinthen geben beim Pulvern 93–94 Proc. Ausbeute, die Entfernung der Samen bedingt aber schon allein einen Gewichtsverlust von 60–75 Proc. Auf diese Unterschiede ist bei Anfertigung ausländischer, ärztlicher Verordnungen mit Pulvis Colocynthidis Rücksicht zu nehmen.

Höchste Einzelgabe Germ. 0,5 g, Austr. 0,3 g, Helv. 0,25 g

„ Tagesgabe „ 1,5 g, „ 1,0 g, „ 1,0 g

Koloquinthen und deren Zubereitungen dürfen zu Heilzwecken nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden. Als Ungeziefermittel verabfolgt man sie mit der nöthigen Vorsicht und entsprechender Belehrung, ein Giftseim ist in Deutschland nicht erforderlich.

† *Fructus Colocynthidis praeparati* (Ergänz.) *Colocynthis praeparata*. *Trochisci Alhandal*. Gepulverte Koloquinthen 5 Th von den Samen befreite, fein zerschnittene Koloquinthen stösst man mit 1 Th fein gepulvertem arabischem Gummi

und q s. Wasser zum Teig an, trocknet und verwandelt in ein feines Pulver Vorsichtig und trocken aufzubewahren Dosis maxima 0,5, pro die 1,0

† **Extractum Colocynthis** (Austr Germ Hely U-St Gall.) Germ 2 Th zer schnittene Koloquinten mit den Samen zieht man mit 15 Th verdünntem Weingeist (60 proc) 6 Tage, dann mit 5 Th verdünntem Weingeist und 5 Th Wasser 3 Tage aus und verdampft zur Trockne Ausbeute 10—20 Proc — Hely 1 Th Koloquinte (II) wird mit 10 Th verdünntem Weingeist (62 proc) 48 Stunden, dann mit einer Mischung von je 3 Th Wasser und Weingeist (94 proc) 24 Stunden digerirt, die Pressflüssigkeiten zur Trockne eingedampft — Austr Aus grob gepulverten Koloquinten ohne Samen wie Extr Aconiti radices Anstr (S 155), aber zur Trockne einzudampfen Ausbeute bis zu 40 Proc — U-St 1000 g grob gepulverte Koloquinten ohne Samen macerirt man 4 Tage mit 3500 ccm verdünntem Weingeist (41 proc), presst ab und zieht im Perkolator mit q s verdünntem Weingeist aus, um 5000 ccm Gesamttflüssigkeit zu erhalten, die nach Ab ziehen des Alkohols¹⁾ zur Trockne eingedampft wird — Gall 1000 g Koloquinten werden 10 Tage mit 6000 g, dann 3 Tage mit 2000 g Weingeist (60 proc) ausgezogen, die Pressflüssigkeit nach Abdestilliren des Weingeists¹⁾ zu einem weichen Extrakt eingedampft Ausbeute aus entsamten Früchten 25—32 Proc, aus nicht entsamten 9—13 Proc (Das Extrakt der Hung besteht zur Hälfte aus Dextrin) Höchste Einzelgabe 0,05 g, höchste Tagesgabe 0,2 g

Vorsichtig und trocken aufzubewahren

† **Tinctura Colocynthis**. Koloquintentinktur Germ Aus 1 Th grob geschnittenen Koloquinten mit den Samen und 10 Th. Weingeist (87 proc) — Hely Aus mittelfein geschnittenen Koloquinten ohne die Samen und 94 proc Weingeist ebenso Vorsichtig aufzubewahren Höchste Einzelgabe 1,0 g, höchste Tagesgabe 5,0 g

Aqua contra cimices.

Wassenzwasser

I.

Rp Fructus Colocynthis
Summitat. Sabinae
Fructus Capici
Aloëa ss 1,0
Aquae communis 40,0—50,0

½ Stunde kochen, dann abpressen

II

Rp Fructus Colocynthis
Fructus Capici
Aloëa
Herbae Absinthii
Seminis Strychni rasp ss 100,0
Aquae communis 8000,0

Flat decoctum Wird der zum Anstreichen der Wände bestimmten Tünche zugesetzt

Cataplasma purgativum.

Rp Aloëa pulveratae
Extracti Colocynthis
Extracta Hellebori viridis
Mellis depurati ss 5,0
Spiritus diluti q s

Dünn gestrichen auf den Unterleib zu legen.

Emplastrum vermicifugum

Wurmpflaster.

Rp Extracti Colocynthis 10,0
Aloëa pulveratae 20,0
Olei Absinthii
Olei Sabinae ss 2,0
Alcohol. absoluti 20,0
Cerae Resinae Pinii 150,0

Wird, dünn auf Leinwand gestrichen, auf den Unterleib gelegt.

† **Extractum Colocynthis compositum.**

Compound Extract of Colocynthis

I Ergänzb

Rp Extracti Colocynthis 3,0
Aloëa pulveratae 10,0
Resinae Scammoniae 8,0
Extracti Rhei 5,0

Mischen, mit Weingeist befeuchtet durcharbeiten und trocknen.

II. Helvet.

Rp Fructus Cardamomi (V) 5,0
Extracti Colocynthis 10,0
Saponis medicati 15,0
Resinae Scammoniae 20,0
Extracti Aloëa 50,0

Bereitung wie bei I

III Brit.

Rp 1 Fructus Colocynthis sine semin 150,0
2 Spiritus (80%) 4000 ccm
3 Extracti Aloëa Barbados 300,0
4 Resinae Scammoniae 100,0
5 Saponis animalis rasi 100,0
6 Seminis Cardamomi pulv 25,0

Man macerirt 1 mit 2 vier Tage, presst, verdampft den Alcohol, fügt 3, 4, 5 und gegen Ende des Eindampfens zu einem festen Extrakt 6 hinzu

IV U-States

Rp 1 Aloëa purificatae 500,0
2 Extracti Colocynthis 160,0
3 Fructus Cardamomi pulv 60,0
4 Resinae Scammoniae 140,0
5 Saponis pulverati 140,0
6 Spiritus (91%) 100 ccm

1 wird im Wasserbade geschmolzen, 2, 4, 5, 6 zugefügt, bei höchstens 120°C bis zur Gleichmässigkeit erhitzt, 3 zugegeben und zur Trockne gebracht

Vorsichtig aufzubewahren!

Dosis maxima (Ergänzb) 0,2, pro die 0,4

Hely 0,25 " 1,0

Brit 0,1 bis 0,5

Guttae purgatoriae Hanz.

Rp Tincturae Colocynthis 5,0

Tincturae Asae foetidae 10,0

Morgens und Abends 14—20 Tropfen bei chronischer Verstopfung

Linalmentum Colocynthis Hanz

Rp Tincturae Colocynthis 20,0

Olei Ricini 40,0

Theelöffelweis zur Einreibung des Unterleibes (den Stuhlgang zu fördern)

¹⁾ Im Kleinstbetrieb ist das Abziehen des Weingeistes nicht anzurathen, da auch die Destillirgeräthe nur schwierig (am besten mit SodaLösung) reinigen lassen

Oleum Colocynthis compositum

Habakuk 81	
Rp Extracti Colocynthis pulv	2,0
Extracti Aloës pulv	10,0
Olei Absinthii aetherel	
Olei Tanaetii	
Olei Rutae	ss 2,0
Olei Terebinthinae	
Petrolei rectificati	ss 10,0
Olei Absinthii infusi	100,0

Einige Stunden digeriren, erkaltet filtriren. Zur Einreibung des Unterleibs bei Wurmeiden (Volksmittel)

Pilulae catharticae compositae (U-St.)

Compound Cathartic Pills	
Rp Extracti Colocynthis compositi	80,0
Hydrargyri chlorati mitis	80,0
Extracti Jalapae	80,0
Guttii	15,0
Aquae	q s

Man macht 1000 Pillen

Pilulae catharticae vegetabiles (U-St.)

Rp Extracti Colocynthis comp	60,0
Extracti Hyoscyami	30,0
Extracti Jalapae	30,0
Extracti Leptandrae	15,0
Resinae Podophylli	15,0
Olei Menthae piperitae	8 ccm
Aquae	q s

Man macht 1000 Pillen

Pilulae cephalicae

Rp Colocynthis praeparatae	
Guttii	
Resinae Scammoniae	
Tuberis Jalapae	
Saponis jalapini	ss 1,5
Aqua	q s

Zu 100 Pillen. Morgens und Abends eine Pille.

Pilulae cholagogae COPLAND

Rp Extracti Colocynthis comp	2,5
Radialis Ipecacuanhae	0,05
Saponis medicati	0,6
Extracti Hyoscyami	1,5

Zu 20 Pillen. Abends 1—2 Stück.

Pilula Colocynthis composita (Brit.)

Compound Pill of Colocynthis	
Rp Colocynthis pulv (pulpa)	20,0
Aloës Barbados	40,0
Resinae Scammoniae	40,0
Kali sulfurici	5,0
Olei Caryophyllorum	5 ccm
Aquae destillatae	q s

Man stößt zur Masse. Dosis 0,25—0,5

Pilula Colocynthis et Hyoscyami (Brit.)

Pill of Colocynthis and Hyoscyamus	
Rp Pilulae Colocynthis compositae (Brit.)	50,0
Extracti Hyoscyami	25,0

Man stößt zur Masse. Dosis 0,20—0,5

Pilulae cum Colocynthis compositae (Gall.)

Pilules de colocynth composites Pilules catholiques, de Rudijs, panchymagogues, cochées mineures.

Rp Aloës pulveratae	0,5
Colocynthis pulv (sine sem)	0,5
Resinae Scammoniae	0,5
Olei Caryophyllorum	0,01
Mellis	q s

Zu zehn Pillen.

BARCLAY's und HAEVEY's Antibilious Pills enthalten als Grundlage Koloquinten-Extrakt

Digestivpillen, GRODDEK's, enthalten in 900 Pillen 52,5 Aloë, 52,5 trockenes Ferrosulfat, 5,2 Koloquintenextrakt, 3,1 Strychnosextrakt. Schwarzglänzende Pillen

Suppositoria Colocynthis

Rp Colocynthis pulveratae	1,0
Saponis olivacei	15,0

Zu 5 Suppositorien

Tinctura Colocynthis composita

Tinctura Colocynthis anisata DAHLBERG	
Rp Tincturae Colocynthis	80,0
Olei Anisi stellati	gtt. II

15—20 Tropfen zweimal täglich

Tinctura Colocynthis seminum RADEMACHER.

Rp Seminum Colocynthis contus	100,0
Spiritus diluti	480,0

Die Samen sind mit Wasser abzuwaschen, hierauf zu trocknen und zu stoßen. Durch 14tägige Digestion bereitet man 440,0 Tinktur

Tinctura contra aphides.**Blattläus-Tinktur**

Rp Acidi salicylici	20
Saponis viridis	50
Tincturae Colocynthis	10,0
Tincturae Quassiae	83,0

Tinctura contra cimices**Wanzen-Tinktur (Vom)**

Rp Extracti Colocynthis fluidi	100,0
Extracti Nicotianae fluidi	100,0
Naphtalin	200,0
Spiritus denaturati	590,0
Olei Mellissae	5,0

Unguentum purgativum CHRISTIAN

Rp Colocynthis pulveratae	1,0
Adipis suilli	9,0

Unguentum contra vermes**Unguentum Arthanitis Wurmsalbe**

Rp Extracti Colocynthis	5,0
Aloës pulveratae	10,0
Fellis Tauri inspissati	15,0
Spiritus	10,0

mischt man bei gelinder Wärme und fügt hinzu

Cerae flavae	100
Adipis suilli	50,0
Sebi taurini	25,0
Olei Petrae	15,0
Olei Absinthii	5,0

die gleichfalls unter Erwärmen gemischt werden.

Vinum antarthriticum**Gichtwein (Boll. de Ph)**

Rp Extracti Colocynthis	1,0
Chinini sulfurici	1,5
Spiritus	10,0
Vini Malacensis	87,5

Vet. Bol purgatif ou aloétique (Gall.)**Pour les chevaux Abführpille**

Rp Fructus Colocynthis pulv	2,0
Aloës pulveratae	25,0
Saponis viridis	q s

Zu einer Pille.

Vet Pilules purgatives pour les chiens (Gall.)**Hundepillen.**

Rp Fructus Colocynthis pulv	1,5
Aloës pulveratae	10,0
Saponis medicati	q s

Zu zehn Pillen. Dosis 1—4 Stück

FOTHERGILL's Pills, gegen Hautkrankheiten, sind Pillen aus Koloquintenextrakt und Antimonoxyd

Laxativum vegetabile saccharo obductum von BURROUGHS, WELLCOME & Co sind überzuckerte Tabletten, deren jede 0,065 zusammengesetztes Koloquintenextrakt, 0,032 Jalapenextrakt, 0,016 Podophyllin, 0,032 Leptandrin, je 0,016 Bilsenkraut- und Löwenzahnextrakt, nebst etwas Minzenöl enthält

Pilules purgatives de CHASSAIGNE BEAUSÉJOUR bestehen aus Kalomel, Koloquintenextrakt und Seife

Colombo.

Jatrorrhiza palmata (Lam.) Miers [syn *Cocculus palmatus* D C Chasmanthera palmata H Bn J¹⁾] Familie der Menispermaceae—Tinosporeae. Heimisch in Mozambique und Obo, kultivirt auf Madagaskar, den Mascarenen und Ceylon. Dieser windende Strauch trägt an dem unteren, etwas verdickten Ende seines Stammes Wurzeln, die in ihrem oberen Theil auf eine Länge von etwa 80 cm anschwellen. Diese angeschwollenen Theile der Wurzel liefern die Droge **Radix Colombo**²⁾ (Gall Germ) s **Columbae** (Austr Brit) s **Calumbae** (Helv) **Calumba** (U-St) **Radix Cocculi palmati**. Colombo- oder Calumbawurzel. Ruhrwurzel. Calumbo. — Racine de colombo — Calumba Root




Fig. 220 (Nach ARTHUR MEYER.)
Querschnitt durch Radix Colombo s Gefäss.
c Cambium. f Ersatzfaser p Parenchym (Markstrahl) s Siebröhre

Beschreibung. Die angeschwollenen Theile der Wurzel werden in Querscheiben zerschnitten und getrocknet. Sie sind rundlich-elliptisch oder etwas nierenförmig, selten kreisrund, sie erreichen 8 cm Durchmesser und 2 cm Dicke (selten kommen Längsviertel der Wurzel in den Handel). Sie sind aussen grob langsrunzelig, braun, auf der Fläche schmutzig-gelb, infolge Austrocknens eingesunken und lassen die grobfaserigen Gefässbündel hervortreten. Auf einem geglätteten Querschnitt erkennt man die $\frac{1}{6}$ – $\frac{1}{8}$ des Durchmessers betragende Rinde, durch die dunkelgefärbte Cambiumschicht vom Holz getrennt. Unmittelbar am Cambium ist der Bau der Rinde und des Holzes strahlig. In der Rinde finden sich einzelne Steinzellen mit klinorhombischen Krystallen von oxalsaurem Kalk. Im Parenchym deutlich geschichtete Stärkekörnchen mit excentrischem Kern, sie werden bis 90 μ gross. Holz und Rinde sind sehr reich an Parenchym, im ersteren kleine Gefässgruppen, in letzteren solche von Siebröhren mit Cambiform (Fig 220)

Geschmack stark und anhaltend bitter

Bestandtheile. Der Geschmack wird bedingt durch 1) Columbium $C_{21}H_{24}O_{11}$, einen krystallinischen, in Wasser schwer löslichen Bitterstoff, in der Rinde zu 0,98 Proc., im Holz zu 1,38 Proc. 2) Berberin $C_{20}H_{17}NO_4 + 4H_2O$, in gelben Nadeln krystallisirendes Alkaloid, in der Rinde zu 2,95 Proc., im Holz zu 1,45 Proc. enthalten. 3) Columbo-säure $C_{21}H_{24}O_{12}$, in Wasser unlöslich. Sie ist das Anhydrid des Columbins, das Berberin ist in der Droge an sie gebunden. Ferner enthält die Droge einen fluorescirenden Körper Asche bis 8 Proc., Extraktgehalt (Alkohol und Wasser 55) 16,5 Proc.

¹⁾ Dieser von der Gall. aufgenommene Name fehlt im Index Kewensis

²⁾ Der Name leitet sich ab von der Negerbezeichnung „Calumb“ für die Droge, er hat mit der Stadt „Colombo“ auf Ceylon nichts zu thun

Verwechslungen und Verfälschungen. Die sogen. amerikanische Colombowurzel von *Fraseria carolinensis* Walt (*Sweetia carolinensis* (Walt) Baill (Gentianaceae) Die Wurzel enthält keine Stärke, aber dafür Gerbstoff, der der *Calumba* fehlt. — Columboholz von *Coscinium fenestratum* Colebrooke ist am charakteristischen Membrancebau zu erkennen. — *Radix Bryoniae* weiss oder hellbraun (vergl. *Bryonia*)

Anwendung. Als schleimig-bitteres Mittel, die Verdauung anregend, auch in grossen Dosen ohne Nachtheil. Bei Dyspepsie mit Diarrhoe, chronischen Durchfällen der Phthisiker, Cholera infantum etc. Dosis 0,5–2,0 mehrmals täglich im Dekokt oder als Tinktur. Kindern 0,5–5,0 100,0 als Dekokt.

Extractum Colombo (Ergänzb. Gall.) s. Calumbae (Austr.) Colomboextrakt. Ergänzb. 2 Th. mittelfein zerschnittene Colombowurzel zieht man 3 Tage mit einer Mischung aus 4 Th. Weingeist und 6 Th. Wasser, dann 24 Stunden mit einer solchen aus 2 Th. Weingeist und 3 Th. Wasser aus, die Pressflüssigkeiten dampft man zur Trockne ein. — Austr. Aus gepulverter Colombowurzel wie *Extr. Aconiti radialis* Austr. (S. 155) Dickes Extrakt. — Gall. Wie *Extract. Colocynthis* Gall. (S. 934) Weiches Extrakt. — Ausbeute 9–10 Proc. Wird zu 0,5–1,0 mehrmals täglich in Pillen oder in Aqua Menthae angewendet.

Extractum Calumbae fluidum (U-St.) Aus 1000 g gepulverter Colombowurzel (No. 20) und einer Mischung von 750 ccm Weingeist (91 proc.) und 250 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 700 ccm Perkolat und stellt 1 s. 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind etwa 3500 g Lösungsmittel erforderlich.

Tinctura Colombo s. Calumbae Colombotinktur. *Tincture ou Alcoolé de Colombo* Ergänzb. Aus 1 Th. grob gepulverter Colombowurzel und 5 Th. verdünntem Weingeist. — Helv. Aus Colombowurzel wie *Tinctura Calami* Helv. (S. 537). — Brit. Aus 100 gepulverter Colombowurzel (No. 20) und 1000 ccm Weingeist (60 proc.) durch Maceration. — U-St. Aus 100 g gepulverter Colombowurzel (No. 20) und einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc.) und 400 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 100 ccm und sammelt 1000 ccm Tinktur. — Gall. Wie *Tinctura Coca* Gall. (S. 869) zu bereiten. — Klare, gelbbraune Tinktur, die sich mit 10 Th. Chlorwasser roth färbt.

Vinum Colombo, Vinum de Chasmanthera palmata (Gall.) Vin ou Oenolé de Colombo. Aus 30 Th. grob gepulverter Colombowurzel und 1000 Th. Roussillonwein (Grenache) durch zehntägige Maceration zu bereiten. — Ex tempore 5,0 Colomboextrakt verreibt man mit 50,0 g Zucker und löst in 950,0 spanischem Wein.

Extractum Colombo solidum (Diet.)

- Rp 1. Radicis Colombo concis 1000,0
2. Aquae destillatae 6000,0
3. Aquae destillatae ebull 4000,0
4. Sacchari albi pulv 400,0
5. Sacchari Lactis pulv 400,0

Man zieht 1 mit 2 24 Stunden, dann mit 3 aus, presst nach 1 Stunde, löst 4 und 5, lässt absetzen, dampft zum dicken Extrakt ein, bringt bei 30°C zur Trockne und fügt hinzu Sacchari Lactis q. s. zu 1000,0.

Infusum Calumbae (Brit.)

Infusion of Calumba.

- Rp Radicis Colombo concis 50,0
Aquae destillatae frigidae 1000,0

Nach halbstündigem Stehen durchsieben.

Liquor Calumbae concentratus (Brit.)

Concentrated Solution of Calumba.

- Rp 1. Radicis Colombo pulv No. 5. 500 g
2. Spiritus (90%) 225 ccm
3. Aquae destillatae 1000 ccm

Man macerirt 1 zweimal 24 Stunden mit je 500 ccm Wasser, erhitzt die Auszüge fünf Minuten auf 82,2°C, fügt nach dem Erkalten 2 hinzu, filtrirt und bringt mit Wasser auf 1000 ccm.

Mixtura amara.

Drogue amère des Indes.

- Rp Extracti Colombo
Tincturae amarae

Tincturae aromaticae ss 10,0

Aquae Cinnamomi spirituos

Aquae Cinnamomi simpl ss 60,0

Essigölweises, bei Durchfall und Magenleiden.

Mixtura antidiarrhoea WENDT

Rp Extracti Colombo 5,0

Elaeosacchari Foeniculi 30,0

Mucilaginis Salep 135,0

1–2stündlich einen Kinderlöffel (bei Durchfall der Kinder)

Mixtura Colombo

(Münch. Nosokom.-Vorschrift.)

Rp Decocti Colombo (s. 10,0) 130,0

Sirupi simplicis 20,0

Pilulae stomachicae Moscoviticae

Russische Magenpillen.

Rp Extracti Colombo

Extracti Gentianae

Extracti Quassiae

Fellia Tauri inapissati ss 5,0

Pulveris aromatici 10,0

Zu 200 Pillen. Vor jeder Mahlzeit 2–3 Stück

Vinum Colombo compositum

Rp Extracti Colombo 5,0

Extracti Gentianae 2,5

Sacchari albi 100,0

Vini albi 850,0

Acidi hydrochlorici (25 proc.) 5,0

Tinct. Chinae comp 40,0

Bei Magenverstimmung, Leibschmerzen, Durchfall

Nerve Restorer von KLINE besteht aus 7,0 Bromammonium, 7,0 Bromkalium, 4,0 Kaliumbikarbonat, 13,0 Colombotinktur, 180,0 Wasser

Vin de Colombo composé BOUCARDAT ist dem **Vinum Colombo comp** ähnlich zusammengesetzt

Colophonium.

Colophonium (Anstr Germ Helv) **Resina** (Brit. U-St) **Pix graeca**. **Resina Colophonium**. **Resina Pini fusca** — **Kolophonium** Geigenharz **Colophon**. Fiedel pech. Spiegelharz **Kalfonig** — **Colophone**. **Arcanson** (Gall) — **Resin. Colophony**.

Beschreibung. Kolophonium ist der durch Erhitzen von Terpenthin (besonders von **Pinus silvestris** L. und **Pinus australis** Michx.) erhaltene Harzrückstand, durch das Erhitzen werden Wasser und ätherisches Oel entfernt. Man erhält den Rückstand solange im Schmelzen, bis er völlig klar geworden ist. Das Kolophonium bildet dann gelbe bis schwarz braune, durchscheinende Stücke, die spröde, glasglanzend und von muschligem Bruch sind. Bei 80° C beginnt es zu erweichen, bei 90—100° C (manche Sorten erst bei 120—130° C) schmilzt es, bei 150° C beginnt es sich zu zersetzen. Es ist unlöslich in Wasser, von 90 proc Alkohol verlangt es bei 20° C 8 Th, bei 60° C einen Theil zur Lösung, leicht löslich in absolutem Alkohol, Chloroform, Essigsäure, Aether, Benzol, theilweise auch löslich in Petroläther, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Die Lösung in absolutem Alkohol reagirt neutral, die in wasserhaltigem sauer (vergl. unten).

Bestandtheile. Das Kolophonium besteht der Hauptsache nach aus dem Anhydrid der Abietinsäure $C_{19}H_{39}O_2$, das beim Lösen in wasserhaltigem Alkohol in das Hydrat übergeht. In amerikanischem Kolophonium kommt auch d-Pimarsäure $C_{20}H_{40}O_2$ vor.

Bei der trocknen Destillation des Kolophoniums gehen zuerst flüssigere Antheile (Harzessenz, Harzessig, Harzspiritus) weg, die zur Fabrikation von Schmiermitteln dienen und in denen Abietinsäure, in Methylisopropylbenzol, Kohlenwasserstoff $C_{11}H_{22}$, Isobuttersäure, Capronsäure und Methylpropylelessigsäure enthalten sind, in den höher (über 360° C) siedenden Antheilen (Harzöl) finden sich Terpene, Phenole und Sauren, sie fluoresciren.

Konstanten, von **Colophonium citrinum** Spec. Gew 1,071—1,0797, Säurezahl 168,0—175,4. Von **Kolophonium rubrum** Spec. Gew 1,074—1,083, Säurezahl 168,0—188,4. Die Esterzahl wird angegeben auf 7—12, die Jodzahl auf 146,6—180,0.

Prüfung. Für das Werthbestimmung ist das spec. Gew. und die Säurezahl am wichtigsten. Das spec. Gew. bestimmt man, indem man sich eine Anzahl Kochsalzlösungen vom spec. Gew. 1,07—1,085 bei 15° C herstellt und feststellt, in welcher hineingeworfene Kolophoniumstückchen in der Schwebe bleiben. Man hat darauf zu achten, dass die Stückchen keine Luft einschliessen.

Die Säurezahl bestimmt man nach DIETZSCH, indem man 1 g Kolophonium mit 25 ccm $\frac{1}{2}$ N alkoholischer Kalilauge übergiesst, verschlossen stehen lässt, bis alles gelöst ist und dann mit $\frac{1}{2}$ N-Schwefelsäure titirt. Die Menge der durch das Kolophonium gebundenen ccm Kalilauge mit 28 multiplicirt, giebt die Säurezahl. — Wasserzusatz ist zu vermeiden.

Verwendung. Für pharmaceutische Zwecke sind nur die hellfarbigen Sorten, das **Colophonium album** und **citrinum** des Handels, geeignet und finden hier zu vielen Salben und Pflastern, gepulvert in der Thierheilkunde, mit Weingeist befeuchtet zu Wergverbänden, als blutstillendes Mittel bei Blutegelbissen und innerlichen Blutungen Anwendung. In der Technik dient es zur Bereitung von Lacken, Firnissen, wasserdichten Kitten, beim Löthen und beim Verzinnen kupferner Geräthe als Reduktionsmittel, wozu natürlich auch die dunkleren Handelsorten genügen. Es haftet ungern an glatten Gegenständen, und hierauf beruht seine Verwendung als Geigenharz, zum Bestreichen von

Treibriemen u dgl wo man eine starke Reibung erzielen will. Das Pulver, in die Flamme geblasen, verbrennt blitzartig und wird deshalb als „Blitzpulver“ für Bühnenzwecke benutzt

Die Pulverung darf wegen der leichten Entzündlichkeit des verstaubenden Kolophoniums nie in einem Raume vorgenommen werden, in welchem offene Flammen brennen, das fertige Pulver bewahrt man in gut verschlossenen, nicht zu grossen Blechgefässen auf, da Selbstentzündung vorkommen kann

Ceratum Resinae (U-St) Resine Cerate Basilicon Ointment 350 Th Kolophonium, 150 Th gelbes Wachs, 500 Th Schweinefett (In der kalten Jahreszeit 120 Wachs, 580 Fett)

Emplastrum Resinae (Brit U-St) Resin Plaster Adhesive Plaster Brit 100 Th Kolophonium, 800 Th Bleipflaster, 50 Th harte Seife, einzeln geschmolzen, dann gemacht — U-St 140 Th. Kolophonium, 800 Th. Bleipflaster, 60 Th gelbes Wachs

Unguentum Resinae (Brit) Resin Ointment Je 200 Th Kolophonium, gelbes Wachs und Olivenöl, 150 Th Schweinefett schmilzt man und rührt kalt

Adhäsionsschmiere für Treibriemen 1) 100 Talg, 300 Fischthran, 150 Kolophonium 2) 100 Schlammkreide mit q s Leinöl verrieben, mischt man mit 600 geschmolzenem Kolophonium

Antikesselsteinkuchen Colophonium (40 Proc), Stearin (10 Proc), Holzasche und Sagemehl schmilzt man und formt kleine Kuchen, die in den Dampfkessel geworfen werden

Bettwachs. Gelbes Wachs, Japanwachs ää 1750,0, Hammeltalg 1125,0, Kolophonium 10,25 kg, Terpentin 2000,0, Kurkumapulver 860,0 In kegelförmige Stangen auszurollen

Bierfassglasur, Verpichungslack 1 kg Kolophonium, 250 g Schellack, 100 g Lärchenterpentin, 50 g gelbes Wachs schmilzt man zusammen und löst unter Erwärmen in 4 l absolutem Alkohol. Man bestreicht die Fässer damit in den Fugen zweimal und übergiesst sie dann mit einer weingeistigen Schellacklösung

Bruchpflaster Tyrpant (Vomačka) 50 Th Kolophonium, 15 Th Hammeltalg, 20 Th Wachs, 15 Th Terpentin, 5 Th Drachenblut, 10 Th Blutatempulver

Einschlusskitt für mikroskopische Präparate. 70 Th Kolophonium, 25 Th Wachs, 5 Th Terpentin schmilzt man. Der Kitt wird mittels eines erhitzten Stabes aufgetragen und nach dem Erhärten mit weingeistiger Schellacklösung überzogen, falls Oelimmersion zur Anwendung kommt.

Flaschenkapsel-Lack, durchsichtiger (Buchh.). 250 Th Kolophonium, 300 Th Aether, 450 Kollodium, man filtrirt und färbt mit einer beliebigen Anilinfarbe

Fliegenleim. 1) 150 Th Kolophonium, 50 Th Leinöl, 18 Th Honig 2) 60 Kolophonium, 38 Leinöl, 2 gelbes Wachs

Fliegenpapier, klebendes Die zweckmässigste Form dafür ist die eines aus festem Papier gefertigten Kegels mit Bodenteller aus Pappe (um das Herabtropfen des Leimes zu verhindern), den man mit einem guten Fliegenleim bestreicht. Vorschriften zu letzterem nach der Drog-Zeig

Kolophonium	600	500	650	600	500
Leinöl	350	300	—	—	—
Reinustöl	—	—	350	300	340
Honig	100	200	—	100	—
Glycerin	—	—	—	—	160

Von Kolophonium eignen sich nur die dunkelbraunen Sorten hierzu

Geigenharz (n Diet.) 10 Th Dammarharz erhitzt man vorsichtig, bis es nicht mehr schäumt, setzt 90 Th weisses Kolophonium zu, schmilzt, erhitzt noch $\frac{1}{2}$ Stunde im Dampfbade unter Umrühren und giest in Tafeln aus

Kitt zum Ausfüllen von Holzugen (Buchh.) Man schmilzt gleiche Theile Wachs und Kolophonium und mischt soviel Raspelspäähne des betreffenden Holzes zu, als die Masse aufnimmt. Man streicht noch warm in die Fugen

Kitt zum Befestigen von Messerheften. 60 Th Kolophonium, 25 Th Eisenfeile, 15 Th Schwefel. Die Messerhefte müssen heiss mit dem geschmolzenen Kitt in Berührung kommen

Löthfett (Diet.) 45,0 Kolophonium, 45,0 Rindstalg, 10,0 Salniakpulver

Perrückenwachs Kolophonium 665, Terpentin, Weisses Wachs je 170, Talg 85, Elemi 17, Perubalsam 5, Stärkemehl 56

Raupenleim. 100 Kolophonium, 20 Fichtenharz, 14 Terpentin, 8 Theer, 50 Schweinefett, 24 Ruböl, 20 Talg — Auch gewöhnliche Wagenschmiere thut gute Dienste

Wasserdicht erhält man Leder, Treibriemen u dergl durch Bestreichen mit einer Mischung von 3 Kolophonium, 2 Benzin, 2 Terpentinöl, 1 Firnis

Witterung zum Fangen schädlicher Schmetterlinge. 930,0 Fliegenlaum (s. oben), 50 Honig, 20 Aepfeläther, 0,5 Cumarin. Auf Holzstöcke gestrichen im Freien aufzu stellen. (Diet)

Emplastrum Pleis rubrum (Diet)
Emplastrum oxycroceum venale.

Rp	Colophoni	540,0
	Cerae flavae	540,0
	Ammoniaci pulv	90,0
	Opbani pulv	90,0
	Ligni santalin pulv	18,0
	Spiritus (90%)	60,0

	Pulvis haemostaticus	
	Blutstillendes Pulver	
Rp	Colophoni pulv	40,0
	Catechu pulv	10,0
	Gummi arabici pulv	10,0

	Pulvis haemostaticus martialis.	
Rp	Carbonis Ligni pulv	3,5
	Gummi arabici pulv	2,5
	Ferri oxydati fusc	5,0
	Colophoni pulv	10,0

	Pulvis haemostaticus Sieboldi.	
Rp	Colophoni pulv	
	Gummi arabici pulv	xx 90,0
	Aluminae pesti plv	15,0

Sparadrapum adhaesivum
Sanctae Annae

Rp	Colophoni	100,0
	Terebinthinae	13,0
	Olei Lauri expressi	10,0
	Elemi	20,0

Man schmilzt und streicht auf Baumwollentoff

Stili resinosa UNNA.

Harzstifte

Rp	Colophoni	90,0
	Cerae flavae	10,0

Man schmilzt und giesst in Stangenformen. Zur Entfernung von Haaren bei Bartflechte und dergl. Die Stängelchen werden bis zum Schmelzen (62–63° C) erhitzt und auf der zu enthaarenden Stelle erkaltet gelassen.

Vernix Colophoni

Kolophonlack Holzlack Sieglack.

Rp	Colophoni americani	400,0
	Spiritus denaturati	600,0
	Olei Terebinthinae	100,0

Desinfektions- und Desodorisationsmittel zum Konservieren von Nutzholz, von KINGSZELL & ZINGLER in London. Eine Lösung von Kolophonum und Kampher in Terpentinöl wird, mit Harzöl gemischt, 24 Stunden bei 60° C einem Luftstrom ausgesetzt, dann durch Zusatz von Kalk oder Sagemehl erhärtet. (HAHN & HOLPERT)

Haarkräuselnde Essenz von MORAS. Kolophonum 0,6, Weingeist 50,0, Parfüm q s

Härtemasse A, von KARL KUPFER, zum Stahlhärten, besteht aus 40 Kolophonum, 50 Fischthran, 10 Fichtenharz. Dazu gehört ein Härtewasser B — eine Lösung von Salpeter und Salmiak —, ein Härtepulver C aus Natronsalpeter, Salmiak, gelb Blutaugensalz und Klauenpulver, und ein Härtewasser D = B in stärkerer Lösung.

Hellpflaster, LORRAIN'S, ist dem Ceratum Resinae Pini ähnlich zusammengesetzt.

Isolir-Masse für elektrische Leitungen. Eine solche bestand aus 40 Kolophonum, 10 Talg, 80 dickem Mineralöfett (B. FISCHER).

Paraplaste nennt man auf Baumwollgewebe gestrichene Pflaster aus Kolophonum, Dammarharz, Kautschuk und Wollfett (RIMDEL).

Pilothrum, ein Enthaarungsmittel, enthält etwa 8 Kolophonum, 40 Elemi, 10 Benzol, 10 gelbes Wachs, 30 Bleipflaster.

Retinol, Oodöl. Durch trockene Destillation des Kolophonums gewonnenes Öl, das sich mit Alkohol und fetten Ölen mischt und als Lösungsmittel für Kampher, Phenol, Phosphor, Saol u. s. w. Verwendung findet. (THOMS)

Stahlverbesserungsmittel von AD. SCHAEFER ist eine Mischung von Kolophonum, Holzkohle, Linnöl und Glycerin.

Wassersinktur von SOLSAIE. 25 Kolophonum, 75 Weingeist.

Condurango.

Cortex Condurango (Austr. Germ. Hely) — **Condurangorinde.** — **Écorce de Condurango.** — Condurango Bark ist die Rinde des zu den Asclepiadaceae — Cynanchoidaeae — Gomolobaeae gehörigen **Gonolobus Condurango Triana**, einer wenig bekannten, in Ecuador heimischen Liane mit grossen, herzförmigen Blättern.

Beschreibung. Die Rinde bildet bis 15 cm lange, rinnen- oder röhrenförmige Stücke, die bis 7 mm dick sind. Sie sind oft etwas verbogen. Ausser mit dünnem, grau braunem Kork, wo derselbe abgesprungen ist, kommt eine hellere, graugelbe Farbe zum Vorschein. Oft zeigt auch die Aussenseite weissliche Flecken. Die Innenseite ist schmutziggelbgrau, ringsstreifig. Bricht man eine Rinde durch, so ragen aus der ebenen Fläche in der äusseren Hälfte vereinzelt Fasern hervor — Auf dem Querschnitt erkennt man mit

der Lupe im äusseren Viertel kleine dunkle Punkte in meist einfacher Reihe, die erwähnten Fasern, ferner in der Mitte eine Zone dunkelgelber Punkte, die innere Hälfte ist fein gestreift. Das Mikroskop zeigt Folgendes: Der Kork besteht aus etwa 15 Lagen zarter Korkzellen, darunter bei dünneren Rinden ein Collenchym mit Einzelkrystallen und Zwillingskrystallen von Kalkoxalat, in der Mittelrinde die erwähnten Bündel stark verdickter, primärer Bastfasern. Weiter nach innen erkennt man die gelben Punkte als Gruppen stark verdickter, poröser Steinzellen, die auch in den Bast vordringen (Fig. 221). Im Bast schmale Baststrahlen und ein- bis zweireihige Markstrahlen. Im Parenchym. Milchsaftschläuche und Drüsen von Kalkoxalat. Auf Längsschnitten sind die Siebröhren sehr deutlich zu sehen. Geschmack schwach bitter und wenig aromatisch, Geruch an Pfeffer erinnernd.

Bestandtheile. 2 Glukoside, die der Rinde mit 95 proc. Alkohol entzogen werden können: α -Condurangin $C_{20}H_{32}O_6$. Schmelzpunkt 60 bis $61^\circ C$, unlöslich in Wasser und Ligroin, löslich in Benzol, wird mit Färdn's Reagens grün. β -Condurangin $C_{18}H_{28}O_7$. Schmelzpunkt $134^\circ C$, löslich in Wasser, reagiert nicht mit Färdn's Reagens. Ferner ein wenig bekannter Körper Conduransterin $C_{30}H_{50}O_8$. Aschengehalt: 12 Proc., in der Asche etwas Mangan.

Sorten: 1) Die officinelle Rinde ist Condurango von Ecuador.

2) C. von Neu-Granada soll von *Macroscopis Trianae* Decaisne (Asclepiadaceae) stammen.

3) C. von Huancabamba oder C. blanco von *Marsdenia Condurango* Reichenbach (Asclepiadaceae) bildet behaarte Stengel von der Dicke eines Taubenfederkiesels.

4) C. von Guayaquil von unbekannter Abstammung bildet holzige Zweige, deren Rinde der officinellen ähnlich gebaut ist.

5) C. von Mexiko in mehreren Sorten, eine stammt von einer *Aristolochia*, eine andere bildet dünne, gespaltene Stengel, die durch Raphidenzellen in der Rinde charakterisirt sind.

6) Als C. kommen auch die Blätter und Stengel der Komposite *Micania Guaco* Humb. vor (vergl. Guaco).

Die dritte Sorte führt den Namen Mataperro, den man auch der echten Droge beilegt.

Wirkung. Die Rinde wurde ursprünglich (1870—1871) als Specificum gegen Magenkrebs empfohlen, ist hiergegen, wie man jetzt annimmt, wirkungslos, vermag aber bei Magenleiden manche Symptome zu mildern und besonders Appetit und Verdauung günstig zu beeinflussen.

Anwendung. Die Rinde wird nur in Form flüssiger Zubereitungen angewendet; man hält sie deshalb als staubfreie Species oder in kleine Würfel geschnitten für Abkochungen und als grobes Pulver zur Extraktbereitung vorrätig. Condurangodekotte dürfen, da das Condurangin sich in heissem Wasser ausscheidet, nur nach völligem Erkalten (!) abgepresst oder durchgeseiht werden.




Fig. 221. Querschnitt durch die Mittelrinde von Cortex Condurango.

Nach CONRADY wird die Rinde am vollständigsten erschöpft, wenn man sie frisch gemahlen mit Wasser von 50°C perkolirt, ein derartiger Auszug 10 g 150 g ist in kürzerer Zeit herzustellen als eine Abkochung

Extractum Condurango (Ergänzb.) 1 Th grob gepulverte Condurangorinde wird 6, dann nochmals 3 Tage mit einer Mischung von je 4 Th Weingeist und 2 Th Wasser ausgezogen, die Pressflüssigkeit zur Trockne eingedampft Ausbeute 10—12 Proc

Extractum Condurango fluidum (Germ.) Condurango-Fluidextrakt 100 Th mittelfein gepulverte Condurangorinde werden mit q s einer Mischung (I) aus 10 Th Weingeist (87 proc), 4 Th Wasser, 1 Th Glycerin beleuchtet, bis die Droge nichts mehr aufnimmt, nach 2—3 Stunden in einem Perkolator mit einer Mischung (II) aus 1 Th Weingeist und 3 Th Wasser übergossen, 48 Stunden bei Seite gestellt und mit Mischung II erschöpft Man sammelt zuerst 85 Th Perkolat, dampft den zweiten Auszug zum dünnen Extrakt ein und fügt demselben soviel Lösung II zu, dass man insgesamt 100 Th Fluidextrakt erhält Man braucht etwa 400 Th Lösungsmittel Trockensubstanz des Extraktes 13—20 Proc

Helv schreibt für Mischung I 10 Th Glycerin, 12 Th Weingeist, 26 Th Wasser vor, lässt 80 Th Perkolat auffangen, die übrigen Auszüge auf 20 Th eindampfen und mischen — sonst wie Germ Trockenrückstand wenigstens 16 Proc

Tinctura Condurango (Ergänzb.) 1 Th fein zerschnittene Condurangorinde, 5 Th verdünnter Weingeist (60 proc) — *Ex tempore* 20 Th Condurango Fluid-Extrakt, 80 Th verdünnter Weingeist

Vinum Condurango Condurangowein Vin de Condurango Germ Aus 1 Th fein zerschnittener Condurangorinde und 10 Th Xereswein durch achtstündiges Ausziehen — Helv 1 Th Condurango Fluidextrakt, 9 Th Marsalawein — Wenn möglich, lässt man Condurangowein vor dem Filtriren einige Wochen absetzen Eine schnelle Klärung erzielt man durch Schütteln mit Milch (3 g auf 1 l) und 24stündiges Absetzen lassen (Auch hier ist, wie bei Vinum Chinae, S 785, ein Zusatz von Gelatine zu empfehlen.)

Decoctum Condurango.

Form mag Berolin.

Rp	Decocti Cort. Condurango	15,0:180,0
	Acidi hydrochlorici (25 proc.)	0,5
	Sirupi simplicis	19,5

Dreimal täglich 1 Esslöffel

Elixir Condurango

Rp	1 Extracti Condurango fluidi	100,0
	2 Vini Malacensis	50,0

1 l m Wasserbade auf 50,0 eindampfen, mit 2 mischen, nach dem Absetzen filtriren

Elixir Condurango peptonatum

Rp	Elixir Condurango	100,0
	Peptoni sicc	2,0

Mixtura Condurango.

Münch. Nosokom.-Vorsch

Rp	Corticis Condurango min conc.	10,0
	Aquae destillatae	260,0

Man macerirt 12 Stunden, dampft auf 150,0 ein, seiht nach völligem Erkalten durch. Adde

	Colaturae	130,0
	Sirupi Aurantii Corticis	30,0

Vinum Condurango aromaticum

Aromatischer Condurangowein.

Rp	1 Corticis Condurango min. conc.	100,0
	2 Vini rubri	1000,0
	3 Tincturae Condurango	90,0
	4. Glycerini	10,0
	5 Tincturae vulnerariae Ph Gall.	100,0

Dem aus 1 und 2 durch Maceration bereiteten Wein fügt man 3—5 hinzu und filtrirt nach dem Absetzen

Vinum Condurango ferratum

Condurango-Eisenwein (BEDALL)

Rp	Ferri citrici ammoniac	1,0
	Vini Condurango	99,0

Vinum Condurango venale

Condurangowein für den Handverkauf nach PROSKAUZE.

Rp	Corticis Condurango conc	75,0
	Corticis Aurantii expulp conc.	
	Corticis Cinnamomi	25 2,5
	Radici Gentianae conc	1,5
	Acidi hydrochlorici (25 proc.)	1,5
	Vini Xerensis	760,0

Man macerirt 8 Tage, presst und fügt hinzu Sirupi simplicia 60,0

Conium.

I. †† Conium (Ergänzb.) Cicutine (Gall) Confin. Cicutin. Rechts-Confin. Rechts- α -Propylpiperidin. Conine. Conéin. $C_8H_{17}N$ Mol. Gew. = 127.

Das Conin ist zwar in allen Theilen des Schierlings, *Conium maculatum* L., vorzugsweise aber in den Früchten enthalten, welche gewöhnlich im unreifen Zustande zur Verarbeitung gelangen.

Darstellung. A. 100 Th gequetschte, unreife Coniumfrüchte werden zunächst mit Wasser zum Quellen gebracht, alsdann mit einer Lösung von 4 Th Natriumcarbonat

in einer hinreichenden Menge Wasser durchfeuchtet und aus einer Destillirblase durch Einleiten von gespanntem Wasserdampf solange destillirt, bis das ablaufende Destillat nicht mehr alkalisch reagirt. Das mit den Wasserdämpfen übergehende rohe Conin scheidet sich zum Theil ölformig ab, zum Theil bleibt es in dem überdestillirten Wasser gelöst. — Die erhaltenen Destillate werden mit Salzsäure versetzt und zur dünnen Sirupkonsistenz abgedampft. Die erkaltete Lauge wird mit 2 Volumtheilen starken Alkohols (von 96 Vol Proc) geschüttelt und vom ausgeschiedenen Ammoniumchlorid abfiltrirt. Von der Lösung des Coninchlorhydrates wird der Alkohol im Wasserbade abdestillirt, eine berechnete Menge Natronlauge zugesetzt und das Conin durch Aether ausgeschüttelt. Die ätherische Lösung des rohen Conins scheidet beim starken Abkühlen oft zolllange Nadeln von Conhydrin aus.

Das nach dem Abdestilliren des Aethers im Wasserbade hinterbliebene Conin wird mit trockenem Kaliumcarbonat entwässert und im Wasserstoffstrome destillirt. Es destilliren etwa 10 Proc von 110–168° C, etwa 80 Proc von 168–169° C, und etwa 20 Proc. von 169–180° C. Die mittlere, bei 168–169° C siedende Fraktion ist reines Conin.


B. Man zieht die gemahlene Frucht im Vakuum Extraktionsapparat mit essigsaurem Wasser aus und verdampft die Auszüge im Vakuum zur Sirupkonsistenz. Der erhaltene Sirup wird mit Magnesiumoxyd übersättigt und mit Aether ausgeschüttelt. Alsdann verfährt man weiter wie unter A angegeben. Dieses Verfahren soll ein reineres Conin liefern.

Eigenschaften. Farblose oder nur schwach gelblich gefärbte, ölige Flüssigkeit von eigenthümlichem, widerlichem Geruche (in verdünntem Zustande maueharnartig riechend), im Wasserstoffstrome bei 167° C (Ergänzb in gewöhnlicher Atmosphäre bei 165 bis 170° C) siedend. Das spec Gewicht ist bei 15° C = 0,850 (Ergänzb = 0,850–0,860). Conin erstarrt bei niedriger Temperatur zu Krystallen, welche bei –2,5° C wieder schmelzen. Es verflüchtigt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur nicht unerheblich, aus der Luft nimmt es, namentlich unter dem gleichzeitigen Einflusse des Lichtes, Sauerstoff auf, wobei es unter Entbindung kleiner Mengen Ammoniak und unter Braunfärbung dickflüssig wird und verharzt. Das aus den Früchten abgeschiedene natürliche Conin lenkt die Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts ab ($\alpha_D = 18,8^\circ$). Es löst sich in etwa 100 Th kaltem Wasser, weniger in heissem Wasser, so dass die bei gewöhnlicher Temperatur gesättigte wässrige Lösung beim Erwärmen sich trübt. In jedem Verhältnisse wird es gelöst von Weingeist, Aether, Aceton, fetten und ätherischen Ölen, weniger leicht von Chloroform und von Schwefelkohlenstoff. Wasserfreies Conin reagirt gegen Lackmus nicht alkalisch, wohl aber ist dies der Fall, wenn das Conin Wasser aufgenommen hat oder in Wasser oder in Alkohol gelöst ist. Das Conin ist im Stande, etwa 25 Proc Wasser aufzunehmen, welches es beim Erwärmen, also z. B. beim Destilliren wieder vollkommen abgiebt.

Reaktionen. Das Conin gehört zu den Alkaloiden, welche arm an charakteristischen Reaktionen sind. Für seine Erkennung sind die nachfolgenden Erscheinungen von Wichtigkeit.

1) In concentrirter Schwefelsäure löst es sich in der Kälte ohne Färbung auf. Chlorwasserstoffgas (!) färbt das Conin zunächst purpurroth, dann tief indigoblau. Beim Verdunsten mit concentrirter Salzsäure hinterbleibt ein krystallinischer, meist bläulich gefärbter Rückstand von Coninchlorhydrat (während Nikotin einen firnissartigen Rückstand giebt. — 2) Die Lösung 1:100 wird weder durch Platinchlorid noch durch Goldchlorid gefällt, weil die entsprechenden Doppelsalze des Conins in Wasser leicht löslich sind. — 3) Dagegen werden Niederschläge erhalten in der durch Schwefelsäure schwach angesäuerten Lösung mit Kaliumwismutjodid (1:4000), Kalium-Mercurijodid (1:800), Phosphomolybdänsäure (1:1000), Gerbsäure (1:100), Jodkalium (1:8000). Die Zahlen geben die Konzentration an, in welcher die Niederschläge durch die auftretende Trübung noch erkennbar sind.

Das Conin ist seiner chemischen Zusammensetzung nach Rechts- α -Propyl-Piperidin. Die Konstitution ist durch die von A. LADENBURG ausgeführte Synthese bewiesen worden. S. w. unten. Das Conin des Handels enthält bisweilen einige



Procente Methyl-Conium, was indessen seine therapeutische Verwendbarkeit nicht beeinträchtigt

Prüfung. 1) In Wasser, welches mit genügenden Mengen Salzsäure angesäuert ist, löse sich das Conium leicht und vollständig auf. Ungelöst bleiben würden nicht basische Beimengungen, z. B. Kohlenwasserstoffe, sowie harzige Zersetzungsprodukte. — 2) Beim Erwärmen trübe sich das Conium nicht, anderenfalls enthält es Wasser, s. oben. — 3) Bei Luftzutritt erhitzt, verbrenne es, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. — 4) Wird die Lösung des Coniums in absolutem Alkohol (1 = 10) mit einer Lösung von Oxalsäure in Weingeist neutralisiert, so trete keine krystallinische Abscheidung (von Ammoniumoxalat) auf.

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig und vor Licht geschützt, in kleinen Gefässen.

Anwendung. Conium gehört zu den stärksten Giften. Unverdünn auf Schleimhäute gebracht, wirkt es hier ätzend, auf der Haut erzeugt es Unempfindlichkeit infolge Lahmung der sensiblen Nervenendigungen. Bei innerem Gebrauche lähmt es zunächst die Endigung der motorischen Nerven, später die Nerven-Centren. — Man giebt es Aeusserlich in Salben und Linimenten (0,05–0,1 10,0 Adeps) als lokales, schmerzstillendes Mittel bei Neuralgien, schmerzhaften Tumoren, innerlich bei Cardialgie (Magenkrampf), Magenkrebs, Neuralgien, Keuchhusten, doch wird hier meist das bromwasserstoffsäure Salz angewendet. Subkutan 0,0005–0,001 g (I) pro dosi.

Höchstgaben pro dosi 0,002, pro die 0,005 g (Ergänzb.) Bei Vergiftung durch Conium sind Brechmittel, Coffein und künstliche Athmung anzuwenden.

Mistura Coniini REIL.			Oleum antiblepharospasticum MAUTHNER.	
Rp	Coniini	gtt. I	Rp	Coniini 0,087 (gtt. II)
	Natrii carbonici	5,0		Olei Amygdalarum dulcium 8,0
	Aquae Menthae piperitae	200,0	Mehrere Male täglich in die Augenspalte einzupipiren (bei Augenliderkrampf der Kinder)	
Dreistündlich einen Esslöffel (bei Magenkrebs)				
Unguentum Coniini MURAWJEW				
	Rp.	Conium	0,5	
		Olei Cocculi	50,0	
M f. unguentum				
Zum Einreiben (bei chronischen Hautleiden)				

Synthetisches Conium. Das Conium ist von LADENBURG durch Reduktion von α -Allyl-Pyridin in alkoholischer Lösung mittels metallischen Natriums dargestellt worden. Die so erhaltene Base glich in allen ihren Eigenschaften dem natürlichen Conium, indessen war sie optisch inaktiv. Es ist alsdann LADENBURG gelungen, dieses inaktive Conium durch Ueberführen in das weinsäure Salz in ein rechts- und linksdrehendes Conium zu spalten, von denen das rechtsdrehende sich als völlig identisch erwies mit dem natürlich vorkommenden Conium. Das synthetische, inaktive Conium ist demnach eine Verbindung gleicher Moleküle r- und l-Conium.

II. †† Coniinum hydrobromicum (Ergänzb.) Bromhydrate de Cicutine (Gall.)
Coniinumhydrobromid. Bromwasserstoffsäures Conium $C_8H_{11}N.HBr$. Mol. Gew. = 208.

Darstellung. Man löst 10 Th. möglichst farbloses, wenn nöthig im Wasserstoffstrome frisch destillirtes Conium in 100 Th. absolutem Aether auf und leitet in die mit Eis abgekühlte Lösung einen Strom wasserfreien Bromwasserstoff. Da das bromwasserstoffsäure Salz des Coniums in Aether unlöslich ist, so scheidet es sich in dem Maasse, als es entsteht, aus der ätherischen Lösung als krystallinisches Pulver ab. Wenn durch Bromwasserstoff eine neue Fällung nicht mehr entsteht, so unterbricht man die Einleitung, sammelt das Salz auf einem Filter, wäscht es mit absolutem Aether nach, lässt diesen an einem warmen Orte verdunsten und krystallisirt das Salz durch freiwillige Verdunstung der kaltgesättigten filtrirten wässrigen Lösung an einem warmen Orte um.

Eigenschaften. Farblose, durchscheinende, glänzende, rhombische Krystalle oder ein weisses, krystallinisches Pulver, welches sich in Wasser und in Weingeist zu farblosen, neutralen Flüssigkeiten löst. Schmelzp. 211° C.

In der wässrigen Lösung des Salzes (1 = 10) ruft Silbernitrat einen gelblich-weißen, Jod-Jodkaliumlösung einen rothbraunen, Gerbsäure einen gelblich-weißen Niederschlag

hervor Natronlauge bewirkt die Abscheidung öliger Tropfen von Conium — Es verbrenne, bei Luftzutritt erhitzt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen

Aufbewahrung, Anwendung Sehr vorsichtig, vor Licht geschützt aufzubewahren Die Anwendung unter den nämlichen Indikationen wie die des Coniins Höchstgaben *pro dosi* 0,005 g, *pro die* 0,015 g [Das Ergänzb giebt die zehnfache Menge dieser Dosen als Höchstgaben an, doch dürfte dies auf Schreib- oder Druckfehlern beruhen]

Rp Conium hydrochloric 0,02 g	Rp Conium hydrobromic 0,1
Sirupi Sacchari 100 0	Aquae distillatae 50 0
Gegen Keuchhusten Dreimal täglich 1 Theelöffel	Zur subkutanen Injektion, 1 cem ist = 0,0012 g Conium
Ein Theelöffel voll ist = 0,001 Conium	

III †† Conium hydrochloricum Conium muriaticum Coniumchlorhydrat Chlorwasserstoffsäures Conium. Salzsäures Conium. $C_8H_{17}N HCl$. Mol. Gew. = 183,5

Wird in gleicher Weise durch Sättigen einer atherischen Coniumlösung mit trockenem Chlorwasserstoffsäure dargestellt wie das Coniumbromhydrat, siehe dieses Oder man neutralisirt Conium genau mit wässriger Salzsäure und lässt diese Lösung im Vakuum verdunsten bez. krystallisiren.

Farblose Krystalle, in Wasser und Alkohol leicht löslich Schmelzp 220° C

Conium.

Gattung der Umbelliferae—Apiodeae—Smyrnieae.

Conium maculatum L. Gefeckter Schierling. Blutschierling. Mäuseschierling. Teufelspeterling Dollkraut Ziegendill. — Cigué. — Hemlock Heimisch in Europa und Asien, eingebürgert im nordöstl. Amerika, Californien, Chile Besonders an Wegen und auf Schnitt Die ganze Pflanze ist kahl Blütenstand eine doppelt zusammengesetzte Dold, Hülle meist 5 blättrig, Hüllchen 8—4 blättrig, beide zurückgeschlagen Stengel bis 2 m hoch, ästig, unten schwach, oben stärker gerillt, bläulich bereift, am Grunde oft (nicht immer) roth gefleckt.

Verwendung finden

L. † Herba Conii (Austr Germ). Conii Folia (Brit) Herba Conii maculati Herba Cicutae. — Schierling (Germ) Schierlingkraut. Fleckschierlingskraut. Giftpetersilie Tollkürbelkraut — Feuille de ciguë officinale. Feuille de grande ciguë (Gall.) — Conium Leaves. Hemlock Leaves.

Beschreibung. Die unteren Blätter von breit-eiförmigem Umriss werden über 20 cm lang Sie sind an einem hohlen Stiel von gleicher Länge befestigt, der am Grunde eine häutige Scheide trägt Sie sind oberseits matt dunkelgrün, unterseits schwach glänzend blaugrün, dreifach gefiedert, jeder Zipfel geht in ein feines farbloses Spitzchen aus. Die Abschnitte erster Ordnung sind 4—8paarig gefiedert, gestielt, die Abschnitte zweiter Ordnung sind 5paarig gefiedert, die dritter Ordnung, wenig regelmässig, aus 4 oder 5 Paaren gebildet.

Die Zipfel letzter Ordnung sind von einem Mittelnerv durchzogen, von dem zarte Nerven 2 oder 3 Ordnung abgehen und kräftig ausgebildete Seitennerven bilden Das Gewebe der Blätter besteht aus den beiden Epidermen mit der Cuticula, von denen die der Unterseite schwach gestreift ist. In den Zellen der Epidermen häufig Sphaerokrystalle. Unter der Oberseite eine Reihe von Palisaden Spaltöffnungen auf beiden Seiten, doch auf der Oberseite nur am Rande (Fig 222), welcher auf der Unterseite keine Spaltöffnungen




Fig 222
Epidermis vom Rande des
Oberseite des Blattes

trägt (Fig 223) — Geschmack widerlich salzig und bitterlich Geruch besonders beim Zerkleinern mit Kalkwasser unangenehm nach Mause-Urin

Bestandtheile. Der wichtigste Bestandtheil ist das Alkaloid Conium $C_8H_{17}N$ Der Gehalt daran ist auch bei der blühenden Pflanze anscheinend sehr schwankend 0,03—0,18 Proc




Fig 223
Epidermis vom Rande der Unter-
seite des Blattes

Der Sitz des Alkaloids ist hauptsächlich in den Epidermen Ferner das weniger giftige Conhydrin $C_8H_{17}NO$ Pseudoconhydrin $C_8H_{17}NO$ Methylconium $C_8H_{18}(CH_3)N$ — Der Wassergehalt der frischen Droge beträgt etwa 80 Proc, der der trocknen 7—12 Proc Der Aschengehalt 12 bis 18 Proc, die Asche enthält 30 Proc Kaliumkarbonat. — Die Droge liefert 30 Proc Extrakt

Nachweis. Für die Droge sind im Gegensatz zu anderen, ähnlichen Umbelliferen charakteristisch 1) Die Kahlheit der ganzen Pflanze 2) Der blauliche Reif, besonders an den Stengeltheilen 3) Die stumpfgrüne Oberseite der Blätter 4) Die Stachelspitzen der Blätter 5) Hülle und Hüllchen am Blütenstand 6) Das Verhalten der Spaltöffnungen (Fig 222 223) 7) Geruch

Als Verwechslungen resp. Verfälschungen kommen vor Chaerophyllum bulbosum L, Chaerophyllum temulum L, Chaerophyllum hirsutum L, Anthriscus silvestris Hoffmann, Anthriscus vulgaris Persoon, Aethusa Cynapium L, Cicuta virosa L

Einsammlung Aufbewahrung. Im Juni und Juli sammelt man das ganze, blühende Kraut, entfernt dickere Stengel und Aeste und verwendet es entweder sofort zur Extraktbereitung, oder man trocknet bei gelinder Wärme (nicht über $25^{\circ}C$), zuletzt über Aetzkalk und bewahrt in Blech- oder Glasgefäßen an einem trocknen Orte vorsichtig, vor Licht geschützt und nicht über 1 Jahr (Anstr.) auf. Bei längerer Aufbewahrung soll der Coniumgehalt schwinden $5\frac{1}{2}$ —6 Th frisches Kraut geben 1 Th trockenes Brit lässt nur das frische, bei Beginn der Fruchtbildung gesammelte Kraut verwenden.

Anwendung Innerlich selten bei Asthma, Keuchhusten, Neuralgien in Pulver oder Pillen zu 0,05—0,3 Aeusserlich als schmerzstillendes Mittel in Aufgüssen und Abkochungen zu Injektionen, Gurgelwässern, Klystieren — Grösste Einzelgabe Austr 0,3, Germ 0,5 Grösste Tagesgabe Austr 2,0, Germ 2,0 In der Thierheilkunde giebt man Pferden 30—90 g, Schafen bis 45 g, Hunden 1—4 g

Schierlingkraut und seine Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen Zum innerlichen Gebrauch dürfen sie nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden




Fig 224. Querschnitt durch Fructus Conii.

II † Fructus Conii (Helv) Conii Fructus (Brit). Conium (U-St) Semen Cicutae — Schierlingfrucht. Schierlingsamen. — Fruit de ciguë officinale ou de grande ciguë. — Hemlock. Conium Fruit.

Beschreibung. Die Frucht ist ungefähr 8 mm lang, von der Seite zusammengedrückt, von den beiden Griffeln gekrönt. Jedes Theilfrüchtchen hat 5 starke Längsrippen, die gekerbt sind (in der getrockneten Frucht können die Kerbungen sehr undeutlich sein) In der Fruchtschale fehlen die grossen, für die Umbelliferen sonst charakteristischen schützenden Sekretbehälter Eine aus im Querschnitt fast quadratischen Zellen bestehende, auffallende Schicht, ferner die sich nach innen daran anschliessenden Zelllagen, sowie das Parenchym ausserhalb der Gefässbündel in den Rippen enthält Conin Das

Endosperm ist im Querschnitt tief eingebuchtet, daher rundlich herzförmig, es enthält fettes Öl und Aleuron. Die Aleuronkörner führen Drüsen, seltener Einzelkrystalle von Kalkoxalat, noch seltener Krystalloide, dagegen häufig Globoid. Geruch und Geschmack wie beim Kraut.

Bestandtheile. Die unreifen Früchte enthalten von allen Theilen der Pflanze am meisten Alkaloid, nämlich in der trocknen Droge bis 3,36 Proc. Conium (als salzsaures C berechnet), mit dem Reifen nimmt der Alkaloidgehalt ab, für reife Früchte werden angegeben 1,32 und 1,44 Proc. Conium (ebenfalls als salzsaures C berechnet). Ausser den übrigen beim Kraut genannten Alkaloiden enthalten die Früchte noch ein 4. Alkaloid Pseudoconhydrin $C_8H_{17}NO$ — Frisch enthalten die Früchte 68 Proc. Wasser.

Einsammlung. Man sammelt die ausgewachsenen, aber noch unreifen Früchte, trocknet sie bei gelinder Wärme, zuletzt über Aetzkalk, und bewahrt sie vorsichtig nicht über ein Jahr auf.

Anwendung wie bei Heilb. Conu. Höchstgaben *pro dosi* 0,2 g, *pro die* 1,0 g (Helv.)

† **Alcoolatura Conii**, Alcoolature de feuille de ciguë (Gall.) Aus frischen Schierlingblättern wie Alcoolature de belladone (S. 470).

† **Conserva Conii**. Schierlingkonserve. 100 Th. frische Schierlingblätter stösst man mit 50 Th. Glycerin zu einem zarten Brei, treibt durch ein Sieb und mischt mit 360 Th. Zuckerpulver.

Emplastrum Conii. Empl. Cicutae. Empl. cum Conio maculato. Schierlingpflaster. Emplâtre de ciguë. Ergänzb. 4 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Terpentin, 1 Th. Olivenöl schmilzt man und fügt 2 Th. fein gepulvertes Schierlingkraut hinzu — Helv. Mit Schierling-Fludextrakt wie Empl. Belladonnae Helv. (S. 471) — Austr. 125 Th. Schweinefett, 250 Th. gelbes Wachs, 25 Th. venet. Terpentin schmilzt man und vermischt mit 100 Th. gepulvertem Schierlingkraut — Gall. 940 Th. Galipot, 440 Th. weisses Pech, 640 Th. gelbes Wachs, 180 Th. Schierlingöl, 2000 Th. frische, gequetschte Schierlingblätter erhitzt man, bis alle Feuchtigkeit verdampft ist, bringt heiss unter die Presse, schmilzt wieder, reinigt die Masse durch Absetzenlassen und verarbeitet sie mit 500 Th. Ammoniakgummi.

† **Extractum Conii**. Schierlingextrakt. Ergänzb. 20 Th. frisches, blühendes Schierlingkraut werden mit 1 Th. Wasser zerstoßen, ausgepresst, dasselbe mit 8 Th. Wasser wiederholt. Die Pressflüssigkeiten erwärmt man auf 80° C, seigt durch, dampft auf 2 Th. ein, mischt mit 2 Th. Weingeist, seigt nach 24 Stunden durch. Den Rückstand behandelt man unter Erwärmen in geschlossenem Gefässe mit 1 Th. verdünntem Weingeist, giesst klar ab, mischt und filtrirt die Auszüge und dampft zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 3,5–4 Proc. Vorsichtig aufzubewahren.

Helv. **Extractum Conii duplex siccum**¹⁾ Trockenes Schierlingextrakt. Extr. de ciguë sec. 200 Th. Schierlingfrucht (IV) werden mit einer Mischung von 20 Th. verdünnter Salzsäure, 20 Th. Wasser, 40 Th. Weingeist (94proc.) befeuchtet, im Perkulator mit q. s. eines Gemisches aus Weingeist und Wasser ää erschöpft. Man fängt zuerst 180 Th. auf, bereitet l. a. 200 Th. Fludextrakt und aus diesem mit q. s. Reispulver 100 Th. trockenes Extrakt.

Austr. **Extractum Conii herbae**. Schierlingkraut-Extrakt. Aus gepulvertem Schierlingkraut wie Extr. Aconiti radices Austr. (S. 155). Ausbeute etwa 20 Proc.

U-St. **Extract of Conium**. Aus 1000 g gepulverten Schierlingfrüchten (No. 40) und einer Mischung von 20 ccm Essigsäure (36proc.) und 980 ccm verdünntem Weingeist (41proc.) im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt, unter Nachfüllen von verdünntem Weingeist, zuerst 900 ccm Perkolat, dann noch etwa 2100 ccm²⁾, verdampft letztere bei höchstens 50° C auf 100 ccm, worauf das Ganze zur Pillenkonsistenz.

Gall. **1 Extractum Conii maculati**. Extrait de ciguë avec le suc. Aus frischem, blühendem Schierlingkraut durch Pressen, Erhitzen, Durchsiehen und Eindampfen des nochmals geklärten Saftes zu einem weichen Extrakt — 2 **Extractum de semine**

¹⁾ Zur Vermeidung von verhängnissvollen Irrthümern sei darauf aufmerksam gemacht, dass man im Geltungsbereich der Ph. Germ. und Austr. unter trockenen, narkotischen Extrakten Präparate versteht, die von denen der Ph. Helv. durchaus verschieden sind. **Extractum Conii siccum** ist in Deutschland und Oesterreich die Bezeichnung für ein mit Süßholzpulver bezw. mit Milchsüßholzpulver eingetrocknetes Extrakt, von welchem 2 Th. 1 Th. **Extractum Conii** entsprechen. Die Standgefässe tragen daher die Aufschrift „sumatur duplum“. Die Höchstgabe für dieses **Extract Conii siccum** wäre 0,4 pro dosi, 1,2 pro die.

²⁾ Vergl. Fussnote S. 925 und „Reaktionen“ S. 943.

Conii Extract de oigü (Semence) wird wie Extr de radice Belladonnae Gall (S 469) bereitet

† **Extractum Conii fluidum** Schierling-Fluidextrakt **Extrait fluide de oigü** Fluid Extract of Conium Helv 100 Th Schierlingfrucht (IV) werden mit einer Mischung von 10 Th verdünnter Salzsäure, 10 Th Glycerin, 20 Th Weingeist befeuchtet, im Verdrängungswege mit q s Wasser und Weingeist ää erschöpft. Man fängt zuerst 90 Th auf, die übrigen Auszüge dampft man zum dünnen Extrakt ein, löst in 40 Th Wasser, filtrirt, verdunstet auf 10 Th, so dass man 1 a 100 Th Fluidextrakt erhält — U-St Aus 1000 g Schierlingfrucht (No 40) und einer Mischung von 20 ccm Essigsäure (36 proc) und 980 ccm verdünntem Weingeist (41 proc) im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm und erschöpft durch Nachgiessen von verdünntem Weingeist. Die ersten 900 ccm stellt man bei Seite und bereitet 1 a 1000 ccm Fluidextrakt — Klar, hellbraun, giebt mit NaHO erwärmt Coniumgeruch, 12 Tr in 10 ccm Wasser werden durch 1 ccm Mayer'scher Lösung sofort bis zur Undurchsichtigkeit getrübt. Vorsicht! aufzubewahren

	Höchste Einzelgabe	Höchste Tagesgabe
Extractum Conii	Austr Ergb 0,2	0,6
Extractum Conii duplex ¹⁾	Helv 0,05	0,25
Extractum Conii fluidum	Helv 0,1	0,5

Aeusserlich zu Augenwässern (2—4 Proc), Augensalben (10—20 Proc), Verbandssalben

† **Pulpa e folio Conii maculati.** Pulpe de oigü (Gall) Frische Schierlingblätter stösst man im steinernen Mörser und treibt durch ein Haarsieb

† **Succus Conii Juice of Conium** (Brit.) wird wie Succus Belladonnae Brit (S 470) dargestellt. Gabe 3,5—7,0 ccm

† **Tinctura Conii.** Schierlingtinktur **Teinture ou Alcoolé de oigü** Tincture of Conium Brit Aus 200 g frisch gepulverter Schierlingfrucht (No 40) und Weingeist (70 proc) bereitet man im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur. Einzelgabe 1,75—3,5 ccm — Gall Aus 100 g grob gepulverten Schierlingblättern und 500 g Weingeist (60 proc) durch 10tägige Maceration — **Dietrich** Aus 100 Th frischem, zerquetschtem Schierlingkraut und 120 Th Weingeist (90 proc) durch Maceration **Ex tempore** 2,0 Schierlingextrakt, 98,0 verd Weingeist. Aufbewahrung vorsichtig und vor Licht geschützt. Gabe 10—20—30 Tropfen

† **Tinctura Conii aetherea** Teinture éthérée ou Éthérolé de oigü (Gall) Wie Tinct Belladonnae aetherea Gall (S 472) zu bereiten

Unguentum Conil. Schierlingsalbe **Pommade de oigü** Conium Ointment Ergänzb 1 Th Schierlingextrakt, 9 Th Wachssalbe. Zur Abgabe frisch zu bereiten — Helv 2 Th Schierling-Fluidextrakt, 8 Th benzinirtes Schweinefett — Brit 88 ccm Succus Conii Brit dampft man bei höchstens 60° C auf 11 ccm ein und vermischt mit 83 g Wollfett — **Dietrich** 10 Th Schierlingextrakt, in 5 Th Glycerin gelöst, vermischt man mit 85 Th Wachssalbe

Cataplasma Conil	
Rp. Herbae Conil	25,0
Piscentae Lini seminis	75,0
Emplastrum Conil ammoniacatum	
Empl. Gicutae cum Ammoniac	
Rp. 1. Ammoniaci via hum. dep	20,0
2. Aceti Scillae	20,0
3. Spiritus	20,0
4. Emplastri Conil	75,0
Man erhitzt 1—3 im Wasserbade bis zum Gewicht von 25,0 und mischt dann mit 4 Trocken aufzubewahren.	
Emplastrum cum extracto Conil maculati.	
Emplâtre d'extrait de oigü (Gall.)	
Rp. Extracti de semine Conil	90,0
Elemi depurati	10,0
Emplastri Lithargyri comp (Gall.)	20,0
Emplastrum de tribus (Buxow)	
Formul. Regionontan.	
Rp. Emplastri Conil	
Emplastri Hydrargyri	
Emplastri adhaesivi aa.	
Emplastrum de Vigo sine Mercurio.	
Rp. Emplastri Conil	20,0
Empl. Lithargyri comp	65,0
Cerae flavae	5,0
Radice Hellebori vin. pulv.	

Olibani pulv	
Myrrhae "	
Sandaracae	aa 2,25
Camphorae	0,8
Styracis liquidi	1,0
† Extractum Conil solidum	
Schierling Dauerextrakt (Diet.)	
Wie Extr Uvae Ursi solidum (S 363) zu bereiten.	
Glyceritum Conil	
Glyceritum cum extracto Conil Glyceré d'extrait de oigü (Gall.)	
Rp. Extracti Conil	10,0
Glyceriti Amyli	90,0
Injectio vaginalis WALDENBURG	
Rp. Infusi Herbae Conil	10 250,0
Tincturae Opil simplicis	5,0
Bei schmerzhaften Uterusleiden.	
Lanolinamentum Conil	
Schierling-Lanolin salbe (Diet.)	
Wie Lanoliment Belladonnae (S 471)	
Lipimentum Conil GUTHRIERMOND	
Balsamum Conil, Baume cicuté, Baume de Conifine GUTHRIERMOND	
Rp. Tincturae Conil aether GARNAD	10,0
Adipis suilli	20,0
Man erhitzt, bis der Aether verdunstet ist. Bei Krebsgeschwülsten	

¹⁾ Siehe Note 1 auf voriger Seite

Liquor Conii ad injectiones GUILLIERMOND
Liquor d'injection de Coniine GUIL-
LIERMOND

Rp Tincturae Conii fructus 100,0
 Aquae Calcariae 800,0

Mixtura antileterica QUARIN

Rp Extracti Conii 1,0
 Extracti Taraxaci 20,0
 Liquoris Kali acetici 45,0
 Aquae Foeniculi 200,0

Sirupi Sennae cum Manna 50,0
 Viarnal täglich 2 Esslöffel

Oleum Conii maculati (Gall).

Huile de ciguë.

Wie Oleum Belladonnae (S. 472) zu bereiten.

Pilulae cicutatae mitiores GUILLIERMOND

Pilulae Conii I Pilules cicutées I de
GUILLIERMOND

Rp Fructus Conii recent pulv 2,0
 Gummi arabici
 Sacchari 33 4,0

Man formt 200 Pillen und überzieht dieselben mit
 Zucker Täglich 2 Stück steigend bis 20 Stück.

Pilulae cicutatae fortiores GUILLIERMOND

Pilulae Conii II Pilules cicutées II de
GUILLIERMOND

Rp Fructus Conii recent pulv 5,0
 Gummi arabici
 Sacchari 33 3,0

Man formt 100 Pillen und überzieht mit Zucker

Pilulae Conii compositae

Rp Extracti Conii 2,5
 Radicis Ipecacuanhae 0,5
 Radicis Liquiritiae 1,0
 Radicis Althaeae q s

Man formt 50 Pillen.

Pilulae Conii VESPAUV

Rp Fructus Conii 2,0
 Extracti Lactucae (Thrace) 8,0
 Succo Liquiritiae q s

Man formt 50 Pillen Bei Krebsleiden täglich 2,
 steigend bis 8 Pillen

Sapo Conii BÉRAL.

Rp Extracti Conii 50

Saponis oleacei pulver 10,0

Auf Leder oder Leinwand zu streichen.

Sirupus Conii

Rp Extracti Conii 0,2
 Sirupi simplicis 100,0

Sirupus Conii fructus

Sirup de Coniine GUILLIERMOND

Rp Tincturae Conii fructus 10,0
 Sirupi simplicis 200,0

Species soplentes Glutici

Rp Herbae Conii
 Herbae Hyoscyami aa 20,0
 Placentae Lini seminis 100,0

Zum Umschlag

Tinctura Conii acida

Rp Herbae Conii mac conc 100,0
 Spiritus diluti 1000,0
 Acidi sulfurici diluti 5,0

Tinctura Conii aetherea

Ether cicuté GÉRARD
 Rp 1 Fructus Conii pulv 100,0
 2 Kali hydnici 4,0
 3 Spiritus 250
 4 Aethers q s

Man befeuchtet 1 mit der Lösung von 2 in 3,
 lässt den Weingeist verdunsten und sammelt durch
 Ausziehen mit 4 im Verdrängungswege = 100,0

Unguentum resolyens LANGLEBERT

Rp Kali iodati 1,0
 Extracti Conii 8,0
 Adipis suilli 20,0

Conserva.

Conserva. Konserve ist eine heute ziemlich in Vergessenheit gerathene Arznei-
 form von der Konsistenz eines derben Breies oder einer Latwerge, in welcher Zucker das
 Vehikel ist. Man nahm als Arzneistoff hierzu gewöhnlich frisches saftiges Vegetabil, ver-
 wandelte dieses in einen zarten Brei und mischte es mit soviel Zuckerpulver, dass ein
 derber Brei entstand. Man glaubte, dass eine solche Zubereitung sich lange Zeit, mindestens
 ein Jahr, konserviren lasse. Dass dies in sehr vielen Fällen nicht der Fall war, beobachtete
 man bald, und man liess diese Arzneiform fallen. Seitdem man im Besitz des Glycerins
 ist, lassen sich in der That jahrelang haltbare Konserven darstellen. Eine allgemeine
 Formel ist 100 Th des frischen Vegetabils durch Zerstossen mit einem hölzernen Pistill
 im steinernen Möser in einen zarten Brei zu verwandeln, diesen mit 50 Th. reinem Glycerin
 zu mischen, durch ein Sieb zu schlagen und dann mit 360 Th. gepulvertem ausgetrocknetem
 Zucker in die derbe Breiform überzuführen. Wäre die Masse zu weich, so genügt dann
 ein Zusatz von 1—5 Th Traganth zur Erlangung der gewünschten Konsistenz. Die Kon-
 serve betrage 500 Theile.

Man bewahrt die Konserven in geschlossenen Porcellanbüchsen.

Conservatio.

Unter „Konserven“ im engeren Sinne versteht man Nahrungsmittel, welche durch eine besondere Zubereitung in einen solchen Zustand versetzt worden sind, dass sie sich für eine längere Zeit aufbewahren lassen, ohne in Verderben überzugehen — Unter „Konservierungsmitteln“ im engeren Sinne versteht man demnach die Hilfsmittel, welche dazu dienen, Nahrungsmittel in einen für längere Aufbewahrung geeigneten Zustand zu versetzen. Unter Konservierungsmitteln im weiteren Sinne versteht man allerdings diejenigen Hilfsmittel, welche dazu dienen, auch andere Objekte aus dem Pflanzen- und Thierreiche (nicht blos Nahrungsmittel) aufbewahrungsfähig zu machen, z. B. Pflanzen und Thiere zu Lehrzwecken, menschliche Leichname u. s. w.

In den Nahrungsmitteln sind insbesondere drei Nahrungselemente vorhanden: Eiweiss und die ihm nahestehenden Substanzen, Kohlehydrate und Fette. Diese Nahrungselemente können unter günstigen Bedingungen verschiedenen Umwandlungen unterliegen.

Die Eiweissstoffe gerathen ziemlich rasch in Faulniss. Es ist festgestellt, dass die Faulniss der Eiweissstoffe bedingt wird durch die Lebensthätigkeit von Mikroorganismen (Fäulnisbakterien). Faulniss kann verhindert oder aufgehoben oder zum Stillstand gebracht werden, wenn man den Zutritt der Mikroorganismen verhindert, oder vorhandene Fäulniserreger tödtet oder in einen Ruhezustand versetzt, in welchem ihr Stoffwechsel = 0 ist. Begünstigt wird die Thätigkeit der Fäulniserreger durch eine geeignete Temperatur und durch einen gewissen Wassergehalt der faulnissfähigen Substanz. Zu niedrige und zu hohe Temperatur beeinflussen die Thätigkeit der Fäulniserreger in einem für diese ungünstigen Sinne. Ebenso wird Faulniss verhindert, wenn die faulnissfähige Substanz nicht so viel Wasser enthält, dass die Fäulniserreger ihren Wasserbedarf leicht decken können.

Die Kohlehydrate unterliegen, insoweit sie gährungsfähige Zuckerarten oder solche Zuckerarten, welche leicht in gährungsfähige übergehen können, darstellen, ausserordentlich leicht der Gährung, indem die überall weit verbreiteten Keime von Gährungserregern (Hefe, Milchsäurebakterien etc.) in deren Lösungen hineingerathen und in ihnen den Gährung genannten Vorgang hervorrufen. Da auch die Gährung ein durch Mikroorganismen hervorgerufener Process ist, so kann ihm durch die nämlichen Mittel wie der Fäulniss begegnet werden, nämlich durch Abhaltung und Abtödtung der Gährungserreger, oder indem man diese in einen Ruhezustand versetzt. Auch wird der Gährungsvorgang verhindert durch zu hohe oder zu niedrige Temperatur, endlich dadurch, dass die zu vergärende Substanz nicht hinreichend wasserhaltig ist.

Die Fette unterliegen weder der Fäulniss noch der Gährung, dagegen werden sie ranzig, d. h. sie nehmen einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch und Geschmack an. Nachweislich ist der Vorgang des Ranzigwerdens verknüpft mit dem Auftreten von freien Fettsäuren, in manchen Fällen auch mit der Bildung von Estern. Indessen völlig aufgeklärt ist der Vorgang des Ranzigwerdens zur Zeit noch nicht. Man weiss noch nicht mit voller Bestimmtheit, ob Licht oder Luft, oder Bakterienthätigkeit, und zwar jeder dieser Faktoren für sich allein oder ob vielleicht alle diese Faktoren zusammen eine Rolle beim Ranzigwerden der Fette spielen. Die praktischen Erfahrungen haben indessen ergeben, dass das Ranzigwerden der Fette begünstigt wird: 1) Durch einen Feuchtigkeitsgehalt. 2) Durch eine gewisse mittlere Temperatur. 3) Durch Zutritt von Luft. 4) Durch Zutritt von Licht. Und mancherlei Beobachtungen weisen darauf hin, dass unter Umständen doch auch Mikroorganismen thätig sind, wie denn überhaupt unter dem Ranzigwerden heute noch verschiedene Vorgänge zusammengefasst werden, welche verschiedene Ursachen und nur das gemeinsam haben mögen, dass die Fette in ihrem Verlaufe unangenehme Eigenschaften annehmen.

Nach dem Vorausgeschickten werden sich die verschiedenen Konservungsverfahren in ihrem inneren Mechanismus leicht verstehen lassen.

1 Erhöhung der Temperatur. Genügend hohe Temperaturen tödten jedes Lebewesen, also auch die Mikroorganismen. Da aber nicht alle Nahrungsmittel der erforderlichen Temperatur von $100-110^{\circ}\text{C}$ unterworfen werden können, ohne ihren Geschmack zu ändern, so ist für jedes Nahrungsmittel das für es zweckmässigste Verfahren auszuwählen.

Das Pasteurisiren Wird besonders zur Konservirung von Milch, Bier und Wein angewendet. Es besteht darin, dass man diese Flüssigkeiten in geschlossenen Gefässen 15 bis 30 Minuten auf $60-70^{\circ}\text{C}$ erhitzt und dann rasch abkühlt. Hierdurch werden die Hefen und sehr viele Bakterien abgetödtet. Nicht getödtet werden dagegen die Dauerformen (Sporen) der Bakterien. Das Pasteurisiren hat sich bei Wein und Bier bewährt, eine absolute Sicherheit gegen die Infektion durch Milch bietet es dagegen nicht.

Appert's Verfahren Schon seit 1804 angewendet. Die nahezu fertig gekochten Nahrungsmittel werden in Blechdosen gefüllt und diese bis auf eine kleine Öffnung zugellothet. Die Öffnung wird nun mit dem betreffenden Saft gefüllt, zugellothet, und nun werden die Büchsen etwa 1 Stunde in Wasser oder Salzlösungen, von denen sie ganz bedeckt sein müssen, erhitzt. Besonders angewendet zur Konservirung von Fleischspeisen (Corned Beef, Zunge), aber auch von eingedickter Milch, Gemüsen und Früchten.

Sterilisation Hierunter ist im Grunde genommen das Appert'sche Verfahren zu verstehen, meist wird aber als Wärmequelle „strömender Wasserdampf“ angewendet. Durch genügend lange Sterilisation im strömenden Wasserdampf werden alle Mikroorganismen getödtet, dagegen können die Dauerformen (Sporen) entwicklungsfähig bleiben.

Diskontinuirliche Sterilisation Diese wird namentlich für Flüssigkeiten angewendet, bei welchen die längere Einwirkung strömenden Wasserdampfes nicht möglich ist. Sie besteht darin, dass an mehreren aufeinander folgenden Tagen die betreffende Flüssigkeit auf $70-80^{\circ}\text{C}$ erhitzt wird. Bei dieser Temperatur gehen wohl die Mikroorganismen zu Grunde, nicht aber deren Dauerformen (Sporen), die zu vegetativen Zellen ausgekeimten Sporen werden durch die nächste Sterilisation getödtet. Wird dieses Verfahren genügend lange fortgesetzt, so wird schliesslich völlige Keimfreiheit erzielt. Dieses Verfahren dient nur selten zur Konservirung von Nahrungsmitteln, dagegen ist es für wissenschaftlich-bakteriologische Zwecke im Gebrauch.

Hierzu würde auch zu rechnen sein das Konserviren der Oelsardinen durch Einlegen in heisses Oel und das Konserviren von gebratenem Geflügel (Wild) durch Einlegen in heisses Fett.

2 Entziehung von Wasser Befreit man eine faulnisfähige Substanz von ihrem Wassergehalt ganz oder doch bis zu einem gewissen Grade, so kann sie der Fäulnis lange widerstehen. Hierauf beruht die Herstellung und die Verwendung des Flaschpulvers, des trockenen Erwesens und Peptons, des Leimes. Getrocknete Gemüse, getrocknetes Obst gerathen, wenn die Trocknung hinreichend ist, weder in Fäulnis noch in Gährung. Auch das Trocknen der Arzneikräuter ist als Konservirungs-Methode aufzufassen. Es ist nicht immer nothwendig, den zu konservirenden Substanzen alles Wasser zu entziehen, es genügt, das Wasser soweit zu entfernen, dass die betreffende Substanz aufhört ein geeigneter Nährboden für die Fäulnis- und Gährungserreger zu sein. Aus diesem Grunde ist z. B. kondensirte Milch mit und ohne Zuckerzusatz haltbar, wenn sie bis zu einer gewissen Konsistenz eingedickt ist. — Aus dem gleichen Grunde bleiben genügend concentrirte Sirupe von Gährung verschont, während dünne Sirupe ziemlich leicht in Gährung gerathen. — Häufig genügt schon eine nur oberflächliche Austrocknung wasserreicher Substanzen, um sie für längere Zeit zu konserviren, hierher gehört z. B. die oberflächliche Austrocknung des Fleisches und der Wurst durch Rauchherang, obgleich diese ausserdem auch noch unter No 5 fallen. Bisweilen geht dem Trocknungsprocess auch noch eine Behandlung mit Salz voraus. Stockfisch ist z. B. getrockneter Kahlau (*Gadus Morhua*). Wird der Kahlau zunächst gesalzen und alsdann erst getrocknet, so heisst das Produkt „Labberdan“.

Die Konservirung durch Austrocknung ist um so erfolgreicher, je rascher das Austrocknen vor sich geht. Deshalb werden grössere Objekte, z. B. Fleisch, in kleinere Stücke geschnitten und dann ausgetrocknet. Auf Entziehung von Wasser ist ebenfalls zurückzuführen die Konservirung durch Zusatz grosser Mengen Kochsalz oder Zucker, ferner das Einlegen in Alkohol und Glycerin. Diese Stoffe nehmen das Wasser der Gewebe auf und erzeugen damit Lösungen, aus welchen die Mikroorganismen Wasser nicht aufnehmen können. Vielmehr entziehen diese Stoffe den Mikroorganismen das Wasser und machen damit ihre Entwicklung unmöglich.

3 Abschluss der Luft Da die meisten hier in Frage kommenden Mikroorganismen Sauerstoff für ihre Lebenshängigkeit bedürfen, so kann in vielen Fällen Konservirung auch durch Abschluss der Luft erreicht werden. Man konservirt z. B. Fleisch und ähnliche Substanzen durch Einlegen in Fett, durch Ueberziehen mit Harz, Paraffin. Man legt Sardinen in Oel ein. Eier werden in Kalkwasser eingelegt, damit der ausfallende kohlensaure Kalk die Poren der Eierschale verstopfe und den Zutritt von Luft verhindere. — Ein solcher Ueberzug bietet natürlich, solange er völlig intakt ist, auch einen Schutz gegen

das Eindringen von Mikroorganismen. Der zarte Reif auf unseren Obstfrüchten (Kirschen, Pflaumen) besteht aus einer zarten Wachsschicht, deren Aufgabe es ist, das Eindringen von Mikroorganismen zu verhindern.

Man hat auch versucht, Konservierung dadurch zu ermöglichen, dass man die Objekte in eine Gasart brachte, welche das Wachstum der Mikroorganismen verhindert. Versuche liegen vor über die Anwendung der Kohlensäure, doch sind dieselben in die Praxis noch nicht übertragen worden.

4 Niedrige Temperatur. Die Entwicklung der Mikroorganismen ist an ein gewisses Temperatur-Optimum gebunden, welches für die verschiedenen Individuen verschieden ist. Bringt man die zu konservierenden Substanzen in Temperaturen, welche erheblich (!) unter diesem Optimum liegen, so können Fäulnis und Gährung lange Zeit hinausgeschoben werden.

Fäulnis und Gährung werden unterdrückt oder doch verzögert. Hierauf beruht die Benutzung der Keller und der Eiskeller bez. Einschränkungen. Indessen ist zu beachten, dass einerseits durch niedrige Temperatur (Kälte) die Mikroorganismen zwar in ihrer Entwicklung gehemmt, aber nicht getötet werden, und dass Kälte insbesondere gegenüber den Dauerformen (Sporen) ziemlich ohne Einfluss ist. Andererseits vertragen zahlreiche Nahrungsmittel eine intensive Kälte nicht. So ist es z. B. für die Kartoffeln bekannt, dass sie durch das Einfrieren einen süßsen Geschmack annehmen, weil die Stärkekörner zerplatzen und theilweise in Zucker übergeführt werden. Fleisch im gefrorenen Zustande ist zwar vor Fäulnis geschützt, aber es fault — einmal aufgethaut — um so rascher. Auch übt in vielen Fällen intensive Kälte einen schädigenden Einfluss auf die betreffenden Nahrungsmittel aus. Zum Zwecke der Konservierung wendet man daher nur mässige Kälte an. Die Temperatur unserer Keller beträgt etwa $8-10^{\circ}\text{C}$ und erweist sich als hinreichend, um unsere Nahrungsmittel eine gewisse, kurze Zeit zu konservieren. Für Fleisch hat sich eine Temperatur von etwa $+2^{\circ}\text{C}$ (in den Kältehäusern der Schlachthöfe) als zweckmässig erwiesen. Ähnliche Temperaturen werden eingehalten in den Eiszügen der Eisenbahnen und in den Eisschuppen.

5 Chemikalien. Eine Anzahl von Chemikalien ist im Stande, Mikroorganismen zu tödten oder doch in ihrer Entwicklung zu hemmen. Zum Theil sind diese Chemikalien Gifte, d. h. sie üben eine bedrohliche oder doch gesundheitsschädliche Wirkung auch auf den menschlichen Organismus aus. Solche Chemikalien, wie z. B. Quecksilberchlorid, sind natürlich für die Konservierung von Nahrungsmitteln ausgeschlossen. Einige Chemikalien sind nun im Stande, Mikroorganismen abzutödten oder in ihrer Entwicklung zu hemmen in Mengen, welche auf den menschlichen Organismus noch nicht in wahrnehmbarer Weise schädigend einwirken. Solche Chemikalien werden als „Konservierungsmittel“ *κατ' ἐξοχήν* bezeichnet. Zu diesen gehören:

Kochsalz. Dasselbe wird in grossen Mengen zum Konserviren von Fleisch und Fleischwaren (Pökeln), auch zum Konserviren von Pflanzentheilen benutzt. In hinreichender Menge angewendet verhindert es die Fäulnis, während es andere bakterielle Prozesse nicht stört. Die Bereitung der Salzcurken und des Sauerkrautes z. B. beruht darauf, dass durch genügenden Zusatz von Kochsalz wohl die Fäulniserreger getödtet werden, während die Thätigkeit der Erreger der Milchsäuregährung wohl verzögert aber nicht ganz unterdrückt wird. — Der Zusatz von Salpeter beim Pökeln des Fleisches hat nur den Zweck, den Fleischfarbstoff aufzuhehlen, also dem Fleische eine schöne rothe Farbe zu geben, für die Konservierung ist dieser Zusatz weniger von Belang.

Fluorwasserstoff und Fluoride. Das Fluorwasserstoffsäure bez. das Fluornatrium wird in der Gährungstechnik angewendet, um falsche Gährungen zu verhindern, also z. B. um den Eintritt von Fäulnis und Milchsäuregährung bei der alkoholischen Gährung zu vermeiden.

Holzessig wird wegen seines Gehaltes an Phenolen namentlich zum Konserviren des Fleisches (Schnellräucherung) benutzt. Bei der Holzzäucherung spielen die auftretenden Phenole gleichfalls die Rolle des Konservierungsmittels.

Essig. Etwa 5 Proc. Essigsäuregehalt ist im Stande, sowohl Fäulnis wie Gährung eine gewisse Zeit zurückzuhalten, namentlich wenn der Essig vor dem Gebrauche durch Aufkochen sterilisirt worden ist.

Neuerdings werden besonders angewendet: Borsäure, Borax, Formaldehyd, um die Fäulnis zu verhindern, also namentlich für Fleisch und Fleischpräparate, ferner Benzoesäure, Salicylsäure zur Verhinderung von Gährung. — Die schweflige Säure ist im Stande Gährungserreger zu tödten, ausserdem, hat sie die Eigenschaft, den Fleischfarbstoff aufzuhehlen und für einige Zeit zu konserviren.

Die zuletzt angeführten Chemikalien sind in den letzten Jahren zu einer grossen Anzahl von Konservierungsmitteln verwendet worden, von welchen in Nachstehendem die wichtigeren aufgeführt werden sollen.

Amerikanische Schinken-Präservé. Haupt-Depot: F. NIETSON, Berlin, Friedrichstrasse 245. Saure Flüssigkeit vom Geruch des Theerwassers und von gelblicher Farbe. Spec

Gew bei 16° C = 1,049 In 1 Liter = 70,0 g Kalh-Alaun und 21,4 g Kaliumnitrat (POLENSKE)

Antisepticum von L. H. ROSE, Hamburg-Uhlenhorst Ist fein gepulverte Borsäure (POLENSKE)

Australian Salt von OHRTMANN Inhaber GLASER & EHRICH, Berlin 5,5 Proc Natriumchlorid, 54,0 Proc Borax mit 40,3 Proc Krystallwasser Das Salz war 1890 mit $\frac{1}{2}$ Proc eines flüchtigen, dickflüssigen Kohlenwasserstoffs durchtränkt, der sich durch Petroleumäther leicht entfernen liess (POLENSKE)

Berlinit, konzentriertes, von DELVENDAHL & KUNTZEL, Berlin Stark alkalisches Pulver aus 7,46 Proc Natriumchlorid, 9,8 Proc Borsäure (BO_3H_3), 45,75 Proc Borax mit 36,8 Proc Krystallwasser (POLENSKE)

Berlinit, Pokel, von DELVENDAHL & KUNTZEL, Berlin Feuchte Salzmasse von saurer Reaktion, aus 45,92 Proc Natriumchlorid, 82,2 Proc Kaliumnitrat, 19,16 Proc Borsäure, 2,28 Proc Wasser (POLENSKE)

Best Australian — New Zealand — Meat Preserve von L. ZIFFER, Berlin 33,12 Proc Natriumchlorid, 48,62 Proc Natriumsulfat, 16,0 Proc Natriumbisulfat, 1,7 Proc Kalk, Magnesia, Feuchtigkeit (POLENSKE)

Carnat von L. ZIFFER, Berlin 18,9 Proc Natriumsulfat, 30,88 Proc Natriumsulfat, 40,12 Proc Natriumchlorid, 1,6 Proc Natriumkarbonat, 5,1 Proc Rohrzucker, 0,7 Proc Calciumkarbonat + Magnesiumkarbonat, 2,00 Proc Feuchtigkeit (POLENSKE)

Carolin-Pulver von H. BEHRND & Co, Berlin 24,55 Proc schweflige Säure, 18,87 Proc Schwefelsäure, 88,88 Proc Natriumoxyd, 19,6 Proc Borsäure (POLENSKE)

China Erhaltungspulver Minerva, Fabrik für Erhaltungspräparate von LOUIS SCHULTZ, Berlin 25,0 Proc Natriumchlorid, 17,7 Proc Borsäure, 38,84 Proc Natriumsulfat (Na_2SO_4), 9,2 Proc Natriumsulfat, 9,4 Proc Wasser

Dreifaches Konservessalz der Hagener Konservessalz-Fabrik Feuchtes, alkalisches Salzgemenge aus 0,8 Proc Natriumchlorid, 55,5 Proc Borsäure, 29,0 Proc Borax mit 14,70 Proc Krystallwasser (POLENSKE)

Dreifaches Konservessalz von THEODOR HEYDRICH & Co, Wittenberg 55,5 Proc Borsäureanhydrid mit 44,1 Proc Krystallwasser (POLENSKE)

Dreifaches Konservierungssalz von KARL STERN, Wien 80,0 Proc Boraxpulver, 17,0 Proc Borsäure, 3 Proc Kochsalz (POLENSKE)

Einfaches Konservessalz der Hagener Konservessalz-Fabrik Feuchtes, alkalisch reagendes Salzgemisch aus 21,95 Proc Borax mit 18,30 Proc Krystallwasser, 83,1 Proc Kaliumnitrat, 32,04 Proc Natriumchlorid (POLENSKE)

Einfaches Konservessalz von THEODOR HEYDRICH & Co, Wittenberg 15,5 Proc Kaliumnitrat, 78,4 Proc Natriumchlorid, 9,45 Proc Borsäure, 1,28 Proc Wasser (POLENSKE)

Erhaltungspulver von L. ZIFFER, Berlin 28,8 Proc Natriumchlorid, 70,1 Proc Borsäure, 1,84 Proc Feuchtigkeit (POLENSKE)

FREEZE-EM., amerikanisches Konservierungsmittel für Fleisch und Fleischwaren. Ist wasserfreies Natriumsulfat mit einem Gehalt von 15,6 Proc Natriumsulfat Das Pulver ist schwach rosa gefärbt (mit Tropaeolin 00) (POLENSKE)

Geruchlose Meat-Preserve-Flüssigkeit von E. DRESSEL, Berlin Spec Gewicht = 1,228 bei 15° C 1 Liter = 22,0 g Natriumchlorid, 0,15 Vanillin, 73,5 Natriumsulfat, 171,0 Natriumsulfat, 34,5 schweflige Säure, 3,0 Ferrichlorid (Die Salze wasserfrei) (POLENSKE)

Konservessalz von M. BROCKMANN, Leipzig Eutritsch 34,32 Proc Natriumchlorid, 14,04 Proc Kaliumnitrat, 15,00 Proc Kaliumsulfat, 24,86 Proc krystall. Borax, 12,0 Proc Borsäure (POLENSKE)

Konservierungsflüssigkeit für Wurstgut Schwach opalisierende, geruchlose, sauer reagierende Flüssigkeit Spec Gew = 1,0605 bei 20° C In 1 Liter = 33,4 g Kaliumnitrat, 27,5 g Borsäure (BO_3H_3), 50,0 g Glycerin (POLENSKE)

Konservierungs-Pokelsalz von E. DRESSEL, Berlin. 80,0 Natriumchlorid, 8,0 Boraxpulver, 12,0 Kaliumnitrat (POLENSKE)

Konservierungssalz von Dr. G. LANGBEIN & Co, Leipzig-Sellerhausen. 80,0 krystall. Natriumsulfat und 20,0 kryst. Natriumsulfat (POLENSKE)

Lakolin von E. DRESSEL, Berlin Klare, gelbe, sauer reagierende Flüssigkeit Spec Gew = 1,244 bei 15° C 1 Liter = 6,8 g Kaliumsulfat, 17,6 Natriumsulfat, 212,0 Natriumbisulfat, 96,0 Natriumsulfat (alle Salze wasserfrei), 25,0 Glycerin, 6,0 Borsäure, 3,6 Ferrichlorid. (POLENSKE)

Magdeburger Konservessalz von Dr. G. MOERLES, Magdeburg 0,46 Proc Calciumoxyd, 20,42 Proc Natriumchlorid, 33,45 Proc Borsäureanhydrid, 15,0 Proc Borax mit 30 Proc Krystallwasser (POLENSKE)

Mayol Budapester Konservierungsmittel für Fleisch Ist ein Gemisch von Methyl und Äthylalkohol mit Borsäure, Glycerin und Ammoniumfluorid (THAN)

Meat-Preserve-Krystall von E DRESEL, Berlin Besteht aus 90 Proc krystall Natriumsulfat $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ und 10 Proc Natriumsulfat (Ursprünglich wohl reines Natriumsulfat BF) (POLENSKE)

Meat-Preserve-Pulver von E DRESEL, Berlin Ist stark zersetztes Natriumbisulfat Monopol von L ZIFFER, Berlin 43,32 Kaliumnitrat, 15,0 Kaliumkarbonat, 17,25 Kaliumchlorid, 1,2 Natriumchlorid, 20,0 Rohrzucker, 3,00 Feuchtigkeit (POLENSKE)

Neuestes Fleischpräservat-Pulver von H SCHRAMM & Co, Berlin Besteht aus 43,0 Natriumsulfat und 57,0 Natriumbisulfat (POLENSKE)

OERTMANN's Real Australian Meat-Preserve Flüssigkeit, in 1 Liter = 11,1 g Calciumoxyd und 61,76 g schweflige Säure enthaltend (Spec Gew = 1,0467 bei 19° C)

OPFERMANN's Erhaltungspulver zu Konservierungszwecken besteht vorwiegend aus Borsäure

Philodaritt. Neuestes Fleischpräservat-Pulver der Magdeburger Konservessalzfabrik von ADOLPH DUBECKE Besteht aus 75 Proc Natriumsulfat und 25 Proc Natriumbisulfat (POLENSKE)

Priservesalz zum Bestreuen der amerikanischen Schinken Ist gepulverter Borax (POLENSKE)

Präservierungssalz von Gebr GAUNE Feuchtes, sauer reagirendes Salzgemenge aus 29,7 Proc Borsäure (BO_3H_3), 37,8 Proc Kaliumnitrat, 26,7 Proc Natriumchlorid, 5,5 Proc Wasser (POLENSKE)

Präservierungssalz von R LIESENTHAL in Köln, „röthend“ Feuchte, sauer reagirende Salzmasse aus 28,34 Proc Borsäure (BO_3H_3), 9,58 Proc Natriumchlorid, 57,35 Proc Kaliumnitrat, 4,5 Proc Wasser (POLENSKE)

Präservierungssalz von R LIESENTHAL in Köln, „nicht röthend“ Geruchloses, alkalisch reagirendes Salzgemenge aus 48,4 Proc Borax mit 39,0 Proc Krystallwasser, 3,44 Proc Natriumchlorid, 9,1 Proc Natriumbikarbonat (POLENSKE)

Preservaline, Schutz gegen Springmaden, von L ZIFFER, Berlin Flüssigkeit, spec Gew = 1,275 bei 15° C 1 Liter = 206,7 g Natriumchlorid, 185,0 Natriumsulfat und -bisulfat, 14,2 Natriumsulfat Spur Eisenchlorid, Spur Benzoesäure (POLENSKE)

Probat von A ADAMCZYK, Berlin 47,5 Natriumsulfat, 10,9 Natriumsulfat (beide wasserfrei), 35,5 Natriumchlorid, 4,5 Rohrzucker, 0,25 Eisenoxyd + Kalk, 1,0 Feuchtigkeit (POLENSKE)

The Real American Meat-Preserve. Farblose, stark nach schwefliger Säure riechende Flüssigkeit Spec Gew = 1,0842 bei 20° C In 1 Liter = 26,42 g Calciumoxyd, 39,60 g schweflige Säure (SO_2), 1,8 g Eisenoxyd + Thonerde, 1,3 g Kieselsäure + Alkalien (POLENSKE)

The Real Australian Meat-Preserve. Farblose, stark nach schwefliger Säure riechende Flüssigkeit Spec Gew = 1,088 bei 20° C In 1 Liter = 11,08 g Calciumoxyd, 46,38 g schweflige Säure (SO_2), 0,39 g Eisenoxyd + Thonerde, 0,52 Kieselsäure + Alkalien (POLENSKE)

Real Australian Meat-Preserve von FRANZ HELLWIG, Berlin Saure, nach schwefliger Säure riechende Flüssigkeit. Spec Gew = 1,0344 bei 19° C In 1 Liter = 9,5 g Calciumoxyd und 39,0 g schweflige Säure (SO_2)

Real Australian Meat-Preserve von DELVENDAHLE & KUNTZEL, Berlin Flüssigkeit, Spec Gew. = 1,0789 bei 19° C. In 1 Liter = 20,7 g Calciumoxyd und 100,0 g schweflige Säure (SO_2)

Dr. C. RÜGER's Barmenit von A. WASMUTH & Co, Barmen 49,95 Proc Natriumchlorid, 27,00 Borsäureanhydrid mit 22,5 Proc Krystallwasser (POLENSKE) vergl hierzu S 501

Stahl (verbessertes Monopol) von A ADAMCZYK, Berlin 79,6 Kaliumnitrat, 10,1 Natriumchlorid, 9,0 Rohrzucker, 0,5 Feuchtigkeit (POLENSKE)

STARKE's Konservator für frisches Fleisch jeder Art 42,1 Natriumchlorid, 32,3 Borax, kryst, 4,0 Rohrzucker, 0,6 Salicylsäure, 6,0 schweflige Säure, 7,9 Schwefelsäure, 6,4 Natriumoxyd (Die letzten drei Säuren sind also als Natriumsalze zugegen.) (POLENSKE)

STARKE's Sanität zur Pökellung 61,0 kryst Borsäure, 7,5 Natriumsalicylat, 14,5 Kaliumnitrat, 7,1 Natriumchlorid, 4,2 Rohrzucker, 6,0 Feuchtigkeit. (POLENSKE)

STARKE's Wurstsatz von M. STARKE, Charlottenburg 60,2 Proc Borsäure, 7,6 Proc Natriumsalicylat, 12,8 Proc Kaliumnitrat, 7,7 Proc Natriumchlorid, 6,8 Proc Rohrzucker, 5,0 Proc Feuchtigkeit. (POLENSKE.)

Sozolith Concentrirtes Präservessalz von Fr M SCHULZ, Berlin Stark nach schwefliger Säure riechende Salzmasse 37,27 Proc Natriumsulfat (Na_2SO_4), 21,0 Proc Natriumoxyd, 39,68 Proc schweflige Säure (SO_2), 2,05 Proc Wasser (POLENSKE)

Stuttgarter Konservierungsflüssigkeit für Fleisch. I. Sauer reagirende, stark nach schwefliger Säure riechende Flüssigkeit Spec. Gew = 1,075 bei 16° C In 1 Liter = 0,163 g arsenige Säure (As_2O_3), 5,5 g Natriumchlorid, 41,94 g Calciumphosphat ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$),

0,44 g Eisenoxyd + Thonerde, 37,44 g schweflige Säure (SO_2), 6,05 g freie Phosphorsäure (H_3PO_4) (POLENSKE 1889) II Seit dem Jahre 1890 ist diese Flüssigkeit frei von Arsen Sie enthält im Liter rund 36,5 g Calcumbisulfit (B FISCHER)

WICKENHEIMER's Flüssigkeit zur Konservierung von Nahrungsmitteln Sauer reagierende, dickliche Flüssigkeit, spec Gew $\approx 1,0995$ bei 20°C In 1 Liter = 52,3 g Borsäure, 18,25 g Natriumchlorid, 22,8 g Salicylsäure, 7,2 g Natriumoxyd (Na_2O) an Salicylsäure gebunden, 250,0 g Glycerin, Aqua q s ad 1 Liter (POLENSKE)

Zauzibai-Karbon, amerikanisches Konservierungsmittel für Fleisch und Fleischwaren Ist eine Mischung von 75 Proc Natriumchlorid u. 25 Proc Bismarckbraun

Zur Konservierung pflanzlicher und thierischer Objekte für wissenschaftliche Zwecke wird ausser Spiritus zur Zeit namentlich eine 4proc Formaldehydlösung verwendet

Formaldehydlösung, 1procentige Ist in Braunschweig zur Konservierung von Gehirn und Rückenmark anthoth vorgeschrieben

Injektionsflüssigkeit zum Einbalsamiren der Leichen von Dr LEUFEN Rp Acidi arseniosi 20,0, Hydrargyri bichlorati 30,0, Aquae carbolisatæ (5 Proc) 3250,0 Spiritus 200,0 Kann mit etwas Fuchsin tingirt werden Für einen Erwachsenen bedarf man 5—6 Liter — Auf den Boden des Sarges bringt man in etwa 10 cm hoher Schicht eine Mischung aus 100,0 g Schwefelblumen, 50,0 g Borsäure, 20,0 g Myrrhe nebst einer entsprechenden Menge Kräuterpulver (Eucalyptus, Salbei, Kamille) Mit dieser Mischung werden auch die Körperhöhlen ausgefüllt

Konservierungsflüssigkeit für naturhistorische und anatomische Objekte von GAWALOWSKI 0,5 g Quecksilberchlorid, 0,01 g Thymol, 100,0 g Glycerin Oder 0,01 Thymol, 100,0 Petroleum

MÜLLER'sche Lösung Zur Konservierung von Gehirn und Rückenmark in Braunschweig vorgeschrieben 2,5 Kahmdichromat, 1,0 Natriumsulfat krystall, 100,0 Wasser

Poudre pour la conservation des cadavres (Gall) Pulvis ad condienda cadavera Rp Acidi carbolici crystalli, Spiritus 90 Proc, Olei Thymi aa 200,0 g Mit dieser Lösung wird eine Mischung aus 2 kg grob gepulvertem krystall Zinkvitriol und 10 kg Sägespänen befeuchtet

Consolida.

Radix Consolidae. Radix Consolidae majoris. Radix Symphyti. — Schwarzwurzel. Beinwurz Beinwellwurzel. Wellwurzel. — Racine de (grande) consoude (Gall) Comfrey root ist die Wurzel des *Symphytum officinale* L., Familie der Boraginaceae — Boraginoidae — Anchuseae, heimisch im gemässigten Europa bis zum westlichen Sibirien

Beschreibung. Die Wurzel ist mehrköpfig, bis 2,5 cm dick, frisch fleischig, getrocknet hart, längarunzelig, aussen schwarz, und zeigt im ebenen Bruch innerhalb der breiten Rinde einen weissen, strahligen Holzkörper Die Zellen des Parenchyms enthalten reichlich Schleim, der im Zellinhalt entsteht. In der Droge findet sich ausser der Wurzel auch das Rhizom, das im Centrum Mark führt, welches häufig geschwunden ist. Die äussere Bedeckung der Wurzel ist kein Kork, sondern dunkel gefarbt Gewebe der primären Rinde

Bestandtheile. Schleim, Gerbstoff, angeblich Asparagin

Einsammlung. Die Wurzel wird im Herbst gesammelt, der Länge nach gespalten und scharf getrocknet. 7 Th. frische Wurzel geben 2 Th. trockene

Anwendung. Einmal gegen alle möglichen Krankheiten gebraucht, ist die Schwarzwurzel heute nur noch ein Hausmittel, das bei Leiden der Athmungsorgane als Aufguss, oder gepulvert mit Honig zur Latwerge gemacht, genommen wird

Hier und da werden auch die Blätter gegen Katarrh angewendet und die Blüten zum Färben — Aehnlich verwendet man *Symphytum tuberosum* L.

Conserva Consolidae

Rp Radix Consolidae pulv 20,0
Glycerini 10,0
Sacchari pulver 70,0
Aque ferriidae q s.

Tisane Consolidae (Gall)

Tisane de consoude grande
Rp Radix Consolidae conc 20,0
Aque destillate ebull 1000,0
Nach 2 Stunden sieht man durch.

Sirupus de radice Consolidae (Call)
Sirap de consoude
 Rp 1 Radicis Consolidae concis 50,0
 2 Aquae destillatae 300,0
 3 Sirupi Sacchari 1500,0
 Man macerirt 1 mit 2 zwölf Stunden, seigt ohne
 zu drücken ab und kocht mit 3 bis zum spec.
 Gew 128

Species adstringentes Astruc

Rp Radicis Consolidae
 Rhizomatis Tormentaliae
 Rhizomatis Bistortiae aa.

FREITAG's Mittel für Brustkrankh. Eine mit geschnittener Schwarzwurzel bereitete gallertartige Latwerge
Hustennittel von MAYEN in Friedeberg ist ein Trank aus Schwarzwurzel, Malz und Meerrettig

Convallaria

Gattung der Liliaceae — Asparagaceae — Convallariaceae — Convallarinaceae

Einzige Art **Convallaria majalis** L., heimisch in Europa, in Sibirien und Japan, in Nordamerika in den Alleghanies Verwendung finden

1) Die Blüthen **Flores Convallariae** (Ergänzb.) **Flores Liliorum convallium.** **Flores sternutatorii** — Maiblumen Maillienblumen. Niesblumen Marien-glückchen. — **Fleur de muguet** (Gall.)

Beschreibung Der Blütenstand ist eine einseitwendige Traube, mit 5—11 nickenden Blüthen in der Achsel kleiner Deckblättchen Perigon weiss, glockig, mit 6 dreieckigen, etwas nach auswärts gebogenen Zipfeln Antheren 6, in das Perigon eingeschlossen nahe der Basis desselben Griffel dreikantig, kurz und dick.

Einsammlung Man sammelt die Blüthen im Mai, trennt sie vom Schafte, trocknet und bewahrt sie, in ein mittelfeines Pulver verwandelt, in gelben Stöpselgläsern auf 7—8 Th frische geben 1 Th trockene

Anwendung Früher als Bestandtheil von Niespulvern, ferner im Aufguss 10 200 (mit Gummischleim, um Diarrhoe zu vermeiden)

2) Das Kraut **Herba Convallariae** (Ergänzb. Helv.) **Maiblumenkraut** **Maiblume.** — **Muguet** (plante entiere) (Gall.)

Man sammelt die ganze, blühende Pflanze ohne den Wurzelstock und verwendet sie entweder frisch zur Bereitung der Tinktur, oder man behandelt sie wie die Blüthen.

3) Das Rhizom **Rhizoma Convallariae** **Convallaria** (U St.)

Man sammelt das Rhizom mit den Wurzeln, reinigt und trocknet es

Bestandtheile 2 Glukoside Convallamarin (zu 0,2 Proc) und Convallarin (vergl. unten), ferner ein Alkaloid Majalin, ausserdem ätherisches Oel

Anwendung. Die Pflanze ist ein seit alter Zeit bekanntes Herzmittel, war aber völlig in Vergessenheit gerathen und ist neuerdings erst wieder in Aufnahme gekommen (Vergl. unten die Glukoside)

† **Extractum Convallariae majalis (aquaesum)** Gall 1 **Extrait de muguet** (aqueux) 300 g frisch gesammelte und getrocknete Maiblumen mit den Stengeln, 100 g getrocknete Maiblumenblätter, 100 g getrocknetes Maiblumenrhizom werden geschnitten, mit 3000 g kochendem, destillirtem Wasser übergossen, nach 12 Stunden ausgepresst und nochmals ebenso behandelt Die Auszüge dampft man zum weichen Extrakt ein, löst in kaltem Wasser, filtrirt und dampft zu einem festen Extrakt ein 2 **Extrait de muguet** (avec le suc) 8000 g frische Maiblumen mit den Stengeln, 1000 g frische Maiblumenblätter, 1000 g frische Maiblumenrhizome stösst man im Steinmörser, presst aus, erhitzt den Saft, seigt durch und dampft zum weichen Extrakt ein, dieses löst man in destillirtem Wasser, filtrirt und dampft zu einem festen Extrakt ein

Extractum Convallariae von Sax wird ebenfalls aus der ganzen Pflanze bereitet

† **Extractum Convallariae fluidum** (Helv U-St) **Maiblumen-Fluidextrakt** — **Extrait fluide de muguet** — **Fluid Extract of Convallaria** Helv 100 Th Maiblumen (V) werden mit einer Mischung von 10 Th Glycerin, 15 Th Wasser, 25 Th Weingeist befeuchtet und im Verdrängungswege mit 98 Weingeist und Wasser aa erschöpft Man fängt die ersten 80 Th Perkolat für sich auf, dampft die übrigen zum dünnen Extrakt ein, löst in 40 Th. Wasser, filtrirt, dampft auf 20 Th ein, so dass man 1 a 100 Th Fluid-

extrakt erhält Vorsichtig aufzubewahren Grösste Einzelgabe 0,1 g, grösste Tagesgabe 0,2 g Muss wenigstens 25 Proc Trockenrückstand geben — U-St Aus 1000 g Maiblumenrhizom (No 60) und verdünntem Weingeist (41 proc) im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuerst 800 ccm Perkolat und stellt 1 a 1000 ccm Fluid extrakt her

Tinctura Convallariae. Maiblumentinktur (Ergänzb) wird aus gleichen Theilen frischem, zerquetschtem Maiblumenkraut und Weingeist (87 proc) durch 8tägige Maceration bereitet Vor Licht geschützt aufzubewahren

Pulvis errhinus HUFELAND		Pulvis sternutatorius viridis	
HUFELAND's Niesepulver		Grüner Schneeberger Schnupftabak	
Rp	Florum Convallariae		Poudre de Saint Ange
	Florum Lavandulae	Rp	Florum Convallariae
	Herbae Majoranae aa 20,0		Herbae Majoranae aa 80,0
	Saponis medicati		Rhizomatis Iridis Florent. 100
	Sacchari albi aa 12,5		Rhizomatus Veratri 1,5
	Olei Bergamottiae		Olei Bergamottiae gtt. X
	Olei Caryophyllor aa gtt XXV	In kleinen länglichen Holzschachteln abzugeben.	

† **Convallamarin** $C_{25}H_{41}O_{13}$ Weisses, krystallinisches, bitterlich süß schmeckendes Pulver In Alkohol und Wasser leicht löslich, in Aether fast unlöslich Vorher befeuchtet, wird es mit Schwefelsäure violett Liefert mit verdünnten Säuren Glukose und Convallamaratin

Anwendung bei Herzschwäche und Kompensationsstörungen subcutan (Dosis 0,005—0,01 g) Innerlich 0,05 pro dosi und pro die bis 0,5

† **Convallarin** $C_{25}H_{41}O_{11}$ Farblose Krystalle, in Alkohol leicht löslich, in Aether unlöslich, in Wasser kaum löslich Schwefelsäure löst es mit brauner Farbe Liefert mit verdünnten Säuren beim Kochen Zucker und Convallaretin

Anwendung wie beim vorigen, wirkt aber abführend, ist der den kratzenden Geschmack der Droge bedingende Bestandtheil Einzeldosis 0,05—0,1 g Tagesdosis bis 0,25 g

Copal.

Gummi vel Resina Copal. Succinum indicum. Kopal. Kopalgummi Kopalharz

Mit dem Namen Kopal bezeichnet man eine Anzahl Harze, die sich durch ihre Härte und den relativ hohen Schmelzpunkt auszeichnen Daneben findet sich für sie (besonders im englischen Handel) der Name Anime, welchen man anderwärts gegenwärtig mehr für weichere, aromatisch riechende, vielleicht von Burseraceen stammende Harze benutzt Der Name Anime gehört schon dem Alterthum an, der Name Kopal wurde erst aus Amerika bekannt und dann allmählich auf in der alten Welt vorkommende, früher als Anime bezeichnete oder diesen ähnliche Harze übertragen

Die Kopale sind amorph, ihre Härte schwankt zwischen der des Kalkspathes und des Gipses, ihr Schmelzpunkt zwischen 180 und 370°C, ihr spec Gew von 1,068 bis 1,121 Die Abstammung ist bei manchen unsicher oder gar nicht bekannt, was seinen Grund theilweis darin hat, dass wir ja über die Abstammung solcher fremden Drogen ohne Struktur wenig erfahren, andererseits darin, dass manche Kopale als halb fossil zu betrachten sind, sie werden in Flussbetten, wo sie zusammengeschwemmt sind, aus der Erde gegraben oder in Gegenden auf oder in der Erde gefunden, wo die Bäume, von denen sie stammen, sicher verschwunden sind

Man theilt sie ein nach der Heimath

I. Afrikanische Kopale

a. Ostafrikanische.

1) Der Sansibar-Kopal, Bombay- oder Salem-Kopal, die geschätzteste Sorte Als Stammpflanze gilt *Trachylobium verrucosum* (Gaertn) Oliv (Caesalpinaceae — Amherstiaeae). Man gräbt ihn in Ostafrika zwischen dem 5° und 15° südl Breite aus der Erde und bringt ihn direkt nach Europa oder erst nach Indien, woher er dann zuweilen den Namen indischer oder Bombay-Kopal führt Er bildet platten oder tropfsteinartige

Stücke von schwachgelber Farbe, warziger Oberfläche, glasglanzendem und muschligem Bruch, die bis 20 cm gross sind. Er ist geschmacklos und ohne Aroma. Hat die Härte des Steinsalzes. Frisch aus der Erde gegraben, zeigt er eine Verwitterungskruste, die durch Ab-schaben und Waschen mit Lauge entfernt wird. Im ungepulverten Zustand ist er bei 300° C noch nicht geschmolzen, feingepulvert beginnt er bei 140° C zu schmelzen. Er ist schwer aber vollständig löslich in 98 proc Alkohol, ebenso in Phenol, unvollständig in Aceton, Benzol, Eisessig, Chloroform, Petroläther, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Aether, Amylalkohol, Terpentinol löst nur Spuren auf.

Bestandtheile 80 Proc Trachylolsäure $C_{51}H_{45}O_2(OH)(COOH)_2$, 4 Proc Isotrachylolsäure, 6 Proc Resene, Bitterstoff, ätherisches Oel, 0,12 Proc Asche.

2) **Chakazzi-Kopal**, gleichfalls von Sansibar in den Handel kommend und vielleicht von derselben Pflanze stammend, wird ebenfalls aus der Erde gegraben, mit schwächerer Verwitterungskruste wie 1.

3) **Baum-Kopal**, ebenfalls von Sansibar, recentes Harz des **Trachylobium verrucosum**.

4) **Madagascar-Kopal**, wenig bekannt, soll mit 1 identisch sein.

5) **Mosambique-Kopal**, flache Stücke, bis 5 cm gross, meist weissgelb, häufig etwas röthlich, oft von Gasblasen und fremden Körpern durchsetzt, Bruch flachmuschlig. Spec Gew 1,069. Als muthmassliche Stammpflanze wird auch **Trachylobium verrucosum** angegeben.

Es scheint danach, als ob alle diese Kopale von derselben Pflanze abstammen und sich nur im Alter unterscheiden.

6) **Inhambane-Kopal**, angeblich von **Copaiba conjugata (?)** und **Copaiba Mo-pane Kirk**, halb fossil.

b Westafrikanische

Sammtlich, mit Ausnahme der Kiesel-Kopale von Sierra-Leone, weicher als die ostafrikanischen.

1) **Kiesel-Kopal von Sierra Leone Glas-Kopal**. Kommt in abgerollten Stücken von 2—3 cm Durchmesser vor, die selten mit einer papierdünnen Kruste bedeckt sind. Farblos bis gelblich, durchsichtig bis durchscheinend, geruch- und geschmacklos. Spec Gew 1,09. Steht im Werth dem Sansibar Kopal nahe.

2) **Junger Kopal von Sierra-Leone**, soll von lebenden Stämmen der **Guibourtia copallifera Benn** gesammelt werden. Besteht aus kugel- oder tropfenförmigen Stücken von 1—3 cm Durchmesser. Spec Gew 1,6. Trübe und gelblich. Wenig werthvoll, soll nur im englischen Handel vorkommen.

3) **Kopal von Gabon**. Runde, oft abgeplattete Stücke von 1—8 cm Durchmesser. Oberfläche zuweilen mit einer sehr dünnen, kreidigen Kruste, die von Sprunglinien durchsetzt ist. Weissgelb bis blutroth, meist trübe. Spec Gew 1,073. Haftet wie 2 beim Kauen schwach an den Zähnen.

4) **Kopal von Loango**. Kommt in Bruchstücken vor, die darauf schliessen lassen, dass die ursprünglichen Stücke, mehrere Decimeter gross sind. Weiss bis roth, Stücke von letzterer Farbe härter. Spec. Gew 1,064.

5) **Kopal von Angola**. Häufig auch in Bruchstücken bis 2 kg schwere Klumpen, mit weisslicher bis braunlicher oder rother Kruste, und mit Warzchen, die aber viel grösser als die der Sansibar-Copale sind. Von der Kruste befreit, ist er gelblich, braunlich, röthlich. Spec Gew 1,062—1,081.

6) **Kopal von Benguala**, mit sehr dünner Haut, farblos bis hellgelb, von muscheligen Bruch.

Die folgenden Sorten der westafrikanischen Kopale gehören zu den weicheren, wenig werthvollen.

7) **Kopal von Acara**, der Sorte 6 ähnlich, oft milchig trübe, dem Copalabalsam ähnlich riechend.

8) Kopal von Benin, der Sorte 5 ähnlich, kuglig, birnförmig, flach, bedeckt mit einer dunkelbraunen, dünnen Rinde, trübe, braunroth, blasig.

9) Kugel-Kopal, auch westindischer Kopal. Durchsichtige, fast farblose, meist kugelförmige Stücke, oft im Innern noch weich, oder in der Wärme zusammenfließend, oft mit rothen Stücken untermengt.

II. Amerikanische Kopale.

Sämmtlich recent, man sammelt sie von den Stämmen und Wurzeln der Stammpflanzen, als welche *Hymenaea Courbaril* L., *Hymenaea stilbocarpa* Hayne, *Trachylobium Martianum* Hayne, *Cynometra* genannt werden. Das Harz der erstgenannten Art besteht aus knollenförmigen, bis 10 cm grossen Stücken, mit einer weissen krädligen Kruste bedeckt, aussen unregelmässig, hückerig, gelb bis dunkelgrün. Bruch fettglänzend. Spec. Gew. 1,082. Haftet beim Kauen an den Zähnen.

Von zwei neuerdings (1893) vorkommenden Sorten war A. farblos bis gelb. Spec. Gew. 1,068, beginnt bei 55° C. zu schmelzen, ist bei 90° C. geschmolzen. Lässt sich im Autoclaven mit Kalilauge völlig verseifen. B. ist weissgelb bis bernsteingelb. Spec. Gew. 1,07, beginnt bei 55° C. zu schmelzen, ist bei 95° C. geschmolzen. Lässt sich ebenfalls verseifen.

III. Kopal von Neuseeland und Neucaledonien, der Kaurie-Kopal, das Harz der *Agathis australis* Salisb. (*Dammara australis* Lamb.) (Coniferae — Pinoideae — Abietineae — Araucariinae), heimisch in Australien und Neuseeland. Man sammelt das im Boden der Wälder angesammelte Harz, das Stücke bis zu 50 kg bildet. Mit dünner, grauer Rinde, im Innern oft trübe, farblos, grau und hellbraun, Bruch muschelrig und fettglänzend, von balsamischem Geruch und aromatischem Geschmack. Klebt beim Kauen an den Zähnen. Spec. Gew. 1,109—1,115. Leicht schmelzbar, in absolutem Weingeist völlig löslich.

Bestandtheile. Dammarsäure $C_{40}H_{80}O_7$, und ein Harz (Damaran), $C_{40}H_{80}O_6$.

IV. Manila-Kopal (Piney resin) von *Vateria indica* L. (Dipterocarpaceae), wird durch Einschnitte in die Rinde gewonnen. Bildet trübe Massen, die bis 1,5 cm messen. Spec. Gew. 1,121. Bruch splitterig, Bruchfläche glänzend. Geruch schwach balsamisch, Geschmack etwas bitter. Das Pulver haftet beim Kauen an den Zähnen. In zwei Sorten vorkommend: a) der harte, dem vorigen ähnlich, aber dunkler und etwas härter, b) der weichere, gelblich, zwischen den Fingern leicht zu zerreiben.

Anwendung. Man verwendet den Kopal in der Technik zur Herstellung von Lacken und Firnissen und bevorzugt dabei die harten Sorten (Sansibar-Kopal), die ein nachheriges Abschleifen und Poliren der lackirten Flächen gestatten. Ebenfalls die harten Sorten werden auch wie Bernstein zu Drechslerarbeiten benutzt.

Copal coctum. Gekochter Kopal. Dient zur Bereitung von Lacken und Firnissen. Entweder erhitzt man Kopal auf 360° C., bis er $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ an seinem Gewicht verloren hat, oder man verfährt folgendermassen: Grob gepulverten Kopal setzt man einige Wochen hindurch der Einwirkung warmer Luft aus, schmilzt ihn alsdann in einem kupfernen, mit Siebboden (s) versehenen Trichter (a) (Fig. 225), indem man denselben mit glühenden Kohlen umgiebt, lässt das geschmolzene Harz in einen untergestellten Mörser abfließen (d) und pulvert es nach dem Erkalten. Nach längerer Aufbewahrung ist dieser Kopal in Terpentinöl, Weingeist, Aether leicht löslich; im anderen Falle muss das Verfahren wie-




Fig. 225.

Vorrichtung zur Bereitung von Kopalack im Längsschnitt.

derholt werden. Auch kann man den schmelzenden Kopal unmittelbar in ein Gefäss mit heissem Leinölfirnis fliessen lassen, verdünnt man alsdann mit der nöthigen Menge Terpentinöl, so erhält man den

Vernix Kopal, Kopalfirnisse, Kopallack, Brauner Kopallack 1) 100 Th gekochten Kopal schmilzt man mit 20 Th Copanabalsam oder 20 Th venetianischem Terpentin und löst in etwa 150 Th Terpentinöl 2) 100 Th gepulverter, gekochter Kopal werden mit 10 Th venetianischem Terpentin geschmolzen, mit 10 Th sehr heissem Leinölfirnis gemischt, vom Feuer entfernt und mit etwa 150 Th heissem Terpentinöl versetzt — Mit $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{5}$ Leinölfirnis vermischt zum Lackiren von Weissblech

Weisser oder farbloser Kopallack 1) Westindischen Kopal, der als Pulver Jahr und Tag gelegen hat, schmilzt man in einem Kolben im Sandbade, um etwaige Feuchtigkeit zu entfernen, mischt $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{4}$ über 110° C erhitzten Copanabalsam, dann nach und nach etwa $1\frac{1}{2}$ Raumtheil heisses Terpentinöl zu 2) 1 Th Kopal lässt man wenigstens 6 Wochen gepulvert an einem trockenen Orte ausgebreitet liegen, mischt mit 1 Th grobem Glaspulver, erhitzt im Sandbad mit 6 Th Terpentinöl bis zum Sieden und setzt 1 Th heissen Leinölfirnis hinzu. Der Lack ist gelblich und klar und eignet sich besonders zur Oelmalerie 3) Nach DRETERICH („Wagenlack“) 400,0 Mandlakopal schmilzt man, giesst in flache Schalen, pulvert, löst in 400,0 Terpentinöl und fugt 300,0 Leinölfirnis zu

Aetherischer Kopallack. 25 Th Kampher löst man in 300 Th wasserfreiem Aether, fugt 100 Th gepulverten, gekochten Kopal, oder Kopal, der gepulvert Jahr und Tag gelegen hat, nach einigen Tagen 100 Th wasserfreien Weingeist und 10 Th Terpentinöl hinzu und kocht durch Absetzenlassen

Elastischer Kopallack. 3 Th Kopal kocht man 2—3 Stunden mit $1\frac{1}{2}$ Th Leinölfirnis und fugt dann 9 Th Terpentinöl hinzu

Weingeistiger Kopallack 1) 100 Th gepulverter, gekochter Kopal, 50 Th Sandarak, 25 Th Mastix, 100 Th grobes Glaspulver werden gemischt und nach Zusatz von 20 Th venetianischem Terpentin mit 100 Th Aceton und 100 Th wasserfreiem Weingeist digerirt. Mit letzterem wird später nach Bedarf verdünnt 2) 180 Th gepulverter, gekochter Kopal, 25 Th Kampher, 800 Th wasserfreier Weingeist, man digerirt, bis Lösung erfolgt ist

Kopallack für Buchbinder (Buchh.) 875,0 Manila Kopal, 90,0 wasserfreier Weingeist, 90,0 Lavendelöl, 450,0 Terpentinöl

Kopallack, goldfarbig 1) Für physikalische Gerathe (Buchh.) 250 g Lavendelöl erwärmt man im Sandbade in einem Glaskolben, tragt nach und nach 125 g gepulverten, hellen, afrikanischen Kopal ein, fugt nach erfolgter Lösung 750 g Terpentinöl zu und filtrirt nach dem Erkalten

Goldlack, Goldfirnis 100,0 gepulverter Brasil-Kopal, 25,0 Kampher, 0,5 Amlin gelb, 1,75 Corallin, 15,0 Terpentinöl, 300,0 Aether lässt man 14 Tage stehen, fugt 100,0 wasserfreien Weingeist hinzu und lässt klar absetzen

Kopallack für Photographen 20 g Mandlakopal löst man im Wasserbade in 70 g Epichlorhydrin, fügt 100 g absoluten Alkohol hinzu und filtrirt. Man kann den Lack warm oder kalt, rein oder verdünnt (1 Epichlorhydrin + 5 Alkohol) anwenden. Er trocknet schnell, ist glänzend und widerstandsfähig

Kitt für Glas oder Metall Feines Mastixpulver wird mit Kopallack zur honigartigen Masse gemischt. Für weisse Gegenstände setzt man noch Zinkoxyd zu

Kitt für Bernsteinsachen Man benutzt hierzu eine ätherische, sirupdicke Lösung des Brasil Kopals

Fussboden-Lack. (Buchh.) 170,0 Manila Kopal, 160,0 Terpentinöl, 170,0 Weingeist
Zahnkitt, zum Ausfüllen hohler Zähne 20 Kopal löst man in 15 Weingeist und fügt Asbestpulver q s zur bildsamen Masse hinzu

Adhaesöl, ein antiseptischer Firnis, ist ein Gemisch aus 350 Kopal, 30 Benzoes, 30 Tolubalsam, 20 Thymianöl, 3 α Naphthol, 1000 Aether (THOMS)

Ambroin, ein Stoff zur Herstellung von Entwicklungsgefässen, Akkumulatorgefässen u dergl., besteht aus Kopal und Faserstoffen (RIEDEL)

Coriandrum.

Gattung der Umbelliferae — Apioideae — Coriandreae

Coriandrum sativum L., heimisch im mediterran orientalischen Gebiet, durch die Kultur weit verbreitet und die Früchte in derselben nach Form und Grösse stark variirend. Verwendung findet die Frucht

Fructus Coriandri (Austr. Ergänz. Brit.). **Coriandrum** (U-St.). **Semen Coriandri**. — Koriander. Koriandersamen. Schwindelkörner.¹⁾ Stinkdillisamen. — **Fruit ou Semence de Coriandre** (Gall.). — Coriander. Coriander Fruit. Coriander Seed.

Beschreibung. Die Frucht ist kuglig (oder zuweilen elliptisch), 5—7 mm im Durchmesser, von den Griffelresten gekrönt, gelbbraun gefärbt; die beiden Theilfrüchtchen fast immer zusammenhängend, da die holzige Mesocarpsschicht beider Theilfrüchtchen an den Rändern verwachsen ist. Die Hauptrippen treten wenig hervor, sie sind geschlängelt, zwischen ihnen die fadenförmigen Nebenrippen. Auf der Fugenseite jeder Theilfrucht zwei Oelstriemen. Das Mesocarp besteht aus unregelmässig gelagerten, fast völlig verdickten, gestreckten, verholzten Zellen; sie sind für die Erkennung der Droge im Pulver besonders charakteristisch. Das Endosperm ist konkav. (Fig. 226.)

Bestandtheile. Aetherisches Oel (0,15 Proc. ostindischer K., 0,4—0,6 Proc. französ., holländ. und italienischer K.; 0,8—1,0 Proc. thüring., mährischer und russischer K.). Das Oel ist farblos oder schwach gelblich, spec. Gew. 0,870—0,885. Drehung (100 mm-Bohr) +8 bis +13°. Es ist löslich in 8 Th. 70 proc. Alkohols bei 20° C. Es enthält einen Alkohol Coriandrol $C_{10}H_{18}O$, der die rechtsdrehende Modifikation des Linalools ist, ferner d-Pinen. Ferner enthalten die Früchte 13 Proc. fettes Oel. Aschengehalt 6,8 Proc., davon 1,05 Proc. in Salzsäure unlöslich.

Aufbewahrung. In Blechbüchsen, das Pulver in gelben Stöpselgläsern. 100 Th. Koriander geben 90—92 Th. Pulver.

Anwendung. Als magenstärkendes und blähungtreibendes Mittel, häufiger als gewürziger Zusatz zu Abführmitteln, als Küchen- und Biergewürz; mit Zucker überzogen als *Confectio Coriandri* im Gebrauch. — Die Rückstände von der Oeldestillation dienen als beliebtes Viehfutter, sie enthalten 11—17 Proc. Protein und bis 20 Proc. Fett.




Fig. 226. Querschnitt durch die Frucht von *Coriandrum sativum* L. 7 mal verg.

Aqua Coriandri.

Rp. Olei Coriandri gtt. III
Aqua destillatae tepidae 100,0.

Curry-Powder.

Rp. Fructus Coriandri 30,0
Fructus Cardamomi 4,0
Rhizomatis Curcumae 30,0
Rhizomatis Zingiberis 3,0
Fructus Capsici 3,0
Fructus Cumini 7,5
Semina Foenugraeci 11,5
Corticis Cinnamomi 15,0
Fructus Pimentae 2,0
Fructus Piperis nigri 1,0
Fructus Piperis longi 1,0
Caryophyllorum 1,0
Macidia 1,0.

Pulvis digestivus FOLLER.

Rp. Fructus Coriandri 15,0
Fructus Anisi 5,5
Fructus Foeniculi 5,0
Semina Myristicae 2,0
Corticis Cinnamomi
Caryophyllorum aa 1,25
Piperis longi 5,0
Sacchari albi 30,0

Divide in part. aeq. XX.

Nach der Mahlzeit $\frac{1}{2}$ bis 1 Pulver.

Species pro pulpa Prunorum.

Pflaumenmusgewürz (DIETRICH).

Rp. Fructus Cardamomi 10,0
Rhizomatis Zingiberis 10,0
Corticis Cinnamomi 20,0
Caryophyllorum 20,0
Fructus Coriandri 40,0

werden als grobes Pulver gemischt.

Spiritus Coriandri.

Rp. Olei Coriandri gtt. XV
Spiritus diluti 100,0.

Alpestre, zur Selbstbereitung von Chartreuse, ist ein Gemisch von 8—9,0 Koriander, 1,0 Angelikafrüchten und Spuren von Zimmt, Wermuth und Pfefferminze für gelben, von 6,0 Koriander und 6,0 einer Mischung von Angelikafrüchten, Ysop, Wermuth, Pfefferminze und Zimmt für grünen Chartreuse.

¹⁾ Unter diesem Namen gehen auch die Kubeben, vergl. S. 972, Note 1.

Kasekräuter, ostfriesische Je 135,0 Koriander und Mutterkummel, je 315,0 Anis und Kummel, 5,0 Safran, 95,0 Nelken

Lebenthee von Kwiert in Berlin, enthält Koriander, Anis, Fenchel, Stiefmütterchen kraut, Hollanderblüthen, Sennesblätter und Weinstein

Theobrominat, zur Geschmackverbesserung von Kakao, ist eine 15proc Lösung von Korianderöl in Weingeist

Oleum Coriandri (Brit U St) Korianderöl **Essence de Coriandre** Oil of Coriander

Geinnung. Bei der Destillation der vorher zerkleinerten Corianderfruchte erhält man 0,5 Proc atherisches Oel

Eigenschaften Dünflüssiges, hellgelbes Oel von eigenthümlichem, gewürzhaftem Coriandergeruch und mildem Geschmack Spec Gew 0,870—0,885 (Brit U St) Drehungswinkel im 100 mm Rohr $+3$ bis $+13^{\circ}$ Das Oel löst sich klar in 3 Theilen Spiritus dilutus

Bestandtheile Corianderöl besteht neben geringen Mengen (5 Proc) Pinen, $C_{10}H_{16}$, in der Hauptsache aus Linalool, $C_{10}H_{18}O$, und zwar aus der in ätherischen Oelen seltenen, rechtsdrehenden Modifikation dieses Alkohols Der den specifischen Koriander geruch hervorbringende Bestandtheil, von dem nur Spuren in dem Oele zugegen sein können, ist noch unbekannt

Prüfung Korianderöl ist rein, wenn es den unter „Eigenschaften“ angegebenen Anforderungen an specifisches Gewicht, Drehungsvermögen und Löslichkeit entspricht

Coronilla.

Gattung der Papilionaceae — Hedysareae — Coronillinae

Verwendung finden

I Coronilla varia L. Heimisch in Mittel- und in Sudeuropa bis nach Vorderasien Man benutzte die blühenden Stengel

† **Summitates Coronillae** Kronwicke — Schaflinse als Diureticum Gegenwärtig kommen noch in Gebrauch

† **Extractum Coronillae variae aquosum** Wird wie Extractum Centaurii aquosum (S 684) bereitet

† **Tinctura Coronillae variae** Aus 1 Th grob gepulverter Kronwicke und 5 Th verdünntem Weingeist (80proc) durch 10tägige Maceration zu bereiten Tagesgabe 2—4—10 g (POULET)

Rp Extract Coronillae var aq 5,0	Rp Tincturae Coronillae var 10,0
Herbae Coronillae var pulv q s	Sirupi Coffeae 3 0
M 1. pilul No 50 4mal täglich 1 Pille Bei krankhafter Herzthätigkeit.	3—6mal täglich 15 Tropfen in Zuckerwasser Tagesgabe 2—4—10 g

II Coronilla Emerus L. Heimisch vom sudl Skandinavien durch Westeuropa bis ins Mittelmeergebiet, zuweilen als Zierstrauch kultivirt Liefert in den Blättern, die einst als Purgans benutzten Folia Colutane scorpioidis, die auch als Surrogat der Folia Sennae vorkommen. Die Blätter sind unpaarig gefiedert, die Blättchen verkehrt-eiförmig, ganzrandig, an der Spitze stumpf oder ausgerandet, auf der Rückseite angedrückt behaart

III. Coronilla scorpioides Koch Heimisch vom Mittelmeergebiet bis nach Persien, mit dreizähligen Blättern. Die Samen gelangen unter die Gerste, von da in das Bier, das davon einen sehr bitteren Geschmack annimmt

† **Coronillinum**, Coronillin ($C_6H_{12}O_6$)x. Von mehreren Arten, nämlich **Coronilla varia L.**, **C. scorpioides Koch**, **C. juncea L.**, **C. montana Scop**, **C. pentaphylla Desf**, nicht aber **C. Emerus L.**, ist seit längerer Zeit bekannt, dass die Samen giftig wirken Sie enthalten ein Glukosid Coronillin, das der Träger der Wirksamkeit ist Es ist ein gelbes, lockeres Pulver, leicht löslich in Wasser, Alkohol, Aceton und Amylalkohol, wenig in Chloroform und Aether Es spaltet sich $2(C_6H_{12}O_6) + 3H_2O = C_6H_{12}O_7 + C_6H_{12}O_5$

Mit Salpetersäure und einer Spur Kupferchlorid giebt es eine kirschrothe bis rothbraune Färbung

Es ist ein ausgesprochenes Herzmittel verstärkt den Pulsschlag, bewirkt Zunahme der Diurese, Abnahme der Oedeme und Dyspnoe — Einzeldosis 0,1 g, grösste Tagesdosis 0,6 g Einzelgaben von 0,8 g erzeugen schon Kriebeln in den Extremitäten

Rp	Coronillini	2,0	Pp	Coronillini	2,5
	Tincturae Coronill. var	20,0		Radix Althaeae	0,5
	Glycerini	5,0		Mucilag. Cydoniae q. s.	
	Sirupi Coffeae	5,0	M pulvae XXV	Consperge pulvere Posae	6 mal
3—6mal täglich 10 Tropfen.			täglich 1 Pille		

Coto

† Cortex Coto (Erganzb) Cortex Cotonis Cotorinde Kotorinde Ceorree de Coto. Coto bark

Seit 1874 bekannte Rinde von einem in Bolivia heimischen Baum aus der Familie der Lauraceen, der wahrscheinlich zur Gattung **Cryptocarya** oder einer naheverwandten Gattung gehört

Beschreibung Die Rinde bildet flache Stücke, die bis 10 cm breit, bis 7 mm dick sind, von mattbrauner Farbe Der Kork ist meist entfernt, die etwa vorhandenen geringen Reste sind von weisslicher Farbe Die ebenfalls braune Innenseite ist grob gestreift Der Bruch ist kurz und derb splittrig Der Querschnitt ist braun und lässt in grossen Mengen hellere Punkte erkennen, die mit der Lupe fein radialgestreift erscheinen Geruch schwach aromatisch, Geschmack gewürzhaft-scharf

Der Kork ist aus dünnwandigen Zellen und solchen, deren Innenwand und Seitenwände verdickt sind, geschichtet Im darauf folgenden Parenchym Steinzellen, die oft ebenfalls vorzugsweise an der Innenwand und den Seitenwänden verdickt sind Weiter nach innen ein fast geschlossener Ring aus Steinzellen, die isodiametrisch oder tangential gestreckt sind Im Bast ansehnliche Gruppen sehr stark verdickter, deutlich geschichteter Zellen Die einzelnen Zellen sind faserartig, etwas knorrig, bis 1100 μ lang und bis 150 μ breit Der zwischen diesen Gruppen gelegene Weichbast ist durch Gruppen zusammengefallener Siebröhren deutlich geschichtet Die Markstrahlen sind 2—3 Zellreihen breit, zwischen den Steinzellgruppen sklerosirt In den nicht verdickten Zellen der Markstrahlen und dem Parenchym feine nadelförmige Oxalatkryställchen Ueberall im Parenchym reichlich Oelzellen

Bestandtheile. Zu etwa 1,5 Proc Cotoin $C_{14}H_{12}O_4$ (vergl unten), Dicotoin $C_{28}H_{20}O_8$, Phenyleumalin $C_{11}H_8O_2$, atherisches Oel, Gerbstoff

Anwendung Als Mittel gegen Diarrhoe (0,5 g 3—4 mal täglich) Die Rinde ruft leicht Reizungen der Magenschleimhaut hervor und infolgedessen Uebelkeit, Aufstossen und Erbrechen Man zieht daher die Verwendung des Cotoins vor

† Cortex Paracoto, Paracotorinde Sehr bald nach dem Bekanntwerden der Cotorinde (1876) erschien eine zweite Cotorinde im Handel, ebenfalls aus Bolivia, die makroskopisch und mikroskopisch von der ersten nicht zu unterscheiden ist

Bestandtheile Paracotoin $C_{12}H_8O_4$ (vergl unten), Leucotin $C_{17}H_{12}O_5$, Oxy-leucotin, Hydrocotoin $C_{16}H_{14}O_4$, Protocotoin $C_{16}H_{14}O_6$, Methyl-Hydrocotoin $C_{16}H_{18}O_4$, Methyl-Protocotoin $C_{17}H_{16}O_6$, Piperonylsaure $C_8H_6O_4$, Gerbstoff, ätherisches Oel Letzteres ist farblos, von angenehmem Geruch, spec Gew 0,9275 Dichtung — 2,12°, es enthält Cadinen $C_{15}H_{24}$ und Methyleugenol, vielleicht noch ein Hydrat des Cadmens $C_{18}H_{28}O$ und Kohlenwasserstoffe $C_{11}H_{18}$ und $C_{12}H_{18}$

Anwendung Wie bei der vorigen

Falsche Cotorinden In neuester Zeit sind zwei solcher vorgekommen

1) Eine Rinde, die makroskopisch den echten Rinden gleicht, mikroskopisch sich von ihnen dadurch unterscheidet, dass sie ausser den grossen Fasergruppen im Bast noch Stab-

zellen enthält, und dass die Zellen des sklerotischen Ringes radial gestreckt sind. Sie riecht und schmeckt zimmtartig und enthält zu 0,145 Proc. ein Alkaloid, das mit Schwefelsäure und Eisenchlorid schmutzig grün, dann am Rande roth, endlich schmutzig violett wird. Sie enthält ferner zu 1,2 Proc. ätherisches Oel vom spec. Gewicht 1,108 und Drehung $-2^{\circ}40'$. Die Rinde stimmt mit der seit langem bekannten Rinde von *Cypocarya pretiosa* Mart. (*Mespidolaphne pretiosa* Nees) überein.

2) Eine Rinde, die in dicken rothbraunen Stücken vorkommt. Sie ist ausgezeichnet durch sehr grosse, knorrige, einzeln stehende faserförmige Zellen im Bast. Dieselbe Rinde ist zuweilen als Gerbrinde (*Curtidor*) nach Europa gekommen. Sie enthält 21 Proc. Gerbstoff. Vielleicht stammt sie von einer Sapotacee.

Aufbewahrung. In dicht verschlossenen Gefässen vorsichtig und vor Licht geschützt. Die Pulverung ist mit den nothigen Vorsichtsmassregeln auszuführen, da der Staub der Rinde die Schleimhäute der Luftwege angreift.

† **Extractum Coto fluidum.** Wird aus mittelfein gepulverter Cotorinde wie Extract Cocae fluid (S. 869) bereitet. **Antidiarrhoeum.** Gabe 5–10 Tropfen mehrmals täglich.
† **Tinctura Coto.** Cototinktur. Ergänzb. 1 Th. grob gepulverte Cotorinde, 5 Th. verdünnter Weingeist — **Dietetik.** 20 Th. Cotofluidextrakt, 80 Th. verdünnter Weingeist. Vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren. Gabe 2stündlich 10 Tropfen.
Nation Form. Grob gepulverte Cotorinde 125,0, Alkohol von 94 Vol. Proc. q. s. zu 1 Liter Tinktur.

† **Cotoinum.** Cotoin $\text{CH}_3\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$ (Ergänzb.)

Darstellung. Echte Cotorinde wird mit Aether extrahirt, der Aether abdestillirt und der Rückstand mit Ligroin vermischt. Man giesst vom ausgefällten Harze ab und lässt die Lösung an der Luft verdunsten. Das so erhaltene Cotoin krystallisirt man aus Wasser um.

Eigenschaften. Aus Wasser in blassgelben, gekrümmten Prismen, aus Alkohol und Chloroform in Tafeln krystallisirend. Schmelzpunkt $130-131^{\circ}\text{C}$. Optisch inaktiv. Wenig löslich in kaltem Wasser, leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol, Aceton, unlöslich in Ligroin. Reducirt in der Kälte Silberlösung, in der Wärme Fehling'sche Lösung. — In Eisessig gelöst, dann mit concentrirter Salpetersäure versetzt, giebt Cotoin eine blutrothe Färbung und der Staub erregt Niesen und Hustenreiz.

Anwendung. Gegen Diarrhoe 0,005–0,01–0,05 g ein- bis dreimal täglich. — Grösste Einzelgabe 0,3, grösste Tagesgabe 1,0. Man verwendet an seiner Stelle meist das folgende

† **Paracotoinum.** Paracotoin. $\text{CH}_3 \begin{array}{c} \diagup \text{O} \diagdown \\ \diagdown \text{O} \diagup \end{array} \text{C}_6\text{H}_3 \begin{array}{c} \diagdown \text{C} \diagup \\ \diagup \text{O} \diagdown \end{array} \begin{array}{c} \text{OH} \text{ OH} \\ \parallel \\ \text{CO} \text{ CH} \end{array}$ (Ergänzb.)

Darstellung. Paracotorinde wird mit Aether ausgezogen und der Aether verdunstet. Die auskrystallisirte Masse wird abgepresst und in heissem Alkohol gelöst, beim Erkalten krystallisirt zuerst Paracotoin aus.

Eigenschaften. Blassgelbe, glänzende Blättchen. Schmelzpunkt 155°C . Etwas löslich in kochendem Wasser, leicht löslich in Aether, Chloroform, Aceton und kochendem Alkohol, schwer in Benzol und Essigsäure. Paracotoin in Eisessig gelöst, wird durch concentrirte Salpetersäure anfangs gelb, dann grün. (Die Reaktion kommt eigentlich dem Oxyleucotin zu, mit dem das käufliche Paracotoin immer verunreinigt ist.)

Anwendung. Bei Darmkatarrh, sowie bei Diarrhoe zu 0,1–0,5 g bis dreimal täglich.

Mixtura Coto

Rp Tinctura Coto
Tincturae Cardamomi aa 2,5
Sirupi Sacchari 10,0
Aque destillatae 180,0
Mucilaginis Gummi arab. 15,0

Bei Durchfall mehrmals täglich eßlöffelweise.

Mixtura Cotoini

Rp Cotoini 0,05–0,08
Spiritus diluti 10,0
Aq. destillat. 120,0
Sirupi Sacchari 30,0

Stündlich bis zweistündlich 1 Eßlöffel voll.

Corylus.

Gattung der Betulaceae.

Liefert von mehreren Arten essbare Früchte, die auch hier und da medicinisch verwendet werden, so *Corylus Avellana* L., die Haselnuss, in Europa, *C. tubulosa* Willd., die Lambertsnuss, in Südosteuropa, *C. Colurna* L., die Baumhasel, Dicknuss, türkische Nuss, im Orient und Himalaya, *C. rostrata* Ait. in Nordamerika. Verwendung findet das Oel der Früchte der erstgenannten Art. *Hulle du noisetier* (Gall.)

Bestandtheile der Früchte von *Corylus Avellana* nach KOENIG: Wasser 7,11 Proc., Stickstoffsubstanz 17,41 Proc., fettes Oel 62,60 Proc., Stickstofffreie Extraktstoffe 7,22 Proc., Holzfaser 3,17 Proc., Asche 2,49 Proc. Das Oel hat das specifische Gewicht 0,917, es erstarrt bei -20°C . Jodzahl 88. Die Haare der Cupula der *C. rostrata* sollen gegen Eingeweidewürmer angewendet werden.

Crocus.

Gattung der Iridaceae — Crocoidae.

Crocus sativus L. var. α -auctumnalis. Im wilden Zustande nicht bekannt. *Crocus sativus* ist heimisch wahrscheinlich in Kleinasien und Griechenland, aber mit der die Droge liefernden Pflanze, die steril ist, nicht identisch. Verwendung finden die Narben der Blüthe: *Crocus* (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). *Crocus orientalis*. *Stigmata Croci*. — Safran. Gewürzsafran. Safran (Gall.). — Saffron.




Fig. 227. (Nach PLANCHON.)
Narben von *Crocus sativus*.

Beschreibung. Der Blütenstiel ist bis 2 cm, das Perigon 10–15 cm lang, blassviolett mit dunkleren Streifen, am Schlunde bürstig, die Abschnitte oblong, stumpf. Die 3 Antheren etwa halb so lang als der Saum des Perigons. Der Griffel etwas länger als die Röhre des Perigons, die 3–3,5 cm langen Narben zwischen den Zipfeln des Perigons herabgebogen. Sie sind am unteren Ende heller gefärbt, dünn, nach oben dunkelroth, keilförmig verbreitert, aufgeschlitzt. Am oberen Rande kleingelappt, papillös, häutig, biegsam, zähe (Fig. 227). In der Droge sind die Narben durch das Trocknen zusammengefallen und durcheinander gewirrt, nach Aufweichen in Wasser, ev. unter Zusatz von $\frac{1}{4}$ Ammoniak tritt die Form deutlich hervor. — Der Geruch ist stark gewürzhaft, fast narkotisch, der Geschmack bitterlich gewürzhaft, etwas scharf.

Auf dem Querschnitt zeigt der Safran einen sehr einfachen Bau. Die Zellen der Epidermis sind an einer Stelle papillös vorgewölbt und von der Cuticula bedeckt, welche




Fig. 228. (Nach PLANCHON.)
Narben von *Crocus vernus*.

sich in Wasser leicht ablöst, da die darunter liegende Membran verschleimt ist. Zwischen den Epidermen dünnwandiges Parenchym und zarte Gefäßbündel mit Spiralgefäßen. In den Epidermen und im Parenchym gelbe Chromatophoren und gelb gefärbter Zellsaft (Polychroit). Bei der Untersuchung des Safrans stößt man häufig auf die runden, dickwandigen Pollenkörner.

Bestandtheile nach KOENIG:

	Wasser	Stickstoff- haltige Sub- stanz	Flüchtiges Öl	Fett	Zucker	Stickstoff- freie Ex- traktstoffe	Holzruhr	Asche	in der Trockensubstanz		
									Stick- stoff- haltige Sub- stanz	Flüch- tiges Öl	Fett
Procent											
Spanischer . . .	15,90	12,57	0,75	3,75	11,99	42,81	4,68	4,05	14,95	0,89	4,46
Gatinalis . . .	14,45	13,53	0,91	8,03	12,51	41,89	4,38	4,25	15,87	1,06	9,34

Ueber den Aschengehalt gehen die Angaben der Litteratur weit auseinander, er wird in anscheinend unverdächtigem Safran bis zu 10 Proc angegeben. HILGER führt als höchsten zulässigen Aschengehalt 8 Proc an, wovon 0,5 Proc in Salzsäure unlöslich sind. Die Asche enthält Aluminium.

Die Pharmakopöen normiren den zulässigen Aschen- und Wassergehalt folgender massen

		Germ	Helv	Austr	Brit	U-St
Asche	Proc	7,5	7,5	8	7	7,5
Wasser	Proc	14,0	14,0		12,5	14,0

Der wichtigste Bestandtheil ist der glykosidische Farbstoff Polychroit oder Crocin $C_{14}H_{10}O_{26}$, der Crocetin $C_{32}H_{48}O_9$ und Dextrose liefert. Das Polychroit ist löslich in Wasser und verdünntem Weingeist, wenig löslich in starkem Weingeist und Aether. Salzsäure löst es mit gelber Farbe, Schwefelsäure mit blauer Farbe. Ausser im Safran findet es sich in den chinesischen Gelbschoten von *Gardenia spec.*, in der *Fabiana imbricata* und in der *Tritonia aurea* (vergl. unten). Nach neuesten Untersuchungen von HILGER und SCHULZER ist der Farbstoff identisch mit Carotin. Bei der Destillation des Safrans mit Schwefelsäure und ätherisches Oel in Menge abgespalten.

Ferner enthält der Safran das in farblosen, prismatischen Krystallen krystallisierende Picrocrocin oder Safranbitter $C_{38}H_{56}O_{17}$.

Sorten. Es sind gegenwärtig im Handel nur zwei von Bedeutung.

1) Französischer oder Gâtinais-Safran, hauptsächlich kultivirt im Arrondissement Pithiviers-en-Gâtinais, nördlich von Orleans. Man unterscheidet 2 Sorten Safran d'Orange, durch künstliche Wärme getrocknet, von besonders lebhafter Farbe, und Safran comtat, an der Sonne getrocknet, weniger geschätzt. Der französische Safran ist der beste.

2) Spanischer Safran in der Provinz Murcia bei Albacete, Andalusien bei Huelva, Valencia bei Alicante, ferner auf den Inseln Palma und Mallorca kultivirt. Der spanische Safran gilt als weit weniger gut, wie der französische, er ist sehr häufig verfälscht, kommt aber, wenn in Frankreich wenig producirt wird, als französischer oft genug zu uns. Da das Einsammeln und Trocknen sehr mühsam ist, so geht die Kultur im all gemeinen zurück, in manchen Ländern, wie Oesterreich und der Schweiz, die früher er hebbliche Mengen producirt, ist sie so gut wie verschwunden.

Prüfung. Dieselbe erstreckt sich zunächst auf die Feststellung, dass wirklich Safran vorliegt (vergl. oben), ferner auf die Bestimmung des Asche- und Wassergehaltes und auf die Fähigkeit, grossere Mengen Wasser gelb zu färben. Germ schreibt vor, dass 1 Th 100 000 Th Wasser gelb färben sollen, ebenso Helv und U-St. Austl 1 : 80 000. CASAR und LORETZ empfehlen neuerdings 0,3 g Crocus mit 300,0 g Wasser mehrere Stunden zu maceriren. Von dieser Lösung soll $\frac{1}{10}$ ccm (= 0,0001 g Crocus) genügen, 100 ccm Wasser deutlich zu färben, also 1 : 1 000 000. Die Bestimmung des Asche- und Wassergehaltes ist wichtig, da viele der im Folgenden aufgeführten Verfälschungen gerade diese sehr bedeutend erhöhen.

Bei der Untersuchung des Pulvers ist der mikrochemische Nachweis des Polychroits von grosser Wichtigkeit. Man breitet eine kleine Menge des zu untersuchenden Pulvers sorgfältig auf dem Objektträger aus, so dass die einzelnen Partikelchen möglichst nicht berühren, und lässt dann, während man bei schwacher ($80\times$) Vergrösserung beobachtet, aus einer Pipette einige Tropfen concentrirter Schwefelsäure zufließen. Alle Partikelchen, die aus Safran bestehen, werden vorübergehend schön blau und violett, während die Verfälschungen gelb, roth, braun, schwarz etc. werden. Hat man auf diese Weise festgestellt, ob überhaupt eine Verfälschung mit einem fremden Pflanzentheile vorliegt, so ist es Sache der weiteren, oft ziemlich schwierigen, mikroskopischen Untersuchung, deren Natur zu ermitteln. Zum Zweck dieser Untersuchung kann man das Pulver in Chloralhydratlösung (8 Chloral 2 Wasser) aufhellen.

Vergl ferner Vinassa, Arch d Ph 1892, S 353 und Tschirch-Oesterle Anatomischer Atlas, S 93

Verfälschungen Der Safran ist ausserordentlich häufigen Verfälschungen ausgesetzt, die im Folgenden aufgeführten sind etwa innerhalb der letzten 15 Jahre vorgekommen

A Ohne Zusatz oder Substitution fremder Substanzen

1) Der Safran ist mit solchem gemengt, dem der Farbstoff ganz oder theilweise entzogen ist Solcher Safran ist hell, spröde, mit geringer oder ohne Farbekraft (vergl oben) Oft ist solcher Safran mit „Rouge soluble“ (Sulfonatiumocellin) aufgefabt Er färbt dann Wasser röthlich oder orange

B Verfälschung mit Theilen der Safranpflanze

2) mit den hellgefärbten Griffeln, die unter dem Namen „Feminelle“ einen Handelsartikel bilden Da beim Herauszipfen der Narben aus der Blüthe häufig der Griffel ganz oder theilweise daran haften bleibt, so lassen Germ, Helv, Austr, Brit dieselben in geringer Menge zu Die zur Herstellung ganz reinen Safrans ausgelesenen Griffel werden aber oft in grösserem Umfange beigelegt

3) Das in Streifen geschnittene, gerollte und gefärbte Perigon sowie die Staubblätter erkennt man beim Aufweichen, die letzteren an den zahlreichen Pollenkörnern, die ersten haben Spaltöffnungen

C Verfälschung mit Beschwerungsmitteln, um das Gewicht zu vermehren

4) Der Safran wird längere Zeit in einem feuchten Keller aufbewahrt, um Wasser anzuziehen

5) Der Safran wird mit Zuckersirup, Honig, Glycerin oder fetten Oelen beschwert (giebt, auf Papier gedrückt, Flecken)

6) Ausserdem setzt man ihm weitere Beschwerungsmittel zu Baryumsulfat, Calciumkarbonat, Gips, Stärkemehl, solche Beschwerungsmittel sind bis zu 60 Proc beobachtet worden Sie sind als krustiger Ueberzug der Narben meist schon bei schwacher Vergrösserung zu erkennen Beim Behandeln mit Wasser liefern solche Beschwerungsmittel ein Sediment im Wasser, das dann weiter mikroskopisch (Stärke) oder chemisch untersucht wird Ueber mineralische Beschwerungsmittel giebt ferner die Aschenbestimmung Aufschluss Die Verfälschung mit Baryumsulfat wird auch so ausgeführt, dass man den Safran mit einem löslichen Baryumsalz und dann darauf folgend mit einem Sulfat behandelt

D Verfälschung mit Theilen fremder Pflanzen

7) Mit den Blüthen von *Carthamus tinctorius* L (vergl S 659)

8) Mit den Blüthen von *Calendula officinalis* L (vergl S 577) Für den Nachweis dieser beiden Kompositenblüthen im Pulver ist besonders auf die Pollenkörner zu achten, die stachelig oder warzig sind

9) Mit den Narben anderer Krokusarten Diese sind meist kürzer und ohne Färb vermögen Diejenigen von *Crocus vernus* (Fig 228) sind vorn breiter und tiefer gekerbt, die von *Crocus speciosus* sind gabelspaltig getheilt

10) Zerschnittene Blüthen von *Papaver Rhoeas* L, *Punica Granatum* L, Staubfaden einer Nelke, Blüthen von *Arnica montana* L, *Scolymus hispanicus* L

11) Zerschnittene und gefärbte Zwiebelschalen

12) Pulver von *Capsicum* fruchten (bis zu 70 Proc im Pulver beobachtet)

13) Zerschnittene und gefärbte, grasartige Pflanzen (*Carex capillaris*?)

14) Mit einem Eosin-Azofarbstoff gefärbte Kemptpflanzen einer Leguminose (*Vicia*?)

15) Würzelchen von *Allium Porrum*

16) Gepulvertes Sandelholz (an den Bruchstücken grosser Gefässe leicht zu erkennen)

17) Kurkuma Der ätherische Auszug hinterlässt beim Verdunsten einen gelben Fleck, der mit Borax und Salzsäure braun wird

E Verfälschung mit thierischen Stoffen

18) Als solche sind Fasern gepökelten und getrockneten Fleisches beobachtet

F Verfälschung mit Kunstprodukten

19) Gelatinefäden, mit einem rothen Farbstoff getränkt

G Verfälschung mit organischen Farbstoffen

20) Dimnitkresol-Kalium oder -Ammonium (Safransurrogat, chemischer Safran), Martiusgelb und Tropaeolin (Safran Algeri), Fuchsin

21) Als Safransurrogat kommt auch vor ein Gemenge von 4 Th Weizenmehl, 2 Th Safran, 2 Th Kurkuma, 1 Th Sandelholz und etwas Gewürz

Einkauf Pulverung. Den Anforderungen der Arzneibücher entspricht nur die als *Crocus electus* bezeichnete, durch künstliche Wärme getrocknete Sorte Das Pulvern

des Safrans geht leicht von statten, wenn man ihn einige Stunden über Aetzkalk, oder bei einer Wärme von höchstens 25° C (Gall) nachtrocknet, er giebt hierbei etwa 10 Proc Feuchtigkeit ab. Safranpulver sollte, da der hohe Preis desselben zu Verfälschungen Anlass giebt, nur aus ganz zuverlässiger Quelle käuflich bezogen werden.

Aufbewahrung. Safran und Safranpulver bewahrt man in gut verschlossenen, gelben Hafenglasern an einem kühlen Orte auf.

Anwendung. Innerlich giebt man ihn als Pulver zu 0,1—0,8 — 1,0 g, als Tinktur zu 15—60 Tropfen, als Sirup theelöffelweise bei Keuchhusten und Krämpfen — Im Haus halt vielfach zum Färben von Speisen, zarten Geweben („Gardinencrems“), seltener als Gewürz. Er gilt als Stomachicum, Antihystericum und Emmenagogum. Da Safran innerlich in Gaben von 5—15 g Abortus bewirken soll, so giebt man ihn in solchen Mengen mit der nothigen Vorsicht ab.

Extractum Croci (Gall.) ist wie **Extract Colocynthis** Gall (S 934) zu bereiten. Ausbeute etwa 50 Proc.

Sirupus Croci. Sir de Croco. Safransirup. Sirop de Safran. Ergänzb. 2 Th Safran zieht man 2 Tage mit 45 Th Weisswein aus und bereitet aus 40 Th Filtrat und 60 Th Zucker 100 Th Sirup — Gall. 25 Th Safran macerirt man 24 Stunden mit 440 Th Roussillonwein (Grenache), sammelt 440 Th Filtrat und löst darin 560 Th Zucker — Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Tinctura Croci. Safran tinctur. Teinture de Safran. Tincture of Saffron. Ergänzb. Helv. 1 Th Safran, 10 Th verdünnter Weingeist — Brit. 50 g Safran, 1000 ccm Weingeist (80 Vol-Proc) — U-St. 100 g Safran, verdünnter Weingeist (41 Proc) q s, durch Verdrängung sammelt man 1000 ccm — Gall. 1 Th Safran, 10 Th Weingeist (80 proc) — Vor Licht geschützt aufzubewahren. 5 Tropfen (nach Helv. ¹/₁₀ Tropfen) färben 1 Liter Wasser noch deutlich gelb.

Aqua Vitae auren
Elixir de quinquina et de safran
Liquenr dorée.

Rp Tincturae Cinnae
Tincturae Croci
Tincturae Cinnamomi
Tincturae Aurantii cort. 55 100,0
Spiritus (90 proc)
Vinum Hispanici 55 2000,0
Aqua Aurantii flor
Aqua Rosae 55 200,0
Sirupi Sacchari 2000,0

Cataplasmata antophthalmicum FLECK.

Rp Croci pulverati 0,7
Vitellum ovi unius
Micas panis albis recent. 85,0

Außerlich, bei Augenentzündung.

Electuarium Croci compositum
Electuaire de safran composé (Gall.)
Confection d'Hyacinthe.

Rp. 1 Croci pulverati 10,0
2 Mellis albi 240,0
3 Sirupi Tunicae hortensis¹⁾ 450,0
4 Myrrhae subit pulver 10,0
5 Ligni Santali citrini pulv 10,0
6 Ligni Santali rubri pulv 10,0
7 Herbae Dictamnii caerulei pulv 10,0
8 Cinnamomi Ceylanici pulv 30,0
9 Lapidum Cancrorum pulv 30,0
10 Terrae sigillatae pulv 80,0

Man stellt 1 mit der erwärmten Mischung von 2 und 3 während 12 Stunden bei Seite und mischt dann 4—10 hinzu.

Elixirium Gari

Elixir de Garus (Gall.)

Rp 1 Spiritus Gari (S 225) 1000,0
2 Fructus Vanillae 1,0
3 Croci 0,5
4 Herbae Adiant. pedati 20,0

5 Aquae destillatae ebullientis 500,0
6 Aquae Aurantii florum 200,0
7 Sacchari albi 1000,0

1, 2, 3 zwei Tage maceriren, Aufguss von 4 mit 5 zur Lösung von 7 in 6 zufügen, das Ganze mischen und filtriren.

Ex tempore

Rp Spiritus Gari 45,0
Sirupi Aurantii flor 50,0
Tincturae Croci 2,5
Tincturae Vanillae gtt V

Emplastrum oxycroceum

Safranpflaster. Oxycroceumpflaster.

Harsiges Safranpflaster.

Ergänzungsbuch.

Rp 1 Cerae flavae 60
2 Colophoni 80
3 Resinae Pini 60
4 Ammoniaci 20
5 Galbani 20
6 Terebinthinae 20
7 Mastiches pulv subit 20
8 Myrrhae pulv subit 20
9 Olibani pulv subit 20
10 Croci pulv subit 10

1—8 im Dampfbade schmelzen, ebenso 4—6, beide mischen, und 7—10 hinzusetzen.

Helvetica

Rp 1 Cerae flavae 35,0
2 Colophoni 25,0
3 Elemi 10,0
4 Galbani (V) 5,0
5 Ammoniaci (V) 5,0
6 Myrrhae (V) 5,0
7 Terebinthinae 12,0
8 Croci (VI) 1,0
9 Extracti Ratanhiae 2,0

1—8 im Dampfbade schmelzen, Lösung von 4—6 in 7, zuletzt 8—9 mit Spir dilut angerührt zufügen.

¹⁾ Sirup d'oeillet, aus den Blüten von Dianthus Caryophyllus wie Sirup Rhoeados zu bereiten (vergl. Dianthus).

Austriaca		
Rp	Cerae Harae	50,0
	Celophonit	100,0
	Ammoniac) via humid	
	Galbani) depurati ad	25,0
	Erebantidae laticinae	25,0
	Olibani subit pulver	
	Masches „	ad 30,0
	Croci „	10,0
Bereitung wie bei vorigem		

Pillulae Croci compositae GAYROIS.		
Rp	Croci	4,0
	Asae foetidae	4,0
	Extracti Opil	0,4
	Extracti Valerianae	2,0
Man formt 50 Pillen 3—4mal täglich 2 Stück		
bei Menstrualbeschwerden		
	Ptisana de Croco sativo	
	Tisane de safran (Gall)	
Rp	Croci	0,2
	Aquae destillatae ebull	100,0
Nach $\frac{1}{2}$ Stunde sieht man durch		

Käsefarbe. Zur Erzielung einer beständigen Gelbfärbung eignet sich besonders höchst fein gepulverter Safran

Kindertinktur, schmerzstillende, von PASQUALE CATHERINUS, enthält die Bestandtheile aus Jalape, Safran, Muskatnuss, Zimmt, Pfefferminze, Kummel

KRINTS' altbewährtes Lebensextrakt ist eine mit Safranauszug versetzte Rhabarbertinktur

Sirop de dentition de Delabarre, zum Erleichtern des Zahnens, besteht aus 7,5 Safrantinktur, 1,0 Brechwurzelinktur und je 50,0 Süssholz- und Rhabarbersirup

Zahnsirup von MARKS ist mit Safran versetzter Zuckersirup

Croton.

Gattung der Euphorbiaceae — Platylobeae — Crotonoideae.

I Croton Eluteria, vergl S 669

II Croton Tiglium L., heimisch im tropischen Asien und vielfach kultivirt Verwendung finden die Samen

† Samen Crotonis Semen Grana Tigli s Moluccana Krotonsamen Krotonkorn Granatill. Purgikorn. — Graine de Tilly Graine des Moluques (Gall)

Beschreibung. Sie sind etwa eiförmig, 10—12 mm lang, 4—8 mm breit, auf dem Rücken mit stumpfem Längskiel, auf der Bauchseite mit deutlich sichtbarer Raphe, an dem einen Ende mit kleiner Caruncula. Die Farbe ist meist schmutzig graubraun mit dunkleren Flecken. Die dünne Samenschale umschließt ein fleischiges Endosperm und den Embryo mit blattartigen Cotyledonen. In beiden neben fettem Oel und Plasma Aleuronkörner, die ein Krystallloid und Globoid enthalten. Geschmack anfangs milde und ölig, bald kratzend und anhaltend brennend. Das Gewicht der Schalen macht etwa 30 Proc. der Samen aus

Bestandtheile 50—60 Proc fettes Oel Ol Crotonis, vergl unten Benzin lost aus den Samen 33,3 Proc., Schwefelkohlenstoff 33,7 Proc., Chloroform 23,0 Proc

Aufbewahrung und Anwendung Krotonsamen werden vorsichtig aufbewahrt und im Handverkauf nicht abgegeben. Nur selten dienen sie noch in der Tierheilkunde als Abführmittel, man giebt einem Pferde 4 bis höchstens 8 Samen (!) mit Kleie. Bei Menschen können schon 4 Samen tödtlich wirken

Auch andere Theile der Pflanze das Holz (Lignum Pavanae, Lignum moluccanum), die Wurzel und Blätter wirken purgirend

† Oleum Crotonis (Austr Brit Germ) Oleum Tigli (Helv U-St.) Huile de Croton Tiglium (Gall) Kroton Oel. Croton oil Granatillol

Das in den Krotonsamen enthaltene Oel kann durch Pressung oder durch Extraktion der Samen mit Aether, Schwefelkohlenstoff und dergl gewonnen werden. Ausserdem ist es nicht ganz gleichgültig, ob die enthulsten oder nicht enthulsten Samen zur Gewinnung benutzt werden. Es schreiben vor Brit, Helv und U St. Durch Pressung der Samen Austr und Germ. Durch Pressung der enthulsten Samen Gall. Durch Pressung der enthulsten Samen oder Extraktion derselben mittelst Aether

Darstellung 1) Man hebst alte, dunkelbraun gewordene, verdorbene Samen auspulvert die zurückbleibenden unverdorbenen, und presst aus ihnen das fette Oel in der

unter *Oleum Amygdalarum* (S 280) angegebenen Weise 2) Man schält die sub 1) erhaltenen unverdorbenen Samen, pulvert die Samenkerne und presst aus ihnen das Oel 3) Man pulvert die geschälten Samen und extrahirt sie im Soxhlet'schen Extraktionsapparat mit Aether Nach dem Verdunsten (oder Abdestilliren) des Aethers bleibt das Krotonol zurück

Das gewonnene Oel wird nach mehrtägigem Absetzen durch ein getrocknetes Filter an einem warmen Orte filtrirt Die Ausbeute beträgt bis zu 30 Proc vom Gewicht der Samenkerne

Vorsicht! Alle Rückstände (Samenschalen, Presskuchen und Filter) sind sofort durch Verbrennen zu vernichten Man hute sich auch vor den flüchtigen Bestandtheilen der Krotonsamens und vermeide jede direkte Beührung mit der blossen Hand

Im Handel unterscheidet man Ostindisches und Englisches Krotonol Ersteres ist gelblich, letzteres braungelb, aber von starkerer Wirkung Wenn es möglich ist, so bereite man das Oel selbst, anderenfalls bemühe man sich, gute Handelsmarken zu erlangen Eine solche ist die in kleinen Flaschchen vorkommende, mit der Signatur „*Croton Oil, sold by A Short, Ratcliff, Highway, London*“

Eigenschaften Krotonöl ist ein fettes, gelbbraunes, dickflussiges Oel, welches zwischen den trocknenden und den nichttrocknenden Oelen, den erstere näher steht Es besitzt einen schwachen, aber eigenthümlichen und unangenehmen Geruch, und rothet infolge seines Gehaltes an freien Säuren angefeuchtetes blaues Lackmuspapier Der Geschmack ist anfangs mild, hinterher sehr scharf und anhaltend kratzend und schmerzhaft brennend (Vorsicht!) In 90proc Weingeist ist es nur zum Theil löslich Der die Hauptmenge ausmachende, in 90proc Weingeist lösliche Antheil ist allein der Träger der drastischen Wirkung, der in 90proc Weingeist unlösliche Antheil ist unwirksam

In dem doppelten Volumen absoluten Weingeistes ist Krotonol häufig schon bei gewöhnlicher Temperatur, jedenfalls aber beim Erwärmen vollig löslich Das spec Gew ist bei 15°C nach Brit Germ U St = 0,940 bis 0,960, nach Austr = 0,940 bis 0,950 also höher als dasjenige anderer fetter Oele, von denen sich in dieser Beziehung nur Ricinusöl und Leinöl dem Krotonöl nähern Krotonol erstarrt bei etwa -16°C Jodzahl = 90 bis 100

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Krotonöl ein Gemenge der Glyceride der Stearinsäure, Palmitinsäure, Myristinsäure, Laurinsäure, Oenanthylsäure), Capronsäure, Valeriansäure, Buttersäure, Krotonolsäure (Krotonoleinsäure), Tiglinsäure Ausserdem enthält es wechselnde Mengen freie Säuren, unter ihnen (etwa 4 Proc) freie Krotonolsäure (Krotonol) nach Siegel $C_{10}H_{18}O_2$

Die Krotonolsäure oder das „Krotonol“, welchem bisher die blasenziehenden Eigenschaften des Krotonöls zugeschrieben wurden, ist nach DUNSTAN und Fil BOOLE ein Gemisch von meist unwirksamen Fettsäuren mit einem Harz (Krotonharz)

Krotonharz $C_{18}H_{18}O_4$, fast unlöslich in Wasser und Benzin, leicht löslich in Alkohol, Aether und Chloroform Schmelzpunkt 90°C Es ist kein Glycerid, sondern voraussichtlich ein Laktone oder komplirtes Anhydrid

Prüfung. 1) Von Wichtigkeit ist die Feststellung des specifischen Gewichtes, weil das Krotonöl höher ist als dasjenige aller anderen fetten Oele mit Ausnahme des Ricinusöls 2) Ferner ist wichtig die Löslichkeit in dem doppelten Volumen absolutem Weingeist, obgleich das Krotonöl die Auflöslichkeit etwa beigemengter fremder Oele, welche an sich in absolutem Weingeiste nicht in gleichem Maasse löslich sind, begünstigt und namentlich Ricinusöl ein gleiches Verhalten gegen absoluten Weingeist zeigt 3) Von Wichtigkeit ist endlich der Ausfall der Elaidinprobe, bei welcher reines Krotonol tagelang flüssig und hellfarbig bleibt, während ein mit nichttrocknenden Oelen versetztes Krotonol innerhalb eines Tages theilweise fest wird oder körnige Antheile abscheidet

2 Raumtheile Krotonöl, nach Zusatz von 1 Raumtheile rauchender Salpetersäure und 1 Raumtheil Wasser kräftig geschüttelt, dürfen nach 1—2 Tagen weder ganz, noch theilweise erstarren

Aufbewahrung Weil das Krotonöl aus der Luft leicht Sauerstoff aufnimmt, wobei es sich verändert und verdickt, auch mehr freie Krotonolsäure abspaltet, so bewahre man es vorsichtig neben anderen starkwirkenden Substanzen in kleinen, möglichst ganz gefüllten und gut geschlossenen Gefäßen vor Tageslicht geschützt auf

Anwendung. Auf die Haut gebracht, erzeugt Krotonöl Brennen, dann Rötung, schliesslich einen pustulösen Ausschlag. Man benutzt es daher ausserlich zu abtötenden Einreibungen. Innerlich wirkt es in Gaben von $\frac{1}{4}$ bis 1 Tropfen drastisch abführend. Man giebt es daher als Laxans, wenn alle Mittel im Stiche lassen. Die Wirkung tritt ungemein schnell ein. Krotonöl darf nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden.

Höchstgaben pro dos 0,05 g, pro die 0,1 g (Austr. Germ. Helv.)

Rp Olei Crotonis gtt I
Sacchari Lactis 3,0
Divide in part 8 2stündl 1 Pulv

Rp Olei Crotonis gtt II
Olei Ricini 60,0
2stündl 1 Esslöffel

Die Beseitigung von Muttermalen geschieht nach Dr. SIGLER durch dreimalige Anwendung von Krotonöl nach Art des Lebensweckers (s. unter Euphorbium)

Bacilli Olei Crotonis Limousin
Krotonstifte Crayons à l'huile de
Croton

Linimentum contra calvitium HOCHSIEDEL

Rp Olei Amygdalarum 16,0
Olei Crotonis 0,5

Rp Olei Cacao
Cerae flavae 5,0
Olei Crotonis 10,0

Linimentum Crotonis
Liniment of Croton Oil (Brit.)

Man formt Stifte von 8—9 mm Dicke

Rp Olei Crotonis 20 ccm
Olei Cajuputi 70 ccm
Spiritus (90%) 70 ccm

Charta epispastica
Papier épispastique (Dieterich)
a stärkeres

Linimentum Tiglli (Nat. form.)

Rp Cerae flavae 50,0
Terebinthinae 20,0
Olei Crotonis 25,0

Olei Crotonis 12 ccm
Olei Cajuputi 44 ccm

b schwächeres
Rp Cerae albae 50,0
Terebinthinae 35,0
Olei Crotonis 15,0

Rp Spiritus (94 Vol Proc) 44 ccm

Linimentum Tiglli compositum (Nat. form.)

Rp Olei Terebinthinae
Olei Sassafras
Olei Crotonis 20 ccm
Olei Olivarum 40 ccm

Die geschmolzene und erkaltende Masse wird mit einem Pinsel auf geöltes, ungesättigtes Schreibpapier gestrichen

Clysmata antidyenterica KONOPLIEFF

Mixtura antispastica

Rp Olei Crotonis 0,05 (0,1—0,2)
Olei Olivarum 30,0
Gummi arabici 15,0
Aquae destillatae 120,0
Extracti Hyoscyami 0,1 (0,2—0,3)

Rp Olei Crotonis 0,1
Sacchari albi 10,0
Gummi arabici
Tincturae Cardamomi 20
Aquae destillatae 60,0

D 8 Zum Klystier

Mehrmals täglich 1 Theelöffel, bei Gehirnhaute-
zündung

Colledium crotonatum
Krotonöl-Kolloidum

Oleum Crotonis argillatum

Rp Olei Crotonis 2,5
Colloidi elastici 7,5

Rp Olei Crotonis 1,0
Argillae purae 9,0

Zur Peizung der Haut und Erzeugung von Pusteln.

Colledium Tiglli (Nat. form.)

Dient in der pharm. Rezeptur zum gewissen Ab-
wägen kleiner Mengen Krotonöl. Nur kurze
Zeit haltbar

Rp Olei Crotonis 1,0
Colloidi (U-St) 9,0

Oleum Ricini artificiale

Rp Eleosaccharum Crotonis
Eleosaccharum Cinnamomi 10,0
Olei Crotonis gtt II

Ph. paup
Rp Olei Crotonis gtt I
Olei Papaveris 80,0

Emulcatio Tiglli iodata
New-Yorker Formel

Rp Olei Crotonis 1 vol
Aetheris 2 "
Tincturae Jodi comp 5 "

Zu 20 Pillen 3mal wöchentlich 1—3 Pillen

Emulsio antidyenterica KONOPLIEFF
Rp Olei Crotonis 0,1 (—0,15)
Olei Amygdalarum 20,0
Gummi arabici 10,0
Aquae Menthae piperit 160,0
Aquae Laurecerasi 5,0 (—10,0)
Sirupi Amygdalarum 40,0

Pillulae hydragogae SCHLESIER
Rp Olei Crotonis 0,1 (gtt III)
Extracti Colocynthis
Gutta 20
Radices Althaeae q s

2stündl 1 Esslöffel, Kindern 1 Theelöffel

Zu 8 Pillen Morgens 1 Pille

Sapo Crotonis
Aus Krotonöl wie Sapo medicatus zu bereiten.
Dosis 0,1—0,15—0,2

Tinctura Crotonis
Rp Semina Crotonis pulv 10,0
Spiritus 100,0
Man digerirt einen Tag und filtrirt.

Yel **Oleum acro GÉNEAU**
Fp Olei Crotonis 40
Olei Cantharidum (Gall) 20,0
Olei Terbinthiniae 20,0
Olei Rapae 60,0
Olei Alkannae q s

Yel **Pilula laxativa fortior**
Rp Aloes pulvrat 20,0
Olei Crotonis gtt VIII
Saponis viridis 5,0
Zu einer Pille für Pferde Auf einmal zu geben,
wenn Aloe allein nicht wirkt

Malicizol des Pfarrers KNEIPP 1 Th Krotonöl, 6 Th Mandelöl

III **Croton Pavana** Hamilton, heimisch in Indien, liefert Samen, die etwas kleiner und dunkler sind als die vorigen, aber noch heftiger wirken, ebenso werden die Samen von **Croton oblongifolius** Roxb (Kowli seeds) benutzt

IV **Croton lacciferus** L in Ostindien, Ceylon und Cochinchina liefert Schellack (vergl dort)

V **Croton salutaris** Casar, **Croton Paulinianus** Mull Arg, beide in Brasilien, **Croton Draco** Schlechtendal in Mexiko, **Croton hibiscifolius** Kth in Neu Granada und andere Arten liefern Drachenblut

VI **Croton phebalioides** R Br in Neu Südwaies, **Croton flavens** L in Westindien, liefern der Cascarella ähnliche Rinden Die jungen Triebe der letztgenannten Art var balsamiferus werden wie Insektenpulver benutzt, sollen aber wirkungslos sein

VII **Croton Malambo** Karst im nördlichen Sudamerika liefert die jetzt obsolete Malamberinde Eine damit identische oder ganz nahe verwandte Rinde ist als falsche Chinarinde vorgekommen

VIII **Croton corymbosus** Engelm in Texas Die blühenden Zweigspitzen werden als Thee benutzt.

Cubebae.

Cubebae (Germ) Fructus Cubebae (Austr Brit Helv) Cubeba (U St) Baccae Cubebae Piper caudatum Kubeben Kubebenpfeffer Stielpfeffer Schwanzpfeffer Schwindelkörner ¹⁾ — Cubèbe Poivre à queue (Gall) — Cubebs. Die Früchte des **Piper Cubeba** L fil Familie der Piperaceae, heimisch auf Java, viel leicht auch auf Sumatra und Borneo, kultivirt auf den Antillen, in Malakka und vielleicht in Sierra-Leone

Beschreibung Man sammelt die Kubeben vor der Reife, sie sind dann kuglig, von etwa 5 mm Durchmesser, sehr wenig zugespitzt, am Grunde in einen bis 1 cm messenden Fortsatz ausgezogen, aussen durch das Trocknen runzelig, grau, graubraun oder schwärzlich Die Schale ist etwa 0,5 mm dick, sie umschliesst den nicht völlig entwickelten, geschrumpften, nur an der Basis angewachsenen Samen Ist der Same gut entwickelt, so erkennt man im Längsschnitt das mächtige Perisperm und im oberen Theil das kleine Endosperm mit dem wenig differenzirten Embryo (Fig 230)

Der Querschnitt durch die Fruchtschale lässt in den der Epidermis zunächst gelegenen Zelliagen zahlreiche Steinzellen erkennen, die eine zusammenhängende Schicht bilden. Im Parenchym sind zahlreiche Zellen zu etwas vergrösserten Oelzellen geworden, deren Inhalt infolge des Gehaltes an Cubebin mit concentrirter Schwefelsäure schon roth wird Die vorletzte Zellschicht der Fruchtschale ist ebenfalls in meist etwas radial ge-

¹⁾ Unter diesem Namen auch die Fructus Coriandri, die weissen Senfsamen und die giftigen Kokkelskörner

streckte, stark verdickte, grosse Steinzellen umgewandelt (Fig. 229). Die dann folgende Samenschale besteht aus zwei stark zusammengefallenen Zellschichten. Im Perisperm ebenfalls reichlich Sekretzellen, deren Inhalt mit Schwefelsäure roth wird, im Parenchym Stärke in grossen, aus sehr zahlreichen Theilkörnchen zusammengesetzten Körnern. Geruch aromatisch, Geschmack scharfaromatisch, bitterlich.

Bestandtheile. 10 bis 18 Proc. ätherisches Oel (vergl. unten), etwa 2,5 Proc. Cubabin $C_{10}H_{16}O_3$, feine weisse Nadeln, die bei $125^{\circ}C$. schmelzen, in kaltem Wasser fast unlöslich, in heissem wenig löslich, in 76 Th. absol. Alkohol löslich, in 26,6 Th. Aether löslich, ferner löslich in Essigsäure, Chloroform, flüchtigen und fetten Oelen. Wird mit konc. Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrid roth. Ferner etwa 1,7 Proc. Kubebensäure $C_{12}H_{14}O$, bildet eine amorphe, bei $56^{\circ}C$. schmelzende Masse, von schwach saurer Reaktion, unlöslich in Wasser, löslich in Weingeist, Aether, Chloroform, Ammoniak und Kalilauge. Wird ebenfalls mit konzentrierter Schwefelsäure roth. Asche 5,45—8,12 Proc., davon in Salzsäure unlöslich 0,09—0,39 Proc. Die Asche ist grünlich, sie enthält Mangan. Die Kubeben geben 20 Proc. Extrakt.

Prüfung etc. Die den Kubeben reichlich beigemengten Bruchstücke der Fruchtschale sind vor der Verwendung zu entfernen. — Da häufig Früchte von abweichender Beschaffenheit im Handel vorkommen, so sollen nur solche verwendet werden, die der obigen Beschreibung genau entsprechen und die mit konzentrierter Schwefelsäure schön roth werden, wobei aber darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass auch Früchte von völlig normalem Bau vorkommen, die die Rothfärbung mit Schwefelsäure nicht geben. Man bezeichnet sie in Java als „Rinoe Katcentjar“, im Gegensatz zu den mit Schwefelsäure roth werdenden, die „Rinoe badak“ heissen. Man muss also auch bei völlig normal gebauten Früchten die Schwefelsäureprobe machen. Zu diesem Zweck zerreibt man einige Früchte im Mörser und übergiesst mit konzentrierter Schwefelsäure. Ganz besonders ist diese Prüfung auch für das Pulver anzurathen. Gerade im letzteren Fall giebt natürlich die Reaktion nur darüber Aufschluss, dass das Pulver echte Kubeben enthält, nicht darüber, ob es mit andern Früchten vermengt ist. Wenn solche Vermengungen aus Piperaceenfrüchten bestehen, so dürften sie durch das Mikroskop kaum nachzuweisen sein, wenn es dagegen Früchte aus anderen




Fig. 229.
Querschnitt durch die Fruchtschale der Cubebe. 180 mal vergr.




Fig. 230.
Cubebe im Längsschnitt.
15 mal vergr.

Familien sind, so ist der Nachweis durch in solchen vorkommende abweichende Zellformen ermöglicht. In Pulver aus echten Kubeben dürfen keine anderen verholzten Zellen vorkommen, als die Sternzellen der äusseren und inneren Steinzellenschicht, die Gefässe und denselben vorgelagerte spärliche Fasern.

Verfälschungen und Verwechslungen Die folgende Uebersicht giebt die echte Droge und die in den letzten Jahren unter den Kubeben oder an ihrer Stelle vorgekommenen fremden Früchte.

A Piperaceenfrüchte

I. Piperaceenfrüchte mit stielartigem Fortsatz

- A Äussere und innere Steinzellenschicht vorhanden, ausserdem zerstreute Sklerose im Parenchym des Pericarps
Piper ribesoides WALLICH
- B Äussere und innere Steinzellenschicht vorhanden, weitere Sklerose fehlt
- a Steinzellen der inneren Schicht radial gestreckt
Piper Cubeba L. fil.
x Ranoe Katoentjar, mit Schwefelsäure roth
xx Ranoe badak, mit Schwefelsäure nicht roth
 - b Steinzellen der inneren Schicht isodiametrisch
Piper crassipes KORTHALS
 - c Steinzellen der inneren Schicht hufeisenförmig verdickt
Piper à court pédicelle
- C Nur eine äussere Steinzellenschicht vorhanden
- a Steinzellen nicht radial gestreckt. Frucht mit Fortsatz bis 3 cm lang
Piper molleissimum BLUME (Keboc Kubeben, Karbauw Beien)
 - b Steinzellen radial gestreckt. Früchte viel kleiner
Piper venosum D. C. Mit Schwefelsäure roth
- D Im Pericarp überhaupt keine Steinzellen
- a Afrikanische Arten
 - 1) Frucht 5–6 mm, Fortsatz ebenso lang
x Mit Schwefelsäure roth
Piper Clusi D. C.
xx Mit Schwefelsäure nicht roth
Piper guineense SCHUM.
 - 2) Frucht bis 4 mm lang, Fortsatz bis 6 mm lang
Piper borbonense D. C. (Cubèbe du pays)
 - b Indische Arten. Mit Schwefelsäure sammtlich nicht roth.
 - 1) Fortsatz viel kürzer als die Frucht
Piper caninum BL. var.
 - 2) Fortsatz so lang wie die Frucht oder länger
x Stiel flach
o *Piper Louong* BLUME. Sekretzellen mit Schwefelsäure blaugrün werdend
oo Ceylon-Pfeffer. Sekretzellen mit Schwefelsäure hochgelb
xx Fortsatz nicht flach, höchstens runzelig
Piper caninum BLUME, *Piper phyllostictum* D. C.

II. Piperaceenfrüchte ohne stielartigen Fortsatz.

- A. Äussere und innere Steinzellenschicht vorhanden
- 1) *Piper nigrum* L. Mit Schwefelsäure roth. Zellen der äusseren Schicht radial gestreckt
 - 2) *Cubèbe de Java sauvage*. Zellen der äusseren Schicht nicht radial gestreckt
- B Nur eine äussere Steinzellenschicht vorhanden
Dangdang boeroeng
- C Äussere und innere Steinzellenschicht fehlt
Kubeben von Bangil. Mit Schwefelsäure zuerst roth, dann braun

Früchte aus anderen Familien.

- 1) *Xanthoxylum Budrunga* WALL. (Rutaceae) Falsche Kubeben von Madura. Kuglige, zweiklappig aufspringende Frucht mit einem schwarzen Samen, der am langen Funiculus hängen bleibt.

2) *Brideha tomentosa* BLUME (Euphorbiaceae) Frucht etwa 6 mm gross, von der Seite zusammengedrückt und eingeschnürt, zweifacherig, zweisamig

3) *Tetranthera citrata* NEES (Lauraceae) Kuglig, bis 6 mm gross, oben zugespitzt, dunkelbraun, einfacherig, einsamig, Embryo mit dicken Cotyledonen Im Pericarp Palissaden mit wellig gekrümmten Wänden

4) *Daphnidium Cubeba* NEES (Lauraceae) Wie vorige, aber Palissaden mit nicht gekrümmten Wänden, Krystalle enthaltend

5) *Pericampylus incanus* MIRAS (Menispermaceae) Scheibenförmig flach, am Rande wulstig aufgetrieben und gerippt

6) *Rhamnus spec* Frucht 3—4 facherig mit ebensoviel Steinkernen

7) *Xylopia frutescens* GAERTNER (Anonaceae), in Brasilien und Guyana 1 facherig, mit 2 glänzend schwarzen oder braunen Samen mit weissem Arillus Endosperm ruminat

8) *Helicteres hirsuta* BL (Sterculiaceae) und *Grewia tomentosa* (Tiliaceae) Beide nicht näher bekannt Vergl. Genaueres Arch d Ph 1898 p 204, 1898 p 172

Aufbewahrung In Blech- oder Glasgefässen, das Pulver in dicht verschlossenen Hafengläsern an einem trockenen Orte und, wegen seiner Neigung zum Verharzen, in nicht zu grosser Menge

Pulverung Kubeben lassen sich ihre hohen Oel- und Harzgehalte wegen schwer pulvern, da sie die Maschen der Siebe verstopfen Man trocknet sie entweder kürzere Zeit bei höchstens 25°C (Gall), und verwandelt sie in ein mittelfeines Pulver oder man lässt sie einige Wochen im Kalt-Trockenschrank (S 546) liegen und verlegt die Arbeit des Pulverns in die kalte Jahreszeit, in welchem Falle sie verhältnissmässig gut von statten geht Aus 100 Th. luftgetrocknen Kubeben erhält man etwa 94 Th mittelfeines Pulver

Anwendung Bei Gonorrhoe als Pulver zu 1,0 bis 10,0 steigend, 3mal täglich in Oblaten, Latwerge, Pillen, Bissen oder Tabletten, häufig zusammen mit Copaiba balsam Vom aetherischen Oel befreit als Cubebae praeparatae s tostae Unzer kleinert bei Kopfschmerz (daher „Schwindelkörner“) In Deutschland sind Kubeben dem freien Verkehr entzogen

Extractum Cubebae s Cubebae (Austr Gall Germ Helv) Extr Cubebae aethereum Oleoresina Cubebae (U-St) — Kubebenextrakt Extrait (oleo-resineux) de cubébe — Oleoresin of Cubeb Germ 2 Th Kubeben (Sieb IV) zucht man je 3 Tage mit 6, dann 4 Th einer Mischung aus Aether und Weingeist ää aus und dampft zum dünnen Extrakt ein — Helv U-St Kubeben (V) werden im Perkulator mit Aether erschöpft, die Auszüge, von denen man den Aether abdestillirt, zum dünnen Extrakt verdunstet — Austr Aus gepulverten Kubeben und einem Gemisch von Aether und Weingeist ää durch Verdrängung und Eindampfen wie voriges — Gall 1 Th Kubebenpulver wird im Verdrängungswege zuerst mit 2 Th Aether (Spec Gew 0,724), dann mit 2 Th Weingeist (95 proc) erschöpft, die Auszüge nach Abdestilliren des Lösungsmittels eingedampft und miteinander gemischt — Ausbeute 17—20 Proc Dunkelbraun, in Wasser unlöslich Vor der Abgabe umzuschütteln (Germ Helv Austr) oder (U-St) ohne Bodensatz zu verabfolgen Ist das Extrakt in wässrigen Mixturen verordnet, so muss es zuvor emulgirt werden, auf 1 Th Extrakt nimmt man 2 Th arabisches Gummi und 3 Th Wasser

Anwendung 0,5—2,0 mehrmals täglich in Latwergen, Pillen oder Gallertkapseln, in letzterer Form häufig mit Copivabalsam gemischt

Die Kubebenextrakte des Handels verdanken ihre bisweilen lebhaft grüne Farbe meistens einem geringen Kupfergehalte, man weist denselben nach dem Einäschern in bekannter Weise nach

Extractum Cubebae fluidum (U-St) Aus 1000 g Kubebenpulver (No 60) und Weingeist (91 proc) im Verdrängungswege zu bereiten Man befeuchtet mit 200 ccm, fängt die ersten 900 ccm besonders auf und stellt 1 a 1000 ccm Fluidextrakt her

Extractum Cubebae spirituosum stellt man durch Ausziehen von 1 Th Kubebenpulver mit 6, dann nochmals mit 2 Th verdünntem Weingeist und Eindampfen zum weichen Extrakt dar Ausbeute 18—20 Proc Durch Eindampfen auf das Gewicht der verwendeten Kubeben erhält man das Extract Cubebae alcoholicum Puche

Tinctura Cubebae. Brit U-St Aus 200 g Kubebenpulver (No 80) und q s Weingeist (90 proc) sammelt man im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur — Gall 1 Th Kubebenpulver, 5 Th Weingeist (80 proc) 10 Tage maceriren

Bell. antigonorrhoei
Rp Balsam Copaivae
2 Cerae flavae 55 100
3 Cubebaram pulv 50,0
Bei gekelter Wärme mischt man und formt 100
Boli

Injectio cubebina Will
Rp Infus Cubebaram (50,00) 600,0
Extracta Belladonnae 0,5
Gegen Leukorrhoe und Gonorrhoe
Pilulae cubebinae HAUSMANN
Rp Extracti Cubebaram 40
Gummi arabici 2,0
Magnesi carbonica 4,0
Aqua destill q s
Man formt 100 Pillen. Jede enthält 10 Stück.

Inulveres cubebini LANGELEBERT
Rp Cubebaram pulv 75,0
Natri bicarbonis 5,0
Divide in part 40
Pulvis Cubebaram compositus BRYAN
Rp Cubebaram pulv 20,0
Radix Belladonnae
Camphora trita 25 1,0
Divide in part 10

Tablettae Cubebae
Rp Cubebaram pulv 10,0
Magnesina usae 1,0
Zu 10 Tabletten. Mit Magnesia usta zu bestreuen

Trugemata cubebina
Trochisci cubebini Copahina Mège
Dragées de copahu et cubebina FARRINGTON
Rp Extracti Cubebaram
Balsam Copaivae 55 100 0
Vitella ovorum No 3
Radix Liquiritiae pulv q s
Man formt längliche Pillen von 0,70 g, trocknet
und überzieht mit Zucker

Trochisci Cubebae (U St)
Troches of Cubeb
Rp Oleocressinae Cubebae 4,0
Olei Sassafras 1 cam
Extracti Liquiritiae pulv 25,0
Gummi arabici pulv 12,0
Sirupi toluatani q s
Man formt 100 Pastillen.

Beize für rohe Tabakblätter Je 60,0 Kubeben, Storax, Zimmt, Salpeter, 85,0 Kaskarilla, 50,0 Honig, 125,0 Brauntwein, 5 l Rosenwasser. Ausreichend für 40—50 kg. **Cubebae compositae** Tabloids von BURROUGES, WELLCOME & Co enthalten jede 0,016 Kubebenextrakt, 0,082 Chlorammonium, 0,016 Glycyrrhizin

Oleum Cubebae (Brit U-St) Kubebenöl **Essence de Cubebe. Oil of Cubebs**

Das aus den zerkleinerten Kubeben in einer Ausbeute von 10—18 Proc gewonnene ätherische Öl ist ein etwas dickflüssiges, farbloses oder hellgrünes bis blaugrünes Liquidum. Es besitzt den charakteristischen Geruch der Kubeben und einen warmen, kampheerartigen, zuletzt kratzenden Geschmack. Spec Gew 0,915—0,930 (Brit) (ca 0,920 U-St). Drehungswinkel im 100 mm-Rohr — 25 bis — 40°. Die Löslichkeit in 90 proc Alkohol ist verschieden, manche Öle lösen sich in gleichen Theilen, bei anderen sind 10 Theile dieses Lösungsmittels erforderlich. Deshalb ist die Anforderung der U St, nach der das Öl sich in gleichen Theilen lösen soll, als zu weitgehend zu bezeichnen.

Das Öl besteht fast nur aus Kohlenwasserstoffen. Es enthält wenig eines von 158—168° siedenden Terpens (Pinen oder Camphen?), ferner Dipenten, $C_{10}H_{16}$ Cadmen, $C_{14}H_{24}$, und ein zweites noch nicht näher untersuchtes Sesquiterpen. In alten Ölen ist Kubebenkampher, ein Sesquiterpenhydrat der Formel $C_{18}H_{26}O$, gefunden worden.

Cucumis.

Gattung der Cucurbitaceae — Cucurbitaceae — Cucumerinae.

I Cucumis sativus L. Gurke — Concombre. — Cucumber. Wahrscheinlich in Ostindien heimisch, seit alter Zeit durch die Kultur verbreitet.

Bestandtheile der Frucht nach KONNIS: Wasser 95,20 Proc, Stickstoffsubstanz 1,18 Proc, Fett 0,09 Proc, Zucker 0,96 Proc, sonstige stickstofffreie Bestandtheile 1,35 Proc, Holzfaser 0,78 Proc, Asche 0,44 Proc, Phosphorsäure 0,084 Proc, Schwefel, organisch gebunden 0,005 Proc.

Anwendung. Die Samen fanden und finden wohl noch Verwendung zu Emulsionen. Gail hat Fruit et semences de Concombre.

II Cucumis Melo L. Melone — Melon. — Melon. Ebenfalls wahrscheinlich in Ostindien heimisch und seit langer Zeit in Kultur.

Bestandtheile der Frucht, nach KOENIG Wasser 90,38 Proc, Stickstoffsubstanz 1,00 Proc, Fett 0,32 Proc, Zucker 2,13 Proc, sonstige stickstofffreie Stoffe 4,40 Proc, Holzfaser 1,09 Proc, Asche 0,68 Proc, Phosphorsäure 0,113 Proc, Schwefel, organisch gebunden 0,009 Proc

Die **Wurzel** wirkt in Dosen von 25 g brechenenerregend, das wirksame Princip heisst Melonen-Emetin, es ist wenig bekannt

III Cucumis myriocarpus Naud, heimisch in Sudafrika Die Frucht wirkt purgirend und brechenenerregend, das wirksame Princip ist ein glykosidischer Bitterstoff, Myriocarpin

IV Cucumis utilisissimus Roxb, heimisch in Vorderindien, enthält im Pericarp ein eiweisslösendes Ferment, das in alkalischer Lösung am besten wirkt

V Cucumis Citrullus Ser, heimisch in Sudafrika Die Wurzel soll blasenziehend wirken

Gurken-Cold Cream (nach ASKINSON) 434,0 frischen Gurkensaft erwärmt man auf etwa 65° C, filtrirt und mischt zu einer Salbe aus je 28,0 Walrat und Wachs, 450,0 Mandelöl, 60,0 Gurkenessenz

Gurkenmilch	
Lait de concombre	
Rp 1 Ceteaei	
2 Ceræ albae	
3 Saponis medicati	
4 Olei Olivæ	ca 100
5 Glycerini	50,0
6 Amygdalar dulc	100,0
7 Aquæ	160,0

8 Succ Cucumæ recent	500,0
9 Spiritus	250,0

Man schmilzt 1—4 ruhr sorgfältig die durchgeseichte Emulsion aus 6—7 und zuletzt 58 und 9 hinzu — Einen Zusatz für diese Zubereitung bildet eine parfümirte Mischung aus je 25,0 Saisenspiritus und Benzoeöl natur, 60,0 Glycerin und 800,0 Rosmarinöl worin man je 20,0 Borax und Natriumacetat gelöst hat

Cucurbita.

Gattung der Cucurbitaceae — Cucurbitaceae — Cucurbitinae.

I Cucurbita Pepo L. Heimisch wahrscheinlich in Amerika, durch die Kultur weit verbreitet

Bestandtheile des Fruchtflisches nach KOENIG Wasser 90,32 Proc, Stickstoffsubstanz 1,10 Proc, Fett 0,13 Proc, Zucker 1,94 Proc, sonstige stickstofffreie Stoffe 5,16 Proc, Holzfaser 1,22 Proc, Asche 0,73 Proc, Phosphorsäure 0,097 Proc, Schwefel, organisch gebunden 0,02 Proc Im Fruchtflisch ist Carotin enthalten

Arzneiliche Verwendung finden die Samen, Samen Cucurbitae Samen Peponis. Pepo (U-St) — Kurbissamen Kurbiskerne oder -kerner. — Graine ou pepin de courge Semence de Calabasse d'Europe, de Gourde ou Cougourde (Gall) Pépin de citrouille — Pumpkin Seed (U St) Gourd Seed

Beschreibung Die Samen sind platt, oval, gegen das eine (Funiculus) Ende deutlich ausgezogen, mit einem aufgetriebenen Rande versehen, bis 2 cm lang, 1 cm breit, 0,3 cm dick Ohne Nährgewebe mit grossem Embryo mit platten Cotyledonen Geschmack milde, ölig

Bestandtheile Aus den geschalteten Samen gewinnt man durch Pressen 20 Proc fettes Oel, das zu den trocknenden Oelen gehört, aber frisch bereitet als Speisöel verwendet werden kann, durch Extraktion mit Aether gewinnt man noch 15 Proc Oel mehr

Es besteht aus Palmitin, Myristin und Olein Ausserdem enthalten die Samen Leucin und Tyrosin Asche 4,4 Proc

Anwendung Die Kurbiskerne gelten seit langer Zeit als Bandwurmmittel und da keinerlei Bestandtheil, dem man eine anthelmintische Wirkung zuschreiben konnte, in denselben ermittelt ist, so nimmt man an, dass die unzweifelhafte Wirkung durch das Oel bedingt, eine mehr mechanische sei Es sollen für einen Erwachsenen 100—200 entschaltete Kerne nothig sein, 5—10 Stunden nach dem Einnehmen 1—2 Theelöffel Ricinusöl

Es scheint, als ob die Samen bald ihre Wirksamkeit einbüssen. Diejenigen von *Cucurbita maxima* Duch sollen dieselbe Wirksamkeit haben. Die nach dem Abpressen des Oeles bleibenden „Oelkuchen“ enthalten 55,60 Proc Rohprotein, 11,40 Proc Rohfett und 8,00 Proc stickstofffreie Extraktstoffe, man empfiehlt sie als „Kraftfutter“

Emulsio taenifuga Desbout

Rp	Semin Cucurbit decortic.	40,0
	Sacchari albi	30,0
	Extracti Filicis	5,0
	Aquae destillatae	150,0

Man bereitet eine Emulsion, die nicht durchgeseiht wird. Auf einmal innerhalb eines Tages zu nehmen, hinterher 2 Löffel Ricinusöl

Emulsio taenifuga Desvoss

Rp	Semin Cucurbit decort.	50,0
	Aquae destillatae	200,0
	Sirupi Aurantii cort.	50,0

Bereitung und Anwendung wie bei vorigem

Pasta Cucurbitae seminum

Conserva taenifuga Kürbiskernpaste

Rp	1 Seminum Cucurbitae	40,0
	2 Sacchari	80,0
	3 Aquae Rosae	5,0

Die Kerne werden geschält und mit 2–3 gleich mässig angestossen. Morgens auf einmal, 10 Minuten später 1 Esslöffel Ricinusöl. Bandwurm mittel

Antitaenia Bandwurmmittel der Pharmacia internationale Saneio Vaccieri ist eine Paste aus 50,0 Kurbissamen, 10,0 Zucker, 10,0 Glycerin und etwas Orangenblutwasser

Bandwurmmittel nach Dupont 20,0–45,0 geschälte Kurbiskerne stösst man mit 25,0 Zucker zum Teig an und ruht 60,0 Milch darunter — Morgens nüchtern, nach zwei Stunden etwas Ricinusöl

II Cucurbita foetidissima H B K In Amerika. Die sehr bitter schmeckende Wurzel enthält ein Alkaloid


Cumarinum

Cumarinum Kumin Cumarinsäureanhydrid Tonkbohnenkampher Cumarylige Säure Ortho Oxyzimmtsäureanhydrid $C_9H_6O_2$ Mol Gew. = 146

Diese in zahlreichen duftenden Kräutern etc. vorkommende Substanz ist in grosster Menge in den Tonkbohnen enthalten und wird entweder aus diesen gewonnen oder synthetisch dargestellt

Darstellung 1) Aus Tonkbohnen. Man kocht zerkleinerte Tonkbohnen zwei bis dreimal hintereinander am Rückflusskühler längere Zeit mit 80 proc Alkohol aus. Die Auszüge werden vereinigt und filtriert. Alsdann destilliert man von ihnen den Weingeist ab, vermischt den hinterbleibenden Rückstand mit dem 3–4 fachen Volumen heissen Wassers, erhitzt nochmals bis fast zum Sieden und filtriert im Dampftrichter durch ein mit Wasser angefeuchtetes Filter, welches das ausgeschiedene Fett zurückhält. Beim Erkalten scheidet sich das Kumin in Krystallen aus. 2) Synthetisch erhält man das Kumin durch Erhitzen von Natrium-Salicylaldehyd mit Essigsäureanhydrid und 4 Th wasserfreiem Natriumacetat bis zum schwachen Sieden. Die nach dem Erkalten krystallinisch erstarrende Masse wird mit Wasser versetzt, worauf sich ein Oel ausscheidet, welches neben Kumin noch Acetyl-Orthocumarsäure enthält. Man destilliert das Oel, wobei sich die Acetyl-Orthocumarsäure in Kumin umwandelt, und krystallisiert dieses aus siedendem Wasser um oder reinigt es durch Destillation im Wasserdampfstrom.

Eigenschaften. Farblose glänzende Blättchen oder rhombische Säulen von angenehmem, eigenartigen Geruche und bitterem, gewürzhaft brennenden Geschmacke, schwer löslich in kaltem (1:400), leichter dagegen (1:50) in siedendem Wasser, sehr leicht löslich in Alkohol und in Aether, auch in flüchtigen und in fetten Ölen. Kumin schmilzt bei $67^{\circ}C$, sublimiert ziemlich leicht (schon in der Wärme des Wasserbades) und siedet unzersetzt bei $291^{\circ}C$. Von concentrirter Schwefelsäure wird es schon in der Kälte langsam und ohne Färbung aufgelöst, auch beim Erwärmen tritt kaum Färbung auf. Uebergiesst man es mit Natronlauge, so löst es sich in der Kälte nur sehr langsam auf, beim Erwärmen mit dieser schmilzt es zunächst und löst sich alsdann unter schwach grünlicher Far-



bung auf. Aus der Lösung wird durch Salzsäure das Kumarin wieder in farblosen Nadeln gefällt.

Prüfung. 1) Es sei farblos und schmelze bei 67°C . Die meisten Verunreinigungen beeinflussen den Schmelzpunkt, indem sie ihn herabdrücken oder erhöhen. Im Zweifelsfalle krystallisirt man eine kleine Menge um und sieht nun, ob der Schmelzpunkt sich geändert hat. 2) Es verbrenne, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. 3) Man kocht 0,1 g mit 1 cem Salzsäure eine Minute lang, und fügt zur klaren Lösung 2 cem Karbolsäurelösung (1:20), sowie etwas filtrirte Chlorkalklösung. Es soll keine rothe Färbung auftreten. Eine solche würde durch Acetanilid verursacht werden und alsdann durch Uebersättigen mit Ammoniak in Indigoblau übergehen (Indophenol-Reaktion s. S. 4). Das Acetanilid ist das beliebteste Verfälschungsmittel für Kumarin und ähnliche Produkte. — Handelt es sich um eine Bestimmung etwa vorhandenen Acetanilids, so erfolgt diese am zweckmässigsten durch die Bestimmung des Stickstoffes nach KJELDHAL (s. Nitrogenium), vorausgesetzt, dass nicht noch andere stickstoffhaltige Substanzen zugegen sind.

Anwendung. Das Kumarin ist ein schwaches Desinficiens, wird aber arzneilich weder äusserlich noch innerlich angewendet. In Gaben von 2,0 g kann es Intoxikationen hervorrufen. Man benutzt es in der Parfümerie, zum Desodoriren von Jodoform und als Bestandtheil von Maibowlen-Essenzen an Stelle des Waldmeisters. Es besitzt etwa die 70fache parfümirende Kraft wie die Tonkbohnen.

Trennung des Kumarins von Vanillin. Liegen alkoholische Lösungen vor, so verdampft man aus 25–100 cem derselben unter Zufügung von etwas Wasser den Alkohol bei 80°C . Alsdann fügt man zu der erkalteten Flüssigkeit vorsichtig Bleiacetat, bis kein Niederschlag mehr entsteht, filtrirt ab und wäscht den Niederschlag aus. Das Filtrat wird mit Aether sorgfältig ausgeschüttelt, welcher sowohl das Kumarin als auch das Vanillin aufnimmt. Alsdann schüttelt man die ätherische Flüssigkeit mit verdünntem Ammoniak. Das Vanillin geht als Ammoniakverbindung in die wässrige Schicht, das Kumarin bleibt in der ätherischen Lösung. Nach Verdunstung des Aethers hinterbleibt das Kumarin und kann durch Behandeln mit Ligroin gereinigt werden. Die ammoniakalische wässrige Schicht wird mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und mit Aether sorgfältig ausgeschüttelt. Das nach dem Verdunsten des Aethers hinterbleibende Vanillin kann gleichfalls durch Ligroin gereinigt werden.

Elaeosaccharum Cumarini.

Rp. Cumarini 1,0
Sacchari pulverati 999,0

Auf 1 Flasche Moselwein setzt man für Waldmeisterbowle = 2 g dieser Mischung zu (DIREKT).

Essentia Asperulae artificialis.

Maiweinessenz. Waldmeisteressenz.
Rp. Corticis Citri recentis
Corticis Aurantii dulcis recentis aa 10,0
Spiritus diluti 200,0
Cumarini 0,1.

Auf 1 Flasche Moselwein = $\frac{1}{2}$ Theelöffel voll.

Cuminum.

Gattung der Umbelliferae — Aploideae — Ammineae — Carinae.

Einzig Art: **Cuminum Cyminum L.**, heimisch im östlichen Mittelmeergebiet bis Turkestan und Aegypten, öfter der Früchte wegen in Südeuropa gebaut.

Verwendung findet die Frucht: **Fructus Cumini** (Ergänzb.). **Semen Cumini** s. **Cymini**. **Semen Carvi romani** s. **aegyptiaci**. — Mutterkümmel. Aegyptischer, römischer, welscher, langer Kümmel. Hafer-, Kreuz-, Kronkümmel. Pfefferkümmel. — **Fruct de cumin** (Gall.). — **Cumin Seed**.

Beschreibung. Die beiden Theilfrüchtchen hängen in der Droge meist noch zusammen. Die Frucht ist länglich, 5–6 mm lang, oben vom Kelchrest, dem Stempel polster und Griffel gekrönt. Farbe braun, mit heller gefärbten Rippen, und zwar in jedem Theilfrüchtchen 5 fadenförmige Haupt- und 4 breitere Nebenrippen. Die Rippen




Fig. 231. Querschnitt durch Fructus Cumin. 15 mal vergr.

(besonders die Nebenrippen) tragen reichlich Borsten. In jeder Nebenrippe ein und auf der Fugenfläche zwei Oelstriemen (Fig. 231). Die Fruchtschale löst sich leicht vom Samen. Die Borsten entstehen aus einer Anzahl emporgewachsener Epidermiszellen, sie sind oft verzweigt und erreichen 0,5 mm Länge. In der an der Fugenfläche befindlichen Parthie der Samenhaut wandeln sich einige Zellen häufig zu porösen Steinzellen um. Geruch und Geschmack aromatisch, nicht sehr angenehm.

Bestandtheile 8 Proc. fettes Oel, 2,5–4,0 Proc. ätherisches Oel. Letzteres ist anfangs farblos, später gelblich. Spec. Gew. 0,893–0,93. Drehung (100 mm Rohr) $+4^{\circ}$ bis $+8^{\circ}$. Es enthält Cuminaldehyd (Cuminal) $C_{10}H_{12}O$, Cymol $C_{10}H_{14}$ und ein Terpen $C_{10}H_{16}$.

Verunreinigungen Fructus Cuminus sind mit reichlichen Mengen Fructus Conii verunreinigt vorgekommen. Auch hier ist Conium begleitet von den Früchten der *Setaria glauca* Beauv. (vergl. S. 314).

Aufbewahrung und Pulverung wie bei Fructus Carvi (S. 660).

Anwendung Mutterkummel wirkt wie Kummel, doch kraftiger. Man verwendet ihn bei Verdauungsschwäche, Kolik und in der Thierheilkunde, in manchen Gegenden als Gewürz für Brot, Kuchen und Käse.

Aqua Cuminus			
Rp	Olei Cuminus	gtt III	
	Aquae destillatae tepidae	100,0	
Emplastrum Cuminus			
Pp	Cerae Resinae Pin.	60,0	
	Olei Myrsinaceae		
	Cerae flavae	aa 12,5	
	Fructus Cuminus sub. pulv.	12,0	
	Olei Cuminus	3,0	
T 1 a	emplastrum	Bei Kolik auf die Magen-	
		gegend zu legen	
Vet. Pulvis Seminum quatuor			
			Viersamen-Pulver
Rp	Fruct. Anisi	gr pulv.	
	Fruct. Carvi	" "	
	Fruct. Cuminus	" "	
	Fruct. Foeniculi	" "	aa.

Mittel gegen Magenkrampf von Fr. Dorez ist ein Aqua Cuminus concentrata.

Semen Cuminus nigra ist der Same der *Nigella sativa* L.

Oleum Cuminus Cuminal. Römisch Kummelöl. Essence de Cumin (Gall).
Oil of Cumin.

Bei der Destillation der zerkleinerten Cuminfruchte erhält man 2,5–4 Proc. ätherisches Oel. Es ist anfangs farblos, wird aber bald gelb und hat den unangenehmen, aber charakteristischen Geruch des Cumins und einen gewürzhaften etwas bitterlichen Geschmack. Spec. Gew. 0,890–0,930. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) $+4^{\circ}$ bis $+8^{\circ}$. Es löst sich in 3–10 Th. 80 proc. Alkohols. Es besteht aus Cuminaldehyd, Cymol und einem noch nicht näher bestimmten Terpen. Der wichtigste Bestandtheil ist das Cuminaldehyd oder das Cuminal $C_{10}H_{12}O$, eine optisch inaktive Flüssigkeit vom spec. Gew. 0,972 bei $13^{\circ}C$ und dem Siedepunkt $232^{\circ}C$. Das Cymol, $C_{10}H_{14}$, ist identisch mit dem in anderen ätherischen Ölen gefundenen, oder dem aus Kampher darstellbaren Paracymol $C_8H_4[1]CH_3$, $[4]C_6H_5$. Cuminalöl wird ähnlich wie Kümmelöl verwendet. Dosis 2–6 Tropfen in weingeistiger Lösung mehrmals täglich.

Cuprum.

Cuprum (Venus) Kupfer. Cuivre (franz.) Copper (engl.) Cu. Atomgew. = 63. Metallisches Kupfer gebraucht der Pharmaceut zur Untersuchung fester Oele mittels der „Elaidinprobe“, zu diesem Zwecke wendet er entweder Drehspäne oder Schnitzel von dünnem Kupferblech an. Ferner Kupferblech in Streifen zur Prüfung saurer Flüssigkeiten auf das Vorhandensein von Arsen oder Quecksilber. Für diesen letzteren Zweck schafft man ein Stück dünnes Kupferblech (0,6 mm stark) vom Kupferschmied an und benützt dessen Oberfläche durch Behandeln mit warmer verdünnter Schwefelsäure blank.

I Cuprum pulveratum seu praecipitatum Praecipitirtes Kupfer Ist feinvertheiltes metallisches Kupfer, welches zur Bereitung von Kupferamalgun nur Zahnärzte und Metallarbeiter, auch in der Homöopathie Verwendung findet

Zur Darstellung lost man 100 Th krystall reines Kupfersulfat in 500 Th Wasser, mischt die filtrirte Lösung mit 300 Th reiner Salzsäure (von 25 Proc HCl) und stellt in dieselbe Stäbe oder Streifen von Zink ein. Das als dunkler Schlamm abgeschiedene Kupfer wird gesammelt (auch vom Zink abgekratzt), mit salzsäurehaltigem Wasser digerirt, dann mit Wasser bis zur völligen Entfernung aller Säure gewaschen, schliesslich zwei bis dreimal mit Alkohol nachgewaschen und rasch getrocknet.

Ein braunliches, spec. schweres Pulver, welches beim Reiben im Porcellanmörser rothe dehnbare Metallfäbner erkennen lässt, im übrigen alle Eigenschaften des metallischen Kupfers besitzt.

Eigenschaften Das Kupfer ist das einzige Metall, welches hellrothe Farbe besitzt (Früher schrieb man auch dem metallischen Titan eine rothe Farbe zu, indessen haben sich die in den Hohofen häufig gefundenen kupferrothen Würfel, welche früher für reines metallisches Titan gehalten wurden, als Cyanstickstoff Titan $Ti N_4C$ herausgestellt, das metallische Titan ist ein graues Pulver). Die dunkelrothe, stumpfe Farbe, welche nicht polirtes Kupfermetall an seiner Oberfläche gewöhnlich besitzt, rührt von Kupferoxydul her, welches an der Oberfläche des Kupfers meist vorhanden ist.

Das metallische Kupfer besitzt hellrothe Farbe, lebhaften Glanz und hohe Politurfähigkeit. Es ist hart, zähe und sehr dehnbar, lässt sich z. B. zu Blech walzen, zu Draht ausziehen und in dünne Blättchen ausschneiden, welche grünlich-blaues Licht hindurchlassen. Der Bruch ist hackig, nach dem Schmieden sehnig. Wenn das Kupfer krystallisirt, z. B. nach dem Schmelzen oder bei der elektrolytischen Abscheidung (in Mennigen- oder DANIELL-Elementen), so tritt es in Krystallen des regulären Systems auf. Das spec. Gewicht des gegossenen Kupfers ist etwa 8,83 (wird übrigens verschieden gefunden wegen der im Kupferguss stets vorhandenen Hohlräume), dasjenige des geschmiedeten Kupfers 8,94. Das Kupfer schmilzt schwerer als Silber und leichter als Gold. Der Schmelzpunkt wird verschieden angegeben (1200—1300°C, auch 1050°C), für reines Kupfer nimmt man meist 1050°C als Schmelzpunkt an. Im geschmolzenen Zustande ist es von grünlichblauer Farbe und absorhirt verschiedene Gase, die es beim Erstarren unter Zischen (Sprätzen) wieder abgibt. — Das reine Kupfer hat ein ausgezeichnetes Leistungsvermögen für Elektrizität. Setzt man das Leistungsvermögen des Silbers = 100, so ist dasjenige des Kupfers = 93. Indessen drücken schon sehr geringe Verunreinigungen mit anderen Metallen das elektrische Leistungsvermögen des Kupfers ganz erheblich herab. Durch eine Spur Arsen z. B. sinkt es auf 58, durch 0,5 Proc. Eisen auf 35, durch je 0,5 Proc. Blei und Antimon auf 6 u. s. w. Deshalb ist es von grosser Wichtigkeit, dass das für elektrische Leitungen benutzte Kupfer möglichst rein ist (s. w. unten).

An trockener Luft ist das Kupfer beständig, an feuchter Luft überzieht es sich oberflächlich mit einer Schicht von basischem Kupferkarbonat (Patina), welche falschlich „Grünspan“ genannt wird. Beim schwachen Erhitzen an der Luft nimmt das Kupfer einen braunrothen Ueberzug von Kupferoxydul an, welcher bei Temperaturen von 160 bis 340°C eine Reihe schöner Anlauffarben durchläuft. Beim starken Glühen an der Luft wird das Kupfer zu schwarzem Kupferoxyd (Kupferhammerschlag, Kupferasche, Glühspan) oxydirt, welches abblättert. Da der Kupferoxydulüberzug der Luft und der Feuchtigkeit besser widersteht als das Metall selbst, so erzeugt man ihn künstlich (künstliche Patina) auf Gegenständen aus Kupfer. — Gegen Schwefelwasserstoff ist Kupfer sehr empfindlich, es überzieht sich unter seiner Einwirkung mit einer Schicht von dunklem Schwefelkupfer. Bisweilen nimmt das Kupfer in einer Schwefelwasserstoff-Atmosphäre auch prachtvoll blaue Färbung an. Man schreibt diese der Bildung von KNAPP's blauem Schwefel zu, für welchen das Schwefelkupfer als Träger gilt.

In allen nicht oxydirenden Säuren (also ziemlich allen Säuren mit Ausnahme der Salpetersäure) ist das Kupfer in der Kälte und solange die Säuren frei von Luft

sind und keine Gelegenheit haben Sauerstoff oder Luft aufzunehmen, unlöslich. Es ist also unlöslich in Salzsäure, verdünnter Schwefelsäure, Phosphorsäure, Essigsäure, Milchsäure, Weinsäure, Citronensäure, solange diese frei von Luft oder Sauerstoff sind. Enthalten diese Säuren aber Luft oder Sauerstoff (und das ist gewöhnlich der Fall, wenn sie nicht vorher ausgekocht waren) oder haben sie Gelegenheit, Luft oder Sauerstoff während ihrer Berührung mit Kupfer aufzunehmen, so wird das Kupfer von dem vorhandenen Sauerstoff oxydirt und das gebildete Kupferoxyd bildet mit der vorhandenen Säure das betreffende Salz. — Es erklärt sich hieraus der Umstand, dass in blanken kupfernen Gefäßen Nahrungsmittel und saure Flüssigkeiten (Pflanzensaft) wohl gekocht werden können, nicht aber darin erhalten dürfen. Bei der Operation des Kochens nämlich wird die Luft ausgetrieben, so dass die luftfreien Säuren nicht losend auf das Kupfer wirken können, während des Erhaltens dagegen wird wieder Luft aufgenommen und dann Kupfer von den Säuren gelöst.

Unter denselben Umständen werden auch viele Flüssigkeiten kupferhaltig, wenn sie Salze (z. B. Kochsalz) enthalten, die mit Kupferoxyd lösliche Verbindungen eingehen. Fette und Öle, in kupfernen Gefäßen aufbewahrt, werden gleichfalls kupferhaltig infolge der Einwirkung bez. Bildung von Fettsäuren. Auf dieses Verhalten hat man stets Rücksicht zu nehmen, wenn man kupferne Gefäße in Gebrauch zieht.

Sehr leicht dagegen wird das Kupfer unter Bildung von Stickstoffoxyd gelöst von Salpetersäure, und zwar schon in der Kälte, ferner von concentrirter Schwefelsäure in der Hitze, wobei Schwefeldioxyd entweicht. Auch Ammoniak wirkt bei Gegenwart von Sauerstoff losend auf Kupfer ein. Aus seinen Lösungen wird das Kupfer durch Eisen, Zink, Blei, Zinn, Cadmium, Wismut, Nickel, Phosphor gefällt. Dagegen werden Silber und Quecksilber aus ihren Lösungen durch Kupfer abgeschieden.

Prüfung des metallischen Kupfers auf Arsen. 5–6 g des zu prüfenden Kupfers werden im möglichst zerkleinerten Zustande in einem Kolben, welches mit einem 60–80 cm langen absteigenden Rohre oder einer andern Kühlvorrichtung versehen ist, mit einem Gemische aus der achtfachen Menge officineller Ferrichloridlösung und der vierfachen Menge officineller Salzsäure (25 Proc. HCl) der Destillation unterworfen und das Destillat in einem gut gekühlten Kolben aufgefangen. Die Destillation ist bis auf ein möglichst kleines Volumen des Rückstandes fortzusetzen, da das vorhandene Arsen hauptsächlich erst gegen das Ende derselben übergeht. — Durch die Einwirkung des Ferrichlorids wird das Kupfer in Lösung übergeführt und das in demselben vorhandene Arsen als Arsentrichlorid verflüchtigt, welches alsdann im Destillate durch Schwefelwasserstoff nachgewiesen werden kann (E. SCHMIDT).

Chemie und Analyse. Man erkennt das metallische Kupfer leicht an seiner rothen Farbe. Auch in Legirungen mit anderen Metallen bietet der Nachweis des Kupfers keine Schwierigkeiten, da die bei Behandlung mit den üblichen Reagentien entstehenden Kupfersalze durch ihre blaue oder grüne Färbung auffallen.

Das Kupfer bildet zwei Salzreihen: die vom Cuprooxyd Cu_2O sich ableitenden Cuprosalze oder Kupferoxydsalze, und die vom Cuprioxyd CuO derivirenden Cuprisalze.

Die Cuprosalze sind im allgemeinen die weniger wichtigen. Das Cuprooxyd selbst ist roth gefärbt, das Cuprohydroxyd kanariengelb. Die Cuprosalze sind meist farblos, die neutralen Cuprosalze auch unlöslich. Die Cuprosalze haben die Neigung in Cuprisalze überzugehen.

Die Cuprisalze sind diejenigen, welche man als Kupfersalze schlechthin bezeichnet. Sie sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Im wasserhaltigen Zustande sind sie blau oder grün gefärbt, im wasserfreien Zustande sind die Salze farbloser. Säuren gleichfalls farblos.

Für die analytische Erkennung des Kupfers kommen namentlich die Cuprisalze in Betracht, weil alle Verbindungen des Kupfers behufs der analytischen Erkennung doch in Cuprisalze übergeführt werden. Cuprisalzlösungen zeigen gegen Reagentien folgendes Verhalten:

1) Schwefelwasserstoff fällt aus sauren, neutralen oder alkalischen Lösungen braunschwarzes Cuprisulfid, CuS , mit einem Stich ins Grünliche oder Bläuliche. Dasselbe ist unlöslich in verdünnter Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure, dagegen wird es von Salpetersäure gelöst. Es ist ferner unlöslich in Kalı- oder Natronlauge, Kaliumsulfid Na_2S , Natriumsulfid, dagegen werden kleine Mengen von Ammoniumsulfid gelöst. In Kaliumcyanid-Lösung ist frisch gefälltes Cuprisulfid leicht zu einer farblosen Flüssigkeit löslich, aus welcher Schwefelwasserstoff kein Cuprisulfid mehr abscheidet. — 2) Kalı- oder Natronhydrat fällen einen hellblauen Niederschlag von Cuprihydroxyd $\text{Cu}(\text{OH})_2$, wird die Flüssigkeit gekocht, so geht das hellblaue Cuprihydroxyd unter Abspaltung von Wasser in schwarzes Cuproxyd über. Die Fällung des Cuprihydroxyds durch Natron oder Kalilauge wird verhindert durch Ammoniumsalze, ferner durch die Anwesenheit genügender Mengen von Weinsäure, Citronensäure, Glycerin, Mannit und anderer organischer Verbindungen. Bei ihrer Anwesenheit geht das Cuprihydroxyd mit prachtvoll blauer Farbe in Lösung. — 3) Natriumkarbonat fällt basisches Cuprikarbonat $\text{CuCO}_3 + \text{Cu}(\text{OH})_2$ als grünlichblauen Niederschlag, der beim Kochen unter theilweisem Uebergang in Cuproxyd braunschwarz wird. — 4) Ammoniak bewirkt, in kleinen Mengen zugesetzt, zunächst die Ausscheidung hellblauer basischer Salze, auf Zusatz von mehr Ammoniak entsteht lasurblaue Lösung. — 5) Kaliumferrocyanid erzeugt in nicht zu stark verdünnten Lösungen einen braunrothen Niederschlag von Cupriferrocyanid FeCy_6Cu , in starker Verdünnung entsteht rothe Färbung. Das Cupriferrocyanid ist in verdünnten Säuren unlöslich, von Kalı- oder Natronlauge aber wird es zersetzt, von Ammoniakflüssigkeit gelöst. — 6) Rhodankalium fällt aus der nicht zu stark verdünnten Lösung schwarzes Cuprirhodanid $\text{Cu}(\text{SCN})_2$, enthält die Lösung aber gleichzeitig schweflige Säure, so wird weisses Cuprorhodanid Cu_2SCN_2 gefällt. — 7) Metallisches Eisen (ein blanker eiserner Spatel) überzieht sich, mit einer concentrirten (und mit Salzsäure etwas angesauerten) Lösung eines Cuprisalzes in Berührung gebracht, augenblicklich mit einer Schicht von metallischem Kupfer. Ist die Cuprisalzlösung stark verdünnt, so tritt der Ueberzug langsam auf. — 8) Bringt man die saure Kupfersalzlösung auf Platinblech und legt in diese ein Körnchen metallisches Zink, so ein, dass dieses mit dem Platin in Berührung ist, so scheidet sich auf letzterem gleichfalls metallisches Kupfer aus. — 9) Wird ein Gemisch von Kupferverbindungen + Soda im Reduktionsfeuer des Löthrohrs auf Kohle geschmolzen, so enthält die Schmelze rothe Metallfäcke, welche duktil sind. — 10) Bringt man etwas metallisches Kupfer oder eine kupferhaltige Legirung oder ein Kupfersalz auf einem dünnen Platindrahte in die nicht leuchtende Flamme, so färbt sich dieselbe smaragdgrün. Zusatz von Salzsäure befördert das Auftreten dieser Erscheinung. — 11) Die Boraxperle oder Phosphorsalzperle wird durch Kupfer und seine Verbindungen in der Oxydationsflamme grün gefärbt, beim Erkalten geht diese Färbung in Blau über. — Setzt man die Perlen der Reduktionsflamme aus und glüht man sie unter Zusatz von etwas Zinn oder nach dem Betupfen mit Stannochlorid, so werden sie undurchsichtig braunroth, weil sich nunmehr Cuproxyd (Kupferoxydul) abgeschieden hat.

Man bestimmt das Kupfer.

1) Als Kupferoxyd CuO . Man erhitzt die neutrale oder schwach saure, aber ziemlich stark verdünnte (!) Kupfersalzlösung in einer Schale aus Platin oder Porcellan bis zum beginnenden Sieden, fügt reine, etwas verdünnte Natronlauge hinzu, solange noch ein Niederschlag entsteht, erhält noch einige Minuten bei einer dem Sieden nahekommenden Temperatur, lässt kurze Zeit absetzen, filtrirt die Flüssigkeit ab, übergiesst den Niederschlag mit Wasser und erhitzt zum Kochen. Nachdem man dies zwei- bis dreimal gethan hat, bringt man den Gesamt-Niederschlag auf das Filter, wäscht ihn mit heissem Wasser völlig (!) aus, trocknet zunächst bei 100°C und glüht dann im Tiegel aus Platin oder Porcellin über einem einfachen Bunsenbrenner $\text{CuO} \times 0,79747 = \text{Cu}$. — Das so erhaltene Kupferoxyd kann man zur Kontrolle durch Erhitzen im Wasserstoffstrome in metallisches Kupfer überföhren. Die Methode ist genau, doch dürfen organische Substanzen, welche die Fällung von Kupfer durch ätzende Basen verhindern (s. oben), nicht zugegen sein.

2) Als Cuprosulfid Cu_2S . Man leitet in die Kupfersalzlösung, welche kleine Mengen freier Salzsäure oder Schwefelsäure aber keine Salpetersäure enthält, Schwefelwasserstoff bis zur völligen Sättigung ein. Damit man einen dichten Niederschlag erhält, ist es zweckmässig, die Flüssigkeit während des Einleitens von Schwefelwasserstoff zum Sieden zu erhitzten, doch darf alsdann freie Salpetersäure nicht zugegen sein. Man filtrirt darauf rasch durch ein Filter, bringt den Niederschlag auf das Filter, wäscht ihn auf diesem mit Schwefelwasserstoffwasser aus und trocknet thunlichst rasch. (Es empfiehlt sich, den später zu benutzenden Rose'schen Tiegel während des Trocknens unter den Trichter zu stellen.) — Nach dem Trocknen trennt man den Niederschlag vom Filter, verbrennt dasselbe in einem Rose'schen Tiegel vollständig (!), mischt zu der Filterasche nach dem Erkalten etwas reinen Schwefel, bringt ferner den Hauptniederschlag dazu, und glüht das erhaltene Gemisch von Schwefel und Cuprisulfid im Wasserstoffstrome (siehe

Hydrogenium) bei dunkler Rothglut bis zum konstanten Gewichte. Man erhält schliesslich Cuprosulfid Cu_2S . Die Berechnung ist die gleiche wie beim Cuprioxyd $\text{Cu}_2\text{O} \times 0,79747 = \text{Cu}$.

3) Als Kupferrhodanur $\text{Cu}(\text{SCN})$. Man versetzt die von Salpetersäure oder freiem Chlor möglichst freie Lösung der Kupferverbindung, welche keine oder nur sehr wenig freie Säure enthalten soll, mit schwefliger Säure oder unterphosphoriger Säure in ausreichender Menge und fügt eine Lösung von Rhodankalium in möglichst geringem Ueberschuss hinzu. Das Kupfer schlägt sich unter diesen Umständen (s. sub 4) als weisses Cuprorhodanid nieder. Man lässt es bei gewöhnlicher Temperatur absetzen, filtrirt, wäscht mit Wasser aus und trocknet den Niederschlag. Dann trennt man ihn vom Filter, verbrennt dieses im Rosse'schen Tiegel, bringt zur Filterasche das Cuprorhodanid, sowie etwas gepulverten Schwefel, mischt und glüht im Wasserstoffstrome bis zum konstanten Gewicht. Man erhält auch in diesem Falle Cuprosulfid Cu_2S . Die Berechnung s. sub 2.

Doch kann man das Cuprorhodanid auch auf gewogenem Filter sammeln und nach dem Trocknen bei 100°C wägen. In diesem Falle ist $\text{CuSCN} \times 0,52066 = \text{Cu}$.

4) Maassanalytisch. Nach VOLHARD. Man bringt die Kupfersulfatlösung, welche nicht zu viel freie Säure enthalten soll, in einen 250 ccm Kolben, erhitzt zum Sieden (!) und setzt so viel einer gesättigten Lösung von schwefliger Säure hinzu, dass die Flüssigkeit deutlich danach riecht. Man fügt nun unter Umschwenken einen Ueberschuss von $\frac{1}{10}$ Normal Rhodanammiumlösung hinzu. Diese bewirkt beim Eintropfen in die Kupferlösung zuerst eine grüne Färbung, hervorgerufen durch Bildung von Cuprirhodanid, welche beim Umschwenken unter Abscheidung von weissem Cuprorhodanid verschwindet. Dieses Verhalten giebt ein Mittel, die vollständige Uebersättigung des Kupfers in letztere Verbindung leicht zu erkennen. Man lässt von der Rhodanammiumlösung so viel zu fliessen, bis an der Einfüllstelle eine Farbenveränderung nicht mehr auftritt, fügt alsdann noch einige ccm $\frac{1}{10}$ Rhodanammiumlösung hinzu, lässt erkalten, füllt bis zur Marke auf und mischt. Nachdem sich der Niederschlag vollständig abgesetzt hat, filtrirt man die Flüssigkeit ab und bestimmt nunmehr den noch in Lösung befindlichen Ueberschuss von Rhodanammium. Zu diesem Zwecke bringt man 50 ccm des Filtrates in einen Kolben, fügt einen gemessenen Ueberschuss $\frac{1}{10}$ -Normal Silbernitratlösung hinzu, mischt durch Umschwenken, macht mit Salpetersäure stark sauer, setzt etwas Eisenalaunlösung hinzu und titirt den nunmehr vorhandenen Ueberschuss mit $\frac{1}{10}$ -Normal-Rhodanammiumlösung zurück. Vergl. auch S. 58.

Da die Reaktion nach der Gleichung $2\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O} + 2\text{NH}_4\text{CNS} + \text{SO}_2 = 2(\text{NH}_4)\text{HSO}_4 + \text{SO}_4\text{H}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{CuCNS}$ verläuft, so ergibt sich daraus, dass 1 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Rhodanammiumlösung, welcher 0,0076 g NH_4CNS enthält = 0,0063 g metallisches Kupfer oder 0,0249 g krystallisiertes Kupfersulfat ($\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$) anzeigt. Beispiel. 10,0 g reines, durch Alkohol gefälltes, lufttrockenes Kupfersulfat wurden in Wasser zu 500 ccm gelöst — 25 ccm dieser Lösung (= 0,5 g $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$) wurden im 250 ccm-Kolben mit 25 ccm Wasser und einigen Tropfen Schwefelsäure zum Sieden (!) erhitzt, dann mit 60 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Rhodanammiumlösung versetzt und nach dem Mischen und Erkalten (!) auf 250 ccm aufgefüllt — 50 ccm des Filtrats (= 5 ccm der ursprünglichen Lösung = 0,1 g $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$) wurden mit 25 ccm Wasser verdünnt, dann wurden 20 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal Silbernitratlösung zulaufen gelassen. Hierauf wurden 10 ccm Salpetersäure von 25 Proc HNO_3 , sowie etwa 1 ccm Eisenalaunlösung zugegeben und mit $\frac{1}{10}$ -Normal Rhodanammiumlösung bis zum Eintreten der Rothfärbung titirt. Verbraucht = 12 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal Rhodanammiumlösung.

Mithin waren für 50 ccm des Filtrates verbraucht worden

Rhodanlösung	Silbernitratlösung
a) Ursprünglich zugesetzt $\frac{60}{5} = 12$ ccm	20 ccm
b) Zur Schluss titrirung $\frac{12}{\text{Sa } 24} = 12$ ccm	

Es sind also in Rechnung zu stellen 4 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Rhodanammiumlösungs $4 \times 0,0249 \text{ g} = 0,0996 \text{ g}$. Diese Menge kryst. Kupfersulfat ist in 5 ccm der ursprünglichen Lösung vorhanden. Mithin sind in 500 ccm dieser Lösung = 0,96 g krystallisiertes Kupfersulfat gefunden worden. Demnach wurden bei dem Versuche 99,6 Proc des vorhandenen Kupfersulfats wiedergefunden.

Die oben erwähnte Färbung von Cuprirhodanid ist bei Gegenwart von Ferrisalzen nicht zu erkennen, auch nach vollständiger Ausfällung des Kupfers entsteht auf weiteren Zusatz von Rhodanammium eine dunkle Färbung, welche beim Umschwenken verschwindet. In solchen Fällen überzeugt man sich von der vollständigen Ausfällung des Kupfers am leichtesten, wenn man nach Absetzen des Cuprorhodanids eine Probe der überstehenden Flüssigkeit in ein Reagensglas bringt und Rhodanammiumlösung dazu bringt. Entsteht keine Fällung mehr, so vereinigt man die Probe mit der Hauptflüssigkeit. Entsteht noch eine Fällung, so ist noch mehr Ammoniumrhodanid zuzusetzen u. s. w.

5) Elektrolytisch. Die eleganteste und genaueste Bestimmung des Kupfers ist die auf elektrolytischem Wege. Wenn auch die elektrolytischen Bestimmungen im allgemeinen das Vorhandensein nicht gerade wohlfeiler Hilfsmittel voraussetzen, so lässt sich doch gerade die Bestimmung des Kupfers mit ziemlich einfachen Mitteln ausführen, weshalb sie hier beschrieben werden soll. Zur Elektrolyse gelangt eine Lösung, welche ausser Kupfer möglichst kein anderes aus salpetersaurer Lösung fällbares Metall enthalten soll (also z. B. kein Antimon und kein Arsen), dagegen ist die Anwesenheit von Blei nicht störend. In Lösung sollen nicht mehr als 0,2 g metallisches Kupfer sein, das Gesamtvolumen der Lösung betrage zum Schluss etwa 120 cem.

Man braucht 1–2 DANIELL-Elemente *A*, eine Platinschale *B*, eine Platinelektrode *C*, Leitungsdrahte, einen kleinen Glasheber und, wenn es zur Verfügung ist, ein elektrolytisches Stativ *D*.




Fig. 232. *A A* Zwei DANIELL-Elemente. *B* Eine Platinschale, mit der zu elektrolysirenden Lösung theilweise angefüllt, als Kathode. *C* Eine in die Flüssigkeit eintauchende Platin-Anode. *D* Ein elektrolytisches Stativ mit Glasstange.

Zur Ausführung bringt man die Kupferlösung, in der das Kupfer als Sulfat enthalten ist und die in der Regel noch einen Ueberschuss von freier Schwefelsäure enthalten wird, in die völlig saubere Platinschale, fügt so viel Ammoniak hinzu, dass basisches Kupfersalz sich ausscheidet oder die bekannte azurblaue Färbung eintritt. Dann säuert man mit Salpetersäure schwach an, füllt mit Wasser auf etwa 100–120 cem auf, fügt noch 3–5 cem Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. hinzu und schaltet die Schale als Kathode in einen Stromkreis von 1–2 DANIELL-Elementen ein, als Anode eine durchlöchernte Scheiben-Elektrode aus Platin und bedeckt das Ganze mit einem durchlochten oder halbirten Uhr-glass. Nach etwa 1–2 Stunden ist der grösste Theil des Kupfers ausgefallen. Man spritzt nun das Uhr-glass ab und überlässt den Apparat etwa 12 Stunden (über Nacht) sich selbst. Nach dieser Zeit prüft man eine mittels Pipette entnommene Probe der Flüssigkeit, ob sie sich durch Uebersättigung mit Ammoniak blau färbt. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, so hängt man in die Schale einen mit Wasser gefüllten Heber (mit der linken Hand) ein und giesst aus einer grossen Spritzflasche (mit der rechten Hand) so viel Wasser in die Schale ein, dass das Volumen der Flüssigkeit stets das gleiche bleibt und die Anode stets mit Flüssigkeit bedeckt bleibt. Während des Auswaschens darf der Strom nicht (!) unterbrochen werden. Wenn etwa 1 Liter Wasser zugegossen ist, nimmt man den Heber aus der Schale heraus, entfernt diese vom Stativ, spült sie noch 1–2 mal mit Wasser, dann 2–3 mal mit Alkohol, schliesslich 1–2 mal mit Aether nach, trocknet im Luftbade und wägt. Man erhält so das Kupfer als glänzend rothen, krystallinischen Niederschlag, der durch Salpetersäure leicht aus der Platinschale herausgelöst werden kann.

Kupferbestimmung in einer Legirung. Man übergiesst in einem Erlenmeyer-schen Kolben mit aufgesetztem Trichter etwa 1 g der möglichst zerkleinerten Legirung mit 5–10 cem Salpetersäure von mindestens 1,2 bis 1,3 spec. Gewicht. Wenn in der Kälte keine Einwirkung mehr erfolgt, so erwärmt man, bis auch unter diesen Umständen braune Dämpfe nicht mehr entweichen. Man spült dann die salpetersaure Flüssigkeit mit Wasser in eine Porzellanschale und dunstet auf dem Wasserbade zur Trockne ein. Ist Zinn vor-

handen, so erhitzt man den Trockenrückstand 2 Stunden lang im Luftbade auf 150°C . Nach dem Erkalten erwärmt man den Rückstand mit Salpetersäure, nimmt mit Wasser auf und filtrirt. Im Rückstande ist Zinndioxyd, event. mit kleinen Mengen Kupfer und Blei. Ueber die Trennung des Zinndioxyds von diesen siehe unter Zinn. Aus der salpetersauren Lösung fällt man durch Zusatz von wenig Salzsäure das Silber als Silberchlorid. Das Filtrat wird mit Schwefelsäure versetzt und auf dem Wasserbade, zuletzt auf dem Sandbade bis zur Verjagung der Salzsäure und Salpetersäure erhitzt. Den Rückstand nimmt man mit verdünnter Schwefelsäure auf, filtrirt das Bleisulfat ab und wäscht mit verdünnter Schwefelsäure völlig aus. Die Schwefelsäure verdrängt man durch Auswaschen mit 80 proc. Alkohol, lässt aber diesen nicht zu dem Kupferfiltrat laufen.

Das kupferhaltige Filtrat verdünnt man mit Wasser und leitet in dasselbe unter Erwärmen Schwefelwasserstoff im Ueberschuss ein. Man filtrirt und wäscht den Niederschlag mit Schwefelwasserstoff. Das Filtrat wird bis zur Trockne verdampft und zur Bestimmung von Eisen, Mangan, Aluminium, Zink verwendet. Den Niederschlag behandelt man in der Wärme mit Schwefelnatriumlösung, welche Arsen, Antimon und Zinn in Lösung bringt. Das von diesen befreite Kupfersulfid wird nach dem Auswaschen mit Schwefelwasserstoffwasser in Salpetersäure gelöst. Man versetzt diese Lösung mit überschüssiger Schwefelsäure, verjagt die Salpetersäure durch Eindunsten auf dem Wasserbade, zuletzt auf dem Sandbade, nimmt mit Wasser auf und bestimmt das Kupfer nach 1, 2 oder 3.

Toxikologisches. Metallisches Kupfer ist vom Magen und Darm aus wirkungslos. Beweis: Verschluckte Kupfermünzen gehen in der Regel ohne Vergiftung verursacht zu haben auf den natürlichen Wegen ab.

Die löslichen Kupfersalze geben mit Eiweiss unlösliches Kupferalbuminat, sie wirken daher ätzend, und wenn sie resorbirt werden, können sie Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Lösliche Kupfersalze in grösseren Mengen in den Magen gebracht, bewirken Erbrechen, das Kupfersalz wird in der Regel völlig wieder herausgeschafft, so dass gesundheitsschädliche Störungen nicht entstehen. Saure Speisen wirken bei Gegenwart von Luft lösend auf metallisches Kupfer ein (s. S. 982), ein Kupfergehalt solcher in kupfernen Geräthen zubereiteter Speisen kann unter Umständen Vergiftungserscheinungen hervorrufen, doch hat man die Giftigkeit der Kupferverbindungen bis vor kurzem stark übertrieben.

Chlorophyllhaltige Pflanzentheile werden behufs Inverkehrbringens als Konserven (Gurken, Erbsen u. a. Gemüsekonserven) mit Kupfersalzen behandelt (*reverdisage*). Es bildet sich alsdann phyllocyaninsäures Kupfer, welches gegen Salzlösungen und Säuren bei weitem widerstandsfähiger ist als Chlorophyll. Dieses Kupfer ist in Deutschland durch das Gesetz vom 5. Juli 1887 eigentlich verboten, wird aber bis zur endgültigen Regelung dieser Frage vorläufig stillschweigend geduldet. TSCHIRCH schlägt vor, als zulässiges Maximum 0,05 g metallisches Kupfer pro 1 kg Konserven zu gestatten. Durch die Verwendung von Kupfersalzen als Bekämpfungsmittel pflanzlicher Parasiten (Brandpilz des Getreides, Mildewpilz der Reben, Erreger der Kartoffelkrankheit) können kleine Mengen von Kupfersalzen in Nahrungsmittel übergehen, doch ist deren Menge zu gering, als dass sie schädlich wirken könnten. Bedenklicher ist der Zusatz von Kupfersulfat zum Mehl, um dessen Backfähigkeit zu erhöhen. Indessen ist in allen solchen Fällen immer darauf Rücksicht zu nehmen, dass Spuren von Kupfer in sehr vielen Nahrungsmitteln als normaler Bestandtheil vorkommen. (In 1 kg Kakaoschalen sind z. B. bis 0,235 g metallisches Kupfer enthalten.)

Die einzelnen Kupferverbindungen sind von verschiedener Giftigkeit. Relativ ungiftig sind die Verbindungen des Kupfers mit Eiweiss, erheblicher giftig sind das Kupfersulfat und das Kupferacetat, am giftigsten Kupferoleat und Kupferstearinat.

Eine chronische Kupfervergiftung, welche mit der Bleivergiftung zu vergleichen wäre, giebt es — nach der heutigen Anschauung — beim Menschen nicht.

Der Nachweis des Kupfers in Nahrungsmitteln etc. ist nicht schwierig zu führen. Man versetzt die getrockneten Objekte, dampft die Asche mit Königswasser wiederholt ein, erhitzt den Rückstand 2 Stunden auf 150°C , zieht ihn mit Salzsäure aus, fällt aus der Lösung durch Schwefelwasserstoff das Kupfer als Schwefelkupfer und schlägt das Kupfer elektrolytisch nieder (s. S. 985).

II Kupferzink-Legirungen. Die Kupferzink-Legirungen mit einem Gehalt von 24–36 Proc. Zink heissen Messing. Sie sind wohlfeiler als Kupfer, von gelber Farbe, widerstandsfähiger gegen oxydirende Einflüsse, härter und leichter schmelzbar. Geschmolzen sind sie sehr dünnflüssig, eignen sich daher vorzüglich zu Gusswaaren. In der Kalte sind sie hämmerbar und streckbar, lassen sich auch stanzen, drücken, pressen. Das zur Verarbeitung mit Feile und Drehbank bestimmte Messing erhält einen Zusatz von 1–2 Proc. Blei, weil es sich dann leichter verarbeitet, z. B. werden die Feilen nicht verschmiert. Dieser Zusatz ist aber ungünstig für die Verarbeitung zu Blech oder Draht. — Je grösser

der Zinkgehalt ist, desto leichter schmelzbar ist das Messing. Bei Lampen z. B. bestehen die einzelnen Theile, je nachdem sie mit der Flamme direkt in Berührung kommen oder nicht, aus hoher oder niedriger schmelzendem Messing.

Messing, gewöhnliches (Gelbguss) Kupfer 70,0, Zink 30,0. Um es auf der Drehbank und mit der Feile leichter bearbeitbar zu machen, erhält es noch einen Zusatz von 1—2,0 Blei.

Roths Messing Rothguss, Tombak, Similor. Besteht gewöhnlich aus 85 Th. Kupfer und 15 Th. Zink.

Weisses Messing Bathmetall, Platine. Hellgelbe Legirungen aus etwa 55 Th. Kupfer und 45 Th. Zink.

Prinzmetall. 75 Proc. Kupfer und 25 Proc. Zink.

Aluminium-Messing 60,0 Kupfer, 30,0 Zink, 2,0 Aluminium. Lässt sich walzen, schmieden, stanzen, pressen.

Muntzmetall Yellow Metal. Findet zu Schiffsbeschlägen Verwendung und besteht aus 50—63 Proc. Kupfer und 50—37 Proc. Zink.

Prometheus oder Titan-Metall Kupfer 60,0, Zink 38, Aluminium 2,0.

Delta-Metall Kupfer 54—56,0, Zink 40—42,0, Blei 0,7—1,8, Eisen 0,9—1,2, Mangan 0,8—1,4. Hart, zähe, leicht zu bearbeiten, polirfähig.

III Kupferzinn-Legirungen. Die aus Kupfer und Zinn bestehenden Legirungen werden „Broncen“ genannt. Sie sind noch leichter flüssig wie Kupfer und Messing, dichter und aus diesem Grunde polirfähiger, ferner klingender. Betragt der Zinngehalt nicht mehr als 15 Proc., so sind sie gelb und zähe, mit zunehmendem Zinngehalte (25 Proc.) werden sie heller gelb, schliesslich fast weiss, härter und spröder. Durch langsame Abkühlung werden sie weich und dehnbar. Man unterscheidet hauptsächlich drei Arten: 1) Kanonenmetall, 2) Statuenbronze und 3) Glockenmetall.

Kanonenbronze Besteht aus 88—92 Proc. Kupfer und 12—8 Proc. Zinn. Hart, fest, elastisch, widerstandsfähig. Der sog. Uchatius Stahl besteht aus 92 Proc. Cu und 8 Proc. Sn und enthält seine besonderen Vorzüge erst durch die mechanische Bearbeitung. Hierher gehören noch:

Maschinen-Bronze, für Lager, Zahnrad u. dergl. Die Zusammensetzung wechselt je nach den geforderten Eigenschaften von 82,0—94,0 Proc. Kupfer und 18,0 bis 6,0 Zinn.

Zapfenlager-Bronze 95,0 Kupfer und 5,0 Zinn.

Statuenbronze Die Zusammensetzung der antiken Statuenbronze ist eine sehr wechselnde. Die modernen Bronzen erhalten, um sie leicht flüssiger zu machen, Zusatz von Zink und Blei. Zweckmässige Zusammensetzungen sind z. B. 1) Reines Kupfer 93,0, Bankzinn 7,0. 2) Kupfer 82,0, Zink 18,0, Zinn 3,0, Blei 1,5.

Glockenmetall 80—75 Proc. Kupfer und 20—25 Proc. Zinn. Die beste Legung soll die aus 22 Proc. Kupfer und 78 Proc. Zinn sein.

IV Verschiedene Legirungen, den mannigfaltigsten Zwecken dienend

Broncepulver Bestehen je nach der Färbung aus Legirungen von 82—98 Proc. Kupfer und 2—18 Proc. Zink.

Münzenbronze Die deutschen und schweizerischen sogenannten Kupfermünzen bestehen aus 95 Kupfer, 4 Zinn und 1 Zink.

Neusilber Argentan, Packfong, Weisskupfer. Besteht aus etwa 50—66 Proc. Kupfer, 31—19 Proc. Zink und 19,1—11,0 Proc. Nickel. Galvanisch versilbertes Neusilber heisst Alfénide, Christofle, Alpaca.

Atlas-Bronze Kupfer 56,5, Zink 39,6, Blei 0,6, Mangan 1,4, Eisen 1,3, Aluminium 0,5.

Kronand-Metall Kupfer 55,8, Nickel 21,9, Zink 21,8, Eisen 1,1.

Bronze, japanische Soll angeblich bestehen aus Gold 1,0, Quecksilber 3—2,0 Zinn 38—65,0, Kupfer 127,0.

Sterrometall, Aichmetall Kupfer 60,0, Zink 40,0, Eisen 0,5—3,0.

Durana-Metall der Dürerer Metallwerke für Torpedos etc. Antimon + Zinn 2,22, Eisen 1,71, Aluminium 1,70, Kupfer 84,78, Zink 29,50. Spec. Gew. bei 16°C = 8,077.

Goldschaum Unechtes Blattgold. Enthält je nach der Färbung 91—98 Proc. Kupfer und 9—17 Proc. Zink.

Talngold Ist vergoldetes Tombak.

Mira-Metall. 74,8 Th. Kupfer, 0,6 Zink, 16,8 Blei, 0,9 Zinn, 0,35 Eisen, 0,25 Nickel, 0,8 Antimon.

Kupferamalgame, ein Metallkitt für Zähne 100,0 Kupfervitriol, 78,0 Quecksilber und 23,0 gepulvertes Eisen werden in einem porcellanen Mörser auf circa 70° C erwärmt, an einem luftigen Orte unter Besprengen mit heissem Wasser zerrieben und gemischt. Nach 6—12 Stunden erstarrt das Amalgam zu einer harten Masse. Man kann auch 30,0 frisches, durch Zink gefälltes Kupfer mit 70,0 Quecksilber in der Wärme des Wasserbades in ein Amalgam verwandeln. 30,0 Kupfermetall werden aus 120,0 Kupfervitriol elektrolitisch abgeschieden.

V Lothe Zur Darstellung der im Nachstehenden angegebenen Kupfer oder Messing enthaltenden Legierungen schmilzt man zuerst das schwerere schmelzende Metall, rührt die leichter schmelzenden hinzu, rührt mit einem eisernen Stabe um und giesst in dünnem Strahle in Wasser aus, welches in lebhaftere Bewegung versetzt wird. Um möglichst kleine Granaten zu erhalten, giesst man die Legierung auch durch einen feuchten Besen.

Hartlothe für Kupfer, sog. hartes Schlaglothe 1) 2 Th Kupfer und 1 Th Zink oder 2) 5 Th Kupfer und 1 Th Blei.

Gelbes Schlaglothe zum Löthen von Kupfer, Messing, Eisen, Bronze 1) Sehr strengflüssig 7,0 Th Messing, 1 Th Zink 2) Strengflüssig 4 Th Messing, 1 Th Zink 3) Leichtflüssig 2 Th Messing, 1 Th Zink 4) Sehr leichtflüssig 5 Th Messing, 4 Th Zink.

Halbweisses Schlaglothe 1) 16,0 Th Kupfer, 18,0 Th Zink und 1 Th Zinn oder 2) 12 Th Messing, 6 Th Zink und 1 Th Zinn.

Weisses Schlaglothe 1) 20 Th Messing, 1 Th Zink und 3 Th Zinn 2) 3 Th Kupfer, 2 Th Zink, 1 Th Zinn.

Schnelllothe (Weichlothe) für Kupfer und Messing 1) Zinn und Blei je 1 Th 2) Blei 2 Th, Zinn 1 Th.

VI Schwarzen von Kupfer und Messing Man überzieht Gegenstände aus Kupfer oder Messing häufig mit einem grauen oder schwarzen Ueberzuge, weil für gewisse Zwecke (z. B. bei Theilen von wissenschaftlichen Instrumenten) die dunkle Färbung an sich zweckmässig erscheint, und weil der dunkle Ueberzug widerstandsfähiger gegen unsere Einflüsse ist als das blaue Metall.

Schwarzbeize für Messing 1) Zur kalten Anwendung Man löst 300 Th Cuprikarbonat in 250 Th Ammoniakflüssigkeit und fügt 500 Th Wasser zu. In diese Lösung werden die gut abgeschmirgelten fettfreien Gegenstände an Drahten aus Kupfer oder Messing kurze Zeit eingetaucht, dann abgetrocknet. Zur warmen Anwendung Man setzt zu concentrirter Salpetersäure Kupfer bis zur Sättigung hinzu. Zu 500 g dieser Lösung bringt man 3,0 Silbernitrat. Die gereinigten Gegenstände werden handwarm gemacht, dann eingetaucht und sofort herausgenommen. Man erhitzt sie, bis der zuerst graue Schaum schwarz geworden ist. Nach dem Erkalten abbürsten und mit Oel abreiben. 2) Man taucht das Metall in eine Lösung, welche hergestellt ist durch Versetzen einer gesättigten Kupfersulfatlösung mit gesättigter Ammoniumcarbonatlösung bis zum Verschwinden des Niederschlags, erhitzt hierauf, wiederholt das Eintauchen und Erhitzen so oft, bis der Ueberzug dunkel geworden ist, bürstet ihn alsdann und überzieht mit Negativ- oder Mattlack. 3) Man löst 1 Th Cuprinitrat in 2 Th Ammoniakflüssigkeit von 0,96 spec. Gew. und hängt die zu überziehenden, fettfreien Gegenstände an Drahten von Kupfer oder Messing ein.

Schwarzgraue Beize für Messing, Bronze, Rothguss, Kupfer, Silber 1000 Th rohe Salzsäure, 60 Th arsenige Säure fein gepulvert, 30 Th Antimonchlorid, 150 Th Hammerschlag fein gestossen. Man fügt alle Bestandtheile zur Salzsäure (Vorsicht wegen Arsenwasserstoff!) und erhält die Mischung 1 Stunde auf 70—90° C. Man taucht die fettfreien Gegenstände zweimal je 10—15 Sekunden ein, spült mit Wasser und trocknet mit weicher Leinwand oder Sagespanen ab.

Stahlgraue Beize für Messing, Bronze, Rothguss, Kupfer, Silber 1) Man löst 88 Th Eisenvitriol und 88 Th gepulverte arsenige Säure in 1000 Th roher Salzsäure. Gebrauch wie bei der vorigen. 2) In einer Mischung aus 1 Liter roher Salzsäure und 0,125 Liter Salpetersäure löst man 42,5 arsenige Säure und 42,5 Eisenspanen (Vorsicht!). Die gereinigten Gegenstände werden 5 Minuten eingehängt.

Mattschwarze Beize von A. BOLLERT Für Kupfer, Messing, Kupferzinnlegierungen, Neusilber, Phosphorbronze. Man löst 500 g Cuprinitrat in 150 g Alkohol von 90 Proc. Man taucht die betr. kalten Metallgegenstände in die kalte Lösung und erhitzt sie alsdann, bis der Ueberzug schwarz ist.

Brünnern von Kupfer Das polirte und erwärmte Kupfer wird bestrichen mit einer Lösung aus 5 Th krystall. Kupferacetat, 7 Th Ammoniumchlorid, 3 Th verdünnter

Essigsäure (von 30 Proc), 85 Th Wasser. Der brünierte Gegenstand wird schliesslich mit einer Lösung von 1 Th Wachs in 4 Th Terpentinöl abgebehen.

VII Verkupferung Die galvanische Verkupferung hat zwar die früher geübten Verfahren der direkten Verkupferung fast vollständig verdrängt, indessen können doch Fälle vorkommen, in denen Verkupferung ohne galvanischen Strom erwünscht ist.

Zinkgegenstände werden mit folgender frisch bereiteten braunen Mischung einbehaht: 10,0 Kupfervitriol in 50,0 destillirtem Wasser gelöst, werden zunächst mit einer Lösung aus 13,0 Kaliumcyanid in 52,0 destillirtem Wasser und dann mit 105,0 weissem Thone oder soviel davon vermischt, dass eine sirupdicke Flüssigkeit daraus hervorgeht.

Zur Verkupferung von Eisen dient folgende Flüssigkeit: 10,0 Kupfervitriol, 6,6 Zinnsalz und 11,5 Zinkvitriol werden in 3,5 Liter reines Wasser, welches zuvor mit 15,0 konzentrirter Schwefelsäure versetzt ist, gegeben. In diese Flüssigkeit werden die eisernen Gegenstände (z. B. 1500,0–2000,0 eiserne Nägel) eine halbe Stunde unter Umrühren erhalten, herausgenommen, mit Wasser abgewaschen und mit trocknen Sagespanen abgetrocknet.

Blanke oder glatte eiserne Gegenstände werden zuerst mit einer Lösung von 1 Th Kupfernitrat in 50 Th verdünnter Salzsäure gepulzt und dann wiederholt mit einer Lösung von 10 Th Kupfernitrat, 10 Th Cuprichlorid in verdünnter Salzsäure mittelst eines wollenen Lappens oder einer Bürste bestrichen (Weisskopf).

Zur Bronzierung von Zinkguss wird dieser zuerst mit einer Lösung von 1 Th Eisenvitriol und 1 Th Kupfervitriol in 20 Th Wasser abgerieben und nach dem Abtrocknen mit einer Lösung von 4 Th Grünspan in 11 Th Essig bestrichen. Nach dem Abtrocknen wird mit Kolkothar polirt.

Zum Bronzieren der Medaillen macht man eine filtrirte Abkochung von 10 Th Grünspan und 5 Th Salmiak in 250 Th Essig. Diese Flüssigkeit wird mit einem gleichen Volum Wasser verdünnt, und nachdem die Medaillen hineingelegt sind, erhitzt und gekocht, bis die Medaillen mit einer genügenden Kupferschicht bedeckt sind.

Galvanisches Messingbad für alle Metalle anwendbar. Man löst 200,0 g Kaliumzinkcyanid und 200,0 g Kalium-Kupfercyanid, sowie 40,0 g Natriumkarbonat, 7,5 g Kaliumcyanid und 7,5 g Ammoniumchlorid in 5 Liter Wasser. Die Lösung wird auf 20–25° C erwärmt. Die Spannung des Stromes betrage 3–4 Volt. Als Anode dient eine Messingplatte. Stromdichte 0,5 Ampère pro Quadratdecimeter.

Galvanisches Kupferbad 1) Für alle Metalle: Cupriacetat 100,0, Natriumkarbonat 100,0, Natriumsulfid 100,0, Kaliumcyanid 100,0, Wasser 5 Liter. Kalt anzuwenden. Spannung 3–4 Volt, Stromdichte 0,4 Ampère pro Quadratdecimeter. Als Anode dient eine Kupferplatte. 2) Für Eisen und Stahl: Cupriacetat 100,0, Natriumsulfid 100,0, Natriumkarbonat 125,0, Kaliumcyanid 125,0, Wasser 5 Liter. Spannung 3–5 Volt, Stromdichte 0,4 Ampère pro Quadratdecimeter. Für Zinkgegenstände ist dieses Bad anwendbar, wenn die Menge des Cyankaliums auf 150,0 bis 200,0 vermehrt wird.

Bronzirlack für Gipsfiguren. Ein solcher besteht aus einer Lösung einer ausgetrockneten Kupferseife in Terpentinöl. Die Kupferseife erhält man durch Fällung von 100 Th trockner Talgseife, gelöst in 500 Th heissem Wasser, mit 35 Th Kupfervitriol, gelöst in 150 Th Wasser.

Volta Kreuz von M. FEITH in Berlin. Besteht aus je einem in Kreuzform ausgeschlagenen Kupfer- und Zinkplättchen mit dazwischen gelegtem rothen Tuchlappchen. Beim Gebrauch ist das Kreuz nach Anfeuchtung des Tuchlappchens an einer seidenen Schnur um den Hals zu tragen. Preis 1,20 M. Werth kaum 10 Pf. (Karlsruher Ortsgesundheitsrath).

WYTER'sche Gichtketten sind aus 60, zu gleichen Theilen aus Kupfer-, Zink- und Messingdraht bestehenden Schaken im Wechsel zusammengesetzt. Es giebt zwei Arten dieser Ketten, bei der einen hangen an dem herzförmig gebogenen Draht, welcher die beiden Enden der Kette verbindet, zwei sogenannte Elephantenläuse, bei der anderen Art hangt an dieser Stelle eine leere Kapsel in Form und Grösse einer kleinen Damenuhr, die eine Seite besteht aus Kupferblech, die andere aus Zinkblech. Dass hier weder Elektrizität noch Magnetismus zur Wirkung kommen, ist ersichtlich.

Cuprum aceticum.

I † **Cuprum aceticum** (Ergänz b Helv) **Cuprum aceticum neutrale** Neutrales Cupriacetat Kupferacetat. Essigsäures Kupfer Aerugo crystallisata Krystallisirter Grünspan Destillirter Grünspan Acétate de cuivre. Cupri Acetas $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 199

Darstellung 10 Th Grünspan werden mit 50 Th Wasser und 10 Th Essigsäure von 80 Proc fein angerieben, die Mischung wird zum Sieden erhitzt und mit soviel 80procentiger Essigsäure versetzt, bis Auflösung des Grünspans erfolgt ist. Man filtrirt alsdann und stellt zur Krystallisation bei Seite. Die ausgeschiedenen Krystalle werden nach dem Abtropfen auf porösen Unterlagen bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet.

Eigenschaften Dunkel-blaulich grüne, prismatische Krystalle von ekelhaft metallischem Geschmacke, löslich in 14 Th kaltem oder 5 Th siedendem Wasser, auch in etwa 16 Th Weingeist. Zur völligen Auflösung in den genannten Medien ist gewöhnlich der Zusatz einer kleinen Menge Essigsäure erforderlich. An der Luft verwittern die Krystalle oberflächlich und erscheinen alsdann mit einer hellblaugrünen, pulverig-matten Schicht bedeckt. Bei 100°C wird das Kupferacetat wasserfrei. Durch einen Ueberschuss von Ammoniakflüssigkeit oder Ammoniumkarbonatlösung wird es zu einer azurblauen Flüssigkeit gelöst.

Prüfung 1) Die Lösung des Salzes (1 = 20) werde durch einen starken (1) Ueberschuss von Ammoniumkarbonat nicht getrübt (Eisen, Thonerde, Kalk). Um einen vorhandenen Niederschlag (von Eisen und Thonerde) sichtbar zu machen, empfiehlt es sich, die Flüssigkeit zu filtriren. 2) Wird die wässrige Lösung (1/20) mit einem starken Ueberschuss von Natronlauge einige Zeit gekocht, so darf das Filtrat durch Schwefelwasserstoff nicht verändert werden (Zink, Blei). 3) Wird 1 g des Salzes stark gegluht, so darf der Glührückstand feuchtes rothes Lackmuspapier nicht blauen (Erden, Magnesia, Alkalien).

Aufbewahrung Vorsichtig, in gut verschlossenen Glasgefäßen. Ein oberflächliches Verwittern der Krystalle ist auch bei sorgfältiger Aufbewahrung kaum zu vermeiden.

Anwendung Nur ausserlich als mildes Aetzmittel in Einstreupulvern, Salben, Augensalben (0,1 auf 5,0), in Lösung zu Injektionen (0,5—1,0 zu 100,0). Technisch wird es in der Färberei, beim Zeugdruck, auch zur Darstellung des Schweinfurter Grünspan verwendet.

Tinte für Zink, Zinn und Eisen Ist eine Mischung aus 10,0 krystall. Cupriacetat, 10,0 Ammoniumchlorid, 5,0 gebranntem Kienruss und der genügenden Menge Wasser.

II † **Cuprum subaceticum** Aerugo (Ergänz b) Vinde Aeris Grünspan Basischer Grünspan. Spangrün. Sousacétate de cuivre (Gall.) Verdet gris. Kommt in zwei, durch Farbe und Zusammensetzung verschiedenen Sorten in den Handel.

Der blaue oder französische Grünspan wird hergestellt durch Einwirkung von in Essigsäure-Gährung begriffenen Weinsternen auf Kupferbleche und besteht im wesentlichen aus einfach-basischem Kupferacetat $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2 + \text{Cu}(\text{OH})_2 + 5\text{H}_2\text{O}$. Er ist in der Regel etwas durch Weinstreuer verunreinigt.

Der grüne oder schwedische (deutsche oder englische) Grünspan wird durch Einwirkung von mit Essig getränkten Zeugstücken auf Kupferplatten (mit denen erstere abwechselnd geschichtet werden) oder durch Besprengen von Kupferplatten mit heissem Essig gewonnen. Er besteht im wesentlichen aus Halbbasischem Kupferacetat $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2]_2 + \text{Cu}(\text{OH})_2 + 5\text{H}_2\text{O}$ neben wenig Zweifach-basisch-Kupferacetat $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_3 + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Beide Sorten können zu therapeutischen Zwecken *promiscue* gebraucht werden, doch wird zu pharmaceutischen Zwecken die grüne Sorte im allgemeinen vorgezogen. Jedenfalls würde es erwünscht sein, sich für eine bestimmte Sorte zu entscheiden.

Eigenschaften. Feste, specifisch schwere, schwerzerreibliche, grüne oder bläulich-grüne Massen von Brot- oder Kugelform. — Rührt man fein vertheilten blauen Grünspan

mit warmem Wasser an, so schwillt er zunächst infolge Aufnahme von Wasser an, dann zerfällt er allmählich in ein blaues krystallinisches, in Wasser unlösliches Pulver (Zweifach basisch Kupferacetat, s oben), während Halb-basisch Kupferacetat (s oben) mit blaugrüner Farbe in Lösung geht. In gleicher Weise bleibt beim Ausziehen des grünen Grunspans mit Wasser das blaue Zweifach-basische-Kupferacetat im Rückstande, während Halb basisches Kupferacetat mit blaugrüner Farbe in Lösung geht. — Von verdünnter Schwefelsäure, von heisser verdünnter Essigsäure wird Grunspan unter nur geringem Aufbrausen und unter Hinterlassung nur geringer Mengen von Unreinigkeiten gelöst.

Prüfung 1) Der Grunspan ist hinreichend rein, wenn 1 Theil von 4 Th verdünnter Schwefelsäure (spec Gew = 1,112) bis zu 94 Proc und von 10 Th Ammoniak flüssigkeit (spec Gew = 0,960) bei gelinder Wärme in gleichem Procentsatz gelöst wird. Das Unlösliche besteht in Treberresten, Fasern, Kupfermetall, Thon, Kalk. 2) Eine etwaige Verwechslung oder Vermischung mit arsenhaltigen Kupferfarben stellt man fest, indem man die Lösung in Salzsäure mit Zink zusammenbringt und das entwickelte Wasserstoffgas auf Silbernitratlösung (1 + 1) einwirken lässt. Ein citronengelber Fleck zeigt Arsen an (s S 407).

Aufbewahrung Man hält den Grunspan in Stücken und fein gepulvert vor Raftig und bewahrt ihn vorsichtig auf.

Anwendung Innerlich wird Grunspan kaum noch angewendet. Aeusserlich als atzendes Streupulver bei unreinen, wuchernden Geschwüren, in Salben (1,0 auf 10,0), in Ceraten, Pflastern. In Augenwassern, Gurgelwassern und Einspritzungen ist Aerugo durch Cuprum aceticum zu ersetzen. In der Tierheilkunde dient er als Beizmittel bei Klauenseuche und gegen wildes Fleisch.

Im Handverkauf wird er bisweilen zu Kratzmitteln verlangt, in diesem Falle wäre die Abgabe zu verweigern. Technisch wird er namentlich zu galvanischen Bädern und zu Metallbeizen verwendet und kann alsdann gegen Giftseife unbedenklich verabfolgt werden.

Spiritus Aeruginis Wird Kupferacetat der trockenen Destillation unterworfen, so destillirt bei 240–260° C Essigsäure, bei 270° C geht Cuproacetat $Cu_2(CH_3CO_2)_2$ in Form wolliger Flocken über. Daher ist dieses auch als Kupferspiritus bekannte Präparat im wesentlichen kupferhaltige Essigsäure.

Aqua viridis HARTMANN	
Rp	Tincturae Gallarum
	Tincturae Absinthii \overline{aa} 10,0
	Aquae aromaticae 100,0
	Mellis depurati 20,0
	Aluminis pulverati
	Aeruginis pulveratae \overline{aa} 5,0
Umgeschüttelt zum Verbands unreiner Wunden oder syphilitischer Geschwüre	

Baume de Metz	
Miltz's Balsam	Baume de feuillet.
Blätterbalsam	Grüner Heilbalsam.

Rp	Aeruginis pulver	12,0
	Aloës pulver	8,0
	Zinci sulfidici pulver	6,0
	Olei Lauri	30,0
	Terebinthinae	60,0
	Olei Lini	
	Olei Olivarum	\overline{aa} 180,0
	Olei Juniperi	15,0
	Olei Caryophyllorum	4,0

Ceratum Aeruginis Germ I u Hamb V	
Ceratum viride Emplastrum Aeruginia.	
Kennedy-Pflaster Grünwachs	

Rp	Cerae flavae	120,0
	Resinae Pinj	60,0
	Terebinthinae	40,0
	Aeruginis subit pulv	10,0

Man gießt das Pflaster in $\frac{1}{2}$ cm dicke Täfelchen aus Als Hühneraugenpflaster

Ergänzungsbuch		
Rp	Cerae flavae	10,0
	Resinae Pinj	5,0
	Terebinthinae	4,0
	Aeruginis subit pulv	10

Emplastra ad clivos pedum	
I Hühneraugenpflaster der Frau GRIMMELT	

Rp	Emplastrum Galbani crocavi	50,0
	Cerae flavae	
	Terebinthinae	\overline{aa} 10,0
	Aeruginis subit pulv	20,0

II RICHTER'S Hühneraugenpflaster		
Rp	Pisus nigrae	20,0
	Emplastrum Lithaigyni simplicis	12,5
	Galbani pulverati	40 0
	Ammonii chlorati	
	Aeruginis	aa 5,0

III RUSK'S Hühneraugenpflaster	
--------------------------------	--

Rp	Cerae flavae	15,0
	Olei Olivarum	4,0
	Ammoniaci	15,0
	Terebinthinae	4,0
	Aeruginis subit pulv	6,0

Emplastrum ad lupam	
Gliedschwamm pflaster	

Rp	Cerum Aeruginis	90,0
	Gallarum subit pulv	10,0

Pflaster bei lupin juncturae.

Emplastrum Manna Del
Emplastrum divinum viride.
Rp Emplastrum Plumbi compositum 900
Crati terebinthi 100
Als erweichendes Pflaster und auf Leichdornen.

Mixtura cuprea RADEMACHER
RADEMACHER's Kupfermischung
Rp Tinctura Cupri acetici 5,0
Mucilaginis Gummi arabici 900
Aqua Cinnamomi 17,0
Aqua destillata 115,0

† Oxydum Aeruginis
Grünspan-Sauerhonig Molescharoti-
cum Aegyptische Salbe Gipsjakob
Liganzb, Hamb-V

Rp Aeruginis subit pulv 10,0
Acidi acetici dil (80 proc) 50
Mellis depurati 100,0

Werden im Wasserbade auf 100,0 eingedampft
Vor dem Gebrauch umzuschütteln, vor-
sichtig aufzubewahren

Pilulae Cupri acetici phosphorici LUGLOIS
Jede Pille enthält

Cupri acetici 0,01
Natrii phosphorici 0,05

Gegen Bleichsucht

Spiritus caeruleus

Blauer Spiritus (Hamb V)

Rp Liquoris Ammonii caustici (10 proc) 50,0
Spiritus Lavandulae
Spiritus Rosmarini 55 70,0
Aeruginis pulv 1,0

Man lässt einig. Tage stehen und filtrirt Zum
Einschreiben auf Contusionen

† Tinctura Cupri acetici RADEMACHER
RADEMACHER's Kupferacetat-Tinktur
(Eiganzb, Hamb-V)

Rp 1 Cupri sulfurici crist 12,0
2 Plumbi acetici 15,0
3 Aquae destillatae 63,0
4 Spiritus (90 proc) 53,0

Man zerreibt 1 u 2 zu mittelfeinem Pulver, reibt
mit 3 an und erhitzt in einem Kupfergefasse zum
Sieden. Nach dem Erkalten (1) wird 4 zugesetzt
und die Mischung in verschlossenen Gefasse
unter häufigem Umschütteln 1 Monat stehen
gelassen, dann filtrirt. Vorsichtig aufzubewahren

Tinctura Cupri acetici SCHWARTZ

[Loco Tincturae Cupri acetici RADEMACHER]

Rp Acidi acetici diluti (80 proc)
Cupri acetici crist 55 10,0
Aquae destillatae 150,0
Spiritus (90 proc) 100,0

Unguentum Aeruginis (Hamb V)

Unguentum Apostolorum (duodecim)

Unguentum dodeka pharmacum
Apostelsalbe Aegyptische Salbe Grün-
spannsalbe

Rp Aeruginis pulveratae
Olibani pulverati 55 1,0
Cerae flavae 30
Terebinthinae 8,0
Olei Olivarum 160

Zum Verbands unruher, fauliger Wunden bei
Menschen und Thieren.

Vet Linimentum apthicum

Liniment gegen Euterschwämme

Rp Cupri acetici 5,0
Acidi salicylici 2,0
Olei Olivae 500

Zum Bestreichen der Aphthen am Euter

Vet Linimentum cupricum

Klauserseuchen-Schmiere

Rp Aeruginis pulv 50,0
Acidi hydrochlorici crudi 20,0
Olei Saponum erudi
Olei Jini 55 500,0

Vor dem Gebrauch gut umzuschütteln.

Vet Onguent aegyptiac (Gall)

Rp 1 Aeruginis pulverati 500,0
2 Aceti (7—8 proc) 500,0
3 Mellis 1000,0

Man erhitzt in einem Kupferkessel 1 und 2 kurze
Zeit, fugt 3 hinzu, und erhitzt unter Umrühren
weiter, bis die Mischung eine rothe Farbe und
Homogenität angenommen hat.

Cuprum chloratum.

† Cuprum monochloratum Cuprum chloratum album. Cuprochlorid.
Kupferchlorid Cu_2Cl_2 . Mol. Gew = 197

Darstellung 42,0 Th krystall Cuprichlorid und 32,0 Th metallisches Kupfer
(Drahtnetz oder Späne) werden mit 100,0 Th heissem Wasser übergossen. Man giebt
235 Th (rohe) Salzsäure vom spec Gew 1,175 hinzu, verschlesst den Kolben mit einem
Trichter und erhitzt nun auf einem Gasofen, wenn nothig noch unter Zusatz von etwas
rauchender Salzsäure, bis farblose Lösung erfolgt ist. Diese 1—2 Stunden dauernde Opera-
tion lässt sich wesentlich beschleunigen, wenn man der Flüssigkeit etwas gefälltes Kupfer-
pulver zufügt. — Wenn die Flüssigkeit farblos geworden ist, so wird sie von dem Kupfer,
welches im Ueberschuss vorhanden sein muss (1), in einen hohen, mit viel kal-
tem destillirten Wasser gefüllten Cylinder durch ein Bauschchen Glaswolle rasch durch-
gegossen (Es ist zweckmässig, destillirtes Wasser anzuwenden, welches ausgekocht und
wieder erkaltet ist). — Nach dem Absetzen des zunächst kassig gefällten Cuprochlorids

wird dekanthirt, das Cuprochlorid schnell abgesaugt, mit Alkohol und Aether gewaschen und im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet

Eigenschaften Weisse, in Wasser unlösliche, schwere Massen, die sich an der Luft unter Grünfärbung leicht oxydiren und durch Chlorwasser oder Königswasser leicht als Cuprichlorid in Lösung gehen. Beim Erhitzen im Röhrchen schmelzen sie ohne Zersetzung.

Aufbewahrung Vorsichtig, vor dem oxydierenden Einfluss der Luft geschützt also in kleinen, gut geschlossenen Gefässen. Zersetzte Präparate sind nicht weiss, sondern schmutziggelb bis braun.

Anwendung Als Reagens in der Gasanalyse in ammoniakalischer oder salzsaurer Lösung zur Absorption des Kohlenoxyds.

Salzsaure Kupferchloridlösung nach WINKLER (Zur Absorption von Kohlenoxyd) Man trägt eine Mischung von 86,0 g Kupferoxyd mit 17,0 g Kupferpulver (durch Reduktion von Kupferoxyd im Wasserstoffstrom dargestellt) langsam und unter Umschütteln in 1086,0 g Salzsäure von 1,124 spec. Gew. ein, bringt in die Flasche eine vom Boden bis zum Halse reichende Spirale von Kupferdraht und verschliesst das Gefäss mit einem weichen Kautschukstopfen. Die anfangs dunkle Lösung wird beim Stehen vollkommen farblos, färbt sich aber in Berührung mit Luft unter Bildung von etwas Cuprochlorid wieder dunkelbraun. Zulässiger Absorptionswerth für 1 ccm = 4 ccm Kohlenoxyd.

Ammoniakalische Kupferchloridlösung nach WINKLER (zur Absorption von Kohlenoxyd) Man löst 250,0 g Ammoniumchlorid in 750 ccm Wasser, bringt die Lösung in eine mit Gummistopfen dicht zu verschliessende Flasche und fügt ihr 200,0 g Kupferchlorür zu. Dieses löst sich beim Umschwenken unter Hinterlassung von etwas Kupferoxychlorid auf. Man erhält eine braunliche Flüssigkeit, welche sich unverändert hält, wenn man in die gut zu verstopfende Flasche eine vom Boden bis zum Halse der Flasche reichende Kupferspirale stellt. Vor dem Gebrauche setzt man dieser Lösung $\frac{1}{2}$ Volumen Ammoniakflüssigkeit von 0,905 spec. Gew. zu. — Absorptionswerth für 1 ccm = 16 ccm Kohlenoxyd.

Ammoniakalische Kupferchlorürlösung nach HEMPEL (zur Absorption von Kohlenoxyd) für eine Menge von 200 ccm. Man löst 10,8 g Kupferoxyd in 100 bis 200 ccm concentrirter Salzsäure und lässt die Lösung alsdann in einem mit Kupferdrahtnetz-Spiralen möglichst erfüllten Kolben von passender Grösse zum Zwecke der Reduktion so lange wohlverschlossen stehen, bis sie vollkommen farblos ist. Man giesst alsdann diese Lösung durch einen Bausch von Glaswolle in ein 1,5–2,0 Liter ausgekochtes und wieder erkaltes destillirtes Wasser enthaltendes Becherglas. Nach dem Absetzen des Kupferchlorürs giesst man die überstehende verdünnte Salzsäure möglichst ab, spült das Kupferchlorür mit 100–150 ccm destillirtem Wasser in eine Kochflasche von 250 ccm Inhalt und leitet in die noch schwach saure Flüssigkeit so lange Ammoniak, bis die Lösung sich schwach blau färbt. Um die Luft möglichst abzuschliessen, verschliesst man den Kolben mit einem zweifach durchbohrten Stopfen, welcher ein Gaszuleitungs- und ein Gasableitungsrohr enthält, welches letztere in etwas Quecksilber taucht. Auch kann man den ganzen Apparat einschliesslich des Entwicklungsapparates für das Ammoniak vorher mit Wasserstoff füllen.

Die so erhaltene Lösung des Kupferchlorürs wird durch Zusatz von Wasser auf 200 ccm verdünnt. — Zulässiger Absorptionswerth für 1 ccm = 6 ccm Kohlenoxyd.

II † Cuprum bichloratum crystallisatum Cuprichlorid Kupferchlorid
Chlorwasserstoffsäures Kupferoxyd $\text{CuCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 170

Zur Darstellung werden 100 Th. Kupferoxyd in 360 Th. Salzsäure von 25 Proc., welche mit 150 Th. destillirtem Wasser verdünnt ist, in der Wärme gelöst und die Lösung auf 300–250 Th. oder soweit eingedampft, bis ein Tropfen, auf eine kalte Porcellanschale gebracht, erstarrt. Man lässt die Gesamtmenge erstarren, presst zwischen Filtrirpapier, trocknet bei gewöhnlicher Temperatur und bewahrt in trocknen, gut verschlossenen Gefässen auf.

Grüne rhombische Krystalle, hygroskopisch, leicht löslich in Wasser und auch in Alkohol. Die wässrige Lösung ist schön grün, bei starker Verdünnung blau. Es wird etwas über 100° C. wasserfrei und geht in das braune, wasserfreie Salz CuCl_2 über. Durch Einwirkung von metallischem Kupfer wird das Cuprichlorid zu Cuprochlorid reducirt (§ S. 992).

Alterans und Tonicum, angewendet bei Skropheln, Rhachitis Hautaffektionen, Dyskrasien Gaben 0,005—0,01—0,015 g drei bis viermal täglich Grösste Einzelgabe 0,03 g

† **Cuprum bichloratum siccum.** Entwässertes Cuprichlorid oder Kupferchlorid CuCl_2 Mol Gew = 134

Es wird durch Erhitzen des obigen krystallarten Salzes auf 110°C erhalten Gelbbraune, zerfliessliche Masse, im übrigen von den Eigenschaften des vorigen

Aether Cupri
Rp Cupri bichlorati cryst 4,0
Aethers 100,0
Dosis 5—8 Tropfen

Aqua antiliasmatica KOECHLIN
Aqua Beisseri Liquor antiliasmaticus
BEISSER

Rp Liquoris antiliasmatici KOECHLIN 1,25
Aqua destillatae 100,0
Anfangs des Morgens, nach mehreren Tagen auch
des Abends einen Esslöffel voll.

Liquor antiliasmaticus KOECHLIN
Liquor Cupri chlorati ammoniatus

Rp Cupri bichlorati cristall 5,4
Ammonii chlorati 50,0
Aqua destillatae q s

(185) dass das Gesamtgewicht = 240,0 beträgt Klare, smaragdgrüne Flüssigkeit von 1,070 bis 1,072 spec Gewicht In 120,0 ist 1,0 Kupfer enthalten Innerlich gegen skrophulöse und syphilitische Haut-, Knochen- und Drüsenaffektionen, gegen Cardialgie, Epilepsie, Chorea etc zu 5—10—15 Tropfen in Verdünnung mehrmals täglich Aeusserlich, ohne Erfolg, zum Verbaude syphilitischer Geschwüre.

Tinctura Cupri bichlorati HELVETIUS

Rp Cupri bichlorati cryst 40,0
Spiritus (30 proc.) 100,0

5—7—10 Tropfen bei Epilepsie, Rhachitis, Wurmern.

Cuprum oxydatum.

I † **Cuprum oxydulatum** Cuprooxyd. Kupferoxydul Kupferhemioxyd. Cu_2O .
Mol. Gew = 142

Zur Darstellung stellt man eine Auflösung von 1 Th Traubenzucker (oder 1,5 Th Honig in 30 Th Wasser dar, filtrirt diese und versetzt sie mit 2—3 Th Seignettesalz sowie mit Natronlauge in reichlichem Ueberschuss (etwa 20 Th) und mischt eine Lösung von 1 Th krystall Kupfersulfat in 30 Th Wasser zu Man muss nun eine klare, lasurblaue Flüssigkeit haben (Ist dies nicht der Fall, so fehlt es entweder an Traubenzucker oder an Natronlauge oder an Seignettesalz) Diese Flüssigkeit erhitzt man auf dem Wasserbade oder auf freier Flamme, worauf sich das Kupferoxydul mikrokrySTALLINISCH abscheidet Man sammelt es, wäscht es zunächst mit heissem Wasser, bis das Ablaufende nicht mehr alkalisch reagirt, dann mit Alkohol und mit Aether und trocknet rasch

Rothes, krystallinisches Pulver vom spec Gew 5,84—5,87 Es verändert sich nicht an der Luft, ist unlöslich in Wasser In Ammoniakflüssigkeit ist es löslich, die ursprünglich farblose Lösung wird bei Luftzutritt blau Durch Chlorwasserstoffsäure wird es in Cuprochlorid verwandelt, sauerstoffhaltige Säuren, z B verdünnte Schwefelsäure, bringen die Hälfte des Kupfers als Kupferoxyd in Lösung, während die andere Hälfte als metallisches Kupfer ungelöst bleibt In feuchtem Zustande oxydirt es sich leicht an der Luft, im trocknen Zustande ist es haltbar Durch Ueberleiten von Wasserstoff oder von Methylalkoholdämpfen über Kupferoxydul in der Hitze wird dieses leicht zu metallischem Kupfer reducirt Durch Glühen an der Luft verglimmt es zu schwarzem Kupferoxyd — Es dient in der Technik zum Färben von Glasflüssen

Cuprohydroxyd, Kupferoxydulhydrat, $\text{Cu}_2(\text{OH})_2$, wird als kanariengelber Niederschlag durch Kalilauge aus Cuprochloridlösungen gefällt Es zersetzt sich schon unter 100°C in Cuprooxyd und Wasser

II † **Cuprum oxydatum** (Ergänzb) Oxyde noir de cuivre (Gall) **Cuprum oxydatum nigrum** RADEMACHER. Kupferoxyd Cuprioxyd. CuO Mol Gew = 79.

Das Kupferoxyd kann durch Erhitzen von metallischem Kupfer an der Luft oder durch Glühen von Cuprinitrat erhalten werden Da die so gewonnenen Präparate aber sehr dicht und selten rein sind, so soll das zum therapeutischen Gebrauche bestimmte Kupferoxyd durch Glühen von Cuprikarbonat dargestellt werden

Darstellung. Man löst 10 Th reines Kupfersulfat in 50 Th Wasser, anderseits 15 Th reines kryst Natriumkarbonat in 50 Th Wasser. Man mischt die filtrirten, klaren Lösungen und erwärmt die Mischung in einer Porcellanschale so lange, bis der Niederschlag sich am Boden des Gefasses in dichter Form abgeschieden. Hierauf wäscht man ihn zunächst durch Dekanthiren, dann auf dem Filter solange mit heissem Wasser, bis das Filtrat nicht mehr alkalisch reagirt, und trocknet ihn auf porösen Unterlagen, zuletzt im Wasserbadtrockenschranke. Den trocknen Niederschlag bringt man in einen Porcellantiegel oder Hessischen Tiegel und glüht ihn bei allmählich verstärktem Feuer so lange, bis eine aus der Mitte entnommene Probe nach dem völligen (!) Erkalten in verdünnter Salpetersäure ohne Aufbrausen von Kohlensäure löslich ist. Man füllt es noch warm in die trockenen, vorgewärmten Gefässe.

Eigenschaften. Schwarzes, glanzloses, spec schweres, nicht krystallinisches Pulver, welches in verdünnter Salpetersäure leicht, ohne Rückstand und ohne Entweichen von Kohlensäure löslich ist. Es ist zart anzufühlen, ohne Geruch und Geschmack, unlöslich in Wasser und Natronlauge, löslich in Säuren. Aus der Luft zieht es etwas Feuchtigkeit an. In Ammoniakflüssigkeit löst es sich mit blauer Farbe zu Kupferoxydammoniak. Durch Ueberleiten von Wasserstoff oder von Methylalkoholdämpfen in der Glühhitze wird es leicht zu metallischem Kupfer reducirt.

Prüfung. 1) Es löse sich in 10 Th. verdünnter Schwefelsäure ohne Aufbrausen (Kohlensäure). — 2) Die salpetersaure Lösung werde durch Baryumnitratlösung nicht sofort getrübt (mehr als Spuren Schwefelsäure). — 3) Die mit verdünnter Schwefelsäure bereitete Lösung gebe nach vollständiger Ausfällung des Kupfers durch Schwefelwasserstoff ein farbloses Filtrat, welches durch Ammoniakflüssigkeit nicht verändert werde (weisse Fällung = Zink oder Aluminium, schwarze Fällung = Eisen) und beim Verdampfen und Glühen keinen feuerbestandigen Rückstand hinterlasse (Kalk, Magnesia, Alkalien). — 4) Werden 0,2 g Kupferoxyd in 2 ccm verdünnter Schwefelsäure ohne Anwendung von Wärme gelöst, und wird die Lösung mit 2 ccm Ferrosulfatlösung vermischt und auf 2 ccm conc Schwefelsäure geschichtet, so darf keine braune Zwischenzone auftreten (Salpetersäure).

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Gefässen, wegen der hygroskopischen Eigenschaften siehe vorher.

Anwendung. Aeusserlich in Form von Salben (1,0 10,0–20,0 Fett) als zertheilendes Mittel bei Drüsengeschwülsten, Gelenkentzündungen, um die Resorption von Exsudaten zu beschleunigen, Hornhauttrübungen. Innerlich bei „Kinderkrankheiten“ und als Wurmmittel, besonders als Bandwurmmittel. Bei der innerlichen Darreichung sind saure Speisen zu vermeiden.

Pilulae Cupri oxydati HAGER
 Rp Cupri oxydati nigri 6,0
 Calcii carbonici 2,0
 Bolli albae 12,0
 Glycerini 11,0
 Fiat pilulae 120 Täglich einmal je 2 Pillen bei Vermeidung saurer Speisen gegen Bandwurm Erwachsener. Einige Tage nach Beendigung des Gebrauchs eine Gabe Ricinusöl. Kinder erhalten zweimal täglich 2 Pillen, im ganzen 50–60 Pillen.
Unguentum contra amaurosia SIEHRT.
 Rp Cupri oxydati nigri 2,0
 Olei Amygdalarum gtt. XV
 Adipis 20,0
 Zum Einreiben von Stirn und Schläfen bei schwarzem Starr infolge übermässigen Tabakrauchens

Unguentum contra zonam
 Rp Cupri oxydati nigri 1,0–4,0
 Unguenti rosati 30,0
 Bei Gürtelrose. Die befallenen Hautstellen werden des Morgens und des Abends eingerieben.

Vet. Pilulae taenifugae HAGER
 Bandwurmpillen für Hunde.
 Rp Cupri oxydati nigri
 Bolli albae 55 10 0
 Glycerini 8,0
 Aquae q s
 Fiat pilulae 200 Kleinen Hunden täglich eine, grösseren täglich zweimal eine Pille im Fleisch gehüllt zu geben, zwei Wochen hindurch.

Vet. Klauenseuchensalbe
 Rp Cupri oxydati 5 0
 Aluminis usti 10 0
 Ammonii hydrochloridi 2 0
 Camphorae 1,0
 Unguenti populei 50,0

Cuprum oxydatum purum granulatum ist ein aus hasen- bis erbsengrossen Stücken bestehendes Kupferoxyd, welches durch Glühen von Cuprinitrat dargestellt wird. Man gebraucht es wesentlich zur Verbrennung in der Elementar-Analyse. Zu diesem Zwecke muss es namentlich frei sein von Salpetersäure, Kohlenstoff bezw. Kohlensäure und Wasser. Dies wird dadurch erreicht, dass man das Kupferoxyd vor jeder neuen Benutzung entweder an der Luft oder im Sauerstoffstrom und zwar im Kupfertiegel oder direkt im Verbrennungsrohr einige Zeit ausglüht. Die Aufbewahrung erfolgt zweckmässig in „Glasbirnen“ unter Chlorcalciumverschluss.

Cuprum oxydatum purum in Drahtform Wird durch Glühen von Kupferdraht stücken im Sauerstoffstrom erhalten und dient gleichfalls zur Elementar-Analyse. Für das selbe gilt das Nämliche, was für das vorige Präparat gesagt worden ist.

Cuprum hydroxydatum **Cuprihydroxyd** **Kupferoxydhydrat** $\text{Cu}(\text{OH})_2$
Mol Gew = 97 Diese Verbindung fällt als hellblauer, gelatinöser Niederschlag aus Kupfersalzlösungen auf Zusatz von atzenden Alkalien. Will man sie auswaschen, so lasse man sie bei 60–70°C stehen, bis sie körnige Beschaffenheit angenommen hat. Erhitzen bis zum Sieden ist unzulässig, weil alsdann das Cuprihydroxyd in Wasser und Kupferoxyd zerfällt. Das Cuprihydroxyd löst sich in Säuren und bei Gegenwart von Traubenzucker, Glycerin, Mannit und weinsäuren Salzen auch in atzenden Alkalien. Ferner wird es von Ammoniak leicht gelöst.

Halbbares kupferhydroxyd nach STUTZER (Zur Fällung der Eiweissstoffe) 100,0 g kryst. Kupfersulfat werden in 5 Liter Wasser gelöst und mit 2,5 g Glycerin versetzt. Aus dieser Lösung wird durch Zusatz von verdünnter Natronlauge, bis die Flüssigkeit alkalisch reagiert, das Kupfer als Hydroxyd ausgefällt. Letzteres wird abfiltriert, alsdann durch Anreiben mit Wasser, welches pro Liter 5 g Glycerin enthält, aufgeschlämmt. Durch wiederholtes Dekanthieren und Filtrieren entfernt man die letzten Spuren von Alkali. Der Filtrückstand wird mit Wasser, dem man 10 Proc. Glycerin zugesetzt hat, verrieben und bis zu einer Verdünnung gebracht, dass derselbe eine gleichmässige, mit einer Pipette aufsaugbare Masse bildet. Dieselbe wird in gut verschlossenen Flaschen und im Dunkeln aufbewahrt. Den Gehalt der bräunlichen Masse an Kupferhydroxyd bestimmt man durch Eindunsten eines abgemessenen Volumens und Glühen des Rückstandes.

III Cuprum oxydatum ammoniacatum **Kupferoxydammoniak** **Cuoxam** (Amerikanische Abkürzung) $\text{CuO} \cdot 4\text{NH}_3 \cdot \text{OH}$. Zur Verwendung gelangt die wässrige Auflösung dieser Verbindung, und zwar als Reagens.

2,0 g krystall. Kupfersulfat werden in 100 ccm destillirtem Wasser gelöst und einige Tropfen concentrirte Ammoniumchloridlösung zugefügt. Hierauf bereitet man eine Lösung von 1,0 g Kohhydrat in 100 ccm Wasser und setzt etwas Barytwasser zu, um das vorhandene Kaliumkarbonat zu fällen. Beide Lösungen werden gemischt. Von dem sich absetzenden Kupferhydroxyd wird dekanthirt, dann wird der Niederschlag wiederholt mit destillirtem Wasser gewaschen, schliesslich abfiltrirt. Den noch feuchten Niederschlag übergiesst man in einer Porcellanschale mit concentrirtem Ammoniak (0,900 spec. Gew.) und filtrirt, sobald Auflösung erfolgt ist, durch Glaswolle.

Das Reagens ist im Dunkeln aufzubewahren, trotzdem zersetzt es sich nach einiger Zeit. Es empfiehlt sich daher, das ausgewaschene Kupferhydroxyd unter Wasser aufzuwahren und im Bedarfsfalle eine kleine Menge desselben in concentrirtem Ammoniak aufzulösen.

Kupferoxydammoniak bringt Cellulose zunächst zum Quellen und löst sie schliesslich vollständig auf. Aus der Lösung wird durch Zusatz von Säuren wieder Cellulose gefällt.

Cuprum sulfuricum.

I. † Cuprum sulfuricum (Austr. Germ. Helv.) **Cuprum sulfuricum purum** **Sulfate de cuivre** (Gall.) **Cupri Sulphas** (Brit. U-St.) **Kupfersulfat** **Cuprisulfat**. Schwefelsaures Kupfer. Reiner Kupfervitriol. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. **Mol. Gew** = 249. Das reine Kupfersulfat lässt sich mit Vortheil nicht aus dem rohen Kupfervitriol gewinnen, man stellt es zweckmässig aus Kupfer dar.

Darstellung 10 Th Kupferschnittel werden mit 30 Th Wasser übergossen, dazu ein erkaltetes und filtrirtes Gemisch von 18 Th engl. Schwefelsäure und 32 Th Wasser

gegeben Man fugt nun in kleinen Antheilen 27 Th Salpetersäure (von 25 Proc) hinzu und erwärmt inzwischen allmählich, schliesslich kurze Zeit zum Sieden. Nach erfolgter Auflösung des Kupfers filtrirt man noch heiss, dampft die Lösung in einer Porcellanschale ein, erhitzt (zur Vertreibung der Salpetersäure) den Rückstand im Sandbade oder über einem Drahtnetz, bis schwere weisse Dämpfe von Schwefelsäure entweichen. Dann lässt man erkalten, lost den Rückstand in etwa 60–70 Th siedendem Wasser, filtrirt heiss und lässt in der Kälte krystallisiren. Das aus den Mutterlaugen zu gewinnende Kupfersulfat verbraucht man als rohen Kupfervitriol. Ausbeute etwa 37 Th.

In sehr handlicher Form lässt sich das Kupfersulfat gewinnen, wenn man die heiss gesättigte wässrige Lösung des reinen Salzes in ein 3–4faches Volumen Alkohol unter Umrühren hineinfiltrirt. Man erhält es dann als krystallinisches Pulver, welches nach dem Absaugen an der Luft getrocknet wird.

Eigenschaften Das reine Cuprisulfat bildet kleinere, durchscheinende, isorhombische, schiefrhombische Krystalle von widerlichem, metallischem Geschmacke, an der Luft allmählich verwitternd, löslich in 3,5 Th kaltem oder 1 Th heissem Wasser, unlöslich in Weingeist. Die wässrige Lösung reagirt sauer und fällt Eiweiss. Das gepulverte Salz ist blauweiss. Durch Erhitzen bis 100°C verliert das Kupfersulfat 4 Mol Krystallwasser, bei 200°C wird es völlig entwässert und bildet ein weisses Pulver, CuSO_4 , welches begierig Wasser aus der Luft oder anderen Medien (Weingeist) aufnimmt unter Uebergang in das krystallwasserhaltige blaue Salz. In gelinder Glühhitze wird es nicht zersetzt, in starker Rothglühhitze entweichen Schwefelsäure, Schweflige Säure sowie Sauerstoff, und Cuproxid bleibt als Rückstand. — Es krystallisirt mit gewissen Salzen (ZnSO_4 , MgSO_4 , FeSO_4) zusammen und ist von diesen durch blosse Krystallisation nicht zu trennen.

Volumengewicht und Gehalt der Lösungen von Cuprisulfat bei 15°C

Vol Gew	Proc $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$	Vol Gew	Proc $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$	Vol Gew	Proc $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$
1,0126	2	1,0649	10	1,1208	18
1,0254	4	1,0785	12	1,1354	20
1,0384	6	1,0933	14	1,1501	22
1,0516	8	1,1063	16	1,1659	24

Prüfung. Man löst 0,5 g des Salzes in 20 cem destillirtem Wasser, fugt einige Tropfen Salzsäure hinzu, erwärmt und fällt das Kupfer durch Einleiten von Schwefelwasserstoff als Cuprisulfid. Das Filtrat von diesem darf a) durch Hinzufügung von Ammoniakflüssigkeit weder dunkel (Eisen, Nickel) noch weiss (Zink) gefällt werden, b) noch nach dem Eindampfen und Glühen einen feuerbestandigen Rückstand hinterlassen (Eisen, Zink, Magnesia, Kalk, Alkalien).

Aufbewahrung Man bewahrt das reine Kupfersulfat in wohlgeschlossenen Gefässen vorsichtig auf. Man hält den Hauptvorrath in Form der Krystalle oder in Form des durch Weingeist niedergeschlagenen Krystallmehles (sehr zweckmässig), eine kleine Menge für den Rezepturgebrauch halt man als feines Pulver vorrathig.

† **Cuprum sulfuricum siccum** Entwässertes Kupfersulfat. Man trocknet das zerriebene Kupfersulfat zunächst im Trockenschranke vor, alsdann erhitzt man es in einer Porcellanschale im Sandbade unter Umrühren, bis es weiss geworden ist, zerreibt es und füllt es sofort in erwärmte, gut zu verschliessende Gefässe ab. Es dient zum Nachweis eines Wassergehaltes im Alkohol, Aether und ähnlichen Flüssigkeiten.

† **Cuprum sulfuricum in bacillis** Kupfervitriolstifte. 1) Diejenigen des Handels werden durch Schleifen ausgesucht grosser und schöner Krystalle von Kupfersulfat auf einem nassen Schleifstein dargestellt. 2) Frisch gepulvertes Kupfersulfat wird mit einigen Tropfen Wasser befeuchtet und in einer Porcellanschale unter Umrühren zum Schmelzen erhitzt, bis eine zähe Masse entstanden ist. Diese wird alsbald in ca 4 mm dicke Stäbe ausgegossen.


II † **Cuprum sulfuricum crudum** (Germ) Rohes Kupfersulfat. Rohes Kupfervitriol. Blauer Vitriol. Blauer Galzenstein. Vitriolum Cupri. Vitriol blen. Couperose bleue. Blue vitriol. Blue stone. Morthoot. Dieses Salz wird in

grossen Mengen in den Hüttenwerken dargestellt und als „Kupfervitriol“ in den Handel gebracht. Es ist häufig ziemlich rein, bisweilen aber auch durch Ferrosulfat, Magnesiumsulfat, Aluminiumsulfat und andere Salze stark verunreinigt.

In seinen Eigenschaften gleicht der rohe Kupfervitriol völlig dem reinen Kupfersulfat, nur stellt er sehr viel grössere Krystalle dar.

Prüfung Die wässrige Lösung gebe mit überschüssiger Ammoniakflüssigkeit eine tiefblaue, klare oder fast klare Flüssigkeit. Reines Kupfersulfat würde eine klare Flüssigkeit geben. Eine Trübung konnte herrühren von Eisen, Thonerde, vielleicht auch Magnesia. Es sind daher geringe Mengen dieser Verunreinigungen zulässig. Da die Beobachtung einer Trübung in der tiefblauen Flüssigkeit schwierig ist, so filtrire man die Lösung durch ein angesaugtes Filter ab und sehe sich einen hinterbleibenden, in der Regel aus Eisenoxyd bestehenden Rückstand näher an.

Eine maassanalytische Bestimmung des Kupfergehaltes lässt sich sehr leicht in der Weise ausführen, dass man 0,2–0,8 g Kupfervitriol in 20 ccm Wasser auflöst, 1–2 g Jodkalium hinzusetzt und nun das ausgeschiedene Jod mit $\frac{1}{10}$ Natriumthiosulfat misst. Da die Reaktion nach der Gleichung



verläuft, so entspricht 1 ccm $\frac{1}{10}$ Natriumthiosulfatlösung = 0,0249 g Kupfersulfat ($\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$).

Die Vitriole des Handels, welche als Salzburger Vitriol, Admonter Vitriol, Bairenther Vitriol, Adlervitriol, Doppelvitriol etc. unterschieden werden, sind nie reiner Kupfervitriol, sondern aus Ferrosulfat und Cuprisulfat bestehende Vitriole. Heller Cypervitriol besteht aus Kupfersulfat und Zinksulfat.

Anwendung Die löslichen Kupfersalze fallen in nicht zu starker Verdünnung Erweiss und Schleim. Daher wirken lösliche Kupfersalze in Substanz oder konzentrierter Lösung auf Schleimhäuten und Wunden atzend, in verdünnter Lösung adstringierend. Ausserdem wirken sie antiseptisch. Innerlich genommen wirken sie brechenenerregend und nervenuntersetzend. In starken Gaben wirken sie giftig und selbst tödtlich. Gegenmittel sind Erweiss, Eisenpulver, Schwefeleisen, Blutlaugensalz. Man giebt das Kupfersulfat zu 0,004–0,025 g bei passiven Blutungen, Epilepsie, Verstanzen und anderen Nervenleiden, als Brechmittel zu 0,05–0,1–0,2 g 4–5 mal innerhalb einer Stunde. Höchstgaben *pro dosi* 0,05 g, *pro die* 0,5 g (Helv.) als Emetikum 1,0 g (Germ. Helv.) 0,4 g (Austr.).

Ausserlich dient das Kupfersulfat in verdünnten Lösungen als adstringirendes Mittel bei mannigfachen Entzündungen der Schleimhäute, in Substanz als Aetzmittel, namentlich in der Form der Kupferstifte. In der Analyse wird Kupfersulfat zur Bestimmung des Erweisses (nach RUTHAUSEN) und zur Bestimmung des Zuckers (nach FEHLING) benutzt.

III † Cuprum sulfuricum ammoniatum (Erganzb.) Ammonium cuprico sulfuricum. Kupferammoniumsulfat. Sulfate de cuivre ammoniacal (Gall.) Ammoniakalkalisches Kupfersulfat. Schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak.

Bereitung. 50 Th. Kupfersulfatkrystalle werden unter Umschütteln in 150 Th. Aetzammon gelöst, wenn nöthig durch ein Bauschoten Glaswolle filtrirt und mit 800 Th. Weingeist gemischt. Den Niederschlag sammelt man in einem Filter und trocknet ihn ohne Anwendung von Wärme durch Walzen auf Fliesspapier. Ausbeute fast 84 Theile.

Man erhält es so als krystallinisches Pulver. Will man ausgebildete Krystalle erzielen (wie Gall. vorschreibt), so schichtet man in hohen Cylindern auf die ammoniakalische Kupferlösung vorsichtig ein gleiches Volumen Alkohol von 90 Proc. und lässt die Mischung, ohne sie zu bewegen, stehen. Nach 1–2–3 Tagen haben sich prachtvolle Krystalle abgeschieden.

Eigenschaften Das officinelle ammoniakalische Kupfersulfat bildet ein dunkel blaues Krystallpulver von schwachem ammoniakalischem Geruche, ähnlichem, ekelhaft metallischem, ammoniakalischem Geschmacke und alkalischer Reaktion. Es ist in $1\frac{1}{2}$ Th kaltem Wasser löslich, mit vielem Wasser scheidet sich daraus ein Salz von blassblauer Farbe ab, welches etwas weniger Ammoniak enthält. Längere Zeit der Luft ausgesetzt, verwittert es, besonders das grössere Krystalle bildende Präparat, es verliert einen Theil seines Ammoniak- und Wassergehalts und wird zuletzt zu einem bläulichgrünen Salzpulver, aus schwefelsaurem Ammon und basischem Kupfersulfat bestehend. Durch Erhitzen verliert es Ammoniak und Wasser, so dass endlich bei 250°C schwefelsaures Kupferoxyd zurückbleibt. Die Zusammensetzung ist $\text{CuSO}_4 + 4\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

Lässt man schwefelsaures Ammon und schwefelsaures Kupferoxyd zusammen krystallisiren, so krystallisirt ein Doppelsalz, das mit dem obigen Präparate nicht zu wechseln ist.

Prüfung Gesättigt blaue Farbe der Krystalle und eine schnelle und bei gewöhnlicher Temperatur erfolgende vollständige Auflösung in 2 Th destill. Wasser sind hinreichende Beweise der Güte. Ein Präparat mit kohlensaurem Ammon bereitet ist nicht von krystallinischer Beschaffenheit, braust auch wohl mit Säuren auf. Auf Zusatz von Aetzkali muss sich Aetzammon entwickeln.

Aufbewahrung Wegen seiner leichten Zersetzbarkeit an der Luft wird das ammoniakalische Kupfersulfat in kleinen, mit guten Korkpfropfen dicht verschlossenen Glasflaschen in der Reihe der starkwirkenden Arzneikörper aufbewahrt.

Anwendung Das ammoniakalische Kupfersulfat gilt als Adstringens, Antispasmodicum und Antiepilepticum. Man giebt dieses Mittel in Pillen und in Auflösung zu 0,01—0,03—0,05 bei mehreren Nervenkrankheiten, wie Epilepsie, Vertigo, Asthma, Magenkrampf. Aeusserlich wird es gegen Hornhautflecke, chronische Augenentzündungen, zu Einspritzungen gegen Tripper und Schlemmflüsse etc. angewendet. Höchstgaben 0,2 g pro dosi, 0,4 g pro die (Ergänz.)

Aqua coerulea seu coelestis.
Rp Cupri sulfurici crystalli 10
Aquae destillatae 575,0
Liquoris Ammonii caustici q s
ad solutionem (50)

Aqua divina externa
Aqua ophthalmica HELVETII
Rp Cupri aluminati 10
Aquae Rosae 2000
Man löse durch Anreiben und filtrire

Aqua ophthalmica ODHELMUS
Aqua ophthalmica YVEL, Collyrium SAINT-JEROMEON
Aqua ophthalmica ALIBOUR
ALIBOUR Wasser Grünes Augenwasser

Rp Cupri sulfurici 33 1,0
Camphorae tritae 0,1
Tincturae Opi crocatae 3,0
Aquae tepidae 200,0
Ungeschüttelt als Augentropfwasser und Augenwaschwasser. Auch zum Verbinden von Wunden.

Aqua ophthalmica SIEGEL.
Rp Cupri sulfurici 0,2
Aquae destillatae 80,0
Tincturae Opi simplicis 0,3
Augenwasser gegen chronische Conjunctivitis.

Aqua styptica
Aqua vitriolica coerulea
Rp Cupri sulfurici
Aluminis 33 100
Aquae destillatae 1800
Acidi sulfurici conc 1,3 g

Collyrium cum Lapide divino
Collyre à la pierre divine
Rp Cupri aluminati 04
Aquae destillatae 100,0
Man löse durch Anreiben und filtrire

† Cuprum aluminatum (Germ., Helv.)
Lapis divinus St. YVES Lapis ophthalmicus
Vitriolum camphoratum Augenstein Heiligenstein Kupferstein

I Germ. Helv.
Rp 1 Aluminis
2 Kalii nitrici
3 Cupri sulfurici 33 160
4 Aluminis
5 Camphorae 33 1,0
1—3 werden gepulvert, gemischt und geschmolzen, worauf man die Mischung von 4 und 5 unter Umrühren mit einem erwärmten Glasstabe zugeibt. Die Schmelze wird auf eine kalte Steinplatte oder in Stangenformen ausgegossen. Als Schmelzgefäss benutzt man die S 375 angegebene Porcellanpfanne.

II. Pierre divine (Gall.).
Rp Kalii nitrici pulv
Cupri sulfurici
Aluminis 33 100,0
Camphorae 5,0

Guttae antiepilepticae NEUMANN
Rp Cupri sulfurici ammoniaci 1,5
Aquae destillatae 20,0
Täglich zweimal 5 Tropfen gegen Chorea und Epilepsie

Lapis causticus LIOUET
LIOUET's Aetzstift
 Rp Cupri sulfurici recentis pulv 60,0
 Aluminis crystall. contusi 30,0
 Man schmilzt die Mischung und giest in Stüben-
 form aus

Liquor corrosivus (Ex. Jünz)
Aetzflüssigkeit VILLAT'sche Lösung
 Rp Cupri sulfurici
 Zinci sulfurici aa 5,0
 Aceti (6 %) 80,0
 Liquoris Plumbi subacetici 10,0
 Nur auf Verordnung zu bereiten

Pasta escharotica FAXAN
 Rp Cupri sulfurici pulv 10,0
 Vitelli ovi q s
 Fiat pasta mollis Die Aetzwirkung soll inner
 halb 1—3 Stunden erfolgen und die Heilung des
 Schorfes keine Narbe hinterlassen

Pilulae Cupri sulfurici ammoniaci
 Rp Cupri sulfurici ammoniaci 1,0
 Bolus albus 7,0
 Liquoris Ammonii caustici gtt XV
 Glycerini q s
 Fiat pilulae 100 Dreimal täglich eine Pille, bei
 Epilepsie Chorea

Pulvis ophthalmicus JÜNGEREN
 Rp Cupri aluminati 1,0
 Opi 0,5
 Sacchari albi 40
 Augenstreupulver bei Hornhautflecken.

Unctura antimiasmatica GORLIS
 Rp Cupri sulfurici ammoniaci 5,0
 Aquae destillatae 45,0
 Acidi hydrochlorici (25 %) gtt II

Unguentum antiblephariticum MUELLER
 Rp Cupri sulfurici pulv 0,5
 Unguenti Glycerini 15,0

Unguentum ophthalmicum DESMARRE
 Rp Cupri sulfurici 0,2
 Butyri insulsi 4,0
 Camphorae 0,4

Liquor Cupri sulfurici PURDY
 Rp Cupri sulfurici crystallisati 4 15 g
 Manniti 10,0 *
 Kalii hydrici 20,4 *
 Liquoris Ammonii caustici
 (0,88 sp Gew) 300 ccm
 Glycerini 50 ccm
 Aquae q s ad 1 Liter

20 ccm dieser Lösung werden durch 15 Milligramm
 Traubenzucker reduziert

Azurin. Mittel zur Vertilgung der *Peronospora* Rp Cupri sulfurici crudi 1 kg,
 Liquoris Ammonii caustici (20 Proc) 1,5 kg, Aquae 330 Liter

Burgunder Brühe, Seifige Kupferkarbonatbrühe, zum Vertilgen der *Perono-*
spora Rp Cupri sulfurici crudi 125 g, Natr. carbonici cryst 175,0 g, Saponis domestici
 25,0 g, Aquae 10 Liter

Bordelaiser Brei gegen die Peronospora und gegen die Kartoffelkrank-
heit Man löst 8 kg Kupfervitriol in 100 Liter Wasser, ferner löst man 15 kg Aetzkalk
 mit 30 Liter Wasser und mischt das Kalkhydrat nach dem Eiskalten (!) der Kupfer-
 lösung zu

Gezuckerte Kupferkalkbrühe 1) Nach BARTH Kupfervitriol 2 kg, gebrannter
 Kalk 1,5 kg, Zucker 0,3 kg, Wasser 100 l 2) Nach PETERMANN Kupfervitriol 2 kg, Aetz-
 kalk 4 kg, Melasse 4 kg, Wasser 100 l 3) Nach PEGLION Kupfervitriol 1,5 kg, Aetzkalk 1,5 kg,
 Zucker 0,75 kg, Wasser 100 l

Kupferzuckeralkapulver. Entwässertes Kupfervitriol 40 Th, Kalkstaub 50 Th,
 gemahlener Zucker 10 Th Auf 100 l Wasser = 3 kg des Pulvers zuzusetzen

Kupferkarbonatbrühe. Kupfervitriol 0,4—0,7 kg, krystall Soda 0,4—0,7 kg, Wasser
 100 Liter

Vet Aqua styptica exungulantium
 Heilwasser für Klauenseuche der Schafe
 Rp Cupri sulfurici crudi 60,0
 Acidi sulfurici Anglii
 Acidi carbonici aa 5,0
 Glycerini 100,0
 Aceti (6 %) 900,0

Vet Aqua vulneraria cuprica
 Rp Cupri sulfurici 0,4
 Liquoris Ammonii caustici (10 %) 10,0
 Spiritus 5,0
 Aqua 80,0
 Aeusserlich bei Wunden und Beulen

Rp Cupri sulfurici 30,0
 Benzoes pulv 60,0
 Aquae communis 1200,0
 Wird im bedeckten Gefäß gekocht und filtrirt.
 Zur Waschung bei Gelenkbrüchen

Vet Pasta gegen Fussesäule
(Foot-Pot Paste)
 Rp Cupri sulfurici
 Ferri oxydati aa 120,0
 Acidi aceticis glacialis 90,0
 Glycerini 80,0
 Wird mit Leinol zur Paste verarbeitet

Vet Linimentum antiparonychicum
Maukewasser
 Rp Aluminis 20,0
 Cupri sulfurici 80,0
 Aquae carbolisatæ (8 %) 400,0
 Glycerini 100,0
 Tincturae Aloës 20,0

Vet Liqueur de Villate (Gall)
Liquor Villate Aqua styptica VILLAT
 Rp Cupri sulfurici cryst
 Zinci sulfurici cryst aa 15,0
 Aceti (7—8 %) 200,0
 Liquoris Plumbi subacetici
 (1,32 sp Gew) 30,0
 Diese Vorschrift ist die der Gall In Deutschland
 wird sie durch den Liquor corrosivus des
 Ergänz. zu ersetzen sein (s oben)

Vet. SCHLEG'sches Pulver
gegen Strahlkrebs der Pferde
 Rp Ferri sulfurici cryst 20,0
 Cupri sulfurici cryst 30,0
 Rhizomatis Tormentillae 40,0

Eine elcste von AUDOYNAUD Cupri sulfurici crudi, Laquoris Ammonii caustici (20 Proc) je 1 kg, Aquae 400 Liter

Mittel gegen Black Rot (d. i. Schwarzfaule, Laetitia Bidwellii (Ell.) V und R) Eine Lösung von 50 g Kupfervitriol wird in eine Lösung von 100 g Kaliseife eingegossen und das Ganze auf 10 Liter aufgefüllt

DUPUR's Samenbeize ist rohes Kupfervitriol

Peironosporicid von EISENSTEIN in Wien Ist mit Kochsalz vermischtes rohes Kupfersulfat

Urinal-Cakes, zum Einlegen in Pissoirbacken, um diese zu desinficiren Eine Mischung von Kupfervitriol, Eisenvitriol, Zinkvitriol, Alaun, Glaubersalz wird unter Zugabe von etwas Harzlösung (Harzseife?) in Kuchen gepresst

Cupri salia varia.

I † Cuprum iodatum Kupferjodür Cuprojodid Cu_2I_2 Mol Gew = 380 20,0 krystallisirtes Cuprisulfat und 25,0 krystallisirtes Ferrosulfat werden in 500,0 destillirtem Wasser gelöst und die filtrirte Lösung unter Umrühren mit einer Lösung von 14,0 Kaliumjodid in 150,0 destillirtem Wasser versetzt Der Niederschlag wird nach einigen Stunden gesammelt, gewaschen und in der Wärme des Wasserbades getrocknet Ausbeute 15,0 Ein weissliches Pulver, unlöslich in Wasser und verdünnten Säuren, löslich in Aetzammon und Kaliumjodidlösung Es enthält 66,7 Proc Jod Wird in Salben (1 auf 10) angewendet

II † Cuprum nitricum Cuprimnitrat Kupfernitrat Salpetersaures Kupferoxyd $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 241 In 100 Th einer 25procentigen Salpetersaure werden nach und nach Kupferspäne eingetragen, so lange Auflösung stattfindet (gegen 13 Th) Die Lösung lässt man absetzen, filtrirt durch Glaswolle und dampft sie im Wasserbade bis zum Salzhautehen ein Dann lässt man nicht unter 10°C krystallisiren, presst das Salz zwischen Filterpapier, lässt es auf poröser Unterlage an der Luft trocknen und bringt es sogleich in die gut zu verschliessenden Gefässe

Man kann auch Kupferoxyd in Salpetersäure lösen und in gleicher Weise weiter verarbeiten — Unter 21°C scheiden sich tafelförmige Krystalle $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ aus

Das Kupfernitrat bildet ein lasurblaues Krystallpulver (oder lasurblaue grossere Krystalle) Es ist hygroskopisch, leicht löslich in Wasser und Weingeist

Es wurde einmal innerlich und äusserlich gegen Syphilis empfohlen und zu 0,005—0,0075—0,01 g dreimal bis viermal täglich gegeben. Die grösste Einzelgabe ist zu 0,025, die grösste Gesamtgabe auf den Tag zu 0,1 g anzunehmen Äusserlich (0,5—1,5 auf 100,0) hat man es zum Verbands oder zum Bepinseln syphilitischer Geschwüre, in Injektion (0,2—0,5 auf 100,0) bei Gonorrhoe und chronischen Hamorrhagien angewendet Es ist ein Causticum und in seiner Wirkung vom Kupfersulfat wohl nicht wesentlich verschieden.

Das Kupfernitrat wird zur Darstellung des Kupferoxyds, zu Bronchitisfällen, auch in der Kattundruckerei, eine ammoniakalische Lösung in der Färberei gebraucht Vorsichtig und vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren

III † Cuprum carbonicum. Cuprum subcarbonicum Kupferkarbonat. Kupfersubkarbonat. Basisch-kohlensaures Kupfer $\text{CuCO}_3, \text{Cu}(\text{OH})_2$ Mol. Gew = 220.

Zur Darstellung erwärmt man in einem kupfernen Kessel oder in einer Porcellanschale eine filtrirte Lösung von 120,0 Th krystall. Natriumkarbonat in 1000,0 Th destillirtem Wasser und trägt in diese Lösung unter Umrühren eine zweite filtrirte Lösung aus 100,0 Th krystall. reinen Kupfersulfat in 1000,0 Th. destill. Wasser ein Man überzeugt sich alsdann, dass die Flüssigkeit deutlich alkalisch reagirt, sollte dies nicht der Fall sein, so ist noch Natriumkarbonat bis zur alkalischen Reaktion hinzuzufügen Man erwärmt nun die Mischung unter gelegentlichem Umrühren solange auf $50\text{--}60^\circ\text{C}$, bis der ursprünglich gelatinöse Niederschlag körnig-krystallinisch geworden ist. Dann wäscht man mit heissem Wasser zunächst durch Dekanthiren, später auf dem Filter, bis das Ablaufende

nicht mehr alkalisch reagirt, presst den Niederschlag ab und trocknet ihn bei 50–60°C Ausbeute etwa 50,0 Th

Ein specifisch leichtes, grünlichblaues, neutrales Pulver, in Wasser unlöslich, in verdünnten Mineralsäuren (z B Salzsäure), auch in Ammoniakflüssigkeit löslich. Es wird zur Darstellung von Kupfersalzen verwendet.

Innerlich in Gaben von 0,2–0,5 g vier- bis sechsmal täglich in Pulvern oder Pillen gegen Neuralgien angewendet. Neuerdings von BAMBERGER gegen Phosphorvergiftung empfohlen. Nachdem ein Brechmittel von Kupfersulfat vorausgegangen, wird 0,25 bis 0,5 g Kupferkarbonat, in Wasser vertheilt, anfangs halbstündlich gereicht, wobei jedes mal 1 Essloß Wasser nachgetrunken wird. In den Intervallen kaltes Getränk, Eisstückchen oder Fruchtsaft, nach einigen Stunden wieder Emeticum von Kupfersulfat. Die Phosphorkugeln sollen sich dadurch mit einer schwarzen Schicht von Phosphorkupfer überziehen, welche das weitere Verdampfen bez die Resorption des Phosphors verhindert. Aeusserlich in Salben und Pflastern 2,0–3,0 10,0

IV †† Cuprum arsenicosum Cuprum subarsenicum. Cupriarsenit. Arsenigsaures Kupferoxyd. SCHEELE'sches Grün. Man löst 10 Th Arsenigsaureanhydrid durch Kochen mit einer Lösung von 20 Th trockenem Aetzkali in 20 Th destillirtem Wasser, verdünnt mit 400 Th destillirtem Wasser und mischt die filtrirte Lösung nach dem Erkalten mit einer filtrirten Lösung von 20 Th krystall. Kupfersulfat in 200 Th destillirtem Wasser. Man lasst den Niederschlag an einem warmen Orte absetzen, filtrirt ihn ab, wäscht ihn mit Wasser aus und trocknet ihn auf porösen Unterlagen bei etwa 50°C. Die Zusammensetzung des Niederschlages ist nicht ganz konstant, entspricht aber annähernd dem Ausdruck CuHAsO_4 .

Zeisgrünes Pulver, in Wasser unlöslich, in Ammoniak löslich. Von Kalilauge wird es mit blauer Farbe gelöst, aus dieser Lösung scheidet sich beim Erkalten langsam, rascher beim Erwärmen, rothes Kupferoxydul aus. Findet nur selten arzneiliche Verwendung. Aufbewahrung Sehr vorsichtig.

Höchstgaben *pro dosi* 0,01 g, *pro die* 0,025 g. Die technischen Sorten fanden früher als SCHEELE'sches Grün oder Schwedisches Grün Verwendung, ihre Benutzung unterliegt indessen heute vielfacher gesetzlicher Beschränkung.

V †† Cuprum acetico-arsenicum Essig arsenigsaures Kupfer. Schweinfurter Grün. Diese zwar giftige, aber sehr schöne grüne Farbe wird dargestellt durch Kochen von Grünspan mit arseniger Säure und Essig. Nach LIEBIG löst man 4 Th basischen Grünspan und 3 Th arsenige Säure, beide für sich, in der genügenden Menge gewöhnlichen Essigs unter Erhitzen bis zum Sieden auf. Man vermischt die Lösungen, dampft das klare hellgrüne Gemisch ab, besetztigt einen geringen, zunächst entstehenden Niederschlag durch Filtriren, worauf sich alsdann die grüne Farbe in grösseren Mengen und zwar in Krystallen abscheidet.



Fig 233 Krystallisirtes Schweinfurter Grün bei 150facher linearer Vergrößerung

Das Schweinfurter Grün ist ein smaragdgrünes Pulver, welches aus mikroskopischen Krystallen besteht. Seine Nuance ist um so dunkler, je grösser die Krystallchen sind. Wird es zerrieben, so wird auch die Nuance heller. Ein als amorphes Pulver im Handel vorkommendes (Englischgrün) deckt zwar besser als das erstgenannte, es hat aber nicht das Feuer wie dieses. Welche Sorte vorliegt, erkennt man mit Leichtigkeit unter dem Mikroskop (s Fig 233). Das krystallisirte Schweinfurter Grün stellt Sphaeroide oder undeutlich ausgebildete sechseckige Krystalle dar mit dunklem Rand und dunklem Centrum in einer zwischen diesen liegenden, grün durchleuchtenden helleren Zone. Die Krystalle sind vielfach mit einander verwachsen.

Das Schweinfurter Grün ist eine Doppelverbindung von Cupriacetat und Cupriarsenit. Seine Zusammensetzung wird durch den Ausdruck $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2 + 3\text{Cu}(\text{AsO}_2)_2$ oder $(\text{Cu})_4 \text{CH}_3\text{CO}_2 (\text{AsO}_2)_6$ wiedergegeben. Es enthält etwa 33 Proc Kupferoxyd, 56 Proc

Arsenigsäure-Anhydrid, 8 Proc Essigsäure und 3 Proc Wasser. Es löst sich sowohl in starken Mineralsäuren als auch in Ammoniak auf und unterscheidet sich vom SCHEELSEHEN Grün dadurch, dass es, im einseitig geschlossenen Glasrohr erhitzt, das widerlich riechende Kakodyl (s S 401) entwickelt.

Es wird sowohl als Oelfarbenanstrich als auch als Wasserfarbe verwendet, doch ist seine Verwendung zur Zeit gesetzlich beschränkt. In Nord-Amerika bildet es einen bedeutenden Produktions- und Handelsartikel. Es wird dort unter dem Namen „Paris green“ zum Bestreuen der Kartoffelfelder und anderer Felder gegen den Colorado Käfer (*Doryphora decemimata*) verwendet. Es kommt aber zu diesem Zwecke nur stark mit Gips vermengt in den Handel.

VI † Cuprum phosphoricum Cupriphosphat Phosphorsaures Kupferoxyd. CuHPO_4 Mol Gew = 159

Dieses Salz entsteht, wenn man eine Lösung von 10 Th krystall Kupfersulfat in 50 Th Wasser zu einer Lösung (nicht umgekehrt!) von 14,5 Th krystall Dinatriumphosphat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$) in 100 Th Wasser zusetzt. Der Niederschlag wird ausgewaschen und auf porösen Unterlagen an der Luft getrocknet.

Blaugrünes Pulver, welches beim Kochen mit Wasser zum Theil in basisches Kupferphosphat übergeht, unlöslich in Wasser, löslich in Säuren und in Ammoniak, durch Kahlauge wird es in der Hitze vollständig zersetzt.

Es wurde neuerdings von LUTON innerlich und in subkutanen Injektionen bei beginnender Phthise empfohlen. Dosis 0,008—0,08 g mehrmals täglich. Es werden Einspritzungen mit einer Mischung (!) folgender zwei Lösungen gemacht. I) Natriumphosphorcrystallisat 5,0, Aquae 30,0, Glycerini 30,0. II) Cupriacetici 1,0, Aquae 20,0, Glycerini 20,0. Auch giebt man es *per os* in Pillen, welche 0,01 g neutrales Kupferacetat und 0,05 g krystall Natriumphosphat per Pille enthalten. In beiden Fällen wird also das Kupferphosphat *ex tempore* gebildet.

Kupferphosphatbrühe gegen den Getreiderost. 1) Nach GALLOWAY Kupfervitriol 60,0 g, Natriumphosphat 105,0 g, Wasser 15,2 Liter. 2) Nach FAIRCHILD Kupfervitriol 400,0 g, Natriumphosphat 700,0 g, Wasser 100 Liter.

VII † Cuprum boricum Cupriborat Borsäures Kupferoxyd. CuB_2O_6 Mol. Gew. = 219. Man mischt Lösungen von 16 Th krystall Kupfersulfat in 100 Th Wasser und 24 Th krystall Borax in 150 Th Wasser, wäscht den blaugrünen Niederschlag mit kaltem Wasser aus, saugt auf porösen Unterlagen ab und trocknet zunächst bei gewöhnlicher Temperatur, erst zum Schluss in der Wärme.

Blaugrünes, krystallinisches Pulver, welches durch heisses Wasser in Borsäure und basisches Kupferborat zerlegt wird.

Das gebluhte Präparat findet Verwendung in der Oel- und Porcellanmalerei.

Kupferboratbrühe nach FAIRCHILD zur Bekämpfung der Blattfleckenkrankheit (*Entomosporium maculatum*) Kupfervitriol 400,0 g, Borax 430,0 g, Wasser 100 Liter.

Kupferboratbrühe nach GALLOWAY. 1) Zur Fernhaltung des Rostes bei Wintergetreide Kupfervitriol 70,0 g, Borax 180,0 g, Wasser 100 Liter. 2) Für Sommergetreide Kupfervitriol 400,0 g, Borax 430,0 g, Wasser 100 Liter.

VIII † Cuprum benzoicum Cupribenzoat Benzoësaures Kupferoxyd $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2)_2\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 341. Man fällt eine wässrige Lösung von 10 Th. krystall Kupfersulfat in 100 Th Wasser mit einer wässrigen Lösung von 18 Th Natriumbenzoat in 50 Th Wasser, wäscht den Niederschlag aus, saugt ihn ab und trocknet ihn an der Luft.

Helblaues Pulver, wenig löslich in kaltem Wasser, reichlicher löslich in heissem Wasser.

IX † Cuprum salicylicum Cuprisalicylat Salicylsaures Kupferoxyd $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2)_2\text{Cu} + 4\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 409. Man stellt zunächst durch Neutralisiren von 276 Th. Salicylsäure mit 200 Th Baryumkarbonat das Baryumsalicylat dar. Alsdann setzt man eine wässrige Lösung von 10 Th Baryumsalicylat mit einer zweiten wässrigen

Lösung von 5,3 Th krystall Kupfersulfat bei 60° C um Aus dem Filtrat scheidet sich das Kupfersalzcytat in blaugrünen Nadeln ab Schwerlöslich in kaltem Wasser

X † Cuprum oleumicum Oelsaures Kupfer ($C_{18}H_{33}O_2$).Cu Mol Gew = 625
Man fällt eine warme Lösung von 20 Th medicinscher Seife in 500 Th Wasser mit einer warmen Lösung von 20 Th. Kupfersulfat in 500 Th Wasser, wäscht den Niederschlag mit Wasser und trocknet ihn bei gelinder Wärme

Grünblaues körniges Pulver, löslich in Aether In Form von Salben 1—2,0 10,0 Fett etc als Antisepticum bei indolenten Geschwüren und unppigen Granulationen

XI † Cuprum sulfocarbolicum Cupri-Aseptol Sulfokarbonsaures Kupfer Paraphenolsulfosaures Kupfer. $[C_6H_4(OH)SO_3]_2$ Cu + 5 H₂O. Mol Gew = 489

Darstellung 10 Th Phenol und 10 Th conc Schwefelsäure werden in einem Kolben solange auf 90—95° C erhitzt, bis eine gezogene Probe in Wasser klar löslich ist Man verdünnt darauf mit etwa 250 Th Wasser und fugt nach und nach Baryumkarbonat erst in der Kalte, dann unter Erwärmen hinzu, bis die Flüssigkeit neutralisirt ist Man kocht auf, filtrirt und wäscht den Filtrerrückstand mit heissem Wasser nach Die vereinigten Filtrate versetzt man in der Hitze mit einer Auflösung von 13,2 Th krystall Kupfersulfat, lässt heisse absetzen, filtrirt vom gebildeten Baryumsulfat ab und dampft die Lösung zur Krystallisation ab

Eigenschaften Grüne rhombische Prismen oder hellgrüne Nadeln, löslich in Wasser und in Alkohol Die wässrige Lösung wird durch überschüssiges Ammoniak tiefblau gefärbt, mit Ferrichlorid giebt sie eine violette Färbung

Die wässrige Lösung (1 = 20) werde durch verdünnte Schwefelsäure nicht getrübt (Baryumsalz) und muss nach vollständiger Ausfällung mit Schwefelwasserstoff ein Filtrat geben, welches beim Verdampfen keinen feuerbeständigen Rückstand hinterlässt. 100 Th. des Salzes hinterlassen beim Glühen unter Anfeuchtung mit Salpetersäure = 15,86 Proc Kupferoxyd

Aufbewahrung. Vorsichtig *Anwendung.* Aeusserlich als Antisepticum in gleicher Weise wie Zincum sulfocarbolicum Zu Verbands und Umschlagen 1 100,0 bis 200,0 Wasser, zu Injektionen in die Urethra und Vagina 0,5—1,0 200,0 bei Gonorrhoe und Blenorrhagie. Auch wird seine blutstillende Wirkung gerühmt

Cupratin-FLEHKE. Man lässt 100 Th Eiereiweiss in Wasser quellen, fugt soviel Natronlauge zu, als eben nothwendig ist, das Natriumalbuminat herzustellen, und vermischt in der Wärme mit einer Lösung von 32 Th Kupfersulfat Man wäscht mit Wasser aus, saugt ab und trocknet

Dunkelbraune, krümelige und pulverisierbare Masse, rund 6,4 Proc metallisches Kupfer enthaltend Fast unlöslich in Wasser, durch Natronlauge erfolgt Auflösung Durch Neutralisation mit Säuren wird es aus dieser Lösung wieder gefällt, ein Ueberschuss von Saure wirkt wieder auflösend Aus den Lösungen wird durch Schwefelwasserstoff kein Schwefelkupfer gefällt Das Cupratin ist nach FLEHKE ungifig

Cuprum resinicum, Kupferresinat. Zur Behandlung von Hufknorpelfisteln empfiehlt LIONTIENES ein Kupferresinat genanntes Präparat, welches er wie folgt darstellt

Man bereitet eine Auflösung von 1 Th Kupfersulfat in 20 Th Wasser, bringt diese zum Kochen und setzt 2 Th Colophonium hinzu Das Harz schmilzt und bleibt auf der Oberfläche der Flüssigkeit Das Ganze wird nun etwa 40 Minuten lang mit einem Glas stabe umgerührt, bis das Harz eine ausgesprochen grüne Farbe angenommen hat Nach dem Erkalten ist das Kupferresinat ein brüchiger, in Wasser unlöslicher, in Alkohol löslicher Körper

Zur Verwendung gelangt es, indem man es in Seifenspiritus oder besser noch in einer Lösung von Schmierseife in Amylalkohol auflöst Eine Lösung von 5 Th Schmierseife in 5 Th Amylalkohol löst 3 Th Kupferresinat auf Diese Lösung ist klar, schön grün gefärbt, in jedem Verhältnisse mit Wasser mischbar

Curare.

†† Curare (Eiganzb) Curara Urari Venenum Americanum — Curare. Pfeilgift Ticunas Gift — Cuiale Quiari Wourali Woolara (Gall)

Curare ist ein seit dem Ende des 16 Jahrhunderts in Europa bekanntes Pfeilgift der Indianer im nördlichen und östlichen Theile Südamerikas. Von den zahlreichen, theilweise unbekannten oder wenig bekannten Bestandtheilen, die auch lokal verschieden sind, sind die wichtigsten eine Anzahl Strychnos Arten, und zwar verwendet man **Strychnos Castelnæa Weddell** am oberen Amazonas, **Strychnos Crevauxii G Planchon** in Cayenne, **Strychnos toxifera Benth** zwischen Orinoko und Essequibo bis zum Rio negro und **Strychnos Gubleri G Planchon** neben dem soeben genannten in Britisch Guyana. — Das Curare kommt in Bambusröhren, Calabassen und Topfen in den Handel und wie wir aus den Arbeiten Bohms wissen, sind diese Sorten auch nach den Bestandtheilen verschieden.

1) **Curare in Bambusröhren, Tubocurare** Es wird angeblich am Amazonas gemacht und gelangt über Para in den Handel (daher Paracurare). Es enthält an Alkaloiden Curin $C_{18}H_{19}NO_4$, glänzende vielsseitige Prismen, Schmelzpunkt $161^{\circ}C$, mit Vanadinschwefelsäure wird es schwarz, dann am Rande dunkelblau, endlich hellzwiebelroth, Metaphosphorsäure giebt eine starke, visse Fällung. Tubocurarin $C_{19}H_{21}NO_4$, hellrothlich gelb, amorph, mit Vanadinschwefelsäure wird es schwarz, nach einigen Minuten zwiebelroth, giebt mit Metaphosphorsäure einen gelblich-weißen Niederschlag. Im Curare enthaltene Krystalle sind Quercit. — Curin bewirkt bei Warmblütern Abnahme des Blutdruckes und führt zur Herzlähmung, Tubocurarin ist ein Gift der Nervenendigungen und bewirkt allgemeine Gefasslähmung.

2) **Calabassencurare** Der wichtigste seiner Bestandtheile ist **Strychnos toxifera Benth**. Es enthält an Alkaloiden Curarin $C_{16}H_{18}N_2O$, mit Vanadinschwefelsäure wird es dunkelviolett, beim Unterschichten der verdünnten, wässrigen Lösung des Chlorids mit concentrirter Schwefelsäure entsteht an der Berührungsoberfläche eine purpurviolette Färbung, Salpetersäure färbt vorübergehend blutroth, Metaphosphorsäure erzeugt erst nach längerer Zeit einen schwachen, flockigen Niederschlag. Ferner enthält es einen dem Curin ähnlichen Bestandtheil. Das Curarin wirkt lähmend.

3) **Topfencurare** Als wichtigster seiner Bestandtheile ist **Strychnos Castelnæa Weddell** anzunehmen. Es enthält an Alkaloiden Protocurarin $C_{20}H_{23}NO_3$, dasselbe giebt mit Metaphosphorsäure eine sehr voluminöse, weisse Fällung, Protocuridin $C_{19}H_{21}NO_3$, krystallisiert in Form farbloser, prismatischer Krystalle, Schmelzpunkt $274-276^{\circ}C$, giebt mit Metaphosphorsäure eine starke, weisse Fällung, Protocurarin $C_{19}H_{23}NO_3$, mit concentrirter Schwefelsäure und Kaliumbichromat wird es violett, mit Vanadinschwefelsäure rothviolett, mit Salpetersäure kirschroth, Metaphosphorsäure bewirkt eine voluminöse gelbe Fällung. Protocurarin wirkt deutlich, aber schwach lähmend, Protocuridin ist ungiftig, Protocurarin wirkt wie Curarin, aber heftiger.

Die Curare sind mehr oder weniger braunc, harte (in den Gefassen zuweilen noch weiche) Extrakte, die sich in Wasser und Alkohol unvollständig lösen und in der wässrigen Lösung mit Alkaloidreagentien deutliche Fällungen erzeugen.

Aufbewahrung Sehr vorsichtig und in dicht verschlossenen Glasern. Trocken aufbewahrt hält sich Curare unverändert, dagegen sind wässrige Lösungen nicht haltbar.

Wirkung und Anwendung Curare wirkt nur, wenn es direct in das Blut gelangt, also subkutan, dagegen nicht vom Magen aus, was darin seinen Grund hat, dass es langsam resorbiert und sehr schnell wieder ausgeschieden wird. Die Wirkung ist eine lähmende, aber wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, eine bei den einzelnen Sorten qualitativ und quantitativ verschiedene. Der Tod tritt ein durch Erstickung. Als Gegengift wird Coffein empfohlen.

Man hat es empfohlen bei Tetanus, Hydrophobie, als Gegengift bei Strychninvergiftungen, bei Epilepsie etc., doch ist die Verwendung eine geringe geblieben, da die Wirkung bei der verschiedenen Beschaffenheit eine zu unsichere ist. Der Arzt hat daher bei der Dosirung sehr grosse Vorsicht anzuwenden. — Zu subkutanen Injektionen verwendet man eine 1 proc. wässrige Lösung ev. unter Zusatz von etwas Glycerin. Die Lösungen sind zu filtriren. Die innere Darreichung ist zwecklos, doch normirt Ergänzb. die höchste Einzelgabe auf 0,02 g, die grösste Tagesgabe auf 0,06. Man benutzt das Curare in den physiologischen Laboratorien, um Thiere für Vivisektionen gefühllos zu machen.

†† Curarin. Curarinum. Die früher unter diesem Namen hergestellten Stoffe waren unrein, Gemenge und von sehr wechselnder Beschaffenheit, je nach der Methode der Darstellung und der Curaresorte von der man ausgegangen war. Ein gegenwärtig von E. Merck in den Handel gebrachtes Curarin, frei von Curin, nach Böhm, soll die mit der oben angegebenen nicht übereinstimmende Zusammensetzung $C_{18}H_{23}N$ (?) haben. Es bildet ein zerfliessliches, braunes, in Wasser und Alkohol lösliches Pulver. Dosis für die Injektion 0,001—0,005.

Curcuma.

Gattung der Zingiberaceae — Hedychieae.

1. *Curcuma longa* L. Heimisch in Südasien, aber im wilden Zustande nicht bekannt, kultivirt in Indien, China, im Archipel, Afrika und Westindien.

Verwendung findet das Rhizom: *Rhizoma Curcumae* (Ergänzb.). *Radix Curcumae*. — Kurkuma. Gelber Ingber. Gelb- oder Gelbwurzel. Gelbsuchtwurzel. Gürkemey. Turmerikwurzel. — *Curcuma long et rond* (Gall.). Souchet des Indes. Turmeric.




Fig. 234.

Langes und rundes Curcumarhizom.

Beschreibung. Die Pflanze hat ein rundlich-birnenförmiges Rhizom mit kurzen, ringsumlaufenden, manschettentförmigen Niederblättern, aus deren Achseln sich schief nach abwärts gerichtete Rhizomzweige entwickeln, die ebenfalls Niederblätter tragen, aus deren Achsel sich wieder Zweige entwickeln können. Diese aus dem Rhizom entstehenden Zweige entwickeln sich zuweilen weiter, indem an der Spitze eines Zweiges eine Knospe zur Entwicklung gelangt. Gewöhnlich geschieht aber die Weiterentwicklung der Pflanzen durch ein ebenfalls knolliges Rhizom, das mit dem ersten zunächst durch einen kurzen Ast vereinigt bleibt. Vom Rhizom und seinen Aesten entspringen Wurzeln, die,

zuweilen anschwellend, zu Reservestoffbehältern werden können.

Man unterscheidet im Handel zwei Formen der Droge: 1) *Curcuma longa*, von den Rhizomzweigen gebildet, etwa fingerlang, 8—12 mm dick, runzelig, undeutlich geringelt; einfach oder mit kurzen Aesten, oder mit den Narben, wo diese abgebrochen sind. Die gegenwärtig am meisten vorkommende Sorte (Fig. 234 C. l.). 2) *Curcuma rotunda* (früher von einer anderen Pflanze abgeleitet), die Rhizome, die noch nicht geblüht haben; sie sind ei- oder birnenförmig, bis 40 mm lang, bis 30 mm dick, ebenfalls queringelt, mit Narben und Resten der Wurzeln (Fig. 234 C. r.). Oft, um das Trocknen zu erleichtern, zer-

schnitten Beide Sorten sind innen wachsglänzend, rothgelb auf dem geglätteten Querschnitt punktiert, die Rinde vom Centrcylinder durch eine dunkle Lamie getrennt

Der Querschnitt lässt unter dem Mikroskop die Epidermis erkennen, die einzellige Haare und Spaltöffnungen hat, innerhalb derselben einige Schichten Parenchym, deren Wände verkorkt sind, und dann den Kork, 5—10 Zellreihen stark Das dann folgende Parenchym enthält reichlich Starkemehl, welches, da die Droge gebrüht wurde, verkleistert ist Wo die Starkekörnchen zu erkennen sind, sind sie 15—45 μ gross, scheibenförmig, im Umriss sackartig, rhombisch, mit dem Kern im verschmälerten Ende Zahlreiche Zellen der Parenchyms sind zu Sekretzellen umgewandelt, die Farbstoff und ätherisches Oel enthalten, in der Droge aber häufig leer sind, da der Inhalt in das Parenchym ausgetreten ist Ausserdem im Parenchym hier und da kleine Krystalle von Calcium oxalat Die „Rinde“ ist vom Gefässcylinder durch die Endodermis getrennt, deren Zellen tangential gestreckt und verkorkt sind Die Gefässbündel sind collateral mit einigen Abweichungen

Im Pulver fallen die durch Curcumin gelbgefarbten Ballen verkleisteter Stärke aus dem Parenchym besonders auf Geschmack feurig gewürzhalt, etwas bitter

Bestandtheile $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Proc Curcumin (vergl unten), Fett, 5,0 bis 5,5 Proc ätherisches Oel, 7,9 Asche

Das ätherische Oel (Oleum Curcumae) ist orangegelb, etwas fluorescirend, spec Gew 0,942 Löst sich in $\frac{1}{2}$ —1 Vol Alkohol (90 proc) klar auf, weiterer Zusatz von Alkohol trübt die Lösung Es enthält einen Alkohol Turmerol $C_{15}H_{22}O$ und Phellandren

Anwendung. Früher als Magenmittel und bei Gelbsucht („similia similibus“) angewendet, dient Kurkuma jetzt nur noch als Farbmittel, seltener als Gewürz Man benutzt zum Gelbfärben weingeistiger Flüssigkeiten die Tinktur, für Öle und Salben das weingeistige Extrakt In Indien wird die Droge reichlich als Gewürz benutzt, sie ist ein Bestandtheil des zum Wurzeln des Reis benutzten Currypulvers

Das Kurkumapulver des Handels ist mikroskopisch auf fremde Starkemehle (S 297) und durch die Aschebestimmung auf mineralische Verfälschungen zu untersuchen


Aufbewahrung Vor Licht und Ammoniakdämpfen geschützt (Das Gleiche gilt für alle Kurkumapreparate)

Das Kurkumapulver findet häufig Verwendung zum Verfälschen anderer gelber Pulver, z B Crocus, Rhabarber Die Auffindung dieser Verfälschung wird durch den Nachweis des Curcumins sehr erleichtert

Tinctura Curcumae Kurkumatinktur Turmeric Tincture a Zum Färben 1 Th grob gepulverte Kurkuma zieht man mit 5 Th Weingeist (90 proc) aus b Zur Bereitung von Kurkumapapier U St Kurkuma (grob gepulvert und von dem feinen Staube durch Absieben befreit) wäscht man so lange mit kleinen Mengen destillirten Wassers aus, als dieses noch gefärbt abläuft Man trocknet den Rückstand im Dunkeln aus, digerirt ihn dann mit seinem 6 fachen Gewicht Weingeist (91 proc) und filtrirt

Nach DIETERICH wird diese Tinktur mit der zehnfachen Menge verdünnten Weingeists (4 Alkohol, 5 Wasser) vermischt und giebt dann ein Reagenspapier von hoher Empfindlichkeit

Extractum Curcumae spirituosum Mittelfein gepulverte Kurkuma erschöpft man im Perkulator mit Weingeist und verdunstet den Auszug zu einem dünnen Extrakt



Curc
Fig 235
Querschnitt durch das Curcumarhizom

Curry Powder (Diet)			Oleum Curcumae (Buchh.)	
Rp	Rhizomat Curcumae	500	Ep 1	Orellante 1200
	Piperis albi	900	2	Rhiz Curcumae 2500
	Fructus Pimentae (Anomi)	100	3	Olii Olivarii seu Arachidis 10000
	Semina Sinapis albi	160	Man trocknet 1 völlig aus, verrührt mit 2	
	Fructus Carvi	50	dünne Bröde mit 8, erhitzt einige Stunden im	
	Fructus Coriandri	25	Wasserbade, presst warm u filtrirt	
	Fructus Capsici	25	Pulvis tinctorius vividus	
Mit Essig geschüttelt giebt diese Mischung einen			Rp	Indiei subit pulv 10
Ersatz für die sog Worcestershire Sauce				Rhizom Curcumae subit. plv 10,0
			Zum Färben von Fetten	

Curcuminum, Curcumin, Curcumgelb $C_{11}H_{11}O_4$

Darstellung. Das zerkleinerte Rhizom wird vom ätherischen Oel befreit, mit heissem Wasser gewaschen und getrocknet. Dann zieht man mit reichlichen Mengen kochenden Benzols aus. Beim Erkalten scheidet sich rohes Curcumin in Krusten ab. Diese löst man in Weingeist, fällt mit neutralem und so viel basischem Bleiacetat aus, dass die Flüssigkeit schwach sauer reagirt. Den Niederschlag von Bleicurcumin wäscht man mit Weingeist, zerlegt ihn unter Wasser mit Schwefelwasserstoff, entzieht dem abfiltrirten Schwefelblei das Curcumin mit kochendem Alkohol und lässt verdunsten.

Eigenschaften. Anscheinend orthorhombische Prismen, die bei 165° C schmelzen. Leicht löslich in Aether und Weingeist, weniger leicht löslich in Benzol. Koncentrirte Mineralsäuren lösen es in geringer Menge mit karminrother Farbe, wässrige Alkalien leicht und mit lebhaft rothbrauner Farbe, das mit Curcumin getränkte Papier wird mit Alkalien braunroth, nach dem Trocknen violett. Verdünnte Säuren stellen die gelbe Farbe wieder her. Borsäure erzeugt eine nur beim Trocknen hervortretende orangerothe Farbe, die durch verdünnte Alkalien in Blau verwandelt wird. Erhitzt man eine alkalische Lösung von Borsäure-Curcumin mit Mineralsäuren, so scheidet sich beim Erkalten Rosocyanin in Form eines körnigen Körpers ab, der sich in Alkohol mit rother Farbe löst, die durch Alkalien Isurblau wird.

II *Curcuma aromatica* Salisbury¹⁾ (Blockzittwer, Rhiz Cassumunar) liefert in Cochinchina ein wahrscheinlich auch Curcumin enthaltendes Rhizom, das man wie I verwendet. Ebenso scheint das Rhizom von *Curcuma caesia* Roxb Curcumin zu enthalten.

III *Curcuma Zedoaria* Rosc liefert Rhizoma Zedoariae (vergl dort)

IV *Curcuma angustifolia* Roxb liefert ostindisches Arrowroot (vergl S 297)

Cydonia.

Gattung der Rosaceae — Pomoidae — Pomariae.

Cydonia vulgaris Pers. Wahrscheinlich im Orient und in Südeuropa heimisch, durch die Kultur verbreitet. Verwendung finden die Früchte und die Samen.

Fructus Cydoniae Poma Cydoniae. Quitten. Fruit de coing (Gall) — Semen Cydoniae (Austr. Ergänzb. Helv) — Quittensamen. Quittenkerne. Quitten- oder Schleimkörner — Semence de coing (Gall) — Pépins de coing — Quince kernels.

Beschreibung. Die grosse, gelbe, anfangs wollig behaarte, später kahle Frucht ist bald von apfelförmiger, bald von birnenförmiger Gestalt (var maliformis Mill. Apfelquitten, var oblonga Mill. Birnquitten), sie ist von dem vergrösserten, laubig gewordenen Kelch gekrönt und enthält in jedem der 5 Fächer 6 — 15 (oder mehr) Samen. Die Frucht ist von starkem, angenehmem aromatischem Geruch und heissem, saurem Geschmack.

Die Samen sind bis 10 mm lang, braun, von Gestalt der Apfelkerne, aber durch gegenseitigen Druck in der Frucht oft etwas verkrümmt, meist zu mehreren mit einander oberflächlich verklebt. Die braune, ziemlich spröde Samenschale umschliesst ein schmales Endosperm und den Embryo mit zwei dicken, plan konvexen Kotyledonen. Die Epidermiszellen der Samenschale enthalten reichlich Schleim, der in Form von Verdickungen

¹⁾ Gall führt als Stammpflanze der Zédoaire ronde *Curcuma aromatica* Rosc an, welche Art nach dem Index Kewensis gar nicht existirt.

der Aussenwand und der Seitenwände entsteht, und welcher 20 Proc der Samen betragen kann. Die Samen enthalten etwas Amygdalin und Emulsin. Die Asche der Samen enthält 42 Proc Phosphorsäure.

Verfälschungen. Als solche werden Apfel- und Birnensamen genannt, die grösser, glänzendbraun, nicht miteinander verklebt sind. Sie geben wenig oder keinen Schleim. Ferner sollen die Samen mit Rosinenkernen verfälscht werden. Vor einigen Jahren kamen die Früchte einer *Xylopi* (*Anonaceae*), die zweisamig und von scharf aromatischem Geschmack sind, als Samen *Cydoniae* in den Handel.

Aufbewahrung. Die im Herbst gesammelten Samen werden, scharf getrocknet, in Bloch- oder Glasgefassen an einem trockenen Orte aufbewahrt. Sie kommen aus Sudrussland, Teneriffa und vom Kap in den Handel. Die russischen Samen gelten als besonders schleimreich.

Anwendung. Die Samen dienen nur zur Bereitung des Schleimes, der als Zusatz zu Augenwassern, als kosmetisches Mittel zum Befestigen der Haare benutzt wird. Die ganze Frucht wird entweder getrocknet, oder in Zucker eingemacht.

Mucilago Cydoniae. *Mucago de semine Cydoniae* Quittenschleim. *Mucilage de semence de coing*. 1 Th Quittensamen schüttelt man in einer Flasche mit 50 Th Rosenwasser (Erganzb.) oder 50 Th Wasser (Helv.), oder 25 Th Wasser (Austr.) und setzt nach $\frac{1}{2}$ Stunde ohne zu pressen durch Gall lässt 1 Th Samen mit 10 Th warmem Wasser 8 Stunden ausziehen und auspressen. Nur im Bedarfsfalle zu bereiten.

Mucilago Cydoniae sicca. *Mucilage desséché de semence de coing* (Gall.) Aus 1 Th Quittensamen und 15 Th destill. Wasser durch 12 stündige Maceration und Entrocknen der Seihflüssigkeit in flachen Schalen bei höchstens 50° C. Ausbeute 10 Proc. Es entspricht also 0,1 g dieses trocknen Präparates 1 g Quittensamen und giebt mit den oben angegebenen Gewichtsmengen Wasser sogleich einen Schleim.

Die Ausbeute wird erhöht (auf 12–15 Proc) und das Verfahren beschleunigt, wenn man 1 Th Samen zuerst mit 10, dann mit 5 Th Wasser behandelt, die Flüssigkeit mit 10 Th warmem Weingeist mischt, und nun die sich trennende untere Schicht eintrocknet.

Sirupus de fructu Cydoniae. *Sirup de coing* (Gall.) wird wie *Sirupus Cerasi* (S. 697) bereitet.

Succus e fructu Cydoniae. *Suc de Coing* (Gall.) Aus noch nicht völlig reifen, zu einem Mus zerriebenen Früchten durch Pressen, Gährenlassen und Filtriren — wie *Succus Cerasi*.

Quittenessenz (nach WEINDEL.) Die Schalen von 25 reifen Quitten werden fein zerschnitten und mit 500,0 Wasser in eine Retorte oder Kolben gebracht, nach zwei Stunden giebt man 300,0 Spiritus dazu, destillirt langsam 500,0 ab und fügt 0,05 Kumin, 0,01 Vanillin, 25,0 Bittermandelwasser, 5 Tropfen Citronenöl, 2 Tropfen Citronellöl, 3 Tropfen Safran tinktur hinzu.

Quittenlikör (nach ALLENSTEIN.) Ausgelesene Quitten werden zerrieben, mehrere Tage kühl gestellt, gelinde durch Flanell gepresst, die Kolatur aufgekocht. 1 Liter des erkalteten Saftes lässt man mit 1 Liter Franzbranntwein, 20 g bittern Mandeln, 10 g Zimmt, 4 g Nelken, 400 g Zucker, 3 Wochen digeriren. Man filtrirt und bewahrt im Kühlen auf.

Pilocarpin oder Dr. KRELL's Tinktur gegen Haarleiden besteht aus I Quittenschleim, II einem durch Oel und Schleim gebundenen Gemisch von Kohle, Schwefel und Salpeter.

Cynoglossum.

Gattung der Borraginaceae — Borraginoideae — Cynoglosseae.

Cynoglossum officinale L. Hundszunge, Venusfinger, Liebauglein, verbreitet durch das gemässigte Europa und Sibirien, sowie in den gemässigten Staaten Nordamerikas. Verwendet wird noch hier und da in der Volksmedizin das Kraut und die Wurzel.

Das Kraut (*Herba Cynoglossi*) besteht aus dem blühenden rauhaargen Stengel mit den ebenfalls rauhaargen Blättern, von denen die unteren gestielt, elliptisch, die oberen sitzend oder stengelumfassend und lanzettlich sind. Die Blüthen sind braunlich roth, selten weisslich.

Die Wurzel (*Radix Cynoglossi*) ist bis 30 cm lang, 2—2,5 cm dick, tief längs runzelig, aussen braun, innen mit weisser, lückiger Rinde und braunlichem Holz. Sie hat einen faden, etwas schleimigen Geschmack und wie das Kraut einen unangenehmen Geruch. Gall hat die Wurzelrinde *Elorce de la racine de cynoglosse* aufgenommen.

Bestandtheile Die Pflanze enthält ein amorphes Alkaloid Cynoglossin, das mit Salzsäure lila wird.

Anwendung Beide Drogen fanden früher als schmerzlindernde Mittel innerlich und ausserlich Verwendung. Das Alkaloid wirkt zuerst excitirend, dann beruhigend. Das Kraut soll Ratten und Mäuse vertreiben.

<i>Pilulae cum Cynoglossa</i> (Gall)	<i>Mvirhne</i>	15,0
<i>Massapilulorum sedantium Pilulae Opi-</i>	<i>Obtenu</i>	12,0
<i>compositae Pilulae de cynoglosse opia-</i>	<i>Croci</i>	
<i>ces Pilulae de cynoglosse</i>	<i>Castorei</i>	33 4,0
<i>Rp Cort rad Cynoglossi</i>	<i>Mulli simplicis</i>	85,0
<i>Extract Opi</i>	<i>f pilul à 0,2 g</i>	
<i>Semin Hyoscyami</i> 33 10,0	<i>In jeder Pille 0,02 g Extr Opi</i>	

Cytisinum.

†† **Cytisinum** Freies Cytisin Cytisin Baptitoxin Sophorin. Ulexin $C_{11}H_{14}N_2O$. Mol Gew = 190 Dieses zu etwa 1,5 Proc in den reifen Samen des Goldregens (*Cytisus Laburnum* L.) enthaltene Alkaloid hat sich als identisch erwiesen mit dem Baptitoxin aus der Wurzel von *Baptisia tinctoria* R. Br., dem in verschiedenen Sophora Arten vorkommenden Sophorin und dem aus dem Samen von *Ulex europaeus* L. dargestellten Ulexin.

Darstellung 1) Die gepulverten reifen Samen des Goldregens werden im Perkulator mit essigsäurehaltigem Alkohol von 60 Proc ausgezogen. Nach Entfernung des Alkohols durch Destillation wird der Rückstand mit Wasser aufgenommen und filtrirt. Das Filtrat wird zur Entfernung von Farbstoffen etc. mit Bleiacetat gefällt. Das Filtrat hiervon wird mit Kalilauge alkalisch gemacht und mit Chloroform ausgeschüttelt. Danach dem Verdunsten des Chloroforms hinterbleibende Cytisin ist aus absolutem Alkohol oder aus siedendem Ligroin umzukrystallisiren.

Eigenschaften. Aus absolutem Alkohol krystallisirt farblose, prismatische Krystalle, bei 152—153°C schmelzend. Sie sind geruchlos, etwas hygroskopisch, von alkalischer Reaktion und können bei vorsichtigem Erhitzen ohne Zersetzung sublimirt werden. In Alkohol, Wasser, Chloroform, Essigäther sind sie leicht löslich, schwieriger in Aether, Benzol, Amylalkohol. Es verbindet sich mit Säuren zu Salzen und fungirt bei der Salzbildung meist als einsäurige Base, obgleich es streng genommen eine zweisäurige Base ist und in der That auch mit 2 Äquivalenten Säure Salze eingeht. Als charakteristische Reaktion giebt v. d. Mose folgende an: Uebergiesst man das freie Alkaloid oder eines seiner Salze mit der Lösung eines Ferrisalzes, so entsteht eine rothe Färbung. Fügt man zu diesem roth getärbten Cytisin einige Tropfen Wasserstoffsuperoxyd, so verschwindet die Farbe, um alsdann bei gelinder (!) Erwärmung auf dem Wasserbade sich in Blau zu verwandeln. Die Reaktion gelingt nach Garreau am besten, wenn man auf 7,7 mg Cytisin 0,2 ccm Ferrichloridlösung von 5 Proc $FeCl_3$ und 2—5 ccm Wasserstoffsuperoxydlösung von 0,5 Proc anwendet. Es sollen sich so noch 0,00005 g Cytisin nachweisen lassen.

Die Lösungen des Cytisins und seiner Salze lenken die Ebene des polarisirten Lichtes stark nach links ab.

†† **Cytisinum nitricum** Cytisinnitrat Salpetersaures Cytisin $C_{11}H_{14}N_2O$
 $HNO_3 + H_2O = 271$

Zur Darstellung werden 10 Th freies Cytisin in 20—30 ccm Wasser gelöst und mit (13,3 Th) Salpetersäure von 25 Proc genau neutralisirt. Beim Verdunsten der Lösung über Calciumchlorid oder Aetzkalk oder Schwefelsäure erhält man wohl ausgebildete Kry-

stalle Zur Reinigung kann man die Krystalle in verdünntem Alkohol auflösen, durch Uebersichten der Lösung mit Aether erhält man schöne Nadeln oder Blättchen

Farblose oder schwach gelbliche Nadeln oder Blättchen, in Wasser leicht löslich Die wässrige Lösung reagirt schwach sauer Leicht löslich in verdünntem Alkohol, schwer löslich in absolutem Alkohol und in Amylalkohol, unlöslich in Aether Bei 100—110° C werden die Krystalle wasserfrei und alsdann undurchsichtig

Aufbewahrung Sehr vorsichtig

Anwendung. Nach MARMÉ wirkt es auf das Rückenmark und die peripherischen motorischen Nerven und das respiratorische Centrum, welche zunächst erregt, dann gelähmt werden Der Blutdruck wird enorm gesteigert ohne Beeinflussung des Herzens (HUSEMANN, KOBERT) KNAEPELLIN hat günstige Erfolge durch subkutane Injektionen von 0,003—0,005 g Cytisininitrat erzielt bei sog paralytischer Migräne, bei welcher Erweiterung der Blutgefäße vorhanden ist Abgeschlossene therapeutische Versuche liegen nicht vor, doch ist eine ausgedehntere therapeutische Verwendung nicht ausgeschlossen Dosis 0,003—0,005 (I) g subkutan

†† Cytisinum hydrochloricum Cytisinchlorhydrat $C_{11}H_{14}NO \cdot HCl + H_2O$
= 244,5

Das Salz fällt als amorphes Pulver aus, wenn man in die Lösung des Cytisins in Chloroform gasförmige Salzsaure einleitet Durch Umrückstallieren des Salzes aus 90 procentigem Alkohol erhält man schwach gelbliche Krystalle, die in Wasser leicht löslich sind

Anwendung und Aufbewahrung wie bei dem Cytisininitrat

Dammar.

Resina Dammar (Austr Germ) Resina Dammarae — Dammar Damar Ostindisches Dammarharz Steinharz Katzenaugenharz Dammar-puti — Damar Dammar

Mit dem Namen „Dammar“ (= Harz) bezeichnet man in Indien eine Anzahl von Harzen, die in erster Linie zur Beleuchtung, dann aber auch allen möglichen anderen technischen Zwecken dienen Sie stammen von Pflanzen aus den Familien der Coniferae, Dipterocarpaceae und Burseraceae, und es kommen folgende Stammpflanzen in Betracht

1) *Agathis Dammara* Rich (syn *Dammara orientalis* Lamb, *D alba* Rumph), Familie der Coniferae — Pinoidae — Abietineae — Araucariaceae

2) *Shorea selanica* Blume und var *β latifolia* Blume, Familie der Dipterocarpaceae

3) *Canarium rostratum* Zippel, Familie der Burseraceae.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ausser den genannten auch noch andere Bäume Dammarharze liefern, für die ausser 1) von der Germ genannten *Hopea micrantha* Hooker und *Hopea splendida* de Vriese ist dies aber sehr zweifelhaft Dasselbe gilt wohl für die von der Austr aufgeführte *Agathis loranthifolia* Salisb Man hat nach C MULLER angenommen, dass das meiste nach Europa kommende Dammarharz von der erstgenannten Art abstammt, wogegen WIESNER auf Grund von Untersuchungen an Ort und Stelle zeigt, dass das von dieser Pflanze gelieferte Harz der *Kaurikopal* (vergl S 959) ist, und dass das Dammarharz des europäischen Handels von einer Art der Gattung *Hopea*, Familie der Dipterocarpaceen abstammt

Beschreibung Es bildet gelblich-weiße, rundliche oder stalaktitenförmige, durchsichtige, gelblich-weiße Stücke oder unformliche Klumpen von erheblicher Härte Löslich in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, wenig löslich in Alkohol. In Rosmarinöl völlig löslich, in Terpentinöl zu 66 Proc löslich Es ist leicht zerreiblich, der Bruch muschelig Säurezahl 20—30 Spec Gew 1,04—1,12 Schmelzpunkt 120° C Ammoniak trübt die alkoholische Lösung Konzentrierte Schwefelsäure löst es mit rother Farbe Der in Petroläther unlösliche Theil färbt sich mit FROBDE'S Reagens gelb bis gelbroth, mit Chloralhydrat schwach grün

Bestandtheile 23 Proc Dammarolsäure $C_{64}H_{77}(OH)_2COOH$ 40 Proc α Dammar Resen (Schmelzpunkt $65^{\circ}C$) $C_{11}H_{17}O$ 22,5 Proc β -Dammar-Resen (Schmelzpunkt $200^{\circ}C$) $C_{24}H_{42}O$ Ferner in geringer Menge ein Bitterstoff und atherisches Oel, Asche 0,1 bis 3,5 Proc

Bestimmung der Saurezahl nach DIETERICH 1 g Dammar übergiesst man mit 50 cem Benzin (spec Gew 0,7 bei $15^{\circ}C$), fügt 10 cem $\frac{1}{2}$ N alkoholische und 10 cem $\frac{1}{2}$ N wässrige Kahlauge zu und lässt 24 Stunden verschlossen stehen. Man titrirt dann ohne Wasserzusatz mit $\frac{1}{2}$ N Schwefelsäure und Phenolphthalein zurück. Die Anzahl der gebundenen cem Kahlauge $\times 28 =$ Saurezahl

Verfälschung des Dammarharzes mit hellem Kolophonum ist beobachtet worden. Zum Nachweis des letzteren werden 2 g des gepulverten Harzes mit 20 cem Ammoniak (spec Gew 0,96) geschüttelt, nach halbstündigem Stehen filtrirt und das höchstens schwach opalisirende Filtrat mit Essigsäure übersättigt. Reines Dammar bleibt klar oder zeigt geringe Opalescenz, bei 5 Proc Kolophonum scheiden sich einige Flocken ab, bei 10 Proc entsteht eine starke Abscheidung, bei 20 Proc eine Gallerte.

Anwendung. In der Pharmacie nur als Bestandtheil des Heftpflasters, sonst zur Bereitung von Lacken und Firnissen, die zum Ueberziehen von Karten und dergl. dienen sollen. Der aus dem natürlichen Harz gewonnene Dammarlack trocknet schwer und erweicht in der Wärme, er eignet sich daher nicht zum Lackiren von Gebrauchsgegenständen, die oft mit der Körperwärme in Berührung kommen, also nicht für Papierschilder an Staudgefäßen (vergl. unter Vernix Dammar) und auch nicht für Anstriche, auf die man sich später setzen soll.

Alabaster- oder Marmor-Imitation. Man überzieht den betreffenden Gegenstand mit farblosem Dammarlack und bestreut mit Glasmehl, nach einem zweiten Lacküberzuge mit feingepulvertem Marmerglas.

Bronce-Tinktur 1) nach STOOKMEIER 250 g feingeriebenes Dammarharz löst man in 1 l Benzin oder Petroleumäther in einer geräumigen Flasche, setzt 250 g Natronlauge (10 proc) hinzu, schüttelt 10 Minuten, hebert die Harzlösung ab, prüft mit Lackmuspapier, entsäuert nöthigenfalls nochmals mit 250 g Lauge und stellt zum Klaren bei Seite. Die saurefreie Dammarlösung ist in möglichst gefüllten, gut verschlossenen Flaschen aufzubewahren. Sie giebt mit 300–500 g Bronce eine nicht grün werdende flüssige Bronce — 2) (Buchh.) 200 g Dammarharzpulver schmilzt man längere Zeit mit 60 g calcinirter Soda, pulvert nach dem Erkalten, löst in 800 g Benzin und klart durch Absetzenlassen — 3) Dammarlack, Terpentinöl je 45,0, Siccativ 10,0

Perrücken-Klebwachs Je 200,0 Dammar, gereinigtes Fichtenharz, Lärchenterpentin, 400,0 gelbes Wachs schmilzt man und fügt 0,5 Alkanin, je 10 Tropfen Beigamottöl und Citronenöl und 5 Tropfen Geraniumöl hinzu (DIETERICH)

Retouchirlack für Photographen 1,0 Dammar, 5,0 helles Kolophonum löst man in 30,0 Terpentinöl. Trocknet langsam

Schilderlack, CRACAT's, Weißer 150 Zinkoxyd reibt man mit q s Terpentinöl an, fügt 90 Dammarlack (1+2), 20 heisses Leinöl, 20 Kopaivabalsam, 5 Ricinusöl, 8 fein gepulverten Bleizucker hinzu. Recht dünn und 2–3 mal aufzutragen. Der Lack wird weder gelb noch spröde. Schwarze Schrift malt man darauf mittels Kienruss, Kolophonum aa, Alkohol q s, oder mittels Steinkohlentheer, den man mit q s Chloroform verdünnt, rothe Schrift mittels Zinnober, Kolophonum aa, Alkohol q s. Schwarzer 5 Kienruss, 15 Dammarlack (1+2), 10 heisses Leinöl, 10 Kopaivabalsam, 2 Ricinusöl, 3–4 Bleizucker

Vernix Dammar Dammarlack. Einen nicht klebenden Lack erzielt man nur mit einem sorgfältig entwässerten Dammarharz. Entweder pulvert man dasselbe und trocknet es scharf aus, oder man schmilzt 40 Th desselben vorsichtig über freiem Feuer, so dass keine Bräunung eintritt, zerstösst nach dem Erkalten und löst in soviel Terpentinöl, dass man 100 Th Lack erhält. Oder man pulvert das Harz, verrührt es mit q s Terpentinöl zum dicken Brei, erhitzt bis zum Schmelzen und weiter so lange, bis das Schäumen aufhört, und setzt q s erwärmtes Terpentinöl (auf 1 Th Harz 1–2 Th Oel) zu. Diese Arbeit wird wegen ihrer Feuergefährlichkeit unfein vorgenommen. Endlich lässt sich der Lack auch schnell und gefahrlos im Verdrängungswege herstellen — Dammarlack nach HENR, für Blech- und Holzarbeiten, ist der vorige mit etwa 2,5 Proc venetianischem Terpentin

Ceratum ad barbam (Vom)
 Bartwische
 Rp Resinae Dammar 70,0
 Terebinthinae lardinae 50,0
 Cerne flavae
 Adipis suilli aa 12,0

In Schaecheln auszugessen

Emplastrum adhaesivum KRAFT

Rp Resinae Dammar 80,0
 Olei Olivarum prov 20,0

Man schmilzt bei gelinder Wärme

Emplastrum adhaesivum Petropolitano
 Petersburger Heftpflaster

Rp Resinae Dammar 60,0
 Cerae flavae 10,0
 Olei Olivarum 15,0
 Terebinthinae lardinae 5,0

Man schmilzt bei gelinder Wärme und seht durch

Emplastrum Dammarae Diet
 Dammarpflaster

Rp 1 Resinae Dammar 125
 2 Cerae flavae 15,0

3 Emplastri Lithargyri 65,0

4 Olei Terebinthinae 7,5

Man schmilzt 1 über freiem Feuer, fügt 2 hinzu, bringt ins Dampfbad, setzt 3 und während des Erkaltes 4 hinzu

Emplastrum Dammarae compositum
 SCHWIMMER

Rp Emplastri Dammar 50,0
 Unguenti Plumbi 26,0
 Acidi salicylici 16,0
 Kreosoti 8,0

Man schmilzt und giesst in Papierkapseln aus

Negativ Lack

Rp Resinae Dammar 100,0
 Mastiches 15,0
 Benzol 885,0

Vernix Dammarae composita

Rp Resinae Dammar 100,0
 1 Resinae Copal 20,0

Man pulvert, trocknet in der Wärme vollständig, löst in Olei Terebinthinae 250,0 und fügt von letzterem q s zur Sirupdickte zu

Diphthericidum, Kaupastillen als Vorbeugungsmittel gegen Diphtherie, bestehen aus Dammarharz, Guttapercha, Thymol, Natriumbenzoat und Saccharin (Thoms)

Mattolein für Photographen 40 Dammar, 20 Koparabalsam, 5 Elemi, 85 Terpentindöl

Datura.

Gattung der Solanaceae — Daturaceae

1 Datura Stramonium L. Gegenwärtig durch ganz Europa, Asien, Afrika und Nordamerika verbreitet, ursprünglich vielleicht am Schwarzen und Kaspischen Meer heimisch. Für den arzneilichen Gebrauch wird die Pflanze hier und dort kultiviert. Verwendung finden

a die Blätter † **Folia Stramonii** (Germ., Helv., Austr.) **Stramonii Folia** (Brit. U-St.) **Folia s. Herba Daturae** **Herba Metellae** — Stechapfelblätter — **Feuilles de stramoine ou de Pomme épineuse** (Gall.) — **Stramonium leaves** **Thorn apple leaves**

Beschreibung Der bis 10 cm lange Blattstiel trägt die bis 20 cm lange, bis 10 cm breite Blattspreite. Diese ist im Umriss spitz eiförmig, stark buchtig gezahnt, die grossen buchtigen Zähne noch einmal mit einigen kleineren. Der Grund der Blattspreite ist keilförmig oder fast herzförmig. Die Sekundärnerven gehen unter einem Winkel von 35–40° vom Mittelnerven ab, theilen sich im äusseren Drittel der Blatthalfte gabelig, der eine Ast verläuft dann in einen Blattzahn, der andere anastomosiert mit einem Tertiärnerven des nachst. oberen Sekundärnerven.

Spaltöffnungen beiderseits, auf der Unterseite zahlreicher. Beide Epidermen tragen, besonders auf den Nerven, dreizellige, derbwandige, warzige Gabelhaare, die oft an der Spitze umgebogen, bis 270 µ lang und an der Basis 40–50 µ dick sind, daneben kurze stielte Drüsenhaare mit wenig-zelligem Kopf. Zahlreiche Zellen des Mesophylls enthalten




Fig. 256 (Nach Vogel.)

Blatt von *Datura Stramonium* von der Unterseite
 s Schwammparenchym h Haare fn Gefäss K Kry-
 stalldrüse st Spaltöffnung

Drusen von Kalkoxalat, in der Nähe der Gefässbündel auch Krystallsand. Für den Nachweis der Blätter und für ihre Unterscheidung von anderen Solanaceenblättern ist auf diese Oxalatdrusen und auf die warzigen Gliederhaare besonderes Gewicht zu legen (Fig. 236). Für die Untersuchung genügt es, um das Blatt durchsichtig zu machen, ein Stückchen desselben einige Stunden in konzentrierte Chloralhydratlösung (3:2 H₂O) zu legen.

Die frisch straffen Blätter welken sehr schnell. Der frisch widerliche Geruch verschwindet beim Trocknen.

Bestandtheile. Die Blätter enthalten ein Alkaloid, das man Daturin nannte, es ist nach LADENBERG identisch mit Hyoscyamin. Der Gehalt daran beträgt 0,308 bis 0,370 Proc. Uebrigens sollen die Blätter von den verschiedenen Theilen der Pflanze, ausser der Wurzel, am wenigsten Alkaloid enthalten; am reichsten sind die Stengel. Kultivierte Pflanzen bleiben im Alkaloidgehalt hinter den wildwachsenden nicht zurück. — Asche 17,4 Proc., sie ist reich an Kaliumnitrat. Bestimmung des Alkaloidgehaltes wie bei Belladonna pag. 467.

Verwechslungen und Verfälschungen. Als solche werden aufgeführt: 1) Die Blätter von *Chenopodium hybridum* L.; sie sind ganz kahl, im Umriss fast gleichschenkelig dreieckig, der Blattstiel ist oberseits rinnig. Im Mesophyll enthält das Blatt ebenfalls Oxalatdrusen, die aber grösser wie die von *Datura* sind. 2) Die Blätter von *Solanum nigrum* L., sie sind viel kleiner, ganzrandig oder buchtig-stumpfgezähnt. 3) Unter der Droge sind 50 Proc. Blätter einer *Lactuca* gefunden.




Fig. 237. Same von *Datura stramonium* im Längsschnitt, schwach vergr.

Einsammlung. Aufbewahrung. Der Stechapfel blüht zwar bis in den Oktober hinein, man sammelt die Blätter indessen, obwohl die Arzneibücher einfach „von der blühenden Pflanze“ vorschreiben, nur zur Zeit der ersten Blüthe, im Juni, trocknet im Schatten ohne künstliche Wärme, und bewahrt sie in Blech- oder Glasgefässen vorsichtig, vor Licht geschützt und (nach Anstr.) nicht über ein Jahr auf. 8–9 Th. frische Blätter geben 1 Th. trockene. Aus 100 Th. der letzteren gewinnt man etwa 87 Th. mittelfeines Pulver. Aus den frischen Blättern wird ein Extrakt und eine Tinktur dargestellt.

Anwendung. Die Wirkung ist der der Belladonna ähnlich. Innerlich kaum noch angewendet — grösste Einzelgabe 0,2 (Germ., Helv.), 0,3 (Austr.), grösste Tagesgabe 1,0 — dienen die Blätter vielfach zu Räucherungen bei Asthma, indem man sie verglimmen lässt und die Dämpfe einathmet, oder in Form von Cigaretten, die indessen leicht Narkose erzeugen.

Die Droge ist dem freien Verkehr entzogen und darf, ausgenommen zum Rauchen oder Räuchern, nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden. Unter der Bezeichnung „Asthmakräuter“ findet sie sich, gewöhnlich mit Salpeter getränkt, häufig im Handel; derartige Mittel sollten nur mit genauer Gebrauchsanweisung und unter Giftsignatur verabfolgt werden, denn es sind durch deren Anwendung Vergiftungen vorgekommen.

b. Die Samen. † Samen *Stramonii* (Ergänzb. Helv.). *Stramonii semen* (Brit. U-St.). — Stechapfelsamen. Tollkörner. — Semence de stramoine ou de Pomme-épineuse (Gall.). — *Stramonium seed*.

Beschreibung. Die Frucht ist eine aufrechte, kurzgestielte, eiförmige, stachelige Kapsel, deren Grund vom unteren Theil des Kelches wie von einer abwärts gerichteten Manschette umgeben ist. Die Frucht öffnet sich vierklappig, lässt oben zwei Fächer, unten vier Fächer erkennen, da die beiden Fächer durch falsche, vom Rücken der Carpell entspringende Scheidewände noch einmal getheilt werden. Die Placenten sind von den Samen dicht bedeckt. Diese sind schwarzbraun (am Nabel heller), flach, rundlich-nierenförmig, etwa 4 mm gross, unter der Lupe höckerig und fein punktiert. Innerhalb der kräftigen Samenschale enthält der Same ein Endosperm und den grossen gekrümmten Embryo mit langer Radicula und zwei flach aufeinander liegenden Cotyledonen (Fig. 237).

Die Samenschale besteht aus der eigenthümlich gebildeten und sehr charakteristischen Epidermis, deren Zellen unten mit kurzen Fortsätzen versehen, vielfach ineinander geklebt sind, und im oberen Theile kurze Tupfel zeigen. Ihre Wände sind zum grossen Theil verkorkt. Daran schliesst sich eine aus zusammengedruckten Zellen bestehende Schicht, die „Nahrschicht“, und eine einfache Zelllage, das Nest des „Knospenkerns“. Im Gewebe des Endosperms und des Embryo lassen sich Protoplasma, fettes Oel und Aleuronkerner nachweisen. In den letzteren ein oder wenige Krystalloide und Globoide. Alkaloid lässt sich in der „Nahrschicht“ und zweifelhaft auch im Endosperm und Embryo nachweisen.

Bestandtheile. Alkaloide Hyoscyamin, geringe Mengen Atropin und Hyoscin, zusammen 0,365 Proc. Ausserdem enthalten die Samen etwa 25 Proc. fettes Oel, darin die Glyceride der Oelsäure, Leinölsäure und Daturinsäure $C_{17}H_{31}O_2$. Endlich hat man in den Samen einen dem Cholesterin ähnlichen Körper aufgefunden. Asche 2–3 Proc.

Zur Alkaloidbestimmung nach KELLER werden 10 g Sem Stramonii gepulvert in einer 300 ccm fassenden Flasche mit 100 g Aether übergossen, nach $\frac{1}{4}$ Stunden 10 ccm Ammoniak (10 proc) zugegeben, 5 Minuten tüchtig durchgeschüttelt und unter wiederholtem Umschütteln 3 Stunden stehen gelassen. Dann filtrirt man die Aetherlösung ab, wägt sie, und schüttelt sie im Scheidetrichter mit 1 proc Salzsäure mehrmals aus, bis die abgelassene wässrige Lösung mit MAYER'schem Reagens keine Trübung mehr giebt. Die wässrige, saure Lösung giebt man dann in den Scheidetrichter, macht mit Natronlauge alkalisch und schüttelt von neuem mehrmals mit Aether aus, bis einige Tropfen des Aethers, verdunstet, mit 1 proc Salzsäure aufgenommen, mit MAYER'schem Reagens keine Trübung mehr geben. Dann wird von der ätherschen Lösung der Aether aus einem gewogenen Kolbchen abdestillirt und der Rückstand bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Unter Berücksichtigung der oben durch Abwägen gewonnenen Menge Aetherlösung (10 g = 1 g Samen) berechnet man den Alkaloidgehalt. Zur Titration löst man das Alkaloid in 5–10 ccm saurem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur beginnenden Trübung hinzu und titirt unter Benutzung von Hamatoxylin als Indikator mit $\frac{1}{100}$ N Salzsäure, 1 ccm $\frac{1}{100}$ N HCl = 0,00289 g Alkaloid.

Einsammlung. Aufbewahrung. Die Samen werden im Herbste der reifen Frucht entnommen, im Schatten bei gelinder Wärme getrocknet und — wie Folia Stramonii aufbewahrt. Das Pulver beräthet man jedesmal frisch.

Anwendung. In gleichen Fällen wie die Blätter, gewöhnlich aber in Form der Tinktur oder des Extrakts. Grösste Einzelgabe 0,2, grösste Tagesgabe 0,6 (nach LEWIN).

† *Alcoolatura Stramonii*. Alcoolature de feuille de stramoine (Gall.) Aus gleichen Theilen frischer Blätter und Alkohol (90 proc) durch 10 tagiges Ausziehen.

Cigarettes de stramoine (Gall.) sollen jede 1 g Stechapfelblätter enthalten.

Emplastrum eum extracto Stramonii. Emplâtre d'extrait de stramoine (Gall.) Aus dem Extrakt der Samen wie *Emplastrum Belladonnae* (s. S. 471 VI).

† *Extractum Stramonii*. Stechapfel-Extrakt. Ergänzb. Aus frischem, blühenden Kraut wie Extr. *Belladonnae* Germ. (S. 469) zu bereiten. Ausbeute etwa 3 Proc. Grösste Einzelgabe 0,1 g, grösste Tagesgabe 0,2 g (nach LEWIN).

Helv. 1) Extr. *Stramonii duplex s. siccum*. Trockenes Stechapfel-extrakt. *Extrait de stramoine sec*. 200 Th. Stechapfelsamen (IV) werden im Perkulator mit Petroläther ausgezogen, bis das Abfließende nach dem Verdunsten kein Oel hinterlässt, getrocknet, gepulvert (V), mit 2 Th. Weinsäure in 30 Th. Weingeist und 60 Th. Wasser befeuchtet, im Perkulator mit q s einer Mischung von 1 Th. Weingeist, 2 Th. Wasser erschöpft. Man fängt die ersten 180 Th. für sich auf, löst darin den auf 20 Th. verdampften Rest und stellt mittels q s Reispulver 100 Th. trockenes Extrakt her. Grösste Einzelgabe 0,025 g, grösste Tagesgabe 0,075 g (vergl. die Fussnote S. 947).

2) *Extractum Stramonii fluidum*. Stechapfel-Fluidextrakt. *Extrait fluide de stramoine*. 100 Th. Stechapfelsamen (IV) werden wie bei vorigem angegeben, entölt, getrocknet, gepulvert (V), mit 1 Th. Weinsäure in 10 Th. Glycerin, 15 Th. Weingeist und 20 Th. Wasser befeuchtet, im Perkulator mit q s einer Mischung aus 1 Th. Weingeist und 2 Th. Wasser erschöpft. Man sammelt zuerst 90 Th., verdampft den Rest zum dünnen Extrakt, löst in 40 Th. Wasser, filtrirt, verdunstet auf 10 Th. und löst diese

im ersten Auszuge zu 100 Th Klares, hellbraunes, grün fluorescirendes, bitteres Extrakt Grösste Einzelgabe 0,05 g, grösste Tagesgabe 0,15 g

Brit Extract of Stramonium Stechapfelsamen (No 40) erschöpft man im Perkolator mittels Alkohol (70 proc), destillirt letzteren ab und verdampft zu einem festen Extrakt Dosis 0,015—0,06 g

U-St 1) Extractum Stramonii seminis Extract of Stramonium Seed Aus 1000 g Stechapfelsamen (No 60) und q s verdünntem Weingeist (41 proc) im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 900 ccm, dann noch 2100 ccm, verdampft letztere bei 50° C auf 100 ccm, dann das Ganze zur Pillenkonsistenz

2) Extractum Stramonii seminis fluidum Fluid Extract of Stramonium Seed Aus 1000 g Stechapfelsamen (No 60) und q s einer Mischung von 750 ccm Weingeist (91 proc) und 250 ccm Wasser im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 200 ccm, sammelt zuerst 900 ccm, und stellt 1 a 1000 ccm Fluid-Extrakt her

Gall 1) Extrait de feuille de stramoine (avec le suc) Aus dem frischen Saft durch Erhitzen, Durchsiehen und Eindampfen zum weichen Extrakt

2) Extractum de semine Stramonii Extrait de semence de stramoine Aus den grob gepulverten Samen wie Extr de radice Belladonnae, Gall (S 469)

Diet Extractum Stramonii solidum Stechapfel-Dauereextrakt Wie Extr Uvae Ursi solid (S 368) Stechapfelextrakt ist vorsichtig aufzubewahren

Oleum Stramonii. Huile de stramoine (Gall) wird wie Ol Belladonnae Gall (S 472 II) bereitet

† Tinctura Stramonii. Ergänzb Stechapfelsamentinktur 1 Th grob gepulverte Samen, 10 Th verd Weingeist (60 proc) Hellbraun, grünschillernd Grösste Einzelgabe 1,0 g, grösste Tagesgabe 8,0 g (nach LSWIK)

Brit Tincture of Stramonium Aus 200 g Stechapfelblättern (No 20) und Weingeist (45 proc) bereitet man im Verdrängungswege 1000 ccm Tinktur Dosis 0,3—0,9 g

U-St Tinctura Stramonii seminis Tincture of Stramonium seed Aus 150 g Stechapfelsamen (No 40) und q s verd Weingeist (41 proc) wie bei vorigem 1000 ccm Tinktur

Gall Teinture de stramoine (feuille) Wie Tinctura Cocae Gall (S 869) zu bereiten

† Tinctura Stramonii ex herba recente bereitet man wie Tinct Belladonnae, Ergänzb (S 470) Aufbewahrung Vorsichtig, vor Licht geschützt

Candelae Stramonii

Candelae antasthmaticae Asthmakerechen Stechapfelkerzchen

Rp Folior Stramonii pulv	60,0
Kali nitric pulv	30,0
Balsami peruviani	1,5
Sacchari pulverat	0,5
Tragacanthae pulv	20

Man stösst mit Muesl Tragacanth an und formt Kerzchen, denen man durch Bepinseln mit Weingeist, worin 0,1% KOH gelöst ist, ein lebhafteres Grün gibt

Charta antasthmatica (Ergänzb)

Asthmapapier

Rp Extracti Stramonii (Ergb)	10,0
Kali nitric	17,0
Sacchari	30,0
Aquae ferridae	100,0

Man tränkt mit der Lösung weisses Filtrpapier und trocknet an der Luft auf Schnüren

Charta fumifera (Gall)

Asthmapappe

Carton fumigatoire ou antasthmaticus.

Rp Chartae bibulae griseae	120,0
Kali nitric pulverat	60,0
Foliorum Belladonnae pulv	5,0
Foliorum Stramonii pulv	5,0
Foliorum Digitalis pulv	5,0
Herb Lobellae pulv	5,0
Myrrhae pulv	10,0
Olibani pulv	10,0
Fructus Phellandri pulv	5,0

Man verwandelt das Papier durch Zerreißen, Einweichen in Wasser und Stampfen in einen gleich-

mässigen Brei, arbeitet die Pulvermischung darunter, vertheilt die Masse in Blechformen und trocknet in der Wärme Die Pappe wird in 30 rechteckige Stücke zerschnitten

Cigarettae antasthmaticae

Asthmacigaretten

Rp Folior Stramonii conc	30,0
Folior Belladonnae conc	50,0
Folior Hyoscyami conc	20,0
Folior Nicotianae conc	40,0
Folior Jaborandi conc	10,0
Foliorum Salviae conc	20,0
Herb Phellandri conc	12,0

Die möglichst gleichmässige, vom Pulver befreite Mischung besprengt man mit 400 Aq Laurocerasi und verarbeitet sie zu Cigaretten.

Cigarettae antispasmodicae Trousseau

Rp 1 Folior Stramonii concis	30,0
2 Extracti Opi	2,0
3 Aquae destillatae	10,0

Man tränkt 1 mit der Lösung von 2 in 3 und wickelt nach dem Trocknen in Cigarettenpapier

Emplastrum Stramonii

Pareurt uti Emplastrum Comu Ergänzb (S 947)

† Folia Stramonii nitrata (Ergänzb)

Asthmakraut

Rp 1 Foliorum Stramonii gross conc	2,0
2 Kali nitric	1,0
3 Aquae	3,0

Man tränkt 1 mit der Lösung von 2 in 3, lässt 12 Stunden stehen und trocknet

Glycerolatum Stramonii

Rp Extracti Stramonii	1,0
Glycerini	10,0

Guttæ anteaethmaticæ RICHTER.

RICHTER'S Asthmastropfen.

- Rp Extract Stramonii 0,1
 Tinctura Digitalis 4,0
 Aquae Valerianae 30,0

Beim Anfall 1 Theelöffel voll

Pilulae antepilepticae RICHTER

- Rp Extract Stramonii
 Extract Belladonnae aa 2,0
 Camphorae
 Opium aa 1,0
 Radix Gentianae q s

Man formt 60 Pillen. Anfangs täglich 1, steigend bis zu 5mal täglich 8 Stück

Pilulae antineuralgicæ TROUSSEAU

- Rp Extract Stramonii
 Extract Opium aa 0,5
 Zinci oxydati 8,0

Zu 40 Pillen Täglich 1, steigend bis zu 8 Stück

Pilulae antiprosopalgicæ OSTERLEIN

- Rp Semina Stramonii
 Foliorum Belladonnae
 Chinini hydrochlorici aa 1,0
 Sacci Liquiritiae q s

Zu 50 Pillen. Täglich 2mal 2, steigend bis zu 5—6 Stück

Pulvis anteaethmaticus

Asthmapulver

I

- Rp Folior Stramonii pulv 4,0
 Fructus Anisi pulv 2,0
 Kali nitrici pulv 2,0

II

- Rp 1 Fructus Anisi pulver 4,0
 2 Herbae Cannabis Indicae
 3 Herbae Lobeliae pulver
 4 Folior Eucalypti pulver
 5 Folior Theae pulver aa 30,0
 6 Folior Stramonii pulver 60,0
 7 Kali nitrici 40,0
 8 Aquae 90,0

Die Pulver 1—6 werden gemischt, mit der Lösung von 7 in 8 getränkt und getrocknet. Zum Gebrauche formt man Häufchen die an der Spitze angezündet werden. Den Rauch athmet man ein.

† Vinum Stramonii

- Rp Semina Stramonii gr pulv 10,0
 Vini Hispanici 100,0

3 Tage digeriren, auspressen, filtriren.

Asthma-Cigaretten von Dr PLAUT 8 Th Stechapfelblätter, 8 Th Grünen Thee, 7 Th Lobelenkraut benetzt man mit gesättigter Kaliumnitratlösung und wickelt in Cigarettenform

Asthma-Cigaretten, Wiener, bestehen aus Stechapfelkraut, Bilsenkraut, Fingerhut- und Tollkirschenblättern

Asthma-Cure, Green Mountain von GULL Mit Salpeterlösung getranktes, grobes Pulver aus Fenchel und Stechapfelkraut

Asthma-Cure von HINROD Foliorum Stramonii, Foliorum Lobeliae, Foliorum Theae aa mit geringem Zusatz von Fenchel- und Anisfrüchten und etwas Kalisalpeter

Asthmadors, Dr R. SCHIFFMANN'S Asthmapulver aus Minnesota, besteht nach Angabe des Erfinders aus 34,9 Proc Salpeter, 51,1 Proc Blättern von Datura arborea und 14 Proc Blättern von Symplocarpus foetidus Nach AUFRICHT 25 Proc Salpeter, 70 Proc Stechapfelblätter, 5 Proc Tollkirschenblätter

Asthmakraut, Holländisches, von Apotheker PLÖNES in Weiskirchen Mit Salpeter getränkte Stechapfelblätter

Asthmapulver der Goethe Apotheke in Frankfurt. 30 Salpeter, 20 Zucker, 30 Stechapfelblätter, 5 Lobelenkraut

III Nach MARTINDALE

- Pp 1 Kali nitrici
 2 Aquae ebulliantis
 3 Herbae Lobeliae pulv
 4 Folior Stramonii
 5 Folior Theae aa 240,0
 6 Olei Anisi 1,0

Man lost 1 in 2, fügt 3—5 hinzu, mischt, trocknet und setzt 6 hinzu

† Sirapus Stramonii

Syrupus de Stramonio

Sirop de stramoine (Gill)

- Rp Tinctura Stramonii 7,5

Sirupi Sacchari 92,5

Species antaethmaticæ (Diet)

Herbae antaethmaticæ Asthmakräuter

- Rp 1 Folior Stramonii concis 1000,0
 2 Spiritus (10 proc) 200,0
 3 Kali nitrici 200,0
 4 Kali nitrici 20,0
 5 Kali carbonici 2,0
 6 Aquae destillatæ 1500,0

Man befeuchtet 1 mit 2, läßt im verschlossenen Gefaße 24 Stunden stehen, trinkt mit der Lösung von 3—5 in 6 und trocknet nach 24 Stunden bei 25—30°C. Statt 1 kann man auch folgende Mischung verwenden

- Pp Folior Stramonii 500,0
 Folior Belladonnae 250,0
 Herbae Hyoscyami 250,0

Die Kräuter müssen frei von Rippen und Stengeln sein

Tabacum antaethmaticum BOUCHARDAT

Espèces pour fumer

- Rp Foliorum Stramonii
 Foliorum Salviae aa.

Zum Rauchen

† Tinctura Stramonii acidis

- Pp Foliorum Stramonii conc. 10,0
 Spiritus dilut (60 proc) 100,0
 Acidi sulfurici puri 0,6

† Tinctura Stramonii seminis aetheræ

- Rp Semina Stramonii gr pulv 1,0
 Spiritus aetheræ 10,0

Linguentum Stramonii (U St)

Stramonium Ointment

- Rp Extract Stramonii seminis 10,0
 Spiritus dilut 5,0
 Adipis benzoati 85,0

Asthmaräucherpulver von O FISCHER 250 Stechapfelblätter, 25 Schafgarbe mit einer Lösung von 50 Kalisalpeter getränkt

Asthmatabletten von FR HELBIG, bestehen aus Stechapfelblättern und einer Hülle von Salpeterpapier

Charta antasthmatica DUKSTHOFF, Stramoniumraucherpapier (D R G M 85982) ist ein aus nitrirter Cellulose in der Grösse 70 170 mm hergestelltes, mit einem fest haftenden Ueberzug gepulverter Stechapfelblätter (nach Art des bekannten Senfpapiers) versehenes Papier Jedes Blatt enthält 2,0 Fol Stramonium

CLEARY'S Asthma Powder Foliorum Stramonii grosse pulv, Foliorum Belladonnae grosse pulv ää 15,0, Opn pulv 2,0, Kali nitrici 5,0

Kaw-ture von GUILLEMAIN besteht aus Stechapfelkraut, Salpeter und einem Stückchen Feuerschwamm

Krebspulver von A FEISCHMUTH ist (nach Thoms) wahrscheinlich ein Gemisch aus Stechapfelkraut mit Wurzel und kohlensaurem Kalk

Nimrod Powder aus Paris besteht aus Kalisalpeter und Stechapfelblättern

Zematone-Cigaretten von ESCOUFLAIR, enthalten nur Salpeter und Stechapfelblätter

II Datura alba Nees (D fastuosa L.) Heumisch in Ostindien, in Südeuropa: Aegypten, Südamerika nicht selten kultivirt Arzneilich verwendet werden die Blätter, die Samen und die Wurzel Die Blätter enthalten wie I Oxalatdrüsen, die Wurzel Oxalatsäure wie bei I

Die Samen sind grosser wie bei D Stramonium, gelbbraun, flach, etwa ohrförmig

Der Alkalidgehalt ist folgender Blätter 0,41 Proc, Blüten 0,461 Proc, Samen 0,541 Proc, Wurzel 0,315 Proc Die Alkaloide sind mydriatisch wirkende, in dem Samen wurde Hyoscyamin und wenig Atropin, in den Blüten Hyoscin aufgefunden Die Pflanze enthält auch das indifferente Stramonin

Die Pflanze wird in Indien wie I gebraucht, in China mit Aconitum zusammen als lokales Anästhetikum

III Datura meteloides D C und **Datura quercifolia H B K** In Mexico Die Blätter werden als Berausungsmittel benutzt, ähnlich verwendet man andere Arten in Südamerika, Indien und Australien

IV Datura arborea L In Brasilien Zu schmerzstillenden Kataplasmen etc. Enthält in den Alkaloiden $\frac{2}{3}$ Hyoscyamin, $\frac{1}{3}$ Atropin

Daucus.

Gattung der Umbelliferae — Apioidae — Dauceae.

I Daucus Carota L Heumisch in Europa, Nordafrika, bis nach Sibirien und Indien als Unkraut verbreitet, vielfach der Wurzeln wegen kultivirt Stengel gefurcht, steifhaarig, Blätter doppelt oder dreifach gefiedert mit langlich lanzettlichen Zipfeln, Hülle und Hüllchen vielblättrig, die fruchttragende Dolde in der Mitte korbartig oder vogelnestartig vertieft, die äusseren Blüthen der Dolde strahlend Verwendung finden

a) Die Frucht der wildwachsenden Pflanze **Fructus Danci** **Semen Danci silvestris.**

Beschreibung Die Frucht ist oval, vom Rücken her stark zusammengedrückt. Auf den stark entwickelten Nebenrippen eine einfache Reihe gebogener Stacheln, auf den Hauptrippen kurze Haarzotten Die beiden seitlich stehenden Nebenrippen jeder Theilfrucht besonders stark entwickelt, so dass die eigentlich seitlich stehenden Hauptrippen gegen die Fugenfläche verschoben werden, die dadurch auffallend breit erscheint. Unter jeder Nebenrippe ein Sekretgang, auf der Fugenfläche je 2 (Fig 288)

Bestandtheile. 0,8—1,6 Proc ätherisches Oel Es ist farblos bis gelb, spec Gew 0,870—0,923 Dreht links (100 mm Rohr) —13 bis —37° Von Bestandtheilen desselben ist ein Terpen $C_{10}H_{18}$, wahrscheinlich Pinen, isolirt

Verwendung als Diureticum

2) Die Wurzel **Radix Danci.** **Racine de carotte** (Gall)

Beschreibung. Die Wurzel der wilden Pflanze ist weisslich, dünn, holzig, von stark aromatischem Geschmack. Die vielfachen Spielarten, in denen die Pflanze gebaut wird, haben eine weisse, gelbe oder röthliche Wurzel, welche stark rübenförmig oder mehr kugelig ist. Das ausserordentlich parenchymreiche Gewebe lässt schmale Markstrahlen, im Holz vereinzelt die Gefässe erkennen. Im Parenchym zahlreiche Farbstoffkörperchen von Carotin.

Bestandtheile nach Koenig im Durchschnitt: Wasser 86,79 Proc., Stickstoffsubstanz 1,23 Proc., Fett 0,3 Proc., Rohrzucker 2,11 Proc., Fruchtzucker 4,08 Proc., sonstige stickstofffreie Bestandtheile 3,08 Proc., Holzfaser 1,49 Proc., Asche 1,02 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 9,31 Proc., Kohlehydrat 69,41 Proc., Stickstoff 1,49 Proc.

Die Asche enthält: Kali 36,99 Proc., Natron 21,17 Proc., Kalk 11,34 Proc., Magnesia 4,38 Proc., Eisenoxyd 1,01 Proc., Phosphorsäure 12,79 Proc., Schwefelsäure 6,45 Proc., Kieselsäure 2,38 Proc., Chlor 4,59 Proc. Ferner enthält die Wurzel 0,0114 Proc. eines farblosen, ätherischen Oeles vom spec. Gew. 0,8863 bei 11,2° C., ein Cholesterin (Daucosterin) vom Schmelzpunkt 186,5° C. Carotin $C_{40}H_{56}$ bildet rothbraune, quadratische, glänzende Krystalle, die bei 167,8° C. schmelzen. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Schwefelkohlenstoff, schwer löslich in Alkohol, Aether, Ligroin und Chloroform, in Schwefelsäure löst es sich mit indigoblauer Farbe. An der Sonne wird es bald farblos und amorph, in der Wärme riecht es nach Veilchenwurzel. Hydrocarotin $C_{48}H_{72}O(?)$, neben Carotin in der Wurzel vorkommend, bildet monokline Blätter, die bei 137,4° C. schmelzen, es dreht die Polarisationsebene links; es soll mit Cholesterin identisch sein, was von anderer Seite bestritten wird.




Fig. 238. Querschnitt durch die Frucht von *Daucus Carota* L., schwach vergrössert. a Stacheln auf den Nebenrippen. b Sekretgänge. c Hauptrippen. e Embryo.

Anwendung. Die Verwendung der Wurzel als Gemüse ist bekannt. Der eingedickte Saft wurde früher als *Succus Dauci inspissatus* pharmaceutisch benutzt. Ueber die Verwendung der Wurzel als Kaffeesurrogat vergl. S. 829.

Pulpa e radice Carotae. Pulpe de Carotte (Gall.) ist der aus der zerriebenen Wurzel gewonnene, durch ein Haarsieb getriebene Brei.

II. *Daucus hispanicus* L. und vielleicht auch ***Daucus gummifer* Lmk.**, beide in Südeuropa, liefern ein Gummiharz durch Einschnitte in den Stengel: *Bdellium siculum*.

III. *Athamantia cretensis* L. Heimisch im Mittelmeergebiet, liefert in den Früchten **Fruits de Daucus de Crète** (Gall.). Die Früchte sind 4 mm lang, stielrund, behaart, mit fadenförmigen Rippen. In jedem Thälchen ein Sekretgang, auf der Fugenfläche zwei. — Die aromatisch riechenden Früchte werden als Diureticum verwendet.

Decocta.

Man versteht hierunter für die Zwecke der Receptur hergestellte Abkochungen. Das dabei eingehaltene Verfahren besteht im allgemeinen darin, dass man die zerkleinerte Substanz mit kaltem Wasser übergiesst, alsdann die Mischung erhitzt und etwa 15—30 Minuten im Kochen erhält, worauf man noch heiss kolirt. Die Vorschriften der Arzneibücher weichen indessen in den Einzelheiten von einander ab.

Austr. Ist die Menge des Arzneistoffes nicht angegeben, so bereitet man aus 1 Th Arzneistoff = 10 Th Kolatur. Diese Regel gilt nicht für stärker wirkende, namentlich narkotische Arzneistoffe (überhaupt bei solchen, für welche Austr. Höchstgaben vorgeschrieben hat), ferner für schleimige Substanzen, bei diesen ist die zu verwendende Menge dem Apotheker überlassen. — Der auszuziehende Arzneistoff ist mit einer genügenden Menge kalten Wassers zu übergossen und unter bisweiligem Umrühren $\frac{1}{2}$ Stunde lang zu kochen oder den Dämpfen des siedenden Wasserbades auszusetzen. — Die Flüssigkeit ist noch heiss abzuseihen, abzupressen und wenn nöthig zu filtriren. — Stoffe dichter Struktur sind in der Regel eine Stunde lang zu kochen.

Germ. Ist die Menge des Arzneistoffes nicht vorgeschrieben, so bereitet man aus 1 Th Arzneistoff = 10 Th Kolatur. Ausgenommen hiervon sind Arzneistoffe, für welche Germ. höchste Gaben festgesetzt hat. Bei schleimigen Substanzen ist das Verhältniss des Arzneistoffes zur Kolatur dem Apotheker überlassen. — Abkochungen sind in der Weise zu bereiten, dass man die Substanz mit der erforderlichen Menge kalten Wassers übergiesst und die Mischung $\frac{1}{2}$ Stunde den Dämpfen des siedenden Wasserbades unter bisweiligem Umrühren aussetzt. Die Flüssigkeit wird noch warm abgepresst. *Decoctum Althaeae* und *Decoctum Seminum Lini* werden durch $\frac{1}{2}$ stündliche Maceration mit kaltem Wasser ohne Umrühren bereitet.

Helv. Abkochungen sind entweder durch $\frac{1}{2}$ stündige Digestion im Dampfbade oder durch Kochen über freiem Feuer zu bereiten, wobei mindestens das $1\frac{1}{2}$ fache der Kolatur an Wasser zu verwenden ist. Das Koliren muss heiss geschehen. Ist die Menge des zu verwendenden Arzneistoffes nicht vorgeschrieben, so wird $\frac{1}{10}$, bei schleimigen Substanzen nur $\frac{1}{20}$ der verlangten Kolatur genommen. Nicht zulässig ist dies für Substanzen aus der Reihe der Separanda und Venena, bei diesen hat der Arzt die Menge des Arzneistoffes vorzuschreiben. — Die Verwendung sogenannter „Decocta sicca“ ist zur Bereitung von Abkochungen nicht gestattet.

U-St. Wenn etwas anderes nicht vorgeschrieben ist, bereitet man aus 50 g der Arzneisubstanz = 1000 cem Kolatur. Man übergiesst in einem Kessel die 50 g Substanz mit 1000 cem kaltem Wasser, bedeckt mit einem Deckel und erhält 15 Minuten im Sieden. Nach dem Abkühlen auf etwa 40° C wird ausgepresst und der Rückstand mit Wasser nachgewaschen, bis die Kolatur = 1000 cem beträgt. — Bei stark wirkenden Substanzen ist die Menge des zu verwendenden Arzneistoffes vom Arzte vorzuschreiben.

Brit. und Gall. geben allgemeine Anweisungen zur Bereitung von Dekokten nicht.

Wenn im Vorstehenden auch angegeben ist, dass die Dekokte im allgemeinen heiss zu koliren sind, so ist das doch cum grano salis zu verstehen. Condurango-Dekokte z. B. sind erst nach vollem Erkalten durchzuseihen, vergl. S. 941.

Delphinium.

Gattung der Ranunculaceae — Helleboreae.

† **Delphinium Staphisagria** L. Stephanskraut, Läusekraut, Heimisch im Mittelmeergebiet. Verwerthung finden die Samen. *Semen Staphisagriae* (Erganzb.), *Semen Staphidis agriae*, *Semen Pedicularis*. — Läuse- oder Stephanskörner, Läusepfeffer, Rattenpfeffer. — *Semence de Staphisaigrie* (Gall.) — *Stavesacre*.

Beschreibung. Die Samen sind bis 7 mm lang, halb so dick, unregelmässig kantig, matt, netzrunzelig, braun bis schwärzlich. Im Querschnitt das dickfleischige Endosperm und der kleine Embryo. Die Samenschale hat eine aus grossen, verdickten, porösen Zellen bestehende Epidermis, woran sich die zusammengefallene Nährschicht schliesst. Im Endosperm grosse Aleuronkörner. Geschmack stark bitter und brennend.

Bestandtheile. 17—18 Proc. Fett im Endosperm und Embryo, ferner durchschnittlich 1 Proc. Alkaloide, die ihren Sitz in den peripheren Theilen des Endosperms

haben sollen, es sind folgende bekannt Delphinin $C_{21}H_{29}NO_7$, stark giftig, wird bei $120^\circ C$ gelb und schmilzt bei $198^\circ C$, in Wasser schwer, in absolutem Alkohol, Aether, Benzol leichter, in Chloroform in jedem Verhältniss löslich, Delphinin, wahrscheinlich mit dem Delphinin isomer, Delphinoidin $C_{25}H_{33}NO_4$, Schmelzpunkt $152^\circ C$, mit Schwefelsäure und Bromwasser eine violette Lösung gebend, mit Zucker und Schwefelsäure braun, dann auf Wasserzusatz grün Staphisagrין, kein einheitlicher Körper, sondern ein Gemenge amorpher Basen

Anwendung und Wirkung Die Alkaloide wirken ähnlich wie Aconitin, rufen aber keine Pupillenerweiterung hervor Die ganzen Samen wirken stark narkotisch, früher und wohl auch noch jetzt gegen Hautungeziefer angewendet

Aufbewahrung Vorsichtig

Linimentum contra scabiem Defens			Unguentum contra pediculos		
Rp	Semin Staphisagriae pulv		Pp	Semin Staphisagr pulv	20,0
	Semin Sabadillae	āā 10,0		Unguent Hydrarg anser	10,0
	Subgins	10		Unguent cerei	70,0
	Olei Olivinum	80,0	Vet,	Aqua antipsoeica Ranque	
				Krätz- und Rindewasser	
	Tinctura Staphisagriae acida		1 p	Semin Staphisagr cont	20,0
Rp	Semin Staphisagr gr pulv	10,0		Capit Papaver conc	30,0
	Spiritus diluti	100,0		Aquae feruida	1000,0
	Acidi sulfurici puri	05		Man erhitzt 1 Stunde im Dampfbade u. prast aus.	

II Delphinium Consolida L. Ackerunkraut in Europa, in Nordamerika eingeschleppt Verwendung finden die Samen *Semen Consolidae regalis*, *Semen Calcatrippae* — Larkspur Seed Sie sind schwarzbraun, kantig, mit hautigen Schuppen bedeckt, 2 mm lang und dick Geschmack bitterlich scharf Sie enthalten ein Alkaloid Calcatrippin Früher wurden auch die Blüthen *Flores Calcatrippae* benutzt

III Delphinium Ajacis L. Verbreitete Zierpflanze Soll als Anästheticum, Excitans, Rubefaciens etc verwendet werden

IV Delphinium Zail Aitch et Hemsl Heimisch in Persien und Afghanistan Das Kraut verwendet man als tonisches Mittel Enthält ein Alkaloid Die gelben Blüthen werden zum Färben verwendet Ebenso verwendet man zum Gelbfärben *Delphinium camptocarpum Fisch et Mey* in Persien und *Delphinium saniculaefolium Boiss*, ebenfalls in Persien Die letztere Art soll Berberin enthalten Die Blüthen dienen als Heilmittel bei Gelbsucht und Wassersucht

V Delphinium denudatum Wall Ein Extrakt der Pflanze wird mit Cardamomen, Sem Strychni, Samen Ignati und Samen Lodoiceae gegen Cholera, Diarrhoe und Chlorose angewendet — Das Sem Lodoiceae ist die Seychellen-Nuss Lodoicea Sechellarum

Desinfectio.

Unter „Desinfektion“ (Entseuchung) versteht man die Vernichtung der in einem bestimmten Objekt enthaltenen pathogenen Mikroorganismen (Bakterien) — Nicht zu verwechseln mit der Desinfektion ist die Desodorisation, welche die Zerstörung oder Verdeckung unblutiger Gerüche bezweckt, die durch die freiwillige Zersetzung (Fäulnis) organischer Substanzen aufgetreten sind

Wer daher mit Erfolg desinficieren will, muss eine genaue Kenntnis von den Eigentümlichkeiten der in Frage kommenden pathogenen Organismen besitzen Er muss ihre Entwicklung, Fortpflanzung, die Art, in welcher sie sich verbreiten, ihre Widerstandsfähigkeit gegen äussere Eingriffe kennen, er muss ferner unterrichtet sein über die Wirksamkeit der Mittel (Desinfektionsmittel), die ihm zur Vernichtung der Bakterien zur Verfügung stehen Er muss endlich Sorge dafür tragen, dass nicht durch das Desinfektionsverfahren eine Verschleppung von Keimen erfolgt Endlich muss er die Gewähr bieten, dass er die erforderlichen Arbeiten mit der nöthigen Zuverlässigkeit ausführt

Die zur Desinfection zur Verfügung stehenden Hilfsmittel sind zum Theil physikalischer, zum Theil chemischer Natur. Von chemischen Desinfectionsmitteln besitzen wir zur Zeit eine wahre Legion. Nur wenige derselben aber haben sich der bakteriologischen Kontrolle gegenüber als geeignet erwiesen — Wir theilen im Nachstehenden diejenigen Desinfectionsmittel mit, welche in der Praxis in Anwendung gezogen werden.

1) **Feuer.** Durch vollständige Verbrennung können natürlich alle pathogenen Organismen mit völliger Sicherheit vernichtet werden. Man wird daher zweckmässig verbrannten kleinere Gegenstände von geringerem Werth, z. B. gebrauchtes Verbandmaterial, Hadern, Lappen, Lumpen, Kehrriecht, Müll, Brot, welches zum Abreiben von Tapeten oder Wandflächen gedient hatte. Desgleichen Bettstroh, Holztheile aus verseuchten Thierställen, stark verschmutzte Wäsche, deren Werth ein geringer ist. Das Verbrennen erfolgt entweder in einer hinreichend grossen Feuerung, z. B. unter einem Dampfkessel, oder auch auf einem im Freien zu errichtenden Scheiterhaufen.

Es ist hierbei Sorge zu tragen, dass durch grössere oder leicht zerstreubare Objekte die Infektionsträger nicht verschleppt werden. Man schlägt deshalb z. B. Bettstroh in mit Sublimatlösung befeuchtete Tücher oder Säcke ein und befördert es auf diese Weise zur Verbrennungsstelle.

Unter diese Abtheilung wurde auch gehören das Verbrennen von Müll und von Excrementen in eigens hierzu konstruirten Öfen.

2) **Kochen in Wasser.** Durch 5—10 Minuten langes Kochen (!) in Wasser werden mit Sicherheit alle Krankheitskeime getödtet. Da Zusatz von Salzen die Siedetemperatur des Wassers erhöht, so kann man dem Wasser, in welchem man die betreffenden Objekte kocht, einen Zusatz von Kochsalz oder Soda (2 Proc.) geben.

Man kocht daher alle Objekte, welche durch diesen Process nicht leiden, also z. B. Instrumente, Essbestecke, ferner Wäsche etwa 1 Stunde lang mit Wasser. Zusatz von 2 Proc. krystallisirter Soda zum Kochwasser ist bei Wäsche zu empfehlen. Auch Stuhlgänge werden in einigen Krankenhäusern durch etwa einstündiges Kochen desinficirt, wobei indessen ekelhafter Geruch auftritt.

In den Cahlernen (Abdeckereien) der Schlachthöfe werden die verworfenen Fleischtheile durch Kochen unter 4—5 Atmosphären Druck unschädlich gemacht und zu Fleischmehl, Blutmehl, Leimdünger verarbeitet.

Bei voluminösen Objekten ist es natürlich nothwendig, die Zeit des einstündigen Kochens von da an zu rechnen, wenn die betr. Objekte bis in ihr Inneres auf die Temperatur des siedenden Wassers gebracht sind.

3) **Dampfen.** Strömender Wasserdampf von 100°C, also Wasserdampf unter gewöhnlichem Drucke tödtet binnen 10—15 Minuten, Wasserdampf von 110—120°C tödtet binnen 2—5 Minuten mit Sicherheit alle pathogenen Bakterien. Zur Desinfection mit strömendem oder gespanntem Wasserdampf sind besondere Desinfectionsapparate konstruirt worden. Man erhitzt in diesen Apparaten je nach der Dampfspannung, mit welcher sie arbeiten, die Objekte 10—30 Minuten lang. Um sich zu vergewissern, dass die zu erzielende Temperatur auch im Centrum des Apparates oder im Innern eines Bündels oder dergl. erreicht ist, bettet man in die Objekte Kontakt Thermometer ein, welche ein elektrisches Klingelsignal auslösen, sobald das Thermometer die Temperatur erreicht hat, auf welche es eingestellt ist. Dieser Art der Desinfection werden namentlich gefärbte Stoffe, Kleidungsstücke, Matratzen, Decken, Betten unterworfen, auch Pelzwerk, welches indessen darunter etwas leidet.

4) **Seifenlauge.** 1 kg Kaliseife wird in 10—15 Liter Wasser gelöst. In diese Lösung werden Wäsche und waschbare Gegenstände 24 Stunden eingelegt, dann mit 2procentiger Sodälösung ausgekocht. Mit derselben Seifenlösung werden Holztheile (Sitzbretter von Aborten), soweit sie abwaschbar sind, gründlich abgeseuert. Auch Hadern, Wischlappen und dergl. werden, soweit sie nicht zu verbrennen sind, in diese Seifenlösung eingelegt und später ausgekocht.

5) **Karbolsäure.** Die 3procentige wässrige Lösung der 100procentigen Karbolsäure tödtet bei genügend langer Einwirkung alle pathogenen Bakterien, nicht aber mit der gleichen Sicherheit deren Dauerformen (Sporen). Der Sicherheit wegen wendet man häufig die 5procentige, energischer wirkende Lösung an. Man benutzt diese Lösungen zur Desinfection der Hände, der Haupt- und Barthaare, von Wäsche und waschbaren Gegenständen, z. B. von Oelanstrichen an Holz und Wänden, Fussböden, ferner zum Abwaschen von Leichen, Befeuchten von Tüchern, in welche letztere gefüllt werden sollen. Rohe Karbolsäure ist um so weniger wirksam, je mehr sie Kohlenwasserstoffe enthält.

6) **Kresolseifenlösung.** Wird in einer Verdünnung von 1:10 bis 1:20 in jenen Fällen angewendet, in denen man Seifenlösung oder Karbolsäurelösung anwendet.

7) **Kalkmilch.** 1 Th. frischgebrannter Aetzkalk ist zunächst mit 1 Th. Wasser abzulöschen, schliesslich setzt man noch 3 Th. Wasser zu. Ist entweder frisch zu bereiten

oder in gut geschlossenen Gefäßen aufzubewahren. Diese Kalkmilch dient besonders zur Desinfektion von Entleerungen (Erbrochenes, Stuhlgang). Man versetzt diese mit dem gleichen Volumen Kalkmilch, rührt gut durch (!) und lässt 2—3 Stunden (mindestens 1 Stunde) stehen. Die Erreger von Typhus und Cholera sind alsdann getödtet. Die nämliche Kalkmilch dient ferner zum Anstreichen von Fußböden, Wänden, Holztheilen, Pflaster, Rinnsteinen, Aborten, von Eimern, Kübeln, Tonnen u. s. w.

Zur Desinfektion von Latrinen und Aborten rechnet man auf 20 Liter Inhalt = 1 Liter Kalkmilch, welche mit dem zu desinficirenden Inhalt gut zu mischen ist.

8) Quecksilberchlorid tödtet in einer Concentration von 0,5—1,0 pro mille alle Organismen. Werden die Lösungen mit gewöhnlichem Wasser bereitet, so setzt man ihnen pro Liter = 2 g Kochsalz oder 5 g Weinsäure zu. Man benutzt diese Lösung zur Desinfektion der Hände, zum Abwaschen von Leichen, zum Befeuchten der Tücher, in welche man Leichen einhüllt. Zum Füllen von Speiglasern, von welchen der Auswurf aufgenommen werden soll. Zum Abwaschen der Wände, Holzwerk, Fenster und Thürrahmen, Bettstellen, Bilderrahmen, Dielen, Möbel.

Gegenüber der sicheren Wirkung dieses Desinfektionsmittels liegt ein Nachtheil desselben in seiner eminenten Giftigkeit. Die zu benutzende Lösung ist mit Fuchsin deutlich roth zu färben, damit Verwechslungen mit Getränken vermieden werden.

9) Chlorkalk wird entweder als Pulver oder als wässrige Lösung angewendet. Auf 1 Liter Entleerungen (Stuhlgang, Erbrochenes) wendet man 50—100 g Chlorkalk mit 25—33 Proc. wirksamem Chlor an und verrührt denselben sorgfältig. Die Einwirkung soll mindestens 1 Stunde andauern.

Man wendet ferner wässrige Lösungen (2 + 100) an, die kalt (!) zu bereiten und zu filtriren sind. Diese Lösung dient zur Desinfektion der Hände und anderer Körpertheile, zum Abwaschen von Leichen. Für Desinfektion des Fußbodens, des Pflasters, der Rinnale, zum Desinficiren von Nachtgeschurren, Kübeln, Tonnen, Eimern und dergl. verwendet man eine Chlorkalkmilch von 50 g Chlorkalk auf 1 Liter Wasser. Einwirkung mindestens 1 Stunde lang.

10) Abreiben mit Brot. Wandanstriche von Leimfarben, Tapeten, Oefen werden mit frischem Brote bis über Mannshöhe abgerieben (Oelanstrich mit Karbolwasser abgewaschen). Hierdurch werden die Bakterien an das Brot festgeklebt und so von den Wänden entfernt. Die gebrauchten Brobstücke sind sofort zu verbrennen.

11) Abreiben mit Tuchein. Polirte Möbel werden mit einem Tuche scharf abgerieben und dieses dann verbrannt. Man kann sie auch, ohne der Politur zu schaden, mit einem mit Benzin angefeuchteten Tuche abreiben. Die Bakterien werden dann an dieses Tuch angelicht.

12) Formaldehyd ist zur Zeit das am meisten empfohlene Desinfektionsmittel. Ueber dessen Gebrauch vergl. unter Formaldehyd.

13) Schweflige Säure tödtet namentlich Hefe-Arten. Sie ist daher für specielle Zwecke, z. B. für Bierbrauereien, Molkereien, ein sehr geschätztes Desinfektionsmittel, zur Abtödtung der für Menschen gefährlichen Mikroorganismen (Bakterien) benutzt man sie dagegen nicht.

Die früher häufig benutzten gasförmigen Desinfektionsmittel Chlor und Brom sind nur in starken Concentrationen von sicherer Wirkung, ausserdem greifen sie alle Metalle heftig an. Ihr Gebrauch ist daher zur Zeit ziemlich aufgegeben. Bemerkte sei noch, dass man nicht zu gleicher Zeit Karbolsäure und Brom anwenden darf, da diese sich in ihrer Wirkung unter Bildung von Tribromphenol gegenseitig aufheben. Die Verwendung von Ozon scheitert gegenwärtig noch an technischen Schwierigkeiten.

Die früher vielfach als Desinfektionsmittel verwendeten Chemikalien Eisenvitriol, Manganchlorid, Zinkchlorid, Theer und Thechrole haben nur den Werth von Desodorationsmitteln. Kaliumpermanganat wirkt zwar desinficirend, kann aber wegen seines hohen Preises nur zu beschränkten Zwecken verwendet werden.

Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass für grössere Städte und andere politische Verände auf dem Verwaltungswege „Desinfektions-Ordnungen“ erlassen worden sind, welche da, wo sie rechtsgültig publizirt worden sind, auch beachtet werden müssen.

Dextrinum.

Dieses Umwandlungsprodukt der Stärke kann nach drei verschiedenen Verfahren hergestellt werden 1) durch Erhitzen von Stärke auf 200—240° C, 2) durch Einwirkung von Säuren auf Stärke, 3) durch Einwirkung von Diastase auf Stärke — Die nach den verschiedenen Verfahren gewonnenen Produkte führen verschiedene Namen Nach 1) und 2) werden icste Dextrine, nach 3) Dextrinlösungen erhalten

I Rost-Dextrin Rostgummi. Leicocom. Leicogonum Gommeline. Rohes Dextrin. Elsasser Gummi Dampfdextrin

Dieses Produkt wird erhalten, indem man Stärke (meist Kartoffelstärke) auf 200 bis 240° C erhitzt Das Erhitzen erfolgt unter Anwendung von Ruhrwerken entweder in flachen eisernen Pfannen über dicktem Feuer oder in rotirenden doppelwandigen Trommeln, deren Zwischenraum mit Oel gefüllt ist, also im Oelbade

Je nach der Art des Erhitzens ein fast farbloses oder mehr oder weniger gelb gefärbtes Pulver, entweder fast geruchlos oder von mehligem Geruch und von fadem Geschmack Ist es durch direkte Röstung gewonnen, so sieht man unter dem Mikroskop die stark verquollenen Stärkekörnchen, unter ihnen auch gelegentlich so weit erhaltene, dass sich die Herkunft der Stärke bestimmen lässt Wurde es durch Eintrocknen der Lösung erhalten, so stellt es dem arabischen Gummi ähnliche, gelbliche bis gelbe Stücke dar, die unter dem Mikroskop eine Struktur nicht mehr erkennen lassen — Es ist von eigenthümlich mehligem Geruch, von fadem Geschmack und in kaltem Wasser um so vollständiger löslich, je weniger unveränderte Stärke es enthält Die wässrige Lösung wird durch Zugabe von Jodlösung granatroth bis violettroth gefärbt

Diese Sorte wird zu technischen Zwecken, z B als Appreturmittel und als Klebmittel, ferner zum Verdünnen von Theerfarbstoffen, in der Pharmacie zu Dextrinverbanden verwendet In der Technik dient es namentlich als Ersatzmittel des arabischen Gummi (vergl Gummia S 1026)

Adruganline ist ein durch vorsichtiges Rösten von Weizenstärke erhaltenes weisses Dextrin

II Saure-Dextrin Zur Darstellung werden 1000 Th Kartoffelstärke mit einer Mischung von 2 Th konz Salpetersäure (von 1,36 spec Gew) und 300 Th Wasser befeuchtet Die Masse wird zunächst in Trockenstuben getrocknet, alsdann gepulvert und, in 3—4 cm hoher Schicht ausgebreitet, im Luftbade auf 110—120° C erhitzt Die Erhitzung wird sofort unterbrochen, sobald die Reaktion auf Stärke ausbleibt

Diese Dextrinsorte ist in der Regel heller wie die durch einfache Röstung dargestellte Sie ist im übrigen von den nämlichen Eigenschaften wie die vorige, reagirt meist schwach, aber deutlich sauer Sie dient den gleichen Zwecken wie die vorige

III Dextrinum depuratum Gereinigtes Dextrin 1000 Th blondes Kartoffel dextrin, 20 Th gefälltes Calciumcarbonat werden mit 2500 Th kaltem destillirtem Wasser übergossen und unter öfterem Umrühren bis zur Auflösung des Dextrins stehen gelassen Dann lässt man klar absetzen, giesst die über dem Bodensatz stehende Lösung klar ab, kocht sie durch ein wollenes Tuch, engt sie auf etwa $\frac{1}{2}$ ihres Volumens ein und giesst sie in ein Gefäss mit 3000 Th Spiritus von 90 Proc unter Umrühren ein Nach dem Absetzen sammelt man das ausgeschiedene Dextrin auf einem Filter oder Kolatorium, wäscht es mit verdünntem Alkohol (von 70 Proc), zum Schluss noch einmal mit starkem Alkohol nach und trocknet es auf Porcellantellern im Trockenschranke

Ein weisses oder weissliches, nicht feucht werdendes, fast geruchloses Pulver, welches in Wasser ziemlich klar löslich ist und dessen Lösung durch Jod rothlich gefärbt wird Dieses Präparat kann zur Herstellung trockener Extrakte verwendet werden

IV Dextrinum officinale Dextrinum (Ergänzb Helv) Dextrine (Gall) Dextrina Officinelles Dextrin.

Dieses Präparat stellt ein fast reines, nur noch geringe Mengen Traubenzucker und Zwischenprodukte zwischen Stärke und Dextrin enthaltendes Dextrin dar

Darstellung. Man löst 4 Th krystallisierte Oxalsäure in 750 Th kaltem Wasser, rührt mit dieser kalten (!) Lösung 150 Th Kartoffelstärke an und erhitzt die Mischung in einem Glaskolben oder in einer bedeckten Porcellanschale im Dampfbade unter öfterem Umrühren so lange (einige Tage), bis ein Tropfen der wohl durchmischten Flüssigkeit, mit 5 ccm Wasser verdünnt, durch Jodlösung nicht mehr blau, sondern nur weinroth gefärbt wird. Sobald dies der Fall ist, setzt man so viel gefälltes Calciumcarbonat (5–6 g) hinzu, dass die Oxalsäure neutralisirt wird, schüttelt häufig um und lässt die Flüssigkeit alsdann an einem kühlen Orte einige Tage absetzen. Hierauf filtrirt man, dampft das Filtrat ein, bis der Abdampfdruckstand sich in Faden ausziehen lässt, trocknet diese auf Porcellan tellern bei 30–40° C (!) im Trockenschranke gut aus und pulvert sie. Das Pulver ist so gleich in vorgewärmte, gut schliessende Gefässe abzufüllen (Germ I)

Eigenschaften. Gelbliche, geruchlose, dem arabischen Gummi ähnliche Massen oder ein gelbliches Pulver, welches nicht hygroskopisch ist. Dextrin löst sich in einer gleichen Gewichtsmenge Wasser zu einer schleimigen, Lackmuspapier nicht verändernden Flüssigkeit, welche nach Zusatz der doppelten Menge Weingeist einen reichlichen Niederschlag giebt.

100 Th Dextrin sollen an siedenden Alkohol nicht mehr als 5 Th (Traubenzucker) abgeben, beim Trocknen nicht mehr als 10 Th Wasser verlieren und nach dem Verbrennen nicht mehr als 0,5 Th Asche hinterlassen. — Die wässrige Lösung (1 = 10) werde nach Sättigung mit Jodlösung durch einen kleinen Ueberschuss derselben nicht gebläut (Stärke). — Calciumacetatlösung verursache nach dem Ansäuern der Lösung mit Essigsäure keine Trübung (Oxalsäure), ebenso wenig Ammoniumoxalatlösung (Kalk). — Schwefelwasserstoffwasser verändere die Lösung nicht, auch nicht nach Uebersättigung mit Ammoniakflüssigkeit (Metalle).

Anwendung. Als Verdünnungsmittel zur Darstellung trockener narkotischer Extrakte. Es hat vor Süßholzpulver den Vorzug, dass es in Wasser löslich ist. Wesentlich ist es hierbei, dass das Dextrin nicht hygroskopisch ist, also nicht grössere Mengen Starkezucker enthält. — Das nach obiger Vorschrift gewonnene Dextrin enthält nur etwa 1,5–2,0 Proc Traubenzucker, welche für die pharmaceutische Verwendung nicht störend sind, auch durch Ausziehen mit Alkohol zum grössten Theil entfernt werden können.

V Dextrinum purissimum Reines Dextrin. Das völlig reine Dextrin ist kaum Gegenstand des Handels, sondern ein Sammlungspräparat. Man erhält es aus dem officinellen Dextrin, indem man dieses in Wasser löst, die Lösung durch Alkohol fällt und dieses Verfahren einige Male wiederholt, so dass alle vorhandene Dextrose entfernt wird.

Gelblich weisses Pulver oder amorphe, dem arabischen Gummi ähnliche Massen, welche sich in etwa der gleichen Menge Wasser zu einer fast farblosen, neutralen, fade schmeckenden Flüssigkeit auflösen. Die wässrige Lösung lenkt die Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts ab (daher der Name *Dextrin* von *dexter*, rechts) und reducirt in der Kalte Fehling'sche Lösung nicht, dagegen findet Reduktion in der Wärme des Wasserbades statt. Eine Lösung von 6 Th Kupferacetat in 98 Th Wasser und 1 Th Essig (Baxford's Reagens) wird durch Dextrin (zum Unterschied von Dextrose) auch in der Hitze nicht reducirt. Bleiacetat und Bleiessig fallen Dextrin erst nach Zusatz von Ammoniak (Unterschied von den Gummarten), dagegen wird es durch Barythydrat und durch Kalkwasser gefällt. In Alkohol und in Aether ist Dextrin unlöslich, aus der wässrigen Lösung wird es durch genügenden Zusatz von Alkohol gefällt.

Die durch Säuren oder hydrolytische Fermente verursachte Umwandlung der Stärke in Dextrin und Zucker durchläuft mehrere Stadien, die im Verlaufe der einzelnen Stadien gebildeten Produkte haben verschiedene Eigenschaften und führen besondere Namen. 1) Amylodextrin (Amidulin, lösliche, krystallisirbare Stärke) giebt in wässriger Lösung mit Jod eine violette bis rothe Färbung. 2) Erythrodextrin (Dextrinogen, α -Dextrin) wird in wässriger Lösung durch Jod braunroth gefärbt. 3) Achroo-

dextrin (β Dextrin) wird in wässriger Lösung durch Jodlösung nicht stärker gefärbt als reines Wasser

Wertbestimmung. Die für die Technik wichtigsten Bestimmungen werden wie folgt ausgeführt (HEFELMANN und SCHMITZ DUMONT)

1) Wasser Man wägt 2,0 g Dextrin in eine mit Glasstab und 20 g ausgeglühtem Sande beschickte Porzellanschale ein, löst in wenig Wasser, verdampft unter Umrühren auf dem Wasserbade zu Trockne und trocknet den Rückstand weiterhin 4 Stunden bei 105° C 2) Asche 5 g Dextrin werden vorsichtig verascht 3) Lösliches und Unlösliches Man löst 5 g Dextrin im 250 cem-Kölbchen in kaltem Wasser und füllt bis zur Marke auf 100 cem der Lösung werden in einem 110 cem-Kölbchen mit 7 cem Aether kräftig geschüttelt, wobei sich die Masse als flockiger Niederschlag zusammenballt, während alles Dextrin in Lösung bleibt Das Volumen beträgt nach dem Schütteln 106 cem Man filtrirt durch ein bedecktes Faltenfilter, dampft 50 cem wie bei der Wasserbestimmung ein und trocknet 4 Stunden bei 105° C Die Gewichtszunahme der Schale ergibt das Lösliche (Dextrin, Zucker und lösliche Salze), während das Unlösliche durch Subtraktion des Löslichen von der Gesamtrockensubstanz erhalten wird 4) Zucker In 25 cem des nach 3) erhaltenen Filtrates wird der Zucker nach ALLIHN bestimmt und als Maltose berechnet 5) Dextrin ergibt sich aus der Differenz des Zuckers vom Löslichen, event unter Berücksichtigung der löslichen Mineralstoffe

Dextrin-Leim 40,0 g Dextrin werden unter Erwärmen in 60,0 Wasser gelöst Der noch warmen Lösung setzt man 2,0 g kryst Aluminiumsulfat zu

Gummitin ist identisch mit Patentgummi (s weiter unten)

LIPPS Reagens auf Dextrin Eine kalt gesättigte Lösung von Bleiacetat wird auf 60° C erwärmt und mit soviel Bleioxyd vermischt, dass die Mischung fest wird Nach einiger Zeit wird mit Wasser extrahirt und filtrirt Giebt beim Kochen mit einer Dextrinlösung weisse Fällung

Mucilago Dextrini. Mucilage of Dextrin (Nat Form) Dextrin 835,0 g, Aquae q s ad 1000,0 cem

Packleim ist I) konzentrierte Dextrinlösung II) Eine Lösung von je 50,0 Borax und Stärkezucker, sowie 500,0 Dextrin in 400,0 Wasser

Pasta dextrinata Dextrinpasta 100,0 Dextrin, 100,0 Glycerin und 100,0 Wasser werden auf dem Wasserbade unter Ersatz des verdunsteten Wassers bis zur völligen Auflösung erwärmt.

Patentgummi in Stücken, welche dem arabischen Gummi ähnlich sind, ist nach SCHWASSINGER Dextrin mit 12 Proc Wasser

Dianthus.

Gattung der Caryophyllaceae — Silenoidae — Diantheae.

Dianthus Caryophyllus L. Heimisch in Westfrankreich, Italien, Sardinien, Dalmatien In zahlreichen Formen als Zierpflanze (Gartennelke) kultivirt

Beschreibung. Stengel der Pflanze, sowie die lineal-lanzettlichen Blätter kahl und meergrün, die blühenden Stengel oberwärts ästig, Blüten einzeln, Kelch röhrig, mit 4–6 Vorblättern, die krautig, fast rhombisch und spitz sind, Blumenblätter mit langem Nagel und horizontal absteigender Platte, diese gezähnt. Wohlriechend

Die Blumenblätter waren früher als Flores Tunicae hortensis oder Flores Caryophyllorum rubrorum in Gebrauch, sie sind jetzt nur noch von der Gall als Fleurs d'Oeillet rouge aufgenommen

Sirap d'Oeillet rouge (vergl S 960 Note 1) Ist aus den Blüten von Dianthus Caryophyllus wie Sirapus Rhoeados zu bereiten

Dictamnus

Gattung der Rutaceae — Rutoideae — Ruteae — Dictamninae.

I Einzige Art *Dictamnus albus* L (syn *Dictamnus Fraxinella* Pers)
Weisser Diptam, Ascherwurz, Spechtwurz. Heimisch von Mittel- und Südeuropa
ostwärts bis zum Amur und Nordechina, auch häufig in Gärten als Zierpflanze

Beschreibung Mehrjähriges Kraut mit unpaarig gefiederten Blättern, die Blättchen eiförmig, am Rande gesägt. Blüten in einfachen oder unterseits zusammengesetzten Trauben mit 2 Vorblättern, 5 zählige, die oberen Kronblätter paarweise aufgerichtet, das untere herabgebogen. 10 Antheren, nach vorn gebogen, am Grunde eines Diskus eingefügt. Fruchtknoten tief 5lappig, Narbe einfach. Frucht eine kurz gestielte, in 5 Theilfruchte zerfallende Kapsel.

Verwendung findet die Wurzelrinde *Radix Dictamni*, *Cortex radialis Dictamni*. — *Racine de Dictamne blanc*, *Racine de Fraxinelle* (Gall.) in rinnenförmig zusammengeboogenen, weisslichen Stücken. Frisch von charakteristischem Geruch und scharfem Geschmack, die aber beim Trocknen fast ganz verschwinden. Der Querschnitt lässt in der Wurzelrinde reichlich grosse Drüsen von Kalkoxalat erkennen, kurze, spindelförmige, stark verdickte Fasern, sowie lysigene Sekretbehälter mit gelbem Inhalt. Im Parenchym reichlich Stärke.

Als **Bestandtheile** sind ätherisches Oel und Harz ermittelt.

Früher als Antihystericum und Diureticum, jetzt im wesentlichen nur noch Volksmittel.

Die jungen Blätter der Pflanze werden in Sibirien wie Thee benutzt.

II *Herba Dictamni cretici*, *Dictame de Crète* (Gall.), stammen von *Origanum Dictamnus* L. (Labiatae).

Pulvis antepilepticus RENDSCHIEDLER.

Rp Radicis Dictamni
Radicis Paeoniae
Visci albi
Conchar praep 33,10,0
Castorei Canadensis 2,0

Pulvis antepilepticus SLOW.

Rp Radicis Dictamni 20,0
Rrhizom Zedaira 2,0

Digestio.

Digestio, Digestion. Sie geschieht im allgemeinen bei einer Temperatur, welche ungefähr 10 bis 15° C niedriger liegt als der Kochpunkt des Vehiculus. Bei 90 procentigem Weingeist wäre demnach die Digestionswärme 60 bis 65° C, bei 80 procentigem Weingeist 65 bis 70° C. Bei der Bereitung der Tinkturen pflegt man die Zeit der Digestion zu verlängern und die Höhe der Digestionswärme herabzusetzen. Daher schreibt das deutsche Arzneibuch vor, „das Digeriren geschehe bei 35—40° C unter wiederholtem Umrühren oder Bewegen der Gemische.“

Digitalinum.

Einleitung. Die wirksamen Bestandtheile des rothen Fingerhuts (*Digitalis purpurea* L.), und zwar der Blätter und der Samen, waren vielfach Gegenstand der chemischen und physiologischen Untersuchung. — Das Studium der hierauf bezüglichen Literatur wird erschwert dadurch, dass einerseits zur Bezeichnung oft ganz verschiedener Individuen die nämlichen Namen gebraucht werden, andererseits die nämlichen Körper mit verschiedenen Namen belegt werden.

Die ersten werthvollen chemischen Untersuchungen der Digitalis Pflanze rühren von den Franzosen her. Die von ihnen angegebenen Darstellungsmethoden der Digitalisstoffe

werden — wenigstens im Princip — auch jetzt noch angewendet. Die genauere Charakterisierung und chemische Untersuchung der pharmakologisch wichtigeren Stoffe wurde aber erst durch die Arbeiten von SCHMIEDEBERG und KILIANI geliefert.

Die französischen Digitaline HOMOLLE veröffentlichte 1845 ein Verfahren, um aus den Digitalisblättern Digitalin abzuscheiden. Er stellte einen wässrigen Auszug derselben her, reinigte diesen mit Bleessig, entfernte das überschüssige Blei, ferner Kalk und Magnesia durch kohlensaures, oxalsaures und phosphorsaures Alkali und fällte mit Gerbsäure. Das entstandene Tannat zerlegte er mit Bleiglätte und brachte den in Freiheit gesetzten Digitaliskörper durch Weingeist in Lösung. Zur weiteren Reinigung wurde der Verdunstungsrückstand der alkoholischen Lösung mit wenig Wasser gewaschen, die Lösung des Rückstandes in absolutem Alkohol mit Thierkohle entfärbt und der nach freiwilligem Verdunsten dieser alkoholischen Lösung verbleibende körnige Rückstand mit Aether ausgezogen, um Fett und andere Substanzen zu entfernen.

Dieses Digitalin (la Digitaline) ist ein weisses, geruchloses, bitter schmeckendes Pulver, sehr schwer in Wasser und Aether, leicht in Alkohol löslich.

In Gemeinschaft mit QUEVENNE untersuchte HOMOLLE dieses Digitalin näher und trennte es mit Hilfe von Aetherweingeist (von 0,78 spec Gew) und 50procentigem Weingeist in drei Körper Digitalin, Digitaline und Digitalose. In Aetherweingeist ist unlöslich Digitalin, löslich Digitaline und Digitalose, in 50proc Weingeist löst sich nur Digitaline.

Die Gall lässt nach dem Verfahren von HOMOLLE (aber unter Weglassung der zuletzt angegebenen Trennungsmethode von HOMOLLE und QUEVENNE) ihr Digitaline amorphe bereiten. Das Digitaline HOMOLLE ist also identisch mit dem Digitaline amorphe (pur) der Gall und Belg und mit dem sog Digitaline chloroformique. Nur insofern besteht ein kleiner Unterschied, als bei der Reinigung des Roh-Digitalins die Behandlung mit Aether unterbleibt. Dafür wird das Digitalin schliesslich mit Chloroform aufgenommen. Nach dem Abdestilliren des letzteren hinterbleibt es als schwach gelbliches Pulver.

NATIVELLE zog Digitalisblätter mit Wasser unter Zusatz von Bleioxyd aus und isolirte die in Lösung gegangenen Körper ähnlich wie HOMOLLE durch Gerbsäure. Er erhielt hierbei einen wasserlöslichen und Digitalin genannten Körper (Digitalin NATIVELLE). Durch nachfolgendes Extrahiren der Blätter mit Weingeist erhielt er noch zwei andere Körper: 1) Digitalin, in Nadeln krystallisirend und von ihm, später auf andere Weise dargestellt, Digitaline cristallisée genannt. Dasselbe ist löslich in Chloroform und in Weingeist, sehr schwer löslich in Wasser und fast unlöslich in Aether. 2) Die „Substance cristallisée inerte“, deren Namen er später in „Digitin“ umänderte. Diese Substance cristallisée inerte, löslich in Weingeist, fast unlöslich in Wasser, Chloroform und Aether, ist vielleicht identisch mit unserem heutigen Digitonin.

Mit Salzsäure von 1,19 spec Gew färbt sich das Digitaline cristallisée grün, Digitin-NATIVELLE bleibt farblos. Ersteres ist sehr giftig, letzteres wirkungslos.

NATIVELLE liess seiner ersten Digitalisarbeit noch andere folgen und arbeitete ein neues Darstellungsverfahren aus. Nach diesem lässt mit geringfügigen Aenderungen die Gall ihr Digitaline cristallisée darstellen, welches sie neben dem bereits 1866 aufgenommenen amorphen Digitalin seit 1884 führt.

Man hat also zu unterscheiden:

- 1) Digitaline cristallisée (Gall) = Digitaline cristallisée NATIVELLE
- 2) Digitaline (pure) amorphe (Gall) = Digitalin-HOMOLLE (La Digitaline)
- 3) Substance cristallisée inerte = Digitin NATIVELLE

4) Digitalin von HOMOLLE und QUEVENNE, aus dem gewöhnlichen amorphen Digitalin (Gall) von HOMOLLE durch das oben angegebene Trennungsverfahren mit Aetherweingeist und 50procentigem Weingeist isolirt.

Es haben noch Andere (HENRY, KOSMANN, LANCELOT, LEBOURDAIS u s w) über Digitalisbestandtheile und ihre Spaltungsprodukte gearbeitet. Da die beschriebenen Körper aber zunächst jedenfalls nicht rein waren, können diese Arbeiten übergangen werden.

Deutsches Digitalin. Ein von den in Frankreich officinellen chloroformlöslichen Digitalinen völlig verschiedenes wasserlösliches Produkt, ein sogenanntes „Deutsches Digitalin“ stellte WALZ her. Dieser zog das weingeistige Extrakt von Digitaliskraut mit Wasser aus und band die wasserlöslichen Digitalisstoffe an Gerbsäure. Das mit Bleioxyd zerlegte Tannat lieferte ihm das rohe Digitalin, welches er mit Aether behandelte. Dieser nimmt auf Fett und einige andere, von ihm Digitaloin, α und β -Digitalacrin genannte Körper. Ungelöst bleiben Digitalin (WALZ) und Digitalletin. Diese trennt er durch Behandeln mit Wasser, in welchem sein Digitalin löslich, das Digitalletin aber unlöslich ist. Nach WALZ ist Digitalletin ein weisser, krystallinischer, bei 175° C schmelzender Körper, also wahrscheinlich unreines Digitonin, sein Digitalin gelblich gefärbt und amorph.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass fast jede neue Untersuchung neue Körper zu Tage brachte, von denen es zweifelhaft war, ob sie einheitliche Individuen darstellten.

Die Untersuchungen SCHMIEDEBERG's Diese Unsicherheit veranlasste SCHMIEDEBERG zu einer Untersuchung der Digitalis-Bestandtheile. Als Ausgangsmaterial diente ihm vorerst käufliches deutsches Digitalin, welches aus Digitalissamen dargestellt war. Er zog dieses mit Chloroform Alkohol aus und versetzte die erhaltene Lösung mit Aether. Dadurch wurde eine Substanz niedergeschlagen, die er solange reinigte, bis er einen rein weissen, amorph, nicht hygroskopischen Körper in Händen hatte, das Digitonin. Dieses war ein stickstoffreies Glukosid, löslich in Wasser und in Chloroform-Alkohol, schwer löslich in kaltem, etwas besser in heissem Alkohol, unlöslich in Aether, Benzol und Chloroform. Die wässrige Lösung schäumt stark (Aehnlichkeit mit den Saponinen) und wird durch Bleiessig, Ammoniak und Gerbsäure gefällt. Konc Salzsäure löst das Digitonin in der Kalte farblos, beim Kochen entsteht eine granat bis violettrothe Färbung. Die nämliche Färbung entsteht beim Kochen mit massig verdünnter Schwefelsäure. Wässrige Lösungen sind nicht lange haltbar. Durch eine Art Gähung entstehen, genau wie beim Kochen mit sehr verdünnter Mineral-Säure, die Spaltungsprodukte des Digitonins, Digitoresin und Digitonemin, beide amorph, in Wasser unlöslich, davon Digitoresin in Aether löslich, Digitonemin in Aether unlöslich. Ferner entstehen zwei kristallisirte Körper Digitogenin und Paradigitogenin.

Das eigentliche Digitalin-SCHMIEDEBERG ist im käuflichen deutschen Digitalin (Digitalinum purum amorphum Germanicum) nur in geringer Menge enthalten. Zu seiner Darstellung extrahirte SCHMIEDEBERG die wässrige Lösung des deutschen Digitalins mit Aether. Dem Verdunstungsrückstand der ätherischen Lösung entzog er das Digitalin durch Alkohol. Durch Zusatz von Aether zu dieser alkoholischen Lösung schied er Digitonin und Digitalein ab. Von der alkoholisch-ätherischen Lösung destillirte er den Aether ab, versetzte die zurückbleibende alkoholische Lösung mit Wasser und überliess sie der freiwilligen Verdunstung. Das hierbei sich abscheidende Digitalin unterwarf er einer weiteren Reinigung. Das so erhaltene Digitalin SCHMIEDEBERG stellte eine weisse, krumlige, amorphe Masse dar, sogut wie unlöslich in kaltem, etwas besser löslich in heissem Wasser, schwierig in Chloroform und in Aether, leicht in Alkohol und in Chloroform-Alkohol und in warmer, verdünnter Essigsäure.

Von kalter konc Salzsäure wird dieses Digitalin ohne Färbung gelöst, beim Erwärmen entsteht eine gelbe bis gelbgrüne Färbung. Konc Schwefelsäure nimmt es in der Kalte mit gelber bis brauner Färbung auf, die auf Zusatz von etwas Kalumbromid in roth bis violettroth übergeht.

Digitalin-SCHMIEDEBERG ist ein Glukosid von der Formel $n(C_5H_7O_2)$, welches durch verdünnte Säuren gespalten wird in Zucker und Digitoresin.

Als dritten Bestandtheil schied SCHMIEDEBERG aus dem käuflichen deutschen Digitalin das Digitalein ab. Dieses geht bei der Darstellung und Reinigung des SCHMIEDEBERG'schen Digitalins in das dabei verwendete Wasser über. Er reinigte es durch wiederholtes Lösen in Alkohol und fraktionirte Fällung mit Aether und erhielt es so schliesslich nicht als rein weisse Substanz, sondern als gelbgefärbte, bröckelige Masse. Dieses Digitalein, von welchem SCHMIEDEBERG annahm, es sei ein einheitlicher Körper, ist in Wasser vollkommen löslich, leicht löslich in absolutem Alkohol, schwierig in Chloroform. Die wässrigen Lösungen schäumen stark wie die des Digitonins und sind wie diese durch Bleiessig und Ammoniak und Gerbsäure fällbar. Konc Salzsäure löst in der Wärme mit gelber, konc Schwefelsäure mit braunrother Färbung, welche auf Zusatz von Kalumbromid purpurroth wird. Durch Kochen mit verdünnter Mineralsäure wird das Digitalein ebenfalls gespalten, und zwar in Zucker und in einen dem Digitalresin ähnlichen oder gleichen Körper.

Alle bisher erwähnten, von SCHMIEDEBERG isolirten Substanzen entstammten dem Digitalis-Samen.

SCHMIEDEBERG untersuchte nun auch das NATIVELL'sche Präparat, das wie oben bemerkt wurde, aus den Blättern dargestellt wird, und fand darin als Hauptbestandtheil einen von ihm Digitoxin genannten Körper. Diesen stellte er selbst aus den Blättern dar. Er extrahirte die Blätter zuerst mit Wasser, dann mit 50proc Weingeist, reinigte die weingeistigen Auszüge mit Bleiessig, entfernte das überschüssige Blei mit Ammoniak, filtrirte und destillirte von dem klaren Filtrate den Weingeist ab. Aus dem verbleibenden flüssigen Rückstande scheidet sich das Digitoxin mit Fett und anderen Pflanzenstoffen gemengt als Schlamm ab, der mit sehr verdünnter Sodaaflösung, dann mit Wasser gewaschen und getrocknet wird. Die trockne Masse wird mit Chloroform ausgezogen, und der nach Abdestilliren desselben verbleibende Rückstand durch Behandlung mit Aether und Petroläther von anhaftenden Verunreinigungen befreit. — Das so erhaltene Roh-Digitoxin wird durch öfteres Umkrystallisiren aus Alkohol und Behandeln mit Thierkohle gereinigt und bildet dann ein weisses, aus feinen Nadelchen oder Blättchen bestehendes Krystallpulver, welches bei ca 240° C schmilzt. Aus der Elementaranalyse wurde die Formel $C_{41}H_{72}O_{16}$ abgeleitet.

Digitoxin ist in Wasser und Benzin völlig unlöslich, so gut wie unlöslich in Aether, schwer in kaltem, leichter in heissem Alkohol, leicht in Chloroform löslich. Beim Er-

wärmen mit konc Salzsäure entsteht eine gelbgrüne Färbung, die bei Wassereinsatz unter Abscheidung einer harzartigen Masse verschwindet. Conc Schwefelsäure löst mit brauner bis schwarzer Farbe, die durch Kalumbromid nicht verändert wird.

Durch Kochen des Digitoxins mit verdünnter Mineralsäure erhielt SCHMIEDEBERG einen giftigen amorphen Körper, das Toxiresin, welches in Aether, Chloroform und Alkohol leicht löslich, dagegen wenig löslich in Benzol und in Wasser ist. Zucker vermochte er als Spaltungsprodukt nicht nachzuweisen. Er nahm daher an, dass das Digitoxin kein Glukosid sei.

Die Untersuchung der französischen Digitaline, d. h. des 1) Digitalins cristallisé NATIVELLE (Gall.), 2) des Digitalins amorphe (Gall.) HOMOLLE, wie sie damals zu Anfang der 70er Jahre im Handel waren, ergab, dass das NATIVELLE'sche krystallisierte Digitalin (sub 1) der Hauptsache nach aus Digitoxin bestand, neben Paradigitonin, Toxiresin, vielleicht auch Digitalose und geringen Mengen Verunreinigungen, dagegen das HOMOLLE'sche amorphe Digitalin (sub 2) aus Digitalin SCHMIEDEBERG, Paradigitonin, Digitalresin und Digitonin.

Von den SCHMIEDEBERG'schen Präparaten kamen für den Arzneischatz nur drei in Betracht: Digitalin, Digitalin und Digitoxin. Digitalin wirkt wohl örtlich äusserst reizend und entzündend, ist aber auf den Gesamtorganismus ohne Wirkung. Die Spaltungsprodukte der Digitaliskörper sind auch nur zum Theil therapeutisch wirksam, zudem sehr theure Präparate, welche damals nicht einmal mit Sicherheit rein und daher gleichmässig erhalten werden konnten. Selbst das aussichtreichste Präparat, das Digitoxin, erschien SCHMIEDEBERG von geringer Bedeutung, zunächst wegen seiner Unlöslichkeit in Wasser, sodann wegen seiner hohen Giftigkeit und der daraus folgenden schwierigen Dosirung. Der Verwendung des weniger giftigen Digitalins und Digitalins, von denen ersteres theilweise, letzteres völlig wasserlöslich ist, war die umständliche und langwierige Reindarstellung im Wege.

So kam es, dass sich längere Zeit nach SCHMIEDEBERG Niemand mit dem Studium der Digitalis beschäftigte. Einen wie grossen Fortschritt auf diesem Gebiete die SCHMIEDEBERG'sche Arbeit auch bedeutet, so liess sie doch manches unaufgeklärt und unvollendet. Ein Theil der neu aufgefundenen Körper wurde nur ihrem Aeusseren, ihren Löslichkeitsverhältnissen und Farbenreaktionen nach beschrieben. Ihre Einheitlichkeit wurde wohl angenommen, jedoch experimentell durch unzweideutige Analysen und Angabe genauer chemischer und physikalischer Konstanten nicht erwiesen. Diese Thatsachen und die immer von neuem erprobte, ausgezeichnete Wirkung eines Infusum Digitalis war der Grund, dass die Digitalisforschung nicht zum Stillstand kam.

Die Arbeiten KILIANI's. Ende der achtziger Jahre nahm sie KILIANI wieder auf, mit der Absicht, die für die Medicin brauchbaren Körper rein und zugleich billig darzustellen. Das erste Hauptergebniss seiner Arbeiten ist der Nachweis, dass das Digitalin SCHMIEDEBERG, obwohl amorph, eine einheitliche, reine Substanz ist, deren früher aufgestellte Molekularformel $x(C_5H_8O_2)$ er bestätigte. KILIANI giebt folgende einfache Darstellungsweise an: 1 Th Digitalin pur pulv Germanic wird in 4 Th Alkohol von 95 Proc gelöst, mit 5 Th Aether (sp. Gew. = 0,720) versetzt und 24 Stunden verschlossen stehen gelassen. Von einer Probe der mittlerweile klar gewordenen Flüssigkeit bestimmt man den Trockenrückstand, zieht darauf im Vacuum die alkoholisch ätherische Lösung bis auf 1,6 Th ihres Trockenrückstandes ab und fügt 2,4 Th Wasser hinzu. Auf diese Weise erhält man eine ca 20 proc spirituose Lösung, aus der sich binnen Tagesfrist das Rohdigitalin abscheidet. Dieses wird mit 10 proc Alkohol, dann mit Wasser abgewaschen, bei niedriger Temperatur getrocknet und zuletzt durch Lösen in Alkohol und Behandlung mit Thierkohle völlig gereinigt. In reinem Zustande stellt dieses Digitalin ein weisses, amorphes Pulver dar, löslich in 1000 Th Wasser und 100 Th 50 Proc Weingeist von gewöhnlicher Temperatur, leicht in heissem starken Alkohol, so gut wie unlöslich in Aether und Chloroform. In konc Salz- und Schwefelsäure löst es sich mit gelber Farbe, die bei letzterer Säure rasch in Roth umschlägt, englische Schwefelsäure liefert ein intensives Blauroth. Auf über 200° C erhitzt, beginnt das Digitalin zu sintern und schmilzt bei ca 217° C. Diesem Präparat, das sich von dem SCHMIEDEBERG'schen nicht unterscheidet, gab die Firma BOEHRINGER in Waldhof den Namen „Digitalinum verum“.

Durch Erhitzen von 1 Th Digitalin ver mit 8 Th 50 Proc Weingeist und 2 Th Salzsäure 1,19 spaltete KILIANI dasselbe glatt in Digitalin, Digitalose und Traubenzucker. Digitalin krystallisiert in weissen Nadeln mit dem Schmelzpunkt 210—212° C. Es ist leicht löslich in Alkohol, schwer in Aether, unlöslich in Wasser, mit Schwefelsäure giebt es die gleichen Reaktionen wie Digitalin. Digitalin ist auf den thierischen Körper unwirksam.

KILIANI stellte im Verlauf seiner Arbeiten fest, dass das SCHMIEDEBERG'sche Digitonin und Digitalin keine einheitlichen Körper waren. Das Digitonin schied er in krystallinierter Form ab, durch Lösen von 1 Th Digitalin pur pulv Germanic in 4 Th Alkohol von 85 Proc. Aus dieser Lösung krystallisiert das Digitonin leicht aus und kann daher bequem

gereinigt werden. Er fand als Molekularformel seines bei 110°C getrockneten, krystallisierten Präparates $\text{C}_{40}\text{H}_{64}\text{O}_{14}$, neuerdings $\text{C}_{40}\text{H}_{64}\text{O}_{16}$. In Wasser ist es schwer löslich (SCHMIEDEBERG in jedem Verhältnisse), leicht dagegen in 50 proc Weingeist. Kalte, concentrirte Salzsäure löst Digitonin farblos, Kochen mit der verdünnten Säure spaltet es in Dextrose, Galactose und Digitogenin. Dieses liefert, mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat erhitzt, ein bei 178°C schmelzendes Acetylderivat, mit Chromsäure oxydirt die Digitogensäure $\text{C}_{26}\text{H}_{44}\text{O}_8$, Schmp $146-150^{\circ}\text{C}$, die mit Kaliumpermanganat weiter oxydirt die Oxydigitogensäure $\text{C}_{26}\text{H}_{42}\text{O}_9$, Schmp ca 250°C und die sehr beständige Digitsäure, wahrscheinlich $\text{C}_{26}\text{H}_{42}\text{O}_{10}$, Schmp 192°C giebt. Aus der Digitogensäure entstehen beim Kochen mit Kalilauge noch zwei andere Säuren, in der Hauptsache Digtosäure $\text{C}_{26}\text{H}_{42}\text{O}_{10}$, daneben noch Hydrodigitosäure $\text{C}_{26}\text{H}_{44}\text{O}_{11}$, bei der Reduktion mit Natriumamalgam entsteht die Desoxydigitogensäure $\text{C}_{26}\text{H}_{42}\text{O}_7$. Alle diese Säuren, mit Ausnahme der Desoxydigitogensäure, liefern gut krystallisirte Salze, was für ihre Reinigung und Bestimmung sehr wesentlich ist.

Mit dem Studium des Digitalins ist KILLIANI zur Zeit noch beschäftigt (Archiv d Pharm Bd 237, Heft 6 pag 453), ein abschliessendes Urtheil über sein Digitalin (wasser, amorph, sehr leicht löslich in Wasser, in Alkohol in einem Gemisch von 3 Th. Aceton mit 1 Th. Wasser, fast unlöslich in Aether, Benzol, Aceton und Chloroform) ist daher noch nicht möglich.

KILLIANI vermuthet, dass ausser Digitalin verum, Digitonin und Digitalin noch andere Körper (Glukoside) im Digitalin pur pulv German, d. h. im Samen Digitalis enthalten sind, bis jetzt vermochte er sie aber nicht abzuscheiden. Auch das Digitoxin fand er nicht darin vor, dessen Studium er sich später widmete, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das Digitalin verum, auf das man ärztlicherseits grosse Hoffnungen gesetzt hatte, dieselben nicht erfüllte. Er untersuchte Handelswaare (Digitoxin kryt MEACK), SCHMIEDEBERG'sches und Digitoxin eigner Darstellung mit dem Endergebniss, dass alle drei identisch waren. Die von ihm anfänglich für Digitoxin angenommene Molekularformel $\text{C}_{41}\text{H}_{66}\text{O}_{16}$ ist die gleiche, die ARNAUD für das Digitalin crystallisae angiebt.

Später änderte er sie jedoch auf Grund der Untersuchungen von Spaltungsprodukten ab in $\text{C}_{41}\text{H}_{64}\text{O}_{11}$. Weiter stellte er fest, dass das Digitoxin ein Glukosid ist, in verdünnter weingeistiger salzsaurer Lösung spaltet es sich in 1 Molekul Digitoxigenin, $\text{C}_{27}\text{H}_{44}\text{O}_8$, Schmp $225-230^{\circ}\text{C}$ und 2 Molekule Digitoxose, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_5$, Schmp 101°C . Aus dem Digitoxigenin entsteht durch Wasserabspaltung das Anhydrodigitoxigenin, eine schön krystallisirende, bei $215-220^{\circ}\text{C}$ schmelzende Substanz. Wird diese in Eisessiglösung durch Chromsäure oxydirt, so bildet sich ein in Nadeln krystallisirendes, ketonartiges Produkt das Toxigenon. Ein anderer Abkömmling des Digitoxigenin ist die Digtogeninsäure, in Nadeln vom Schmelzpunkt $220-230^{\circ}\text{C}$ krystallisirend, sie wird erhalten durch Behandeln von Digitoxigenin mit verdünnter alkoholischer Natronlauge.

KILLIANI glaubt in den Digitalisblättern neben dem Digitoxin noch einen diesem ähnlichen, ebenfalls krystallisirenden Körper gefunden zu haben, das Digitophyllin, $\text{C}_{38}\text{H}_{62}\text{O}_{10}$, Schmp $230-232^{\circ}\text{C}$. Digitalin, Digitonin und Digitalin, die Samenglukoside, vermochte er dagegen darin nicht nachzuweisen. Mit dieser letzteren Angabe befindet er sich in Widerspruch mit KELLER, der sich in letzterer Zeit gleichfalls mit den Digitalisblättern beschäftigte und ein Verfahren zur Werthbestimmung derselben ausgearbeitet hat, gegründet auf der Bestimmung ihres Gehaltes an Rohdigitoxin. Gepulverte Blätter (20 Th) werden mit 70 Proc Weingeist völlig erschöpft, die Auszüge eingedampft (auf 25 Th), mit Wasser versetzt (bis 222 Th Gesamtgewicht), mit Bleiessig (25 Th) gefällt und filtrirt. 130 Th des klaren Filtrates werden mit 5 Th Natriumsulfat, gelöst in 7 Th Wasser, entbleit und 130 Th der bleifreien Lösung entsprechend 10 Th Fol Digitalis, nach Zusatz von 2 cem Ammoniak 4-5mal mit je 30 cem Chloroform ausgeschüttelt. Die Chloroformauszüge werden filtrirt, das Chloroform abgezogen, das zurückbleibende Rohdigitoxin in 3 cem Chloroform gelöst und diese Lösung zur Trennung von Fett, Oel und Riechstoffen mit 7 gr Aether und 50 g Petroläther versetzt. Dabei schlägt sich das Digitoxin in weissen Flocken nieder und wird nach dem Trocknen gewogen. Dieses Digitoxin ist in kalter Salzsäure 1,19 mit gelber Farbe löslich, die beim Erwärmen grünlich bis grünlich braun wird. Wasserzusatz bewirkt eine gelbgrüne Färbung und Abscheidung eines Niederschlages. Mit concentrirter Schwefelsäure färbt es sich braun bis braunschwarz, in eisenchloridhaltigem Eisessig gelöst und mit concentrirter Schwefelsäure unterschichtet, entsteht auf der obersten Schicht der Schwefelsäure eine braunrothe Färbung und der Eisessig färbt sich intensiv indigoblau. Das so gewonnene KELLER'sche Digitoxin ist noch durchaus kein reines Material und muss, um in die krystalline, schmelzpunkt-reine Form zu kommen, erst von den schwierig abzutrennenden Beimengungen befreit werden. Aus diesem Grunde hat das angeführte Verfahren nur einen bedingten Werth. KELLER giebt als Digitoxingehalt von untersuchten Blättern 0,26-0,82 Proc, als Durchschnitt 0,2-0,3 Proc an. Diese Zahlen bedeuten aber nicht reines, krystallisiertes Digitoxin, sondern KELLER'sches Rohdigitoxin. Digitoxin cryst kommt in weit geringerer Menge vor. NATIVELLE fand in den Digitalis-

blättern 0,10—0,12 Proc Digitalin crystallisee, von dem SCHMIEDBERG nachwies, dass es ausser Digitoxin noch andere Beimengungen enthält. SCHMIEDBERG giebt auf Grund eigener Erfahrung als Gehalt 0,0100—0,0125 Proc an, er beträgt bei Verarbeitung grösserer Mengen Blätter ca 0,02 Proc.

Gegenwärtigen Stand der Digitalisfrage. Nach unserer heutigen Kenntniss der Digitaliskörper enthalten sowohl die Samen als auch die Blätter ein Gemenge von krystallisirten und amorphen Körpern. Im Samen sind genau nachgewiesen und als einheitlich charakterisirt worden Digitonin als krystallisirter und Digitalin verum, sowie Digitalein „Kilian“ als amorphe Substanzen. Diese zusammen machen nach KILIAN etwa 50 bis 60 Proc des deutschen Digitalins aus. Der Rest ist ein Gemenge noch unbekannter, amorpher Glukoside. In den Blättern ist als krystallisirter Körper sicher nachgewiesen das Digitoxin, die Existenz eines zweiten, des Digitophyllin, ist wahrscheinlich. Wie aus dem Samen, kann man auch aus den Blättern auf ähnliche, allerdings nicht so einfache Weise ein dem Digitalin pur pulv Germanic ähnliches Material darstellen. Es sind in denselben deshalb auch die sogenannten Samenglukoside, wenn auch vielleicht in anderen Mengenverhältnissen, vorhanden.

Von den Digitalisstoffen haben grossere Bedeutung erlangt, d. h. werden in grosseren Mengen medicinisch angewandt Digitalin pur pulv Germanic, Digitoxin, Digitaline cristallisée und Digitalin pur amorph Pharm. Gallica und Belgica = Digitaline chloroformique. Digitalinum verum ist zwar zweifellos eine einheitliche, wirksame Substanz, vermag aber das Infusum Digitalis nicht zu ersetzen. Digitoninum crystallisatum ist werthlos, weil es überhaupt keine Herzwirkung besitzt. Für das reine Digitalein fehlt es bis jetzt an einer praktisch brauchbaren Darstellungsmethode. Digitalin pur pulv Germanic, aus den Samen von Digitalis purpurea gewonnen, besteht zu 50—60 Proc aus Digitonin cryst, zu 5—6 Proc aus Digitalin verum, der Rest aus Digitalein und noch nicht näher untersuchten Glukosiden. Digitoxin ist das aus den Blättern gewonnene Glukosid, vielleicht identisch mit Digitaline cristallisée, wie es heute von den Franzosen geliefert wird. Von diesen ist mehrfach die Berechtigung des Namens Digitoxin bestritten worden, weil Digitoxin nichts anderes sei als Digitaline cristallisée. In Wirklichkeit ist die Sachlage diese. Der Name Digitaline cristallisée ist älter als der Name Digitoxin. Digitaline cristallisée ist nicht zu allen Zeiten dasselbe Präparat gewesen, heute ist es ein anderes als vor ca 30 Jahren. Als damals SCHMIEDBERG das von NATIVELLE eingeführte und als „Digitaline cristallisée“ bezeichnete Präparat untersuchte, war es ein Gemenge mehrerer Substanzen. Die wirksamste und in grösster Menge darin vorkommende isolirte er, wie bereits erwähnt, und erkannte ihre Gleichartigkeit mit seinem Digitoxin. Seit dieser Zeit haben die Franzosen ihr Darstellungsverfahren verbessert, und das heute fabrikmässig hergestellte französische Präparat zeigt nach den Angaben verschiedener Forscher keine wesentlichen Unterschiede gegenüber Digitoxin.

Digitalin pur amorph Pharm. Gallica und Belgica = Digitaline chloroformique ist dem Digitoxin in der Wirkung ähnlich, ebenfalls aus Blättern gewonnen, chloroformlöslich und amorph. Nach der französischen Pharmakopoe ist es in seiner Wirkung dreimal schwächer als das krystallisirte Präparat und stets zu verabreichen, wenn auf einem Recept das Digitalin nicht specialisirt ist.

Digitonin cryst. Dieses Präparat wurde zuerst von МЯКОК aus dem Digitalissamen dargestellt und hatte zum Unterschied von dem amorphen Digitalin pur pulv Germanic die nahegelegende Bezeichnung Digitalinum crystallisatum erhalten, weil es mit keinem der bis dahin bekannten Digitaliskörper eine Aehnlichkeit hatte. Erst viel später hat KILIAN nachgewiesen, dass es identisch mit dem von ihm hergestellten Digitonin cryst ist.

Digitalein, das zur Zeit in den Listen pharmaceutischer Präparate geführt wird, ist der nach den Angaben SCHMIEDBERG's hergestellte Körper, also ein Gemenge

†† Digitalin pur pulv Germanic. Deutsches, amorphes Digitalin. Digitalis samen (oder -Blätter) werden mit Weingeist extrahirt, der Weingeist wird abgezogen, das zurückgebliebene Extrakt mit Wasser verdünnt und durch Bleiacetat gereinigt. Aus der

vom Bleischlamm getrennten Flüssigkeit wird mit Natr phosphoric das überschüssige Blei abgeschieden. In der so gereinigten Lösung werden die Digitaliskörper mit Gerbsäure gefällt, die Tannate mit Wasser gut gewaschen und darauf mit Blei oder Zinkoxyd zerlegt. Das hierbei abgeschiedene Digitalin wird in Weingeist aufgenommen, durch vorsichtige Destillation von letzterem befreit und dann so lange mit Aether gewaschen, bis derselbe nichts mehr aufnimmt. Dann wird das auf diese Weise gereinigte Digitalin bei niedriger Temperatur getrocknet und schliesslich gepulvert.

Digitalin pur pulv Germanic ist ein gelblich weisses, amorphes Pulver, löslich in Wasser und Weingeist, unlöslich in Aether und Chloroform. Färbereaktionen haben bei dem deutschen Digitalin, das, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, kein einheitlicher, sondern ein Gemenge verschiedener Körper ist, wenig Werth.

Das Digitalin Germanic ist ein Diureticum und Herztonicum. Infolge seiner Wasserlöslichkeit hat es den Vorzug, nicht kumulativ zu wirken. Es wird entweder in Substanz oder wässriger Lösung (bei subkutanen Injektionen) gebraucht. Die Dosis beträgt 0,001 bis 0,002 g 2—3 mal täglich. Maximaldosis ist *pro dosi* 0,004 g, *pro die* 0,020 g.

Als Gegenmittel kommen zunächst in Betracht Brechmittel, Magenpumpe, Magenausspülungen und Gerbsäure, dann Morphin, Nitroglycerin und alkoholische Stimulantien.

Das Präparat ist vor Licht geschützt und in mit Glasstopfen versehenen Flaschen sehr vorsichtig aufzubewahren.

Es ist höchst wichtig, bei dem Digitalin pur pulv, welches ein Gemisch von ausserst wirksamen und wirkungslosen Digitaliskörpern ist, darauf hinzuweisen, dass nur dann auf eine stets gleichmässige und gefahrlose Wirkung gerechnet werden kann, wenn bei der Darstellung ein und dasselbe Verfahren namentlich genau eingehalten wird. Darauf ist bei Kauf des Mittels Rücksicht zu nehmen. Man sollte immer aus derselben Quelle beziehen, die für eine gleichmässige Beschaffenheit auch wirklich garantiren kann.

†† **Digitoxinum** (Ergänzb.) Digitalisblätter werden zur Beseitigung störender Extraktivstoffe mit kaltem Wasser gut extrahirt, scharf abgepresst und dann mit Weingeist von 50—60 Proc so lange ausgezogen, als die Blätter noch Bitterstoff abgeben. Die vereinigten, weingeistigen Auszüge werden mit Bleiessig gereinigt, überschüssiges Blei wird durch Ammoniak beseitigt, der Bleiniederschlag abfiltrirt und etliche Male mit 60 Proc Weingeist nachgewaschen. Das Filtrat, das neutrale Reaction zeigen muss, wird im Vakuum völlig vom Weingeist befreit. Aus der dadurch erhaltenen wässrigen Digitalislösung, die man noch etwas einengen kann, scheidet sich beim Stehen das in Wasser unlösliche Digitoxin neben Harz, Fett etc ab. Die wässrige Lösung wird vorsichtig abgegossen, und der feste Rückstand bei niedriger Temperatur getrocknet. Diesem entzieht man das Digitoxin mit Chloroform und erhält nach Abdestilliren desselben das Rohdigitoxin in Form einer stark gefärbten Masse, welche nach dem Waschen mit Aether durch Umkrystallisiren aus 80 Proc Weingeist unter Behandlung mit Thierkohle gereinigt wird.

Digitoxin, $C_{41}H_{64}O_{11}$, stellt ein weisses, geruchloses, bitterschmeckendes Krystallpulver dar, bestehend aus feinen Nadelchen oder Blättchen, im krystallwasserfreien Zustand bei 238—240° C, im krystallwasserhaltigen bei ca 145° C schmelzend. Digitoxin ist unlöslich in Wasser, so gut wie unlöslich in Aether, schwer in kaltem, leicht in heissem Weingeist und leicht in Chloroform löslich. Es fällt mit Gerbsäure, aber nicht mit Bleisalzen. Konc Salzsäure von 1,19 spec Gew löst Digitoxin mit tiefgrüner Farbe. Ergänzb. Löst man 0,001 g Digitoxin in 5 ccm Eisessig, fügt einen Tropfen einer (1:20) verdünnten Ferrichloridlösung hinzu und schichtet diese Lösung auf das gleiche Volumen konc Schwefelsäure, so bildet sich an der Berührungsstelle der beiden Flüssigkeiten ein breites, anfangs braunlich grünes, bald dunkelblau werdendes Band, welches gegen die Schwefelsäureschicht nur einen schmalen, rothbraunen Saum zeigt, während die Essigsäureschicht sich allmählich grün färbt. (KELLER'sche Farbenreaction, von KILIANI wie folgt gefasst: Reine Schwefelsäure 1,84 versetzt mit 1 Proc von einer wässrigen 5 proc Lösung von Ferrum sulfuric oxydat pur löst das Glukosid mit schmutzig braunrother Farbe

Digitoxin in Essessig gelöst, der ebenfalls mit 1 Proc obiger Ferrisulfatlösung versetzt und der erwähnten Schwefelsäure übererschichtet ist, färbt denselben beim Stehen tief indigoblau, an der Grenze beider Flüssigkeiten bildet sich eine dunkle Zone, während die Schwefelsäure fast farblos bleibt)

Digitoxin findet bei Herzkrankheiten (Herzklappenfehler, Myocarditiden, Hydrops) als ausgezeichnetes Herztonicum immer mehr Anwendung. Es wirkt diuretisch und bei Cyphus und Pneumonie günstig auf Puls und Temperatur. Von seiner Verordnung muss bei schwerer Degeneration des Herzfleisches und bei starken Magenstörungen abgesehen werden. Die Einzeldosis beträgt 0,00025 g, die Tagesdosis 0,002 g im Maximum. Die Gesamtmenge des während einer Krankheit verabreichten Digitoxins soll 0,005 g durch Subkutaninjektion und 0,007 g per rectum eingeführt, nicht überschreiten. Als Gegenmittel sind die bei Digitalin pur pulv Germ angegebenen anzuwenden.

Bei der Verordnung des Mittels ist besonders darauf zu achten, dass es in einer Form gelöst in den Körper eingeführt wird, die ein Wiederausfallen desselben verhindert. (Darauf, dass man diesen wichtigen Umstand, auf den zuerst belgische Aerzte aufmerksam gemacht haben, nicht berücksichtigte, durften vielfach die widersprechenden Angaben beruhen, die früher über die Wirksamkeit des Digitoxins gemacht worden sind.)

Eine Digitoxinlösung, die weder mit Wasser, noch mit physiologischer Kochsalzlösung, noch mit Serum Fällungen giebt, wird folgendermassen hergestellt:

Rp Digitoxini cryst. Merck 0,003
Chloroformil
Spiritus (90%) aa q s ad solut (1,0)
Aque destillatæ ad 200,0
D S Alle 6—8 Stunden den 6 Teil zu nehmen
Eine andre bewährte Verordnungsweise ist folgende
Rp Digitoxini cryst. Merck 0,1
Spiritus (90%) 205,0
Aque dest 740,0
Sacchari cryst 55,0
Von dieser Lösung werden 15 gr (10 gr enthalten 0,001 gr Digitoxin) mit 25 gr Sirup vermischt und diese Mixture auf dreimal in Zwischenräumen von 4 zu 4 Stunden binnen Tagesfrist verabreicht. Die Einzeldosis beträgt somit 0,0005 gr. Zur Behandlung per rectum wird folgende Formel empfohlen

Rp Digitoxini cryst. Merck 0,01
Spiritus (90%) 10,0
Aque destill. q s ad 200,0
Von dieser Lösung werden nach einem vorher applicirten Reinigungsklystier zuerst dreimal täglich, später zweimal und zuletzt einmal je 10 gr auf ein 100 gr Wasser enthaltendes, lauwarmes Klystier gegeben.

Zur Verhinderung von Phlegmonen und, um die Lirdegewebereizung auf das geringste Mass herabzusetzen, wurde folgende Lösung für Subkutaninjektion verwendet

Rp Digitoxini cryst. Merck 0,01
Alcohol absol 5,00
Aque 15,00

D S $\frac{1}{2}$ —1 Pravazspitze zu injiciren

In neuerer Zeit ist das Digitoxin zur bequemen Dosirung in Tablettenform verordnet und in den Handel gebracht worden. 1 Tablette = 0,00025 g Digitoxin. Die mittlere Dosis für 1 Klystma sind 2 Tabletten, für innerlichen Gebrauch 1 Tablette 3—4 mal täglich. Die Tabletten sind in 100 ccm lauwarmen Wassers + 15 Tropfen Alkohol absolutus vollkommen löslich.

†† Digitaline cristallisee (Gall) Die Gall giebt folgende Darstellungsart an. Digitalisblätter 1000 Th werden mit 1000 Th Wasser, in dem 250 Th Bleiszucker gelöst sind, angefeuchtet und nach eintägigem Stehen mit Weingeist von 60 Proc extrahirt. Die Auszüge werden mit Natriumbikarbonat neutralisirt, eingeeengt bis auf 2 Liter und darauf mit Wasser versetzt. Der dadurch entstandene Niederschlag wird in Weingeist gelöst und die weingeistige Lösung mit Bleiszucker, dann mit Kohle gereinigt. Auf der Kohle (50 g) schlägt sich beim Abseihen des Weingeistes das Rohdigitoxin nieder. Sie wird mit Wasser ausgewaschen und bei einer Temperatur, die 100° C nicht übersteigt, getrocknet, worauf man ihr das Digitalin mit Chloroform entzieht. Nach dem Abdestilliren desselben wird der Rückstand in 90 proc Alkohol gelöst und einer nochmaligen Reinigung mit Bleiszucker und Thierkohle unterworfen. Das soweit gereinigte Digitalin wird in (ca 10 ccm) 10 proc Alkohol gelöst, die Hälfte Aether und so viel Wasser, als man Alkohol + Aether angewandt hat, hinzugefügt und die Mischung durchgeschüttelt. Beim Stehen trennt sie sich in zwei Theile, aus der unteren farblosen krystallisirt das Digitalin aus und wird nach vorheriger Behandlung mit Thierkohle in alkoholischer Lösung auf die eben angegebene Weise nochmals gereinigt.

Es bildet leichte, weisse Krystalle, die in Form kurzer, dünner Nadelchen um eine gemeinsame Axe gruppiert sind, ist sehr bitter, kaum in Wasser, leicht in 90 proc Alkohol, kaum in absolut Alkohol, fast nicht in Aether, leicht in Chloroform löslich. Es löst sich ferner in konc Salz- und Phosphorsäure, nach kurzer Zeit nimmt die Lösung eine smaragdgrüne Farbe an. Nach ARNAUD besitzt das Digitalin cristallisé die Formel $C_{41}H_{60}O_{10}$ und den Schmelzpunkt $243-245^{\circ}C$ (Wir fanden jedoch den Schmelzpunkt französischer Handelswaare etwas niedriger liegend, mit dem des Digitoxin cryst $238-240^{\circ}C$ übereinstimmend.) Die Beziehungen zwischen Digitaline cristallisé und Digitoxin sind bereits erwähnt. Was bei letzterem in medicinischer Hinsicht (Verordnungsweise, Gegengifte) gesagt wurde, gilt auch für das französische Präparat.

Poudre de Digitaline cristallisé au centième. Pulvis Digitalini cristallisati dilutus (Gall.) Rp Digitalini cristallisi Gallici 1,0 g, Sacchari Lactis 96,5 g, Carami 2,5 g

†† Digitaline (pure) amorphe Pharm Gallica und Belgica = Digitaline chloroformique

Die französische Pharmakopoe giebt folgende Vorschrift zur Darstellung an: 100 Th gepulverte Digitalisblätter werden mit 1 Liter Wasser befeuchtet und im Perkolator langsam so lange ausgezogen, bis das Perkolat 3 Liter beträgt. Dieses wird mit 250 Th Bleiessig gefällt und das vom Blei getrennte Filtrat zur Entfernung überschüssigen Bleies mit 40 Th kryst Soda und 20 Th phosphorsaur Natrium-Ammonium versetzt. Vom Bleischlamm wird abfiltrirt, das Filtrat mit 40 Th officinellem Tannin gefällt, das Tannat mit 25 Th gepulverter Bleiglatte und 50 Th gereinigter Thierkohle vernichtet und eingetrocknet. Der eingetrockneten Masse wird der Digitaliskörper mit 90 proc Alkohol entzogen, letzterer abdestillirt, der Rückstand mit destill Wasser ausgewaschen und darauf wieder in 90 proc Alkohol aufgenommen. Dieser wird nochmals abdestillirt und der Rückstand nun mit Chloroform erschöpft. Beim Abtreiben des letzteren bleibt das Digitalin zurück.

Es ist ein gelblich-weisses, amorphes Pulver von eigenartigem aromatischen Geruch und von bitterem Geschmack, es ist neutral gegen Lackmus, fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Chloroform, unlöslich in Aether, erweicht bei $90^{\circ}C$ und beginnt bei $100^{\circ}C$ zu schmelzen. Durch Lösungen von Bleisalzen wird es nicht niedergeschlagen, mit Gerbsäure bildet es ein in Wasser unlösliches Tannat und färbt sich mit konc Salzsäure smaragdgrün. Das amorphe Digitalin ist immer abzugeben, wenn nicht ausdrücklich krystallisiertes verlangt wird (— nach der französischen Pharmakopoe —). Die Angaben über seine Giftigkeit lauten verschieden, was seinen Grund darin haben mag, dass es ein Gemenge von amorphen, digitoxinähnlichen aber nicht gleichwerthigen Körpern ist, und soll ungefähr $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ desjenigen des Digitaline cristallisé betragen. Als Dosis wird angegeben 0,00025 g, schnell steigend bis 0,0015 g *pro die*, Maximaldosis *pro die* 0,002 g. Gegenmittel wie bei dem deutschen Digitalin. Digitoxin, Digitaline cristallisé und Digitaline pur amorph Pharm Gallica und Belgica sind ausserst heftige Gifte. Man bewahrt sie sehr vorsichtig vor Licht geschützt auf.

Granules de Digitaline (Gall.) Rp Digitalini amorphi gallici 0,1 g, Sacchari Lactis 4,0 g, Gummi arabici 1,0 g, Mellis depurati q s. Fiat granulae 100. Jedes Körnchen enthält 0,001 g amorphes Digitalin.

†† **Digitaleinum** Das Handelsprodukt ist nach dem Verfahren SCHREIBENNE's dargestellt, also nicht das KILIAN'sche. Ein bitter schmeckendes, amorphes, gelblichweisses Pulver, leicht löslich in Wasser und absolut Alkohol, fast unlöslich in Chloroform, unlöslich in Aether. Die wässrigen Lösungen schäumen stark und werden durch Bleiessig und Ammoniak und Gerbsäure gefällt. Bei diesem Körper, der, wie oben angegeben, nicht einheitlich ist, kann auf Farbenreaktionen kein grosses Gewicht gelegt werden.

Das Digitalein wird wie das Digitalin pur pulv Germanic als Herztonicum und Diureticum gebraucht. Dosis 0,001—0,002 g täglich zwei- bis dreimal. Aufbewahrung und Gegenmittel wie beim deutschen Digitalin.

†† **Digitalinum verum** KILIANI's Digitalin. Die Darstellung ist in der historischen Uebersicht der Digitalisstoffe schon angegeben worden. Es ist ein weisses, amorphes Pulver, von schwach bitterem Geschmack, so gut wie unlöslich in Chloroform und Aether, sehr schwer in Wasser, leichter in 50proc Weingeist, leicht in heissem absoluten Alkohol und in Chloroform-Alkohol löslich. Konc Salz- und Schwefelsäure (reine) lösen das Digitalin verum mit gelber Farbe, die schwefelsaure Lösung färbt sich bald roth, diese Farbe wird durch Zusatz eines Tropfens Brom noch intensiver. Engl Schwefelsäure giebt sofort eine blauröthliche Färbung. Die unter Digitoxin angeführte eisenhaltige Schwefelsäure zeigt diese blauröthliche oder violettrothe Farbe in besonders schöner und beständiger Weise. Eisenhaltiger Eisessig giebt keine Farbenreaktion!

Die Zusammensetzung des Digitalin verum wird ausgedrückt durch die Molekularformel $x(C_{40}H_{56}O_{14})$, wozu x höchstwahrscheinlich $= 7$ ist, also $C_{280}H_{392}O_{98}$. Es schmilzt bei ca $217^{\circ}C$, nachdem es schon vorher gesintert ist. Ausser den angeführten Eigenschaften, die ein der Untersuchung unterworfenen Digitalin verum zeigen muss, hat es noch folgende von KILIANI angegebene Proben auszuhalten:

1. Einige Körnchen des Digitalins mit ca 2 ccm Kalilauge 1:10 übergossen, müssen mindestens 1 Minute lang weiss bleiben. (Sofortiges Auftreten intensiver Gelbfärbung zeigt Beimengungen an.)

2. Rührt man Digitalin ver mit Wasser zu einem dünnen Brei an, setzt unter Umschütteln auf je 100 Theile des verwendeten Wassers 22 Th Amylalkohol hinzu und lässt im verschlossenen Kolbchen stehen, so bilden sich innerhalb 24 Stunden deutlich Krystallwäzchen, falls Digitonin auch nur in höchst geringer Quantität vorhanden ist.

Dosis 0,00025 g, 2—3 stündlich zu geben. Gegenmittel wie bei dem deutschen Digitalin. Aufbewahrung in Flaschen mit Glasstopfen, sehr vorsichtig.

†† **Digitoninum cryst** (= **Digitalinum crystallinum** MENCK) Weisses, körnig krystallinisches Pulver, sehr schwer löslich in Wasser (Lösung opalescirt), schwer in kaltem, leichter in heissem Alkohol, leicht in 50proc Weingeist, in Amylalkohol und Chloroformalkohol, kaum löslich in Chloroform, unlöslich in Aether, Petroläther und Benzol. Es wird von kalter Salz- und Salpetersäure farblos aufgenommen, auch eisenhaltige Schwefelsäure und eisenhaltiger Eisessig geben bei Anwendung von sehr wenig Substanz keine gefärbte Lösung. Das Digitonin cryst findet keine medicinische Anwendung, da schon die spezifische Digitaliswirkung mangelt.

†† **Digitalinum depuratum** Früher nach der österreichischen Pharmacopoe officinell, wird nach deren Vorschrift unter Anwendung von Chloroform aus dem deutschen Digitalin dargestellt.

Digitalis.

Gattung der Scrophulariaceae — Rhinanthoideae — Digitaleneae.

1 **Digitalis purpurea** L. Heimisch in Westeuropa bis Südsandinavien, häufiger in Bergwäldern, seltener in der Ebene, oft kultiviert, aber mehr als Zierpflanze als zum arzneilichen Gebrauch. Die zweijährige Pflanze treibt im ersten Jahre eine grosse Rosette von bodenständigen Blättern. Im zweiten Jahre entwickelt sich der bis 2 m hohe, einfache Stengel mit alternirenden Stengelblättern und grosser einseitwendiger Traube. Der fünftheilige Kelch umschliesst eine bauchig glockige Korolle mit fast zweilappigem Saum. Staubblätter didynamisch, der Kronröhre angedrückt und die Staubbeutel einander paarweise genähert. Der ebenfalls angedrückte Griffel mit zwei Narben. Frucht eine wandspaltig zweiflügelig aufspringende Kapsel mit zahlreichen kleinen Samen. Verwendung finden die Blätter der wildwachsenden Pflanze.

† *Folia Digitalis* (Germ. Helv. Austr.). *Digitalis folia* (Brit.). *Digitalis* (U-St.). *Herba Digitalis*. — Fingerhutblätter. — *Feuille de digitale* (Gall.). — *Digitalis leaves*. Foxglove leaves.

Beschreibung. Die Blätter sind eiförmig-länglich, spitz, die untersten in einen langen, geflügelten Blattstiel verschmälert (Fig. 239), die oberen am Stengel kurzgestielt oder sitzend, alle ungleich oder fast doppelt gekerbt mit einem kleinen hellen Drüsen auf der Spitze jedes Zahnes. Länge bis 30 cm, Breite bis 15 cm. Runzelig, oberseits dunkelgrün, flaumig, unterseits, besonders auf den Nerven, deren Netz hier besonders deutlich hervortritt, weichfölig. In der Kultur geht die Behaarung zurück, und die Pflanze kann fast kahl werden. — Die Sekundärnerven gehen vom Primärnerven am Grunde des Blattes unter einem Winkel von 30–40°, weiter oben von 40–50° ab, zwischen ihnen bilden Nerven dritter und vierter Ordnung reichliche Anastomosen und Maschen. Hält man das Blatt gegen das Licht, so erscheint zwischen diesen immer noch relativ dicken Nerven ein zartes Netz feiner durchschimmernder Nerven höherer Ordnung (Fig. 240). Die Zellen der Epidermis der Oberseite ziemlich geradlinig polygonal mit schmalen Spaltöffnungen, die der Unterseite mit buchtigen Wänden und runderen Spaltöffnungen. Die Epidermen (die untere viel reichlicher) tragen bis 6zellige Gliederhaare, deren Basalzelle




Fig. 239.

nicht selten in der Mitte eingezogen ist, und Köpfchenhaare mit ein- oder zweizelligem Kopf. Die Gliederhaare sind etwas warzig. Der Querschnitt zeigt nichts Auffallendes: an der Oberseite eine Reihe ziemlich kurzer Palissaden, die Gefäßbündel sind kollateral ohne Faserbelag. Krystalle fehlen dem Blatt (Unterschied von den officinellen Solanaceenblättern). So leicht das Blatt auch in kleinen Bruchstücken an der starken Behaarung der Unterseite, den hervortretenden stärkeren Nerven, den durchscheinenden feinen Nerven erkannt wird, so sehr fehlt es an charakteristischen Merkmalen, es als Pulver zu erkennen, höchstens kämen Bruchstücke der Haare mit kollabirten Basalzellen in Betracht. Man thut in solchem Falle besser, den Nachweis der Glukoside ins Auge zu fassen.

Bestandtheile. Als die Wirksamkeit bedingend, sind die Glukoside von grösster Wichtigkeit, von denen mehrere bekannt sind. Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass es noch nicht feststeht, ob die in den Blättern vorkommenden Glukoside identisch sind mit denen der Samen, welche häufig zur Herstellung der officinellen etc. Digitaline verwendet werden. Nach KELLER sollen in den Blättern vorhanden sein: „Digitoxin“, der Hauptträger der Wirkung, Digitonin und Digitalin, letzterem wurde früher der Hauptantheil an der Wirkung zugeschrieben, was gegenwärtig aber bezweifelt wird. Nach KILIANI sollen in den Blättern Digitonin und Digitalin fehlen und der als Digitonin bezeichnete Körper ein Gemenge sein. Dagegen soll sich neben dem Digitoxin noch ein dieselbe Reaktion gebendes Glukosid in den Blättern finden, nämlich Digitophyllin. Da jedenfalls der wichtigste Bestandtheil der Blätter das Digitoxin ist, so ist auf dessen Nachweis

grossen Anzahl vorliegender Untersuchungen noch nicht angezeigt erscheint, Forderungen für einen bestimmten Digitoxingehalt in die Pharmacopöen aufzunehmen

Daneben ist auch den anderen Glukosiden Aufmerksamkeit zuzuwenden (Bestimmung vergl unten) Ausserdem enthalten die Blätter einen nicht glukosidischen Farbstoff Digitoflavin $C_{15}H_{10}O_6$, H_2O , Inosit, Wasser 6,4—11,6 Proc, Asche 7,55 bis 12,85 Proc Die Blätter liefern 20 Proc dickes Extrakt

Nachweis der Glukoside nach KELLER 10 ccm klares, filtrirtes Digitalis Infusum (1 10) werden in einem kleinen Scheidetrichter mit 2—3 ccm Alkohol versetzt und dann mit 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt Nachdem sich die Flüssigkeiten getrennt haben, lässt man das Chloroform abfliessen, filtrirt durch ein kleines, mit Chloroform benetztes Filter und verdunstet im Wasserbade Den Rückstand löst man in 4 ccm Eisessig, setzt eine Spur Eisenchlorid hinzu und unterschichtet mit Schwefelsäure Es tritt eine rothe




Fig 240 Stückchen von Fohium Digitalis, schwach vergrössert

A Primärnerv B Sekundärnerv C Tertiärnerven D Quaternärnerven. Die zwischen diesen befindlichen, nur mit einfacher Linie gezeichneten feineren Nerven sind nur im durchfallenden Licht sichtbar

Zone, darüber ein breites, blaugrünes Band auf Das letztere gehört dem Digitoxin, die erstere den anderen Glukosiden an

Quantitative Bestimmung des Digitoxins nach FROMME 28 g Fol Digital pulv werden mit 280 g Spirit. dilut in einer 400 g-Flasche 8 Stunden lang unter öfterem Umschütteln macerirt, dann durch ein Filter von etwa 18 cm Durchmesser filtrirt, 207 g des Filtrats auf dem Wasserbade unter Umrühren auf ca 25 g eingeeengt, dann mit Wasser auf 222 g gebracht, diese mit 25 g Liq Plumbi subacetici versetzt, durch ein 18 cm Filter 132 g abfiltrirt, das Filtrat mit einer Lösung aus 5 g krystallisirtem Natriumsulfat in 8 g destill Wasser in einem ERLIENMEYER-Kolben versetzt und das Gemisch einige Minuten bei Seite gestellt Dann giebt man dem Kolben eine so schräge Lage, dass die Flüssigkeit fast die Oeffnung erreicht, stellt zum völligen Absetzen bei Seite, giesst dann vorsichtig 130 g ab, versetzt mit 2 g Liq Ammon. caustici und schüttelt 5 mal mit je 30 ccm Chloroform in einem Scheidetrichter aus Die Chloroformauszüge filtrirt man nach dem jedesmaligen Absetzen direkt aus dem Trichter in einen tarirten ERLIENMEYER-Kolben ab, destillirt ab und verdampft im Wasserbade zum konstanten Gewicht Den Rückstand wägt man, es ist Roh Digitoxin — Zur Reinigung löst man dasselbe in 3 g Chloroform, setzt der Lösung 7 g Aether und 50 g Petroläther zu, schwenkt gut um, wonach sich das geräuherte Digitoxin flockig ausscheidet und filtrirt durch ein Filter von 5—6 cm Durchmesser, wobei man das im Kolben haften bleibende Digitoxin ausser Acht lässt Den Rückstand auf dem Filter spült man mit heissem, absolutem Alkohol durch Filtration in den Kolben zurück, verdunstet den Alkohol und trocknet zum konstanten Gewicht Der Rück

stand $\times 10$ giebt den Digitoxingehalt der Droge an. Zur Werthbestimmung der Tinktur dampft man 200 g derselben im Wasserbade ein auf circa 20 g, nimmt den Rückstand mit Wasser auf, verdünnt auf 222 g, versetzt mit Liq. Plumb. subaceti und verarbeitet weiter wie oben. Entsprechend verfährt man beim Nachweis im Fluidextrakt.

Auf Grund der vorliegenden Bestimmung lassen sich besonders nach CAESAR und LOERTZ folgende Gesichtspunkte für die Beurtheilung der Droge anstellen.

1) Der Gehalt an Digitoxin schwankt von 0,1—0,62 Proc. Es scheint, als ob 0,8 Proc. ein Durchschnittsgehalt wäre, an den sich der Apotheker halten sollte, denn, wie schon gesagt, die Anzahl der vorliegenden Untersuchungen reicht zu einem abschliessenden Urtheil noch nicht aus.

2) Die Droge ist nicht später wie Mitte September einzusammeln, von da ab macht sich ein erheblicher Rückgang bemerkbar, z. B. 0,290 und 0,327 Proc. gegen 0,139 und 0,170 Proc.

3) Nach langer Regenperiode gesammelte Blätter sind minderwerthig.

4) Die nicht blühende Pflanze hat einen höheren Digitoxingehalt als die blühende, die Differenz beträgt etwa 10 Proc. Sollte sich das durch weitere Untersuchungen bestätigen, so würden die Arzneibücher die Forderung, nur von der blühenden Pflanze zu sammeln, fallen lassen müssen.

5) Die von den Blattstielen und stärkeren Rippen befreiten Blätter geben etwa doppelt so viel Digitoxin wie die ganzen Blätter.

6) Blüthen mit den Kelchen ergeben einen ähnlich hohen Digitoxingehalt wie die Blätter, Wurzeln enthalten nur Spuren.

7) Die Einwirkungen der Kultur erweisen sich bis jetzt als ungünstig, kultivierte Blätter enthalten erheblich weniger Digitoxin wie wildgewachsene, so dass die entsprechenden Forderungen der Arzneibücher ihre Berechtigung haben. Ob aber fortgesetzte und sorgfältig geleitete Kulturversuche den Gehalt nicht günstig beeinflussen werden, muss die Zukunft lehren. Jedenfalls ist bei solchen der Auswahl des Bodens, der Düngung, Bewässerung, Meereshöhe grosse Aufmerksamkeit zu schenken.

8) Ein Rückgang sorgfältig aufbewahrter Blätter im Digitoxingehalt nach einjähriger Aufbewahrung scheint nicht stattzufinden.

9) Dagegen scheint es, als ob das Pulver, wenn es nicht vor Licht und Luft sorgfältig geschützt wird, im Digitoxingehalt rasch zurückgeht.

Verfälschungen und Verwechslungen. 1) Die Blätter kultivierter Pflanzen sind weniger behaart, oft fast kahl, sie sollen nicht verwendet werden (vergl. oben).

2) Die Blätter anderer Digitalis-Arten (*Digitalis ambigua* Murray, *D. lutea* L., *D. parviflora* Lam.) sind stiellos, kleiner, schmaler, mit weniger stark hervortretendem Adernetz, fast kahl oder kahl.

3) Die Blätter von *Verbascum*-Arten sind dicker, schmecken nicht bitter, sie haben, abgesehen von anderen Merkmalen, Sternhaare.

4) Die Blätter von *Inula Conyza* DC. sind elliptisch, brüchig, spitzig, oberseits weichhaang, unterseits dünnfilzig, am Rande gesägt oder ganzrandig. Kein feines Fasernetz im durchfallenden Lichte. Kaum bitter schmeckend.

5) Die Blätter von *Symphytum officinale* L. sind herablaufend, untere in den Blattstiel verschmälert, rauhaarig, ganzrandig, nicht bitter.

6) Die Blätter von *Teucrium Scordonia* L. sind nicht filzig, gestielt, lanzförmig.

7) Die kürzlich beobachteten Blätter von *Solanum tuberosum* L. und *Solanum nigrum* L. sind am Oxalat leicht zu erkennen (vergl. *Datura*).

Officinell sind (vergl. oben) nur die von der 2jährigen, wildwachsenden Pflanze während der Blüthe gesammelten Blätter, in Deutschland ausserdem das frische, blühende Kraut zur Bereitung der Tinktur, in Frankreich gebraucht man bisweilen auch die getrockneten Blüten.

Auf **Einsammlung und Aufbewahrung** dieses äusserst wichtigen Arzneimittels ist besondere Sorgfalt zu verwenden. Man sammelt die Blätter von der im Juli

und August blühenden Pflanze, trocknet sie an einem schattigen Orte zunächst an der Luft, dann bei einer Wärme von höchstens 30° C und bewahrt sie in dicht schliessenden Blechbüchsen auf. Holzfasser oder gar Sacke bieten keinen genügenden Schutz gegen Luft, Licht und Feuchtigkeit und sind hier als Aufbewahrungsgefässe nicht geeignet.

Wer nicht in der Lage ist, die Digitalis selbst sammeln zu lassen, beziehe dieselbe von Apothekern in Gebirgsgegenden, oder von durchaus zuverlässigen Droghäusern und auch dann am besten in unzerkleinertem Zustande! Man durchmustert jede Sendung eingehend, entfernt missfarbige Theile oder zweifelhafte Beimengungen, und achtet auf die weniger wirksamen Blätter der angehauchten Pflanzen. Durch Reiben auf einem Drahtsiebe, wobei die groberen Rippen zurückbleiben, welche verworfen werden, verwandelt man die Blätter in eine feine Species für Aufgüsse, oder nach kürzerem Nachtrocknen über Aetzkalk in ein feines Pulver und bewahrt beide Zerkleinerungsformen in gelben, dicht verschlossenen Hafenglasern auf. — 5 Th frische Blätter geben 1 Th trockene, das Pulver in der letzteren bedingt einen Verlust von 10—12 Proc.

Digitalisblätter sind vorsichtig, vor Licht geschützt, aufzubewahren und jährlich zu erneuern, die älteren Vorräthe werden am besten verbrannt. Vergl. vorige Seite.

Wirkung und Anwendung. Die Wirkung ist hauptsächlich auf das Herz gerichtet. Durch kleine Dosen wird nach vorübergehender Beschleunigung die Pulsfrequenz herabgesetzt und der Blutdruck erhöht infolge erhöhter Energie der Herzkontraktionen und gleichzeitiger Verengung der peripherischen Gefässe. — Grosse Dosen erzeugen Pulsbeschleunigung durch Lähmung der Hemmungsapparate und Verminderung des Blutdruckes. — Sehr grosse Dosen bewirken schnellen, unregelmässigen, kleinen Puls und führen zur Lähmung des Herzmuskels selbst. — Auf die Diurese wirkt bei gesunden Menschen Digitalis nicht ein, wohl aber bei bestehenden, organischen Herzfehlern. — Bei grosseren Dosen wird die Körpertemperatur erniedrigt. — Digitalis besitzt kumulative Wirkung, bei wiederholter Darreichung kleinerer Dosen kommt es zu Intoxikationserscheinungen: Erbrechen, Kopfschmerz, verlangsamter Puls, Schwindel, Hallucinationen, Diarrhoe, Kalte und Schwächegefühl. — Der Tod kann durch Herzlähmung unter Konvulsionen erfolgen.

Man verwendet sie hauptsächlich bei Herzerkrankungen, als Diureticum bei Wasser sucht infolge von Kompensationsstörungen bei Herzerkrankungen, als die Pulsfrequenz herabsetzendes Mittel bei fieberhaften Krankheiten, bei Lungenentzündung etc., bei akutem Rheumatismus zur Bekämpfung der denselben complicirenden Herzerkrankungen.

Man giebt Digitalis innerlich in Pillen, Pulvern oder als Infusum 1,5—2,0 150,0, bisweilen auch, wenn letzteres nach längerem Gebrauch nicht mehr vertragen wird, in concentrirter Form als subkutane Injektion. In diesem Fall ist der Aufguss natürlich durch Papier zu filtriren. Bei Herstellung der Aufgüsse soll ein Kochen mit Rücksicht auf die Zersetzbarkeit der Glukoside unterbleiben. Nach BENYSCHKE ist die heisse Perkolation das beste Verfahren zur Bereitung gehaltreicher, wässriger Auszüge. Dieselben haben die Eigenthümlichkeit, leicht zu gelatiniren, man hat das einem reichlichen Pektinhalte, besonders einjähriger Blätter, zugeschrieben. Gegenwärtig wissen wir, dass Bakterien die Ursache sind, nämlich *Bacillus gummosus* Ritsert (*Bacillus gelatinogenus* Brautgam), und dass der Schleim durch Umwandlung des im Infusum befindlichen Rohrzuckers entsteht. Solche gelatinirte Infusa dürfen nicht verwendet werden. Alkalien, Gerbsäure, Metallsalze, Jod sind mit Digitalisarzneien unverträglich.

Grösste Einzelgabe Germ. Helv. 0,2 g Austr. 0,2 g Brit. 0,12 g

 " Tagesgabe " " 1,0 g " 0,6 g

Grösste Tagesgabe im Aufguss nach Helv. 2,0 g. Für Kinder rechnet man 0,05 g auf's Lebensjahr als Höchstgabe (Biedert).

Für Thiere 2,0—12,0 g für Pferde und Rinder, 0,1—1,0 g für Schafe und Ziegen, 0,05—0,3 g für Hunde.

Digitalis und ihre Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen und dürfen nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden.

† *Alcoolatura Digitalis* *Alcoolatura de digitale* (Gall) Aus gleichen Theilen frischer, zu Beginn der Blüthe gesammelter Fingerhutblätter und Alkohol (90 proc) durch 10tägige Maceration zu bereiten

Cigarettes de digitale (Gall) Wie *Cigarettes de stamone* Gall (S 1015)

Emplastrum cum extracto Digitalis *Emplâtre d'extrait de digitale* Gall
Mittels Extr digital alcool wie *Emplastrum cum extracto Conu* Gall (S 948)

† *Extractum Digitalis* Ergänzb Fingerhutextrakt Man bereitet es aus frischem, zur Blüthezeit gesammeltem Fingerhutkraut wie *Extract Belladonnae* Germ (S 469) Ausbeute 3 Proc Grösste Einzelgabe 0,2 g, grösste Tagesgabe 0,6 g (nach LEWIN)

Helv Extr Digitalis duplex s siccum¹⁾ Trockenes Fingerhutextrakt *Extrait de digitale sec* 200 Th Fingerhutblatt (V) erschöpft man mit q s einer Mischung von Wasser und Weingeist (94 proc) ää im Perkolator²⁾ Man befeuchtet mit 100 Th, sammelt zuerst 150 Th, verdunstet den Rest auf 50 Th, vermischt beides, fügt allmählich unter Umschütteln 200 Th Weingeist zu und giesst nach 48 Stunden klar ab. Den durch gelindes Erwärmen in 40 Th Wasser gelösten Rückstand fällt man nochmals mit 120 Th Weingeist, filtrirt nach 24 Stunden, mischt beide Auszüge und bereitet durch Eindampfen mit q s Reispulver 100 Th trockenes Extrakt Grösste Einzelgabe 0,05 g, grösste Tagesgabe 0,25 g

U-St *Extract of Digitalis* Aus 1000 g Digitalispulver (No 60) und q s einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc) und 300 ccm Wasser im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt etwa 3000 ccm³⁾, destillirt den Weingeist ab und verdampft bei höchstens 50° C zur Pillenkonsistenz

Gall 1) *Extrait de digitale (aqueux)* Durch Uebergiessen von 1 Th grobem Digitalispulver mit 6, dann 2 Th siedendem Wasser, je 12stündiges Ausziehen und Eindampfen der Pressflüssigkeiten zu einem weichen Extrakt

2) *Extrait de digitale (alcoolique)* 1000 g mittelfeines Digitalispulver erschöpft⁴⁾ man im Verdrängungswege mit 6000 g Weingeist (60 proc), destillirt den letzteren ab und verdampft zu einem weichen Extrakt

DIETRICH *Extractum Digitalis solidum* *Infusum Digitalissiccum* Fingerhut-Dauerextrakt Aus feingeschnittenen Blättern wie Extr Uvae Ursi solidum (S 363) durch 12stündiges Ausziehen

Die Verwendung dieses Extrakts an Stelle eines frischen Aufgusses wird von der Ph Helvet ausdrücklich untersagt

† *Extractum Digitalis fluidum* Fingerhut-Fluidextrakt *Extrait fluide de digitale*

Helv 100 Th Fingerhutblatt (V) befeuchtet man mit einer Mischung von 10 Th Glycerin, 15 Th Wasser, 25 Th Weingeist und erschöpft⁵⁾ im Perkolator mit q s Wasser und Weingeist ää Man sammelt zuerst 75 Th, verdampft des Rest auf 25 Th und versetzt beide zu 100 Th Grösste Einzelgabe 0,1 g, grösste Tagesgabe 0,5 g

U St Aus 1000 g Digitalispulver (No 60) und einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc) und 300 ccm Wasser im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuerst 850 ccm, dann weiter l a durch Eindampfen des Restes q s zu 1000 ccm Fluid Extrakt Digitalis-Extrakte sind vorsichtig aufzubewahren

† *Tinctura Digitalis* Fingerhuttinktur *Teinture de digitale* *Tincture of Digitalis* *Tincture of Foxglove*

Germ Aus 5 Th frischem, zerquetschtem Fingerhutkraut und 6 Th Weingeist⁶⁾ Braungrün, wird durch Wasserzusatz trübe (die folgenden nicht!)

Helv Aus Fingerhutblatt (V) wie Tinct Belladonnae Helv (S 470)

Austr Aus gepulverten Fingerhutblättern wie Tinct Aconiti rad Austr (S 155)

Brit Aus 125 g gepulverten Fingerhutblättern (No 20) und q s Weingeist (60 proc) bereitet man durch Verdrängung 1000 ccm Tinktur

U-St Aus 150 g gepulverten Fingerhutblättern (No 60) und q s verd Weingeist (41 proc) wie vorige 1000 ccm Tinktur

Gall Aus gepulverten Fingerhutblättern wie Tinct Coccae Gall (S 869).

Aufbewahrung Vorsichtig und vor Licht geschützt

Grösste Einzelgabe Germ Austr 1,5 Helv 1,0 Brit 0,9

Grösste Tagesgabe 5,0 5,0

Tinctura Digitalis ab oleo et acido liberata. Um die oft brechenerrregenden Wirkungen der Digitalis zu beseitigen, wird empfohlen, die zerschnittenen Blätter im Ver-

¹⁾ Vergl Fussnote S 947

²⁾ Vergl Fussnote S 925 und oben unter Nachweis der Glukoside

³⁾ U-St giebt unter *Tincturae Herbarum recentium* — *Tinctures of fresh herbes* folgende allgemeine Vorschrift für Tinkturen aus frischen Kräutern 500 g frisches Kraut, 1000 ccm Weingeist (91 proc), durch 14 tägige Maceration zu bereiten

drängungswege mit Petroläther zu entfetten, ferner die durch Perkolation bereitete Tinktur vor dem Einstellen auf das richtige Gewicht mit 10 proc Ammoniak zu neutralisieren

† *Tinctura Digitalis aetherea*. Aetherische Fingerhuttinktur *Teinture étherée ou éthérée de digitale* Ergänzb 10 Th fein zerschnittene Fingerhutblätter, 25 Th Aether, 75 Th Weingeist Grösste Einzelgabe 1,0 g, grösste Tagesgabe 3,0 g (nach Löwen) In Gelatinekapseln zu 0,25 im Handel

Gall Aus 100 g mittelfein gepulverten Digitalisblättern und 500 g Aether (spec. Gew 0,758) durch Verdrängung Wie vorige aufzubewahren.

† Aetum Digitalis Ergänzb

Fingerhut Essig *Vinaigre de digitale*
Rp Foliorum Digitalis min. conc 10,0
Spiritus (87 proc) 10,0
Acidi acetici diluti (30 proc) 18,0
Aqua destillatae 72,0

Durch Stängiges Ausziehen Beim Auspressen sind Metallgeräthe zu vermeiden Aufbewahrung vorsichtig und vor Licht geschützt Höchstgabe 2,0 g, pro die 5,0 g

Candelae Digitalis

Rp Folior Digitalis pulver 50,0
Kali nitrici 40,0
Radice Althaeae pulver 10,0

Man stösst mit Wasser an und formt 10 Kerzen

Guttae diureticae HILDEBRAND

Rp Tincturae Digitalis
Tincturae Colchici seminis aa 10,0
Spiritus Aetheris nitrosi 2,0

Bei Brustwassersucht zu 20 Tropfen

Guttae sedantes OPPOLZER

Rp Tincturae Digitalis 5,0
Aqua Laurocerasi 7,5
Smal täglich 20 Tropfen

Infusum Digitalis

Infusion of Digitalis

I Brit

Rp Foliorum Digitalis gr ply 8,8
Aqua destillatae ebullientis 1000,0

Nach 15 Minuten auspressen

II U-St.

Rp 1. Folior Digitalis concis 15,0 g
2. Aqua ebullientis 500 ccm
3. Spiritus (81 proc) 100 ccm
4. Aqua Cinnamomi (U-St) 150 ccm
5. Aqua frigidae q s

Man übergiesst 1 mit 2 presst nach dem Erkalten, fügt 3 und 4 und zuletzt 5 q s zu 1000 ccm hinzu.

Infusum Digitalis concentratum pro receptura

Rp 1. Folior Digitalis concis. 25,0
2. Aqua destillatae fervid 250,0
3. Aqua destillatae fervid 200,0
4. Spiritus (90 proc) 50,0

Man zieht 1 mit 2, dann mit 3 lege artis im Wasserbade aus, oder man perkoliert mit heissem Wasser im Heisswassertrichter, fügt nach dem Erkalten und Auspressen 4 hinzu, filtrirt und bringt mit q s Wasser auf 500,0 g Gesamtgewicht, 20 Th. Infusum = 1 Th. Fol Digitalis. Eine Rezepturleichterung, die man nur für den Tagesbedarf vorrätig hält

Mixtura antasthmatica CHOUANT

Rp Infusi Fol Digitalis 2,0 120,0
Rad Ipecacuanh. 1,0
Sirup Althaeae 25,0
Liquoris Ammonii anisati 2,5

Bei Asthma, Krampfhusten 2stündlich 1 Esslöffel.

Mixtura antihæmoptysica LEBERT

Rp Infusi Digitalis (1,2) 150 0
Extracti Ratanhæ 2,0 (-4,0)
Extracti Opi 0,06 (-0,12)
Sirupi Succi Citri 50,0

Gegen Blutspelen esslöffelweise

Mixtura Digitalis

Münch Nosokom-Vorsch

Rp Infusi Fol Digitalis (0,5) 110,0
Sirupi simplicis 20,0

Mixtura Digitalis composita

Münch Nosokom-Vorsch

Rp Infusi Digitalis (0,5) 110 0
Liquoris Kali acetici 20,0
Sirupi simplicis 20,0

Mixtura diuretica HALLÉ

Rp Tincturae Digitalis 18,0
Vini Colchici 6 0
Kali iodati 10,0
Sirupi Sarsaparili comp 50,0
Aqua destillatae 75 0

Bei Wassersucht theelöffelweise

Oxymel diureticum GUBLER

Rp. Tincturae Digitalis
Extracti Secalis cornuti aa 5 0
Acidi gallici 2,5
Kali bromati
Aqua Laurocerasi aa 15 0
Sirupi Cerasi 200 0
Oxymellis Scillae 260,0

Esslöffelweise bei Herz- und Nierenleiden.

† Pastilli Digitalis LABELONYE

Rp Extracti Digitalis 1,0
Sacchari albi 280,0
Tragacanthae pulv 0,05
Aqua glycerinatae q s

Zu 300 Pastillen

Pilulae hecticae HEIN

Form mag Berolin

Rp Folior Digitalis pulv
Radice Ipecacuanh pulv aa 0 06
Opi pulverati 0,86
Radice Liquirit pulv 2,0
Extracti Heleni 3,0

Zu 30 Pillen Smal täglich 1 Pille

Pilulae diureticae PEARSON

Rp Folior Digitalis
Bulbi Scillae aa 2,0
Extracti Gentianae 1,0
Olei Juniperi fructus 0,1
Mucilaginis Gummi arab q s

Zu 80 Pillen Bei Wassersucht.

Pilulae diureticae

nach Rev intern de Méd

Rp Foliorum Digitalis ply
Bulbi Scillae ply aa 2,0
Extracti Colocyntidis 0,4
Extracti Rhei q s

Zu 60 Pillen Morgens und Abends 1-2 Stück

Pilulae hydragogae HEIMT
HEIMS harntreibende Pillen.

		Ergzb	Helv	Form
Rp	Folior Digitalis	2,5	2,0	0,7
	Gutta pulv	2,5	2,0	0,7
	Bulbi Scillae pulv	2,5	2,0	0,7
	Silbi sulfurat aurant	2,5	2,0	0,7
	Extracti Pimpinell	2,5	2,0	0,7
	Gummi arabici	—	2,0	—
	Mucilag Gummi arab	q s	—	q s.
	Glycerini, Aquae aa	—	gtt VIII	—
	Man format	100	100	80 Pillen.

Polveres antiphlogistici GORRIS

Rp	Folior Digitalis pulv	0,03
	Calomelanos	0,06
	Zinci oxydati	0,12
	Sacchari albi	0,4
	Dentur tales doses X.	

Pulvis diureticus BREDA.

Rp	Folior Digitalis pulv	0,1
	Kali nitrici	1,0
	Dentur tales doses X	

Pulvis laxativus et diureticus
 (Nach Bull therap)

Rp	Folior Digitalis pulv	
	Bulbi Scillae pulv	
	Calomelanos	aa 0,05
	Divide in part. III	Stündl 1 Pulver

Sirupus de Digitale purpurea

	Sirup de digitale (Gall)	
Rp	Tincturae Digitalis	25,0
	Sirupi Sacchari	875,0

Sirupus Digitalis LABÉLONYE.

Rp	Extracti Digitalis	0,1
	Sirupi Sacchari	100,0

† **Tinctura Digitalis acida**

Rp	Foliorum Digitalis conc.	25,0
	Spiritus diluti	250,0
	Acidi sulfurici puri	1,5

Acettractum Digitalis fluidum vergl

CHRISTISON'S Einreibung bei Hydrops **Olei camphorati aa**

Extractum Digitalis DENZEL ist ein Fluid Extrakt, von welchem 5 g = 1 g Digitalisblättern entsprechen, es soll nur das Digitalin und Digitalin enthalten und fast frei von abeln Nebenwirkungen sein

Hydragogin ist ein Gemisch von Fingerhut-, Meerzwiebel- und Strophanthus-Tinktur

II Ob die anderen bei uns heimischen Digitalis Arten **Digitalis ambigua Murray** und **D. lutea L.**, ebenfalls Glukoside enthalten und event an Stelle von I treten können, darüber stehen die Angaben einander direkt gegenüber **Digitalis ferruginea L.** soll zehnmal so stark wirken wie **D. purpurea**

Tinctura Digitalis composita s. rubra
Elixir antasthmaticum Anskow

Rp	Folior Digital conc.	20,0
	Radic Liquirit conc.	40,0
	Lign Santal rubr	4,0
	Spirat dilut	
	Aq Foeniculi	aa 100,0
	† Tinctura Digitalis salina	
Rp	Foliorum Digitalis conc.	20,0
	Liquoris Ammonii aethici	100,0
	Spiritus (90 proc)	20,0
	Durch Maceration bereitet man 100,0 Tinktur	

Tinctura diuretica HUFELAND

Rp	Tincturae Digitalis	
	Spiritus Aethers nitrosi	aa 10,0
	Olei Juniperi fructus	2,0
	1—2 Stündl	20—30 Tropfen.

Unguentum Digitalis

Fingerhutsalbe

I Ergänz

Rp	Extracti Digitalis	1,0
	Unguenti cerei	9,0

Zur Abgabe frisch zu bereiten. Das Extrakt löst man in wenig Glycerin oder verd Weingeist.

II Helvet

Rp	Extracti Digitalis fluid	2,0
	Adipis benzoati	8,0

Vinum Digitaleum compositum

Vin de digitalis composé de l'Hôtel-Dieu
 (Gall) **Vin de Troussseau** **Oenolé de digitale composé de l'Hôtel-Dieu**

Rp	1 Folior Digitalis pulv	5,0
	2 Bulbi Scillae conc	7,5
	3 Fructus Juniperi cont	75,0
	4 Kali acetici	50,0
	5 Vini albi	900,0
	6 Spiritus (90 proc.)	100,0

Man zieht 1—3 mit 5—6 zehn Tage aus, presst und läßt 4

† **Vinum diureticum (Ergänz)**

Harntreibender Wein.

Rp	Folior Digitalis conc	10,0
	Bulbi Scillae conc	10,0
	Fruct Juniperi cont	60,0
	Vini Xerensis	1000,0
	Man zieht 8 Tage aus, presst und läßt	
	Kali acetici	2,5

Acettract Cocae fluid S 870

Rp **Tincturae Scillae, Tincturae Digitalis,**

Diphenylaminum.

I. **Diphenylamin Phenylanilin. (C₆H₅)₂NH.** Mol. Gew. = 169. Wird in den Theerfarbenfabriken dargestellt durch Erhitzen von Anilinchlorhydrat mit Anilin auf 220 bis 230° C

Eigenschaften Farblose, monokline Krystalle von schwach fruchtartigem Geruche, in Wasser unlöslich, dagegen in Alkohol, Aether und Benzol leicht löslich. Schmelz


punkt 54° C, Siedepunkt 310° C Es ist eine sekundäre Base, die sich mit Säuren zu losen Verbindungen (Salzen) vereinigt, doch zerfallen diese schon unter dem Einfluss des Wassers.

Prüfung 0,2 g Diphenylamin geben mit 2 ccm verdünnter Schwefelsäure (von ca 16 Proc) und 20 ccm reiner (salpetersäurefreier) Schwefelsäure eine farblose Lösung, die durch eine Spur Salpetersäure prachtvoll blau gefärbt wird.

Anwendung In der Theerfarbenfabrikation zur Darstellung von Diphenylamin blau, Anilinblau, Aurantia In der Analyse als Reagens auf Salpetersäure

Diphenylamin-Reagens Man löst 0,5 g Diphenylamin unter Zusatz von 20 ccm destillirtem Wasser in 100 ccm konc salpetersäurefreier Schwefelsäure Von dieser Lösung bringt man etwa 5 ccm in ein Probirglas und schichtet darauf die zu untersuchende Lösung Bei Gegenwart von Salpetersäure oder salpetriger Säure entsteht an der Berührungszone mehr oder weniger intensive Blaufärbung — Die Blaufärbung wird indessen auch hervorgerufen durch Unterchlorige Säure, Chlorsäure, Chromsäure, Eisenoxysalze und ähnliche oxydierende Agentien

II † Thiooxydiphenylaminum Sulfaminol. $C_{12}H_{10}(OH)S_2NH$ Mol Gew. = 247 Die Darstellung erfolgt durch Kochen von Metaoxydiphenylamin mit Natronlauge und Schwefel Die filtrirte Lösung wird mit Ammoniumchlorid behandelt, wobei Natriumchlorid in Lösung geht und Sulfaminol, welches mit Ammoniak keine Verbindung eingeht, als gelber Niederschlag ausfällt Dieser wird mit Wasser gewaschen und getrocknet



OH
Sulfaminol
(Thiooxydi-
phenylamin).

Gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in ätzenden Alkalien, schwieriger in Alkalikarbonaten Auch von Weingeist und Essigsäure wird es aufgenommen Die Lösungen sind gelb gefärbt Erhitzt bräunt es sich, wird weich und schmilzt bei etwa 155° C

Die Anwendung erfolgt als Antisepticum (Jodoform Ersatz) zu Einblasungen bei Kehlkopftuberkulose, zur Trockenbehandlung bei Eiterungen der Kieferhöhle Als Streupulver bei Wunden, Fussgeschwüren und Decubitus Innerlich in Gaben von 0,25 viermal täglich bei Cystitis

Einstäubungen von Sulfaminol haben sich als spezifisches Mittel zur Bekämpfung der Faulbrut der Bienen bewährt

Sulfaminol-Eucalyptol (8 Proc) Lösung von 8 Th Sulfaminol in 92 Th Eucalyptol. Gebrauch wie Sulfaminol zum Pinseln bei Kehlkopftuberkulose

Sulfaminol-Guajakol (8 Proc) Lösung von 8 Th Sulfaminol in 92 Th Guajakol. Gebrauch wie Sulfaminol für rhinolaryngologische Zwecke

Sulfaminol-Kresol (8 Proc) Lösung von 8 Th Sulfaminol in 92 Th Kresol. Für rhinolaryngologische Zwecke

Sulfaminol-Menthol (8 Proc) Lösung von 8 Th Sulfaminol in 92 Th Menthol. Für rhinolaryngologische Zwecke

III † Dijodcarbazolum Dijodenbazol $C_{12}H_8J_2NH$ Mol Gew. = 419. Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Jod auf Carbazol (Diphenylimid)

Geruchlose, gelbe Blättchen, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Aether, Benzol, Chloroform, heissem Alkohol. Als Antisepticum bez Jodoformersatz empfohlen

Dita.

Cortex Dita Cortex Alstoniae. — Ecorce de Dita (Gall.) Ditarinde. — Ecorce d'Alstonia. — Alstonia Bark Dita Bark ist die Rinde des Stammes der zu den Apocynaceae — Plumierioideae — Plumiereae — Alstoniinae gehörigen *Alstonia scholaris* (L.) R Br In ganz Indien und von da bis zum tropischen Australien und Neu Guinea wachsender Baum, angeblich auch in Ostafrika

Beschreibung. Die Rinde bildet flach rinnenförmige Stücke, die bis 1,5 cm dick, aussen gelbgrau, mit etwas schwammigem Kork bedeckt, innen braun gestreift sind. Querschnitt rötlich. Der Kork besteht aus wechselnden Lagen dünnwandiger und dickwandiger Zellen In der Mittelrinde reichliche Gruppen von Steinzellen, die strecken

weise fast zu einem geschlossenen Ring zusammentreten. Die Steinzellen gehen auch in den Bast über, der Milchsaftschläuche und zusammengefallene Siebrohren erkennen lässt. Markstrahlen bis 3 Zellreihen breit, ihre Zellen radial gestreckt. Im Parenchym der Baststrahlen und der Mittelrinde reichlich Oxalat in Einzelkrystallen.

Da unter dem Namen Ditarinde ganz verschiedene Rinden in den Handel gelangen, so ist vorkommenden Falles genau auf den Bau zu achten.

Bestandtheile. Alkaloide: Ditamin $C_{16}H_{19}NO_2$, Ditain oder Echitamin $C_{28}H_{29}N_3O_4$, ein heftiges Gift. Ferner Echicerinsäure, Echikautschin $C_{60}H_{110}O_2$, eine elastische Substanz, löslich in Chloroform, Aether, Benzin, Echicerin $C_{30}H_{48}O_2$, Echitin $C_{34}H_{52}O_2$, Echitein $C_{12}H_{17}O_2$, Echitenin $C_{20}H_{27}NO_4$, Echiretin. — Ditain wird von konzentrierter Salzsäure nach mehreren Stunden purpurroth gelöst, ebenso lösen Schwefelsäure, Vanadumschwefelsäure, Salpetersäure mit rother Farbe.

Ditamin wird von Salpetersäure mit gelber Farbe gelöst, die Farbe wird dann grün, endlich orangeroth.

Anwendung. Man verwendet die Rinde als Febrifugum und Tonicum, besonders bei chronischer Diarrhoe und Ruhr, wie Chinarinde. Zum arzneilichen Gebrauch eignet sich am besten das Fluidextrakt und die Tinktur (1:10), von der 3—7 g *pro dosi* gegeben werden.

Drosera.

Gattung der *Dioscoreaceae*

I *Drosera rotundifolia* L. Sonnentau. *Rosée du soleil*. *Youthwort*. *Lustwort*. Heimisch auf Torfmooren Europas und Nordamerikas. Perennirendes Kraut mit einer Rosette grundständiger, rundlicher, in den langen Stiel verschmalerter, reizbarer, mit Drüsenhaaren besetzter Blätter. Inflorescenz wickelartig. Blüten klein, zwittrig, fünfzählig, mit 3 Karpellen.

Verwendung findet die ganze Pflanze.

Herba *Droserae* **Herba *Rorillae* s. *Roris Solis*** — Sonnentau. *Sonnenkaut*. *Ohrloffeikaut*. *Edler Weidenhon*. *Jungfernhut* — *Drosera* (Gall.)

Das blühende, bei gewöhnlicher Temperatur getrocknete Kraut 7 Th. frisches geben 1 Th. trockenes.

Bestandtheile. Ein peptonisirendes Ferment, der Träger der verdauenden Kraft der Blätter, ferner rothe und gelbe Farbstoffe und ein atherisches Oel, die frisch etwas scharfen und reizenden Blätter verlieren diese Eigenschaft beim Trocknen. Das trockne Kraut liefert mit Alkohol (60 proc.) 25 Proc. Extrakt.

Anwendung. Die in Vergessenheit gerathene Droge wird neuerdings besonders in England und Amerika bei Bronchitis, Asthma, Keuchhusten und dem Husten der Phthisiker angewendet. — Es wird auch eine Wirkung auf die Sexualorgane behauptet. Im wesentlichen scheint die Wirkung eine diuretische zu sein, daher auch bei Wassersucht verwendet. — Dass die Pflanze zu den sogenannten „fleischressenden“ gehört, ist bekannt.

II Ebenso verwendet man auch die anderen bei uns heimischen Arten *Drosera intermedia* Hayne und *Drosera longifolia* L.

Alcoolatura *Droserae* (Gall.) wird aus der ganzen, frischen Pflanze wie *Alcool Digitalis* Gall. (S. 1041) dargestellt.

Extractum *Droserae* s. *Rorillae* Durch Ausziehen des trockenen Krautes mit verdünntem Weingeist bei gelinder Wärme und Eindampfen zur Extraktstärke. Ausbeute etwa 25 Proc. Gabe 0,1—0,3.

Extractum *Droserae fluidum*. Wie *Extractum Belladonnae fluidum* U-St. (S. 470) zu bereiten.

Tinctura *Droserae* s. *Rorillae* 1 Th. Sonnentau, 5 Th. verdünnter Weingeist (60 proc.) Nach *Codex* 100 g trocknes Kraut, 11 verd. Weingeist (60 proc.) Einzelgabe 0,4—1,0 g, Tagesgabe 6—10,0 g.

Rp Tincturae Droserae 5,0
 Vini Pepsini 80,0
 M D S Sätündlich ein Kaffeelöffel voll.

III Ausländische Arten **Drosera Whittakeri** Planch in Australien enthält einen rothen Farbstoff $C_{11}H_8O_5$ und einen orangegelben $C_{11}H_8O_4$.

In Brasilien liefert **Drosera communis** St Hil in der ganzen gestossenen Pflanze ein reizendes Mittel, wie Senfteig, auf Schafe soll die Pflanze giftig wirken. **Drosera villosa** St Hil, ebenfalls in Brasilien, liefert aus dem Saft der ganzen Pflanze mit Zucker einen Hustensaft, die Blätter einer andern, nicht bestimmten Art liefern einen schweiss- und urntreibenden Thee

Duboisia.

Gattung der Solanaceae — Salpiglossideae.

Kahle Baumchen mit ungetheilten Blättern und zahlreichen, in einem endständigen, rispigen Blütenstand stehenden, relativ kleinen, weissen Blüten. Die röhrig glockige Blumenkrone mit funflappigem, schwach zweilappigem Saum. 4 Staubblätter, Frucht eine Beere. Enthält 2 Arten.

I **Duboisia myoporoides** R Br. Heimisch in Australien und Neukaledonien. Verwendung finden die Blätter **Folia Duboisiae**.

Beschreibung. Sie sind bis 15 cm lang, bis 3 cm breit, länglich lanzettlich, am Rande etwas umgebogen. Vom beiderseits hervortretenden Mittelnerven gehen die Sekundärnerven fast unter einem rechten Winkel ab. Spaltöffnungen oberseits spärlich, unterseits sehr zahlreich, fast kreisrund, ziemlich gross, ferner auf der Epidermis keulenförmige, mehrzellige Drüsenhaare.

Bestandtheile. Die Blätter enthalten ein Alkaloid $C_{17}H_{21}NO_4$, das als Duboisin bezeichnet wurde. Nach LADENBURG soll das Duboisin mit dem Hyoscin identisch sein, es ist aber darauf aufmerksam zu machen, dass das Duboisin stärker wirkt, als das Hyoscin. Nach E. SCHMIDT enthalten die Blätter Scopolamin und Hyoscyamin und nach E. MERCK Pseudohyoscyamin, letzteres schmilzt bei 133—134° C, dreht links, ist in Wasser und Aether schwer, in Alkohol und Chloroform leicht löslich, es liefert bei der Spaltung Tropasäure und eine Base $C_8H_{11}NO$. — Uebrigens scheinen die Blätter nicht immer die gleichen Alkaloide zu enthalten, vielleicht sind sie nach dem Alter oder der Jahreszeit verschieden, so enthält ein von SCHUTTS untersuchtes Muster nur Hyoscyamin, ein anderes nur Hyoscin.

Anwendung. Die Blätter wurden früher ebenso wie die anderer narkotischer Solanaceen verwendet, gegenwärtig ist der Gebrauch sehr zurückgegangen, doch sollen sie anderen Solanaceenblättern beigemengt im Handel vorkommen.

Charakteristisch ist vorkommenden Falles der beiderseits vorragende Mittelnerv, sein Gefässbündel ist wie bei anderen Solanaceen bikollateral, er enthält Steinzellen.

†† **Duboisinum sulfuricum**, Duboisinsulfat (Ergänzb.) wird als Hypnoticum und Sedativum zuweilen angewendet. Das Duboisinsulfat ist keine einheitliche Verbindung, sondern ein Gemenge aus wechselnden Mengen Hyoscyaminsulfat, Scopolaminsulfat (= Hyoscinsulfat) und anderen Sulfaten der in den Blättern der *Duboisia myoporoides* enthaltenen Basen. Es kann je nach der Art der verarbeiteten Blätter das eine Mal fast reines Hyoscyaminsulfat, ein anderes Mal fast reines Scopolaminsulfat sein. Es giebt die unter Atropinsulfat angeführten Reaktionen. Sehr vorsichtig aufzubewahren.

Dosis subcutan bei Frauen 0,0008—0,0012	} pro Dosi und die
bei Männern 0,0012—0,0022	
innerlich bei Frauen 0,0008—0,0022	

II Duboisia Hopwoodii F v M (syn *Duboisia Piturie* Bankroft), *Pituri*¹ Pitschurie. Heimisch in Sudansstrahlen. Die Blätter sind 5—10 cm lang, lineal, die Spitze oft etwas umgebogen. Sie enthalten ein Alkaloid Piturin. Dasselbe wird als farbloses, mit Wasser, Aether und Alkohol lösliches Öl vom Siedepunkt 243°C beschrieben. Nach Ladeneburg soll es mit dem Nicotin identisch sein.

Dulcamara.

Stipites Dulcamarae (Erganzb) *Caulis Dulcamarae* (Helv) *Caules Dulcamarae* (Austr) *Dulcamara* (U-St) *Amara dulcis*. *Lignum Dulcamarae* — Bittersüssstengel. Bittersüss. Heiligenbitter.¹⁾ Hindischkrautstengel Münscholz — *Douce-amère* (Gall) — Bittersweet. Bittersweet stalks sind die oberirdischen Äste von *Solanum Dulcamara* L. (Solanaceae — Solanene — Solaninae), durch ganz Europa, bis nach China und Japan verbreitet.

Beschreibung Pflanze strauchartig, Stengel unten holzig, oben mehr krautig, niederliegend oder klimmend. Blätter gestielt, länglich eiförmig, ganzrandig, spitz oder zugespitzt, am Grunde oft herzförmig oder selbst gedöhrt, 3zählig. Blüten violett, selten weiss, in langgestielten, rispenartigen, gablig beginnenden Wickeln, dieselben durch Anwachung scheinbar extraaxillar.

Die Stücke der Äste, gewöhnlich geschnitten im Handel, sind 4—8 mm dick, der Länge nach gestreift oder gefurcht, aussen grünlich braun, ziemlich glänzend mit Kohwarzen (Lenticellen) und zerstreuten Blattnarben, innen häufig hohl.

Ausserhalb des dünnen Korkes bleibt die Epidermis mit ihrer Cuticula erhalten, im Parenchym der Mittelrinde Chlorophyll, darauf folgend ein einfacher, oft unterbrochener Kreis von Fasern. Im Holz reichlich Holzfasern, wenig Parenchym. Die Gefässbündel sind bikollateral, daher im Mark ebenfalls Phloem, das nach innen (also gegen das Centrum) Fasern erkennen lässt. In zahlreichen Zellen, besonders des Parenchyms, Oxalatsand.

Geschmack zuerst bitterlich, dann süsslich (daher der Name).

Bestandtheile $\frac{1}{2}$ pro mille Solanin $C_{45}H_{57}NO_{15}$, ferner ein amorphes, bitter schmeckendes, noch nicht sichergestelltes Alkaloid $C_{65}H_{100}N_2O_{29}$, ein Glukosid Dulcamarin $C_{32}H_{54}O_{16}$, das bei der Spaltung Glukose und Dulcamaretin $C_{16}H_{28}O_8$ liefert. Seine Spaltung beim Kauen scheint den Wechsel im Geschmack der Droge (erst bitter, dann süss) zu bedingen. Vielleicht gehört das Dulcamarin zu den Saponinen.

Verwechslungen Als solche werden die Stengel von *Lonicera*-Arten und *Humulus Lupulus* L. genannt. Sie haben gegenständige Blattnarben und keine bikollateralen Bündel.

Einsammlung etc Officiell sind die jüngeren (Helv U St), wie auch die zwei- bis dreijährigen Stengel, die nach Ergänz. im Herbst nach dem Abfallen der Blätter nach Austr. im ersten Frühlinge oder im Spätherbste gesammelt werden. Man schneidet sie, um glatte Scheiben zu erhalten, in frischem Zustande, nachdem man die dickeren Stengel gespalten, trocknet zunächst an einem luftigen, schattigen Ort, dann bei gelinder Wärme und bewahrt in Blechgefässen auf. Die grüne Farbe der Rinde verliert sich bei längerer Aufbewahrung.

Anwendung Innerlich zu 0,5—2,0 im Pulver oder als Abkochung, auch in Theemischungen. In der Homöopathie gegen Durchfall. In grösseren Dosen erzeugt die Droge Schluckbeschwerden, Uebelkeit, Erbrechen, Schwäche, Schwindel, Cyanose, Pupillenerweiterung, Konvulsionen. Innerlich verwendet man sie gegen Hautkrankheiten (Psoriasis, Pityriasis), Rheumatismus, Katarrhe, Asthma.

Extractum Dulcamarae. Bittersüss-Extrakt. *Extrait de douce-amère*. Ergänz. 1 Th fein zerschnittene Bittersüssstengel wird zweimal mit je 5 Th siedendem

¹⁾ Unter diesem Namen sonst *Species Hieracii* piceae

Wasser übergossen 6, dann 8 Stunden stehen gelassen, die Pressflüssigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 16—18 Proc. Gall. lässt zuerst mit 5, dann 3 Th kaltem Wasser je 12 Stunden ausziehen. Diet empfiehlt zur Erhöhung der Haltbarkeit Eindampfen zum dünnen Extrakt, Fallen der Schleimtheile mit ää Weingeist, Filtriren, Waschen des Rückstandes mit verd. Weingeist und Eindampfen. Ausbeute 14—15 Proc. Gabe 0,5—1,0—1,5 g.

Extractum Dulcamarae fluidum. Fluid Extract of Dulcamara (U-St.) Wird ebenso wie Extr. Convallariae fluid. U-St. (S 957) bereitet. Auf 100 Th der Droge braucht man etwa 450 Th des Lösungsmittels.

Filix antieatarrhale HURELAND.

Rp	Extracti Dulcamarae	2,0
	Extracti Cardui benedicti	6,0
	Aquae Foeniculi	50,0
	Aquae Amygdalarum amar.	60

Bei Katarrh mehrmals täglich einen Theelöffel.

Pillulae depuratoriae ARTHUR.

Rp	Extracti Dulcamarae	10,0
	Stibii sulfurati lavigati	5,0
	Stiptum Dulcamarae pulv.	2,5

Z. 150 Pillen. Smal täglich 3, steigend bis 7 Pillen.

Bei Hautausschlägen.

Tisana Dulcamarae (Gall.)

Tisane de douce-amère

Rp	Stiptum Dulcamarae conc.	20,0
	Aquae destillatae ebullientis	1000,0

Nach 2 Stunden auspressen.

Sirupus Dulcamarae

Rp	Extracti Dulcamarae	20
----	---------------------	----

Sirupi Sacchari 98,0

Kindern theelöffelweise, Erwachsenen esslöffelweise.

Sirupus de Dulcamara (Gall.)

Sirap de douce-amère

Rp	1 Stiptum Dulcamarae conc.	100,0
	2 Aqu. destill.	1500,0
	8 Sacchari	

1 wird mit 2 Lothend übergossen, nach 6 Stunden presst man ab, fügt auf 100,0 der Pressflüssigkeit 180,0 von 3 hinzu und löst durch Aufkochen.

Species pectorales RUROW.

RUROW'scher Thee

Rp	Herbas Cardui benedicti	
	Herbas Centaurii min.	
	Lichen Islandici	
	Stipt. Dulcamarae ää	60,0

Divid. in part. X. Ein Päckchen mit 2 l Wasser auf 1 l einkochen und tagsüber lauwarm verbrauchen. In Ostpreussen beliebtes Hausmittel.

Tinctura Dulcamarae

Rp	Stiptum Dulcamarae conc.	1,0
	Spiritus diluti	6,0

Ex tempore

Rp	Extracti Dulcamarae	4,0
	Spiritus diluti	96,0

Unguentum cardiacum SCHROEDER.

Rp	Extracti Dulcamarae	20
	Spiritus diluti	1,0
	Ol. Lauri	
	Unguenti Rosmarini comp.	
	Unguenti cerei ää	10,0

Zum Einreiben der Herzgrube bei Magenweh der Kinder.

Kräuterthee von PROSS, besteht aus Bitterstängeln, Kornblumenblüthen, Sennesblättern und Pfefferminze.

KUNZEL'S antihyperpetische Pillen, Bluthreinigungspillen 10 Th Bittersussextrakt, 5 Th Goldschwefel, 1 Th Aloe.

MORAWITZ'S Heilkräuter-Extrakt, gegen Lungenleiden, ist ein gereinigter Honig mit Spuren von Auszügen aus Bittersuss, Mohnkapseln und bitteren Kräutern.

Ecballium.

Gattung der Cucurbitaceae — Cucurbiteneae — Cucumerinae. Umfasst eine Art **Ecballium Elaterium (L.) A. Rich.** Heimisch im Mittelmeergebiet. Verwendung finden die Beerenfrüchte **Fructus Ecbalii** **Fructus Elaterii** s. **Momordicae** s. **Cucumeris asinini** — Springgurke. Eselgurke. — **Concombre sauvage** — **Ecballium (Gall.)**

Beschreibung. Die Früchte sind oval, etwa 4 cm lang, 2,5 cm dick, gelblich grün, weichstachelig, dreifachrig, in jedem Fach zahlreiche, in einen grünlichen Schleim eingebettete Früchte. Die am gekrümmten Blattstiel herabhängenden Früchte lösen sich bei der Reife von demselben ab, wobei sie aus dem dadurch entstandenen Loche die Samen mit dem Schleim heftig herausspritzen. Man sammelt die Früchte kurz vor der Reife und verwendet sie nach Entfernung der Samen zur Herstellung des **Extractum Elaterii** und des **Elaterins**.

Bestandtheile. **Elaterin (Elaterin)** $C_{20}H_{28}O_6$, sechseckige Tafeln, von sehr bitterem und scharfem Geschmack und neutraler Reaktion. In Wasser und Glycerin unlöslich.

schwer in kaltem, leicht in kochendem Weingeist löslich, ebenfalls leicht in Schwefelkohlenstoff, Amylalkohol, Chloroform und Benzol löslich. In konzentrierter Schwefelsäure mit rother Farbe löslich, ebenso in Phenol und Schwefelsäure. Man gewinnt es durch Extraktion des weissen Elaterium (vergl unten) mit kochendem Alkohol, Ausfällen mit Wasser, Reinigen und Waschen mit Aether und Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol. Es ist das drastische Princip der Früchte. Dieselben enthalten ferner Prophetin $C_{20}H_{36}O_7$ (?), Ecbalin (Elaterinsäure) $C_{20}H_{34}O_4$ (?), Hydroelaterin $C_{20}H_{40}O_8$ (?), Elaterid $C_{20}H_{38}O_{13}$ (?).

Anwendung. Die ganzen Früchte werden kaum benutzt, dagegen das Elaterium und Elaterin.

† **Extractum Elaterii.** Man unterscheidet 1 **Elaterium album** s. **anglicum** Elaterium (Brit.) Durch Absotzenlassen des Saftes und Eintrocknen des Satzes hergestelltes Präparat von sehr ungleichmassiger Zusammensetzung, denn der Elateringehalt, nach Brit 20–25 Proc., schwankt zwischen 15 und 50 Proc. Gabe 0,006–0,03 g (Brit.), doch genügen zur Purgirwirkung (nach HUSEMANN) 0,003–0,015 g. Die Anwendung ist nicht rathsam, bei alten Leuten sogar gefährlich (!). Wird zuweilen mit Calciumcarbonat und Stärke verfälscht. Grünliche, zerbröckliche Kuchen von schwachem Theegeruch.

2 **Elaterium nigrum** s. **Miltense**. Durch Eindampfen des aus den frischen Früchten gepressten und durchgeseihten Saftes zum dicken Extrakt zu bereiten. Ausbeute etwa 1,5 Proc. Grünlich braun, in Wasser trübe löslich. Enthält 15–20 Proc. Elaterin.

†† **Elaterium.** Elaterin (Brit U-St.) Gabe 0,0015–0,006 g (Brit.) (vergl oben)

† **Pulvis Elaterini compositus** (Brit.)

Compound Powder of Elaterin.

Rp Elaterini 1,0
Sacchari Lactis 88,0

Dosis 0,06–0,20

Trituratio Elaterini (U-St.)

Trituration of Elaterin.

Rp Elaterini 1,0
Sacchari Lactis 9,0

Elaeis.

Gattung der **Palmae** — **Ceroxyllinae** — **Elaeinae**.

1 **Elaeis guineensis** L. Vielleicht in Südamerika heimisch, gegenwärtig durch die Kultur in den Tropen und besonders in Afrika weit verbreitet.

Verwendung findet das Oel des Mesocarps der Früchte und das des Endosperms der Samen.

a) Das Oel des Mesocarps **Oleum Palmae** **Palmfett**. **Palmbutter** — **Beurre ou huile de palme**. — **Palm oil**. Frisch gepresst ist es butterartig, gelb bis röthlichgelb, von schwachem Veilchengengeruch, an der Luft bleicht der Farbstoff bald aus. Das Mesocarp enthält 48,5 Proc Fett. Konstanten des Oeles spec. Gew bei 15° C = 0,945, bei 50° C = 0,8930, spec. Gew der Fettsäuren bei 100° C = 0,8701, Schmelzpunkt des Fettes nach Alter und Herkunft verschieden 27° C bis 42,5° C. Schmelzpunkt der Fettsäuren 47,75° C. Erstarrungspunkt derselben 44,13° C. HENNER'sche Zahl 95,6. Verseifungszahl 202,0. Verseifungszahl der Fettsäuren 207,0. REICHERT'sche Zahl 0,5. Jodzahl 51,0–52,4. Jodzahl der Fettsäuren 53,4.

Bestandtheile. Viel freie Fettsäuren, in frischem Oel 12 Proc., in alterem 50 Proc., in ganz altem 100 Proc., ferner Palmitin und Olein. Bemerkenswerth ist der Gehalt an einem Lipochrom, auf dessen Gegenwart charakteristische Reaktionen beruhen. Chlorzink färbt das geschmolzene Fett grün, Schwefelsäure färbt blaugrün, Mercurnitrat färbt gelb, dann grün.

b) Das Oel des Endosperms **Palmkernöl** — **Huile de pépin de palme**. — **Palm seeds oil**. **Palm kernel oil**. Es wird vielfach aus den Kernen in Europa gepresst. Sie enthalten davon 23,4 Proc. Es ist weissgelblich oder braun, von angenehmem Geruch und Geschmack. Konstanten des Oeles spec. Gew bei 15° C = 0,952, bei 79° C = 0,8731. Schmelzpunkt des Fettes 23–28° C. Erstarrungspunkt 20,5. Schmelzpunkt der Fettsäuren 25–28,5° C. Verseifungszahl des Fettes 247,6, der Fettsäuren 258–265. Jodzahl 10,3–17,5.

Bestandtheile. Etwa 26 Proc Olein, 33 Proc Stearin, Palmitin und Myristin, etwa 44 Proc Glycende der Laurinsäure, Caprinsäure, Caprylsäure und Capronsäure

Verwendung. Wie Kokosöl. Die Pressrückstände der Samen werden als Viehfutter benutzt, sie enthalten 16,1 Proc Rohprotein, 10,98 Proc Rohfett, 37,85 Proc stickstofffreie Extraktstoffe. Sie dienen auch zur Verfälschung des gemahlenen Pfeffers, man unterscheidet sie hier leicht von dem ähnlich gebauten Endosperm der Kokospalme durch die etwas stärker und knotig verdickten und sehr deutlich getupfelten Zellwände. Die Zellen enthalten ebenfalls grosse Aleuronkörner und Reste von Fett.

II Elaeis melanococca Garin Heimisch in Mittel- und Sudamerika. Aus dem Mesocarp gewinnt man ebenfalls ein Fett von talgartiger Konsistenz. Es ist von dunkelrother Farbe.

Elemi.

Elemi (Ergänzb. Helv. Austr.) Gumm. s. Resina Elemi Balsamum caucum — Elemi Elemiharz Oelbaumharz ¹⁾ — Elemi (Gall)

Mit dem Namen Elemi bezeichnet man eine ganze Anzahl verschiedener, wohl meist von Burseraceen stammender Harze.

a) Amerikanisches Elemi von **Icica- und Amyris-Arten**. In den Handel kommt zuweilen mexikanisches Elemi von **Amyris elemifera Royle** und Yucatan-Elemi von **Amyris Plumieri DC** und andere Arten. Beide Sorten sind hart. Dahin gehört ein neuerdings vom **Protium heptaphyllum March** in den Handel gekommenes weiches Elemi, von grauer Farbe und fenchelartigem Geruch. Es enthält 7,3 Proc. ätherisches Öl.

b) Ostindisches Elemi von **Canarium-Arten** bildet harte Stücke von schwarzem Geruch.

c) Bengalisches Elemi, angeblich von **Amyris Agallocha Roxb** und **Bala modendron Roxbourghii Arn**, ein weiches, weisses Harz.

d) Neu-Guinea-Elemi, angeblich von **Canarium-Arten**, bildet harte, gelblich-weiße Stücke.

e) Mauritius-Elemi von **Colophonia Mauritiana DC**, welches Harz, dem folgenden ähnlich.

f) Manila-Elemi oder Philippinisches Elemi, auf der Insel Luzon gesammelt. Die einzige, gegenwärtig in grösserer Menge in den Handel gelangende und nach den oben genannten Arzneibüchern officinelle Sorte. Gall und Helv. nennen mit einiger Reserve als Stammpflanze **Canarium commune L.**, Austr. die Gattung **Canarium** überhaupt. Wahrscheinlich ist die Ableitung falsch, da das Harz von Canarium fest ist.

Beschreibung. Es bildet eine weiche, teig- oder terpentinartige, gelblich-weiße oder grünliche Masse von körnig-krystallinischer Beschaffenheit, mit vielen Pflanzen- und Kohlenpartikelchen untermischt. Geruch an Fenchel erinnernd, Geschmack gewürzhaft und etwas bitterlich. Bei längerer Aufbewahrung wird das Elemi allmählich fester und nimmt eine mehr gelbe oder bräunliche Farbe an. In Chloroform bei gewöhnlicher Temperatur, in Alkohol, Aether und Benzol beim Erwärmen löslich, in Petroläther unvollständig löslich. Spec. Gew. 1,02—1,08.

Bestandtheile. 30 Proc. ätherisches Öl, 20—25 Proc. Amyrin (α -Amyrin Schmelzpunkt 180—181° C und β -Amyrin Schmelzpunkt 193—194° C, beide Amyrine sind Triterpenalkohole der Formel $C_{30}H_{48}OH$), ferner eine krystallisirbare Säure Elemisäure $C_{28}H_{46}O_4$, zwei andere, krystallinische Körper, die in Wasser löslich sind, Bryoidin

¹⁾ Man nahm früher an, dass das Elemi ein Sekret des wilden Oelbaumes sei.

$C_{30}H_{48}O_2$ und Breidin und einen Bitterstoff Die Hauptmenge bildet ein in Alkohol lösliches, amorphes Harz

Das ätherische Oel **Oleum Elemi** — **Elemiol**. — **Essence d'Elemi** — **Oil of Elemi** ist farblos oder hellgelb Spec Gew 0,87—0,91 Es dreht (100 mm-Rohr) + 44° 3' Es enthält d- Phellandren, Dipenten, Polyterpene und sauerstoffhaltige Antheile

Aufbewahrung In gut verschlossenen Blechgefäßen

Anwendung In der Pharmazie zur Bereitung reizender Salben, in der Technik zu Firnissen Aeusserlich wirkt es wie Terpentin, doch milder

Elemi depuratum s. expurgatum. Résine élémi purifiée (Gall) Man schmilzt Elemi bei gelinder Wärme und seigt durch Leinwand Dieses gereinigte Elemi ist gewöhnlich etwas dunkler gefärbt

Unguentum Elemi (Erganzb Helv) **Balsamum Arcae** **Unguentum Arcae** — **Elemisalbe** **Arcaealbe** **Arcaesalbe** (volkstümlich A-B-C-Balsam) — **Onguent d'Arcaeus** (Gall) **Baume d'Arcaeus** **Erganzb Helv** Elemi, Lärchenterpentin, Hammeltalg¹⁾, Schweineschmalz¹⁾ ää Gall 200 Hammeltalg, 150 Elemi, 150 Lärchenterpentin, 100 Schweinefett

Balsamum Arcae liquidum
Rp Unguenti Elemi 30,0
Olei Petras 70,0
Bei gelinder Wärme schmelzen und kühnühren.

Balsamum vulnerarium Hollandorum
Holländischer Wundbalsam
Rp Elemi 20,0
Cerae flavae 5,0
Terebinth laricina 35,0
Olei Hyperici 40,0

Emplastrum glutians
Empl ad clavos pedum Delacroix.
Emplâtre D'André de la Croix
Rp Elemi 25,0
Resinae Pini 100,0
Terebinth laricinae
Olei Lauri express ää 12,5

Auf Taffet gestrichen gegen Hühneraugen.

Emplastrum glutians odoratum
Wohriechendes Heftpflaster

Rp Elemi depurata 20,0
Colophonii flavi 30,0
Cerae flavae siccae 10,0
Terebinth laricinae 5,0
Man schmilzt und fügt hinzu
Vanillin 0,1
Olei Bergamottae
Olei Cauri ää 1,0

Unguentum Elemi rubrum
Rother Arcaealbe
Rp Unguenti Elemi 95,0
Boli Armenae isegigatae 5,0

BARNLEY's Pferdehufsalbe, das Spalten der Hufe zu vermindern, besteht aus 2 Elemi, 1 Talg, 1 Rübol

CASPAR MENET's Bruchpflaster. Ein mit einer Masse aus Wachs, Terpentin und Elemi bestrichenen, mit Gaze bedecktes Papier

Psilothrum von E JACOBSEN, ein Enthaarungsmittel, enthält 8 Th Kolophonum, 40 Th Elemi, 10 Th Benzoe, 10 Th Wachs, 30 Th Bleipflaster

Emplastrum.

Emplastrum, Pflaster, Emplâtre, Plaster. Ueber die Darstellung, das Formen, Anstreichen, Streichen und Aufbewahren der Pflaster ist alles Erforderliche in dem Kom mentar von HAGER-FISCHER-HARTWICH, II Aufl, S 605 u f gesagt, ferner in HAGER's Technik der Pharmaceutischen Receptur V Aufl S 302 u f — Dagegen ist es erforderlich, die neue Pflasterform der Collempластира zu besprechen.

Collempластира Der Name „Collempластира“, aus Colla = Leim und Emplastrum = Pflaster entstanden, ist eigentlich nicht glücklich gewählt, da gerade die Kautschukpflaster gegen Wasser beständig sind und gerade die entgegengesetzten Eigenschaften eines Leimes — die Klebkraft ausgenommen — besitzen Während die URNA'schen Leimkompositionen, die DIERERICH'schen Colligamina und Glutektone gerade durch ihre Wasserlöslichkeit, überhaupt dadurch wirksam sind, dass sie sich auf der Wunde verflüssigen,

¹⁾ Helv lässt tierische Fette nur benzinirt verwenden Vergl Adeps benzinatus S 159

scheint bei den Collemplastra besonders der hermetische Verschluss, die vollkommene Unlöslichkeit der Kautschukmasse, die Beliebtheit dieser Formen zu erklären. Allerdings darf hierbei nicht unerwähnt bleiben, dass trotz des ausserordentlichen Konsums der Collemplastra, trotz ihrer Beliebtheit, das heutige Streben der Aerzte dahin geht, hermetische Verschlüsse der Wunden möglichst zu vermeiden. Jedenfalls aber hat die Praxis gezeigt, dass die Collemplastra — ursprünglich in Amerika hergestellt — einen grossen technischen Fortschritt bedeuten und zwar schon deshalb, weil sie eine aussergewöhnliche Klebkraft besitzen und mit verhältnissmässig grossen Mengen Medikamenten versetzt werden können. In dieser Eigenschaft nähern sie sich den Guttaperchaplastermullen, welche so ziemlich von allen Verband- und ausserlichen Stoffen die grössten Mengen an Medikamenten inkorporirt enthalten. Seit der Einführung der Collemplastra ist der Verbrauch an den Emplastra entschieden zurückgegangen.

Formen. Die Collemplastra sind nicht nur in endlosen 20 cm breiten Rollen, sondern auch in Bandform und — was die praktischste Form ist, in Spulenform im Handel. Gerade letztere Form verdient deshalb Erwähnung, weil sie sich für den Arzt zum bequemen Mitnehmen eignet. Meist ist das Collemplastrum auf Shirting gestrichen, es kommen aber auch andere Grundlagen vor. Während früher vor allem das amerikanische Kautschukpflaster direct auf Wunden Nebenwirkungen zeigte, sind die neueren deutschen Fabrikate geeignet, als reizloses, antiseptisches Kautschukpflaster direct auf Wunden gelegt zu werden.

Darstellung. Zur Herstellung eines guten, namentlich lange Zeit haltbaren Kautschukpflasters bedarf es vor allem eines prima Para Kautschuk. Andere, besonders minder werthige Kautschuke, wie Madagaskar-Kautschuk, liefern wohl ein schönes Präparat, können aber keine Garantie für Haltbarkeit gewähren. Zur Herstellung verwendet man am besten eine atherische Kautschuklösung, die mit noch anderen Ingredientien wie Harzöl, Copaivabalsam, Wachs, Terpentin, Kolophon etc. vermischt wird und nur noch als Grundmasse mit weiteren Zusätzen, wie Mehl, Harzöl, Aether und Medikamenten versetzt zu werden braucht, um eine weiche, schmierige Masse zu liefern, die nicht erst, wie bei den Pflastern geschmolzen werden braucht, sondern die in einer Kastenstreichmaschine direct gestrichen werden kann. (Siehe *Massa Collemplastrum*, seu *Corpus ad collemplastrum* S. 682.) Als Stoff zum Streichen wählt man ein recht dichtgeschlossenes Gewebe. Das fertige Kautschukpflaster wird dann auf Hürden gelegt, die mit Stoff bezogen sind, um das Abdunsten des Kautschukpflasters auch noch zu ermöglichen, und dann nach Belegen mit Gaze eingerollt. Die Herstellung des Kautschukpflasters durch Aufwalzen des heissgemachten Kautschuks auf den Stoff — wie es merkwürdigerweise von Amerika gesagt wird — ist eine weder lukrative noch rationelle Methode, die diesbezüglichen Angaben dürften wohl auf falschen Berichten beruhen und cum grano salis aufzunehmen sein.

Die Konsistenz des Kautschukpflasters, seine Klebkraft etc. ist auch noch abhängig von dem Feinheitsgrad der Pulver. Man verfährt genau nach den bekannten Vorschriften, von denen die E. DITTMER'schen (*Pharm. Manual*, VII. Auflage, pag. 70 u. fig.) empfehlenswerth sind.

Vor der Verwendung von Kohlenwasserstoffen (Benzin etc.) ist zu warnen, weil dieses, ebenso wie Schwefelkohlenstoff, zersetzend und verändernd auf den zum Pflaster verwendeten Kautschuk wirkt und ein nur kurze Zeit haltbares Präparat liefert.

Emulsio.

Emulsio (Austr. Germ. Helv.) **Emulsion** (Gall.) **Emulsum** (engl.) Ueber die verschiedenen Arten der Emulsionen und die Technik ihrer Darstellung vergl. Kommentar zum deutschen Arzneibuche von HAGER-FISCHER-HARTWIG, II. Aufl. Bd. I, S. 623 u. fig., sowie HAGER's Technik der pharmaceutischen Rezeptur. Bezüglich der von den einzelnen

Pharmakopoen gegebenen allgemeinen Anweisungen ist zu bemerken, dass Brit u U St solche überhaupt nicht geben. In den übrigen Pharmakopoen sind folgende Bestimmungen enthalten:

Austr. Samenemulsionen bereitet man in der Regel so, dass von 1 Th des zerstoßenen Samens mit der erforderlichen Menge destillierten Wassers = 10 Th Kolatur erhalten werden.

Oelemulsionen sind zu bereiten aus Oel 5 Th, arabischem Gummi 2,5 Th, Wasser 92,5 Th.

Germ Samenemulsionen werden, wenn nicht andere Verhältnisse vorgeschrieben sind, so bereitet, dass von 1 Th Samen = 10 Th Kolatur bereitet werden.

Oelemulsionen werden, wenn nicht andere Verhältnisse vorgeschrieben sind, bereitet aus Oel 10 Th, arabischem Gummi 5 Th, destilliertem Wasser 85 Th.

Wird *Emulsio oleosa* verordnet, so ist diese aus Mandelöl zu bereiten.

Helv. Bezüglich der Samenemulsionen und Oelemulsionen (einschliesslich der *Emulsio oleosa*) gelten die gleichen Vorschriften wie in der Germ.

Gummiharzemulsionen werden bereitet aus Gummiharz 10,0 Th (welches mit sehr wenig Mandelöl feingerieben ist), arabischem Gummi 10,0 Th, Wasser von 50° C = 80,0 Th.

Gall giebt keine eigentlichen allgemeinen Anweisungen. Dagegen giebt sie für *Emulsio Amygdalarum* folgende Vorschrift: *Amygdalarum excoctitatum*, Sacchari $\bar{a}\bar{a}$ 50,0, Aquae 1000,0. In gleicher Weise sind zu bereiten *Emulsio Amygdalarum amararum*, *Emulsio Cannabis* und *Emulsio Pistaciae*.

Sie giebt ferner für *Emulsio Balsami tolutani* folgende Vorschrift: *Balsami tolutani* 20,0, Spiritus (90 Proc.), Tincturae Quillajae $\bar{a}\bar{a}$ 100,0, Aquae tepidae 780,0. In gleicher Weise sind zu bereiten *Emulsio Balsami Copaivae*, *Emulsio Olei Cadini* und *Emulsio Picis*.

Es versteht sich von selbst, dass die allgemeinen Anweisungen bezüglich der Mengenverhältnisse, wie sie Austr., Germ. u. Helv. geben, sich nur auf nicht starkwirkende Samen und Oele, nicht aber auf starkwirkende (z. B. Samen Hyoscyami, Olenum Crotonis u. a. m.) beziehen.

Emulsio Olei Jecoris dextrinata
Dextrin-Emulsion of Cod Liver Oil
(Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	500 ccm
	Mucilaginis Dextrini	825 ccm
	Sirupi tolutani	125 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	$\bar{a}\bar{a}$ q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Jecoris
Emulsio Olei Morrhuae (Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	464,0 g
	Gummi arabi pulv	116,0 g
	Sirupi tolutani	100,0 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	$\bar{a}\bar{a}$ q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Jecoris cum
Calcio phosphorico (Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	464,0 g
	Gummi arabici	116,0 g
	Calcii phosphorici	85,0 g
	Sirupi tolutani	100,0 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	$\bar{a}\bar{a}$ q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Jecoris cum Calcio Lacto-
phosphorico (Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	464,0 g
	Gummi arabici	116,0 g
	Calcii lactici	85,0 g
	Acidi phosphorici (85 Proc.)	80,0 g
	Sirupi tolutani	100,0 g
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae destillatae	$\bar{a}\bar{a}$ q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Jecoris cum Calcio et Natrio
phosphorico (Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	464,0 g
	Gummi arabici	116,0 g
	Calcii phosphorici	
	Natrii phosphorici	$\bar{a}\bar{a}$ 175 g
	Sirupi tolutani	100,0 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	$\bar{a}\bar{a}$ q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Jecoris cum Extracto Malti
(Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	500,0 ccm
	Mucilaginis Dextrini	125,0 ccm
	Extracti Malti	875,0 ccm

¹⁾ Unter „Flavoring“ versteht das Nat. Form ein Geschmackscongruens. Und zwar empfiehlt es auf 1 Liter der fertigen Emulsion je nach Geschmack eins der folgenden ungefähr in den hier angegebenen Mengen zuzusetzen: 1) Olei Gaultheriae 4 ccm, 2) Olei Gaultheriae, Olei Sassafras $\bar{a}\bar{a}$ 2,0 ccm, 3) Spiritus Auranti compositi (U St.), s. 9 S53 1,5 ccm, 4) Olei Gaultheriae 2,0 ccm, Olei Amygdalarum amararum aetheri, Olei Cornu-dri $\bar{a}\bar{a}$ 0,25 ccm, 5) Olei Gaultheriae, Olei Sassafras $\bar{a}\bar{a}$ 1,5 ccm, Olei Amygdalarum amararum aetheri 0,25 ccm, 6) Olei Gaultheriae, Olei Amygdalarum amararum aetheri $\bar{a}\bar{a}$ 2,5 ccm, 7) Olei Neroli, Olei Amygdalarum amararum aetheri $\bar{a}\bar{a}$ 1,5 ccm, Olei Caryo-phyllorum 0,25 ccm.

Emulsio Olei Jecoris cum Hypophosphitibus
(Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	464,0 g
	Gummi arabici	118,0 g
	Salis hypophosphorosi solubilis	
	cujuslibet	17,5 g
	Sirupi tolutani	100,0 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Jecoris cum Fructu Virginianae

Rp	Olei Jecoris	464,0 g
	Gummi arabici	118,0 g
	Extracti Fructu Virginiani fluidi	65,0 ccm
	Sirupi tolutani	100,0 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	aa q s ad 1 Liter

Emulsio Olei Ricini (Nat. Form)

Rp	Olei Ricini	32,0 g
	Gummi arabici	8,0 g
	Tincturae Vanillae	2,5 ccm
	Sirupi Sacchari	20,0 ccm
	Aquae	q s ad 100,0 ccm

Emulsio Olei Terebinthinae (Nat. Form)

Rp	Olei Terebinthinae	12,5 ccm
	Gummi arabici	2,0 g
	Vitelli ovi	15,0 ccm
	Elixir aromatica (U-St)	15,0 ccm
	Aquae Cinnamomi	q s ad 100,0 ccm

Emulsio Olei Terebinthinae fortior (Nat. Form)

Rp	Olei Terebinthinae	50,0 ccm
	Gummi arabici	2,5 ccm
	Aquae	50,0 ccm

Emulsio phosphatica (Nat. form)

Rp	Olei Jecoris	250,0 ccm
	Glyceriti Vitelli	180,0 g
	Acidi phosphorici diluti (10 Proc)	50,0 ccm
	Olei Amygdalarum amararum	
	aetherel	15 ccm
	Ram	250,0 ccm
	Aquae Anranti florum	q s ad 1 Liter

Glyceola Emulsio Olei Jecoris (Nat. Form)

Rp	Olei Jecoris	500,0 ccm
	Glyceriti Vitelli	175,0 ccm
	Sirupi tolutani	100,0 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	aa q s ad 1 Liter

Quillaja Emulsio Olei Jecoris

Rp	Olei Jecoris	500 ccm
	Tincturae Quillajae	60 ccm
	Sirupi tolutani	100 ccm
	Flavoring ¹⁾	
	Aquae	aa q s ad 1 Liter

Ephedra.

Gattung der Gnetaeaceae.

I Ephedra vulgaris Rich (syn *E. monostachya* L., *E. distachya* L., *E. helvetica* C. A. Meyer) Heimisch im Mittelmeergebiet und Orient bis zum Himalaya, nördlich bis ins Wallis, Tirol und Ungarn. Die oberirdischen vegetativen Theile der Pflanze sind ein altes Mittel gegen Diarrhoe, die Früchte (*Amenta Uvae marinae*) verwendete man gegen Fieber. Neuerdings ist die Pflanze als Mittel gegen akuten und chronischen Rheumatismus empfohlen worden, hat aber mit Ausnahme von Russland wenig Verbreitung gefunden, da sie gegen andere, genauer bekannte Mittel zweifellos zurücksteht.

Bestandtheile Der die Wirkung bedingende Stoff ist das Alkaloid Ephedrin $C_{10}H_{15}NO$. Man entzieht es dem weingeistigen Extrakt der Droge nach Zusatz von Alkali mit Aether. Durch Ueberführung in das gut krystallisirende Chlorhydrat wird es gereinigt. Letzteres schmilzt bei $216^{\circ}C$ und ist in Wasser leicht löslich. Das reine Alkaloid ist in Alkohol, Aether und Wasser leicht löslich, es schmilzt bei $210^{\circ}C$. Es schmeckt bitter, adstringirend und wirkt stark giftig mydriatisch. Daneben kommt ein zweites Alkaloid Pseudoephedrin $C_{10}H_{15}NO$ vor, das bei $115^{\circ}C$, dessen Chlorhydrat bei $174^{\circ}C$ schmilzt, es ist dem vorigen im übrigen, auch bezüglich der Wirkung, sehr ähnlich. Ein drittes, ebenfalls als Ephedrin bezeichnetes Alkaloid soll die Zusammensetzung $C_{11}H_{19}NO$ haben, Schmelzpunkt $112^{\circ}C$, der des Chlorhydrats $207^{\circ}C$. Seine Wirkung ist sehr schwach. Ausserdem enthält die Pflanze einen oder mehrere Körper, die dem Phytosterin ähnlich sind und Bronzkatechin. Asche des Krautes 5,10 Proc., der Wurzel 4,09 Proc.

II. Ephedra andina Poeppig In Peru und auch sonst auf den Anden Südamerikas. Namen *Pingo Pingo* und *Pinco-Pinco*. Verwendung finden die Wurzeln gegen Steinleiden. Sie sind 5 mm dick und dicker, mit einer hellbraunen, blattrigen Rinde bedeckt. Querschnitt zierlich gestreift. Unter der Rinde die karmirothe Rinde. Das Holz gelb.

¹⁾ Siehe Fussnote auf voriger Seite

In der Rinde stark verdickte, lange unverholzte Fasern und eigenthümlich gestaltete Idio-
blasten Das Holz mit echten Gefässen

III Andere Arten **Ephedra Ariana** Tel In Brasilien Namen **Fragaria do campo**, **Morango do campo** Die Früchte verwendet man gegen Fieber **E trifurcata** Torr an der Südküste der Vereinigten Staaten Namen **Canutillo** Mittel gegen Gonorrhoe **E antisyphilitica** C A Mey In den westlichen Vereinigten Staaten Namen **Bigum weed**, **Mormon tea**, **Mountain rush** Mittel gegen Gonorrhoe und Syphilis **Ephedra fragilis** Desf Im östlichen Mittelmeergebiet Mittel gegen Hamorrhoiden

Equisetum.

Einzige Gattung der Equisetaceae

Die oberirdischen Theile von **Equisetum hiemale** L und **Equisetum arvense** L fanden früher als diuretische Mittel Verwendung, sind aber völlig in die anscheinend wohlverdiente Vergessenheit gerathen **Equisetum hiemale** L wird in den Vereinigten Staaten als Adjuvans der Digitalis verwendet Neuerdings haben sie Aufnahme gefunden in den Arzneischatz Pfarrer Kneipps

Wassersuchthee, Pfarrer KNEIPP's Herba Equiseti 40,0, Fruct Cynosbati 20,0, Fol Rosmarini, Rad Sambuci, Lign Sassafras aa 10,0, Fol Rutae, Fol Thifolii sbr, Fol Uvae Ursi, Viscum album, Lign Santali, Fruct Juniperi aa 5,0

Equisetum ramosum verwendet man in der Mandschurei bei Augenentzündungen und als Adstringens

Einige Arten enthalten Aconitsäure $C_6H_6O_6$, daher früher als Equisetsäure bezeichnet **Equisetum hiemale** L enthält 1,4 Proc fettes Oel und 5,8 Proc eines Weichharzes

Die Verwendung der kiesel-säurereichen Pflanzen zum Scheuern von Metallgeschirr (daher Zinnkraut) und zum Glätten oder Schuchteln des Holzes (daher Schachtelalm) ist bekannt

Eriodictyon.

Gattung der Hydrophyllaceae-Nameae

Eriodictyon glutinosum Benth Heumisch in Kalifornien Yerba santa Saint herb Mountain peach Unter demselben Namen werden auch die Blätter von **E tomentosum** Benth und **E angustifolium** Nutt verwendet

Beschreibung Die Blätter der erstgenannten Art sind lanzettförmig, bis 10 cm lang, 1—1,5 cm breit, am Rande geschwefelt-gezähnt, kurzgestielt, ledrig Obenseits sind sie grün, unterseits silberweiss, beim Zerreiben riechen sie aromatisch, sie schmecken schwach adstringierend und schleimig

Der Querschnitt lässt beiderseits die Epidermis mit dicker, gefalteter Cuticula erkennen Spaltöffnungen nur auf der Unterseite Unter der Oberseite eine Reihe langer, gefächerter Palissaden, die Oxalatkrystalle enthalten sollen (von uns nicht gefunden) Schwammparenchym schmal Auf beiden Seiten Drüsenhaare vom Bau der Labiatendrüse Die Nerven ragen auf der Unterseite sehr stark hervor, die dadurch entstehenden „Zellen“ sind dicht mit dickwandigen, geschlangelten Haaren erfüllt Die Blätter sind von ausgetrocknetem Harz und Oel klebrig, die in der Droge befindlichen Stengeltheile sind direkt mit einer Harzschicht überzogen

Bestandtheile Eine eigenthümliche Säure Eriodictyonsäure zu 2,4 Proc, Ericolin, ein in Wasser löslicher Bitterstoff, zwei Harze, von denen das eine in

Alkohol, das andere in Aether (zu 9 Proc) löslich ist, Gummi, ein glukosidischer Gerbstoff, ätherisches und fettes Öl

Anwendung. Man verwendet die Blätter in Amerika bei entzündlichen Krankheiten der Athmungsorgane, besonders Bronchialkatarrh, am liebsten in Form des Fluid extraktes — Viel besprochen ist die Fähigkeit der Blätter, die Geschmacksempfindung für „bitter“ aufzuheben. Sie besitzen diese Fähigkeit nur in sehr geringem Maasse (vergl. Gymnema)

Sirupus Eriodictyi		Sirupus Eriodictyi aromaticus (Nat. Form)	
Rp	Extr. fluid. Eriodictyi	83	28
	Magnesia aëstae		1
	Aquae destillatae		15
	Sacchari		28
F l a sirupus			
	Extr. fluid. Eriodictyi	83	28
	Magnesia aëstae		1
	Aquae destillatae		15
	Sacchari		28
	Extr. fluid. Eriodictyi	83	28
	Magnesia aëstae		1
	Aquae destillatae		15
	Sacchari		28

Extractum Eriodictyi fluidum (U St). Extractum Yerba santa Aus 1000 g gepulverten Blättern (Nr 60) und q s einer Mischung von 800 cem Weingeist (91 proc) und 200 cem Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 400 cem, sammelt zuerst 900 cem und verfährt weiter, so dass man lege artis 1000 cem Fluidextrakt erhält

Extractum Santa fluidum, von Eriod. Californicum DCne, wird zu 1—4 cem mehrmals täglich gegen chronischen Husten und Blasenkatarrh angewendet

Eryngium.

Gattung der Umbelliferae — Saniculoideneae — Saniculeneae.

I Eryngium campestre L. Mannstreu, Biachdistel — Panicaut — Chardon Roland. Heimisch in einem grossen Theile Europas, Nordafrika, südliches Sibirien.

Verwendung findet die Wurzel Radix Eryngii s. Eryngii s. Acus Veneris. — Racine de Panicaut (Gall.)

Beschreibung. Bildet 10—15 cm lange, 5—10 mm dicke Stütcke, die aussen* grau, runzelig, hockrig sind. Die Rinde ist schwammig blattrig, das Holz strahlig. Im Holz und in der Rinde findet sich Oxalat, in der Rinde Rhomboide und Drusen, im Holz Drusen.

Verwendung. Als Diureticum

II Als Diureticum und Sudoricum verwendet man in Nordamerika **E. aquaticum L.** als Fiebermittel und gegen Schlangenbiss, **E. foetidum L.**, in Cayenne und Jamaica, endlich als die Milchsekretion hemmendes Mittel **E. maritimum L.**

Erythritum.

Erythrit, Erythrol, Erythromannit, Erythroglucin, Phyeit, C₄H₈(OH)₄, Mol. Gew. = 122. Diese dem Glycerin und Mannit nahestehende Verbindung wird aus dem in verschiedenen Flechten vorkommenden „Erythrin“ durch Einwirkung von Basen gewonnen. Man extrahirt die Flechten (Roccella tinctoria DC, Roccella fuciformis Ach) kalt mit verdünnter Kalkmilch, filtrirt und fällt aus dem Filtrat mit Salzsäure das Erythrin. Der gallertartige Niederschlag wird gut gewaschen und einige Stunden hindurch mit Kalkmilch gekocht. Man filtrirt, fällt den gelösten Kalk durch Einleiten von Kohlensäure und dampft zum Sirup ein, den man mit Sand vermischt und entrocknet. Durch Extraktion des Rückstandes mit Aether wird zunächst Orcin entzogen. Alsdann zieht man mit

Wasser aus, füllt die konc Lösung mit Alkohol, löst den Niederschlag nochmals in Wasser, entfärbt mit Thierkohle und lässt krystallisiren

Quadratische Prismen von süssem Geschmack, sehr leicht löslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol, unlöslich in Aether. Sie schmelzen bei 126° C und siedend unter theil weiser Zersetzung bei etwa 330° C. Spec. Gew. = 1,451. Die Lösungen sind optisch inaktiv. Mit Hefe nicht vergährbar. Wird therapeutisch nicht verwendet.

† **Erythritum tetranitricum** Erythrolum tetranitricum. Nitro-Erythrit Nitro-Erythriomanit Erythrolnitrat $C_4H_6(NO_3)_4$ Mol. Gew. = 302

Zur Darstellung trägt man Erythrit in abgekühlte (!) rauchende Salpetersäure ein. Nachdem Auflösung erfolgt ist, lässt man kurze Zeit stehen und setzt zur Lösung ein gleiches Volumen konc Schwefelsäure, wodurch die Verbindung ausgefällt wird. Man krystallisiert sie aus siedendem Wasser oder aus Alkohol um. Aus Alkohol krystallisiren farblose, grosse Krystallblätter, unlöslich in kaltem Wasser, löslich in siedendem Wasser und in Alkohol. Schmelzpunkt 61° C. Sie explodiren durch Druck und Schlag, daher Vorsicht. Ihrer Konstitution nach ist die Verbindung ein Salpetersäureester des Erythrits, „Erythroltetranitrat“.

Man giebt das Präparat bei Angina pectoris, Asthma, Herzkrankheiten, chronischer Nierenentzündung in alkoholischer Lösung (1:60) und zwar in Gaben von 0,03—0,06 g. Vorsichtig aufzubewahren.

Erythrophloeum.

Gattung der Caesalpinaceae — Dimorphanthaceae

I Erythrophloeum guineense P. Don Red-water-tree, Manéne, Bonvane des floupes. Heimisch in Sierra Leone. Verwendung findet die Rinde Cortex Erythrophloeif. — Muncône-, Tali-, Sassy-Rinde. — Casca bark, Saxon bark, Boom bark.

Beschreibung. Etwa 1 cm dicke Stücke, aussen matt zimtbraun, unregelmässig längsrisig und quergerunzelt, innen schwärzlich. Auf dem Querschnitt erkennt man in der dunkelbraunen Grundmasse kleine, heller gefärbte Punkte, die gegen die Innenrinde durch eine ebenfalls heller gefärbte Zone abgegrenzt werden. In der Innenrinde die Punkte besonders zahlreich und gross. Die hellen Punkte werden gebildet von Gruppen stark verdickter poröser Steinzellen, ausser diesen in der Innenrinde vereinzelte Fasern. In einzelnen Zellen grosse Oxalatkristalle. Der Weichbast ist aus Parenchym und zusammengefallenen Siebröhren geschichtet. Die Markstrahlen 1—2 Zellreihen breit. Im Parenchym starke und rothbraune Inhalt, der mit concentrirter Schwefelsäure schon roth wird.

Bestandtheile. Ein Alkaloid Erythrophloein $C_{20}H_{27}N_3O_2$ (?), bildet einen dicken hellen Sirup, auch die Salze sollen nur in Sirupform erhalten werden. Schwefelsäure löst mit gelber Farbe, später wird die Lösung am Rande rosa und grün. Froehde's Reagens löst mit grüner Farbe, mit Schwefelsäure und Kaliumpermanganat wird es vorübergehend violett. Leicht löslich in Alkohol und Essigäther, wenig in Aether und Chloroform. Beim Kochen mit Säuren und Alkalien liefert es stickstofffreie Erythrophloeinsäure und Manconin, einen dem Pyridin ähnlichen Körper.

Anwendung. In der Heimath der Pflanze dient die Rinde als Gifttrank bei Gottesurtheilen, wahrscheinlich auch als Pfeilgift. Bei uns als lokales Anästhetikum angewendet, nach anderer Ansicht soll die Wirkung eine lähmende sein. Das Alkaloid ist ein Herzgift, es zeigt Digitalinwirkung, erinnert sie aber auch an die des Pikrotoxins. — Die geringe Aufnahme, die das Alkaloid gefunden hat, ist mit darauf zu schieben, dass zweifellos verschiedene Rinden auf Erythrophloein verarbeitet werden. Ein später in den Handel gekommenes Erythrophloein hydrochloric ist ein hellgelbes, amorphes Salz,

das reine Digitalinwirkung hat. Die Zusammensetzung dieses neuen Alkaloids wird an gegeben als $C_{25}H_{43}NO_7$ oder $C_{25}H_{43}NO_7$, es liefert mit Säuren eine vielleicht mit der Erythrophloeinsäure identische Säure und Methylamin.

Als Lieferanten der Rinde werden auch genannt **E. Coumango Baill**, von den Seychellen, **E. Adansonii (?)** aus Afrika, **E. chlorostachys Hennings** aus Australien und **E. Fordii Oliv.** aus China.

Eschscholtzia.

Gattung der Papaveraceae — Papaveroidae — Eschscholtziaceae.

Eschscholtzia californica Chamisso California Poppy Von Kalifornien bis Neumexiko, bei uns oft als Gartenpflanze kultiviert.

Beschreibung. Kraut mit feinertheilten Blättern und langgestielten, gelben, orangefarbenen oder weissen Blüten. Blütenhülle und Staubblätter auf einer den Fruchtknoten scheidig umgebenden Ausbreitung der Blütenachse schwach perigyn eingefügt, Griffel fädig, Frucht eine septicide Kapsel oder auch die Klappen sich von den Placenten lösend.

Bestandtheile. Alkaloide Protopin $C_{20}H_{17}NO_6$, Chelerythrin $C_{21}H_{17}NO_4$ (vergl. Chelidonium S 725). Die Anwesenheit von Morphin in der Pflanze, die behauptet wurde, hat sich nicht bestätigt.


Anwendung und Wirkung. Die Pflanze gilt als schlafmachendes und schmerzmilderndes Mittel, sie soll im Stande sein, besonders in der Kinderpraxis das Opium zu ersetzen, zumal ihr die unangenehmen Nebenwirkungen des letzteren fehlen sollen. Man verwendet die ganze Pflanze in Dosen von 2–10 g, am liebsten als Fluidextrakt (1–2 ccm), in Pillen oder als Sirup.

Eucainum.

Unter „Eucainen“ versteht man Derivate des γ -Oxy-Methylpiperidins, demnach also Verbindungen, welche enge Beziehungen zum Tropin und zum Cocain haben. Generell hat man Eucaine mit Carboxylgruppen und solche ohne Carboxylgruppen zu unterscheiden. Die ersteren stellen völlige Analoga des Cocains dar.


I † Alpha-Eucaïn **Eucainum hydrochloricum A.** Unter den obigen Namen ist das salzsaure Salz des Benzoyl-n-methyltetramethyl- γ -oxypiperidincarbonsäuremethylesters zu verstehen $C_{29}H_{27}NO_4 \cdot HCl + H_2O$. Mol Gew = 387,5 (D.R.P. 90245).

Darstellung. Die Tetramethyl- γ -oxypiperidincarbonsäure wird aus dem Triacetonamin durch Anlagerung von Cyanwasserstoff und Verseifen des entstandenen Cyanhydrins dargestellt. Von dieser Karbonsäure gelangt man zu dem Eucain-A, indem man den Hydroxylwasserstoff (mittels Benzoylchlorid) durch die Benzoylgruppe und den Carboxyl- und den Imidwasserstoff (durch Einwirkung von Jodmethyl) durch Methyl ersetzt. Die so erhaltene freie Base ist in Wasser schwer löslich, aus Alkohol oder Aether krystallisiert sie in grossen glasglänzenden Prismen vom Schmp $104^\circ C$. — Sie löst sich leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol. Durch Neutralisation der Base mit wässriger Salzsäure erhält man das als „Eucaïn-A“ oder Alpha Eucaïn bezeichnete salzsaure Salz.



Eigenschaften. Das salzsaure Eucaïn-A krystallisiert aus Wasser in glänzenden, luftbeständigen Blättchen oder Tafeln, die 1 Mol. Krystallwasser enthalten und in 11 Th.

Wasser von 15° C zu einer neutralen oder sehr schwach sauren Flüssigkeit löslich sind — Aus der wässrigen Lösung wird durch Ammoniak, atzende und kohlensäure Alkalien die freie Base als klebriger, bald krystallinisch erstarrender Niederschlag gefällt — Beim Erhitzen mit wenig (1) Eisenchloridlösung färbt sich die Lösung des salzsauren Alpha-Eucains vorübergehend gelb und orangeroth (Cocainchlorhydrat verhält sich ebenso) — Fügt man zu



Eucain A.

5 ccm einer 1 procentigen Lösung des Salzes drei Tropfen einer 5 procentigen Chromsäurelösung, so entsteht sogleich ein krystallinischer citronengelber Niederschlag (Salzsaures Cocain giebt unter den gleichen Verhältnissen keinen Niederschlag) — Versetzt man 5 ccm einer 1 procentigen Lösung des Salzes allmählich mit 3 ccm einer 10 procentigen Kaliumjodidlösung, so tritt zunächst Trübung auf, welche vorerst wieder verschwindet, in kurzer Zeit aber geseht die Flüssigkeit zu einem dünnen Krystallbrei farbloser Blättchen von jodwasserstoffsäurem Eucain (Salzsaures Cocain zeigt diese Reaktion nicht) — Die 5 procentige Lösung des Salzes giebt mit conc Kaliumpermanganatlösung (s Cocain) einen krystallinischen, violetten, mit Mercurchlorid einen weissen Niederschlag — Auf Zusatz von Natriumsäurelösung entsteht zunächst eine harzige Ausscheidung, die durch Reiben sehr rasch in weisse Krystalle übergeht — Durch Wasserstoffsuperoxyd wird das salzsaure Eucain-A zersetzt


Prüfung 1) Fällt man aus einer wässrigen Lösung von 0,5 g des Salzes die freie Base durch Zusatz von Ammoniak, schüttelt alsdann mit Aether aus, so soll der Verdampfungsrückstand (die freie Base) nach dem Trocknen im Wasserdampftrockenschranke bei 104—105° C schmelzen 2) 0,1 g des Salzes sollen, auf dem Platinbleche erhitzt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen verbrennen

Aufbewahrung. Vorsicht! **Anwendung.** Das Eucain-A wirkt ebenso wie das Cocainchlorhydrat auf Schleimhäuten anästhesierend, überhaupt überall da anästhesierend, wo es zur Resorption gelangt Man verwendet es daher als lokales Anästheticum zur Anästhesie der Cornea, es bewirkt keine Mydriasis, keine Accomodationsparese und übt keine schädliche Einwirkung auf die Cornea aus Ferner zur Anästhesierung der Nasen- und Rachenschleimhaut, in der zahnärztlichen und urologischen sowie dermatologischen Praxis Zur Verwendung gelangt gewöhnlich die 2procentige Lösung, stärkere Lösungen können bei der Applikation auf die Cornea und bei subkutaner Anwendung reizend wirken — Die Lösungen können sterilisirt werden, ohne dass sie sich zersetzen

Unguentum Alpha Eucaini 10 Proc.		Unguentum Alpha Eucaini cum Mentholo	
Rp	Alpha-Eucaini hydrochlorici 1,0	Rp	Alpha-Eucaini hydrochlorici 1,0
	Olei Olivarum 2,0		Menthol 0,2
	Lanolini 7,0		Olei Olivarum 2,0
			Lanolini 7,0
Zur Erzeugung von Anästhesie auf Schleimhäuten und Wunden (LIEBREICH)		Bei juckenden Hämorrhoiden, Pruritus ani, Pruritus pudendorum	

Nachweis des Alpha-Eucains im Cocain Löst man 1 g Cocainchlorhydrat in 50 ccm Wasser und schüttelt mit 2 Tropfen Ammoniak, so bleibt die Lösung eine Zeit lang klar, während bei Anwesenheit von nur 2 Proc Eucain milchige Trübung eintritt, die erst nach Zusatz von mehr Wasser verschwindet

II ‡ Beta-Eucainum Beta-Eucain. Eucain-B. Eucainum hydrochloricum B. Unter den vorstehenden Namen ist das salzsaure Salz des Benzoylvinylid-acetonalkamins zu verstehen $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NO}_2 \cdot \text{HCl}$ Mol. Gew. = 271,5. DRP 97672 Diese Verbindung ist zu denjenigen Eucainen zu rechnen, welche Carboxylgruppen nicht enthalten



Benzoylvinylid-acetonalkamin.

Darstellung. Vinylidacetonamin, welches durch Einwirkung von Paraldehyd auf Diacetonamin erhalten ist, wird durch Reduktion mittels metallischen Natriums in Vinylidacetonalkamin verwandelt und dieses mit Benzoylchlorid benzoylirt Die freie Base wird alsdann durch Neutralisation mit Salzsäure in das salzsaure Salz verwandelt.

Eigenschaften. Ein farbloses Salzpulver von neutraler oder sehr schwach alkalischer Reaktion. Es löst sich in etwa 20 Th. Wasser von gewöhnlicher Temperatur. Diese Lösung kann gekocht (sterilisiert) werden, ohne dass sie Zersetzung erfährt.

In der 5 procentigen Lösung erfolgt durch Natronlauge, Natriumcarbonatlösung oder Ammoniak eine milchige Ausscheidung der freien Base, welche durch Aether gelöst wird. Durch Mercurchlorid entsteht keine Fällung. Durch Chromsäure entsteht in der Lösung ein pomeranzengelber, amorpher Niederschlag, der sich bald zusammenballt, und in viel Wasser löslich ist, also in sehr verdünnter Lösung überhaupt nicht entsteht. — In konz. Schwefelsäure ist es ohne Färbung löslich, diese Lösung wird auch durch Zugabe von etwas Salpetersäure nicht gefärbt. Mit Kaliumwismutjodid entsteht ein orangegelber, mit Pikrinsäure ein citronengelber und mit Phosphormolybdänsäure ein weisser Niederschlag. FROHDE'S Reagens wird nicht gefärbt. Dampft man eine kleine Menge des Salzes mit Salpetersäure ein, so ist der Rückstand ungefärbt, befeuchtet man denselben mit alkoholischer Kalilauge, so tritt keine Färbung, wohl aber deutlich wahrnehmbarer Geruch nach Benzoesäureäthylester auf.

Aufbewahrung. Vorsichtig. **Anwendung.** Die 2—3 procentige Lösung bewirkt auf Schleimhäute gebiacht oder subkutan injiziert, vollkommene Anästhesie. Die Empfindungslosigkeit der Hornhaut und Bindehaut des Auges tritt sehr schnell ein und dauert 15—20 Minuten. Es ist nur geringe Pupillenerweiterung vorhanden. Davon abgesehen ist das Beta-Eucain nur etwa $\frac{2}{3}$, so giftig als Alpha-Eucain.

Solutio anaesthetica haemostatica LEGRAND

Rp	Gelatinae purae	2,0
	Natrii chlorid	0,7
	Acidi carbonici crist.	0,1
	Beta-Eucain	0,7
	Cocaini hydrochlorid	0,3
	Aquae destillatae q. s. ad 100,0	

Die Lösung kann sterilisiert werden.

Unguentum Beta Eucaini 10 Proo

Rp	Beta Eucaini	1,0
	Olei Olivarum	2,0
	Lanolini	7,0

Bei juckenden Hämorrhoiden, Pruritus ani, Pruritus pudendorum

Unguentum Beta Eucaini cum Mentholo

Rp	Beta Eucaini	1,0
	Mentholi	0,2
	Olei Olivarum	3,0
	Lanolini q. s. ad 10,0	

Eucalyptolum

Eucalyptolum (Erganzb. U. St.) **Eucalyptol** (Gall.) **Eucalyptuskampher** **Cineol** **Cajeputol** **Terpan** $C_{10}H_{18}O$. Mol. Gew. = 154

Dieser, in grösster Menge im ätherischen Oele von *Eucalyptus globulus* LABILL. LARDIERE, aber auch im ätherischen Oele anderer Eucalyptusarten vorkommende, sauerstoffhaltige Körper ist identisch mit dem aus dem Wurmsamenöl abgeschiedenen Cineol, ferner mit dem aus dem Cajeputöl abgeschiedenen Cajeputol, und mit dem Terpan von BOUCARDAT und VOLEY. Er ist übrigens während der letzten 15 Jahre in sehr zahlreichen anderen ätherischen Ölen, u. a. auch im Myrtenöl nachgewiesen worden.

Darstellung. Man kühlt das Eucalyptusöl oder die zwischen 170—180°C siedenden Anteile desselben in einer Kältemischung stark ab und leitet einen Strom trocknen Salzsäuregases ein, bis die Flüssigkeit zu einem Krystallbrei erstarrt ist. Die entstehende Eucalyptol-Salzsäureverbindung $C_{10}H_{18}O \cdot HCl$ wird scharf abgepresst, mit Wasser (in Salzsäure und Eucalyptol) zerlegt und das abgeschiedene Öl nochmals mit Salzsäure in gleicher Weise behandelt. Schliesslich wird das Eucalyptol mit etwas alkoholischer Kalilauge erwärmt, mit Wasser bis zum Entfernen der letzten Reste Salzsäure gewaschen, durch Chlorcalcium getrocknet und über metallischem Natrium rectificiert.

Eigenschaften. Das Eucalyptol bildet eine farblose, kampherartig riechende Flüssigkeit, die in Wasser nahezu unlöslich ist, sich dagegen mit absolutem Alkohol, Aether, Chloroform, Terpentinöl und fetten Ölen mischen lässt. Das spec. Gewicht ist

bei $15^{\circ}\text{C} = 0,930$ (Erganzb U St) (Gall $= 0,940$), der Siedepunkt liegt konstant bei $176\text{--}177^{\circ}\text{C}$ (Gall 174°C) Kühlt man das Eucalyptol in einer Kältemischung von Eis und Kochsalz ab, so erstarrt es vollkommen zu langen Krystallnadeln, deren Schmelzpunkt bei etwa -1°C liegt Die Ebene des polarisierten Lichtes beeinflusst Eucalyptol nicht, es ist optisch inaktiv

Prüfung Das Eucalyptol sei farblos, habe bei 15°C ein spec Gewicht von 0,930 und destillire bei $176\text{--}177^{\circ}\text{C}$ in seiner ganzen Menge über — Betrachtet man die Wandung eines Reagirglases mit etwas Eucalyptol und lässt dann Bromdampf einfließen, so bilden sich an den Wandungen des Reagirglases ziegelrothe Krystalle eines Brom additionsderivates $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{OBr}_2$ (Charakteristische Reaktion) — Es erstarrt in einer Kältemischung zu langen Krystallnadeln, die bei -1°C schmelzen (Terpene verhindern das Erstarren) und sei optisch inaktiv (Terpene) — Mit dem gleichen Volumen Paraffin liquidum sei es klar mischbar (Prüfung auf Wassergehalt) — Es bildet lose Additionsprodukte mit Brom (s oben), Jod, Chlorwasserstoff, Jodwasserstoff, Bromwasserstoff, Phosphorsäure, α und β -Naphthol, auch mit Jodol, die theilweise zur Isolirung und Charakterisirung des Eucalyptols zu benutzen sind

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt unter den indifferenten Arzneimitteln

Anwendung Eucalyptol dient äusserlich zu reizenden Einreibungen bei Rheumatismus, Neuralgien Ferner zum desinficirenden Wundverbande bei atonischen Geschwüren, Hospitalbrand, Gangrän (Verbandpackchen der britischen Kolonialtruppen) Innerlich wird es bei chronischer Bronchitis, Lungenganglien, Asthma, katarrhalischen Affektionen der Harnwege und bei Intermittens gegeben Man reicht mehrmals täglich 5 Tropfen in Gelatinekapseln oder in Emulsionsform

Eulyptol, von Dr SCHMELZ als energisches antifermentatives Mittel empfohlen Dasselbe besteht aus 6 Th Salicylsäure, 1 Th Karbolsäure und 1 Th Eucalyptusöl

Capsules-Cognet Sind Gelatinekapseln, von denen jede 0,03 g Eucalyptol, 0,03 g Kreosot und 0,05 g Jodoform enthält

Eucalypteol, Eucalyptenum hydrochloricum Terpilendichlorhydrat $\text{C}_{10}\text{H}_{18} \cdot 2\text{HCl} = 209$ Wird durch Einwirkung von Salzsäuregas auf Eucalyptol erhalten. Farblose, perlmutterartige Lamellen, in Wasser unlöslich, in Alkohol, Aether und Chloroform leicht löslich Schm-P 50°C , Siedep 115°C Als innerliches Antisepticum bei Typhus, Diarrhoe u s w zu 1–2 g Vor Licht geschützt aufzubewahren

Eucalypto-Resorcin. Man erwärmt 10 Th Resorcin mit 15 Th Eucalyptol, lässt erkalten und reinigt die Krystallmasse durch Umkrystallisiren aus 95 proc Alkohol — Weisses, krystallinisches Pulver, in Alkohol, Aether und Chloroform löslich, in kaltem Wasser unlöslich In siedendem Wasser schmilzt es zu öligen Tropfen Bei 100°C sublimirt es unter Entwicklung kampherähnlichen Geruchs Zu antiseptischen Inhalationen in alkoholischer Lösung bei Phthisis mit stinkendem Auswurf Vor Licht geschützt aufzubewahren

Eucalyptol-Jodoform Eine Auflösung von 5 Th Jodoform in 95 Th Eucalyptol, zum äusserlichen Gebrauche

Eucalyptol-Gaze nach LISTER, 4 Proc Rp Eucalyptoli 40,0, Resinae Dammar 240,0, Paraffini 360,0, Hydrophile Gaze (22–25 m) 1000,0 Bereitung wie Karbol Gaze nach LISTER, S 30

Eucalyptol Gaze nach NUSSBAUM, $7\frac{1}{2}$ Proc Rp Eucalyptoli 100,0, Spiritus 96 proc 500,0 Man löst und setzt hinzu Aquae destillatae fervidae 900,0 Mit dieser Mischung trankt man 1000,0 hydrophile Gaze, presst bis auf 2250,0 ab und trocknet auf Schnüren oder Holzstäben

Fliegen- und Mückenessenz (DIETZICH) A) Zum Gebrauch im Zimmer Rp Eucalyptoli, Aetheris aceticæ ää 10,0, Spiritus coloniensis 40,0, Tincturae Chrysanthemi 50,0 B) Im Freien Rp Eucalyptoli, Olei Lauri expressi, Aetheris ää 10,0 Spiritus (90 Vol Proc) 70,0

Fliegen- und Mückenöl, Bremsenöl (DIETZICH) Rp Olei Lauri expressi, Eucalyptoli ää 50,0, Nitrobenzoli 100,0, Petroles 300,0, Olei Rapae 500,0, Chlorophylli 2,0

Fliegen- und Mückenstifte (DIETZICH) Rp Eucalyptoli 4,0, Olei Anisi 1,0, Paraffini liquidi 45,0, Paraffini solidi 50,0 Man giesst in Metallstangen aus

Eucalyptol-Opodeldoc. Rp Saponis pro Opodeldoc 90,0, Spiritus (90 Vol Proc) 750,0, Camphorae 45,0, Mentholi 7,5, Eucalyptoli 22,5, Liqueoris Ammoni caustici (10 Proc) 45,0

Eucalyptus.

Gattung der Myrtaceae — Leptospermoideae — Leptospermeae — Eucalyptinae. Mit Ausnahme weniger Arten, die im malayischen Gebiet und auf Neu-Guinea vorkommen, auf Australien und Tasmanien beschränkte, artenreiche Gattung, die arzneilich verschiedentlich verwendet wird. Es kann im Folgenden nur eine kurze Zusammenstellung gegeben werden. Man verwendet

I Die Blätter *Folia Eucalypti* (Ergänzb.) *Folium Eucalypti* (Helv.) *Eucalyptus* (U-St.) — *Eucalyptusblätter*. — *Feuilles d'eucalyptus* (Gall.) — *Eucalyptusleaves*. Von *Eucalyptus Globulus* Labillardiere Fieberbaum Gum Tree Blue Gum Tree Fever Tree. Heimisch in Neu-Südwesten und Tasmanien, durch die Kultur weit verbreitet in wärmeren Gegenden, da der Baum seiner Schnellwuchsigkeit wegen sich sehr zur Entwässerung feuchter Fiebergegenden (Fever-Tree) eignet.

Beschreibung. Die Blätter des Baumes sind dimorph, die zuerst an den Zweigen entstandenen sind gegenständig, ungestielt, eiförmig mit herzformigem Grunde, an der Pflanze wagerecht gestellt. Diese normale Stellung kommt auch im Bau zum Ausdruck. Diese Blätter sind bifacial gebaut, d. h. sie haben Palissaden nur an der Epidermis der Oberseite. Die später an den Zweigen entstehenden Blätter stehen zerstreut, sie sind gestielt, der Blattstiel gedreht. Die Lamina ist sichelförmig oder schmal-lanzettförmig, lang zugespitzt, ganzrandig, am verdickten Rande etwas umgebogen, am Grunde schief gerundet oder in den Stiel etwas zusammengezogen, 20 cm und darüber lang. Farbe graugrün. Von dem wenig starken Primärnerven gehen beiderseits die Sekundärnerven am Grunde des Blattes unter einem Winkel von etwa 50°, in der Mitte von 40°, gegen die Spitze von 30° ab, sie bilden in einiger Entfernung vom Blattrand einen sehr ausgeprägten Randnerv. Beiderseits etwas höckerig und durchscheinend punktiert.

Cuticula auf beiden Epidermen dick, die Zellen der letzteren beiderseits polygonal und mit Stomatien. Beiderseits 2 oder 3 Reihen von Palissaden, in der Mitte schmales Schwammparenchym. Reichlich Ölbehälter und im Mesophyll Einzelkrystalle und Drüsen von Kalkoxalat. Ausserdem nicht selten im Blatt Korkwucherungen, die dasselbe als braune Punkte durchsetzen. Geruch angenehm aromatisch, Geschmack ebenso und etwas bitterlich.

Bestandtheile. In den trocknen Blättern 1,6—3,0 Proc. ätherisches Öl (siehe S. 1064), ferner Farbstoff, Harz, Bitterstoff etc.

Handelswaare. Pharmaceutisch verwendet werden nur die soeben beschriebenen, sichelförmigen, monofacial gebauten Blätter, sie kommen meist aus Italien und Nordafrika zu uns.

Aufbewahrung. Vergl. S. 807 Fussnote.

Anwendung. Dieselbe beschränkt sich fast ausschliesslich auf das ätherische Öl (s. unten) und die Tinktur. Letztere verwendet man bei Magen- und Darmkatarrh sowie Blasenleiden, mit Wasser verdünnt zu Gurgelwässern, zum Wundverband.

Alcoholatura Eucalypti (Gall.) Aus frischen Eucalyptusblättern wie *Alcoholat Digitalis* (Gall.) (S. 1041).

Aqua Eucalypti. *Hydrolatum Eucalypti* *Eau distillée d'Eucalyptus* (Gall.) Wie *Eau de Camomille* (Gall.) (S. 716) zu bereiten.

Cigarettes d'eucalyptus (Gall.) Sollen jede 1 g Eucalyptusblätter enthalten.

Extractum Eucalypti fluidum. *Eucalyptus fluidextract* *Extrait fluide d'eucalyptus* *Fluid Extract of Eucalyptus* (Helv.) 100 Th. Eucalyptusblatt (IV) erschöpft man im Perkolator mit q. s. Weingeist (94 proc.). Man befeuchtet mit 35 Th., sammelt zuerst 85 Th. und stellt weiter 1 a. 100 Th. Fluidextrakt her. Braunschwarz, von kampherähnlichem Geruch, mit Wasser trübe mischbar. — U-St. Aus 1000 g Eucalyptusblätternpulver (Nr. 40) und einer Mischung von 750 com. Weingeist (91 proc.) und 250 com. Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 400 com., sammelt zuerst 900 com. und verfärbt weiter 1 a., so dass man 1000 com. Fluidextrakt erhält.

Tisana de folio Eucalypti. *Tisane d'eucalyptus* (Gall.) Wie *Tisane de buchu* (S. 511).

Eucalyptus

Sirupus Eucalypti. Syrupus de Eucalypto (Gall) Wie Sirupus Chiri Gall (S 716) zu bereiten

Tinctura Eucalypti. Eucalyptustinktur Teinture d'eucalyptus ganzb 1 Th mittelfein zerschnittene Eucalyptusblätter, 5 Th verdünnter Weing Helv Aus Eucalyptusblatt (IV) wie Tinct Cannabis indicae Helv (S 593) — Aus grob gepulverten Blättern wie Tinct Cinnamomi Gall (S 848)

Vinum Eucalypti. Vinum de Eucalypto Vin ou oenolé d'euca (Gall) Wird wie Vinum Colombo Gall (S 937) bereitet

Aquae dentifricia antiseptica (Ergänzb)
Antiseptisches Mundwasser
Rp Olei Eucalypti 1,5
Thymoli
Olei Menthae piperit. aa 1,0
Olei Citri 2,0
Chloroformum 5,0
Glycerini 10,0
Spiritus 100,0

Aqua dentifricia cum Eucalypto
Eucalyptus-Zahnwasser

Rp Eucalyptoli 20,0
Mentholi 20,0
Olei Caryophyllor 5,0
Olei Gaultheriae 1,0
Aetheris acetic 10,0
Chlorophylli q s
Spiritus (90 proc) 1000,0

Elixir Eucalypti (Nat Form.)

Rp Extracti Eucalypti fluidi
Spiritus (84 Vol Proc) aa 120,0 cem
Magnesi carbonici 10,0 g
Syrupi Coffeae 370,0 cem
Elixir Taraxaci compositi 470,0 „

Ist öfter zu schütteln und nach 48 Stunden zu filtriren.

Formalinum eucalyptatum

Rp Formalini (40 proc) 20,0
Tincturae Eucalypti 5,0
Spiritus 170,0

Diese angenehm riechende Flüssigkeit enthält in 1 Theelöffel (5 g) 0,25 reines Formal.

Pasta dentifricia eucalyptata

Eucalyptus-Zahnpasta.

Rp Calci carbonici praecip 50,0
Saponis medicati 15,0
Amyli Tritici 15,0
Olei Eucalypti 1,0
Olei Menthae piperit 0,3
Olei Gerani 0,3
Olei Caryophyllorum 0,1
Olei Anisi 0,1
Glycerini
Phloxini aa q s

Siehe Zahnpasten S 554.

Pulvis antisepticus

Rp Aluminis pulver
Boracis pulver aa 50,0
Acidi carbonici cryst
Olei Eucalypti
Olei Gaultheriae
Mentholi
Thymoli aa 5,0

Remedia contra Insecta

Mittel gegen lästige Insekten.

a. Bremsenmittel

1 Rp Olei Eucalypti 1,0
Olei Lauri expressi 4,0

Zum Einreiben an Hals, Seiten u s w

2 Rp Aquae Eucalypti 1000,0

mischt man mit

Cresolini q s

so dass eben eine milchige Trübung entsteht.

Mittels eines Schwammes aufzutragen

3 Rp Olei Eucalypti
Olei Lauri
Olei Caryophylli aa 50,0
Tinct flor Pyrethri 80,0

b Mittel gegen Fliegen.
Fliegenessenz

Rp Eucalyptoli 100
Aetheris acetic 10,0
Tinctur Flor Pyrethri 80,0
Aquae Colonicus 50,0

Mit 3 Th Wasser verdünnt zum Bestrichen Haut, Kopf und Barthaare, mit 10 Th W gemischt zum Verstäuben in den Zimmern

Fliegenpulver

Rp Eucalyptoli 50
Folia veneti 100
Amyli 85,0

Mittels eines Wattelauses betupft man hinter Kopf und Hände

Fliegensalbe. Fliegenstift.

Rp Paraffini solidi 50,0
Paraffini liquidi 40,0
Eucalyptoli 4,0
Olei Anisi 1,0

Zum Einreiben der unbedeckten Körpertheile verabfolgt die Salbe in Schiebedosen

Stroupulver

Rp Eucalyptoli 1,0
Rhizomatis Indis 4,0
Amyli pulv 15,0

Mittels einer Streubüchse oder eines Gazebis zu verstäuben

Milchengest. Milchenspiritus (Vomässa)

Rp Eucalyptoli 15,0
Aetheris acetic 15,0
Olei Terebenti 5,0
Naphthol 5,0
Spiritus saponati 30,0
Spiritus camphorati 30,0

Schnupfen-Riechmittel (Nat Drug)

Rp Acidi carbonici
Olei Eucalypti
Jodi aa 1,0
Alkohol absoluti 2,0
Liquoris Ammonii caust. 4,0

Spiritus saponato camphoratus eucalyptae
Eucalyptus Opodeldok

Rp 1 Saponis oleacei 100,0
2 Spiritus 770,0
3 Camphorae 50,0
4 Mentholi 7,5
5 Olei Eucalypti 22,5
6 Liquoris Ammonii caust 50,0

1 in der Wärme in 2 Lössen dann 3 und 4—6 zufügen

Tela eucalyptata

Eucalyptus-Gaze

1 i proc. nach LISTEN.

Rp Olei Eucalypti 40,0
Resinae Dammar 240,0
Paraffini solidi 500,0
Tela hydrophil 1000,0 (27—25

Vergl Tela carbolisata S 31 c

II 7½ proc nach NUSSBAUM		Unguentum Eucalypti (Brit)	
Ep	Oel Eucalypti	100,0	Eucalyptus-Ointment
	Alcohol absolut	500,0	
	Aquae destillat. fervid.	900 0	Ep Oel Eucalypti
Mit der Lösung trinkt man			Paraffin dur
Telle hydrophil 1000,0 (22—26 m),			(Schm P 54,4—57,2° C) 120,0
presst bis zum Gewicht von 2250,0 und trocknet			Paraffin mollis
auf Holzstücken oder Schnüren			(Schm P 30,5—33,3° C) 150,0

Oleum Eucalypti (Brit U St Ergänz) **Oleum Eucalypti Globuli.** **En-calyptusol.** **Essence d'Eucalyptus** (Gall) **Oil of Eucalyptus.**

Von der überaus grossen Anzahl der Eucalyptusole findet hauptsächlich das Oel von *Eucalyptus Globulus* Labill. medicinische Verwendung (U-St Gall Ergänz), nur Brit lässt neben diesem Oele auch die Oele anderer Eucalyptusarten zu, wenn sie nur die weiter unten besprochenen Eigenschaften haben. Man pflegt im pharmaceutischen Sprachgebrauch das Globulus-Oel einfach als Eucalyptusol zu bezeichnen.

Darstellung. Eucalyptusöl wird in Australien, Californien, Algier und Portugal aus frischen Blättern durch Dampfdestillation gewonnen. Ausbeute etwa 0,7 Proc. Das rohe Oel ist wegen seiner stark zum Husten reizenden Nebenbestandtheile Valeraldehyd, Amylalkohol etc. nicht direkt brauchbar, es kann zu medicinischen Zwecken erst verwendet werden, nachdem diese Körper durch fraktionirte Destillation über Kalk oder Natronlauge entfernt worden sind.

Eigenschaften. Rektificirtes Eucalyptusol ist ein farbloses oder hellgelbes, dünnflüssiges, angenehm erfrischend riechendes Liquidum vom spec. Gewicht 0,910—0,930 (Brit), [0,915—0,925 (U St), 0,920—0,925 Ergänz]. Das Globulus Oel ist stets rechtsdrehend (+1 bis +15° im 100 mm-Rohr) und unterscheidet sich dadurch von dem phellandrenhaltigen Oel von *Eucalyptus amygdalina*, das stark nach links dreht. Es löst sich klar in 3 Th. Spiritus dilutus auf. Tragt man in 5 Th. auf 50° C erwärmtes Eucalyptusol allmählich 1 Th. zerriebenes Jod ein, so erstarrt die Mischung beim Erkalten zu einem Krystallbrei (Ergänz), der aus Cineoljodid, $C_{10}H_{16}OJ_2$, besteht. Fügt man zu gut gekühltem Eucalyptusol in kleinen Portionen die gleiche Menge sirupose Phosphorsäure vom spec. Gewicht 1,750 (siehe S. 90) unter Umrühren hinzu, so entsteht ein halbfestes, durch Feuchtigkeit zersetzliches Additionsprodukt (Brit) von Cineol und Phosphorsäure ($C_{10}H_{16}O \cdot H_3PO_4$?). Wie bereits erwähnt, werden von der Brit. auch die Oele anderer Eucalyptusarten zugelassen, wenn sie ein zwischen 0,910 und 0,930 liegendes spec. Gewicht haben, den polarisirten Lichtstrahl nach keiner Richtung mehr als 10° ablenken, die eben beschriebene Phosphorsäure-Reaktion halten und mit Natriumnitrit und Essig (siehe später unter Oel von *Eucalyptus amygdalina*) keine krystallinische Masse bilden (Abwesenheit grösserer Mengen von Phellandren).

Bestandtheile. Die charakteristischsten Eigenschaften des Eucalyptusols werden durch das bei 176° siedende Cineol oder Eucalyptol, $C_{10}H_{16}O$, das 60—70 Proc. der Gesamtmenge ausmacht, bedingt. Von Terpenen ist nur Rechts-Pinen, $C_{10}H_{16}$, sicher nachgewiesen, während die Anwesenheit von Camphen und Fenchon als wahrscheinlich angenommen wird. In den um 200° C siedenden Antheilen findet sich der Ester eines specifisch schweren, linksdrehenden, noch nicht näher untersuchten Alkohols. Das Rohöl enthält Valeraldehyd, Butyraldehyd und Capronaldehyd, Aethylalkohol und Amylalkohol, sowie niedrigere Fettsäuren.

Anwendung. Eucalyptusöl wird meistens ausserlich zu Salben und Einreibungen (bei Neuralgien) oder zum Einathmen (als Schutzmittel gegen Influenza) gebraucht. Es bildet ferner einen Bestandtheil derjenigen Einreibungen, die zur Abwehr von Mücken und Schnaken verwendet werden.

Ebenfalls durch einen hohen Eucalyptolgehalt ausgezeichnet und in ihren Eigenschaften dem Globulus-Oel ähnlich sind die Oele aus den Blättern folgender Eucalyptusarten:

Oleum Eucalypti odoratae BERN. Oelausbeute 1,4 Proc., spec. Gewicht 0,899 bis 0,925, optisch linksdrehend. Das Oel enthält neben Eucalyptol noch Cuminaldehyd.

Oleum Eucalypti oleosae F v MULL Ausbeute 1,25 Proc, spec Gew 0,906 bis 0,926, optisch rechtsdrehend Bestandtheile Eucalyptol und Cuminaldehyd

Oleum Eucalypti dumosa Ausbeute 1 Proc, spec Gew 0,884—0,915, rechtsdrehend, eucalyptolhaltig

Oleum Eucalypti rostratae SCHLECHTD Ausbeute 0,1 Proc, spec Gew 0,912 bis 0,925, in der Regel rechtsdrehend Bestandtheile Eucalyptol, Valeraldehyd

Oleum Eucalypti Amygdalinae Sehr arm an Cineol (Eucalyptol) ist das zum Parfümiren von billigen Seifen vielfach verwendete Oel von *Eucalyptus amygdalina* LABILL. Es riecht pfefferartig, hat das spec Gewicht 0,850—0,886 und dreht den polarisirten Lichtstrahl im 100 mm Rohre 25 bis 70° nach links. Es ist unlöslich in Spiritus dilutus und erfordert zur Lösung meist mehr als 6 Th Spiritus. Versetzt man das mit dem doppelten Vol Petroläther verdünnte Oel mit einer concentrirten, wässrigen Auflösung von Natriumnitrit, so entsteht nach Hinzufügen von Essig-säure in kleinen Portionen eine breiartige Masse verfilzter nadelförmiger Kryställchen von Phellandrennitrit, $C_{15}H_{18}N_2O_4$, Schm.-P. 105°C)

Nicht alle Eucalyptusole führen Eucalyptol. Einige wie die von *Eucalyptus citriodora* Hooker, *Eucalyptus maculata* und *Eucalyptus dealbata* A. CUNY enthalten Citronellal, $C_{10}H_{18}O$, als charakteristischsten Bestandtheil. Citral, $C_{10}H_{18}O$ findet sich in den Oelen von *Eucalyptus Staigeriana* F v MULL und von *Bockhousia citriodora* F v MULL. Die Destillate der Blätter von *Eucalyptus haemastoma* SM und von *Eucalyptus piperita* SM sind durch einen pfefferminzartigen Geruch ausgezeichnet, der möglicher Weise auf einen Gehalt des Oeles an Menthon zurückzuführen ist. Alle nicht eucalyptolreichen Oele werden bisher nur in beschränkten Mengen in der Seifenfabrikation und Parfümerie angewendet.

Cineol ist die Bezeichnung einer Mischung von Eucalyptus, Cajeput- und Terpenöl (Karlsruher Ortsoges-Rath)

Eucalyptus Globulin von BENZE & ECKE, ein Kesselsteinmittel, ist ein alkalischer Auszug von Rinde und Holz des Blaugummbaumes

Eucymol ist ein Antisepticum aus Eucalyptusöl, Gaultheriaöl, Thymol und Menthol (Ruedel)

Eunol, α - und β -, sind Verbindungen von α - und β -Naphthol mit Eucalyptol. Gegen Hautkrankheiten benutzt (GEM)

Euthymol, ein Antisepticum, enthält Eucalyptusöl, Wintergreenöl, Borsäure, Thymol und das Fluidextrakt von *Baptisia tinctoria* (THOMAS)

II Eine Anzahl von Arten sind des reichen Gerbstoffgehaltes verschiedener Theile wegen von Bedeutung. Die Rinde vom **Eucalyptus leucoxylon** F v M enthält 41,09 Proc Gerbstoff, die Blätter der **E. macrorhyncha** F v M enthalten 18,4 Proc Gerbstoff, von **E. obliqua** L'Her 17,2 Proc, **E. stellulata** Sieb 16,62 Proc, **E. Gunnii** Hooker 16,6 Proc, auf **E. rostrata** Schlechtd vorkommende Gallen enthalten 43,40 Proc.

III Ferner liefern eine Anzahl Arten Kino und Gummi. Beides lässt sich anscheinend nicht scharf trennen, insofern das Sekret mancher Arten als adstringierend schmeckendes Gummi beschrieben wird und andererseits manche Kinosorten beim Behandeln mit Alkohol ein Gummi hinterlassen. Das austretende Sekret ist zuerst farblos, wird aber an der Luft bald roth bis schwarz.

Am besten bekannt ist das Kino vom **Eucalyptus rostrata** Schlechtd. **Eucalyptus Gum** (Brit.) Es bildet eine bruchige Masse und ist von purpurner oder mehr brauner Farbe, das Pulver ist ockerfarben. Es löst sich in 90 Proc Alkohol trübe hellbraun oder orangefarben, in Wasser zu 80—90 Proc. Es soll Catechin und Gerbstoff 84,3 Proc enthalten (Gerbstoff 46,22 Proc), Holzstoff 0,3 Proc, Wasser 15,2 Proc, Asche 0,2 Proc. In einigen Arten, z. B. **E. hemiphloia** F v M, sind als beim Lösen trübende Substanzen Eudesmin und Aromadendrin ermittelt worden, letzteres hat

die Zusammensetzung $C_{10}H_{16}O_2$, Schmelzpunkt $216^{\circ}C$, es ist weiss, krystallinisch, löslich in Aether, Essigäther, Alkohol und Amylalkohol, unlöslich in Chloroform, Benzol und Petroläther

Gerbstoffgehalt einiger Kinosorten **E. macrorrhyncha** F v M 78,72 Proc, **E. stellulata** Sieb 69,96 Proc, **E. piperita** Sm 62,12 Proc

Trochisci Eucalypti Gummi Eucalyptus Gum Lozange (Brit) Mit Frucht Basis (vergl Ribes) formt man Pastillen, deren jede 0,0648 g Eucalyptus Gummi enthält

IV Einige Arten liefern der Manna ähnliche Stoffe, so durch den Stach der *Cicada moerens* **Eucalyptus viminalis** Labill, **E. mannifera** Mudie, **E. resinifera** Smith, **E. Gunnii** Hook Die Manna der zuletzt genannten Art enthält eine bei $87^{\circ}C$ schmelzende Melitriose, die ein Kondensationsprodukt von Galaktose, Glukose und Fruktose sein soll

V 1874 wurde ein angeblich von **Eucalypten** gesammelter Honig als hervorragendes Heilmittel empfohlen Es zeigte sich, dass es sich dabei um gewöhnlichen, mit **Eucalyptusöl** parfümierten Honig handelte Dass indessen die Bienen in Australien auch von **Eucalypten** Honig sammeln, ist zweifellos und durch das Auffinden zahlreicher Pollen körner von **Eucalyptus** in demselben erwiesen Echter **Eucalyptushonig** enthält 1 Proc Galaktose, ferner viel Glukose und viel Fruktose.

Euchininum.

Mit dem vorstehenden Namen wird der von den Chinnfabriken ZIMMER & Co in Frankfurt a M dargestellte und in den Verkehr gebrachte „Aethylkohlenensäureäther des Chinins“ bezeichnet $C_{20}H_{28}N_2O$ Mol Gew. = 306.

Die Darstellung dieser Verbindung erfolgt fabrikmässig durch Einwirkung von Chlorkohlenensäure-Aethylester auf Chinin $C_2H_5CO_2Cl + C_{20}H_{24}N_2O = HCl + C_{20}H_{28}N_2O$

Eigenschaften Zarte, weisse, fast geschmacklose Nadeln, noch leichter und seidenglanzender wie das leichte Chininsulfat, in Wasser schwer löslich, in Alkohol, Aether und Chloroform leicht löslich Es reagirt alkalisch, schmilzt bei $95^{\circ}C$, giebt die Thalleiochin-Reaktion, aber keine dem Herapatit analogen Verbindungen (s S 745 u 839) Mit Säuren geht es leicht lösliche, salzartige Verbindungen bez leicht lösliche Salze ein Die mit Schwefelsäure oder Salpetersäure bereiteten Lösungen fluoresciren mindestens ebenso stark wie die entsprechenden Chininlösungen Die Salze schmecken, soweit sie löslich sind, bitter Das gerbsaure Salz ist unlöslich — Uebergiesst man etwa 0,2 g des Euchinins mit 2—3 cem Natronlauge, fügt einige Kornchen Jod hinzu und erwärmt, so tritt vorübergehend ein schwacher Geruch nach Jodoform auf (Vorhandensein der Aethyl-Gruppe) In seinen Lösungen erzeugen die ähnlichen allgemeinen Alkaloidreagentien Niederschläge

Prüfung. 1) Das Euchinin sei farblos und fast geschmacklos, auf angefeuchtetes Lackmuspapier von schwach alkalischer Reaktion 2) Es schmelze bei $95^{\circ}C$ 3) Die mit Salpetersäure bereitete Lösung werde weder durch Silbernitrat noch durch Baryumnitrat verändert (Verwechslungen mit Chininhydrochlorid oder Chininsulfat, die aber schon durch die Geschmacksprobe erkannt werden) 4) Es verbrenne auf dem Platinbleche ohne einen Rückstand zu hinterlassen

Anwendung. Das Euchinin wird als nicht oder nur wenig unangenehm schmeckender Ersatz des Chinins überall da angewendet, wo letzteres wegen des bitteren Geschmacks nur mit Schwierigkeit gegeben werden kann, also z B in der Kinderpraxis, 1,5—2,0 g sind gleichwerthig mit 1 g Chininchlorhydrat Man giebt es sowohl in den bekannten Arzneiformen, als auch mit Milch, Suppe, Chokolade und dergl vermischt Die Neben

wirkungen sollen geringer sein als nach Chinin Angewendet bei Influenza, Keuchhusten, Phthuse, auch als typisches Antipyreticum mit Erfolg

Euchininum tannicum Eine dem Chininum tannicum analoge Verbindung von Euchinin mit Gerbsäure, welche rund 33 Proc Euchinin enthält Ein gelbliches Pulver, in Wasser nur wenig löslich, ohne bitteren Geschmack In der Kinderpraxis an Stelle des Euchinins verwendet

Eugenia.

Gattung der Myrtaceae — Myrtoideae — Myrteneae — Eugeninae.

I **Eugenia caryophyllata** (vergl S 663)

II **Eugenia Cheken Hooker et Arnott** Heimisch in Chile Man verwendet die Blätter und dünnen Zweige

Beschreibung Die Blätter sind 1—4 cm lang und halb so breit, elliptisch bis eiförmig, starr, zart gerunzelt, hellgrün, kurz gestielt, am Rande umgebogen, beiderseits kahl Gegen das Licht gehalten, scheinen Sekretbehälter durch Zellen der Epidermis beiderseits wellig, Stomaten nur auf der Unterseite An der Oberseite kurze Palissaden. Im Blattgewebe grosse Sekretbehälter, die bis an die Epidermis der Oberseite reichen Gefässbündel mit Faserhülle Geruch gewürzhaft, Geschmack anfangs ebenso, später stark bitter

Bestandtheile 1 Proc ätherisches Oel, das Cineol und Rechtspinen enthält, ferner zu 0,08 Proc krystallinisches Chekenon $C_{40}H_{44}O_8$, krystallinisches Chekenin $C_{12}H_{11}O_8$, amorphes Chekenbitter und Chekenitin $C_{11}H_9O_6$ H_2O , endlich Gerbstoff 9,48 Proc Asche

Verwendung. Als tonisches, expektorirendes, diuretisches und antiseptisches Mittel, am liebsten in Form des Fluidextraktes in Dosen von 4—12 cem

III **Eugenia acris Wight et Arnott.** In Westindien Aus den Blättern destillirt man ätherisches Oel, das wie das von *Myrica acris* (vergl. dort) als Bayol bezeichnet wird Das Oel ist zu 2,0—2,5 Proc in den Blättern enthalten Spec Gewicht 0,965—0,985 Drehung (100 mm-Rohr) — 2° Das frische Oel löst sich in gleichviel 90 proc Alkohol auf, alteres nicht mehr Es enthält Eugenol $C_{10}H_{12}O_2$, Myricen $C_{10}H_{16}$, Chavicol $C_8H_{10}O$, Methyleugenol $C_{11}H_{14}O_2$, Methylechavicol $C_{10}H_{12}O$, Phellandren $C_{10}H_{18}$, Citral $C_{10}H_{16}O$


Das Oel wird mit Ol Terebinth verfälscht Zum Nachweis desselben destillirt man von 10 cem langsam 1 cem ab, mischt das Destillat mit 1 cem Amylnitrit und 2 cem Eisessig Dann setzt man tropfenweise unter Schütteln und Abkühlen so lange gleiche Mengen Eisessig und Salzsäure zu, als noch Blaufärbung entsteht Bei Anwesenheit von Pinen aus Ol Terebinth entsteht ein weisser Niederschlag von Pinennitroschlorid Noch 10 Proc sind nachzuweisen

IV. Andere Arten **Eugenia lucidula Miq** Die Früchte werden unter dem Namen Daden Salen als Gewürz verwendet **Eugenia Sandwicensis** Asa Gray und **Eugenia Malaccensis** L Von beiden Arten verwendet man Blätter, Blüten und Rinde gegen Schwindsucht und Halskrankheiten Von **Eugenia Micheli** Lam verwendet man die Blätter gegen Rheumatismus

Eugenolum.

I **Eugenolum.** Eugenol *p*-oxy-m-Methoxyallylbenzol $C_6H_3(C_2H_5)(OCH_3)(OH)$ Mol Gew = 164 Ueber Gewinnung dieses Phenols ist auf S 665 unter Oleum Caryophyllorum das Nothige gesagt

Eigenschaften Frisch destillirt eine farblose oder schwach gelbliche, stark lichtbrechende, an der Luft und im Lichte sich allmählich braunende Flüssigkeit von durchdringendem Geruch des Nelkenöls und scharfem, brennendem Geschmack. Es siedet unter gewöhnlichem Drucke unter nur geringer Zersetzung bei 258—254° C und hat bei 15° C das spec Gewicht 1.027.



Eugenol ist unlöslich in Wasser, dagegen leicht löslich in Alkohol, Aether, Chloroform, Eisessig und in Kalilauge von 1—2 Proc KOH. Die Auflösung von 2 Tropfen Eugenol in 4 ccm Weingeist wird durch 1 Tropfen verdünnter Ferrichloridlösung (1:20) blau, durch einen Tropfen unverdünnter Ferrichloridlösung grün gefärbt. Es ist ein einatomiges Phenol und giebt dementsprechend mit atzenden Alkalien salzartige Verbindungen, z. B. Eugenolnatrium $\text{C}_6\text{H}_3(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{OCH}_2)_2\text{ONa}$.

Prüfung 1) Wird 1 g Eugenol mit 20 ccm heissem Wasser geschüttelt, so darf dieses blaues Lackmuspapier nur undeutlich rothen (saure Bestandtheile unorganischer oder organischer Natur). 2) Das nach dem Erkalten klar filtrirte Wasser darf sich mit 1 Tropfen Ferrichloridlösung nur vorübergehend graugrünlich, aber nicht deutlich blau färben (Karbolsäure). 3) 1 Th Eugenol muss sich in 2 Th verdünntem Weingeist, sowie in 1 Th Natrumsalicylatlösung (1 = 2) klar auflösen.

Aufbewahrung Vor Licht geschützt.


Anwendung Therapeutisch zur Zeit meist in der Form des Nelkenöls und in ähnlichen Mischungen. Es wirkt lokal anästhesirend, zugleich aber auch reizend bez. atzend. In der Mikroskopie an Stelle des Nelkenöls zum Aufheilen von Präparaten. — Technisch zur Darstellung von Vanillin, in welches es durch Oxydation mit Kaliumpermanganat übergeht.

II Eugenolum benzoicum Benzoyl-eugenol. Benzeugenol. Eugenolbenzoat. $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2$ Mol. Gew. = 268. Diese Verbindung wird durch Einwirkung von Benzoylchlorid auf Eugenolnatrium in der S. 666 angegebenen Weise dargestellt.

Farb- und geruchlose, schwach bitter schmeckende, neutrale Krystallnadeln vom Schmelzpunkt 70,5° C. Sie lösen sich kaum in Wasser, leicht in heissem Alkohol, in Chloroform, Aether, Aceton. Durch Erhitzen mit heisser Kalilauge wird die Verbindung in Kaliumbenzoat und Eugenolkalium gespalten.


In Gaben von 0,5—1,0 g an Stelle des Eugenols bei phthisischen Zuständen, zur Behandlung von Husten und tuberkulösen Kehlkopfleidn., auch bei neuralgischem Kopfschmerz.

III Eugenol acetamidum Eugenolessigsäureamid. $\text{C}_6\text{H}_3(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{OCH}_2)_2\text{OCH}_2\text{CONH}_2$ Mol. Gew. = 221. Zur Darstellung wird durch Einwirkung von Monochlor-



essigsäure auf Eugenolnatrium zunächst Eugenolessigsäure $\text{C}_6\text{H}_3(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{OCH}_2)_2\text{COOH}$ dargestellt. Diese wird durch Auflösen in absolutem Alkohol und Einleiten von trockenem Salzsäuregas in die Lösung in den Eugenolessigsäureäthylester $\text{C}_6\text{H}_3(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{OCH}_2)_2\text{OCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$ und dieser durch Einwirkung von alkoholischem Ammoniak in Eugenolacetamid übergeführt. Es krystallisirt aus Wasser in farblosen, glänzenden Blättchen, aus Weingeist in feinen, farblosen, glänzenden Nadeln, welche auf Schleimhäuten anästhesirend wirken und die Zungennerven gefühllos machen sollen. Schmelzpunkt 110° C.

Man verwendet es in der Form des sehr feinen Pulvers an Stelle des Cocains als Anästheticum auf Schleimhäuten, ferner als Antisepticum bei der Wundbehandlung.



IV. Eugenolcarbinolum Eugenolcarbinol. $\text{C}_6\text{H}_3(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{OCH}_2(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ (1.3.4.5) Mol. Gew. = 194. Wird durch Einwirkung von Formaldehyd auf Eugenol dargestellt (D. R.-P. 85588) und stellt farblose Krystalle vom Schmelzpunkt

87° C dar Sie sind in Wasser und in Ligroin schwer, in Alkohol, Aether und Benzol leicht löslich und geben mit Ferrichlorid blaue Färbung

Es ist ebenso wie das Eugenolacetamid als lokales Anästhetikum und als Antiseptikum zur Wundbehandlung empfohlen worden

Eupatorium.

Gattung der Compositae — Eupatoriaceae — Ageratinae

I Eupatorium cannabinum L. Wasserdost, Königskraut, Lammerschwanz Heimisch in Europa Liefert die jetzt obsoleten Radix et Herba Cannabis aquaticae s Eupatoriae Die Wurzel soll als Verwechslung der Radix Valerianae vorkommen Enthält ein Glukosid Eupatorin Durch Füllen der alkoholischen Tinktur mit verdünnter Salzsäure stellt man das gleichnamige „Resinoid“ dar (vergl Evonymus)

II Eupatorium Ayapana Vent E triplinerve Vahl (Gall) In Brasilien heimisch, weiter in Amerika und in Ostindien kultiviert Das Kraut riecht nach Cumarin Eine aus den Blättern (Folia Ayapanae Feuilles d'Aya Pana [Gall]) hergestellte Paste verwendet man als blutstillendes Mittel, sonst dient sie bei Magenleiden als Tonicum Neuerdings öfter nach Europa gekommen

III Eupatorium perfoliatum L. In den amerikanischen Südstaaten Man verwendet die Pflanze als Bittermittel Sie soll ein Glukosid, das man ebenfalls Eupatorin nennt, einen nicht glukosidischen Bitterstoff, 0,01 Proc ätherisches Öl, Gallussäure, Gerbsäure etc und die blühende Pflanze ein Alkaloid enthalten

U-St führt als Eupatorium, Thoroughwort die Blätter dieser Pflanze, sowie ein Extrakt daraus an

Extractum Eupatoriae fluidum. Fluid Extract of Eupatorium Aus 1000 g der gepulverten Droge (No 40) und verdünntem Weingeist (41 proc) wie Extr. Cynallariae fluidum U-St (S 957) zu bereiten

IV Eupatorium purpureum L. Purple Boneset, Gravel root, Trumpet weed Enthält wenig ätherisches Öl, Euparin oder Eupapurin $C_{12}H_{11}O_3$, Schmelzpunkt 117,2° C, mit konzentrierter Schwefelsäure wird es roth.

V Eupatorium aromaticum L. In Nordamerika Enthält 0,6 Proc ätherisches Öl Volksmittel bei rheumatischen Leiden

VI Eupatorium tinctorium (?) In Südamerika Paraguay Indigo Enthält Indigo, ebenso E. lamifolium H B K

Euphorbia

Gattung der Euphorbiaceae — Platylobae — Crotonoideae — Euphorbiaceae.

I Euphorbia resinifera Berg Von kaktusähnlichem Habitus Heimisch im Innern Marokkos, auf den Vorbergen des Atlas Man verwendet das nach Einschnitten in die Kanten der Stengel austretende Gummiharz

† **Euphorbium** (Austr Germ Helv) Resina s Gummi-resina Euphorbium — Euphorbium Euphorbiumharz — Euphorbe Gomme résine d'euphorbe (Gall)

Beschreibung Die Droge bildet rundlich eckige, unregelmässige, oft stalaktitenartige Stücke, die meist beim Sammeln abgerissene Theile der Pflanze (Stacheln und Stengelfragmente) einschliessen oder doch die Höhlungen zeigen, in denen solche Theile lagen Die Farbe ist mattgelblich bis braunlich, durchscheinend, bestäubt, zerreiblich Unter dem Mikroskop ist es amorph, lässt aber hier und da die für die Euphorbiaceen

charakteristischen, knochenförmig gestalteten Starkekörner erkennen Geschmack anhaltend und brennend scharf. Sonst geruchlos verbreitet es, in grösseren Mengen erhitzt, einen an Weibianch erinnernden Geruch. Wasser bildet mit ihm keine Emulsion, sondern entzieht ihm, wenn man es damit verreibt, nur Gummi und verschiedene Salze. In Wasser wenig löslich, besser in Alkohol, Aether und ätherischen Oelen, doch löst keine dieser Flüssigkeiten vollständig.

Saurezahl nach Beckurts und Baume 18—25, Esterzahl 49—68, Verseifungszahl 70—88.

Bestandtheile Nach Henke 34,6 Proc Euphorbon, 29,95 Proc in Aether lösliches Harz, 14,25 Proc in Aether unlösliches Harz, 1,10 Proc Kautschuk, 1,50 Proc Äpfelsäure, 8,10 Proc mit Alkohol fallbares Gummi und Salze, 12,30 Proc mit Alkohol nicht fallbares Gummi und Salze, 1,20 Proc in Ammoniak lösliche Salze und organische Stoffe.

Das Euphorbon $C_{16}H_{34}O$ kann man der Droge entweder direkt mit Petroläther entziehen oder nach Extraktion der Droge durch Wasser und Alkohol mit Aether Schmelzpunkt je nach den Lösungsmitteln, aus denen man krystallisiert, sehr wechselnd, aus Petroläther $87^{\circ}C$, aus Alkohol $114^{\circ}C$. Es dreht rechts. Löslich in Petroläther, Chloroform, Aether, Alkohol, Benzol, Aceton und 90proc Alkohol, in 10000 Th heissen Wassers. Mit Schwefelsäure ziegelroth sich färbend.

Das in Aether lösliche Harz schmeckt scharf, im Schlunde kratzend, und erzeugt Niesen und Augenentzündungen. Schmelzpunkt $42-43^{\circ}C$. Das in Aether unlösliche Harz reagirt sauer, schmeckt wenig bitter, meist kratzend, etwas zusammenziehend. Schmelzpunkt $119-120^{\circ}C$. Asche 10 Proc, in der Chlorkalium nebst Karbonaten des Natrium und Calcium vorhanden sind.

Aufbewahrung Pulverung, Euphorbium hat seinen Platz unter den vor-sichtig aufzubewahrenden Arzneimitteln. Unzerkleinert wird es nicht gebraucht und auch selten vorrathig gehalten. Man lässt es unter Beobachtung der grössten Vorsicht (vergl. S. 595) am besten im Freien stossen und kann zur Verminderung des Staubens auf 100 g zwei süsse Mandeln zusetzen. Da indessen trotz aller Vorsicht das Pulvern des Euphorbiums, dessen Staub schon in geringer Menge zu heftigem und anhaltendem Niesen reizt, eine der unangenehmsten Arbeiten ist, so überlässt man sie in der Regel den Drogenhandlungen, hier wird das Gummiharz in geschlossenen Pulvermühlen gemahlen und gelangt alsdann in dicht verklebten Pappkastchen von $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ Kilo Inhalt in den Handel. 100 Th liefern etwa 98 Th. mittelfeines Pulver.

Anwendung Das Euphorbium dient hauptsächlich in der Thierheilkunde als Zusatz zu reizenden oder blasenziehenden Salben und Pflastern, ist es dabei mit Kantharden oder Harzen zu mischen, so besprengt man es vorher mit wenig Terpentinol. Euphorbium ist dem freien Verkehr entzogen, im Bereich der Austr. darf es nur gegen ärztliche Verschreibung abgegeben werden.

† **Tinctura Euphorbii**, Euphorbiumtinktur Teinture d'euphorbe. Er-gänzb. 1 Th. grob gepulvertes Euphorbium, 10 Th. Weingeist (87 proc) — Gall. Wie Tinctura Cinnamomi Gall. (S. 843) zu bereiten.

Emplastrum Capueinorum	
Kapuzinerpflaster Gichtpflaster	
Rp	<i>Pinus nigrae navalis</i> 80,0
	<i>Ceraui Resinae Fini</i> 40,0
	<i>Empl. Galbani crocat.</i> 20,0
	Euphorbii pulv. 2,0
	Benzoeis pulv. 8,0

Emplastrum Euphorbii	
Emplastrum ischiadicum.	
Rp	Euphorbia pulv. 8,0
	<i>Ceraui Resinae Fini</i> 97,0
Bei Kreuz- und Hüftweh.	

Oleum Euphorbii	
Rp	Euphorbii pulv. 10,0
	Olei Terebinthin. 10,0
	Olei Olivarum. 90,0
Digeriren nach dem Absetzen filtriren. Zum Einreiben bei Lähmung.	

Pulvis resinosus acer Vogt
 Rp Euphorbia 20
 Colophonil 18,0
 Mastiches 6,0
Unguentum Euphorbii (NÉLIGAN)
 Rp Euphorbia pulv 1,0
 Adipis suill 20,0

Vet Feu liquide ordinaire (Gall)
 Rp 1 Euphorbia pulv 30,0
 2 Cantharidum pulv 30,0
 3 Olei Olivatum 300,0
 4 Olei Lavandulae 600,0
 Man digerirt 1 und 2 mit 3 zwei Stunden und
 fügt dann 4 hinzu

ACFRA's antirheumatisches Oel, für Pferde, ist Ol Euphorbia ohne Terpentinol
BAUNSCHEIDT's Oel, durch Ausziehen von Euphorbium und Seidelbastrinde mit
 Weingeist und Olivenöl dargestellt, dient zum Einreiben der mittels des sog „Lebens
 weckers“ erzeugten Nadelstiche

Blist. liquide 100 Euphorbium, 400 Leberthran, 1 Alkannawurzel werden 8 Tage
 digerirt, dann filtrirt

Hundswuthmittel von PATKIEWICZ Ein Gebäck, dessen Fettstoff zuvor mit den
 Samen einer Euphorbia gekocht wurde, und eine unschuldige Salbe

KORNPOTTEE's Blutreinigung-Bienen-Pustel Fettstoff, enthält Euphorbium,
 Kanthariden, Crotonöl, Seidelbast, Senf und Veratrin

RIEGER's Diphtheritismittel ist anscheinend ein ölgiger Auszug von Wolfsmilch,
 ausserdem Anisliquor und eine Mischung aus Benzoeextrakt, Franzbranntwein u. a

II. Euphorbia Lathyris L. Wohl in Südeuropa heimisch, in Mexiko und Peru
 eingeführt. In der Gall sind die Samen *Semence d'épurga* und die Wurzel *Racine*
d'épurga aufgeführt. Die ersteren Samen *Cataputiae minoris*, Samen *Trithymali la-*
tifolii, Samen *Lathyridis majoris*, *Grana regia minora*, Sparg- oder Purgirkeiner
 enthalten 40 Proc eines stark abführend wirkenden Oeles (*Huile d'épurga*), ferner
 Aesculetin und einen zweiten krystallinischen Körper. Der Milchsaft enthält Euphorbon

III Euphorbia pilulifera L. Heimisch in Australien, verbreitet in Ostindien,
 Westindien etc. *Pill bearing spurge*, *Snake-weed*, *Cat's hair*. Scheint als wirk-
 samen Stoff ein Harz zu enthalten. Wird gegen Bronchitis und Asthma empfohlen, be-
 sonders das Flindextrakt (2—4 cem mehrmals täglich). In ähnlicher Weise verwendet man
E. maculata L. in Nord und Mittelamerika

IV Euphorbia Cattimandoo W Elliot. In Ostindien. Enthält im Milchsaft
 35 Proc Euphorbon. Man verwendet denselben gegen Rheumatismus

V Euphorbia heterodoxa Mull Arg. In Brasilien *Alveloz*, *Aveloz*. Der
 Milchsaft findet Verwendung als Heilmittel bei Krebsleiden. Ebenso verwendet man
E. phyllanthus (?). Ebenfalls in Brasilien.

VI Euphorbia Tirucalli L. Heimisch in Ostafrika, in Indien kultivirt. Die
 Rinde verwendet man gegen Kolk, den Milchsaft als Purgans, letzterer enthält Euphorbon

Euphthalmium.

† **Euphthalmium** *Euphthalmin*. *Euphthalmium hydrochloricum*. Unter
 diesem Namen ist das salzsaure Salz des Phenylglykoly¹-n-methyl-β-vinyl-
 diacetonalkamins zu verstehen $C_{17}H_{25}NO_3 \cdot HCl$. Mol Gew = 327,5.


Die freie Base steht in engem Zusammenhange mit dem Eucain B, doch steht an
 Stelle der Benzoylgruppe beim Euphthalmin der Rest der Mandelsäure, und das Wasserstoff-
 atom im Stickstoff ist durch die Methylgruppe ersetzt.

Darstellung. Vinyl-diacetonalkamin wird zunächst durch Einwirkung von Jod-
 methyl am Stickstoff methyliert, dann wird durch Einwirkung von Mandelsäure in sehr ver-
 dünnter wässrig-salzsaurer Lösung der Rest der Mandelsäure (Phenylglykoly¹-Rest) einge-
 führt. — Die freie Base krystallisirt aus siedendem Petroläther in sechsseitigen Prismen,
 die bei 108—113° C schmelzen. — Das salzsaure Salz wird in krystallinischer Form er-
 halten, indem man in die ätherische Lösung der Base trocknes Salzsäuregas einleitet und
 das sich ausscheidende Salz aus absolutem Aether umkrystallisirt

Eigenschaften. Farbloses, krystallinisches, luftbeständiges Pulver, sintert bei 181° C zusammen und schmilzt bei 183—184° C. Sehr leicht löslich in Wasser, ferner in 2 Th absolutem Alkohol, schwerer löslich in Aether.

Aufbewahrung Vorsichtig

Anwendung Es unterscheidet sich in seiner Wirkung ganz wesentlich vom Eucain B. Während dieses nämlich anästhesirend wirkt, aber eine mydriatische Wirkung auf das Auge nicht ausübt, erzeugen die Lösungen des Euphthalmins, in das Auge eingetropft, beträchtliche Pupillenerweiterung, aber keine Anästhesie. 2—3 Tropfen einer 2 procentigen Lösung erzeugen nach 20—30 Minuten eine 2 bis 3 Stunden anhaltende Mydriasis. Man gebraucht es daher wie Homatropin und Atropin.



Die freie Euphthalminbase

† Euphthalminum salicylicum Salicylsäures Euphthalmin $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{O}_3\text{N}$ $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ Mol Gew = 429

Wird durch Vermischen von 291 Th freier Euphthalminbase und 188 Th Salicylsäure in absolut-ätherischer Lösung als Niederschlag erhalten. Durch Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol-Aether erhält man in Wasser leicht lösliche Krystalle vom Schmelzpunkt 115—116° C.

Evonymus

Gattung der Celastraceae — Celastroideae — Evonymeneae

Evonymus atropurpurea Jacq. Heimisch im nördlichen und mittleren Theil der Vereinigten Staaten. Verwendung findet die Rinde der Wurzel und der jungen Zweige. **Evonymi cortex** (Orit) **Euonymus** (Wahoo) (U-St) **Ecorce d'evonymus** (Gall Suppl.)

Beschreibung Die Rinde besteht aus bis 20 cm langen, 1 cm breiten, halbrinnenförmigen oder rinnenförmigen Stücken von gelblich-grauer Farbe. Der Bast lässt keine Fasern, sondern wie die anderen Evonymus Arten eigenthümliche faserartige, auf der Aussenseite mit Grübchen versehene Gebilde erkennen, von denen man annimmt, dass sie durch Umwandlung normaler Fasern entstanden seien. Geschmack anfangs süßlich-fade, später kratzend, zuletzt bitter.

Bestandtheile Ein Glukosid Evonymin, leicht in Alkohol, schwer in Wasser löslich, ferner Evonsäure, Mannit. Das Evonymin ist ein Herzgift.

Anwendung. Man verwendet die Rinde als Chologogum, Tonicum und Laxativum. Nicht zu verwechseln mit dem Glukosid Evonymin ist die in Amerika gebräuchliche „Konzentration“ das „Resmoid“ gleichen Namens. Man erhält es durch Fallen der konzentrierten alkoholischen Tinktur mit Salzsäure und Vermischen des ausgewaschenen und getrockneten Niederschlags mit einem indifferenten Pulver. Man unterscheidet **Evonyminum fuscum** aus Wurzelrinde und **Evonyminum viride** aus Zweigrinde.

Extractum Euonymi (U St) **Extract of Euonymus** Aus gepulverter Rinde (No 80) wie Extr. Digitalis U St. (S 1041) zu bereiten.

Extractum Evonymi. **Extrait d'Evonymus atropurpureus** **Evonymine brune** (Gall Suppl.) Aus 1000 g gepulverter Rinde (Sieb No 70) und 6 Liter 60 proc Weingeist im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 3 Litern, erschöpft nach 24 Stunden mit dem Rest des Weingeists, verdrängt letzteren durch Wasser und destillirt vom Perkolat den Weingeist ab. Den filtrirten Rückstand dampft man zum weichen Extrakt ein, löst in destill. Wasser, filtrirt und dampft wiederum ein und bringt mit 20 g gepulvertem Milchzucker zur Trockne.

Extracta.

I. Extracta *Extrait* *Extracts* Mit den vorstehenden Namen bezeichnet man Zubereitungen von dünnflüssiger, dickflüssiger oder fester (pulveriger) Beschaffenheit, welche man durch Abdampfen eines natürlichen Saftes oder einer Lösung gewinnt, die durch Ausziehen eines vegetabilischen, seltener animalischen Rohstoffes mittels eines geeigneten flüchtigen Lösungsmittels, hergestellt worden ist

Die Arzneibücher gehen zur Bereitung der Extrakte fast ausnahmslos allgemeine Anweisungen, welche viele gemeinsame Punkte besitzen, in Einzelheiten aber doch von einander abweichen

Austr Die zur Bereitung der Extrakte zu verwendenden Pflanzenstoffe sind zerschnitten, zerstoßen, grob oder fein gepulvert zu verwenden. Zur Bereitung der wasserigen Extrakte werden die Rohstoffe bei nicht über 20° C macerirt oder bei nicht über 50° C digerirt — Die wasserigen Auszüge sind sofort auf den $\frac{1}{4}$ Theil ihres Volumens einzudampfen, dann an einem kalten Orte durch Absetzenlassen zu klären, worauf man die klare Flüssigkeit abgießt oder abfiltrirt und die Kolatur oder das Filtrat durch Eindampfen bei einer 100° C nicht erreichenden Temperatur auf die richtige Konsistenz bringt — Zur Bereitung der spirituellen und ätherischen Extrakte werden die gepulverten Rohstoffe in einem geschlossenen Apparate (Perkolator) durch das Verdrängungsverfahren vollständig erschöpft. Die gesammelten Flüssigkeiten werden vermischt und durch Destillation von der Hauptmenge des Weingestes oder Aethers befreit. Der Destillationsrückstand ist bei gelinder Wärme auf die vorgeschriebene Extraktkonsistenz zu bringen. Bezüglich der Konsistenz sind vier Grade zu unterscheiden

- 1) Flüssige (*Extracta fluida*), von der Konsistenz dichter Tinkturen
- 2) Dunne (*Extracta tenuia*), von der Konsistenz des frischen Honigs (*Mellagines*)
- 3) Dicke (*Extracta spissa*), welche sich nach dem Erkalten nicht ausgießen lassen.
- 4) Trockene, die zu Pulver zerreiblich sind

Zur Bereitung der trockenen Extrakte dampft man die Auszüge bis zu einer gewissen Konsistenz ein, streicht sie alsdann auf Porcellanplatten und trocknet bei nicht über 40° C

Verreibung narkotischer Extrakte Es ist gestattet, Verreibungen nicht trockener narkotischer Extrakte herzustellen und vorrätig zu halten. Zu diesem Zweck wird 1 Th des betreffenden Extraktes mit 1 Th Milchzucker zur Trockne gebracht. Die getrocknete und gepulverte Mischung wird durch Zusatz von Milchzucker auf das Gesamtgewicht von 2 Th gebracht. *Signatur Sumatur daphim*

Brit. Gibt keine allgemeinen Anweisungen zur Darstellung der Extrakte. Aus dem Text lassen sich folgende allgemeinen Gesichtspunkte entnehmen. Die Brit kennt folgende Konsistenzgrade

- 1) Weiche Extrakte (*soft extracts*)
- 2) Dicke Extrakte (*firm extracts*)
- 3) Massig dicke Extrakte (*moderately firm extracts*)
- 4) Trockene Extrakte (*dry extracts*)
- 5) Fluid-Extrakte (*fluid extracts*)

Die alkoholischen Extrakte werden theilweise durch Abdunsten der entsprechenden Fluidextrakte dargestellt. Die narkotischen Extrakte sind, soweit sie Alkaloide enthalten, „standardisirt“, d. h. sie werden auf einen bestimmten Alkaloidgehalt eingestellt

Gall Gibt folgende allgemeine Anweisungen. Natürliche Säfte werden in der von der Natur gebotenen Konzentration (ohne Verdünnung) eingedampft. Müssen Rohstoffe ausgezogen werden, so bemühe man sich, möglichst konzentrierte Auszüge zu erhalten, damit diese durch den Abdampfungsprocess und die hierbei statthabende Einwirkung der Luft möglichst wenig verändert werden — Das Abdampfen soll nicht über freiem Feuer erfolgen. Der beste Apparat für das Abdampfen ist der, welcher das Verdampfen bei möglichst niedriger Temperatur und in der kürzesten Zeit ermöglicht (also das Vakuum)

Gibt es von einem Rohstoff ein wässriges und ein alkoholisches Extrakt, so ist das erstere abzugeben, wenn der Arzt nicht ausdrücklich das letztere verordnet hat.

Die Gall unterscheidet die Extrakte nach folgenden Konsistenzgraden

- 1) Weiche Extrakte (*extraits mous*)
- 2) Dicke Extrakte (*extraits fermes*)
- 3) Trockene Extrakte (*extraits secs*)

Die Gall läßt ferner zahlreiche alkoholische Extrakte durch Perkolation herstellen, ohne doch die Fluidextrakte aufgenommen zu haben

Germ. Die für die Bereitung der Extrakte auszumehenden Rohstoffe müssen in dem vorgeschriebenen Grade der Zerkleinerung angewendet werden — Die wasserigen Auszüge werden sofort auf $\frac{1}{2}$ ihres Volumens eingedampft, dann an einem kühlen Orte absetzen gelassen und durchgeseiht — Das Abdampfen erfolge im Dampfbade (natürlich ist das Vakuum nicht ausgeschlossen) unter Umrühren. Bei alkoholischen und wasserigen Auszügen darf die Verdampfungstemperatur 100°C , bei ätherischen Auszügen 50°C nicht übersteigen. Die wenigsten Extrakte sind gegen Ende des Eindampfens mit kleineren Mengen Weingeist wiederholt zu verrühren und so fertig zu stellen. Bezüglich der Konsistenz unterscheidet Germ in analoger Weise wie Austr: oben 1 dünne Extrakte, 2 dicke Extrakte, 3 trockene Extrakte, 4 Fluid-Extrakte.

Trockene narkotische Extrakte werden aus dicken Extrakten bereitet, indem man 4 Th Extrakt und 3 Th feines Sussholzpulver mischt, die Mischung im Dampfbade austrocknet, noch warm zerreibt und ihr soviel feines Sussholzpulver zumischt, dass das Gesamtgewicht = 8 Th beträgt. Von dieser Extraktmischung entsprechen also 2 Th = 1 Th des ursprünglichen Extraktes. Sie wird daher mit „*Sumatur duplum*“ signirt.

Lösungen narkotischer Extrakte dürfen, nach folgender Vorschrift bereitet, vorrathig gehalten werden: 10 Th Extrakt, 6 Th Wasser, 1 Th Weingeist (von 90 Proc), 3 Th Glycerin. 2 Theile dieser Lösungen entsprechen gleichfalls 1 Theile des ursprünglichen Extraktes.

Helv. Die zur Bereitung der Extrakte dienenden Rohstoffe müssen in dem vorgeschriebenen Grade der Zerkleinerung angewendet werden. Die Auszüge werden absetzen gelassen und filtrirt. Das Eindampfen soll ohne Verzug vorgenommen werden und im Dampfbade oder im Vakuum erfolgen. Beim Verdampfen in offener Schale soll das Verdunsten durch Umrühren beschleunigt werden. Die Verdampfungstemperatur soll bei wasserigen und alkoholischen Auszügen 90°C , bei ätherischen 50°C nicht übersteigen.

Die von der Helv. aufgenommenen Extrakte werden nach ihrer Konsistenz in folgende Grade eingetheilt:

- 1) Fluid-Extrakte
- 2) Dünne Extrakte wie Austr.
- 3) Dicke Extrakte, welche bei 110°C getrocknet 18–20 Proc an Gewicht verlieren
- 4) Trockene Extrakte, welche bei 110°C getrocknet nicht mehr als 4 Proc ihres Gewichtes verlieren

Trockene narkotische Extrakte (*Extracta duplicia*) sind solche, von welchen 1 Th = 2 Th der Droge entspricht. Sie werden mit Reispulver bereitet, dessen Menge je nach dem Trockengehalte des betreffenden Auszuges bemessen wird. Der Gehalt an Trockensubstanz wird bestimmt, indem 1 g des Auszuges bei 110°C bis zum konstanten Gewichte getrocknet wird. Die Flüssigkeit wird nunmehr durch Verdunsten im Wasserbade concentrirt, nach dem Erkalten mit der berechneten Menge trocknen Reispulvers gleichmässig gemischt, bei nicht über 50°C vollständig ausgetrocknet und zerrieben.

Zur Prüfung auf 1) Metallgehalt werden 1–2 g des Extraktes im Porcellantiegel verascht, die Asche wird mit 5 ccm verdünnter Salzsäure (von 10 Proc HCl) erwärmt und die Lösung filtrirt. Das Filtrat darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert und nach Übersättigung mit Ammoniak durch Schwefelammonium nur gefärbt, nicht gefällt werden (eine Ausnahme bildet *Extractum Ferri pomatum*). 2) Wird 1 g Extrakt in der ursprünglichen Extraktionsflüssigkeit gelöst, so darf nach dem Filtriren und Auswaschen nur ein unwägbarer Rückstand zurückbleiben.

U.-St. Gebt keine allgemeinen Vorschriften, sondern schreibt für jedes Extrakt ein besonderes Verfahren vor. Sie kennt:

- 1) Dicke Extrakte (extracts of pilular consistence)
- 2) Trockene Extrakte (dry extracts)
- 3) Fluid-Extrakte (fluid extracts)

Die Auszüge werden (mit Ausnahme des *Extractum Haematoxylini*, bei welchem dies nicht angingig ist) durchweg durch Perkolation bereitet, die alkoholischen Auszüge werden bei nicht über 50°C eingedunstet.

II. Fluidextrakte. Man bezeichnet mit diesem Namen Auszüge von Arznei-Drogen, welche so hergestellt sind, dass 100 Gewichtstheile der Droge = 100 Gewichtstheilen oder Raumtheilen des fertigen Präparates (Fluidextraktes) entsprechen. Dies Princip ist indessen von der Brit. durchbrochen, indem sie für solche Fluidextrakte, welche Alkaloide enthalten, einen bestimmten Alkaloidgehalt vorschreibt, auf welchen die Auszüge einzustellen sind. Die Herstellung der Fluidextrakte erfolgt durch das Verdrängungsverfahren (Perkolation) in besonderen, verschlissbaren Extraktionsgefäßen (Perkolatoren). In diese werden die zu extrahirenden Substanzen im Zustande gehörriger Zerkleinerung „eingepackt“, nachdem sie vorher mit dem Extraktionsmittel befeuchtet und einige Stunden lang im be-

deckten Gefässe stehen gelassen worden sind. Durch langsames Zutropfenlassen der vorgeschriebenen Extraktionsflüssigkeit erreicht man das Abfließen sehr concentrirter Auszüge aus dem Perkolator.

Hat man z. B. aus 1000,0 g Hydrastiswurzel = 1000,0 g Fluidextrakt zu bereiten, so sammelt man die zuerst abfließenden 850,0 g Perkolat und stellt diese bei Seite. Dieser Auszug, welcher die Hauptmenge der vorhandenen Extraktivstoffe enthält, wird keinen eingreifenden Operationen mehr unterworfen. Man setzt nun das Perkoliren fort, bis die Droge erschöpft ist, d. h. bis das Perkolat ungefärbt abläuft, oder bis sich in demselben Alkaloide nicht mehr nachweisen lassen (Vergl. S. 925 die Fussnote). Die so erhaltenen Auszüge sind weitaus schwächer als die zuerst erhaltenen 850 Th. Perkolat. Man destillirt von ihnen die Hauptmenge des flüchtigen Lösungsmittels (Alkohol u. dergl.) ab, dampft den Rückstand im Wasserbade zum dünnen Extrakt ein, nimmt dieses mit einer genügen Menge des vorgeschriebenen Extraktionsmittels auf, bringt auf 150,0 g und vereinigt diese Flüssigkeit mit den vorher zurückgestellten 850,0 g erstem Auszug.

Das Extraktionsmittel ist in vielen Fällen lediglich verdünnter Alkohol. Bisweilen werden demselben, in der Absicht, vorhandene Alkaloide in eine leichter lösliche Form zu bringen, Zusätze von Säuren (Salzsäure, Essigsäure) gemacht. Enthält das Extraktionsmittel Glycerin, so wird es gewöhnlich in zwei Theilen angewendet. Der in bestimmten Gewichtsmengen angewendete I. Theil enthält das Glycerin und wird zum Befeuchten der Droge benutzt, zum Verdrängen dieses ersten Lösungsmittels, bez. zur Beendigung der Perkolation benutzt man alsdann den II. Theil des Lösungsmittels, welcher lediglich aus verdünntem Alkohol besteht.

Bezüglich der Concentration der Fluidextrakte machen die hier berücksichtigten Pharmakopöen folgende Angaben:

Austr. hat in dieser Hinsicht kein bestimmtes Princip, sie schreibt die Concentration für jedes aufgenommene Fluidextrakt im einzelnen Falle vor.

Brit. Lässt bei den indifferenten Drogen aus 1000 g Rohstoff = 1000 cem Fluidextrakt bereiten. Bei den stärker wirkenden, alkaloidhaltigen Drogen lässt sie die Fluidextrakte auf einen im Einzelfalle vorgeschriebenen Alkaloidgehalt einstellen.

Gerin. Lässt aus 100 Gewichtstheilen = 100 Gewichtstheile Fluidextrakt bereiten.

Helv. Wie Germanica.

U-St. Lässt aus 100 Gewichtstheilen Droge = 100 Volumtheile Fluidextrakt bereiten.

Ueber die technischen Einzelheiten der Perkolation s. Kommentar von HAGEN FISCHER-HARTWICH II. Aufl. Bd. I S. 642.

Acetracta, Acetextrakte. Diese von Prof. Remington in Philadelphia angegebenen Arzneiformen werden bereitet, indem man die Drogen anstatt mit Alkohol mit Essigsäure, z. B. mit einer solchen von 60 Proc., extrahirt. Diese Arzneiformen haben in Deutschland bisher Eingang nicht gefunden, auch sind sie wohl noch nicht genügend durchgearbeitet.

Valoids. Unter diesem Namen versteht man in Amerika und in England diejenigen Fluidextrakte, bei welchen 1 g = 1 g der Droge ist (nicht 1 cem = 1 g Droge).

Mit Kochsalzlösung bereitete Extrakte. Nach D. R.-P. 80287 werden die frischen Vegetabilien zerkleinert, mit ungefähr 10 Proc. Kochsalz gemischt, einige Zeit mit diesem stehen gelassen und abgepresst. Die so erhaltene Soolc wird im Vakuum zur Sirupconsistenz eingedickt und mittels der Osmose vom grössten Theile des Kochsalzes befreit. Die so erhaltene Extraktlösung dampft man schliesslich zur Extraktstärke ein. Diese Präparate haben sich bisher nicht eingeführt.

Concentrationen, amerikanische, auch Resinoide, sind Verreibungen indifferenten Pulver wie Milchzucker, Lycopodium u. a. mit den aus den betreffenden Pflanzenstoffen dargestellten wirksamen Bestandtheilen. Die Darstellung ist verschieden. In der Regel wird ein concentrirter alkoholischer Auszug durch Wasser oder mit Säuren angesäuertes Wasser oder Salzlösungen gefällt und der erhaltene Niederschlag mit den oben angegebenen Verdünnungsmitteln verrieben, und zwar so, dass das Gewicht des fertigen Präparates zum Gewicht der angewendeten Rohdroge in einer bestimmten Relation steht. Diese Arzneiformen haben in Deutschland Eingang nicht gefunden. Sie sind besonders deswegen zu erwähnen, weil sie mit Namen belegt werden (Atropin, Baptisin, Corydalin, Hydrastin u. s. w.), welche mit den deutschen Bezeichnungen zahlreicher starkwirkender Alkaloide und Glukoside identisch sind. Evonymin z. B. ist der deutsche Name des Glukosids

Evonymin, aber zugleich die Bezeichnung für die amerikanische Konzentration (das Resinoid) aus der alkoholischen Tinktur der Wurzelrinde bez. der jungen Zweigrinde von *Evonymus atropurpureus*

Fabiana.

Gattung der Solanaceae — Cestreae — Nicotianaceae

Fabiana imbricata R et P Pichi Heimisch in Chile Verwendung finden die beblätterten und oft mit Blüthen versehenen Zweige der Pflanze

Beschreibung Der Habitus der Pflanze ist ein in Rücksicht auf die Familie sehr auffallender, er erinnert an *Erica* und *Tamarix*, auch wohl an manche *Cupressineen*. Die kleinen Blättchen sind dicht dachziegelig gestellt. Das einzelne Blatt ist lanzettlich-zugespitzt, mit konvexer, gekielter Aussen- und konkaver Innenseite, mit breiter Basis sitzend. Die Blüthen sind violett oder weisslich, röhrig, über dem Kelch eingeschnürt, nach oben etwas aufgeblasen, mit 5 Zipfeln. Ältere Aeste zeigen Borkebildung. Die Borke ist schwarzlich-grau, etwas langrissig. Die Gefässbündel sind bikollateral, im Mark der Stengel Sternzellen, ebenso in der Rinde. Die Epidermis mit Drüsenhaaren. Das Blatt führt im Schwammparenchym Drüsen von Oxalat. Die sehr harzreiche Droge ist von schwach balsamischem Geruch und aromatisch-bitterem Geschmack.

Bestandtheile Die Droge enthält nach KUNZ KRAUSE ein Weichharz, welches als die Muttersubstanz einiger anderer Bestandtheile aufzufassen ist, nämlich 1) *Fabianol* $C_{54}H_{90}O_4$, ein atherisches Oel von angenehmem Kampher- und Krauseminzgeruch, und dessen Oxydationsprodukt 2) *Fabianresin* $C_{54}H_{90}O_6$, in weissen Krystallen vom Schmelzpunkt $280^{\circ}C$ erhalten. 3) *Fabianaglykotannoid*, ein hellgelbes, ausserst hygroskopisches Pulver von schwach saurer Reaktion, vielleicht Glykosyl-Dioxyzimmtsäure, und dessen Zersetzungsprodukte 4) *Chrysotropasäure* (β -Methyl Ascouletin) und 5) einen nicht krystallisirenden und nicht drehenden, aber reduzierenden Zucker. Ferner enthält die Droge Cholin und reichliche Mengen von Magnesiumphosphat. Infolge des Gehaltes an *Chrysotropasäure* nimmt die Abkochung der Droge leicht eine violette Farbe an.

Wirkung und Anwendung Man verwendet die zuerst 1885 in Europa bekannt gewordene Droge in Abkochung, als dickes Extrakt oder als Fluidextrakt gegen Erkrankungen der Blase (Blasenstein), Entzündungen der Harnwege, sowie bei Leberleiden. In Südamerika ist die Droge auch ein beliebtes Mittel gegen den Leberegel (*Distoma hepaticum*) der Schafe und Ziegen.

Dosis des Fluidextraktes 0,6—2,6 cem, des dicken Extrakts 0,13—0,65 g

Fagus.

Gattung der Fagaceae

Fagus silvatica L Buche Rothbuche. — Hêtre — Beech. Heimisch im grössten Theile Europas und im westlichen Asien. Man verwendet

1) Die Früchte, dreikantige Schliessfrüchte, zu zweien von der Cupula ganz umschlossen, die bei der Reife aufreiss, um die Frucht zu entlassen. Die Frucht ist bis 18 mm lang, bis 10 mm breit, aussen glänzend braun. In der Fruchtschale unter der Epidermis mehrere Lagen stark verdickter Steinzellen, im darauf folgenden Parenchym reichlich Oxalatdrüsen. Der Samenschale fehlen charakteristische Elemente, sie umschliesst inner halb eines dünnen Endosperms den Embryo mit breiten, mehrfach gefalteten Kotyledonen. Der letztere enthält Oel, Oxalat in Drüsen, Aleuron und kleinkörnige Stärke (die Körnchen bis 5μ). 100 Th. der Früchte enthalten 67 Proc Kerne und 33 Proc Schalen.

Bestandtheile der ungeschälten Früchte nach KOENIG Wasser 4,74 Proc, stickstoffhaltige Substanz 14,34 Proc, Rohfett 23,08 Proc, stickstofffreie Ex-

traktstoffe 32,27 Proc, Rohfaser 21,99 Proc, Asche 3,58 Proc In der Trocken substanz stickstoffhaltige Substanz 15,06 Proc, Rohfett 21,23 Proc

Durch Pressen gewinnt man aus den Samen 12—17 Proc Oel *Oleum Fagi silvaticae*. — *Bucheckernöl* — *Huile des fruits du hêtre* — *Beech oil*.

Es ist hellgelb, ohne Geruch, von fadem Geschmack, dient als Speise- und Brennöl Konstanten Spec Gew 0,920—0,9225 Erstarrungspunkt $-17,5^{\circ}\text{C}$ Schmelzpunkt der Fettsäuren 24°C Erstarrungspunkt 17°C *HEIMKE'sche* Zahl 95,16 Verseifungszahl 196,25 Jodzahl 104,4 Das Oel besteht vorwiegend aus Olein

Die Rückstände von der Oelgewinnung, die Büchelkuchen, Buchelsamen kuchen, finden Verwendung als Viehfutter, doch sollen sie auf Pferde giftig wirken können Die Rückstände mit Schale enthalten Wasser 16,10 Proc, Stickstoffsubstanz 18,15 Proc, Fett 8,34 Proc, stickstofffreie Extraktstoffe 28,39 Proc, Holzfaser 23,89 Proc, Asche 5,13 Proc Ausserdem sollen die Samen einen giftigen Stoff Fagin, der Trimethylamin sein soll, enthalten

2) Aus dem Holz gewinnt man durch trockne Destillation den *Buchenholztheer* (vergl. *Pix*) und aus diesem *Kreosot* (vergl. den betr. Artikel)

Faham.

Faham Thee *Faham Thee* *Bourbon-Thee* — *Feuille de Faham* (Gall) — *Orchid-Tea* sind die Blätter von *Angrecum fragrans* Lindl., Familie der *Orchidaceae* — *Monandriae* — *Acrotonae* — *Sarcanthinae* — *Acridae*, heimisch auf Mauritius und Reunion

Beschreibung. Die Blätter sind lederig, lineal, bis 10 cm lang, bis 12 mm breit, an der Spitze ausgerandet, parallelnervig Unter den Epidermen, von denen nur die untere Spaltöffnungen hat, beiderseits ein sklerotisches Hypoderm Im Mesophyll vereinzelte Sternzellen und Oxalatraphiden Auf beiden Epidermen Drüsenhaare Die Blätter riechen angenehm nach Cumarin, welches anscheinend in krystallinischem Zustande in den Epidermiszellen der Unterseite vorkommt Geschmack angenehm, etwas bitterlich

Bestandtheile 8,68 Proc Wasser, 5,21 Proc Eiweissstoffe, 6,35 Proc Asche, ferner Cumarin, o-Oxyzimmtsäure, o-Cumarinsäure, Phenolpropylsäure

Anwendung Empfohlen als Heilmittel gegen Schwindsucht, als Ersatz des chinesischen Thees Man soll auch Cigarren mit einem Deckblatt aus Tabak daraus machen

Farfara.

Tussilago Farfara L. Familie der *Compositae* — *Tubuliflorae* — *Senecioneae* — *Senecioninae* Heimisch in Europa, Nordafrika und dem gemässigten Asien, im östlichen Nordamerika eingebürgert Kraut mit tief in die Erde gehendem, mehliköpfigen, Ausläufer treibenden Rhizom Im ersten Frühjahr erscheinen die nur mit Schuppenblättern besetzten Blüthentriebe, nach der Blüthezeit die Laubblätter Verwendung finden

1) Die Blüthenköpfchen *Flores Tussilaginis* *Flores Farfarae*. — *Huflattigblüthen*. — *Capitule de tussilage ou de pas d'aue* (Gall) *Zyadur*

Beschreibung. Die Köpfchen sind etwa $1\frac{1}{2}$ cm lang, 2 cm breit, die Blüthen von goldgelber Farbe, der Hüllkelch grünlich, weisslich spinnwebig behaart, cylindrisch, aus zwei Reihen angedruckter Blättchen bestehend Blütenboden ohne Spreublätter

Weibliche Randblüthen in mehreren Reihen, schmal zungenförmig, die zwittrigen Scheibenblüthen röhrig, fünfzählig Griffeläste halb-walzenförmig, stumpf (Fig 241)

2) Die Blätter *Folia Farfarae* (Germ) *Folia seu Herba Tussilaginis* — Huflattigblätter. Huflattig Brandlattig. Brustlattig Lehmblätter Sandkraut Quirinskraut. — Feuilles de tussilage ou de pas d'âne — Coltsfoot leaves

Beschreibung. Die bis handgrossen Blätter sind langgestielt, herzförmig-rundlich, winkelig-gezähnt, die Zähne rothbraun, knorpelig Das Blatt ist von einem Mittelnerven durchzogen, die ersten Sekundärnerven gehen am Grunde des Blattes ab, so dass die Nervatur handförmig erscheint Die Sekundärnerven endigen in den Haupt-Adhärenzen des Blattrandes, ihre Zweige in den kleineren Zähnen Oberseits sind die Blätter kahl, unterseits sind sie, wenigstens in der Jugend, von langen Haaren filzig Die Haare bestehen aus einer Anzahl kürzerer, etwas angeschwollener Zellen, an die sich eine dünnere, am Grunde ebenfalls angeschwollene, ausserordentlich lange Endzelle anschliesst

Epidermiszellen der Oberseite wenig buchtig, mit Stomatien, die der Unterseite stark buchtig, ebenfalls mit Stomatien Unter der Oberseite drei Reihen kurzer Palissaden, das Schwammparenchym ausserordentlich locker, so dass weite Maschen entstehen, die von schmalen Parenchymstreifen gebildet werden Diese Maschen treten auf mit Chloralhydrat durchsichtig gemachten Stückchen des Blattes von der Unterseite sehr deutlich hervor Der Blattstiel ist im Querschnitt langgezogen herzförmig, mit meist 13 Gefässbündeln, unter der Epidermis mit sehr stark ausgeprägtem Collenchym, bei dem besonders die Tangentialwände erheblich verdickt sind Geruchlos, Geschmack fade schleimig




Fig 241

a Scheibenblüthe b Randblüthe von *Tussilago Farfara*

Bestandtheile. Spuren atherischen Oeles, 2,83 Proc eines glukosidischen Bitterstoffes, kautschukartige Substanz, Schleim, Gallussäure und 17,10 Proc Asche, die Chloride, Karbonate, Phosphate und Silicate von Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Aluminium enthält

Verwechslungen und Verfälschungen Die Blätter von *Petasites officinalis* Moench haben bis 60 cm im Durchmesser, sie sind kaum eckig, unterseits wollig, die von *Petasites tomentosus* DC fast dreieckig-herzförmig, unterseits schneeweiß filzig, Lappen des Grundes vorne verbreitert, einwärts gekrümmt, die von *Petasites niveus* Baumgarten sind ähnlich, aber die Lappen des Grundes auseinander tretend Alle sind den Huflattigblättern ähnlich gebaut, doch haben sie nur eine Palissadenschicht

Die Blätter der Kletten, *Lappa officinalis* Allioni und *Lappa tomentosa* Link, sind oval herzförmig, zugespitzt, klein gezähnt, mit stark auf der Unterseite hervortretenden Nerven

Einsammlung und Anwendung Die Blätter werden im Mai und Juni gesammelt, geschnitten, von erdigen und filzigen Theilen durch Absieben gereinigt und an einem trocknen Orte aufbewahrt 5 Th. frische geben 1 Th. trockne Man bedient sich ihrer bei katarrhalischen Leiden der Respirationsorgane Die Wirksamkeit bei Skrophulose bedarf der Bestätigung

Ptisana de floribus Tussilaginis Tisane de tussilage (Gall.) 5g Huflattigblüthen, 1000 g siedendes Wasser Nach $\frac{1}{2}$ Stunde abseihen und durch Papier filtriren

Sirupus de Tussilagine. Sirop de tussilage (Gall.) Wie Sirop Chamomillae (S 716) zu bereiten

Sirupus pectoralis Sirop d'espèces pectorales (Gall.) 100 g Brustthee (Espèces pectorales avec les fleurs, Gall S 233) übergiesst man mit 1200 g siedendem Wasser, presst nach 6 Stunden, bringt auf 1000 g, filtrirt, fügt 50 g Orangenblüthenwasser, worin 0,3 g Opiumextrakt gelöst sind, hinzu und macht mit 2000 g Zucker zum Sirop

Species Hispanicae
Thea Hispanica Spanischer Thee.

Rp	Florum Ithae	
	Foliorum Farfarae	
	Foliorum Millefolii	
	Foliorum Menthae pip	
	Herbae Veroniceae	
	Rhizomat Graminis	aa 85,0
	Fructus Cestromie	
	Hordei perlati	aa 80,0
	Herbae Violae tricolor	
	Florum Rhoeados	aa 50,0
	Rhizom Polypodi	
	Rhizom Calami	
	Ligni Sassafras	
	Fructum Foeniculi	
	Fructum Anisi	
	Fassular major	aa 30,0
	Robor Rosmarini	
	Robor Lauri	
	Florum Primulae	
	Florum Cyani	
	Rhizomat Indis	aa 10,0

Species majales

Maikurthee

Rp	Species Hispanic	500,0
	Natri sulfure in crist parv	50,0
	Florum Verbasci	
	Florum Rhoeados	aa 45,0

Species pectorales Knapp	
Knapp's Hustenthees	
Rp	Foliorum Farfarae 20,0
	Foliorum Urticae
	Herbae Equiseti aa 10,0
	Fruct Foeniculi
	Fruct Juniperi
	Folior Plantaginis
	Flor Malvae arbor
	Flor Fulse aa 5,0
	Semina Foeniculi
	Flor Verbasci aa 25

Thea Helvetica
Species vulnerariae Espèces
vulneraires (Gall) Thé suisse

Rp	Florum Amicae
	Florum Antennariae dioicae
	Florum Tussilaginis
	Herbae Absinthii
	Betonicae
	" Ajugae reptantis
	" Calaminth offic
	" Chamaedrys
	" Hyssopi
	" Heder terrestr
	" Millefolii
	" Organi
	" Vincet pervinc
	" Rosmarini
	" Saniculae
	" Salviae
	" Scolopendril
	" Scordii
	" Thymi
	" Veronicae aa

Bock's Pectoral, Hustenpastillen, enthalten nach Angabe des Fabrikanten Huflattig, Süssholz, Island Moos, Röm Kamillen, Sternanis, Veilchenwurzel, Eibisch, Schafgarbe, Klatschrose als Auszug, mit Malzextrakt, Salmiak, Tragant, Zucker, Vanille und Rosenöl zu Pastillen geformt

HABERLAND's Alpenkrauterthee, ein Blutreinigungsmittel, besteht aus Eibischwurzel, Süssholz, Senna, Guajakholz, Sassafras, Ringelblumen, Klatschrosen, Schlehen- und Schafgarbenblüthen, Waldmeister und Huflattig

Harzer Gebirgsthee, von PAUL HEIMER Eine Mischung von Schafgarbe, Lavendel, Schlehdornblüthen, Sassafras, Senna, Pfefferminze, Huflattig, Süssholz

Herba Salona ist ein Gemisch aus Huflattig und zerriebenen Weizenschrot

Kräutertee (Wiener Vorschrift) Eibisch, Huflattig, Scabiosenblätter, Lungenkraut aa 4,0, Leberkraut, Sassafras, Guajak, Rothes Sandelholz, Queckenwurzel, Süssholz, Sennesblätter aa 2,0, Fenchel 1,0, Klatschrosen, Kornblumen, Weiblumen aa 0,5

Lippspringer Thee Huflattig, Island Moos, Eibisch, Alant, Süssholzwurzel, Wasserfenchel, Schafgarbe aa 20,0, Klatschrosen, Malvenblumen, Weiblumen aa 10,0

Fel.

Die Galle ist ein Gemenge von dem Sekrete der Leberzellen und dem sog Schleim, welcher von den Drüsen der Gallengänge und von der Schleimhaut der Gallenblase abgesondert wird. Das Sekret der Leber, die Lebergalle, ist dünnflüssig und klar, die in der Gallenblase angesammelte Galle ist mehr zähe und dickflüssig und infolge Beimengung von Zellen, Pigmentkalk und dergl trübe. Therapeutische Verwendung findet nur die Rindergalle, welche den frisch geschlachteten Rindern (*Bos taurus* L) bez deren Gallenblasen im möglichst frischen Zustande entnommen wird

I. Fel Tauri (Erganzb) **Fel Bovis** (U-St) **Biel de boeuf** (Gall) **Fel Tauri recens**, Ochsegalle, **Fiel de boeuf** Ovgall.

Die frisch der Gallenblase des Rindes entnommene Flüssigkeit werde vor dem Gebrauche durchgeseiht — Bräunlichgrüne oder dunkelgrüne, schleimig-dickliche, eigen-

thümlich, aber nicht widerlich oder faulig riechende Flüssigkeit von sehr bitterem, unangenehmem Geschmache, von neutraler oder schwach alkalischer Reaktion. Mit Wasser geschüttelt, schäumt sie seifenartig. Das spec. Gewicht ist bei 15° C = 1,018—1,028. Löst man eine ganz kleine Menge Galle in einem Porcellanschälchen direkt in wenig konc. Schwefelsäure und erwärmt, oder mischt man ein wenig gallensaurehaltige Flüssigkeit mit konc. Schwefelsäure mit der Vorsicht, dass in beiden Fällen die Temperatur nicht über 70° C steigt, und fügt dann unter Umrühren mit einem Glasstabe tropfenweise Rohrzuckerlösung von 10 Proc. hinzu, so erhält man eine prachtvoll rothe Flüssigkeit, deren Farbe bei Zimmertemperatur nicht verschwindet, aber im Verlaufe eines Tages mehr blauviolett wird. Die rothe Flüssigkeit zeigt vor dem Spektroskop zwei Absorptionsstreifen, den einen bei *F* und den anderen zwischen *D* und *E*, neben *E* (PETTENKOPF's Gallensaure Reaktion). Da diese Reaktion auf die Bildung von Furfurol durch Einwirkung der Schwefelsäure auf Zucker beruht, so kann man sie nach MYLUS und UBRANSKY auch mit 1% Furfurolösung ausführen. Zu je 1 ccm der alkoholischen Gallenlösung setzt man 1 Tropfen 1% Furfurolösung und 1 ccm konc. Schwefelsäure und kühlt, wenn nöthig, etwas ab. Es entsteht alsdann gleichfalls die oben beschriebene Färbung. In dieser Weise soll sich noch $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{100}$ mg Cholsäure nachweisen lassen.

Die Galle enthält 8—10 Proc. Trockensubstanz, in dieser als spezifische Bestandtheile Gallensäuren (Glykocholsäure $C_{26}H_{47}NO_8$ und Taurocholsäure $C_{26}H_{45}NSO_7$) an Kali und Natron gebunden, Gallenfarbstoffe (Bilirubin, Biliverdin), im übrigen kleine Mengen Lecithin, Cholesterin, Seifen, Neutralfette, Harnstoff und Mineralstoffe ($NaCl$, $Ca_3(PO_4)_2$, $Mg_3(PO_4)_2$ und $FePO_4$). Sämmtliche gallensauren Alkalisalze sind löslich in Wasser und Alkohol, unlöslich in Aether. Die alkoholische Lösung der Salze wird daher durch Aether gefällt, und diese Fällungen können im krystallinesten Zustande erhalten werden (PLATTNER's krystallisirte Galle) durch Fällung mit Alkohol kann man die Schleimstoffe, durch Extraktion mit Aether das Fett, Cholesterin und verwandte Stoffe, durch Digestion mit Thierkohle die Farbstoffe entfernen. Die genuine Galle ist nur eine beschränkte Zeit haltbar und geht bald in Faulniss über. Für therapeutische Zwecke wird sie daher in eine haltbare Form gebracht.

Die physiologische Rolle der Galle besteht darin, dass sie die Aufgabe hat, die Resorption der Fette zu befördern, dadurch, dass sie dieselben verseift und emulgirt. Ausserdem nimmt man an, dass die Galle die pankreatische Verdauung des Eiweisses unterstützt und eine gewisse Desinfektion des Darmes besorgt.

Anwendung. Die frische Ochsgengalle wird löffelweise hypochondrischen Hamorrhoidariern gegeben. Sie wird beim Fleischer bestellt und noch frisch aus dem geschlachteten Thiere genommen, kühlt und dispensirt. Ueber zwei Tage halt sie sich, auch wenn sie im Eisschrank aufbewahrt wird, nicht. Damit sie sich einige Tage länger konservirt, ist ein Zusatz von circa 3 Proc. Spiritus aethereus zu empfehlen. Die Anwendung der Ochsgengalle im Haushalt und in den Gewerben zur Reinigung gefärbter wollener Zeuge ist bekannt. Um Ochsgengalle für einen weiten Transport oder auf mehrere Tage zu konserviren, versetzt man sie mit 0,5—1,0 Proc. Aether.

II Fel Tauri inspissatum (Ergänzb.) Extractum animale amamm. **Eingedickte Ochsgengalle.** Erwärmte und durch Leinwand geseichte, frische Ochsgengalle dampft man sofort im Dampfbade in einem Porcellangefässe ohne umzurühren zur Konsistenz eines dicken Extraktes ein. Das „ohne umzurühren“ ist so zu verstehen, dass die euzudampfende Galle nicht unnöthig viel gerührt werden soll. Ausbeute 11—13 Proc.

Eigenschaften. Die eingedickte Ochsgengalle bildet eine grünlich-braune Masse von dicker Extraktconsistenz, von anfangs süßlichem, dann stark bitterem Geschmack und dem eigenthümlichen Gallengeruche. Frisch bereitet, giebt sie mit Wasser eine grünlich-braune, klare, nach längerer Aufbewahrung etwas trübe Lösung. Sie enthält die Bestandtheile der Ochsgengalle, jedoch zum Theil im veränderten Zustande.

Anwendung. Man wendete dies Präparat früher in denselben Fällen wie die trockene gereinigte Ochsgengalle an. Das Volk streicht es auf Blase wie ein Pflaster auf

und legt es den kleinen Kindern auf den Nabel oder Unterleib zur Vertreibung der Spulwurmer

III Fel Tauri depuratum inspissatum Fel bovinum purificatum (Brit)
Fel Bovis purificatum (U-St) Gereinigte eingedickte Ochsen-galle Purified Ox Bile (oder Ox Gall)

Man dampft 300 g frische Ochsen-galle auf etwa 120 g ein, vermischt den Rückstand mit 100 g Alkohol (95 proc), filtrirt nach dem Absetzen und wäscht den Filtrückstand mit etwas Alkohol nach, destillirt von den vereinigten Filtraten die Hauptmenge des Alkohols ab und dampft den Rückstand zu einem dicken Extrakt ein

Eigenschaften und Anwendung wie das vorige Durch die Reinigung mit Alkohol werden namentlich die Eiweisstoffe beseitigt Ausbeute 8—10 Proc Das Präparat besteht vorwiegend aus glykocholsaurem und taurocholsaurem Kali und Natron und Gallenfarbstoffen

IV Fel Tauri depuratum siccum (Ergänz) Fel Tauri depuratum. Natrum cholemicum Extractum Fellis taurini Gereinigte trockne Ochsen-galle. Gleiche Volume frischer Ochsen-galle und Weingeist werden unter Schütteln durcheinander gemischt und zwei Tage bei Seite gestellt, filtrirt, hierauf von dem Filtrat der Weingeist durch Destillation im Wasserbade abgezogen und der Rückstand unter häufigem Umschütteln mit so viel feuchter thierischer Kohle, welche vorher durch Salzsäure gereinigt worden ist, nach und nach versetzt, bis eine der Flüssigkeit entnommene und filtrirte geringe Menge sich nur von schwach gelber Farbe erweist Alsdann filtrirt man und macht die Flüssigkeit zu einem trocknen Extrakt Ausbeute circa 6,5 Proc

Eigenschaften Die trockne gereinigte Galle bildet ein hygroskopisch gelblich-weißes Pulver von anfangs süsslichem, dann anhaltend bitterem Geschmack und schwachem Gallengeruch Mit Wasser und verdünntem Weingeist giebt sie klare, schwach gelbliche Lösungen Die wässrige Lösung, die beim Schütteln stark schäumt, mit etwas Zucker versetzt, wird auf allmählichen vorsichtigen Zusatz von concentrirter Schwefelsäure dunkel-purpurroth gefärbt (PETTENKOPF'sche Gallenprobe) und giebt dann mit vielem Wasser verdünnt eine völlig trübe zimmtfarbene Flüssigkeit Beim Glühen hinterlässt die Galle einen weissen alkalischen Rückstand

Die Bestandtheile der trocknen reinen Galle sind vorwiegend Taurocholsäure, Glykocholsäure, hauptsächlich an Natrium, theils auch an Kali gebunden, dann Cholin, Glycerin-phosphorsäure (Lecithin), etwas fleischmilchsäure Salze Die gereinigte trockne Galle ersetzt das sogenannte (unreine) choleinsäure Natrium, *Natrum cholemicum*

Prüfung Die Reinheit des Präparats ergibt sich theils aus den vorstehend angegebenen Eigenschaften Verfälschungen mit Arabischem Gummi, Dextrin und Milchzucker und die Verunreinigung mit Gallenschleim werden beim Auflösen in kaltem Weingeist erkannt, welche Stoffe darin ungelöst bleiben Die weingeistige Lösung des reinen Präparats ist fast klar Mit Chloroform geschüttelt, setzt sich die reine Ochsen-galle in der Ruhe an der Oberfläche ab, während etwaige beigemischte Salze, Zucker etc einen Bodensatz bilden Beim Erhitzen schmilzt das Pulver, bläht sich dann unter Ausstossung widerlich riechender, leicht entzündlicher Dämpfe auf Die zurückbleibende kohlige Masse hinterlässt endlich nach starkem Glühen von dem Gewicht der trocknen gereinigten Galle ungefähr $\frac{1}{6}$ weisse Asche von alkalischer Reaktion

Anwendung Man giebt die trockne gereinigte Ochsen-galle zu 0,3—0,5—1,0 mehrmals täglich in Pillen bei Verdauungsschwäche, chronischen Magenkatarrhen, zur Bethätigung der Gallensekretion, bei Störungen der Leberfunktionen, chronischen Leber- und Milzanschwellungen, Diabetes mellitus etc Ausserlich hat man sie als Streupulver in Wunden gebraucht

V Extrait de fiel de boeuf (Gall.) Frische Ochsen-galle wird durch ein Wolltuch kocht und die kochte Flüssigkeit im Wasserbade zum trocknen Extrakte eingedampft

Balsamum oticum

Ohrenbalsam Gehörbalsam

Rp	Fellis taurini inspissati	50
	Acidi salicylici	1,0
	Glycerini	150
	Aquae Cinnamomi vinosae	100
	Olei Thymi	gtt XV

Einige Tropfen auf Baumwolle täglich in den Gehörgang einzuführen (bei Ausfluss aus den Ohren)

Glycerinum fellis bovis

(New-Yorker Vorschr)

Rp	Fellis tauri inspiss.	1000 g
	Glycerini	700 „
	Acidi salicylici	1,0 „
	Aquae destill. q s ad	200 ccm
D S	30—40 ccm mit Seifenwasser zum Klystier	

Linimentum Sanctae Mariae

St. Marienbalsam Unguentum PONCILL.

Rp	Fellis Tauri recentis	100,0
	Salis culinaris	20,0
	Olei Papaveris	100

Zum Einreiben (bei Verhärtungen und Anschwellungen, besonders der Brüste)

Oleum oticum SPIELMANN

SPIELMANN'Sches Gehörl.

Rp	1 Bulbi Allii Cepae concisi	50,0
	2 Fellis Tauri recentis	20,0
	3 Olei Amygdalarum	50,0
	4 Olei Majoranae	
	5 Olei Rosmarini	
	6 Olei Rutae	aa gtt. VI.

Man digerirt 1 mit 2 und 3 während 2 Tagen, presst ab und fügt zu dem filtrirten Oele 4—6 zu

Pilulae aperientes CLAY

Rp	Fellis taurini inspissati	10,0
	Olei Carvi	gtt XII
	Magnesi carbonici	q s

Fiant pilulae 50,0

Täglich dreimal drei Pillen (bei Verstopfung aus mangelnder Gallenabsonderung)

Unguentum vermifugum

Pp	Aloës pulverisat.	5,0
	Fellis Tauri inspissati	7,5
	Glycerini	
	Spiritus Vini	aa gtt XV
	Unguenti Rosmarini compositi	25,0
	Täglich dreimal die Nabelgegend einzureiben.	

Pilulae aperientes HUTTENLAND

Rp	Fellis Tauri inspissati	
	Extracti Taraxaci	
	Saponis medicati	
	Rhizomatis Rhei	aa 50

Fiant pilulae 150

Cortici Cinnamomi Cassiae pulverato conspergantur
Täglich dreimal 5—10 Pillen (bei Leibesverstopfung)

Pilulae Natril choleylis

Rp	Fellis Tauri depurati sicc.	10,0
	Gummi Arabici	10
	Radici Althaeae	0,5
	Aquae destillatae	q s

Fiant pilulae 100

Täglich zweimal, später dreimal je fünf Pillen (bei Cholichthasie)

Pilulae resolventes WEICKARD

Rp	Fellis taurini depurati sicc.	10,0
	Extracti Gentianae	
	Extracti Centaurii minoris	
	Rhizomatis Rhei	aa 5,0
	Radici Gentianae	q s

Fiant pilulae 150

Täglich dreimal 4—6 Pillen (bei Hypochondrie)

Sapo fellitus

Gallenseifenkugeln

Pp	1 Fellis taurini recentis	100,0
	2 Boraci pulverati	50
	3 Sacchari albi pulverati	30,0
	4 Saponis Hispanici pulverati	400
	5 Terebinthinae laticinae	4,0

Man dampft 1 auf 20,0 ein, mischt 2—5 darunter und formt Kugeln von 30,0 g Schwere. Zum Reinigen gefärbter Stoffe aus Wolle oder Seide

Sapo fellitus liquidus

Flüssige Gallenseife

Rp	Massae Saponis felliti	50,0
	Fellis taurini recentis	200,0
	Glycerini	1000
	Liquoris Ammonii caustici	5,0
	Olei Terebinthinae	gtt XV

Anwendung wie Sapo fellitus.

Dr Meyer's Unterleibspillen, von einer Berliner Apotheke in den Handel gebracht, erwiesen sich zusammengesetzt aus Fellis taurini depurati sicc. 7,0, Saponis medicati 5,0, Extracti Liquiritiae 2,0, Tuberum Jalapae et Radici Althaeae ana q s zu 120 Pillen gemacht (HAGER, Analyt.)

Liqueur BERNHARD, ein Fleckwasser, bestehend aus circa 10 Th Galle, 5 Th Pottasche und 100 Th Wasser

Ferrum.

Ferrum. Mars. Eisen. Fer (franz) Iron (engl) Fe. Atomgew = 56 Das metallische Eisen findet in der Pharmacie in mehrfachen Formen Verwendung

I **Ferrum in filis**, Eisendraht. **Clavi ferrei**, eiserne Nägel. **Limatura Ferri**, Ramentum Ferri, Ferrum in ramentis, Scobis ferrea, Eisenfelle, Eisenspäähne. **Tornatura Ferri**, Eisendrehspäähne.

Unter den vorstehenden Namen verstand man früher diejenigen Formen des Eisens, in denen dasselbe damals, als die reineren Eisensorten noch einen verhältnissmässig hohen Preis hatten, zur Darstellung von Eisenpräparaten verwendet wurde. Die Verhältnisse sind heute infolge des wohlfeilen Preises der reineren Eisensorten sehr viel einfachere geworden — Als leitende Gesichtspunkte für die Auswahl des zu Eisenpräparaten bestimmten Eisens kann man folgende nehmen.

Gusseisen, welches neben Kohlenstoff, Silicium, Phosphor auch noch Schwefel, Arsen, Kupfer, Blei und je nach der Beschaffenheit der Erze, aus denen es ausgebracht wurde, auch noch andere Metalle als Verunreinigungen enthält, sollte niemals zur Darstellung pharmaceutischer Präparate benutzt werden. Das Gleiche gilt hier für den Hammerschlag, den Drahtabfall und die Eisenfeilspäähne der Metallarbeiter. Diese enthalten in der Regel Kupferfeilspäähne und Messingstaub.

Das beste Material zur Darstellung von Eisenpräparaten ist der Eisendraht. Man verwendet ihn in Stärken von 1–1,5 mm. Da er oberflächlich stets etwas fettig ist, so wird er von dieser Fettschicht entweder durch Abreiben mit Kork, oder durch schwaches Ausglühen gereinigt. Um ihn bequemer handhaben zu können, biegt man ihn in kleine Weifen oder dreht ihn in kleine Zöpfe. Fast ebenso rein sind die eisernen Nägel, und zwar sowohl die jetzt nur noch ausnahmsweise gebrauchten Schmiedenägel (Haken) als auch die sog. Drahtstifte. — Sehr rein sind ferner die in den Maschinfabriken abfallenden Eisendrehspähne.

Prüfung. Man übergiesst 1,0 Eisenfeile mit 9,0 verdünnter (12,5 procentiger) Salzsäure, bewirkt die Lösung zuletzt unter Anwendung von Wärme und verdünnt mit einem doppelten Volum Wasser. Ein Theil dieser Lösung mit Schwefelwasserstoffwasser versetzt, darf sich höchstens etwas dunkler färben oder bräunen, aber keinen dunklen Niederschlag ergeben (Kupfer, Blei). Erfolgte hier keine Fällung, so versetzt man einen anderen Theil der Lösung jenes Rückstandes mit einer reichlichen Menge Natriumacetatlösung oder Ammoniumacetatlösung und dann mit Schwefelwasserstoff. Eine weisse Fällung zeigt Zink an. Eine schwache Trübung ist gegenstandslos.

Die Eisenfeile, welche zur Darstellung des Tartarus martiatus Verwendung findet, wird in gleicher Weise geprüft, jedoch ist 1,0 der Eisenfeile in der genügenden Menge Bromsalzsäure (s. S. 507) zu lösen.

Aufbewahrung. In gut und dicht geschlossenen Glasgefässen, um das Rosten zu verhindern.

Ferrum in filis pro analysi. Eisendraht zur chemischen Analyse. Zur Titerstellung von Kaliumpermanganatlösungen benutzt man Blumendraht oder dünne Klaviersaiten, welche durch Abreiben mit Bismutpulver und darauffolgend mit Filterpapier von Unreinigkeiten und Oxyd befreit sind. Man kann, ohne einen besonderen Fehler zu begehen, annehmen, dass dieser Draht 99,6 Proc. Eisen enthält. Für ganz genaue Bestimmungen muss der Eisengehalt des Drahtes ein für allemal festgestellt werden.

II Ferrum pulveratum (Aust. Germ. Helv.) Limaille de fer porphyrisée (Gall.) Gepulvertes Eisen. Eisenpulver. Limatura Martis praeparata. Pulvis Ferri alcoholisatus.

Es wird in Tyrol fabrikmässig dargestellt. Möglichst reines Eisen wird zunächst mit grossen Feilen, welche durch Wasserkraft bewegt werden, bearbeitet, und die erhaltene „Eisenfeile“ durch Stossen in Stahlmörsern noch weiter zerkleinert. Das so erzielte Eisenpulver wird durch Luftgebläse sortirt, wobei die feinsten Theilchen am weitesten weggetragen werden, während die gröberen Theile näher liegen bleiben. Die letzteren gelangen in den Stahlmörser zurück und werden nach wiederholter Zerkleinerung wiederum durch den Luftstrom sortirt. Zum Pulvern darf nicht Gusseisen, sondern lediglich Schmiedeeisen oder kohlenstoffarmer Stahl (Draht) verwendet werden.

Eigenschaften. Das reine gepulverte Eisen bildet ein geruch- und geschmackloses, schweres, höchst feines, graues oder dunkelgraues Pulver, welches vom Magneten angezogen wird, welches beim Druck mit dem Pistill eine grau metallisch glänzende Fläche bietet, und beim Auflösen in verdünnter Salzsäure unter Entwicklung übelriechenden

Wasserstoffgases bis auf einen unbedeutenden und leichten, kohligen Rückstand löslich ist. Von Wasser wird es wegen anhaftender Luftbläschen nur unvollständig benetzt. Beim Glühen an der Luft verglimmt es zu rothem Eisenoxyd, welchem sich mit Essigsäure fremde Metalle entziehen lassen.

Das Eisenpulver besteht nicht aus chemisch reinem Eisen, es enthält grössere oder kleinere Mengen Kohlenstoff (Graphit), Schwefel, Arsen, Phosphor, Silicium, Sand, oft auch Mangan, Kupfer, Blei. Verfälschungen sind Graphit, Sand, Hammerschlag.

Das aus rohem Gusseisen hergestellte Eisenpulver hat eine schwarzgraue Farbe und ist mit Kohle, Schwefel, Arsen, Phosphor, Silicium und Mangan reichlich verunreinigt. Die Pharmacopoen fordern ein von Zink, Kupfer und Blei völlig reines Eisenpulver. Schwefel und Arsen dürfen darin nur in sehr geringen Spuren enthalten sein. Demnach darf das aus rohem Gusseisen hergestellte Eisenpulver nicht in den Gebrauch gezogen werden, und ist ein dunkel- oder schwarzgraues Eisenpulver zuzurückzuweisen.

Prüfung Diese richtet sich gegen einen Gehalt von Schwefel, Arsen, sowie fremden Metallen und auf die Bestimmung des Eisengehaltes. 1) Wird 1 g Eisenpulver mit 20 ccm verdünnter Schwefelsäure (Helv) oder mit einer Mischung aus 15 ccm Wasser und 10 ccm Salzsäure von 1,123 sp G (Germ) übergossen, so soll das entweichende Gas einen mit Bleiacetat getränkten Papierstreifen innerhalb 5 Sekunden nicht mehr als braunlich färben. Da jedes technische Eisen unter diesen Bedingungen Schwefelwasserstoffentwicklung giebt, so wird es sich nur darum handeln, ein nicht zu stark schwefelhaltiges Eisenpulver auszuwählen. Man wird also dem Eisenpulver den Vorzug zu geben haben, welches unter sonst gleichen Bedingungen eine nur leichte Bräunung des Bleipapiers verursacht. 2) Wird ein Theil der sub 1 erhaltenen salzsauren oder schwefelsauren Lösung mit Schwefelwasserstoffwasser übersättigt, so darf sich an der Berührungsstelle eine dunkle Zone (Blei, Kupfer) nicht zeigen. 3) Ein anderer Theil der sub 1 erhaltenen salzsauren oder schwefelsauren Lösung wird mit starker Salpetersäure vollständig oxydirt und diese Lösung in zwei Hälften getheilt. a) Wird die eine Hälfte mit Natriumlauge übersättigt, so darf das Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser nicht weiss getrübt werden (Zink). b) Wird die andere Hälfte mit Ammoniakflüssigkeit übersättigt, so darf das Filtrat nicht bläulich gefärbt erscheinen (Kupfer). 4) Ein Gemisch aus 0,2 g gepulvertem Eisen und 0,2 g Kaliumchlorat werde in einem geräumigen Probirrohr mit 2 ccm Salzsäure übergossen, und die Mischung, nachdem die Einwirkung beendet ist, bis zur Entfernung des freien Chlors erwärmt. Wird alsdann 1 ccm des Filtrats mit 3 ccm Zinnchloridlösung versetzt, so darf innerhalb einer Stunde eine braune Färbung nicht eintreten. Diese Prüfung würde durch das Auftreten einer braunen Färbung oder eines braunen Niederschlages die Anwesenheit grosserer Mengen von Arsen, als zuzulassen sind, anzeigen. Kleine Mengen von Arsen sind nahezu in jedem Eisenpulver enthalten. Ihr Nachweis geschieht am schärfsten durch den Marsh'schen Apparat. 5) Bestimmung des Eisengehaltes. Germ und Helv schreiben für das Eisenpulver einen Gehalt von 98 Proc metallischem Eisen vor.

Germ lässt die Bestimmung auf jodometrischem Wege ausführen. 1 g gepulvertes Eisen werde in etwa 50 ccm verdünnter Schwefelsäure gelöst, und diese Lösung auf 100 ccm verdünnt. 10 ccm der verdünnten Lösung werden mit Kaliumpermanganat (5 = 1000) bis zur schwachen bleibenden Röthung versetzt, nach eingetretener Entfärbung, welche nöthigenfalls durch einige Tropfen Weingeist veranlasst werden kann, werde 1 g Kaliumjodid zugegeben und die Mischung eine Stunde lang bei gewöhnlicher Wärme im geschlossenen Gefässe stehen gelassen, es müssen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods mindestens 17,5 ccm der Zehntel-Normal-Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden.

Helv. 0,1 g Eisenpulver, bei Luftabschluss in 15 ccm verdünnter Schwefelsäure gelöst, soll so viel Kaliumpermanganatlösung bis zum Eintreten einer röthlichen Färbung erfordern, als zur Oxydation von 1,75 ccm Normal-Oxalsäure erforderlich ist.

Ueber die Einzeinheiten beider Bestimmungen. s. S. 1088.

III Ferrum reductum (Austr. Germ. Helv.) Fer réduit par l'hydrogène (Gall.) Ferrum redactum (Brit.) Ferrum reductum (U-St.) Ferrum Hydrogenio reductum. Reducirtes Eisen. Reduced iron. (Fer de Quevenne.)

Darstellung Diese zerfällt 1) in die Darstellung eines reinen Ferrhydroxydes (aus Ferrichlorid), Trocknen und Pulvern desselben, 2) in das Ueberleiten eines ergiebigen und anhaltenden Stromes von reinem Wasserstoffgase über das getrocknete Ferrhydroxyd, welches in dünner Schicht ausgebreitet ist und allmählich auf Rothgluth erhitzt wird. Das Erhitzen ist so lange fortzusetzen, als noch Wasserdampf entweicht. 3) In dem Erkalten lassen des reduzierten Eisens im Wasserstoffstrome — Das erforderliche Wasserstoffgas wird aus Zink und verdünnter Schwefelsäure entwickelt und zu seiner Reinigung zunächst durch Lösungen von Bleiacetat und Cuprisulfat, schliesslich, um es zu trocknen, durch conc. Schwefelsäure geleitet.

Das reducirte Eisen wird von den deutschen chemischen Fabriken in durchaus vorchriftsmässiger Beschaffenheit geliefert.

Eigenschaften Das sog. durch Wasserstoff reducirte Eisen ist nicht reines metallisches Eisen, sondern ein Gemenge von metallischem Eisen und Eisenoxyduloxyd. Es bildet ein geruch- und geschmackloses und je nach dem Gehalte an Eisenoxyduloxyd glanzloses graues oder dunkelgraues, feines Pulver, welches vom Magneten angezogen wird und specifisch etwas leichter als das gepulverte Eisen ist. Ein grauschwarzes oder schwarzes reducirtes Eisen ist verdächtig, denn es enthält entweder nur wenig metallisches Eisen und viel Eisenoxyduloxyd, oder es ist stark kohlenstoffhaltig. An der Luft erhitzt, verglimmt es zu rothem Ferrioxyd. In verdünnter Salzsäure löst es sich unter Entwicklung eines geruchlosen Wasserstoffgases zu einer grünlichen Flüssigkeit.

Prüfung Dieselbe erfolgt im allgemeinen unter den gleichen Gesichtspunkten wie bei Ferrum pulveratum, nur sind die Anforderungen noch etwas strenger:

1) 1 g reducirtes Eisen muss sich in einer Mischung von 15 ccm Wasser und 10 ccm Salzsäure (25 Proc.) bis auf höchstens 0,01 g (Kieselsäure) leicht auflösen — Das dabei entweichende Wasserstoffgas sei fast geruchlos und verändere Bleiacetatpapier innerhalb 5 Sekunden überhaupt nicht (Abwesenheit von Schwefelverbindungen).

2) 10 ccm Wasser, mit 2 g reducirtem Eisen geschüttelt, dürfen rothes Lackmuspapier nicht bleichen, das Filtrat darf beim Verdunsten keinen Rückstand hinterlassen (Natriumkarbonat, von der Darstellung herrührend).

3) Prüfung auf Arsen erfolgt genau wie unter Ferrum pulveratum angegeben.

4) Die Bestimmung des Eisengehaltes nimmt bei diesem Präparate insofern eine Sonderstellung ein, als hier nicht der Gesamtgehalt an Eisen, sondern nur der Gehalt an metallischem Eisen bestimmt werden soll.

Germ. 1 g reducirtes Eisen werde mit 50 ccm Wasser und 5 g gepulvertem Quecksilberchlorid im Wasserbade unter häufigem Umschwenken so lange erwärmt, bis dasselbe gelöst ist, die Flüssigkeit nach dem Erkalten mit Wasser bis zu 100 ccm aufgefüllt und filtrirt. 10 ccm des Filtrats werden zunächst mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure, und hierauf mit Kaliumpermanganatlösung (5 = 1000) bis zur bleibenden Rothung versetzt, nach eingetretener Entfärbung, welche nothigenfalls durch Zusatz von einigen Tropfen Weingeist veranlasst werden kann, werde 1 g Kaliumjodid zugegeben, und die Mischung bei gewöhnlicher Wärme im geschlossenen Gefässe eine Stunde lang stehen gelassen, es müssen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods mindestens 16 ccm der Zehntel-Normal-Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden. Hiernach wird verlangt ein Gehalt von 89,6 Proc. metallischem Eisen.

Helv. 1,0 g reducirtes Eisen mit 4,0 g Jod, 3,0 g Kaliumjodid und 50,0 g Wasser zwei Stunden lang in einer gut verschlossenen Flasche digerirt, soll ein Filtrat von grüner Farbe geben, welches durch Stachelösung nicht gebläut wird, was einem Minimalgehalte von 88 Proc. Eisen entspricht.

Austr. Werden 0,2 g metallisches Eisen in einem mit Kohlensäure gefüllten Kolbchen unter Erwärmen in verdünnter Schwefelsäure gelöst, so sollen mindestens 0,11548 g Kaliumpermanganat zur dauernden Röthung erforderlich sein = 98,8 Proc. metall. Fe.

Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschützt in gleicher Weise wie das Eisenpulver, zweckmässig in enghalsigen Flaschen unter Korkverschluss.

Ferrum electricitate reductum COLLAS. Fer réduit par l'électricité de COLLAS. Fer-COLLAS, hat vor dem durch Wasserstoff reducierten Eisen nichts voraus und kann daher durch letzteres jederzeit ersetzt werden. COLLAS bringt sein Präparat als Specialität in

den Handel und zwar in kugelförmige Gelatinkapseln von der Grösse einer 0,125 Gramm-pille eingefüllt Eisen, welches aus ammoniakalzhaltigen Lösungen elektrolytisch abgeschieden wurde, ist nicht völlig rein, sondern enthält kleine Mengen Stickstoff, in noch unbekannter Weise gebunden

Chemie und Analyse In reinem Zustande ist das Eisen von silberweisser Farbe, sehr zähe und weicher als Stabeisen, sehr schwer schmelzbar Das spec Gewicht ist = 7,6–7,8 Das, was uns im gewöhnlichen Leben als Gusseisen, Stahl und Stabeisen unter die Hände kommt, ist nicht reines Eisen, sondern Eisen, welches mehr oder weniger Kohlenstoff chemisch gebunden oder mechanisch beigemengt enthält

An der Luft geglüht, verbrennt das Eisen zu Eisenoxyd In feuchter, namentlich kohlensäurereicher Luft rostet es sehr leicht

Man erkennt das metallische Eisen in Gemischen am einfachsten daran, dass es vom Magneten angezogen wird Es ist hierdurch sogar möglich, das Eisen ziemlich quantitativ aus Gemischen mit anderen Substanzen auszu ziehen Verwechselt konnte dabei das Eisen nur werden mit Kobalt und Nickel, die aber weit weniger magnetisch sind, ferner mit Magnetisenstein (Eisenoxyduloxyd), vom letzteren unterscheidet sich das metallische Eisen dadurch, dass es beim Zusammenbringen mit verdünnter Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure freien Wasserstoff entwickelt, was das Eisenoxyduloxyd bekanntlich nicht thut

Das Eisen bildet zwei Salzreihen, welche sich von dem Eisenoxydul Fe_2O_3 (oder FeO) und dem Eisenoxyd Fe_2O_3 , ableiten — Löst man Eisen in Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure, so entstehen die Oxydulsalze des Eisens Durch Oxydationsmittel (Chlor, Brom, Salpetersäure) kann man die Eisenoxydulsalze in Eisenoxydsalze überführen — In stark verdünnter Salpetersäure löst sich das Eisen ohne Wasserstoffentwicklung (der Wasserstoff wird zur Reduktion der Salpetersäure verbrannt) zu salpetersaurem Eisen oxydul Wirkt conc Salpetersäure auf Eisen ein, so erfolgt unter Auftreten von Stickoxyden Bildung von salpetersaurem Eisenoxyd

Analytisch zeigen die Eisenoxydulsalze und Eisenoxydsalze folgendes Verhalten

A Die Eisenoxydulsalze Dieselben sind im wasserhaltigen Zustande grünlich oder bläulich, im wasserfreien Zustande weiss 1) Schwefelwasserstoff erzeugt in den mit Mineralsäuren angesäuerten Lösungen keine Fällung Neutrale oder essigsaure Lösungen werden nur unvollständig gefällt 2) Schwefelammonium fällt aus neutralen oder alkalischen Lösungen alles Eisen als grünschwarzes Ferrosulfid FeS , leicht löslich in Mineralsäuren Sehr verdünnte Lösungen werden zunächst nur grün gefärbt, erst nach längerem Stehen bei Luftabschluss scheidet sich das Ferrosulfid als grünschwarzer Niederschlag ab Ammoniumchlorid begünstigt die Abscheidung des Ferrosulfids, durch genügende Mengen von Weinsäure oder Citronensäure und anderer organischer Substanzen kann die Fällung verhindert werden, in diesem Falle tritt alsdann nur grünschwarze Färbung auf 3) Kalilauge, Natronlauge und Ammoniak bewirken die Ausscheidung von Ferrohydroxyd, welches im ersten Augenblicke weiss ist, aber bald bläulich und grünlich wird und sich durch Aufnahme von Sauerstoff schnell in rostfarbiges Ferrhydroxyd verwandelt Ammoniaksalze verhindern die Fällung durch Kali- oder Natronlauge theilweise, diejenige durch Ammoniak vollständig, aber nur so lange, als der Sauerstoff der Luft abgehalten wird Tritt derselbe hinzu, so erfolgt Bildung von Ferrhydroxyd, welches nicht mehr in Lösung gehalten, sondern abgeschieden wird Nicht flüchtige organische Säuren, sowie Zucker verhindern oder verzögern die Fällung des Ferrohydroxydes durch Alkalien 4) Ferrocyankalium erzeugt in Eisenoxydulsalzlösungen einen weissen Niederschlag von Ferrocyan-Eisenoxydul-Kalium $(\text{FeCy})_2\text{K}_2\text{Fe}_2$, welcher durch Aufnahme von Luftsauerstoff rasch blau wird und durch Salpetersäure oder Chlor alsbald in Berliner Blau übergeht 5) Ferricyankalium erzeugt einen blauen Niederschlag, welcher in Säuren unlöslich ist, durch Alkalien (KOH , NaOH) aber zerlegt wird unter Abscheidung von Eisenhydroxydul — In stark verdünnter Lösung kommt es nur zu einer blauen Färbung 6) Rhodankalium erzeugt in oxydfreien Lösungen von Eisenoxydulsalzen keine Färbung

7) Baryumkarbonat zerlegt in der Kalte die Eisenoxydsalze — mit Ausnahme des Ferrisulfats — nicht

B Die Eisenoxydsalze Die wasserfreien neutralen Oxydsalze sind weiss, die wasserhaltigen gelb bis braun 1) Schwefelwasserstoff bewirkt in den mit Mineralsauren angesauerten Eisenoxydsalzlösungen milchige Trübung in Folge Ausscheidung von Schwefel Gleichzeitig werden die Eisenoxydsalze zu Eisenoxydsulfiden reducirt Davon abgesehen, ist das Verhalten der Oxydsalze gegen Schwefelwasserstoff das nämliche wie dasjenige der Oxydsulfide 2) Schwefelammonium fällt aus neutralen wie aus alkalischen Lösungen grünschwarzes Ferrosulfid FeS , mit freiem Schwefel gemengt Im Uebrigen treten die nämlichen Verhältnisse ein wie bei den Eisenoxydsulfiden 3) Kalilauge, Natronlauge und Ammoniak bewirken die Fällung von rothbraunem Ferrhydroxyd $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$ Nicht flüchtige organische Säuren (Weinsäure, Citronensäure), ebenso Zucker, verhindern, falls sie in hinreichender Menge vorhanden sind, die Fällung 4) Ferrocyankalium bewirkt die Ausscheidung eines blauen Niederschlages von Berlinerblau $(\text{FeCy})_3$, Fe_4 Dasselbe ist in Säuren unlöslich, wird aber durch atzende Alkalien unter Abscheidung von Ferrhydroxyd zersetzt 5) Ferricyankalium färbt Eisenoxydsalze dunkler braun, giebt aber keine blaue Färbung 6) Rhodankalium erzeugt in sauren Eisenoxydsalzlösungen blutrothe Färbung in Folge Bildung von Ferrrhodanid Die Färbung verschwindet nicht durch wenig Weingeist, wohl aber durch Zugabe von Mercurichlorid In essigsauren Lösungen des Eisens tritt die blutrothe Färbung des Ferrrhodanids erst auf, nachdem man die Lösung mit Salzsäure angesäuert hat Ähnliche Verhältnisse ergeben sich für Lösungen der Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure, Phosphorsäure, Arsensäure — Das Ferrrhodanid geht durch Ausschüttelung der wässrigen Lösung mit Aether in diesen über 7) Baryumkarbonat fällt aus Eisenoxydsalzlösungen schon in der Kalte alles Eisen als basisches Salz

Man bestimmt das Eisen entweder gewichts- oder massanalytisch, und zwar wählt man dasjenige der beiden Verfahren, welches sich für den bestimmten Fall am besten eignet

A Gewichtsanalytisch. Liegt das Eisen nicht schon im Zustande des Oxydsalzes vor, so muss es durch Oxydation mit Chlor, Brom, Salpetersäure oder Königswasser in das Oxydsalz verwandelt werden Etwa vorhandene Kieselsäure ist vorher abzuschneiden Die Eisenoxydsalzlösung versetzt man in einer Porcellanschale mit einer für die vorhandene Magnesia hinreichende Menge von Ammoniumchlorid, fügt alsdann Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss hinzu und erhitzt bis nahezu zum Sieden Man lässt kurze Zeit absetzen, dekanthirt durch ein Filter, wäscht den Niederschlag vollständig (!) aus, trocknet ihn, verbrennt das Filter und glüht den Niederschlag im Platintiegel bis zum konstanten Gewicht (Enthalt der Niederschlag noch Ammoniumchlorid, so kann ein Verlust durch Verflüchtigung von Ferrichlorid erfolgen) Was man gewogen hat, ist Eisenoxyd Fe_2O_3 Das gefundene Fe_2O_3 $> 0,7000$ ist = metallisches Eisen

Ist neben Eisenoxydsalz auch noch Aluminiumsalz zugegen, so wird mit dem Ferrhydroxyd zugleich Aluminiumhydroxyd gefällt Um beide zu trennen, löse man den gut ausgewaschenen Niederschlag in warmer verdünnter Salzsäure Man erhitzt alsdann in einer Platinschale einen erheblichen Ueberschuss reiner Natronlauge (aus Natronhydrat e Natro) bis zum gelinden Sieden und giesst die salzsaure Lösung unter Umrühren im dünnen Strahle in die Lauge ein Man erhitzt noch kurze Zeit, lässt in der Wärme absetzen, dekanthirt durch ein Filter, sammelt auf diesem den Niederschlag, wäscht ihn mehrmals aus, löst ihn wieder in heisser verdünnter Salzsäure, fällt mit Ammoniak und führt die Bestimmung zu Ende, wie oben angegeben ist

B Massanalytisch. Die massanalytische Bestimmung des Eisens geschieht entweder oxydimetrisch durch Kaliumpermanganat oder jodometrisch

a) Durch Kaliumpermanganat oxydimetrisch Diese Methode beruht auf folgenden Thatsachen Versetzt man eine, genügende Mengen freier Schwefelsäure enthaltende Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydul mit Kaliumpermanganat, so wird das Eisenoxydul-

salz zu Eisenoxydsalz oxydirt, gleichzeitig das Kaliumpermanganat so lange entfärbt, als noch Eisenoxydulsalz in der Lösung vorhanden ist. Sobald alles Eisenoxydulsalz oxydirt ist, bleibt die rothe Färbung des Kaliumpermanganats bestehen, und diese Rothfärbung zeigt das Ende des Versuches an. — Voraussetzung ist demnach, dass bei dieser Bestimmung das Eisen im Zustande der Oxydulverbindung zugegen ist. Ist dies nicht der Fall, liegt z. B. metallisches Eisen vor, so ist dieses durch Auflösen in verdünnter Schwefelsäure (unter Anschluss von Luft) in das Oxydulsalz überzuführen. Um während des Auflösungs Vorganges die Luft abzuhalten, verschliesst man das Kölbchen, in welchem die Auflösung vorgenommen wird, mit einem Kautschukpfropfen, in dessen Bohrung ein Glasrohr eingesetzt ist, über welches man ein Blatt Kautschukpapier spannt. Diese Einrichtung gestattet wohl den im Kolben unter Druck stehenden Gasen auszutreten, nicht aber dem Luftsauerstoff, in den Kolben einzutreten (Fig. 242).

Enthält die so bereitete Eisenoxydulsalzlösung eine genügende Menge freier Schwefelsäure, so ist sie vor der Oxydation hinreichend lange geschützt, so dass man die Titration ohne Fehler zu begehen ausführen kann. Liegt eine Oxydsalzlösung vor, so





Fig. 242.


dampft man diese (falls sie nicht etwa an und für sich schon Ferrisulfat ist) mit einem Ueberschuss verdünnter Schwefelsäure ein, um flüchtige Säuren zu verjagen. Man löst alsdann den Rückstand in Wasser, fügt, wenn nöthig, noch etwas Schwefelsäure hinzu, trägt einige Stücke (Stangen) eisenfreies Zink ein und erwärmt im Wasserbade unter gelegentlichem Umschwenken so lange, bis eine mittels Platindraht auf eine Porcellanplatte gesetzte Probe durch Rhodanammonium nicht mehr geröthet wird. Dann giesst man vom Zink ab, spült 1 bis 2 mal mit ausgekochtem destillirten Wasser nach und titirt ohne Verzug.

Die Ausführung der Titrirung erfolgt in der Weise, dass man über einer weissen Unterlage (Filtrirpapier) zu der in einem Kolben befindlichen, genügend freie Schwefelsäure enthaltenden Lösung unter Umschwenken so lange Kaliumpermanganat zufließen lässt, bis die Flüssigkeit eben anfängt, eine beständige, schwach rothe Färbung anzunehmen.

Da die Reaktion nach der Gleichung




verläuft, so ergibt sich daraus, dass




Es ist erwünscht, dass diese Bestimmungsweise lediglich in schwefelsaurer Lösung ausgeführt wird.

β. Jodometrisch. Diese Bestimmungsweise beruht darauf, dass durch Einwirkung von Eisenoxydsalzen auf Kaliumjodid bei Gegenwart freier Säure nach folgender Gleichung freies Jod abgespalten wird:



Die Bestimmung hat demnach zur Voraussetzung, dass das Eisen in Form eines Eisenoxydsalzes zugegen ist. Abwesend sein müssen Substanzen, welche ihrerseits Jod aus Kaliumjodid in Freiheit zu setzen vermögen, z. B. freies Chlor, Salpetersäure, Jodsaure. Dagegen verläuft die Reaktion am günstigsten bei Anwesenheit einer massigen Menge freier Salzsäure. Liegt daher schon ein Oxydsalz als solches zur Bestimmung vor, so kann man dasselbe ohne weiteres oder, wie bei dem salpetersauren Salze, nach dem wiederholten Eindampfen mit Salzsäure zur Bestimmung verwenden. Ist das zu bestimmende Salz aber ein Oxydsalz, so muss es zunächst in das Oxydsalz übergeführt werden. Dies geschieht in einfachster Weise dadurch, dass man die betreffende Lösung bei Anwesenheit einer genügenden Menge von freier Schwefelsäure mit Kaliumpermanganatlösung bis zur eben bleibenden Röthung versetzt. Einen Ueberschuss von Kaliumpermanganat kann man durch Zufügung einer geringen Menge Weingeist (1–2 Tropfen) beseitigen.

Die Ausführung dieser Bestimmung erfolgt in der Weise, dass man die betreffende Lösung in ein hinreichend geräumiges Gefäss mit Glasstopfen bringt, falls sie noch nicht genügend salzsauer sein sollte, etwas Salzsäure, sowie einen Ueberschuss von reinem jodsaurefreien (!) Kaliumjodid dazu giebt. Das Glas wird sofort verschlossen, der Inhalt gemischt und nun 1 Stunde sich selbst überlassen. Nach dieser Zeit lässt man zu der durch freies Jod braun gefärbten Flüssigkeit, soviel $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung zulaufen, dass die Flüssigkeit gerade noch gelb gefärbt ist. Dann fügt man etwas Starke-lösung zu und titirt mit der Natriumthiosulfatlösung auf farblos. Aus der Formel



ergibt sich, dass 127 Th Jod = 56 Th metallisches Eisen an/eigen.

Physiologisches. Das Eisen ist in allen drei Naturreichen verbreitet. Im Mineralreiche ist es fast in allen Mineralen und in vielen (Eisenerzen) als wesentlich oder be-gleitender Bestandtheil vorhanden. Es ist in allen natürlichen Wassern enthalten, feiner ein niemals fehlender Bestandtheil der Ackerkrume. Aus dem Erdboden bez. dem Wasser wird das Eisen von den Pflanzen aufgenommen. Eisen ist ein organogener Bestandtheil der Pflanzen. Es ist ein wesentlicher Bestandtheil des Chlorophylls, an welches bekanntlich der Assimilationsvorgang der Pflanzen gebunden ist. Mit der vegetabilischen Nahrung und dem Wasser gelangt das Eisen in den thierischen Organismus. In diesem hat es unzweifelhaft eine ebenfalls sehr wichtige Funktion. Eisen ist in allen Organen und Sekreten des Thierorganismus enthalten, z. B. in Milch, Eiern, Haaren, Federn, Galle, Gallensteinen, Horn, Muskelfleisch, Knorpel, Knochen, Nerven, vor allem aber im Blute.

Im Blute bildet das Eisen, in der Form des Hämoglobins fast ausschliesslich den Inhalt der farbigen Blutkörperchen, deren Menge zu derjenigen des Eisens in einem konstanten Verhältnisse steht. Die Eisenmenge im Blute eines 70 kg schweren Mannes schätzt GOURV-BESANZ auf 3,077 g.

Der Bestand des Organismus ist an das Vorhandensein einer gewissen Menge von Eisen geknüpft. Die im Verlaufe des Stoffwechselvorganges täglich ausgeschiedenen, wenn auch kleinen Mengen von Eisen müssen dem Organismus wieder ersetzt werden. Dies geschieht auf dem Wege der Nahrungsaufnahme. Nach BOUSSINGAULT genügen täglich 0,059–0,061 g Eisen, um den Bedarf des menschlichen Körpers an Eisen zu decken, und diese Menge wird dem Organismus unter normalen Bedingungen mit der Nahrung zugeführt.

Bei gewissen krankhaften Zuständen des Körpers genügt das mit der Nahrung eingeführte Eisen nicht, um den Eisenbedarf zu decken, in solchen Fällen wird das Eisen als Medikament eingeführt.

Prinzipiell ist zu beachten, dass nur ein verschwindend geringer Procentsatz des in der Form von Arzneien eingeführten Eisens zur Resorption gelangt, der Rest wird, und zwar hauptsächlich durch die Faeces als Schwefeleisen, in Spuren auch durch den Urin, wieder ausgeschieden. Abgesehen von der bithischen Wirkung, welche gewissen Eisenpräparaten eigen ist und die meist in einer Aetzung oder doch Reizung besteht, ist die entfernte Wirkung des (resorbirten) Eisens eine tonisirende, d. h. es bessert sich die Zusammensetzung des Blutes, damit zugleich die Ernährung der einzelnen Organe, wodurch Hebung des Allgemeinbefindens eintritt.

Ueber die Art, in welcher die Aufnahme der in den Magen eingeführten Eisenverbindungen durch den Organismus erfolgt, ist man sich noch keineswegs im Klaren. Früher, als man meist unorganische Eisenpräparate verordnete, stellte man sich vor, dass nicht bloss kleine Mengen Eisen resorbirt würden, sondern dass die physiologische Aufgabe der gereichten Eisenpräparate auch darin bestehe, dass sie den bei krankhaften Zuständen im Darne in überreichen Mengen vorhandenen Schwefelwasserstoff zu Schwefeleisen binden.

sollten, so dass dieser nicht mehr zersetzend auf das Hamatogen der Nahrungsmittel wirken könne. Das war jene Zeit, in welcher Eisensalze in den bekannten grossen Gaben wie bei den BLAUD'schen Pillen verwendet wurden, während welcher auch die Oxydulsalze bevorzugt wurden — Später wurde die Annahme gemacht, dass die Oxydulverbindungen, bevor sie zur Resorption gelangen, im Magen bez. Darm erst zu Oxydverbindungen oxydirt werden müssen. Da dies mit einem Verlust an Sauerstoff an irgend einer Stelle verknüpft sein muss, so bevorzugt man nunmehr die Eisenoxysalze. Und da die unorganischen Eisenoxysalze mit den im Magen und Darm vorhandenen Eiweissstoffen unlösliche Verbindungen eingehen, so benutzte man eine gewisse Zeit und bis auf den heutigen Tag solche Eisenpräparate (z. B. *Ferrum citricum*), welche mit Eiweiss unlösliche Verbindungen nicht eingehen.

Während der letzten 15 Jahre ist man zu der Anschauung gekommen, dass die Eisenverbindungen, bevor sie zur Resorption gelangen können, in Eisenalbuminatverbindungen umgewandelt werden sein müssen. Um dem Organismus diese Arbeit abzunehmen, hat man Albuminate, Peptonate und ähnliche Verbindungen des Eisens therapeutisch angewendet. Und neuerdings ist man, von der Erwägung ausgehend, dass der Blutfarbstoff das am günstigsten resorbirbare Eisenpräparat sein müsse, zur Bevorzugung der Blut-eisenpräparate gelangt.

Metallisches Eisen (als *Ferrum pulveratum* oder *Ferrum reductum*) gilt zur Zeit als eine wenig empfehlenswerthe Form, erstlich deswegen, weil das bei seiner Auflösung entstehende Wasserstoffgas Blähungen verursacht, ferner aber auch deswegen, weil zunächst Ferrosalze gebildet werden, welche Sauerstoff absorbiren und dadurch angeblich den Magen belastigen. Die namliche unerwünschte Wirkung kommt natürlich den Eisenoxydulsalzen an sich zu.

Sauer reagirende gelöste Eisenverbindungen in die Mundhöhle eingeführt, wirken auflösend auf die Zahnschubstanz und gehen mit Bestandtheilen des Speichels unlösliche Verbindungen ein, welche auch in schwarzhäutiger Substanz auf den Zähnen abgelagern. Nicht sauer reagirende Eisenlösungen bewirken diesen Uebelstand bei normal alkalisch reagirendem Speichel nicht.

Anwendung. Die Anwendung des Eisens ist in allen den Fällen angezeigt, in welchen der Eisengehalt des Blutes (die rothen Blutkörperchen) gemindert ist. Daher gelten Eisenpräparate als Heilmittel bei Bleichsucht, nach Säfte- und Blutverlust, anämischen Zuständen, Veitstanz, Körperschwäche, Gliederzittern, Migräne, Facialschmerz, Krämpfen, Hysterie, Schleimflüssen jeder Art, übermässigen Schweissen, ferner bei allen Krankheiten, zu deren Heilung eine kräftige Blutbereitung gefordert ist, wie bei Krebs, allen kachektischen Zuständen, Skropheln, Rhachitis etc. Kontraindicirt ist der Eisengebrauch (ausgenommen in sehr geringen Gaben) bei allgemeiner Vollblütigkeit, entzündlichen, fieberhaften und gastrischen Leiden.

Kitte mit Eisenfeile und Eisenpulver. — Rostkitt, Eisenkitt (für eiserne Röhren, Gerätschaften) ist 1) ein Gemisch aus 100 Th. feinen Eisenfeilspanen und 1—2 Th. Salmiak — oder 2) aus 60 Th. Eisenpulver, 2 Th. Salmiak, 1 Th. Schwefelblumen und der nöthigen Menge Wasser — oder 3) aus Eisenpulver mit Essig angerührt — oder 4) aus 200 Th. Eisenfeile, 150 Th. Eisenpulver, 4 Th. Salmiak, 1 Th. Gips, 3 Th. Schwefelblumen und 2 Th. Kalkcement. Diese Mischung wird mit Essig zum Brei angerührt und sofort verbraucht — oder 5) zum Einkitten eiserner Theile in Eisen. 30 Th. frisch gebrannter Gips, 10 Th. Eisenfeile und 1 Th. Graphit werden gemischt und zum Gebrauch mit Essig zum Brei angerührt. Er ist sofort anzuwenden. — 6) Kitt für luftdichte Oefenthüren aus 5 Th. feiner Eisenfeile, 1 weissem Bolus mit Essig angerührt, oder aus 120 Th. Eisenfeile, 2 Th. Salmiak, 8 Th. Feldspathpulver (oder Kalkcement), 1 Th. Schwefelblumen mit Wasser angerührt.

BECK's Stahlhärte-Substanz. Besteht aus einer Salbe und einem Salzgemisch. A) Die Salbe Colophoni 50,0, Terabinthinae 40,0, Olei Lini 10,0. B) Das Salzgemisch Ammonii chlorati 65,0, Kali sulfurici 6,5, Kali nitrici 13,0, Natrii nitrici 4,0, Asae foetidae 11,0 (B. FRISCHER).

LICHTAR's Schweiss- und Löthpulver für Eisen und Stahl. 100 Th. Eisenfeile, 50 Th. Borax, 5 Th. Kopravabalsam und 7,5 Th. Salmiak werden gemischt, geglüht und in ein feines Pulver verwandelt. Zur Anwendung werden die Schweissflächen mit dem Pulver bestreut, rothglühend gemacht und in gewöhnlicher Weise die Schweissung ausgeführt.

Verquecksilberung des Eisens. Das mit stark verdünnter Salzsäure gereinigte, in eine mit Salzsäure versetzte, stark verdünnte Cupriessigsäurelösung auf eine Minute eingetauchte, dann abgeriebene und abgewaschene Eisen wird alsbald in eine mit etwas Salzsäure versetzte Sublimatlösung eingetaucht (RABINSON).

Schwarzbeize für Eisen. Um kleinere Eisentheile schwarz zu färben, bestreicht man diese mittels eines Haarpinsels unter Erwärmen mit einer Lösung von 70 Th Kupfernitrat in 80 Th Weingeist und erwärmt auf Eisenblechen. Das Bestreichen und Erwärmen ist zu wiederholen, bis der gewünschte schwarze Ton erzielt ist. Nimmt man an Stelle von Kupfernitrat Mangannitrat, so erhält man Bronze-Töne.

Stahlbeize zum Bruniren von Gewehrläufen, Lanzenstäben u dergl.
I) Hydrargyri bichlorat 7,5, Spiritus 30,0, Acidi nitrici crudi 7,5, Liquoris Ferri sesquichlorat 30,0, Cupri sulfurici 4,5, Aquae 250,0 **II)** Hydrargyri bichlorat 25,0, Acidi tartarici 2,0, Aquae 650,0, Acidi nitrici crudi 2,0

Stahl-Rostschutz. Man reibt die Gegenstände aus Stahl ganz dünn mit flüssigem Paraffin ab oder taucht sie in eine Lösung von 1 Th flüssigem Paraffin in 200 Th Benzin.

Stahl-Pulver als Schleifmittel an Stelle von Smirgel u dergl. (Crushed steel). Zur Darstellung werden alte Sägeblätter gehartet und dann gepulvert. Es wird mit Wasser befeuchtet zum Schleifen verwendet.

Dr ELKING's Pulver gegen Bleichsucht Rp Ferri pulverat 30,0, Corticis Cinnamomi pulverat 7,5, Sacchari albi 45,0

Dr DERRNEH's Pulver gegen Blutarmuth und Blutstockung Rp Ferri pulverat 16,0, Amyli 20,0, Sacchari 65,0

Ferrin Ist ein mit Eisen versetztes Fleischextrakt, welches in Kapseln in den Handel kommt.

Kolner Klosterpillen. Rp Ferri pulverat, Herbae Cardui benedicti, Succus Sambuci aa

Hohl's Eisenpulver Rp Ferri pulverat 1,4 g, Sacchari albi 10,0, Pulveris Herbarum 8,6 Divide in partes X

Schwäbische Bleichsuchts-Latwerge Rp Fructus Juniperi pulv, Corticis Cinnamomi pulv, Herbae Cardui benedicti aa 7,5, Ferri pulverat 30,0, Succus Juniperi 120,0 Nach beendeter Wasserstoffentwicklung setzt man zu Aquae 20,0 und erwärmt unter Bedecken des Gefasses im Dampfbade

Mixtura Ferri aromatica
HELLMUND's Ink. HEBERDEY's Mixture

Rp 1 Corticis Chinae gr pulv 50,0
 2 Radices Colombo concisae 15,0
 3 Caryophyllorum contusorum 7,5
 4 Ferri pulverat 10,6
 5 Aquae Menthae pipritae 400,0
 6 Tincturae aromaticae 50,0
 7 Tincturae Aurantii corticis 25,0
 Man maceirt 1—3 während 2 Tagen, filtrirt und versetzt 850,0 des Filtrates mit 6 und 7 Täg-
 lich 2—3 Esslöffel als Tonicum

Pasta Cacao maritima
 Rp Pastae Cacao saccharatae 1000,0
 Ferri reducti 20,0
 Man verrührt beide Bestandtheile in der Wärme des Wasserbades und formt 100 Tabletten

Chocolat au fer réduit
 Miquelard et Quevenne
 sind 40,0 g schwere Chokoladetafeln mit 0,3 g re-
 duziertem Eisen

Pilulae Ferri
 Rp Ferri pulverat 5,0
 Extracti Ferri pomati
 Rhizomatis Calami
 Corticis Cinnamomi aa 10,0
 Extracti Absynthii q s
 Fiat pilula ponderis 0,3 g

Pilulae Ferri camphoratae EDLSSSEN
Kampfer-Eisen nach EDLSSSEN
 Rp Ferri reducti
 Camphorae tritae aa 5,0
 Extracti Gentianae 5,0
 Pulveris gummosi
 Aquae aa q s
 Fiat pilulae 90
 Dreimal täglich 2—3 Pillen bei Blutarmuth.

Pilulae Ferri reducti
A Form. Berol.
 Rp Ferri reducti 5,0
 Radices Gentianae 1,0
 Extracti Gentianae 3,0
 Fiat pilulae 60
B Münch. A.-V
 Rp Ferri reducti 5,0
 Radices Liquiritiae 2,0
 Succus Liquiritiae depurati q s
 Fiat pilulae 90
Pulvis antatrophicus (pauperum)
 Rp Ferri pulverat 5,0
 Corticis Cinnamomi 10,0
 Magnesi carbonici 25
 Sacchari albi 50,0
 Drei- bis viermal täglich eine Messerspitze

Trageae Ferri reducti
Dragées au fer réduit.
 Rp Ferri reducti 5,0
 Sacchari albi
 Gummi arabici aa q s
 Fiat cum Aqua granulae 100, Saccharo obdu-
 cendae

Trochisci antatrophici
 Rp Calci phosphorici 20,0
 Calci carbonici 10,0
 Ferri reducti 5,0
 Massae cacaoinae
 Pastae Cacao saccharatae aa 85,0
 Fiat leni calore trochisci 100,0

Trochisci antirrhachitici
 Rp Rhizomatis Rhei 5,0
 Ferri reducti 25
 Massae cacaoinae 92,5
 Fiat leni calore trochi ci 100,0
 Den Tag über 4—6 Pastillen

Trochisci Ferri hydrogenio reducti,**I**

Rp Ferri reducti 10,0
 Massae cacaotinae 90,0
 Fiant trochisci 100 Singuli continent 0,1 g
 Ferri

II

Rp Ferri reducti 5,0
 Massae cacaotinae 95,0
 Fiant trochisci 100 Singuli continent 0,05 g
 Ferri

Trochisci martiati MILLER

Rp Ferri pulverati 25,0
 Secalis cornuti 2,0
 Sacchari albi 72,0
 Aquae destillatae q s

Fiant trochisci 100

Morgens und Abends je 5 Pastillen (bei Incontinentia urinae infolge von Anämie)

Ferrum aceticum.

I Ferrum aceticum siccum Ferrum aceticum lamellatum. Trockenes Ferriacetat Acetate de fer. Peracetate of iron

Zur Darstellung bedeckt man Glastafeln mit einer etwa 1,5 mm hohen Schicht des noch zu besprechenden Liquor Ferri subacetici und trocknet diese an einem schattigen, staubfreien Orte bei einer 25° C nicht übersteigenden Temperatur soweit aus, dass der Verdunstungsdruckstand sich von den Glastafeln als spröde Lamellen abtosseln lässt. Roth braunes Pulver oder braunrothe Lamellen, in kaltem Wasser und in Spiritus langsam aber klar und vollständig zu einer braunrothen Flüssigkeit löslich. Durch heisses Wasser erfolgt Zersetzung unter Abscheidung unlöslicher basischer Salze. 1 Th entspricht = 6 Th des Liquor Ferri subacetici der Germ.

Aufbewahrung in gut verstopften Glasgefässen, vor Licht geschützt

II Liquor Ferri subacetici (Germ) Ferrum aceticum solutum (Hely) Liquor Ferri Acetatis (Brit U-St) Liquor Ferri acetic. Essigsäure Eisenoxydlosung Ferriacetatlosung.

Darstellung. Die Darstellungsvorschriften der einzelnen Pharmakopen wechseln stark, infolgedessen fallen auch die Eigenschaften der Präparate nach den einzelnen Pharmakopen sehr verschieden aus. Principiell werden die sammtlichen Präparate dadurch dargestellt, dass man aus einem Ferrisalz durch Ammoniak das Ferrihydroxyd ausfällt, dieses auswäscht, durch Pressen vom Ueberschuss des Wassers befreit und nunmehr in Essigsäure auflöst. Dabei ist folgendes zu beachten. Bei der Fällung ist das Ferrisalz in die Ammoniakflüssigkeit zu gressen (nicht umgekehrt), andernfalls geht die Zersetzung nicht vollständig zu Ende, es können dem Ferrihydroxyd vielmehr basische Salze beigemengt bleiben. Die Fällung ist ferner nicht mit concentrirten, sondern hinreichend verdünnten Flüssigkeiten auszuführen. Es ist ferner jede Erwärmung thunlichst zu vermeiden, damit nicht wasserärmere und infolgedessen in Essigsäure schwerer lösliche Eisenhydroxyde auftreten. Es empfiehlt sich deshalb in die Ammoniakflüssigkeit einige Eisstücke einzutragen. Das Auswaschen des Niederschlages hat an einem kühlen, schattigen Orte mit thunlichster Beschleunigung zu geschehen. Desgleichen soll man das Auflösen des gehörig abgepressten Ferrihydroxydes in konc oder verdünnter Essigsäure an einem kühlen Orte in einem geschlossenen Gefässe vor sich gehen lassen. Die Lösung ist schliesslich zur Entfernung von Fasern etc durch einen Bausch Glaswolle zu filtriren.

Brit. 180,0 g Liquor Ferri sulfurici (10,16 Proc metallisches Eisen enthaltend, spec Gew = 1,441) werden mit 1 Liter Wasser verdünnt und in eine Mischung von 200,0 g Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc NH_3 und 1 Liter Wasser eingegossen. Der gehörig ausgewaschene und abgepresste Niederschlag wird in 79,5 g Eisessig von 99 Proc Essigsäuregehalt gelöst und die Flüssigkeit mit Wasser auf 1 Liter oder auf das Gewicht von 1031,0 g gebracht. Spec Gewicht = 1,031. Entsprechend einem Gehalt von etwa 1,75 Proc metallischem Eisen. — Das Präparat der Brit enthält auf 1 Atom Fe = 4,1 Mol Essigsäure. Es ist demnach eine Auflösung des neutralen Ferriacetates $\text{Fe}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_3$, mit einem Ueberschuss freier Essigsäure. Man kann ihm die Formel $\text{Fe}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_3 + \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ geben.

Germ. 50,0 g Ferrichloridlösung (mit ca 10 Proc metallischem Eisen, spec Gew 1,280—1,282) werden mit 200,0 g Wasser verdünnt. Diese Lösung wird in eine Mischung von 50,0 g Ammoniakflüssigkeit mit 1000,0 g Wasser eingetragen. Der völlig ausgewaschene und möglichst stark ausgepresste Niederschlag wird in 40,0 g Essigsäure (von 80 Proc $C_2H_3O_2$) gelöst. Nach erfolgter Auflösung des Ferrihydroxydes wird die Lösung auf das spec Gewicht 1,087—1,091 gebracht, entsprechend einem Gehalte von 4,8—5,0 Proc metallischem Eisen. Das Präparat der Germ enthält auf 1 Atom Fe = 2,24 Moleküle Essigsäure, es ist demnach vorwiegend eine Lösung des $\frac{2}{3}$ Ferracetates $Fe(OH)(CH_3CO_2)_2$ mit kleinen Mengen freier Essigsäure.

Helv. 54,0 g Ferrichloridlösung (mit einem Gehalt von 10,0 Proc Fe, spec Gew = 1,28—1,29) werden mit 500,0 g Wasser verdünnt. Andererseits werden 54,0 g Ammoniakflüssigkeit (spec Gew 0,960) mit 500,0 g Wasser vermischt. Beide Lösungen werden gleichzeitig in dünnem Strahle und unter Vermeidung jeder Erwärmung (Eiszusatz) in 2000 Th Wasser eingegossen. Der gehörig ausgewaschene und bis auf 50,0 g abgepresste Niederschlag wird in 40,0 g verdünnter Essigsäure (von 80 Proc $C_2H_3O_2$, spec Gew 1,041) gelöst und diese Lösung durch Wasser auf 100,0 g gebracht. Spec Gew = 1,087—1,090. Der Gehalt an metallischem Eisen beträgt etwa 5 Proc Fe. Auf 1 Atom Fe sind = 2,07 Mol Essigsäure (CH_3CO_2H) vorhanden. Demnach stellt das Präparat eine Lösung des $\frac{2}{3}$ Ferracetates $Fe(CH_3CO_2)_2$ dar ohne erhebliche Mengen freie Essigsäure.

U-St 1000,0 g Ferrisulfatlösung (8 Proc Fe enthaltend, spec Gew = 1,820) werden mit 10 Liter Wasser vermischt. Diese Lösung wird in eine Mischung von 850,0 g Ammoniakflüssigkeit (10 Proc) mit 3 Liter Wasser eingetragen. Der ausgewaschene Niederschlag wird auf 700,0 g ausgepresst, in 260,0 g Eisessig von 99 Proc gelöst und die Lösung mit Wasser auf 1000,0 g gebracht. Spec Gew = 1,160. Das Präparat enthält 7,5 bis 8 Proc metallisches Fe. Auf 1 Atom Fe sind 3 Mol Essigsäure vorhanden. Das Präparat ist demnach eine Auflösung des neutralen Ferracetates $Fe(CH_3CO_2)_2$.

Eigenschaften. Eine klare, dunkelbraunrothe, nur in dünnen Schichten durchsichtige Flüssigkeit vom Geruch der verdünnten Essigsäure und von süsslich styptischem Geschmack. Sie ist von saurer Reaktion und mit Wasser oder Weingeist in jedem Verhältnisse mischbar. Beim Erhitzen zersetzt sie sich unter Abscheidung von unlöslichem basischen Ferriacetat. Ueber spec Gewicht, Gehalt und Zusammensetzung der Präparate siehe oben unter Darstellung.

Prüfung. 1) Eine klare, rothbraune Flüssigkeit ohne Bodensatz, schwach nach Essigsäure riechend. 2) Wird 1 ccm derselben mit 10 ccm Wasser verdünnt und mit soviel Salzsäure versetzt, dass die rothbraune Färbung in Gelb übergeht, so soll durch Ferricyankalium keine Blaufärbung verursacht werden (Eisenoxydsalz) (wohl aber soll Blaufärbung durch Ferrocyanalkalium entstehen). 3) Verdünnt man 5 ccm mit 10 ccm Wasser und fällt mit einem Ueberschuss von Ammoniak, so muss das ammoniakalische Filtrat farblos sein (Blaufärbung durch Kupfer), auch darf es durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert werden (Kupfer, Blei, Zink), auch nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitratlösung nicht mehr als opalisirend getrübt werden (Chlor).

Gehaltsbestimmung. Germ. Werden 2 ccm des Präparates mit 2 ccm Salzsäure versetzt, nach dem Verschwinden der rothen Färbung mit 20 ccm Wasser verdünnt und hierauf unter Zusatz von 2 g Kaliumjodid im verschlossenen Gefässe eine Stunde lang stehen gelassen, so sollen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods = 18,5—19,5 (Germ) oder 18,5—19,0 ccm (Helv) $\frac{1}{10}$ Normal-Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden. Unter den gleichen Bedingungen werden verbraucht für 2 ccm Eisenacetatlösung nach

	Brit.	Germ	Helv	U St.
Spec. Gewicht	1,031	1,087—1,091	1,087—1,090	1,160
Verbrauchte ccm $\frac{1}{10} Na_2S_2O_3$	6,45	18,5—19,5	18,5—19,0	31,1—33,1
Procentgehalt an metall Fe	1,75	4,8—5,0	4,8—5,0	7,5—8,0

Aufbewahrung. Die Ferracetatlösung muss vor der Einwirkung des Tageslichtes bei einer Temperatur, die nicht unter 10° C und nicht über 20° C liegt, aufbewahrt werden, da sie bei niedriger Temperatur Bodensätze bildet, bei höherer Temperatur bisweilen gelatinirt. Die in der Kälte entstandenen Bodensätze gehen bei mittlerer Temperatur gewöhnlich wieder in Lösung.

Anwendung. Die Ferrinacetatlosung dient ziemlich ausschliesslich zur Bereitung der Tinctura Ferri acetici aetherea. In der Farberei benutzt man ein rohes Präparat, welches im Nachstehenden beschrieben ist.

Eisenacetatlosung als Beize in der Farberei. Wird wie das Präparat der Germ dargestellt, nur löst man das aus 50 Th Ferrichloridlösung gefällte Ferrhydroxyd nicht in 40, sondern vielmehr in 50 Th verdünnter Essigsäure auf, auch wird das Auswaschen des Ferrhydroxyds nur so lange fortgesetzt, bis das Chlor der Hauptsache nach entfernt ist.

III Tinctura Ferri acetici Rademacheri (Erganzb., Hamb. Vorschr.) RADEMACHER'S Eisenacetat Tinktur

Diese Tinktur kann nicht durch eine ex tempore bereitete Mischung von Eisenacetatlosung mit Weingeist ersetzt werden. Wo sie öfter gebraucht wird, hält man zwei Standgefässe von etwa je 5 Litern vorräthig, von denen immer der Inhalt des einen abgelagert, während derjenige des anderen verbraucht wird.

Darstellung. Man stösst in einem eisernen Mörser 23 Th krystall. Ferrosulfat mit 24 Th krystall. Bleiacetat zusammen, bis eine breiartige Masse entstanden ist. Diese wird mit 48 Th Wasser und 96 Th Essig (von 6 Proc. Essigsäuregehalt) in einem eisernen Kessel zum Sieden erhitzt und nach dem Erkalten mit 80 Th Weingeist vermischt. Die Mischung wird in einer lose verschlossenen Flasche unter öfterem Umschütteln einige Monate an einem kühlen Orte stehen gelassen, dann filtrirt und vor Licht geschützt, aufbewahrt (Erganzb.). RADEMACHER'S Eisenacetattinktur ist von braunrother Farbe und besitzt einen an Malaga erinnernden Geruch und etwas zusammenziehenden Geschmack. Man giebt sie zu 30–80 Tropfen in Wasser drei bis viermal täglich als Antiphlogisticum bei Lungenentzündung. Sie sei frei von gelösten Bleiverbindungen.

Mixtura Ferri acetici Rademacheri. Rp. Tincturae Ferri acetici Rademacheri 30,0, Aquae destillatae 200,0, Gummi arabici 30,0.

Tinctura antiphthisica FULLER ist der vorstehenden RADEMACHER'schen einigermassen verwandt. Je 10,0 reiner Eisenvitriol und Bleiacetat werden zusammen gerieben, dann mit 100,0 verdünntem Weingeist übergossen, unter öfterem Umschütteln (im offenen Gefäss) 24 Stunden macerirt und dann filtrirt.

Tinctura antiphthisica GRAMMAN (welche immer stark bleihaltig ist) wurde durch Vermischen einer Lösung von 5,0 Bleiacetat in 20,0 Essig mit einer Lösung von 4,0 (nach der Originalvorschrift mit 3,75) reinem Eisenvitriol in 60,0 Rosenwasser und Zusatz von 20,0 Weingeist, eine zweitägige Maceration und endlich durch Filtration dargestellt. Ein vollständiger Ersatz für dieses Präparat dürfte eine Mischung aus 4,0 Liquor Ferri acetici, 4,0 Wasser und 3,0 Weingeist sein.

Tinctura Martis ZWELFER, Tinctura Ferri acetici aromatica, ZWELFER'S Stahl tropfen. 25,0 reiner Eisenvitriol werden zerrieben, zuerst mit 50,0 kaltem Wasser und 10,0 verdünnter Essigsäure (von 30 Proc.), dann mit 50,0 Kaliumacetatflüssigkeit von 1,180 spec. Gew. übergossen und unter bisweiligem Umrühren 24 Stunden bei Seite gestellt. Hierauf wird ein Gemisch aus 400,0 wenigem Zimmtwasser und 450,0 verdünntem Weingeist dazu gegeben. Man lässt unter bisweiligem Umrühren 8 Tage stehen, filtrirt hierauf, versetzt das Filtrat mit einer Lösung von 2,5 Citronensäure in wenigem Zimmtwasser und giebt dann von letzterem soviel hinzu, dass ein Liter ausgefüllt wird. Diese Tinktur enthält kaum 0,4 Proc. Eisen. Dosis ein Theelöffel voll 3–5 mal täglich. Es existiren noch andere Vorschriften, welche eine Tinktur mit kaum 0,15 Proc. Eisengehalt liefern.

Tinctura Ferri acetico-formicata (Bad. Taxe, Münch. Ap.-V.) Ersatz für HENSEL'S Tonicum. 60,0 Calciumcarbonat werden mit einer Mischung aus 200,0 Ameisensäure (25 proc.) und 155,0 Wasser übergossen. Nach Aufhören der Kohlensäureentwicklung wird eine Lösung von 21,0 krystall. Ferrosulfat, 80,0 Ferrisulfatlösung (spec. Gew. 1,428–1,430), 80,0 Wasser und 320,0 verdünnter Essigsäure (30 proc.) zugesetzt, die Mischung in eine Flasche gegeben und gut durchgeschüttelt. Dann fügt man zu 400,0 Weingeist und 15,0 Essigäther, lässt die Flasche an einem schattigen Orte unter bisweiligem Lüften des Stopfens 4 Wochen stehen und filtrirt alsdann.

Hämatin-Eisen nach HENSEL enthält die festen Bestandtheile von HENSEL'S Tonicum, ist also ein Kalk-Eisenpräparat.

Essentia antiscorbutica

Skorbut Essenz

Rp.	Tincturae Chinae	50,0
	Tincturae Ferri acetici aetherea	25,0
	Acidi citrici	3,0
	Glycerini	22,0

Dreimal täglich 20–30 Tropfen in Wein zu nehmen.

Liquor Ferri et Ammonii Acetatis (U-St)		Sirupus Ferri acetici	
BASHAMS Mixture		Pp	Liquoris Ferri acetici 100
Rp	Tincturae Ferri chlorati (enthaltend 13,6 Proc FeCl_3) 20 cem Aceti (6 Proc) 30 cem Liquoris Ammonii acetici (7 Proc) 200 cem Chixir aromatici 100 cem Glycerini 120 cem Aquaes q. s. ad 1 Liter	Sirupi Sacchari 90,0	
Remedia anticarcinomatosa GRAHAM		Tinctura Ferri acetici aetherea.	
I Alterativpillen		Tinctura Martis KLAPROTH	
Rp	Ferri oxydati fusc 15,0 Rhizomatus Rhei 3,0 Aloës 3,5 Extracti Chamomillae 10,0 Plant. pilulae 150	KLAPROTH's Eisentinctur] Stahltropfen. Germ und Helv	
II Absorbent Tinktur		Rp	Liquoris Ferri subacetici 8,0 Spiritus Aetheris aceticus 55 10 Enthält etwa 4,0 Proc metall Eisen Spec. Gew = 1,044—1,046
III Detergentpulver		Tinctura Martis BOHRHAVE	
Ferrum phosphoricum oxydatum		Pp	Liquoris Ferri acetici Aceti (6 Proc.) 55 10 8 Sirupi Sacchari 110 0 Spiritus Vini 90,0

Nach einer älteren Vorschrift werden 10,0 Eisen-
feile, 120,0 Essig und 80,0 Zucker bis auf 140 0
eingekocht, die Kolatur mit 20,0 Weingeist ver-
mischt und nach einiger Zeit filtrirt

Ferrum albuminatum

Das Eisenalbuminat wird in der Regel in der Form seiner wässerigen Lösung,
seltener als trockenes Pulver angewendet.

I Liquor Ferri albuminati (Germ) Ferrum albuminatum solutum (Helv)
Eisenalbuminatlösung Die von Germ und Helv gegebenen Vorschriften weichen unter
einander etwas ab, geben aber schliesslich das gleiche Präparat

Darstellung Grundsätzlich ist folgendes zu beachten. Versetzt man eine Eiweiss-
lösung mit Ferroxychlorid, so erhält man eine rostfarbene trübe Flüssigkeit von saurer
Reaktion. Neutralisirt man diese Flüssigkeit ganz genau (!) so scheidet sich Ferrialbuminat
als rostfarbener Niederschlag ab. Wäscht man denselben mit Wasser bis zur annähernden
Chlorfreiheit aus, so geht der noch feuchte Niederschlag durch Einwirkung kleiner
Mengen von Natronhydrat in Lösung. Diese Lösung wird „Eisenalbuminatlösung“ genannt.

Germ 35 Th trockenes Eiweiss werden in 1000 Th Wasser von nicht höherer
Temperatur als 50° C (!) gelöst. Diese Lösung wird — um Eintauche und andere trübende
Bestandtheile zu entfernen — durch ein feines Seidensieb gegossen und in eine Mischung
von 120 Th flüssigem Eisenoxychlorid (Liquor Ferri oxychlorati) unter Umrühren an-
getragen. Man erhält gewöhnlich eine trübe, rostbraune Flüssigkeit, in der nur wenig
Niederschlag vorhanden ist. Man stellt die Reaktion dieser Flüssigkeit fest. Sie wird in
der Regel sauer sein. Man fügt zu dieser sauren Flüssigkeit tropfenweise — am besten
aus einer Burette — soviel einer 0,75 procentigen Natronlauge hinzu, dass die Flüssigkeit
genau neutral ist. (Ein Ueberschuss von Natronlauge ist zu vermeiden, da alsdann das
Ferrialbuminat wieder in Lösung geht.) Sobald die Flüssigkeit genau neutral ist, scheidet
sich das Ferrialbuminat gut ab. Man lässt dieses absetzen und wäscht es durch Dekan-
thiren mit Wasser (von 50° C) so lange aus, bis das Waschwasser nach dem Ansäuern
mit Salpetersäure durch Silbernitrat nur noch schwach opalisirend getrübt wird. Hierauf
bringt man den Niederschlag auf ein genässtes Leinen-Kolatorium und lässt ihn auf diesem
freiwillig abtropfen. Wenn das Abtropfen beendet ist, bringt man den Niederschlag in
eine vorher gewogene, genügend grosse Flasche und übergiesst ihn unter Umschütteln mit
einer Lösung von 0,45 Th festem Natronhydrat in 50 Th Wasser. Hierdurch geht der
Niederschlag binnen kurzer Zeit in Lösung. Nach stattgehabter Lösung fügt man hinzu
Weingeist (von 90 Vol Proc) 150,0 Th, Zimmtwasser 100,0 Th, Tinctura aromatica 2,0
und soviel Wasser, dass das Gesamtgewicht = 1000,0 Th ist.

Helv 200,0 Th frisches Eiweiss werden mit 4000,0 Th Wasser von 50° C ge-
mischt und nach dem Durchgessen durch ein Seidensieb unter Umrühren zu einer
Mischung gegossen von 120,0 Th Eisenoxychloridlösung und 4000,0 Th Wasser von 50° C.
Die Flüssigkeit wird hierauf mit einer 0,3 procentigen Natronlauge genau (!) neutralisirt
und der alsdann entstandene Niederschlag nach dem Absetzen solange durch Dekan-
thiren gewaschen, als das Waschwasser noch Chlor enthält. Dann sammelt man den Niederschlag
auf einem gewogenen Kolatorium und lässt ihn bis zu 400,0 Th abtropfen. Diesen Rück-

stand (von 400 Th) bringe man in eine gewogene Flasche und füge eine Lösung von 0,75 g festem Natronhydrat in 2,0 g Wasser unter Umschütteln hinzu. Nachdem Auflösung des Niederschlages erfolgt ist, setze man eine Mischung hinzu von Tinctura aromatica 2,0, Zimmtwasser 100,0, Spiritus 150,0, Wasser 350,0, lasse absetzen und kohlren.

Eigenschaften. Klare, aromatisch riechende und ebenso schmeckende rostfarbige nicht völlig klare Flüssigkeit von schwach alkalischer Reaktion. Das spec Gewicht ist bei 15° C = 0,99. Der Gehalt an metallischem Eisen beträgt = 0,4 Proc. Klar mischbar mit Wasser, Milch und nicht zu erheblichen Mengen von Alkohol. Durch Zusatz von Ammoniakflüssigkeit oder Natriumbikarbonat entsteht keine Fällung. Neutralisirt man die Flüssigkeit aber vorsichtig mit Salzsäure, so entsteht ein Niederschlag von Ferralbuminat, der auf weiteren Zusatz von Salzsäure in Ferrichlorid und Eiweiss gespalten wird. Niederschläge entstehen durch Einwirkung sehr verdünnter Kochsalzlösung (z. B. $\frac{1}{10}$ -Normal-NaCl-Lösung). Durch Gerbstäure entsteht keine Dunkelfärbung, durch Kaliumferrocyanid ohne Zusatz von Salzsäure keine Blaufärbung, dagegen wird durch Schwefelammonium schwarzes Schwefeleisen gebildet. Durch Zusatz kohlensaurer oder ätzender Alkalien erfolgt Gelatiniren der Lösung.

Prüfung. 1) Die Eisenalbuminatlösung sei flüssig, nicht dicklich oder gelatinös.

2) Werden 40 ccm Eisenalbuminatlösung mit 0,5 ccm Normalsalzsäure vermischt, so muss ein farbloses Filtrat resultiren. Ware dasselbe nicht farblos, so würde das ein Beweis dafür sein, dass das Präparat zu viel Alkali enthält.

3) Zur Bestimmung des Eisengehaltes erhitzt man 10 g Eisenalbuminatlösung in einem Becherglase mit 5 ccm Salzsäure, bis das anfangs ausgeschiedene rothbraune Eisenalbuminat völlig zersetzt ist. Das geronnene Eiweiss filtrirt man ab, wäscht es aus und verdampft das Filtrat nach Zusatz von wenig Kaliumchlorat im Wasserbade zur Trockne. Man nimmt alsdann mit Wasser und wenig Salzsäure wieder auf, fügt 1 g Kaliumjodid hinzu und lässt die Mischung bei gewöhnlicher Wärme im geschlossenen Gefasse 1 Stunde lang stehen. Hierauf titrirt man mit $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung. Bei Annahme eines Gehaltes von 0,4% Fe würden zur Bindung des ausgeschiedenen Jods 7,1 ccm $\frac{1}{10}$ Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein.

Aufbewahrung. Man bewahre die Eisenalbuminatlösung in wohlverstopften, möglichst gefüllten Gefässen, vor Säuredämpfen geschützt, an einem Orte von mittlerer und gleichmässig bleibender Temperatur auf. Glasstopfen sind nicht zu empfehlen, weil sie ein Verdunsten des Weingeistes nicht verhindern. Man wähle Korkstopfen, welche übrigens fast gar nicht geschwärzt werden. Die Einwirkung von Luft und direktem Sonnenlicht, sowie Temperaturschwankungen sind von dem Präparate möglichst fernzuhalten. Der Fäulniss ist es übrigens nicht unterworfen.

Trotz aller aufgewendeten Sorgfalt gelatinirt die Eisenalbuminatlösung doch bis weilen nach einiger Zeit der Aufbewahrung, ohne dass es bekannt wäre, welche Ursachen dies bewirken und ob dieselben stets die nämlichen sind. In der Regel beseitigt eine Erhöhung des Natronzusatzes das Gelatiniren.

Anwendung. Eisenalbuminatlösung steht in dem Rufe, ein milde wirkendes, leicht verdauliches, den Magen nicht belastigendes Eisenpräparat zu sein. Man giebt es Kindern und Erwachsenen je nach dem Alter zu 5–80 Tropfen oder zu $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{1}$ Theelöffel voll dreimal täglich kurz vor den Mahlzeiten entweder mit Wasser oder mit Milch vermischt. Tz. Gmepr hat es mit gutem Erfolge bei Magengeschwüren angewendet.

II Ferrum albuminatum (Ergänzb.) Eisenalbuminat. Trocken- Eisenalbuminat.

Dieses Präparat wird erhalten, indem man, wie unter Liquor Ferri albuminati angegeben, eine Eiweisslösung mit Ferroxychloridlösung vermischt und die Flüssigkeit mit 0,3procentiger Natronlauge genau neutralisirt. Der entstandene Niederschlag wird bis zur Chlorfreiheit ausgewaschen, alsdann zum Abtropfen gebracht, später, soweit es möglich, abgepresst, bei einer 30° C. nicht übersteigenden Wärme in dünner Schicht ausgetrocknet.

und in ein feines Pulver verwandelt (Eine Auflösung in Natronhydrat findet hier also nicht statt)

Ein ockerfarbenes Pulver, das in Wasser unlöslich ist und 13–14 Proc metallisches Eisen enthält

Prüfung. 1) Werden 3,0 g Eisenalbuminat durch Anreiben in einer Mischung von 0,8 ccm Natronlauge (von 15 Proc. NaOH) und 96 ccm Wasser vertheilt und einige Zeit unter bisweiligem Umschwenken sich selbst überlassen, so erfolgt Auflösung zu einer im durchfallenden Lichte klaren, im zurückgeworfenen Lichte etwas trüben, rothbraunen Flüssigkeit. Diese Lösung entspreche bezüglich ihrer Reinheit der Eisenalbuminatflüssigkeit.

2) Eisenbestimmung 0,5 g Eisenalbuminat werden mit einem Theile einer Mischung aus 0,2 ccm Natronlauge (von 15 Proc. NaOH) und 20 ccm Wasser angerieben, mit dem Rest der Flüssigkeit in ein Becherglas gespült, nach vollendeter Auflösung mit 5 ccm Salzsäure (25 Proc. HCl) versetzt und im Wasserbade erhitzt, bis das anfangs ausgeschiedene rothbraune Eisenalbuminat völlig zersetzt ist. Das geronnene Eiweiß wird abfiltrirt und ausgewaschen, das Filtrat wird nach Zusatz von wenig Kaliumchlorat im Wasserbade zur Trockne verdampft und mit Wasser + wenig Salzsäure aufgenommen. Die Lösung wird bis auf 100 ccm mit Wasser verdünnt und nach Zusatz von 3,0 g Kaliumjodid bei gewöhnlicher Wärme im geschlossenen Gefasse 1 Stunde lang stehen gelassen. Es müssen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods 11,6–12,5 ccm der $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein, was einem Gehalte von 13–14 Proc an metallischem Eisen entspricht.

Aufbewahrung Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Liquor Ferri albuminati DREES DREES'sche Eisenalbuminatflüssigkeit ist ein nach einer geheim gehaltenen Vorschrift dargestelltes Eisenpräparat, welches im wesentlichen identisch ist mit dem von der Germ und Helv aufgenommenen Präparat (s. oben).

Liquor Ferri albuminati dialysati Wird wie das Präparat der Germ und Helv bereitet, nur wird das in verdünnter Natronlauge gelöste Ferrialbuminat solange der Dialyse unterworfen, bis das den Dialysator umgebende Wasser nicht mehr alkalisch reagirt.

Liquor Ferri albuminati GUAMM (Holländische Specialität) Rp. Liquoris Ferri albuminati (dialysati) 80,0, Liquoris Ferri oxychlorati 10,0, Aquae destillatae 50,0, Aquae Menthae piperitae 10,0.

Sirupus Ferri albuminati, Eisenalbuminatsirup I Hamb. Vorschr. Sacchari pulverati 5,0 werden in Liquoris Ferri albuminati 10,0 gelöst und mit Sirupi Sacchari 85,0 gemischt. II Albuminis ovi recentis 25,0 werden mit Aquae destillatae 15,0 und Sirupi Sacchari 50,0 gemischt. In der kochten Mischung löst man Ferri oxydati saccharati solubilis 12,5 (Münch. Ap.-V.)

III Liquor Ferri albuminati Brautlecht, Eisenalbuminatsirup nach BRAUTLECHT Albuminis ex ovis sicc. 10,0 löst man in Aquae destillatae 100,0, fugt zur Lösung Natrii caustici (1,16 spec. Gew.) 25,0 und erhitzt im Dampfbade auf 80–90° C. Anderseits mischt man Aquae destillatae 150,0, Liquoris Ferri oxychlorati 180,0, löst in der Mischung durch Erhitzen auf 80–90° C. Sacchari albi pulv. 500,0, vereinigt mit der heissen Albuminatlösung, fugt Tincturae aromaticae 20,0 hinzu und bringt mit Wasser auf ein Gesamtgewicht von 1000,0 (DIETZICH). Nach 8 Tagen wird von einem etwa vorhandenen Bodensatze dekantirt.

IV. Ferrum albuminatum cum Natrio citrico (DIETZICH) Den bei der Bereitung von Liquor Ferri albuminati (Germ.) aus 300,0 g Liquor Ferri oxychlorati gewonnenen Eisenalbuminat Niederschlag presst man, nachdem er chlorfrei gewaschen, schwach aus. Andererseits löst man 7,5 g Citronensäure in 30,0 g destillirtem Wasser und neutralisirt unter Kochen mit q. s. (15–17,0 g) krystall. Natriumcarbonat. Den zerbrockelten Niederschlag übergiesst man in einer Porcellanschale mit der erkalteten Natriumcitratlösung und überlässt die bedeckte Schale der Ruhe. Wenn sich alles, wenn nothig nach Zusatz von etwas Wasser, gelöst hat, sieht man durch, giesst auf Glasplatten und trocknet bei 25–35° C.

Liquor Ferri albuminati cum Natrio citrico, Ferri albuminati cum Natrio citrico (Marko Helfenberg) 28,0 löst man unter öfterem Schütteln in Aquae destillatae 770,0 und setzt der Lösung zu Spiritus (90 proc.) 100,0, Spiritus Vini Cognac 100,0, Tincturae Zingiberis, Tincturae Galangae, Tincturae Cinnamomi Ceylonici aa 1,5.

Ferrum benzoicum.

Ferrum benzoicum (Erganzb, Hamb Vorschr) Eisenbenzoat. Ferribenzoat. Benzoësaures Eisenoxyd. $\text{Fe}_2(\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2)_3 (\text{OH})_3 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 634.

Darstellung. 20,0 Th Benzoesäure (e Toluolo) werden in 400 Th Wasser gelöst und mit q s (28,0 Th) Ammoniakflüssigkeit von 0,98 spec Gew genau neutralisirt. Zu dieser Lösung setzt man eine Mischung aus 81,0 Ferrichloridlösung (spec Gew 1,280—1,282) und 1000,0 Th Wasser. Der entstandene rothbraune Niederschlag wird zunächst durch Dekanthiren, später auf dem Filter gewaschen, bis das ablaufende Wasser nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nicht mehr getrübt wird, dann massig abgepresst und bei einer 30° C nicht übersteigenden Wärme an einem schattigen Orte getrocknet. Ausbeute 30,0 Th.

Eigenschaften. Ein brännlich röthliches, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser unlöslich. Durch heisse Salzsäure wird es mit gelber Farbe gelöst, während beim Erkalten der Lösung sich Benzoesäure in Krystallen abscheidet. Durch atzende Alkalien wird das Salz unter Abscheidung von Ferrihydroxyd zersetzt. Frisch bereitet löst es sich in Leberthran, diese Löslichkeit nimmt aber im Verlaufe der Aufbewahrung ab. Es enthält 17—18 Proc metallisches Eisen und hinterlässt daher beim Verbrennen im Platintiegel 24,28 bis 25,71 Proc Ferroxyd Fe_2O_3 .

Prüfung. 1) 1 g Ferribenzoat hinterlasse beim Glühen im Platintiegel 0,24—0,25 Proc Ferroxyd, wird letzteres mit 1 ccm Wasser befeuchtet, so blaue es rothes Lackmuspapier nur schwach.

2) 0,5 g Ferribenzoat werden in 2 ccm Salzsäure (von 25 Proc HCl) und 15 ccm Wasser in der Wärme gelöst. Nach dem Erkalten filtrire man und wasche den Filterrückstand mit Wasser bis zur Entfernung alles Eisens aus. Zum Filtrat bringe man 1,0 g Kaliumjodid und lasse die Mischung bei gewöhnlicher Temperatur 1 Stunde im geschlossenen Gefasse stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen mindestens 15 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein. $15 \times 0,0056 \text{ g} = 0,084 \text{ g}$ metallisches Eisen. Da diese Menge in 0,5 g Ferribenzoat mindestens enthalten sein soll, so wird hierdurch für dieses ein Mindestgehalt von 16,8 Proc metallischem Eisen gefordert. Vergl S 1089.

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt aufzubewahren. **Anwendung.** Lediglich zur Bereitung von Eisenleberthran (vergl S 420).

Ferrum bromatum.

Das Ferrobromid oder Eisenbromür kommt 1) Im wasserfreien Zustande, 2) als krystallisiertes Salz $\text{FeBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, 3) als Lösung in verschiedenen Formen vor. Unter Ferrum bromatum im Sinne der Pharmacie ist stets das krystallisirte Salz sub 2 zu verstehen.

I Ferrum bromatum anhydricum. Wasserfreies Ferrobromid oder Eisenbromür. FeBr_2 . Mol. Gew. = 216.

Dieses Salz entsteht, wenn man Bromdampf bei schwacher Rothgluth über metallisches Eisen, am besten über Eisendraht, leitet. Grünlichgelbe krystallinische Schuppen, welche hygroskopisch sind und deshalb in Glasröhren eingeschmolzen werden. Wegen seiner schwierigen Handhabung wird es in der Praxis so gut wie gar nicht angewendet, sondern ist lediglich als „Sammlungspräparat“ anzusehen.

II. Ferrum bromatum crystallisatum album. Weisses Ferrobromid oder Eisenbromür. $\text{FeBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 252.

Das Salz dieser Zusammensetzung wird wie folgt erhalten. Man übergiesst in einem Kolben 35,0 Th Eisenpulver mit 300,0 Th destillirtem Wasser und fügt allmählich 68,5 Th Brom hinzu. Die Darstellung erfolgt in analoger Weise wie beim Ferriodid, s S 1111. Die filtrirte Lösung wird unter Zusatz von etwas Bromwasserstoffsäure in der Wärme des Wasserbades zur Trockne gebracht. Alsdann zerreibt man den Rückstand, breitet ihn zwischen zwei Glasplatten aus und setzt ihn zwischen diesen von beiden Seiten dem direkten Sonnenlicht aus, bis er grünlich weiss geworden ist.

[NB. Lässt man die wässrige Lösung des Ferrobromids bei Luftabschluss verdunsten, so erhält man bläulich grüne Krystalle $\text{FeBr}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$]

Da das Ferrobromid ziemlich leicht zersetzbar ist, wird es meist *ex tempore* dargestellt. Es sei bemerkt, dass man bei Pillenmassen das im Ueberschuss vorhandene Eisen nicht abfiltrirt, sondern mit dem Ferrobromid zusammen in die Pillen verarbeitet.

Zur Darstellung des wasserhaltigen Ferrobromids *ex tempore* (z. B. für Pillenmischungen) sind anzuwenden

Ferrobromid	Brom	Eisenpulver	Ferrobromid	Brom	Eisenpulver
g	g	g	g	g	g
0,5	0,32	0,15	5,5	3,49	1,65
1,0	0,63	0,3	6,0	3,81	1,8
1,5	0,95	0,45	6,5	4,13	1,95
2,0	1,27	0,6	7,0	4,44	2,1
2,5	1,59	0,75	7,5	4,76	2,25
3,0	1,90	0,9	8,0	5,08	2,4
3,5	2,22	1,05	8,5	5,40	2,55
4,0	2,54	1,2	9,0	5,71	2,7
4,5	2,86	1,35	9,5	6,03	2,85
5,0	3,17	1,5	10,0	6,35	3,0

Wasser muss mindestens so viel, als Ferrobromid darzustellen ist, genommen werden.

III. Liquor Ferri bromati enthält 10 Procent wasserhaltiges Ferrobromid $\text{FeBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Es wird wie oben sub II angegeben bereitet, das Filtrat aber mit destillirtem Wasser bis auf 1000,0 verdünnt und im Tageslichte wie der Liquor Ferri chlorati aufbewahrt.

Bromure ferreux (Gall.) Solution officinale de bromure de fer ist eine fast genau 38 Proc wasserfreie Ferrobromid FeBr_2 enthaltende wässrige Lösung und wird bereitet durch Zusammenbringen von 40,0 Th Brom, 20 Th Eisen und 100 Th Wasser.

IV Tinctura Ferri bromati, wird *ex tempore* bereitet durch Lösung von 9,6 Kaliumbromid, 12,0 krystallisirtem Ferrosulfat in 40,0 destillirtem Wasser. Zusatz zunächst von etwa 0,5 Eisenpulver und dann von 50,0 Weingeist von 90 Proc. Nach einem halbstündigen Beisetzstellen wird die geschüttelte Flüssigkeit durch ein Bauschen Glaswolle filtrirt und wie die Ferrobromidlösung aufbewahrt. Sie enthält 10 Proc Ferrobromid, $\text{FeBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

Aufbewahrung. Das Ferrobromid und seine Lösungen werden in gutgeschlossenen Gefässen (vor Luft und Feuchtigkeit geschützt), aber unter möglichster Bestrahlung durch das direkte Sonnenlicht aufbewahrt. Die Lösungen halten sich trotzdem nur kurze Zeit und sollten deshalb stets *non nisi ad dispensationem* bereitet werden.

Anwendung. Innerlich in wässriger oder spiritusböser Lösung zu 0,05—0,25 g bei Chlorose, Dysmenorrhoe, chronischer Diarrhoe, Fluor albus, Gonorrhoe, Diphtherie, Bronchitis, besonders gut wird es mit kohlensaurem Wasser vertragen (s unten). Aeusserlich zum Aufpinseln bei Erysipelas, zur Inhalation bei Bronchitis.

Aqua ferri bromata nervina BAUER & BAUM. Auf 1 Liter kohlensaures Wasser werden 2,0 g Ferrobromid $\text{FeBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ zugesetzt. Gegen Neurasthenie und Anämie.

Liquor Ferri bromati PARRISH
Rp Sacchari albi pulverati 40,0
Liquoris Ferri bromati (10 Proc) 60,0

Pilules de bromure ferreux (Gall)
Rp 1 Solutionis Ferri bromati (33 proc.) 15,0 g
2 Ferri pulverati 0,1 g
3 Gummi arabici
4 Radicis Liquiritiae 33 q s

Man dampft 1 mit 3 auf 5,0 ein, giesst den Püch-
stand in einen erwärmten Porcellanmörser und

formt mit 3 und 4 = 100 Pillen. Diese werden
in Eisenpulver (oder auch Graphit) gerollt und
mit einem ätherischen Lack aus Mastix und
Tolubalsam lackirt.

Sirapus Ferri bromidi Nat. form.
Rp Ferri pulverati 80,0
Bromi 75 0
Sacchari pulverati 600,0
Aqueae q s ad 1000,0

Der Sirup enthält 10 Proc. wasserfreies Ferrobromid FeBr₃.

† V Ferrum sesquibromatum solutum Liquor Ferri perbromati. Ferri-
bromidlösung. Eisenbromidlösung.

Das trockne Ferribromid FeBr₃ ist sehr hygroskopisch und daher schwer konservir-
bar. Man stellt es durch Hinüberleiten von Bromdämpfen, welche man über dunkelroth-
glühendes Eisen leitete, dar. Die 10procentige Lösung des Ferribromids wird wie folgt
dargestellt: 2,5 Eisenpulver, circa 60,0 destillirtes Wasser und 5,4 Brom werden
in eine Ferrobromidlösung verwandelt, nach dem Filtriren, welches unter Nachwaschen des
Filtrums geschieht, mit 2,7 Brom und dann soviel destillirtem Wasser versetzt, dass
die Flüssigkeit 100,0 beträgt. Diese wird in Flaschen mit dichtschliessendem Glasstopfen
in der Reihe der starkwirkenden Arzneikörper aufbewahrt.

Anwendung. Es ist das Ferribromid bei Skrofeln, Amenorrhoe, Hysterie, Leu-
korrhoe, Hypertrophie des Herzens und Uterus empfohlen und zu 0,02–0,04–0,06 g drei-
bis fünfmal täglich gegeben worden. Die stärkste Einzeldosis ist zu 0,15 g, die stärkste
Gesamtdosis auf den Tag zu 0,5 g anzunehmen. Aeusserlich als Pinselflüssigkeit fand
es GILLISPIE besonders wirksam auf Geschwülste der Drüsen und bei Erysipelas.

Ferrum carbonicum.

Das Karbonat des Eisenoxyduls, Ferrokarbonat FeCO₃, ist bekannt. Es
entsteht als ein weisser Niederschlag, wenn man eine Ferrosalzlösung mit Natriumkarbonat
oder Natriumbikarbonat unter Abschluss von Sauerstoff fällt. Aber dieser Niederschlag ist
wenig beständig, er wird schon durch die Einwirkung des Luftsauerstoffs rasch oxydirt,
wobei er eine grünliche bis bläuliche, schliesslich rostrothe Färbung annimmt. Man ver-
sucht, das Ferrokarbonat durch Zusätze von Zucker und ähnlichen Substanzen in eine
haltbare Form zu bringen. Das Karbonat des Eisenoxyds, Ferrikarbonat Fe₂(CO₃)₃,
ist zur Zeit kaum bekannt. Es soll angeblich nur bei niedriger Temperatur bestehen.
Durch Fällung von Ferrisalzlösungen mit Natriumkarbonat oder Natriumbikarbonat erhält
man bei gewöhnlicher Temperatur unter Entweichen von Kohlensäure = Ferrhydroxyd.

I. Ferrum subcarbonicum Safran de Mars apéritif. Ciocus Martis.
 $x \text{ FeCO}_3 + y \text{ Fe(OH)}_3$

Man löst 100,0 g reines krystall. Ferrosulfat in 1 Liter Wasser, andersseits 120,0 g
krystall. Natriumkarbonat in $\frac{1}{2}$ Liter Wasser und giesst die Sodalösung in kleinen An-
theilen allmählich unter Umrühren in die Eisenlösung. Man lässt den zunächst fast
weissen Niederschlag absetzen, wäscht ihn vorerst einige Male durch Dekanthiren, später
auf dem Kolatorium oder Filter, bis im ablaufenden Wasser Schwefelsäure sich nicht mehr
nachweisen lässt. Gleichzeitig sorgt man während des Fallens und Auswaschens dafür,
dass der Niederschlag in möglichst gründliche Berührung mit der Luft kommt. Er
nimmt infolgedessen eine grünliche bis bläuliche, später rostrothe Färbung an. Sobald dies
der Fall und Schwefelsäure im Filtrat nicht mehr nachzuweisen ist, wird der Niederschlag
auf porösen Unterlagen bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet.

Ein rostfarbendes Pulver, welches im wesentlichen aus Ferrhydroxyd besteht und
nur kleine Mengen Ferrokarbonat enthält.

II Ferrum carbonicum saccharatum (Austr Germ Helv) **Ferri Carbonas saccharatus** (Brit U-St.) **Zuckerhaltiges Ferrokarbonat.** Das Präparat ist im wesentlichen Ferrokarbonat, welches durch Zusatz von Zucker in haltbaren Zustand gebracht worden ist

Darstellung. Man bereitet zunächst Ferrokarbonat durch Fällung einer Ferrosulfatlösung mit Natriumkarbonat oder Natriumbikarbonat oder Ammoniumbikarbonat. Damit das Ferrokarbonat möglichst wenig oxydirt wird, wendet man die Ferrosulfatlösung heiss (!) an, die Erwärmung der Natriumbikarbonatlösung dagegen soll nicht über 50° C hinausgehen. Man bringt die Natrium(bi)karbonatlösung in eine passende Flasche, filtrirt die heisse Ferrosulfatlösung dazu, füllt die Flasche sofort (!) mit ausgekochtem Wasser völlig an und lässt unter Verschliessen (!) der Flasche mit einem Kork absetzen. Nach dem Absetzen hebert man die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit ab, füllt die Flasche wiederum mit ausgekochtem Wasser völlig an, schüttelt um, lässt absetzen und hebert wieder ab. Dieses Auswaschen mit heissem Wasser wiederholt man so oft, bis die überstehende Flüssigkeit, nach dem Ansäuern mit Salpetersäure, durch Baryumchlorid kaum noch getrübt wird. Ist dieser Punkt erreicht, so lässt man den Niederschlag sich möglichst dicht absetzen, hebert die Waschflüssigkeit thunlichst vollständig ab und giesst alsdann den rückständigen Brei in eine Porcellanschale, welche die vorgeschriebene Menge Zucker enthält. Die letzten Reste kann man mit Hilfe von mehreren kleinen Portionen Alkohol dazubringen. Man dampft nun die Zuckermischung im Wasserbade rasch zur Trockne, zerreibt den trocknen Rückstand und bringt ihn durch Vermischen mit Zucker auf das geforderte Gewicht. — Die Vorschriften der einzelnen Pharmakopen weichen in Einzelheiten von einander etwas ab, gehen aber summtlich von den oben ausgeführten Gesichtspunkten aus.

Austr. Eine siedende Lösung von 200,0 Th kryst Natriumkarbonat in 1200 Th Wasser wird mit 50,0 Th gereinigtem Honig vermischt. Dann setzt man unter Umschwenken in kleinen Antheilen 250,0 Th gepulvertes krystall Ferrosulfat hinzu (das Schäumen lässt sich durch Zusatz kleiner Mengen Weingeist unterdrücken). Der Niederschlag wird, wie oben angegeben, gewaschen und mit 200,0 Th Zuckerpulver eingedampft bez. angetrocknet.

Germ und Helv. Eine hinreichend geräumige Flasche enthält eine filtrirte Lösung von 35,0 Th Natriumbikarbonat in 500,0 Th lauwarmem Wasser (von nicht über 50° C). In diese Lösung filtrirt man eine zweite Lösung hinein von 50,0 Th krystall Ferrosulfat in 200,0 Th siedendem (!) Wasser. Der Niederschlag wird wie oben angegeben ausgewaschen, dann in eine Porcellanschale übergeführt, welche 10,0 Th Milchzuckerpulver und 80,0 Th Zuckerpulver enthält und mit diesen zur Trockne verdampft und angetrocknet. Der Trockenrückstand wird zerrieben und durch Vermischen mit Zuckerpulver auf 100,0 Th gebracht.

Brit. Eine Lösung von 40,0 g krystall Ferrosulfat in 1,6 Liter siedendem Wasser wird in eine Lösung von 25,0 g Ammoniumkarbonat in 1,6 Liter siedendem Wasser eingetragen, der Niederschlag wie oben angegeben ausgewaschen und mit 20,0 g Zuckerpulver eingedampft.

U-St. Eine heisse Lösung von 50,0 Th krystall Ferrosulfat in 200,0 Th heissem Wasser wird in eine Lösung von 35,0 Th Natriumbikarbonat in 500,0 Th lauwarmem Wasser, welches nicht über 50° C heiss sein soll, eingetragen, der Niederschlag wie oben angegeben ausgewaschen, mit 80 Th Zucker eingedampft und schliesslich mit Zucker auf das Gesamtgewicht von 100 Th gebracht.

Eigenschaften. Ein grünlichgraues Pulver von anfangs stissem, hinterher von mildem Eisengeschmacke. Beim Uebergiessen mit verdünnter Salzsäure löst es sich unter Aufbrausen (d. h. Entwicklung von Kohlensäure) zu einer gelblichen Flüssigkeit auf. Bei sorgsamer Bereitung sind von dem vorhandenen Gesamteisen etwa 25 Proc als Ferrihydroxyd und etwa 75 Proc als Ferrokarbonat zugegen. Die salzsäure Lösung giebt daher sowohl mit Ferrocyankalium, als auch mit Ferriocyankalium blaue Niederschläge.

Prüfung. Die Güte des Präparates ergibt sich zunächst aus seiner Färbung. Grünlichgrüne oder graue Präparate sind weniger zersetzt als deutlich braune. Ferner muss beim Uebergiessen mit verdünnter Salzsäure lebhaftes Aufbrausen von Kohlensäure

erfolgen In dem Maasse, wie die Umwandlung des Ferrokarbonats zu Ferrhydroxyd erfolgt, wird nämlich das Entweichen der Kohlensäure weniger lebhaft

1) 1 g des Präparates muss sich in verdünnter Salzsäure ohne Rückstand zu einer gelben Flüssigkeit auflösen, welche nach dem Verdünnen mit Wasser durch Baryumchlorid nur ganz schwach getrübt werden darf (Spuren von Schwefelsäure sind zuzulassen)

2) Bestimmung des Gesamteisens Helv 1 g des Präparates wird im Platintiegel versacht, der Rückstand wird wiederholt mit Salpetersäure behandelt und bis zum konstanten Gewicht gegluht Es sollen etwa 0,14 g Ferrioxyd zurückbleiben, entsprechend einem Gehalt von 9,8 Proc (also rund 10 Proc) an metallischem Eisen Germ 1 g des Präparates werde in 10 ccm verdünnter Schwefelsäure in der Wärme gelöst, nach dem Erkalten (1) mit Kaliumpermanganatlösung bis zur vorübergehend bleibenden Rothung und darauf mit 1 g Kaliumjodid versetzt Diese Mischung werde 1 Stunde bei gewöhnlicher Temperatur in einem geschlossenen Gefasse stehen gelassen Es sollen alsdann zur Bindung des abgeschiedenen Jods 17,0—17,8 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden entsprechend einem Gehalte von 9,52—9,97 Proc metallischem Eisen

3) Bestimmung des Gehaltes an Ferrokarbonat (Eisenoxydulsalz) Diese schreiben nur Brit und U-St vor Brit Wird 1 g des Präparates in konc Phosphorsäure (von 66 Proc H_3PO_4) unter Erwärmen gelöst, die Lösung mit Wasser verdünnt und mit 29,0 ccm Kaliumdichromatlösung [4,87 g $K_2Cr_2O_7$ in 1 Liter] versetzt, so soll dieselbe mit Kaliumferrieyanid noch eine blaue Färbung geben Daraus berechnet sich ein Gehalt von rund 16 Proc metallischem Eisen in der Form des Oxydulsalzes oder ein Gehalt von 88 Proc Ferrokarbonat $FeCO_3$ U-St Wird 1,16 g des Präparates in 10 ccm verdünnter Schwefelsäure gelöst und die Lösung mit Wasser auf 100 ccm verdünnt, so sollen etwa 15 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal Kaliumpermanganatlösung zur bleibenden Rothung verbraucht werden [3,1584 g $KMnO_4$ in 1 Liter] Hieraus berechnet sich ein Gehalt von 8,4 Proc metallischem Eisen im Zustande eines Ferrosalzes, bez 15 Proc Ferrokarbonat $FeCO_3$

Aufbewahrung Das gut ausgetrocknete Pulver werde in trocknen, nicht zu grossen und gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt Die Einwirkung direkten Lichtes ist eher nützlich als schädlich

Massa pilularum Ferri carbonici **Massa pilularum Valetti.** **Massa Ferri Carbonatis (U-St)**

Gall. Man löst 100,0 krystall Ferrosulfat in heissem 5procentigen Zuckerwasser und giesst die heisse Lösung in eine zweite, noch heisse Lösung von 120,0 krystall Natriumkarbonat in 5procentigem Zuckerwasser Der Niederschlag wird in einer stets völlig gefüllt und gut verschlossen zu haltenden Flasche (siehe oben) mit heissem 5procentigen Zuckerwasser gewaschen, bis das Waschwasser nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Baryumnitrat nicht mehr merklich getrübt wird Dann bringt man ihn auf ein mit Zuckersirup angefeuchtetes Leinen-Kolatorium, bindet dieses zu und presst unter der Presse allmählich, aber stark ab Den Pressrückstand bringt man in eine Porcellanschale, fügt 80,0 Honig und 30,0 Milchzucker zu und dampft zur Konsistenz eines dicken Extractes ein U-St Man fällt eine heisse Lösung von 100,0 g krystall Ferrosulfat in 200,0 g heissem Wasser + 20 ccm weissem Sirup mit einer gleichfalls heissen Lösung von 100,0 g, krystall. Natriumkarbonat in 200,0 g Wasser, wäscht mit heissem Zuckerwasser (1 weisser Sirup, 19 Wasser) aus, sammelt auf einem Leinen-Kolatorium, presst möglichst stark und dampft den Rückstand in einer Porcellanschale mit 88,0 g gereinigtem Honig und 25,0 g Zucker bis zum Gewicht von 100,0 g im Wasserbade ab

Aqua Ferri nervina von WOLFF & CALMBERG Enthält in 100 Liter kohlensaurem Wasser 15,0 g Ferrokarbonat, 205,7 g Calciumphosphat, 232,9 g Natriumchlorid und 99,7 g Natriumbikarbonat Es wäre demnach nachzubilden aus 21,1 g Ferrochlorid ($FeCl_2 + 2H_2O$), 205,7 g Calciumphosphat, 218,8 g Natriumchlorid und 120,7 g Natriumbikarbonat auf 100 Liter kohlensaures Wasser

Dr. NAGEL'S Nervenpillen der Salomonis-Apotheke in Dresden Rp Massae pilularum Valeti 10,0, Ferri lactis 2,5, Chinini 0,3, Rhizomatis Rhei 5,0, Vini Tokayensis Extracti Gentianae aa 5,0

Blleichsuchtwasser von Dr. Ewich enthält in 10000 Th 11 Th kohlensaures Natron, 9 Th Chlornatrium, 1,5 Th schwefelsaures Natron, 7 Th kohlensaure Kalkerde und 1,2 Th kohlensaures Eisenoxydul nebst reichlicher Kohlensäure (HAGER, Analyt.)
Zu seiner Darstellung gehören entwässertes Natriumkarbonat 20,0, wasserfreies Calciumchlorat 10,0, krystall Ferrosulfat 8,0, Wasser 10000, Kohlensäure q s

Chocolat ferrugineux (Gall)

Eisen-Chokolade

Rp Pastae Cacao saccharatae 990,0
Ferri subcarbonici (= Safran apéritif) 10,0
Man bereite nicht zu grosse Vorräthe

Granula Ponguensis

Dragées de Pongues

Rp Ferri carbonici saccharati
Calci carbonici
Magnesi subcarbonici $\overline{\text{aa}}$ 10,0
Natri bicarbonici 80,0
Sacchari albi 140,0
Olei Menthae piperitae 2,0
Tragacanthae pulveratae 0,5
Aqua q s

Fiant pilulae ponderis 0,12, quae saccharo obducantur

Mixtura antihæstica GRIFFITH

GRIFFITH'sche Mixtur Mixtura antiphthisica GRIFFITH Mixtura Ferri composita (Ergänzb) (Hamb V)

Rp 1 Ferri sulfuri 1,25
2 Kalii carbonici 1,50
3 Aquae Menthae crispae 250,0
4 Myrrhae pulveratae 4,0
5 Sacchari 15,0

Man löst 1 und 2 in 3, reibt 4 mit 5 fein und reibt es mit der Lösung an

Pasta Cacao cum Ferro carbonico

Rp Pastae Cacao saccharatae 1000,0
Sacchari vanillinat 5,0
Ferri carbonici saccharati 20,0

Man forme 100 Kieselchen à 10,0 g

Pilulae antigestralgiae SCERLECKY

Rp Massae pilularum Valetti
Radici Colombo $\overline{\text{aa}}$ 8,0
Seminis Strachani 0,5
Radici Liquiritiae 1,5

Fiant pilulae sexaginta (60)

Zwei bis drei Pillen dreimal täglich (bei chlorotischer Gastralgie)

Pilulae Ferri carbonici BLAUD

BLAUD'sche Eisenpillen.

I Ergänzb

Rp Ferri sulfuri sicc 9,0
Sacchari pulv 8,0
Kali carbonici 7,0
Magnesiae ustae 0,7
Radici Althaeae 1,4
Glycerini q s (0,4)

werden zu 100 Pillen geformt.

II Pilulae Ferri sulfuri Blandii (Form Berol.)

Rp Ferri sulfuri
Kali carbonici $\overline{\text{aa}}$ 9,0
Tragacanthae 12
Aquae destillatae q s

Fiant pilulae 60

III Pilulae Blandii alkalinae

(Münch Verschr)

Rp Kali carbonici 18,0
Ferri sulfuri sicc 12,0
Magnesi carbonici 5,2
Glycerini q s

Fiant pilulae ponderis 0,4 g

IV Hamb Verschr

Rp 1 Ferri sulfuri sicc
2 Kali carbonici $\overline{\text{aa}}$ 12,5
3 Mellis 13,0

Man schmilzt 3 im Dampfbade, fügt die innige Mischung von 1 und 2 hinzu, lässt zur Masse an und formt diese noch halbwarm zu 100 Pillen. Keine zu grossen Vorräthe halten!

V Aeltere Verschrift

Rp 1 Ferri sulfuri crystalli
2 Kali carbonici $\overline{\text{aa}}$ 10,0
3 Sacchari albi 5,0
4 Radici Althaeae q s

Man zerreibt 1 und 2 in einem eisernen Mörser und lässt $\frac{1}{4}$ Stunde oder so lange stehen, bis die Mischung breig geworden. Dann fügt man 3 und 4 hinzu und formt 100 Pillen, die mit Zimmpulver zu bestreuen sind

VI Pilulae ferratae Kalinae (Helv)

Rp Gummi arabici

Kali carbonici $\overline{\text{aa}}$ 3,5
Ferri sulfuri crystalli
Sacchari $\overline{\text{aa}}$ 5,0
Aqua gtt VIII

Man formt 100 Pillen, welche sofort in Milchnucker zu rollen und an der Luft zu trocknen sind.

Pilulae Ferri carbonici

I Germ I

Rp Massae pilularum Valetti 10,0
Radici Althaeae q s

Fiant pilulae 100, cortice Cinnamomi conspergendae für den Handverkauf werden die Pillen häufig versilbert oder kandi abgegeben

II Gall Pilulae de carbonate ferreux selon VALLET

Rp Massae pilularum Valetti 80,0
Radici Liquiritiae 10,0

Fiant pilulae ponderis 0,25 g

III Pilulae Ferri carbonici (Helv)

Rp Gummi arabici 2,5
Ferri carbonici saccharati 10,0
Glycerini
Aqua $\overline{\text{aa}}$ gtt XV

Fiant pilulae 100

Pilulae ferrugineae de BLAUD (Gall)

Rp 1 Gummi arabici 5,0
2 Aquae destillatae 80,0
3 Sirupi Sacchari 15,0
4 Ferri sulfuri sicc
5 Kali carbonici $\overline{\text{aa}}$ 80,0

Man löst unter Erwärmen 1 in 2, fügt 3 und 4 hinzu, rührt dann mit einem eisernen Spatel unter Erwärmen 5 dazu und verarbeitet zu 200 Pillen, die zu versilbern sind

Pilulae Ferri compositae GRIFFITH

Pilulae Myrrhae ferratae

Rp Ferri sulfuri crystalli
Kali carbonici $\overline{\text{aa}}$ 2,5
Myrrhae pulveratae 5,0
Extracti Gentianae 2,5

Fiant pilulae 100

Fünf Pillen täglich drei bis viermal (bei Phthisis tuberculosa)

Compound Pills of iron (Nat Form)		Pulvis aërophorus ferrugineus MENZEL	
Rp	Myrrhae 9,75	A	
	Natrii carbonici cryst.	Rp	Ferri sulfurici cryst. 0,2
	Ferri sulfurici cryst. 33 4,85		Sacchari 0,5
	Sirupi Sacchari q s	In eine blaue oder rothe Kapsel.	
Plant pilulae 100		B	
			Natrii bicarbonici 0,2
			Sacchari 0,5
		In eine weisse Kapsel Gebrauch wie vorher.	
Pulvis effervescent ferratus (Helv)		Pulvis aërophorus ferrugineus WALDENBURG	
Rp	Ferri sulfurici sicc. 80,0	Rp	Ferri sulfurici sicc. 0,05
	Acidi tartarici 270,0		Pulveris aërophori 1,0
	Natrii bicarbonici 805,0	Doses tales X	
	Sacchari 894,0	Pulvis aërophorus martiatius vernalis	
Poudre gazeuse ferrugineuse (Gall)		Rp	1 Natrii bicarbonici 25,0
Rp	Acidi tartarici 80,0		2 Magnesii carbonici 2,0
	Natrii bicarbonici 80,0		3 Acidi tartarici 23,0
	Sacchari 280,0		4 Sacchari 20,0
	Ferri sulfurici cryst. 2,0		5 Ferri pyrophosphorici 5,0
			6 Sacchari 20,0
Pulvis aërophorus martiatius FRANK		Man mischt zunächst je für sich 1 und 2, ferner	
	A	3 und 4, dann 5 und 6 Die drei Mischungen	
Rp	Ferri carbonici saccharat.	werden dann zu einem Pulver zusammengemischt	
	Natrii bicarbonici 33 0,75	Sirupus Ferri carbonici	
In eine blaue oder rothe Kapsel.		Sirupus ferratus	
	B	Rp	Massae pilularum Valetti 2,0
	Acidi tartarici 0,7		Aquae destillatae 5,0
	Elaeosacchari Cistri 0,5		Sirupi Sacchari 93,0
In eine Wachskapsel Man löse A zuerst in Wasser		Umgeschüttelt täglich 2—4mal 1 Kinderlöffel	
und füge alsdann B hinzu.			

Ferrum chloratum.

I. Ferrum chloratum crystallisatum viride Ferrum chloratum oxydntatum crystallisatum Chlorure ferreux cristallisée (Gall) Krystallisiertes Eisenchlorür oder Ferrochlorid. $\text{FeCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 199

Darstellung In einen geräumigen Glaskolben bringt man 150 Th reine Salzsäure (von 25 Proc HCl) und giebt dazu allmählich 35 Th Eisen in Form kleiner Schmiedenagel oder als Draht. Wenn die Gasentwicklung bei gewöhnlicher Temperatur fast aufgehört hat, so erwärmt man den Kolben einige Zeit massig, bis die Einwirkung der Säure auf das Eisen völlig beendet ist. Man filtrirt alsdann rasch und kocht das Filtrat alsbald in einem Porcellanfass über freiem Feuer bis zum Salzhautehen ein. Man fügt zu der Flüssigkeit alsdann 1 Th Salzsäure (von 25 Proc) hinzu und dampft unter Umrühren mit einem Glasstabe bis auf 98—100 Th Rückstand ab oder so lange, bis der resultierende Brei, auf einen kalten Gegenstand gebracht, zu einer Krystallmasse erstarrt. Man lässt alsdann erkalten, stösst die Krystallmasse in Stücke und bringt diese sofort in gut zu verschliessende Gefässe.

Eigenschaften. Grünliche, hygroskopische Krystallfragmente, die meist durch Oxydation oberflächlich mit einer ockerfarbigen Schicht von Ferroxychlorid bedeckt sind. Sie lösen sich in Wasser und Weingeist, in Aether sind sie unlöslich. Bei der Auflösung in Wasser verursacht das vorhandene Ferroxychlorid eine Trübung, die durch Salzsäure verschwindet. Das Salz enthält rund 64 Proc Ferrochlorid FeCl_2 und 36 Proc Wasser, es enthält trotz sorgfältigster Darstellung und Aufbewahrung stets Ferroxychlorid. Ueber die Aufbewahrung siehe das folgende Präparat.

Prüfung Es ist genügend rein, wenn es sich in gleichviel Wasser unter Zusatz einiger Tropfen Salzsäure klar löst, und wenn diese Lösung mit einem dreifachen Volumen Weingeist eine klar bleibende Mischung liefert. Die wässrige Lösung soll auch durch Baryumchlorid nicht getrübt werden.

II. Ferrum chloratum insolatione paratum Ferrum chloratum (Ergänzb)
Ferrum chloratum siccum $\text{FeCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew = 163.

Darstellung Die sub I gewonnene heisse Salzlösung wird nicht mit 1 Th, sondern mit 3 Th Salzsäure vermischt, die später erhaltene harte Krystallmasse zu Pulverreiben und dieses in etwa 0,5 cm dicker Schicht auf Porcellantellern den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt. Sobald die äusserste Schicht weiss erscheint, wird umgerührt und dies so oft wiederholt bis alles in ein trocknes weisses Pulver verwandelt ist und eine kleine Menge, in Wasser gelöst, mit Kaliumferrocyanid zunächst nur eine weissliche Trübung giebt. Das Pulver wird sofort in kleine langliche Flaschen von ca 50 ccm Rauminhalt eingefüllt etc. Bereitungszeit im Sommer.

Eigenschaften. Dieses Ferrochlorid bildet ein weisses, wenig hygroskopisches, in Wasser fast klar lösliches Pulver, welches mit Kaliumferrocyanid eine weissliche, erst nach einigen Augenblicken bläulich werdende Trübung giebt. Es besteht aus 78 Proc wasserfreiem Ferrochlorid FeCl_2 und 22 Proc Wasser. Die Prüfung erfolgt wie bei dem vorgehen Präparat.

Aufbewahrung Das krystallisierte sowie das getrocknete Ferrochlorid werden sofort nach der Darstellung in kleine lange Cylindergläser von ca 50 ccm Rauminhalt eingefüllt, die Gläser mit Kork dicht geschlossen und die Verschlüsse mit Flaschenlack dicht gemacht. Der Aufbewahrungsort ist ein Ort, auf welchen helles Tageslicht und auch direktes Sonnenlicht fällt.

Liquor Ferri chlorati (Ergänz.) Eisenchlorürlösung 110 Th metallisches Eisen werden mit 520 Th Salzsäure (von 25 Proc HCl), wie sub I angegeben, gelöst. Man filtrirt die Lösung durch ein mit 1 Th Salzsäure angefeuchtetes Filter und wäscht dieses mit Wasser nach, bis das Gewicht des Filtrates = 1000 Th ist. Klare, grünliche Flüssigkeit vom spec Gewicht 1,226–1,230. Sie enthält 10 Proc metallisches Eisen oder 22,68 Proc wasserfreies Ferrochlorid FeCl_2 .

Tinctura Ferri chlorata Eisenchlorürtinktur. Ergänzb. Ferri chlorati insolatione parata 25,0, Spiritus diluti (70 proc) 225,0, Acidi hydrochlorici (25 proc) 1,0. In kleinen Flaschen im hellen Tageslichte aufzubewahren.

Liquor Ferri Protochloridi Nat Form. Ferri metallici 160,0 g, Acidi hydrochlorici (31,9 proc) 625,0 g, Glycerini 250,0 ccm, Acidi hypophosphorosi diluti (10 proc) 10 ccm, Aquae destillatae q s ad 1 Liter.

Pilulae de chlorure ferreux (Gall.)
Rp Ferri chlorati siccati 1,0
Radix Liquiritiae
Gummi arabici aa 0,5
Aquae q s

Fiant pilulae 10

Man rolle sie in Eisenpulver (oder Graphit) und lackire sie alsdann mit einem ätherischen Lack aus Tolu balsam und Mastix ad.

Pilulae Ferri chlorati (haltbare)

Rp Ferri chlorati sicci 5,0
Sacchari pulverati 1,0
Pulvis Althaeae 1,0
Tragacanthae 0,2
Sirupi Sacchari q s

Fiant pilulae 50

Sirupus Ferri Protochloridi (Nat form)
Sirup of Protochloride of Iron.

Rp Liquoris Ferri chlorati (Nat form) s vorher 50 ccm
Glycerini 125 ccm
Aque Auranti florum 120 ccm
Sirupi Sacchari q s ad 1 Liter

Ferrum citricum.

I Ferrum citricum oxydatum (Germ.) Citrate de fer. Ferrietrat Eisen-citrat. Citronensaures Eisenoxyd. $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7, \text{Fe})_2$ Mol. Gew = 460

Darstellung 25 Th. Ferrichloridlösung von 1,28–1,282 spec Gew werden mit 250 Th. Wasser gemischt und in ein Gemenge (nicht umgekehrt) von 25 Th Ammoniakflüssigkeit (0,96 spec Gew) und 200 Th Wasser im dünnen Strahle, unter Umrühren und unter Ausschluss jeder Erwärmung eingegossen (man bringe zweckmässig etwas Eis in die ammoniakalische Flüssigkeit). Am Ende der Fällung muss ein Ueberschuss von freiem Ammoniak durch den Geruch deutlich (l) wahrzunehmen sein.

Man lässt die Fällungsflüssigkeit unter gelegentlichem Umrühren zunächst 2—3 Stunden an einem kühlen, schattigen Orte stehen. Dann lässt man absetzen, zieht die klare, überstehende Flüssigkeit mit Hilfe eines Hebers ab, wäscht den Niederschlag so lange mit kaltem (zum Schluss mit destillirtem) Wasser aus, bis etwa 100 ccm des Filtrats nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nur noch opalisirend getrübt werden. Man sammelt nun den Niederschlag am besten auf einem dichten, genassten und dann gewogenen Leinentuche, lässt ihn abtropfen und presst ihn in demselben vorsichtig so weit aus, dass sein Gewicht etwa 12,5 Theile beträgt. Die noch feuchte Masse trägt man alsdann sofort in eine geeignete Flasche ein, welche eine Lösung von 9 Th. Citronensäure in 85 Th. Wasser enthält, und lässt an einem vor Licht geschützten Orte unter häufigem Umschütteln so lange stehen, bis möglichst vollständige Auflösung eingetreten ist. Ist es nothig, die Mischung zum Zwecke der Auflösung zu erwärmen, so lasse man die Temperatur nicht über 50° C hinausgehen. Sobald alles gelöst erscheint, filtrirt man. Das Filtrat wird bei sehr gelinder Wärme (45 bis 50° C) bis zur Sirupsdicke eingedampft und bei ca. 30 bis 45° C, auf wagerecht liegenden Glasplatten angestrichen, getrocknet. Die Ausbeute beträgt ungefähr 12 Theile.

Eigenschaften. Ferricitrat bildet dünne durchscheinende Blättchen von rubinrother Farbe und schwachem Eisengeschmacke, beim Erhitzen verkohlt es unter Entwicklung eines eigenartigen Geruches und Hinterlassung von Eisenoxyd, in 100 Theilen sollen 19 bis 20 Theile Eisen enthalten sein. In siedendem Wasser ist es leicht, in kaltem Wasser nur langsam, aber vollständig löslich.

Das nach der vorstehenden Vorschrift der Germ bereitete Präparat hat die Zusammensetzung $(C_6H_5O_7 Fe)_2 + 6H_2O$. Die in demselben enthaltenen 6 Mol Krystallwasser entweichen erst bei etwa 150° C. Trotzdem empfiehlt es sich, zur Erzielung eines in Wasser leicht löslichen Präparates beim Eindampfen und Trocknen die Temperatur von 50° C nicht zu überschreiten, weil andernfalls sehr langsam lösliche bzw. wenig lösliche Präparate erhalten werden.

Die wässrige Lösung des Ferricitrates ist gelb gefärbt, sie schmeckt schwach eisenuartig und reagirt schwach sauer. In derselben erfolgt durch Schwefelwasserstoff kein Niederschlag von Schwefeleisen, Ammoniak bewirkt Bildung von löslichem Ferriammoniumcitrat, keine Fällung. Dagegen entsteht durch Aetzkali oder Aetznatron ein Niederschlag von Ferrhydroxyd, durch Natriumkarbonat jedoch erst beim Erhitzen.

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung (1 = 10) giebt mit Kaliumferrocyanid zunächst nur eine blaue Färbung, erst nach dem Ansäuern mit Salzsäure fällt ein blauer Niederschlag aus. — Mit überschüssiger Kalilauge versetzt, fällt ein gelbrother Niederschlag aus. Wird das Filtrat von diesem mit Essigsäure schwach angesäuert, und nach Zusatz von Calciumchlorid zum Sieden erhitzt, so entsteht eine weisse krystallinische Ausscheidung von Calciumcitrat. — 2) Die wässrige Lösung (1 = 10) werde nach Zusatz von etwas Salpetersäure durch Silbernitrat nur opalisirend getrübt (Chlor), mit Kaliumferrocyanidlösung gebe sie höchstens blaugrünliche Färbung (Ferrosalz). Nach Ansäuerung des Eisens durch Kalilauge gebe sie ein Filtrat, welches nach dem Ansäuern durch Essigsäure auch bei längerem Stehen eine krystallinische Ausscheidung nicht bilde (Weinsäure). — 3) Ferricitrat gebe beim Verbrennen einen Rückstand, welcher feuchtes rothes Lackmuspapier nicht bläut (Alkali).

4) **Gehaltsbestimmung.** A. Man löse 0,5 g Ferricitrat in 2 ccm Salzsäure und 15 ccm Wasser, füge 1 g Kaliumjodid hinzu und lasse in verschlossenem Glasstopfengefasse 1 Stunde lang bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen alsdann 17—18 ccm der $\frac{1}{10}$ -Normal Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein, entsprechend einem Gehalte von 19,04—20,16 Proc. metall. Eisen. B. 1 g Ferricitrat hinterlasse beim Veraschen 0,271—0,288 g Ferrioxyd.

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt. **Anwendung.** Das Ferricitrat gehört zu den milden Eisenpräparaten und wird leicht resorbirt. Seine verdünnte Lösung soll

neben der Eisenwirkung dünnflüssig, die concentrirte die Harnabsonderung beschränkend wirken. Man giebt es zu 0,1—0,3—0,5 drei- bis viermal täglich.

Ferri Citras (U-St.) Ferrie Citrate. Der im Nachstehenden noch zu besprechende Liquor Ferri Citratis (U-St.) wird bei nicht über 60° C zum Sirup abgedunstet, dieser auf Glasplatten gestrichen und bei 50—60° C getrocknet. Granatrothe Blättchen von den gleichen Eigenschaften wie das vorige Präparat — 0,5 g verbrauchen bei der jodometrischen Bestimmung (s. vorher) = 14,3 cem $\frac{1}{10}$ -Normal Natriumthiosulfatlösung — 1,0 g des Ferri citratis hinterlasse beim Verbrennen = 0,2286 g Ferrioxyd. Nach beiden Bestimmungen wird ein Gehalt von 13 Proc metallischem Eisen verlangt.

Liquor Ferri Citratis (U-St.) Ferri citratlösung. Man fällt aus 840,0 g Ferrisulfatlösung (143 spec Gew.) nach gehöriger Verdünnung mit Wasser in der auf S. 1092 angegebenen Weise das Ferrihydroxyd durch 880 cem Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc NH_3). Den wohl ausgewaschenen Niederschlag presst man ab, bringt ihn in eine Porzellanschale und erwärmt mit 800,0 g Citronensäure im Wasserbade auf 60° C, bis völlige Auflösung erfolgt ist, bringt das Gesamtgewicht auf 1000 g, lässt absetzen und filtrirt.

Dunkelbraune Flüssigkeit, spec Gewicht = 1,25 bei 15° C. Sie enthalte 7,5 Proc metallisches Eisen. Demnach müssen 2,0 g nach dem Auflösen in 4 cem Salzsäure und nach Zugabe von 20 cem Wasser und 2 g Kaliumjodid (nach einstündigem Stehen) zur Bindung des ausgeschiedenen Jods = 26,8 cem $\frac{1}{10}$ -Normal Natriumthiosulfatlösung erfordern.

II Ferrum citricum ammoniatum (Ergänz. Austr. Helv.) Citrate de fer ammoniacal (Gall.) Ferri et Ammonii Citras (U-St.) Ferri Ammoniumcitrat. Eisenammoniumcitrat. Citronensaures Eisenammonium. Wenn auch die Vorschriften der einzelnen Pharmacopoen in den Mengenverhältnissen der vorgeschriebenen Bestandtheile von einander abweichen, so stimmen sie doch alle im Princip der Darstellung überein. Demnach wird zunächst durch Eingießen einer Ferrisalzlösung (Ferrichlorid, Ferrisulfat) in Ammoniakflüssigkeit unter den S. 1092 angegebenen Bedingungen normales Ferrihydrat gefällt, dieses vollständig ausgewaschen, dann in Citronensäure gelöst und diese Lösung mit Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss versetzt, bei gehdeter Wärme zur Sirupkonsistenz verdunstet, und der Sirup durch Aufstreichen auf Glasplatten und Eintrocknen bei 50° C in Lamellenform gebracht.

Austr. Giebt weder eine Vorschrift, noch schreibt sie einen bestimmten Eisengehalt vor. Man wird das Präparat daher sowohl nach der Vorschrift der Helv. als nach derjenigen des Ergänz. bereiten dürfen.

Ergänz. Man fällt aus 50,0 Th Ferrichloridlösung (spec Gew. 1,28—1,282) in der S. 1092 angegebenen Weise durch Ammoniakflüssigkeit das Ferrihydroxyd, wäscht dieses völlig aus und trägt es noch feucht in eine Auflösung von 18 Th Citronensäure in 70 Th Wasser ein. Nach erfolgter Auflösung, welche durch Erwärmen (nicht über 50° C) unterstützt werden darf, filtrirt man, wäscht das Filter mit Wasser nach, löst im Filtrat 9 Th Citronensäure, fügt Ammoniakflüssigkeit bis zur deutlich alkalischen Reaction hinzu, dunstet im Wasserbade bei nicht über 50° C zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet.

Helv. Man fällt aus 50,0 Th Ferrichloridlösung (spec Gew. 1,28—1,28) durch Ammoniak das Ferrihydroxyd, bringt dieses nach völligem Auswaschen noch feucht (!) in eine Lösung von 17,5 Th Citronensäure in 85 Th Wasser, digerirt bis zur Auflösung, versetzt das Filtrat mit Ammoniakflüssigkeit bis zur alkalischen Reaction, dunstet im Wasserbade zur Honigkonsistenz ein, streicht auf Glasplatten und trocknet.

Gall. Man fällt aus 375,0 Th Ferrichloridlösung (1,280—1,282 spec Gew.) das Ferrihydroxyd, wäscht es völlig aus, löst es noch feucht durch Zugabe von 100,0 Th kryst. Citronensäure, macht die filtrirte Lösung durch Zugabe von etwa 86,0 Th Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc. alkalisch, dunstet sie im Wasserbade bei nicht über 60° C zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei 40—50° C.

Brit. Man fällt aus 288,0 Th Ferrisulfatlösung (1,441 spec Gew.) durch Ammoniak in der S. 1092 angegebenen Weise das Ferrihydroxyd, wäscht dieses völlig aus, löst es in einer konc. Lösung von 80,0 Th kryst. Citronensäure auf, macht mit 103,0 Th Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc.) alkalisch, filtrirt, wenn nöthig, die Lösung, dunstet sie unter gelegentlicher Zugabe von etwas Ammoniakflüssigkeit zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei nicht über 38° C.

U-St. Man mischt 100 cem Liquor Ferri Citratis U-St. (s. S. 1107) mit 40 cem Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc., dunstet bei nicht über 60° C zum Sirup, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet.

Eigenschaften. Dünne, durchscheinende, etwas hygroscopische Blättchen von hellrothbrauner Farbe und salzigem, hintenach schwach eisenartigem Geschmacke, welche

beim Erhitzen unter Entwicklung von Ammoniak verkohlen und als Verbrennungsrückstand Ferroxyd hinterlassen

Sie lösen sich leicht in kaltem Wasser, kaum in Alkohol und in Aether. Die wässrige Lösung röthet blaues Lackmuspapier schwach. Sie wird durch Ammoniakflüssigkeit nicht gefällt, aber dunkler gefärbt. Auf Zusatz von Kali- oder Natronlauge entsteht ein rostfarbener Niederschlag, beim Erwärmen tritt deutlich Ammoniakentwicklung auf.

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung (1 = 10) werde nach Zusatz von Salpetersäure durch Silbernitratlösung nur schwach opalisirend getrübt. (Spuren von Chlor sind zuzulassen). 2) Mit Kaliumferricyanidlösung gebe sie höchstens eine blaugrüne Färbung. 3) Wird 1 g des Präparates verascht, so soll das zurückbleibende Ferroxyd angefeuchtetes rothes Lackmuspapier nur ganz schwach blauen.

4) Bestimmung des Eisengehaltes. Diese kann jodometrisch oder durch Bestimmung des beim Verbrennen hinterbleibenden Ferroxyds erfolgen. Bei der jodometrischen Bestimmung wende man 0,5 g des Präparates an und verfähre genau wie auf S. 1108 angegeben ist.

Es verlangen

	Austr.	Brit.	Gall.	Ergänzb.	Helv.	U. St.
Gehalt an Fe in Proc.	—	21,7—22,4	—	18,0—14,0	—	16,0
1 g hinterlasse Fe_2O_3	—	0,31—0,32 g	—	0,181—0,20 g	—	0,228 g
0,5 g erfordern com.						
$\frac{1}{10}$ N-Natriumthiosulfat	—	19,4—20,0	—	12,0—13,0	—	14,3

5) Nach dem Ausfällen des Ferrhydroxyds durch Kalilauge darf das Filtrat beim Uebersättigen mit Essigsäure auch nach längerem Stehen keine krystallinische Ausscheidung geben (Weinsäure). Wird das essigsäure Filtrat mit Calciumchlorid versetzt und zum Sieden erhitzt, so muss eine körnige Ausscheidung von Calciumcitrat auftreten.

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt, in kleineren, gut verschlossenen Gefässen, letzteres mit Rücksicht auf die hygroskopischen Eigenschaften des Präparates.

Anwendung. Als mildes Eisenmittel wie das Ferrum citricum. Man giebt es zu 0,2—0,5—1,0 g drei- bis vier Mal täglich.

Ferrum citricum cum Magnesio citrico ist eine Mischung aus gleichen Theilen Ferrum citricum und Magnesium citricum.

Aqua Acidi carbonici cum Ferro citrico.

I.

Rp	1 Ferri citrici	20
	2 Acidi citrici	4,5
	5 Aquae frigidae	600—700
	4 Natrii bicarbonici	35

Man löst 1—3 in einer Mineralwasserflasche auf, fügt 4 in Stücken hinzu und verschleibt sofort mit einem Kork, der zu verdrahtet ist.

II.

Rp	Ferri citrici	0,2
	Aquae destillatae	20,0
	Aquae Acido carbonico saturatae	980,0

Cerevisia Ferrata

Rp	Ferri citrici	1,0
	Cerevisiae tascas	500,0

Drei- bis viermal täglich ein Weinglas voll

Ferrum citricum effervesces

Gekörntes Eisenbrausepulver (Ergänzb. Hamb. V.)

Rp	Ferri pyrophosphorici cum	
	Natrii pyrophosphorico	20,0
	Acidi citrici	35,0
	Natrii bicarbonici	45,0
	Sacchari	100,0

werden als mittelfeine Pulver gemischt, mit Weingeist in eine klümelige Masse gebracht, diese durch ein Sieb aus verzinntem Eisendraht von 2 mm Maschenweite gerieben und bei nicht über 40°C getrocknet. Weiße Körner, vor Luft geschützt aufzubewahren.

Ferrum citricum effervesces flavum

Rp	1 Ferri citrici ammoniaci	50,0
	2 Aquae destillatae	20,0
	3 Acidi citrici	50,0
	4 Spiritus (95 Proc.)	80,0
	5 Natrii bicarbonici	250,0
	6 Acidi citrici	200,0
	7 Sacchari	500,0
	8 Spiritus (95 Proc.)	60,0

Man löst 1 und 3 in 2, und fügt 4 hinzu. Anderseits mischt man die scharfgetrockneten 5—7, befeuchtet mit 8, arbeitet die dickere Lösung von 1—4 gleichmäßig darunter und granuliert durch ein verzinntes Eisensieb (siehe vorher).

Mixtura Ferri et Chinini effervesces.

(Consumption Hospital London)

Rp	Ferri citrici ammoniaci	0,8
	Chinini sulfurici	0,08
	Acidi citrici	0,6
	Aquae destillatae	30,0

Mit 0,6 g Natriumbicarbonat zu nehmen

Pilulae Ferri citrici (Form. Barol.)

Rp	Ferri citrici oxydati	5,0
	Radicle Gentianae	1,0
	Extracti Gentianae	3,0

Fiant pilulae 60

Sirup de citrate de fer ammoniacal (Gall.)

Rp	Ferri citrici ammoniaci	
	Aquae destillatae	88 20,0
	Sirupi Sacchari (1,32 sp. G.)	950,0

Sirupus Ferri citrici		Vinum Ferri Citratis (U St.)	
Rp	Ferri citrici	Rp	Ferri citrici ammoniati 40,0 g
	Aquae destillatae aa 25,0		Tincturae Auranti dulcis
	Sirupi Sacchari (sp G 1,32) 950,0		(Apfelsinentinktur) 100,0 ccm
			Sirupi Sacchari 100,0 ccm
			Vini albi q s ad 1 Liter
Tablettes de citrate de fer ammoniacal (Gall)		Vinum martiatum Fuller	
Rp	Ferri citrici ammoniati 50 0	Vinum Ferri aromaticum Fuller's	
	Sacchari 1000 0	Stahlwein.	
	Sacchari Vanillae 30,0	Rp	Ferri citrici 50
	Mucilagois Tragacanthae 100,0		Vini albi 450 0
Fiant tablettae à 10 g			Tincturae aromaticae 15,0
Vin chalybe (Gall)		Vinum Ferri Citratis (Brit.)	
Rp	Ferri citrici ammoniati 5,0	Rp Ferri citrici ammoniati (Ergänzb) 27 5	
	Vin de Grenache 1000,0	Vini Auranti q s ad 1 Liter	
Vinum ferratum (Ergänzb)			
Stahlwein.			
Rp	Ferri citrici ammoniati 5,0		
	Vini Xerensis 100,0		

Sirup adstringent de Chable ist eine Auflösung von 10,0 Ferrum citricum ammoniatum in 800,0 Sirupus Sacchari.

Ferrum cyanatum.

I Ferrum cyanatum Ferrum Borussiaeum Ferrum zooticum Ferrocyanure ferrique (Gall) Ferroferrieyanid. Eiseneyanurecyanid (Berliner Blau). Blausaures Eisen. $3(\text{FeCN})_2 + 4 \text{Fe}(\text{CN})_2 + x\text{H}_2\text{O}$

Darstellung Man giesst unter Umrühren eine Lösung von 10 Th Kaliumferrocyanid (gelbes Blutlaugensalz) in 100 Th Wasser in eine Mischung aus 20 Th Ferri-chloridlösung (spez Gew 1,280—1,282) mit 200 Th Wasser ein. Der entstandene blaue Niederschlag wird zunächst wiederholt durch Dekanthiren mit salzsaurehaltigem warmen Wasser, schliesslich auf dem Filter mit Wasser gewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt und durch Silbernitrat kaum noch getrübt wird. Nach dem Abtropfen wird der noch feuchte (!) Niederschlag (weil das Papier an denselben sehr leicht antrocknet) vom Filter abgelöst und auf Porcellantellern in massiger Wärme getrocknet. Zur therapeutischen Anwendung eignet sich nur das so dargestellte Präparat, nicht aber die blauen Farbstoffe des Handels.

Eigenschaften. Ein tiefblaues, amorphes, geruch- und geschmackloses Pulver, unlöslich in Wasser, Weingeist und verdünnten Säuren. Beim Erwärmen mit Kalilauge wird es unter Rückbildung von Kaliumferrocyanid und Abscheidung von Ferrihydroxyd zerlegt, wobei natürlich die blaue Farbe verschwindet. Ähnlich wird es durch Kochen mit Quecksilberoxyd unter Bildung von Mercurcyanid und Ferroferrihydroxyd zerlegt. In konz. Schwefelsäure löst es sich ohne Entwicklung von Blausäure zu einer farblosen kleisterartigen Masse, aus der durch Verdünnen mit Wasser wieder Berlinerblau ausfällt. Ebenso löst es sich in konz. Salzsäure und fällt aus dieser Lösung beim freiwilligen Verdunsten (krystallinisch) oder beim Verdünnen mit Wasser (amorph) wieder aus. Beim Erhitzen an der Luft wird es zersetzt, es entweichen zunächst Dämpfe, welche nach Ammoniak und nach Blausäure riechen, schliesslich hinterbleibt Ferrioxyd, welches gewöhnlich etwas kalihaltig ist. Das lufttrockne Präparat enthält in der Regel circa 20 Proc Wasser, welches unter theilweiser Zersetzung erst gegen 250° C vollständig entweicht.

Prüfung Nach dem Glühen und vollständigen Verbrennen des Kohlenstoffs muss die Asche, mit Salzsäure erwärmt, eine klare gelbe Lösung geben (Ungelöstes Schwespath, Kieselerde). Nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure und Kochen theilt man die Lösung in zwei Theile. Den einen Theil fällt man mit einem Ueberschuss Ammoniakflüssigkeit, den anderen mit Aetznatron oder Aetzkali und filtrirt. Das ammoniakalische Filtrat darf nicht blau sein (Kupfer) und durch Ammoniumcarbonat nicht getrübt werden (Erden), das kalische Filtrat dagegen weder durch Schwefelwasserstoff, noch nach der

Neutralisation mit Salzsäure durch Ammoniakflüssigkeit eine Veränderung erleiden (Blei, Zink, Thonerde)

Aufbeuahrung In geschlossenem Glas oder Porcellengefäss

Anwendung Das Ferroferrocyanid wird gelegentlich als Febrifugum und Antiepilepticum angewendet und zu 0,2—0,4—0,6 drei- bis viermal täglich in Pulvern oder Pillen gegeben. Eine Wirkung dieser Verbindung ist wegen ihrer Unlöslichkeit zweifelhaft. Im pharmaceutischen Laboratorium wird es zur Darstellung des Mercurcyanids gebraucht.

II Ferrum cyanatum solubile Kalium-Ferrocyan Eisen Kaliumferroferrocyanid Lösliches Berlinerblau. Diese Verbindung entsteht, wenn man eine Ferrichloridlösung mit einem grossen Ueberschuss (!) von Kaliumferrocyanid fällt: $2[Fe(CN)_6 KFe] + xH_2O$.

Zur Darstellung trägt man eine Mischung von 8 Th. Ferrichloridlösung mit 100 Th. Wasser in eine Lösung von 10 Th. Kaliumferrocyanid (gelbem Blutlaugensalz) in 100 Th. Wasser ein. — Um das technische Produkt zu gewinnen, giesst man die Flüssigkeit nach dem Absetzen auf ein Filter, bringt auch den Niederschlag später darauf und wäscht ihn so lange mit Wasser aus, bis das Filtrat blau durchzulaufen beginnt. Sobald dies der Fall ist, lost man den Niederschlag in Wasser, um diese Lösung als blaue Tinte zu verwenden, oder man trocknet ihn nach dem Abtropfen bei 25—30° C auf Porcellantellern. Will man die Verbindung rein haben, so wäscht man den Niederschlag zunächst mit verdünntem Weingeist, dann löse man ihn in Wasser und fälle ihn aus dieser Lösung wieder durch Zusatz von Alkohol. Im trocknen Zustande ein violettblaues Pulver, welches in Wasser mit blauer Farbe löslich ist, seine Löslichkeit aber durch Trocknen bei 100—110° C verliert.

Coerulamentum. 1) Eine wässrige Lösung des vorstehend beschriebenen löslichen Berliner Blaus. 2) 10 Th. reines Berlinerblau (welches mit verdünnter Salzsäure ausgezogen und völlig ausgewaschen worden ist, s. oben) werden mit einer Lösung von 2,5 Th. Oxalsäure in 10 Th. destillirtem Wasser angerieben und nach Zusatz von 60 Th. Gummi schleim mit destillirtem Wasser auf 500 Th. gebracht.

III. Technische Berlinerblau-Sorten Diese werden meist dargestellt, indem man Ferrosulfatlösung mit Ferrocyanalkaliumlösung fällt und das entstandene wenig gefärbte Produkt der Oxydation durch die Luft überlässt, wodurch es lichtblau wird. Die Sorten werden als Farbstoffe verbraucht und zu diesem Zwecke häufig mit Thonerde, Gips, Kreide, Schwerspath vermischt. Als die reinsten Sorten gelten Pariser Blau und Berliner Blau, als die unreinsten das Mineralblau, Hamburger Blau, Erlanger Blau, Diesbacher Blau, Williamson's Blau sind sämmtlich technische Sorten von Berliner Blau.

TURNBULL's Blau entsteht durch Fällung von Ferrosalzen mit Kaliumferrocyanid. Es ist dem Berliner Blau sehr ähnlich, aber theurer als dieses, hat auch vor demselben keinen Vorzug.

Bleu Suisse ist eine eingetrocknete Lösung von Pariserblau in concentrirter Oxalsäurelösung.

Pilulae antineuralgicæ JOLLY

Rp	Ferri cyanati	2,0
	Chinini sulfurici	15
	Extracti Opil	0,1
	Conservae Rosae	q. s.

Frant pilulae 25

Stündlich 1—2 Pillen.

Pulveres febrifugi STROCH

Rp	Ferri cyanati	1,2
	Chinini sulfurici	1,8
	Rhizomata Bhei	3,0
	Blasosacchari Calami	6,0

Fiat pulvis Divide in partes aequales X

3—4 mal täglich ein Pulver (bei hartnäckigen Wechselnfebern)

Bestimmung des Cyans in Gasreinigungsmasse 4,0 g der feingepulverten Substanz werden in einem glatten Porcellanmörser mit 8,0 g chlorfreiem, gefälltem Quecksilberoxyd gemischt und mit Wasser fein gerieben. Man spült den feinen Brei mittels weithalsigen Trichters in einen 100 ccm Kolben und spült soviel Wasser nach, dass der Kolben halb gefüllt ist. Dann kocht man in schräger Lage des Kölbchens 10—15 Minuten lang. Wenn die Farbe der Mischung von Grün in Gelbbraun übergegangen ist, so lässt man erkalten, füllt bis zur Marke auf und fügt noch 2,5 ccm Wasser zu, um das Volumen des Bodensatzes auszugleichen. Man mischt durch Umschütteln und filtrirt alsdann durch ein glattes trocknes Filter von 7 cm Durchmesser in ein trocknes Kölbchen. Man bringt

nun 50 cem des Filtrates (= 2 g Masse) in einen 300 cem Kolben, giebt eine konc Lösung von 3–4 g kryst chlorfreiem Zinksulfat in Ammoniakflüssigkeit und freie Ammoniakflüssigkeit dazu, dass die Lösung völlig klar ist. Hierauf versetzt man nach und nach unter jedesmaligem Umschütteln mit kleinen Portionen frischbereiteten, gesättigten Schwefelwasserstoffwassers, bis in der über dem schwarzen Niederschlage stehenden Flüssigkeit eine rein weisse Zinkfällung erfolgt (Man überzeugt sich von der Beendigung dieser Reaktion dadurch, dass man absetzen lässt, mittels Pipette einige cem der klaren Lösung entnimmt und Schwefelwasserstoffwasser zugebt. Es muss nun eine rein weisse Zinkfällung entstehen. Die entnommene Probe fügt man zu der Gesamtmflüssigkeit wieder zu, spült Reagensglas sowie Pipette nach und giebt auch diese Waschwasser dazu.) Wenn dies der Fall ist, füllt man mit Wasser bis zur Marke auf, mischt und filtrirt durch ein trocknes Faltenfilter in ein trocknes Kölbchen. Von dem Filtrat pipettirt man 150 cem (= 1 g Masse) in ein Becherglas, fügt Silbernitratlösung im Ueberschuss hinzu und säuert mit Salpetersäure an. Das ausgeschiedene Silbercyanid wird gesammelt, gewaschen, getrocknet und im Porcellantiegel bei langsam gesteigerter Hitze $\frac{1}{4}$ Stunde gegluht. Das hinterbleibende metallische Silber wird gewogen. $\text{Ag} \times 0,24074 = \text{CN}$ $\text{Ag} \times 0,44243 = \text{Fe}_2(\text{CN})_{12}$ $\text{CN} \times 1,8375 = \text{Fe}_2(\text{CN})_{12}$

Ferrum iodatum.

I Ferrum iodatum anhydricum Wasserfreies Ferrojodid. FeJ_2 . Mol. Gew. = 310

Zur Darstellung der wasserfreien Verbindung erhitzt man Eisenfeile in einem bedeckten Porcellantiegel zum Gluhen, setzt dann Jod in kleinen Mengen allmählich hinzu und sowie die Masse rothglühend ist, wirft man grössere Mengen von Jod hinein, setzt das Erhitzen fort, bis sich nur wenig Joddampf mehr zeigt, und lässt dann den gut bedeckten Tiegel erkalten. Sobald die Temperatur sich etwas erniedrigt, entwickeln sich plötzlich reichliche Joddämpfe, woraus zu schliessen ist, dass die glühend flüssige Masse Ferrojodid enthält, das sich beim Erkalten zersetzt. Der Tiegeleinhalt erstarrt zu einer grauen, blätterig-krystallinischen Masse von Ferrojodid FeJ_2 , welches bei 177°C schmilzt.

Ferrum iodatum crystallisatum. $\text{FeJ}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 382. Diese Verbindung krystallisirt in grünlichen Krystallen, wenn man eine wässrige Lösung des Ferrojodids durch Eindampfen bis zum Salzhauteichen concentrirt.

Beide Salze sind nur wenig haltbar und finden aus diesem Grunde allgemeine therapeutische Anwendung nicht.

II Liquor Ferri iodati (Germ.) Ferrum iodatum (Helv.) Eisenjodidlösung

Man beachte, dass die Helv. unter „Ferrum iodatum“ eine Lösung des Eisenjodurs versteht. Diejenige der Germ. enthält 50 Proc., die der Helv. 25 Proc. FeJ_2 .

Germ. In ein Glaskölbchen von ca. 200 cem Fassungsraum bringt man 50 Th. Wasser, sowie 41 Th. Jod und fügt nun in kleinen Antheilen unter häufigem Umschütteln soviel (15 Th.) Eisenpulver hinzu, bis die zunächst braunliche Flüssigkeit grünlich geworden ist. Sollte die Reaktion zu heftig werden, so kann man sie durch Abkühlen des Gefässes in Wasser massigen. Die filtrirte Lösung enthält 50 Proc. Ferrojodid FeJ_2 . Eisenjodurlösung ist bei Bedarf frisch zu bereiten. Wird Eisenjodur verschrieben, so sind für je 1 Th. Eisenjodur = 2 Th. frisch bereitete Eisenjodurlösung zu rechnen und nöthigenfalls in einer eisernen Schale rasch einzudampfen.

Für Pillenmassen stellt man 5 Th. Ferrojodid dadurch her, dass man in eisernen Mörser 4 Th. Jod mit 8 Th. Wasser verreibt, 1 Th. Eisenpulver zugeibt und nachdem die Flüssigkeit grünlich geworden ist, unter Zufügung der übrigen Ingredienzen die Pillenmasse bereitet, ohne den kleinen Ueberschuss des metallischen Eisens vorher zu beseitigen.

Helv. Lässt zu einer Mischung von 15 Th. Eisenpulver und 100 Th. Wasser allmählich 41 Th. Jod zufügen, nach beendigter Reaktion die grünliche Flüssigkeit filtriren und durch Nachwaschen des Filters mit destillirtem Wasser auf 200 Th. bringen. Diese Lösung enthält 25 Proc. Ferrojodid FeJ_2 .

Man beachte also Im Geltungsbereiche des deutschen Arzneibuchs bedeutet Ferrum iodatum die wasserfreie Verbindung FeJ_2 , im Geltungsbereiche der Pharmacopoea Helvetica dagegen die 25procentige wässrige Lösung der Verbindung FeJ_2 .

Aufbewahrung Für den Fall, dass Ferrojodid häufig in der Rezeptur vorkame, kann man es wohl für eine Woche in Lösung vorrathig halten, wenn man es in gut verstopfter Flasche über Eisenpulver und an sonnigem Orte aufbewahrt. Das zu dispensierende Quantum wird jedesmal nach dem Umschütteln abfiltrirt. Die Mischung wird für diesen Fall aus 8,0 Jod, 6,0 Eisenpulver und 40,0 destillirtem Wasser bereitet und die Signatur mit *sumatur quintuplum* vervollständigt, denn fünf Theile der filtrirten Lösung enthalten 1 Th. Ferrojodid, FeJ_2 .

Anwendung Man giebt das Eisenjodür in allen den Fällen, wo man die Wirkung des Jods mit derjenigen des Eisens kombiniren will, zu 0,1—0,15—0,3 drei- bis viermal täglich. Die stärkste Einzeldosis ist zu 0,5, die stärkste Gesamtdosis auf den Tag zu 3,0 anzunehmen. Ausserlich findet es Anwendung in Baden (30,0—50,0 auf ein Vollbad), zu Injektionen (1,0 auf 80,0—100,0 Wasser), in Salben (1,0 auf 50,0 Fett).

Liquor Ferri Jodidi (Nat. form.) Man bereitet eine Ferrojodidlösung aus 200 g Eisenpulver, 664 g Jod und 750 ccm Wasser, filtrirt in eine, 25 ccm Unterphosphorige Säure von 10 Proc. H_3PO_2 enthaltende Flasche, wäscht mit 85 ccm heissem Wasser nach und füllt auf 1 Liter auf. 100 ccm dieser Lösung enthalten 81 g Ferrojodid FeJ_2 .

III Ferrum iodatum saccharatum (Erganzb.) Ferri Jodidum saccharatum. (U St.) Zuckerhaltiges Eisenjodür. Die Vorschriften des Ergänzb. und der U-St. führen zu identischen Präparaten.

Darstellung Man bereitet zunächst in der oben angegebenen Weise aus 3 Th. Eisen, 10 Th. Wasser und 8 Th. Jod eine Lösung von Eisenjodür. Man filtrirt diese Lösung durch ein kleines Filter in eine Porcellanschale, welche 40 Th. mittelfein gepulverten und getrockneten Milhzucker enthält, wäscht das Filter mit heissem Wasser nach und dampft die Masse im Wasserbade unter beständigem Umrühren zur Extraktdicke ab. Man zieht alsdann die Masse in Fäden, trocknet diese thunlichst rasch im Trockenschranke aus und verwandelt sie durch Zerreiben in ein mittelfeines Pulver, das sogleich in gut zu verschliessende, kleine Gläschen untergebracht wird.

Eigenschaften Ein gelbliches Pulver ohne Geruch, von süslichem und zugleich eisenartigem Geschmack. In 7 Th. Wasser klar löslich. 100 Th. enthalten etwa 20 Th. Ferrojodid FeJ_2 . — Wird die wässrige Lösung (1 = 10) mit einem Tropfen Ferrichloridlösung versetzt und alsdann Starkelösung zugegeben, so tritt Blaufärbung ein. — Wird die wässrige Lösung mit Kaliumferrocyanidlösung versetzt, so färbt sie sich nur hellblau.

Jodbestimmung Löst man 2,0 g zuckerhaltiges Eisenjodür in etwa 30 ccm Wasser, fügt zu dieser Lösung zunächst 30 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Silbernitratlösung, alsdann 2 ccm Salpetersäure (von 25 Proc. HNO_3) und 2 ccm Ferriammoniumsulfatlösung, so sollen nicht mehr als 4,5 ccm (theoretisch 4,2 ccm) zum Auftreten einer rothen Färbung erforderlich sein, entsprechend einem Gehalt von 20 Proc. FeJ_2 . Zur Vervollständigung dieser Prüfung löst man etwa 0,5 g des zuckerhaltigen Eisenjodürs in 50 ccm Wasser und fällt nach dem Ansäuern durch Salpetersäure durch Silbernitrat im Ueberschuss. Wird der ausgeschiedene Silberniederschlag auf einem Filter gesammelt und nach dem Auswaschen durch Wasser mit Ammoniakflüssigkeit ausgezogen, so soll das klare ammoniakalische Filtrat beim Ansäuern durch Salpetersäure nur opalisirend getrübt werden (Eisenchlorür).

Aufbewahrung Ein gut ausgetrockneter Ferrojodidzucker hält sich in wohl verkorkten kleinen Flaschen über Jahr und Tag. Mangelhaft ausgetrocknet, oder nachdem er etwas Feuchtigkeit aus der Luft angezogen hat, wird er dunkler in der Farbe, zuletzt braun und riecht nach Jod. Ein solches verdorbenes Präparat lässt sich auf keine Weise wieder brauchbar machen und muss weggeworfen werden. Selbst die Einwirkung des Sonnenlichtes ist ohne jeden Erfolg.

Anwendung. Das zuckerhaltige Eisenjodür vereinigt in sich die stärkende, blutverbessernde Wirkung des Eisens und die umstimmende Wirkung des Jods. Man giebt es zu 0,5—1,0—2,0 g drei- bis viermal täglich bei skrofulösen Leiden und sekundärer Syphilis mit anämischer Blutmischung, gegen Kropf, bei Lungentuberkulose, Lungenphthisis, Milzhypertrophie, Lähmungen des Rückenmarks, Morbus Brightii. Als grösste Einzelgabe sind 2,5, als grösste Gesamtdosis auf den Tag 15,0 anzunehmen.

Ferrum jodatum lamellatum Ferrojodid in Lamellen, ein Präparat mit 10 Proc Ferrojodid. Die Ferrojodidlösung aus 6 Th Eisenpulver, 20 Th Wasser und 16 Th Jod wird mit einer pulverigen Mischung von 10 Th Milchzucker, 4 Th weissem Zucker und 165 Th arabischem Gummi vermischt und die sirupdicke Masse auf Porcellan- oder Glasflächen ausgestrichen an einem lauwarmen Orte ausgetrocknet, bis sich das Präparat leicht von seiner Unterlage sondern lässt. Die Aufbewahrung ist dieselbe wie vom Ferrojodidsaccharat, die Gabe doppelt so gross.

IV Sirupus Ferri jodati (Aust. Germ. Helv.) Sirop de jodure de fer (Gall.)

Sirupus Ferri Iodidi (Brit. U. St.) Die Vorschriften zur Darstellung und der Gehalt an Ferrojodid sind in den einzelnen Pharmacopoen sehr verschieden.

Aust. Man bereite aus 4 Th Eisenpulver, 87 Th destillirtem Wasser und 10 Th Jod eine wässrige Lösung von Ferrojodid, filtrire sie durch ein genastetes Filter (ohne nachzuwaschen) auf 141 Th Zuckerpulver und bereite im bedeckten Gefässe durch Schütteln und Erwärmen einen Sirup. Dieser enthält ungefähr 5 Proc Ferrojodid FeJ_2 .

Brit. Man bereitet aus 825 g Zucker und 300 g siedendem Wasser einen Sirup. Von diesem Sirup verdünnt man 25 ccm mit 25 ccm Wasser und stellt die Mischung zur Seite. Dann bereitet man eine Lösung von Ferrojodid aus 25 g Eisenpulver, 83 g Jod und 125 g Wasser, diese filtrirt man in die Hauptmenge des Sirups, dann wäscht man zunächst mit der vorher zur Seite gestellten und zum Sieden erhitzten Sirupmischung, schliesslich mit soviel siedendem Wasser nach, dass 1 Liter Sirup erhalten wird. Der Sirup enthält 7,3 Proc Ferrojodid, oder 1 Liter enthält rund 100 g FeJ_2 .

Gall. Man bereitet eine Ferrojodidlösung aus 4,1 g Jod, 2,0 g Eisenpulver und 10,0 g destillirtem Wasser. Diese filtrirt man in eine Mischung von 785,0 g Sirupus Gummi arabici und 200,0 g Sirupus Aurantii florum und wäscht mit wenig Wasser nach. Der Sirup enthält etwa 0,5 Proc Ferrojodid FeJ_2 .

Germ. Man bereitet eine Ferrojodidlösung aus 50 g Wasser, 41 g Jod und 15 g Eisenpulver, filtrirt durch ein kleines Filter in 850 g Zuckersirup und bringe das Gesamtgewicht durch Auswaschen des Filters auf 1000 g. Der Sirup enthält 5 Proc Ferrojodid FeJ_2 .

Helv. Man mischt 40 Th Eisenjodur (d. i. Liquor Ferri jodati, 25 Proc FeJ_2 , enthaltend s. S. 1111) mit 0,2 Th Citronensäure und 960 Th Zuckersirup. Der Sirup enthält 1 Proc Ferrojodid FeJ_2 .

U. St. Man bereitet eine Ferrojodidlösung aus 25 g Eisenpulver, 83 g Jod und 150 g Wasser. Diese filtrirt man in ein Gefäss, welches 600 g Zuckersirup enthält, wäscht das Filter mit einer siedenden Mischung aus je 25 ccm Zuckersirup und destillirtem Wasser nach und füllt darauf mit Zuckersirup bis 1000 g auf. Der Sirup enthält etwa 10 Proc Ferrojodid FeJ_2 .

Eigenschaften. Jodeisensirup ist frisch bereitet fast farblos oder etwas gelblich. Bei unzuverlässiger Aufbewahrung färbt er sich gelegentlich infolge Ausscheidung von Jod braunlich.

Aufbewahrung. Man bewahre den Jodeisensirup in möglichst gefüllten Flaschen aus weissem Glase von 50–60 ccm Fassungsraum auf und hänge die Gefässe so auf, dass sie möglichst reichlich vom Sonnenlicht getroffen werden. Das Sonnenlicht allein verhindert, — vorausgesetzt, dass der Sirup heiss in die Gefässe gefüllt wurde, und dass diese möglichst vollgefüllt sind — in durchaus befriedigender Weise die Ausscheidung von Jod. Die Vorschläge, dem Sirup (wie Helv. vorschreibt), um ihn haltbarer zu machen, einen Zusatz von Citronensäure zu geben oder einen blanken eisernen Nagel in das Vorrathsgefäss zu bringen, sind als überflüssig zu bezeichnen.

Anwendung. Die Gabe vom Sirupus Ferri jodati der Germ. ist ungefähr 1,5–2,0–5,0. Als eine sehr starke Gabe für Kinder bis 10 Jahren können 3,0, für erwachsene Personen 7,5 g (2 Theelöffel), als die stärkste Gesamtdosis auf den Tag 30,0 angesehen werden. Sollte der Arzt diese Dosis überschreiten, so mache man ihn darauf aufmerksam. Dies ist in Elsass-Lothringen und überhaupt an der französisch-schweizerischen Grenze wohl zu beachten, weil der Sirup der Gall. nur 0,5, derjenige der Helv. 1 Proc Ferrojodid enthält.

Aqua Acidi carbonici cum Ferro jodato

Rp	1 Kalk jodati	0,60
	2 Natrii chlorati	1,0
	8 Aquae destillatae	10,0
	4 Aquae Acidi carbonici	600,0
	5 Ferri sulfatici crystall.	0,05

Man löst 5 in 4, giebt die Lösung von 1–3 hinzu und verschliesst die Flasche sofort.

Injunctio jodoferrata Ricord

Rp	1 Ferri pulverati	0,3
	2 Jodi	0,4
	8 Aquae destillatae	30,0
	4 Aquae destillatae q. s.	ad 300,0

Man bereite aus 1–3 eine Ferrojodidlösung und fülle das Filtrat auf 30,0 auf. Zu 3–4 Injectionen bei Blennorrhoe ohne Schmerzen.

Liquor Ferri Jodidi (Nat form)
 Rp 1 Ferri pulverati 200,0 g
 2 Jodi 654,0 g
 3 Acidi hypophosphorosi diluti (10 Proc) 25,0 cem
 4 Aquae q s (750,0) ad 1 Liter
 Man bereitet aus 1, 2 und 4 eine Ferrojodidlösung, fügt 3 hinzu und füllt zu 1 Liter auf 100 cem enthalten etwa 81,0 g FeJ₃.

Mixtura Ferri Jodati GPFEN
 Rp Kali jodati 8,0
 Aquae destillatae 50,0
 Ferri sulfurici 5,0
 Tincturae Cardamomi
 Syrupi Sacchari aa 25,0
 Täglich dreimal 1 Theelöffel bei Amenorrhoe mit Cephalalgie und Schmerzen in der Regio pelvis

Oleum Ferro Jodatum
 Rp Ferri pulverati 1,0
 Olei Olivae 100,0
 Jodi 0,3
 Man lässt unter häufigem Umschütteln 24 Stunden an einem warmen Orte stehen und filtrirt.

Oleum Jecoris Aselli cum Ferro Jodatum
 Wie Oleum ferro jodatum mit Leberthran zu bereiten

Pilulae antiscarcinomaticeae BORVER
 Rp Saponis medicati 5,0
 Gummi Ammoniaci 4,0
 Ferri jodati 3,0
 Ferri bromati 1,0
 Extracti Conii
 Extracti Aconiti aa 3,0

Fiant pilulae 120
 Täglich drei- bis viermal eine Pille zu nehmen (mindestens sechs Monate hindurch) Zur Darstellung dieser Pillenmasse wären in einem Porcellanmörser 0,9 Eisenpulver und circa 3,0 Wasser, dann 1,64 Jod und 0,68 Brom zu geben, umzurühren, hierauf zunächst mit dem Gemisch aus Ammoniakgummi und der Seife, zuletzt mit den Extrakten zu versetzen und die Masse mit Tragantpulver zu verdicken. Dass Eisenseife und Natriumjodid und Natriumbromid entstehen, ist ersichtlich.

Pilulae Ferri jodati BLANGARD.
BLANGARD'sche Eisenpillen
 I Gall
 Rp 1. Jodi 4,1
 2 Ferri pulverati 2,0
 3 Aquae 8,0
 4. Mellus 5,0

Man bereitet eine Ferrojodidlösung aus 1—3 filtrirt setzt 4 zu und dampft bis auf 10,0 ein. Dann stösst man mit gleichen Theilen Radix Althaeae und Radix Liquiritiae zur Masse an und formt 100 Pillen, welche man in Eisenpulver rollt und mit einem Tolu balsam enthaltenden Mastixlack schwach lackirt. Jede Pille enthält 0,06 g Ferrojodid.

II Helv
 Rp 1 Ferri pulverati 2,0
 2 Aquae 2,0
 3 Jodi 4,0
 4. Tragacanthae 0,6
 5 Gummi arabici
 6 Sacchari Lactis
 7 Amyli Trichter aa 6,0

Man lässt 1—3 im Eisenmörser auf einander einwirken, stösst mit 4—7 zur Masse an und formt 100 Pillen, welche sogleich in Milchsucker zu rollen sind. Jede Pille enthält 0,06 g Ferrojodid.

III U St.
 Rp Ferri reduci 4,0
 Jodi 5,0
 Radix Liquiritiae
 Sacchari pulv aa 4,0
 Extracti Liquiritiae
 Gummi arabici aa 1,0

Man forme 100 Pillen, die mit einer ätherischen Tolu balsamlösung zu lackiren sind.

Syrupus Ferri Citro Jodidi (Nat form)
Tasteless Syrup de Jodide of Iron.

Rp Ferri limati 28,5 g
 Jodi 50,0 g
 Kali citrici 89,0 g
 Sacchari 650,0 g
 Aquae q s ad 1 Liter

Syrupus Ferri et Mangani Jodidi (Nat form)

Rp Jodi 81,5 g
 Ferri limati 28,5 g
 Mangani sulfurici 26,5 g
 Kali jodati 31,5 g
 Sacchari 775,0 g
 Aquae q s ad 1 Liter

Syrupus Ferri Jodati LUTAND
LUTAND's Jodeisensyrup

Rp Ferri Kali tartarici 20,0
 Aquae Cinnamomi 60,0
 Kali jodati 20,0
 Syrupi Sacchari 900,0

Tinctura Ferri jodati
 Rp 1 Ferri pulverati 3,0
 2 Jodi 8,2
 3 Aquae 20,0
 4. Spiritus q s ad 100,0

Man bereitet aus 1—3 eine Ferrojodidlösung zu, fügt 4 (ca 70,0) hinzu, filtrirt und bringt durch Nachwaschen mit Spiritus auf 100,0.

Trochisci Ferri jodati
 Rp Ferri jodati saccharati 50,0
 Ferri reduci 1,0
 Sacchari pulverati 100,0
 Massae cacaotinae 250,0

Man rührt die Mischung im erwärmten Eisenmörser zum gleichförmigen Brei und formt 400 Trochisken. Jede derselben enthält 0,125 g Ferrum jodatum saccharatum oder 0,025 Ferrojodid FeJ₃.

Ferrum lacticum.

I. Ferrum lacticum (Austr Germ Helv) Lactate ferreux (Gall) Ferri Lactas (U St) Ferrolaktat Eisenlaktat Milchsäures Eisenoxydul Fe(C₂H₃O₂)₂ + 3H₂O. Mol. Gew = 288

Darstellung. Abgerahmte Kuhmilch lässt man an einem warmen Ort gerinnen und sondert durch Koliiren die Molken von dem Kase 500 Th der trüben

Molken, 100 Th Wasser, 25 Th Meliszucker, 25 Th vom Staube durch Abseihen gereinigte Eisenfeile werden mit 10 Th altem speckigen Kuhkase, welcher mit 30—50 Th Wasser zu einer emulsionsähnlichen Flüssigkeit angerieben ist, vermischt und an einen Ort, dessen Temperatur weder unter 20°C herabgeht, noch 35°C übersteigt, gestellt. Eine niedrigere Temperatur begünstigt die Weingeistbildung, eine höhere die Buttersäuregährung, und die Ausbeute wird vermindert. Mit einem Holzstabe rührt man des Tages 4—5 mal um. Die Milchsäuregährung tritt nach Verlauf eines Tages ein, und unter Aufwerfen von Schaumblasen bildet sich Ferrolaktat, welches sich als ein grünlich weisses Pulver am Boden des Gefasses ansammelt. Nach zwei Tagen der Gährung (also am vierten Tage morgens) werden 25 Th Meliszucker zugesetzt und, wie oben bemerkt, rührt man den Tag über 4—5 mal um. Die Zuckerzusätze werden nach Verlauf von je 2 Tagen wiederholt, bis im ganzen 125 bis 180 Th Zucker verbraucht sind. Wenn einige Tage nach dem letzten Zuckerzusatz sich keine Blasen mehr an der Oberfläche der Flüssigkeit ansammeln, ist die Milchsäuregährung beendet. Man griesst nach Zumischung von 200 Th kochend heissem Wasser und 5 Th Zucker die Flüssigkeit sammt Bodensatz in einen eisernen Kessel, kocht über freiem Feuer und unter bisweiligem und sehr massigem Umrühren (das Ansetzen der Salzmasse zu verhüten) nur einige Male auf und griesst die kochendheisse Lösung durch ein leinenes, nicht zu dichtes Kolatorium. Den Rückstand im Kolatorium bringt man in den Topf zurück, in welchem man wiederum circa 250 Th Wasser ins Kochen gebracht hat, kocht auf und kolirt wieder. Sollte der Rückstand auf dem Kolatorium noch bedeutend sein und durch körnige Beschaffenheit einen erheblichen Gehalt an Ferrolaktat zu erkennen geben, so wird er nochmals mit circa 150 Th. Wasser aufgeköcht.

Die Kolaturen sind eine gestittigte Auflösung von Ferrolaktat mit verschiedenen Mengen Ferrolaktat. Ersteres scheidet man ab, wenn man der Kolatur ein Drittel ihres Volumens Weingeist zumischt, sie an einen kalten Ort stellt, alle 2—4 Stunden umrührt, nach Verlauf von 1½ Tagen die dickliche Masse in einen Abtropftrichter bringt, anfangs mit 60procentigem Weingeist, zuletzt mit 90procentigem Weingeist die gefärbte Mutterlauge aus dem Krystallmehle verdrängt, dieses in Kolaturen auspresst und die ganzen Presskuchen trocknet. Es lohnt nicht, aus der hier gewonnenen Mutterlauge noch Ferrolaktat abzuscheiden.

Ausbeute 75—95 Th Ferrolaktat. Es fällt während der Milchsäuregährung die Temperatur sehr ins Gewicht, die günstigste Ausbeute wird bei 30—33° C der Gährungstemperatur erlangt.

Die Mutterlauge wird mit dem Weingeist, den man zum Nachwaschen benutzte, gemischt und einen Tag bei Seite gestellt. Es setzen sich daraus noch 5 bis 6 Th eines grünlich weissen Eisenlaktats ab, welches man nach dem Abgessen der klaren grünlich braunen Flüssigkeit in einem Trichter sammelt, mit etwas Weingeist auswascht, auspresst und trocknet.

Eigenschaften. Ferrolaktat bildet ein weisses, aus nadelförmigen Krystallen bestehendes Pulver mit einem geringen Stich ins Grünliche, oder grünliche oder grünlich-weiisse Krystallkrusten. In reinem Zustande ist es geruchlos, von süsslich-metallisch herbem Geschmack. Das im Handel befindliche Präparat besitzt jedoch in der Regel noch den eigenthümlichen Geruch der Gährungsflüssigkeit in sehr geringem Grade. Es löst sich in etwa 40 Th kaltem oder 12 Th siedendem Wasser. Die wässrige Lösung ist grünlichgelb, reagirt sauer und färbt sich an der Luft durch Aufnahme von Sauerstoff braun. In Weingeist ist Ferrolaktat so gut wie unlöslich. Das trockne Ferrolaktat ist kaum hygroskopisch und oxydirt sich an der Luft nur langsam. Im feuchten Zustande dagegen geht es erheblich leichter in braunes basisches Ferrolaktat über. Aus der letzteren Verbindung bestehen die braunen Beläge an Stopfen und Hals der Standgefässe des Ferrolaktates.

Auf dem Platinblech erhitzt, verkohlt es unter Verbreitung saurer, nach verbrennendem Zucker riechender Dämpfe, schliesslich hinterbleibt rothes Eisenoxyd, welches an

Wasser keine löslichen Antheile abgeben und befeuchtetes rothes Lackmuspapier nicht blauen soll.

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung (1=50) gebe nach dem Ansäuern durch Salzsäure mit Ferrocyankalium einen starken, mit Ferrocyankalium einen nur schwachen, blauen Niederschlag, wodurch Spuren von Ferrisalz zugelassen sind — 2) Dieselbe Lösung werde a) durch Bleiacetat nur schwach getrübt (Schwefelsäure, Citronensäure und Apfelsäure), b) nach dem Ansäuern mit Salzsäure durch Schwefelwasserstoffwasser nur schwach getrübt (Ferrolaktat) aber keinesfalls dunkel gefärbt oder gefällt (Kupfer, Blei), c) nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Baryumnitrat oder Silbernitrat nur opalisirend getrübt (Spuren von Schwefelsäure oder Chlor sind zuzulassen) — 3) Wird Ferrolaktat mit conc. Schwefelsäure vermischt, so darf weder eine Gasentwicklung, noch Braunung (Kohlhydrate), noch der Geruch nach Buttersäure (buttersäure Salze) auftreten — 4) Versetzt man die wässrige Lösung mit Kalilauge bis zur alkalischen Reaction, filtrirt und fügt zum Filtrat Fehling'sche Lösung, so trete in der Kälte weder eine Koagulation (Gummi), noch beim Erwärmen Abscheidung von rothem Kupferoxydul ein (Milchzucker) — 5) Wird 1 g Ferrolaktat mit 10 Tropfen Salpetersäure befeuchtet, alsdann getrocknet und geglüht, so soll es mindestens 0,27 g Ferroxid hinterlassen, welches feuchtes rothes Lackmuspapier nicht blaut und an Wasser nichts Lösliches abgibt. Die Theorie verlangt 0,277 g Ferroxid.

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefässen hält sich das trockene Ferrolaktat ziemlich unverändert. Einwirkung von direktem Sonnenlicht befördert die Haltbarkeit. Man achte darauf, dass Stopfen und Hals von anhaftendem Ferrolaktat freigehalten werden, da die der feuchten Luft ausgesetzten Antheile sich leicht zu (braunem) basischem Ferrolaktat oxydiren.

Anwendung. Als milde wirkendes, den Magen nicht belastigendes, leicht resorbirtbares Eisenpräparat in Gaben von 0,1—0,4 g täglich in Pulvern, Pillen und Pastillen. Lösungen wurden sich schnell verändern.

Elixir Ferri Lactatis (Nat form)		Sirupus Ferri phospholactici	
Rp	Ferri lactici 17,5 g	Rp	Ferri lactici 2,25
	Kali citrici 52,5		Acidi phosphorici (25 Proc) 10 0
	Elixir aromatici q s ad 1 Liter		Sirupi Sacchari 40 0
Ferrum et Manganum lacticum			Diacosacchari Citri 1,0
Rp	Ferri lactici		Sirupi Sacchari q s ad 200,0
	Manganii lactici 33.	Tablettes de lactate de fer (Gall.)	
Pilulae Ferri lactici (Form Berol)		Rp	Ferri lactici 50 0
Rp	Ferri lactici 5,0		Sacchari pulverata 1000,0
	Radici Gentianae 1,0		Sacchari Vanillae (1+9) 30,0
	Extracti Gentianae 3,0.		Mucilaginis Tragacanthae 100,0
Piant pilulae No 60		Piant pastilli à 1,0 g	
Sirupus Ferri lactici		Trochisci Ferri lactici	
Rp	Ferri lactici 2,0	Rp	Ferri lactici 50 0
	Sirupi Sacchari 100,0		Massae Cacao 650,0
			Sacchari 800,0
		Piant trochisci 1000	
Vinum Ferri lactici amarum			
JOBERT de LAMBALLE			
Rp	Ferri lactici 10,0		
	Vini albi 560,0		
	Tincturae Gentianae 30,0		

Dragées au lactate de fer de GÉLIS et CONTRÉ, eine Specialität, mit aromatisirtem Zucker überzogene Pillen, deren jede 0,05 Ferrolactat enthält.

II Ferrum lacticum oxydatum Milchsäures Eisenoxyd. Ferrisublaktat. Ferrihydrat, ist ein Sublaktat und wird hergestellt durch Auflösen des noch feuchten Ferrihydrats, welches man aus 150,0 g der Ferrichloridflüssigkeit von 1,28 spec Gewicht mittels Ammoniakflüssigkeit abgeschieden hat, in 55—60 Th. concentrirter Milchsäure unter enttägiger Maceration. Die nöthigenfalls filtrirte Lösung wird bei gelinder Wärme (40—50° C) bis zur Sirupdicke eingeengt und dann auf Porcellan- und Glasflächen aus-

gestrichen getrocknet. Es bildet lichtbraune durchscheinende Lamellen, welche vor Einflus des Lichtes und der Luft aufzubewahren sind. Sie sind in Wasser und Weingeist leicht löslich und von mildem styptischen Geschmack.

Ferrum malicum.

Ferrum malicum, Eisenmalat, äpfelsaures Eisen, kommt nicht in reiner Substanz in den Arzneigebrauch, sondern in folgenden Formen

I Extractum Ferri pomatum (Germ, Helv) **Extractum Malatis Ferri** (Austr)
Extractum Ferri. Extractum Martis pomatum.

Germ 50 Th reife, saure Äpfel werden in einem steinernen Mörser in einen Brei verwandelt und ausgepresst. Der Saft wird mit 1 Th gepulvertem Eisen versetzt und die Mischung auf dem Wasserbade zunächst ziemlich schwach, später stärker erhitzt, bis die Gasentwicklung (von Wasserstoff) aufgehört hat. Die mit Wasser auf 50 Th verdünnte Flüssigkeit lässt man einige Tage an einem kühlen Orte absetzen. Alsdann filtrirt man die geklarte Flüssigkeit und dampft sie im Wasserbade zu einem dicken Extrakte ein — Ausbeute etwa 7 Proc vom Gewicht der Äpfel.

Austr 300 Th zerstoßene reife, saure Äpfel werden mit einer genügenden Menge Wasser $\frac{1}{4}$ Stunde gekocht, dann mit 50 Th reiner Eisenfeile während einiger Wochen an einem lauen Orte unter häufigem Umrühren und unter Ersatz des verdunsteten Wassers digerirt, bis eine schwarze Masse entstanden ist. Man presst in Beuteln ab, lässt die Flüssigkeit durch Absetzen klären, filtrirt und dampft sie zu einem dicken Extrakte ein. Ausbeute ca 10 Proc vom Saft.

Helv Man fällt aus 10 Th Ferrichloridlösung (1,28—1,29) durch Ammoniak das Eisen als Ferrhydroxyd, wäscht dieses aus und löst es noch feucht unter Erwärmen in 100 Th Saft von reifen, sauren Äpfeln. Die erhaltene Lösung wird filtrirt und zu einem dicken Extrakte eingedampft.

Eigenschaften Ein dunkel-grünschwarzes Extrakt, welches sich in Wasser klar mit dunkelbrauner Farbe löst, von eisenhaltigem, aber mildem Geschmack. Ein aus Ebereschentrüchten dargestelltes Extrakt hat einen unangenehmen, kratzenden Geschmack. Sind in der Flüssigkeit während der Bereitung unbeabsichtigte Gährungen (Milchsäure, Bernsteinsäure) aufgetreten, so enthält das Extrakt infolge Vergährung der Äpfelsäure ausser äpfelsaurem Eisen auch noch milchsäures und bernsteinsaures Eisen. Das Eisen ist bei der Helv als Ferrisalz, bei Germ und Austr zum grosseren Theil als Ferri-, zum geringeren Theile als Ferrosalz zugegen. Der Gehalt an metallischem Eisen beträgt 6—8 Proc — Sind erhebliche Mengen von bernsteinsaurem Eisen zugegen, so löst sich das Extrakt nicht völlig in Wasser, in der Regel bleibt vielmehr das bernsteinsaure Eisen als krystallinischer, sandiger Rückstand zurück.

Anwendung Das Extractum Ferri pomatum gehört zu den milden Eisenmitteln und wird zu 0,25—0,5—0,75 g drei- bis viermal täglich in Lösung und in Pillen gegeben.

Extractum Ferri cydoniatum wird aus Quittenfrüchten in der nämlichen Weise wie das vorstehende bereitet, kann übrigens durch dieses in allen Fällen ersetzt werden.

II Tinctura Ferri pomata (Germ, Helv) **Tinctura Malatis Ferri** (Austr)
Äpfelsaure Eisentinktur Tinctura Martis pomata Stahltröpfchen. Eisentropfen

Germ, Helv Eine filtrirte Lösung von 1 Th. Extractum Ferri pomatum und 9 Th Aqua Cinnamomi. **Austr** Eine filtrirte Lösung von 2 Th Extractum Ferri pomatum und 10 Th Aqua Cinnamomi spirituos.

Schwarzbraune Flüssigkeit von Zimmtgeruch und mildem Eisengeschmack, mit Wasser in jedem Verhältniss klar mischbar. Sie bildet nach einiger Zeit gern Bodensätze und muss alsdann wiederholt filtrirt werden. Man giebt 3—4 mal täglich $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Theelöffel.

Tinctura Ferri cydoniata. Wird aus Extractum Ferri cydoniatum wie die vorige bereitet und kann durch diese in allen Fällen ersetzt werden.

Sirupus Ferri compositus (Helv)		
Sirupus magistralis Magistralisirup		
Rp	Extracti Ferri pomati	1,0
	Aquae Cinnamomi	4,0
	Sirupi Aurantii corticus	20,0
	Sirupi Sacchari	24,0
	Sirupi Phei	50,0
	Tincturae Cinnamomi	1,0

Tinctura Digitalis ferrata LIEBK		
Rp	Tincturae Ferri pomatae	20,0
	Tincturae Digitalis	10,0
Dreimal täglich 15—30 Tropfen bei Klappenkrankheiten des Herzens		
Vinum Aurantii martiatum		
Rp	Extracti Ferri pomati	10,0
	Vini Hispanici	160,0
	Tincturae Aurantii corticus	80,0

Ferrum nitricum.

Ferrinitrat $\text{Fe}_3(\text{NO}_3)_6$ entsteht durch Auflösen von Eisen in Salpetersäure. Die konzentrierte, braune Lösung setzt auf Zugabe von Salpetersäure, je nach der Menge der selben oder der Konzentration der Flüssigkeit, entweder farblose Würfel $\text{Fe}_3(\text{NO}_3)_6 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ oder farblose monokline Prismen $\text{Fe}_3(\text{NO}_3)_6 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ab. Die Krystalle sind sehr zerfließlich und lösen sich in Wasser zu einer braunen Flüssigkeit.

I Liquor Ferri Nitratis (U-St.) Man fällt aus 145,0 g Ferrichloridlösung (spec Gew 1,280—1,282) nach passender Verdünnung mit Wasser in der auf S 1092 angegebenen Weise durch einen Ueberschuss von Ammoniakflüssigkeit das Eisen als Ferrihydroxyd. Dieses wäscht man mit Wasser bis zur Chlorfreiheit aus, sammelt es auf einem Sehtuch, lässt ablaufen, bringt es sodann in eine Porzellanschale, löst es in 194,0 g Salpetersäure von 25 Proc HNO_3 , bringt die Lösung durch Zugabe von Wasser auf 1000,0 g und filtrirt. Klare, bräunliche Flüssigkeit von saurer Reaktion. Spec Gew = 1,050 bei 15° C. Enthält 1,4 Proc metallisches Eisen.

Liquor Ferri pernitritis (Brit.) Spec Gew = 1,107 Enthält 3,22 Proc metallisches Eisen.

II Liquor Ferri nitrici Kerr Tinctura Ferri nitrici KERR Ferrinitrat-Lösung. Salpetersäure-Eisenlösung. Eisennitratflüssigkeit. 5 Th Eisendraht in Stückchen werden nach und nach in 60 Th Salpetersäure von 1,185 spec Gew eingetragen. Nach Ablauf der Reaktion wird die Lösung im Dampfbade erhitzt und bis zur Sirupdicke eingedampft. Nach dem Erkalten wird sie mit soviel Wasser gemischt, dass ihr Gewicht 100 Th beträgt, und endlich durch Glaswolle filtrirt.

Eigenschaften. Eine dunkelrothe, sehr styptische Flüssigkeit, welche 5 Proc Eisen oder 21,6 Proc wasserleeres Ferrinitrat enthält.

Anwendung. Man giebt die Ferrinitratlösung zu 5—10—15 Tropfen, allmählich bis zu 25 Tropfen steigend in wässriger Verdünnung 3—4 mal täglich bei chronischer Diarrhoe, Blennorrhoe, Leukorrhoe, Nesselsucht und atonischen Zuständen. Aeusserlich auf Aphthen und schlaffe Geschwüre.

Das salpetersäure Eisen des Handels, ein Gegenstand für die Farber, ist eine unter Erwärmen bewirkte Lösung von ca 25 Th Eisenvitriol in einem Gemisch aus 2 Th Schwefelsäure und 5 Th. roher Salpetersäure, nach dem Erkalten verdünnt mit 16 Th Wasser.

Linimentum Ferri nitrici		
Rp	Liquoris Ferri nitrici KERR	40,0
	Olei Olivae	60,0
Misce agitando		
Zum Einreiben (bei Gesichtsschmerz, arthritischen Leiden)		

Unguentum martiatum		
Rp	Liquoris Ferri nitrici KERR	
	Olei Olivae	50,0
Misce agitando		

Unguentum martiatum THAL et NEVERMANN		
Rp	Liquoris Ferri nitrici	20,0
Eraporando ad 10,0 remanentia redacta commisce cum		
Aloë pulveratae q s		

ut fiat massa unguinea
Salbe (auf Condylome, phagedänische Schanker, faule und brandige Geschwüre)

Ferrum oxydatum

I. Ferrum oxydatum hydratum Ferrum oxydatum fuscum. Ferrum hydricum Magisterium Vitrioli Martis Ferrioxydhydrat. Braunes Ferrihydrat. Braunes Eisenoxydhydrat Unterscheidet sich wenig von dem auf S 1100 abgehandelten Crocus Martis

Darstellung 100 Th des Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec Gew 1,428—1,430) werden mit 1000 Th kaltem destillirten Wasser verdünnt und dann einer kalten Mischung aus 100 Th 10proc Ammoniakflüssigkeit und 200 Th destillirtem Wasser unter Umrühren zugesetzt. Den Niederschlag sammelt man in einem leinenen Kolatorium, und nachdem man ihn mit kaltem destillirten Wasser gut ausgewaschen hat, vertheilt man ihn in dünner Schicht auf Glas- oder Porcellanflächen und lässt ihn an einem Orte, dessen Temperatur nicht über 30° C hinausgeht, vor Tageslicht geschützt trocken werden. Endlich zerreibt man ihn zu Pulver. Wesentliche Momente bei der Bereitung sind die Fällung aus kalten Flüssigkeiten und das Austrocknen bei möglichst geringen Warmegraden. Ausbeute 15—16 Th

Eigenschaften. Ein feines, braunliches, geruch- und geschmackloses Pulver, welches in Wasser unlöslich, in Chlorwasserstoffsäure aber ohne Aufbrausen löslich ist. Diese Lösung, mit Wasser verdünnt, giebt mit Kaliumferrieyanid keine blaue Färbung.

Es besteht, wenn es bei einer über 30° C nicht hinausgehenden Temperatur getrocknet wurde, der Hauptmenge nach aus braunem (amorphen) normalen Ferrihydroxyd (Eisenoxydhydrat) $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$. Wenn die Trocknungstemperatur erheblich über 30° C herausging, können diesem wasserärmere Ferrihydroxyde ($\text{Fe}_2\text{O}_3\text{H}_4$ und $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{H}_2$) beigemengt sein. Das normale Ferrihydroxyd $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$ ist das am meisten reaktionsfähige. Es wird deshalb Werth darauf gelegt, dass von diesem möglichst viel in dem Präparat enthalten ist.

Prüfung Das braune Ferrihydroxyd muss, mit einer 5fachen Menge 25procentiger Salzsäure übergossen, sich darin ohne Aufbrausen auflösen (Darstellung und Fällung mit Alkalikarbonat), und ein Theil dieser Lösung mit einem 20fachen Volumen destillirtem Wasser verdünnt mit Chlorbaryum keine oder nur geringe Trübung erleiden (eine starke Trübung, welche die Durchsichtigkeit der Flüssigkeit völlig aufhebt, deutet auf ungenügendes Auswaschen des Ferrihydroxyds). Das mit verdünntem Aetzammon geschüttelte Präparat muss endlich ein Filtrat geben, welches auf Zusatz von Oxalsäurelösung keine Trübung erfährt (zum Auswaschen verwandtes kalkhaltiges Brunnenwasser).

Aufbewahrung In gut geschlossenen Glasgefäßen und vor Tageslicht geschützt.

Anwendung Das Eisenoxydhydrat ist ein höchst mildes Eisenpräparat, welches sich besonders in Pulvern, Pillen, Pastillen und Lecksaften geben lässt und die Zähne nicht angreift wie Eisenlösungen. Man giebt es zu 0,15—0,3—1,0 drei bis viermal täglich. Ausserlich gebraucht man es als Einstreupulver in jauchige Wunden, Krebsgeschwüre etc.

Emplastrum Ferri (U-St.)		Trochisci Ferri (U-St.)	
Strengthening Plaster		Rp	Ferri hydrici 30,0
Rp	Ferri hydrici 90,0		Vanillae 10
	Olei Olivae 50,0		Sacchari 100,0
	Resinae Burgundicae 140,0		Mucilaginis Tragacanthae q s
	Emplastrum Plumbi 720,0		Fiant trochisci 100

Ferrum hydroxydatum in Aqua. Ferrum hydricum in Aqua. Ferri Oxydum hydratum (U-St.) Sesquioxido de fer bihydraté (Gall.) Man verdünnt 100,0 Th Ferrisulfatlösung mit 1000,0 Th Wasser und giesst diese Lösung unter Umrühren in 110,0 Th Ammoniakflüssigkeit von 10 Proc NH_3 , die mit 300,0 Th Wasser verdünnt ist. Man wascht den Niederschlag aus, bis das Ablaufende Schwefelsäure nicht mehr enthält, sammelt ihn auf einem Kolatorium, presst gelinde aus, vertheilt ihn durch Anreiben mit Wasser, bringt auf das Gesamtgewicht von 1000,0 Th und bewahrt diese Mischung an einem kühlen Orte auf.

Dient besonders als Antidot bei Arsenikvergiftungen, s S 391. Indessen ist nur ein frischbereitetes Präparat von der gehörigen Wirksamkeit.

Polirpulver für Stahl ist ein Gemisch aus kohlensaurer Magnesia 1 Th, gebrannter Magnesia 1 Th und braunem Eisenoxyd 2 Th

II Ferrum oxydatum rubrum Ferrum oxydatum (Helv) (Crocus Martis adstringens) Rother Eisenoxyd Ferrioxyd. Fe_2O_3 Mol Gew. = 160.

Darstellung 100 Th krystallisirtes Ferrosulfat und 9 Th Kaliumnitrat werden zu einem groben Pulver gemischt, in einen Gluhtiegel gegeben, so dass dieser höchstens halb angefüllt ist, und anfangs bei gelindem, dann allmählich verstärktem Feuer erhitzt, bis keine Dämpfe mehr daraus aufsteigen. Nach dem Erkalten wird die gepulverte Masse mit destillirtem Wasser ausgekocht und ausgewaschen, getrocknet und aufbewahrt. Es ist ein braunrothes geruch- und geschmackloses Pulver. Es kann auch durch schwaches Gluhen des Ferrum oxydatum fuscum dargestellt werden.

Dieses unwirksame Präparat wird nicht mehr therapeutisch angewendet, und, wenn es ein Arzt verordnen sollte, durch das wirksamere Ferrum oxydatum fuscum ersetzt.

III Haematites Lapis Haematites Bergioth Hämatit Blutstein. Rother Glaskopf. Ein natürliches Eisenoxyd von krystallinischer spießig faseriger Textur, von braunrother bis stahlgrauer Farbe und ein rothes Pulver gebend. Es wird gewöhnlich nur in ganzen Stücken vorrätig gehalten, indem es besonders in fingerlangen und dicken Stücken zum Zeichnen auf Eisen, Stein u. dergl. von Handwerkern gefordert wird, in mittelfeiner Pulverform mit Schmirgel als Schleifmittel dient. In Stelle des gepulverten und geschlammten, des präparirten Blutsteins, Haematites praeparatus, als Medikament für Vieh pflegt man gewöhnlich gepulvertes Colcothar zu dispensiren.

IV Colcothar Vitrioli Caput mortuum Crocus Martis vitriolatus Englisch roth. Braunroth. Vitriolroth. Tottenkopf. Colcothar. Oxyde de fer anhydre (Gall.) Der pulvrige Rückstand von der Destillation der Schwefelsäure aus Eisenvitriol. Es besteht aus Eisenoxyd mit kleinen Mengen Ferrisulfat.

Der Tottenkopf findet eine vielseitige Anwendung als Anstrichfarbe, Polirmittel. Vom Volke wird er oft als innerliches und äußerliches Arzneimittel gebraucht bei Blutungen, auf Wunden, bei Blutharnen und Rühren der Haus- und Zugthiere, auch gegen das sogenannte Ranschen der Saue.

Die im Handel bezogene Waare wird durch ein mittelfeines Sieb geschlagen und aufbewahrt.

Ein geschlammter Colcothar ist das beste Putzpulver für Goldsachen.

Eisenmennige ist ein etwas Thonerde und Kalk enthaltendes Eisenoxyd von hellrother Farbe. Sie dient als Anstrichfarbe. Man beachte, dass die Eisenmennige in sehr verschiedenen Nuancen vorkommt, deshalb bestellt man stets zweckmässig nach Probe.

V Eisenglanz Ein natürlich vorkommendes Eisenoxyd in Rhomboedern von röthlich stahlgrauer Farbe krystallisirend. Im fein gemahlenen Zustande zu Anstrichfarben verwendet.

Schuppenpanzerfarbe A) In Teigform 75 Th fein gepulverter Eisenglanz und 25 Th Leinölfirniss B) Streichfertig 80 Th fein gepulverter Eisenglanz, 70 Th Leinölfirniss.

VI Ferrum oxydatum saccharatum (Germ) Ferrum oxydatum saccharatum solubile (Helv) Eisenzucker. Ferrisaccharat.

Die Bereitung dieses Präparates beruht auf der Erkenntniss der Thatsache, dass Ferrihydroxyd in Zuckerlösung löslich ist bei Gegenwart einer zwar geringen, aber immerhin genügenden Menge Natronhydrat. Dieses zum Zustandekommen der löslichen Verbindung erforderliche Natronhydrat lässt Germ einfach zusetzen, nach Helv bleiben genügende Mengen Natronhydrat in dem Ferrhydratniederschlage, da dieser absichtlich nicht bis zur Beseitigung alles Natronhydrats ausgewaschen wird.

Darstellung Die Vorschrift der Germ ist im allgemeinen derjenigen der Helv vorzuziehen, da sie unter allen Umständen ein lösliches Präparat liefert.

Germ. In einem etwa 2 Liter fassenden Gefasse werden 80 Th Ferrichloridlösung (spez. Gew. = 1,28—1,282) mit 150 Th kaltem, destillirtem Wasser verdünnt, dann wird

nach und nach eine heiss bereitete, filtrirte und wieder vollständig erkaltete Lösung von 26 Th kryst Natriumkarbonat in 150 Th Wasser mit der Vorsicht hinzusetzt, dass bis gegen Ende der Fällung vor jedem weiteren Zusatze die Wiederauflösung des entstandenen Niederschlages abgewartet wird (!) Man hat wohl darauf zu achten, dass beide Lösungen vollständig kalt sind. Nachdem die Fällung vollendet ist, übergiesst man den Niederschlag mit etwa der 3—5fachen Menge kaltem destillirten Wasser, zieht die klare Flüssigkeit nach etwa 2ständigem Absetzenlassen mit Hilfe eines Hähners klar ab und wiederholt dies so oft, bis das Ablaufende, mit 5 Raumtheilen Wasser verdünnt, nach dem Filtriren und Versetzen mit etwas Salpetersäure, durch Silbernitratlösung nicht mehr als opalisirend sich trübt, bis also das Natriumchlorid bis auf Spuren entfernt ist. Alsdann wird der Niederschlag auf einem angefeuchteten, dicht gewebten, leinenen Tuche gesammelt und nach dem Abtropfen nur gelinde abgepresst. Man ziehe die Presse sehr langsam und vorsichtig an, weil sonst das Tuch leicht platzt. Hierauf mischt man den noch feuchten Niederschlag in einer Porcellanschale mit 50 Th Zuckerpulver und zunächst mit 3 Th Natronlauge (von 15 Proc NaOH). Man achte hierbei sorgfältig darauf, dass sich nicht etwa unzertheilte Klumpchen von Eisenoxydhydrat in dem Gemische befinden, weil sich diese beim späteren Erhitzen und Eindampfen nur schwierig oder gar nicht auflösen, sondern zu kleinen festen Stückchen, aus Eisenoxyd bestehend, eintrocknen. Die Mischung wird nun im Dampfbade bis zur vollständigen Klärung erwärmt, nöthigenfalls noch etwas Natronlauge von 15 Proc NaOH (0,5 bis höchstens 2 Th) zugesetzt, darauf unter Umrühren zur Trockne eingedampft, zu mittelfeinem Pulver zerreiben, diesem noch so viel trockenes Zuckerpulver zugemischt, dass das Gewicht der Gesamtmenge 100 Th beträgt, und das Ganze durch ein geeignetes Sieb geschlagen.

Helv 30 Th Ferrisublimlösung, 10 Th Zucker und 10 Th Wasser werden gemischt, alsdann allmählich und unter Umrühren mit 40 Th Natronlauge von 30 Proc NaOH (oder 80 Th Natronlauge von 15 Proc NaOH) versetzt. Man lässt einige Stunden bis zum Klarwerden stehen und fügt alsdann hinzu 500 Th siedendes Wasser. Das Gemisch wird bis nach erfolgter Klärung zur Seite gestellt, die überstehende klare Flüssigkeit später abgehebert und der Niederschlag so lange mit Wasser ausgewaschen, als die Flüssigkeit farblos abläuft und deutlich alkalisch reagirt. Der noch feuchte Niederschlag wird in einer Porcellanschale mit 90 Th Zucker gemischt, die Mischung wird im Dampfbade eingetrocknet, der Rückstand gepulvert und durch Zumischen von Zucker auf das Gewicht von 100 Th gebracht.

Eigenschaften. Eisenzucker bildet ein rothbraunes, süß und schwach nach Eisen schmeckendes Pulver, welches sich in 20 Th Wasser klar auflöst. Die wässrige Lösung zeigt ein anderes Verhalten, als es sonst für Lösungen von Eisenoxydverbindungen bekannt ist. Phosphorsäure, Kohlensäure, Arsensäure, Bernsteinsäure, benzoesäure Alkalisalze erzeugen in ihr keine Fällung, durch Ferrocyankalium entsteht kein blauer Niederschlag, durch Rhodankalium keine rothe Färbung, durch Gerbsäurelösung keine blauschwarze Fällung. Dagegen fällt Schwefelammonium alles Eisen als Schwefeleisen.

Auf Zusatz sehr vieler Neutralsalze (z. B. NaCl, KBr, KJ, Sulfate, Nitrate u. a. m.) zur Lösung, wird aus derselben beim Erwärmen sofort, bei gewöhnlicher Temperatur allmählich unlösliches Eisensaccharat abgeschieden.

Auf Zusatz von Säuren zur Lösung des Eisensaccharates erfolgt zunächst Abscheidung von unlöslichem Eisensaccharat, bei weiterem Zusatz von Säure werden unter Zerlegung des Eisensaccharates die betreffenden Salze des Eisens gebildet. Daher wird die wässrige Lösung des Eisensaccharates durch Ferricyankalium nicht verändert, auf Zusatz von Salzsäure entsteht zunächst schmutzig grüne, alsdann rein blaue Färbung.

Prüfung. 1) Man erhitzt 10 ccm der wässrigen Lösung (1/20) mit 2 ccm Salpetersäure. Nach dem Erkalten der Flüssigkeit darf in derselben durch Silbernitrat nur eine opalisirende Trübung erzeugt werden. Spuren von Chlor sind zuzulassen. 2) Zur Bestimmung des Eisengehaltes bringt man 1 g Eisenzucker in eine Flasche mit gut eingeschiffenem Glasstopfen, fügt 5 ccm Salzsäure hinzu und verdünnt nach erfolgter Auflösung mit 20 ccm Wasser. Hierauf setzt man 1,0 g Kaliumjodid hinzu und lässt das verschlossene Gefäß eine Stunde lang bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Nach dieser Zeit sollen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods folgende Mengen $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden.

Germ 5,0—5,3 ccm, entsprechend 2,8—2,968 Proc metall Eisen und Helv 5,35 ccm entsprechend rund 3 Proc (genauer 2,996 Proc) metall Eisen.

Anwendung Der Eisenzucker ist ein mildes Eisenpräparat, welches nicht unangenehm schmeckt und die Zähne nicht angreift, auch den Magen nicht belastigt. Er steht in dem Ansehen, besonders leicht zur Resorption zu gelangen, was allerdings nicht bewiesen erscheint, um so mehr, als unter dem Einflusse des sauren Magensaftes jedenfalls eine Veränderung des Präparates erfolgt. Dagegen hat er zweifellos den Vorzug, dass er mit alkalischen Nahrungs- oder Genussmitteln vermischt werden kann, ohne Zersetzung zu erfahren.

Man giebt den Eisenzucker von 0,3—0,5—1,0 g drei- bis viermal täglich in Pulvern, Pillen und Pastillen in allen jenen Fällen, in denen man das Eisen als tonisirendes und das Blut verbesserndes Mittel anwenden will.

Sirupus Ferri oxydati solubilis Sirupus Ferri oxydati Eisensirup. Ferri-saccharatsirup. Natriumferrisaccharatsirup

A) 1 Proc metallisches Eisen enthaltend. Man bereitet, wie S 1121 angegeben, das Ferrum oxydatum saccharatum der Germ aus 30,0 Th Ferrichloridlösung, fügt im ganzen 100,0 Th Zucker zu, verdampft aber nicht zur Trockne, sondern auf 150,0 Th, und fügt 150,0 Th Zuckersirup hinzu.

B) 6,6 Proc metallisches Eisen enthaltend (Hamb Vorschr.) Wird wie Ferrum oxydatum saccharatum (Germ) bereitet, nur mit dem Unterschiede, dass der aus 30,0 Th Ferrichloridlösung erhaltene Niederschlag (von $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$) nach dem Auswaschen gemischt wird mit 25,0 Th Zuckerpulver sowie 3,0 Th Natronlauge (von 15 Proc NaOH), worauf man die Mischung auf 45 Th eindampft.

C) **Sirupus Ferri saccharati solubilis** (Nat Form) 1 Proc metallisches Eisen enthaltend. Wird entweder nach A dargestellt oder *ex tempore* aus Ferri oxydati saccharati, Aquae, Sirupi Sacchari ää.

Anwendung. Man giebt den Eisensirup zu 3,0—5,0—10,0 g drei- bis viermal täglich rein, nie in Mixturen und anderen Arzneistoffen, oft aber in Verdünnung mit *Sirupus Aurantii florum*.

Sirupus Ferri-Ammonii saccharati (Sirupus Ferri oxydati solubilis HAGEN), eine Zuckerlösung mit fast 1,5 Proc Eisen oder 2 Proc wasserleerem Eisenoxyd. 150 Th einer Ferrichloridlösung von 1,280—1,282 spec Gew werden mit der 15fachen Menge kaltem destillirtem Wasser verdünnt und mit 120 Th einer 10procentigen Ammoniakflüssigkeit, welche zuvor mit ihrer 10fachen Menge destillirtem Wasser verdünnt ist, gemischt, nach einer Stunde auf ein Filter gegeben und der Niederschlag mit einer 1procentigen Ammoniakflüssigkeit so lange ausgewaschen, bis das Ablaufende mit Salpetersäure angesäuert aufhört, mit Silbernitrat eine Chlor-Reaktion zu geben. Dann giebt man den Niederschlag nebst 10 Th 10procentiger Ammoniakflüssigkeit auf 700 Th zerstoßenen Zucker, welche sich in einem porcellanen oder eisernen Gefäss befinden, erhitzt unter Umrühren, kocht einige Male behufs Verflüchtigung des freien Ammoniaks auf und verdünnt mit soviel Rosenwasser, dass das Gewicht der Mischung 1100 Th beträgt.

Eisenzucker, krystallisirter. 1000 Th weisser Zucker werden mit 100 Th Ferrum saccharatum solubile gemischt, in 300 Th Wasser bei Digestionswärme gelöst und an einem Orte von ca. 30° C zur Krystallisation bei Seite gestellt.

VII Ferrum oxydato-oxydulatum Ferrum oxydulatum nigrum Oxydum Ferri magneticum Aethiops martialis. Eisenmohr. Ein Gemisch oder eine Verbindung von Ferroxyd mit Ferrixyd.

Darstellung. 100 Th einer Fernsulfatlösung von ca 1,318 spec Gew setzt man eine Lösung von 25 Th krystallisirtem Ferrosulfat in 350 Th destillirtem Wasser hinzu und versetzt nach geschehener Mischung unter Umrühren mit 105 Th 10proc Aetzammon, oder soviel davon, dass es etwas vorwaltet. Dann giebt man das Gemisch in einen eisernen Kessel und kocht so lange, bis der Niederschlag pulvrig und sehr schwarz erscheint. Hierauf wird der Niederschlag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, mit heissem Wasser gewaschen und auf unglasirten Thonplatten bei gelinder Wärme trocken gemacht. Ausbeute ca 15 Th. Ein in verdünnter Salzsäure bei Digestionswärme völlig lösliches schwarzes Pulver. Früher wurde dieses Präparat auch durch Glühung von Ferrum oxydatum fuscum, welches mit Olivenöl getränkt war, dargestellt.

Man bewahrt es in gut geschlossener Flasche auf. Es ist ein höchst wenig wirksames Eisenpräparat, welches kaum noch Anwendung findet. Die Gabe ist eine behagige.

Bromophtharin, ein Desinfektionsmittel zur groben Desinfektion Gemisch aus Eisenoxyd, Calciumoxyd, Calciumkarbonat, Gips, Natriumsulfat, ca 5 Proc Sand, mit einem alkoholischen Farbstoff gelb gefärbt Desinfizierende Wirkung = Null

Ferrosol. Angeblich ein Doppelsaccharat von Eisenoxydehlorhydrat (?) mit 0,77 Proc Eisengehalt Mit Wasser mischbare Flüssigkeit Bei chlorotischen und anämischen Zuständen Die Zusammensetzung des Präparates ist nicht näher bekannt

Frostsalbe, **BALFELD's**, ein Gemisch aus Ferrum oxydatum fuscum 6,0, Bolus Armena 3,0, Terebinthina 6,0, Sebum taurinum 50,0, Adeps 50,0 und 15 Tropfen Oleum Bergamottae

Frostsalbe des Parochus WAHLER in Kupferzell ist von vorstehender Salbe nicht wesentlich verschieden

Grains de beauté von Dr PRINCE PARIS Mit Silberüberzug versehene Pillen aus Hülsenfruchtmehl, Zucker, Ferrihydroxyd, Gerbstoff, Drachenblut und einigen aromatischen Pflanzenstoffen

Purine, Metallputzpomade von **BERENDT & Co - Berlin** besteht aus Englschroth und Braunkohlensasche, die mit Rückständen der Purnfabrikation zur Paste verarbeitet sind.

Putzpomade Adapis 5 kg, Acidi stearici 700,0 g, Acidi oleici 1,8 kg, Capitis mortuum 500,0, Terrae triphosphanæ 6 kg, Nitrobenzol 75,0 g Die Pulver müssen fein geschlämmt sein Zum Schluss lässt man die ganze Masse durch eine Farbmühle gehen

ATHEVSTADT'S Eisentinktur der Tinctura Ferri composita, Ergänzb., ähnlich zusammengesetzt

Emplastrum cum Ferre oxydato
Emplâtre ou Onguent de CANET (Gall.)
Rp Emplastri lithargyri simplicis
Emplastri lithargyri compositi
Cerae flavae
Olei Olivae
Colcotharis aa 100,0

Der Colcothar ist mit der Hälfte des Oeles fein zu reiben Gilt als Heilpflaster für alle Fälle

Emplastrum sticticum rubrum.
Emplastrum sticticum (stypticum) CROLL.
Emplastrum defensivum rubrum Emplâtre de BAUMEUL. Rothos Sticticum
Rothos Bruchpflaster CABBAN'S Bruch- und Heilpflaster Stick-Schweda.

Rp Emplastri Plumbi simplicis 400,0
Cerae flavae 500
Turbinthinae lancae 200
Olibani pulverati 200
Colcotharis Vitrioli 400
Olei Olivae 200

Der Colcothar ist vorher mit dem Olivenöl fein zu reiben Das Pflaster ist in Stangen auszurollen.

Pilulae Ferri oxydulati KIRCHMANN

Rp Ferri sulfurici crystallisati 120
Magnesiae ustae 2,0
Glycerini gr. XXV vel q. s.

M f pilulae centum (100), ut singulae 0,08 Ferri oxydulati continent.

Liquor Ferri cum Cacao (Hamb Vorschr)

Aromatische Eisensessenz mit Kakao.

Rp 1 Cacao exoleat 20,0
2 Spiritus (90 Proc.)
3 Aquae aa 240,0
4 Sirupi Ferri oxydati sacch (II V = 6,6% Fe) 33,0
5 Aquae 227,0
6 Sirupi Sacchari 240,0
7 Mixturae aromaticae 5,5

Man macerirt 1—3 während 3 Tagen. Dem Filtrat setzt man 4—7 zu

Tinctura Ferri aromatics (Hamb Vorschr)

Aromatische Eisensessenz.
Rp Sirupi Ferri oxydati saccharati (66 Proc Fe Hamb V) 33,0
Sirupi Sacchari 240,0
Spiritus (90 Proc.) 160,0
Aquae 562,0
Mixturae aromaticae 5,5

Mixtura aromatics (Hamb Vorschr)

Aromatische Mischung

Rp Aetheris acetic 40
Tincturae Vanillae 150
Tincturae aromaticae 300
Tincturae Aurantii corticis 600

Tinctura Ferri composita (Ergänzb.)

Aromatische Eisentinktur

Rp Ferri oxydati saccharati (Germ.) 75,0
Aquae 574,0
Sirupi Sacchari 180,0
Spiritus (90 Proc.) 165,0
Tincturae Aurantii 5,0
Tincturae aromaticae 1,5
Tincturae Vanillae 1,5
Aetheris acetic gtt V

Tinctura Ferri aromatics composita

Aromatische Eisentinktur (Bad T.).

Rp Ferri oxydati saccharati 22,0
Aquae 570,0
Sirupi Sacchari 240,0
Spiritus (90 Proc.) 165,0
Acidi citrici 0,2
Tincturae Aurantii corticis 5,0
Tincturae aromaticae
Tincturae Cinnamomi Ceylanid
Tincturae Vanillae aa 0,75
Aetheris acetic gtt li

Trochisci cum Ferre oxydato saccharato solubili

Rp Ferri oxydati saccharati solubilis 100,0
Sacchari albi 300,0
Sacchari vanillinati 5,0
Tragacanthae pulveratae 1,0
Aquae destillatae q. s.

Fiant trochisci 1000, ut singuli continent 0,1 Ferri oxydati saccharati.

Unguentum Ferri compositum (Hamb Vorschr).

Frost-Heilsalbe

Rp Boll rubrae laevigatae 25,0
Ferri hydrici 50,0
Terebinthinae venetae 50,0
Sabi ovilla
Adipis suilli aa 430,0
Olei Lavandulae 5,0

Vet Pulvis antichloroticus ovium
 Rp Colcotharis rubri Vitrioli
 Fuliginis splendens aa 200,0
 Vitrioli Ferri 50,0
 Natrii carbonici dilapsi 10,0
 Natrii sulfurici
 Herbae Absinthii
 Fructus Juniperi aa 400,0
 Radix Liquiritiae 200,0
 Olei Cerebinthinae 50,0

Täglich 15 g mit Wasser angerührt einem Schafe zu geben (bei der Fäule, nebenher Fütterung mit Pappel- und Weidenlaub)
 Dieselbe Mischung passt auch bei Rückenblut der Rinder, nur in doppelter Menge pro dosi und täglich drei Gaben.

Vet. Pulvis vermifugus suum
 Rp Aloës 2,0
 Seminis Strychni 1,0
 Colcotharis Vitrioli
 Radix Liquiritiae aa 10,0
 Dosis Eine Messerspitze auf das Futter

Vet Pulvis martiatus ad boves
 Rp Colcotharis Vitrioli 200,0
 Vitrioli Ferri 20,0
 Kali nitrici 100,0
 Natrii sulfurici 500,0

Divide in partes aequales 20
 Täglich viermal ein Futter mit Wasser (bei Rückenblut der Rinder)

Vet Pulvis suum aurilantium
 (Rauschpulver für Säue)
 Rp Antimonii crudi
 Natrii nitrici
 Capiti mortuum aa partes
 Eine Messerspitze auf jedes Futter (zur Unterdrückung der Geschlechtsaufregung der Mastäue)

Ferrum peptonatum.

I. Ferrum peptonatum (Ergänzb.) Eisenpeptonat. Peptoneisen Peptonate de fer. Peptonate of iron. Ferripeptonat

Darstellung. 20 Th trocknes Pepton werden in 2000 Th Wasser gelöst, worauf der kalten Lösung eine Mischung aus 240 Th flüssigem Ferroxychlorid (Germ) und 2000 Th Wasser in dünnem Strahle und unter fortwährendem Umrühren zugefügt wird. Zur Fällung des gebildeten Eisenpeptonats wird mit verdünnter Natronlauge (1,5 Proc NaOH enthaltend) bis zur ganz schwach (l) alkalischen Reaktion versetzt. Hierauf wird der entstandene Niederschlag möglichst schnell durch Dekanthiren mit Wasser so lange ausgewaschen, bis eine Probe des Waschwassers durch Silbernitratlösung nicht mehr verändert wird. Der Niederschlag wird alsdann auf einem angefeuchteten leinenen Tuche gesammelt und nach dem Abtropfen in einer Porzellanschale mit 3 Th Salzsäure (von 25 Proc HCl) bis zur Auflösung erwärmt. Die Lösung wird nunmehr im Dampfbad zur Sirupdicke abgedunstet, der Sirup auf Glasplatten gestrichen und bei 50–60° C getrocknet.

Eigenschaften. Glänzend braune, durchscheinende Blättchen oder Schüppchen, welche in 100 Th. = 24–25 Th Eisen enthalten. Eisenpeptonat löst sich langsam in kaltem, schneller in warmem Wasser zu einer schwach sauer reagirenden Flüssigkeit, welche weder durch Kochen noch durch Zusatz von Weingeist gerührt wird. Werden 10 ccm einer Lösung (1 = 20) des Eisenpeptonats mit 2 ccm Salzsäure langsam bis zum Kochen erhitzt, so findet zunächst Trübung, dann flockige Ausscheidung statt, bevor Auflösung eintritt.

Bestimmung des Eisengehaltes 0,5 g Eisenpeptonat werden in 20 ccm heissem Wasser gelöst, mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure erhitzt, bis die entstandenen Ausscheidungen wieder gelöst sind. Alsdann wird die Lösung mit 200 ccm heissem Wasser verdünnt, mit Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss versetzt und so lange im Wasserbade erhitzt, bis der Niederschlag sich völlig ausgeschieden hat und die Flüssigkeit farblos erscheint. Der Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, mit heissem Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat durch Baryumnitrat keine Trübung mehr erleidet, sodann durch Auftropfen heisser, verdünnter Schwefelsäure auf dem Filter in Lösung übergeführt. Die Lösung wird durch Auswaschen des Filters auf etwa 100 ccm gebracht. Man fügt 3–4 g Kaliumjodid hinzu und lässt 1 Stunde lang bei gewöhnlicher Temperatur im verschlossenen Gefässe stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen alsdann 21,4–22,8 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein, entsprechend einem Gehalt von 23,97 bis 24,97 Proc metallischem Eisen. Vergl. S. 1089.

Aufbewahrung. Vor Licht geschützt aufzubewahren.

II Liquor Ferri peptonati (Erganzb) Eisenpeptonatessenz.

8,0 g trockenes Pepton werden in 100 g heissem Wasser gelöst. Zu der erkalteten Lösung fügt man allmählich 174 g Ferrioxychloridlösung (Germ) unter fortwährendem Umrühren hinzu. Bei durch genaues Neutralisieren der Flüssigkeit mit stark verdünnter Natronlauge (1,5 Proc NaOH enthaltend) erhaltene Niederschlag wird solange mit Wasser gewaschen, bis im Waschwasser Chlor nicht mehr nachzuweisen ist. Alsdann sammelt man ihn in einem leinenen Kolatorium und lässt abtropfen. Hierauf verreibt man den abgedampften Niederschlag mit 200 g Zuckersirup und fügt unter Erwärmen soviel Natronlauge (von 1,5 Proc. NaOH) hinzu, bis Auflösung des Niederschlages erfolgt, wozu etwa 90 g der 1,5 procentigen Natronlauge erforderlich sind. Der erkalteten (!) Lösung werden zugefügt Spiritus (90 Proc) 100,0 g, Pomeranzenschalentinktur 3 g, Aromatische Tinktur, Vanilletinktur je 1,5 g, Essigäther fünf Tropfen und Wasser bis zum Gesamtgewicht von 1000,0 g.

Klare, röthlich braune Flüssigkeit 100 Th enthalten mindestens 0,6 Th Eisen.

Vor Licht geschützt aufzubewahren

III Sirupus Ferri peptonati Eisenpeptonatsirup (Hamb Vorschr) Man

löse 14,4 g trockenes Pepton in 500,0 g Wasser unter Erwärmen. Zu der erkalteten Lösung fügt man eine Mischung aus 174,0 Th Ferrioxychloridlösung (Germ) und 400,0 Th Wasser. Alsdann neutralisirt man genau mit 1,5 proc Natronlauge (ca 50 Th). Der Niederschlag wird ausgewaschen und gelinde ausgepresst, dann in einer Porcellanschale mit 60 Th Zuckerpulver verrieben und unter Zusatz von 1,5 proc Natronlauge (ca 45 Th) durch Erwärmen in Lösung gebracht und durch Eindampfen auf ein Gesamtgewicht von 125,0 Th gebracht. Der Sirup enthält rund 5 Proc metallisches Eisen.

IV Ferralbumose

Fein gehacktes, vom Fett befreites Fleisch wird mittels künstlichen Magensaftes verdaut, das nach vollendeter Verdauung erhaltene Filtrat zur Beseitigung von Eiweiss aufgeköcht, mittels Natriumkarbonatlösung genau neutralisirt, nochmals filtrirt und im luftverdünnten Raume zur Trockne eingedampft. Diese Albumose wird in 10procentiger wässriger Auflösung durch eine Lösung von Eisenchlorid (1 10) gefällt, bis kein Niederschlag mehr entsteht, der Niederschlag gesammelt, gewaschen, getrocknet, zerrieben und gesiebt (Dokkum).

Der Eisengehalt beträgt rund 10 Proc Fe = rund 14 Proc Fe_2O_3 .

Ferro-Chininum peptonatum. 16 g Eisenpeptonat (mit 25 Proc Fe) löst man durch Kochen in 80 g destillirtem Wasser. Andererseits verreibt man 5 g Chininchlorhydrat in 10 g destillirtem Wasser, setzt q s Salzsäure bis zur Auflösung hinzu, mischt beide Flüssigkeiten, dampft zum Sirup ein, streicht auf Glasplatten und trocknet. Enthält 20 Proc metall. Eisen und 25 Proc Chininchlorhydrat (DIETTERICH).

Liquor Ferri peptonati Eisenpeptonat-Essenz			Liquor Ferri peptonati cum Chinino I Bad Taxe		
I Bad Taxe			Rp Liquoris Ferri peptonati 100 g		
Bp	Ferri peptonata	16,0	Chinini sulfurici 0,5		
	Aquae calidae	708,0	II. Münch Ap-V		
	Spiritus Cognac	100,0	Bp 1	Ferri peptonata	24,0
	Spiritus (80 Proc)	75,0	2	Aquae calidae	665,0
	Sirupi Sacchari	100,0	3	Chinini sulfurici	5,0
	Essentiae Benedictinorum	10	4	Spiritus (80 Proc)	100,0
	Aetheris acetic	0,5	5	Sirupi Sacchari	200,0
Man lasse absetzen und filtrire			6	Tincturae Aurantii corticis	3,0
II Hamb Vorschr			7	Tincturae Vanillae	
Bp	Sirupi Ferri peptonati		8	Tincturae aromaticae	ss 15
	Spiritus	ss 125,0	9	Aetheris acetic	0 25
	Aquae	750,0	Man löst 1 in 2 unter Erwärmen, in der wieder		
	Mixturae aromaticae (s S 1188)	5,5	erkalteten Lösung 3 und fügt alsdann 4—9 zu		
Pillulae Ferri peptonati (Form. Berol.).					
Rp. Ferri peptonati sicc 5,0					
Radici Gentianae 1,0					
Extracti Gentianae 3,0					
Fiant pillulae No 60					

Ferrum phosphoricum.

Da die Zusammensetzung der phosphorsauren Salze des Eisens in der Nomenclatur nicht immer genügend zum Ausdruck kommt, so hat man sich in jedem einzelnen Falle die Frage vorzulegen, welches Salz wohl gemeint ist.

I Ferrum phosphoricum oxydulatum (Ergänzb) **Ferrum phosphoricum Ferri Phosphas** (Brit) **Ferrum phosphoricum caeruleum. Ferrophosphat. Eisenprotophosphat. Ferroferriphosphat. Phosphorsaures Eisenoxydul**

Darstellung. Ergänzb Zu einer Lösung von 3 Th krystall Ferrosulfat in 18 Th. Wasser wird eine andere Lösung von 4 Th. krystall Natriumphosphat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$) in 16 Th. Wasser unter Umrühren hinzugesetzt. Der ausfallende Niederschlag ist zunächst weiss, wird aber rasch bläulich. Man bringt ihn alsbald auf ein Filter und wäscht ihn solange mit Wasser, bis das Ablaufende, mit Salpetersäure angesäuert, durch Baryumchlorid nicht mehr getrübt wird. Hierauf lässt man ihn auf porösen Tellern absaugen und trocknet bei gewöhnlicher Temperatur.

Brit. lässt eine Lösung von 60 Th. kryst. Ferrosulfat in 600 Th. Wasser durch eine Lösung von 55 Th. kryst. Natriumphosphat in 600 Th. Wasser bei $40-55^\circ\text{C}$ fallen, alsdann eine Lösung von 15 Th. Natriumbikarbonat zusetzen und wie vorher auswaschen.

Eigenschaften. Ein lockeres, graublaues oder lavendelblaues, geruch- und geschmackloses Pulver, in der Wärme grünlichblau, bei starkerer Hitze graubraun. In Wasser und Weingeist ist es unlöslich, von Mineralsäuren wird es leicht gelöst. Die Lösung in verdünnter Salzsäure ist schwach goldgelb gefärbt. Es besteht vorwiegend aus Ferrophosphat $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$, neben geringeren Mengen Ferriphosphat $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$ und Eisenoxyduloxyl.

Die Lösung in Salzsäure darf nach dem Verdünnen mit Wasser durch Baryumchloridlösung nur schwach getrübt, durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel gefärbt werden.

Aufbewahrung. In gut geschlossener Flasche und an einem kühlen Orte. Tageslicht wirkt in betreff der Farbe konservierend.

Anwendung. Die gebräuchliche Gabe ist 0,1–0,3–0,6 mehrmals des Tages in allen den Fällen, wo milde Eisensalze indicirt sind, besonders bei Rhachitis.

Sirupus Ferri Phosphatis (Brit) **Sirupus Ferri phosphoric. Ferri in filis** 8,6 g, **Acidi phosphorici** (86,3 Proc H_2PO_4) 93,8 g **Sirupi Sacchari** 700 ccm, **Aquae q s ad 1 Liter.** Enthält Ferrophosphat.

II. Ferrum phosphoricum oxydatum (Ergänzb) **Ferrum phosphoricum album. Ferriphosphat. Eisenphosphat. Phosphorsaures Eisenoxyd.** $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3 + 8\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 448.

Darstellung. Man vermische einerseits 1 Th. Ferrichloridlösung (1,280–1,282 spec. Gew.) mit 9 Th. Wasser, anderseits löst man 1 Th. krystall Natriumphosphat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$) in 9 Th. Wasser. Beide Lösungen werden bei gewöhnlicher Temperatur gleichzeitig (I) in dünnem Strahle unter Umrühren in ein Gefäss eingegossen. Der entstandene Niederschlag wird solange mit kaltem Wasser gewaschen, bis eine Probe des Waschwassers nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nur noch opalisirend getrübt wird. Man sammelt ihn alsdann auf einem leinenen Tuche oder auf einem Filter, lässt auf porösen Unterlagen absaugen und trocknet bei gewöhnlicher Temperatur.

Eigenschaften. Ein weisses oder gelblichweisses Pulver, fast geschmacklos, in Wasser und Weingeist unlöslich, löslich in Mineralsäuren, unlöslich in Essigsäure, beim Erhitzen braun werdend. — Nach dem Trocknen bei 50°C hat es die Zusammensetzung $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3 + 8\text{H}_2\text{O}$, nach dem Trocknen bei 100°C entspricht es der Formel $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3 + 4\text{H}_2\text{O}$.

Aufbewahrung. In geschlossener Flasche vor Tageslicht geschützt.

Anwendung. Wie das blaue Ferroferriphosphat. Das Ferriphosphat findet auch eine äusserliche Anwendung z. B. in Salbenform auf Krebsgeschwüre (3–5 auf 10 Fett).

Ferrum phosphoricum cum Natrio citrico **Ferri Phosphas solubilis** (U St)
Ferrum phosphoricum solubile Man löst 50 Th Ferricitrat in 100 Th destillirtem Wasser unter Erwärmen auf dem Wasserbade, fagt 55 Th unverwittertes Natriumphosphat hinzu, rührt bis zu dessen Auflösung, dunstet die Lösung bei 60° C zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet

Glanzende, grüne, durchsichtige Blättchen, leicht und völlig löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Enthalt 12 Proc metallisches Eisen

Liquor Ferri phosphorici SCHÖBEITZ		Panis martiatu8		
Liquor Ferri phosphorici acidus		Eisenbrot		
Liquor Schöbeiti		Rp	Ferri phosphoric oxydati albi	35,0
			Farinae triticeae	65,0
			Farinae secalinae alb s imae	
			Farinae secalinae grossioris	25 2000,0
			Salis cuhnaris	q s
			Fructus Cavi	
			Fructus Anisi	25 q s
Man löst unter Erwärmen, filtrirt, wäscht mit Wasser nach und dampft das Filtrat auf 20,0 ab		Man lasse vom Bäcker Brote backen.		
Einige Tropfen auf Waite in den Zahn zu bringen (bei Schmerz cariöser Zähne)		Kindern täglich zwei bis drei Schnitten mit Butter		
		100,0 enthalten circa 0,5 Ferriphosphat.		

III Ferrum pyrophosphoricum (Erganzb) **Ferripyrophosphat** **Eisenpyrophosphat** **Pyrophosphorsaures Eisenoxyd.** **Pyrophosphate de fer** **Ferri Pyrophosphas** $\text{Fe}_2(\text{P}_2\text{O}_7)_2 + 9\text{H}_2\text{O}$ Mol Gew = 908

Darstellung Eine Lösung von 84 Th Natriumpyrophosphat in 500 Th Wasser wird allmählich in eine Mischung von 126 Th Ferrichloridlösung (spec Gew 1,28—1,282) mit 800 Th Wasser unter Umrühren eingetragen. Man lasst absetzen, dekanthirt die klare Flüssigkeit und wascht den Niederschlag auf dem Filter solange aus, bis das Filtrat nach dem Ansauern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nur noch ganz wenig opalisirend getrübt wird. Man trocknet den Niederschlag auf porösen Unterlagen bei Anwendung gewöhnlicher Temperatur. Wärme ist bei der Fällung und bei dem Auswaschen unbedingt auszuschliessen. Ausbeute etwa 50 Th

Eigenschaften. Ein weissliches, geruchloses und fast geschmackloses amorphes Pulver, fast unlöslich in Wasser, löslich in verdünnter Salzsäure, sowie in einer wässrigen Lösung von Natriumpyrophosphat. Im frischgefällten Zustande wird es auch durch Ammoniakflüssigkeit und durch Ammoniumcitratlösung in Lösung übergeführt.

1 g Ferripyrophosphat löse sich in 20 cem Wasser unter Zusatz von 3 g Natriumpyrophosphat zwar langsam, aber vollkommen auf. Diese Lösung muss beim Versetzen mit überschüssiger Salpetersäure in der Kälte klar bleiben, und diese salpetersaure Lösung darf durch Baryumnitratlösung oder Silbernitratlösung nicht mehr als opalisirend getrübt werden.

Aufbewahrung Vor Licht geschützt.

Ferri Pyrophosphas solubilis (U-St) **Ferrum pyrophosphoricum solubile.** Man löst 50 Th Ferricitrat in 100 Th destillirtem Wasser unter Erwärmen auf dem Wasserbade, bringt 50 Th unverwittertes Natriumpyrophosphat hinzu, löst unter Umrühren, dunstet die Lösung bei 50° C zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet — Grüne, durchsichtige Blättchen, leicht löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Sie enthalten 10 Proc metallisches Eisen

Mistura Ferri pyrophosphorici		
Rp	1 Natrii pyrophosphorici	18 0
	2 Aquae destillatae ferricae	100 0
	3 Liquoris Ferri sesquichlorati	
	(spec Gew 1,280—1,282)	5,0
	4. Aquae destillatae frigidae	100 0

Man löst 1 in 2, lässt völlig erkalten (!), setzt die Mischung aus 3 und 4 zu und filtrirt, nachdem der entstandene Niederschlag sich wieder gelöst hat. Dreimal täglich einen Esslöffel mit Selterser Wasser

IV. Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico (Erganzb Helv)
Pyrophosphate de fer citro-ammoniacal (Gall) **Eisenpyrophosphat mit Ammoniumcitrat** Man trägt, wie unter Ferrum pyrophosphoricum angegeben ist, in eine Mischung aus 126 Th. Ferrichloridlösung (spec Gew 1,280—1,282) mit 800 Th Wasser nach Ergänzb eine Lösung von 84 Th (nach Helv von 75 Th) Natriumpyrophosphat in

500 Th Wasser ein Der ausgewaschene Niederschlag wird noch feucht in eine Lösung von 26 Th Citronensäure mit 50 Th. Wasser und 100 Th Ammoniakflüssigkeit (oder soviel von letzterer, dass sie ein wenig vorwaltet) eingetragen Die klare, event filtrirte Lösung wird in einer Porcellanschale bei nicht über 50° C zum Sirup eingedampft, dieser auf Glasplatten gestrichen und getrocknet

Grünlichgelbe Blättchen von schwachem Eisengeschmacke, leicht und vollständig in Wasser löslich, 18 Procent metallisches Eisen enthaltend — Mit Kalilauge erhitzt, giebt die wässrige Lösung unter Entweichen von Ammoniak einen rothbraunen Niederschlag — Die wässrige Lösung (1 = 10) darf auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit einen Niederschlag nicht fallen lassen und nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitratlösung höchstens opalisirend getrübt werden

Werden 0,5 g des Präparates in 2 ccm Salzsäure gelöst und mit 1 g Kaliumjodid versetzt, so sollen nach einstündigem Stehen 15—16 ccm $\frac{1}{10}$ Normal Natriumthiosulfatlösung zur Bindung des ausgeschiedenen Jods erforderlich sein Vergl S 1089 Vor Licht geschützt aufzubewahren

Sirupus Ferri pyrophosphorici **Sirap de pyrophosphate de fer** (Gall.) Ferri pyrophosphorici cum Ammonio citrico 10,0, Aquae destillatae 20,0, Sirupi Sacchari 970,0

V Ferrum phosphoricum cum Natrio pyrophosphorico **Ferrum et Natrium pyrophosphoricum** (Austr.) **Pyrophosphate de fer et de soude** (Gall.) **Natrium pyrophosphoricum ferratum.** **Natriumferripyrophosphat** **Ferro-Natrium-pyrophosphoricum.** Das Präparat ist eine lose molekulare Verbindung von Ferripyrophosphat, Natriumpyrophosphat und kleinen Mengen Natriumchlorid

Darstellung. 200 Th krystallisirtes Natriumpyrophosphat werden zu Pulver zerrieben, mit 400 Th. kaltem, destillirtem Wasser übergossen und unter beständigem Umrühren allmählich mit 120 Th Ferrichloridlösung (von 1,282 spec Gew), welche vorher mit 200 Th destillirtem Wasser verdünnt sind, versetzt, und zwar so, dass nicht eher eine zweite Portion dieser Eisenlösung zugesetzt wird, ehe nicht der vorher entstandene Niederschlag in Lösung übergegangen ist Diese Flüssigkeit wird mit 1000 Th. Weingeist gemischt, der dadurch entstandene Niederschlag mit etwas Weingeist abgewaschen, zwischen Fliesspapier ausgepresst und bei gelinder Wärme getrocknet. Ausbeute circa 125 Th

Eigenschaften. Das nach vorstehender Vorschrift bereitete Natriumferripyrophosphat bildet ein weissliches, amorphes (nicht krystallinisches) Pulver von erwärmend mild salzigem, keineswegs styptischem Geschmack, welches sich in kaltem Wasser langsam löst und damit eine blassgrünliche Lösung giebt, aus welcher es durch Weingeist wieder ausgefällt wird. Wird die Lösung bis zum Aufkochen erhitzt, so findet die Umsetzung in Orthophosphorsäure statt, und es scheidet sich weisses Fernorthophosphat ab Die Gegenwart freier Säure setzt es ebenfalls, aber langsamer, in Orthophosphat um, selbst die Kohlensäure der Luft genügt, diese Umsetzung anzubahnen Dem den Hauptbestandtheil dieser Verbindung angeblich bildenden Natrium-Ferripyrophosphat wird die Formel $\text{Fe}_2(\text{P}_2\text{O}_7)_2 + 3\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7 + 14\text{H}_2\text{O}$ zugeschrieben, doch ist diese Formel nicht völlig sicher gestellt.

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasgefässen, vor Sauredämpfen und vor Tageslicht geschützt

Anwendung. Man giebt das Natriumferripyrophosphat für sich oder in Pulver- und Pillenmischungen zu 0,2—0,5—1,0 g zwei- bis dreimal täglich In der Lösung vermeide man saure Zusätze

Ferrum pyrophosphoricum solubile. **Phosphate de fer soluble de LERAS** Ist ein Gemisch aus Ferripyrophosphat, Natriumpyrophosphat und Natriumchlorid in Lamellenform

100 Th. krystallhartes Natriumpyrophosphat werden in der 10fachen Menge destillirtem Wasser gelöst und nach und nach in kleinen Portionen unter Umrühren solange mit Ferrichloridlösung versetzt, als der dadurch entstehende Niederschlag noch in Lösung übergeht Dann setzt man noch 10 Th krystallisirtes Natriumpyrophosphat hinzu, dampft bei

gehender Wärme auf ein Drittel-Volum ein, trägt mittelst eines Pinsels die Flüssigkeit auf Glastafeln und lässt am lauwarmen Orte trocken werden Ausbeute ca 180 Th

Dieses Präparat bildet glänzende, durchscheinende, farblose oder weisse Lamellen oder Lamellensplitter Es ist in Wasser leicht löslich, damit eine fast farblose Lösung von sehr schwach salzigem und styphischem Geschmack gebend

Das LERAS'sche lösliche Eisenphosphat wird wie vorstehend bereitet, in Stelle des Ferrichlors aber Ferrisulfatlösung genommen

Liquor Ferri pyrophosphorici Natronhaltige Ferripyrophosphatlösung, enthält 1 Proc Ferripyrophosphat in Lösung 48 Th kristallisiertes Natriumpyrophosphat werden in 850 Th destillirtem Wasser gelöst und der kalten Lösung unter Umrühren allmählich 24 Th Ferrichloridlösung von 1,282 spec Gew (oder aus 12 Th kristallisiertem Ferrichlorid), verdünnt mit 50 Th destillirtem Wasser, zugesetzt Nachdem der entstandene Niederschlag nach mehrstündiger Maceration in Lösung übergegangen ist, werden noch 2 Th kristallisiertes Natriumpyrophosphat hinzugegeben und gelöst, endlich filtrirt und das Filtrat bis auf 1000 Th mit destillirtem Wasser verdünnt

Solution de LERAS, Phosphate de fer soluble de LERAS, eine französische Specialität, wird wie die Ferripyrophosphatlösung dargestellt und aus 10,0—12,0 kristallisiertem Natriumpyrophosphat, 15,0 Ferrisulfatlösung von 1,817 spec Gew und soviel destillirtem Wasser bereitet, dass die Lösung 1000,0 beträgt

Sirupus Ferri pyrophosphorici LERAS Sirop de LERAS Eine Lösung von 0,5 Natriumbicarbonat, 1,0 des Natriumferripyrophosphats in 50,0 Sirupus Sacchari und 50,0 Sirupus Auranti florum Ein kalkhaltiges Wasser zu den Sirupen ist zu vermeiden.

Vinum Chinæ ferratum FORESTIER.

Rp	1 Ferri pyrophosphorici		Man bereitet durch Digestion eine Lösung von
2	Acidi citrici	ss 5,0	1—5, anderseits stellt man einen Auszug von
3	Natrii pyrophosphorici	10,0	6—8 dar, vermischt beide und filtrirt nach einigen
4	Glycerini	50,0	Tagen
5	Vini Hispanici	200,0	
6	Corticis Chinæ	50,0	Bei kachektischen, anæmischen, chlorotischen
7	Corticis Auranti fructus	15,0	Leiden täglich drei bis viermal ein halbes Wein-
8	Vini Hispanici	750,0	glas

Lac Ferri (Hamb Vorschr) **Lac Ferri pyrophosphorici** (Ergänz) **Eisenmilch.** Man löst 2 Th Natriumpyrophosphat in 40 Th Wasser und 5 Th Glycerin, filtrirt und bringt nach und nach unter Umrühren eine Mischung von 3 Th Ferrichloridlösung (spec Gew = 1,282) und 40 Th Wasser hinzu und fällt mit Wasser zu 100 Th auf

Lac Ferri cum Calcio phosphorico (Hamb Vorschr) Zu einer Lösung von 100 g Natriumpyrophosphat in 2 Liter Wasser werde eine Mischung von 100 g Ferrichloridlösung (spec Gew 1,282) und 50 g einer Calciumchloridlösung (1+2) sowie 2 Liter Wasser gegossen Der entstandene Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, nach völligem Abtropfen wiederholt mit geringen Mengen Wasser gewaschen und mit 0,5 g Natriumpyrophosphat, 400 g weissem Sirup und soviel Wasser angerührt, dass man 2 Liter enthält.

Elixir Ferri Pyrophosphatis (Nat form)

Rp	Ferri pyrophosphoricum	
	solubilis (U-St)	35,0 g
	Aquæ destillatæ	80 ccmm
	Elixir aromatici q s	ad 1 Liter

Pyrophosphorsaures Eisenwasser Auf 125 Liter mit Kohlensäure imprägnirtes destillirtes (!) Wasser giebt man eine filtrirte Lösung von 180,0 g Natriumpyrophosphat in 3250,0 g Wasser, sowie 90,0 g Ferrichloridlösung (spec Gew 1,282) mit 225,0 g Wasser Das Natriumpyrophosphat wird in der vorgeschriebenen Menge Wasser gelöst und in die völlig erkaltete (!) Lösung wird die Eisenlösung tropfenweise (!) unter Umschütteln eingetragen Die erhaltene Lösung ist zu filtriren Sind die Lösungen warm, so löst sich der zuerst entstehende Niederschlag nicht mehr auf, sondern man erhält eine bleibende Fällung Das pyrophosphorsaure Eisenwasser ist mit destillirtem Wasser zu bereiten, weil es mit gewöhnlichem Wasser bereitet nach einiger Zeit Niederschläge bildet Die Flaschen sind vor dem Einfüllen des fertigen Wassers in einer pneumatischen Wanne mit Kohlensäure zu füllen

VI Ferrum hypophosphorosum Man hat ein Oxydsalz und ein Oxydsalz des Eisens mit der unterphosphorigen Säure zu unterscheiden

Ferrum hypophosphorosum (hypophosphoricum) oxydulatum. Hypophosphis ferrosus. Ferrohypophosphit $\text{Fe}(\text{PO}_2\text{H}_2)_2$ Mol Gew. = 186

Darstellung. 10,0 Calciumhypophosphit und 16,4 krystallisiertes Ferrosulfat nebst 50,0 kaltem destillirtem Wasser werden in einer Flasche gemischt und eine Stunde macerirt, die Flüssigkeit durch Filtration gesondert und bei sehr gelinder Wärme abgedampft. Ausbeute ca 11 Th

Eigenschaften. Ein grüngelbliches krystallinisches, der Zersetzung ungernein leicht unterworfenen Pulver. Wegen letzteren Umstandes ist von dem Gebrauche desselben abzurathen.

Anwendung. Ein recht überflüssiges Präparat, welches besonders bei Phthisis grosse Erfolge sichern soll. Es dürfte durch ein Gemisch aus Ferrochlorid und Calciumhypophosphit zu gleichen Theilen jederzeit ersetzt werden.

Ferrum hypophosphorosum oxydatum. Ferri Hypophosphitis (U-St.) Unterphosphorigsaures Eisenoxyd. $\text{Fe}_2(\text{PH}_2\text{O}_2)_4$, Mol Gew = 502. Man löst 100 Th kryst. Ferri-Ammoniumsulfat in 400 Th Wasser, andrerseits 67 Th Natriumhypophosphit in 125 Th Wasser und mischt beide Lösungen unter Umrühren. Man wäscht den entstandenen Niederschlag, bis das ablaufende Waschwasser ohne Geschmack ist, und trocknet schliesslich an einem warmen Orte.

Ein grauweisses, geruchloses und fast geschmackloses Pulver, an der Luft beständig. Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Salzsäure. Eine Lösung von Natriumcitrat nimmt es mit grünllicher Färbung auf. Im Glasrohre stark (I) erhitzt, entwickelt es selbstentzündlichen Phosphorwasserstoff. In verdünnter Essigsäure muss es sich ohne Rückstand auflösen (Ferriphosphat), diese essigsäure Lösung darf mit Ammoniumoxalat keinen weissen, in Salzsäure löslichen Niederschlag (Calcium) ausscheiden.

Aqua Ferri nervina Wolff & Calmberg. Enthält nach Krukenberg in 10000 Th Ferrokarbonat 1,50, Calciumphosphat 20,57, Natriumchlorid 23,29, Natriumbikarbonat 9,97. Man wird es demnach nachzubilden haben aus Ferrochlorid ($\text{FeCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$) 2,1, Natriumphosphat (Na_2PO_4) 21,75, Calciumchlorid (CaCl_2) 20,72, Calciumkarbonat 1,3, Natriumbikarbonat 12,17, Kohlensaures Wasser 10000,0. Man vergl. S 343.

Elisir Cinchonae et Ferri (Nat. form)

Rp Ferri phosphorici solubilis (U-St.)	80,0 g
Aquae	60,0 ccm
Elisir Quininae compositi (Nat. form) s S 785 q s ad 1 Liter	

Elisir Cinchonae, Ferri et Bismuti (Nat. form)

Rp Bismuti Ammonio-citrici s S 487	17,5 g
Aquae fervidae	30,0 g
Liquoris Ammonii caustici q s.	
Elisir Cinchonae et Ferri (s vorher) q s ad 1 Liter	
Ammoniakflüssigkeit ist nur soviel zuzusetzen als erforderlich ist, um das Wismutsalz in Lösung zu bringen.	

Elisir Cinchonae, Ferri et Calci Lactophosphatis (Nat. form)

Rp Calci lactici	8,5 g
Acidi phosphorici (85 Proc. H_3PO_4)	4 ccm
Liquoris Ammonii caustici (10 Proc.)	32 ccm
Acidi citrici	16,0 g
Elisir Cinchonae et Ferri (s oben) q s ad 1 Liter	

Elisir Ferri Phosphatis (Nat. form.)

Rp Ferri phosphorici solubilis (U-St.)	85,0 g
Aquae	60,0 ccm
Elisir aromatici q s ad 1 Liter	

Elisir Ferri Phosphatis, Quininae et Strychninae (Nat. form)

Rp Ferri phosphorici solubilis (U-St.)	17,5 g
Chinini puri	8,75 g
Strychnini puri	0,275 g
Spiritus (94 Vol Proc.)	180,0 ccm
Elisir aromatici q s ad 1 Liter	

Elisir Ferri Hypophosphitis (Nat. form)

Rp. Liquoris Ferri Hypophosphitis (Nat. form)	100 ccm
Elisir aromatici	800 ccm

Liquor Ferri Hypophosphitis (Nat. form)

Rp Ferri-Ammonii sulfurei (Eisensaun s S 1148)	530,0 g
Natru hypophosphorosi	220,0 g
Kali citrici	215,0 g
Glycerini	150,0 ccm
Aquae q s. ad 1 Liter	

Pulvis Ferri Phosphatis effervescentis (Nat. form)

Rp Ferri phosphorici solubilis (U-St.)	24,0
Natru bicarbonid	356,0
Acidi tartarici	530,0
Sacchari	280 0

Sirupus Phosphatum compositus (Nat. form)

Chemical food	
Rp Calci carbonid	85,0 g
Ferri phosphorici solubilis (U-St.)	
Ammonii phosphorici	2a 17,5 g
Kali bicarbonid	
Natri bicarbonid	25 4,0
Acidi citrici	60,0
Glycerini	65,0 ccm
Acidi phosphorici (50 Proc.)	125,0 ccm
Aquae Aurantii florum	125,0 ccm
Tincturae Persaeonis	14,0 ccm
Sacchari	525,0 g
Aquae q s ad 1 Liter	

Sirupus Ferri Hypophosphitis (Nat. form)

Rp. Ferri hypophosphorosi (U-St.)	17,5 g
Kali citrici	25,0 g
Aquae Aurantii florum	65,0 ccm
Sirupi Sacchari q s ad 1 Liter	
Man beachte, dass dieser Sirup das Ferrihypophosphit enthält.	

Sirupus Ferri hypophosphorosi (Ergänzb. Hamb. V.)		Acidi hydrochlorici (12,5 Proc.) 1,0	
Rp. 1 Ferri sulfuri crystall	3,0	Spiritus diluti (70 Vol. Proc.) 9,0	
2 Aquae	4,5	Glycerini 12,0	
3 Acidi phosphorici (25 Proc.)	3,0	Sirupi Ferri hypophosphorosi 32,0	
4 Calci hypophosphorosi	2,05	Sirupi Calci hypophosphorosi 650,0	
5 Sirupi Sacchari	q s	II Nat. form.	
Man bereitet eine Lösung von 1—3, trägt 1 ein. Nach 5 Minuten wird der entstandene Niederschlag durch Kolieren und Pressen entfernt 1 Th des Filtrates mit 8 Th Sirupus Sacchari gemischt. Man beachte, dass dieser Sirup Ferri hypophosphit enthält.		Rp Calci hypophosphorosi	30,0 g
Sirupus Hypophosphitum compositus. I Hamb. Vorschr.		Natrii hypophosphorosi	33 17,5 g
Rp Chinini sulfuri	1,0	Ferri hypophosphorosi (U. St.)	
Extracti Strychni	2,0	Mangani hypophosphorosi	2,25 g
		Kali citrici	5,0 g
		Acidi citrici	2,0 g
		Chinini hydrochlorici	1,125 g
		Tincturae Strychni	22,5 ccm
		Sacchari	77,0 g
		Aquae	q s ad 1 Liter

Ferrum sesquichloratum.

I Ferrum sesquichloratum anhydricum Wasserfreies Ferrichlorid Wasserfreies Eisenchlorid. Perchlorure de fer. Ferri Chloridum Fe_2Cl_6 . Mol. Gew. = 325.

Dieses Präparat wird durch Erhitzen von Eisendraht in einem Strome trockenen Chlorgases erhalten und stellt kantharidenglanzende Krystallblättchen (etwa wie krystall Fuchsin) dar. Sie sind sehr hygroskopisch und in Wasser, Alkohol und Aether leicht löslich, doch wird es in atherischer Lösung unter dem Einfluss des Lichtes leicht zu Eisenchlorür reducirt. Die durch Zerfließen dieser Krystalle an der Luft entstehende Flüssigkeit heisst früher *Oleum martis per deliquium*. Das wasserfreie Eisenchlorid ist lediglich ein Sammlungspräparat, welches praktisch kaum verwendet wird.

II Ferrum sesquichloratum (Germ.) Ferrum sesquichloratum crystallisatum (Austr.) Ferri Chloridum (U-St.) Gelbes, krystallisiertes Eisenchlorid oder Ferrichlorid Ferrum perchloratum crystallisatum. Ferrum muriaticum oxydatum crystallisatum $\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 12\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 541

Zur Darstellung bringt man 1000 Th Ferrichloridlösung von 1,280—1,282 spec. Gew. in eine Porcellanschale, dampft sie in dieser auf 483 Th. ein und lässt diesen Rückstand unter Bedecken der Schale an einem kühlen, trockenen Orte erkalten. Binnen 1—2 Tagen erstarrt die Flüssigkeit zu einer gelben, krystallinischen Masse. Sobald sie vollständig fest geworden ist, wärmt man die Schale über einer Flamme rasch an, nimmt den ganzen Kuchen heraus, zerstoest ihn in einem kalten, trockenen Porcellanmörser zu Stücken und bringt diese in trockne Gefässe, welche sogleich zu verstopfen und mit Paraffin zu dichten sind.

Eigenschaften Gelbe, strahlige, drusig oder warzig krystallinische Massen, sehr hygroskopisch, an der Luft zerfließlich, durch Sonnenlicht werden sie zum Theil zu Ferrochlorid reducirt. Schmelzpunkt zwischen 35 und 40° C. Sie lösen sich leicht in Alkohol und in Wasser, auch in Aetherweingeist, die Lösungen reagiren sauer. Das Präparat besteht aus 60 Proc. wasserfreiem Ferrichlorid Fe_2Cl_6 und 40 Proc. Wasser. Die Lösung von 1 Th des Präparates in 1 Th Wasser entspreche in ihrer Reinheit den bei Liquor Ferri sesquichlorati gestellten Anforderungen.

Aufbewahrung. In mit Korken dicht verschlossenen Gefässen unter Paraffindichtung an einem kühlen Orte, vor Licht geschützt.

Anwendung. Insbesondere zur Darstellung von Pillenmassen.

Ferrum sesquichloratum crystallisatum rubrum Wasserarmes krystallisiertes Ferrichlorid $\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 6\text{H}_2\text{O}$ oder $5\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 433 bez. 415. Dieses Salz wird erhalten, wenn man die oben erwähnte gelbe Krystallmasse $\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 12\text{H}_2\text{O}$ über Schwefelsäure sich selbst überlässt. Die Krystallmasse wird alsdann zunächst wieder flüssig und

bei weiterem Abdunsten von Wasser scheiden sich alsdann aus der Lösung rothe warzenartige Krystallmassen der Zusammensetzung $\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 5\text{H}_2\text{O}$ (auch $6\text{H}_2\text{O}$) aus. Es entsteht ausserdem direkt, wenn man eine Eisenchloridlösung über die vorher angegebene Konzentration von 60 Proc. Fe_2Cl_6 hinaus an einem warmen Orte abdunsten lässt.

Dieses Salz ist nicht das von den Pharmakopoen recipirte, es findet sich zuweilen zufällig in geringeren oder grösseren Mengen in dem officinellen gelben Salze, wenn die Ferrochloridlösung zuweit eingedampft worden war.

III Liquor Ferri sesquichlorati (Germ.) **Ferrum sesquichloratum solutum** (Anstr. Helv.) **Chlorure ferrique dissous** (Gall.) **Liquor Ferri Chloridi** (U-St.) **Liquor Ferri Perchloridi** (Brit.) **Liquor Ferri perchlorati** **Liquor Ferri muratici oxydati** **Oleum Martis** **Liquor stypticus Looffii**. **Eisenchloridflüssigkeit** **Ferrichloridflüssigkeit**. **Eisenol**.

Die von den verschiedenen Pharmakopoen aufgenommenen Präparate enthalten verschiedene Mengen von Ferrichlorid.

Darstellung Diese erfolgt durch Oxydation von Ferrochloridlösung und zwar mittels Chlor oder Königswasser. Bei der Darstellung verfolgt man das Ziel, eine möglichst neutrale Ferrichloridlösung zu gewinnen, welche frei ist von Salpetersäure oder freiem Chlor und möglichst frei von freier Salzsäure und basischem Ferrichlorid. Dies ist der Grund, weshalb man zunächst das krystallisirte Salz darstellt.

125 Th abgeriebenen Eisendraht (ziemlich genau gewogen) übergiesse man in einem langhalsigen Kolben in mehreren Antheilen, so dass kein Ueberschaumen stattfindet, mit 525 Th Salzsäure von 25 Proc. HCl. Wenn die Einwirkung der Säure auf das Eisen in der Kälte nachlässt, so führt man die Reaktion durch Erwärmung auf dem Wasser oder Sandbade zu Ende. (Man hüte sich, den entweichenden Wasserstoff einzuathmen oder zur Entzündung zu bringen.)

Nachdem die Salzsäure mit Eisen gesättigt ist, wird die warme (!) Lösung in ein tarirtes, zuvor mit Wasser genüsses Filter gegeben, und der Eisenrest mit dem letzten Theile der Lösung, zuletzt mit etwas heissem (!) destillirtem Wasser in das Filter gespült. Das Filter wird mit warmem (!) Wasser mit Hilfe einer Spritzflasche völlig ausgewaschen und dann mit seinem Inhalte getrocknet, um durch Nachwägen das Gewicht des in Lösung gegangenen Eisens zu erfahren. Waren gerade 100 Th Eisen gelöst worden, so sind dem Filtrate 260 Th Salzsäure von 25 Proc. HCl und 135 Th Salpetersäure von 25 Proc. HNO_3 zuzusetzen. Waren nur 98 Th Eisen gelöst worden, so musste der Zusatz berechnet werden $100 : 260 = 98 : x (= 254,8)$ und $100 : 135 = 98 : x (= 132,3)$. Es wären in diesem Falle also 254,8 Th Salzsäure und 132,3 Th Salpetersäure hinzuzusetzen.

Man giebt das Filtrat, die Ferrochloridlösung, in einen Glaskolben¹⁾ mit nicht zu langem Halse, welcher bis zu $\frac{1}{6}$ damit angefüllt sein kann, setzt zur Ueberführung in Ferrichlorid die vorgeschriebenen Mengen Salzsäure und Salpetersäure hinzu, verschliesst die Kolbenöffnung mit einem Glasrichter und erhitzt im Wasserbade oder Sandbade bis auf ca. 90°C . Die hier sich freimachenden Dämpfe und Gase hute man sich einzuathmen. Zur Prüfung, ob die Chlorirung (Oxydation) der Ferrochloridlösung vollendet ist, beräute man sich eine sehr verdünnte Lösung eines oberflächlich abgewaschenen Krystalls von Kalumferricyanid. In diese lässt man einige Tropfen des Kolbeninhaltes fallen. Zeigt sich nun keine Blaufärbung mehr, so ist die Ueberführung des Ferrochlorids in Ferrichlorid beendet.

Nunmehr wird der Kolbeninhalt in eine tarirte Porcellanschale gebracht und soweit eingedampft, dass für je 100 Th des gelösten Eisens = 483 Th Rückstand verbleiben. Ist dieser Punkt erreicht, so verdünnt man die Flüssigkeit mit Wasser, dampft wiederum bis auf 483 Th ein und wiederholt dieses Verfahren so oft, bis sich nach der unter „Prüfung“ angegebenen Reaktion mit Schwefelsäure und Ferrosulfat Salpetersäure nicht mehr nachweisen lässt. Das wiederholte Abdampfen hat den mehrfachen Zweck, den vorhandenen Ueberschuss von Salpetersäure (bez. freiem Chlor und Oxyden des Stickstoffs), aber auch die vorhandene freie Salzsäure zu entfernen. Dieser Zweck wird allerdings erreicht, zugleich aber werden kleine Mengen Ferrichlorid unter Abspaltung von Chlorwasserstoff in Ferrihydroxyd verwandelt, so dass die von Salpetersäure und freier Salzsäure befreite Ferrichloridlösung schliesslich etwas Ferrioxychlorid enthält. Indessen verfolgt die Vorschrift die Absicht, eine Ferrichloridlösung darzustellen, welche keinesfalls

¹⁾ Man beachte, dass Brit. einen **Liquor Ferri perchloridi** und einen **Liquor Ferri perchloridi fortis** kennt.

²⁾ Hier ist absichtlich ein Kolben (nicht eine Schale) vorgeschrieben, weil in diesem die entwickelten Dämpfe von Stickoxyd wieder zu Untersalpetersäure regenerirt zurückfliessen und nicht unausgenutzt in die Luft entweichen.

freie Salzsäure, Salpetersäure, freies Chlor oder Oxide des Stickstoffs enthalten darf, während ein geringer Gehalt an Ferroxychlorid als weniger störend mit in Kauf genommen wird. Hat der Versuch gezeigt, dass die Lösung Salpetersäure nicht enthält, so dampft man, wenn nöthig, nochmals ein und verdünnt den noch heissen Rückstand mit so viel Wasser, dass das Gesamtgewicht das Zehnfache der angewendeten Eisenmenge beträgt und das spec Gewicht bei 15° C = 1,280 bis 1,282 ist.

Ein anderes, weniger bequemes Verfahren der Darstellung besteht in der Chlorirung der Ferrochloridlösung durch Chlorgas. Die oben aus 100 Th Eisen gewonnene Ferrochloridlösung wird bis auf 800 Th mit destillirtem Wasser verdünnt, bis auf 60–80° C erwärmt, und in dieselbe so lange Chlorgas eingeleitet, bis die Eisenlösung sich gegen Kaliumferriocyanid indifferent verhält. Leitet man das Chlorgas in eine kalte oder zu konzentrierte Ferrochloridlösung, so geht die Chlorirung nur langsam vor sich, und ein Theil Chlorgas geht sogar unausgenutzt durch die Eisenlösung und entweicht. Nach vollendeter Chlorirung muss die Flüssigkeit durch Aufkochen von freiem Chlorgas befreit werden. Für die Ferrochloridlösung aus 100 Th Eisen ist das Chlor aus 450 Th 29proc roher Salzsäure und 95 Th Braunstein erforderlich.

Eigenschaften Die Ferrichloridlösung der Pharmakopoen ist eine gelbbraune, sauer reagirende Flüssigkeit, fast ohne Chlor- oder Salzsäureruch. Sie lässt sich in jedem Verhältnisse mit Wasser, Weingeist und Glycerin mischen. Durch kleine Mengen von Alkalien entsteht nur eine rothbraune Färbung der Lösung, infolge Bildung von Ferroxychlorid, durch Alkalien (KOH, NaOH, NH₄ OH) im Ueberschuss werden je nach den eingehaltenen Bedingungen verschiedene Ferrihydroxyde erhalten. Bezüglich der Concentration stellen die einzelnen Pharmakopoen folgende Anforderungen:

	Austr.	Brit.	Gall.	Germ.	Helv.	U.-S.
Spec Gew bei 15° C	1,28	1,11	1,26	1,280–1,282	1,28–1,29	1,287
Proc metall. Eisen	10,0	4,50	8,96	10,0	10,0	13,0
Proc Fe ₂ Cl ₆	29,0	13,0	26,0	29,0	29,0	37,8
Proc Fe ₂ Cl ₆ + 12H ₂ O	48,2	21,6	43,3	48,2	48,2	62,9

Liquor Ferri perchloridi fortis (Brit.) Hat das spec Gew 1,42 und soll in 100 cem = 22,5 g Eisen enthalten. In Gewichtsprocenten demnach 15,84 metallisches Eisen oder 45,9 Proc wasserfreies Ferrichlorid oder 76,5 Proc Fe₂Cl₆ + 12H₂O. Indessen stimmen diese Procentangaben mit dem specifischen Gewichte nicht überein.

Gehaltstabelle der Lösungen des wasserfreien und krystallisirten Ferrichlorids.
Temperatur 17,5° C (nach HAGEN)

Spec Gew	Proc Fe ₂ Cl ₆	Proc Fe ₂ Cl ₆ + 12H ₂ O	Spec Gew	Proc Fe ₂ Cl ₆	Proc Fe ₂ Cl ₆ + 12H ₂ O	Spec Gew	Proc Fe ₂ Cl ₆	Proc Fe ₂ Cl ₆ + 12H ₂ O
1,570	60	100,0	1,415	40	66,6	1,180	20	33,3
1,559	59	98,2	1,403	39	64,9	1,170	19	31,6
1,548	58	96,4	1,390	38	63,2	1,160	18	29,9
1,536	57	94,8	1,376	37	61,5	1,150	17	28,3
1,524	56	93,2	1,364	36	59,9	1,140	16	26,6
1,512	55	91,5	1,352	35	58,2	1,131	15	24,9
1,500	54	89,8	1,340	34	56,6	1,123	14	23,3
1,587	53	88,2	1,328	33	54,9	1,113	13	21,6
1,573	52	86,4	1,316	32	53,2	1,104	12	19,9
1,560	51	84,8	1,304	31	51,6	1,095	11	18,3
1,547	50	83,2	1,292	30	49,9	1,087	10	16,6
1,533	49	81,5	1,280	29	48,2	1,078	9	14,9
1,520	48	79,9	1,268	28	46,6	1,069	8	13,3
1,507	47	78,2	1,256	27	44,9	1,060	7	11,6
1,494	46	76,5	1,245	26	43,2	1,051	6	9,9
1,481	45	74,9	1,234	25	41,6	1,042	5	8,3
1,469	44	73,2	1,223	24	39,9	1,033	4	6,6
1,454	43	71,6	1,212	23	38,3	1,025	3	4,9
1,441	42	69,9	1,202	22	36,6	1,016	2	3,3
1,428	41	68,2	1,191	21	34,9	1,008	1	1,6

Das spec Gew der Lösungen vermehrt oder vermindert sich zwischen 8–24° C bei Ab- und Zunahme der Wärme um 1° C bei einem Gehalt an wasserfreiem Chlorid.

von 50—60 Proc	durchschn	um 0,0008	von 30—39 Proc	durchschn	um 0,0005
„ 45—49 „	„	„ 0,0007	„ 20—29 „	„	„ 0,0004
„ 40—44 „	„	„ 0,0006	„ 10—19 „	„	„ 0,0003

Prüfung Die Reinheit des Präparates stellt man in folgender Weise fest

1) Breitet man über einer Glasscheibe einige Tropfen Eisenchloridlösung aus und hält über dieselbe einen mit Ammoniaklösung benetzten Glasstab, so sollen nicht Nebel entstehen. Bei einem erheblichen Gehalte an freier Salzsäure entstehen augenblicklich dichte Nebel von Salmiak — 2) Hält man über die Öffnung des die Eisenchloridlösung enthaltenden Gefäßes ein Stück mit Zinkjodidstärkelösung befeuchtetes Papier, so darf dasselbe nach 2 Minuten nicht blau gefärbt werden, andernfalls enthält das Präparat freies Chlor (Man achte darauf, dass nicht Eisenchloridlösung in Substanz auf das Papier gelangt) — 3) Nach dem Ansehern mit Salzsäure darf sie mit 20 Th Wasser verdünnt durch Ferncyankalum nicht sogleich gebläut werden (Ferrosalz) — 4) Man verdünnt eine Probe mit Wasser und fällt mit Aetzammon im Ueberschuss. Das Filtrat ist farblos (bei Gegenwart von Kupfer ist es vielleicht bläulich). Ein Theil desselben darf beim Eindampfen und Glühen keinen Rückstand hinterlassen (feuerbeständige Stoffe), ein anderer Theil auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser weder eine weisse (Zink), noch eine gefärbte Trübung oder Fällung (Kupfer und andere Metalle) veranlassen. Ein dritter Theil des Filtrats mit Salzsäure schwach angesäuert, darf auf Zusatz von Chlorbaryumlösung keine weisse Trübung (Schwefelsäure) geben. Ein vierter Theil des Filtrats wird bis zum Verschwinden des Ammoniakgeruchs erwärmt. Wird die erkaltete (1) rückständige Flüssigkeit mit dem gleichen Volumen conc. Schwefelsäure gemischt und diese Mischung mit Ferrosulfatlösung überschichtet, so soll keine braune Zone entstehen (Salpetersäure) — 5) Auf zu hohen Gehalt an Ferroxychlorid prüft man durch Aufkochen der Lösung. Es darf alsdann keine Trübung auftreten — 6) Auf Arsen prüft man am sichersten im Marsh'schen Apparate, s S 404. Weniger genau mit BERTENDORF's Reagens. Wird 1 ccm Eisenchloridlösung mit 3 ccm Zinnchloridlösung versetzt, so geht zunächst die Dunkelfärbung der Flüssigkeit in Hellgrün über, indem Ferrochlorid gebildet wird. In dieser Flüssigkeit darf innerhalb 1 Stunde eine Färbung sich nicht zeigen, andernfalls ist Arsen zugegen.

Bestimmung des Eisengehaltes. Man wägt (1) 2,5 g des Liquors ab, verdünnt mit Wasser, fällt mit Ammoniak unter Erwärmen, filtrirt, wäscht aus, trocknet den Niederschlag, glüht ihn und wägt das vorhandene Eisenoxyd. Gefundenes $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0,700$ = metallisches Eisen. Gefundenes $\text{Fe}_2\text{O}_3 > 2,031$ = wasserfreies Ferrichlorid Fe_2Cl_6 . Gefundenes $\text{Fe}_2\text{O}_3 > 3,3812$ = krystalisiertes Ferrichlorid $\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 12\text{H}_2\text{O}$.

Aufbewahrung. In Glasflaschen mit Glasstopfen vor Tageslicht geschützt, weil durch Belichtung das Ferrichlorid zu Ferrochlorid reducirt wird. Man achte darauf, dass die Stopfen der Gefässe nach jedesmaligem Gebrauche gereinigt werden, weil sonst an Hals und Stopfen durch den Ammoniakgehalt der Zimmerluft haseliche Ausscheidungen von Eisenhydroxyden entstehen.

Anwendung. Eisenchloridlösung ist ebenso wie das feste Eisenchlorid das kräftigste der Eisenoxysalze. Sie koagulirt Eiweiss, wirkt daher im conc. Zustande auf Schleimhäuten und Wunden atzend, in starker Verdünnung adstringirend. Innerlich erzeugt sie in conc. Form heftige Magenentzündung. In starker Verdünnung zeigt sie allgemeine Eisenwirkung, stört aber die Verdauung. Man benutzt sie Aeusserlich als Aetzmittel bei widem Fleisch, Kondylomen, Diphtherie, als blutstillendes Mittel, verdünnt zu adstringirenden Injektionen. Innerlich nur selten und dann entweder in Form von Tropfen oder von Pillen.

Eisenchlorid verträgt sich nicht mit Natriumkarbonat, Tannin, gerbstoffhaltigen Aufgüssen, Schleimen, Gummi arabicum, Opium, Morphin, Scacale cornutum, Ergotin, Eiweissstoffen, Quecksilbersalzen, Arsenik, Brechweinstein, Schwefelantimon etc. Helv giebt für die Eisenchloridlösung als Höchstgaben 1,0 g *pro dosi*, 4,0 g *pro die*.

Aether martiatus
Aether Ferri martiatici.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 5,0
 Aethers 20,0
 Man lässt einen Tag unter häufigem Umschütteln stehen und giesst dann den Aether ab.

Bacilli e Ferri sesquichlorato MARTY
 Rp Ferri sesquichlorati crystallati
 Radices Althaeae aa 1,0
 Glycerini q s.
 Ist bacillum unum Doses V
 Bei chronischer Metritis Uteruskatarrh.

Collodium ferratum
 Collodium martiatum Collodium haemostaticum, Collodium stypticum.
 Rp Ferri sesquichlorati crystall 2,0
 Collodii 18,0
 Aeusserlich, als blutstillendes Mittel

Gossypium haemostaticum (Ergänzb.)
Gossypium stypticum (Nat. form.)
Eisenchloridwatte
 Ergänzb Nat. form.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati (Ergänzb = 1,387, Nat form = 500,0 500,0
 Aqueae 1100,0 500,0
 Gossypii depurati 1000,0 500,0
 Glycerini — 500,0

Glycerolatum martiatum CLAR.
 Glycerinum cum Ferri sesquichlorato
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 2,5
 Glycerini 37,5
 Halbstündlich 1 Kaffeelöffel voll bei Group, Diphtherie.

Linimentum martiatum.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 20,0
 Aqueae destillatae
 Glycerini aa 50,0
 Bei Krampfadern, Blutadern, Varices, jeden 3 bis 4. Tag das auf Leinwand gestrichene Liniment aufzupressen.

Liquor aureus contra perniones.
Golden-Frostapiritus
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 20,0
 Spiritus diluti 30,0
 Die Frostanschwellung morgens und abends zu bestreichen. Man lasse $\frac{1}{2}$ Stunde trocknen und verbinde das Glied mit Watte

Liquor haemostaticus ADRIAN
Haemostaticum JAHSEN
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 15
 Salis cubensis aa 100
 Aqueae destillatae 300
Mixtura antihæmoptotica OPPOLZER.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 150,0
 Aqueae destillatae 150,0
 Sirupi Papaveris 30,0
 Tincturae Opi simplicis 0,3
 Halbstündlich einen Esslöffel voll

Tinctura Ferri ammoniata
Tinctura Martis aperitiva Aroph
Paracelsi
 Rp Ammonii chlorati ferrati 5,0
 Spiritus diluti (70 Vol Proc.) 20,0
 Man löst durch Digeriren und filtrirt mehrmals täglich 30—40 Tropfen

Tinctura Ferri Citro Chloridi (Nat. form.).
Tasteless Tincture of Iron
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati (1,387) 250,0 ccm
 Natrii citrici 400,0 g
 Spiritus (94 Vol Proc.) 1000 g
 Aqueae destillatae q s ad 1 Liter

Tinctura Ferri sesquichlorati
Tinctura Ferri martiatici oxydati.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 5,0
 Spiritus diluti (70 Vol Proc.) 20,0

Unguentum Ferri sesquichlorati
Unguentum haemostaticum
 Rp Ferri sesquichlorati crystallisati 5,0
 Aqueae destillatae 1,0
 Adipis 20,0

Unguentum contra combustiones STARR.
STARR'sche Brandsalbe.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 2,0
 Vasellini 16,0

Vet. Collodium stypticum
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 5,0
 Collodii 50,0

Zum Bepinseln der Geschwüre am Ohr und an der Schwefspitze

Vet. Liquor vulnerarius stypticus.
 Rp Liguoris Ferri sesquichlorati 10,0
 Aluminii sulfurici 5,0
 Acidi benzoici e Toluolo 1,5
 Aqueae communis 150,0

Damit befeuchtete Charpie oder Leinwand in die Wunde zu legen.

IV Tinctura Ferri chlorati aetherea. Spiritus aethereus martiatus. Liquor anodynus martiatus Tinctura nervina BESTUSCHEFF Tinctura tonico-nervina BESTUSCHEFF Tinctura aurea LAMOTTE BESTUSCHEFF's Nerventropfen. LAMOTTE's Goldtropfen. Die von den einzelnen Pharmakopoen gegebenen Vorschriften weichen zwar in den Mengenverhältnissen von einander ab Sie stimmen aber zum Theil darin überein, dass man die Mischungen in langen cylindrischen, gut verstopften Flaschen zunächst dem Sonnenlichte aussetzen soll, bis sie farblos geworden sind. Dann soll man sie an einem dunklen Orte unter öfterem Lüften des Stopfens lassen, bis sie wieder goldgelbe Färbung angenommen haben Die einzelnen Vorschriften lauten

Austr. Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus Ferri sesquichlorati crystallati ($\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 12\text{H}_2\text{O}$) 15,0, Spiritus Aetheris (0,820) 180,0 Im Sonnenlicht entfärben, dann wieder gelb werden lassen

Brit. Tinctura Ferri perchloridi Liguoris Ferri sesquichlorati fortis (spec Gew = 1,42) 250 ccm, Spiritus von 90 Proc 250 ccm, Aqueae q s ad 1 Liter Durch einfaches Mischen zu bereiten

Germ Tinctura Ferri chlorati aetherea Aetherische Chloresisentinktur Liquoris Ferri sesquichlorati (spec Gew 1,280—1,282) 1,0, Aethers 2,0, Spiritus 7,0 Im Sonnenlicht entfärben, dann wieder gelb werden lassen

Helv Spiritus aethereus ferratus Liquoris Ferri sesquichlorati (Spec Gew 1,28—1,29) 1,0, Spiritus aetherei 9,0 Im Sonnenlicht entfärben und wieder gelb werden lassen

U-St. Tinctura Ferri chloridi Liquoris Ferri sesquichlorati (spec Gew 1,387) 250 cem Spiritus (94 Vol Proc) q s ad 1 Liter Die Mischung soll vor der Abgabe mindestens drei Monate stehen, dann vor Licht geschützt in Glasstopfenflaschen aufbewahrt werden

Tinctura Ferri Chloridi aetherea Nat. Form ist = Tinctura Ferri chlorati aetherea Germ

Man giebt diese mehrmals täglich zu 10—20—30 Tropfen in einem Glase voll Zuckerwasser bei Chlorose und Nervenschwäche

Sirup de perchlorure de fer (Gall) Liquoris Ferri sesquichlorati (spec Gew 1,26) 15,0, Sirupi Sacchari 985,0

V Ammonium chloratum ferratum Eisensalmiak (Germ Helv) Chlorure de fer et d'ammonium. Ammonium muriaticum martiatum Flores Salis ammoniaci martiales. Ist keine chemische Verbindung, sondern eine galenische Mischung

Germ Ammonii hydrochlorici 32,0 Th werden in einer Porcellanschale mit Liquoris Ferri sesquichlorati (1,280—1,282 spec Gew) 9,0 Th gemischt und unter fortwährendem Umrühren im Dampfbade zur Trockne verdampft Es enthalte etwa 2,5 Th metallisches Eisen 10 cem einer wässrigen Lösung, welche in 100 cem = 5,6 g Eisensalmiak enthält, werden nach Zusatz von 2 cem Salzsäure kurze Zeit zum Sieden erhitzt Nach dem Erkalten fügt man 0,5 g Kaliumjodid hinzu und lässt 1 Stunde bei gewöhnlicher Temperatur im geschlossenen Glase stehen Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen 2,5—2,7 cem $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung erforderlich sein.

Helv Liquoris Ferri sesquichlorati 1,0 Th, Ammonii hydrochlorici 6,0 Th, Aquae 3,0 Th werden im Wasserbade unter Umrühren zur Trockne verdampft

Pomeranzengelbes, krystallinisches, etwas hygroskopisches Pulver, in 8 Th Wasser löslich

Vor Licht geschützt aufzubewahren Anwendung zu 0,1—0,3—0,5 g mehrmals täglich als roborirendes Eisenmittel und zur Beförderung des Auswurfes bei Bronchitis

VI Liquor Ferri oxychlorati (Germ) Ferrum oxychloratum solutum (Helv) Ligor Ferri peroxychlorati Eisensubchloridlösung Peroxyde de fer soluble

Eisenchloridlösungen sind im Stande, grosse Mengen von frisch gefälltem Ferrihydroxyd aufzulösen Diese Lösungen haben eigenthümliche, rothbraune Färbung Wenn das Eisenchlorid mit genügenden Mengen Ferrihydroxyd verbunden ist, so lässt sich in der Lösung das Chlor durch Silbernitrat nicht ohne weiteres nachweisen

Darstellung Diese ist nach Germ und Helv die gleiche, nur schreibt die Helv einige überflüssige Umständlichkeiten zur Fällung des Ferrihydroxydes vor

Man mischt 350 Th Ferrichloridlösung (von 1,280—1,282 spec Gew) mit 1600 Th kaltem destillirten Wasser Sodann mischt man in einem hinreichend geräumigen Gefässe 350 Th Ammoniakflüssigkeit (von 10 Proc NH_3) mit 3200 Th kaltem destillirten Wasser und giesst die Ferrichloridlösung unter Umrühren in die verdünnte Ammoniakflüssigkeit Jede Temperaturerhöhung ist auszuschliessen, sehr zweckmässig ist es, die Ammoniakflüssigkeit durch Eintragen einiger Eisstücke kalt zu halten Nach Beendigung der Fällung muss die Flüssigkeit deutlich nach Ammoniak riechen (!) und rothes Lackmuspapier bläuen Auch hier ist (wie bei *Liquor Ferri acetici* S 1092) darauf hinzuwirken, dass der Niederschlag wirklich aus normalem Ferrihydroxyd $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$ besteht und weder wasserärmere Hydrate noch Ferrioxychloride enthält Riecht die Flüssigkeit zu Ende der Fällung nicht deutlich nach Ammoniak, so muss von diesem noch zugegossen werden Da in dieser Anweisung schon ein Ueberschuss von Ammoniak vorgeschrieben ist, so würde das Eintreten dieses Falles darauf hinweisen, dass entweder die Ferrichloridlösung zu sauer oder die Ammoniakflüssigkeit zu schwach ist Den Niederschlag sammelt man nach sechsstündigem Stehen auf einem leinenen Kolatorium und wäscht ihn unter Nachgiessen von destillirtem Wasser so lange aus, bis sich das Abtropfende, nach dem Ansäuern mit Salpetersäure, mit Silbernitrat nicht mehr trübt Dann legt man die Kanten des Kolatoriums aneinander, und unter Umschnüren mit Bindfaden schliesst man es beutelförmig oder in einer Weise, dass das Kolatorium mit seinem Inhalte einem zugeschnürten Beutel ähnlich

ist Man legt es nun einige Stunden in destillirtes Wasser, hierauf den Beuteltheil auf den kasserren Boden einer umgestülpten porcellanenen Abdampfschale, so dass das aus dem Inhalte Abtropfende abwärts fließen kann, drückt den Zipfeltheil des Kolatoriums mit den Händen aus, überdeckt den Beutel mit einer Porcellanplatte oder einem Teller und beschwert den Teller nach und nach 2stündlich mit Gewichten, so dass wohl die Flüssigkeit sehr langsam aus dem Niederschlage austreten, aber von dem Niederschlage selbst nichts durch die Maschen des Gewebes treten kann. Mittels einer Presse lässt sich dieses Ausdrücken im Anfang weniger zweckmässig bewerkstelligen. Nachdem der grösste Theil des Wassers aus dem Beutel allmählich ausgedrückt ist, kann man mit der Presse nachhelfen. Der Druck auf den Niederschlag kann bis zu 10–15 kg nach und nach verstärkt werden. Die Masse hat dann ein fast gleiches Gewicht wie die zur Fällung verwendete Ferrichloridlösung und eine bröcklige Konsistenz. Man giebt sie in eine tarirte Flasche mit weiter Oeffnung und übergiesst sie dann mit 30 Th Salzsäure von 25 Proc HCl. Man setzt einen Stopfen auf und schüttelt gut durch. Hierauf stellt man die Mischung an einen kühlen schattigen Ort und wiederholt das Umschütteln alle 3–4 Stunden. Im Verlaufe von 1–2 Tagen ist dann Lösung erfolgt. Wenn es nicht unbedingt nöthig ist, so vermeide man es, die Lösung durch Erwärmen zu befördern, wenn dies auch zulässig ist. Man verdünnt auf etwa 800 Th, lässt nun einige Tage absetzen, giesst die Lösung klar ab und bringt sie durch Zusatz von Wasser auf das vorgeschriebene spec Gewicht.

Eigenschaften Eine braunrothe, klare oder fast klare, sauer reagirende Flüssigkeit von nur schwach adstringirendem Geschmacke, in 100 Th = 3,5 Th metall. Eisen enthaltend. Das spec Gewicht ist = 1,050 bei 15° C. Sie lässt sich mit Wasser, wenig Weingeist, auch mit Zuckerlösung ohne Trübung mischen. Conc. Salzlösungen scheiden Ferrhydroxyd aus, durch Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniak wird gleichfalls Ferrhydroxyd gefällt. Kaliumferrocyanid erzeugt blaue, Gerbsäurelösung schwarze Fällung. Das Präparat gerinnt nach öfterem Erhitzen, in der Kälte durch Einwirkung von Spuren Schwefelsäure, Alkalien, Carbonaten und Sulfaten der Alkalien. Nicht verändert wird es durch Gegenwart kleiner Mengen von Salzsäure und Salpetersäure. Viele Neutralsalze, z. B. Ferrosulfat, Magnesiumsulfat, erzeugen Fällung. Beim Vermischen mit Eiweisslösung entsteht, wenn die Flüssigkeit völlig neutral gemacht wird, ein rostfarbener Niederschlag von Ferrialbuminat (s. S. 1095).

Seiner chemischen Zusammensetzung nach kann das Ferrioxychlorid aufgefasst werden als eine Verbindung von 1 Mol Fe_2Cl_3 + 8 Mol $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$, 100 Th. enthalten 3,5 Th. metallisches Eisen, entsprechend 7,07 Th. der Verbindung $\text{Fe}_2\text{Cl}_3 + 8\text{Fe}_2(\text{OH})_6$.

Prüfung 1 cem flüssiges Eisenoxychlorid wird mit 19 cem Wasser verdünnt und hierauf mit 1 Tropfen Salpetersäure und 1 Tropfen Silbernitratlösung versetzt. Die Flüssigkeit muss im durchfallenden Lichte klar erscheinen. Eine Trübung würde ungehörigen Chlorgehalt anzeigen. Es würde alsdann der Schluss zu ziehen sein, dass 1 Mol Fe_2Cl_3 mit weniger als 8 Mol $\text{Fe}_2(\text{OH})_6$ verbunden ist. Die Verhältnisse sind genau einzuhalten, insbesondere ist nur 1 Tropfen Salpetersäure und 1 Tropfen Silbernitratlösung anzuwenden. Würde mehr Salpetersäure zugesetzt werden, so würde ein Gemisch von Ferrinitrat und Ferrichlorid entstehen und infolgedessen das Chlor durch Silbernitrat nachweisbar werden.

Zur quantitativen Bestimmung des Eisengehaltes kann man a) eine gewogene Menge mehrmals mit Salpetersäure eindampfen, glühen und den Rückstand als Ferrioxyd, Fe_2O_3 , wägen, oder b) eine gewogene Menge mit einem Ueberschuss von Ammoniakflüssigkeit fällen, den Niederschlag auswaschen, trocknen, glühen und als Ferrioxyd wägen, c) massanalytisch verfahren. 5,6 g des Präparates werden mit 3 g Salzsäure schwach erwärmt, bis eine hellgelbe Lösung resultirt. Nach dem Erkalten fügt man 20 cem Wasser und 2 g Jodkalium hinzu, und lässt 1 Stunde im verschlossenen Gefässe bei gewöhnlicher Wärme stehen. Alsdann füllt man zu 100 cem auf und titirt 20 cem dieser Lösung mit $\frac{1}{10}$ -Natriumthiosulfatlösung. Von letzterer müssen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods 7 cem verbraucht werden.

Aufbewahrung Dieselbe erfolge in gut geschlossenen Gefässen an einem kühlen Orte, vor Sonnen- oder Tageslicht geschützt, da durch Einwirkung desselben die Abscheidung von Niederschlägen begünstigt wird.

Dispensation. Wird *Liquor Ferri oxydati dialysati* veroidnet, so darf (Germ), bez soll (Helv) *Liquor Ferri oxychlorati* abgegeben werden

Sirupus Ferri dialysati, Sirupus Ferri oxychlorati (Hamb Vorschr) Eisen-oxychloridsirup. *Liquoris Ferri oxychlorati* 40,0, *Aquae destillatae* 100,0, *Sacchari* 210,0 Enthalt 0,56 Proc metallisches Eisen

VII Liquor Ferri oxydati dialysati (Ergänz) **Ferrum hydroxydatum dialysatum liquidum** (Austr) Dialysirtes, flüssiges Eisenhydroxyd. **Dialysirtes Eisen Fer BRAVAIS** Das thatsächlich durch Dialyse dargestellte Präparat ist dem Ferroxychlorid zwar ziemlich ähnlich, aber doch nicht gänzlich mit demselben identisch

Darstellung 100 Th Ferrichloridlösung verdünnt man mit 150 Th destillirtem Wasser, kühlt die Mischung ab und versetzt sie in kleinen Antheilen unter Umrühren und Ausschluss jeder Erwärmung mit einer Mischung von 25 Th Ammoniakflüssigkeit und 25 Th Wasser Wenn nach 1—2 Stunden die Flüssigkeit völlig klar geworden ist, fügt man ihr vorsichtig so viel Ammoniakflüssigkeit zu, bis eine bleibende, schwache Trübung entsteht und beseitigt diese durch vorsichtige Zugabe von etwas Ferrichloridlösung (klart sich die Flüssigkeit nach dem ersten Zusatz von Ammoniak nach einiger Zeit nicht völlig, so giebt man natürlich kein Ammoniak mehr zu, sondern beseitigt die Trübung durch Zugabe von Ferrichloridlösung)

Diese Lösung giebt man in einen Dialysator und unterwirft sie in diesem solange der Dialyse (s unten), bis sie neutral ist, und das die Membran umgebende Wasser nicht mehr bräunlich gefärbt ist und kein Chlor oder wenigstens nur Spuren desselben enthält Ist dies der Fall, so bringt man die Lösung durch Eindunsten oder durch Verdünnen mit Wasser auf das spec Gewicht 1,05

Eigenschaften Eine rothbraune, klare, neutrale, kaum nach Eisen schmeckende Flüssigkeit, welche sich von der sonst ähnlichen Ferroxychloridlösung durch folgende Momente unterscheidet

Die mit Wasser verdünnten (1 : 20) Lösungen zeigen folgendes Verhalten

	Ferroxychlorid	Dialysirtes Eisenhydroxyd
Ferrocyankalium	Blaue Fällung	Schwache Trübung ohne Färbung
Rhodanammonium	Blutrothe Färbung	Geringe Trübung, die Flüssigkeit wird heller gelb
Gersäure	Blauschwarze Ferritannatlösung	Trübung, auch nach mehrstündigem Stehen kein Niederschlag
Silbernitrat	10 cem mit 3 Tropfen Salpetersäure zeigen nach Zusatz von 10 Tropfen Silbernitratlösung im auffallenden wie im durchfallenden Lichte starke Trübung	10 cem mit 3 Tropfen Salpetersäure werden erst nach 30 Tropfen des Reagens im auffallenden Lichte trüb, im durchfallenden Lichte klar

Die Lösung kann auf 70—80° C, ja bis zum Sieden erhitzt werden, ohne dass unlösliche Antheile sich ausscheiden, sie kann im Wasserbade zur Trockne abgedunstet werden, der Verdunstungsrückstand ist in Wasser löslich Sie enthält bei einem spec Gew von 1,05 bei 15° C = 3,5 Proc metall Eisen oder 5 Proc Eisenoxyd

Ihrer chemischen Zusammensetzung nach ist sie eine Lösung eines sehr stark basischen Ferrichlorids, d h das Ferrhydroxyd wird durch die möglichst geringste Menge Ferrichlorid in Lösung gehalten

Prüfung. Werden 5 cem des Präparates mit 5 cem verdünnter Salpetersäure erwärmt, bis die Lösung gelb geworden ist, darauf mit 4,5 cem $\frac{1}{10}$ -Normal-Silbernitratlösung versetzt, so soll nach dem Umschütteln und Filtriren eine klare Flüssigkeit erhalten werden, welche durch Silbernitrat nicht mehr getrübt wird Vor Luft geschützt aufzubewahren.

Dispensation. Von den Pharmacopöen schreibt nur die Austr vor, dass ihr **Ferrum hydroxydatum dialysatum liquidum** in der That durch Dialyse bereitet werden soll.

Germ sagt Wenn Liquor Ferri oxydati dialysati verordnet wird, so darf Liquor Ferri oxychlorati gegeben werden Helv Wenn Liquor Ferri dialysati verordnet wird, so soll Ferrum oxychloratum solutum gegeben werden

Dialyse. Der Vorgang der Dialyse beruht bekanntlich darauf dass zwei Flüssigkeiten von verschiedener Zusammensetzung, welche von einander durch eine Membran getrennt sind, sich durch diese hindurch ins Gleichgewicht zu setzen suchen, soweit wenigstens ihre diffusionsfähigen Bestandtheile, die sog Krystalloide, in Betracht kommen. Als Membran benutzt man heute das für die Zuckerraffination fabricirte Dialyspergamentpapier (Osmose Papier, s S 720) Man beachte wohl, dass nicht das gewöhnliche zu Verpackungszwecken dienende Pergamentpapier hierfür benutzt werden kann Für Dialyse nur einigermaßen grosserer Mengen benutzt man den nachstehenden, von KRUYSSE angegebenen Dialysator

Der Dialysator besteht aus einem langlich vierseitigen flachen Kasten Die lichte Weite entspricht 43 cm Länge bei 23 cm Breite und 3 cm Tiefe An jeder der Breitseiten

Wand von ebenfalls 3 cm Höhe eingesetzt, die am Boden befestigt ist und sich in einem Abstand von 2 cm von der Breitseite befindet, so dass zwei kleine Behälter entstehen, von welchen der eine für die Aufnahme des frischen Wassers dient, während der andere das verbrauchte Wasser aufnimmt Zwischen diesen beiden schmalen Behältern befindet sich ein Raum von 38 cm Länge Dieser Raum ist auf dem Boden mit einer Anzahl Leisten versehen,




Fig 248. Dialysator nach KRUYSSE

welche 5 mm breit und ebenso hoch in einem Abstand von 1,5 cm von einander parallel mit den Längsseiten laufen und sich an die Scheidewände anschliessen Auf diese Leisten kommt das Pergamentpapier zu legen Die Länge und Breite des Papiers ist gleich der des mittelsten Raumes vermehrt um 6 cm Man schlägt nun an allen vier Seiten des Papiers einen Streifen von 3 cm Breite aufwärts um die an den vier Eckpunkten entstehenden dreieckigen Stücke auf die Seite, so dass man ein flaches Papierkästchen erhält, welches gerade in den mittelsten Raum des Dialysators passt Das Papier wird jetzt auf die Seiten aufgelegt, so dass die aufstehenden Seiten durch die Längsseiten des Kastens und die Scheidewände gestützt werden Das Papier kann man sich der Bequemlichkeit halber auch auf einem gesonderten Rahmen falten, dessen Abmessungen um ein wenig kleiner sind als der Innenraum des Kastens, man setzt dann das auf dem Rahmen gefaltete Papier mit diesem in den Kasten und entfernt sodann den Rahmen wieder, da dieser sonst den Raum für die dialysirende Schicht unnötig verkleinern würde Man lässt nun das Wasser in das erste Reservoir einfließen Dasselbe gelangt durch Oeffnungen, welche unten in den Scheidewänden zwischen den Leisten angebracht sind, in den mittleren Raum, fliesst dort langsam an der Unterseite des Pergamentpapiers entlang und gelangt ebenfalls durch Oeffnungen in der zweiten Scheidewand in das dritte Reservoir, von wo es den Dialysator durch eine in der Nähe des Bodens durch die Aussenwand gebohrene Oeffnung von 1,5 cm Durchmesser verlässt

Um zu verhüten, dass der Papierkasten zu stark auf die Leisten aufrückt, hat man Sorge zu tragen, dass das Niveau der Flüssigkeit innerhalb in gleicher Höhe mit dem Wasser in den beiden Aussenbehältern zu stehen kommt Dies lässt sich durch folgende Regulierung des Abflusses erreichen In die Ausflussöffnung des Kastens wird mittels eines Korkes ein zweimal rechtwinklig gebogenes Glasröhrchen eingesetzt, so dass man durch Drehung des Röhrchens das Wasser im Dialysator leicht auf die gewünschte Höhe einstellen kann Um das Abtropfen des Wassers zu befördern, ist ein weiteres, schief abgeschliffenes Röhrchen mittels eines Korkes aufgesetzt

Man giesst nun die zu dialysirende Ferroxychloridlösung in etwa 1 cm hoher Schicht in den Pergamentpapierkasten und lässt das Wasser, nachdem sich der Apparat gefüllt hat, so zu laufen, dass in der Minute etwa 30 Tropfen zu- und ablaufen

Antimiasmatischer Likor von Dr KOENE in Geertruidenberg, Mittel gegen Cholera, Ruhr, Typhus, Pocken, Rôtheln, Scharlach, Masern, Diphtherie, ist Eisenchloridlösung mit viel freier Salzsäure

LEGOUX's Mittel zur Behandlung des Schweissfusses. Liquoris Ferri sesquichlorati 30,0, Glycerini 10,0, Olei Bergamottae gtt. XX

LÖFFLER's Diphtheriemittel. Spiritus 60,0, Toluol 36,0, Liquoris Ferri sesquichlorati 4,0, Mentholi q s Die erkrankten Stellen werden alle 3—4 Stunden mit einem in obiger Lösung getränkten Wattebausch betupft

WOLLMAR's Desinfektionsmittel. In den Handel gelangt eine Flüssigkeit und ein Pulver Zur Darstellung werden Eisenoxydhydrat enthaltende Mineralien mit Sagemehl gemischt, zu Haufen geschichtet, diese mit Salzsäure befeuchtet und sich selbst überlassen Das Ablaufende ist WOLLMAR's Desinfektionslösung, das Zurückbleibende WOLLMAR's Desinfektions-Streupulver Beide enthalten wechselnde Mengen Ferrochlorid und Ferrichlorid B FISCHER fand Wasser 43,2, Gesamtisen (Fe) 11,4, davon Fe_2O_3 in Wasser löslich 9,5, Fe_2O_3 in Salzsäure löslich 6,9, ferner Chlor 10,3, Kieselsäure und Sand (in HCl unlöslich) 8,4, Sagemehl 12,7

Eisencognac von GOLLIEZ enthält in 100 cem = 0,5 g Eisenoxyd und 18,5 g Alkohol und wird daher dargestellt durch Versetzen von 10 cem Ferrioxychlorid mit 90 Th eines Brantweins von 20 Gewichtsprocent Alkohol (möglicherweise eine Mischung aus gleichen Theilen Cognac und Wasser) B FISCHER

Ferrum sulfuratum.

Ferrum sulfuratum. Ferrosulfid. Schwefeleisen. Einfach-Schwefeleisen Sulfure de fer. Sulfid of iron. FeS . Mol Gew. = 88. Man hat von dieser Verbindung zwei Modifikationen das auf trockenem Wege und das auf nassem Wege bereitete, zu unterscheiden

1 Ferrum sulfuratum fusum Ferrum sulfuratum (Ergänzb) Sulfure de fer par vole sèche (Gall) Dieses Präparat wird von chemischen Fabriken in genügender Reinheit bezogen, und nur im Nothfall bewirkt man seine Darstellung im pharmaceutischen Laboratorium

60 Th reine Eisenfeile und 45 Th sublimirter Schwefel werden abwechselnd in 0,8 cm dicken Lagen in einen irdenen Schmelztiegel bis zu $\frac{3}{4}$ seines Rauminhaltes unter Drücken eingeschichtet Dann wird der Tiegel, nachdem er mit dem Deckel geschlossen ist, zwischen Kohlen erhitzt Schon bei verhältnismässig mässiger Hitze verbindet sich das Eisen mit dem Schwefel Es tritt eine sehr lebhafte Reaktion ein, welche sich durch Auftreten reichlicher Schwefeldämpfe zu erkennen giebt Man erhitzt alsdann unter Verstärkung des Feuers weiter, bis der überschüssige Schwefel verdampft und das gebildete Schwefeleisen geschmolzen ist, und giesst den Fluss entweder auf eine Eisenplatte oder in Stabformen aus

Eigenschaften. Dunkelgraue oder grauschwarze, nach längerer Aufbewahrung auch broncefarbene, zusammengesinterte, stellenweise blasige, harte Massen ohne Geruch und Geschmack, vom spec. Gew 4,7 In verdünnten Säuren (HCl oder H_2SO_4) muss es nahezu ohne Rückstand unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff gelöst werden. Das entwickelte Gas muss nahezu vollständig von Kalilauge absorbt werden (Wasserstoff wird nicht absorbt) Wird das in einer Waschflasche mit Wasser gewaschene Gas in rauchende Salpetersäure geleitet, so darf beim Verdampfen derselben kein Rückstand hinterbleiben, der, in den MARSH'schen Apparat gebracht, Flecken oder Spiegel von Arsen verursacht

Aufbewahrung An einem trockenen Orte, in gut geschlossenen Gefässen

Anwendung. Zur Darstellung von Schwefelwasserstoffgas s S 118 Man unterscheidet im Handel verschiedene Sorten dieses Schwefeleisens Die gewöhnliche Sorte, von welcher 1 kg etwa 25 Pfg kostet, enthält stets noch geringe Mengen von Arsen. Zur toxiologischen Analyse verwendet man Ferrum sulfuratum absolut arsenfrei zur forensischen Analyse, von welchem sich 1 kg im Einkauf auf 4 Mk. stellt.

Hepar Sulfuris martiale, ein Gemisch aus Kaliumsulfid und Ferrosulfid 40 Th trocknes Kaliumkarbonat, 40 Th gewaschener sublimirter Schwefel und 20 Th feine Eisenfeile oder Eisenpulver werden gemischt in einen Tiegel gefüllt und wie oben bei Bereitung des Ferrosulfids bemerkt ist behandelt. Eine graubraune Masse, welche in wohl verstopfter Flasche aufzubewahren ist.

II Ferrum sulfuratum praecipitatum Ferrum sulfuratum hydratum. Sulfure ferreux par voie humide (Gall) Frisch gefälltes Schwefeleisen. Die Gall läßt es bereiten durch Fällung einer Lösung von 189,0 g krystall Ferrosulfat mit einer Lösung von 120,0 g krystall Natriummonosulfid ($\text{Na}_2\text{S} + 9\text{H}_2\text{O}$)

Bereitung 82,0 g krystallisirtes Ferrosulfat werden zu Pulver verrieben mit 50,0 g Aetzammon und 1000,0 g Wasser übergossen. In die bisweilen umzurührende Flüssigkeit wird nun Schwefelwasserstoffgas bis zur Uebersättigung eingeletet. Der Niederschlag wird in einem Filter gesammelt, mit etwas Wasser ausgewaschen und für irgend einen Zweck (zur Darstellung einer Mixture, eines Sirups etc) verwendet. Er enthält 10,0 g Ferrosulfid.

Man beachte, dass das Präparat nicht getrocknet wird, sondern stets noch feucht zur Verwendung gelangt. Will man es aufbewahren, so geschieht dies unter ausgekochtem destillirtem Wasser oder unter Schwefelwasserstoffwasser in kleinen, völlig gefüllten Flaschen — Verwendung findet das Schwefeleisen gelegentlich als Antidot bei Metallvergiftungen.

Sirupus Ferri sulfurati, Schwefeleisensirup. Der nach vorstehender Vorschrift gewonnene Ferrosulfidniederschlag (aus 82,0 g kryst Ferrosulfat) wird mit 500,0 destillirtem Wasser, in welchem 5,0 kryst Natriumkarbonat und 2,0 trocknes Aetznatron gelöst sind, ausgewaschen, dann, so feucht wie er ist, sofort mit 125,0 Zuckerpulver versetzt und in geschlossenen Gefäß bis zur Auflösung des Zuckers digerirt. Endlich wird mit soviel destillirtem Wasser verdünnt, dass das Gewicht des Sirups 200,0 beträgt. Dieser Sirup enthält gut umgeschüttelt etwa 5 Proc Ferrosulfid.

Er wird zum Gebrauch jedesmal frisch bereitet. Man giebt ihn (am besten mit Magnesiamilch, *Lac Magnesiae*, abwechselnd) bei Vergiftungen mit Metall-, besonders Blei- und Quecksilbersalzen nach Umständen zu $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel alle halbe bis ganze Stunden und nach jeder Dosis ebensoviel von der Magnesiamilch. Vorzuziehen ist die alsbaldige Mischung von 200,0 des Ferrosulfidsirups mit einer Mischung aus 5,0 *Magnesia usta* in 50,0 Wasser oder auch das Duflos'sche Präparat.

Magnesia cum Ferro sulfurato in Aqua. Antidotum Duflosii, Duflos' Antidotum. Der aus 82,0 krystallisirtem Ferrosulfat gewonnene Ferrosulfid-Niederschlag wird mit 8,0 gebrannter Magnesia und 58,0 Wasser gut durchmischt und endlich mit soviel Wasser versetzt, dass die Mischung 160,0 beträgt.

Es wird in ganz gefüllten, gut verstopften Flaschen an einem kühlen Orte aufbewahrt.

Ferrum sulfuricum oxydulatum.

I. Ferrum sulfuricum (Aust. Germ. Helv.) Sulfate ferreux officinal (Gall.) Ferri Sulphas (Brit. U. St.) Ferrum sulfuricum purum seu crystallisatum. Vitriolum Martis purum. Reiner Eisenvitriol. Ferrosulfat. Reines schwefelsaures Eisenoxydul. $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ Mol. Gew. = 278. Man kann dieses Präparat sowohl in gut ausgebildeten Krystallen als auch in Form eines krystallinischen Pulvers gewinnen.

Darstellung. A) der Krystalle 1000 g destillirtes Wasser werden in einem Kolben von etwa 3 Litern Fassungsraum durch Umschwenken des Kolbens in wirbelnde Bewegung versetzt, worauf man 250 g reine concentrirte Schwefelsäure in dünnem Strahle zufließen lässt. In diese Mischung trägt man 165 g Eisendraht, der durch Abreiben gereinigt und in Bündel zusammengedreht ist, ein. Sobald die Wasserstoffentwicklung nachlässt, erwärmt man den Kolben im Dampfbade, zunächst kurze Zeit, später andauernd, bis die Wasserstoffentwicklung aufhört. — Die so erzielte Lösung wird in eine Flasche, welche 80 Th verdünnte Schwefelsäure enthält, hineingefiltrirt. Alsdann dampft man das Filtrat bis zum Salzhäutchen ein und lässt es an einem kühlen Orte krystallisiren. Die Krystalle lässt man in einem Trichter abtropfen, wäscht sie mit wenig Wasser, dann mit etwa 50procentigem Alkohol nach und trocknet sie durch Walzen auf Filtrirpapier bei ge-

wöhnlicher Temperatur Man passt den Zeitpunkt ab, wenn die Krystalle trocken sind, und bringt sie alsdann sogleich in die Gefässe, lässt sie nicht durch unnöthiges Liegen an der Luft verwittern — Es mag hier gleich bemerkt werden, dass das Ferrosulfat aus der neutralen oder aus schwachsaurer Lösung in bläulichgrünen, aus stark schwefelsaurer Lösung aber in grasgrünen Krystallen anschießt

B) des Krystallpulvers Man löst wie sub A 165 g Eisendraht in einer Mischung von 1000 g Wasser und 250 g kono Schwefelsäure und filtrirt diese Lösung noch warm in ein Gefäss, welches 500 g Alkohol (90—95 Vol Proc) enthält, der während des Einfiltrirens der Lösung durch Umrühren mit einem Glasstabe in Bewegung erhalten wird Das Ferrosulfat scheidet sich alsdann in Form eines blass bläulichgrünen Krystallpulvers ab Das Krystallpulver sammelt man nunmehr auf einem leinenen Kolatorium wäscht es mit 50procentigem Weingeist, bis es nur noch sehr schwach sauer reagirt, presst es alsdann leicht ab und trocknet durch Wälzen auf Filtrirpapier und Ausbreiten auf diesem in dünner Schicht, bis es lufttrocken geworden ist Das lufttrockne Präparat bringt man sogleich in die Aufbewahrungsgefässe

Eigenschaften. Entweder blass-grünlich-blaue, schiefrrhomboidische (monokline) Krystalle oder ein weisslich-blassblau grünliches Krystallpulver, löslich in 1,8 Th Wasser von gewöhnlicher Temperatur oder in 0,5 Th Wasser von 100° C, in Alkohol oder Aether unlöslich Die wässrige Lösung ist blass grünlich-blau, reagirt sehr schwach sauer und verwandelt sich unter Sauerstoffaufnahme aus der Luft allmählich in eine Ferroferrioxysulfatlösung, welche eine braungelbe Farbe hat und ein gelbes basisches Salz (Ferroferrioxysulfat) absetzt Diese Oxydation kann einige Zeit verzögert werden durch Ansäuern der wässrigen Lösung mit etwas verdünnter Schwefelsäure Beim Liegen an der Luft verwittern die Krystalle des Ferrosulfats allmählich, bei einer Temperatur von 30—40° C ziemlich schnell, zu einer fast weissen Masse Sind die Krystalle feucht oder befinden sich dieselben in feuchter Luft, so werden sie braungelb unter Bildung von Ferroferrioxysulfat Erhitzt, schmelzen die Krystalle, lassen bei 100° C $\frac{1}{4}$ ihres Krystallwassers abdestilliren verlieren aber erst zwischen 250—300° C das letzte $\frac{1}{4}$ Krystallwasser, das sogenannte Konstitutionswasser

Das bei gewöhnlicher Temperatur aus der concentrirten Lösung krystallisirende und das durch Alkohol gefällte Ferrosulfat haben beide die Zusammensetzung $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ Bei 80° C krystallisirt aus der gesättigten Lösung ein Salz von der Zusammensetzung $\text{FeSO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ in geraden, rhombischen Säulen

Prüfung. 1) Die mit ausgekochtem destillirten Wasser bereitete wässrige Lösung reagirt nur schwach sauer (stark saure Reaction zeigt freie Schwefelsäure an) und werde nach dem Ansäuern mit Salzsäure durch Schwefelwasserstoff nicht verändert (Dunkle Färbung oder Fällung = Kupfer oder Blei) — 2) Werden 2 g des Salzes in wässriger Lösung mit Salpetersäure oder Bromwasser oxydirt und dann mit einem Ueberschusse von Ammoniakflüssigkeit versetzt, so darf das farblose Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verändert werden, auch beim Abdampfen und Glühen einen wagbaren Rückstand nicht geben. Blaufärbung der ammoniakalischen Lösung würde Kupfer, ein durch Schwefelwasserstoff entstehender weisser Niederschlag würde Zink anzeigen, ein glühbeständiger Rückstand würde Magnesium und Alkalisalze anzeigen 3) Wird 1 g des Ferrosulfats mit Natronlauge erhitzt, so darf der Geruch nach Ammoniak nicht auftreten (Verwechslung mit dem ähnlich aussehenden Ferro-Ammoniumsulfat)

Spec. Gewicht und Gehalt der Lösungen an krystallisirtem Ferrosulfat bei 15° C.

Proc. $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	Spec. Gew bei 15° C	Proc. $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	Spec. Gew bei 15° C	Proc. $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	Spec. Gew bei 15° C	Proc. $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	Spec. Gew bei 15° C	Proc. $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$	Spec. Gew bei 15° C
40	1,289	32	1,187	24	1,137	16	1,088	8	1,048
39	1,282	31	1,180	23	1,131	15	1,082	7	1,037
38	1,276	30	1,174	22	1,125	14	1,077	6	1,032
37	1,219	29	1,168	21	1,118	13	1,071	5	1,027
36	1,218	28	1,161	20	1,112	12	1,065	4	1,021
35	1,206	27	1,155	19	1,106	11	1,059	3	1,016
34	1,200	26	1,149	18	1,100	10	1,054	2	1,011
33	1,198	25	1,148	17	1,094	9	1,048	1	1,005

II Ferrum sulfuricum siccum (Austr Germ Helv) **Ferri Sulphas exsiccatus** (Brit U-St) **Ferrum sulfuricum exsiccatum**. Entwässertes Ferrosulfat. Getrocknetes Ferrosulfat.

Darstellung Man legt Ferrosulfat (als Krystallmehl) zwischen zwei Fließpapierschichten, in ungefähr 0,5 cm dicker Schicht locker ausgebreitet, an einen Ort, welcher 20—30° C warm ist. In einer über 45° C hinausgehenden Wärme würde das Salz schmelzen. Die Krystallchen verwittern bei lauer Wärme oberflächlich in kurzer Zeit und schmelzen dann, in die Wärme des Wasserbades gebracht, nicht mehr. In letzterer lässt man das Pulver unter bisweiligem Umrühren $1\frac{1}{2}$ —2 Tage, um es schliesslich noch eine Stunde hindurch im Sandbade bei ca 120° C zu erhitzen, nach welcher Zeit die Verdampfung der 6 Mol Wasser sicher vollendet sein wird. Das in eine tarirte Porcellanschale übergeführte Salz wird wiederholt bezüglich seines Gewichtsverlustes kontrollirt und ist genügend entwässert, wenn 100 Th auf 64 Th reducirt sind. Vollig vom Krystallwasser ($6H_2O$) befreit, beträgt der Rückstand 61,15 Proc.

Wurde man das Krystallpulver sofort im Wasserbade auch mit aller Vorsicht langsam erwärmen, so kann dennoch leicht Schmelzung eintreten. Das geschmolzene Salz müsste erkaltet wieder zu einem Pulver zerrieben werden.

Eigenschaften Ein weisses, in Wasser unter Selbsterwärmung langsam, aber völlig lösliches Pulver, welches ungefähr die Zusammensetzung $FeSO_4 + H_2O$ hat. Auf seine Reinheit ist es wie das krystallisirte Salz zu prüfen.

Bestimmung des Eisengehaltes Die Lösung von 0,2 g des getrockneten Ferrosulfates in 10 ccm verdünnter Schwefelsäure werde mit Kaliumpermanganatlösung (5 = 1000) bis zur bleibenden Rothung versetzt, nach eingetretener Entfärbung, welche nothigenfalls durch Zusatz von einigen Tropfen Weingest veranlasst werden kann, werde 1 g Kaliumjodid zugegeben, und die Mischung bei gewöhnlicher Wärme im geschlossenen Gefässe eine Stunde lang stehen gelassen, es müssen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods mindestens 10,8 ccm der $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumthiosulfatlösung verbraucht werden, entsprechend einem Gehalte von 20,14 Proc metall Eisen. Das getrocknete Ferrosulfat wird namentlich zur Bereitung der *Pilulae aloëticae ferratae* gebraucht. Es ist in einem gut verschlossenen Gefässe vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren, da es sonst Wasser aus der Luft aufnimmt und theilweise wieder in das wasserhaltige Salz übergeht.

Aufbewahrung. Das krystallisirte und das durch Alkohol gefällte Ferrosulfat sind beide lange Zeit haltbar (das durch Alkohol gefällte ist aber immer das haltbarere), wenn sie völlig lufttrocken und frei von ungebundener Schwefelsäure sind. Sind sie aber feucht oder enthalten sie freie Schwefelsäure, oder hat feuchte Luft zu ihnen Zutritt, so oxydiren sich die Krystalle, indem sie sich oberflächlich mit rostfarbigen Flecken bedecken. Es ist also wesentlich, das gut gewaschene und völlig lufttrockene Salz in trockene, nicht zu grosse Gefässe zu füllen und diese gut zu verstopfen.

Anwendung. Das reine Ferrosulfat ist ein kräftiges Eisenmittel und beschränkt besonders die Absonderung der Schleimhäute der Verdauungswege. In grossen Gaben wirkt es ätzend und erzeugt Entzündung der Magenschleimhaut. Man giebt es innerlich zu 0,05—0,1—0,2 g drei- bis viermal täglich bei inneren Blutungen, chronischen Katarrhen des Darmkanals, der Lungen und Urogenitalorgane, Chlorose, Wurmliden. Aeusserlich wendet man es als Adstringens zu Einspritzungen, Waschungen etc an bei Schleimflüssen, Nasenbluten, bei Auflockerung der Bindehaut, bei Hornhautflecken etc. In der Pharmacie dient es zur Bereitung verschiedener Eisenpräparate und als Reagens.

Ueber die Wirkung des Eisens und seiner Präparate ist S 1089 das Nothwendigste angeführt.

Ferri Sulphas granulatus (U St) ist das durch Alkohol gefällte, krystallinsche Ferrosulfat.

III Ferrum sulfuricum crudum (Germ Helv) **Sulfate ferreux du commerce** (Gall.) **Vitriolum Martis**. Eisenvitriol. Grüner Vitriol. Kupferwasser. Rohes

Ferrosulfat. Wird von den Vitriolwerken meist aus Schwefelkiesen dargestellt und gelangt in grossen Mengen in den Handel.

Der Eisenvitriol ist nie rein, sondern gewöhnlich mit den Sulfaten von Mangan, Zink, Kupfer, Thonerde etc. verunreinigt. Eine gute Waare ist ziemlich durchsichtig, trocken, von bläulichgrüner oder grünlicher Farbe, in der Regel etwas verwittert und mässig oxydirt, daher sind die Krystalle zum Theil meist beschlagen und stellenweise mit gelblichen Partikeln bedeckt. Sie bildet grössere Krystallhumpen, untermischt mit einzelnen Krystallen und Bruchstücken derselben. Die grossen Krystalle sind die besten. Mit vielem Krystallgruss untermischte, kleinstückige, an der Oberfläche bräunlichgelbe, sowie eine schwarzlichdunkelgrüne (Schwarzvitriol) Waare ist zu verwerfen oder nur zur Bereitung der Gallustinte oder zu Desinfektionszwecken anwendbar.

Die wässrige Lösung (1 = 5) darf einen erheblichen, ockerartigen Bodensatz nicht fallen lassen und muss nach dem Filtriren eine blaugrüne Farbe zeigen. Nach dem Ansäuern darf sie durch Schwefelwasserstoffwasser nur schwach gebräunt werden.

Kleinere Mengen des Eisenvitriols bewahrt man in Steinzeuggefässen, grössere Mengen in Holzkästen oder in Holzfässern an einem kühlen, schattigen Orte auf.

Anwendung. Der Eisenvitriol wird äusserlich zu Bädern (25,0—50,0 auf ein Vollbad) angewendet und besonders zur Desinfektion von Fekalmassen (um theils Ammon, theils Schwefelwasserstoff zu binden oder zu zerstören) für sich in Auflösung, oder als Pulver oder in Mischung mit Aetzkalkpulver gebraucht, er ist indessen lediglich als Desodorierungsmittel, nicht als Desinfektionsmittel anzusehen.

Balneum Vichense

Bain de Vichy

Rp	Natrii bicarbonici pulverati	500,0
	Salis culinaris	20,0
	Natrii sulfurici crystallisati	130,0
Misce	Signa Salze I.	

Rp Calcii chlorati crystallisati 180,0.
Signa Salze II.

Rp Magnesi sulfurici 33,0
Ferri sulfurici 2,0
Misce, Signa Salze III.
In das Bad, aus 200—250 Litern Wasser bestehend, werden zuerst Salze I, nach dem Umrühren Salze II und zuletzt Salze III gegeben. Vergl. auch S 442.

Lapis stypticus KNAUFF

Poudre adstringente de KNAUFF (Gall).
Heilstein

Rp	1. Ferri sulfurici cryst.	
	2. Aluminis crud.	aa 50,0
	3. Ammonii hydrochlorici	
	4. Zinci sulfurici cryst.	
	5. Cupri oxydati	aa 3,0

Man schmilzt 1—4, rührt 5 darunter und giebt auf eine Eisenplatte aus Ein wie eine wälsche Nuss grosses Stück wird in einem Liter warmem Wasser gelöst und mittelst Kompressen auf wunden Hautstellen, Wunden, Hautausschlägen etc. bei Menschen und Vieh, in zwei Litern Wasser gelöst auch als Augewasser angewendet.

Liquor stypticus BRIGHTON

Rp	Ferri sulfurici crystallisati	3,0
	Aquae destillatae	60,0

Äusserlich (mit der erwärmten Flüssigkeit getränkter Schwamm mittelst Rollbinde aufzulegen, nebenher ein Laxans und Gebrauch von Chinin und Ferrichlorid bei Phlegmatia alba dolens puerperarum).

Pilulae antihæmorrhagicae MOST

Rp	Ferri sulfurici crystallisati	
	Kino	
	Extracti Gentianae	
	Terebinthinae coctae	aa 6,0
	Fiant pilulae ducentae (200)	
	Dreimal täglich 5—6 Pillen (bei inveterirten Hæmorrhagien)	

Pilulae antichloroticae KÄMPF

KÄMPF's Rothe-Backen-Pillen.

Rp	Ferri sulfurici crystallisati	5,0
	Extracti Myrrhae	
	Galbani	aa 16,0
	Extracti Aurantii corticis q s	
	Fiant pilulae centum et quinquaginta (150),	
	Täglich 4—5mal fünf Pillen	

Pilulae Ferri cum Magnes.

Eisen-Magnesia-Pillen.

I Ergänzb.

Rp	1. Ferri sulfurici cryst.	20,0
	2. Sacchari pulverati	2,0
	3. Aquae destillatae	10,0
	4. Glycerini	2,0
	5. Magnesiae ustae	7,4
	6. Tragacanthae	0,8
	7. Radicis Althaeae	2,0

Man löst 1—4 unter Erwärmen im Wasserbade, mischt 5 hinzu und dampft auf 25,4 ein. Der Rückstand wird mit 6 und 7 zur Pillenmasse angestossen, aus welcher 120 Pillen zu formen sind.

II. Form. Berol.

Rp	Ferri sulfurici cryst.	3,0
	Magnesiae ustae	1,0
	Glycerini	q s
	Fiant pilulae No 80	

Pulvis desinfectorius SMITH

Rp	Ferri sulfurici cryst.	1000,0
	Zinci sulfurici	50,0
	Gipsi	2000,0
	Carbonis Ligni	100,0

Pilulae nervinae Norveg
Rp Ferri sulfurici
 Asae foetidae
 Extracti Gentianae aa 5,0
 Pulveris Gentianae q s
 Fiat pilulae 100

Pulvis aërophorus ferrugineus
Poudre gazeuse ferrugineuse (Gall),
Rp Acidi tartarici 80,0
 Natrii bicarbonici 60,0
 Sacchari 260,0
 Ferri sulfurici cryst 3,0

Pulvis martialis externus DAUVERGNE.
Rp Ferri sulfurici crystallisati 10,0
 Carbonis Ligni 80,0

Fiat pulvis subtilissimus
D S Aeusserlich (abends auf das Kinn auszu-
 breiten bei der Kinnflechte)

Species ad balneum ferrugineum
 Eisenbad.
I Balneum mitius
Rp Ferri sulfurici crudi 100,0
D S No 1
Rp Acidi tartarici 20,0
D S No 2
Rp Natrii bicarbonici pulverati 60,0
D S No 3

In dieser Reihenfolge werden die Substanzen dem
 Badewasser zugesetzt, nach jedem Zusatz einige
 Male umgerührt.

II Balneum fortius.
Rp Ferri sulfurici crudi 150,0
 Salis marini 300,0
D S Auf ein Bad.

Sirupus Ferri sulfurici
Sirupus chalybeatus Wirtia
Rp Ferri sulfurici crystallisati 2,0
 Sirupi Sacchari 100,0

Vet Electuarium anticoryzarium
I p Vitrioli Martis 50,0
 Foliorum Digitalis 80,0
 Herbae Conii 15,0
 Lichenis Islandici 250,0
 Radicis Liquiritiae
 Farinae secalinae aa 200,0
 Aquae q s

Fiat electuarium.
 Vierstündlich so viel wie ein Hühnerei gross (bei
 bösartiger Druse der Pforte)

Vet Infectio uterina
Rp Ferri sulfurici 20
 Lactis vaccini 750,0

(Bei Gebärmutterentzündung der Kühe Neben-
 her Gaben einer Latwerge aus kohl. nitr., Na-
 trium nitricum, Natrium sulfuricum)

Vet. Pulvis contra haematuriam
Rp Vitrioli Martis 50,0
 Radicis Althaeae
 Radicis Imperatoriae
 Rhizomatis Calami aa 90,0

Fiat pulvis Divide in partes aequales decem (10)
 Täglich viermal ein Pulver mit Wasser zu geben
 (bei Blutharnen der Rinder)

Vet Pulvis roborans
 Für genesendes Rindvieh.
Rp Ferri sulfurici cryst
 Radicis Gentianae pulv
 Fructus Carvi pulv aa

Vet Trinkwasser für das Geflügel
 bei Hühnercholera
Rp. Ferri sulfurici 5,0
 Aquae 500,0

Massa pilularum Blandii, haltbare A) Man erhitzt im Wasserbade Ferri sul-
 furici praecipitati 500,0, Natrii bicarbonici, Kali carbonici aa 250,0, Sacchari albi 150,0,
 Aquae destillatae 120,0, bis die Kohlensäure-Entwicklung nachlässt, setzt Gummi arabici
 pulv, Radicis Liquiritiae aa 40,0 hinzu und dampft auf 1000,0 ein 20,0 g Masse liefern
 100 Pillen mit je 0,1 g Ferrum sulfuricum Die Masse hält sich in gut schliessenden Ge-
 fassen unverändert B) Nach MIEHLE Ferri sulfurici crystalli 1200,0, Sacchari pulv 400,0,
 Glycerini 350,0, Magnesia usta 100,0, Kali carbonici, Natrii bicarbonici aa 600,0 Man
 mischt in der angegebenen Reihenfolge zusammen, rührt mit 1000,0 heissem Wasser an,
 dampft zur Breiconsistenz ein, gibt 30,0 Radix Althaeae pulv hinzu, dampft weiter ein,
 bis die Masse bröcklig wird, fügt noch 170,0 Radix Althaeae zu und mischt nach Ent-
 fernung vom Dampfbade sorgfältig Das Endgewicht betrage 3000,0 37,5 g der Masse
 enthalten 15,0 g Ferrosulfat.

Farmer's Friend Down's Pulver gegen Brand in Getreide, zur Beseitigung
 der Schnecken, Erdflöhe, Würmer etc Eisenvitriol 67,5 Th., Kupfervitriol 18,5 Th.,
 Arsenige Säure 13,8 Th., Sand 0,2 Th

Fungivore von Gensoul in Toulon, zur Bekämpfung von Oidium, Pero-
 nospora etc auf Reben und Obstbäumen Gemisch von Schwefel und Eisenvitriol

Lammerlähme-Mittel von SEER No. I. Grobes Pulver aus Kalmus 50,0, Angelika-
 wurzel 100,0, Chamillenpulver 160,0, Kalkumsulfat 60,0, Eisenvitriol 120,0, Bolus roth,
 Bolus weiss je 30,0, Schwefel 120,0, Kräuterpulver 200,0, Hagebuttenkörner 15,0
No. II. Ein feines Pulver aus Kampher 1,0, Aloë 8,0

LEIDLOFF's Desinfektionspulver. Gemisch aus rohem Eisenvitriol und Gips.
 Kann nicht als Desinfektionsmittel angesehen werden

Mittel gegen Brand des Getreides von ARZENROUT in Gonda. Kupfervitriol
 9,0 Th., Eisenvitriol 53,0 Th., Arsenige Säure 35,0 Th

Reblausmittel von BOGHEAU. Natriumphosphat 3,0 Th., Ammoniumphosphat 1,0 Th.,
 Ammoniumchlorid 4,0 Th., Kalkumsulfat 3,0 Th., Natriumkarbonat 5,0 Th., Schwefelblumen
 6,0 Th., Eisenvitriol 173,0 Th

Urinal-Cakes zur Desinfektion von Klosets Eine Mischung von Kupfervitriol, Eisenvitriol, Zinkvitriol, Alaun und Natriumsulfat, die mit Hilfe von Colophonium in die Form von Kuchen gebracht ist

IV Ferrum sulfuricum oxydulatum ammoniatum (Erganzb) **Ferro-Ammonium sulfuricum**, **Ferrum sulfuricum ammoniatum** **Ammonium Ferrosulfat**, **Eisendoppelsalz** **Monf'sches Salz**, **Eisenoxydulammonsulfat** $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2 \cdot \text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 392.

Eine Lösung von 100 Th reinem Ferrosulfat und 48 Th Ammoniumsulfat in 600 Th destillirtem Wasser und 5 Th verdünnter Schwefelsäure wird filtrirt und durch Abdampfen und Beiseitestellen in Krystalle verwandelt Die letzte Mutterlauge wird fortgegossen Dann werden die Krystalle in der vielfachen Menge destillirtem Wasser gelöst und unter Umrühren in ein doppeltes Volum Weingeist eingegossen Das abgeschiedene Krystallmehl ist in derselben Weise wie das durch Weingeist gefällte Ferrosulfat (S 1142) zu behandeln

Die Aufbewahrung erfordert dieselbe Fürsorge, wie der reine Eisenvitriol.

Helle, bläulichgrüne Krystalle oder ein hellbläulichgrünes krystallinisches Pulver, von den Eigenschaften des reinen Ferrosulfats, nur wird beim Erwärmen mit Natronlauge Ammoniak in Freiheit gesetzt. Das Salz ist haltbarer als das Ferrosulfat, dient deshalb häufig zur Titerstellung Es enthält genau $\frac{1}{7}$ seines Gewichts, metallisches Eisen im Zustande des Oxyduls

V Ferro-Natrium sulfuricum **Natriumferrosulfat** **Schwefelsaures Natrium-Eisenoxydul**, $\text{FeSO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 366

Darstellung. 100 Th krystallisirtes Ferrosulfat, unter Erhitzen gelöst in 100 Th destillirtem Wasser und 2,0 verdünnter Schwefelsäure, werden mit 115 Th sehr reinem krystallisirten Glaubersalz (Natriumsulfat) versetzt, ins Kochen gebracht und unter fortgesetztem Umrühren so weit eingedampft, bis das ausgeschiedene Salz vom Ganzen ungefähr $\frac{2}{3}$ Volum, das Flüssige $\frac{1}{3}$ Volum einnimmt Man entfernt nun vom Feuer, rührt bis zum Erkalten um, giesst die Flüssigkeit ab, giebt die Salzmasse in einen Trichter, welcher mit einem hochst lockeren Bäuschchen Glaswolle versehen ist, verdrängt die anhängende Lauge mit einer geringen Menge destillirtem Wasser (oder einer kalt gesättigten Lösung des Salzes), trocknet das Salz durch Drücken zwischen zwei Lagen Fliesspapier oberflächlich ab, dann in warmer Stubenluft oder in der Sonne und endlich in der Wärme des Wasserbades (Bltz und Graeger)

Eigenschaften Das Natrium-Ferrosulfat ist ein bläulich weisses Pulver von grosser Beständigkeit, welches sein Krystallwasser noch bei 100° C vollständig zurückhält Es enthält 15,3 Proc. Eisen

Aufbewahrung. Wie beim Ferrosulfat angegeben ist

Anwendung Zu analytischen Zwecken in Stelle des Ferro-Ammoniumsulfats und des Ferrosulfats (Graeger) Das Gewicht des krystallisirten Ferrosulfats mit 1,3166 multipliziert ergibt das äquivalente Gewicht des Natrium Ferrosulfats

Ferrum sulfuricum oxydatum

Ferrum sulfuricum oxydatum, **Ferrisulfat** **Schwefelsaures Eisenoxyd** **Sulfate ferrique**, **Ferri Persulphas**, **Ferri Tersulphas**.

Dieses Salz wird ganz allgemein durch Oxydation einer Ferrosulfatlösung mittels Salpetersäure bei Gegenwart einer hinreichenden Menge von freier Schwefelsäure dargestellt, ist aber von den Pharmakopöen nicht in festem Zustande, sondern in Form von Lösungen aufgenommen worden

I. Ferrum sulfuricum oxydatum siccum $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Mol. Gew. = 400

Dieses Salz bildet eine weisse, krystallinische, sehr hygroskopische Masse, welche aus der Luft Wasser aufnimmt und zu einem braunen Sirup zerfliesst

II Liquor Ferri sulfurici oxydati (Ergänzb.) Ferrum sulfuricum oxydatum solutum (Helv.) Liquor Ferri Persulfatis (Brit.) Liquor Ferri Tersulfatis Ferrisulfatlösung Schwefelsaure Eisenoxydflüssigkeit

Darstellung 80 Th krystallisiertes Ferrosulfat, 40 Th Wasser, 15 Th reine Schwefelsäure vom spec Gew 1,836 (!) und 22 Th Salpetersäure (von 25 Proc HNO_3) werden in einem Glaskolben auf dem Wasserbade erhitzt, bis die Mischung eine blassere Farbe angenommen hat und 1 Tropfen, mit Wasser verdünnt, durch Kaliumferricyanidlösung nicht mehr blau gefärbt wird. Wenn dieser Punkt erreicht, also alles Eisenoxysulfat in Eisenoxysulfat übergeführt ist, wird die Flüssigkeit in einer gewogenen (!) Porcellanschale auf dem Wasserbade auf 100 Th eingedampft. Der Rückstand wird mit 60 Th Wasser verdünnt und wiederum auf 100 Th eingedampft. Dieses Verdünnen des Rückstandes mit Wasser und Abdampfen auf 100 Th wird so oft wiederholt, bis nach der unten angegebenen (s. Prüfung) Methode sich Salpetersäure nicht mehr nachweisen lässt. Man lässt die Flüssigkeit schliesslich erhalten und bringt sie durch Zusatz von Wasser auf das Gewicht von 160 Th, bez auf das spezifische Gewicht 1,428—1,430.

Eigenschaften Klare, etwas dickliche, bräunlichgelbe Flüssigkeit, welche nach Ergänzb., Brit u. Helv übereinstimmend 10 Proc metallisches Eisen enthalten soll. Dagegen weichen die Angaben über das spec Gewicht etwas ab, was seinen Grund darin hat, dass die Präparate je nach der Bereitungsvorschrift verschiedene Mengen freier Schwefelsäure enthalten. Spec Gew. Nach Ergänzb. und Helv = 1,428 bis 1,430, nach Brit. = 1,441. — Das Präparat der U. St. soll nur 8 Proc metallisches Eisen enthalten und das spec Gewicht 1,320 bei 15° C haben. Die wässrige Lösung des Präparates ist von saurer Reaktion und von styptischem Geschmack, sie wird durch Baryumnitrat weiss, durch Kaliumferricyanid blau gefärbt.

Prüfung 1) Wird eine Mischung von 8 Tropfen Ferrisulfatlösung und 10 ccm $\frac{1}{10}$ -Normal-Natriumsulfatlösung langsam zum Sieden erhitzt, so müssen beim Erkalten einige Flöckchen Ferrhydroxyd sich zeigen. Beweist die Gegenwart kleiner Mengen basischen Ferrisulfats und damit die Abwesenheit freier Schwefelsäure. — 2) In dem mit 10 Th Wasser verdünnten und mit Schwefelsäure angesäuerten Präparate darf Kaliumferricyanid blasse Färbung nicht hervorrufen (Ferrosalz). — 3) Werden 5 ccm Ferrisulfatlösung mit 20 ccm Wasser verdünnt und mit überschüssiger Ammoniakflüssigkeit gemischt, so soll ein farbloses Filtrat erhalten werden (Blaufärbung = Kupfer), welches nach Uebersättigung mit Essigsäure weder durch Silbernitratlösung (Chlor), noch durch Kaliumferricyanidlösung (Zink weiss, Kupfer braun) verändert wird und beim gelinden Glühen einen wägbaren Rückstand nicht hinterlässt. — 4) 2 ccm des ammoniakalischen Filtrates mit 4 ccm konz. Schwefelsäure gemischt und mit 1 ccm Ferrosulfatlösung überschichtet, dürfen eine braune Zone nicht geben (Salpetersäure).

Aufbewahrung Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Anwendung. Die Ferrisulfatlösung findet vorzugsweise Anwendung zur Bereitung des *Antidotum Arsenici* und einiger Eisenpräparate. In Verbindung mit Wasser wird sie gelegentlich auch als Stypticum und Desinficiens auf Wunden und profus eiternden Geschwüren angewendet.

Achtung! Wegen der wichtigen Verwendung als Antidot des Arseniks hatte die Germ I vorgeschrieben, dass in jeder deutschen Apotheke stets ein eiserner Bestand von mindestens 500 g Ferrisulfatlösung vorrätig sein solle. Wenn diese Forderung auch von den späteren Pharmakopöen mit dem Präparate selbst fallen gelassen worden ist (auch das Ergänzb. stellt sie nicht), so wird der Apotheker doch gut thun, sich dieselbe von seinem Gewissen vorschreiben zu lassen. Dieses könnte unter Umständen schwer belastet werden, wenn er sich sagen müsste: Ein Menschenleben hätte vielleicht gerettet werden können, wenn — ich 500 g Ferrisulfatlösung vorrätig gehalten hätte.

Spec. Gewicht und Gehalt der Lösungen an wasserfreiem Ferrisulfat und an metallischem Eisen bei 18° C.

Spec Gew bei 18° C	Proc. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	Proc. Fe	Spec Gew bei 18° C	Proc. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	Proc. Fe	Spec Gew bei 18° C	Proc. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	Proc. Fe	Spec Gew bei 18° C	Proc. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	Proc. Fe
1,557	44	12,32	1,380	33	8,24	1,232	22	6,16	1,107	11	3,08
1,540	43	12,01	1,365	32	8,96	1,220	21	5,88	1,097	10	2,80
1,523	42	11,76	1,351	31	8,68	1,208	20	5,60	1,087	9	2,52
1,506	41	11,48	1,337	30	8,40	1,196	19	5,32	1,077	8	2,24
1,490	40	11,20	1,323	29	8,12	1,184	18	5,04	1,067	7	1,96
1,474	39	10,92	1,310	28	7,84	1,173	17	4,76	1,057	6	1,68
1,458	38	10,67	1,297	27	7,56	1,162	16	4,48	1,046	5	1,40
1,442	37	10,46	1,284	26	7,28	1,151	15	4,20	1,036	4	1,12
1,427	36	10,08	1,271	25	7,00	1,140	14	3,92	1,027	3	0,84
1,411	35	9,80	1,258	24	6,72	1,129	13	3,64	1,017	2	0,56
1,395	34	9,52	1,245	23	6,44	1,118	12	3,36			

III Liquor Ferri oxysulfurici Liquor Ferri subsulfurici Liquor Ferri Subsulphatis (U St) Liquor haemostaticus Monsel. MONSEL's Solution. Eine wässrige Lösung von basischem Ferrisulfat von wechselnder Zusammensetzung mit einem ungefähren Gehalt von 13,6 Proc metallischem Eisen

I) 65,0 g kono Schwefelsäure werden in 400,0 g destillirtes Wasser eingetragen. Man erhitzt die Mischung in einer Porcellanschale zum Sieden, giebt 178,0 g Salpetersäure (von 25 Proc HNO_3) hinzu und trägt nun in vier einzelnen Portionen insgesamt 675,0 g (also jedesmal ca 170 g) zerriebenes krystall Ferrosulfat unter Umrühren ein. Beim jedesmaligen Zusatz einer Portion erfolgt Auftreten brauner Stuckoxyde. Man setzt eine neue Portion erst dann zu, wenn die durch den vorhergegangenen Zusatz verursachte Entwicklung von Stuckoxyden beendet ist. Wenn alles Ferrosulfat zugegeben und gelöst ist, fügt man einige Tropfen Salpetersäure hinzu. Wenn hierdurch die Entwicklung rother Dämpfe veranlasst wird, so giebt man tropfenweise solange Salpetersäure hinzu, bis braune Stuckoxyde nicht mehr entweichen. Dann erhitzt man die Lösung so lange, bis sie eine rubinrothe Farbe annimmt und nicht mehr nach salpetriger Säure riecht. Schliesslich bringt man sie auf ein Gesamtgewicht von 1000,0 g (U St)

II) Eine einfachere Vorschrift lautet: 1000,0 g Liquor Ferri sulfurici oxydata (spec. Gew 1,428—1,480), sowie 250,0 g destillirtes Wasser und 500,0 kryst Ferrosulfat erhitzt man in einer Porcellanschale und dampft die Flüssigkeit ein, bis ihr Volumen = 1 Liter ist, was einem spec Gewichte von etwa 1,450 entspricht. Der Eisengehalt beträgt etwa 14,0 Proc metall. Eisen

Nach U-St. eine braunrothe Flüssigkeit vom spec Gew 1,55 bei 15° C, etwa 13,6 Proc metallisches Eisen enthaltend, mit Wasser und Weingeist in jedem Verhältniss klar mischbar

IV. Ferrum sulfuricum oxydatum ammoniatum. Ferri et Ammonii Sulphas (U-St) Alumen ammoniacale ferratum Ferri-Ammoniumsulfat. Ammoniakalischer Eisenalaun. $\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2 + 12\text{H}_2\text{O}$. Mol. Gew. = 482.

Darstellung In 240 Th der Ferrisulfatlösung vom 1,428—1,480 spec Gew werde 28 Th Ammoniumsulfat gelöst und die Lösung durch Abdampfen und Beisetzstellen in Krystalle gebracht. Diese werden in einem Trichter gesammelt, mit wenig Wasser abgewaschen und durch Walzen auf Fliesspapier ohne Anwendung von Wärme getrocknet.

Eigenschaften. Der Eisenammonalaun bildet grosse, sehr blass violettamethystfarbene, durchsichtige, oktaëdrische Krystalle, welche an der Luft oberflächlich verwittern. Er ist ohne Geruch, aber von stark styptischem Geschmack, unlöslich in Weingeist, löslich in 2 Theilen Wasser von mittlerer Temperatur. Die Lösung reagirt sauer, wird durch Aetzkalklauge unter Fällung von Eisenoxydhydrat und Erwerden von Ammoniak zersetzt und giebt mit Baryumchloridlösung eine weisse Fällung.

Aufbewahrung Der Eisenammonalaun wird nicht nur vor Licht geschützt, sondern auch in dichtgeschlossenem Glasgefäss aufbewahrt, damit er im ersten Falle

einen Ferrisulfatgehalt nicht in Ferrosulfat umsetzt und im zweiten Falle das Verwittern auf das geringste Maass beschränkt bleibt

Prüfung 1) Die wässrige Lösung 1 = 20 werde nach dem Ansäuern mit Salzsäure durch eine frischberetete Kaliumferricyanidlösung nicht geblaut — 2) 30 ccm der wässrigen Lösung (1 = 20) werden nach Zusatz von 3 ccm Salpetersäure durch Silbernitrat nicht verändert, d. h. das Salz sei völlig chlorfrei

Anwendung Therapeutisch wird dieses Salz nur höchst selten angewendet, und zwar soll es ein noch kräftigeres Adstringens sein, als der gewöhnliche Alaun. Die hauptsächlichste Verwendung findet es in der Analyse und zwar als Indikator bei der Chlortitration nach VOLHARD, s. S. 58, und zur Hervorbringung der Identitätsreaktion des Morphins (Blaufärbung)

Ferrum tartaricum.

I Ferrum tartaricum (Ergänz.) Ferrum tartaricum (Brit.) Ferritartrat. Eisentartrat. Weinsaures Eisenoxyd $(C_4H_4O_6)_2 \cdot Fe_2 + H_2O$. Mol. Gew. = 574

Darstellung. Man fällt aus einer Mischung von 100 Th. Ferrichloridlösung (spec. Gew. 1,280—1,282) und 400 Th. Wasser in der auf S. 1092 angegebenen Weise mittels einer Mischung von 100 Th. Ammoniakflüssigkeit (spec. Gew. 0,960) das Eisen als Ferrhydroxyd. Der Niederschlag wird bis zur Chlorfreiheit gewaschen, dann in eine Lösung von 40 Th. Weinsäure und 150 Th. Wasser, welche sich in einer Porzellanschale befindet, eingetragen und bei gewöhnlicher, jedenfalls aber 50° C. nicht übersteigender Temperatur bis zur nahezu vollständigen Lösung stehen gelassen. Die Lösung wird filtrirt, bei nicht über 50° C. zum Syrup eingedunstet, dieser auf Glasplatten gestrichen und bei nicht über 50° C. getrocknet.

Eigenschaften. Dünne, durchscheinende, rubinrothe Blättchen von säuerlichem Eisengeschmack. Sie verkohlen beim Erhitzen unter Verbreitung von Karamelgeruch und hinterlassen schliesslich Eisenoxyd. Leicht löslich in kaltem Wasser, in siedendem Wasser unter Abscheidung von etwas basischem Salz noch leichter löslich, die wässrige Lösung rothet blaues Lackmuspapier.

Die wässrige Lösung giebt nach dem Ansäuern durch Salzsäure mit Kaliumferricyanid einen tiefblauen Niederschlag. Durch Kalilauge wird sie in der Kälte nur dunkler gefärbt, nicht gefällt, erst beim Kochen scheidet sich ein braunrother Niederschlag ab. Wird das alkalische Filtrat mit Essigsäure übersättigt, so scheidet sich beim Stehen ein krystallinischer Niederschlag von Kalumbitartrat ab.

Prüfung. 1) Die wässrige Lösung (1 = 20) werde durch Kaliumferricyanid nur blaugrün gefärbt, nicht blau gefällt (Oxydulsalz) und nach dem Ansäuern mit Salpetersäure durch Silbernitrat nur opalisirend getrübt (Chlor, von welchem Spuren zuzulassen sind) — 2) 1,0 g. des Präparates hinterlasse beim Verbrennen 0,248—0,257 g. Ferroxyd, welches nicht alkalisch reagiren soll, entsprechend einem Gehalt von 17—18 Proc. metallischem Eisen. (Brit. schreibt vor, dass 1 g. = 0,8 g. Ferroxyd hinterlassen solle, entsprechend einem Gehalt von 21 Proc. metallischem Eisen.) Die Aufbewahrung erfolge vor Licht geschützt, die Anwendung ist die gleiche wie die des Ferrum citricum.

II Ferri-Ammonium tartaricum Tartrate ferri-co-ammonique (Gall.) Ferrum tartaricum ammoniatum. Ferrum tartaricum cum Ammonio. Ammonium tartaricum ferratum. Ammoniumferritartrat. $C_4H_4O_6(FeO)NH_4 + 2H_2O$. Mol. Gew. = 274. Das im Folgenden zu besprechende Präparat der Gall. ist zu dispensiren, wenn es von Aerzten, welche der romanischen Rasse angehören, verordnet wird.

Darstellung. Man fällt aus 560 Th. Ferrichloridlösung (spec. Gew. 1,280—1,282) nach gehöriger Verdünnung mit Wasser durch 560 Th. Ammoniakflüssigkeit (spec. Gew. = 0,960), welche gleichfalls gehörig verdünnt sind, in der auf S. 1092 angegebenen Weise

das Eisen als Ferrhydroxyd, wäscht dieses bis zu annähernden Chlorfreiheit aus. Den gut abgetropften Niederschlag bringt man in eine Porcellanschale, fugt 150 Th gepulverte Weinsäure zu. Man erwärmt schwach und fügt, wenn das Eisen in Lösung gegangen und die Flüssigkeit eine mehr gelbliche Färbung angenommen hat, unter Umrühren in kleinen Portionen soviel Ammoniakflüssigkeit (von 0,960 spec Gew, ca 180 Th) hinzu, dass die Flüssigkeit deutlich nach Ammoniak riecht und klar (!) ist. Dann dunstet man bei nicht über 60° C ein, streicht auf Glasplatten und trocknet.

Eigenschaften Das Ammoniumferritartrat bildet amorphe, glänzende, durchscheinende, granatrothe, in Masse dunkel rothbraune, mild styptisch-süßlich schmeckende Lamellen, welche sich in Wasser leicht, nicht in Weingeist lösen. Es enthält annähernd 30 Proc Eisenoxyd oder 20,44 Proc Eisen.

Aufbewahrung In gut verstopften Glasgefassen vor Licht geschützt.

Anwendung Man hat dieses Präparat vorzugsweise bei Chlorose, Chorea, Neuralgien, typhoiden Fiebern, Erysipelas, nervöser Hysterie u d m in Gaben zu 0,3—0,5—0,8 zweier- bis viermal täglich angewendet.

Ferri et Ammonii Tartras (U-St) Iron et Ammonium Tartrate ist von den vorigen verschieden. 105 Th Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec Gew 1,428—1,430) werden in gehöriger Verdünnung durch 110 Th Ammoniakflüssigkeit von 0,960 spec Gew in der S 1092 angegebenen Weise zersetzt. Das gebildete Ferrhydroxyd wird ausgewaschen, dann in einem leinenen Kolatorium thunlichst ausgepresst. Dann löst man 14,5 Th Weinsäure in Wasser, neutralisirt diese Lösung genau (!) mit (ca 33 Th Ammoniakflüssigkeit, fügt nochmals 14,5 Th Weinsäure hinzu, löst das ausfallende Ammoniumbitartrat durch gelindes Erwärmen, bringt unter Umrühren den ausgepressten Niederschlag in kleinen Portionen hinzu und erwärmt bei nicht über 60° C, bis Auflösung erfolgt ist. Man filtrirt die Lösung noch heiss, dunstet sie bei nicht über 60° C zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet.

Granatrothe bis braunrothe, etwas hygroskopische Blättchen, leicht löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Sie enthalten 17 Proc metall. Eisen. Ihre Zusammensetzung entspricht etwa der Formel $(C_4H_4O_6)_2 Fe_2O_3 \cdot 2NH_4 + 9H_2O$. **Aufbewahrung.** Vor Licht geschützt. **Anwendung** Wie das vorige.

Sirupus Ferri tartarici ammoniati Sirop de tartrate de fer ammoniacale (Gall.) Ferri tartarici ammoniati 25,0, Aquae destillatae 25,0, Sirupi Sacchari 950,0.

III Ferri-Kalium tartaricum Tartarus ferratus (Ergänz. Helv.) Tartrate ferrico-potassique (Gall.) Ferri et Potassii Tartras (U-St) Ferium tartarisatum Tartarus martiatus purus. Eisenweinstein. Kaliumferritartrat. $C_4H_4O_6(FeO)K$. Mol Gew. = 259.

Die Darstellungsvorschriften der Arzneibücher können als identisch angesehen werden.

Darstellung. Man trägt eine Mischung von 300 Th Ferrichloridlösung (spec Gew 1,280—1,282) und 1600 Th Wasser in eine Mischung von 300 Th Ammoniakflüssigkeit (spec Gew 0,960) und 6000 Th Wasser ein, wäscht das gefällte Ferrhydroxyd in der auf S 1092 angegebenen Weise sorgfältig aus, der noch feuchte Niederschlag wird in einer Porcellanschale mit 100 Th gepulvertem Kalumbitartrat und der erforderlichen Menge Wasser unter Ausschluss des Sonnenlichtes im Dampfbade bei nicht über 60° C erwärmt, bis er sich unter Hinterlassung eines nur geringen Rückstandes gelöst hat. Die filtrirte Lösung wird bei etwa 60° C zum Sirup eingedampft, dieser auf Glasplatten gestrichen und bei 50—60° C unter Lichtabschluss getrocknet. Starke Erhitzung beim Eindampfen und Einwirkung des Sonnenlichtes befördern die Bildung von Ferrotartrat.

Dünne, braunroth durchscheinende, glänzende Blättchen von fast schwarzer Farbe, von mild adstringirendem, kaum eisenartigem Geschmack, löslich in 5 Th Wasser, unlöslich in Alkohol. Hinterlässt beim Glühen einen stark alkalischen, Eisenoxyd enthaltenden Rückstand. Der obigen Formel entspricht ein Gehalt von 21,62 Proc metall. Eisen. **Ergänz.** verlangt einen Eisengehalt von etwa 21 Proc, U-St dagegen bei gleicher Darstellung nur von 15 Proc Fe. Dementsprechend wird aus 1 g des Präparates erhalten werden müssen Ferroxyd Fe_2O_3 . Nach **Ergänz.** = 0,3 g, nach U-St. = 0,215 g.

Aufbewahrung Diese ist dieselbe, wie beim vorhergehenden Präparate.

Prüfung. Eine vollständige Löslichkeit in 10 Th Wasser und nur eine weisse Trübung durch Schwefelwasserstoff genügen als Zeichen der Reinheit. Spuren Ferrooxyd werden in dem Präparate immer vorhanden sein.

Anwendung Der reine Eisen Weinstein ist ein sehr mildes Eisensalz, welches wie das vorhergehende und in gleicher Gabe angewendet wird. Es wird nur selten gebraucht.

Soluté de tartrate ferrico-potassique Tinctura Martis (Gall.) Ferri Kali tartarici 1 Th Aquae destillatae 4 Th Man löse in der Kälte und filtrire.

Sirupus Tartari ferrati. Sirup de tartrate ferrico-potassique (Gall.) Ferri Kali tartarici, Aquae destillatae aa 25,0, Sirupi Sacchari 950,0

IV Ferro-(Ferri-)Kalium-tartaricum crudum Tartarus ferratus crudus (Erganzb) Tartarus martiatus crudus Rohrer Eisen Weinstein Ein Gemisch aus Ferrotartrat, Ferritartrat und Weinstein.

Bereitung 1 Th grobgepulverte Eisenfeile und 5 Th grobgepulverter Weinstein werden in einem ordnen Gefässe mit Wasser zu einem Brei angerührt und dieser unter öfterem Umrühren und Ersatz des verdampften Wassers solange bei 35—40° C digerirt, bis eine gleichmässige, schwarze Masse entstanden ist, und bis eine aus der gut umgerührten Masse entnommene Probe sich zum grössten Theile (zu einer grunschwarzen Flüssigkeit) löst. Man trocknet alsdann die Masse an einem warmen Orte ein und verwandelt sie in ein mittelfeines Pulver. Ausbeute etwa 5,6 Theile.

Schmutzig grünliches, mit der Zeit braun werdendes Pulver, in 16 Th kaltem Wasser zum grössten Theile löslich. Hinterlässt beim Glühen eine stark alkalische, Eisenoxyd enthaltende Asche.

Anwendung. Der Eisen Weinstein wird hauptsächlich zur Darstellung von Eisen- oder Stahlbädern gebraucht. Zu einem Vollbade gehören 75,0—100,0 g Eisen Weinstein. In Wasser oder Wein gelöst, gebrauchen ihn bleichsüchtige Mädchen als ein billiges Eisenmittel. Die Dosis ist circa 0,8—1,0 g zwei- bis dreimal des Tages. Das reine Präparat wird auch in Wasser gelöst zum Verbands von eiternden Wunden und Schankern angewendet.

Globuli martiales (Austr.) Boile de Nancy Stahlkugeln. Im Handverkauf wird der rohe Eisen Weinstein in Form von Kugeln gefordert. Zur Darstellung derselben werden 100 Th des gepulverten rohen Eisen Weinstein mit 20 Th destillirtem Wasser und 1 Th gepulvertem arabischem Gummi angerührt und im Wasserbade so lange erwärmt, bis sich aus der warmen Masse Kugeln formen lassen. Man macht dieselben 35,0—36,0 g schwer und lässt sie an einem lauwarmen Orte langsam austrocknen. Nach dem Trocknen überstreicht man sie mit einer Lösung des arabischen Gummis, welcher einige Tropfen Galläpfeltinktur zugesetzt sind, damit sie glänzend und schwarzlich werden. Eine Kugel wiegt dann ca 30,0 g. Man hat auch Messingformen, in denen man die Kugeln durch Pressung darstellt.

Pulvis aerophorus martiatus HUFELAND		
Rp	Tartari ferrati	5,0
	Magnesi carbonici	15,0
	Tartari depurati	30,0
Tablettes de tartrate de fer ammoniacal (Gall.)		
Rp	Ferri Ammonii tartarici	86,0
	Sacchari	1000,0
	Sacchari Vanillae	30,0
	Mucilaginis Tragacanthae	100,0
	Plant. tabulettarum No	1000

Tinctura Ferri tartarizata		
Tinctura Martis Ludovici seu Glauberi		
Rp	1 Ferri sulfurici cryst.	8,0
	2 Tartari depurati	4,0
	3 Aquae destillatae	30,0
	4 Spiritus diluti	70,0
Man reibt 1 und 2 mit 3 fein an, digerirt die Mischung unter häufigem Umschütteln 24 Stunden, fügt 4 hinzu, lässt einige Stunden absetzen und filtrirt.		

Ferrum valerianicum.

Ferrum valerianicum Ferri Valerianae (U-St.) Ferrivalerianat. Ferri-subvalerianat. Baldriansaures Eisenoxyd. Ist ein basisch valeriansaures Eisenoxyd von nicht ganz konstanter Zusammensetzung.

Darstellung. 20,0 Valeriansäure werden mit einer Lösung von 25,0 krystallisiertem Natriumkarbonat in 225,0 destilliertem Wasser oder mit soviel dieser Lösung versetzt, dass eine neutrale Flüssigkeit entsteht. Nachdem noch zweimal soviel krystallisiertes Natriumkarbonat, als zur Sättigung erforderlich war, zugegeben und in Lösung gebracht worden ist, wird filtrirt und in das kalte Filtrat nach und nach in kleinen Mengen 100,0 Ferrichloridlösung von 1,280—1,282 spec Gew., verdünnt mit gleichviel Wasser, unter Umrühren emgegossen. Ware die in der Ruhe sich klärende Flüssigkeit noch gelblich gefärbt, so giebt man noch einige Tropfen der Natriumkarbonatlösung hinzu, um die Fällung vollständig zu machen. Den Niederschlag sammelt man auf einem Filter, wäscht ihn mit kaltem Wasser aus und trocknet ihn in dünner Schicht auf einer porösen Porcellanplatte ausgebreitet vor Tageslicht geschützt an einem Orte, dessen Temperatur 25° C nicht überschreitet. Ausbeute circa 33,0

Eigenschaften. Das Ferrisubvalerianat ist ein rothbraunes, nach Valeriansäure riechendes, in Wasser unlösliches, in Alkohol lösliches Pulver von mild styptischem Geschmacke.

Seine Zusammensetzung entspricht etwa der Formel $\text{Fe}_2(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2)_2(\text{OH})_4$. Mol Gew = 382. Dieser Formel entspricht ein Gehalt von rund 29,5 Proc metall. Eisen oder 41,8 Proc Ferroxyd. U-St fordert für ihr Präparat nur einen Gehalt von 15—20 Proc metall. Eisen, entsprechend 21,5—23,6 Proc Ferroxyd, was eben mit der wechselnden Zusammensetzung dieses Salzes zusammenhängt.

Aufbewahrung. In gut verstopfter Flasche vor Tageslicht geschützt.

Anwendung. Man hat das Ferrisubvalerianat bei Chlorose, welche von hysterischen oder epileptischen Krämpfen begleitet ist, und bei Chorea angewendet. Gabe 0,2—0,5—1,0 zwei- bis dreimal täglich in Bissen oder Pillen.

Ferri salia varia.

I. Ferrum oleinicum. Oelsaures Eisen, flüssige Eisenseife. 100 Th käufliche Oelsäure, 10 Th Eisenpulver und 15 Th Wasser werden in einen Glaskolben gegeben und unter bisweiligem Umschütteln 8 Tage hindurch* in der Wärme des Wasserbades digerirt. Dann wird die erwärmte dunkelbraune Flüssigkeit durch ein Bäschchen mit Oelsäure getränkter Baumwolle filtrirt.

Diese Eisenseife wurde von KRAL als Heilmittel von Wunden und Geschwüren empfohlen und als Specialität in den Handel gebracht.

Unguentum Saponis ferriol

Rp Ceræ flavae 10,0

Ferri oleinici 20,0

Man mischt unter gelindem Erwärmen und rührt
alsdann bis zum Erkalten.

Unguentum Saponis ferriol cum Acido carbolico

Rp Unguenti Saponis ferriol 30,0

Acidi carbolici puri 1,0

Salbe (auf schlaffe oder faulig eiternde Wunden
und Geschwüre)

II Ferrum sebacinum. Emplastrum ferratum. Emplastrum martiatum. Emplastrum Martis ex Sebo. 150 Th einer gut ausgetrockneten Talgseife werden zerschnitten in 1500 Th. heissem destillirtem Wasser gelöst und dann unter Umrühren mit 80 Th Ferrichloridlösung oder soviel davon versetzt, als dadurch ein Niederschlag entsteht. Dieser wird in kaltem Wasser malaxirt und in Stangen ausgerollt. Ausbeute circa 100 Theile. Wird zum Verbands der Wunden gebraucht, allerdings höchst selten.

III Ferrum tannicum. (Ergänzb.) Ferritannat, Gerbsaures Eisenoxyd. Tannate ferrique. Tannas ferrieus.

Zu einer Lösung von 65 Th. Gerbsäure in 500 Th Wasser wird eine Mischung von 100 Th Ferriacetatlösung (Liquor Ferri subacetici Germ s S 1092) mit 200 Th Wasser unter Umrühren in langsamem Strahle zugegossen. Der entstandene Niederschlag wird nach dem Absetzen mit lauwarmem Wasser ausgewaschen, auf einem Filter gesammelt und auf porösen Unterlagen bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet.

Schwarzes geschmackloses Pulver, welches 13—14 Proc metallisches Eisen enthält 1,0 g gebe beim Verbrennen an der Luft unter Befeuchten mit Salpetersäure 0,186—0,20 g Ferrioxyd, welches an Wasser nichts Lösliches abgeben darf Vor Licht geschützt aufzubewahren

Das Präparat soll als Roborans und als Darmadstringens verwendet werden, dürfte aber keine Zukunft haben

IV Ferrum caseinatum Ferrum nucleo albuminatum.

Entrahmte und mit Wasser verdünnte Milch wird mit soviel stark verdünnter Essigsäure versetzt, dass das Kasein gefällt, ein Ueberschuss von Essigsäure aber vermieden wird (s S 670) Das gefällte Kasein wird wiederholt mit warmem Wasser, dann mit Alkohol gewaschen, zuletzt mit Aether entfettet 1 Th des so gereinigten Kaseins wird mit 1 Th Calciumcarbonat und 100 Th warmen Wassers angerieben und die entstandene Lösung von Calciumkaseinat filtrirt. Das Filtrat wird mit einem geringen Ueberschuss einer 1 procentigen, frisch bereiteten wässerigen Lösung von Ferrolaktat versetzt. Der hierdurch entstehende Niederschlag, welcher ursprünglich weiss ist, wird gewaschen und getrocknet. Er nimmt infolge des Trocknens Fleischfarbe an

Geruch- und geschmackloses, fleischfarbiges Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in schwacher Natriumcarbonatlösung, auch in Ammoniakflüssigkeit. Von Pankreatin, sowie auch von Pepsin + Salzsäure wird das Eisenkaseinat verdaut. Der Gehalt an metallischem Eisen beträgt 2,5 Proc Von Dawydow an Stelle des Eisenalbuminates als leicht resorbirbares Eisenpräparat empfohlen

V Ferrum oxalicum oxydulatum. Ferrooxalat. Oxalsäures Eisenoxydul. $\text{FeC}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Mol Gew. = 180

10 Th krystall Oxalsäure werden in 50 Th heissen Wassers gelöst, durch (27 Th.) Ammoniakflüssigkeit von 0,96 spec Gew neutralisirt und mit einer Lösung aus 21 Th krystall Ferrosulfat in 45 Th Wasser versetzt. Der entstandene Niederschlag wird nach dem Erkalten auf einem Filter ausgewaschen und an einem lauwarmen Orte getrocknet

Blassgelbes bis citronengelbes, krystallinisches Pulver, geruchlos und fast geschmacklos, luftbeständig, wenig löslich in kaltem oder in heissem Wasser, unlöslich in Weingeist. Von konc kalter Salzsäure oder heisser verdünnter Schwefelsäure wird es gelöst bez zersetzt. Beim Erhitzen an der Luft verglümmt es zu Eisenoxyduloxyd, schliesslich hinterbleiben 44,4 Proc Eisenoxyd Fe_2O_3 . Als mildes Eisenpräparat (Tonicum und Alterans) bei Anämie und Chlorosis in Gaben von 0,1—0,4 g dreimal täglich Technisch als photographischer Entwickler, auch zur Darstellung von Ferrum Hydrogenio reductum

VI Ferrum salicylicum Ferrisalicylat. Salicylsäures Eisenoxyd. Gleiche Theile Ferrichloridlösung (spec Gew 1,280—1,282) und Natriumsalicylat werden in konc Flüssigkeit mit einander vermischt. Es fällt ein brauner, bald violett sich färbender Niederschlag aus, der nach dem Auswaschen und Trocknen eine amorphe braune Masse oder ein schwarzbraunes Pulver darstellt. Wird in Gaben von 0,2—0,6 g und zwar in Pillenform als Tonicum, Antisepticum, Adstringens und Antirheumaticum gelegentlich angewendet.

VII Ferrum succinicum Man neutralisirt 32 Th Bernsteinsäure mit (ca. 90 Th.) Ammoniakflüssigkeit von 0,960 spec. Gew, verdünnt die Lösung mit einem gleichen Volumen Wasser und trägt in dieselbe eine Mischung von 100 Th. Ferrichloridlösung (spec. Gew 1,280—1,282) unter Umrühren ein. Der Niederschlag wird nach dem Absetzen von der überstehenden Flüssigkeit getrennt, bis zur Chlorfreiheit gewaschen und auf porösen Unterlagen bei 30—40° C getrocknet.

Bräunliches Pulver, nur wenig löslich in kaltem Wasser, durch siedendes Wasser wird es theilweise in Ferrihydroxyd und Bernsteinsäure gespalten (verhält sich also ähnlich wie Ferriacetat)

VIII Ferratin Ferrialbuminsäure Eisenalbuminsäure. Ferratin BOEHLINGE. In unseren Nahrungsmitteln kommt nach Buxen das Eisen in einer besonderen Form sehr

fest an Eiweiss gebunden vor. Diese Verbindung ist von SCHMIEDEBERG aus Schweinelebern abgeschieden worden, indem er diese mit Wasser auszog und den filtrirten wässrigen Auszug mit Weinsäure fällte. Das so erhaltene Produkt nannte SCHMIEDEBERG „Ferratin“. Eine Verbindung mit den gleichen Eigenschaften wie das natürliche Ferratin, also gewissermassen ein künstliches Ferratin, erhält man nach folgendem, der Firma BÖHRINGER & SOHN durch D.R.P. 72168 und 74588 geschützten Verfahren.

Darstellung. Zu einer Lösung von 100 Th. Eier-Eiweiss in 2000 Th. Wasser fügt man eine Lösung von 25 Th. Ferritartrat in 250 Th. Wasser, ferner 100 Th. einer 10 proc. Natronlauge. Die zunächst schwarzrothe Flüssigkeit wird solange auf 90° C. (im Dampfbade) erhitzt (1—2 Stunden), bis sie klar, dünnflüssig und wieder heller roth geworden ist. Dann leitet man einen Dampfstrom ein und fügt gleichzeitig Weinsäure bis zur neutralen Reaktion hinzu, säuert mit Weinsäure an und leitet den Dampfstrom noch einige Minuten weiter ein. Nachdem die Flüssigkeit sich geklärt hat, wird filtrirt. Das Filtrat macht man mit Ammoniak ammoniakalisch, erhält die Mischung alsdann mehrere Stunden bei 90° C. Durch Ansäuern mit Weinsäure fällt alsdann das Ferratin aus, welches durch nochmaliges Auflösen in ammoniakhaltigem (und Ammoniumtartrat haltigem) Wasser und Wiederausfällen aus dieser Lösung durch Weinsäure gereinigt wird. Der Niederschlag wird gewaschen, schliesslich getrocknet und gepulvert.

Eigenschaften. Ein rothbraunes Pulver in Wasser und schwach angesäuertem Wasser unlöslich, in grossen Mengen Weinsäure jedoch löslich. Frisch gefällt ist es in kaltem schwach alkalischem, scharf getrocknet in gelinde erwärmtem, schwach alkalischem Wasser sehr leicht löslich. Es enthält 7—10 Proc. Eisen, aber nicht in Form eines Salzes, sondern — nach Ansicht der Erfinder — direkt an Kohlenstoff gebunden.

Von den gewöhnlichen Eisenalbuminaten unterscheidet sich die Verbindung durch folgende Reaktion. Löst man 0,06 g. des Präparates in 20 cem ammoniakhaltigem Wasser und fügt 1 Tropfen 50 proc. Schwefelammoniumlösung hinzu, so verändert sich innerhalb 3 Minuten die Flüssigkeit nicht, erst von da ab tritt Dunkelfärbung ein infolge Bildung von Schwefeleisen.

Anwendung. Als leicht verdauliches und angenehm zu nehmendes Eisenpräparat in Form von Pulvern oder Pastillen zu 0,5—2,0 täglich in gebrochener Dosis (Kinder entsprechend weniger) bei Chlorose, akuter Anämie und grossen Blutverlusten. Neuerdings wird auch ein lösliches Natrium-Ferratin dargestellt und verordnet.

Ferripton. Ein von Apotheker KUNZE in Serkowitz bei Radebeul dargestelltes, koncentrirtes und säurefreies Eisenpräparat, welches die Zähne nicht angreifen und in der vorgeschriebenen Verdünnung geruch- und geschmacklos sein soll.

Filix.

I Nephrodium Filix mas Michaux (syn. *Aspidium Filix mas* (L.) Sw., *Polystichum Filix mas* Rth.) Familie der Polypodiaceae—Aspidiaceae—Aspidiinae

Heimisch in ganz Europa, von der Ebene bis auf 2000 m steigend, in Algerien, Nordasien, Kaukasus und Himalaya, in Amerika südwärts bis Peru. Blätter der Pflanze einen Trichter bildend, nach vorn allmählich, nach dem Grunde wenig verschmälert, oberseits dunkelgrün, unterseits heller mit haarähnlichen Spreuschuppen, Stiel kürzer wie die Blattfläche, mit grossen, braunen Spreuschuppen. Fiedern abwechselnd, kurz gestielt, aus breiter Basis lineal lanzettlich, Fiederchen am Grunde mit breiter Basis mit einander verschmelzend, kerbig oder angeschnitten gesägt. In der Regel nur der mittlere und obere Theil der Blätter fruktificierend, die Sori zwerchlagig an den Fiederchen, selten bis zur Spitze derselben vorhanden. Indusium herz-merenförmig. Sporangium mit unvollständigem, auf der Bauchseite in die schmalen Zellen des Stomium übergehenden Ring. Sporen dunkelbraun mit unregelmässigen, gewundenen Leisten. Verwendung findet.

das Rhizom mit den stehengebliebenen Blattbasen. *Rhizoma Filicis* (Germ. Helv.). *Radix Filicis maris* (Austr.). *Filix mas* (Brit.). *Aspidium* (U-St.). *Radix Nephrodii crenati*. *Radix Polypodii filix mas*. — Farnwurzel. Wurmfarawurzel. Bandwurmwurzel. Johannisswurzel. Teufelsklaus. — Rhizome de fougère mâle (Gall.). — Male Fern.

Beschreibung. Das wagerecht oder schräg in der Erde liegende Rhizom erreicht eine Länge von 30 cm (das längste der einheimischen Farne), seine Dicke beträgt 2—2,5 cm, erscheint aber durch die zahlreichen Basen abgestorbener Blätter, die dem Rhizom ange-drückt sind, bis 6 cm dick. Auf dem Querschnitt ist das Rhizom höchst unregelmässig infolge der durch die Blattstielbasen verursachten Eindrücke, am hinteren Ende mit zahlreichen aus den Blattstielbasen vordringenden Wurzeln, am vorderen Ende häufig mit einer Knospe schneckenförmig eingerollter Blätter. Das ganze Rhizom ist in zahlreiche Spreublättchen eingehüllt. Die Blattbasen sind nach oben und unten etwas verjüngt, also von gedrun-gen spindelförmiger Gestalt, glänzend dunkelbraun, die an der Unterseite und an den Seiten stehenden sind nach oben aufgebogen. Ihr Querschnitt ist von rundlich ovaler Gestalt, an der dem Rhizom zugedrehten Seite etwas abgeplattet, er zeigt in einen lockeren Kreis gestellte Gefässbündel, von denen 5—10 vorhanden sein können, am häufigsten 7—9 (Fig. 245). Die einzelnen Bündel sind konzentrisch gebaut, sie haben das Xylem im Centrum vom schmalen Phloëm und dieses wieder von einer Endodermis umgeben. Die Spreuhaare sind von gestreckt lanzettlicher Gestalt, von breiterem Grunde ausgehend in eine schlanke Spitze endigend, am Rand mit spärlichen, aber kräftig ausgebildeten, aus meist 2 Zellen bestehenden Zähnen, an der Basis oft zwei kleine Drüsen.




Fig. 244.

Querschnitt durch das Rhizom von *Nephrodium Filix mas* Michaux. f Gefässbündel.

Das Rhizom selbst lässt auf dem Querschnitt einen Kreis von ungefähr 8 stärkeren Bündeln erkennen und ausserhalb desselben eine grössere Anzahl kleinerer Bündel (Fig. 244). Dieselben sind gebaut wie die in den Blattbasen. Das Grundgewebe ist ein lückiges, getüpfeltes Parenchym, das reichlich Stärkemehl enthält in meist rundlichen, etwas abgeflachten, oft aber auch eiförmig oder unregelmässig gestalteten Körnchen, die bis 18 μ gross sind. In den grossen Interzellularräumen trifft man häufig auf einzellige kuglige Drüsenhaare, die durch eine Wand von der Parenchymzelle, der sie aufsitzen, abgetrennt sind (Fig. 246). Die Drüsen sondern zwischen ihrer Membran und der infolgedessen abgehobenen Cuticula ein grünlich-gelbes Sekret ab, in welchem man die wirksamen Bestandtheile der Droge (vergl. unten) erblickt. Neben der Stärke führen manche Parenchymzellen braunen Inhalt, der mit Eisensalzen schmutzig grün und danach mit Natriumkarbonat behandelt violett oder blau wird (Gerbstoff). Der Querschnitt des Rhizoms sowohl wie der Blattbasen muss von grüner und nicht brauner Farbe sein.




Fig. 245. Querschnitt durch die Blattbasis von *Nephrodium Filix mas*. Michaux, schwach vergr.

Bestandtheile. Filixsäure (vergl. unten), ätherisches Oel 0,04—0,05 Proc. in der im Herbst und 0,025 Proc. in der im Juni gesammelten Droge. Dasselbe ist hellgelb von intensivem Geruch der Droge und aromatisch-brennendem Geschmack. Leicht löslich in Aether und absolutem Alkohol. Spec. Gew. 0,85—0,86. Das Oel beginnt bei 140° C. zu sieden, über 250° C. tritt Zersetzung ein. Es enthält neben freien Fettsäuren (Buttersäure) Hexyl- und Octyl-Ester der Fettsäuren von der Buttersäure bis etwa zur

Pelargonensäure Gerbstoff (Filixgerbsäure) zu etwa 10 Proc von glukosidischem Charakter, liefert mit verdünnten Säuren einen nicht krystallisirbaren Zucker und das Phlobaphen (Filixroth), das auch in der Droge vorkommt. Letzteres hat die Zusammensetzung $C_{22}H_{18}O_{12}$ und liefert mit Kali geschmolzen Phloroglucin und Protocatechusaure. Mit Eisenchlorid wird der Gerbstoff olivengrün. Die braune Farbe älterer Droge ist durch das Filixroth bedingt. Flavaspidsäure, Albaspidin, Aspidinol. Fettes Oel (Filixöl) zu 5–6 Proc, besteht aus Glycerinestern der Filosmylsäure und Filixolinsäure, Zucker 11 Proc. Filixwachs, eine braunlich gelbe, amorphe Masse, die bei 69° C schmilzt, leicht in heissem Alkohol und Petroläther, schwer in Aether löslich. Harz, aus dem Filixroth und weiteren Umwandlungsprodukten des Gerbstoffes bestehend. Wassergehalt etwa 14 Proc, Asche 1,4–3,0 Proc, davon 0,1–0,3 Proc in Salzsäure unlöslich. Als Hauptträger der Wirksamkeit gilt die Filixsäure (vergl unten), ferner in zweiter Linie das ätherische Oel, beide bilden mit dem fetten Filixöl ein inniges Gemisch (Emulsion), vielleicht sogar eine lockere Verbindung. Auch der Gerbstoff soll an der Wirkung theilhaftig sein.




Fig 246 Querschnitt durch das Rhizoma Filidis
a Gütüpfelte Zellen. b Stärke. c Drüsenhaare

Verwechslungen und Verfälschungen

Die Rhizome der übrigen in Mitteleuropa heimischen Farne sind meist im Aussehen und in den Dimensionen dem von N f m so unähnlich, dass an eine irrtümliche Verwendung solcher in der Apotheke nicht wohl zu denken ist. Da wir aber jetzt nach neuesten Untersuchungen von Hausmann wissen, dass solche Rhizome nicht selten auf Extrakt (vergl dort) verarbeitet werden, so ist es doch wünschenswerth, die unterscheidenden Merkmale solcher Rhizome anzugeben.

1) *Aspidium spinulosum* Sw. (syn *Polystichum spinulosum* D O) Rhizom aufsteigend, 5 cm lang, Durchmesser 8 mm, locker mit Blattbasen besetzt. Im Querschnitt unregelmässig gebuchtet, mit 5–7 Gefässbündeln. Blattbasen im Querschnitt mit 5–8, meist 6 und 7 Gefässbündeln. Im Parenchym Drüsen. Spreublättchen ziemlich breit, in eine lange, aus einer Zellreihe bestehende Spitze mit einer (oft abgebrochenen) Drüse auslaufend. Rand des Spreublättchens wenig buchtig, mit wenig Drüsen.

2) *Aspidium cristatum* Sw. (syn *Polystichum cristatum* Roth) Im Parenchym Drüsen. Blattbasen im Querschnitt mit 5–8, meist 5 und 6 Bündeln. Spreublättchen ganzrandig, selten mit kurzen und stumpfen Zähnen, breit, Drüsen am Rande sehr spärlich oder fehlend.

3) *Aspidium montanum* Aschers. (syn *Polystichum montanum* Roth) Rhizom kurz, aufsteigend. Drüsen im Parenchym fehlend. Spreublättchen ganzrandig, Drüsen von zweierlei Form, kleine, einzellige und grössere mit 2–3zelligem Saft, nicht nur am Rande, sondern auch auf der Fläche. Blattbasen im Querschnitt fast dreieckig, zwei Gefässbündel zeigend.

4) *Aspidium rigidum* Sw. (syn *Polystichum rigidum* D C) Im Parenchym Drüsen. Blattbasen im Querschnitt fast rund mit 4–6 Bündeln, von denen drei grösser sind. Spreublättchen am Rande mit spärlichen Zähnen, am Rande mit kleinen Drüsenhaaren.

5) *Aspidium lobatum* Sw. Ohne Drüsen im Parenchym. Blattbasen im Querschnitt dreieckig mit ausgezogenen Seiten, mit 4–6 Bündeln. Spreublättchen ohne Drüsen, am Rande durch die zahlreichen Zähne verzerrt.

6) *Aspidium dilatatum* Sw. Im Parenchym Drüsen. Spreublättchen wie bei *A. spinulosum*, aber mehr in die Länge gezogen und allmählicher zugespitzt.

7) *Asplenium Filix femina* Bernh. (syn *Aspidium Filix femina* Sw. *Athyrium Filix femina* Roth) Rhizom schief aufsteigend, 10 cm lang, 0,5–1,0 cm im Durchmesser, innen blassgrün, im Querschnitt mit 4–7 Bündeln. Im Parenchym keine Drüsen. Blattbasen im Querschnitt fast dreieckig mit breiter Basis, mit 2 Bündeln, ähnlich wie *A. montanum*, aber grösser. Spreublättchen ganzrandig, ohne Drüsen. — (Vergl weiter Schwarz, *Wochenschrift f. Pharmacie* 1896 p 440)

Einsammlung, Aufbewahrung. Uebereinstimmend lassen die Arzneibücher die Droge im Spätsommer oder Herbst sammeln, von den Spreuschuppen, Nebenwurzeln und abgestorbenen Theilen soviel wie möglich befreien, ohne Schälung bei gelinder Wärme trocknen und nicht über ein Jahr aufbewahren. Das in nicht zu grosser Menge hergestellte Pulver soll hellgrün sein, es wird in braunen, gut geschlossenen Gläsern oder im Dunkeln untergebracht, ein gelbliches oder zimmtbraunes Pulver darf weder abgegeben, noch zur Extraktbereitung verwendet werden. 100 Th lufttrockner Droge liefern 85–90 Th Pulver. Nach CAESAR und LORETZ soll die auf vulkanischem Boden, dann die auf Thonschiefer gewachsene Pflanze am gehaltreichsten sein.

Da auch bei sorgfältigster Aufbewahrung einzelne Rhizome nach längerem Liegen nicht mehr „grünbrechend“ sein werden, so sei darauf hingewiesen, dass in Deutschland nur für die Apotheker Bayerns eine gesetzliche Verpflichtung, die Farnwurzel jederzeit vorrätig zu halten, besteht.

Wirkung und Anwendung. Das Farnrhizom und die aus ihm hergestellten Präparate (Extrakt) sind eines der am besten und sichersten wirkenden Bandwurmmittel (sowohl bei *Taenia* wie bei *Botriocephalus*). Meist werden die Bandwürmer durch das Mittel nicht getödtet, sondern nur betäubt, weshalb es darauf ankommt, sie durch ein folgendes Abführmittel zu entfernen. Es ist aber zu beachten, dass die Filixsäure, wenn sie resorbiert wird, auch für den Menschen ein starkes, das Centralnervensystem lähmendes Gift ist, ferner sind häufig einseitige oder doppelseitige Erblindungen beobachtet. Von 78 beobachteten Vergiftungsfällen endeten 12 mit dem Tode. Der Apotheker sollte, auch wenn der Abgabe des Farnrhizoms und seiner Zubereitungen (in Oesterreich darf das Extrakt nur gegen ärztliche Verordnung verabfolgt werden) keine gesetzlichen Hindernisse entgegenstehen, sich unter keinen Umständen auf eine Bandwurmkur einlassen. Da die Resorption der Filixsäure besonders erleichtert wird, wenn sie in Oel gelöst ist, so ist die Verwendung von Ricinusöl als Abführmittel neuerdings aufgegeben und man bedient sich eines anderen Laxans, etwa Kalomel.

Die Droge selbst findet kaum noch Verwendung, meist benutzt man das ätherische Extrakt, neuerdings auch die reine Filixsäure (vergl. unten).

Das Vorrätighalten des Rhizoms vermeidet man am besten ganz und verarbeitet das frisch bezogene Rhizom sofort auf ätherisches Extrakt, das man in kleinen, ganz gefüllten Gläsern aufbewahrt. Die Droge beziehe man im Herbst, wenn man nicht im Stande ist, sie selbst sammeln zu lassen, nur aus ganz zuverlässiger Quelle. Die grüne Farbe des Rhizoms im Querschnitt ist noch kein Beweis für dessen Frische, dagegen nicht grünes natürlich unter allen Umständen zu verwerfen. Ebenso beziehe man das fertige Extrakt nur aus ganz zuverlässiger Quelle, wo man sicher ist, dass die Angaben über das Alter des Präparates auf Wahrheit beruhen, und ferner, dass nur die officinelle Droge zu seiner Herstellung benutzt wurde. Wir wissen durch neueste Untersuchungen von HAUSMANN, dass auch die Rhizome anderer Farne auf Extrakt verarbeitet werden, für *Aspidium spinulosum* Sw darf das als sichergestellt angesehen werden (E. MAACK bringt dieses Extrakt neuerdings in den Handel). Verschiedene der im Handel befindlichen Extrakte enthalten keine Filixsäure, sondern Aspidin $C_{22}H_{22}O_7$, welches in dem genannten Farn vorkommt.

Um zu entscheiden, ob ein Extrakt Filixsäure oder Aspidin enthält, wird ein Quantum desselben nach HAUSMANN mit soviel gebrannter Magnesia angerieben, dass ein homogenes Pulver entsteht. Dieses wird durch ein Sieb geschlagen und auf je 50 g mit 10 l Wasser 1–1½ Tag ausgelaut. Die abfiltrirte Lösung wird mit Schwefelsäure angesäuert, der entstandene Niederschlag durch Koliren gesammelt, die Schwefelsäure ausgewaschen und der Niederschlag über conc. Schwefelsäure getrocknet. Die Ausbeute beträgt 6–18 Proc. Aspidinhaltige Extrakte geben relativ geringe Ausbeute. — Das trockne Pulver wird dann in möglichst wenig Aether gelöst. Enthält die Lösung Aspidin, so erstarrt sie innerhalb weniger Stunden zu einem krystallinischen Brei, den man in kleinen Portionen in Alkohol absolutus einträgt und damit verrührt. Die fast unlöslichen Krystalle des Aspidins

können dann durch Filtriren, Absaugen und Nachwaschen von der Mutterlauge getrennt werden. Man reinigt sie durch Lösen in siedendem absoluten Alkohol und wiederholt die Operation. Das reine Aspidin hat dann den Schmelzpunkt $124-125^{\circ}\text{C}$ — Erstarrt die ätherische Lösung nicht, so lässt man den Aether zum grossen Theil freiwillig verdunsten, versetzt mit einer grosseren Menge Aceton und lässt längere Zeit stehen, wobei sich die Filixsäure als undeutlich krystallinisches Pulver abscheidet, das man auf dem Saugfilter sammelt und so lange mit Aceton nachwascht, bis dasselbe nicht mehr rothgelb, sondern gelb abläuft. Die Filixsäure auf dem Filter krystallisirt man wiederholt aus heissem Essigather um, bis sie den Schmelzpunkt $184-185^{\circ}\text{C}$ zeigt. Der Gehalt an Filixsäure in den untersuchten Extrakten schwankte von 0,15—1,8 Proc, derjenige an Aspidin von 0,5—1,8 Proc. Von 19 untersuchten Extrakten enthielten 4 Aspidin. Uebrigens sollen Extrakte aus *Aspidium spinulosum* ebenfalls anthelmintisch wirken.

Bestimmung des Gehaltes an Filixsäure im Extractum Filicis nach FROMM. 5,0 Extract Filicis, 30,0 Aether und 100,0 Baryhydratlösung (1proc) werden in einer 200 g-Flasche 5 Minuten anhaltend geschüttelt, dann in einen Scheidetrichter gegossen und 10—15 Minuten der Ruhe überlassen. Von der unteren, wässrigen Lösung werden 86,0 (= 4,0 Extract) mit 25—30 Tropfen Salzsäure übersättigt und nacheinander mit 25, 15, 10 und 10 ccm Aether ausgeschüttelt. Die vereinigten ätherischen Ausschüttelungen werden nach dem Filtriren in einem tarirten 100,0 g Kolben zur Trockne abgedunstet. Der Rückstand wird mit 1 ccm Amylalkohol und 1 ccm Methylalkohol über freier Flamme durch Schwenken gelöst und der Lösung so lange tropfenweise Methylalkohol zugegeben, bis die Lösung beim Schwenken nicht wieder klar wird. Dann wird soviel Methylalkohol zugegeben, dass die ganze verwendete Menge desselben 30 ccm beträgt, worauf sich die Filixsäure ausscheidet. Das Ganze lässt man dann 10—12 Stunden bei möglichst niedriger Temperatur stehen, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wäscht Kolben- und Filtrerrückstand mit 2×5 ccm Methylalkohol aus, presst das Filter mit Inhalt zwischen Fließpapier vorsichtig aus, bringt es in den Kolben zurück, trocknet zunächst bei 40°C , dann bei 80°C und wägt. — Das Gewicht minus Kolben und Filter ist die Filixsäure in 4,0 g Extract. Der nach diesem Verfahren ermittelte Gehalt an Filixsäure ist viel höher wie der oben von HAUSMANN ermittelte, er beträgt nach CAESAR und LORETZ 5,09—9,80 Proc.

Electuarium anthelminticum. Wurmlatwerge (DIERCKH) Farnrhizom, Wurzelsamen je 20 Th, Jalapenknollen 5 Th, mischt man mit Sussholzextrakt 5 Th, gereinigtem Honig 20 Th, gereinigtem Tamarindenmus 25 Th.

Extractum Filicis (Germ, Helv), **Extr Filicis maris** (Austr), **Extr Filicis liquidum** (Brit), **Oleo-resina Aspidii** (U-St), **Oleum Filicis maris** — Farnextrakt, Wurmfarnextrakt — **Extrait de fougère mâle** (Gall) — **Liquid Extract of Male Fern** — Nach Austr, Brit, Helv, U-St, Gall wird das frische, gereinigte und grob¹⁾ zerstoßene Farnrhizom im Verdrängungsapparate mit Aether erschöpft, wozu nach Gall auf 1 Th Farnrhizom 2 Th Aether (spec Gew 0,724) genügen, nach DIERCKH höchstens 4 Th gebraucht werden, nach Germ wird 1 Th zuerst mit 8 dann mit 2 Th Aether je 8 Tage lang ausgezogen. Von den Auszügen wird der Aether abdestillirt und der Rückstand zu einem dünnen, völlig ätherfreien Extrakte verdunstet. Ausbeute 12—15, nach WÄFFER und LUNERS wenigstens 10 Proc. Aufbewahrung Kuhl, vor Licht geschützt. Das grüne (Germ) bis bräunlich grüne (Helv), in Wasser unlösliche Extrakt ist vor der Abgabe umzuschütteln. Mit Glycerin verdünnt darf es unter dem Mikroskop keine Stärkekörner zeigen, deren Anwesenheit auf sorglose Filtration des Auszuges deutet.

Brit giebt als Einzelgabe 2,5—5 g, Helv die Dosis max pro die auf 10 g an.

Die angenehmste Form ist die der elastischen Gelatinekapseln, wenn dieselben frisch sind. Solche Kapseln mit Farnextrakt und Ricinusöl sollten aus den oben angeführten Gründen nicht verwendet werden. Ebenso ist man neuerdings von der bisher üblichen Vorbereitungsart abgekommen. Nach E. GRAWITZ nimmt man am Tage der Kur Morgens nüchtern Karlsbader oder Bittersalz und nach erfolgter Abführung das Bandwurm-mittel (8—10 g Extrakt, bei Kindern die Hälfte) mit Kaffee. Die Kapselfabriken liefern übrigens die Bandwurmkapseln auch mit Zusätzen wie Kalomel, Sagraealextrakt, ferner mit Kain, Granatwurzelextrakt und mit Keratinüberzug.

Das Extrakt ist vor der Dispensation immer gut umzuschütteln.

Emulsio Extracti Filicis nach WIDERHOFER. WIDERHOFER's Bandwurm-mittel. Farnextrakt 18 g, Pomeranzenschalen-sirup 46 g, arabisches Gummi 12 g mischt man und reibt damit Kamala 24 g an.

¹⁾ Gall schreibt mittelfeines Pulver, U-St Pulver No 60 vor, um grössere Ausbeute bei geringerem Aetherverbrauch zu erzielen.

Wurmmittel für Thiere (nach DRETLICH)

Wurmpillen für Hunde Farnextrakt 2 g, Aloe 3 g, Seife 3 g Zu 2 Pillen, die morgens auf einmal gegeben werden

Wurmol für Hunde. Farnextrakt 2 g, Ricinusöl 20 g Morgens erwarmt auf einmal zu geben

Wurmpillen für Schafe Farnextrakt 1 g, Aloe 5 g, Naphtalin 0,1 g, Seifenspiritus q s zu einer Pille

Aus Farnextrakt mit oder ohne Zusätze von Granatwurzelextrakt, Ricinusöl, Himbeersaft u dergl bestehen folgende Bandwurmmittel

Berliner von J LEWINSOHN, Genfer von BERNARD, Genfer von PESCHIER, von M BÖTTCHER in Altenburg, von ENDERWEIT in Berlin, OTTO FLOHR in Freiberg, Dr FINKING in Berlin, HEYNE in Berlin, Pflatter KNEIPP, Th KOZETZKI in Stein, LAFFON, LUTZE, LUTZE & Co in Braunschweig, RICH MOHRMANN in Berlin, MOOK in Berlin, MUTH in Chemnitz, PERZOLD in Leipzig, WENDE in Berlin

Helminthenextrakt von O KONETZKI FRITSCH in St Ludwig ist ein Gemisch von 5 Th Extr Embel Rib, 1,5 Th Extr Cort Granati, 38,5 Th Extr Filicis, 1,7 Th Extr Absinthii, 53 Th Ol Ricini, 0,3 Th Vanillin

Tritolum Filicis, Bandwurm-Tritol nennt DRETLICH eine Gallerte aus Farnextrakt, Ricinusöl und Malzextrakt

Electuarium contra taeniam		Gummi arabici	3,0
Munch. Nosokom. Vorsch.		Aquae destillat	96,0
Rp.	Extract Filicis	Sirupi simplicis	500
	Pulpae Tamarind depur	Morgens nüchtern auf zweimal (Bull therap.)	
	22,0	Vet Teinture contre l'anémie vermineuse	
Potion taenifuga VAN AUERL.		(Gall Suppl.)	
Rp.	Acidi salicylici	0,1	
	Olei Filicis aeth	0,6	Rp Tinct Filicis maris 25,0
	Tinct Cinnamom gttis X		Extract Filicis aeth 50

† Acidum filicinum amorphum Filixsäure $C_{15}H_{14}O_{13}$ Amorphes, leichtes, weisses, geruch- und geschmackloses Pulver, in kaltem Alkohol löslich, wird von Alkalien und fetten Oelen sehr leicht aufgenommen Schmelzpunkt $125^{\circ}C$ Nur diese amorphe Säure wirkt anthelmintisch, die sich ebenfalls häufig reichlich im Extrakt findende krystallinische Säure $C_{14}H_{14}O_6$, die man für ein Anhydrid der amorphen halt, gilt als wirkungslos Schmelzpunkt der krystallinischen Säure $184-185^{\circ}C$ (nach KRAFT $179-180^{\circ}C$) Sie ist fast unlöslich in absolutem Alkohol, unlöslich in Wasser

Dosis der amorphen Säure 0,5–1,0, zugleich als Abführmittel Kalomel oder Kalomel und Jalappe Die ausserordentlich verschiedene Wirkung der Farnextrakte dürfte zum grossen Theil damit im Zusammenhang stehen, wieviel der vorhandenen Filixsäure im amorphen und wieviel im krystallinischen Zustand vorhanden ist — Ausser in Nephrodium Filix mas ist die Filixsäure auch in Aspidium rigidum Sw. und Asplenium Filix femina Bernh. aufgefunden worden.

II. *Aspidium marginale* Willdenow (syn *Dryopteris marginalis* Asa Gray) Heimisch in Nordamerika. Das Rhizom ist nach U-St neben I officinell Es ist diesem sehr ähnlich, soll aber im Querschnitt nur etwa 6 Bündel im Rhizom erkennen lassen Filixsäure konnte in der Droge nicht nachgewiesen werden. *Aspidium rigidum* Sw wird in Nordamerika auch als Anthelminticum verwendet

III *Aspidium athamanticum* Kunze Heimisch in Südafrika Namen Inkomkomo, Unkomocomo Das Rhizom (*Radix Pannae*) gelangt seit 1851 auch zuweilen nach Europa

Beschreibung. Es ist bis 15 cm lang, von allen Seiten mit dachziegelförmig angeordneten Blattbasen oder deren Narben und mit Spreublättchen bedeckt. Der Querschnitt ist wie bei I durch Druck der Wedelbasen unregelmässig bucktig, wohl meist von brauner Farbe, er zeigt 8–13 in einen Kreis angeordneter Gefässbündel Der Querschnitt der Blattbasen ist meist halbrund, aber auch flacher, er lässt 6–7 in einen Kreis gestellte grössere und reichlich kleinere Bündel erkennen

Im Parenchym einzellige Drüsenhaare wie bei I, die Stärkekörnchen sind grösser wie bei I, eiförmig oder nierenförmig Interzellularräume sind etwas spärlicher wie bei I, auch die Zellwände des Parenchyms dicker

Bestandtheile Das Rhizom liefert 5,1 Proc ätherisches Extrakt. Es enthält Flavopannin $C_{21}H_{21}O_7$, aus Aether in citronengelben, bei $151^\circ C$ schmelzenden Prismen erhalten. Albopannin $C_{21}H_{21}O_7$, aus Alkohol in seidenglanzenden weissen Nadeln erhalten und Pannol (Pannsäure) $C_{21}H_{14}O_7$, in feinen verfilzten Nadeln von gelblicher Farbe erhalten.

Von diesen drei Körpern ist das Flavopannin intensiv giftig, das Albopannin etwas weniger giftig, das Pannol ist nicht giftig.

Verwendung als Anthelminticum wie bei I.

IV Polypodium vulgare L. Familie der Polypodiaceae — Polypodieae. Heimisch in Europa, dem nördlichen Asien und Nordamerika. Verwendung findet das Rhizom Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filiculae dulcis. — Engelsass Korallenwurzel. Tropfenwurzel. — Polypode de chêne.

Beschreibung Besteht aus 5–12 cm langen, 3–5 mm dicken, meist flach gedrückten, etwas gekrümmten Stücken, die fein runzelig, rothbraun bis dunkelbraun sind und deren obere Seite entfernte, abwechselnd gestellte 1–3 mm hohe, 3 mm breite, schüsselförmig vertiefte Blattnarben trägt. Die Unterseite lässt die Reste der abgeschnittenen Wurzeln erkennen. Im Parenchym Stärke und eine fadenziehende Masse. Geschmack süsslich, dann etwas bitter, Geruch schwach ölig-ranzig.

Bestandtheile Zucker 5 Proc, fettes Oel 8 Proc, angeblich auch Glycyrrhizin.

Einsammlung und Verwendung. Das Rhizom soll im Herbst gesammelt werden, 5 Theile der frischen Droge geben 1 Th. trockne.

Man verwendet es noch hier und da als Expectorans und Diureticum.

V Ebenfalls als Expectorans gelangt noch zuweilen nach Europa aus Peru und Chile das Rhizoma Calabualae oder Calagualae von Polypodium Calaguala Ruiz, mit dem oft die Rhizome von Acrostichum Huascaro Ruiz und Polypodium crassifolium L. verwechselt werden.

Beschreibung. Das echte Rhizom ist 4 cm lang, 1,5 cm dick, mit Spreuschuppen bedeckt. Die Rückseite trägt Blattbasen, die Bauchseite Narben. Querschnitt des Rhizomes oval, leicht ausgerandet, er zeigt 10–12 Gefässbündel, von denen zwei grösser wie die übrigen sind.

VI Polypodium adiantiforme L. verwendet man auf Portorico als Antisyphiliticum und Sudorificum.

Polypodium incanum Sw. dient als Emmenagogum.

Von Notochlaena hypoleuca verwendet man in Columbien die Blätter als Mittel gegen Brust- und Leberkrankheiten.


Vergl. auch Adiantum.

Fluoresceinum.

I Fluoresceinum Fluorescein Resorcinphthalein $C_{20}H_{12}O_5$ Mol. Gew. = 332. Zur Darstellung der reinen Verbindung erhitzt man 5 Th. Phthalsäureanhydrid mit 7 Th. Resorcin im Oelbade auf 195 – $200^\circ C$, bis die Masse festgeworden ist. Nach dem Erkalten zieht man das Produkt mit Wasser aus, bringt den Rückstand durch Natronlauge in Lösung und fällt die filtrirte Lösung durch Säure, worauf sich das Fluorescein in Flocken abscheidet. — Die technischen Sorten werden durch Erhitzen von 25 Th. Resorcin mit 17 Th. Phthalsäureanhydrid und 8 Th. Chlorzink auf $185^\circ C$ dargestellt.

Ein gelbrothes Pulver, in Wasser, Aether und Benzol ziemlich unlöslich, in Alkohol mit gelbrother Farbe und grünlicher Fluorescenz löslich. Von ätzenden Alkalien wird es

leicht gelöst, diese Lösungen sind im durchfallenden Lichte röthlich gefärbt und besitzen im auffallenden Lichte prachtvoll grüne Fluorescenz, die noch in sehr starker Verdünnung bemerkbar ist



Das Fluorescein dient zu diagnostischen Zwecken in der Augenheilkunde, in der Acidimetrie und Alkalimetrie als Indikator, in der Hydrologie zum Nachweis des unterirdischen Zusammenhanges von Gewässern. In der Technik als Ausgangsmaterial zahlreicher Farbstoffe und organischer Verbindungen. Gegen atzende Alkalien verhält es sich wie ein zweiatomiges Phenol.

II Uranium Fluorescein-Natrium $C_{20}H_{10}O_6Na_2$. Mol Gew. = 378. Ist das Natriumsalz des vorigen und kommt als rothgelbes Pulver in den Handel, welches in Wasser leicht löslich ist und dessen wässrige Lösung die oben beschriebene Fluorescenz giebt. Es ist diejenige Form, in welcher man zur Zeit das Fluorescein zu diagnostischen Zwecken verwendet.

Um den Zusammenhang von Wasserläufen festzustellen, trägt man eine mit Natronlauge stark alkalisch (!) gemachte Lösung des Urans in genügender Menge (!) — in einem Falle wurden einmal 30 kg angewendet — in den hoher gelegenen Wasserlauf ein. Das Auftreten einer gelbgrünen Fluorescenz in dem niedriger gelegenen Wasserlaufe zeigt einen Zusammenhang beider Wasserläufe an.

III Tetrabromfluorescein Eosin $C_{20}H_6Br_4O_6$. Mol Gew. = 648. Entsteht durch Einwirkung von Brom auf in Wasser vertheiltes Fluorescein. Ein gelbrothes, in Wasser fast unlösliches Pulver. Das Kaliumsalz = Eosinkalium $C_{20}H_6K_2Br_4O_6 + 6H_2O$ ist der unter dem Namen Eosin (Gelbstich), namentlich zur Tintenfabrikation beliebte rothe Farbstoff, welcher aber auch zum Färben von Seide und Wolle und von Mikroorganismen dient.

IV Tetraiodfluorescein $C_{20}H_6I_4O_6$. Mol. Gew. = 836. Zur Darstellung wird Fluorescein in Natronlauge gelöst, diese Lösung mit einer Lösung von berechneten Mengen Jod in Natronlauge vermischt und dann mit Säuren angesäuert. Das Natriumsalz $C_{20}H_6I_4O_6Na_2$ kommt als Jodeosin, Erythrosin, Eosin (Blaustich) in den Handel. Es färbt ähnlich wie das gewöhnliche Eosin, aber mit etwas blaulichem Stich.

V. Tetrabromdichlorfluorescein $C_{20}H_6Cl_2Br_4O_6$. Mol Gew. = 717. Entsteht durch Einwirkung von Brom auf Dichlorfluorescein, welches seinerseits durch Erhitzen von Resorcin mit Dichlorphthalsäure dargestellt wird. Das Kalisalz $C_{20}H_6Cl_2Br_4O_6K_2$ kommt als Phloxin in den Handel.

Dieses Phloxin ist ein sehr bequemer und prachtvoller Ersatz des Karmins zum Färben von Zahnpasten, Zahnpulvern, Schminken u. dergl. Für Pulver und pastenartige Zubereitungen ist es in der Nuance unübertrefflich. Für alkoholische Lösungen eignet es sich dagegen nicht, für diese ist Cochenilletinktur weitaus geeigneter. Vergl. S. 554 unter Pasten und 555.

Fluorum.

Das Fluor ist ohne Zweifel ein Element, welchem eine wichtige physiologische Bedeutung für den thierischen Körper zukommt, wenn wir auch über dieselbe zur Zeit nur wenig unterrichtet sind. Das Fluor kommt als Calciumfluorid vor in den Knochen, im Schmelz der Zähne, im Blut, in der Milch und in zahlreichen Pflanzenaschen. Die umfangreichere therapeutische Verwendung von Fluorderivaten dürfte der nächsten Zukunft angehören, nachdem es in den letzten Jahren der Firma VALENTINER & SCHWARZ in Leipzig-Plagwitz gelungen ist, im Kern fluorirte aromatische Verbindungen nach einem relativ einfachen Verfahren darzustellen. D.R.P. 96153.

Darstellung. Versetzt man eine Lösung von salzsaurem Anilin und freier Salzsäure in der Kälte mit einer Lösung von Natriumnitrit, so erhält man zunächst Diazo

benzolechlorid $C_6H_5N \equiv N-Cl$ Wird die stark verdünnte wässrige Lösung des Diazobenzolchlorids mit Fluorwasserstoffsäure erhitzt, so findet unter Abscheidung von Stickstoff Umsetzung in Fluorbenzol C_6H_5F statt

Beispiel 10 Th Anilin werden in ein Gemisch von 32,5 Th Salzsäure (von 25 Proc HCl) und 20 Th Wasser eingetragen und die gut abgekühlte (!) Lösung wird allmählich mit 7,58 Th Natriumnitrit ($NaNO_2$) versetzt Die Diazobenzolchloridlösung wird darauf in einen Kessel gebracht, mit 20 Th Flusssäure versetzt und unter Rückflusskühlung allmählich steigend erwärmt, bis keine Stickstoffentwicklung mehr stattfindet Das Reaktionsgemisch wird neutralisiert, das gebildete Öl abgehoben, durch Wasserdampf übergetrieben und durch fraktionierte Destillation gereinigt

In der nämlichen Weise, wie beim Anilin, kann jede im aromatischen Kern stehende $-NH_2$ Gruppe durch ein Fluor-Atom ersetzt werden

Fluorbenzol. C_6H_5F Wie vorher beschrieben dargestellt, ist ein lichtbrechendes, wasserhelles Öl von aromatischem Geruch, Siedepunkt $85^\circ C$

Fluortoluol $C_6H_4(CH_3)F$ Durch Einwirkung von Natriumnitrit auf eine, freie Salzsäure enthaltende Lösung von salzsaurem p-Toluidin wird Diazo p-Toluolchlorid dargestellt und dieses durch Einwirkung von Fluorwasserstoffsäure in Fluortoluol übergeführt Wasserhelles, leicht flüchtiges Öl, Siedepunkt $116^\circ C$

Fluorpsendocumol. $C_6H_2(CH_3)_3F$ Wird analog den vorigen aus Psendocumidin $C_6H_2(CH_3)_3NH_2$ dargestellt und bildet eine bei $172^\circ C$ siedende wasserhelle Flüssigkeit von stark aromatischem Geruche, welche zu schillernden Blättchen vom Schmelzpunkt $24^\circ C$ erstarrt.

Fluorphenetol. $C_6H_4(OC_2H_5)F$ Wird analog den vorigen aus Phenetidin $C_6H_4(OC_2H_5)NH_2$ dargestellt und bildet eine gelbliche, bei $197^\circ C$ siedende Flüssigkeit von einem an Anisöl erinnernden Geruche

Fluor-Naphthalin (β) $C_{10}H_7F$ Wird analog den vorigen aus β -Naphthylamin dargestellt Farblose, schillernde Blättchen, Schmelzpunkt $59^\circ C$, Siedepunkt $211^\circ C$

Difluordiphenyl $F-C_6H_4-C_6H_4-F$ Wird analog den vorigen aus Benzidin $NH_2-C_6H_4-C_6H_4-NH_2$ dargestellt und bildet farblose, bei $87^\circ C$ schmelzende Blättchen Unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Äther, Chloroform und in fetten Ölen Geruch an Dillamen erinnernd

Diese Verbindungen werden zur Zeit auch in Form von Salben und Streupulvern in den Handel gebracht und therapeutisch angewendet

Die Fluorverbindungen müssen durch Erwärmen mit der Salbengrundlage in diesen gelöst werden

Antitussin — VALENTINER & SCHWARZ Rp Difluordiphenyl 5,0, Adipis Lanae anhydrici 85,0, Vaselin 10,0 Wird in Einreibungen angewendet bei akuten Keuchhusten anfallen, Mandelentzündungen, Hals- und Rachenkrankheiten Die Einreibungen wirken schlafmachend, der Anfall wird coupirt, ein Keuchhusten geht in gewöhnlichen Husten über Ueber die Anwendung siehe das folgende

Fluorrheumin — VALENTINER & SCHWARZ (Antirheumin)¹⁾ Rp Fluorphenetol 1,0, Difluordiphenyl 4,0, Adipis Lanae anhydrici 85,0, Vaselin 10,0 Wird zu Einreibungen gegen Rheumatismus, Hexenschuss, Influenza angewendet Die einzureibenden Hautstellen müssen vorher, damit die Hautporen aufnahmefähig werden, mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden Die Aufnahme der Salbe von der Haut ist durch Massage zu befördern Man bedeckt schliesslich die eingeriebene Stelle mit einem losen Verbands, welcher 12 Stunden liegen bleiben kann, bevor eine neue Einreibung nöthig ist.

Epidermin — VALENTINER & SCHWARZ Rp Fluorpsendocumol 1,0, Difluordiphenyl 4,0, Adipis Lanae anhydrici 85,0, Vaselin 10,0 Wird auf eiternden Wunden (auch bei bösartigen Eiterungen z B Ulcus molle), Brandwunden, überhaupt als Heilsalbe, ähnlich wie bisher die Borsalbe angewendet Es wirkt schmerzstillend, reinigt die Wunden, befördert die Granulationsbildung und bewirkt rasche Ueberhäutung

Streupulver der genannten Antiseptica werden mit Taleum venetum und zwar entweder im Verhältnisse 5 + 95 oder 10 + 90 in der dermatologischen Praxis angewendet

¹⁾ Nicht zu verwechseln mit der aus Natriumsälicylat und Methylenblau bestehenden Mischung, welche „Antirheumatin“ genannt wird.

Ueber die Wirkung dieser aromatischen Fluorverbindungen ist man sich vom theoretischen Standpunkte aus noch keineswegs im klaren. Es scheint nicht, dass diese Fluorverbindungen lediglich als bakterientödtende Antiseptica wirken, es scheint vielmehr, als ob sie zur Resorption gelangten und unstimulirend auf die Zellen bezw. anregend auf das Nervensystem wirken.

Ueber den Nachweis und die Prüfung dieser Fluorverbindungen lässt sich zur Zeit nur wenig sagen. Das Fluor sitzt in dem aromatischen Kern so fest, dass es kaum durch Erhitzen mit konc. Schwefelsäure (nur bei dem Difluordiphenyl ist uns dies möglich gewesen) abgespalten werden kann. Dagegen gelingt die Abspaltung des Fluors durch Erhitzen mit metallischem Natrium. Für die Reinheit der unvermischten Verbindungen würden die Bestimmungen des Schmelzpunktes bezw. Siedepunktes von Wichtigkeit sein. — Den menschlichen Organismus scheinen die besprochenen Fluoride unverändert zu passiren.

Fluoroform. CHF_3 . Mol. Gew. = 70. Wird von VALENTINER & SCHWARZ durch Einwirkung von Fluorsilber auf Jodoform bei Gegenwart von Wasser, aber unter Ausschluss von Luft erhalten. Es ist bei gewöhnlicher Temperatur (und auch noch bei -20°C.) ein Gas, welches von dem gleichzeitig auftretenden Kohlenoxyd durch Waschen mit Kupferchloridlösung befreit wird. Es löst sich zu etwa 2,8 Proc. in Wasser, und wirkt ebenso wie Chloroform anästhesirend. Vorläufig findet es im wesentlichen in Form seiner wässerigen Lösung Verwendung. In der wässerigen Lösung ist das Fluoroform ziemlich fest gebunden.

Aqua Fluoroformil. Fluoroformwasser. Eine gesättigte Lösung von Fluoroform in Wasser, etwa 2,5 Proc. CHF_3 enthaltend.

Es ist nahezu geruchlos und geschmacklos und hinterlässt beim Schlucken ein leichtes Kratzen im Gaumen. Man giebt es vier- bis fünfmal täglich kaffee- bis esslöffelweise gegen Phthisis, Lupus und tuberkulöse Gelenkerkrankungen.

Foeniculum.

Gattung der Umbelliferae—Apiodeae—Ammineae—Seselineae.

I. Foeniculum vulgare Mill. (syn. *F. capillaceum* Gilib., *F. officinale* All.), heimisch von den Azoren bis Persien, von Nordafrika bis Ungarn, vielfach kultivirt. Einjähriges oder ausdauerndes kahles Kraut mit bis 2 m hohem, zart gerilltem, bereiftem Stengel. Blätter 3- und mehrfach sparrig getheilt, die letzten Zipfel pfriemlich, oberseits schmal rinnig, Dol- den 10—20 strahlig. Hülle und Hüllchen fehlen, Blüthe gelb. Verwendung findet die Frucht:

Fructus Foeniculi (Austr. Germ. Helv.). **Foeniculi Fructus** (Brit.). **Foeniculum** (U-St.). **Semen Foeniculi**. **Semen Foeniculi germanici s. majoris**. — Fenchel. Fenchelthee. — Fenouil. **Fruits ou semences de fenouil**. — Fennel. Fennel Fruit.

Beschreibung. Die Frucht erreicht eine Länge von 8 mm (nur deutscher und französischer Fenchel erreichen diese Maximalgrenze) und einen Durchmesser von 3 mm. In der Droge ist sie meist in die beiden Theilfrüchtchen zerfallen. Die Farbe ist grünlichbraun. Auf der Spitze sind der Diskus und die beiden kurzen Narben deutlich zu erkennen (Fig. 251, 252). Die Rippen treten stark hervor, in jedem Thälchen zwischen den Rippen schimmert ein schizogener Oelgang durch, ausserdem trägt die Fugenfläche jedes Theilfrüchtchens zwei (Fig. 247, 248, 250), also das Theilfrüchtchen im ganzen sechs, doch kommt zuweilen eine Verdoppelung




Fig. 247. Querschnitt durch deutschen Fenchel.

eines Ganges vor, das Parenchym der Fruchtschale ist in der Nahe der Gefässbündel zu gross maschig netzförmig verdickten Zellen umgewandelt, die für die Erkennung des Fenchels auch im Pulver wichtig sind. Doch ist zu bemerken, dass die Ausbildung dieser Zellen




Fig 248 Querschnitt durch römischen Fenchel

bei den einzelnen Sorten eine sehr verschiedene ist, bei deutschem und galizischem Fenchel waren nur wenige Zellen in der Nahe der Gefässbündel in der angegebenen Weise verdickt, wogegen bei römischem und macedonischem fast die ganze Mittelschicht des Pericarps aus solchen Zellen besteht (Fig 249)

Die Zellen des Endosperms führen Alemonkörner, die wie auch sonst bei den Umbelliferen theils Drüsen von Oxalat, theils Globoide enthalten. Sie messen 1,5 bis 16,0 μ . Geruch angenehm aromatisch, Geschmack süss-aromatisch, charakteristisch. Japanischer Fenchel riecht und schmeckt auffallend nach Anis.

Bestandtheile nach KOENIG: Wasser 17,18 Proc., stickstoffhaltige Substanz 16,28 Proc., athetisches Oel 3,89 Proc., Fett 8,86 Proc., Zucker 4,71 Proc., Stärke (durch Säuren in Zucker überführbare Substanz) 14,33 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 12,40 Proc., Rohfaser 13,74 Proc., Asche 8,60 Proc. Sie enthält Kali 31,96 Proc., Natron 2,38 Proc., Kalk 19,54 Proc., Magnesia 14,03 Proc., Eisenoxyd 2,12 Proc., Phosphorsäure 16,47 Proc., Schwefelsäure 9,98 Proc. Kieselsäure 0,87 Proc., Chlor 3,41 Proc. Das Gehalt an ätherischem Oelschwankt von 2—6 Proc. (vgl. S 1167)

Sorten. Die Früchte sind nach der Provenienz in Farbe, Grösse, Aussehen und Oelgehalt ziemlich verschieden.




Fig 249 Netzförmig verdickte Zellen in der Fruchtschale des Fenchels

1) Deutscher Fenchel bis 10 mm lang, bis 3 mm breit. Die Oelgänge sind im Querschnitt bis 0,22 mm lang und 0,07—0,08 mm breit. Ziemlich cylindrisch, oft etwas gekrümmt. Farbe grünlichgrau und graubraun, die Rippen stark hervortretend und von hellerer Farbe. In den Thälchen schimmern die Oelgänge durch (Fig 247).

2) Pugliser Fenchel aus Apulien mit wenig hervortretenden Rippen. In der Farbe dunkler wie 1, von feinem Geschmack. Oelgänge kaum halb so gross wie bei 1 (Fig 250).

3) Macedonischer Fenchel, so gross wie der deutsche, von brauner Farbe, mit stark hervortretenden Rippen. Oelgänge kleiner wie bei 1 (Fig 252).




Fig 250 Querschnitt durch Pugliser Fenchel

4) Galizischer Fenchel, bis 5 mm lang, von grau-grüner Farbe, mit stark hervortretenden Rippen. Oelgänge im Querschnitt 0,2—0,22 mm lang, 0,08—0,1 mm breit. Geschmack ziemlich scharf, kampferartig.

5) Römischer, kretischer, florentiner, süsser Fenchel. Stammt von in Südfrankreich kultivirten Pflanzen, die man als *Foeniculum dulce* D. C. von der gewöhnlichen Art unterscheidet, die aber neuerdings als Varietät derselben gilt. Sie ist charakterisirt durch kürzeren, unten zusammengedrückten Stengel, fast 2zeilig gestellte Grundblätter und 6—8strahlige Dolden. Die Früchte werden bis 12 mm lang, sie sind hell gefärbt und zeichnen sich durch stark hervortretende Rippen aus. Die Oelgänge sind im Querschnitt 0,11 mm lang und 0,04—0,05 mm breit. Die Früchte *Fructus Foeniculi romani* s. *cretici*, *Semen Foeniculi dulcis*, *Fruit de fenouil doux* sind in die Gall aufgenommen (Fig 248 252).

Verunreinigungen und Verfälschungen. Der Fenchel ist nicht selten mit fremden Früchten, Samen, Doldenstrahlen, Erde u. s. w. verunreinigt, natürlich ist einer solche Sorte vom pharmaceutischen Gebrauch auszuschliessen. Ferner kommen häufig

Fruchte in den Handel, denen das Oel ganz oder zum Theil entzogen ist, entweder 1) durch Destillation im Dampfströme oder 2) durch Destillation mit Wasser oder 3) durch theilweise Extraktion mit Alkohol. Da der Fenchel der letzteren Kategorie nicht unerhebliche Mengen von Oel noch enthält, so bespungen man die saft-, geruch- und geschmacklosen Früchte der beiden ersten Kategorien mit etwas Fenchelöl und Alkohol, um solchen der 3. Kategorie vorzutauschen. Diese extrahirten Früchte sind immer mehr oder weniger entfärbt, man stellt die Farbe dann wieder her mit Chromfarben, grünem Eisenoxyd oder Schüttgelb. Guter Fenchel giebt 15 Proc. trocknes, wässriges Extrakt, ausgezogener viel weniger.

Endlich sind als „Fenchel“ vorgekommen die Früchte von *Meum athamanticum* Jacq., die als Bärenfenchel, wilder Fenchel etc. in der Vollmedizin eine Rolle gespielt haben. Sie sind so gross wie die erste Droge, aber etwas breiter, von brauner Farbe, schmecken auffallend nach *Sem. Foenugraecae* und haben in jedem Theilchen nicht einen, sondern mehrere (2–3) Sekretgänge.

Die beste Handelsorte ist der nach der Art der Einsammlung benannte Kammmfenchel. Die reifen Früchte werden an der Luft getrocknet und, von etwaigen Beimengungen gereinigt, in Blechgefässen (s. S. 507 Fussnote) aufbewahrt. Das Pulver bereitet man aus dem bei gelinder Wärme oder über Aetzkalk nachgetrockneten Fenchel 100 Th. liefern 90–92 Th. Pulver.

Wirkung und Anwendung. Aeusserlich als Aufguss oder Tinktur zu Augensäften, innerlich als Stomachicum, Carminativum und Expectorans 5,0–15,0 150,0 als Aufguss.

In Frankreich ist auch die Wurzel des *Foeniculum dulce* D. C. als *Racine de fenouil* deux officinell.

Aqua Foeniculi. Fenchelwasser. *Eau de fenouil*. Fennel Water. Germ. 1 Th. gequetschter Fenchel giebt mit q. s. Wasser 30 Th. Destillat. — *Helv.* Aus 4 Th. Fenchel (III) destillirt man ohne Befuchtung im Dampfstrom 100 Th. — *Austr.* 1 Th. Fenchel macerirt man mit 40 Th. Wasser und destillirt nach 12 Stunden 20 Th. ab. — *Brit.* Aus 1 Th. Fenchel und 20 Th. Wasser 10 Th. Destillat. — *U-St.* 2 cum Fenchelöl verreibt man mit 4 g präcipitirtem Calciumphosphat, fügt nach und nach Wasser q. s. zu 1 Liter hinzu und filtrirt. — Aufbewahrung in gelben Flaschen im Kühlen. Es wird empfohlen, die Gefässe nur mit Pergament zu überbinden¹⁾. Vor dem Filtriren lässt man das Wasser einige Stunden bei Zimmerwärme stehen.

Hydrolatum Foeniculi. Eau distillée de fenouil (Gall.) Wie Hydrolatum Chamomillae S. 716.

Sirupus Foeniculi. (Ergänz.) Fenchelsirup. Aus zerquetschtem Fenchel wie Sir. Chamomill. (S. 716) *Ex tempore* 15 Th. Fencheltinktur, 85 Th. Zuckersirup. *Sirupus Foeniculi* 10 plexs. S. 231. — In kleineren, ganz gefüllten Gläsern aufzubewahren. Bei Darstellung im grossen ist die Verarbeitung der Pressrückstände auf ätherisches Oel lohnend.

Tinctura Foeniculi. *Tinctura Foeniculi composita* (Ergänz. *Helv.*) *Essentia ophthalmica*. *Spiritus ophthalmicus*. Zusammengesetzte Fencheltinktur. *ROXBURSHAUSEN's* Augenssanz. — *Teinture de fenouil composée* 100 Th. grob gepulverten Fenchel zahlt man 3 Tage mit 500 Th. verdünntem Weingeist aus und löst im Filtrat 1 Th. Fenchelöl.

Aqua ophthalmica ROXBURSHAUSENI (Ergänz.).

ROXBURSHAUSEN's Augenwasser.

℞ Tinct. Foeniculi comp. 1,0
Aque destillatæ 5,0

Zum Waschen der Augen behufs Stärkung der Sehkraft.

Augentrost KNEPP's.

℞ Exsucti Aloës 0,8
Fructum Foeniculi
Herbas Euphrasæ 25 10,0
Spiritus 20,0
Aque destill. 80,0

Digiren und filtriren.



Fig. 251
Deutscher
Fenchel.
8 mal vergr.



Fig. 252 Böhmischer und
macedonischer Fenchel.
1 1/2 mal vergr.

¹⁾ Nach C. GESNER werden in Spanien aromatische Wässer in Flaschen aufbewahrt, die man nicht verkorkt, sondern nur mit Pergament zubindet, man soll dadurch das Verderben der Wässer verhüten. Porcellankrüge mit Deckel waren früher als Vorrathsgefässe auch sonst vielfach gebräuchlich.

Confectio Foeniculi

Überzuckerter Fenchel.

Man gewinnt denselben genau so, wie überzuckerte Pflaen, im Drageekessel

Elaeosaccharum Foeniculi

Olaeosaccharura de fenoil

Wie Elaeosacch. Carri (S 661) zu bereiten.

Fenchelhonig-Extrakt

Rp	Olei Foeniculi	gtt	V
	Spiritus		5,0
	Glycerini		2,5
	Mellis depurati		200,0
	Sirupi simplicis (Missa Patinade)		500,0

Handverkaufs Artikel

Mel Foeniculi

Fenchelhonig.

I

Rp	Sirupi Foeniculi	
	Mellis depurati	aa.

II.

Rp	Olei Foeniculi	gtt	XXV
	Sirupi simplicis		400,0
	Mellis depurati		600,0

Man mischt durch kräftiges Schütteln, erwärmt im Wasserbade, filtrirt heiss, und füllt in kleinere Flaschen.

III. (nach RODERFELD)

Rp	1 Fruct Foeniculi gr plv	200,0
	2 Spiritus	100,0
	3 Aquae destillatae	400,0
	4 Mellis crudi	2000,0
	5 Aquae destillatae	1000,0
	6 Sacchari albi	1200,0

Man zieht 24 Stunden 1 mit 2 und 3 aus, presst ab, vermischt mit 4 und 5, erwärmt 1 Stunde im Dampfbade und filtrirt heiss, nöthigenfalls unter Zusatz von etwas weissem Bolus. Im Filtrat kocht man 6 und seigt durch. Statt 1—3 kann man eine Lösung von 4,0 Fenchelöl in 88 Weingeist und 880 Wasser verwenden.

Pulvis Foeniculi compositus

Pulvis Magnesiae compositus Pulvis galactopoeus ROSENSTEIN Pulvis lac provocans ROSEN Ammenpulver

Rp	Fructus Foeniculi pulv	25,0
	Cardioli Aurantii pulv	10,0
	Magnesi carbonici pulv	45,0
	Sacchari albi pulv	20,0

Theelöffelweise

Mel Foeniculi cum Maltio
Sirupus Malti foeniculatus Maltio-
Fenchelhonig (Hambg Vorschr)

Rp	Olei Foeniculi	1,0
	Mellis depurati	500,0
	Extracti Malti	100,0
	Sirupi simplicis	400,0

Species placantes

Kinderberuhigungsthee (Wiener Vorschr).

Rp	Fructum Foeniculi	
	Florum Chamomillae	aa 100,0
	Radici Althaeae	
	Radici Liquiritiae	
	Rhizom Graminis	aa 200,0

Species galactopoeus Bene

Milchthee Ammenthee.

Rp	Fructus Foeniculi	50,0
	Fructus Anisi	10,0
	Herbae Melissae	
	Rhizom Polypodii	aa 20,0

Spiritus Foeniculi

Rp	Olei Foeniculi	gtt	XV
	Spiritus diluti		100,0

Vet.

Drusenpulver

Rp	Fructus Foeniculi gr plv	45,0
	Fructus Juniperi gr plv	
	Semin Foenugraeci gr plv	aa 60,0

2 Esslöffel auf jedes Futter

Vet.

Kostenvpulver für Pferde

Rp	Fruct. Anisi gr plv	
	Fruct Foeniculi gr plv	
	Semin Foenugraeci plv	aa 800,0
	Süßli sulfurati aurant	100,0

2 Esslöffel mehrmals täglich in warmem Kleientrank.

Vet

Milch und Nutzenpulver

Rp	Fructus Foeniculi plv	
	Fructus Juniperi plv	
	Natrii chlorati plv	
	Sulfuris sublimati plv	
	Rhizom Calami plv	aa.

Zweimal täglich 1 Esslöffel

Sirupus diuretics

Sirupus de quinque radicibus compositus Sirupus Foeniculi compositus

Sirup des cinq racines Sirup diurétique (Gall)

Rp	1 Specier diureticar (Gall)	50,0
	2 Aquae destill ebull	300,0
	3 Sacchari albi	200,0

Man übergiesst 1 mit der Hälfte von 2, seigt nach 12 Stunden ab, wiederholt dasselbe mit dem Rest von 2, filtrirt und bringt mit 3 zum Sirup vom spec. Gew 1,82.

Species diureticae

Espèces diurétiques. Cinq racines apéritives (Gall)

Rp Radici Apii graycolentis

- „ Asparagi
- „ Foeniculi
- „ Petroselinii
- „ Rusci aculeati aa.

Augenessenz, Dr MÜLLER's, ist ein schwacher, mit Fenchel-, Lavendel- und Rosmarinöl versetzter Weingeist

Augenwasser von BERGMANN ist Fenchelwasser

RIEDEL's Mittel gegen Kopfkolik. Mischung aus Aloëstinktur, Rhabarbertinktur und Kampherspiritus zum Einnehmen, Fencheltinktur mit anderen Pflanzenstoffen zum Einreiben

Soothing-Sirup der Mrs Winslow in New-York Ein mit Anis-, Fenchel und Kümmeltinktur oder spiritus versetzter Zuckersirup mit einem Morphingehalt von 0,1 bis 0,2 Proc

Oleum Foeniculi (Germ Helv Austr Gall USt) **Fenchelöl.** *Essence de Fenouil.* *Oil of Fennel.*

Gewinnung. Durch Destillation der zerquetschten Fenchelfrüchte mit Wasserdampf. Es gelangt meist mährischer oder Lützenser Fenchel, zuweilen aber auch galizischer und rumänischer zur Verarbeitung. Die Ausbeute beträgt 4,5–6 Proc. Die anderen Fenchelsorten wie der römische, macedonische Fenchel oder der wild wachsende Bitterfenchel, geben Öle von anderen Eigenschaften und anderer Zusammensetzung.

Eigenschaften, Prüfung. Farblose oder gelbliche, nach Fenchel riechende Flüssigkeit von einem anfangs bitteren, kampherartigen, hintennach süßen Geschmack. Spec. Gewicht 0,965–0,975 [nicht unter 0,960 Germ Austr USt.] Drehungswinkel im 100 mm-Rohre + 12 bis + 24° C. Beim langsamen Abkühlen scheidet es Krystalle von Anethol ab und erstarrt bei stärkerer Kälte zu einer festen, von Öl durchtrankten Masse. Der nach der auf S. 315 beschriebenen Weise bestimmte Erstarrungspunkt liegt bei guten Ölen zwischen + 3 und + 6° C. Minderwerthige Fenchelöle scheiden erst bei noch niedrigerer Temperatur Krystalle ab und werden bisweilen im Kaltgemisch überhaupt nicht fest. Fenchelöl löst sich in gleichen Theilen Spiritus klar auf.

Bestandtheile. Der werthvollste Bestandtheil ist das zu 50 bis 60 Proc. im Öle enthaltene Anethol, $C_{10}H_{18}O$ (s. Seite 315). Charakteristisch für Fenchelöl ist ein bitter schmeckendes mit Kampher isomeres Keton $C_{10}H_{16}O$, das Fenchon. Es verhält sich ähnlich wie Kampher und bildet diesem ähnliche Verbindungen. Sdp. 192–193° C. Spec. Gewicht 0,9465 bei 19° C. Specifisches Drehungsvermögen $[\alpha]_D = + 72^\circ C$. Schmelzp. + 5 bis + 6° C.

Von Terpenen enthält das Fenchelöl Rechts-Pinen (Sdp. 157–160° C.) und Dipenten (Sdp. 175° C.).

Anwendung. Fenchelöl wird wie Anisöl als Geschmackscorrectiv und Carminativum, meist mit Zucker verrieben, verabreicht. Dosis 0,05–0,15 g = 2–6 Tropfen.

II Indischer Fenchel stammt von *Foeniculum Panmorium* D. C., den man aber auch als Varietät von I. auffasst. Die Früchte sind 6–7 mm lang, die Oelgänge im Querschnitt 0,1 mm lang und 0,03–0,04 mm breit. Der Geschmack ist süß und erinnert an Anis.

III In Sicilien werden die scharf schmeckenden Früchte des *Foeniculum piperitum* Sweet benutzt.

Formaldehydum.

Unter dem Namen Formaldehyd werden zur Zeit verschiedene, mit einander allerdings nahe verwandte Substanzen zusammengeworfen. 1) Gasförmiger Formaldehyd CH_2O , 2) die wässrige Lösung des gasförmigen Formaldehyds, 3) das Polymerisationsprodukt des gasförmigen Formaldehyds, nämlich das Paraformaldehyd $(CH_2O)_n$.

I. Formaldehyd, wasserfreier, gasförmiger. CH_2O . Mol. Gew. = 30.

Dieser ist bei gewöhnlicher Temperatur ein stechend riechendes Gas, welches in Wasser löslich ist. Durch Abkühlung mit einem Gemisch von fester Kohlensäure und Aether wird das Gas zu flüssigem Formaldehyd verdichtet. Dieser bildet eine wasserhelle, leicht bewegliche Flüssigkeit, welche bei – 21° C. siedet. Sie ist nur bei starker Kälte im flüssigen Zustande zu bewahren. In einer Kaltmischung von – 20° C. verwandelt sie sich in eine feste, weisse Substanz, ein Polymeres des Formaldehyds (Kirkulz).

II Formaldehyd in wässriger Lösung *Formaldehydum solutum* (Germ)
 Formalin Formol. Methylaldehyd. Oxymethylen Ameisenaldehyd Ist eine wässrige Auflösung des gasförmigen Formaldehyds, welche nach Germ rund 35 Proc CH_2O enthalten soll

Darstellung. Dieselbe erfolgt durch Oxydation von Methylalkohol mittels Luft unter bestimmten Bedingungen. Zur Darstellung kleinerer Mengen leitet man ein Gemisch von Methylalkoholdampf und Luft über eine erhitzte Kupferspirale. Der hierzu zu benutzende Apparat ist im Kommentar von HAGER-FISCHER-HARTWIGER, II Aufl S 759 abgebildet. — Im fabrikmässigen Betriebe gelangt meist das Verfahren von TRILLAT zur Anwendung!

Methylalkoholdampf wird durch feine Oeffnungen in ein weites kupfernes, einseitig offenes Rohr geleitet, in welchem sich an einer ausgebauchten Stelle Koks- oder Ziegeltstücke befinden. Das andere Ende des kupfernen Rohres steht mit dem zum Auffangen des gebildeten Formaldehyds dienenden Recipienten in Verbindung. An letzterem wirkt eine Saugvorrichtung, sodass eine zur Oxydation des Methylalkohols ausreichende Menge Luft zu dem offenen Ende des Kupferrohres eintritt, während der gebildete Aldehyd in den Recipienten gesaugt wird.

Die Oxydationsprodukte werden in Wasser aufgefangen. Aus der wässrigen Lösung wird der Methylalkohol durch Destillation entfernt. Konzentrierte Lösungen werden durch Verdünnen mit Wasser, verdünnte durch Abdestilliren eines Theiles des Wassers auf den richtigen Gehalt gebracht, in der Technik schlägt man natürlich dünne Lösungen wieder zum Sättigen mit Formaldehyd vor.

Eigenschaften. Eine klare, farblose, infolge Verflüchtigung von gasförmigem Formaldehyd stechend riechende, wässrige Flüssigkeit. Dem Gehalt von etwa 35 Proc Formaldehyd entspricht bei 15°C ein specifisches Gewicht von 1,079 bis 1,081. Die reine Formaldehydlösung ist gegen Lackmus neutral, in der Regel aber reagirt das Handelspräparat infolge eines geringen Gehaltes an Ameisensäure schwach sauer. Die Bildung der Ameisensäure erfolgt durch Einwirkung des Luftsauerstoffes auf den Formaldehyd. Mit Wasser und mit Weingeist lässt sich die Formaldehydlösung in jedem Verhältnisse mischen, nicht aber mit Aether.

In chemischer Hinsicht zeigt der Formaldehyd alle Eigenschaften eines Aldehydes. Er ist additionsfähig, polymerisationsfähig und ein hervorragendes Reduktionsmittel, auch ist seine Verbindungsfähigkeit mit zahlreichen Substanzen eine bemerkenswerthe.

Dampft man die wässrige Lösung auf dem Wasserbade ein, so entweicht ein Theil des Formaldehyds zusammen mit den Wasserdämpfen, im Rückstand verbleibt eine weisse, amorphe, in Wasser unlösliche Masse, Paraformaldehyd oder Trioxymethylen, $(\text{CH}_2\text{O})_3$. Der Formaldehyd hat demnach sein Molekül verdreifacht. Erhitzt man den Paraformaldehyd für sich oder mit Wasser auf $180\text{--}200^\circ\text{C}$, so geht er wieder in gewöhnlichen Formaldehyd über $(\text{CH}_2\text{O})_3 = 3\text{CH}_2\text{O}$.

Löst man 0,1—0,2 g Silbernitrat in 10 cem Wasser, fügt 1—2 Tropfen Ammoniakflüssigkeit, sowie 2—3 Tropfen Formaldehydlösung hinzu und mischt, ohne stark zu schütteln, so bleibt die Flüssigkeit zunächst unverändert. Allmählich aber scheidet sich ein glänzender Silberbelag an der Glaswandung ab (Aldehyd-Silberspiegel) (Reduktion).

Fügt man zu 5 cem Fehling'scher Lösung 5 Tropfen Formaldehydlösung, so tritt zunächst keine Veränderung ein, beim Erwärmen jedoch oder nach längerem Stehen erfolgt Abscheidung von metallischem Kupfer. — In ähnlicher Weise werden Goldsalze reducirt.

Mit dem Ammoniak verbindet sich der Formaldehyd zu der einsäurigen Base Hexamethylentetramin $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$.

Durch Kalkmilch wird der Formaldehyd in eine zuckerartige Verbindung, die sog Formose übergeführt, welche zum grössten Theile aus α -Akrrose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ besteht. Mit Hydroxylamin verbindet er sich zu einem polymeren Formoxim $(\text{CH}_2 = \text{N-OH})_n$, mit saurem

schwefligsaurem Natrium zu formaldehydschwefligsaurem Natrium (oxymethylsulfosaurem Natrium) $\text{CH}_2(\text{OH})\text{SO}_2\text{Na}$

Spec. Gewicht wässriger Formaldehydlösungen bei 18,5° C


nach H. LUTKE

Proc	Spec. Gew	Proc	Spec. Gew	Proc	Spec. Gew	Proc	Spec. Gew	Proc	Spec. Gew
1	1,002	9	1,023	17	1,041	25	1,064	33	1,078
2	1,004	10	1,025	18	1,043	26	1,067	34	1,079
3	1,007	11	1,027	19	1,045	27	1,069	35	1,081
4	1,008	12	1,029	20	1,049	28	1,071	36	1,082
5	1,015	13	1,031	21	1,052	29	1,073	37	1,083
6	1,017	14	1,033	22	1,055	30	1,075	38	1,085
7	1,019	15	1,036	23	1,058	31	1,076	39	1,086
8	1,020	16	1,039	24	1,061	32	1,077	40	1,087

Wird eine wässrige Formaldehydlösung verdampft, so scheidet sich eine weisse flockige Masse aus, nach völligem Eintrocknen hinterbleibt eine weisse, porcellanartige, amorphe Masse (Paraformaldehyd), welche beim Erhitzen für sich oder mit Wasser wieder in Formaldehyd übergeht (siehe oben) und an der Luft verbrennt, ohne einen Rückstand zu hinterlassen — Wird Formaldehydlösung mit Ammoniak stark alkalisch gemacht, so tritt starke Selbsterwärmung ein. Die Flüssigkeit muss farblos sein (Blaufärbung = Kupfer), wird sie im Wasserbade verdunstet, so verbleibt ein weisser, in Wasser sehr leicht löslicher Rückstand von Hexamethylentetramin

Prüfung. 1) Formaldehydlösung soll, mit 5 Th Wasser verdünnt, nur schwach sauer reagieren (Ameisensäure) Zur Bestimmung der Ameisensäure schüttelt man eine gemessene oder gewogene Menge Formaldehydlösung mit reinem Calciumcarbonat, filtrirt und bestimmt im Filtrat das Calcium als Calciumoxyd 1 g Calciumoxyd entspricht = 1,64 g wasserfreier Ameisensäure 2) 5 ccm Formaldehyd werden in einem Platinschälchen verdampft Man erhitzt schliesslich, bis der zurückbleibende Paraformaldehyd verbrennt. Es darf kein wägbarer Rückstand hinterbleiben Derselbe würde aus mineralischen Verunreinigungen bestehen. 3) Man bereite sich eine Mischung von 6 ccm Formaldehydlösung und 24 ccm Wasser Von dieser Lösung werden je 10 ccm nachfolgenden Prüfungen unterworfen a) Silbernitrat bringe darin keine Veränderung hervor Eine weisse Opalescenz oder Trübung oder ein weisser Niederschlag würde Chlor anzeigen. b) Baryumnitrat bringe auch nach einigen Stunden keine Trübung hervor, andernfalls ist Schwefelsäure zugegen c) Schwefelwasserstoffwasser bringe weder dunkle Färbung noch Fällung hervor Hier kommt besonders Kupfer als Verunreinigung in Betracht, welches leicht hineingelangen kann, wenn bei der Herstellung kupferne Spiralen benutzt werden Kupferhaltige Präparate geben beim Uebersättigen mit Ammoniak Blaufärbung 4) 1 ccm Formaldehydlösung werde mit 1 Tropfen Normal-Kalklauge versetzt Die Mischung darf nicht mehr sauer sein, also blaues Lackmuspapier nicht mehr röthen Hierdurch wird ein Höchstgehalt von etwa 0,0028 g wasserfreier Ameisensäure in 1 ccm Formaldehydlösung zugelassen.

Gehaltsbestimmung. Diese beruht auf der Thatsache, dass Formaldehyd auch in wässriger Lösung sich mit Ammoniak zu Hexamethylentetramin vereinigt im Sinne folgender Gleichung



Setzt man also zu Formaldehydlösung Ammoniakflüssigkeit im Ueberschuss und zwar in bekannter Menge zu und ermittelt nach Ablauf der Reaction die Menge des noch im freien Zustande vorhandenen Ammoniaks, so kennt man auch die Menge des gebundenen Ammoniaks und kann nach obiger Gleichung die Menge des vorhandenen Formaldehyds berechnen Das entstandene Hexamethylentetramin ist zwar eine einsäurige Base,

wendet man aber als Indikator Rosolsäure an, so braucht man auf das Hexamethylentetramin keine Rücksicht zu nehmen, weil dieses auf Rosolsäure nicht einwirkt (die Rosolsäure darf aber nicht etwa durch einen beliebigen anderen Indikator, z. B. Methylorange oder Congo ersetzt werden). Ferner ist zu beachten, dass man verdünnte Lösungen von Formaldehyd und Ammoniakflüssigkeit 2–3 Stunden stehen lassen muss, wenn man sicher sein will, dass die Bildung des Hexamethylentetramins sich quantitativ vollzogen hat. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände verfährt man wie folgt:

Man stellt die Formaldehydlösung genau auf 15° C ein, misst mit Hilfe einer Pipette oder Burette 5 ccm ab und bringt diese in ein mit gut eingeschliffenem Glasstopfen versehenes Glas von etwa 180 ccm Inhalt. Alsdann giebt man 56,5 ccm Normal-Ammoniakflüssigkeit (vorher gleichfalls auf die Temperatur von 15° C gebracht), verschliesst das Gefäss mit dem Stopfen, mischt den Inhalt durch und überlässt das Ganze 2–3 Stunden lang sich selbst. Nach dieser Zeit ist der Formaldehyd völlig verschwunden und mit einem Theile des Ammoniaks zu Hexamethylentetramin verbunden.

Zu der nach 2–3 stündigem Stehen erhaltenen Flüssigkeit werden 20 ccm Normal-Salzsäure gegeben. Hierdurch wird alles freie Ammoniak neutralisirt und die Lösung enthält nunmehr einen Ueberschuss von Salzsäure. Diesen bestimmt man dadurch, dass man 3–5 Tropfen Rosolsäure hinzugebt und — indem man das Gefäss auf eine weisse Unterlage stellt — so lange Normal-Kalilauge zufließen lässt, bis die gelbliche Färbung der Lösung in Rosa übergegangen ist. Hierzu sollen mindestens 4 ccm Normal-Kalilauge erforderlich sein.


Für die praktische Ausführung der Titration ist Folgendes zu beachten. Giebt man einige Tropfen Rosolsäure zu destillirtem Wasser, so wird dieses gelblich gefärbt. Setzt man zu dieser Flüssigkeit Säure, so bleibt die gelbliche Färbung unverändert. Lässt man zu der sauren Flüssigkeit nunmehr Kalilauge (oder ein anderes Alkali) zufließen, so bleibt die gelbliche Färbung bestehen, so lange die Flüssigkeit sauer oder neutral ist. Ein kleiner Ueberschuss von Alkali aber führt die gelbliche Färbung in Rosa über.

Der Farbenumschlag ist nicht ganz scharf, sondern geht durch ein gelbrothes Stadium hindurch. Man muss daher den Umschlag durch blinde Versuche studiren und stets das gleiche Rosa als Endpunkt festhalten. Am besten stellt man sich beim Titriren Vergleichslösungen auf den Arbeitsplatz.

Berechnung. Es wurden angewendet 5 ccm (= 5,4 g) Formaldehydlösung und 56,5 ccm Normal Ammoniak, welche 0,96 g NH_3 (genau 0,9605 g NH_3) enthalten.


Der Ueberschuss von Ammoniak wurde durch 20 ccm Normal-Salzsäure weggenommen und der nunmehr vorhandene Ueberschuss von Salzsäure mit 4 ccm Kalilauge neutralisirt. Wir können daher der Einfachheit halber für diese 4 ccm Normal-Kalilauge direkt 4 ccm Normal Salzsäure in Abzug bringen und annehmen, wir hätten zur Bindung des freien Ammoniaks 16 ccm Normal Salzsäure verbraucht.

16 ccm Normal-Salzsäure sättigen nach der Gleichung



Angewendet wurden 0,96 g NH_3 (s. oben). Es sind also zur Bindung des Formaldehydes verbraucht worden 0,960 minus 0,272 g, d. i. 0,688 g NH_3 .

Wir berechnen nunmehr, welcher Menge Formaldehyd dieses verbrauchte Ammoniak entspricht



und finden 1,820 g Formaldehyd. Da diese Menge in 5,4 g Formaldehydlösung enthalten ist, so berechnet sich nach der Gleichung

$$5,4 \quad 1,820 \quad = \quad 100 \quad x \quad \quad x = 33,7$$

der Gehalt dieser Lösung an Formaldehyd, CH_2O , zu 33,7 Proc.

Aufbewahrung. Da die Formaldehydlösung ziemlich starke Dampftension besitzt, so bewahre man sie an einem Orte mittlerer Temperatur und in gut verschlossenen Gefässen auf. Die weissen Krusten, welche sich zwischen Stopfen und Hals bilden, sind Paraformaldehyd, welcher infolge Verdunstung von Wasser hinterbleibt. Bei starker Abkühlung der Lösung scheiden sich weisse Flocken aus, die gleichfalls aus polymeren Modifikationen bestehen. Man hüte sich, zu stark an Formaldehydlösungen zu riechen, da Formaldehyd die Schleimhäute stark reizt. — Die Aufbewahrung erfolge vorsichtig und da man annimmt, dass Belichtung die Säurebildung befördert, vor Licht geschützt.

Anwendung. Formaldehyd ist, wie von Löw nachgewiesen wurde, ein mächtiges Protoplasmagift, welches besonders auf niedere Organismen einwirkt. Auf Grund dieser Erkenntnis wird es zur Zeit als relativ ungiftiges Antisepticum empfohlen. Nach STAHL tötet es in einer Verdünnung¹⁾ von 1 : 20000 Milzbrandbacillen und in einer Verdünnung von 1 : 1000 Milzbrandsporen nach einstündiger Einwirkung. Es wird daher als Antisepticum empfohlen zum Reinigen und Aufbewahren der Schwämme, zum Reinigen der Hände und Instrumente (Formaldehyd solut 1,0, Aqua 100,0) — Lässt man Formaldehydlösung im geschlossenen Raum ohne Anwendung von Wärme verdampfen und die Dämpfe auf Verbandstoffe (Watte etc.) einwirken, so schlägt sich in diesen Paraformaldehyd nieder und macht sie aseptisch und steril. Auch zur Konservierung anatomischer und mikroskopischer Objekte wird Formaldehyd angewendet. Ferner ist es auch zur Haltbarmachung von Nahrungsmitteln vorgeschlagen worden, doch hat kürzlich der oberste Sanitätsrath in Wien diese Verwendung vorläufig als unzulässig erklärt. Durch Ammoniak wird die desinficirende Wirkung aufgehoben!

Merkwürdig ist die örtliche Wirkung des Formaldehyds. Bringt man dieses auf die thierische Haut, so wirkt es auf diese lederbildend. Die Haut wird hart, undurchdringlich und zum Absterben gebracht. Möglicherweise wird sich auch diese Eigenschaft therapeutisch (z. B. gegen Warzen und andere Neubildungen) verwerthen lassen. Nach JABLON-GONNER benutzt man zur Konservierung von Bier und Wein pro Liter 0,0005 bis 0,001 g, für eingelegte Früchte pro Kilo 0,1 g Formaldehyd, CH_2O .

Solutio Formalini, 1 Proc. (Munch. Ap. V.) Rp Formaldehydi soluti Germ. 3,0, Aquae destillatae 97,0

Der Formaldehyd hat Proteinverbindungen gegenüber merkwürdige Eigenschaften. Er macht die Gelatine unlöslich in Wasser, so dass sie eine hornähnliche Substanz wird. In ähnlicher Weise wirkt er auf Kasein und Eiweiss.

Er hebt die Quellbarkeit der Stärke auf, und soll sich sogar mit Dextrin und Gummi verbinden. Wieweit die so erhaltenen Produkte einheitliche chemische Verbindungen sind, muss abgewartet werden. Dass sie es sind, wird von den Herstellern behauptet, ohne dass hierfür genügende Beweise erbracht worden wären. Immerhin finden diese Substanzen therapeutische Anwendung und müssen deshalb besprochen werden.

Formaldehyd-Gelatine Glutoforn. Glutof — SCHLEICH. Die Gelatine mit Formaldehyd zu verbinden, bietet keine Schwierigkeiten, man braucht nur eine Gelatine-lösung mit Formaldehydlösung einzudampfen und zu trocknen oder Gelatineblätter in Formaldehydlösung einzulegen, abzuwaschen und zu trocknen. Eine gewisse Schwierigkeit besteht jedoch darin, eine pulverförmige Formaldehyd-Gelatine darzustellen.

Nach J. B. SCHMIDT 500 g Gelatine werden in 375 g Wasser aufgelöst. Man giebt 25 Tropfen Formaldehydlösung zu, giesst die Masse aus und trocknet sie in einem geschlossenen Kasten, in welchem sich ein mit Formalin getränkter Wattebausch befindet, über Aetzkalk soweit, dass man eine plastische Masse erhält. In diesem Zustande zerkleinert man das Präparat durch Reiben im Mörtel und trocknet dann vollständig.

Nach VAN VLOTEN Man löst 100 Th. Gelatine in 400 Th. Wasser, setzt die nöthige Menge Formaldehydlösung zu und schlägt die Flüssigkeit mit einem Eierschäumer zu Schaum. Der Schaum verhält sich genau wie trockner Eierschaum und kann leicht in ein feines Pulver verwandelt werden.

Nach SCHROEDER Man löst 50 Th. Gelatine in 50 Th. Wasser, fügt zu der noch warmen Lösung 2 cem Formaldehydlösung und rührt kräftig durch, worauf auch die Masse als dicker Klumpen um den Rührstab festsetzt. Man bringt alsdann die noch warme Masse in eine kalte Schale, übergiesst sie darauf in einem geschlossenen Gefasse mit Formalinlösung und lässt sie damit einige Zeit in Berührung. Die so behandelte Gelatine wird dann zu grobem Pulver zerrieben, mit Wasser gut gewaschen und im Exsiccator getrocknet. Dann trocknet man noch kurze Zeit im Wasserbade und zerreibt zu trockenem Pulver.

¹⁾ Diese Angabe bezieht sich auf die wasserfrei gedachte Verbindung CH_2O

Die pulverförmige Formaldehydgelatine wird als Trockenantiseptikum auf Wunden angewendet. Man stellt sich vor, dass durch die biologische Thätigkeit des Organismus Formaldehyd aus dem Präparate abgespalten wird, welcher antiseptisch wirkt.

Collaform nennt C. Fr. HAUSMANN in St. Gallen die von ihm hergestellte pulverförmige Formaldehyd Gelatine.

Formaldehyd-Kasein Wird durch Einwirkung von Formaldehyd auf Kasein ähnlich wie die Formaldehydgelatine dargestellt und ist ein geruchloses, fast geschmackloses gelbliches Pulver, welches von verdünnten Säuren langsam gelöst und aus diesen Lösungen durch Natronlauge wieder abgeschieden wird. Wie die vorigen zur antiseptischen Wundbehandlung.

Dextrinoform Dextroform Ebenso wie das vorige eine Kombination von Dextrin mit Formaldehyd, wahrscheinlich durch Eindampfen einer konc. Dextrinlösung mit Formaldehyd erhalten. Weisses, in Wasser lösliches Pulver.

Amyloform Eine von CLASSEN dargestellte Kombination von Formaldehyd und Stärke, welche angeblich eine feste chemische Verbindung sein soll, die auf 1 Mol. Stärke = 1 Mol. Formaldehyd enthalten soll.

Ueber die Darstellung ist nichts Näheres bekannt, doch wird man nicht fehlgehen in der Annahme, dass das Präparat erhalten wird durch Anrühren von Stärke mit kaltem Wasser, Zusatz der Formaldehydlösung, worauf man die Mischung einige Zeit stehen lässt dann im Wasserbade bis zum Verkleistern erhitzt, entrocknet und pulvert.

Weissliches Pulver, mit Wasser quellbar, aber keinen Kleister mehr gebend. Verkleistert weder mit Essigsäure, noch mit Natronlauge. Kann ohne Zersetzung bis 180° C. erhitzt werden. Beim Erhitzen mit verdünnten Säuren und Alkalien wird Formaldehyd abgespalten, beim Erhitzen mit verdünnten Säuren wird die Stärke verzuckert. Mit Jodlösung Blaufärbung, unter dem Mikroskop zeigen sich schollige Massen (keine Stärkekörner), ein Beweis, dass das Präparat durch Erhitzen von Stärke mit wässriger Flüssigkeit dargestellt worden ist.

Wird ebenso wie die Formaldehydgelatine zur Wundbehandlung angewendet. Seine Wirkung soll auf der durch die Gewebssäfte verursachten Abspaltung von Formaldehyd beruhen.

Protogen Oveprotogen. Wird durch Erhitzen von Eierweiss mit Formaldehyd dargestellt. Gelbes, trockenes Pulver, welches zu Ernährungszwecken und zwar als Zusatz zur Milch und zur subkutanen Ernährung dienen soll.

Colloidum Paraformii UNNA.

UNNA's Paraform-Colloidum.

Rp Paraformii 50

Colloidi 95,0

Unguentum Formaldehydi refrigerans UNNA.

Formalin-Kühlsalbe nach UNNA.

Rp Adipis Lanae 20,0

Vaselini 10,0

Formaldehydi 10—20,0

Gegen übermässige Schweissbildung an Händen und Füssen.

Bonal, ein Konservierungsmittel, besteht aus Formaldehyd 2,42, Natriumsulfit 0,888, Natriumchlorid 28,672, Natriumphosphat 2,506, Milchzucker 56,884, Wasser 11,186.

AUFBECHT

Chinoform. Wird durch Fällung eines Chinamindenauszuges mit Formaldehyd und starker Salzsäure dargestellt.

Desodor ist eine Formaldehyd enthaltende Mundessenz.

Einbalsamierungsflüssigkeit von J. W. WAGNER. Kochsalz 500,0, Alaun 750,0, arsenige Säure 850,0, Zinkchlorid 120,0, Quecksilberchlorid 90, Formaldehydlösung (85—40 Proc.) 6 Liter, Wasser q. s. ad 24 Liter.

Eufornol ist eine amerikanische Specialität, bestehend aus Menthol, Thymol, Wintergrünöl, Eucalyptusöl, Borsäure Extractum Baptisiae tinctoriae.

Formaldehyd-Alcin. Kondensationsprodukt von Formaldehyd mit Alcin. D. R. P. 86449. Man mischt eine Lösung von 10 Th. Alcin in 20 Th. Wasser mit 10 Th. Formaldehydlösung (von 40 Proc.) und fügt 10 Th. konc. Schwefelsäure zu. Ein gelbes Pulver, in Alkalien löslich. In Wasser schwer löslich, wird daher langsamer resorbiert wie das Alcin und ist nicht so intensiv bitter wie dieses.

Formalinseife, überfettete, 5 Proc Formaldehyd enthaltend, nach UNNA. Bei Osmidrosis, Hyperidrosis, zum Reinigen der Hände nach dem Hantiren mit fauligen Stoffen (nach Sektionen)

Formalith. Kieselguhr, der mit Formaldehyd getränkt ist, in Form von Pastillen oder als Pulver

Formochlorol-Trillat (Formochlor) Ist eine Auflösung von Calciumchlorid in Formaldehydlösung, weil ersteres die Polymerisation des Formaldehyds verhindern soll

Formoform Streupulver gegen Fussgeschwisse Formaldehyd soluti 1,0, Thymol 0,1, Zinci oxydat 35,0, Amyl 65,0

Glykoformal ist zu mischen aus 75 Th Formaldehydlösung (35—40 g), 15 Th Wasser und 10 Th Glycerin

Holzlin Menthol 1,0, Formaldehyd absolut 17,5, Methylalkohol 81,5 **AUFRECHT** Nach anderen Angaben eine konc 60proc methylalkoholische Formaldehydlösung

Holzlinol Formaldehyd absolut 2,0, Menthol 40,0, Methylalkohol 58,0 **AUFRECHT** Nach anderen Angaben Lösung geringer Mengen Menthol in Holzlin

Steroformium chloratum Formaldehyd 5,0, Ammoniumchlorid 10,0, Pepsin 20,0, Milhzucker 65,0 Innerliches Antisepticum

Steroformium jodatum Formaldehyd 5,0, Ammoniumjodid 10,0, Pepsin 20,0, Milhzucker 65,0 Wundstreupulver

Sterisol, innerlich anzuwendendes Antisepticum Milhzucker 2,98, Natriumchlorid 0,672, Dikahumphosphat (HK_2PO_4) 0,322, Formaldehyd absolut 0,5, Wasser 95,5 **AUFRECHT**

Sudol, ein Crème gegen Schweissfuss, besteht aus einer Grundlage von Wollfett und Glycerin mit 8 Proc Formaldehyd, parfümirt mit Wintergrünöl

Nachweis des Formaldehyds Im konc Zustande ist der Formaldehyd leicht an seinem charakteristischen Geruche zu erkennen. In denjenigen Mengen, in welchen er als Konservierungsmittel für Nahrungsmittel verwendet wird, ist sein Nachweis keineswegs leicht und einfach. Die angegebenen Farbenreaktionen etc. gelten auch nicht durchweg nur für Formaldehyd, sondern treten auch mit anderen Aldehyden ein. Dazu kommt, dass kleine Mengen von Formaldehyd wahrscheinlich auch bei gewissen legalen Zubereitungen von Nahrungsmitteln, z. B. beim Räuchern auftreten. Alle diese Momente legen es nahe, bei dem Nachweis des Formaldehydes in Nahrungsmitteln möglichste Vorsicht zu beobachten und das Vorhandensein erst dann als erwiesen anzunehmen, wenn mehrere der angegebenen Reaktionen und unter ihnen eine der charakteristischen ein positives Ergebnis geliefert haben.

In allen Fällen wird man das Untersuchungsobjekt (wenn nothig nach dem Ansäuern mit Phosphorsäure oder verdünnter Schwefelsäure) der Destillation mit Wasserdampf unterwerfen und mit dem Destillat die folgenden Reaktionen anstellen:

1) Ammoniakalische Silbernitratlösung wird reducirt. Vergl. hierzu S 517 — 2) Nessler'sches Reagens wird reducirt. 3) Eine durch schweflige Säure entfärbte Fuchsinlösung nimmt eine violette Färbung an, die auf Zusatz einiger Tropfen schwefliger Säure nicht verschwindet. 4) Geringe Spuren Formaldehyd bringen in Anilinwasser eine deutliche Trübung hervor. 5) Vermischt man in einem Probirglase 1 cem Milch oder Peptonlösung mit einigen Tropfen des Formaldestillates und überschneidet vorsichtig mit konc Schwefelsäure, die eine Spur Eisen enthält, so zeigt sich an der Berührungsstelle eine schöne blaue Zone. Diese Reaktion gilt als charakteristisch für Formaldehyd (HEHNEN). 6) Uberschichtet man eine Mischung von Formaldehyd mit einer sehr verdünnten Lösung von Benzophenon mit konc Schwefelsäure, so entsteht ein karmoisinrother Ring. 7) Wird das Destillat mit starker Natronlauge und etwas Resorcin zum Sieden erhitzt, so nimmt die anfangs gelbe Flüssigkeit eine rothe Färbung an. 8) Bringt man unter eine Glasglocke ein Uhrglas mit einigen Tropfen der zu untersuchenden Formaldehydlösung und daneben ein Porcellanschälchen mit einem Kryställchen Morphinchlorhydrat und 10 Tropfen konc Schwefelsäure, so färbt sich die Mischung nach kurzer Zeit indigoblau (JONISSEN).

Nachweis von Formaldehyd nach VITALI Bringt man zu einer formaldehydhaltigen Lösung eine Phenylhydrazinlösung, so bildet sich eine dem präcipitirten Schwefel ähnliche Ausscheidung, die sich an den Wandungen und am Boden des Gefässes festsetzt und theilweise auch suspendirt bleibt. Die Flüssigkeit färbt sich nach und nach gelb, schliesslich — schneller beim Erhitzen — rothgelb. Der amorphe Niederschlag löst sich in Alkohol und scheidet sich aus dieser Lösung in Prismen oder rhombischen Tafeln ab.

Formaldehyd als Desinfektionsmittel Der Formaldehyd ist, seitdem man gelernt hat, ihn in ergiebiger Weise billig darzustellen, sehr bald als Desinfektionsmittel vorgeschlagen worden. Die Vortheile, welche er gegenüber anderen Desinfektionsmitteln

bietet, sind folgende 1) Er ist ein Gas, verbreitet sich somit gleichmässig im Raume 2) Er ist relativ ungiftig 3) Er wirkt energisch keimtödtend 4) Seine Anwendung ist relativ wohlfeil, führt nicht zur Zerstörung der zu desinficirenden Objekte, auch hinter lässt sie keinen unangenehmen Geruch

Dabei ist jedoch zu beachten, dass nur dem gasförmigen Formaldehyd CH_2O , nicht aber auch seinen polymeren Formen die kräftige Desinfektionswirkung zukommt, und dass sie auch dann nur gesichert ist, wenn der vergaste Formaldehyd bei Gegenwart einer genügenden Menge Wasser(dampf), also gewissermassen als wässrige Lösung zur Wirkung gelangt Da nun der Formaldehyd sowohl als Gas als auch in wässriger Lösung die Neigung zeigt, sich zu polymerisiren, so versucht man bei seiner Anwendung als Desinfektionsmittel dieser Neigung durch allerlei Massnahmen entgegen zu arbeiten

Die Desinfektion von Räumen mittels Formaldehyd ist durch Flüge und seine Mitarbeiter wissenschaftlich begründet und in einer Abhandlung (Ztschr. f. Hygiene 1898 29 276 u. f.) niedergelegt worden Wir geben unter Verweisung auf das Original aus diesem Folgendes wieder

Ein Gas durchdringt von der Entwickelungsstelle aus den ganzen Raum gleichmässig — Durch Verdampfen der 40 proc Formaldehydlösung bekommt man nur einen Theil des Formaldehyds gasförmig, der Rest wird zu Paraform polymerisirt Paraform wirkt kaum, trockener Formaldehyd CH_2O nur wenig desinficirend, dem letzteren muss vielmehr, damit er seine volle Wirkung entfaltet, eine geeignete Menge Wasserdampf zugeführt werden

Die bis zur Gegenwart ausgebildeten Verfahren für die Desinfektion mit Formaldehyd sind folgende

1) Methode von TRILLAT 40 procentige Formaldehydlösung wird im Autoklaven unter 3 Atmosphären Druck verdampft Um Polymerisation des Formaldehyds zu vermeiden, wird Calciumchlorid zugesetzt Die aus 1000 cem Formaldehydlösung, 200 cem Wasser und 200 g Calciumchlorid bestehende Flüssigkeit heisst „Formochlorol“ Der Apparat wird ausserhalb des zu desinficirenden Raumes aufgestellt, die Desinfektion erfolgt durch Einleitung des Gases durch das Schlüsselloch

2) Methode von ROSENBERG In einer Schale wird durch angezündete Presskohlen Formaldehydlösung (von 40 Proc) verdampft Um Polymerisation zu vermeiden, erfolgt Zusatz von 5 Proc Menthol, zu dessen Auflösung eine gewisse Menge Methylalkohol zugesetzt wird Diese Desinfektionslösung heisst „Holzin“

3) Methode von SCHERRING Pastillen von 1 g Paraform werden in einem, „Aeskulap“ genannten Apparate durch eine Spiritusflamme vergast, so dass die Formaldehyddämpfe von den Verbrennungsgasen mit fortgerissen werden Ein Apparat fasst 250 Pastillen Die Spiritusmenge in der Lampe ist so bemessen, dass sie zum Vergasen aller Pastillen ausreicht Der Apparat wird im Zimmer aufgestellt, die Flamme entzündet, das Zimmer verlassen und verschlossen

Neuerdings empfiehlt SCHERRING auch einen Apparat, bei welchem die Vergasung der Pastillen mit dem Verdampfen von Wasser kombiniert ist

4) Methode von WALTHER SCHLOSSMANN In einem besonderen Apparate wird mittels einer Spirituslampe Wasser verdampft Der Dampf drückt auf eine Mischung von 90 Th Formaldehydlösung (40 proc) und 10 Th Glycerin, welche „Glykoform“ genannt wird und in Form eines feinen Sprays austritt Der Glycerinzusatz soll die Polymerisation verhindern Die Aufstellung des Apparates erfolgt in dem zu desinficirenden Raume selbst

5) Breslauer Methode (von C FLÜGE) Polymerisation tritt in wässrigen Formaldehydlösungen nur dann ein, wenn die Konzentration von 40 Proc überschritten wird Da aber Formaldehyd auch aus verdünnten Lösungen leicht ausgetrieben wird, so wendet die Methode solche an Da der gasförmige Formaldehyd sich in der Luft leicht wieder zu Paraform polymerisirt, so wird, um dies zu verhindern, reichlich Wasserdampf zugeführt, der durch Verdampfen der verdünnten Lösungen zugleich mit dem Formaldehyd entwickelt wird

FLÜGE stellt nun für die Desinfektion von Räumen mit Formaldehyd folgende Leitsätze auf Man muss dosirte Mengen Formaldehyd für die Kubik-Einheit in Anwendung bringen Um diese Dosirung ausführen zu können, müssen die Räume vor der Desinfektion abgedichtet werden Dies geschieht z. B. durch Dichten der Fenster mit Wattestreifen und Glaserkitt, Bekleben von Spalten mit Papier mittels Stärkekleister, Abdichten der Ofenöffnungen u. s. w.

Unter dieser Voraussetzung genügt nach FLUGGE für grosse leere Zimmer eine Menge von 200 g Formaldehyd CH_2O , bei kleineren, welche mit Möbeln relativ stark besetzt sind eine Menge von 250 g Formaldehyd CH_2O für 100 Kubikmeter Luftraum. Lässt man den Formaldehyd unter diesen Bedingungen 7 Stunden lang einwirken, so erhält man eine sichere Abtödtung von Diphtheriebacillen, Streptokokken, resistenten Staphylokokken, Tuberkelbacillen, Milzbrandsporen mittlerer Resistenz in mit Bouillonkulturen durchtrankten Lappchen, in Eiter, Sputum, Membranen, falls die Schichten nicht dick sind, gleichgültig, an welcher Stelle des Raumes sich die Kulturen befinden — Keine sichere Abtödtung erfolgt bei dicken Schichten Sputum etc., bei durchtrankten dicken Stoffen, in geschlossenen oder nur wenig vorgezogenen Schiebläden, unter Möbeln und Betten, die vom Erdboden nur geringen Abstand haben.

Um die für eine 7stündige Einwirkungsdauer nötige Menge von 250 g Formaldehyd CH_2O zu erzielen, muss man nach den einzelnen Methoden

1) Im TRILLAT'schen Apparate 700 ccm Formochlorol, verdampfen. Einzufüllen sind mindestens 1000 ccm. Daneben hat man 3 Liter Wasser zu verdampfen. Der TRILLAT'sche Apparat ist theuer.

2) Nach ROSENBERG. Man muss 750 ccm Holzin im ROSENBERG'schen Apparat und ausserdem 3 Liter Wasser verdampfen. Der Zusatz von Menthol und Methylkano vertheuert das Verfahren ohne Nutzen.

3) Nach SCHERING. Es sind 250 Pastillen zu vergasen und daneben 3 Liter Wasser zu verdampfen. Die Pastillen sind nicht ganz billig.

4) SCHLOSSMANN schreibt für 80 Kubikmeter Raum vor = 2 Liter Glykotalmal, also für 100 Kubikmeter Raum etwa 900 g Formaldehyd CH_2O . Insgesamt werden 4 Liter Flüssigkeit verdampft bez. versprüht. Das Verfahren ist wirksam, arbeitet aber mit einem grossen Ueberschuss Formaldehyd und wird dadurch theuer. Das Glycerin bildet auf den zu desinficirenden Gegenständen einen unangenehmen, schleimigen Ueberzug.

5) FLUGGE's Breslauer Methode. Für 100 Kubikmeter Luftraum wird in den Apparat eingefüllt eine Mischung von 800 ccm Formaldehydlösung (40 proc.) und 3200 ccm Wasser. Davon werden 3 Liter verdampft.

Die Ausführung der Breslauer Methode erfolgt in der Weise, dass die verdächtige Wasche in Sublimatkochsalzlösung eingelegt wird. Verdächtige Flecken oder Stellen auf dem Fussboden (von Exkreten u. dergl. herrührend) werden gleichfalls mit Sublimatlösung gewaschen. — Die Möbel sind von den Wänden abzurücken. Thüren und Schiebläden der Schränke etc. sind weit zu öffnen. Betten, Teppiche, Kleider, sind an Wascheleinen oder Gestellen freihängend zu befestigen und zwar so, dass sie nirgends aufliegen und nirgends enge Falten bilden. Die Taschen der Kleidungsstücke sind nach aussen zu kehren. — Nachdem nunmehr noch der zu desinficirende Raum abgedichtet worden ist (§ S 1174), bringt man den Apparat in das Zimmer, stellt ihn so auf, dass jede Feuersgefahr ausgeschlossen ist, entzündet die Lampe, schliesst das Zimmer und überlässt es nunmehr sich selbst während 8 Stunden.

Nach dieser Zeit (8 Stunden) wird durch das Schlüsselloch hindurch Ammoniakgas eingeleitet, welches aus 800 ccm Ammoniakflüssigkeit von 25 Proc. entwickelt worden ist. Das Zuleitungsrohr muss im Innern des Zimmers eine Vorrichtung besitzen, welche die abtropfende Ammoniakflüssigkeit aufzunehmen vermag. Man wartet nach dem Einleiten des Ammoniaks noch 30 Minuten und lüftet darauf gründlich durch Öffnen von Thür, Fenster, Ofenthür. Das so desinficirte und gelüftete Zimmer kann sogleich wieder bezogen, ja als Schlafzimmer benutzt werden.

Nach FLUGGE ist die Desinfektion durch Formalin anwendbar bei Diphtherie, Scharlach, Masern, Tuberkulose, Influenza.

Abzusehen ist von der Formalin Desinfektion bei Cholera, Unterleibstypus, Ruhr. Bei diesen ist wie bisher die Desinfektion auf Dampf-Desinfektion für Betten, Wasche, Kleider, auf Abwaschen der naheren Umgebung des Bettes mit Sublimat- oder Karbollösung und auf die Desinfektion der Aborte mit Kalkmilch zu beschranken.

Bei Kindbettfieber und anderen septischen Erkrankungen (namentlich in Hospitälern, Operationssälen u. s. w.), ferner bei Pocken und Pest ist neben der Formalin Desinfektion die Desinfektion der Matratzen und Betten im Dampfapparat erforderlich.

Formaldehyd-Lampen Um zur Desinfektion Formaldehyddämpfe zu erzeugen, sind von verschiedenen Autoren Lampen konstruirt worden, in welchen Methylalkohol dämpfe durch Ueberleiten über glühendes Platindrahtnetz zu Formaldehyd oxydirt werden. Soweit die einstufte Desinfektion in Betracht kommt, muss die Wirkung dieser Lampen bis jetzt als völlig unzuverlässig und ungenugend bezeichnet werden.

Thymoform $[C_4H_8(CH_2) \cdot C_4H_7O]_2 \cdot CH_2$. Von Dr. G. F. HENNING in Berlin dargestellt. Entsteht unter dem Einflusse von Kondensationsmitteln aus Thymol und Formaldehyd und ist ein gelbliches, geschmackloses Pulver von ganz schwachem Thymolgeruche. Es spaltet beim Kochen mit Schwefelsäure Formaldehyd ab, löst sich aber nicht in Kalilauge — das Formaldehyd scheint also acetalartig gebunden zu sein. Es ist leicht löslich in Aether, Alkohol, Chloroform, Olivenöl, unlöslich in Wasser, Petroläther und Glycerin. Auf eiternde Wunden wirkt es desinficirend. Es ist daher in Aussicht genommen als Ersatz für Jodoform und Dermatol.

Jodothymoform HENNING. Jodirt man Thymoform nach einer der bekannten Methoden, so erhält man ein jodreiches, gelbes Pulver, das fast geruchlos ist und sich leicht in Aether, auch in Alkohol, Chloroform, Benzol und Olivenöl löst, dagegen in Wasser und Glycerin unlöslich ist. Mit Jodothymoform impragnirte Verbandstoffe können sterilisirt werden, da der Schmelzpunkt der Verbindung über $150^\circ C$ liegt. Ist als Ersatz des Jodoforms in Aussicht genommen.

Geoform, Kreoform HENNING. Diese Verbindungen entstehen unter dem Einflusse von Kondensationsmitteln aus Formaldehyd und Guajaköl bez. Kreosot. Geruchlose und geschmacklose Verbindungen, welche weder ätzen noch reizen und nicht giftig sind. Sie lösen sich leicht in Kalilauge und fallen aus dieser Lösung beim Ansäuern mit Säuren wieder aus. Sie sind unlöslich in Wasser und Petroläther, leicht löslich in Alkohol, Aether und heissem Benzol. Sie sollen als Ersatz des Guajaköls bez. Kreosot für den innerlichen Gebrauch verwendet werden.

Polyformin insolubile HENNING. Man erhält es, indem man mehrwerthige Phenole in wässriger Formaldehyd löst und diese Lösung mit starkem Ammoniak versetzt. Hat sich in der Praxis nicht bewährt!

Napththoformin α - und β -HENNING. Entsteht durch Auflösen von α - bez. β -Naphthol in Formaldehydlösung und Versetzen mit starkem Ammoniak. Hat sich in der Praxis nicht bewährt.

Polyformin soluble $[C_6H_4(OH)_2]_2 \cdot (OH)_6N_4$ entsteht durch Kombination von 2 Mol. Resorcin mit 1 Mol. Hexamethylentetramin. Farblose Krystalle. Hat sich in der Praxis nicht bewährt.

Formica.

Formicae. — Ameisen. — **Fourmis.** Ants. **Pismires.** Sind die flügellosen Arbeiter der Waldameise **Formica rufa** L. (Familie der Hymenoptera aculeata, Unterfamilie von Formicariæ), durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika, besonders in Nadelwäldungen lebend.

Beschreibung. Die Thiere sind ungeflügelt, 4—6 mm lang. Der breite, abgerundet dreieckige Kopf ist braun, an den Seiten rothbraun, die 13gliedrigen Fühler noch einmal so lang wie der Kopf. Zwei umgekehrt eiförmige Augen, ausserdem an der Stirn ein gleichseitiges Dreieck bildend noch drei Nebenaugen. Der Rumpf ist braunroth, mit sechs dunkelrothbraunen, oben etwas helleren Beinen, Hinterleib sechsgliedrig, rundlich-eiförmig, schwarzbraun mit braunen Haaren, durch einen zweigliedrigen Stiel mit dem Rumpf verbunden, mit Giftbläschen, die eine scharfe, im wesentlichen aus Ameisensäure bestehende Flüssigkeit enthält, die fortgespritzt werden kann.

Bestandtheile. Ameisensäure, 1 Proc. ätherisches Oel, fettes Oel, Eiweiss etc. etc.

Einsammlung. Man fängt die Ameisen in den Sommermonaten in Flaschen, die man neben den Ameisenhaufen eingrabbt, sodass die innen mit Honig bestrichene Mündung eben noch hervorragt, und tödtet die hineingefallenen Insekten mittels wenig Aether oder Wangeist.

Anwendung. Sie dienen im frischen Zustande lediglich zur Bereitung einer Tinktur und des Spiritus Formicarum, sowie zu Bädern, 300—750 g auf ein Vollbad.

Abgesehen von der Nützlichkeit der Ameisen sind diese Zubereitungen insofern un zweckmässig, als sie nur in einer bestimmten Jahreszeit angefertigt werden können, ausserdem in ihrem Gehalte schnell zurückgehen. Man ersetzt sie deshalb besser durch weingeistige Auflösungen der Ameisensäure, die sich zu jeder Zeit in beliebiger Stärke durch Mischen herstellen lassen. Man verwendet sie zu hautreizenden Einreibungen bei Gicht, Gliederschwache, Lahmungen.

Als Ersatz der Bader dient eine Mischung von Ameisenspiritus und Tinktur aa, von welcher man 500 g auf ein Bad nimmt.

Oleum Formicarum Ameisenöl. 1 Th frische, zerquetschte Ameisen, 1 Th. entwässertes Natriumsulfat, 5 Th Olivenöl digerirt man bei 60–70° C 10 Stunden, presst aus und filtrirt.

Spiritus Formicae (Hely). **Spiritus Formicarum destillatus** Ameisen geist. **Esprit de fourmis**. 50 Th frisch gesammelte Ameisen macerirt man 2 Tage mit je 75 Th Wasser und Weingeist (94proc), dann werden 100 Th abdestillirt. Spec Gew 0,887–0,889. Mit Wasser aa opalsirend. Schendet mit Bleessig Krystallnadeln ab und färbt Silbernitrat beim Erwärmen dunkel. Da der Gehalt an freier Säure durch Esterbildung beständig abnimmt, so hält man den Spiritus nur in massigen Mengen vorrätig.

Spiritus Formicarum (Germ.) s S 49

Tinctura Formicarum (Ergänz.) Ameisentinktur. **Brauner Ameisenspiritus**. **Mierenspiritus**. **Teinture de fourmis**. **Tincture of Ants**. Aus 2 Th frischen, zerquetschten Ameisen und 3 Th. Weingeist (87proc) durch Maceration. Wird durch Wasser milchig getrübt.

Spiritus Formicarum compositus.

Rp Spiritus Formicarum 98,0
Olei Terebinthinae
Olei Lavandulae aa 1,0

Tinctura Formicarum composita.

Ip Spiritus Formicarum 60,0
Mixture oleoso-balsam
Tincturae aromaticae 53,20,0

Fragaria.

Gattung der Rosaceae — Rosoideae — Potentilleae — Potentillinae

Fragaria vesca L. Erdbeere. Fraisiert. Strawberry. Heimisch in einem Theile von Europa und Asien.

Man verwendet

1) Die Blätter **Folia Fragariae** — Erdbeerblätter. — **Feuilles de fraiser.**

Beschreibung. Sie sind dreizählig, die Blättchen oval, kerbig gesägt, besonders unterseits seidenhaartig, sitzend, das mittlere zuweilen gestielt. Die Epidermiszellen der Oberseite gradlinig polygonal, ohne Spaltöffnungen, solche nur auf der Unterseite, hier ausserdem dickwandige, einzellige Haare, Köpfchenhaare mit wenigzelligem Stiel und ein zelligem Köpfchen. Zwei Reihen kurzer Palissaden, Oxalatdrüsen in den Palissaden, seltener im Schwammparenchym.

Anwendung. Man verwendet sie hier und da als Theesurrogat. Medicinisch waren sie obsolet, sind aber neuerdings in den Arzneischatz Pfarrer Kneipp's aufgenommen.

2) Das Rhizom **Radix Fragariae**. — Erdbeerwurzel. — **Racine de fraiser** (Gall.)

Beschreibung. Dasselbe bildet cylindrische, etwas gebogene Stücke, die 8–10 cm lang, 1 cm dick sind. Der Bruch ist glatt. Im Holz breite primäre und einreihige sekundäre Markstrahlen. Im Mark und in der Rinde Drüsen von Kalkoxalat.

Verwendung. Man benutzt das im Herbst gesammelte Rhizom seines Gerbstoffgehaltes wegen als Adstringens.

Ptisana Fragariae Tisane de fraiser (Gall.) Ist wie Ptisana Dulcamarae, S. 1048, zu bereiten.

Species antiferiense

Galbsauchtthee.

Rp Radix Fragariae
Radix Rubrae

Rhizom Felicia

Corucia Frangulae 53 40,0

Tartari depurati 10,0

Divide in p seq X

3) Die Scheinfrucht *Fructus Fragariae*. *Baccae Fragariae*. *Fraga* — Erdbeeren. — *Fraises Fruits de fraiser* (Gall) — *Strawberries*

Beschreibung. Die Erdbeere besteht aus dem nach der Blüthezeit vergrösserten, fleischig und saftig gewordenen Bluthoden, dem die zahlreichen nussartigen Fruchtknoten eingefügt sind

Bestandtheile. Nach Koenig Wasser 87,66 Proc, Stickstoffsubstanz 0,54 Proc, freie Säure 0,93 Proc, Zucker 6,28 Proc, sonstige stickstofffreie Stoffe 1,46 Proc, Holzfaser 2,32 Proc, Asche 0,81 Proc In der Trockensubstanz Stickstoffsubstanz 4,63 Proc, Zucker 49,97 Proc Die Asche ist reich an Kalk (14,2 Proc)

Die Kulturformen der Erdbeere sind theils aus *Fragaria elatior* Ehrh hervorgegangen, theils sind es Kreuzungen der *F virginiana* Ehrh und *F chiloensis* Ehrh, beide in Amerika heimisch, dahin z B die Ananas-Erdbeere

Essentia Fragariae Erdbeeressenz I Frische, vollkommen reife Erdbeeren werden zerquetscht, mit dem gleichen Gewicht 80proc Weingeist 14 Tage ausgezogen, leicht abgepresst, Filtrat wird in ganz gefüllten Glasern kühl aufbewahrt II Für Brause Limonade (nach WEINDEL) 750 g frische, trockne Walderdbeeren zerquetscht man, mischt mit je 200 g Tokayer und Cognac, bringt in eine Retorte, fügt 1,5 g Vanille, 300 g Spiritus, 500 g Wasser hinzu und destillirt langsam 1000 g über Man färbt schwach röthlich

Erdbeerlikör. Erdbeeressenz 2,5 kg, Essigsäureamylather 0,5 kg, Himbeerwein 1 kg, Kirschlarbeeröl 2 Trpf, Rosenöl 1 Trpf, Zucker 40 kg, Wasser 60 Liter, Weingeist 25 Liter, rother Pflanzenfarbstoff q s

Pomata Fragariae. Erdbeerpomade 3 Th Hammeltalg, 5 Th Schmalz, 8 Th Kakaobutter schmilzt man und lässt mit 3 Th frischen Erdbeeren 24 Stunden bei Schmelzwärme stehen, seigt durch und fügt q s Rosen- und Nerohöl, nöthigenfalls auch Erdbeeräther hinzu

Sirupus Fragariae Erdbeersirup I 1000 g frische Walderdbeeren werden zerquetscht und mit 20 g Zucker bei Zimmerwärme ausgehen gelassen, dann lässt man mit 100 g Weisswein 24 Stunden stehen, presst ab, schüttelt mit Talk und filtrirt In 500 Th Filtrat löst man kalt 800 g Zucker und 2,5 g Citronensäure, seigt durch und füllt auf kleine Flaschen

II Man schichtet die Beeren abwechselnd mit Zuckerpulver, seigt nach einigen Tagen den Saft ab, kocht einmal auf und füllt nach Zusatz von etwas Rum auf Flaschen

III Erdbeeren, feinste Raffinade aa Man giesst die gelauterte, heisse Lösung über die durch Waschen und Trocknen auf einem Tuche gereinigten Früchte, lässt eine Nacht mässig warm stehen, seigt durch ein feines Haarsieb, fügt ein wenig Salicylsäure zu und füllt auf 1/2-Liter Flaschen

IV Man löst unter Erwärmen 5 kg Zucker in 1 kg Wasser, setzt alsdann 2,5 kg möglichst reife Walderdbeeren hinzu, rührt sanft (!) um, lässt kurze (!) Zeit aufkochen und kocht ohne zu drücken oder zu pressen (!) durch ein wollenes Kolatorium Der Rückstand kann zur Bereitung eines Erdbeerlikörs noch mit verdünntem Weingeist ausgezogen werden (B FISCHER)

Franciscea.

Gattung der Solanaceae — Salpiglossideae.

Franciscea uniflora Pohl (syn *Bruffelsia Hopeana* Benth.) *Manaca*. *Mercurio vegetal*. Heimisch im äquatorialen Amerika

Man benutzt die Wurzel und die Zweige

Beschreibung. Die Droge bildet ungleich lange, federspulen- bis zweifingerdicke, cylindrische Stücke mit dünner, schwarzbrauner oder rostbrauner Rinde Die Rinde zeigt reichliche Gruppen stark verdickter Steinzellen und grosse Oxalatdrüsen, in einzelnen Stücken, wahrscheinlich von Zweigen, auch stark verdickte Fasern. Im Holz ziemlich enge Gefässe, verdickte Fasern, spärliches Holzparenchym Markstrahlen eine Zellreihe breit, auf dem Tangentialschnitt auffallend hoch An denjenigen Stücken, die von Zweigen stammen, erkennt man das intraxyläre Phloem An der Grenze zwischen Mark und Xylem in ersterem zuweilen Sternzellen.

Bestandtheile. Ein Alkaloid Manacin $C_{23}H_{33}N_3O_{10}$, ein zweites Manac $C_{12}H_{23}N_2O_{10}$. Das Manacin wirkt stark giftig und tödtet durch Stillstand der Respiration die Sekretion der Drüsen anregen, das zweite wirkt viel schwächer.

Anwendung. Seit 1884 als Antisyphiliticum, Antiarthriticum, Purgativum und Diureticum empfohlen.

Es ist vorkommenden Falles sehr zu beachten, dass unter dem Namen Mercur vegetal auch andere Drogen: Bichetea officinalis (Urticaceae), ferner als Azong vegetal (= Mercurio vegetal): Urostigma cystopodum Miq. vorkommen. Die beiden Drogen heissen auch Murure. — Unter den Namen Manaca werden in Brasil noch verwendet: Duranta bicolor und Aderosma superflua. (Die Namen die Pflanzen finden sich nicht im Index Kewensis.)

Frangula.

Rhamnus Frangula L. (syn. Frangula Alnus Mill.) Familie der Rhamnaceae — Rhamnaceae. Heimisch in Laubwäldern und an Waldrändern Europas, Centralasie Nordafrikas. Bis 6 m Höhe erreichender Strauch mit unscheinbaren, zwittrigen, grünlich 4—5zähligen Blüten. Die Frucht ist eine anfangs rothe, später schwarze Steinfrucht. Die Blätter sind elliptisch, ganzrandig oder schwach wellig-ausgerandet, an wechselstehenden, dornenlosen Zweigen.

Verwendung findet die Rinde: Cortex Frangulae (Aust. Germ.). Cortex Rhamni Frangulae (Helv.). Frangula (U-St.). Cortex Alni nigrae. Cortex Avenal. — Faubaumrinde.¹⁾ Gelbholz-, Pulverholz-, Zapfenholzrinde. — Écorce de bourdaine ou d'aune noir. — Buckthorn. Black elder bark. Dog wood.

Beschreibung. Die Rinde bildet bis 25 cm lange, bis 2 cm im Durchmesser messende, eingerollte Stücke, die von einem grünbräunlichen oder grünschwätzlichen dünnen Kork bedeckt sind, der jedoch oft durch hellere Parthieen unterbrochen ist und daher fleckig erscheint. Jüngere Rinden sind mehr braun, ältere mehr schwärzlich. Die Aussenseite zeigt zahlreiche Korkwärtchen (Lenticellen), die bei jüngeren Rinden weisslich, bei älteren etwas dunkler und quergestreckt sind. Die einzelnen Stücke der Rinde erreichen eine Dicke von 1,5 mm. Beim Abschälen des Korks mit dem Messer kommt eine schöne rothe Farbe zum Vorschein. Die Innenseite der Rinde ist bei jungen Stücken gelb bis gelbbraun, bei alten braunroth. Der Bruch ist kurzfasrig.




Fig. 253. Querschnitt durch Cortex Frangulae. a Kork. b Collenchym. d Primäre Fasern. e sekundäre Fasern. f Markstrahlen.

Der Querschnitt (Fig. 253) lässt zu äusserst eine dünne Korkschiebt aus flachen Zellen mit rothem Inhalt erkennen. Daran schliesst sich ein schmales Collenchym, dem das Parichym der primären Rinde folgt, in welchem man die zusammengedrückten Bündel primäre Fasern erkennt. Die Markstrahlen der sekundären Rinde sind 1—3 Zellreihen breit, 25 Zellen hoch, die Zellen radial gestreckt und mit gelbem Inhalt versehen. In den Markstrahlen rundliche oder tangential gedehnte Gruppen stark verdickter Fasern, die

¹⁾ Den Namen „Faubaum“ führt auch die Traubenkirsche: Prunus Padus

Krystallzellen umgeben sind Im Parenchym Drüsen von oxalsaurem Kalk. Steinzellen fehlen der Rinde

Mit Kalkwasser und anderen Alkalien übergossen wird die Rinde schön roth, der wässrige Auszug der Rinde wird durch Eisenchlorid tiefbraun gefärbt Geschmack bitterlich süss und etwas schleimig

Bestandtheile Der wirksame Bestandtheil der Droge ist glukosidischer Natur, man bezeichnet ihn nach KUBLY als Frangulasäure (AWENG's primäres Glukosid), diese liefert beim Kochen mit Citronen- oder Oxalsäure durch Hydrolyse KUBLY's reine Frangulasäure oder AWENG's Pseudofrangulin, das wieder durch Hydrolyse AWENG's Pseudo-Emodin liefert Pseudofrangulin löst sich mit prachtvoll rother Farbe in Aetzalkalien, schwerer in Alkalkarbonaten Pseudo-Emodin löst sich mit derselben Farbe leicht in Karbonaten Beide wirken mild abführend in Gaben von einigen Decigrammen Das Pseudo-Emodin, das ebenso wie die entsprechenden Körper aus der Aloë, dem Rhabarber und den Senesblättern ein Oxymethylantrachinon $C_{15}H_{10}O_6$ ist, schmilzt bei $250^{\circ}C$

Um die Gesamtmenge der wirksamen Bestandtheile für die Darstellung des Fluidextraktes zu verwerthen, soll die Rinde mit mindestens 50 proc Alkohol ausgezogen werden, noch besser ist es nach AWENG, das etwa noch in der Rinde vorhandene primäre Glukosid vorher zu hydrolysiren Zu diesem Zweck erhitzt man das Rindenpulver mit Lösung von Citronensäure, dampft zur knetharen Masse ein und perkolirt mit 96 proc Alkohol Der gewonnene Auszug, der aus 100 Th Rinde 500 Th beträgt, wird grösstentheils mit Calciumkarbonat abgestumpft. — Der Extraktgehalt der Rinde beträgt rund 20 Proc

Verwechslungen. Solche sind durch das gemeinsame Vorkommen mit ähnlich aussehenden Sträuchern leicht möglich Es kommen folgende in Betracht

1) Rinde der Erle, *Alnus glutinosa* (L.) Gärt. Sie ist braun und glatt Baum-Schalen zeigt sie keine rothe, sondern nur eine gelbbraune Farbe Mit Ferrichlorid wird der Auszug schwarz Die Lenticellen sind spärlich, punktförmig Der Bruch ist nicht faserig Die Rinde hat einen aus Fasern und Steinzellen gebildeten, „gemischten sklerotischen Ring“

2) Die Rinde von *Alnus incana* (L.) D. C. ist der vorigen ähnlich

3) Die Rinde von *Rhamnus cathartica* L. ist glänzend rothbraun Lenticellen spärlich. Sie bildet viel kürzere Stücke wie *Cortex Frangulae* Der Bruch lässt lange, gelbe Fasern erkennen

4) Die Rinde der *Rhamnus Purshiana* D. C. hat Steinzellen (vergl. *Rhamnus*)

5) Die Rinde der Traubenkirsche oder des Faulbaumes *Prunus Padus* L. riecht frisch nach bitteren Mandeln wegen des Gehaltes an Amygdalin Sie hat rundliche, grüngelbe oder gelbgraue Korkwarzen und feinfaserigen Bruch mit weissen Bastfasern.

Einsammlung, Aufbewahrung. Die Rinde wird im Mai und Juni gesammelt und getrocknet, hauptsächlich aber bei der Verarbeitung des Holzes zu Schiesspulver als Abfall gewonnen, ist daher eine billige Waare Wegen ihrer unangenehmen (brechen-erregenden) Nebenwirkungen in frischem, oder frisch getrockneten Zustande darf sie, wie es Helv. und U-St. auch vorschreiben, erst nach wenigstens einjähriger Lagerung in Gebrauch genommen werden. Es empfiehlt sich aus diesem Grunde, die selbstgesammelte und, wenn man von der Zuverlässigkeit seines Lieferanten nicht völlig überzeugt ist, auch die eingekaufte Rinde mit einem entsprechenden Vermerk versehen ein, besser zwei Jahre bei Seite zu stellen. Dieselbe Veränderung, die eine solche längere Ablagerung bewirkt, soll übrigens durch einstündiges Erhitzen der frischen Rinde auf $100^{\circ}C$ zu erreichen sein Nach AWENG ist die brechen-erregende Wirkung der frischen Rinde auf die Gegenwart eines Fermentes zurückzuführen

Eine für Theemischungen besonders geeignete Zerkleinerungsform ist die *Cort. Frangulae* □ *concosa* der Drogisten, für Abkochungen hält man eine ferne Speciesform zur Extraktbereitung ein mittelfeines Pulver (100 Th Rinde geben etwa 90 Th) vorrätig

Wirkung, Anwendung Als einheimisches, billiges und sicher wirkendes Abführmittel bei Verstopfung, Hamorrhoidalbeschwerden und Leberleiden in Form der Abkochung, 8—15—30 g 150—200 g, oft in Verbindung mit Natriumsulfat sehr gebräuchlich oder als Fluidextrakt, seltener im Aufguss. Größere Gaben bewirken Kolikschmerzen. Die Rinde ist in mittleren Gaben ein sicheres Abführmittel, ohne Kollischmerzen und wenn sie alt genug ist, ohne Brechen zu erregen.

Extractum Frangulae (Ergänzb.) Faulbaumrindenextrakt. Aus mittelfein geschnittener Rinde wie Extr. Dulcamarae zu bereiten (S 1047). Harzige Ausscheidungen beim Eindampfen bringt man durch Zusatz kleiner Mengen Weingeist in Lösung — Dick, dunkelbraun, in Wasser trübe löslich. Vorzügliches Bindemittel für Abführpillen.

Extractum Frangulae fluidum (Germ U-St.) Faulbaum-Fluidextrakt. Fluid Extract of Frangula. Germ. Aus 100 Th mittelfein gepulverter Rinde und q s einer Mischung von 3 Th Weingeist (87proc) und 7 Th Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 35 Th, lässt 48 Stunden im Perkolator stehen, fängt zuerst 85 Th auf, dampft den zweiten Auszug zum dünnen Extrakt ein und löst dieses in q s des Lösungsmittels, so dass man im ganzen 100 Th Fluidextrakt erhält. Es sind etwa 1000 Th Lösungsmittel erforderlich (bei Verwendung fein gepulverter Rinde erheblich weniger). Giebt von 13—20 Proc Trockenrückstand. Anwendung statt Decoctum Frangulae concentratum und als Ersatz des Extr. Cascarae Sagradae fluidum zu 10—20 Tropfen, als einmaliges Abführmittel zu 10—20 g — U-St lässt aus 1000 g Rinde (Pulv No 40) mittels einer Mischung von 500 cem Weingeist (91proc) und 800 cem Wasser unter Zurückstellen der ersten 800 cem 1000 cem Fluidextrakt herstellen.

Extractum Frangulae fluidum examanatum (Ergänzb.) Enthittertes Faulbaum-Fluidextrakt. 100 Th Faulbaumrinde (V) und 5 Th gebrannte Magnesia werden mit einer Mischung von Weingeist (87proc) und Wasser ää im Perkolator erschöpft. Man fängt die ersten 80 Th für sich auf und bereitet 1 a 100 Th Extrakt. Klar dunkelbraun roth, schwach bitter.

Extractum Frangulae siccum gewinnt man durch Eindampfen des Extractum Frangulae zur Trockne.

Extractum Frangulae solidum (DIETERICH) Decoctum Frangulae siccum. Faulbaumrinde Dauereextrakt wird wie Extr. Uvae Ursi solidum (S 363) bereitet, doch nimmt man statt 700 g Milchsücker 200 g Zucker und 500 g Milchsücker.

Tinctura Frangulae Faulbaumtinktur. Bad. Erg.-Taxe 1 Th Faulbaumrinde (III), 5 Th verdünnter Weingeist (60proc) — Münch. Vorschr. 20 Th Faulbaumfluidextrakt, 80 Th verdünnter Weingeist.

Vinum Frangulae (Ergänzb.) Faulbaumwein. 50 Th enthittertes Faulbaumfluidextrakt dampft man im Wasserbade auf 20 Th ein und löst in 80 Th Süsswein.

Decoctum Frangulae GUMPRECHT
Rp 1. Decoct Cort. Frangulae 250 200,0
2 Fructus Carvi 5,0
Man übergießt 2 mit der heissen Abkochung und
sieht nach $\frac{1}{2}$ Stunde ab.

Decoctum Frangulae concentratum BECKMANN
Decoctum Frangulae Suecicum.
Rp 1 Corticis Frangulae min. conc. 500,0
2 Sacchari 25,0
3 Aquae destillat. 2000,0
4 Tincturae Aurant. cort. 15,0
5 Tincturae Aurant. fruct. 10,0
6 Spiritus 85,0

1—3 drei Tage digeriren, eine Stunde kochen, auspressen, den Rückstand mit 1000 Wasser nochmals auskochen, die Kolaturen auf 200,0 eindampfen, mit 4—6 mischen und nach dem Absetzen durchsieben.

Decoctum Frangulae compositum
Zusammengesetzte Faulbaumrinde-
Abkochung
Rp 1 Corticis Frangulae conc. 10,0
2 Aquae destillatae 110,0
3 Rhizomatis Rhei conc. 2,0
4 Strobil. Lupuli 0,5
5 Fructus Cardui Mariae 0,5
Man erhitzt 1—2 eine halbe Stunde, dann mit
3—5 noch 10 Minuten im Dampfbade, sieht durch
und bringt mit q s Wasser auf 100,0.

Elixir Frangulae
Faulbaum-Elixir
Rp Tinct. Aurant. cort. 10,0
Aqueae Cinnamon. spir. 20,0
Sirupi simplicis 30,0
Extract. Frangulae fluid. 40,0

Nach dem Absetzen filtriren.
Essentia Frangulae
Hamb. Vorschr.

I
Rp 1 Cort. Frangul. min. conc. 10,0
2 Aquae destillat. 50,0
3 Tinct. Aurant. cort. 10
4 Spiritus 1,0

Man erhitzt 1—2 mehrere Stunden im Dampfbade, preßt aus, dampft auf 9,0 ein und fügt 3—4 hinzu.

II
Rp Extract. Frangul. fluid. 10,0
Tinct. Aurant. cort. 1,0

Sirupus Frangulae
Faulbaumrinden-Sirup
Rp Extract. Frangul. fluid. 5,0
Sirupi simplicis 95,0

Species Anglicae
Englischer Thee
Rp Cortic. Frangulae 75,0
Fructus Carvi
Cortic. Aurant. fruct. 33 12,5

Species aperientes Bromthee		
Rp	Cort Frangulae	40,0
	Folior Sennae	
	Florum Acaciae	
	Florum Luliae	
	Ligni Sassafras	aa 15,0

Species Frangulae corticis Hämorrhoidal Thee Schwedischer Thee		
Rp	Cort Frangul gr pulv	200,0
	Sacchar albi pulv	
	Natrii sulfuris pulv	
	Natrii bicarbonici pulv	
	Fruct Carri res gr pulv	aa 25,0
	Aquae destillat	50,0
Man trocknet bei gelinder Wärme und treibt durch ein feines Theesieb (III) 1 Esslöffel auf 1 Tasse kochendes Wasser		

Tinctura Frangulae RICH		
Rp	Decocti Frangul cort	25,0 150,0
	Spiritus diluti	20,0

Man dampft die Selbstsichtigkeit auf 25,0 ein und
mischt mit dem Weingeist Abends 2 Theelöffel

Species gynaecologicae MARTL MARTIN'scher Thee		
Form Bacolin		
Rp	Corticis Frangulae conc.	
	Foliorum Sennae conc.	
	Herba Millefolii conc.	
	Rhizomat Graminis conc	aa 25,0

Species laxantes KNEIPP KNLIFF's Blutreinigungsthee		
Rp	Corticis Frangulae	
	Florum Sambuci	
	Folior Sambuci	
	Radicis Ebuli	
	Ligni Santali	
	Visci albi	aa 10,0
	Flor Acaciae	
	Folior Fragariae	
	Folior Urticae	aa 5,0
	Summitat Juniperi	2,5

Alpenkräuter-Gesundheits-Likur, RUD BOHL's, enthält einen Auszug aus Sternanis, Faulbaumrinde, Zimmt, Tausendgüldenkraut, Ochromenwurzel, Enzian und Aloë

Blutreinigungstabletten von FRITZ GRASSMANN Bestandtheile Faulbaumrinde, Senna, Rainfarn

Blutreinigungsthee, LALLEMANDS, von Apotheker BERNARD, besteht aus Ginster, Eibisch und Rhabarberwurzel, Faulbaumrinde, Islandisch Moos, Fenchel, Anis, Kümmel, Huflattig, Guajakholz, Wollblumen

Plechtenmittel von JOSEPH KULLA in Elberfeld 1) Thee aus Enzian, Faulbaumrinde, Pomeranzenschale 2) Pulver aus Schwefel, Senna, Süssholz, Aloë 3) Salbe aus Wachssalbe und Holztheer

Geburths Balsam von G SCHMIDT in Berlin, gegen Hämorrhoiden, Verstopfung u s w ist ein Sirup mit den Bestandtheilen von Rhabarber, Faulbaumrinde, Schifgarbe, Rainfarn

Malzextrakt-Gesundheitsbier, Malzextrakt des JOHANN HOFF in Berlin Ursprunglich ein minderwerthiges Bier, das mit einem Auszuge aus Faulbaumrinde, Bitterklee, Cardo benedictenkraut, Koriander, Anis, Kardamomen u s w und Zuckerfarbe versetzt war Weingeistgehalt 3 Proc, Extrakt von 4,5 bis zu 12 Proc, infolge eines Zusatzes von Stärkesirup

Pferhofer Pillen. 2,0 Faulbaumrinden Extrakt, 2,0 Rhabarber Extrakt, Seife und Löwenzahn-Extrakt q s Pillen von 0,1 g

Rhamnus saccharatus DE VRIJ entspricht genau dem Extractum Frangulae soludum DIETERICH

Universal-Blutreinigungsthee von SANDROCK in Berlin besteht aus Faulbaumrinde, Quecken, Lavendel, Pomeranzenschalen.

Fucus.

Gattung der Fucaceae.

Fucus vesiculosus L. Im nördlichen atlantischen Ocean weit verbreitet Pflanze über 1 m lang, gabelig getheilt, die linealen Lappen des Thallus, in einer Ebene liegend, bis 2 cm lang, ganzrandig, von einer Mittelrippe durchzogen, neben der Mittelrippe mit paarweise gestellten Luftblasen Fruktifikationsorgane (Scaphidien) an den Enden der dann etwas angeschwollenen Zweige.

Man verwendet die ganze getrocknete Pflanze **Fucus vesiculosus** **Quercus marina** — Blasentang. Höckertang. Seesiehe. — Varech vésiculeux (Gall)

Bestandtheile. 74 Proc. Wasser, 22 Proc organische Substanz, 3 Proc Asche, 0,08 Proc Jod. (F vesic ist damit eine der an Jod ärmsten Meeressalgen) Das Jod findet sich in organischer Bindung und ist in der frischen Pflanze in Alkohol und Wasser löslich, nicht aber, oder nur zum kleinsten Theil in der getrockneten, es

sind daher die mit Alkohol aus der trocknen Droge bereiteten Präparate unrationell. Die Alge enthält ferner einen Zucker Fucose $C_6H_{12}O_6$, der Rhamnose isomer. Liefert wie verwandte Arten beim Destilliren mit Säuren Fucosol, ein Gemenge von Furfurol und Methylfurfurol.

Ein Sammlung Wird in dünner Schicht ausgebreitet in der Sonne, dann bei gelinder Wärme getrocknet. 100 Th frischer Tang geben etwa 25 Th. trocknen.

Anwendung Gegen Fettleibigkeit allein in der Form des weingeistigen Extraktes.

Verkohlt liefert er den

Fucus vesiculosus tostus Aethiops vegetabilis Tangkohle. See- oder Meerseepulver. Vegetabilischer Mohr, gegen Siropheln und Kropf gebraucht.

Extractum Fuci vesiculosi Bläsentangextrakt. Aus grob gepulvertem Tang mittels 45 proc Weingeist durch Maceration, dann Perkolation und Eindampfen. Weiches Extrakt. Gabe 1–2 g.

Extractum Fuci vesiculosi fluidum Flüssiges Bläsentangextrakt. Aus 1000 g grob gepulvertem Tang mittels 60 proc Weingeist im Verdrängungswege. Man sammelt zuerst 750 g, erschöpft mit 2 l Weingeist, dann mit warmem Wasser q s zu 9 l, dampft den zweiten Auszug auf etwa 260 g ein und mischt beide. Das Filtrat muss 1000 g betragen.

Sirupus Fuci vesiculosi 25 g des Fluidextraktes mischt man mit 75 g Zuckersirup.

Pilulae antipolysarcicae Antifett-pills. Pillen gegen Fettleibigkeit.			wieder auf 3 zurückgehen. Dauer der Kur etwa 10 Wochen.	
I			II	
Rp	Extracti Fuci vesiculosi	20,0	Pp	Extracti Fuci vesicul
	Extracti Frangulae cort	5,0		Kali sulfurici
	Kali sulfurici	10,0		Kali bromati
	Radices Althaeae	2,0		Kalli iodati
	Fuci vesiculosi pulv	q s		Fuci vesiculosi pulv
Man formt 200 Pillen und überzieht mit Pillenlack.			Zu 800 Pillen, die mit Lack überzogen werden.	
Täglich 2, wöchentlich steigend bis 4 mal 3, dann			Täglich 3, wöchentlich steigend bis 5 mal 3 Stück	

Fuligo.

I Fuligo splendens Glanzruss. Man versteht darunter diejenige firmisartige, stark glänzende Decke, welche sich in den mit Holz (nicht mit anderen Brennmaterialien, z. B. Steinkohle) geheizten Feuerungen in der Nähe des Holzfeuers absetzt. In weiterer Entfernung des Holzfeuers setzt sich der sog. Flatterruss ab.

Braunschwarze, glänzende, zerbrechliche, nach Bitumen und Rauch riechende, empyreumatische Substanz, welche, von Kalkstückchen und Sand möglichst befreit, als mittelfeines Pulver zu Veterinärzwecken verwendet wird.

Fuligo splendens depurata. **Extractum Fuliginis.** **Fuligina.** Gereinigter Glanzruss. Unter dieser nicht ganz zutreffenden Bezeichnung ist ein Extrakt zu verstehen, welches die in Wasser und Alkohol löslichen Theile des Glanzrusses enthält.

Der zu einem groben Pulver zerstoßene Glanzruss wird mit der doppelten Menge kaissem Wasser übergossen und einen Tag digerirt. Nach dem Erkalten wird kolirt und der feuchte Rückstand mit einem gleichen Gewicht Weingeist einen Tag digerirt.

Die zusammengewonnenen Kolaturen werden bei gelinder Wärme abgedampft, auf Porcellan- oder Glastafeln ausgebreitet, ausgetrocknet und in ein Pulver verwandelt, welches in gut verstopftem Glase aufzubewahren ist.

Bestandtheile Der Glanzruss besteht neben Kohlenstoff aus etwa 30 Proc in Wasser löslicher Bestandtheile, die früher als Asbolin und Ulmin bezeichnet wurden. Neuerdings hat man in demselben Brenzkatechin und Homobrenzkatechin nachgewiesen. Ausserdem sind in demselben natürlich noch vorhanden Essigsäure, Ammoniaksalze, Kreosol und ähnliche Phenole.

Anwendung Der Glanzruss war bei den alten Aerzten ein Excitans, Nervinum und Antispasticum. Man gab ihn bei allen innerlichen Leiden, ausserlich bei den verschiedensten Hautkrankheiten. Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er als Surrogat des damals noch theuren Kreosots verwendet. Gegenwärtig kann er als obsolet angesehen werden.

Fulgokali simplex. 100,0 gepulverter Glanzruss und 20,0 Kalihydrat werden in 500,0 Wasser übergossen, zwei Stunden im Wasserbade erhitzt, dann filtrirt, eingedickt und auf porcellanen Tellern ausgestrichen bei gelinder Wärme trocken gemacht. Es ist hygroskopisch und muss daher in wohlverstopfter Flasche aufbewahrt werden.

Fulgokali sulfuratum 15,0 Kalihydrat und 5,0 Schwefel werden mit 5,0 Wasser übergossen und unter Umrühren erhitzt, bis Vereinigung des Kalis mit dem Schwefel stattgefunden hat. Dann werden 75,0 Fulgokali simplex darunter gemischt und zur Trockne gedampft. Die Aufbewahrung ist dieselbe wie beim Fulgokali simplex.

Beide Fulgokali werden äusserlich und innerlich bei Hautkrankheit gebraucht wie das Anthrakokali (s. S. 626).

Spiritus Fuliginis Russi war ein Produkt der trocknen Destillation aus dem Glanzruss.

Tinctura Fuliginis wird durch Digestion aus 1 Th gepulvertem Glanzruss und 1 Th 45 procentigem Weingeist dargestellt.

Tinctura Fuliginis HUFELAND wurde aus 1 Th Glanzruss und 8 Th 80 procentigem Weingeist dargestellt.

Tinctura Fuliginis CLAUDE 6,0 gepulverter Glanzruss, 12,5 Kaliumkarbonat und 5 Ammoniumchlorid werden mit 80,0 Wasser übergossen, im geschlossenen Gefasse zweimal digerirt, öfters geschüttelt und nach dem Erkalten filtrirt. Die Kolatur betrage 100,0.

Taglich drei- bis viermal 30–60 Tropfen mit Wasser zu nehmen (gegen Podagra, Arthritis, Menstrualbeschwerden).

Aqua ophthalmica Benedictinorum.

Rp Fuliginis splendentis pulv	5,0
Florum Rosae concisum	7,5
9 Aquae Rosae	75,0
Aceti (6 Proc)	30,0
Spiritus (90 Vol Proc)	7,5

Man macerirt während 2 Tagen, kocht und filtrirt. Die Kolatur betrage 100,0. Mit der zehnfachen Menge Wasser verdünnt bei ekrophthalmischer Augenentzündung.

Haecostum Fuliginis aluminatum ROCHETTA.

Rp 1 Fuliginis splendentis pulv	50,0
2 Aquae	800,0
3 Aluminis	20,0
4 Aquae	q s

Man kocht 1 und 2. In der Kolatur löse man 3 auf und fülle mit 4 zu 1 Liter auf. Zu Injektionen bei Leukorrhoe.

Emplastrum Fuliginis BERNHARDI.

Rp Cerati resinae Fini	
Resinae Pini	ss 10,0
Fuliginis splendentis pulv	20,0

Tinctura Fuliginis foetida.

Rp Asae foetidae depuratae	5,0
Tincturae Fuliginis	100,0

Nach eintägiger Maceration zu filtriren.

Unguentum anticarcinomaticum BLAUD.

Rp Fuliginis splendentis pulv	
Adipsi suilli	ss 20,0
Extracti Belladonnae	5,0

Zum Verbands der Krebsgeschwüre.

Unguentum Fuliginis phenylatum.

Rp Unguenti Fuliginis	100,0
Acidi carbonici	1,0

Unguentum Fuliginis splendentis

Rp Fuliginis splendentis pulv	25,0
Spiritus diluti (70 proc)	5,0
Adipsi suilli	85,0

Man digerirt im Wasserbade während 1 Stunde und kocht.

II Fuligo et caeda Fuligo. Kienruss. Die bekannte, lockere, amorphe Kohle, welche früher in Gebirgsdüffern durch Verbrennung von Kienholz bei beschränktem Luftzutritt und Auffangen des Rauches in besonderen Kammern dargestellt wurde. Gegenwärtig stellt man den Kienruss in den sog. Russbrennereien fabrikmässig durch Verbrennen von Theer, Theeröl und ähnlichen billigen Materialien dar. Um ihn von den beigemengten ohlenwasserstoffen etc. zu befreien, wird er in eisernen Cylindern bei Luftabschluss nacheinander ausgeglüht und heisst dann Fuligo usta, gebrannter Kienruss. — Mit dem vorher besprochenen Glanzruss ist dieser Kienruss nicht zu verwechseln.

Man benutzt ihn in der Pharmacie zum Dunkelfärben von Salben (Unguentum contra oculos), zum Schwarzfärben von Haarwachs und Pomaden, in der Therapie zur Herstellung der dermatographischen Stifte (zum Schreiben auf die Haut). Die Anwendung in der Technik als Anstrichfarbe, zur Herstellung von Tusche, Stiefelwische, Buchdruckerbwärze und dergl. mehr ist eine sehr ausgedehnte.

Lampenruss heisst eine besonders feine Russsorte, welche man durch Verbrennen kohlenstoffhaltiger Materialien, z. B. Sesamol, Petroleum und dergl., in besonders konstruirten Lampen gewinnt. Sehr feiner Russ wird zur Zeit auch durch Verbrennen von Acetylen dargestellt.

Asboline nennt Braconnot eine Flüssigkeit, welche er aus Kienruss durch Auskochen mit Wasser, Behandeln des Extraktes mit Salzsäure, Ausziehen mit Alkohol, Abdampfen, Aufnehmen des Alkoholrückstandes mit Aether und Abdestilliren des Aethers darstellt. Das gegen verschiedene Krankheiten, besonders Tuberkulose, angewendete gelbliche, sirupartige Präparat enthält als Hauptbestandtheile Brenzkatechin und Homobrenzkatechin. Wir möchten hieran die Frage knüpfen, ob das Präparat wirklich aus Kienruss und nicht etwa aus Glanzruss hergestellt worden ist.

Bacilla dermatographica PIERIS Adipis suilli 10,0, Terebinthinae 20,0, Cerae flavae 30,0, Fuhgini et tassa ustae 10,0

Kohol, ein Haarfarbmittel, ist chinesische Tusche, mit Quittenschlim und arabischem Gummi angerieben.

Druckerschwärze Ordinare für Zeitungen Schwacher Firniss 1000,0, Siccativ 50,0, Harzöl 300,0, Kolophonum 300,0, Harzseife 200,0, Russ 400,0 Bessere I) Lix. chenterpentini 675,0, Kalb-Oelseife 750,0, Olcm 300,0, Lampenschwarz 150,0, Pariser Blau 80,0, Oxalsäure 40,0, Wasser 80,0 II) Syrischer Asphalt 150,0, Mineralöl 400,0, Berliner Blau 20,0, Beinschwarz 300,0, Lampenschwarz 230,0 III) Syrischer Asphalt 100,0, Mineralöl 400,0, Berliner Blau 20,0, Beinschwarz 100,0, Lampenschwarz 300,0

Stempelfarbe, nicht durchschlagend Für Metallstempel zum Stempeln auf Papier Sechsfach gebrannter Russ wird mit Rapsöl q. s. fein angerieben.

Fumaria.

Gattung der Papaveraceae—Fumarioidenae

Fumaria officinalis L. Heimisch in Europa und Asien in Amerika eingeschleppt.

Beschreibung Einjährig, mit kahlem Stengel, blanch bereiften, fiederschnittigen Blättern, deren Abschnitte dreitheilig, die Zipfel mehrspaltig sind. Die in Trauben angeordneten Blüthen sind hellroth mit dunkelpurpurnem Fleck an der Spitze. Kelchblätter 3 mal kleiner als die Blumenkrone. Frucht niedergedrückt-kugelig, quer breiter, oben abgestutzt oder ausgerandet.

Bestandtheile Ein Alkaloid Fumarin, in konz. Schwefelsäure mit dunkel violetter Farbe sich lösend, schwer löslich in Wasser, leicht in Alkohol, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff und Amylalkohol, unlöslich in Aether. Die Pflanze enthält ferner Fumarsäure (CH₂COOH). Man verwendet das ganze Kraut.

Herba Fumariae (Eigänz.) — Erdrauch Erdraute Taubenkerbel. **Gründkraut** — **Fumeterre** (Gall.) — **Fumitory**

Gebrauchlich ist das zur Blüthezeit — Mai bis Juli — gesammelte Kraut ohne die Wurzel. 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trocknes.

Extractum Fumariae (Gall.) Erdrauchextrakt **Extrait de fumeterre** Wird wie Extr. Digitalis Gall. (S. 1041 1) bereitet. Ausbeute 20—22 Proc.

Sirupus Fumariae Sirop de fumeterre (Gall.) Wie Sirupus Chimonilli Gall. (S. 716) zu bereiten.

Conserva Fumariae
Erdrachzucker
Rp Herb. Fumariae pulv. 10,0
Sacchari pulv. 70,0
Glycerini
Aqua destill. ad 10,0
Theelöffelweise für akrophobische Kinder

Ptisana de Fumaria
Tisane de fumeterre (Gall.)
Wie Tisane de Buchu (S. 511)
Handb. d. pharm. Praxis I

Serum Lactis aperitivum VAN SWIETEN
Rp Seri. Lactis 500,0
Herbae Taraxaci recent.
Herbae Fumariae recent.
Herbae Cichorii recent.
Herb. Nasturt. recent. aa 20,0
Man kocht, löst in der Selbstdosis,
Tartari natronali 10,0
und fügt hinzu
Sirupi simplicis 25,0
Morgens nach und nach 4 Weingläser

Extractum Fumariae parviflorae aus dem Kraut der *F. parviflora* ebenso zu bereiten

Rp	Extr. Fumariae parviflorae	6,0
	Aquae destillatae	120,0
	Sirupi Rhinanthi cathartici	60,0
D S	3—4 Esslöffel täglich	

Fungus

I **Fungus ignarius** (Austr.) **Fungus Chirurgorum** (Germ.) **Agaricus** s. **Boletus Chirurgorum** **Fungus ignarius praeparatus** **Agaricus** s. **Boletus** s. **Fungus quernus** s. **quercinus** — Feuerschwamm Wundschwamm Blutschwamm Zunder Zunderschwamm. — **Agaric de Chêne** (Gall.) **Amadou** — **Surgeon's Agaric**. **Tonch wood** **German tinder** Ist der Fruchtkörper des zu den **Basidiomycetes** — **Autobasidiomycetes** — **Polyporaceae** gehörigen **Fomes fomentarius** (**Polyporus fomentarius** Fr.), der an Buchen und Birken im ganzen nördlichen und mittleren Europa vor kommt

Beschreibung. Der Fruchtkörper ist 30 cm und darüber breit, an der Anheftungsstelle bis 10 cm dick, fast dreieckig hutförmig, mit breiter Seite aufstehend, oben gewölbt, hell mit konzentrischen Zonen, unterseits flach, das aus Röhren bestehende Hymenium zeigend. In der Jugend ist er grau, später mehr weisslich, das Hymenium ist zimtbraun. Die zwischen der dichten, nach oben gelegenen Rindenschicht und dem Hymenium gelegene, aus lockeren Hyphen bestehende Schicht findet Verwendung. Er kommt meist aus den Karpathenländern, Böhmen, Thüringen und Schweden in den Handel.

Zubereitung. Aus dem im August und September gesammelten Pilz wird mittels eines Messers die weichste, lockerste, sogenannte Zunderschicht herausgeschnitten, durch Einweichen in Wasser oder schwache Aschenlauge und durch Waschen gereinigt, getrocknet und durch Klopfen mit hölzernen Hämmern bearbeitet, bis sie die Beschaffenheit eines weichen Leders zeigt.

Für die Verwendung als Zunder trankt man den so vorbereiteten Schwamm mit Salpeterlösung und trocknet ihn. Ein solcher Feuerschwamm wird von den Arzneibüchern verworfen, lässt sich aber im Nothfalle durch sorgfältiges Auswaschen mit Wasser, Ausdrücken und Trocknen zur Wundbehandlung verwendbar machen.

Guter Wundschwamm ist weich und dehnbar, verglimmt angezündet ohne Geräusch und ohne Funken sprühen und nimmt leicht und reichlich Wasser auf, wird letzteres abgepresst und eingedampft, so darf es nur einen geringen Rückstand hinterlassen.

Anwendung. Als blutstillendes Mittel bei Blutegelbissen und geringeren Verletzungen, doch heute durch Eisenchloridwatte so ziemlich verdrängt.

II **Fungus cervinus**. **Boletus cervinus**. **Tubera cervina**. — Hirschbrunst Hirschtrüffel (Rinderpulver)

Ist der Fruchtkörper des zu den **Ascomycetes** — **Euasci** — **Elaphomycetaceae** gehörigen **Elaphomyces granulatus** Fries, der unter Kiefern und Fichten, seltener unter Buchen und Eichen wächst.

Beschreibung. Der Fruchtkörper ist von der Grösse einer Haselnuss bis Walnuss, fast kuglig, anfangs gelblich, später braungelb, nach dem Trocknen schwärzlich, auf der Oberfläche durch kleine Wärzchen rauh. Die dicke, harte Schale (Peridie) ist von einer dunklen Sporenmasse erfüllt, die von einem zarten, flockigen Capillitium durchzogen wird. Die Sporen sind 35 μ gross, schwarzviolett, stachelig. Von bitterem Geschmack und frisch von unangenehmem Geruch.

Der Pilz wird von Landleuten noch häufig als Brunstmittel für Rinder und Schweine verlangt und den Thieren zu 50–60 g eingegeben. Man zerstösst ihn und verwendet nur

den pulverigen Inhalt, entweder in Getränk oder in Form einer Latwerge Als Brunstpulver verabfolgt man eine Mischung der Sporenmasse mit Zimmpulver oder mit Pulvis aromaticus.

Brunstmittel für Kühe und Schweine		
Rp	Fungi corvini	80 g
	Cantharidum pulv	1,0 g
	Fructus Lauri pulv	
	Fructus Foeniculi pulv	
	Semin Tournegræci pulv	55 40 g
D 9	Auf 2mal binnen $\frac{1}{2}$ Stunde einzugeten.	

Furfurolum.

Furfurol. Furfuraldehyd. Brenzschleimsaurcalddehyd. Furanaldehyd. Furof. Künstliches Ameisenöl (DORREINER) C_4H_4O CHO Mol Gew. = 96

Das Furfurol entsteht beim Erhitzen der Pentosen und Kohlehydrate mit Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure Es ist auch im Fuselöl enthalten In reichlichster Menge entsteht es bei der Destillation von Weizenkleie mit verdünnter Schwefelsäure

Darstellung 1 Th. Weizenkleie wird mit einer Mischung von 3 Th. Wasser und 1 Th. konz. Schwefelsäure destillirt, bis 3 Th. übergegangen sind Man neutralisirt das Destillat mit Natriumkarbonat und sättigt es mit Kochsalz Hierdurch wird das Furfurol unlöslich abgeschieden (ausgesalzen) Zur Reinigung behandelt man es mit sehr verdünnter Schwefelsäure unter Zusatz kleiner Mengen von Kaliumdichromat, entwässert es mittels Calciumchlorid und rektifizirt es wiederholt im Wasserstoffstrome Ausbeute etwa 3 Proc der Kleie.

Eigenschaften. Frisch rektifizirt eine klare, farblose Flüssigkeit von aromatischem Geruch (zugleich nach Zimmtöl und Bittermandelöl riechend), an der Luft und im Lichte färbt es sich bald gelb bis braun, schliesslich geht es in eine theerartige Masse über Das Furfurol hat bei 15° C das spec Gewicht von 1,165, es siedet bei 160–162° C und ist in 12 Th. Wasser löslich, in Alkohol und in Aether sehr leicht löslich Mit Natriumbisulfit verbindet es sich zu blätterigen Krystallen

Das Furfurol hat alle Eigenschaften eines Aldehydes und ist besonders durch seine Neigung zur Farbstoffbildung ausgezeichnet, worauf einige schöne Farbreaktionen des Furfuröls beruhen Lost man z. B. 1–2 Tropfen Furfurol in 2–3 cem 96procentigem Alkohol, fügt 3–4 Tropfen farbloses Anilin und 2–3 Tropfen Salzsäure von 25 Proc hinzu, so entsteht eine prachtvolle karmirthe Färbung, auf deren Zustandekommen der Nachweis des Fuselöls nach JONASSEN beruht Das Furfurol soll nicht ganz ungiftig sein Therapeutische Verwendung findet es nicht, dagegen ist es wichtig geworden zum Nachweis des Sesamöl-Zusatzes zur Margarine (s. S. 519)

Aufbewahrung Das Furfurol wird in Röhrchen in den Handel gebracht, welche mit Wasserstoff gefüllt und zugeschmolzen sind Es empfiehlt sich, den Inhalt eines solchen Röhrchens sogleich zur Herstellung der 2procentigen alkoholischen Lösung zu verbrauchen oder, wenn dies nicht angänglich ist, das Glaschen wieder zuzuschmelzen. Davon abgesehen, muss es vor der Einwirkung des Lichtes (und der Luft) thunlichst bewahrt werden. Man wählt also ein braunes Glas und bringt dieses noch in einem Pappkasten unter — Eine leichte braunliche Färbung macht übrigens das Furfurol zum Nachweis des Sesamöls noch nicht ungeeignet

Furfurol (LEMPKE's ätherisches Heusamenextrakt) besteht nach AUFRICHT aus einem Seife, Kampher, Salicylsäure, Essigäther und Ammoniak enthaltenden alkoholischen Auszug von Pfefferminzblättern.

Galanga.

Rhizoma Galangae (Germ. Helv.) *Radix s. Rhizoma Galangae minoris*. — Galgantwurzel Galgant Fiebertwurzel — *Galanga officinal*. *Galanga de la Chine* (Gall.) — *Galangal-root*. Ist das Rhizom der zu den Zingiberaceae — Zingiberene gehörigen *Alpinia officinarum* Hance Willd auf der Insel Hainan, auf der gegenüberliegenden chinesischen Kuste und in Siam kultivirt Stapelplätze sind Hoichow auf Hainan, ferner Hankow und Shanghai

Beschreibung. Die Bruchstücke des sympodralen Rhizoms, die die Droge liefern, sind bis 9 Internodien lang, am hinteren Ende im Absterben begriffen, an den Knoten mit ringsum laufenden manschettenförmigen Niederblättern Wurzeln finden sich vorzugsweise an der Unterseite des schief-horizontale in der Erde liegenden Rhizoms — Die Stücke erreichen eine Länge von 10 cm und eine Dicke von 2 cm, sie sind meist als Speicherorgane entwickelt Die Farbe ist ein mattes Zimmetbraun, die Stücke zwischen den Niederblattmanschetten gestreift




Fig. 254 Querschnitt durch *Rhizoma Galangae*
ab Gefäßbündel

Im Querschnitt erkennt man die nach innen durch die dunkle Endodermis begrenzte Rinde, in der sparliche Gefäßbündel verlaufen, die im centralen Leitbündelcylinder viel reichlicher sind Sie sind kollateral, von Faserscheiden umgeben, die bei denjenigen Bündeln des centralen Cylinders, die an die Endodermis grenzen, meist an einander stoßen Im Parenchym zweierlei Formen von Sekretzellen, solche mit tiefbraunem Inhalt, der mit Eisenchlorid schwarz wird (Gerbstoff und Phlobaphen) und solche mit grünlichgelbem Inhalt, der zuweilen reichlich Krystallnadeln enthält und auf Eisenchlorid nicht reagirt (ätherisches Oel und Kämpferid?) Im Parenchym, dessen Zellen gewöhnlich getüpfelt sind, ist reichlich Stärkemehl vorhanden



Fig. 255 Stärkekörnchen aus *Rhizoma Galangae* 300 mal vergrößert

Die Körner desselben sind keulenförmig, stabförmig, zuweilen etwas gebogen, mit dem Kern am dickeren Ende Sie werden 50μ und darüber lang Daneben kommen kleinere rundliche, ovale, auch aus bis vier Theilkörnchen zusammengesetzte Körner vor Die keulenförmigen Körnchen sind das am meisten charakteristische Element der Droge, auf sie ist zu achten, wenn man die Droge in einem Gemenge nachweisen will — Geruch und Geschmack der Droge gewürzhaft aromatisch

Bestandtheile 0,5—1,0 Proc ätherisches Oel von grünlich-gelber Farbe, kampherartigem Geruch und anfangs schwach bitterem, später etwas kuhlendem Geschmack Spec Gew 0,915—0,925, Drehung (im 100 mm-Rohr) — $1^{\circ}30'$ bis — $3^{\circ}30'$ Es siedet zwischen 170 und 275°C Es mischt sich mit demselben Gewicht 90proc Alkohols, von 80proc sind 10—20 Theile zur Lösung erforderlich Es enthält Cineol — Ausserdem enthält die Droge 0,12—0,14 Proc Kämpferid (BRANDERS), welches JAHNS in Kämpferid $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{O}_4$, H_2O , Galangin $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_6$ und Alpinin $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{O}_6$ zerlegte Asche 3,35 Proc, in der Mangan vorhanden ist, und 23 Proc Stärke

Ähnliche aromatische Rhizome liefern *Alpinia Galanga* Willd (*Rhiz Galangae majoris*) auf den Sundainseln, *A. japonica* L in Japan, wenig aromatisch, *A. zingiberina* Hook in Siam, stark aromatisch Sie gelangen zuweilen nach Europa

Aufbewahrung Wie bei Radix Angelicae (S 307)

Anwendung. Als Gewürz, als magenstärkendes und die Einsaat anregendes Mittel innerlich zu 0,5–1,0–1,5 g, als Kaumittel, vielfach auch in der Thierheilkunde. Das Pulver des Rhizoms ist als Verfälschung des Pfeffers vorgekommen — Man vermeide es, den Staub der Galgantwurzel einzuathmen, da derselbe die Schleimhäute reizt

Tinctura Galangae (Ergänz.) Galganttinktur Aus 1 Th fein zerschnittener Galgantwurzel und 5 Th verdünntem Weingeist (60proc) durch Maceration

Eau d'Orval Orvaltropfen			Trochisci stomacici Magenpastillen		
Rp	Tinctur aromatica,	50,0	Ip	Rhizomat. Galangae	7,5
	Tinctur Galangae			Pulvers aromatica	
	Tinctur Aurant. cort			Sacchari Vanillinae	2,5
	Tinctur Calami	25 100		Lign. Santal. rubr.	10
	Spiritus Juniperi	200		Stoech. alba	600
	Ulei Foeniculi			Massae Cacao	260
	Olei Anisi	55 gr V		Troch. anth. pulv.	0,5
Theelöffelweise mit Wein.			Nach mischt, bringt mittels Orangenblüthenwasser zur Masse und formt 100 Pastillen		

Aqua Vitae aromatico-amara von Friedr. Boile, Berlin Ein weingeistiger Auszug aus Galgant, Ingwer, unreifen Pomeranzen, Tausendgüldenkraut, Enzian, Zimmt, Angelica

Goldbalsam, rother, der Kungseer Ollitätenhändler. Je 180,0 Galgant, Nelken, Zedoaria, je 90,0 Salbei und rothes Sandelholz, je 60,0 Muskatnuss, weisser Senf, Alkanna, 45,0 Drachenblut, 30,0 Kalmus, 12 i 80proc Weingeist, je 10,0 Kampfer und Citronenöl

Kraftessenz, von Stanley Eine Tinktur aus Galgant, Ingwer, Zimmt und Vanille

Pyrogastrikon Wird aus 100,0 Galgant, 50,0 Ingwer, 2,5 schwarzem Pfeffer, 25,0 Kalmus, je 12,5 Zimmt und Nelken durch Digestion mit 1000,0 Weingeist (60proc) bereitet

SCHREIBER's Beatricellikör. Ein mit Lavendel-, Nelken-, Ginsengöl (?) und Perubalsam versetzter weingeistiger Auszug aus Galgant, Baldrian, Enzian, Rhabarber, Clusinarinde und Myrrhe

Galbanum.

Galbanum (Germ. Helv. Austr. Brit. Gall.) **Gummi-resina Galbanum.** **Gummi seu Resina Galbannum.** — Galbanum. Mutterharz galbansaft Ist ein Gummiharz verschiedener zu den Umbelliferae — Apiodeae — Peucedaneae gehörender, grosser, stattlicher Pflanzen. Es werden als solche genannt 1) *Ferula galbaniflua* Boissier et Buhse (syn *F. erubescens* Boiss z Th, *Peucedanum galbanifluum* B) Vom Demawend ins Afghanistan 2) *Ferula Schair* Borszczow Am Syr-Darja, bei Tschardara, Chiwa etc Soll das feste, persische Galbanum liefern 3) *Ferula rubricaulis* Boissier (*F. erubescens* Boiss z Th, *Peucedanum rubricaulis* B) In Südpersien Soll nach Holmes kein Galbanum liefern 4) *Ferula ceratophylla* Regel et Schmalhausen. In den Gebirgen Turkestans Zweifelhaft, liefert ein durchsichtiges, dem Galbanum ähnliches Gummi an den Blättern und zwischen den Dolden — Die Pflanzen enthalten das Gummiharz in grossen schizogenen Sekretheältern. Man sammelt meist nur das freiwillig am Grunde des Stengels und der Blattscheiden ausgetretene Sekret, doch lässt eine mit ovalen Wurzelscheiben vermengte, neuerdings zuweilen in den Handel gelangte Sorte darauf schliessen, dass man es auch ähnlich wie *Asa foetida* (S 412) gewinnt. Es kommt auf nordwestlichem Wege über Orenburg und Astrachan, auf westlichem über Kleinasien und von da nach Triest und Marseille, sowie auf südöstlichem Wege über Bombay in den Handel

Beschreibung. Ähnlich wie die anderen Umbelliferen-Gummiharze, kommt es in mehreren Sorten in den Handel

1) Als terpenartige, halbflüssige Masse persisches Galbanum. Von rötlich-brauner Farbe und etwas abweichendem Geruch Soll nach einer Angabe von

Ferula Schafr., nach einer anderen von *Ferula galbaniflua* stammen. Der Geruch erinnert an den des Fenchels. Es ist daran zu erinnern, dass die halbfliessige Konsistenz noch nicht die Annahme einer besonderen Stammpflanze fordert, da alle diese Gummiharze halbfliessig und von weisser oder gelblicher Farbe aus der Pflanze treten und erst allmählich an der Luft erstarren und nachdunkeln. Indessen soll ein solches halbfliessiges G., das in den Handel gekommen ist, von *Opoidia galbanifera* Ldl. abstammen.

2) Galbanum in Körnern (Galbanum in granis seu lacrymis). Erbsen- bis nuss-grosse, rundliche, wachsglanzende Körner von gelblicher bis rötlichbrauner Farbe, oft zusammengeklebt, im Bruch weisslich oder gelblich.

3) Galbanum in Massen (Galbanum in massis seu placentis). In der Wärme leicht zerfliessende, heller oder dunkler grünlichbraune Massen, in die Körner von 2 eingebettet sind.

Galbanum erweicht ziemlich leicht in der Wärme, Geruch und Geschmack sehr aromatisch, nicht scharf. — Salzsäure nimmt, eine Stunde lang mit Galbanum in Berührung, eine schon rothe Farbe an, die nach Versetzen mit Alkohol und Erwärmen mehr violett wird. Es ist aber darauf aufmerksam zu machen, dass diese Reaktion nicht alle Sorten zeigen.

Kocht man zerriebenes Galbanum eine Viertelstunde mit rauchender Salzsäure, filtrirt und übersättigt das klare Filtrat mit Ammoniak, so fluorescirt die Mischung blau. Diese Umbelliferon-Reaktion zeigen alle Sorten. Dieselbe Reaktion, in dieser oder ähnlicher Weise ausgeführt, giebt auch *Asa foetida*, nicht aber *Ammoniacum* (vergl. S. 254).

Bestandtheile nach CONRADY (1894). In einem Galbanum in massis 9,5 Proc. ätherisches Oel, 63,5 Proc. in Alkohol lösliches Harz und 27 Proc. Unreinigkeiten. Das Harz enthält 0,25 Proc. freies Umbelliferon, 50 Proc. Galbaresinotannol $C_{10}H_{10}O$ und endlich Umbelliferon-Galbaresinotannolester 0,35–31,31 Proc. Asche.

Der Gehalt an ätherischem Oel kann bis 22 Proc. betragen. Es ist gelblich, vom specifischen Gewicht 0,910–0,940, die Dichtung ist (100 mm-Rohr) $+20^{\circ}$ bis -10° . Oel von persischem G. soll rechts drehen, solches von levantischem dagegen links. Das Oel enthält d-Pinen $C_{10}H_{16}$ und Cadinen $C_{15}H_{24}$.

Aus den bisher vorliegenden Untersuchungen geht hervor, dass als Galbanum zwei verschiedene Gummiharze in den Handel gelangen, von denen das eine die oben genannte Reaktion mit Salzsäure giebt, das ist die von CONRADY 1894 untersuchte Sorte, wogegen eine andere, als persisches Galbanum bezeichnete Droge, die Reaktion nicht giebt, das Oel der letzteren Droge dreht rechts, das der anderen, levantischen, links.

Prüfung. Erstreckt sich auf die angegebenen Merkmale und Reaktionen, ferner auf die Bestimmung des in siedendem Alkohol löslichen Theiles (70–80 Proc.), Germ verlangt 50 Th. Ferner auf Bestimmung des Aschegehaltes, es lassen zu Germ bis 10 Proc., Haly bis 8 Proc.

Bestimmung der Säurezahl nach K. DIETERICH. 0,5 Galbanum werden fein zerrieben, in einem Kolben mit etwas Wasser übergossen und dann durch den im Sandbade erwärmten Kolben Wasserdämpfe geleitet. Das aus dem Kolben kommende Rohr verbindet man mit einem Kühler und lässt dessen Rohr in eine mit 40 ccm wässriger $\frac{1}{2}$ -N-Kallauge beschickte Vorlage in die Flüssigkeit eintauchen. Man destillirt 500 ccm über, spült das Destillationsrohr gut mit destillirtem Wasser nach und titirt den Inhalt der Vorlage unter Verwendung von Phenolphthalein mit Schwefelsäure zurück. Die Menge der durch das Destillat gebundenen Kubikcentimeter Kallauge $\times 28$ = Säurezahl. Grenzzahlen 73,5–114,5.

Bestimmung der Harzzahl und Verseifungszahl nach K. DIETERICH. Zweimal 1 g Galbanum zerrabt und übergiesst man mit je 50 ccm Petroleumbenzin (spec. Gew. 0,700 bei $15^{\circ} C$), fügt dann je 25 ccm alkoholische $\frac{1}{2}$ -N Kallauge hinzu und lässt bei Zimmertemperatur unter häufigem Umschwenken in 1 Literflaschen 24 Stunden stehen. Die eine Probe wird dann nach Zusatz von 500 ccm Wasser unter Umschwenken mit $\frac{1}{2}$ -N-Schwefelsäure und Phenolphthalein zurücktitirt. Die verbrauchten Kubikcentimeter Kallauge $\times 28$ = Harzzahl. Grenzzahlen 107,5–122,5.

Der zweiten Probe setzt man noch 25 ccm wässrige $\frac{1}{2}$ -N-Kallauge und 75 ccm Wasser hinzu und lässt unter häufigem Umschwenken abermals 24 Stunden stehen. Man

verdünnt dann mit 500 cem Wasser und tritt wie oben zurück. Die verbrauchten Kubikcentimeter Kahlauge $\times 28 =$ Verseifungszahl Grenzzahlen 116,2—135,5

Galbanum depuratum Gummi Galbanum expurgatum (Gall) Gereinigtes Galbanum Galbanum purifié

Man verfährt genau wie bei Bereitung des Ammoniacum depuratum (S 253) Ausbeute nach dem Verfahren von E. DIETRICH 70—75 Proc

Aufbewahrung Wie bei Ammoniacum (S 254)

Galbanum ist in Deutschland dem freien Verkehr entzogen

Anwendung. Innerlich bei Luftröhrenkatarrh, eitrigen Entzündungen der Harnwege in Form der Emulsion (Lac Galbani) oder in Pillen zu 0,5—4,0, auch als anregendes und die Regel beförderndes Mittel Aeusserlich als Bestandtheil erweichender oder gelinde reizender Pflaster bei Drüsenanschwellungen, Geschwüren, Gliederreissen, Hühneraugen Technisch als Zusatz zu Kitten

Tinctura Galbani. Galbantinktur 1 Th gestossenes Galbanum wird bei gelinder Wärme mit 5 Th 87proc Weingeist ausgezogen

Tinctura Galbani aetherea 1 Th gepulvertes Galbanum, 10 Th Aetherweingeist

Emplastrum antapoplecticum	
Pp	Galbani depurati 15,0
	Papieri Pyrethri pulv
	Pipens longi pulv
	Castorei canadensis pulv 33,0
	Terebinthin laed. 10,0
	Cerae flavae 10,0
Emplastrum anticephalicum	
Pp	Emplastr Galbani crocat 50,0
	Terebinthin
	Aqua foetidae pulv 33,0
	Olei annalis aethera
	Olei Menthae pip
	Olei Caryophyllor 1,20

Emplastrum diabetanum	
Kräuterpflaster	
Bp	Emplastr Lithargyr comp. 40,0
	Emplastr Melifol
	Emplastr Conii
	Emplastr aromatic
	Emplastr fusc. camphorat.
	Picus navalis nigrae
	Fructus Lauri pulv 33,0
Man schmilzt und rollt in Stängelchen aus	

Emplastrum Diachylon fuscum	
Brauner Diachel Braunes Diachylon-Pflaster Gummipflaster Braunes oder gelbes Zug- und Heilpflaster	
Für den Handverkauf	
Rp	1. Saba taurini 20,0
	2. Resinae Pini 40,0
	3. Cerae flavae 80,0
	4. Emplastr Lithargyr 650,0
	5. Ammoniac pulv 15,0
	6. Galbani pulv 50,0
	7. Terebinthinae 80,0
	8. Aquae 40,0
	9. Ochrac fuscas plv 25,0

Man schmilzt 1—4, ebenso 5—8, mischt beide und fügt 9 hinzu In Stangen auszurollen

Emplastrum Diachylon gummatum	
Emplastrum Diachylon gom mé (Gall.)	
Rp	1 Lithargyri pulv
	2 Adipis suilli
	3 Olei Olivarum 33,0
	4 Aquae 1250,0
	5 Cerae flavae
	6 Resinae Pini Burg
	7 Terebinth laed. 33,0

	3 Ammoniaci
	9 Galbani 33,0
	10 Olei Terebinthinae 60,0
Man kocht 1—3 mit 4 zum Pflaster und lässt 4 zum grössten Teil verdampfen (I), dann emulgiert man 8—10 mit 1000,0 Wasser, leicht durch, dampft zur Honigkonsistenz (in, mischt mit I und fügt 5—7, geschmolzen und durchg. seigt, hinzu	
Gibt auf Leinwand gestrichen den Sparadrap cum Diachylo gummato (Gall)	

Emplastrum Galbani	
Mutterharzpflaster	
Rp	1 Cerae flavae
	2 Resinae Pini 33,0
	3 Galbani depurati 30,0
	4 Terebinthinae 10,0
Man schmilzt 1 mit 2, 3 mit 4 und mischt.	
Emplastrum Galbani camphoratum.	
Rp	1 Emplastr Galbani crocat 85,0
	2 Ammonii carbonici pulv
	3 Olei Petrae
	4 Camphorae 33,0
Man schmilzt 1 und fügt 2—4 hinzu	

Emplastrum Galbani compositum Phoebe	
Zusammengesetztes Galbanumpflaster nach PHOEBUS	
Rp	Opi pulverati 5,0
	Aquae 2,0
	Camphorae tritae 10,0
	Ammon carbon. pyro-oleos 20,0
	Olei Cajuputi 3,0
macht man und fügt es unter stetem Rühren zu geschmolzenem	

	Emplastr Galbani crocat. 75,0
Emplastrum Galbani crocatum (Ergänzb)	
Safranhaltiges Galbanumpflaster	
Rp	1 Emplastr Lithargyri 80,0
	2 Cerae flavae 25,0
	3 Resinae Pini
	4. Terebinthinae 33,0
	5 Galbani 73,0
	6 Croci subtilis pulv 2,0
Man schmilzt 1—2, ebenso 3—5, mischt und fügt 6, mit etwas Weingeist angerieben, hinzu	

Emplastrum Galbani martiatum	
Emplastrum Martis cum Galbano	
Rp	Galbani depurati 5,0
	Mastiches 10,0
	Emplastr martialis 85,0

Emplastrum contra perniones PLAT

RUST's Frostpflaster

Rp Emplastr Galbani croc 25 0
 Opi pulverat
 Camphorae trit. 55 5 0

Emulsio Galbani

Galbanum-Emulsion

Wie Emulsio Ammoniaci (S 254) zu bereiten.

Mixtura anthydropica JAHN

Rp Galbani depurati 15,0
 Aceti Scillae 100 0
 Liquoris Ammonii acet 12 5
 Spiritus Aetheris nitrosi 5,0
 Sirupi Althaeae 50,0

1—2stündl 1 Essl

Oleum Galbani compositum

Galbanetum Paracelsi Liquor SENNERI

I.

Rp Galbani 100 0
 Elemi 25,0
 Olei Terebinth 70 0
 Olei Lavandulae 20 0
 Olei Lauri express 10,0

Man digerirt 1 Tag und destillirt dann über 100,0

II.

Rp Olei Galbani 10,0
 Olei Lavandulae 15 0
 Olei Terebinthinae 20,0

Pilulae emmenagogae JAHN

Rp Galbani
 Saponis medicati
 Extracti Rhei compos 55 5 0

Zu 100 Pillen. 3mal täglich 3—4 Stück

Pilula Galbani composita (Brit).

Compound Pill of Galbanum

Compound Pill of Asafetida

Rp Asae foetidae
 Galbani
 Myrrhae 55 50,0
 Sirupi C. lucosi 25,0

Man schmilzt im Wasserbade und rührt bis zur
 Pillenkonsistenz Dosis 0,25—0,5

Pilulae resolventes SCHMUCKER.

Rp Tartari stibiaci 0,25
 Rhizomatis Rhei
 Saponis medicati
 Galbani depurati
 Sagapeni depurati 55 1,50
 Succo Liquirit depur 5,0

Man formt 90 Pillen und bestreut mit gepulverter
 Muskatnuss

Pilulae solventes HLIM

Rp Galbani depurati 6,0
 Bulbi Scillae
 Radix Ipecacuanhae
 Stibii sulfurati aurant 55 0,5
 Extracti Pimpinellae 3,0
 Radix Liquiritiae q s

Man formt 100 Pillen und bestreut mit Veilchen
 wurzelpulver 3mal täglich 5 Pillen

**Uct Balsamum mirabile
Wunderbalsam**

Rp Galbani 12,0
 Alkohol 48,0

Man digerirt 24 Stunden, filtrirt und fügt hinzu

Olei nuc. Juglandis
 Olei Phosphorum 55 15,0
 Olei Petrae
 Unguent Hydrargyr. citrat 55 12,0

Emreibung für Thiere

Galeopsis.

Gattung der Labiatae — Stachyoideae — Lamiaceae.

I Galeopsis Ladanum L (syn G ochroleuca Lam) Heimisch in Mittel und Westeuropa Blätter eiförmig bis länglich-lanzettlich, gesägt, weichhaarig Oberlippe der Blüthe gelblich-weiss, eingeschnitten gezahnt, Unterlippe mit hellgelbem Hof, zuweilen mit zwei braunrothen Flecken

Bestandtheile. Bitteres Harz, theils in Aether löslich, theils darin unlöslich, bitterer, theils in Aether, theils in Wasser löslicher Extraktivstoff Das ganze Kraut liefert **Herba Galeopsidis** (Austr Ergänz) **Herba Galeopsidis grandiflorae s. ochroleuca.** **Herba Lieberianae** — Hohlzahnkraut Blankenheimer Thee. **LIEBER'sche Kräuter** Auszehrungs, Gesundheits- oder Schwindsuchtkräuter. Spanischer Thee.

Einsammlung Man sammelt das Kraut zur Blüthezeit, trocknet und bewahrt es in geschnittenem Zustande auf 9 Th frisches gehen 2 Th trocknes

Anwendung. Nur noch selten gegen Husten und Katarrh zu 20—30 g täglich im Aufguss

Auszehrungs- und Lungenkräuter von Dr REDLING, gegen Schwindsucht und Bluthusten sind **LIEBER'sche Kräuter** mit wenig Lungenkraut vermischt

Gesundheitskräuter von LIEBER in Creussen sind Herb Galeopsid grandifl conc 375 g = M 5,15

II. Galeopsis Tetrahit L. Vom Himalaya bis Irland. Mit schmutzig-hellpurpurner Oberlippe und gelblichem, purpurn geflecktem Hof auf der Unterlippe

Lieferte früher **Herba Cannabis silvestris** Die Fasern bilden den sogenannten Nesselhanf

Galium.

Gattung der Rubiaceae — Coffeaceae — Psychotriaceae — Galiceae.

I **Galium Mollugo L.** Heimisch in Europa, Westasien, Ostindien bis Ceylon und Burma. Stengel vierkantig, meist kahl, Blätter zu acht, stachelspitzig, vorn breiter, beiderseits grün. Blüthe weiss, die Zipfel der Corolle begrannt, Früchte etwas ranzig.

Das Kraut *Sommité fleurie de Caille* — lait blanc (Gail), lieferte früher *Herba Galii albi*.

II **Galium verum L.** (*G. luteum Lam.*) Heimisch von Europa durch Nordasien, in Nordafrika, auch am Himalaya. Stengel rundlich mit 4 hervorragenden Linien, kurzhaarig oder kahl. Blätter zu 8–12, linealisch-stachelspitzig. Blüthe gelb. Zipfel der Corolle stumpf, kurz stachelspitzig. Früchte glatt, meist kahl.

Das Kraut *Sommité fleurie de Caille* — lait jaune (Gail), lieferte früher *Herba Galii lutei*.

III **Galium Aparine L.** Heimisch in Europa, Nordafrika, Asien, Amerika. Stengel niederliegend oder kletternd, Blätter zu 6–8, unterseits rückwärts starklig. Blüten weiss. Frucht meist hakig borstig.

Liefert *Herba Aparinae*. Neuerdings bei Hautkrankheiten empfohlen.

IV **Galium pilosum Ait.** In Nordamerika. Das Kraut gilt als Mittel gegen den Biss giftiger Schlangen.

Gallacetophenonum.

† **Gallacetophenon** (korrumpirt in *Gallactophenon* und *Gallacelophenon*) *Trioxycetophenon*. Alizarin gelb C. $C_6H_2(OH)_3CH_2CO$ Mol. Gew. = 168. Die Verbindung ist das von der Badischen Anilin- und Sodafabrik in den Handel gebrachte „Alizarin gelb C“.

Darstellung. 1 Th. Pyrogallol wird mit 1,5 Th. Chlorzink und 1,5 Th. Eisessig kurze Zeit auf 145–150° C. erhitzt. Aus der noch heiss mit Wasser verdünnten Schmelze scheidet sich das Gallacetophenon beim Erkalten krystallinisch ab und wird durch ein maliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser rein erhalten. $C_6H_2(OH)_3H + HOCH_2CO = H_2O + C_6H_2(OH)_3CH_2CO$. Das Chlorzink wirkt bei der Reaktion lediglich als wasserentziehendes Mittel.

Eigenschaften. Schmutzig fleischfarbiges, krystallinisches Pulver von schwach saurer oder neutraler Reaktion, in etwa 600 Th. kaltem Wasser, leicht in heissem Wasser, Alkohol oder Aether löslich, in Glycerin in jedem Verhältnisse löslich. Durch Zusatz von Natriumacetat wird die Löslichkeit in Wasser erhöht. Bei Zusatz von 30 g Natriumacetat können 4 g Gallacetophenon in 100 ccm Wasser in Lösung bleiben. Der Schmelzpunkt liegt bei 170° C. In Natriumkarbonatlösung oder Natronlauge löst es sich mit gelber Färbung. Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid grünschwarz gefällt. Silbernitrat wird sowohl in saurer wie in alkalischer Lösung reducirt. Auf Aluminiumoxyd bezw. -Hydroxyd wird das Gallacetophenon mit canariengelber Farbe fixirt.

Prüfung. Es reagirt nur schwach sauer, seine Lösung in Kalkwasser färbt sich nicht nach wenigen Augenblicken roth (Pyrogallussäure). Es schmilzt bei 170° C. und verbrennt ohne einen Rückstand zu hinterlassen (unorg. Verunreinigungen).

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschützt.

Anwendung. Im Gegensatz zum Pyrogallol hat sich das Gallacetophenon als eine verhältnissmässig ungiftige Verbindung erwiesen, welche indess gegen Mikroorganismen stark antiseptisch wirkt. Es wird in Form von 10proc. Salben bei Psoriasis empfohlen.

und soll hier ebenso gut wirken wie Pyrogallol, ohne die toxischen Erscheinungen des letzteren zu zeigen. Die Ausscheidung erfolgte bei den Thierversuchen in Form von Schwefelsäureathern und Glukuronverbindungen.

Gallae.

Gallae (Germ Austr.) Gallia (Helv Brit U St.) Gallae Asiaticae s. Halepenses s. Levanticae s. Turcicae. Gallae Aleppo nigrae. Gallae quercinae. Noces s. Poma Gallarum — Gallen. Gallapfel. Gallnusse. Eichäpfel — Galle de Chêne d'Alep. Noix de galle d'Alep (Gall.) — Galls. Nutgalls. Gall-nuts. Oak-apples. Sind die durch die weibliche Gallwespe *Cynips tinctoria* Hartig (syn. *Cynips Gallae tinctoriae* Oliver, *C. tinctoria* L.) (Familie der Cynipidae, Abtheilung der echten Gallwespen *Psenides*) auf *Quercus infectoria* Oliv. (syn. *Qu. lusitanica* a. *infectoria* Alph. D. C.) erzeugten Gallen. Die strauchige Eiche mit welligen, stachelgezackten Blättern ist heimisch im östlichen Mittelmeergebiet und in ganz Kleinasien. Das Insekt kommt weiter nach Osten vor, es erzeugt in Mitteleuropa auf *Quercus sessiliflora* Sm. und *Qu. pubescens* Willd. kleinere, den officinellen ähnliche Gallen. Das Insekt legt je ein Ei in eine Knospe, wahrscheinlich ohne dabei die Blättchen zu durchstechen. Ob die Galle entsteht infolge eines durch die blosse Gegenwart des Eies und später der Larve hervorgerufenen Reizes oder durch den von Flüssigkeiten verursachten Reiz, welche das Insekt bei der Eiablage oder das junge Individuum absondern, ist noch ungewiss.

Beschreibung. Die Galle, die also aus einer umgewandelten Knospe hervorgeht, ist kuglig, nach unten meist in einen ganz kurzen, stielartigen Fortsatz verschmälert, in der oberen Hälfte mit kurzen Hockern, Stacheln oder kalten. Der Durchmesser beträgt bis 2,5 cm. Etwas unterhalb der Mitte liegt das ungefähr 3 mm weite Flugloch, wenn das Insekt nach seiner Ausbildung die Galle bereits verlassen hat. Die Farbe ist schwarzlich-grünlich, braun, braungelb bis gelb. Bereits durchbohrte Gallen sind heller und weniger werthvoll als dunkle, nicht durchbohrte. Die Gallen sind sehr hart, so dass sie unter dem Hammer in scharfkantige Stücke zerspringen. Auf einem Querschnitt unterscheidet man 1) die dichte oder zuweilen zerklüftete, weissliche oder braune Aussengalle und 2) die aus einer „Schuttschicht“ und der innerhalb derselben gelegenen „Nährschicht“ bestehende Innengalle. Die Aussengalle besteht aus grosszelligem, meist getupfeltem Parenchym, dessen Zellen Gerbsäure in grossen Klumpen, Stärke sowie Oxalat in Einzelkrystallen und Drusen enthalten (Fig. 256a, b, c). Sie geht allmählich in die Schuttschicht der Innengalle über, deren Zellen stark verdickte, poröse Steinzellen sind (Fig. 256e). In den dünnwandigen Zellen der Nährschicht liegen grosse Stärkekörner, die aber nicht direkt dem Insekt zur Nahrung dienen, sondern vorher (durch ein vom Thier abgesondertes Ferment?) mit anderen Zellbestandtheilen eine Umwandlung erliden, als deren Produkt hauptsächlich Oel und Aleuron zu konstatiren ist. Daneben finden sich grosse, braune, von einer Membran umschlossene Gerbstoffkugeln (Fig. 256g) und an den Zellwänden rundliche oder traubige, geschichtete, an Cystolithen erinnernde Wucherungen, die stark verholzt sind (Fig. 256h).

Die letzteren, die mit Phloroglucin und Salzsäure leuchtend roth werden, sowie die Gerbstoffkugeln, die sich mit Eisenchlorid allmählich schwärzen, sind die am meisten charakteristischen Bestandtheile der Gallen und im Pulver mit Hilfe der genannten Reagentien leicht aufzufinden.

Bestandtheile. Bis 70 Proc. Gallusgerbsäure (vergl. *Acid. tannic.* S. 183), 3 Proc. Gallussäure, 2 Proc. Ellagsäure, 3 Proc. Zucker, 2 Proc. Stärke, etwas flüchtiges Oel. Dunkel gefärbte, nicht vom Insekt durchbohrte Gallen sind reicher an Gerbsäure, als hellgefarbte, durchbohrte.

Handelssorten. 1) Aleppische G. von schwärzlichgrüner Farbe, sehr hart und spröde, meist vor dem Auskriechen des Insektes gesammelt. Als besonders gute Sorte gelten Jerligallen, besonders kleine, ausgesuchte heissen Soriangallen. Diese Sorte entspricht in erster Linie den Anforderungen der Arzneibücher.

2) Mossulische Gallen, etwas heller gefärbt, oder wie bestäubt aussehend. Selten im Handel.

3) Smyrnaer Gallen. Von gelblicher oder bräunlicher Farbe, meist durchbohrt. Sie gelten als am wenigsten werthvoll, indessen ist darauf aufmerksam zu machen, dass als Smyrnaer Gallen neuerdings auch solche vorkommen, die von 1. nicht zu unterscheiden sind.

4) Tripolitanische Gallen, sollen den Smyrnaer ähnlich sein, vielleicht sind es solche von *Quercus ilex* L. und *Qu. coccifera* L., die aus Tripolis exportirt werden.

Verfälschungen. 1) Man giebt hellen, durchbohrten Gallen das Aussehen dunkler, indem man sie in eine Lösung von Eisensulfat legt und die Löcher mit Wachs verklebt; in heissem Wasser kann man das Wachs wieder ausschmelzen.

2) Man verfälscht sie mit Kollari-gallen und anderen Sorten (vergl. unten), die minderwerthig sind.

Aufbewahrung. Die ganzen Galläpfel werden in Holzkästen, das Pulver in Hafengläsern an einem trocknen Orte aufbewahrt. Beim Pulvern vermeidet man möglichst, den Staub einzuathmen, da er die Schleimhäute angreift.

Anwendung. Galläpfel finden zu Heilzwecken nur selten Anwendung, da man der aus ihnen gewonnenen Gerbsäure den Vorzug giebt; bisweilen dienen sie fein gepulvert (und mit Talkum oder Lycodium gemischt) zu Streupulvern, auch wohl im Aufguss (10:50—100) innerlich wie äusserlich als zusammenziehendes Mittel. Bei Vergiftungen mit Brechweinstein und Alkaloiden können sie als Gegenmittel dienen.

Seit langer Zeit benutzt man sie zur Bereitung der Gallustinten, die sich durch ihre tief-schwarzen, licht- und wasserbeständigen Schriftzüge auszeichnen.

Bei Bereitung von Galläpfelauszügen and von Arzneiformen, die Galläpfel enthalten, sind eiserne Geräthe zu vermeiden.

Tinctura Gallarum (Germ. Austr. Gall.), **Tinctura Gallae** (Helv. U-St.). — Galläpfeltinktur. — *Teinture de noix de galle.* — *Tincture of Galls.* Tr. of Nut-




Fig. 25a. Querschnitt durch eine aleppische Galla. a Aeusserer, b mittlere, c innere Schicht der Aussengalle. d Gefässbündel. e Schutzschicht der Innengalle. f Nährschicht. g Gerbstoffkugeln. h Ligninreiche Wucherungen der Zellwände.

gall — Germ Aus 1 Th grob gepulverten Galläpfeln und 5 Th verdünntem Weingeist (60proc) — Helv Aus Galläpfelpulver (V) Wie Tinct Calami Helv (S 587) — Austr Aus grob zerstoßenen Galläpfeln wie Tinct Aurant cort Austr (S 853) — U St Aus 200 g Galläpfelpulver (No 40) und einer Mischung von 100 cem Glycerin und 900 cem Weingeist (91 proc) im Verdrängungsweg. Man erschöpft, zuletzt mittels Wein- geist, so dass man 1000 cem Tinctur erhält — Gall Wie Tinct Coca Gall (S 869) Sauer reagrende, mit Wasser klar mischbare Tinktur, die durch Eisenchloridlösung blauschwarz gefärbt wird. Verkattet leicht die Glasstopfen der Standgefässe (s unter Percha lamellata) — Innerlich 15–40 Tropfen bei Durchfall, äusserlich gegen Frostbeulen

Balsamum contra Perniones

Frostbalsam

Rp	Gallarum subtiliss plv	10,0
	Aquae destillat	20,0
	Unguenti diachylon	70,0

Bei offenen Wunden Zum Gebrauch frisch zu bereiten

Pulvis ad atramentum

Pulvis atramentarius Tintenpulver

I

Ip	1	Gallar Aleppo pulv	1000,0
	2	Aquae ebullientis	q s
	3	Gummi arabici pulv	200,0
	4	Ferri sulfurici pulv	500,0
	5	Cupri sulfurici pulv	50,0

Man zieht 1 mit 2 aus, dampft zur Extraktstärke ein, mischt mit 3, trocknet aus, mischt mit 4 und 5 Zum Gebrauch in heissem Wasser zu lösen

II

Gewöhnliches (für Schuhmacher)

Rp	1	Cupri sulfurici crudi gr plv	20,0
	2	Gummi arabici ordinari pulv	40,0
	3	Ferri sulfurici pulv	300,0
	4	Gallarum gr plv	640,0

1 und 3 sind unter Erwärmen gut zu trocknen. An einem trocknen Ort aufzubewahren

Remedium antidoticum stypticum

Antidotum alkaloidicum

Rp	1	Jodi puri	5,0
	2	Alcohol absoluti	20,0
	3	Gallarum subtl pulv	100,0
	4	Tartari depurati	10,0
	5	Sacchari albi	30,0

Man kst 1 in 2, mischt mit 3, trocknet bei gelinder Wärme und setzt 4 und 5 zu. In Stöpselgläsern aufzubewahren. Bei Vergiftungen mit Metallen oder Alkaloiden $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Theelöffel

Sirupus Gallarum

Rp	Tincturae Gallarum	15,0
	Sirupi simplicis	85,0

Spiritus ad mammas

Brustwarzenspiritus

Rp	Gallar pulverat	10,0
	Acidii salicylici	0,5
	Benzols	25
	Olei Bergamotti	gtt. III
	Olei Sassafras	gtt. V
	Spiritus	
	Aquae Rosae	aa 50,0

Bei Wunden Brustwarzen

Tinctura contra Perniones

Frostbalsam

Rp	Tinctur Jodi	3,0
	Tinctur Gallarum	5,0
	Glycerini	6,0

Bei noch nicht aufgebrochenen Frostbeulen

Tinctura Gallarum composita

Tinctura tannica s adstringens

AKFOMINS

Rp	Acidii tannici	100
	Aquae destillatae	60,0
	Spiritus	80,0
	Olei Citri	gtt. III

Mit kühnem Wasser gemischt als Schönheitsmittel, mit 10 Th Wasser zu Waschungen, Lin- spritzungen

Tinctura tannica

Rp	Tincturae Gallarum	
	Tincturae Catechu aa	40,0
	Spiritus Rosae	20,0

Abends 1–2 Theelöffel mit Zuckerwasser. Gegen Nachtschweiss

Unguentum Gallae (Brit U St)

Gall Ointment. Nutgall Ointment

Rp	Gallar subtl pulv	20,0
	Adipis benzoinati	80,0

Unguentum Gallarum BELLI

BELL's Hamorrhoidensalbe.

Rp	Gallar subtil pulv	5,0
	Unguenti cerei	80,0

Unguentum Gallae cam Opio (Brit)

Gall and Opium Ointment.

Rp	Unguenti Gallae (Brit)	22,5
	Opii subtl pulv	7,5

Unguentum Gallarum compositum

Unguentum adstringens FERNEL

Rp	Gallar subtiliss pulv	5,0
	Olei Lauri	
	Olei Myristicae aa	10,0
	Unguenti Rosmarini	25,0

Bei Bruchschäden, Verrenkungen

Unguentum Gallarum opiato camphoratum

Unguent antihaemorrhoidale WARE

Rp	Gallarum subtl pulv	10,0
	Camphora	2,0
	Tincturae Opii simplicis	5,0
	Unguenti cerei	40,0

Zum Bestreichen der Hämorrhoidalknoten

Unguentum ad diarrhoeas

Pulvis antidiarrhoeicus

Pulver gegen Durchfall der Kinder

Rp	Gallarum gr m pulv	
	Radici Liquiritiae pulv	aa 50,0

2stündlich die Hälfte mit warmem Wasser zu geben.

Unguentum ad strabismum

Strahlfäden-Tinktur

Rp	Acidii salicylici	5,0
	Glycerini	20,0
	Tincturae Aloë	
	Tincturae Gallarum aa	100,0

Täglich einmal den Strahl einspinseln, dann auf Werg in den zwischen den Ballen befindlichen Spalt eindrücken. Der Huf ist vorher mit Seifenwasser zu reinigen (DIETZICH)

Ebenholz-Nachahmung. 4 Th Galläpfel, 1 Th Campecheholz, $\frac{1}{2}$ Th krystallinarten Grünspan kocht man in einem gläsernen Thongefässe mit Wasser, filtrirt heiss, und tragt heiss mit einem weichen Pinsel mehrmals auf. Hierauf bereitet man sich aus Eisenfeile

und starkem Weinessig unter Erwärmen eine Lösung, die man erkaltet auf die gebeizte Fläche aufträgt, nach dem Trocknen giebt man nöthigenfalls noch 1—2 Anstiche

Es eignet sich hierzu besonders feinfaseriges Ahorn, Buch, Apfel- oder Nussbaumholz Antipilothon von HLOEWALD, gegen das Ausfallen der Haare, ist eine mit ätherischen Oelen versetzte, verdünnte Gallapfelinktur

BARR's giftigeles Pulver zur Vertilgung der Nasenpolypen besteht hauptsächlich aus Gallapfelpulver (24 g = 8 Mark)

BUSCH's vegetabilische Komposition, gegen Kesselstein, besteht aus dem Pulver billiger, gerbstoffhaltiger Früchte, Eichenrinde, Soda und Islandischem Moos

Henriettenbalsam gegen Zahnleiden, soll ein wengeistiger Auszug der Caroba di Guinea sein (vergl S 1193)

Scriptol, ein Tintenextrakt, ist mit Dextrin und Nigrosin versetzte Gallustinte
Ati unentum. Nigimentum Tinte Schwarze Tinte Gallustinte Encre Ink. Tint

Wohl die meisten zur Zeit im Handel vorkommenden Tinten sind Anilintinten, die schwarzen werden aus Nigrosin, Melamin u. a. Theerfarbstoffen durch einfaches Lösen in heissem Wasser hergestellt und eignen sich überall da zum Gebrauch, wo die Beständigkeit der Schriftzüge von untergeordneter Bedeutung ist, ganz besonders aber zu Kopirtinten

Die Vorzüge der Anilintinten leidet aus der Feder zu fließen, diese nicht anzugreifen, keine Bodensätze zu bilden und nicht zu schimmeln, verlangt man auch von den Gallustinten, ausserdem müssen die letzteren aber die Eigenschaft besitzen, nach wenigen Tagen auf dem Papier licht- und wasserbeständig zu werden, wenn sie als Kanzlei oder Dokumententinten Verwendung finden sollen Diese Bedingungen erfüllen in ganz besonderem Masse diejenigen Tinten, welche aus Gallapfelauszügen oder Tanninlösungen, in denen die Gerbsäure in Gallussäure übergeführt ist, mittels Ferrisalzlösungen hergestellt werden, Ferrisalze geben unter gleichen Umständen Tinten, welche sich durch ihre Kopirfähigkeit auszeichnen Nach den von E. DITERICH gegebenen Vorschriften für Gallustinten kann auch im kleinen mit Vortheil gearbeitet werden, die erzielten Tinten sind vorzüglich

Alizarintinte nach VOMÁČKA. 7 Th Gallapfelabkochung (I) kocht man mit 4 Th Eisenlösung (II) auf und setzt 1 Proc Malachitgrün zu

Kopirtinte, wie vorige, doch statt Malachitgrün mit 2 Proc Anilin Jetzschwarz

Gallapfelabkochung (I) 10 Th zerstoßene chinesische Galläpfel, 1 Th Alkanaparzel weicht man einige Stunden in 100 Th Wasser ein, kocht gründlich aus, filtrirt und löst 2 Th Zucker

Eisenlösung (II) 160 Th Eisenvitriol löst man in 80 Th Wasser, setzt 38 Th Schwefelsäure, dann 37 Th Salpetersäure zu, erhitzt, bis die Lösung rothbraun und klar geworden ist, dampft auf 200 Th ein, erhitzt unter Wasserzusatz, bis kein Geruch nach Salpetersäure mehr wahrzunehmen ist, und verdünnt mit destill. Wasser auf 3200 Th

Expresskopirtinte 100 Th gewöhnliche Tinte, 60 Th Glycerin, je 20 Th Honig und Kandiszucker, 10 Th Spiritus, 5 Th Melasse Mit dieser Tinte soll man ohne Weiteres kopiren können

Gallustinte, billige 200 Th zerstoßene Aleppogallen und 400 Th Campecheholz kocht man zweimal mit je 5000 Th Wasser 1 Stunde, dampft die Pressflüssigkeiten auf 6000 Th ein und vermischt mit einer Lösung von 150 Th Eisenvitriol, 120 Th arabischem Gummi und 15 Th Kupfervitriol in 1500 Th rohem Holzessig Man schüttelt öfter um und lässt dann absetzen

Gallus Kanzlei-Tinte nach E. DITERICH Man zerstoßt 3 kg chinesische Galläpfel gröblich, durchfeuchtet sie mit Regenwasser und lässt unter Einatz des verdunstenden Wassers bei 20—25° C stehen, bis sie von Schimmelpilzen völlig durchsetzt sind, zieht dann dreimal mit je 5 kg Regenwasser jedesmal 1 Stunde im Wasserbade aus, schüttelt die vereinigten Pressflüssigkeiten mit 300 g Talkum, stellt 24 Stunden bei Seite, filtrirt unter Nachwaschen des Filterinhaltes mit Wasser, sodass man 15 kg Flüssigkeit („Gallapfel auszug“) erzielt Man vermischt dieselbe mit 1,5 kg Eisenchloridlösung (10 Proc Fe), filtrirt nach 14tägigem Absetzenlassen, fügt eine Lösung von 25 g reiner Karbolsäure und 75 g Phenolblau 3 F (von FRANZ SCHAALE in Dresden) in 10 kg Regenwasser hinzu und stellt in lose verbundener Flasche 8 Tage im Kühlen bei Seite Die alsdann fertige Tinte füllt man auf kleinere Flaschen

Gallus Kopirtinte nach DITT 900 g des obigen Gallapfel auszuges erhitzt man mit 4,0 g Schwefelsäure (spec Gew 1,835) ¼ Stunde im Dampfbade, löst 60 g krystall. Eisenvitriol, stellt 2 Wochen bei Seite, filtrirt, bringt durch Nachwaschen auf 1000 g, löst 2,5 g Phenolblau 3 F, 30 g Zucker, 1 g Karbolsäure und verfärbt weiter wie vorhin angegeben

Statt des Phenolblau kann man natürlich auch entsprechende Mengen anderer Anilinfarben wählen, denn dieselben dienen nur dazu, die Schriftzüge der sonst blass aus der Feder fließenden Tinte besser sichtbar zu machen

Tinten-Extrakte. Man versteht hierunter pulverförmige, wasserlösliche Mischungen, welche mit heissem Wasser übergossen sofort die fertige Tinte geben. Gallustinten-Extrakt nach DIETZICH. 50,0 oxydirtes Tannin¹⁾, 40,0 entwässertes Ferrisulfat, 3,0 Phenolblau 3 F, 20,0 Zucker, 1,0 Salicylsäure; auf 1 l kochendes Regenwasser.

Tinten-Büder. 3—10 proc. Tanninlösungen werden mit 2—5 proc. Ferrosulfatlösungen getrennt verabfolgt und zum Gebrauch gemischt. Nach LEO LEISTIKOW bewähren sich Umschläge mit dieser Mischung besonders bei Hautentzündungen und Pruritus, indem sie das schmerzhaft Jucken stillen und das Eintrocknen der Bläschen beschleunigen.

Ausser den beschriebenen Gallen sind eine ganze Reihe anderer von erheblicher technischer Bedeutung. Wir führen die wichtigsten auf.

a. Eichengallen.

1) Morea- oder Krongallen von *Quercus Cerris* L. Klein, kreiselförmig, um den oberen Theil mit einem Kranz stumpfer Spitzchen. Kommen unter den officinellen zuweilen vor. (Bis 30 Proc. Gerbsäure.)

2) Oesterreichische, böhmische, deutsche Gallen erzeugt durch *Cynips Kollari* Hart. auf verschiedenen Eichen. Auch als persische Gallen vorgekommen. Von Grösse der aleppischen G., braun, meist ohne Höcker, schwammig. Kommen zuweilen unter den officinellen vor. (Bis 30 Proc. Gerbsäure.)

3) Istrische Gallen, häufig ein Gemenge, in dem kleine aleppische, kleine ungarische G. (von *Cynips lignicola* Hart. auf *Quercus pedunculata* Ehrh. und sessiliflora Sm.) und Kollarigallen vorkommen. (Bis 30 Proc. Gerbsäure.) Unter diesem Namen sind auch aleppische und Smyrnaer G. vorgekommen.

4) Knopperrn, erzeugt durch *Cynips calicis* Burgsdorff auf *Quercus pedunculata* Ehrh., vielleicht auch sessiliflora Sm. und pubescens Willd., bilden unregelmässig gefügelte Auswüchse am Fruchtbecher. In Osteuropa und Südosteuropa. (Bis 33 Proc. Gerbsäure.)

In Amerika verwendet man noch folgende Arten:


5) Erbsengrosse Gallen auf den Blättern von *Quercus alba* L., erzeugt durch *Acraspis erinacei* Walch. (Bis 18 Proc. Gerbsäure.)

6) Auf den Blättern von *Quercus palustris* Du Roi (?) erzeugt durch *Hollaspis globulus*. (Bis 9,5 Proc. Gerbsäure.)

7) Wachstümpfartige glänzende runde Gallen auf den Zweigen von *Quercus alba* L. erzeugt durch Arten von *Cecidomyia* und *Diplosis*.

b. Sumachgallen.

8) Chinesische Gallen, erzeugt durch *Schlechtendalia chinensis* Jacob Bell auf Blättern und Zweigen von *Rhus semialata* Murray var. *Osbeckii*, unregelmässig verzweigte oder ausgezackte, hohle, blasenförmige Körper, kurzbehaart, von graubrauner Farbe, enthalten bis 77 Proc. Gerbsäure (Fig. 257).



9) Pflaumen- oder birnenförmige Gallen aus China, den vorigen sehr ähnlich, aber unverzweigt. Sollen noch reicher an Gerbsäure sein.

10) Japanische Gallen, von derselben Abstammung wie 8, aber kleiner, reicher verzweigt und heller gefärbt. (Bis 63 Proc. Gerbsäure.)

11) In Amerika verwendet man auf *Rhus glabra* L. vorkommende Gallen, die 8 ähnlich sind. (Bis 61,70 Proc. Gerbsäure.)

c. Pistaciengallen.

12) Durch Arten der Gattung *Pemphigus* auf verschiedenen *Pistacia*-Arten in Europa, Asien und Afrika erzeugt. Davon gelangen zuweilen die Bokhara-Gallen mit 32 Proc. Gerbsäure und die Carobe di Giudea mit 60 Proc. Gerbsäure in den Handel.

Fig. 257. Chinesische Gallen, b aufgebrosen.

¹⁾ 100 Tannin in 150 Wasser gelöst erhitzt man in einem Kolben mit 30 gepulverten Kaliumbisulfat und 10 roher Salzsäure (Spec. Gew. 1,16) im Wasserbade 10 Stunden bei 80—90° C. und dampft dann in einer Porcellanschale zur Trockne ein. Ausbeute 130 „oxydirtes Tannin“.

d Tamarindgallen

13) Auf verschiedenen Arten von Tamarix von nicht bekannten Insekten (darunter aber vielleicht Cecidomyia Tamaricis Holl.) in Asien und Afrika erzeugt. Selten im Handel. (Bis 50 Proc Gerbsäure)

Gambir.

Gambir ¹⁾ Catechu (Brit Germ) Catechu pallidum Extractum Uncariae — Gambir. Gutta Gambir Katagamba Terra japonica Gambir — Katechu — Catechu clair. — Pale Catechu

Germ fasst unter dem Namen Catechu dieses und Gambir zusammen (vergl Seite 678)

Beschreibung Man gewinnt das Gambir aus den dünnen Zweigen und Blättern der *Uncaria Gambir* Roxburgh (syn *Ourouparia Gambir* Baill, *Nauclea Gambir* Hunter) und *Uncaria dasyneura* Korth (*Uncaria Gambir* Thwaites) (Familie der Rubiaceae — Clusonoideae — Naucleaceae), erstere Art ist heimisch in Hinterindien, besonders an der Strasse von Malakka, die zweite auf Ceylon. Man kultivirt die erstere auf den Inseln des Riouw Lingga-Archipels zwischen Singapore und Sumatra, ferner auf Singapore, neuerdings auch auf Borneo und Java. Drei bis viermal im Jahre werden die Blätter und jungen Zweige geerntet und in Kesseln ausgekocht, oder mit Dampf extrahirt. Der Auszug wird bis zur beginnenden Sirupkonsistenz eingedickt, dann bis zur beginnenden Krystallisation gerührt und erkalten gelassen. Das erstere soll durch einen Zusatz des Holzes der *Macaranga hypoleuca* Mull Arg (*Euphorbiaceae*) beschleunigt werden.

Gambir kommt zu uns meist in Form gelbbrauner, erdiger, leicht zerbrechlicher Würfel, die im Innern gelblich sind, seltener in Form grosser Blöcke (aus Calcutta und Singapore), die in Matten eingeknäht sind. Auch soll es vorkommen, dass man diese letztere Form dem Gambir erst in Hamburg giebt. In Indien selbst fabricirt man ihn in sehr vielen Formen und Sorten, als Tafeln, runde Scheiben, Kugeln, Zeltchen, kleine Würfelchen etc, die aber meist in Indien selbst verbraucht werden (vergl Verwendung).

Unter dem Mikroskop erscheint Gambir meist krystallinisch. Behandelt man eine kleine Probe, wie S 679 angegeben, so findet man an pflanzlichen Resten einzellige, ziemlich dickwandige Haare.

Bestandtheile Nach TREMBLE 7,76—19,76 Proc Catechin, 33,3—47,2 Proc Catechugerbsäure, 10,1—16,0 Proc Schleim, ferner fettes Oel und Wachs, 3,4 bis 4,7 Proc Asche, 9,9—11,0 Proc Wasser. Ob das Catechin des Gambir dasselbe ist, wie das des Catechu, ist noch nicht sicher festgestellt, nach GAUTIER ist das erste ein Gemenge von 3 Körpern.

1) $C_{40}H_{28}O_{15} \cdot 2H_2O$ 2) $C_{42}H_{30}O_{16} \cdot H_2O$ 3) $C_{45}H_{32}O_{18} \cdot H_2O$, die sich nach Löslichkeit, Schmelzpunkt etc unterscheiden.

Ferner enthält das Gambir Quercetin und einen fluorescirenden Körper, der an der Luft bald Gambir-Catechuroth bildet. Da dieser Körper dem Catechu fehlt, so kann auf seine Erkennung der Nachweis von Gambir gegründet werden, man übergiesst 3 g Gambir mit 25 ccm N Kaliäuge, 100 ccm Wasser und Benzin, schüttelt einigemal um, die Benzinschicht zeigt dann grüne Fluorescenz.

Prüfung 1) Mikroskopische Prüfung und Nachweis des fluorescirenden Körpers (vergl Bestandtheile)

2) Der Aschengehalt soll nicht höher als 5 Proc, sein.

3) Eisenchlorid ruft in der verdünnten, weingestigen Lösung eine grüne Färbung hervor, die nicht sofort in Braun übergeht, wie das bei Catechu der Fall ist.

¹⁾ Gambir kommt auch als Bezeichnung für Kino vor.

4) Eine Verfälschung mit Starkmehl, die beobachtet wurde, ist durch mikroskopische Untersuchung nachzuweisen

Anwendung. Wie bei Catechu (S 679) Gabe 0,3—0,9 g (Brit) Dient in der Technik zum Färben und Gerben In Ost- und Sudasien wird es in ausserordentlichen Massen als Zusatz zum Betelkauen verwendet, indem man ein Blatt des Betelpfeffers um etwas Kalk, ein Stück Arekanuss und etwas Gambir wickelt und das Ganze zusammen kaut

Pulvis Catechu compositus (Brit) Compound Powder of Catechu 100,0 Gambir, 50,0 Kino, 50,0 Ratanhawurzel, 25,0 Ceylon-Zimmt, 25,0 Muskatnuss Gabe 0,6—2,4 g

Tinctura Catechu (Brit) Aus 200,0 Gambir, 50,0 Ceylon Zimmt, 1000 ccm Weingeist (60 proc) durch Maceration

Tinctura Catechu (Germ) Aus 1 Th grob gepulvertem Catechu und 5 Th verdünntem Weingeist (60 proc) Die Bezeichnung der Germ „dunkelrothbraun, nur in dünner Schicht durchsichtig“ trifft besonders für die aus Pegu-Catechu bereitete Tinktur zu, Würfel Gambir liefert eine Tinktur, welche etwa den Farbenton und die Durchsichtigkeit der Tinct Ratanhae besitzt

Trochiscus Catechu (Brit) Catechu Lozenge Aus 32,4 g Gambir, 496,0 g Zuckerpulver, 19,5 g arabischem Gummi, 35,5 ccm Gummischleim und q s Wasser formt man 500 Pastillen, jede enthält 0,0648 Gambir

Garcinia.

Gattung der Guttiferae—Clusioidae—Garcinieae.

I Garcinia Mangostana L. Wahrscheinlich auf Malakka heimisch, in den Tropen reichlich kultivirt. Die gerbstoffreiche Fruchtschale dient als Mittel zum Gerben und Färben, in der Medizin gegen Diarrhoe Sie enthält in schützenden Sekretbehältern einen gelben Farbstoff Mangostin $C_{20}H_{14}O_6$ — Die Früchte sind ein sehr beliebtes Obst

II Garcinia purpurea Roxb und Garcinia indica Chois Heimisch in Vorder- und Hinterindien Die Samen enthalten 30 Proc Fett, von dem man aber durch Auskochen nur etwa 10 Proc erhält (**Kokum Oel** oder **Kokum-Butter**) Es ist fest, weiss, krystallinisch, von mildem Geschmack und Geruch nach Kakao Es enthält reichlich Stearin, wenig Myristin, Olein und Laurinsäure Schmelzpunkt $41-42^{\circ}C$ Erstarrungspunkt $37,6-37,9^{\circ}C$ Verseifungszahl 191,3 Säurezahl 21,1 Esterzahl 170,2 Jodzahl 33,14

Es findet Verwendung zur Verfälschung ausgelassener Butter, ferner als Ersatz des Cetaceum und des Kakaofettes

Die Fruchtschalen verwendet man als Antiscorbuticum ihres Sauregehaltes wegen und als Gewürz zum indischen Curry Sie sind glänzend schwarz

Die Samen sind nierenförmig, abgeplattet, 1—2 cm lang, bis 1 cm breit, von brauner Farbe In der Samenschale Sekretbehälter, im Embryo das deutlich krystallinische Fett und einige Aleuronkörner, von denen eines auffallend gross ist, zerstreute Zellen des Embryo mit braunem Inhalt, der auf Gerbstoff reagirt.

III Garcinia Kola (vergl Cola)

IV Garcinia Morella (vergl Gutt)

Gaultheria.

Gattung der Ericaceae—Arbutoidae—Gaultherieae.

I Gaultheria procumbens L Heimisch in den atlantischen Staaten Nordamerikas, von Canada bis Carolina — Verwendung finden die Blätter

Folia Gaultheriae — Amerikanisches Wintergrün. Kanadischer Thee Labrador thee. — Thé de Jersey, de montagne ou de Terre Neuve Thé rouge. — Wintergreen Box-berry Mountain-tea Partridge berry

Beschreibung Die Blätter sind oval, verkehrt-eiförmig bis länglich, in den kurzen Stiel verschmälert, stachelspitzig, 3—4 cm lang, am scharf zahnigen Rande etwas umgerollt, kahl, lederartig-steif, oberseits dunkelgrün oder bräunlich-grün, unterseits blässer, mit wenigen Sekundärnerven, die einen Randnerv bilden — Spaltöffnungen nur unterseits, mit 2 Nebenzellen. Sehr vereinzelt dickwandige, kleine Haare. Unter der oberen Epidermis 2—3 Schichten von Palissadenzellen. Im Parenchym Drüsen von Oxalat. Am Rande eine denselben verstärkende Faserschicht. Um die Gefäßbündel Faserbelege.

Bestandtheile Aetherisches Öl (vergl. unten) 5,4 Proc., Gerbstoff, Arbutin und Ericolin, Schleim, Zucker, Asche 4 Proc.

Anwendung finden die Blätter in Amerika als Genussmittel im Aufguss wie der chinesische Thee, ferner gegen Asthma, hauptsächlich aber zur Gewinnung des ätherischen Oeles.

II Gaultheria fragrantissima Wall., heimisch in Ostindien **G. leucocarpa Bl.** in Java (die Blätter werden wie Betel gekaut), liefern ebenfalls Methylsalicylat.

Oleum Gaultheriae (U-St.) Gaultheriöl Wintergreenöl Oil of Wintergreen. Wird durch Destillation der Blätter des Amerikanischen Wintergrüns (s. oben), neuerdings auch viel häufiger durch Destillation der Rinde von *Betula lenta L.* gewonnen. Beide Öle sind als identisch zu betrachten.

Eine farblose oder gelbliche, bisweilen durch Spuren von Eisen röthlich gefärbte, aromatisch riechende Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,175—1,185, bei 218—221° C. siedend. Das Gaultheriöl ist optisch schwach linksdrehend, das Birkenrindenöl optisch inaktiv. Im Geruch unterscheiden sich beide Arten etwas von einander (vergl. auch S. 103).

Sie bestehen beide zu mehr als 99 Proc. aus Salicylsäuremethylester. Man kann daher Verfälschungen durch Bestimmung der Verseifungszahl nach KOTTSTORFER ziemlich leicht erkennen. Vor Licht geschützt aufzubewahren.

Pflärsch Essen		Sirupus Gaultheriae	
		Wintergrünsirup	
Pp	Aetheris aceticus 1,0	Rp	Olei Gaultheriae gtt. V
	Amyliäther aceticus 10,0		Tinctur Aurant. cort. 10,0
	Olei Gaultheriae gtt. V		Sirupus simpliciis 90,0
	Spiritus dilutus 80,0		

Spiritus Gaultheriae (U-St.)

Rp	Olei Gaultheriae 50 ccm
	Spiritus (91%) 950 ccm

WARVER'S Safe Cure Medicines. Safe Cure ist eine Abkochung von (angeblich) *Hepatica nobilis* und *Lycopus virginicus*, versetzt mit Glycerin, Salpeter, Weingeist und Wintergrünöl.

Safe Kidney Cure unterscheidet sich vom vorigen nur durch die Mengenverhältnisse. **Salicilol**, eine französische Specialität, enthält Wintergrünöl, Salicylsäure, Methylalkohol und Wasser.

Gelatina.

I Gelatina. Gallerte. Gelée (Gall.) Eine Arzneiform. Mit diesem Namen bezeichnet man eine nicht flüssige, sehr weiche, homogene, gemeinlich durchsichtige oder durchscheinende, nicht plastische, bei gelinder Wärme schmelzende Masse, welche bei der Berührung in eine zitternde Bewegung geräth. Die Konsistenz ist so, dass man mit einem Löffel glatt davon abstechen kann und an Stelle des Abgestochenen eine Vertiefung zurückbleibt. Als Grundlage einer Gallerte dienen entweder die sub II aufgeführten Gelatine, oder Hausenblase oder Pflanzenschleime und Pektinstoffe.

Um der Gallerte aus Pflanzenstoffen die gehörige Konsistenz zu geben und sie dauernder zu machen, giebt man ihr häufig einen kleinen Zusatz von Hausenblase oder

weissen Lein (*Gelatina alba*). Gewöhnlich versetzt man behufs Darstellung einer klaren Gallerte die konzentrierte und kochte Abkochung eines Vegetabilis mit etwas Zucker, wenn solcher auch nicht vorgeschrieben ist, schäumt unter gelindem Aufkochen ab und macht, nachdem die Flüssigkeit auf das vorgeschriebene Maass eingekocht ist, die übrigen Zusätze wie Wein, medicinische Sirupe. Fluchtige Oele werden mit etwas Zucker abgerieben und auch andere Substanzen, wie Tinkturen, Bittermandelwasser etc., der noch warmen Flüssigkeit, also vor dem Gelatiniren, beigemischt.

Soll sich die Gallerte über vier Tage hinaus konserviren, so ist statt des Zuckers Glycerin, auch wohl ein Zusatz von 6 Proc verdünntem Weingeist, oder die Glycerin-Gelatine (siehe weiter unten) als Grundlage nöthig.

II Gelatinae medicatae in lamellis Gelatine-Lamellen. Eine von Prof. ALMÉN in Upsala 1869 in den Verkehr gebrachte Arzneiform. Papierdünne, in gleichmässige Quadrate von etwa 1,5 cm Seitenlänge getheilte Blättchen, deren Grundmasse aus weisser Gelatine mit Zusätzen von Glycerin, Gummi oder Traganth besteht. Dieser Grundmasse ist das Arzneimittel einverleibt, welches gewöhnlich zu den sehr stark wirkenden gehört. Diese Arzneiform soll eine bequeme und namentlich genaue Dosirung von Arzneistoffen ermöglichen, welche nur in sehr geringen Mengen verordnet zu werden pflegen.

Der Apparat zur Herstellung dieser Gelatinelamellen besteht aus einer Glasplatte oder Schieferplatte, auf welcher man durch Aufkitten von Glasleisten ein rechteckiges Kästchen von 300 □ cm Fläche hergestellt hat (15 > 20 cm Seitenlänge). Boden und Seitenflächen werden schwach mit Kakaobutter abgerieben. Benutzt man eine Schieferplatte, so lässt sich in diese auch eine Theilung einritzen, desgleichen natürlich in eine Glasplatte.

Alsdann bereitet man unter Erwärmen (für 800 qcm) eine Auflösung von 6,0 g bester Gelatine in 24,0 g Wasser, fügt 1,0 g Glycerin, ferner die für 300 Lamellen berechnete Menge des Arzneistoffes hinzu, welche man, wenn derselbe in Wasser löslich ist, zweckmässig vorher in einem Theile des Wassers auflöst. Man mischt alles gut durch und giesst die noch lauwarme Flüssigkeit auf die mittelst einer Wasserwaage völlig horizontal eingestellte Platte, bez. in das Kästchen. Nach 24stündigem Austrocknen an einem lauwarmen staubfreien Orte löst man die Gelatineplatte von der Unterlage. Man kann die Platte nun mit einer Eintheilung mittelst Bleistift versehen oder die einzelnen Quadrate direkt auseinanderschneiden. Kommen diese Arzneiformen einigermaßen häufiger vor, so empfiehlt es sich, jedes einzelne Quadrat mittels eines Gummistempels zu signiren, die Signatur soll den abgekürzten Namen des Arzneistoffes und die Dosis enthalten, z. B. Atropin 0,001 — Enthält die Ausgussplatte eine erhabene oder vertiefte Eintheilung, welche sich in der Gelatineplatte abprägt, so lässt man zweckmässig immer 10 Plättchen zusammen und zwar in 2 Reihen à 5 Stück.

Zur Darstellung z. B. von 300 Plättchen *Gelatina lamellata Morphini acetici* sollen genommen werden 36 Tropfen Glycerin — zu 300 Pl. *Gel. Stibio-Kali tartarici* 2,5 Brechweinstein mit 45 Tropfen Glycerin (0,075 in jedem Plättchen) — *Gel. Plumbi acetici* 10,0 Plumbum acetium, 50 Tropfen Glycerin — *Gel. Cupri sulfurici* 10,0 kryst. Kupfervitriol, 40 Tropfen Glycerin — *Gel. Ferri sulfurici* 20,0 Eisenvitriol, 90 Tropfen Glycerin. Diese Form soll unpassend sein, weil sich das Salz beim Trocknen verändert, so auch *Gel. Ferri iodati*. — *Gel. Extracti Opii* 5,0 Extrakt, 36 Tropfen Glycerin — *Gel. Extracti Belladonnae* 5,0 Extrakt, 34 Tropfen Glycerin — *Gel. Extracti Hyoscyami* 10,0 Extrakt, 10 Tropfen oder kein Glycerin. — *Gel. Extracti Colocynthis compositi* 10,0 Extrakt, 36 Tropfen Glycerin — *Gel. Ipecacuanhae opiate* Brechwurzpulver und Opium aa 5,0, 80 Tropfen Glycerin etc. Es bewährt sich diese Arzneiform zur örtlichen Application auf das Auge und würde man nach ALMÉN eine *Gel. Atropini sulfurici* aus 1,0 Gelatine, 8 Tropfen Glycerin, 75 ccm Wasser und 0,25 Atropinsulfat 400 Blättchen formen. In ähnlichem Verhältniss wäre *Gel. Extracti Physostigmatis* darzustellen.

III Gelatina alba (Ergänzb) *Gelatina animalis* (Austri Helv) *Gelatine animal* (Gall) *Gelatinum* (Brit) *Weisser Leim* *Thierleim*

Mit dem Namen Gelatine bezeichnet man einen in die Form von dünnen Tafeln bez. Blättern gebrachten Leim, welcher mit besonderer Sorgfalt aus den Knochen von Rindern und Kalbern bereitet ist. Zum pharmaceutischen Gebrauche eignet sich am besten die als *Gelatina in foliis alba* Ia oder als *Grenétine* im Handel vorkommende Sorte. Es mag darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir in Deutschland Gelatinefabriken z. B. in Höchst a. M. haben, dass indessen die französischen und die belgischen Gelatine sorten sich auch heute noch eines ganz besonderen Rufes erfreuen.

Farblose, oder nahezu farblose, durchsichtige, dünne Tafeln von glasartigem Glanze, geruch- und geschmacklos — Gelatine löst sich nicht in Alkohol, auch nicht in Äther. In kaltem Wasser quillt sie stark auf, ohne sich zu lösen. In heissem Wasser ist sie leicht löslich zu einer, je nach der Konzentration mehr oder weniger klebrigen Flüssigkeit, die beim Erkalten noch im Verhältnisse von 1:100 zu einer Gallerte erstarrt, die entweder völlig blank ist oder nur sehr schwach opalisirt. — Die Lösung der Gelatine reagirt neutral. Auf Zusatz von Weingeist entsteht darin ein weisser, flockiger Niederschlag. Auch aus sehr stark verdünnten wässrigen Lösungen werde die Gelatine durch Gerbsäure, sowie durch Formaldehydlösung leicht und vollständig gefällt. Gelatine hinterlasse beim Verbrennen nicht mehr als 2% Asche.

Gelatine ist nahezu reines Glutin. Demgemäss wird die wässrige Lösung von Essigsäure und Ferrocyankalium, ferner durch neutrales und basisches Bleiacetat, durch Ferrisulfat, Alaun, Kupfersulfat, Silbernitrat, sowie durch verdünnte Mineralsäuren nicht gefällt. Dagegen wird sie gefällt durch Mercurchlorid und durch Gerbsäure. Die wässrige Lösung des Glutins ist linksdrehend. Gewisse Salze wie Kochsalz, Salpeter, Chlorzink, auch verdünnte Säuren, z. B. Essigsäure und Salpetersäure, heben die Eigenschaft des Glutins zu coaguliren auf. Ebenso wird die Fähigkeit des Glutins zu coaguliren durch häufiges Kochen, ferner durch Erhitzen über 100° C vermindert bez. aufgehoben.

Gelatina glycerinata *Glycerinleim* (Ergänzb) 25 Th weisse Gelatine werden mit 25 Th Wasser übergossen. Nach halbstündigem Quellen werden 50 Th Glycerin hinzugefügt. Die Masse wird durch Erwärmen im Dampfbade unter beständigem Rühren gelöst. Zur Bereitung von weichem Glycerinleim nimmt man an Stelle von 25 Th. Gelatine nur 15 Th.

Gelatinelösung zur subkutanen Injektion nach LANGERAUX und PATLESKO *Gelatinae albae* 5,0, *Natrii chlorati* 1,4, *Aquae destillatae* 200,0. Man sterilisirt die Lösung im zugeschmolzenen Kolbchen bei 120° C. Trübe, beim Erkalten nicht erstarrende Lösungen sind unbrauchbar. Vor der Benutzung verflüssigt man den Kolbcheninhalt durch Erwärmen auf 37° C.

Solutio gelatinosa CARNOT *Gelatinae albae* 50,0, *Calci chlorati* 10,0, *Aquae* 1000,0. Die Lösung wird bei 110° C sterilisirt und dient als örtliches Blutstillungsmittel z. B. in Körperhöhlen.

Chromgelatine, Chromleim. Man quellt 10 Th Gelatine oder Leim in 90 Th Wasser, löst durch schwaches Erwärmen und fügt unmittelbar vor dem Gebrauche unter Lichtabschluss (photographisches Dunkelzimmer!) eine Lösung von 2 Th Kaliumdichromat in 10 Th Wasser hinzu. Wird dieser Leim dem Lichte ausgesetzt, so wird die Chromsäure zu Chromoxyd reducirt und die Gelatine wird in Wasser unquellbar und unlöslich. Man benutzt diesen Leim zum „Gelatine-Druck“, ferner zum Kitten und Kleben, z. B. von Pergamentpapier. Letzteres muss vor dem Zusammenkleben befeuchtet werden. Das Kleben nimmt man im Dunkelzimmer bei rothem Licht vor, lässt rasch trocknen und setzt die Gegenstände alsdann dem Lichte aus. Der Leim ist in schwarzen Flaschen aufzubewahren, am besten aber vor der Bereitung frisch darzustellen.

Gelatina japonica. Als Tjen-Tjan, Isinglass, *Colle végétale* etc. kommen aus Japan und China vegetabilische Leime in den Handel, welche dort aus Seetang, essbarem Seegras, Seekraut, Seekohl etc. gewonnen werden. Diese „Schleime“ sind haltbarer als Gelatine und haben eine grössere gelatinirende Kraft. Die 1/2 proc. Lösung derselben giebt eine ebenso stoffe Gallerte wie eine 3—5 proc. Gelatinelösung.

Gelatine-Leim, französischer oder belgischer. Ist ein fast farblos durchsichtiger Leim, also eine farblose Gelatine in dicken Leimtafeln, welcher namentlich zur Fabrikation von Gelatinekapseln dient (s. S. 610).

Mundleim. 10 Th Gelatine und 1 Th Zucker werden gelöst und in die Form runder Scheiben gebracht

Gelose. Agar Agar wird in Streifen geschnitten, diese 24 Stunden in 6proc Salzsäure macerirt, dann mit Wasser gewaschen und 24 Stunden in 5proc Ammoniakflüssigkeit macerirt und wiederum mit Wasser gewaschen. Die so gereinigten Agarstreifen löst man in siedendem Wasser. Die Lösung wird kocht, eingedampft, der Rückstand getrocknet und gekörnt oder man streicht die Lösung auf Glasplatten und stellt Lamellen dar.

Tannocol der Berliner Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation 10 l einer 1proc Gelatinelösung werden mit 2 l 5proc Tanninlösung gefällt. Der Niederschlag wird abfiltrirt, mit Wasser gewaschen und gepresst. — Der Pressrückstand wird zerbrochen und in dünner Schicht bei mittlerer Temperatur an der Luft solange getrocknet, bis er im Wasserbade nicht mehr schmilzt, dann bei 150° C getrocknet, schliesslich gepulvert.

Schwach gelbliches, geruchloses und geschmackloses Pulver.

Glutektone, Leimstifte, HEFENBERGER Enthalten als Körper Glycerinleim mit Zusätzen von Alpha Eigon, Zinkoxyd mit Salicylsäure oder Ichthyol, bezw. beiden in verschiedenen Stärken. Zum Gebrauche nässt man die zu behandelnde Hautstelle mit einem feuchten Schwamme und reibt dann mit dem Glutektone solange, bis sich ein dünner Ueberzug einer Leimdecke gebildet hat. Bei Ekzemen.

IV Gluten fabrike Leim Tischlerleim Entsteht durch anhaltendes Kochen leimgebender Gewebe mit Wasser. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Leim: das aus den permanenten Knorpeln gewonnene Chondrin (Knorpelleim) und das aus Knochen und Haut entstandene Glutin. Das Chondrin (der Knorpelleim) kommt wegen seiner geringeren Bindkraft weniger in Betracht als das Glutin. Je nachdem dieses aus Knochen oder Hautabfällen gewonnen wird, bezeichnet man den fertigen Leim als „Knochenleim“ oder „Hautleim bez. Lederleim“.

Knochen geben beim Dämpfen direkt eine Leimlösung, welche in Vacuumapparaten concentrirt und alsdann zum Erstarren gebracht wird. — Oder man macerirt die Knochen mit Salzsäure, entsauert den zurückbleibenden Knorpel mit Kalkmilch, wäscht ihn mit Wasser und verkocht ihn bis zur Leimbildung mit Wasser. Hautabfälle werden zunächst längere Zeit mit Kalkmilch behandelt, dann gewässert und schliesslich durch längeres Kochen mit Wasser zu Leim gelöst.

Der Leim kommt in ausserordentlich verschiedenen Sorten im Handel vor. Als Kölner Leim bezeichnet man eine helle, klare Leimsorte (aus Haut, Leder) von besonders guter Klebkraft. Knochenleim ist gewöhnlich etwas trübe infolge kleiner Mengen beigemengten Calciumphosphats. Bezüglich der Prüfung des Leimes lassen sich bestimmte Vorschriften nicht geben, da hierüber noch keine Uebereinstimmung herrscht. Guter Leim ist in der Regel hell, nicht dunkel gefärbt, indessen ist dieses Moment nicht ausschlaggebend, da es auch dunkle Leimsorten von vorzüglicher Klebkraft giebt. Man verlangt von gutem Leim, dass er glanzend, durchscheinend, hart und spröde, an der Luft trocken sei, beim Biegen kurz abbreche und einen glasartig kurzen Bruch gebe. In kaltes Wasser gebracht soll er selbst nach 48 Stunden nur stark gequollen, aber nicht völlig zerflossen sein. Einige betrachten auch die Wasseraufnahmefähigkeit des Leimes als ein Merkmal zur Beurtheilung, d. h. sie halten den Leim für den besten, von welchem eine Gewichtseinheit innerhalb 24 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur das meiste Wasser aufnimmt.

KISSING fand bei zahlreichen Analysen von Tafelleim 12,3—18,0 Proc Wasser, 1,0—5,1 Proc Asche, 0—0,8 Proc flüchtige Säure, 0—40,0 Proc in Wasser unlösliche Bestandtheile. Die zuverlässigste Prüfung ist die mechanische. Man leimt zwei Stücke Holz zusammen und bestimmt das Gewicht, welches erforderlich ist, um dieselben auseinander zu reissen. Diese Prüfung wird von Special-Laboratorien ausgeführt.

Für die Klebkraft des Leimes ist seine Vorbereitung und Behandlung von grosser Bedeutung. Die beste Klebkraft wird erzielt, wenn man den Leim 12—18—24 Stunden in Wasser quellen lässt, dann das überschüssige Wasser abgiesst und den gequollenen Leim im Wasserbade (!) bis zur Auflösung erhitzt. Ueber freiem Feuer wird der Leim leicht überhitzt (angebrannt), wodurch er an Klebkraft einbässt. Die Klebkraft wird auch verringert, wenn der Leim oft im Wasserbade wieder flüssig gemacht wird.

Kasein-Leim ist eine Auflösung von fettfreiem Kasein in gesättigter Boraxlösung und kann Leimlösung und arabisches Gummi vielfach ersetzen

Leimweiss ist ein durch beginnende Fäulnis veränderter Kleber. Zu seiner Darstellung wäscht man Kleber mehrmals mit Wasser und setzt ihn einer Temperatur von 15–25° C aus. Der Kleber beginnt sich zu zersetzen und wird flüssig. Man griesst dann in Formen und bringt diese in einen auf 25–30° C erwärmten Raum, nach 24–40 Stunden sind die oberen Schichten hart geworden. Man nimmt dann die Tafelchen heraus, breitet sie — die hart gewordene Seite nach unten — auf Drahtgewebe aus, bringt sie in den Trockenraum und trocknet sie. Dient zum Leimen des Holzes, des Leders (in der Schuhmacherei), zum Kitten von Steingut, Glas, Porcellan, Perlmutter. Auch in der Druckerei und Färberei verwendet.

Kleberleim ist ein Gemisch von Kleber und gegohlenem Mehl und hat nur ein geringes Klebvermögen.

Russischer Leim ist undurchsichtig weiss und verdaut dieses Aussehen einem Zusatz von Bleiweiss, Bleisulfat, Zinkweiss, Kreide oder Barytweiss. Ein solcher Leim hat bei weitem nicht die Klebkraft wie gewöhnlicher, guter Leim. Auch mit Bleichromat gelb gefärbter Leim kommt vor.

Colligamen Leimbinde. Von E. DIETRICH erfundenes Verbandmaterial. Mittels maschineller Einrichtungen werden Mullbinden einseitig mit Leimlösungen bestrichen. Zum Gebrauche werden die Binden rasch in kaltes Wasser eingetaucht, mit der Strichseite auf die Hautstelle aufgeklebt und mit etwas Watte oder einer Binde bedeckt. Sie ermöglichen in bequemer und billiger Weise die Anlegung eines UNNA'schen Dauerverbandes.

Leim in Pulverform liefert O. M. OERTEL in Forchheim in Bayern.

Appreturmasse für Leinen und Baumwolle. Leim 30 Th, Wasser 40 Th, Stärkesirup 30 Th, Glycerin 10 Th. dampft man auf 100 Th ein. (B. FISCHER.)

Buchdruckerwalzenmasse. 500 Tischlerleim lässt man mit 2000 Wasser quellen, griesst das nicht aufgesogene Wasser ab, fügt 500 Glycerin zu und dampft im Dampfbad bis auf 1000 ab. DIETRICH.

Hektographen-Masse. 1) Gelatinae 200,0, Aquae 1125,0 — 2) Gelatinae 160,0, Aquae 250,0, Glycerini 600,0, Sacchari albi 250,0 — 3) Vorschrift des französischen Arbeitsministeriums: Kölner Leim 100,0, Glycerin 500,0, Wasser 375,0, Baryumsulfat gefällt 25,0.

Tinte zum Hektographen. Methylviolett, Alkohol, Gummischleim je 5,0, Wasser 35,0.

Syndetikon. Unter diesem Namen werden verschiedene Präparate als Kitte und Leime verkauft. 1) 100 Th gebrannter Kalk werden mit 50 Th Wasser gelöscht, das überstehende Wasser wird abgossen. Dann löst man 60 Th Meliszucker in 180 Th Wasser, setzt der Lösung 15 Th gelöschten Kalk zu, erwärmt auf 75° C und stellt unter öfterem Umschütteln einige Tage bei Seite. In 205 Th dieser klaren Lösung löst man 60 Th Kölner Leim auf. 2) Gummi arabicum 10 Th, Zucker 30,0, Natronwasserglas 100,0. 3) Ein von mir kürzlich untersuchter Syndetikon war eine Lösung von Leim in Essigsäure mit 45 Proc. Trockenrückstand. B. FISCHER.

Azotina ist ein Düngemittel, aus Wollenbällen (Lumpen) durch Behandeln mit überhitztem Wasserdampf dargestellt.

Epilepsie-Mittel, Schandauer der Frau Majorin WITTICH. Abgetheilte Pulver einer mit Muskatnuss aromatisirten thierischen Hornsubstanz. Angeblich dienen zur Bereitung. Echte Elensklauen, echte Perlen und ein Sekret aus dem Sprunggelenk der Hasen.

Gelanthum-UNNA. Eine Hautfirmis Grundlage, etwa von der Konsistenz der Glycerinsalbe. Besteht aus Gelatine, Traganth, Glycerin, Wasser. Wird durch Zusatz kleiner Mengen Eosin auch hautfarbig hergestellt.

Gelatinepapier, wasserdichtes. Man bestreicht Papier auf beiden Seiten mit einer Lösung aus 1 Th Gelatine, 1 Th Glycerin und 4 Th Wasser, lässt den Ueberzug fest werden, taucht dann das Papier in eine Lösung von 1 Th Formalin (10proc) und 7 Th Wasser, lässt abtropfen und hängt zum Trocknen auf.

Gelatine-Folien, unlosliche. Gelatineplatten werden in einer Lösung von Formaldehyd getaucht und hierauf getrocknet. D. R. P. 91505.

Gelatoidpapiere sind Bromsilbergelatinepapiere, welche durch Behandeln mit Formaldehyd gehärtet worden sind.

Gelatino-plastique, Masse zu Suppositorien, Vaginalkugeln, Anthrophoren etc. Gelatinae 15,0, Aquae 60,0, Glycerini 50,0.

Glyceritum Gelatinae, amerikanisches Mittel auf Brandwunden. Gelatinae albae 30,0, Glycerini 4,0, Acidi carbolici 1,0, Aquae 64,0.

Krystallschöne zum Weinklären ist eine Mischung aus Gelatine und Alaun ää. (J. NESSLER.)

Potelline. Eine Erfindung eines gewissen POREL. Ist eine Mischung von Gelatine, Glycerin und Tannin in verschiedenen Verhältnissen. Dient zu Flaschenverschlüssen, zum

Einhüllen von Fleisch, mit Farbstoffen, Baryumsulfat und Zinkoxyd versetzt zu allerlei Gebrauchsgegenständen

Sublimatgelatine nach Pica. Gelatinae albae 30,0, Aquae 45,0. Man lässt quellen, erwärmt, mischt hinzu Glycerini 25,0, Hydrargyri bichlorati 0,05 in wenig Wasser gelöst und gießt in Tafeln aus. Zum Aufpinseln bei Ekzemen.

Tannalinhauts, Linné's. Sind die mit Formaldehyd gehärteten Gelatineblätter.

Tannalin heißt die zur Hartung der Gelatine dienende schwache Formaldehyd-
lösung.

Vaginal-Tampons Dr. Fischer's. Sind komische Gelatine kapseln, welche das Medikament auf Watte vertheilt einschließen. Die Watte ist an einem durch den Deckel gezogenen Seidenfaden befestigt. Bei der Applikation schmilzt die Gelatine, man wartet 10–15 Minuten und zieht alsdann den Tampon an dem Faden heraus.

V Cornu Cervi raspatum. **Cornu Cervi tornatum**. **Rasura Cornus Cervi**. Geaspeltes Hirschhorn. Der Edelhirsch, *Cervus Elaphus L.*, ist ein in Wäldern einheimischer Wiederkäuer und Zwielhauer aus der Familie der Hirschtiere (*Cervina*). Nur das Männchen trägt ein Geweih, welches es zur Brunstzeit abwirft.

Das Hirschhorn kommt von verschiedener Güte in den Handel, entweder als Abfall von verarbeitetem Hirschhorn, oder besonders aus den grosseren Stücken des Abfalls gepaspelt. Erstere Sorte, *Cornu Cervi raspatum*, ist schwer an Gewicht und höchstens zu Abkochungen verwendbar, dagegen ist die zweite etwas theurere, aber schön weisse und durch Abdrehen des Hirschgeweihes gewonnene Sorte, *Cornu Cervi tornatum*, besonders für Theegetrenschke zu empfehlen.

Bestandtheile. Das Hirschhorn besteht aus ungefähr 25 Proc. löslicher thierischer Materie (Leim), 50 Proc. Calciumphosphat, 15 Proc. Calciumkarbonat und 10 Proc. Feuchtigkeit nebst geringen Mengen anderer Salze und unlöslicher thierischer Materie.

Anwendung. Das Hirschhorn war früher ein billiges Gelatinematerial, welches aber heute, wo wir eine sehr reine Gelatine durch den Handel beziehen, in dieser Beziehung werthlos geworden ist. Hin und wieder ist es ein Bestandtheil von Theemischungen für Kinder.

Cornu Cervi ustum, Gebranntes Hirschhorn. Dieses wird durch *Conchae praeparatae* ersetzt (s. S. 552).

Gelée de corne de cerf (Gall). *Cornu Cervi raspati* 250,0 wird mit Wasser gewaschen, dann mit 2000,0 destillirtem Wasser bis auf 1000,0 eingekocht. Man kühlt, presst ab, fügt 120,0 Zucker sowie den Saft einer Citrone und nach dem Erkalten ein zu Schaum geschlagenes Weisses zu. Man kocht durch Aufkochen, kühlt oder filtrirt, dampft ein, bis eine Probe starr wird, setzt dann die Citronenschale hinzu, erwärmt kurze Zeit, kühlt und lässt erstarren.

Decoctum album Sydenhami. **Aporème blanc**. *Cornu Cervi raspati*, *Micae Panis albi* 15,0 kocht man mit Aquae 1000,0 zur Kolatur 700,0 und fügt hinzu Gummi arabici 7,5, Sacchari albi 15,0, Aquae Auranti florum 10,0.

Gelatina Cornu Cervi artificialis.

Rp	1	Gelatinae	10,0
	2	Aquae	80,0
	3	Aciduli citrici	0,5
	4	Vini albi	10,0
	5	Glycerini	30,0

Man löst 1 in 2, fügt die Lösung von 3–5 hinzu, seigt durch und setzt Aquae q. s. ad 100 zu.

Massa gelatinosa

für Vaginalkugeln etc.

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Glycerini	47,–50,0
	Aquae	10,0

Gelatina roberans

Weingelée (Münch. Ap.-V.)

Rp	Gelatinae albae	5,0
	Aquae destillatae	50,0
	Sirupi sacchari	200,0
	Vini albi	875,0
	Succa Citri	0,0

Bereitung wie vorher

Flüssiger Leim. **Kaltflüssiger Leim**. **Glutinum fluidum**. Dieses Klebemittel, welches den gewöhnlichen Tschierleim keineswegs ersetzen kann, wird in verschiedener Weise hergestellt.

1) Man lässt 100 Th. Kölner Leim in Wasser quellen, giesst den Ueberschuss des Wassers ab, giebt 100 Th. verdünnte Essigsäure (30 proc.) hinzu, erwärmt 12–24 Stunden im Wasserbade oder so lange, bis der Leim beim Erkalten nicht mehr gelatinirt, stumpt dann die Säure mit Ammoniak soweit ab, dass der Leim nicht mehr als 2 Proc. freie Essigsäure enthält und dampft auf 220 Th. ein, wenn der Leim sehr dick oder auf 290 bis 300 Th. ein, wenn er dünner sein soll. Schliesslich giebt man noch etwas Thymol zu (B. Fischer).

2) Man lässt 100 Th. Kölner Leim mit 100 Th. Wasser quellen, löst unter Erwärmen und versetzt die Flüssigkeit mit 20 Th. roher Salpetersäure von 1,33 spec. Gew. Sollte

der Leim nach dem Erkalten nicht flüssig bleiben, so erwärmt man und setzt noch 3 bis 5—10 Th der Saure hinzu

3) Man laßt 100 Th Wasser mit 250 Th Kölner Leim quellen, setzt 50 Th reine (25proc) Salzsäure, sowie 25 Th Zinkvitriol zu und digerirt 12 Stunden im Wasserbade

4) Man löst 10 Th. Leim und 10 Th Chloralhydrat in 50 Th Wasser DRP 77103

Klebleime

1) Klebleim für sog gummirte Etiquetten 100 Th Kölner Leim (oder Gelatine-Leim s S 1208), 40 Th Zucker und 30 Th arabisches Gummi werden in 200 Th Wasser gelöst und mit einer Lösung von 5 Th Alaun in 20 Th Wasser versetzt Die durch schwaches Erwärmen verflüssigte Leimmasse wird auf die Rückseite des Etiquetts aufgestrichen und bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet

2) Klebmittel für Signaturen in feuchten Kellern 30 Th Kölner Leim in 100 Th Essig von 6 Proc aufweichen, dann mit einer Anreibung von 50 Th feinem Weizenmehl mit 400 Th kaltem Wasser vermischen und das Ganze einige Minuten auf kochen

3) Klebmittel für Papier auf Weissblech A) Man verwendet eine Lösung guten Leimes, welcher etwas Calciumchlorid zugesetzt ist.

B) Man bestreicht die zu beklebende Stelle der Buchse mit verdünntem Dammarlack und klebt dann das Papier mit Leimlösung an Noch mehr zu empfehlen ist, den Lackanstrich nach dem Trocknen noch mit etwas Schmirgelpapier rau zu reiben

Kitte

1) Kitt für Elfenbein, Knochen, Perlmutter, weisse Steine etc 15,0 Hausenblase klein geschnitten behandelt man mit 200,0 destillirtem Wasser in der Wärme des Wasserbades, kocht die Lösung, löst darin ferner 25,0 Gelatine Leim, dampft bis auf 140,0 in der Wärme des Wasserbades ein, setzt der heissen Flüssigkeit unter Umrühren zuerst bestes Zinkweiss 15,0 mit Wasser in einem Mörser höchst fein zerrieben und dann eine Lösung von 0,5 Mastix und 1,0 Lärchenterpentin in 10,0 Weingeist hinzu

2) Kitt für Holz mit Glas, Metall etc 100 Th Tischlerleim werden in 50 Th Wasser in der Wärme des Wasserbades gelöst und mit 10 Th Kalkhydrat und 10 Th Kreide gemischt

3) Holz auf Glas Gelatine wird in Essigsäure in der Wärme gelöst Die Lösung muss von teigartiger Konsistenz sein und warm angewendet werden

4) Kitt zum Verfügen der Fussböden. Ocker, Sägemehl, Leim zu gleichen Theilen Man läßt den Leim in Wasser quellen, fügt Sägemehl und Ocker sowie Wasser q s hinzu, dass ein in mässiger Wärme steifer Brei entsteht

Gelatina Acidi acetici UNNA

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Aquae destillatae	35,0
	Glycerini	50,0
	Acidi acetici glacialis	5,0

Gelatina Acidi salicylici UNNA

I. 5 Proc

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Aquae destillatae	45,0
	Glycerini	40,0
	Acidi salicylici	5,0

II. 10 Proc

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Aquae destillatae	35,0
	Glycerini	45,0
	Acidi salicylici	10,0

III 20 Proc

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Aquae destillatae	20,0
	Glycerini	50,0
	Acidi salicylici	20,0

Gelatina Aluminii acetici UNNA

Rp	Gelatinae albae	5,0
	Aquae destillatae	55,0
	Glycerini	30,0
	Aluminii acetici sicc	10,0

Gelatina Argillae UNNA

Rp	Gelatinae albae	5,0
	Aquae destillatae	55,0
	Glycerini	50,0
	Argillae	10,0

Gelatina Chlorali hydrati UNNA

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Aquae destillatae	40,0
	Glycerini	40,0
	Chlorali hydrati	10,0

Gelatina Camphorae UNNA

Rp	Gelatinae albae	5,0
	Aquae destillatae	55,0
	Glycerini	20,0
	Camphorae	5,0

Gelatina Zinci vulgaris UNNA

Rp	Gelatinae albae	3,0
	Zinci oxydati	3,0
	Glycerini	5,0
	Aquae	9,0

Gelatina Zinci dura UNNA

Rp	Gelatinae albae	4,0
	Zinci oxydati	8,0
	Glycerini	5,0
	Aquae	9,0

Gelatina mollis BEIERSDORF

Rp	Gelatinae albae	10,0
	Aquae	40,0
	Glycerini	40,0
	Zinci oxydati	10,0

Gelatina dura BEIERSDORF

Rp	Gelatinae albae	15,0
	Aquae	35,0
	Glycerini	40,0
	Zinci oxydati	10,0

Gelatina mollis MIELEK

Rp	Gelatinae albae	15,0
	Aquae	45,0
	Glycerini	25,0
	Zinci oxydati	15,0

Gelatina dura MIELEK

Rp	Gelatinae albae	20,0
	Aquae	40,0
	Glycerini	25,0
	Zinci oxydati	15,0

Gelatina amygdalata

Blanc-manger

Rp	1 Amygdalarum dulcium	10,0
	2 Sacchari albi	5,0
	3 Aquae Aurantii florum	2,0
	4 Gelatinae Cornu Cervi artificialis	100,0

Man stösst 1—3 zum feinen Brei an, erwärmt diesen im Wasserbade mit 4 und kollirt.

Gluten glycerinatum
Flaschenleim

Rp	Glutinis fabulae	100,0
	Aquae	
	Glycerini	33 500

Dient zum Überziehen von Flaschenhalsen an Stelle der Stanniolkapseln und des Flaschenlackes und kann durch Theerfarben beliebig gefärbt werden

Species Infantum
Kinderthee

Rp	Cornus Cervi albi tornati	60,0
	Radix Liquiritiae	15,0
	Radix Althaeae	8,0
	Fructus Foeniculi non contusi	32,0

Species Longovalianenses
Langenthaler Thee

Rp	Cornus Cervi tornati	
	Florum Calendulae	
	Florum Cyani	33 15,0
	Theae nigrae Sinensis	50,0
	Tragacanthae	5,0

Species Puerperarum

Thé de Femme en couche Kindbettthee

Rp	Cornus Cervi tornati	60,0
	Florum Malvae silvestris	
	Florum Paeoniae	
	Florum Thibae sine bracteis	
	Florum Prunellae	33 5,0
	Fructus Anisi	
	Fructus Foeniculi	33 10,0
	Fructus Cerastrinae	
	Radix Liquiritiae	33 20,0

Gelsemium

Gattung der Loganiaceae — Loganioideae — Gelsemieae.

† **Gelsemium sempervirens Ait** Heimisch von Virginia bis Texas und Florida Schlingender Strauch mit gegenständigen, lanzettlichen, gestielten Blättern und wenigbluthigen, axillären Blütenständen, die zuweilen auf die Endblüthe reducirt sind. Blüten gross, trichterförmig, gelb — Verwendung finden die Wurzel und die unterirdischen Stengeltheile

† **Radix Gelsemii** (Ergänz. Helv. Brit.) **Rad. Anonymos. Gelsemium** (U-St) — Gelsemiumwurzel. Gelbe Jasminwurzel. — **Rhizome et Racine de gelsemium** (Gall) — Gelsemium Root. Yellow Jasmine Root

Beschreibung. Die Droge besteht aus meist mehrere cm langen, bis 25 mm dicken Stücken, die stielrund, mit Wurzelfasern besetzt, oft gespalten sind. Die Stücke der Wurzel mattbraun, langsrundlich mit dünner Rinde, ohne Mark, die der Stengel braun oder violettbraun, ebenfalls langsrundlich, oft ausserdem mit Querrissen, mit Mark, das aber häufig geschwunden ist — Ohne Geruch, Geschmack bitterlich — In den Markstrahlen der Rinde, die sich nach aussen verbreitern, grosse Einzelkrystalle von Kalkoxalat, die bis 40 μ lang werden. Markstrahlen des Holzes getupfelt, verholzt, bis 8 Zellreihen breit. Im Bast des Stengels Faserbündel und Steinzellen, ferner markständiges Phloëm, in den Zellen des Markes häufig Krystalle

Bestandtheile. Zwei Alkaloide Gelsemin $C_{19}H_{23}N_5O_{14}$ in weissen Krystallen, die bei 154—155°C schmelzen, in Weingeist, Chloroform und Aether löslich. Mit Kaliumdichromat und Schwefelsäure roth, dann grün. Gelseminin $C_{22}H_{26}N_4O_6$ amorph, sintert bei 105°C zusammen, ist bei 120°C geschmolzen, in Wasser wenig, in Alkohol, Aether und Chloroform leicht löslich. Mit Salpetersäure grün, mit Schwefelsäure und Kaliumdichromat rothviolett, dann grün. Beide Alkaloide mit Ceriumoxyd und Schwefelsäure roth. — Ein

unter dem Namen Gelseminum im Handel befindliches, harzartiges Präparat enthält beide Alkaloide. Die Alkaloide finden sich im Parenchym der Rinde, im markständigen Phloëm und im Mark selbst. Der Gehalt an Gelsemin beträgt in der Wurzel 0,17 Proc., im Rhizom 0,2 Proc., im oberirdischen Stamm fehlt es. Ausserdem enthält die Droge Gelseminumsäure, im Rhizom 0,37 Proc., in der Wurzel 0,3 Proc. Zusammensetzung $C_{13}H_{11}O_5$. Sie bildet gelbliche, nadelförmige Krystalle, die bei 206° C. schmelzen. Man hat sie für identisch gehalten mit Aesculin, was eine neuere Untersuchung nicht bestätigt hat. Sie ist in ihren Lösungen durch starke Fluorescenz ausgezeichnet.

Verfälschung. Da die Pflanze in Nordamerika der Blüten wegen oft den Namen „gelber Jasmin“ führt, wird sie mit den Wurzeln von *Jasminum fruticans* L. verwechselt, die in der Wurzel im Bast Fasern hat.

Aufbewahrung. In der Reihe der vorsichtig aufzubewahrenden Mittel, die zerkleinerte Wurzel in gelben Hafengläsern.

Anwendung. Als Abkochung, in der Regel aber als Fluidextrakt oder als Tinktur. Man verwendet die Droge bei Neuralgien, Asthma und Keuchhusten.




Fig. 258. Rhizom und Wurzel von *Gelsemium sempervirens*.

† *Extractum Gelsemii alcoole paratum* (Gall.) wird wie *Extr. Digitalis alcoole paratum* Gall. (S. 1041, 2.) bereitet.

† *Extractum Gelsemii fluidum* (U-St.). *Fluid Extract of Gelsemium*. Aus 1000 g gepulverter Wurzel (No. 60) und 91 proc. Weingeist im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, fängt zuerst 900 ccm auf und stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind etwa 5000 ccm Lösungsmittel erforderlich. Gabe 0,05–0,3 mehrmals täglich.

† *Tinctura Gelsemii* (Ergänz. Helv. Brit. U-St.). *Gelsemiumtinktur*. Ergänz.: Aus 1 Th. grob gepulverter Wurzel und 10 Th. verdünntem Weingeist (60 proc.). Helv.: Aus gepulverter Wurzel (V) wie *Tinct. Capsici* Helv. (S. 806). — Brit.: Mittels Weingeist von 60 vol. Proc. ebenso. — U-St.: Aus 150 g gepulverter Wurzel (No. 60) und einer Mischung von 650 ccm Weingeist (91 proc.) und 350 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 100 ccm und sammelt l. a. 1000 ccm Tinktur. — Bräunlich-gelbe, blau fluorescierende Flüssigkeit, von welcher 1 ccm mit 5 Tropfen verdünnter Salzsäure und 9 ccm Wasser eine schillernde Lösung giebt, worin 1 ccm *MAYER's* Reagens einen flockigen Niederschlag erzeugt. Vorsichtig aufzubewahren.

Höchste Einzelgabe: Brit. 0,3–0,9 g. Helv. 1,0 g n. LEWIN 1,0 g

„ Tagesgabe: „ 5,0 „ „ 3,0 „

Acettractum Gelsemii fluidum vergl. *Acettractum Cocae fluidum* S. 870.

Mixtura antineuralgica HILL.

Rp. *Extracti Gelsemii fluidi*

Kalii bromati

Kalii bicarbonici

ss 5,0

Aquae destillatae

80,0.

Gegen Migräne. 3 mal täglich 1 Theelöffel.

Limon, gegen Zahnschmerz, ist eine Tinktur aus Gel-emumkraut 1 10

Universalmittel gegen Zahnschmerz, aus einer Kölner Apotheke, bestand 1) aus Gelsemiumtinktur, 2) aus Chloralhydrat, Kampher, Gelsemiumtinktur und Cayepulöl

II † *Gelsemium elegans* Benth Heimisch in China und Sumatra Enthält ein Alkaloid, das mit dem der vorigen Art nicht identisch sein soll Wird in China zu Giltmorden verwendet

Genista.

Gattung der Papilionaceae—Genistaceae—Spartinae.

I. Verschiedene Arten enthalten das giftige Cytisin, so *G. ramosissima* Poir, *G. spicata* Eckl et Zeyh

II *Genista tridentata* (?) in Brasilien, liefert ein atherisches Oel Carquejaöl Spec Gew 0,9962 Drehung — 31° 15' Es ist gelb, riecht kampherähnlich Enthält Cineol und liefert bei der Destillation Essigsäure

III *Genista tinctoria* L Färberginster Farbblumen Gelbkraut — Genêt des teinturiers Genistrole Heimisch durch fast ganz Europa bis nach Sibirien Man verwendete die Blätter *Herba Cytisogenistae* und die Blütenstände *Summitates Genistae* medicinisch, auch gegen Wasserschen Enthält einen gelben Farbstoff, man verwendet sie daher hier und da in der Färberei (z B zur Darstellung des Schüttgelb) Ähnlich verwendet man *G. ovata* W et K, *G. anglica* L, *G. sagittalis* L, *G. monosperma* Lam, *G. purgans* L.

IV Die Fasern von *Genista virgata* D C und einigen anderen Arten werden zur Herstellung von Geweben benutzt

V Flores *Genistae* Flores *Genistae scopariae* Flores *Spartii scoparii* — Ginsterblumen Besenkrautblumen sind die Blüten des *Cytisus scoparius* Lk (syn *Sarothamnus scoparius* L.) Familie der Papilionaceae—Genistaceae—Cytisinae Heimisch in Mitteleuropa Sie sind gross, gelb, selten weiss, der Kelch ist zweilappig, der Griffel lang, schneckenförmig eingerollt Sie enthalten Spartein (vergl. dort)

Einsammlung Man pflückt die Blüten mit den Kelchen von der im Mai und Juni blühenden Pflanze, trocknet sie sorgfältig und schnell und bewahrt sie in dicht geschlossenen Blech- oder Glasgefässen auf Bei sorgloser Behandlung gehen Farbe und Geruch leicht verloren, und man findet deshalb im Handel gewöhnlich die bestandigeren Blüten von *Spartium junceum* L

Verwendung Hier und da noch als Purgans und Diureticum (vergl. *Spartium*), ausserlich bei Erysipel

Scoparii Cacumina (Brit.) *Scoparius* (U-St) *Summitates Scoparii* *Genistae* *Herba Spartii Scoparii*. — Besenginsterkraut. — Genêt à balais (Gall Suppl.) — Broom Tops

Anwendung. Aus dem frischen Kraut presst und verwendet man den Saft als harntreibendes Mittel, ferner bereitet man daraus ein Extrakt, aus dem getrockneten eine Tinktur, giebt indessen seit Reindarstellung der wirksamen Bestandtheile diesen den Vorzug Bekannt ist die Verarbeitung der Zweige zu Besen und Bürsten (daher der Name) Die Knospen werden hier und da statt der Kapern, die reifen, gerösteten Samen bisweilen als Kaffeeersatz benutzt

† *Extractum Scoparii*, Extr *Spartii scoparii* Man digerirt die frischen, blühenden Zweige mit 50proc Weingeist und dampft zum dicken Extrakt ein Zu 0,2 bis 0,4 g mehrmals täglich Höchstgabe 0,6 g

Extractum Scoparii fluidum (U-St) Fluid Extract of *Scoparius* 1000 g gepulvertes Kraut (No 60) wird im Verdrängungswege mittels verdünntem Weingeist (41proc)

erschöpft Man befeuchtet mit 350 cem, fängt zuerst 850 cem auf und stellt 1 a 1000 cem Fluidextrakt her

Infusum Scoparii (Brit) Infusion of Broom Aus 100 g geschnittenem Besengusterkraut und 1000 cem siedendem Wasser Nach $\frac{1}{4}$ Stunde abpressen

Succus Scoparii (Brit) Juice of Broom Frisches Besengusterkraut zerquetscht man, presst den Saft aus und mischt 3 Raumth desselben mit 1 Raumth 90 (vol) proc Weingeist Gabe 3,5—7,0 cem

Tinctura Sparti Scoparii wird aus 1 Th Ginsterblumen und 5 Th verdünntem Weingeist durch Digestion bereitet Ebenso eine Tinktur aus dem Samen des Strauches

Ginsterextrakt des Pfarrers KNEIPP ist Extr Sparti scoparii spirituosum

Ginsterkraut, Pfarrer KNEIPP's, ist Herba Genistae tinctor cum floribus

Rothlaufmixture nach TESTA ist eine mit 5 Proc Salicylsäure versetzte Abkochung von Besengusterblumen (100,0—150,0 1000,0) Man macht damit Umschläge auf die erkrankten Stellen und bedeckt mit Guttaperchapapier

Wassersucht-Universalmittel von Dr BRESER in Berlin ist Besenginster (50,0 = M 1,50)

Gentiana.

Gattung der Gentianaceae — Gentianoideae — Gentianeae

1 Eine Anzahl von Arten finden der bitterschmeckenden Wurzeln wegen allgemeine arzneiliche Verwendung, nämlich **Gentiana lutea L.** Heimisch auf den mittleren Hohen der Gebirge von Portugal bis zu den Donauländern Mit 1,5 m hohem, einfachem Stengel Untere Blätter handbreit und doppelt so lang, elliptisch, ganzrandig, in einen breiten Stiel verschmälert, mit 5—7 Hauptnerven Obere Blätter sitzend, allmählich in die Hochblätter des Bluthenstandes übergehend Alle Blätter gegenständig Blüthen gross, gelb, Scheinquirl bildend, 5 und 6zählig, die Korolle fast bis zum Grunde in langhoh-lanzettliche Zipfel gespalten Die hautigen Kelche reissen einseitig auf **Gentiana pannonica Scopoli** Heimisch in den Alpen, Karpathen und dem Böhmerwald Mit glockigem, fast gleichmässig gezahntem Kelch Zipfel der Blüthe dreimal kürzer, als ihre Röhre, 6—7zählig, purpurn mit dunkleren Punkten Antheren röhrig zusammenhängend **Gentiana purpurea L.** Heimisch von den Apenninen durch die Alpen bis Norwegen, auch in den Karpathen Korolle glockig, aussen purpurroth, innen gelblich, Blüthen meist 6zählig Laubblätter meist 5nervig Kelchzähne zurückgekrümmt **Gentiana punctata L.** Heimisch in den Alpen, Karpathen und Sudeten Blüthen mit glockiger, 6—7zähliger, gelber, schwarzpunktirter Korolle Kelchzähne aufrecht

Radix Gentianae (Austr Germ Helv) **Gentianae Radix (Brit)** **Gentiana (U St)** **Radix Gentianae rubrae.** — Enzianwurzel Enzian. Rother Enzian (Volksthumlich Bitterwurzel, Alexiawurzel, Fieberwurzel, Hirschwurzel, Werlachwurzel). — Racine de gentiane (Gall) — Gentian Root

Beschreibung Das bis 4 cm dicke, aufrechte, dicht geringelte und mit 4 schiefen Reihen von Knospen versehene Rhizom bringt jährlich die dekussirten Laubblätter hervor und blüht nach 10—25 Jahren Danach entwickelt sich eine oder 2 Knospen zu Rhizomzweigen, die wieder nach einigen Jahren blühen Nach unten geht das Rhizom in die eine Länge von 1 m erreichende, wenig verzweigte Wurzel über In der Droge ist das Rhizom quergebüngelt, die Wurzel langsfurchig Sie ist aussen rothbraun, innen gelbbraun Vorsichtig und rasch getrocknete Droge ist fast weiss, wird aber nach einiger Zeit ebenfalls roth Um diese Röthung schneller herbeizuführen, schichten die Enziangräber die Wurzeln auf Haufen, die sie festtreten und sich längere Zeit selbst überlassen, durch die dann eingetretene Gährung wird die Röthung be-culeunigt Die trockene Droge bricht glatt und schneidet sich wachsartig Der Geruch ist angenehm aromatisch, der Geschmack rein und stark bitter Auf dem Querschnitt lässt sich mit der Lupe der dunkle Cambiumring erkennen, das Holz ist undeutlich strahlig, die Rinde meist lückig — Die Droge ist zu äusserst von 5—10 Schichten flacher Korkzellen bedeckt, an die sich ein Hypoderm anschliesst Die Hauptmasse der Rinde besteht aus Parenchym, in dem die

unregelmässig vertheilten Siebstränge leicht aufgefunden werden. Im Holz kleine Gruppen von Gefässen oder einzelne Gefässe und ebenfalls unregelmässig zerstreute Gruppen von Siebröhren (Fig 259). Markstrahlen sind in Holz und Rinde schwer zu erkennen. Stärke fehlt der Droge. Im Parenchym erkennt man kleine Oeltropfen und winzige Kryställchen. Die Wurzeln der 3 anderen, oben genannten Arten weichen von *Gentiana lutea* wenig ab, sie sind durchweg etwas dünner, im Bau stimmen sie überein.

Bestandtheile. Den bitteren Geschmack verdankt die Droge dem Glykoside Gentiopikrin $C_{20}H_{30}O_{12}$, wovon sie $\frac{1}{10}$ Proc enthält. Dasselbe bildet farblose Nadeln, die sich leicht in Wasser und verdünntem Alkohol, nicht in Aether lösen. Sie lösen sich in Schwefelsäure farblos, beim Erhitzen wird die Lösung karminroth. Mit verdünnten Säuren liefert es Zucker und Gentioenin $C_{14}H_{16}O_6$. Ferner enthält die Wurzel $\frac{1}{10}$ Proc Gentiansäure (Gentisin) $C_{15}H_{16}O_2(OCH_3)(OH)_2$, die blaugelbe, glänzende, geschmack-

lose Nadeln bildet, sie löst sich in Alkalien mit gelber Farbe, und ist der Methylather des 1 3 7 Trioxyxanthons. Als weitere gelbe Substanzen werden bezeichnet Gentenin und Quercitrin oder ein Zersetzungsprodukt des selben. Ferner sind in der Droge enthalten 6 Proc fettes Oel, ein Zucker Gentianose $C_{18}H_{30}O_{11}$, der als Reservestoff dient, 8 Proc Asche.




Fig 259 Querschnitt durch Radix Gentianae
G Gefässe S Siebtheile.

Verwechselungen und Verfälschungen. Durch Unachtsamkeit der Sammler werden gelegentlich die Wurzeln von *Aconitum Napellus*, *Veratrum album* oder *Atropa Belladonna* mitgesammelt, die sammtlich stark giftig sind. (Vergl. die betr. Artikel.) Das Pulver soll mit Ocker und dem Pulver von *Lign. Guaiaci* verfälscht werden. Ersteren erkennt man durch die Aschenbestimmung, letzteres unter dem Mikroskop an den grossen Gefässen, an den Oxalatkristallen und an der Blaufärbung des alkoholischen Auszuges mit Oxydationsmitteln.

Einsammlung. Die Wurzeln werden im Frühling gesammelt, stärkere der Länge nach gespalten, der Gährung (vergl. oben) unterworfen und hiernach getrocknet. Dieses Verfahren giebt der Wurzel die rötlich braune Färbung, beeinträchtigt indessen ihre Beschaffenheit derart, dass man sie nur noch zu Pulvern, Theemischungen oder weingeistigen Auszügen gebrauchen kann. Bei der Extraktbereitung liefert eine derartig behandelte Wurzel nur noch geringe Ausbeute, das gewonnene Extrakt ist entweder trübe losch oder wird es in kurzer Zeit. Ein klar lösliches Extrakt in möglichst reicher Ausbeute erhält man nur aus einer ungegohrenen Wurzel und thut deshalb gut, sich zur Darstellung desselben die innen hellfarbige, „unfermentirte“ Enzianwurzel zu beschaffen. Es gilt hier ein altes Vorurtheil zu überwinden — 100 Th. frische Wurzel geben etwa 30 Th. trockne. Das Pulvern der luftgetrocknen Droge bedingt einen Verlust von 10–12 Proc durch Entweichen und Verstäuben.

Aufbewahrung. Die Wurzel zieht Feuchtigkeit aus der Luft an, sie wird daher in dichten Blech- oder Holzgefässen, das feine Pulver in braunen Hafenglasern aufbewahrt.

Anwendung. Als Bittermittel in Pulver zu 0,25–1,0, als Aufguss (unzweckmässig, da derselbe zur Gallertbildung neigt), meist aber in den verschiedenen Zubereitungen. Als Mittel gegen Trunksucht hat Enzianwurzel sich nicht bewährt, ebenso nicht an Stelle der Laminariae als „Quellmeissel“.

Extractum Gentianae. Enzianextrakt *Extrait de gentiane* *Extract of Gentian* Germ 1 Th Enzianwurzel in Scheiben von 1—2 mm Dicke zieht man erst 48, dann 12 Stunden mit je 5 Th Wasser aus, kocht die vereinigten Pressflüssigkeiten auf, dampft auf 2 Th ein, löst (in der 2—3fachen Menge) kalten Wassers, lässt absetzen, filtriert und dampft zum dicken Extrakt ein — Die Macerationsdauer von 48 Stunden ist entschieden zu lang, die Hälfte genügt — Helv 1 Th Enzianwurzel (II) wird zuerst mit 5 Th Wasser 24 Stunden, dann mit 3 Th Wasser 12 Stunden ausgezogen, die auf 3 Th eingedampften Pressflüssigkeiten mit 1 Th Weingeist versetzt 3 Tage kühl gestellt, klar abgesehen, der Weingeist abdestilliert, der Rückstand nach 2 Tagen filtriert und zum dicken Extrakt eingedampft — Austr 1 Th Enzianwurzel wird je 24 Stunden mit 6, dann mit 2 Th Wasser ausgezogen, die durch Absetzenlassen geklärten Auszüge aufgekocht, durchgeseiht und zum dicken Extrakt eingedampft Ausbeute etwa 25 Proc — Brit lässt die Wurzel mit dem zehnfachen Gewicht kochenden, destillierten Wasser übergießen, nach 2 Stunden 15 Minuten lang kochen, auspressen und zum weichen Extrakt eindampfen — U-St 1000 g gepulverte Enzianwurzel (No 20) werden mit 400 ccm Wasser befeuchtet, nach 24 Stunden im Perkolator mit Wasser erschöpft, der Auszug auf $\frac{3}{4}$ seines Gewichts eingekocht, durchgeseiht und zur Pillenkonsistenz eingedampft — Gall 1 Th Enzianwurzel in Scheiben wird mit 5, dann mit 3 Th Wasser je 12 Stunden ausgezogen, die Pressflüssigkeiten nach dem Absetzen zum weichen Extrakt eingedampft — E Diet. 1000 g kleingeschnittene, staubfreie Enzianwurzel zieht man je 24 Stunden mit 3500,0, dann mit 2500,0 Wasser aus, kocht die Auszüge mittels Filtrirpapiermasse (je 20,0) durch Aufkochen, Abschäumen und Filtriren, dampft auf 750,0 ein, fügt 1500,0 Weingeist (90 proc) hinzu, filtriert nach 24 Stunden, zieht den Filtrerrückstand mit 1250,0 Weingeist (68 proc) aus, filtriert, destilliert 2000 g Weingeist ab, dampft zum dicken Extrakt ein, stellt dieses 8 Tage kühl, löst in der dreifachen Menge Wasser, filtriert und dampft ein Die Ausbeute aus gegohrener Wurzel beträgt bisweilen nur 13 Proc, durchschnittlich 30 Proc eines oft nachtrübenden Extrakts, aus schnell getrockneter Wurzel bis zu 40 Proc eines klar löslichen, bedeutend helleren Extrakts Germ und Helv fordern ein in Wasser klar lösliches Enzianextrakt, trifft das nicht zu, so löst man es in der 2—3fachen Menge kalten Wassers, lässt absetzen, filtriert und dampft wieder ein — Innerlich zu 0,5—2,0 g mehrmals täglich in Pillen

Extractum Gentianae fluidum (U St) *Fluid extract of Gentian* Aus 1000 g gepulverter Enzianwurzel (No 80) und verdünntem Weingeist (41 proc) im Verdrängungswege Man befeuchtet mit 350 ccm, fängt zuerst 800 ccm auf und stellt 1 a. 1000 ccm Fluidextrakt her

Tinctura Gentianae Enziantinktur *Tincture ou Alcoolé de gentiane* Germ Aus 1 Th mittelfein zerschnittener Enzianwurzel und 5 Th 60 proc Weingeist durch Maceration Gall Aus grob gepulverter Wurzel ebenso Helv Aus Enzianwurzel (V) wie Tinct Calami Helv (S 537) Mit Wasser in jedem Verhältnisse klar mischbar

Enziantinktur des Pfarrers KNEIPP ist aus frischer Wurzel zu bereiten

Vinum Gentianae. Vinum de Gentiana Enzianwein *Vin de gentiane* Oenolés de gentiane Helv Aus 5 Th Enzianwurzel (III) und q s Marsalawein zu 100 Th Filtrat im Verdrängungswege — Gall 30,0 geschnittene Enzianwurzel maceriert man 24 Stunden mit 60,0 Weingeist (60 proc), fügt 1000,0 Rothwein hinzu, lässt 10 Tage stehen und filtriert — Diet 50,0 grob gepulverte Enzianwurzel, 1000,0 Xereswein Nach 8 Tagen abpressen und filtriren. — Ex tempore 1,0 Enzianextrakt, 10 Th, Enziantinktur, 89 Th Xereswein

Elixir Gentianae (Nat form)

Enzian-Elixir *Elixir of Gentian*

Rp

- | | |
|---|--------|
| 1 Extract Gentian fluid (U St) | 35 ccm |
| 2 Liquoris Ferri Tersulphatis (S 1147) | 25 ccm |
| 3 Spirit Cardamom comp (Nat form) ¹⁾ | 25 ccm |
| 4 Liquor Ammonii caustici (10 proc) | 23 ccm |
| 5 Spiritus (91 proc) | } q s |
| 6 Aquae destillatae | |
| 7 Elixir aromatic (U St) | |

Man verdünnt 2 mit 250 ccm kaltem Wasser, mischt mit der mit Wasser 55 verdünnten Lösung 4, sammelt den Niederschlag auf einem gekasteten Musselnschiffchen, lässt völlig ahtropfen verrührt mit 250 ccm Wasser, bringt wieder aufs Schiffchen und wäscht in gleicher Weise nochmals

mit 250 ccm Wasser aus Hierauf befreit man den Niederschlag durch Pressen möglichst vom Wasser, wägt, fügt $\frac{1}{4}$ seines Gewichts Weingeist, ferner 1 3 und 750 ccm von 7 hinzu, stellt 24 Stunden unter bisweiligem Schütteln bei Seite, filtriert durch Papier und bringt durch Nachwaschen mittels q s von 7 auf 1000 ccm

Elixir Gentianae cum Tinctura Ferri Chloridi
(Nat form.)

Elixir of Gentian with Tincture of Chloride of Iron

Rp

Tinct Ferri Citro-Chloridi (Nat form)
(S 1155)

Elixir Gentianae (Nat form) 100 ccm

900 ccm

¹⁾ Vorschrift zu dem Compound Spirit of Cardamom Nat form Ol Cardamomi 2 ccm, Ol Carvi 0,75 ccm, Ol Cinnamom Cass 0,5 ccm, Spiritus (91 proc) 500 ccm, Glycerin 65 ccm, Aq destill q s ad 1000 ccm

Elixir Gentianae et Ferri Phosphatis (Nat form)
Elixir of Gentian and Phosphate of Iron
Elixir Gentianae ferratum Ferrated or
Ferrophosphated Elixir of Gentian

Rp Ferri Phosphatis solub (U-SL) 17,5 g
 Aquae destillatae 35 ccm
 Man löst unter Erwärmen und Rührt hinzu
 Elixir Gentianae (Nat form) q s ad 1000 ccm

Elixir viscerale HUFELAND

Rp Extracti Absinthii
 Extracti Centauri minor
 Extracti Gentianae
 Extracti Trifoli SS 5,0
 Aquae aromaticae 90,0
 Tincturae aromatica 5,0

Magenmittel Theelöffelweise

Infusum Gentianae compositum (Ent)
Compound Infusion of Gentian

Rp Radix Gentianae
 Cortex Auranti fruct SS 12,5
 Cortex Citri fruct recent. 20,0
 Aquae destillat ebullient. 1000,0

Nach $\frac{1}{2}$ Stunde abzupressen Gabe 15—30 g

Infusum Gentianae compositum (Nat. form)

Rp Infusi Gentian compos fortior Nat. form. 1 Vol
 Aquae destillatae 8 Vol.

Infusum Gentianae compositum fortius
 (Nat. form)

Stronger Compound Infusion of Gentian.

Rp Radix Gentian pulv (No 40) 125,0 g
 Fruct Corundri „ 35,0 „
 Cort. Auranti fruct „ 35,0 „
 Spiritus diluti (41 proc.) q s

Im Verdrängungswege bereitet man 1000,0 ccm Flüssigkeit.

Mixtura stomachica
 (Londoner Vorschrift)

Rp Radix Gentianae 10,0
 Cortex Auranti fruct. 3,5
 Rhizomatis Rhei 2,25
 Rhizomatis Zingiberis 1,65
 Aquae q s

Man digeriert 3 Stunden und stellt 1000,0 Flüssigkeit her Esslöffelweise

Pilulae stomachicae SENNER
SENNER's magenstärkende Pillen.
Kraft- und Magenpillen.

Rp. Ferri sesquichlorati crist.
 Acidi hydrochlorici (25 proc.)
 Pulveris aromatici
 Radix Althaeae
 Sacchari albi SS 5,0
 Extracti Gentianae 10,0
 Radix Gentian pulv q s

Man formt 300 Pillen, welche mit Zimmt bestreut, in einem Glase abgegeben werden Bei Verdauungsstörungen, Mangel an Esslust 3—4 Stück vor der Mahlzeit.

Pilulae Gentianae (Gall)
Tisane de Gentiane.

Rp Radix Gentianae concisa. 50
 Aquae destill frigidae 1000,0
 Man maceriert 4 Stunden und seigt durch.

Pulvis antarthriticus amarus
Poudre de la Mirandole

Rp. Radix Gentianae pulv 25,0
 Radix Angelicae pulv 10,0
 Pulveris aromatici 5,0

Theelöffelweise mit Wein zu nehmen.

Pulvis antarthriticus Portlandi
PORTLAND's antarthritic powder
PORTLAND's Gichtpulver

Rp Radix Gentianae 15,0
 Resinae Guajac
 Radix Asari
 Cort. Auranti fruct SS 5,0
 Herb Centauri minor 10,0

Theelöffelweise mit Wein zu nehmen

Sirupus Gentianae

Sirupus de Gentiana (Gall)

Sirup de gentiane

Wie Sirap Chamomili Gall (S 716)

Sirupus Sanitatis Berolinensis

Sirupus Vitae longae (Sirupus
 mercurialis compos)

Rp Extracti Gentianae 1,0
 Extracti Mellefolii 2,0
 Mellis depurati 120,0
 Spiritus 10,0

Tinctura amara

Tinctura Gentianae composita Tinctura
 stomachica Bittere Tinktur Bittere
 Magentropfen Bittertropfen Gall-
 tropfen. Magentinktur Tincture amère

I Germanica.

Rp Radix Gentianae min conc.
 Herb Centauri min conc. SS 3,0
 Cort. Auranti fruct conc. 2,0
 Fruct Aurant. immat gr pulv
 Rhizom Zedoar min conc SS 1,0
 Spiritus diluti (60%) 50,0

Man lässt eine Woche stehen, presst und füllt art.

II Nation Form.

Rp Radix Gentianae min conc.
 Herb Centauri min conc pulv (No 40) SS 50,0
 Cort. Auranti fruct conc. 30,0
 Fruct Aurant. immat gr pulv
 Rhizom Zedoar min conc SS 17,0
 Spiritus diluti (60%) q s
 Man bereitet im Verdrängungswege 1000 ccm

Tinktur

III Austriaca.

Rp Radix Gentianae
 Folior Trifoli fibrin
 Herb Centauri min
 Cort Aurant fruct SS 10,0
 Natr carbonici crist 5,0
 Aquae Cinnamom spirit 500,0

Man digeriert 3 Tage, presst und füllt.

Tinctura amara acida

X. Formul Berolin et Colon.

Rp Acidi hydrochlorici (25%) 5,0
 Tincturae amarae 20,0

Dreimal täglich 15 Tropfen.

II. Münch Nosokom Vorsch.

Rp Acid hydrochlor dilut. (12,5%) 1,0
 Tinctur amarae
 Tinctur aromaticae SS 15,0

Tinctura amara composita.

Rp Tinctur amarae 40,0
 Tinctur Aurant cort.
 Tinctur Gentianae SS 20,0
 Tinctur Angelicae
 Tinctur Zingiberis SS 10,0

Tinctura amara viridis

Rp Tincturae amarae 100,0
 Anilini coerulei 0,02 vel q s

Tinctura Gentianae alcalina (Gall)
Teinture ou Alcoolé de Gentiane alcaline
Elixir amer de PEYRILHE Elixir anti-
scrophulosum PEYRILHE

Rp Radic. Gentian gr pulv 10,0
Natrii carbonici crist. 3,0
Spiritus diluti (60%) 900,0

Man macerirt 10 Tage, presst und filtrirt.

Tinctura Gentianae ammoniacalis
Elixir Gentianae DESCHAMPS Elixir
antiscrophulosum

Rp Extracti Gentianae 10
Ammonii carbonici 0,8
Aqua destillata 20,0
Spiritus diluti (60%) 75,0

Theelöffelweise

Tinctura Gentianae composita
Compound Tincture of Gentian.

I Britannica

Rp Radic. Gentian concis 100,0
Corticis Aurant. fruct. 3,5
Semin Cardamomi cont. 12,5
Spiritus (45 proc) 1000 ccm

Durch Maceration zu bereiten.

II United States

Rp 1. Radicis Gentian pulv No 40 100,0
2 Cortic. Aurantii fruct No 40 40,0
3 Fruct Cardamomi No 40 10,0
4 Spiritus (91% 600 ccm) q s
Aqua destillata 400 ccm

Man macerirt 1—3 mit 100 ccm von 4 24 Stunden
und sammelt dann im Verdrängungswege 1000
ccm Tinktur

Tinctura roborans

Rp Corticis Aurant. fruct 20,0
Corticis Quercus 20,0
Radicis Caryophyllatae 60,0
Radicis Gentianae 85,0
Spiritus diluti (70 Vol %) 700,0
Aqua Menthae pip 850,0.

Tinctura salina Halensis

Rp Cortic. Aurant. fruct
Radic. Gentianae 33 20,0
Kali carbonici 80,0
Aqua fervida 250,0

Nach dem Erkalten fügt man hinzu
Spiritus (90 Vol %) 100,0

Durch Digestion zu bereiten

Vinum Gentianae compositum

Vinum amarum Bitterwein Magenwein.

Rp Extracti Gentianae 20,0
Tincturae Aurant. cort. 50,0
Tincturae aromaticae 80,0
Vini Xerensis 900,0

Vet. Electuarium stomachicum
Appetitstärker für Pferde.

Rp Radic. Gentian. gr pulv
Phisom Calami " 33 100,0
Fruct Juniperi " 33 100,0
Fruct Carvi
Semin Foenugraeci " 33 50,0
Farinae Secalis 33 50,0
Semin Sinapis pulv 25,0
Syrupi communis q s

Vet. Kraft- und Reizpulver für Pferde

Rp Semin Strychni pulv 6,0
Ferri sulfurei 30,0
Radicis Gentian pulv 45,0
Pulver aromatici 15,0

Divide in part. XII.

Vet. Pulver gegen Hautpesteln HARVEY

Rp Radic. Gentianae pulv
Natrii hyposulfurici 33 90,0
Semin Lin pulv 60,0

Divide in part. XII

Vet. Pulvis cordialis

Poudre cordiale tonique Lebas (Gall)

Rp Radicis Gentianae pulv 250,0
Salis marini 125,0
Ferri oxydati (Capit. mort.) 25,0

Vet. Pulver gegen blaue Milch

Rp Radic. Gentianae gr pulv
Phisom Calami " "
Fruct Juniperi " "
Herb Absinthii " "
Ciculae albae " 33

Vet. Pulvis Equorum

I. Fresspulver für Pferde

Pp Radicis Gentian. gr pulv 500,0
Natrii sulfurici " 250,0
Natrii bicarbon " "
Natrii chlorati crudi 33 125,0

II. Pulver gegen Durchfall.

Rp Radicis Gentian gr pulv 140,0
Rhizom Calami " 100,0
Ciculae albae " 150,0
Fructus Juniperi " 100,0
Semin Strychni " 10,0

1—2 Esslöffel aufs Futter

Vet. Pulvis Porcorum

Fresspulver für Schweine

I

Rp Radic. Gentian. gr pulv 120,0
Subli sulfurati nigr
Rhizomat. Calami 33 200,0
Semin Foenugraeci
Sulfuris sublimati 33 160,0
Fructus Anisi
Fructus Foeniculi 33 80,0

II

Rp Stibii sulfurat nigr 50,0
Sulfur sublimat. 100,0
Kali nitrici 120,0
Kali sulfurici 80,0
Radic. Gentian. pulv 700,0

III Verfängpulver

Rp Stibii sulfurati nigr pulv
Tartari crudi pulv
Radic. Gentian. pulv 33 10,0
Semin. Lin 33 50,0
Natrii sulfurici sicc 40,0

Vet. Pulvis Vaccarum

Fresspulver für Kühe.

I

Pp Radic. Gentian. gr pulv
Semin Foenugraeci " "
Cortic. Chinae " "
Sulfuris sublimati " "
Folior Trifolii fibr " "
Rhizom Calami " "
Natrii chlorati crudi 33 100,0
Pulveris Herbar et Radic. 300,0

II

Rp Radicis Gentian gr pulv
Natrii bicarbonici venal 33 150,0
Natrii chlorati crudi 800,0
Natrii sulfurici sicc 400,0

Aquae Vitae Gentianae. Eau de vie de Gentiane Enzian Ein in verschiedenen Gebirgsgegenden aus der Enzianwurzel durch Gährung mit Zucker und nach herige Destillation, bisweilen unter Zusatz von Wermuth, Fenchel, Zimmt und anderer Gewürzen, hergestelltes Getränk

Bainsche Tropfen Eine Mischung aus Enzian-, Wermuth- und aromatischer Tinktur ää 15,0 mit Rhabarberwein q s bis zur schwachen Trübung

Bunsenliqueur von HENSEN in Mainz, gegen Fettleibigkeit, ist eine Tinktur aus Enzian, Sassa, Pomeranzen, Gutta, Pottasche und Salpysäure

Edelenzianwurzelsaft der Gebr. HAESELER ist ein über Enzianpflanzen destillirter Schnaps

Gall und Magentropfen, Königseer Entsprechen einer Mischung aus Lebenselixir, Bitterer Tinktur, Enzian- und Pomeranzenzinktur ää 10,0, Pottasche 0,3

Gesundheitsliqueur, Berliner, von EMIL THOIZ Ein Alos und Enzian enthaltender Schnaps

Hamburger Magenbitter oder Magen-Drops von F O WUNDERM Je 10 g Gewürz- und bittere Tinktur, 2 g Hoffmannstropfen, 12 Tropfen Pfefferminzöl

HELLOKING's Arabisches und Asiatisches Thierheilpulver von BITTNER & WILHELM 10 Th Enzian, 6 Th Glaubersalz, 2 Th Mergel, 2 Th Schwefel, wenig Wermuth

Lebensbalsam von SPURARIUS wird bereitet aus je 120 g Enzian- und Angelikawurzel, 80 g Kalmus, 580 g Alos, 100 g Rhabarber, 20 g Safran und 10 kg Franzbranntwein

Orientalisches Viehheil, von WALKOWSKI in Berlin 650 g Pulver aus Alaun, Glaubersalz, Kreide, Bockshornsamensamen, Kamillen, Sandelholz, Enzian, Roggenmehl

Schweizer Alpenkräuterbitter Je 125 g Enzian, Galgant, Wacholderbeeren, 60 g Angelika, je 30 g Thymian, Salbei, Baldrian, Kalmus, Zimmt

Stomachicum comp nennen BURROUGHS, WELLCOME & Co Tabletten mit einem Gehalt von je 7,5 Enzian- und Rhabarberaufguss, 0,324 Natriumbikarbonat, 0,003 Pfefferminzöl

Verdauungsliqueur von Prof AUG MULLER in Berlin Ein mit äther Oelen versetzter Enzianlikör

Mittel gegen Trunksucht Enthalten fast durchweg Enzian als Grundlage Das von MAX FALKEN BERG in Berlin 1) 318 g Enzianpulver, 2) 68 g Kalmuspulver (10 M) Von E FRANKE in Berlin Enzian- und Kalmuspulver (2 M)

HEYMAN in Berlin Auszug aus bitteren Drogen, besonders Enzian

KASER-GALLATI in Glarus 1) Enziantinktur, 2) 2,6 proc Lösung von Brechweinstein (12 M)

KELM in Berlin 30 Pillen aus Enzianpulver, Enzianextrakt und Spuren Eisenoxyd (8 M)

TH KÖNETZKI in Berlin Tinktur aus Alos, Rhabarber, Safran, Kalmus, Enzian, Lärchenschwamm (7 M, Gebrauchsanweisung dazu 10,50 M) „Karlsruh Ortsges Rath“

A. KRAHMER Ein Pulver aus Enzian, Süssholz und Eisen

W KRÖNIG in Berlin: 1) 2—300 Pillen aus Eisen, Enzian, Enzianextrakt 2) 40 g Pulver aus Kalmus und Enzian (6 M)

Dr OSKA in Stein-Säckingen 1) 70 g Enzianpulver, 2) 180 g Theemischung aus Enzian und Butterklee (12 M)

R. RETZLAFF in Dresden (Kräutermehl) ist Enzianpulver

Dr SCHULZE, Königl Preuss Oberarzt, Autographirte Recepte, welche lauten Fern carbon sacch, Extr Gentian, Rad Gentian ää 5,0 Mucil, q s, f pil 100 (1 Recept = 10 M)

A VOLLMANN in Berlin Pillen aus Enzianpulver und Enzianextrakt, dazu 40 g Enzianpulver (10 M).

II In Japan verwendet man wie Enzianwurzel die Wurzel von *Gentiana scabra* Bunge var. *a Buergeri* Max., in Nordamerika vielfach ebenso diejenige von *G. ochroleuca* Frol, in Indien die von *Gentiana Karrooa*.

Geranium.

Gattung der Geraniaceae — Geraniene.

I Geranium maculatum L. Heimisch in Nordamerika und den nördlichen und östlichen Staaten der Union. Verwendet wird das Rhizom *Cranesbill* (U-St.), *Alaunwurzel*. Dasselbe ist trocken von der Dicke einer Federspule, bis 10 cm lang, oft verzweigt, gebogen, knollig, langsrundlich, aussen dunkelbraun, innen heller. Wurzeln fast ausschliesslich an der Unterseite und den Seiten. Auf dem Querschnitt erkennt man ein breites Mark, wenige Holzbündel und das Cambium, die Rinde lässt eine radiale Streifung nicht erkennen. Aussen eine dünne Korkschicht. Im Parenchym reichlich Gerbstoff und Stärk.

Bestandtheile. Gerbstoff im Oktober 9,72 Proc, im April 27,88 Proc. Derselbe ist ein Glukosid.

Anwendung. Eines der in Amerika am meisten gebrauchten Adstringentien.

Extractum Geranii fluidum (U-St.) Fluid Extract of Geranium. Als 1000 g gepulvertem Geraniumrhizom (No 30) und einer Mischung von 100 cem Glycerin und 900 cem verdünntem Weingeist (41 proc) im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 350 cem, erschöpft zuerst mit dem Rest des Lösungsmittels, dann mit verdünntem Weingeist, fängt die ersten 700 cem für sich auf und bereitet L. a. 1000 cem Fluidextrakt.

II Geranium Robertianum L. lieferte früher *Herba Ruperti* & *sanguineum L.* lieferte *Herba* und *Radix Sanguinariae*.

III Indisches Geranium-Oel, vergl. *Andropogon* S 304.

Französisches, afrikanisches, spanisches, deutsches, Reunion-Geraniumöl wird von Arten der Gattung *Pelargonium* gewonnen, besonders *P capitatum* Ait, *P roseum* Willd, *P odoratissimum* Willd und zwar durch Destillation der Blätter. Sie enthalten als riechende Bestandtheile Geraniol, Citronellal und wahrscheinlich auch Linalool. Man verwendet die Oele in der Parfümerie.

Geum.

Gattung der Rosaceae — Rosoideae — Potentilleae — Dryadinae.

I Geum urbanum L. Heimisch in Europa, Asien und dem nordwestlichen Amerika (angeblich auch in Australien).

Verwendung findet das Rhizom *Radix* & *Rhizoma Caryophyllatae* *Radix Gall.* — Nelkenwurz. Benediktenwurz. Benedikten-Nägelnwurz — *Souche de benoit* (Gall.)

Beschreibung. Es ist über fingerlang, ringum bewurzelt, an dem verdickten oberen Ende mit Stengelresten, sehr hart. Der Querschnitt lässt ein sternförmiges Mark, einen gelblichen, von breiten Markstrahlen durchbrochenen Holzkörper und eine schmale Rinde erkennen. Im Parenchym Oxalatdrüsen. Frisch nach Nelken riechend, trocken geruchlos. Geschmack herbe und bitter.

Bestandtheile 42 Proc Gerbstoff (nach anderer Angabe 3 Proc), Bitterstoff, Stärke, 0,04 Proc ätherisches Oel, nach Nelken riechend.

Einsammlung. Im Frühjahr. **Anwendung.** Als Adstringens.

Tinctura Caryophyllatae wird aus 1 Th zerschnittener Nelkenwurz und 5 Th verdünntem Weingeist bereitet.

II Geum rivale L. liefert *Radix Caryophyllatae aquatica* (Water avens).

Ginseng.

I Die Ginseng-Wurzel. — *Radix Ginseng* *Radix Ninsi* stammt von *Panax Ginseng* C A Meyer (Araliaceae — Araliaceae), in China und Korea wild und kultivirt, in Japan, neuerdings auch in Nordamerika nur kultivirt.

Beschreibung. Die Wurzel ist weisslich, schlank rübenförmig, oben mit dem kopfartig abgesetzten Axenrest, nach unten in einige dickere Aeste getheilt, so dass eine entfernt menschenähnliche Gestalt zu Stande kommt. Die Wurzel erreicht die Dicke von 2,5 cm. Sie zeigt im Bau nichts Auffallendes, in der Rinde schizogene Sekretbehälter, die Stärke des Parenchyms ist verkleinert, da man die Wurzel gewöhnlich brüht, wodurch sie halb durchscheinend wird.

Bestandtheile. Panakolin $C_{24}H_{42}O_{11}$, von unbekanntem chemischen Charakter.

Anwendung. Die Droge geniesst in China einen ausserordentlichen Ruf als Universalmittel und speciell als Aphrodisiacum, zu dem vielleicht die menschenähnliche Gestalt der Wurzel Veranlassung gegeben hat. — Da die in Asien gewonnene Droge nicht den Bedarf deckt, so führt man aus Amerika die kürzere, runzlige, dicker rübenförmige Wurzel von *Panax quinquefolius* L. (*Radix Ginseng americana* — **Kraftwurzel** — **Red berry**) ein, die aber als weit weniger werthvoll gilt (Vergl. auch *Sanega*). Man kultivirt die Pflanze auch für diesen Zweck. Sie enthält einen wenig charakterisirten Körper Panquilon, der mit H_2SO_4 roth wird. Der echten Ginsengwurzel substituirt man zuweilen die Wurzel des in Korea heimischen *Sium Ninsi* L.

II In Nord-Amerika heisst die kuglige Wurzel von *Panax trifolius* L. **Dwarf Ginseng**.

Glechoma.

Gattung der Labiatae — Stachyoidae — Nepeteae.

Glechoma (Glechoma) hederacea L. Heimisch in Europa und dem nördlichen Asien, in Amerika verwildert. Kriechend mit eiförmig rundlichen, gekerbten Blättern. Blüten infolge von Gynodioecie gross- und kleinblüthig. Kelch 5zählig, die zweilippige Krone mit flacher Oberlippe, die Antheren der Staubblätter paarweise in ein Kreuz gestellt. Auf den Blättern kurze einzellige und mehrzellige Gliederhaare, ausserdem Drüsenhaare mit kleinerem, 1–2zelligem und solche mit grösserem, 8zelligem Kopf. — Das blühende Kraut liefert

Herba Hederacae terrestris (Erganzb.) — **Gundermann**. **Gundelrebe**. **Donnerrebe**. **Erdephen**. — *Lierre terrestre* (Gall.) — **Ground-ivy**.

Bestandtheile. Aetherisches Oel 0,06 Proc., Fettsäure bei 53°C schmelzend, 0,96 Proc., Kautschuk 0,38 Proc., Wachs 0,66 Proc., Glukose 2,49 Proc., Saccharose 0,40 Proc., Gerbstoff 2,64 Proc., Asche 15,90 Proc. etc. Das ätherische Oel ist von dunkelgrüner Farbe, sein spec. Gewicht ist = 0,925.

Einsammlung. Im April und Mai 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trocknes

Anwendung. Als Heilmittel ist Gundermann varaltet. In den Apotheken wird er als Hausmittel gefordert. In Amerika gegen Fieber, Brechreiz etc. verwendet.

Ptisana de follo Glechomae (Gall.) *Tisane de lierre terrestre*. Wie *Ptisana Buchu* (S 511) zu bereiten.

Sirupus de Glechoma (Gall.) *Sirup de lierre terrestre*. Wie *Sirupus Chamomillae* (S 716) zu bereiten.

Herbae hechilae.
Brust- und Lungenkräuter
 Rp *Herbae Hederacae terrestris*
Herbae Veronicae
Folior Fariinae
Radicle Liquiritiae
 Stipl. Dulcanar Σ 20,0.

Mixtura antitarrhalis GALLIOT.
 Rp *Infusi Hederacae terr* 200,0
Gummi Ammoniaci 2,0
Vitella ovis duor
Sirupi Aurantii flor 50,0
Extracti Opii 0,1
 Stündlich einen Esslöffel

	Potio pulmonalis GLOVER.	
Bp	Herb Hederæ terr	
	Fol Thææ Chinens	ss 100
	Florum Verbasci	50
	Rhizom Iridis flor	25
	Aquæ ferri	2250
Zur Schilfflüssigkeit fügt man hinzu		
	Sirupl Auranti flor	800
	Sirupl Balsami tolit	150
	Spiritus Sacchari (Rum)	800
	Tinctur Cinnamomi	10
In 24 Stunden zu verbrauchen		
	Species cruciatae Hispanicae	
	Spanischer Kreuzthée	
Bp	Fructus Amari stellati	
	• Foeniculi	ss 250
	• Amari vulgaria	200
	• Coriandri	100
	Cortic. Cinnamonom	250
	Cancrum siccant	500

Flor Rhoeados	80,0
Herb Hederæ terr	
• Hepaticæ	ss 1000
Fol Farinæ	80,0
Rhizom Chinæ	
• Galangæ	
• Calamæ	ss 50,0
• Indis flor	70,0
Radix Liquirit	600
• Sarsaparill	20,0
Rhizom Graminis	100,0
• Carici areæ	
Ligni Sassafras	
Fruct Ceratoniae	ss 500
Passular minor	50
Cornu Ceru raspat	70,0
Flor Chamomill Rom	1000
• Irunulæ	80,0
Wird in cylindrischen Packeten zu 90,0 und 450,0 g abgegeben.	

Glycerinum.

I Glycerinum (Anstr Brit Germ Helv U-St) **Glycérine officinale** (Gall). Glycerina. Oelsüss SCHEELE'sches Süß. Lipyloxydhydrat, Glyceryloxydhydrat. $C_3H_5(OH)_3$ Mol Gew = 92

Handelsorten. Das Glycerin wird in grossen Mengen bei der Verseifung der Fette mittels Aetzkalken (Saponifikationsglycerin) und bei der Spaltung der Fette mittels überhitzten Wasserdampfes zum Zwecke der Gewinnung der Fettsäuren gewonnen. Im Handel unterscheidet man 1) Roh Glycerin, das durch Verdampfen der Seifenlaugen gewonnene Glycerin, eine braune zähe Masse, welche noch stark verunreinigt ist 2) Raffinirtes Glycerin. Dieses ist aus dem Rohglycerin durch Behandlung mit Chemikalien (ohne Destillation) erhalten, z B wird es mit Baryumkarbonat zur Entfernung der Schwefelsäure, mit Oxalsäure zur Entfernung des Kalks behandelt und behufs Entfärbung über Kohle filtrirt. Diese Sorte kann zum pharmaceutischen Gebrauche nicht verwendet werden 3) Destillirtes Glycerin, welches durch überhitzten Wasserdampf überdestillirt worden ist. Diese Sorte wird, um sie farblos und blank zu machen, noch über Kohle filtrirt, abermals destillirt und stellt alsdann das Glycerin der Pharmakopöen dar.

Indessen sind die officiellen Sorten nicht absolutes, 100procentiges Glycerin, sondern sie enthalten wechselnde Mengen Wasser.

Eigenschaften A. Des absoluten Glycerins. Das absolute oder wasserfreie Glycerin ist eine farblose, dickflüssige, sehr hygroskopische Flüssigkeit vom spec Gew 1,269 — Es erstarrt, besonders wenn es häufigen Erschütterungen ausgesetzt wird, bei $-8^{\circ}C$ zu einer farblosen Krystallmasse. Die Krystalle sind sehr hygroskopisch und schmelzen bei $+20-21^{\circ}C$. Trägt man einen Glycerinkrystall in stark abgekühltes Glycerin ein, so erstarrt dieses sofort zu einer zusammenhängenden Krystallmasse. Im übrigen besitzt das absolute Glycerin die Eigenschaften des folgenden.

B. Die officiellen Glycerine. Diese sind, wie schon erwähnt, Glycerine mit verschiedenem Gehalte an Wasser. Dem entsprechend ist das spec Gewicht nach den verschiedenen Pharmakopöen ein verschiedenes.

	Anstr	Brit	Gall	Germ	Helv	U-St
Spec Gewicht bei $15^{\circ}C$	1,35	1,28	1,348	1,225—1,235	1,25—1,235	$> 1,25$
Gehalt an absolut Glycerin in Proe	98	96	90	84—87	85—87	> 95

Germ. Sirupartige, klare, farblose, geruchlose Flüssigkeit von eigenthümlich süßem Geschmack. Es lässt sich, ohne zu erstarren, auf $-40^{\circ}C$ abkühlen (wasserfreies Glycerin erstarrt bei $-8^{\circ}C$). Unter normalem Drucke siedet es unter theilweiser Zersetzung in Acrolein und Bildung von Polyglyceriden bei $290^{\circ}C$, unter vermindertem Drucke ohne

Zersetzung bei erheblich niedriger Temperatur, doch verdampft es schon bei 100° C nicht unbeträchtlich. Ebenso ist es mit Wasserdämpfen flüchtig, besonders leicht aber, wenn die selben überhitzt sind, s. Darstellung. Glycerin ist mit Wasser, Weingeist und Aetherweingeist in allen Verhältnissen mischbar, nicht mischbar dagegen ist es mit Aether, Chloroform, Benzin, Schwefelkohlenstoff, fetten und ätherischen Oelen. Glycerin ist nicht leicht entzündlich, doch sind seine Dämpfe brennbar, mittels eines Doctes kann man Glycerin in Lampen etc. brennen, die Glycerinflamme ist nicht leuchtend. Glycerin ist ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für viele unorganische und organische Stoffe. Es löst einige Metallhydroxyde, z. B. Bismuthhydroxyd, Kupferhydroxyd, verhindert daher deren Fällung durch atzende Alkalien aus den betreffenden Salzlösungen. Ferner löst es Phenole, Alkaloiden a. m.

Eine wichtige Eigenschaft des korn. Glycerins ist seine Eigenschaft, begierig Wasser aufzunehmen, es ist hygroskopisch. Darauf ist zurückzuführen der Umstand, dass unverdünntes Glycerin die Gewebe des thierischen Körpers (z. B. die Haut) reizt, weil es ihnen Wasser entzieht, ferner die Eigenthümlichkeit, dass Glyceringefäße sich immer feucht anfühlen, und dass beim Neigen derselben aus der Gegend zwischen Hals und Stopfen immer einige Tropfen stark verdünntes Glycerin abfließen. Auch seine Anwendung als Konservierungsmittel für anatomische Präparate ist darauf zurückzuführen, dass es den Geweben Wasser entzieht, somit Faulniss unmöglich macht.

Spec. Gewicht der Mischungen aus Wasser und Glycerin bei 12–14° C.
(nach Lenz)

Proc. Glycerin	Spec. Gewicht	Proc. Glycerin	Spec. Gewicht	Proc. Glycerin	Spec. Gewicht	Proc. Glycerin	Spec. Gewicht	Proc. Glycerin	Spec. Gewicht	Proc. Glycerin	Spec. Gewicht	Proc. Glycerin	Spec. Gewicht
100	1,269	85	1,229	71	1,191	57	1,150	43	1,112	29	1,074	15	1,037
99	1,266	84	1,226	70	1,188	56	1,148	42	1,110	28	1,071	14	1,034
98	1,263	83	1,223	69	1,185	55	1,145	41	1,107	27	1,068	13	1,032
97	1,261	82	1,221	68	1,182	54	1,143	40	1,104	26	1,066	12	1,029
96	1,258	81	1,218	67	1,179	53	1,140	39	1,101	25	1,063	11	1,027
95	1,255	80	1,215	66	1,176	52	1,137	38	1,098	24	1,060	10	1,024
94	1,253	79	1,212	65	1,173	51	1,134	37	1,096	23	1,058	9	1,022
93	1,250	78	1,210	64	1,170	50	1,132	36	1,093	22	1,055	8	1,019
92	1,247	77	1,207	63	1,167	49	1,129	35	1,090	21	1,052	7	1,017
91	1,245	76	1,204	62	1,164	48	1,126	34	1,088	20	1,049	6	1,014
90	1,242	75	1,201	61	1,161	47	1,123	33	1,085	19	1,047	5	1,012
89	1,239	74	1,199	60	1,158	46	1,121	32	1,082	18	1,044	4	1,009
88	1,237	73	1,197	59	1,155	45	1,118	31	1,079	17	1,042	3	1,007
87	1,234	72	1,194	58	1,153	44	1,115	30	1,077	16	1,039	2	1,004
86	1,231											1	1,002

Beim Ueberhitzen unter gewöhnlichem Druck zerfällt das Glycerin in Wasser und Akrolein. Diese Spaltung tritt besonders leicht ein beim Erhitzen von 1 Th Glycerin mit 2 Th Kaliumsulfat, worauf der qualitative Nachweis des Glycerins sich gründet. Durch Einwirkung von Schwefelsäure und Salpetersäure in der Kälte wird Glycerintrinitrat (Nitroglycerin) gebildet. Durch Erhitzen mit Kaliumpermanganat wird es zu Oxalsäure oxydirt.

Kaliumpermanganat, Chlorsäure, Chromsäure und ähnliche oxydirende Agentien wirken auf Glycerin sehr energisch, bisweilen unter Entzündung ein, man vermeidet es daher, diese Substanzen mit unverdünntem Glycerin zusammenzumischen.

Obgleich Glycerin eine sehr beständige Substanz ist, so lässt sie sich doch vergähren. Durch ein Ferment, welches dem Hau durch Wasser entzogen werden kann, vergährt eine wässrige Glycerinlösung zu Buttersäure, durch Bierhefe zu Propionsäure.

Prüfung. Das in den Apotheken vorrätig gehaltene Glycerin sollte vor allem sorgfältig auf seine physikalischen Eigenschaften geprüft werden, was um so nöthiger ist, als viel „künstlich appetirtes“ Glycerin in den Handel gelangt. Es sei farblos,

klar, blank, ohne Geruch, neutral und besitze das vorgeschriebene spec Gewicht Um auf Farblosigkeit zu prüfen, betrachte man das Glycerin in grosserer Schicht in einem weissen Glase, welches man auf eine weisse Unterlage stellt Es muss al-dann eben farblos aussehen Sorten, welche duster oder grünlich oder bläulich aussehen, sind ursprünglich gelbliche Sorten, welchen zur Verdeckung des gelben Farbtones ein blauer Farbstoff (Methylenblau oder Methylviolett) zugesetzt worden ist Die chemischen Prüfungen führt man wie folgt aus

1) Das mit einem gleichen Volumen Wasser verdünnte Glycerin sei gegen rothes wie gegen blaues Lackmuspapier (besser noch gegen Lackmustrinktur) indifferent (Alkalien, Säuren) 2) Wird 1 cem Glycerin mit 3 cem Zinnchloridlösung versetzt, so darf im Verlaufe einer Stunde eine Färbung nicht eintreten (Arsen, auf dessen Vorkommen im Glycerin HAGER, ferner E. JAHNS aufmerksam machte) 3) Man bereite eine Lösung von 10 Th Glycerin und 50 Th Wasser In 10 cem derselben sollen weder durch Schwefelwasserstoffwasser (Braunfärbung = Kupfer, Blei) noch durch Baryumnitratlösung (weisser Niederschlag = Baryumsulfat) oder Calciumchloridlösung (weisser Niederschlag = Calciumoxalat, von der zur Reinigung benutzten Oxalsäure herrührend) Aenderungen erzeugt werden Durch Silbernitratlösung soll höchstens opalisirende Trübung erfolgen, daher sind Spuren von Chloriden zuzulassen 4) Erhitzt man etwa 5 cem Glycerin in einem Schälchen aus Porcellan oder Platin zum Sieden und zündet die Dämpfe an, so verbrenne es vollständig bis auf einen dunklen Anflug, der bei stärkerem Erhitzen verschwindet Dieser dunkle Anflug lässt sich bei jedem Glycerin beobachten, weil bei dem Erhitzen eine geringe Zersetzung des Glycerins erfolgt. Reichliche, schwerverbrennliche Kohle wurde auf Kohlehydrate (Zucker) hinweisen, ein unverbrennlicher Rückstand wurde von anorganischen Salzen herühren, welche allerdings schon durch die vorübergehende Prüfung gefunden sein müssten 5) Vermischt man 5 cem Glycerin mit 5 cem Ammoniakflüssigkeit und 5 Tropfen Silbernitratlösung, so darf die Mischung bei gewöhnlicher Temperatur innerhalb 15 Minuten keine dunkle Färbung annehmen (Akrolein, Ameisensäure) 6) 1 cem Glycerin darf, mit 1 cem Natronlauge erwärmt, sich weder färben (gelbe bis braune Färbung = Traubenzucker) noch Ammoniakgeruch entwickeln (Ammoniaksalze), und mit verdünnter Schwefelsäure erwärmt einen unangenehmen ranzigen Geruch (nach niederen Fettsäuren, z. B. Buttersäure, Capronsäure, s. Darstellung) nicht abgeben — Versetzt man 1 cem Kupfersulfatlösung (1 = 20) mit 5 cem Glycerin und 5 cem Natronlauge, so erhalte man eine klare, tiefblaue Lösung, aus welcher sich beim Erhitzen rothes Kupferoxydul nicht abscheiden darf

Aufbewahrung. Wegen der schon erwähnten hygroscopischen Eigenschaften des Glycerins benutze man für die Standflaschen in der Officin Glasstopfen mit Rinnen Die Gefässe stelle man auf Porcellanteller Es empfiehlt sich, nach dem Gebrauche Hals und Stopfen sauber abzuwischen Will man ein Glycerinstandgefäss so abwischen, dass es sich nicht mehr feucht anfühlt, so muss dies mittels Spiritus geschehen — Sollte eine Filtration des Glycerins nöthig sein, so erfolgt dieselbe am besten in einer Wärme von 50–60° C, bei grösseren Mengen mit Hilfe eines Warmwassertrichters

Anwendung. Glycerin hat keine besonderen Heilkräfte Es wirkt allerdings gährungs- und fäulnisswidrig und hat die Eigenschaft, Fermente zu lösen und deren Wirkung zu konserviren Seine medicinische Anwendung verdankt es seiner Eigenschaft hygroscopisch zu sein und nicht einzutrocknen Aeusserlich benutzt man es namentlich als reizmilderndes, deckendes Mittel bei Erkrankungen der Haut, doch beachte man, dass unverdünntes Glycerin stark reizt Im Handverkaufe suche man daher zweckmässig am mit 80 Proc. Rosenwasser verdünntes Glycerin einzuführen Innerlich früher als Ersatz des Zuckers bei Diabetes, wo es aber heute durch das Saccharin und Dulcin verdrängt ist — Glycerin einschliessende Suppositorien sind seit 1838 im Gebrauch

In der Technik ist seine Verwendung eine ganz enorme Die grössten Mengen werden verbraucht zum Füllen der Gasuhren und zur Dynamitfabrikation. Mit Bleioxyd giebt Glycerin einen allmählich erhärtenden Kitt.

SARG's Glycerin Price-Patent-Glycerin sind sehr reine Sorten eines konzentrierten Glycerins und angeblich (!) aus kristallisiertem Glycerin hergestellt

Glycerin-Suppositorien Die Verwendung der Glycerin Suppositorien beruht auf der Erkenntnis, dass die Einführung von 1—2—3 g konzentriertem Glycerin in den Mastdarm, wahrscheinlich infolge der wasserentziehenden Wirkung des Glycerins, peristaltische Bewegungen des Dickdarms auslöst, welche zu einer Stuhlentleerung führen. Man hat versucht, das Glycerin zu diesem Zweck in verschiedene Formen zu bringen.

Kakaobutter Suppositorien mit Glycerin Boas hat zuerst die SAUREN'schen Deckelzapfen aus Kakaobutter mit Glycerin gefüllt und in dieser Form angewendet. Diese sind später von LUTZE vervollkommenet worden. Die vollkommensten Suppositorien dieser Art sind die von KUMMER, welche besonders dünne Wandungen haben, so dass ein rasches Schmelzen der Kakaobutter und ein rascher Erguss des Glycerins erfolgt. Zur Herstellung der Hohl-suppositorien aus Kakaobutter (welche käuflich bezogen werden können) bedarf es besonderer Suppositorien Pressen.

Glycerin-Suppositorien mit Seife Zuerst von E. DIETBEICH dargestellt. 1) **Dietrich** 10 Th besonders harter dialysirter Stearinsäure werden in heissem Wasser gelöst, die Lösung mit 90 Th Glycerin vermischt und im Dampftrichter filtrirt. Das Filtrat wird auf 100 Th eingedampft und in Formen gegossen. 2) **Suppositoria cum Glycerino** (Hamb. Vorsch.) 9,5 Th Sapo medicatus werden im Wasserbade in 90,5 Th Glycerin unter Verminderung der Schaumbildung gelöst und die Masse kurz vor dem Erkalten in Formen gegossen. 3) **Suppositoria Glycerini** (U. St.) Man löst unter Erwärmen 3 Th krystall. Natriumkarbonat in 60 Th Glycerin, fügt 5 Th Stearinsäure hinzu und giesst, nachdem die Verseifung erfolgt ist und die Kohlensäureentwicklung aufgehört hat, die halb erkaltete Masse in Formen.

Glycerin-Gelatine-Suppositorien. Von HECK empfohlen. 1 Th Gelatine, 1 Th Wasser, 3—4 Th Glycerin. Man lässt die Gelatine mit dem Wasser quellen, giebt das Glycerin zu, dampft auf 5 bzw. 6 Th ein und giesst in Formen. Diese Suppositorien sind elastisch und müssen vor der Einführung mit etwas Glycerin oder Oel bestrichen werden.

Enule heissen von BURROUGS WELLCOME & Co London in den Handel gebrachte Glycerin Rectal Suppositorien. Dieselben bestehen aus 95 Proc Glycerin und 5 Proc Seife.

Mikroklysma Die mit ODTMANN's Purgatif erzielten günstigen Erfolge führten schliesslich zu der Erkenntnis, dass die Einführung von 4—5 g Glycerin per rectum bei Erwachsenen, von 2—3 g bei Kindern genüge, um Stuhlentleerung zu erzeugen. Seitdem bezeichnet man die Applikation solcher Glycerinmengen per clyisma als „Mikroklysma“. Man führt das Glycerin mittels einer kleinen Zinnspritze ein.

Ediromy. Universalmittel gegen Hämorrhoidalleiden und Verstopfung von ver. Frau Dr. LASKOWSKA-Breslau. Lösung von 0,5 Extractum Belladonnae in 100,0 Glycerin. Die Anwendung erfolgt als Clyisma mittels einer beigegebenen Zinnspritze. B. FISCHER.

HAGGARD's Stoolpromotor. Rp. Corticis Frangulae 10,0, Kali carbonici 3,0, Natrii chlorati, Natrii sulfurici aa 2,5, Olei Anisi gtt V, Spiritus Vin 50,0, Aquae destillatae 200,0. Man digerirt 2 Tage, filtrirt und setzt zu Glycerini q s ad 1 Liter. Zum Mikroklysma 4,0 g für Erwachsene, 2—3,0 g für Kinder.

ODTMANN's Purgatif, ein Mikroklysma, dessen wahre Zusammensetzung noch nicht feststeht. Nach dem Fabrikanten sollen die Flindestrikte von Allium, Frangula, Nicotiana den Hauptbestandtheil ausmachen. Diese Angaben sind bestimmt falsch. Nach GOLDENSTEDEN-BEZZING soll es nichts anderes als rohes Glycerin sein.

II †† Nitroglycerinum Glycerinum trinitricum. Glycerintrinitat. Glonoin. Angioneurosin. $C_3H_5(NO_3)_3$. Mol. Gew. = 227

Unter dem wissenschaftlich unzutreffenden Namen „Nitroglycerin“ wird der neutrale Salpetersäure-Ester des Glycerins verstanden.

Darstellung. Man mischt 100 Th. wasserfreies Glycerin mit 3 Th. Schwefelsäure (von 66° B) und trägt diese Mischung allmählich in kleinen Portionen (!) in ein erkaltetes und durch sorgfältige Kühlung mittels Eis stets kalt gehaltenes Gemisch von 280 Th. Salpetersäure (48° B) und 300 Th. Schwefelsäure (66° B) ein. Nach dem jedesmaligen Eintragen einer Portion der Glycerinmischung mischt man die Reaktionsflüssigkeit durch sanftes Schwenken gut durch. Nach dem Eintragen der letzten Portion wartet man 10—15 Minuten und giesst dann das Reaktionsgemisch in sein sechsfaches Volumen kaltes

Wasser Das gebildete Nitroglycerin scheidet sich als schweres Oel ab Es wird solange mit destillirtem Wasser gewaschen, bis es keine saure Reaktion mehr zeigt Als dann wird es gesammelt und im luftverdünnten Raume über Schwefelsäure bis zur Entfernung jeder Spur von Feuchtigkeit getrocknet

Die Darstellung kleinerer Mengen von 20–30 g, wie sie für den pharmaceutischen Gebrauch erforderlich sind, ist mit Gefahr nicht verbunden, wenn man die angegebenen Bedingungen einhält Wesentlich ist namentlich, dass man für ausgezeichnete Kühlung Sorge trägt — Das Auftreten massenhafter rothbrauner Dämpfe zeigt an, dass die Salpetersäure oxydirend wirkt und in diesem Falle kann leicht freiwillige Explosion erfolgen, welcher man durch gute Kühlung oder durch Zugabe von viel (!) Wasser vorzubeugen haben wurde

Eigenschaften. In reinem Zustande ist es eine völlig farblose, ölige, geruchlose Flüssigkeit Erwärmt jedoch besitzt es einen stechenden Geruch, im Geschmack nähert es sich dem Glycerin, schmeckt aber etwas pikanter wie dieses 1 g löst sich in etwa 800 cem Wasser, in 4 cem absolutem Alkohol oder in 10,5 cem Spiritus (0,846) In jedem Verhältniss ist es löslich in Aether, Chloroform, Eisessig, wenig oder gar nicht löslich da gegen in Glycerin Auch in fetten Oelen ist es nicht unbeträchtlich löslich Das spec Gew beträgt 1,60

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Nitroglycerins ist seine leichte Zersetzlichkeit Durch Schlag, Stoss oder plötzliches Erwärmen auf etwa 200° C explodirt es mit ungeheurer Gewalt Bei – 20° C erstarrt es in langen Nadeln, in diesem festen Zustande explodirt es noch leichter als im flüssigen

Indessen kommt es auch vor, dass Nitroglycerin ohne wahrnehmbare äussere Ursache, also freiwillig explodirt In der Regel schreibt man diese freiwilligen Zersetzungen der mangelhaften Reinheit der Präparate zu Aus diesem Grunde empfiehlt es sich das Nitroglycerin in den Apotheken überhaupt nicht im unverdünnten Zustande, sondern in alkoholischer oder ölgiger Lösung (mit Mandelöl) im Verhältniss 1 10 oder 1 100 vorrätig zu halten

Prüfung Es sei farblos, in der Kälte geruchlos Wasser, welches mit Nitroglycerin geschüttelt wurde, reagire nur schwach sauer und gebe mit Baryumchlorid keinen Niederschlag (Schwefelsäure)

Aufbewahrung Niemals in Substanz, sondern stets nur in alkoholischer oder ölgiger Lösung (mit Mandelöl) Die Lösungen sind vor Licht geschützt an kühlem Ort sehr vorsichtig aufzubewahren


Anwendung. Nach HAY ist die Wirkung des Nitroglycerins darauf zurückzuführen, dass es im Organismus unter Abspaltung von salpetriger Säure zerlegt wird Es soll dem Amylnitrit und dem Natriumnitrit analog, aber viel intensiver und nachhaltiger als das erstere wirken Man giebt es in Dosen von 0,0002–0,0008–0,001, am besten in Pastillenform THUSSZWISSCH macht von Nitroglycerin, für welches er den Namen Angio-neurosin vorschlägt, einen sehr ausgedehnten Gebrauch Er empfiehlt es bei Angina pectoris, Migräne, Neuralgien, Seekrankheit, einigen Formen von Anämie, besonders des Gehirnes Man beginnt mit ganz kleinen Dosen, z B einem halben Tropfen einer 1 proc Lösung und steigt, bis der Patient das Gefühl von Blutandrang, Schwere oder Pulsation im Kopfe hat So kann man bei Gewöhnung an das Mittel allmählich auf 5–10 Tropfen der 1 proc Lösung steigen

Tablettae Nitroglycerini. Nitroglycerin-Tabletten. Man löst 0,1 g Nitroglycerin in Aether und mischt diese Lösung gut mit 180 g Chokoladenpulver und 70 g Gummi arabicum ply Nach dem Abdunsten des Aethers bildet man mit Wasser eine Pastillmasse und formt daraus 200 Pastillen, deren jede 0,0005 Nitroglycerin enthält

III Dichlorhydrin α -Dichlorhydrin. $C_2H_4Cl_2O$. Mol Gew. = 129.


Entsteht durch Erwärmen von wasserfreiem Glycerin mit der $2\frac{1}{2}$ -fachen Menge Chlorschwefel im Kochsalzbade während mehrerer Stunden $C_2H_4O_3 + 4SCl = C_2H_4Cl_2O + 2HCl + SO_2 + 3S$ Die Verbindung wird von der chemischen Fabrik H FLEMING in

Kalk bei Köln a/Rh dargestellt Farblose und fast geruchlose Flüssigkeit von etwas trüper Konsistenz, in etwa 10 Volumen Wasser löslich Spec Gew = 1,396 bei 16° C Siedepunkt 176--177° C



Das Dichlorhydrin ist ausgezeichnet durch ein hohes Auflösungsvermögen Es löst z B Kopal und andere harte Harze schon in der Kälte, fein gepulverten Bernstein in der Wärme, desgleichen sehr leicht Nitro Cellulosen Da es ausserdem bei den gewöhnlichen Arbeitstemperaturen nicht leicht entzündlich ist, so lässt sich voraussehen, dass es demnächst in der Technik eine Rolle zu spielen berufen ist. Zur Zeit ist es noch nicht aus dem Versuchsstadium heraus

IV Epichlorhydrin $\text{C}_2\text{H}_5\text{ClO}$. Mol Gew = 92,5



Die Verbindung entsteht, wenn man das vorher besprochene Dichlorhydrin mit etwa der Hälfte gepulvertem Natronhydrat nicht über 130° C erhitzt und wird wie das vorige von H FLEMING in Kalk dargestellt

Farblose, etwas chloroformähnlich riechende, leicht bewegliche Flüssigkeit Spec Gew = 1,191 bei 15° C Siedepunkt 117° C Auch diese Verbindung zeichnet sich durch ein hohes Lösungsvermögen gegenüber Harzen, Nitro Cellulosen u. dergl aus Von seiner künftigen Verwendung gilt das für das Dichlorhydrin Gesagte

V Unguentum Glycerini (Austr Germ Helv) 1) Austr 4 Th Stärke werden mit 60 Th Glycerin gemischt und im Dampfbade allmählich erwärmt, bis eine durchscheinende Masse entstanden ist 2) Helv Aus 7 Th Stärke und 93 Th Glycerin in gleicher Weise wie Austr zu bereiten 3) Germ Man mischt 10 Th Weizenstärke mit 100 Th Glycerin und 15 Th Wasser, dann setzt man eine Anreibung von 2 Th feinem Tragantpulver und 5 Th Spiritus (90 Vol Proc) hinzu und erhitzt im Wasserbade, bis eine gleichmässige Gallerte entstanden ist **Glycerinum Amyli** (Brit) Amyli 20,0, Glycerini 180 cem, Aquae 80 cem, wie Austr zu bereiten **Glyceritum Amyli** (U-St) Amyli 10,0, Aquae 10,0, Glycerini 80,0, wie Austr zu bereiten

Antifenssterschweiss. Glycerini 1,0, Spiritus diluti (60 Proc) 10,0 Parfum ad libitum

Antisudorin Gemisch aus Salicylsäure, Borsaure, Citronensäure, Glycerin, Spiritus dilutus und Aetherarten

BRIDGEMAN'S Handbalsam. Mischung von Glycerin, Perubalsam und Melissengeist, gegen aufgesprungene Hände und zur Pflege der Hände B FISCHER

Brillantine Toilettenmittel I Glycerini 10,0, Spiritus, Aquae destillatae aa 100,0, Parfum ad libitum II Olei Ricini 6,0, Saponis medicati 2,0, Benzoes pulv 2,0, Spiritus 200,0, Olei Rosae gtt 1

Brillantina, Mittel, um den Narben des Oberleders geschmeidig zu machen Aquae 1000,0, Sacchari 200,0, Spiritus 500,0, Glycerini 1000,0

Crème Iris Toilettenmittel Borax 0,5, Talci veneti 2,0, Zinci oxydati 10,0, Unguenti Glycerini 87,5, Tuberosenextrakt q s B FISCHER

Glycelaeum. GROVES Eine aus 1 Theil Furfur Amygdalarum, 2 Th Glycerin und 6 Th Oleum Olivarum hergestellte Paste, als Verbandmittel und Salbengrundlage empfohlen.

Glycerin-Gelatine zum Einschliessen mikroskopischer Präparate nach KAISER Man weicht 1 Th Gelatine in 6 Th. Wasser ein, giebt 7 Th Glycerin zu, in welchem 0,14 Th konc Karbolsäure gelöst ist, und löst durch Erwärmen im Wasserbade Man filtrirt durch Glaswolle, welche kurz vorher mit heissem Wasser ausgewaschen ist

Glycerin-Jelly. Glyceringallerte für die Hände (engl Specialität) 8,5 Gelatine werden in 180,0 Rosenwasser eingeweicht Man löst im Dampfbade, lässt erkalten, setzt den Schnee von 20,0 Erweiss hinzu und erhitzt wieder Die nach dem Absetzen durchgeseigte Flüssigkeit wird mit einer Lösung von 0,75 Salicylsäure und 180,0 Glycerin versetzt, um Heisswassertrichter filtrirt und mit Rosenöl parfümirt

Glycerin-Kerzen 5 Th. Gelatine, 20 Th Wasser, 25 Th Glycerin Der warmen Lösung fügt man zu eine Lösung von 2 Th Tannin und 10 Th Glycerin, erwärmt bis zur Klärung und giesst in Kerzenformen mit Docht aus Diese Kerzen sollen wie Stearinkerzen, auch geruchlos, verbrennen (?)

Glycerinnmilch Man versteht hierunter entweder eine Lanolin Glycerin Emulsion, oder eine Mischung von etwa 3,0 g Zinkoxyd, dem Weissen von einem Ei, 70,0 g Glycerin und Wasser q s ad 100,0 g Oder auch eine Mischung von Starke, Zinkoxyd und Glycerin

Glycerin-Pomade Adipis 6 kg, Sibi taurini 1 kg, Glycerini 300,0, Cerae flavae 100,0, Olei Ricini 100,0, Olei Citri 128,0, Olei Bergamottae 60,0, Olei Caryophyllorum 40,0

Glycerin-Sichel Französische Specialität, Toilettenmittel Eine parfümierte Mischung aus gleichen Theilen Glycerin und Liqueur

Glycerinum sulfurosus — SCHOTTEN Ein mit schwefeliger Säure gesättigtes Glycerin Wird durch Einleiten von schwefeliger Säure in eine Mischung von 90 Th Glycerin und 10 Th Wasser erhalten Es soll 10 Proc SO_2 enthalten

Glycerinum Vitelli (Glyconin-Sichel) Rp Vitelli Ovi 45,0 g, Glycerini 55,0

Misce

Glysapolum — GÖLNER Mischung aus Seife, Glycerin, Paraffin, Citronensäure und Alkohol gegen Seborrhoea capitis

Kali-Crème. Farblose, mit Rosenöl parfümierte Flüssigkeit aus Wasser 60,7, Glycerini 37,1, Natrii carbonici anhydrici, Kali carbonici aa 2,2 B. F. L. C. H. E. R.

Levorin, ein Kosmetikum Tragacanthae 15,0, Glycerini 100,0, Acidi salicylici 1,0, Spiritus q s ad solutionem Aquae fervidae 400,0 Man bereitet durch Erhitzen unter Umrühren eine Salbe und parfümiert diese mit Jasmin und Maiglöckchen

Mikrobmort. Mischung aus Glycerin und Karbolsäure aa

Mittel gegen schweißige Hände Boracis, Acidi salicylici aa 15,0, Acidi borici 5,0, Glycerini, Spiritus diluti aa 60,0 Dreimal täglich einzurubben

Oculustro Mittel gegen das Beschlagen der Brillengläser Ist eine Olein-Kahiseife mit 30 Proc Glycerin und etwas Terpentinöl

Simson's Lotion gegen Taubheit Ist Glycerin mit geringem Zusatz von Alkohol und Aether

Stempelkissen. Flüssigkeit zum Befechten derselben Gummi arabici 250,0, Aquae 150,0, Glycerini 350,0, Succi Sacchari 250,0 In 500 g dieser Flüssigkeit löst man 50,0 g einer wasserlöslichen Anilinfarbe

Styroglycerit, gegen aufgesprungene Hände Tincturae Benzoes compositae 4,0, Glycerini 8,0, Saponis kalini 1,0, Aquae Rosae 16,0

Glycerinum Acidi tannici (U-St.)

Rp Acidi tannici 20,0
Glycerini 80,0

Glycerinum cosmeticum

Rp Tincturae Benzoes 0,5
Aquae Rosae 1,0
Spiritus 8,5
Glycerini q s ad 80,0

Zum Einreiben der Haut nach jedemmaligem Waschen

Glycerinum Jodatum causticum HERRA.

Rp Jodi
Kali jodati aa 25,0
Glycerini 50,0

Glycerinum lacto-carbolicum Dr BOIER

Rp I II III
Acidi carbolicus 1,0 2,0 5,0
Acidi lactici 2,0 4,0 10,0
Glycerini 20,0 20,0 20,0

Zu Atzungen bei Kehlkopf- und Tuberkulose

Glycerinum saponatum 80%.
(Form Colonensis)

Rp Glycerini 80,0
Saponis stearinici 20,0

Dient als Grundkörper Frisch zu bereiten,

Glycerinum saponatum cum Acido salicylico

(Form Colonensis)

Rp Glycerini saponati (80%) 65,0
Acidi salicylici 5,0

Glycerinum saponatum cum Acido salicylico et

Resorcino (Form Colonensis)

Rp Glycerini saponati (80%) 80,0
Acidi salicylici 5,0
Resorcini 5,0

Glycerinum saponatum HERRA

Rp Saponis Coccolis 10—20,0
Glycerini 80—90,0

Werden im Dampfbade gelöst und in Formen gegossen.

Glycerinum stearicum

Rp Saponis stearinici 8,0
Glycerini 21,0

Seife balneo vaporis

Glycerinum Bismuti (Nat. Form.)

Liquor Bismuti concentratus

Rp 1 Bismuti Ammonii citrici 275,0
2 Liquoris Ammonii caustici
(sp G = 0,901) q s
3 Glycerini 500 ccm.
4 Aquae q s ad 1 Liter

Man reibt 1 mit 350 von 4 und 250 von 3 an, giebt von 2 soviel hinzu, dass Auflösung erfolgt und eine neutrale Flüssigkeit entsteht Dann setzt man den Rest von 3 und von 4 q s zu 1 Liter hinzu.

Glycerinum Gelatinae.

Rp Gelatinae albae 50,0
Glycerini 4,0
Aquae 64,0
Acidi carbolicus 1,0

Amerikanisches Mittel auf Brandwunden

Linimentum Plumbi cum Glycerino BOEHLER

Rp Talci pulverati
Amyli aa 100,0
Glycerini 40,0
Aquae Plumbi q s

ut fiat pasta Gegen trockene, stark juckende Ekzeme

Pasta Glycerini cum Acido acetico

Rp Glycerini 5,0
Acidi acetici diluti (30 Proc.) 7,0
Kaolini 9,0

Sirupus antiphthitiscus FREMY

Rp Sirupi Ferri jodati (0,5 Proc.)
Glycerini puri aa 100,0
Sirupi Morphini 200,0

Sirupus antiphthiticus LACOURD			
Rp	Glycerini	100,0	
	Aquae destillatae	50,0	
	Olei Menthae piper. gttss	v	

Unguentum Boroglycerini			
Boroglycerinsalbe (Hamb V)			
Rp	Lenolui	50	
	Acidi borici	100	
	Glycerini	250	
	Unguenti Paraffini	600	

Glycyrrhiza.

Gattung der Papilionaceae — Galegeae — Astragalinae.

Glycyrrhiza glabra L. Heimisch im Mittelmeergebiet, in Südosteuropa und Vorderasien, kultiviert in Spanien, Südfrankreich, Italien, England, Deutschland, Mähren, Russland, China etc. Für den Handel sind besonders die Kulturen in Spanien und in Russland (Wolgadelta, Batum) von Bedeutung. Die Pflanze ist in den oberirdischen Theilen krautig, die Wurzel ausdauernd, mit zahlreichen fingerdicken, langen Ausläufern, die schuppige Niederblätter tragen, aus deren Achseln neue Schösslinge entstehen. Blätter unpaarig 5—8fach gefiedert, die Fiedern oval, stachelspitzig. Blüthentrauben kürzer als die Blätter. Hülsen meist viersamig, kahl. Die Pflanze bildet mehrere Varietäten, von denen die folgenden wichtig sind: α) *typica* Regel et Herder, liefert das spanische Süßholz, β) *glandulifera* Regel et Herder, drusig behaart, liefert das russische Süßholz, ist auch sonst am meisten kultiviert. Man sammelt die Droge meist von dreijährigen Pflanzen, die russische besteht ziemlich gleichmässig aus Ausläufern und Wurzeln, sie kommt geschält in den Handel, die spanische und die meisten anderen so gut wie ausschliesslich aus Ausläufern.

I Radix Liquiritiae (Germ. Helv. Austr.) **Glycyrrhizae radix** (Brit.) **Glycyrrhiza** (U-St.) **Radix Glycyrrhizae echinatae s. Russica.** — Süßholz. Russische oder geschälte Süßholzwurzel. — Racine de réglisse. Réglisse ratissée (Gall.) — Liquorice Root (Brit. U-St.)

Germ. schreibt vor die geschälten Wurzeln und Ausläufer von *Gl. gl. β glandulifera*. Helv. ungeschälte Ausläufer von *Gl. glabra* aus Spanien und geschälte Wurzeln aus Russland von *Gl. glabra β glandulifera*. Austr. ungeschälte Wurzeln von *Gl. glabra* und geschälte von *Gl. echinata* (?) als Rad. Liquirit. mund. Brit. geschälte Wurzeln und Ausläufer von *Gl. glabra*. U-St. ungeschälte Wurzel von *Gl. glabra β* und geschälte von *var. glandulifera*. Gall. Wurzel und Rhizom (Ausläufer) von *Gl. glabra*.

Beschreibung. Die Pflanze besitzt einen bis 10 cm dicken Wurzelkopf, der oft noch die Reste der Stengel trägt und nach unten die wenig verzweigte, am oberen Ende mehrere cm dicke Wurzel hat. Sie sowohl wie die 1—2 cm dicken, geraden Ausläufer sind graubraun, runzlig, im Querschnitt gelb, strahlig, im Holz mit deutlich erkennbaren Gefässen. Bruch ziemlich faserig. Die Ausläufer haben ein deutliches Mark, das den Wurzeln fehlt, deren Holz auch etwas weniger dicht wie das der Ausläufer ist. — Die ungeschälte Droge besteht zu ausserst aus einer dünnen Korkschicht, die 10—25 Zelllagen dick ist, an die sich ein wenigzelliges Phelloderm schliesst. In dem folgenden Parenchym Einzelkrystalle aus Oxalat, die von einer Membran umschlossen sind, sie finden sich auch sonst im Parenchym der Droge. Dasselbe gilt für die Stärke, deren Körnchen rundlich, spindelförmig, meist einzeln, seltener zu zweien zusammengesetzt sind. Sie messen meist 2,5—20,0 μ , selten bis zu 30 μ . Die Innenrinde besteht aus breiten Markstrahlen, deren Zellen gross und radial gestreckt sind, in den Baststrahlen derselben fallen die reichlichen Siebröhren auf, die schon in geringer Entfernung vom Centrum zusammengepresst, dicke, im allgemeinen radial verlaufende Stränge bilden. Ferner fallen Bündel stark verdickter, geschichteter Fasern auf, die von Oxalatzellen umkammert sind. Dieselben Faserbündel finden sich im Holz, dessen Gefässe einen Durchmesser von 25—170 μ haben, ihre Wände haben leiter- oder netzförmige Verdickung oder rombsisch-spaltenförmige Tupfel (Fig. 260).

Für den Nachweis von Süßholz im Pulver kommen in Betracht: Die Stärkekörnchen, die reichlichen Oxalathkrystalle und deren Bruchstücke, dann die Fasern, deren Schichtung auch in der Längsansicht deutlich ist, und die Bruchstücke der Gefäßwandungen. Ob ein Pulver aus spanischem oder russischem Süßholz hergestellt ist, entscheidet sich durch die Anwesenheit oder Abwesenheit der Korkzellen, da das erste ungeschält, das zweite geschält in den Handel kommt.

Bestandtheile. 6,0–7,0 Proc. (nach Tschirch 2,5 Proc.) Glycyrrhizin, das saure Ammonsalz der Glycyrrhizinsäure (s. dort), 1,25 Proc. Asparagin, Zucker, Mannit, Farbstoffe, 1,65 Proc. Harz, 3,26 Proc. Proteinstoffe, 6,18–7,58 Proc. Asche. Extraktgehalt des spanischen Süßholz 15,3 bis 27,2 Proc., des russischen 26,4–88,5 Proc.

Zubereitung. Aufbewahrung. Man hält die geschälte, ganze Wurzel, welche im Handverkauf öfter als „Süßholz in Stangen“ verlangt wird, in ausgesuchten, dünneren Stücken vorrätig. Für Theemischungen ist die von den Drogisten in □ Stücken gelieferte, aus sorgfältig nachgeschälter Wurzel hergestellte Speciesform wegen ihres sauberen Schnittes zu empfehlen. Das feine Pulver wird, da die faserige Wurzel sich im Mörser nur schwierig pulvern lässt, am besten aus zuverlässiger Quelle gekauft. Etwaige Verfälschungen sind durch das Mikroskop und durch Einäschern leicht nachzuweisen. Man bewahrt die Wurzel an einem trockenen Orte, das feine Pulver in dicht verschlossenen Gefäßen auf. 100 Th. geschälte Wurzel liefern etwa 90 Th. Pulver.

Anwendung. In Theemischungen oder im Aufguss bei Husten und katarrhalischen Leiden (Säuren, Alkaloide und deren Salze sind dabei zu vermeiden), auch als geschmackverbesserndes Mittel. Das Pulver dient als Bindemittel zu Pillenmassen.

Radix Liquiritiae ammoniata, ammoniirtes Süßholz nennt X. LINDERER eine in Species- oder Pulverform mit Ammoniakgas behandelte Süßholzwurzel, bei welcher der süße Geschmack besonders stark hervortreten soll.

Extractum Liquiritiae (Austr.). Extr. Liquiritiae Radicis (Ergänz.). Extr. Glycyrrhizae (Brit.). — Süßholzextrakt. — *Extrait de réglisse* (Gall.). — *Extract of Liquorice*. (Ergänz.): 1 Th. grob zerschnittenes Süßholz wird 48, dann nochmals 12 Stunden mit je 5 Th. Wasser ausgezogen, die Pressflüssigkeiten aufgekocht, auf 2 Th. eingedampft, mit kaltem Wasser verdünnt, filtrirt und zum dicken Extrakt eingedampft. — Austr.: Aus zerstoßenem Süßholz wie Extr. Gentianae Austr. (S. 1213) zu bereiten. — Brit.: 1 Th. gepulvertes Süßholz (No. 20) wird 24, dann 6 Stunden mit je 2,5 Th. Wasser ausgezogen, die Pressflüssigkeiten aufgekocht und zu einem weichen Extrakt eingedampft. — Gall.: Wie Extract Gentianae Gall. (S. 1213). — E. DIERCKHOF lässt 1 Th. geschnittenes Süßholz grob pulvern, 12 Stunden mit 3 Th. kaltem, dann 1 Stunde mit 2 Th. heissem Wasser ausziehen, die Auszüge durch $\frac{1}{2}$ stündiges Kochen mit Filtrirpapierabfall klären, sonst wie Ergänzb. — Braungeb., in Wasser klar löslich. Ausbeute etwa 25 Proc., nach E. DIERCKHOF bei spanischer Wurzel 20–25, bei russischer 35–38 Proc.

Extractum Glycyrrhizae fluidum (U-St.). Extr. Liquiritiae ammoniatum. Süßholz-Fluidextrakt. Fluid Extract of Glycyrrhiza. Aus 1000 g gepulvertem Süßholz (No. 40) und einer Mischung von 50 com Ammoniakflüssigkeit (10 proc.), 800 com




Fig. 260. Querschnitt durch Radix Glycyrrhizae (Nach ARTHUR MEYER.)

p Parenchym der Rinde. s Siebröhren. f Fasern. m Libriformfasern im Holz. o Oxalathkrystall. c Cambium. pv Holzparenchym. g Gefäß.

Weingeist (91 proc) und 650 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 350 ccm, erschöpft zuerst mit dem Rest des Lösungsmittels, dann mit q s einer Mischung von 800 ccm Weingeist und 650 ccm Wasser, fängt die ersten 750 ccm Perkolat besonders auf und stellt 1 a 1000 ccm Fluidextrakt her — Man braucht etwa 3000 Th Lösungsmittel — E. DIETZSCH setzt dem zweiten Auszuge vor dem Eindampfen 80 Th Ammoniakflüssigkeit zu.

Extractum Glycyrrhizae liquidum (Brit.) **Liquid Extract of Liquorice**. Man verfährt genau wie bei **Extr. Glycyrrhizae** (Brit.) angegeben, dampft aber die Pressflüssigkeiten nur bis zum spec Gew von 1,200 ein, vermischt mit $\frac{1}{4}$ ihres Volumens Weingeist (91 proc), lässt absetzen und filtrirt.

Extractum Glycyrrhizae purum (U St.) **Pure Extract of Glycyrrhiza**. Aus 1000 g Süssholzpulver (No 20) und einer Mischung von 150 ccm Ammoniakflüssigkeit (10 proc) und 3000 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 1000 ccm, erschöpft zuerst mit dem Rest der Mischung, dann mit destillirtem Wasser und verdampft zu Pillenkonsistenz.

Extractum Glycyrrhizae s. Liquiritiae Spiritu depuratum E. DIETZSCH. Weingeistiges Süssholzextrakt. 1000 g grob gepulvertes russisches Süssholz zieht man mit 5000 g kaltem Wasser 4 Stunden, dann mit 3000 g siedendem Wasser aus, verdampft die vereinigten Auszüge bis auf 500 g, mischt noch heiss mit 1000 g Weingeist (90 proc), filtrirt nach 24 Stunden, destillirt 900 g ab und dampft zum mitteldicken Extrakt ein. Ausbeute 18—20 Proc. In Wasser klar lösliches Extrakt.

Gelatina Liquiritiae pellucida. Durchsichtige Lakritzgallerte (Austr.) 40 Th geschältes, zerstoßenes Süssholz zieht man mit 3000 Th destill. Wasser aus, seigt durch, löst 1000 Th arabisches Gummi und 800 Th Zuckerpulver, seigt nochmals durch, verdunstet bis zur Hälfte, schäumt sorgfältig ab, fügt 40 Th Orangenblüthenwasser hinzu, giesst in Papierkapseln, trocknet und zerschneidet in kleinere Stücke. Will man die Masse völlig klar haben, so setzt man (nach DIETZSCH) zu der Lösung 2 Th trockenes Hühnereweiss, in wenig Wasser gelöst, und 10 Th Filtrirpapierschnittel zu, kocht auf, schäumt ab, filtrirt durch Flanell und dampft nun erst ein.

Glycyrrhizinum ammoniatum (U St.) **Glyzina**. **Glycyrrhizine ammoniacale** (Gall.) **Ammoniated Glycyrrhizin** (U St.) 500 g Süssholzpulver (No 20) befeuchtet man mit einer Mischung von 475 ccm Wasser und 25 ccm Ammoniakflüssigkeit (10 proc), packt in einen gläsernen Perkolator und sammelt nach 24 Stunden durch Nachgiessen von Wasser 500 ccm Flüssigkeit. Man setzt vorsichtig Schwefelsäure zu, solange noch ein Niederschlag entsteht, sammelt denselben und wäscht mit kaltem Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion. Durch nochmaliges Lösen in ammoniakalischem Wasser, Fällen mittels Schwefelsäure und Waschen wird der Niederschlag gereinigt, hierauf in q s mit Wasser 55 verdünnter Ammoniakflüssigkeit gelöst, auf Glasplatten gestrichen und getrocknet. Dunkelbraune oder rothbraune geruchlose Schuppen von sehr süßem Geschmack. Gall. 1000 g Süssholz (Smyrna) wird, zu feinen Fasern zerstoßen, zweimal mit je 2000 g destill. Wasser 4 Stunden ausgezogen, die Flüssigkeit aufgeköcht, filtrirt und nach völligem Erkalten nach und nach mit einer Mischung von 20 g Schwefelsäure (spec Gew 1,843) und 80 g Wasser versetzt, so lange noch ein Niederschlag entsteht. Man lässt absetzen, sammelt den Niederschlag, wäscht ihn mit Wasser bis zum Aufhören der sauren Reaktion, löst ihn auf dem Wasserbade in möglichst wenig 5 proc Ammoniakflüssigkeit und trocknet bei 40°C auf Glasplatten ein. — Aus guter Wurzel muss man 6—7 Proc Ausbeute erzielen.

Pasta Liquiritiae (Ergänzb.) **Pasta Liquiritiae flava** (Austr.) **Massa cum succo Glycyrrhizae** (Gall.) Süssholzpaste. Gelber Lakritzteig. Braune oder gelbe Reglisse. Brauner Lederzucker. Braunes Jungfernlleder. Ergänzb. 1 Th grob zerschnittenes Süssholz zieht man mit 30 Th Wasser 12 Stunden aus, löst im Filtrat ohne Erwärmen 15 Th arabisches Gummi und 9 Th Zucker, setzt etwas zu Schaum geschlagenes Eiweiß zu, kocht auf, seigt durch Flanell, dampft unter Umrühren auf 40 Th, dann weiter ohne Umrühren so lange ein, bis eine Probe beim Erkalten erstarrt, giesst in Formen, trocknet und schneidet in Tafelchen. — Austr. Zu einer durchgesehenen Lösung von 120 g gereinigtem Lakritz und 1000 g arabischem Gummi in q s Wasser fügt man 1000 g Zuckerpulver und das Eiweiß von 20 Eiern, formt in der Wärme zum Teig, setzt eine Mischung von 2 g Vanille und 15 g Zucker zu und macht 1 a Tafelchen daraus. — Gall. 1) **Pâte de réglisse brune**. 100 g Lakritz in Stücken werden auf einem Haarnetze durch Einstellen in 2500 g kaltes Wasser gereinigt, die filtrirte Lösung mit 1500 g Senegalgummi, 1000 g Zucker, 0,75 g Opiumextrakt versetzt und weiter verfahren, wie bei **Pâte de Lichen** angegeben. Enthält etwa 0,02 Proc Opiumextrakt. 2) **Pâte de réglisse noire**. 500 g Lakritz behandelt man wie unter 1) mit 3500 g Wasser, löst im Filtrat 8000 g gewaschenes Senegalgummi im Wasserbade, seigt durch, fügt 2000 g Zucker hinzu und bringt zur Paste, wie bei **Pasta Jujubae** angegeben. — E. DIETZSCH. 600 g gepulvertes arabisches Gummi löst man ohne Erwärmen in 2500 g destill. Wasser, setzt 400 g Zucker, 2 g trockenes Hühnereweiss in wenig Wasser gelöst und 10 g Filtrirpapier-

abfall zu, kocht, schäumt ab, filtrirt durch Fanell, dampft auf 1600 g ein, fügt 10 g durch Weingeist gereinigtes Süssholzwurzel hinzu, dampft ohne Umrühren auf etwa 1300 g ein, entfernt die gebildete Haut, giest in Papier- oder geblöte Blechformen und verfährt wie bei *Pasta Jujubae* angegeben. Ausbeute etwa 900 g

Pasta Liquiritiae gelatinata Braune Reglisse 200 g Gelatine löst man unter Erwärmen in 400 g Wasser, fügt je 300 g gepulvertes arabisches Gummi und Zucker, 200 g Glycerin, 20 g gereinigten Süssholzwurzel hinzu, erwärmt bis zur völligen Lösung, dampft zur Extraktstärke ein, giest in geblöte Blechformen etwa 4 mm dick aus und sticht nach dem Erkalten mittels eines runden Blechrolles Scheiben von etwa 1,5 cm Durchmesser aus, die bei gehender Wärme getrocknet werden

Sirupus Liquiritiae (Germ Helv) *Sirupus Glycyrrhizae* Süssholzwurzel Sirup de réglisse Germ 20 Th grob zerschnittenes Süssholz, 5 Th Ammoniakflüssigkeit, 100 Th Wasser macerirt man 12 (nach Helv 24) Stunden, presst, kocht auf, dampft im Wasserbade auf 10 Th ein, vermischt mit 10 Th Weingeist, filtrirt nach 12 (Helv 24) Stunden und bringt das Filtrat mit q s Zuckersirup auf 100 Th. Brauner, klarer Sirup. Bei der Darstellung sind Metallgeräthe, besonders kupferne, zu vermeiden. Scheiden sich beim Eindampfen Flocken aus, so bringt man sie durch wenig Ammoniak wieder in Lösung. *Sirup of Liquorice* (Nat form) In 500 cem Wasser löst man zuerst 125 g Extract *Glycyrrhizae purum* (U St), dann 650 g Zucker, seigt durch, rügt 125 g Glycerin und Wasser q s zu 1000 cem hinzu

Sirupus Liquiritiae decemplex. Dass sich nach obiger Vorschrift ein Sirup, der mit 9 Th Zuckersirup ein vorschriftsmässiges Präparat liefert nicht herstellen lässt, liegt auf der Hand. Ein solcher ist bei der vorzüglichen Haltbarkeit des Süssholzwurzel Sirups auch überflüssig

II *Succus Liquiritiae* (Austr Germ Helv) *Succus Liquiritiae crudus* Extractum *Glycyrrhizae* (U St) s *Liquiritiae crudum*. — Süssholzwurzel Lakritz Lakritzen-saft — Bärendreck Bärenzucker. — *Suc de réglisse* (Gall) *Jus de réglisse*. — Extract or Juice of Liquorice.

Ueber *Darstellung* und *Sorten* vergl HAGER FISCHER-HARTWICH, Kommentar zum deutschen Arzneibuch, 2 Aufl, Band 2 pag 621ff

Von den verschiedenen Sorten ist für die pharmaceutische Verwendung die Sorte „Barracco“ am beliebtesten. Es ist beim Einkauf genau auf den Namen zu achten, da manche Imitationen denselben mit geringen Abänderungen nachahmen. Es giebt aber auch Nachahmungen mit ganz korrekter Schreibweise des Namens. Ferner werden in der Pharmacie viel verwendet *Sanitas Tiflis*, *Gul Grasso*, *Zagarese u Co.*, *Sinib Oddo*, *Muzzi*, *Gerace*, *Duca di Atri*

Eigenschaften und Bestandtheile Harte, schwarze oder schwarzbraune glanzend brechende Stangen oder Massen von rein süßem Geschmack. Es enthält die wesentlichen Bestandtheile der Süssholzwurzel, so in einer guten Sorte 20,00 Proc Wasser, 15,35 Proc gummosse Substanz, 15,25 Proc Glycyrrhizin, 6,42 Proc Zucker, Mannit, 87,48 Proc Extraktivstoffe, zusammen in Wasser löslich 74,5 Proc, in Wasser unlöslich 5,5 Proc, 8–10 Proc Asche

Tabelle über die Zusammensetzung einer Anzahl Sorten von *Succus Liquiritiae* nach PROLITUS

Bezeichnung	Wasser	In kaltem Wasser unlöslich	Glycyrrhizin	Stärke	Bezeichnung	Wasser	In kaltem Wasser unlöslich	Glycyrrhizin	Stärke
Selbst bereit	12,8	3,9	23,0	fehlt	Imit Sicil Barracco	13,0	35,0	15,0	von handen
Sanitas Tiflis	12,5	10,0	30,0	"	Duca di Atri	11,8	25,6	11,0	fehlt
Sinib Oddo	11,0	23,0	19,0	"	Uso Barracco	14,0	34,0	10,0	"
Fichera	16,5	16,2	19,0	"	Grimaldi	11,7	35,0	9,0	"
Zagarese & Co	18,5	20,0	10,0	"	Spanischer Barracco	14,8	29,0	9,0	"
Barracco	13,0	24,0	11,0	"	Messina	9,2	33,0	11,0	von handen
Barone Amorello	14,0	22,0	16,0	"	Cassano	11,5	34,0	5,0	fehlt
Gul Grasso	7,0	24,0	14,0	"	Salozzi	15,0	40,0	6,0	"
Muzzi	12,0	23,0	9,0	"	Pignatelli	14,6	26,0	13,0	"
Gerace	10,5	23,9	11,0	"	F S D	10,0	32,0	12,0	"
P S	11,8	22,7	17,0	"	Baron Compagno	36,0	31,0	18,0	"

Untersuchung 1 Bestimmung des Glycyrrhizins Man löst in einer 100 ccm Flasche 5 g zerstoßenen Succus durch öfteres Umschütteln in 50 ccm lauwarmem Wasser, indem man 2 ccm Liq Ammon caust hinzufügt Nachdem der Succus völlig zerfallen ist, fügt man Alkohol bis zur Füllung der Flasche hinzu und lässt einen Tag stehen Dann filtrirt man und wäscht mit 40proc Alkohol nach, bis die ablaufende Flüssigkeit kaum noch gelb gefärbt ist Das Filtrat wird auf dem Wasserbad auf $\frac{1}{3}$ eingedampft und nach dem Erkalten unter Umrühren 5 ccm verdünnte Schwefelsäure (bis zur sauren Reaktion) zugegeben Die ausscheidende Glycyrrhizinsäure sammelt man nach dem Absetzen auf einem Filter und wäscht mit 30 ccm Wasser nach Dann übergiesst man den Filterinhalt mit Ammoniak, dampft die durch das Filter laufende Flüssigkeit im gewogenen Schälchen im Wasserbade ein und trocknet bis zum konstanten Gewicht

2 Bestimmung des Wassergehalts in bekannter Weise

3 Man digerirt in einer Flasche 10 g Succus mit 100 g Wasser bis zum völligen Zerfall des Succus Nach dem Erkalten fügt man 200 g Alkohol zu, schüttelt wiederholt und lässt mehrere Stunden stehen Dann filtrirt man durch ein doppeltes Filter und wäscht den Niederschlag auf dem Filter mit einer Mischung von 2 Alkohol und 1 Wasser aus In dem Filtrat kann man das Glycyrrhizin bestimmen

4 Der Rückstand auf dem Filter wird an der Luft getrocknet und mit Wasser übergossen, bis dasselbe klar abläuft Das Filtrat wird im Wasserbade in gewogener Schale eingedampft und bis zum konstanten Gewicht getrocknet = Gummöse Substanz

5 Der auf dem Filter bei 4 gebliebene Antheil wird getrocknet und gewogen unter Benützung des äusseren Filters als Tara = in Wasser unlöslicher Theil

6 Auf Stärke prüft man unter dem Mikroskop, indem man ein Stückchen in Wasser völlig zerfallen lässt und den Rückstand untersucht Eine geringe Menge von Stärke korncornen, die die für Radix Glycyrrhizae charakteristische Form haben, berechtigt nicht, eine Verfälschung mit Starkemehl anzunehmen

7 Eine Prüfung auf Kupfer ist nicht überflüssig, da der Succus zuweilen in solchen Schalen eingedampft und dann herausgeschüttet wird, wobei sogar kleine Spalme von Kupfer mitgehen können Man löst in Wasser, säuert an und stellt eine blanke Messer Klinge in die Flüssigkeit.

Verfälschungen Man setzt dem Succus nicht selten, um die Menge wasserlöslicher Stoffe zu vermehren Dextrin, Gummi, Starkezucker, auch Gelatine zu Man sollte daher unter allen Umständen neben der Bestimmung der wasserlöslichen Stoffe auch eine solche des Glycyrrhizins vornehmen, die erst Klarheit schafft, und einen Succus, der nicht mindestens 11 Proc. davon enthält, zurückweisen

Anwendung. Abgabe Dient zur Bereitung des gereinigten Süssholzsaftes, welcher gegeben wird, wenn Succus Liquiritiae in flüssigen Arzneimischungen verordnet ist Dagegen pflegt man als Bindemittel für Pillenmassen das Pulver zu verwenden, das man aus dem grob zerstoßenen oder in Scheiben geschnittenen und dann in der Wärme getrockneten rohen Stangenlackritz bereitet Für die Abgabe im Handverkauf greift es eine durch Querringel in gleichmässige Abschnitte getheilte Handelswaare Doch lassen sich auch die dicken Stangen leicht schneiden, wenn man sie kurze Zeit in die Wärme legt, oder auch mittels eines scharfen Messers, auf das man einen kurzen Schlag mit einem Hammer führt

Austr lässt zum pharmaceutischen Gebrauch nur den gereinigten Lackritz verwenden

Succus Liquiritiae depuratus (Austr Germ Helv) s **inspissatus**. Gereinigter Süssholzsafft — Suc de réglisse purifié Purified Extract of Liquorice (Nat form)

Roher Lackritz¹⁾ wird in ein Extrahirfass schichtenweise eingelegt, so dass die Stangen immer nur eine Lage bilden und durch eine dünne Schicht Strohhalme, Holzwolle oder Bastgeflecht — welche vorher durch Einweichen in Wasser und Abwaschen gründlich gestäubert sein müssen — getrennt sind Man deckt einen Deckel darüber, beschwert ihn

¹⁾ Nach OLSEN & LOHREY geben die Sorten „Barracco“ und P S die grösste Extrakt-ausbeute

in geeigneter Weise oder zieht bei Benutzung eines Gefäßes wie Fig. 261 die Schraube fest an, und gießt nun kaltes, destillirtes Wasser auf, so dass die oberste Schicht eben bedeckt wird. Nach zweitägigem Stehen lässt man die Flüssigkeit mittels eines Hahnes ablaufen, sieht durch und dampft sofort im Wasserbade unter beständigem Rühren zur Extraktstärke ein. Den Rückstand im Fasse behandelt man nochmals in gleicher Weise. Ob ein dritter Auszug lohnend ist, was selten der Fall sein wird, stellt man durch einen Versuch im kleinen fest; er muss wenigstens ein spec. Gew. von 1,015—1,020 zeigen und beim Abdampfen nicht weniger als 5 Proc. Trockenrückstand geben. Eine vollständige Erschöpfung des Rohsuccus ist schwer zu erreichen, nach HINSON & SCHNEIDER selbst nach 40maligem Ausziehen nicht. Der gereinigte Süßholzsaft muss braun oder schwarzbraun, in Wasser klar löslich sein und rein süß schmecken. Ausheute je nach dem verwendeten Rohstoff 60—80 Proc. Man bewahrt ihn in Thon- oder Porcellankruken an einem luftigen, trocknen Orte auf, nicht im Keller, wo er sich leicht mit Schimmelpilzen überzieht.

Es ist empfohlen worden, den gereinigten Süßholzsaft unmittelbar aus der Wurzel durch Ausziehen und Eindampfen herzustellen; ein solcher Succus wäre gleichbedeutend mit dem Extractum Liquiritiae Radicis.

Solntio Succ. Liquiritiae.

Für Recepturzwecke pflegt man eine Lösung von gereinigtem Süßholzsaft in gleichen Theilen Wasser vorrätig zu halten. In kleinen, ganz gefüllten Flaschen im Kühlen aufbewahrt, hält sich dieselbe längere Zeit; in der wärmeren Jahreszeit, wo sie leicht in Gährung übergeht oder Schimmel ansetzt, füllt man sie entweder kochend oder mit 5 Proc. Weingeist versetzt in die Gefäße und hält nur kleinere Vorräthe. Die Helfenberger Fabrik führt einen Succus Liquiritiae depuratus tenuis, der nur soweit eingedickt ist, dass er sich noch giessen lässt, ferner einen Succus Liquiritiae depuratus pulveratus, der sich klar löst, mithin auch für flüssige Arzneimischungen verwenden lässt. (Siehe auch unten: Liquor Extracti Glycyrrhizae.)

Das bisweilen beobachtete Gelatiniren ammoniakalischer Succuslösungen ist wahrscheinlich auf einen Pilz zurückzuführen; durch vorsichtigen Zusatz verdünnter Kalilauge lässt sich eine derartige Lösung meistens wieder verflüssigen und für Handverkaufszwecke verwendbar machen.

Succus Liquiritiae depuratus in bacillis ist eine im Handverkaufe beliebte Form in federkieldicken Stängelchen, welche man aus dem eingedickten Saft durch Verarbeiten mit geeigneten Zusätzen darstellt. Nach E. DIETZSCH löst man 300,0 Zuckerpulver unter Erwärmen in 400,0 gereinigtem Lakritz, stößt mit 300,0 Süßholzpulver zur gleichmässigen Masse und rollt diese aus oder presst sie durch gelochte Platten.

Bacilli Liquiritiae anisati.

Succus Liquiritiae depuratus in bacillis
a. in fillis. Cachou. Caschu.

I.

Rp. Succ. Liquir. dep. inspiss. 75,0
Gummi arabici pulver. 2,0

Tragacanthas 2,0
Sacchari albi pulver. 15,0
Olei Anisi gutt. XX.

Man mischt unter Erwärmen im Wasserbade und presst mittels einer Cachoupresse in Fäden, die nach dem Trocknen in Weissblechgefässen aufbewahrt werden.

II.

Die unter Succ. Liquirit. dep. in bacilli angegebene Masse mischt man mit 4,0 Anisöl, 1,0 Fenchelöl und behandelt sie wie I.




Fig. 261. HAGEN'sches Extrahiergefäß.

Bacilli Liquiritiae crocatis
s. citrini Hustenstangen Gelbe Brust
stängel

Rp	1 Radicis Liquiritiae pulv	
	2 Rhizom Iridis	"
	3 Gummi arabid	"
	4 Amyli Tristici	" 33 100,0
	5 Tragacanthae	" 10 0
	6 Sacchari albi	" 590,0
	7 Tincturae Croci	" 20,0
	8 Olei Anisi	" 3,0
	9 Olei Aurantii flor	" 0,5

Man mischt 6 mit 7, nach dem Trocknen mit den
übrigen, stößt mit Rosenwasser zur Masse und
formt 8 mm dicke Stäbchen die man trocknet
und mit verdünnter Safranfärbung bestreicht

Bacilli pectorales Hugo
Hugo'sche Bruststängel

Rp	Radicis Liquiritiae pulv	200,0
	Sacchari albi	415 0
	Succi Liquiritiae	350,0
	Tragacanthae	5,0

Man bringt mit Wasser zur Masse und formt in
Stäbchen.

Elisir adjuvans (Nat. form)
Adjuvant Elisir

Rp	1 Corticis Aurantii ole pulv No 40 75 g	
	2 Corticis Pruni virgin	" 150 "
	3 Radic. Liquirit. russ	" 500 "
	4 Fructus Coriandri	" 10 "
	5 Fructus Carvi	" 40 "
	6 Sirupi Sacchari (U-St)	1500 ccm
	7 { Spiritus (91 proc) 1 vol } 9 "	
	8 { Aquae destill 2 vol }	

Man befeuchtet 2 mit 150 ccm Wasser, fügt nach
12 Stunden 1, 3, 4, 5 hinzu mischt mit 150 ccm
von 7, bringt in einen Verdünnungsapparat,
sammelt durch Nachgessen von 7 8500 ccm Per-
kolat und stellt durch Mischen mit 6 5000 ccm
Gesamtmischung her

Elisir e Succo Liquiritiae (Germ.)
Elisir pectorale (Helv.) Elisir regia
Danica. Elisir Ringelmannii Brust-
elixer Elisir pectoral du roi de Dane-
mark. Pectoral Elisir

Rp	1 Succi Liquiritiae depurati	2,0
	2 Aquae Foeniculi	5,0
	3 Liquoris Ammonii anisati	2 0

Man löst 1 in 2 und mischt 3 hinzu Germ lässt
nach sechsstündigem Absetzen filtrieren (was in
bedeckten Trichter bei 17—20° C geschehen
muss!) und verlangt eine braune, klare Flüssig-
keit. Nach Helv soll dieselbe trübe sein, ist
also vor der Abgabe umzuschütteln. Als Husten-
mittel theelöffelweise In Deutschland dem
freien Verkehr entzogen

Elisir e Succo Liquiritiae opiatum

Elisir ammoniato-opiatum

Rp	Elisir e Succo Liquiritiae	98,0
	Tincturae Opil crocatae	2,0

3—4 stündlich 1 Theelöffel

Elisir Glycyrrhizae (Nat. form)

Elisir of Glycyrrhizae or Liquorice

Rp	Extracti Glycyrrhizae fluidi (U-St.)	125 ccm
	Elisir aromatici (U St.)	875 "

Elisir Glycyrrhizae aromaticum (Nat. form)

Aromatic Elisir of Glycyrrhizae or

Liquorice

Rp	1 Extracti Glycyrrhizae fluidi (U-St.)	125 ccm
	2 Olei Caryophyllorum	"
	3 Olei Cinnam ceylan.	33 0,4 "
	4 Olei Myristicæ	0,25 "
	5 Olei Foeniculi	0,25 "

6 Marcesali carbonici 10 g

7 Elisir aromatici (U-St) 9 "

Man verrührt 2—5 mit 6, fügt nach und nach
875 ccm von 7 hinzu, lässt eine Stunde unter
öfteren Schütteln stehen, filtrirt, sammelt unter
Nachwaschen mit 7 = 875 ccm Filtrat und mischt
dieses mit 1

Elisir Liquiritiae aromaticum

Rp	Tincturae aromaticae	10 0
	Tincturae Cinnamomi	5 0
	Olei Aurantii florum	"
	Olei Macidis	33 gttis II
	Olei Anisi stellati	gtt I
	Sirupi Liquiritiae	85,0

Dient zur Geschmackverbesserung

Liquor Extracti Glycyrrhizae (Nat. form)

Solution of Extract of Glycyrrhizae or
Liquorice

Rp	1 Succi Liquirit. depur sicc	250 g
	2 Spiritus (91 proc)	125 ccm
	3 Glycerini	200 ccm
	4 Aquae q s ad	1000 ccm

In einer kleinen Probe Succi Liquir. depur in-
spiciert bestimmt man den Trockenrückstand,
berechnet darnach die 250 g trockenem Extrakt
entsprechende Menge, löst diese in 250 ccm
Wasser, fügt 2, dann 3 hinzu und bringt mit 4
auf 1000 ccm

Loech pulmonale

Fuchslungensaft

Rp	Succi Liquiritiae depur	7,5
	Liquoris Ammonii anisati	2,5
	Sirupi Sacchari	90,0

Hustennittel für den Handverkauf

Mistura Glycyrrhizae composita (U St.)

Compound Mixture of Glycyrrhizae
Brown Mixture

Rp	Extracti Glycyrrhizae puri (U-St)	80 g
	Sirupi Sacchari	50 ccm
	Mucilag Gummi arabid	100 "
	Tincturae Opil camphoratae	120 "
	Vini Antimonii (U-St)	60 "
	Spiritus Aetheris nitrosi	80 "
	Aquae destillatae	q s ad 1000 "

Pasta pectoralis Gxoce.

Pâte pectorale de Gxoce

Rp	1 Gummi arabid	600,0
	2 Sacchari albi	400 0
	3 Aquae	1000,0
	4 Magnesiae ustae	12 5
	5 Morphini hydrochlorid	0,25
	6 Decocti rad. Liquirit (e 12,5)	50,0

Man erhitzt 1—3 zwei Stunden im Wasserbade,
entfernt die gebildete Haut, seigt durch, dampft
auf die Hälfte ein, fügt 4—6 hinzu, dampft bis
zur Pastillenkonsistenz ein und formt rauten-
förmige Tafelchen In Frankreich gebräuchliches
Hustennittel

Pastilli contra tussim

Hustentastillen.

Rp	Succi Liquirit. pulv	250,0
	Cubebae	" 180,0
	Sacchari albi	5500,0
	Acidi benzoici	15,0
	Olei Menthae pip	7,5
	Mucilag Tragacanth.	q s

Fiant pastilli pond 1,0 (Brit and Col Drugg)

Pastilli s. Trochisci Liquiritiae

Pastilli Ammonii hydrochlorici (Diet)
Saliniakpastillen

Rp	Radix Liquiritiae pulv	
	Succi Liquiritiae	aa 100,0
	Ammonii hydrochlorici	10,0
	Herba Meliloti	80,0
	Triglochin	10,0
	Sacchari albi	200,0
	Olei Anisi	
	Olei Foeniculi	aa gts V
	Sirupi Sacchari	q s

Man stösst zum Feig an, rollt zur gleichmässigen dicken Platte und sticht daraus 1000 Pastillen oder schneidet in rautenförmige Täfelchen

Pastilli pectorales DIETZICH

Trochisci bechici Hustenpastillen

I Weisses Hustenpastillen

Rp	Radix Liquiritiae pulv	
	Rhizomatis Iridis flor	
	Dextrini	aa 50,0
	Sacchari albi	300,0
	Olei Rosae	gts III
	Olei Auranti flor	gts I
	Sirupi Sacchari	q s

Man verfährt wie bei vorigem

II Gelbe Hustenpastillen.

Vie I, doch mit einem Zusatz von
Croci pulverati 10,0

III Schwarze Hustenpastillen

Rp	Fructus Anisi pulv	
	Fructus Foeniculi	aa 25,0
	Rhizom Iridis flor	50,0
	Radix Liquiritiae	100,0
	Sacchari Cumarini	2,0
	Sacchari albi	300,0
	Sirupi Liquiritiae	q s

Verfahren wie bei den vorigen

Pastilli pectorales opiatii

Rp	Extracti Liquiritiae	100,0
	Radix Liquiritiae pulv	200,0
	Opil	5,0
	Triglochin	10,0
	Sacchari albi	700,0
	Mucilag Triglochin	q s

Man formt 1000 Pastillen mit je 0,005 Opium

Pilulae ad prandium HALT (Nat form.)

HALT's Dinner Pill

Rp	Aloës purificatae (U-St)	
	Extracti Liquiritiae	
	Saponis	
	Sirupi communis (Melasse)	aa 6,5 g

Zu 100 Pillen.

Pilulae odoriferae.

Mundpillen (gegen übelriechenden Athem)

Albert-Cachou Cachoupillen Cachou
Prince Albert Cachou de Boigne Pastilles des fumeurs Cachou aromatique
(vergl S 678)

I Nach DIETZICH

Rp	Rhizomat. Iridis pulv	10,0
	Moschi	0,02
	Cumamini	0,05
	Vanillini	0,5
	Olei Rosae	Neroli Menthae pip
	Unonae odorat	aa gts V
	Succi Liquiritiae	q s

Man formt Pillen von 0,05 versilbert sie und giebt 50 Stück in kleinen Metallboxen ab

Handb d pharm Praxis I

II Nach DORVANT

Rp	Succi Liquiritiae pulv	100,0
	Catechu	30,0
	Gummi arabici	10,0
	Corallia Caseariae	
	Crocus Thibae	
	Mastiche	
	Rhizom Iridis	aa 20
	Olei Menthae pip	20
	Tinctura Moschi	
	Tinctura Ambræ	aa gts V

Man verfährt wie bei I

Folio pectoralis

Liquiritia pectoralis (Str 5b Apoth Ver 1887).

Rp	Succi Liquiritiae depur	5,0
	Aquae destillatae	100,0
	Liquiritia Ammonii auseri	1,0
	Sirupi simplicis	15,0

Ptilana Glycyrrhizae

Tisane de Réglisse (Gall)

Rp	Radix Liquiritiae mundat conc	100
	Aquae destillatae frigidae	1000,0

Nach 6 Stunden zieht man durch Hart durch eine Lösung von 0,5 Glycin in 1000 Wasser ab

Pulvis Liquiritiae coctae

Pulvis pectoralis crocatus Gelbes

Brustpulver

Rp	1 Gummi arabici pulv	
	2 Radix Liquiritiae	
	3 Rhizom Iridis flor	aa 100,0
	4 Triglochin	25,0
	5 Sacchari albi	670,0
	6 Croci	5,0
	7 Spiritus	5,0

Man verreibt 6 mit 7, mischt 5 hinzu, trocknet und vermischt mit 1—4

Pulvis Liquiritiae compositus (Austri Germ Hebr)

Pulvis Glycyrrhizae compositus (Brit U-St) Pulvis pectoralis Pulvis pectoralis Kurellae Brustpulver Kurellaschus Brustpulver Hämorrhoidalpulver — Poudre pectorale Poudre de réglisse composée — Compound Powder of Liquorice or Glycyrrhiza. Pectoral powder Germ Hebr U-St

Rp	Austr Gnt	
Fructus Foeniculi pulv sublt	1	1
Sulfuris depurati	1	1
Folior Sennae pulv sublt	2	2
Rad Liquiritiae	2	2
Sacchari albi	6	4
Olei Foeniculi	—	4

Man mischt, schlägt durch ein Sieb und mischt nochmals. In dicht schliessenden Gefässen aufzubewahren. Ein bei katarrh, Verstopfung und Hämorrhoidaliden sehr heilbares Volksmittel, das theilweise, von Kindern massenspitzenweise mit Wasser genommen wird.

Pulvis pectoralis Viennensis

Wiener Brustpulver Piakerpulver

Rp	Subli sulfurati aurant	0,5
	Fructus Anisi pulv	4,5
	Folior Sennae	
	Radix Liquiritiae	
	Sulfuris depurati	aa 10,0
	Sacchari albi	50,0

Pulvis pectoralis Quarilii n. VOMÁČKA

Rp	Croci pulverati	
	Subli sulfurati aurant	aa 0,5
	Amyli	15,0
	Gummi arabici	35,0
	Succi Liquiritiae pulv	49,0

Sirupus Liquiritiae aromaticus (Amer. Drugg.)

Pp	1	Cortici Cinnamomi zeri	20,0
	2	Rhizom Zingiberis	12,0
	3	Caryophyllorum	8,0
	4	Semini Myristicae	3,0
	5	Latrachi Liquiritiae	10,0
	6	Sacchari albi	750,0

Man kocht durch Parkochen von 1—4 mit 1 l q s Alkohol 100 cem, mischt diese mit 6 und verdunstet den Alkohol in der Wärme. Alsdann sammelt man durch Nachgießen von Wasser 500 cem. Pulver kocht darin 5 und den aromatischen Zucker kocht auf und stellt 1 a 1000 g Sirup her.

Species pectorales HERMANNI Dr. HERMANN'S Brustthee

Pp	Florum Thiae	
	Luctus Anisi stellati	
	Radici Senegae	13 5,0
	Rhizom Iridis flor.	10,0
	Radici Liquiritiae	
	Stipit Dulcamaras	13 15,0
	Fruct Coriandri	20,0
	Carmen	25,0

1 Esslöffel auf $\frac{1}{4}$ l kochendes Wasser

Succus Liquiritiae tabulatus Lakritzenlöffelchen.

Rp	Succi Liquiritiae depur.	400,0
	Sacchari albi pulv.	250,0
	Radici Liquiritiae pulv.	150,0
	Mucilag Gummi arab. vel q s	300,0

Man mischt in der Wärme giest die Masse in dünner Schicht in mit Wach abgeriebene Blechformen und trocknet in der Wärme, oder man stößt mit q s Mucilago zur Masse und rollt diese mit einem Nadelholz aus. Man schneidet mit dem Rollmesser in rautenförmige Stücke und trocknet scharf aus. Um die Tafelchen zu versilbern, verfährt man wie beim Versilbern von Pillen oder man legt den ausgerollten Kuchen mehrere Stunden in einen sauberen Keller und überzieht ihn dann mit Blattsilber. Scharf ausgetrocknet in Blechgefäßen aufzubewahren. Durch Feuchtwerden zusammengebackene Vortheile dürfen nicht in der Wärme, sondern nur über Aetzkalk ausgetrocknet werden!

Tabulae Liquiritiae cum Ammonio chlorato (Ergänz.)

Salmiaktabletten.

Rp	1	Succi Liquiritiae depur.	9,0
	2	Ammonii chlorati	1,0

1 wird in Wasser gelöst, 2 zugesetzt, zur Teigmasse eingedampft, diese wie bei vorigem angegeben, behandelt.

Tabulettae pectorales

Tabulae Pulveris Liquiritiae compositi.

Rp	Folior Sennae	pulv	
	Radici Liquiritiae		13 2,0
	Fruct. Foeniculi	"	" 2,0
	Sulfuris depurati	"	13 1,0
	Gummi arabici	"	" 1,0
	Sacchari albi	"	13 15
	Aquae destillatae	gtts	1

Man preßt 10 Tabletten und bestäubt mit Lycopodium.

Tabulettae solventes n. SALZMANN

Rp	Ammonii chlorati	
	Succi Liquiritiae pulv.	13 200,0
	Sacchari Lactis	"

Tafel von 10	"	13 80,0
Ampli	"	10,0
Benzois	"	10,0

Man mischt und formt durch Druck Tabletten von 0,6

Trochisci Liquiritiae

Schweizer Brustlücken Pastillen de Nyon Pectorales suisses

Pp	Succi Liquiritiae pulv.	500,0
	Sacchari albi	" 500,0
	Rhiz. Iridis flor.	" 50,0
	Gummi arabici	" 20,0
	Olei Anisi	gtts XX
	Aquae	600 vel q s

Man stößt zur Masse, formt Pillen von 0,5 und drückt diese mittels eines am Ende sternförmig eingekerbten Stäbchens flach in der französischen Schweiz beliebtes Hustenmittel.

Trochisci Glycyrrhizae et Opi (U-St.)

Troches of Glycyrrhiza and Opium

Rp	Extract Liquiritiae pulv.	15,0
	Opi pulveris	0,5
	Gummi arabici	" 12,0
	Sacchari albi	" 20,0
	Olei Anisi	gtts IV
	Aquae	q s

Zu 100 Pastillen

Vet. Electuarium adoucissant (Gall.)

Rp	Radici Liquiritiae pulv.	
	Radici Althaeae	" 13
	Mellis	q s

Vet. Electuarium antitussivum

Rp	Stibii sulfurati nigri	1,0
	Tartari depurati	2,0
	Ammonii chlorati	3,0
	Radici Liquiritiae	20,0
	Mellis	q s

Bei Staupe der Hunde mehrmals täglich haarsnussgroß

Vet. Influenzapulver für Pferde

Pp	Ammonii chlorati	30,0
	Radici Liquiritiae pulv.	60,0
	Natrii sulfurici	80,0
	Kali nitrici	80,0

3 mal täglich 1 Esslöffel im Getränk

Vet. Poudre adoucissante (Gall.)

Rp	Radici Liquiritiae pulv.	
	Radici Althaeae	" 13

Vet. Pulvis bechicus LEBAS

LEBAS' Viehpulver

Pp	Radici Liquiritiae pulv.	
	Radici Althaeae	" 13 100,0
	Rhizomat. Indis	" 20,0
	Sulfuris sublimati	30,0

Vet. Pulvis contra tussim

Hustentpulver

I Für Pferde

Rp	Radici Liquiritiae pulv.	200,0
	Stibii sulfurati nigri	" 50,0
	Natrii chlorati	" 250,0

II Für Schweine

Rp	Ammonii chlorati	
	Kali nitrici	
	Stibii sulfurati nigri	13 40,0
	Natrii sulfurici	
	Semina Lini	13 120,0
	Radici Liquiritiae	140,0

Mit Wasser zum Teig gemacht, mehrmals täglich haubengroß

Alpenkräuter-Brustleig von GRABLOWITZ Rautenförmige Kuchen aus Gummi, Zucker, Lakritz, Safran und Eibischabkochung

Asthmamittel, Inspektor SCHAFFER's in Leipzig Lindenau, ist eine Pulvermischung aus Zucker, Süssholz und Pimpinellwurzel (60 g = 3 50 Mk.)

Asthmathee von Dr ORLEIN, gegen alle möglichen Leiden empfohlen, besteht aus je 2 Th Andorn und Bitterklee, 5 Th islandischem Moos, 6 Th Eibisch, 8 Th Süssholz 200 g = 3 Mk

Brustpulver, nach Dr QUARIN Wiener Vorschrift Je 125,0 Süssholz und Stärke, je 250,0 arabisches Gummi und Lakritzenpulver, 1000,0 Zucker, 20,0 Bittersuss-extrakt (Vergl auch Pulv pectoral Quarin)

Brustthee, Hamburger, von Dr KOWIG Der Hauptsache nach eine Mischung aus Süssholz, Eibischwurzel und -blättern, Klatschrosen und Malvenblüthen

Cough Lozenges, Hustenpastillen von KEATING, enthalten neben Zucker, Lakritz und Salmiak etwa 0,002 g Morphin im Stück, vielleicht auch Lactucarium (Hamb Staatslaboratorium)

Eurener, Frau, Mittel derselben 1) Brustwasser, eine Mischung von 30,0 Brustelixir und 270,0 Fenchelwasser 2) Purgirlimonade 3) Salbe aus Altheesalbe und Lorbeeröl

Hustentropfen, Dr BÖTTGER's Rp Acid. benzoici 5,0, Alcohol absol 30,0, Liq Ammon caust q s ad sol præcipit, Tinct Opn benz 25,0, Elixir e Succo Lauri 20,0, Aquae dest q s ad 120,0 Dreimal täglich 15—20 Tr 15 g = 50 Pfg

Hustennittel, Prof KOCH's, ist Süssholzabkochung

Katarrhröbchen, Dr MULLER's, enthalten Zucker, Salmiak, Sternanis, Süssholz, Fenchelöl

Katarrhmittel von Dr SIMPSON besteht aus Reis- und Maismehl, Veilchenwurzel, Lakritz

Kräuter-Brustsirup Dr LAZAROWITZ' Ein Gemisch aus Stärke- und Rohzucker-sirup mit Brusttheeauszug

Kräuter-Magenbitter-Essenz oder Benediktiner von PRINZ soll Lakritz, Aloë, Gewürze, Anis- und Minzenöl enthalten (Karlsruhe Orts Ges Rath)

Krauter-Malz-Brustsaft des Dr HESS ist Stärkesirup, mit Lakritzensaft gefärbt

Krautersaft, B SPRENGEL's 30 g Jalapenpulver in 150 g eines mit Weingeist versetzten Auszuges aus Süssholz und Faulbaumrinde

Lebenswecker, Dr HUMMEL's Ein schwach weingeistiger Auszug von Süssholz, Quecken, Gundermann und wenig Gewürzen, nebst 4 Proc Glaubersalz

Lungenleiden, Mittel dagegen von FOCZTA sind sodahaltige Lakritztafelchen.

Mastpulver von Geo DOTZNER ist ein Gemisch von Süssholz, Natriumkarbonat und Kochsalz

Schlafpastillen, F OCHERNAL's, sind in Stanniol gehüllte Tafelchen aus gering werthigem Lakritz

WEIDHAAS'scher Sternthee Urvorschrift Rad. Consolid 4,5, Rad Lauri 7,5, Rhiz Iridis 3,0, Herb Veronic, Centauri min, Galeopsid, Urticae aa 6,0, Herb Violae tric 3,0, Herb Millefol 4,5, Fol Althaeae, Fol Farfar aa 9,0, Fol Sennae 0,75, Lich Island 7,5, Flor Millefol 2,25, Fruct Foeniculi, Geratoniae aa 9,0, Carie tost 13,0

WYBET Tabletten, ein Hustennittel aus Basel, sind rautenförmige Tafelchen aus Lakritz, Zucker, arab Gummi und Minzenöl

Gnaphalium.

Gattung der Compositae — Inuleae — Gnaphalinae.

Manche hierher gehörige Pflanzen sind gegenwärtig zu anderen Gattungen gestellt.

I Antennaria dioica Gärtner (syn Gnaphalium dioicum L.) Heuschrecke in Europa, Nordasien, Nordamerika Zweihäusig Mit Ausläufern und aufrechten, weiss wolligen Stengeln, mit in gedrangten Doldenrispen angeordneten Blüthenköpfchen. Blätter oberseits kahl, unterseits weissfilzig, Grundblätter gestielt, spatelförmig, stachel-spitzig. Hüllblätter ungleich lang, an der unteren Hälfte aussen wollig, die obern trocken hautig, bei den männlichen Köpfchen stumpf, bei den weiblichen spitz, oft länger wie die Blüthe. Die getrockneten Blüthenköpfchen liefern

Flores Gnaphalii. Flores pedis cati. — Weisse oder rothe Katzenpfötchen oder Immortellen. — Capitule de pied-de-chat. Pied-de-chat (Gall.)

II Helichrysum arenarium D C (syn *Gnaphalium arenarium L*) Heimisch in Mitteleuropa. Wollig-filzig. Blätter flach, die unteren langlich verkehrt-eiförmig stumpf, die oberen lineal lanzettlich, spitz. Blütenköpfe kugelig, dicht doldenartig, Hüllblätter dachziegelig, trockenhäutig, locker anliegend, die inneren öfter strahlend. Die Blütenköpfchen liefern

Flores Stoechados cithinae (Ergänzb.) *Flores Stoechados Germanicae* *Flores Amaranthi lutei*. — Ruhrkrautblüthen. Gelbe Katzenpfötchen. Immortellen. Harnblumen. Sandruhrkrautblumen. Gelbe Strohblumen. Steinblumen.

Einsammlung Aufbewahrung Man sammelt die Blütenstände vor dem völligen Aufblühen und bewahrt sie in Blechbüchsen auf.

Anwendung Für sich oder in Theemischungen in Form des Aufgusses bei Blasenleiden und veralteten Hautkrankheiten.

III Gnaphalium purpureum L In den wärmeren Gegenden der ganzen Erde, wird gegen Husten benutzt. *Gn polycephalum Michx* in Nordamerika gilt als Diureticum.

Gossypium.

Gattung der Malvaceae — Hibisceae. Umfasst ausdauernde oder krautige Pflanzen mit meist gelappten Blättern und schonen grossen, gelben oder rothen Blüten. Die Frucht ist eine 3—5 fächerige, fachspaltig aufspringende Kapsel, aus der die Samen (5—8 in jedem Fach) mit den reichlich daran sitzenden Haaren als zusammenhängende Ballen herausquellen.

Man unterscheidet folgende 7 Arten: *Gossypium barbadense L* Heimisch wahrscheinlich in Westindien. *G arboreum L* Heimisch in Afrika. *G herbaceum L* Heimisch wahrscheinlich in Ostindien. *G religiosum L* Heimisch in China. *G hirsutum L*, in Ostasien (diese beiden vielleicht Varietäten von *G herbaceum*). *G sandwicense Parlatore*, auf den Sandwichinseln und *G taitense Parlatore*, auf den Gesellschaftsinseln. — In grossem Umfange kultivirt man die 3 ersteren zur Gewinnung der Samenhaare. Man verwendet

I Die Wurzelrinde von *Gossypium herbaceum L*

Cortex Gossypii Radicis (Ergänzb.) *Gossypii Radicis Cortex* (USt) — Baumwollwurzelrinde. — Cotton root bark.

Beschreibung Die Rinde kommt in den Handel in Form langer, zäher Bänder, von etwa $\frac{1}{2}$ mm Dicke, die innen von weisslicher, aussen von lebhaft gelbrother Farbe sind. Die Mittelrinde zeigt kleine Gruppen von Zellen, deren Inhalt auf Gerbstoff reagirt. Die Innenrinde hat dreieckige Markstrahlen, die sich nach aussen fächerförmig verbreiten, so dass die dazwischen liegenden Baststrahlen sich auf dem Querschnitt nach aussen zu spitzen. Die Baststrahlen sind charakterist. durch tangentielle Gruppen von Fasern. In den Markstrahlen und in der Mittelrinde fallen Sekretbehälter mit braunem Inhalt auf, deren Inhalt nicht auf Gerbstoff reagirt, sich aber in Alkohol, Aether und in Alkalien mit gelber Farbe löst.

Ueber die *Bestandtheile* liegen genauere Untersuchungen noch nicht vor.

Anwendung Die Droge führt Kontraktionen des Uterus herbei, wird daher als Ersatz für Mutterkorn verwendet, in Amerika auch missbrauchlich als Abortivmittel.

Extractum Gossypii fluidum (Ergänzb.) *Extractum Gossypii radialis fluidum* (USt) Baumwollwurzel Fluidextrakt — Fluid Extract of Cotton root bark. Ergänzb. Aus mittelfein gepulverter Baumwollwurzelrinde wie *Extract Condurango fluidum Germ* (S 942) zu bereiten. — USt. Aus 1000 g gepulverter Baumwollwurzelrinde (No 30) und einer Mischung aus 250 ccm Glycerin und 750 Weingeist (91 proc) im Verdünnungswege. Man befeuchtet mit 500 ccm, erschöpft mit dem Rest der Mischung, dann mit Weingeist, fängt zuerst 700 ccm auf und stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. — Innerlich bei Blutungen 2—3 ccm mehrmals täglich.

Extractum Gossypii spirituosum. 1 Th. Baumwollwurzelrinde zieht man 6, dann 3 Tage mit je 5 Th. verdünntem Weingeist aus und dampft zum dicken Extrakt ein.

Extractum Gossypii spirituosum siccum
erhält man aus vorigem durch weiteres Eindampfen
und völliges Austrocknen über Aetzkalk.

Ellulae Gossypii compositae FRITSCH.

Rp. Extr. Gossypii
Extr. Hydrastis
Ergotin. DENZEL 2H 5,0.

M. f. pil. No. 100. 3 mal täglich 8 Stück. Bei
congestiver Dyamenorrhoe.

II. Die Samenhaare.

Gossypium (Brit.). **Gossypium depuratum** (Germ.) s. **purificatum** (U-St.). **Lana gossypina**. **Pili Gossypii**. — Gereinigte Baumwolle. Charpiebaumwolle. Gereinigte Watte. Verbandwatte. Wundwatte. (Watta.) — **Coton** (Gall.). **Coton purifié**. — **Cotton** (Brit.). **Cotton Wool**. **Purified cotton**.

Beschreibung. Der rundlich-eiförmige Same trägt 2 Formen von Haaren: 1. lange, lockig gewellte Haare, die die Baumwolle des Handels liefern, und 2. ganz kurze (0,5–3,0 mm), gerade Haare, die sogen. „Grundwolle“. Die Haare 1. werden in der Egrenirmaschine (Entkörnungsmaschine) von den Samen getrennt, dann mittels verschiedener Maschinen weiter von allen Unreinigkeiten befreit, durch die Wattermaschine zu dünnen Platten gerollt und aufgewickelt, endlich durch die Krempelmaschine die einzelnen Haare in eine parallele Lage zu einander gebracht; die so vorbereitete Baumwolle ist die pharmaceutisch zu verwendende. Da man sie aber meist, bevor sie in die Krempelmaschine kommt, einfettet und sie auch von vornherein etwas Fett enthält, so wird die für den pharmaceutischen Gebrauch bestimmte Watte kurze Zeit in Benzol maceriert, ausgepresst und getrocknet oder auch mit Sodaaflösung gewaschen etc. (vergl. unten).

Das einzelne Baumwollhaar lässt eine Basis, wo es abgerissen erscheint und am anderen Ende eine mehr oder weniger schlanke Spitze erkennen. Es ist, abgesehen von der Spitze, etwas zusammengedrückt bis bandartig flach, zuweilen von einem oder beiden Rändern eingebogen, streckenweis korkzieherartig um sich selbst gedreht. Das Haar verjüngt sich nicht gleichmässig gegen die Spitze, die grösste Breite liegt etwas unterhalb der Mitte, und erst von da ab verläuft es in die Spitze. In Luft unter dem Mikroskop betrachtet, ist es auf der Aussenseite mehr oder weniger feinrüzellig oder feinkörnig durch Unregelmässigkeiten der Cuticula (Fig. 262).

Die Länge und Breite eines Haares beträgt

bei <i>G. barbadense</i>	Länge bis 4,05 cm,	Breite 19–23 μ
„ <i>G. arboreum</i> „	2,50 „	20–38 „
„ <i>G. herbaceum</i> „	1,82 „	12–23 „

Bestandtheile und Reaktionen. Lufttrocken: Cellulose 87,00 Proc., Wasser 6,0 Proc., Wachs (in der Cuticula) 0,83–0,48 Proc., stickstoffhaltige Substanz (im Protoplasma) 0,084 Proc., ferner Farbstoffe, Asche bis 1,00 Proc. Den Maximalgehalt an Asche normirt Germ. auf 0,3 Proc., U-St. auf 0,8 Proc., Brit. auf 1,0 Proc. In Jodlösung (1 KJ:100 H₂O und dazu J im Ueberschuss) wird Baumwolle braun, auf Zusatz von Schwefelsäure schön blau¹⁾ (Cellulosereaktion), in Phloroglucin und Salzsäure bleibt




Fig. 262. Baumwolle. a Gedrehtes Haar. b Haar, in Luft untersucht, um die Cuticularanzeln zu zeigen. c Spitze des Haars. d Querschnitt

¹⁾ Für die Untersuchung von Pflanzenfasern und auch sonst für mikrochemische Zwecke ist die nach v. HÖHNEL verdünnte Schwefelsäure zu empfehlen: 2 Vol. Glycerin, 1 Vol. H₂O, und 8 Vol. conc. Schwefelsäure.

sie farblos, wird nicht roth (Abwesenheit von Verholzung). In Kupferoxydammoniak (man fällt eine gesättigte Lösung von CuSO_4 mit Natronlauge, wäscht den Niederschlag auf dem Filter, befreit ihn durch Pressen zwischen Filtrirpapier möglichst von der Flüssigkeit und löst in wenig starkem Ammoniak [20 proc.] quellen einzelne Theile der Faser kugel- oder tonnenförmig auf, zwischen denen die Cuticula ringförmig sich zusammenschiebt. Die innerste Membranschicht und Plasmareste (der „Innenschlauch“) krümmen sich wurmförmig zusammen. Die gegnollenen Theile lösen sich bald auf, und es bleibt nur der Innenschlauch und die Cuticularinge zurück (Fig. 263). Vergl. S. 996.




Fig. 263. Baumwollhaar, in Kupferoxydammoniak gequellen.

Prüfung. 1) Die entfettete Baumwolle muss, auf Wasser geworfen, rasch unter sinken, fetthaltige schwimmt längere oder kürzere Zeit. 20,0 g, mit Aether extrahirt, sollen nicht mehr als 0,03 g bei 80°C getrockneten Rückstand hinterlassen. — Nicht genügend entfettete Baumwolle ist nicht im Stande, Wundsekrete rasch aufzusaugen. — 2) Sie darf, angefeuchtet, Lackmuspapier nicht verändern. — 3) Der mit siedendem Wasser bereitete Auszug (1:10) soll durch Silbernitrat (Cl), durch Baryumnitrat (H_2SO_4) und durch Ammoniumoxalat (Ca) höchstens opalisirend getrübt werden. Er soll ferner Kaliumpermanganat nicht entfärben. — 4) Bestimmung des Aschengehaltes (vergl. oben). Auch der Forderung der Germ., wenn sie auch ziemlich streng ist, wird eine Baumwolle, die die übrigen Reaktionen aushält, in den meisten Fällen genügen.

Aufbewahrung. Die gereinigte Watte wird an einem trocknen Orte, wegen ihrer Verwendung zu Wundverbänden sorgfältig vor Staub geschützt, aufbewahrt. Man bezieht sie am besten in ausgewogenen Packeten oder Faltschachteln und hält sie neben den imprägnirten Watten in einem besonderen, nur für Verbandstoffe bestimmten Schrank vorrätig. Aufbewahrung und Verpackung der getränkten Watten etc. richtet sich natürlich nach den für die betreffenden Arzneikörper geltenden Vorschriften; so wird man z. B. Eisenchlorid-, Benzoesäure-, Karbol-, Jodoformwatte und -Gaze vor Licht- und Luftzutritt geschützt, also in braunen Hafengläsern oder dicht schliessenden Blechpackungen vorrätig halten.

Anwendung. Allein oder mit verschiedenen Arzneistoffen imprägnirt als Verbandmittel. In der Rezeptur gebraucht man reine Watte zum schnellen Filtriren von Mixturen, in die Fremdkörper hineingerathen sind; dünne Wattetäfelchen, beim Koliren von Augfüssen in die Seihre gelegt, ersetzen die veralteten Seihthücher von Flanell. In dickeren Schichten hält Watte organische Keime zurück, deshalb bedient man sich in der Bakteriologie der Watepfropfen zur Erzielung keimdichter Verschlüsse.

Gossypium antarthriticum s. antirheumaticum.
Watta antirheumatica. Gichtwatte.

I.
Rp. Gossypii depurati q. s.
besprengt man mit folgender Lösung:
Olei Caryophyllorum
„ Cinnamomi
„ Rosmarini
Camphorae aa 1,0
Spiritus (90%) 20,0

II.
Rp. Gossypii depurati 1000,0
Olei Betulae rectific.
„ Terobinth. rectif.
„ Ligni Juniperi
„ Rosmarini
„ Caryophyllorum aa 1,5

Camphorae 2,5
Spiritus (90%) 40,0
Tinctur. Capsici 25,0
Acidi salicylici 5,0

Man besprengt die dünn ausgebreitete Watte mit dem Zerstäubers mit der filtrirten Lösung, rollt zusammen und verpackt in Pergamentpapier.

Gossypium aromaticum.

Watta aromatica. Aromatische Watte.

Rp. Gossypii depurati 1000,0
Olei Caryophyllorum 2,5
Mixturen, oleoso-balsam. 5,0
Tincturae Benzoes 10,0
Spiritus (90%) 40,0

Bereitung wie bei der vorigen.

Gossypium camphoratum	
Kampher-Watte	
Rp	Gossypii depurati 10000
	Camphorae 2,0—3,0
	Aetheris 100,0

Bereitung wie bei vorigen

Gossypium incombustibile	
Unverbrennbare Watte für Weihnachtsbäume	
Rp	Gossypii depurati q s
	Solut Ammonii phosphoricum 10,0 100,0
Man durchtränkt und trocknet	

Gossypium iodatum	
Watte iodata Iodwatte	
Rp	1 Gossypii depurati 100,0
	2 Jodi puri pulver 10,0
Man legt 1 Schichtenweise mit 2 bestreut in ein Fließglas mit Glasstopfen, erhitzt im Wasserbade bei anfangs lose aufgesetztem Stöpsel bis das Jod die Watte gleichmässig durchdrungen hat und kühlt schnell ab — In ähnlicher Weise würde durch Einstellen eines Fläschchens mit Brom oder einer Chlor entwickelnden Mischung Gossypium bromatum, G chloratum zu bereiten sein	

Decken für Schwerleidende, von G. Schirbt in Dresden, bestehen aus Watte, die mit Natriumsulphat getränkt ist Ganz das Nämliche ist auch die „Präparirte Schafwolle“ jenes Hündlers

Gichtwatte, Dr. PATTISON's, gegen Gicht und alle möglichen Leiden, ist eine gewöhnliche Watte, die auf einer Seite mit einer Tinktur aus Sandelholz, Benzoe und Peru balsam besprengt ist

Gichtwatte, aromatische, von ALTGELD, ein Stück schlechte Watte, die auf einer Seite mit einer schwachen, mit Kugellack gefärbten Theeölösung bestrichen ist

Hydromise Watte, LIPPMANN's, ist fetthaltige, für Wasser undurchlässige Watte

Lintin, ein flaches Baumwollgewebe, wird als Ersatz für Verbandwatte gebraucht

Ohrbaumwolle, präparirte, von OELSENER Mit Olivenöl getränkte, gewöhnliche Watte

Skein von SPITZMÜLLER in Wien, bei Schnupfen etc in die Nase zu stecken, ist ein Bäschchen roth gefärbte Watte (1 Mk.)

Tendriff, ein Schnupfenmittel, besteht aus Wattetüfchen, die mit ca 7,5 Proc Zucker und 1,5 Proc Aluminiumsulfat beschwert sind

Waldwolle, von LAHRITZ, ist mit einem Kiefernadelauszug getränkte Watte

Wärmeschutzmasse, Wattenpapier, von BLOCH & MÜLLER in Kohleuscheid Zwischen zwei Lagen starken Papiers ist eine Watte aus Baumwolle, Wolle etc fest zu einem Stück verklebt, mit welchem das zu schützende Rohr umhüllt wird

Zahnwolle von BIRGMANN ist ein Sträuchen rother Baumwollendocht, dessen nach dem Anzünden und Ausblasen entstehender Dampf eingeathmet werden soll

Verbandstoffe aus Baumwolle

Die Darstellung von Verbandstoffen ist nur bei fabrikmässigem Betrieb lohnend sie wird im Laboratorium der Apotheke schon aus dem Grunde seltener vorgenommen, weil die hier vorhandenen Gerathe und Einrichtungen für Arbeiten in grösserem Maassstabe nicht genügen Im Folgenden sind deshalb die in Frage kommenden Stoffe und Gewebe nur kurz und deren Verarbeitung auch nur soweit behandelt, als die Arzneibücher Vorschriften darüber enthalten

Baumwolle, Watte, Baumwollwatte.

Die auf Maschinen durch Kardiren, Krempeln u s w gereinigte Rohbaumwolle gelangt theils in gepressten Ballen von 50 kg als Polsterwatte, Spitalwatte — Coton cardé, Carded cotton — theils in beiderseits mit Leim überzogenen Vliesen oder Tafeln von verschiedener Stärke als Geleimte Tafelwatte — Sägana gossypina — Coton collé, Ouate collée ou gommée — Grey sheet Wadding — in den Handel Die erstere bildet den Rohstoff, aus welchem die Verbandwatte gewonnen wird.

Gereinigte Baumwolle Charpiebaumwolle Verbandwatte Antiseptische oder hydrophile Watte — Gossypium depuratum (Germ) Lana Gossypii Xylum praeparatum — Coton hydrophile (Gall) Coton-Charpie Coton dépuré Ouate antiseptique — Cotton-wool Wound dressing-cotton Absorbent Cotton wool Verschrift der Gall

Kardirte, möglichst langstapelige Rohbaumwolle wird zunächst, um sie zu entfetten, in eine sehr verdünnte, siedende Lösung von Soda oder Pottasche getaucht, ausgepresst, hierauf gebleicht, indem man sie für wenige Minuten in ein Bad von 5 proc Calcium- oder Natriumhypochloritlösung bringt, wieder presst, mit reinem Wasser, dann mit einem schwach mit Salzsäure angesäuerten Wasser und zuletzt wieder mit reinem Wasser wäscht, bis sowohl rothes als blaues Lackmuspapier nicht mehr verändert wird Man trocknet sie an einem staubfreien Orte und giebt ihr schliesslich die nöthige lockere Beschaffenheit durch nochmaliges Krempeln — Eine mittels Benzin entfettete Baumwolle ist als Verbandwatte nicht verwendbar Auch sind Zusätze von Stearinsäure und dergl nicht statthaft welche früher wohl vorgekommen sind, um der Watte die Weisse und den „knirschen-

den Griff^a zu verleihen, den man eine Zeit lang zu den Eigenschaften einer guten Waare rechnete

Die gereinigte Verbandwatte wird von den Fabriken gewöhnlich in 5 verschiedenen Qualitäten geliefert und in abgewogenen Mengen zu 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 g in Pergamentpapier, in Faltschachteln oder Pappkistchen verpackt, abgegeben. Sehr zweckmässig ist die Bindenform mit Zwischenlagen von Papier, denn sie gestattet das Abscheiden einzelner Streifen, ohne die Watte mit den Händen zu berühren.

Solchen Wattebinden giebt man durch Mullunterlagen grössere Festigkeit. Für den Versandt nach überseeischen Ländern presst man die Watte auf etwa $\frac{1}{8}$ zusammen und formt zu \square Packeten.

Wäschehäusche, Wattekugeln, Tampons sind lose oder in hydrophilen Mull gehüllt. Watteballen, die in verschiedenen Formen wie Schwamm benutzt werden.

Vaginal-Tampons dürfen nur sterilisirt angewendet werden.

Zu den aufsaugenden Verbandstoffen gehören noch

Holzwohle — *Lana ligni* — *Charpie de bois* — *Woodwool* — die als Unterlage für Wöchnerinnen etc., und die zu etwa $\frac{1}{2}$ aus Holzwohle, zu $\frac{1}{2}$ aus Verbandwatte bestehende Holzwohlwatte, die zu billigen Dauerverbänden dient, ferner die Jute-fasern, die als *Charpie* — *Lintenum carptum Germanicum* — allbekannte Zupf-leinwand, und der Torfmoos.

Verband-Mull. Hydrophiler Verbandstoff. Entfetteter Mull. Antiseptische Gaze — *Tela* (Ergänz.) *Pannus* (*bombycinus*) *mollior* *Lineamentum* (Gall.) *Carbasus* (Nat. form) — *Gaze hydrophile* — Absorbent Gauze — Ein glattes, leichtes, lockeres Baumwollgewebe, welches im gem. 11×11 bis 15×15 Fäden zeigt und wovon 1 qm 30–45 g wiegt (Gall.) Als Rohstoff ist nach Gall ein weisser, nicht appreturter oder mit Stärke und dergl. beschwerter Musseln zu wählen. Man wäscht denselben zunächst mit Wasser von 80°C , presst aus, lässt 24 Stunden in kaltem Wasser liegen, presst wiederum aus, bringt für $\frac{1}{2}$ Stunde in eine schwache Natriumhypo-chloritlösung (spez. Gew. 1,015), wäscht mit reichlichem Wasser, bis Lackmuspapier nicht mehr entfärbt wird, presst von neuem, legt für $\frac{1}{2}$ Stunde in 5 proc. Salzsäure enthaltendes Wasser, wäscht mit reinem Wasser bis zur völligen Neutralität und trocknet.

Mull wird an Aufsaugungsvermögen von der Watte übertroffen. Die Prüfung ist die gleiche wie dort.

Mull- und Gazebinden. Als Gazebinden, auch Organdine- oder Kleisterbinden, bezeichnet man gewöhnlich solche aus stoffem, appreturtem Stoff, als Mullbinden, hydrophile Binden solche aus weichem Gewebe ohne Appretur. Obwohl die Gaze sich leicht dem Faden nach reissen oder schneiden lässt, bezieht man die Binden gewöhnlich aus den Fabriken, wo sie mittels besonderer Maschinen aufs sauberste geschnitten und gewickelt werden.

Binden mit fester Kante müssen natürlich eigens gewebt werden. Eine besonders dicht gewebte Sorte sind die Cambricbinden.

Verbandmull findet ferner Verwendung in der Form von Kompressen als Tupfmaterial, zu Menstruationsbinden (Damen-, Perioden- oder Hygienische Binden), mit Moos oder Sägemehl gefüllten, schlauchförmigen Kissen, ganz besonders aber zur Darstellung der Salbenmulle — *Steatina*, *Unguenta extensa* —, Pflastermulle und ähnlicher Verbandmittelformen, welche von Dr. UNNA eingeführt worden sind und die früheren, auf Leinwand gestrichenen Pflaster mehr und mehr verdrängen, sie werden in nahezu 200 verschiedenen Zusammensetzungen besonders von P. BEIERSDORF & Co in Hamburg-Eimsbüttel, ferner von E. DIETRICH in Helfenberg u. A. fabrikmässig hergestellt, sind aber von begrenzter Haltbarkeit.

Englisch Lint, *Lintenum carptum Anglicum*, ein dünneres, wolliges Gewebe mit baumwollenem Einschluss, dient wie Watte zum Wundverband.

Schirting, *Tela* (*bombycina*) *densior*, ist ein ziemlich dichtes, appreturtes Gewebe aus Baumwollengarn, welches hauptsächlich als Unterlage für gestrichene Pflaster benutzt wird, ebenso der

Batist, Batist, worunter man theils eine feine Leinwand, theils ein ihr ähnliches Baumwollgewebe (Baumwollbatist) versteht. Eine etwas locker gewebte Sorte heisst Musselin.

Macintosh ist ein durch Ueberziehen mit Kautschuklösung wasserdicht gemachtes Baumwollzeug.

Getränkte (imprägnirte oder präparirte) Verbandstoffe — *Xyla et Lineamenta medicamentosa* — *Cotons et Gazes médicamenteuses* (Gall.) Sind Watten oder Gewebe, die einen wirksamen Arzneistoff in gleichmässiger Vertheilung enthalten. Das einfachste Verfahren besteht darin, dass man bestimmte Gewichtsmengen der betreffenden Verbandstoffe mit einer Lösung des Arzneikörpers tränkt, die genau dosirt und so bemessen ist, dass sie bei mässigem Druck vollständig aufgesogen wird. Derart sind die Vorschriften des Ergänz. für Karbol-, Eisenchlorid-, Sublimat- und Salicylwatte, für Kar-

bol., Sublimat-, Jodoform und Salicylnull. Man kann aber auch eine gewogene Menge der Watte oder des Gewebes in eine Lösung von vorgeschriebenem Gehalt eintauchen und die überschüssige Flüssigkeit verdunsten lassen (s. Jodoformgaze Gall), oder durch Auspressen bis auf ein bestimmtes Gewicht entfernen, wie es Gall für Boräure-, Karbol-, Salol- und Sublimatgaze verlangt (Die Vorschriften selbst, sowie die Gehaltsbestimmung s. bei den betreffenden Artikeln). Ein drittes Verfahren, die Stoffe anzufeuchten und mit dem feingepulverten Arzneistoff zu bestreuen, ist der ungleichmässigen Vertheilung wegen nur dort in Anwendung zu bringen, wo es an geeigneten Lösungsmitteln fehlt.

Die nach der einen oder andern Vorschrift behandelten Stoffe werden in luftigen, stäubfreien und vor Tageslicht geschützten Räumen (mit Fenstern aus gelbem Glas!) bei 25–30° C Wärme oder bei Zimmerwärme getrocknet und sogleich in üblicher Weise verpackt.

Sterilisirte Verbandstoffe. — *Panséments stérilisés* — *Sterilized Dressings*. Im allgemeinen verfährt man bei Herstellung keimfreier Verbandstoffe in der Weise, dass man die mit Fließpapier umhüllten Watten, Gazen u. s. w. längere Zeit einer hohen Hitze aussetzt und dann dicht verpackt. Als völlig einwandfrei können indessen wohl nur die Verfahren bezeichnet werden, wonach die Stoffe zuerst sorgfältig verpackt und verklebt, bei Benutzung von Pergamentschläuchen mit keimdichtem Verschluss versehen, bei Blechpackung dicht verlöthet und dann im strömenden Wasserdampf sterilisirt werden. Bei grösseren Packungen ist dasselbe leider nicht anwendbar, ebenso wenig natürlich da, wo flüchtige oder zersetzbare Körper, wie z. B. Jodoform, in Frage kommen. In solchen Fällen wird die Keimfreiheit durch Verwendung kochender, alkoholischer Lösungen gewährleistet.

III Das Oel der Samen *Oleum Gossypii* — *Cottonöl* Baumwollsaamenöl — *Huile de coton*. — *Cotton-oil* (U-St)

Aus den nach dem Egreniren (vergl. oben) zurückbleibenden Samen gewinnt man, nachdem sie meist geschält sind, durch Pressen das Oel, von dem sie 24 Proc. enthalten. Roh ist es rubinroth bis schwarz, raffiniert strohgelb von nussartigem Geschmack und meist saurefrei, da es bei der Reinigung mit Laugen behandelt ist. In der Kälte, aber auch schon bei gewöhnlicher Temperatur setzt es Stearin (Cotton-Margarin) ab, von dem man den flüssigen Antheil, der als Speiseöl dient, trennt.

Konstanten des Oeles Spec Gew bei 15° C 0,922–0,930 Spec Gew der Fettsäuren bei 100° C 0,8816 Schmelzpunkt der Fettsäuren 34–40° C Erstarrungspunkt 30–38° C *Henckes'sche* Zahl 95,87 Verseifungszahl 191–197 Verseifungszahl der Fettsäuren 203,9–208,0 Acetylzahl 16,6 Jodzahl 102–111 Jodzahl der Fettsäuren 111–115,7 Jodzahl des flüssigen Antheiles der Fettsäuren 136–148,2 Refraktometerzahl 1,4732

Es gehört zu den schwach trocknenden Oelen.

Bestandtheile. Triglyceride der Palmitinsäure, Oelsäure, Linolsäure und Linolensäure, ferner geringe Mengen von Oxyfettsäuren, Cottonölsäure (der Ricinölsäurereihe angehörend), eines aldehydartigen Körpers, eines schwefelhaltigen, widerlich riechenden Körpers.

Anwendung als Speiseöl und Brennöel, vielfach aber auch zur Verfälschung von Olivenöl. Um dies in einem solchen Fall nachweisen zu können, sind eine ganze Zahl von Reaktionen vorgeschlagen worden. Wir empfehlen die folgenden: 1) Salpetersäure (spec Gew 1,375) mit dem gleichen Volum Oel geschüttelt, färbt Oele, die mit Cottonöl vermischt sind, mehr oder weniger kaffeebraun, Olivenöl, Rübsöl etc. werden gelblich. 2) Bei der Elaidinprobe giebt es eine gelbe bis orangegefärbte Masse von butterartiger Konsistenz. 3) *Brown's* Reaktion. Man gebraucht folgende Lösungen: a) 1 g Silbernitrat in möglichst wenig Wasser und 200 ccm Alkohol (98 Proc.) gelöst, mit 20 ccm Aether und 0,1 Salpetersäure versetzt; b) 15 ccm Colzaöl (*Oleum Brassicae* von *Brassica campestris*) gelöst in 85 ccm Amylalkohol — 10 ccm des zu untersuchenden Oeles werden mit 1 ccm der Lösung a gemischt und dann 10 ccm der Lösung b zugegeben, durchgeschüttelt, in zwei Hälften getheilt und die eine Hälfte dann 5–10 Minuten in kochendes Wasser gestellt. Bei Gegenwart von Cottonöl wird die Probe hellgrau bis braun. Nicht so sicher wie Probe 1, da die Braunfärbung bei Gegenwart von Cottonöl ausbleiben kann und da z. B. Schweinefett sich auch mit Silberlösung färbt (vergl. auch S. 158).

Cottonolmargarin, der durch Abkühlen und Abpressen gewonnene feste Anteil des Oeles (vergl oben) Wird auch gewonnen, indem man den schwarzen Niederschlag, der bei Raffination des rohen Oeles mit Lauge entsteht, mit Säuren zersetzt, die dunkle Fettmasse mit Schwefelsäure erhitzt, mit Wasser ansieht, mit überhitzten Dampf destilliert und durch Abkühlen und Abpressen trennt. Es ist hellgelb von butterartiger Konsistenz.

Konstanten Spec Gew bei 15° C 0,923 Schmelzpunkt 30–39° C Erstarrungspunkt 16–22° C Schmelzpunkt der Fettsäuren 27–30° C Erstarrungspunkt der Fettsäuren 21–23° C HENRIE'sche Zahl 95,5–96,3 Verseifungszahl 194,6 Jodzahl 88,7 bis 92,8 Jodzahl der Fettsäuren 94,3

Anwendung als Speisefett und als Zusatz zum Schweineschmalz (vergl S 158)

Die Samen, die auch unverändert als Viehfutter benutzt werden, enthalten in Procenten

	Wasser	Stoff- substanz	Fett	Stickstoff- freie Ex- traktstoffe	Holzfaser	Asche	In der Trockensubstanz		
							Stick- stoff- substanz	Fett	Stick- stoff
Nicht geschält	9,76	19,56	19,01	22,45	23,46	4,86	21,68	22,06	3,46
Geschält	7,53	29,14	24,33	26,33	4,63	7,99	31,51	26,31	5,04

Die nach dem Abpressen des Oeles bleibenden Oelkuchen, die man als Kraftfutter verwendet, enthalten in Procenten

	Rohprotein	Rohfett	Stickstofffreie Extraktstoffe
Amerikanische	47,63	16,43	18,20
Ägyptische	25,00	7,15	26,13

Davon sind verdaulich in Procenten

84,70	87,80	95,10
-------	-------	-------

Übersicht der wichtigsten Textilfasern Für die Untersuchung genügt ein gutes Mikroskop mit 300mal linearer Vergrößerung. Man überzeugt sich zuerst bei schwächerer Vergrößerung (60–80 mal), ob das Untersuchungsobjekt gleichförmig ist oder aus verschiedenen Fasern besteht, und prüft dann die einzelnen genauer bei starker Vergrößerung.

Man untersucht die Fasern im Wasser, wozu sie etwas aufquellen und sich meist etwas verkürzen. Thierische Fasern werden 10–14 Proc dicker, künstliche Gelatineseide 50 Proc., pflanzliche Fasern bis 29 Proc.

Reagentien: Jodlösung, Schwefelsäure, Phloroglucin und Salzsäure, Kupferoxyd ammoniak vergl oben S 1238

Um Querschnitte von Fasern anfertigen zu können, fertigt man von denselben, indem man sie möglichst parallel legt, bleistiftdicke Stäbchen, die man mit folgender Lösung trankt: 70 g Gummi arabicum werden in gleichviel Wasser langsam gelöst. 4 g Hausenblase lässt man in 16 g warmen Wassers quellen und filtriert durch Musselin. 10 g des Filtrats werden der Gummilösung zugefügt, das Ganze im Wasserbad erhitzt und 10 bis 12 g Glycerin zugefügt. Die damit getränkten Fasern werden getrocknet und mit scharfem Rasirmesser geschnitten. Die Schnitte bringt man in einen kleinen Tropfen Wasser und legt das Deckgläschen vorsichtig auf.

Die Figuren 262–275 sind sämtlich bei 400facher linearer Vergrößerung gezeichnet.

A Die Faser lässt ein deutliches Lumen erkennen (Pflanzenfasern)

1. Pflanzenhaare. Die Faser lässt einen Gegensatz von Basis und Spitze erkennen: a unvorholzt, also mit Jod und Schwefelsäure blau, mit Phloroglucin und Salzsäure farblos. Baumwolle vergl oben. Das seit einigen Jahren angewendete Mercersiren der Baumwolle, das in einem Behandeln derselben mit Lauge besteht, um der Faser dadurch seidenartigen Glanz zu geben, verändert die Faser, indem sie dadurch etwas

aufrückt, sodass die Unebenheiten der Cuticula verschwinden; der Querschnitt ist runder, und die Wand dicker. b. schwach verholzt, mit Jod und Schwefelsäure gelb bis braun, mit Phloroglucin und Salzsäure roth. **Kapok.** Haare der Samen von *Eriodendron anfractuosum* D. C. (Bombacaceae). Bis 8 cm lang, 19–43 μ dick, im Querschnitt rund, an einer Seite etwas stärker verdickt, an der Basis mit schwachen, netzförmigen Verdickungsleisten. Aus Hindustan. Gutes Polstermaterial, da sich die Fasern nicht zusammenballen, aber die einzelne Faser ziemlich brüchig (Fig. 264).

II. Echte Fasern aus der Rinde, also an beiden Seiten gleich gestaltet.

a. unverholzt.

1. **Lein oder Flachs.** Faser von *Linum usitatissimum* L. (Linaceae). 2–6 cm (meist 2,0–3,0 cm) lang, 12–45 μ (meist 15–17 μ) dick. Enden schlank, peitschenförmig zugespitzt, selten stumpflich. Querschnitt rund, polyedrisch oder etwas gestreckt, lässt deutliche Schichtung erkennen. Häufig „Verschiebungsstellen“, wo die Faser auf der einen Seite etwas vorgewölbt erscheint. Häufig mit steilen Spirallinien. Diese Spirallinien, die den Lein scharf vom Hanf unterscheiden und die Risse in der Wand sind, erkennt man am besten, wenn man die Fasern scharf austrocknet und dann in absolutem Alkohol untersucht. Da es trotzdem oft nicht möglich ist, die einzelnen Fasern mit Sicherheit vom Hanf zu unterscheiden, kann man bei groben Geweben, Seilen etc. auf das übrige Rindengewebe, die „begleitenden Gewebelemente“ achten: Epidermiszellen sind gross, rechteckig, die Spaltöffnungen gross und deutlich, rund, mit zwei Nebenzellen, die Zellen des subepidermalen Gewebes kleiner wie die der Epidermis (Fig. 265).

2. **Hanf.** Faser von *Cannabis sativa* L. (Moraceae). 1–5,5 cm lang, 15–60 μ dick. Enden fast immer stumpf mit Neigung zu seitlicher Ausackung oder Zweigbildung. Querschnitt wie bei 1. Schichtung häufig deutlicher. Ebenfalls Verschiebungsstellen. Schiefe Spiralstreifung fehlt. Da der Hanf primäre und sekundäre Fasern bildet (der Flachs nur primäre), so sind die sekundären häufig viel dünnwandiger. „Begleitende Gewebelemente“: Epidermiszellen unregelmässig polyedrisch, kleiner wie bei 1. Spaltöffnungen sehr spärlich und klein, über das Niveau der Epidermis emporgewölbt. In der Epidermis grosse, dicke, gebogene, warzige Haare, die am Grunde in der Höhlung zuweilen einen Cystolithen führen. Die Zellen des subepidermalen Gewebes sind grösser wie die der Epidermis, in




Fig. 264. Kapok. a Basis des Haars. b Längsansicht aus der Mitte. c Spitze. d Querschnitte.




Fig. 265. Lein. a Faser mit schiefer Längsstreifung. b Faser mit Verschiebungsstellen. c Spitze einer Faser.




Fig. 266. Hanf. a, b, c Spitzen von Fasern. d mit angedeuteter, e mit ausgeprägter Verzweigung. d Querschnitt durch ein Faserbündel.

denselben Oxalatdrüsen und Milchsafschläuche mit braunem Inhalt. — Die Fasern des Hanfes sind zuweilen ganz schwach verholzt (Fig. 266).




Fig. 267. Ramié. *a* Spitzen von Fasern. *b* Querschnitte durch Faserbündel.

Fig. 268. Jute. *a* Faser mit Verengung und Verschluss des Lumens. *b* Faser mit Verengung und mit Tüpfeln. *c* Faserenden. *d* Gegabeltes Ende. *e* Querschnitt durch ein Bündel der primären, *f* der sekundären Fasern.

3. Ramié oder Chinagrass von *Boehmeria nivea* (L.) Hook. et Arn. (Urticaceae). Auf den Sundainseln und in China, auch in Europa angebaut: Diese vortreffliche Faser wird in Asien, wo man die einzelnen Fasern durch mühsame Handarbeit isoliert, seit lange zu „Nesseltuch“ verarbeitet, neuerdings gelingt es, die Fasern auch bei uns durch Maschinen im grossen abzuscheiden. 6–25 (meist 12 cm) cm lang, und bis 80 (meist 50) μ dick, also länger und dicker wie 1 und 2. Spiralstreifung und Verschiebungsstellen vorhanden, Enden stumpf, Querschnitt meist breit und deutlich geschichtet (Fig. 267).

b. verholzt.




Fig. 268. Manillahemp. *a* Längsansicht aus der Mitte der Faser. *b* Spitze. *c* Querschnitt durch ein Faserbündel. *d* Stigmata von oben, *e* von der Seite.

1. Jute von *Corchorus capsularis* L., *C. olitorius* L., auch *C. fuscus* L. und *decemangulatus* Roxb. (Tiliaceae). In Bengalen. Länge 1,5–5,0 mm, Dicke bis 25 μ . Enden stumpf, nicht selten ausgesackt oder verzweigt. Im Querschnitt lassen sich wie beim Hanf etc. deutlich stärker verdickte (primäre) und schwächer verdickte (sekundäre) Fasern unterscheiden. Schichtung niemals zu erkennen. Lumen streckenweise verengert oder sogar ganz geschlossen. Nicht selten feine Tüpfel in steiler Spirale. Obschon die Faser verholzt ist, färbt sie sich doch mit Jod und Schwefelsäure violett. Es ist ferner darauf aufmerksam zu machen, dass man der Jute die verholzenden Substanzen zuweilen entzieht, so dass sie sich dann mit Phloroglucin und Salzsäure nicht roth färbt. Wird bei uns zu größeren Geweben: Vorhängen, Tischdecken etc. verwendet (Fig. 268).

2. Manillahemp (Abaca, Plantainfibre, Siamhemp) von *Musa textilis* Nees (Musaceae). Auf den Philippinen. Länge 8–12 (meist 6) mm, Dicke 16–32 (meist 24) μ . Querschnitt polygonal mit stark abgerundeten Ecken oder rundlich. Lumen gross, zuweilen mit gelbem Inhalt. Sehr charakteristisch

sind kleine verkieselte Plättchen (Stigmata), welche die Faserbündel häufig begleiten. Sie sind länglich viereckig, solid mit einer runden, durchscheinenden Grube in der Mitte. Man sieht sie am besten, wenn man die Faserbündel in Chromsäure macerirt. Wird zu Seilen und Tauen verwendet (Fig. 269).

3. Coir. Faser aus dem Perikarp der Kokosnuss: *Cocos nucifera* L. (Palmae). Die Fasern bilden meist runde, einen Kanal einschliessende Bündel, der Gefässe enthält. Die Fasern sind braun, 0,4–1,0 (meist 0,7) mm lang, 12–24 (meist 20) μ dick, deutlich gestüpfelt. Die Fasern sind ebenfalls von verkieselten Plättchen (Stigmata) begleitet, die von rundlicher Form sind. Wird zur Herstellung von groben Teppichen, Schnüren etc. verwendet (Fig. 270).

B. Die Faser lässt kein Lumen erkennen (thierische Fasern).

I. Die Faser ist mit einer aus Schuppen bestehenden Epidermis bedeckt. Schafwolle: Die Faser besteht günstigsten Falles 1) aus der schuppigen Epidermis, 2) aus der faserigen Rindenschicht, 3) aus der aus über einander stehenden Zellen bestehenden Markschicht. Von diesen dreien kann die Markschicht ganz oder theilweise fehlen, so besonders bei feinen Merinowollen. Die Rindenschicht kann ausserordentlich reducirt sein, fehlt aber wohl nie völlig. Ebenso ist die Epidermis normal stets vorhanden, kann aber fehlen, wenn die Haare von Körpertheilen stammen, an denen sich die Thiere häufig reiben oder in Kunstwolle (Shoddy). Die Dicke ist sehr wechselnd: Merino 12–37 μ , Leicester 30 bis 90 μ . Die Länge kann 20 cm und mehr erreichen. Jodlösung färbt braun, MILLON's Reagens beim Erwärmen ziegelroth. Beim Verbrennen riecht die Faser unangenehm nach verbranntem Horn. Verdünnte Kalilauge löst vollständig (Fig. 271).

II. Die Faser besteht aus einem einfachen, soliden Faden. Seide: Der vollständige, von der Raupe des Seidenspinners (*Bombyx Mori* L.) secernirte Seidenfaden besteht aus zwei neben einander verlaufenden Fibroinfäden, die mit einer im frischen Zustande klebrigen Substanz verklebt und umhüllt sind (Sericinhülle). Durch den Degummirungsprocess wird die Hülle entfernt und die beiden Fäden getrennt. Der einzelne Faden ist im Querschnitt rundlich oder rundlich dreieckig, glatt, höchstens fein gestreift, zuweilen etwas abgeplattet oder um einander gedreht. Dicke 8–24 (meist 15) μ . Mit Jodlösung hellbraun; beim Auswaschen mit Wasser bleibt die Farbe lange Zeit. Concentrirte Kalilauge löst die Seide auf. Mit MILLON's Reagens roth, mit Zucker und Schwefelsäure rosa. Beim Kochen mit Salzsäure wird Mori-Seide kaum violett, fremde (wilde) Seiden meist deutlich violett (Fig. 272).

Die Fäden der sog. wilden Seiden, wie z. B. der Yamamayseide, der Tusahseide sind viel dicker, bräunlich oder gelblich, deutlich gestreift, im Querschnitt meist gestreckt dreieckig, deutlich punktirt (Fig. 272).

Seit einigen Jahren sind künstliche Seiden im Handel.

a. Die Kollodiumseide gewinnt man, indem man Kollodium aus engen Kapillaren austreten lässt, wobei der Faden sofort erstarrt. Die so gewonnene Seide wird durch Behandeln mit Schwefelammonium denitrirt, um ihr die Explosionsfähigkeit zu nehmen. Die Fäden einer untersuchten Probe sind sehr gleichmässig, etwa viermal dicker wie Seide und ziemlich spröde. Sie werden mit Jodlösung tief schwarzbraun, beim Auswaschen mit Wasser wird die Faser blau und bald farblos.

b. Gelatineseide, nach mehreren Verfahren dargestellt, die aber anscheinend




Fig. 270. Coir. a) Faser. b) Stigmata.




Fig. 271. Schafwolle. a) Haar mit reichlicher Markentwicklung. b) Haar mit spärlicher Markentwicklung. c) Feines Merinohaar ohne Mark.

im Grossbetrieb noch keine Verwendung gefunden haben: entweder mengt man die Gelatine mit Kal. bichromic. und setzt die gesponnenen Fäden dem Lichte aus, oder man macht die Gelatinefäden mit Formalin unlöslich. Die Fäden sind so dick wie die von a), in Wasserquellen sie um 50 Proc. auf. Sie werden mit Jod dunkelbraun, die Farbe bleibt beim Auswaschen mit Wasser lange Zeit erhalten.




Fig. 273. Seide. a) Roher Seidenfaden von Bombyx Mori, in der Mitte die beiden Fibrinfäden. b) Die Sericinshülle. c) Ein solcher Faden querdurchgeschnitten. d) Einfacher Seidenfaden. e) Querschnitt. f) Faden von Tussahseide, g) im Querschnitt.

Beginn der Zertrennung in Fibrillen zeigen, die in steiler Spirale angeordnet sind. Lein zeigt die schiefe Streifung und Verschiebungsstellen, Hanf Verschiebungsstellen und stumpfe Enden, Jute die Verengerungen des Lumens und Abwesenheit von Schichten in der Wand.




Fig. 278. Elemente des Strohstoffs. a) Epidermiszellen. b) Haare. c) Parenchymzellen.

die zerriebenen Stengel und Blätter unserer Cerealien, ferner Reis, Maislieschen, Esparto (von *Lygeum Spartum* L.), Halfa (von *Stipa tenacissima* L.) in Betracht. Sie werden

c. Celluloseseide, hergestellt durch Lösen von Baumwolle in Kupferoxydammoniak zu einer dicken Flüssigkeit, Verspinnen derselben und Behandeln der Fäden mit Schwefelsäure.

Vergl. weiter über Fasern: v. HÖHNEL, Mikroskopie der technisch verwendeten Faserstoffe.

Mikroskopische Untersuchung von Papier. Bei der Untersuchung von Papier handelt es sich, abgesehen von den physikalischen Prüfungen, für die besondere Apparate nöthig sind, um die Aschenbestimmung, die Bestimmung der Art der Leimung, Nachweis von Chlor und freien Säuren, um die Feststellung der dasselbe zusammensetzenden Fasern, wobei es einmal auf die Art der Fasern ankommt, dann meist auf die Feststellung, ob sich „Holzschliff“ unter denselben befindet.

Als Papierfasern kommen in Betracht:

1) von den bereits besprochenen hauptsächlich: Baumwolle, Lein, Hanf, Jute, neuerdings auch Ramie und Manilahanf. Sind diese Fasern direkt zu Papier verarbeitet, so bereitet ihr Nachweis nach den oben angegebenen Merkmalen keine besondere Schwierigkeit. Anders ist es, wenn sie aus Lumpen, „Hädern“ hergestellt sind, sie sind dann häufig weitgehend zertrümmert und zerfasert. Man kann sich dann an folgende Merkmale halten: Baumwolle bewahrt die Form am besten, man findet immer gedrehte Stücke, die aber häufig den

Zu diesen kommen dann 2) Fasern und faserähnliche Stoffe, die, wenigstens bei uns, nur für Zwecke der Papierfabrikation benutzt werden: a) die Faser des Papiermaulbeerbaumes *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., aus der man das bekannte japanische Papier macht, die aber auch bei uns verarbeitet wird. Solche Papiere, besonders zum Schreiben etc. benutzte glatte Sorten, zeichnen sich durch einen eigenthümlichen und unverkennbaren seidigen Glanz aus. Die Faser ist 6–25 mm lang, 25–35 μ dick. Sie sieht im allgemeinen der Baumwolle recht ähnlich, lässt aber Schichtung und Verschiebungsstellen erkennen. Zuweilen haften den Fasern kleine Oxalatkrystalle an und die Fasern stecken zuweilen in einer mit Jod und Schwefelsäure sich gelb färbenden Scheide, die der primären Membran angehört. b) Strohstoff: Als solcher kommen

sämmtlich erkannt an den lang-gestreckten, vielfach buchtigen Epidermiszellen, kurzen, gekrümmten, dickwandigen, einzelligen Haaren, schlauch- oder sackförmigen Parenchymzellen, die, obgleich ziemlich dünnwandig, doch offenbar vermöge ihrer Elasticität im Papier wohlverhalten sind (Fig. 273). Dazu kommen die schlanken, dünnen Fasern und Gefässe. c) Holzschliff und Holzcellulose: Beide werden aus dem Holze unserer Nadel- und Laubholz-bäume bereitet, indem man das Holz stark zerkleinert und zerreibt. Der Holzschliff wird dann direkt zur Papierfabrikation verwendet, seine Elemente sind also grösstentheils verholzt und werden daher mit Phloroglucin und Salzsäure roth; für Herstellung der Holzcellulose wird das Holz durch Natronlauge unter hohem Druck in seine Elemente zerlegt oder auch wohl das zerriebene Holz damit behandelt; in beiden Fällen wird aber im Holz das Lignin zerstört und es giebt die Phloroglucinreaktion nicht oder nur sehr schwach. Der Nachweis von Holzschliff ist oft von grosser Wichtigkeit, da solche Papiere wenig haltbar sind. Die Feststellung, ob Nadel- oder Laubholz verwendet ist, ist leicht zu führen, im ersteren Fall achtet man auf die Tracheiden des Holzes mit ihren behöften Tüpfeln (Fig. 274), im zweiten auf die sehr charakteristischen Bruchstücke der Gefässe (Fig. 275).

Um ein Papier für die mikroskopische Untersuchung vorzubereiten, wird ein Stück desselben, in Stückchen von etwa 1 □ cm Grösse zerschnitten, in einem Kolben mit Aether übergossen und etwa $\frac{1}{2}$ Stunde am Rückflusskühler erhitzt, dann giesst man den Aether ab, spült noch einige Male damit nach, lässt das Papier abtrocknen und kocht es dann in Wasser in einer Porcellanschale unter Ersatz des verdampfenden Wassers mindestens eine Stunde. (Den allgemein angegebenen Zusatz von Natronlauge können wir nicht empfehlen, da es nicht ausgeschlossen erscheint, dass bei gelegentlicher Concentration der Lösung die Lauge die Fasern angreift und ihre Erkennbarkeit erschwert.) Dann bringt man die aufgelockerten Papierstückchen in einen Mörtel und zerreibt sie mit wenig Wasser unter schwachem Druck mit dem Pistill zu einem gleichförmigen Brei, von dem man kleine Mengen auf den Objektträger bringt, sie fein vertheilt und dann unter dem Mikroskop untersucht. Für eine vorläufige Klassificirung der Fasern ist es sehr nützlich, die Fasern in Jodlösung (20 Wasser, 1,15 Jod, 2 Jodkalium, 1 Glycerin) zu untersuchen. Es bleiben dann farblos oder werden ganz schwach gelb gefärbt: Holz-, Strohcellulose. Es werden gelb gefärbt: Holzschliff, Jute. Es werden braun gefärbt: Baumwolle, Leinen, Hanf. Für den speciellen Nachweis von Holzschliff dient, wie oben erwähnt, Phloroglucin und Salzsäure. Man soll sich aber nie damit begnügen, die Bestimmung der Fasern nur nach solchen Farbreaktionen vorzunehmen, sondern soll durch genaue Untersuchung die Natur der einzelnen Fasern feststellen. Die quantitative Abschätzung der einzelnen Bestandtheile eines Papieres ist schwierig und verlangt ziemlich viel Uebung. Man hat sich dabei davor zu hüten, die Menge stark gefärbter (roth oder braun) Fasern zu überschätzen.

Vergl. weiter: HERZBERG, Papier-Prüfung 1888, und das oben genannte Buch von v. HÖHNEL.




Fig. 274. Nadelholztracheiden mit behöften Tüpfeln.




Fig. 275. Bruchstück eines Gefässes aus Laubholz.

Granatum.

Punica Granatum L. Familie der Punicaceae. Heimisch von der Balkanhalbinsel bis zum Himalaya, durch die Kultur in alle tropischen und subtropischen Gebiete verbreitet. Kleiner, bis 8 m hoher Baum oder Strauch mit lederigen, kurzgestielten, 5 cm langen, bis 22 mm breiten, ganzrandigen, oblong-lanzettlichen Blättern. Blüten einzeln, terminal und in den Blattachsen mit granatroth gefärbtem Receptaculum und Kelch und scharlachrother Korolle. Kelchblätter 5–8, ebensoviel damit abwechselnde Kronblätter. Antheren in vielen, nach innen absteigenden Kreisen. Fruchtknoten unterständig, mit 2 Kreisen von Fächern, einem äusseren, vor den Kronblättern stehenden, mit ihnen gleichzähligen und einem inneren, tieferen aus meist nur 3 Fächern. Griffel fadenförmig mit

verdicktem Grunde und kopfiger Narbe. Frucht eine vom Kelch gekrönte Beere mit zahlreichen Samen, die äussere Schicht der Testa saftig, pulpös, durchsichtig. Embryo mit spiralig um einander gerollten Kotyledonen.

Verwendung findet die Rinde der Wurzel und der Zweige.

Cortex Granati (Germ. Helv. Austr.). Granati Cortex (Brit.). Granatum (U-St.). — Granatriinde. Bandwurmrinde. — Écorce de grenadier (Gall.). — Pomegranate bark.

Nach den genannten Arzneibüchern ist Wurzel-, Stamm- und Astrinde zulässig, nach Gall. indessen nur die Wurzelrinde. Helv. lässt den Vorrath jährlich erneuern.

Beschreibung. Bis 10 cm lange, unregelmässig eingerollte oder rinnenförmige, oft verbogene Stücke, die bis 3 mm dick sind. Sie bricht glatt, ist im Innern gelblich,

höchstens nach aussen etwas grau oder braun. Die Wurzelrinde ist durch frühzeitigentstehende Schuppenborke ausgezeichnet. Auf der Zweigrinde häufig Flechten. Nach dem Abschälen des Korkes kommt bei der Zweigrinde häufig chlorophyllführendes Gewebe zum Vorschein. Geschmack herbe.




Fig. 276. Korkzellen aus Cortex Granati.




Fig. 277. Steinzellen aus Cortex Granati.

Bei stärkerer Vergrösserung ist der Bau sehr charakteristisch: der Kork besteht aus dünnwandigen und aus an der Innenwand verdickten Zellen (Fig. 276). In der primären Rinde fallen grosse, etwas in der Richtung der Axe gestreckte Steinzellen auf, die auch in den äusseren Parthien des Bastes vorkommen (Fig. 277). Dieser selbst besteht aus

1—2 Reihen breiten Markstrahlen und schmalen Baststrahlen, in denen Schichten, die eine Oxalatdrüse führen, mit solchen, die oxalatfrei sind und Siebröhren enthalten, abwechseln (Fig. 278). (Besonders bei schwächerer Vergrösserung tritt die Regelmässigkeit des Baues deutlich hervor.) Ausser den Drüsen kommen auch, besonders in der Mittelrinde, Einzelkrystalle vor. — Im Pulver fallen die grossen Steinzellen, die Oxalatdrüsen und Stärkekörnchen des Parenchyms, die 2—8 μ gross, rundlich oder keulenförmig und selten zusammengesetzt sind, ferner die Einzelkrystalle und die einseitig verdickten Korkzellen auf. — Ausserdem lässt sich in der Rinde mit Leichtigkeit Gerbstoff mikrochemisch nachweisen.




Fig. 278. Querschnitt aus dem Bast von Cortex Granati. M Markstrahlen. B Baststrahlen.

Bestandtheile. Die wirksamen Bestandtheile sind einige Alkaloide: Pelletierin $C_8H_{15}NO$, flüssig, Siede-P. 195° C., spec. Gew. bei 0° C. 0,988, löslich in

Alkohol, Aether, Chloroform, 20 Th. Wasser; es dreht rechts. Methypelletierin $C_8H_{17}NO$, flüssig, Siede-P. 215° C., löslich in 25 Th. Wasser, in Alkohol, Aether, Chloroform. Pseudopelletierin $C_8H_{15}NO \cdot 2H_2O$, krystallinisch, Schmelz-P. 246° C., löslich in Wasser, Aether, Chloroform und Alkohol. Isopelletierin $C_8H_{15}NO$, von denselben Eigenschaften wie Pelletierin, aber optisch inaktiv. Das Pseudopelletierin (Granatonin) ist eine tertiäre Base und wahrscheinlich ein Ketonamin. Hauptträger der Wirksamkeit soll das erste Alkaloid sein. Ferner enthält die Droge 20—28 Proc. Gerbsäure, die mit der Gallusgerbsäure identisch ist. Nach anderen Angaben ist daneben noch ein zweiter Gerbstoff in der Droge vorhanden. Sonst liefert die Rinde Benzolextrakt 0,76 Proc., Aether-Extrakt 0,30 Proc., Alkoholisches Extrakt 9,93 Proc., wässriges Extrakt 12,85 Proc.,

alkalisches Extrakt 6,26 Proc, saures Extrakt 7,62 Proc, Lignin 8,98 Proc, Cellulose 31,89 Proc, Feuchtigkeit 8,70 Proc, Asche 2,7 Proc. Nach anderer Angabe 10,73 Proc Asche. Der Alkaloidgehalt der Droge ist ein sehr schwankender und daher Feststellung desselben und Gebrauch einer Waare von möglichst gleichförmigem Gehalt sehr zu empfehlen. Ältere Rinde soll im Alkaloidgehalt zurückgehen, dagegen scheint das Trocknen ohne Einfluss darauf zu sein.

Die niederländische Pharmacopoe verlangt einen Minimalgehalt von 1 Proc an sauren Alkaloiden, was bemangelt wurde, da die Handelswaare selten mehr als 0,3 Proc reine Alkaloide enthalten soll. Diese Zahl ist entschieden zu niedrig gegriffen. Ewers fand bei Untersuchung zahlreicher Wurzel- und Stammrinden 0,5–0,7 Proc reiner Alkaloide und konnte einen wesentlichen Unterschied zwischen Wurzel- und Stammrinden nicht konstatieren, wogegen von anderer Seite die Superiorität der Wurzelrinde mit 1 Proc und darüber aufrecht erhalten wird. Uns gaben eine Reihe von Mustern, die aus Stamm- und Wurzelrinde gemengt waren 0,5–0,6 Proc. — Am alkaloidreichsten sind javanische Rinden, in denen Ewers 0,92–0,98 Proc fand. Erheblich höher sind früher von Ströden gefundene Zahlen bei javanischer Wurzelrinde, nämlich 1,71–3,75 Proc salzsaurer Alkaloide.

Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes kann man 12 g Cortex Granati gr m pulv in einem 200 g-Glase mit 120 Aether Chloroform (3:1) übergossen, nach kräftigem Durchschütteln 10 ccm 20 proc Natronlauge und nach einer Stunde, während welcher wiederholt umgeschüttelt ist, noch 10 ccm Wasser zugeben und wieder umschütteln, bis sich das Pulver gut zusammenballt. Von der klar überstehenden Aether-Chloroformlösung giesst man 100 g durch ein trockenes Filter in einen Scheidetrichter. Diese Lösung (= 10 g Rinde) schüttelt man mit 50 ccm $\frac{1}{100}$ N-Salzsäure und darauf dreimal mit je 10 ccm Wasser aus (oder so lange, bis das Wasser mit Mäxer'schem Reagens keine Trübung mehr giebt), füllt die wässrigen, sauren Lösungen zu 100 ccm auf, giebt 50 ccm davon in eine Flasche, verdünnt mit gleichviel Wasser und titirt nach Zusatz von Aether und 5 Tropfen Jodeosinlösung mit $\frac{1}{100}$ N-Kalklauge, bis die wässrige Schicht blauschwarz wird. Die zur Neutralisation der Alkaloide verbrauchten Kubikcentimeter $\frac{1}{100}$ N-Salzsäure $\times 0,00295$ = Gehalt an Alkaloiden. — Oder man macht, um die Alkaloide gravimetrisch zu bestimmen, die saure Lösung wieder alkalisch, schüttelt wieder mit Aether-Chloroform aus, destillirt ab, verdampft zur Trockne und wägt.

Verwechslungen und Verfälschungen. Als solche werden die Wurzelrinden von *Berberis vulgaris* L, *Buxus sempervirens* L, *Morus nigra* L angegeben. Sie haben sammtlich nicht den beschriebenen, charakteristischen Bau.

Aufbewahrung. Da, wie oben angegeben, die Rinde an Wirksamkeit verliert, so sollte man sie alle Jahre erneuern. Das gilt ganz besonders für die gepulverte Droge.

Anwendung. Als gutes und zuverlässiges Bandwurmmittel. Es ist aber daran zu erinnern, dass nach ihrem Gebrauch schwere Vergiftungsfälle vorgekommen sind, und dass vor ihrer Anwendung durch nicht Sachverständige dringend gewarnt werden muss. Man verwendet sie als Abkochung oder Maceration, am zweckmassigsten aber als Macerationsdekot (s. Apozema) aus 50–60 g Rinde, welches man heiss filtrirt und, um das Erbrechen zu verhindern, mit einem Zusatz von Ingwersirup versieht. Es wird auf dreibis viermal binnen einer Stunde genommen. — Die für ein Dekot empfohlene Menge von 200–400 g ist zu gross und nicht anzuwenden. In den vielfach angewendeten, kalt bereiteten, wenigen Auszug der Rinde geht nach unseren Untersuchungen nur etwa $\frac{1}{10}$ der Alkaloide über, in den heiss bereiteten die Hälfte. — In Deutschland ist die Rinde dem freien Verkehr entzogen. Das Extrakt darf im Geltungsbereich der Austr nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden.

Apozema de cortice radiceis puniceae (Gall.) Granatrindenabkochung. **Apozème d'écorce de racine de grenadier.** 60,0 frische, zerstoßene Granatwurzelrinde macerirt man wenigstens 6 Stunden mit 750,0 destill. Wasser, kocht über freiem Feuer auf $\frac{3}{4}$ ein, sieht durch und filtrirt (heiss!).

Decoctum Granati corticis (Brit.) Decoction of Pomegranate Bark. 200 g gepulverte Granatrinde (Nr 10) kocht man 10 Minuten mit 1200 ccm destill. Wasser, sieht durch und bringt durch Nachwaschen mit Wasser auf 1000 ccm Flüssigkeit. Gabe 15 bis 60 g.

Extractum Granati Extr Punicae Granati. Extr Granati alcohole paratum Granatrindenextrakt Granatwurzelextrakt — **Extrait de grenadier** (alcoolique) Austr Aus gepulverter Granatrinde wie Extr Aconiti Austr (S 155) zu bereiten — **Ergänz** Aus fein zerschnittener Granatwurzelrinde wie Extr Coffae Ergänz (S 906) Harzige Ausscheidungen während des Eindampfens bringt man durch kleine Mengen Weingeist wieder in Lösung Nach E DIETENICH vermeidet man dieselben, wenn man die aus 1000,0 Rinde gewonnenen Auszüge auf 250,0 eindampft, mit 100,0 Weingeist versetzt und nun zu einem dicken Extrakt bringt Ausbeute etwa 20 Proc — **Gall** Wie Extr Digitalis alcool par Gall (S 1041, 2)

Extractum Granati corticis solidum **Decoctum Granati corticis siccum** Granatwurzelrinde — **Dauerextrakt** (Diet) 1000 g gepulverte Rinde maceriert man 12 Stunden mit 5000,0 destill Wasser, erhitzt 2 Stunden im Dampfbad, nach dem Auspressen nochmals mit 3000,0 Wasser 2 Stunden, presst aus, löst 700 g Milchzucker und bringt I a (s Extr Uvae Ursi S 363) auf 1000 g

Boll taenifugi REITENBACHER.

Rp Extract Granati cort. 10,0
Extract Filicis 5,0
Rhizom Filicis pulv q s

Man formt 80 Pillen, die man mit geschmolzenem Wachs überzieht

Decoctum contra taeniam BLOCH

BLACH'S Bandwurmmittel

Rp Cort Granat rad gr pulv 50,0
Aquea destillatae 500,0

kocht man übermässigen Feuer auf $\frac{1}{4}$ ein, fügt hinzu

Flor Koso 10,0

Heist erkalten, seht durch, bringt die Seifh Flüssigkeit auf 85,0 und setzt hinzu

Spiritus (90 %) 15,0

I.

Rp Extract Granati 5,0
Spiritus 5,0
Sirupi simplicis 90,0

Decoctum Granati WALDENBURG

Rp Cort Granati radie 30,0
Aquea frigidae 800,0

maceriert man 12 Stunden, kocht, sodass man 2,00

schlflüssigkeit erhält und fügt hinzu

Sirupi Zingiberis 30,0

Die Hälfte auf einmal, nach $\frac{1}{4}$ Stunde die andre Hälfte

Emulsio taenifuga RICHTER

Emulsio contra taeniam. Bandwurm-Emulsion

Rp Apozamac de cort. Granat. 60,0 130,0
Olei Ricini 30,0
Gummi arabici pulv 15,0
Sirupi Liquintinae 30,0

M f. leg art emulsio Für Erwachsene morgens die Hälfte, nach $\frac{1}{4}$ Stunde die andre Hälfte

Sirupus Granati corticis

II

Rp Succ e Granato 55,0
Syrupchari albi 65,0

2) **Cortex Granati fructus** **Cortex Granatorum s Psidii. Malicorium.** — Granatschale Granatäpfelschale — **Ecorce de grenade** (Gall) Sie enthält bis 28 Proc Gerbstoff

Anwendung In der Färberei und Gerberei (bei Bereitung des Saffian)

3) **Flores Granati. Flores Balaustii Balaustia** — Granatblüthen — **Fleur de grenadier Balauste** (Gall)

Nur noch selten im Theeaufguss bei Ruhr, Durchfall, Weissfluss, auch als Gurgelwasser

4) **Die ganze Frucht; Fruit du grenadier** (Gall)

In Frankreich bereitet man daraus

Sirupus Granatorum. Sirop de grenade (Gall) in derselben Weise, wie Sirupus Cerasi Gall. (S 697)

Succus e Granato. Suc de grenade (Gall) Man zerreibt das Fleisch der Granatpfel auf einem Haarsiebe, fängt den Saft auf, presst den Rückstand, unterwirft die vereinigten Flüssigkeiten der Gährung und filtrirt sie zuletzt

Antidysentericum. Ein Gemenge aus Granatwurzelextrakt, Rosenextrakt, Pelletierin, Myrobalanen und Gummi (RUPPEL'S Mentor)

Bandwurmmittel nach Ther Gaz Pelletierin sulfuric 0,18, Tannin 1,0, Aquea destill, Sirup simpl. ss 80,0, Tinct. Aurant cort. gttis X. Auf zweimal innerhalb $\frac{1}{4}$ Stunde zu nehmen

Bandwurmkur nach JANSSEN Besteht in dem Gebrauch von Pillen, welche aus Granatextrakt hergestellt werden, das man aus frischer nicht getrockneter Granatwurzelrinde bereitet

Bandwurmkur nach FLEISCHMANN, bei Kindern

I.

Rp Extracti Granati cort rad
Extracti Filicis aeth. ss 2,5
Cort. Granat. rad q s

Man formt 40 Pillen und überzuckert sie

II

Rp Extract Granati cort rad
(vel Extract. Filicis) 2,5
Olei Ricini 10,0
Gummi arabici piv 5,0
Aquea Menthae pip 82,5

M f. emulsio

Morgens 3 mal 10 Pillen, bei eintretender Uebelkeit zwischendurch Thee oder Limonade, bei Erbrechen giebt man nach $\frac{1}{4}$ Stunde die übrigen Pillen, 4 Stunden später Mixtur II auf zweimal (vergl. hierzu S 1157, Abs. 3)

Bandwurmmittel von Mook in Berlin ist eine mit Wurmfauextract versetzte Abkochung von Granatwurzelnrinde

Granula.

Granula (Germ. *Helv*) **körner** **Granules** (Gall.) **Paivules** Als „Granula, Körner“ bezeichnet man kleinste Pillen, welche mit besonderer Sorgfalt hergestellt sind und meist stark wirkende Arzneistoffe enthalten. Da sie weiss sind, muss bei ihrer Bereitung auch die peinlichste Sauberkeit eingehalten werden.

Germ. Zur Bereitung von Körnern werden die Arzneistoffe entweder unmittelbar oder nach vorgangiger Lösung in Aether, Weingeist oder Wasser mit der, einem Gewichte von 0,05 g für das einzelne trockene Korn entsprechenden Menge einer pulverförmigen Mischung aus 4 Th Milchzucker und 1 Th arabischem Gummi sorgsam gemengt. Aus dem Gemenge werde mittels weissen Sirups, welchem auf je 1 Th = 0,1 Glycerin zugesetzt worden, eine bildsame Masse hergestellt, und letztere dann in die vorgeschriebene Anzahl runder Körner geformt. Ein oberflächliches Befeuhten vorrätiger, aus indifferenter Masse geformter Körner mit einer Lösung des Arzneistoffes ist nur bei den homöopathischen, sogenannten Streukügelchen gestattet.

Helv. 1,5 g arabisches Gummi wird mit dem verordneten Medikamente innig gemischt, dann mit 3,5 g Zucker und 8 Tropfen Wasser zu 100 Körnern verarbeitet.

Das Anstossen der Körnermasse erfolgt zweckmässig in einem mit Kalilauge sorgfältigst gesäuberten, glasierten Porcellanmörser. Man stösst die Masse ziemlich derb an. Zum Ausrollen halte man eine besondere Pillenmaschine. Alle Theile, mit denen die Körner in Berührung kommen, auch die fertige Masse, reibe man kurz vor dem Ausrollen mit *Talcum venetum* ab, desgl. die Finger.

Sollen die Körner aufbewahrt werden, so stösst man sie ohne Glycerinzusatz, sondern nur mit Gummischleim oder mit Zuckersirup an, weil sie sich, mit Glycerin angestossen, leicht abplätten.

Da, wo mehrere Sorten Körner vorrätig gehalten werden, empfiehlt es sich, die einzelnen Sorten — zur Vermeidung von Verwechslungen — in verschiedenen Farben zu färben. Man benutzt hierzu Lösungen von Eosin, *Tinctura Croci*, *Tinctura Curcumae* u. dgl. Auch kann man die Körner versilbern oder vergolden.

Gratiola.

Gattung der Scrophulariaceae—Antirrhinoideae—Gratiolaceae.

Gratiola officinalis L. Heimisch in Europa, West- und Mittelasien, in Nordamerika wahrscheinlich eingeschleppt — Verwendung findet

1 Das Kraut † *Herba Gratiolae* (Ergänzb.) *Hb. gratiae* dei — Gottesgnadenkraut. Purgierkraut. Erdgalle. Weisses oder wildes Auring¹⁾. — *Gratiola* (Gall.) *Herbe à pauvre homme* — Hedge-hyssop.

Beschreibung. Der Stengel ist bis 30 cm hoch, vierkantig, kahl, Blätter bis 4 cm lang, decussirt, lanzettlich, vorn gesägt mit mehreren Längsnerven. Blüthen gestielt in den Blattachseln, mit 2 linealen Vorblättern. Kelch 5theilig, Korolle trichterig, viel-spaltig, fast 2lippig, hellgelb, innen behaart. Nur 2 Staubblätter ausgebildet, die Anthereuhälften durch das verbreiterte Connektiv getrennt, ausserdem 2 Staminodien. Geruchlos, von bitterem Geschmack.

¹⁾ Wenn im Handverkauf Erdgalle oder Auring verlangt wird, so pflegt man *Herb. Centaurei minor* zu verabfolgen.

Bestandtheile 2 Glukoside 1) Gratiolin $C_{40}H_{84}O_{14}$, krystallinisch, schwer löslich in kaltem Wasser und in Aether, leicht löslich in heissem Wasser und in Alkohol. Schmilzt bei $200^{\circ}C$. Liefert mit verdünnter Schwefelsäure Zucker und Gratioletin und Gratioleretin. 2) Gratosolin $C_{40}H_{84}O_{14}$, amorph, ziemlich leicht löslich in Wasser und Alkohol, schwer in Aether. Schmilzt bei $125^{\circ}C$. Liefert mit verdünnter Schwefelsäure Zucker und Gratosoletin, welches, ebenfalls glukosidischer Natur, Zucker, Gratosoleretin und Hydrogratosoleretin liefert. Das Gratosolin scheint der Träger der Wirkung zu sein. Ferner eine Fettsäure Gratiolinsäure und deren Glycerid, das Gratiolafett.

Das im Juni und Juli während der Blüthe ohne Wurzel gesammelte Kraut 4 Th frisches geben 1 Th trocknes — Vorsichtig aufzubewahren!

Anwendung. Aeusserst selten als Abführmittel zu 0,15–0,3 in Pulver oder Abkochung. Grösste Einzelgabe 1,0 g, grösste Tagesgabe 3,0 g (nach LEWIS). Neuerdings bei Wassersucht in Form von Extractum aquosum liquidum empfohlen.

† Extractum Gratiolae (Ergänzb.) Gottesgnadenkraut-Extrakt. Wird aus dem frischen, blühenden Kraut wie Extractum Belladonnae Germ (S 469) bereitet. Ausbeute etwa 8 Proc. Man giebt es zu 0,05–0,1. Grösste Einzelgabe 0,5 g, grösste Tagesgabe 1,0 g (LEWIS).

2 Das Rhizom † Rhizoma Gratiolae.

Beschreibung 3–4 mm dick, stielrund, gegliedert, unterseits bewurzelt. Rinde durch grosse Lufträume lückig, mit grossem Mark.

Führt anscheinend dieselben Bestandtheile wie das Kraut und gilt als noch wirksamer als dieses.

Grindelia.

Gattung der Compositae—Asteraceae—Solidagineae

1 **Grindelia robusta** Nuttall. Gumplant, Wild Sunflowers, Yellow tairweed. Heimisch in Nordamerika langs der Küste des Stillen Oceans.

Man verwendet das blühende Kraut Herba Grindellae (Ergänzb.) Grindelia (U-St.) Flores, Stipites & Summitates Grindellae. — Herbe de grindelie.

Beschreibung Die im jüngeren Zustande weissflaumigen Stängel tragen spärlich behaarte, deussierte, nach oben den Stängel umfassende, spatelförmige bis lanzettförmige Blätter, die durchscheinend punktiert sind. Die Blättchen des Hüllkelches der Köpfchen sind zurückgekrümmt und aussen mit einem braunen, im frischen Zustande milchweissen Sekret bedeckt. Die ganze Pflanze ist klebrig von einem solchen, durch Drüsenhaare ausgeschiedenen Sekret.

Bestandtheile wenig studirt. Es werden genannt ein Saponin zu 2 Proc., Grindelin, ein dunkelbraunes, unangenehm riechendes ätherisches Oel, das die Hirn- und Rückenmarksfunktion herabsetzen soll, ein Harz, das expectorirend wirkt. Ueber die Anwesenheit eines Alkaloids stehen sich die Angaben direct gegenüber.

Verwechslungen. Der Droge sollen auch andere Arten beigemengt werden, so Grindelia squarrosa Dunal, Gr. integrifolia D C, Gr. inuloides Willd., Gr. glutinosa Dunal, Gr. hirsutula Hook et Arn, Gr. rubricaulis D C.

Anwendung. Bei Asthma, Keuchhusten, Blasenkatarrh, Katarrh der Harnröhre, Nierenleiden. Grössere Dosen wirken giftig.

Elixir Grindellae (Nat. form.) Elixir of Grindelia. 65 cem Extract Grindellae fluid (U-St.), 10 cem Spirit Aurantii comp (U-St.), 115 cem Alcohol deodorat (U-St. 92,5 proc), 810 cem Elixir Paraxaci comp (Nat. form.) werden gemischt.

Extractum Grindellae fluidum Grindelia-Fluidextrakt. Fluid Extract of Grindelia. Ergänzb. Aus grob gepulvertem Grindeliakraut wie Extr. Frangulae fluid Germ (S 1181) 1 Th Kraut erfordert 7–7½ Th Lösungsmittel — U-St. Aus 1000 g Grindeliakraut (No 30) und Weingeist (91 proc) im Verdrängungswege. Man

befeuchtet mit 300 cem, fangt zuerst 850 cem auf und stellt 1 a 1000 cem Fluidextra her — Anwendung bei Asthma 2—3 cem mehrmals täglich

Extractum Grindellae (boravatum) 1000 Th Grindelakraut erhitzt man in Boraxlösung 25 4000 Th, digerirt 2 Tage, presst, lässt absetzen und dampft zum dicken Extrakt ein Zu 0,1—0,2 g mehrmals am Tage

Sirupus Grindellae Man presst die zerquetschten Blütenköpfchen und bring 100 Th des Saftes mit 200 Th Zucker und 60 Th Weingast (45 proo) zum Sirup E tempore 5,0 Grindela Fluidextrakt, 95,0 Zuckersirup

II Grindelia squarrosa Dunal, Ague weed In Mexiko und in den westlichen Staaten der Union Blätter schmal lanzettlich, gegen die Basis zusammengezogen wie herzförmig — Enthält ebenfalls ein Saponin — Verwendet gegen Intermitteus und Rheumatismus

Guaco.

Unter Guaco und Huaco versteht man eine ganze Anzahl von Arzneipflanzen, die sammtlich in Süd- und Mittelamerika, zunächst gegen Bisse giftiger Schlangen, dann auch als Heilmittel gegen Syphilis, Krebs und Rheuma empfohlen werden Sie sind wiederholt nach Europa gekommen Es sind als solche hauptsächlich zu nennen **Mikania Guaco** H B und andere Arten (Compositae—Eupatorieae—Ageratinae), ferner Arten von **Aristolochia**, so **A fragrantissima** Ruiz, dann **Comocladia integrifolia** Jac (Anacardiaceae), **Cissampelos Pareira** L (Menispermaceae) und endlich Pflanzen aus den Familien der Liliaceen, Cucurbitaceen und Passifloraceen

Mikania Guaco ist auch als Condurango nach Europa gekommen

Guajacolum.

I † Guajacolum (Ergänzb Helv) **Guaiacol** (Gall.) **Guajakol**. Brenzcatechin monomethylester **Méthylpyrocatechin** $C_8H_8(OH)OCH_3(1 \cdot 2)$ Mol Gew. = 12

Darstellung Das Guajakol ist ein wesentlicher Bestandtheil des Buchenholtheer-Kieosots und wird aus diesem abgeschieden, indem man die bei 200—205° C übergehende Fraktion desselben erst mit starkem Ammoniak wäscht Dann bildet man durch Zugabe einer alkoholischen Lösung von Kalhydrat das Kalisalz (Guajakol-Kalium), wäscht dieses mit Aether, krystallisirt es aus Alkohol um und zerlegt es mit verdünnter Schwefelsäure Das in Freiheit gesetzte Guajakol wird alsdann wiederholt rectificirt B vor etwa 10 Jahren kannte man es nur als Flüssigkeit, heute gewinnt man es in Krystalle indem man die Lösung des reinen Guajakols in Petroläther der freiwilligen Verdunstung überlässt.

Eigenschaften Entweder eine klare, farblose oder schwach gelbliche, ölige Flüssigkeit oder farblose, prismatische Krystalle, welche bei 28—28,5° C schmelzen Es besitzt einen durchdringenden, rauchartigen Geruch, ätzenden Geschmack, siedet bei etwa 205° C und hat im flüssigen Zustande bei 15° C das spec Gew 1,143 (Ergänzb Siedepunkt 205° C, spec Gew 1,117—1,143 Schmelzpunkt nicht unter 28° C Helv Siedepunkt 200—203° C, spec. Gew 1,116—1,133 Gall. Siedepunkt 205° C, spec Gew 1,14 Schmelzpunkt 28,5° C)

Es ist löslich in etwa 60 Th Wasser, oder in 7 Th Glycerin In Alkohol, Aether, Eisessig, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und zahlreichen anderen Lösungsmitteln ist es leicht löslich — Die wässrige Lösung wird auf Zusatz von Ferrichloridlösung missfarbig Die alkoholische Lösung wird auf Zusatz von wenig Ferrichlorid rein blau, durch Zusatz von mehr Ferrichlorid smaragdgrün, später braun

Prüfung. 1) Ein Volumen Guajakol gebe, mit zwei Volumen Petroleumbenzol geschüttelt, eine bald klar werdende Mischung, welche aus zwei Schichten besteht Blei

die Mischung längere Zeit trübe, so weist dies auf Verunreinigungen des Guajakols hin
 2) Ein Volumen Guajakol muss sich in zwei Volumen Natronlauge unter Selbsterwärmung auflösen Diese Mischung muss nach dem Erkalten zu einer weissen Salzmasse erstarren (Farbung = chinonartige Verunreinigungen) und in 10 Volumen Wasser klar löslich sein (Trübung = Kohlenwasserstoffe)
 3) Wird 1 Tropfen Guajakol zu 10 Tropfen konzentrierter Schwefelsäure zugefügt, so trete eine reine gelbe, nicht röthliche Farbung auf (Kreosot), erst auf Zusatz von etwas Aceton färbe sich die Mischung intensiv roth.

Aufbewahrung Vorsichtig und vor Licht geschützt, da es unter dem Einflusse des Lichtes nachdunkelt Dunkelgewordene Präparate können durch Ueberdestilliren wieder farblos erhalten werden

Anwendung Nach GUTTMANN tödtet das Guajakol, wenn es in einer Verdünnung von 1 2000 im Blute cirkulirt, die Tuberkelbacillen, bei einer Verdünnung von 1 4000 schwächt es sie noch Es dient daher in ausgedehntem Maasse zur Bekämpfung der Tuberkulose Man giebt es in Gaben von 0,05—0,1 g mehrmals täglich in Pillen, Kapseln, Lösungen Höchstgaben *pro dosi* 0,5 g (Ergänzb. Helv.), *pro die* 2,0 g (Ergänzb.), 3,0 g (Helv.) Für die therapeutische Verwendung können vorläufig das flüssige und krystallisirte Guajakol *promiscue* gebraucht werden

† **α-Guajakol** *Guajacolum absolutum* Reines Guajakol Synthetisches Guajakol. Nach D R P 95 839 wird o-Anisidin durch Einwirkung von salpetriger Säure diazotirt und die mit Schwefelsäure angesäuerte Lösung im Dampfstrom destillirt Das übergegangene Guajakol wird rektificirt Es siedet bei etwa 200° C und erstarrt ohne weiteres zu Krystallen, welche bei 29—30° C schmelzen

† **Homo-Guajakol** Homobrenzcatechin-Methyläther Kreosol. $C_6H_3(CH_3)(OCH_3)OH$ Mol. Gew. = 138. Ein höheres Homologes des Guajakols Ist im Buchen holztheer-Kreosot enthalten und wird aus diesem ähnlich wie das Guajakol durch die Kalverbindung hindurch abgeschieden

Farblose, angenehm riechende, ölige, in Wasser kaum lösliche Flüssigkeit, welche von Alkohol und Aether leicht gelöst wird Siedep. 221° C Die alkoholische Lösung wird durch Eisenchlorid grün gefärbt

Ist bezüglich seiner therapeutischen Verwendung noch im Versuchsstadium begriffen

† **Guajaperolum** Guajaperon. Piperidinum guajacolicum Piperidin-Guajakolat. $C_8H_{11}N(C_7H_5O_2)_2$.

Entsteht durch Auflösen von 85 Th Piperidin und 248 Th Guajakol in Petroläther oder Benzol — Farblose, prismatische Nadeln, in 30 Th Wasser löslich, auch löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln Schmelzp. 80° C

Brenzcateinum Guajakolbenzyläther $C_6H_4(OCH_2)_2OCH_2C_6H_5$. Mol. Gew. = 214 Entsteht durch Einwirkung von Benzylchlorid $C_6H_5CH_2Cl$ auf Guajakol Natrium Farblose, fast geruchlose und fast geschmacklose, aber hinterher kratzend und anästhesierend schmeckende, neutrale Krystalle, in Alkohol und Aether löslich, bei 62° C schmelzend Löst sich auch in Xylofen Weder die wässrige noch die alkoholische Lösung wird durch Ferrichlorid gefärbt In Natronlauge ist es unlöslich Beim Kochen mit Kalium permanganat und verdünnter Schwefelsäure tritt Geruch nach Bittermandelöl, beim Kochen mit Salzsäure Geruch nach Guajakol auf Es ist von MARCUS zur Erzielung örtlicher Anästhesie mittels Kataphorese benutzt worden Nicht zu verwechseln mit Benzosol

Guajakol Chininchlorid, aus molekularen Mengen Guajakol und Chininchlorid bestehend, weisse Nadeln, wird an Stelle von Guajakol als ungiftiger Ersatz desselben angewendet Vergl. S. 778

Guajacolum phosphoricum Phosphorsäure-Guajacyläther $(C_6H_4 \cdot OCH_2)_2 \cdot PO_4$ Mol. Gew. = 416.

Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Guajakol Natrium

Ein weissliches, fast geruchloses Krystallpulver, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Chloroform und Aceton Schmelzp. gegen 98° C Es findet in gleicher Weise und in gleichen Dosen Anwendung wie das Guajakol selbst, indessen ist sein Gebrauch ein verhältnissmässig beschränkter

Guajacolum aethylenatum Guajakoläthylenäther. $[CH_2O \cdot C_6H_4O]_2 \cdot C_2H_4$ Mol. Gew. = 274.


Die Darstellung erfolgt durch Erhitzen von Guajakolnatrium mit Aethylenbromid oder Aethylenchlorid unter Druck bei Anwesenheit von Alkohol als Verdünnungsmittel.

Farblose Krystallnadeln, in Wasser schwer löslich, leicht löslich in heissem Alkohol. Schmelzpunkt 138—139° C.

Bei Lungentuberkulose in gleicher Weise wie Guajakol angewendet in Gaben von 0,5—1,0 g zweimal täglich.

Guajacolum carbonicum Guajakolkarbonat Kohlensäure-Guajacyl-äther Duotal. $(C_6H_4OCH_3)_2CO_2$ Mol Gew. = 274

Zur Darstellung bringt man 2 Molekulargewichte Guajakol durch die erforderliche Menge Natronlauge in Lösung und leitet in diese Lösung langsam 1 Molekulargewicht Kohlenoxychlorid (Phosgen $COCl_2$) gasförmig ein.



Das sich unlöslich abscheidende Guajakolkarbonat wird mit Sodaaugewaschen und aus Alkohol umkrystallisiert.

Eigenschaften Weisses krystallinisches, neutrales Pulver, nahezu geschmacklos und geruchlos, unlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol, leicht löslich in heissem Alkohol, ferner in Aether, Chloroform und Benzol. In Glycerin und in fetten Ölen ist es nur wenig löslich. Schmelzpunkt 78—84° C. Wird von alkoholischer Kalilauge sofort zerlegt in Kohlensäure und Guajakol, welches letztere durch Ansäuern roth werden kann. Die alkoholische Lösung wird durch Eisenchlorid nicht charakteristisch gefärbt. Es enthält 91,5% Guajakol.

Aufbewahrung Unter den indifferenten Arzneimitteln.

Anwendung Den gesunden Magen passiert es unverändert, im Darme erfolgt Spaltung in Guajakol und Kohlensäure. Diese Spaltung erfolgt schon im Magen bei krankhaften Zuständen desselben. Man gibt es bei Tuberkulose anfangs täglich zu 0,2—0,5 g und steigt bis auf 2—4 g. Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als Guajacylschwefelsäure.

Guajacolum valerianicum Guajakolvalerianat Valeriansäure-Guajacyl-ester Geosot $C_6H_4OCH_3C_4H_7CO_2$ Mol Gew. = 208

Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Valerylchlorid auf Guajakolnatrium.

Gelbliche, ölige Flüssigkeit, zugleich nach Guajakol und nach Baldriansäure riechend, spec Gew 1,087. Siedepunkt 245—265° C. Wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform.

Wird wie das Guajakol selbst bei Lungentuberkulose angewendet. Man gibt es in Gelatinekapseln in 0,2 g und zwar 3—6 Kapseln täglich.

Guajacolum benzoicum Guajakolbenzoat Benzoylguajakol Benzoöl. Benzo-Guajakol Benzoesaures Guajakol $C_6H_4(OCH_3)C_6H_5CO_2$ Mol Gew. = 228.

Entsteht durch Einwirkung von Benzoylchlorid auf Guajakolkalium und wird durch Umkrystallisiren aus Alkohol rein dargestellt.

Eigenschaften Farbloses, krystallinisches Pulver ohne Geruch und Geschmack, fast unlöslich in Wasser, leicht löslich in Aether, in Chloroform und in heissem Alkohol. Es schmilzt im Kapillarrohre bei 56° C.¹⁾ Durch alkoholische Kalilauge wird es in Guajakolkalium und Kaliumbenzoat gespalten. Durch concentrirte Schwefelsäure wird es mit citronengelber Farbe gelöst. Die alkoholische Lösung wird durch Eisenchlorid nicht charakteristisch gefärbt.

Aufbewahrung Unter den indifferenten Arzneimitteln.

Anwendung. An Stelle des Guajakols und Kreosots. Es bietet vor diesen beiden die Vorzüge, dass es geschmacklos ist und den Verdauungstraktus nicht reizt. Den Magen

¹⁾ Ein aus synthetischem Guajakol hergestelltes Präparat schmilzt nach Thoms bei 59° C.

passirt es unzersezt, und wird alsdann im Darms zu Guajakol und Benzoesäure gespalten, welche beide leicht resorbirt werden. Man giebt es in Tagesdosen von 1–10 g

Guajacolum salicylicum Guajakolsalicylat. Guajakol Salol Salicyl Guajakol Salicylsäure-Guajakolester. $C_9H_8O_2$, C_7H_6O Mol Gew = 244

Zur Darstellung wird ein Gemisch gleicher Molekulargewichte Guajakolnatrium und Natriumsalicylat mit Phosphoroxychlorid behandelt $2[C_9H_7OCH_2ONa] + 2[C_7H_5(OH)CO_2Na] + POCl_3 = 3NaCl + PO_3Na + 2[C_9H_7(OH)CO_2C_7H_5(OCH_2)]$

Eigenschaften. Weisses, krystallinisches Pulver, ohne Geruch und Geschmack, fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, in Aether und in Chloroform. Schmilzt im Kapillarrohre bei 65° C. Durch alkoholische Kalilauge wird es in Guajakolkalium und Kaliumsalicylat gespalten.

Die alkoholische Lösung bringt beim Eintropfen in wässriges Eisenchlorid nur eine Trübung hervor. Die alkoholische Lösung selbst aber wird durch Eisenchlorid weinroth gefärbt.

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln.

Anwendung. Bei innerlicher Darreichung wird es im Darms zu Guajakol und Salicylsäure gespalten, welche beide leicht resorbirt werden. Man giebt es Phthisikern als den Appetit erregendes und die Verdauung beförderndes Mittel in Einzelgaben von 1–10 g täglich, ferner als Darmantisepticum.

Guajacolum cinnamyllicum Guajakolcinnamat. Cinnamyl-Guajakol Zimmtsaures Guajakol. Styraol $C_9H_7O_2$, $C_9H_7(OCH_2)$. Mol Gew = 254.

Zur Darstellung werden gleiche Molekulargewichte Guajakol und Cinnamylchlorid bei gewöhnlicher Temperatur gemischt und nach 2 Stunden einige Zeit auf dem Wasserbade erwärmt, dann aus siedendem Alkohol umkrystallisirt. — Farblose, bei 130° C schmelzende Krystallnadeln, welche in Wasser so gut wie unlöslich, in Alkohol, Chloroform und Aceton löslich sind.

Soll antiseptisch wirken. Wird innerlich bei Lungentuberkulose, ferner zur Hemmung von Gährungs- und Fäulnisprocessen bei chronischem Blasenkatarrh, Gonorrhoe, Magen- und Darmkatarrh angewendet. Dosis 1 g mehrmals täglich.

Guacamphol-Hexine Kampfersäure-Guajakolester. $C_8H_7(CO_2C_9H_7OCH_2)_2$ Mol Gew. = 412. Entsteht durch Einwirkung von Kampfersäurechlorid auf Guajakol-Natrium und stellt farblose, geruch- und geschmacklose Nadeln dar, unlöslich in Wasser, leicht löslich in heissem Alkohol und in Chloroform. Durch Kalilauge wird der Ester langsam verseift. Die Verbindung soll gegen Diarrhoe und gegen die Nachtschweisse der Phthisiker Verwendung finden.

Guajacolum jodoformatum v Mosetig	Ferrum hypophosphorosum	0,05
Guajakol-Jodoform v Mosetig	Chinin hypophosphorosum	0,02
Rp. Olei Amygdalarum 1,0	Guajacoli carbonici	0,025
Guajacoli 4,0	Zu 1 Pastille Gegen Lungentuberkulose	
Jodoformii 1,0	Solutio Picot	
Durch mässige Wärme zu lösen. Injektionen von	Picot'sche Lösung	
0,5–1,0 ccm (I) gegen Gelenktuberkulose	Rp. Guajacoli	5,0
	Jodoformii	1,0
	Paraffinum liquidum	
	Olei Olivae aa q s ad 100,0 ccm	
	Ist zu sterilisiren	
Pilulae Guajacoli à 0,1 g	Solutio Pignol	
(Form. Berol)	Pignol'sche Lösung	
Rp. Guajacoli	Rp. Eucalyptoli	14,0
Radialis Liquiritiae	Guajacoli	5,0
Glycerini	Jodoformii	1,0
Fiant pilulae N 60	Olei Amygdalarum (sen	
	Olivarum) q s ad 100,0 ccm	
	Ist zu sterilisiren	
Pilulae Guajacoli à 0,05 g	Solutio Morel Lavallee	
(Form. Berol)	MOREL-LAVALLÉE'sche Lösung	
Rp. Guajacoli	Rp. Eucalyptoli	12,0
Radialis Liquiritiae	Guajacoli	5,0
Glycerini	Jodoformii	4,0
Fiant pilulae N 60	Olei Olivarum q s ad 100,0 ccm	
	Ist zu sterilisiren	
Pastilli Guajacoli compositi Apos.		
Rp. Acidum arsenicosum		
Strychnini hypophosphorosum aa 0,001		
Calcii hypophosphorosum		
Natrii hypophosphorosum aa 0,025		

Solutio Dubourg
Dubourg'sche Lösung.
Rp Jodoform 10
Guajacoli 50
Olei Olivarum q s ad 100,0 ccm
Ist zu sterilisieren

Sirupus Calcii chlorhydrophosphorici cum
Guajacolo

Rp 1 Balsami toluani 15,0
2 Spiritus (80 Proc) 20,0
3 Aquae destillatae 25 75,0
4 Calci phosphorici 80,0
5 Acidi hydrochlorici (25 Proc) 70,0
6 Aquae destillatae 120,0
7 Guajacoli 10,0
8 Spiritus (90 Proc) 500,0
9 Spiritus Aracae 30,0

10 Vini Malacensis 50,0
11 Sirupi Sacchari 500,0
Man bereitet eine filtrirte Lösung von 1-3, ferner von 4-6, endlich von 7-10, vermischt diese und filtrirt nach dem Absetzen 3-mal täglich 1 Theelöffel bis 1 Esslöffel Bei Phthisis

Mixtura Guajacoli SANZI


Rp Guajacoli 1-20 g
Aquae destillatae 180,0
Spiritus (90 Proc) 20,0
1 Theelöffel bis 1 Esslöffel in einem Glase Wasser nach den Mahlzeiten zu nehmen Gegen Phthisis

Vinum Guajacoli GRAENTZEL

Rp Guajacoli 18,5
Tincturae Gentianae 80,0
Spiritus (90 Proc) 200,0
Vini Hispanici q s ad 1000,0
2-3mal täglich 1 Esslöffel in einem Weinglase voll Wasser

II Acidum guajacolocarboneum Guajakolkarbonsäure. Methoxysalicylsäure $C_6H_3(OH)(OCH_3)CO_2H + 2H_2O$ Mol. Gew. = 204.

Darstellung Man leitet unter Erhitzen über Guajakol-Alkali Salze Kohlensäure. Hierbei entstehen, analog der Bildung der Salicylsäure, wahrscheinlich zunächst die Salze der Guajacylkohlensäure, z B unter Zugrundelegung des Guajakolnatriums zunächst Guajacyl Natriumkarbonat, welches bei weiterem Erhitzen in guajakolkarbonsaures Natrium übergeht



Aus der Lösung des entstandenen Natriumsalzes wird die freie Säure durch Ansäuern ausgefällt und durch Krystallisation aus heissem Wasser oder verdünntem Alkohol gereinigt

Eigenschaften Weisses, krystallinisches, sauer reagirendes, geruchloses Pulver von bitterem Geschmack, schwer löslich in kaltem Wasser, ziemlich leicht löslich in heissem Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether, desgleichen in Natriumbikarbonatlösung. Schmelzpunkt der wasserfreien Säure 148-150° C

Die kalte wässrige Lösung wird durch Eisenchloridlösung rein blau gefärbt.

Aufbewahrung Unter den indifferenten Arzneimitteln

Anwendung. Die Verbindung ist aus dem Versuchsstadium noch nicht heraus, sie wirkt antiseptisch, wahrscheinlich auch antirheumatisch.

Natrium guajacolocarboneum, guajakolkarbonsaures Natrium, methoxysalicylsaures Natrium, $C_6H_3(OCH_3)(OH)CO_2Na$ wird durch Neutralisation der Guajakolkarbonsäure mit eisenfreiem Natriumbikarbonat in verdünnter alkoholischer Lösung dargestellt

Weisses, krystallisches Pulver, entweder schwach sauer reagirend oder neutral, leicht löslich in Wasser. Die wässrige Lösung wird durch Eisenchlorid rein blau gefärbt

Es soll ähnlich, aber milder wie Natriumsalicylat wirken, und frei von Nebenwirkungen sein. Noch im Versuchsstadium!

III. Acidum guajacolosulfuricum Guajakolsulfosäure. Ortho-Guajakolsulfosäure $C_6H_3(OH)(OCH_3)SO_3H$ (1:2:6). Mol. Gew. = 204. Zur therapeutischen Anwendung gelangt nur die Ortho-Säure, weil die Para-Säure unangenehme Nebenwirkungen besitzt. Die Ortho-Säure entsteht durch Mischen von Guajakol mit konz. Schwefelsäure in geringem Ueberschuss und Erwärmen bis auf höchstens 70-80° C. Man löst das Reaktionsgemisch in Wasser, stellt durch Sättigen mit Baryumkarbonat (s S 86) das Baryumsalz dar und zerlegt dieses mit berechneten Mengen Schwefelsäure, dampft die wässrige Lösung ein und krystallisirt die Säure aus verdünntem Alkohol um

Weisse, glänzende, wasserfreie Blättchen, welche bei 270° C noch nicht schmelzen und sich in 3 Th Wasser von 15° C oder in 1 Th siedendem Wasser auflösen. In Al-

kohol von 95 Proc sind sie kaum löslich, unloslich in Aether, Benzol, Chloroform, Aceton. Conc. Schwefelsäure löst sie auch beim Erwärmen ohne Färbung auf — Silbernitratlösung wird schon in der Kälte, rascher beim Erwärmen reducirt, mit Ferrichloridlösung entsteht eine blaue Färbung, die auf vorsichtigen Zusatz von Ammoniak in Hellgelb umschlägt — Der Geschmack der freien Säure ist bitterlich, ohne an denjenigen des Guajakols irgendwie zu erinnern.

Thiokolum Thiokol o-Guajakolsulfosaures Kalium. $C_6H_3(OH)(OCH_3)SO_3K$. Mol. Gew. = 242. Die Darstellung erfolgt durch Umsetzung von o-Guajakolsulfosäurem Baryum (s. oben) mit Kaliumsulfat. Beim Eindampfen der wässrigen Lösung erhält man aus massig konzentrierter Lösung das Salz als grosse rhombische Krystalltafeln, aus ganz konzentrierter Lösung dagegen als weisses geruchloses Krystallpulver ohne Krystallwasser. In dieser Form gelangt das „Thiokol“ in den Handel.

Farbloses Krystallpulver, sehr leicht (1+1) löslich in Wasser, etwas schwerer löslich in verdünntem Alkohol, fast unloslich in 96 proc. Alkohol. Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid die schon oben erwähnte Blaufärbung, sie zeigt ferner ein bemerkenswerthes Reduktionsvermögen gegen Silbernitrat und Kaliumpermanganat. Sie ist neutral und von schwach bitterlichem, hinterher süßlichem Geschmack, nicht nach Guajakol riechend.

Man giebt Thiokol in Gaben von 0,5–1,0 g und zwar zu 2–4,0 g täglich als ungiftigen Ersatz des Guajakols bei Lungentuberkulose, namentlich in deren Frühstadien.

Sirolin. Eine 6–7 proc. Auflösung des Thiokols in 40 proc. Zuckerlösung, mit Orangenschalenextrakt parfümirt. Ein Esslöffel Sirolin enthält = 1,0 g Thiokol. Man giebt das Sirolin in Tagesgaben von 1–5 Theelöffel.

Bestimmung des Thiokols in Zuckerlösungen. 5 g der Substanz (genau gewogen) werden in einem schräg gestellten Kjeldahlkölbchen mit 25 ccm Salpetersäure von 1,28–1,30 spec. Gew. zunächst gelinde erwärmt, dann $1\frac{1}{2}$ Stunde im Sieden erhalten. Man verdünnt mit ca. 150 ccm Wasser und bestimmt die Schwefelsäure durch Fällung mit Baryumchlorid. 238 Th. $BaSO_4$ = 242 Th. $C_6H_3KO_6S$ (Thiokol).

Calcium guajacolosulfuricum o-Guajakolsulfosaures Calcium. Guajacyl. $[C_6H_3(OH)(OCH_3)SO_3]_2 \cdot Ca$. Mol. Gew. = 446.

Zur Darstellung neutralisirt man die wässrige Lösung der o-Guajakolsulfosäure auf dem Wasserbade mit Calciumcarbonat. Man filtrirt, dampft das Filtrat zur Trockne, löst den Rückstand in 4–5fachem Gewicht 90 proc. Alkohols und bringt die filtrirte Lösung durch Eindampfen zur Trockne.

Ein bläulichgraues Pulver, in Wasser und Alkohol leicht löslich, in Oel unloslich. Die wässrige Lösung giebt mit Ferrichlorid die schon oben erwähnte Blaufärbung, auch wirkt sie reducierend gegen Silbernitrat und Kaliumpermanganat.

Die wässrige Lösung des Salzes 1 : 20, welche violettroth gefärbt, aber haltbar und nicht ätzend ist, dient in subkutanen Injektionen als lokales Anästhetikum. Man spritzt 0,5–1,5 ccm der 5 procentigen, oder 1 ccm der 10 procentigen Lösung ein. Die Gefühlslosigkeit soll nach 6–8 Minuten eintreten.

IV Aethakolum Ajakol. Guæthol. Thanathol. Brenzcatechinmonoäthyläther. $C_6H_3(OH)O \cdot C_2H_5$ (1.2). Mol. Gew. = 138.

Zur Darstellung wird Brenzcatechin mit äquivalenten Mengen Äthylalkohol unter Zusatz von Chlorzink am Rückflusskühler oder im geschlossenen Gefässe auf 180–220° C. erhitzt. Man verdünnt das Reaktionsprodukt mit Wasser, destillirt mit Wasserdampf, bindet das übergegangene Produkt an Natronlauge, schüttelt die alkalische Lösung mit Aether aus, zerlegt sie durch Säure, rektificirt das Produkt und lässt in der Kälte krystallisiren.

Eigenschaften. Grosse farblose, feucht aussehende und ätzend anzufühlende Krystalle von einem dem Guajakol ähnlichen Geruch. Schmelzp. 26° C., Siedep. 209–210° C. In Wasser schwerlöslich (1 : 120), leicht löslich in Alkohol und in Aether. Das spec. Gew. der verflüssigten Krystalle ist bei 15° C. = 1,0913. Das einmal verflüssigte Präparat bedarf längerer Zeit, bevor es wieder krystallisirt.


Fügt man zur alkoholischen Lösung wenig Eisenchlorid, so färbt sie sich zunächst blau, durch mehr Eisenchlorid wird die Färbung grünlich, schliesslich ohrenfarbig. Verdünnt man jetzt mit Wasser, so nimmt die Lösung feurig braunrothe Färbung an.

Aufbewahrung Vorsichtig, vor Licht geschützt

Anwendung In gleichen Dosen und unter den nämlichen Indikationen wie das Guajaköl

V Guajacetin Guacetin Brenzcatechinmonoacettsaures Natrium Natrium guajaceticum $C_9H_4(OH)OCH_2CO_2Na$ Mol. Gew. = 190.

Darstellung Ein Salz eines Saure-Esters des Brenzcatechins, z. B. Monobenzol-sulfobrenzcatechinatrium, wird mit monochloressigsaurem Natrium behandelt und dann die Benzolsulfosaure durch Erhitzen mit Alkohollösung abgespalten. — An Stelle des Benzol-sulfonesters kann man auch die Ester vom Typus des Monocetyl- und Monobenzoyl-ester des Brenzcatechins verwenden und an Stelle der Monochloressigsäure die Alkoholäther D. R. P. 87668



Es wird zunächst die freie Säure dargestellt und diese durch Neutralisiren mit Natriumkarbonat in das Natriumsalz übergeführt.

Eigenschaften. Farbloses, geruchloses Krystallpulver, aus vierkantigen Säulen bestehend, welches beim Erhitzen unter Verbreitung aromatischer Dämpfe verkohlt und einen beträchtlichen Salzsäure-Rückstand hinterlässt, der die Flamme gelb färbt, alkalisch reagiert und mit Säuren aufbraust. Das zu Tabletten komprimierte Salz bläht sich beim Erhitzen etwa wie Rhodanquecksilber auf. Beim Eindampfen des Guajacetins mit verdünnter Schwefelsäure tritt Geruch nach Coumarin auf.

Es löst sich in 15 Th. Wasser von 15° C. zu einer neutralen Flüssigkeit, welche bitterlich schmeckt, durch wenig Eisenchlorid entsteht in dieser Lösung zunächst violette, durch mehr Eisenchlorid blaue Färbung unter Abscheidung von missfarbenen Flocken. Silberammoniumtrinitrat lässt die wässrige Lösung vorübergehend klar, alsdann erfolgt Ausscheidung des krystallinischen Silbersalzes, welches beim Erwärmen der Flüssigkeit, besonders auf Zusatz eines Tropfens Ammoniak, rasch zersetzt wird. — Säuren scheiden aus der konzentrierten wässrigen Lösung die freie Brenzcatechinmonoacettsäure in Krystallen aus, welche in reinem Zustande bei 130–131° C. schmelzen.

Von konzentrierter Schwefelsäure wird das Guajacetin (Na Salz) zunächst ohne Färbung aufgenommen, von Salpetersäure wird es sehr schnell braunroth gefärbt. Die Formel des Guajacetins ist $C_9H_4(OH)OCH_2CO_2Na$ (Mol. Gew. 190), seine Beziehungen zum Guajaköl zeigen obige Konstitutionsformeln.

Prüfung Die wässrige Lösung sei neutral bez. sie reagiere sehr schwach sauer. — Versetzt man 0,5 Proc. des Salzes, dampft die Asche mit einem Ueberschuss verdünnter Schwefelsäure ein und verwandelt den Salzsäurerückstand durch Erhitzen in einer Ammoniumkarbonat-Atmosphäre in neutrales Natriumsulfat, so betrage das Gewicht desselben nicht mehr als 0,187 g.

Man löse 3 g Guajacetin in 60 ccm Wasser, füge zu dieser Lösung 10 ccm verdünnte Schwefelsäure und schüttle mit 30 ccm Aether aus. Die abgehobene ätherische Schicht wird 2–3 mal mit Wasser gewaschen, die nach dem Verdunsten hinterbleibenden Krystalle sollen bei 130–131° C. schmelzen.

Aufbewahrung Unter den indifferenten Arzneimitteln. Nicht lichtempfindlich.

Anwendung. Bei der Behandlung der Tuberkulose, wo früher Kreosot und ähnliche Präparate gereicht wurden, 3–4–6 mal täglich je 0,5 g als Pulver oder in einer Flüssigkeit (Wein) gelöst. Es ist geschmacklos, reizt den Verdauungstraktus nicht, erzeugt keine Uebelkeit etc.

Migrol (Dr MAJERT) Von MAJERT & EBERS als dispensirte Pulver in den Handel gebracht Jedes Pulver enthält je 0,25 g Coffein guajaceticum und Natrium guajaceticum Gegen Migräne und ähnliche nervöse Beschwerden sollen täglich bis zu drei Pulver genommen werden

VI Gujasanol Salzsäures Diäthylglycocol-Guajakol. $C_8H_7(OCH_3)OCO CH_2N(C_2H_5)_2 HCl$ Mol. Gew = 273,5

Zur Darstellung lässt man das gechlorte Acetyl Guajakol $C_8H_7(OCH_3)OCO CH_2Cl$ auf Diäthylamin einwirken

Das Gujasanol krystallisiert in weissen Prismen vom Schmelzpunkt $184^{\circ}C$, welche schwach nach Guajakol riechen, einen salzigen, bitteren Geschmack besitzen und in Wasser ausserordentlich leicht löslich sind Die wässrige Lösung ist gegen Lackmus neutral und lässt auf Zusatz von kohlensaurem Alkali das freie Diäthyl-Glycocol als basisches Oel ausfallen Die wässrige Lösung giebt mit Eisenchlorid keine besondere Färbung

Nach HEINZ ist das Gujasanol nicht giftig Die 2procentige wässrige Lösung reizt Wunden nicht, diese Lösung soll desodorirend, antiseptisch und schwach anasthetisirend wirken Der antiseptische Werth des Gujasanols soll etwa gleich dem der Boisäure sein Das Gujasanol spaltet im Organismus Guajakol ab, aus dem Harn lässt sich nach dem Gebrauch von Gujasanol des Guajakol durch Ansäuern mit Salzsäure und Ausschütteln mit Aether gewinnen Das Präparat ist gegen zerstreutes Licht nicht empfindlich

Guajacum.

Gattung der Zygophyllaceae

I Guajacum officinale L. Heimsch auf vielen westindischen Inseln und auf der Nordküste von Sudamerika Immergrüner Baum, bis 13 m hoch, mit 2—3paarig gefiederten Blättern, Fiedern eiförmig bis eiförmig-langlich Die hellblauen Blüthen in Dolden Frucht eine zweifacheuge, verkehrt herzförmige, von den Seiten zusammengedrückte Kapsel, in jedem Fach ein Same Liefert die Hauptmasse der Droge

II. Guajacum sanctum L. Heimsch auf einem Theile der Antillen, den Bahamas-Inseln und im südlichen Florida Blätter 3—4paarig, Blättchen kurz bespitzt Frucht fünfzählig und fünffachrig Beide Arten liefern

1) das Kernholz *Lignum Guajaci* (Austr Germ Helv) *Guajaci Lignum* (Brit U-St) *Lignum sanctum, benedictum, gallicum Lignum vitae* — Guajakholz. Pockholz. Franzosenholz. Schlangenhholz — Bois de gayac (Gall) — Guinacum wood Pockwood

Beide Arten führen auf Helv, Brit, U St, Gall, nur die erstgenannte Germ, Austr

Beschreibung Die Droge kommt in schweren Blocken und Aststücken ohne Rinde in den Handel Das Holz besteht aus dem helleren, gelblichen, schmalen Splint und dem schwärzlich grünen Kernholz. Nur das letztere liefert die Droge Es ist sehr schwer (spec Gew 1,3), lässt concentrische Kreise erkennen und ist schlecht zu spalten, da die Elemente des Holzes abwechselnd rechts- und linksschief verlaufen

Unter dem Mikroskop lässt das Holz eine Zellreihe breite, 4—6 Zellen hohe Markstrahlen erkennen. Die Gefässe in den Holzstrahlen sind gross, oft den Zwischenraum zwischen zwei Markstrahlen ausfüllend, mit ihnen zusammen fallen schmale tangentielle Bänder von Parenchym auf Die Hauptmasse wird von stark verdichteten Holzfasern gebildet. In den Parenchymzellen Einzelkrystalle von Kalkoxalat (Fig 279) Es riecht, namentlich beim Erwärmen, angenehm aromatisch und schmeckt kratzend, der Splint ist so gut wie geruch- und geschmacklos.

Bestandtheile. Harz, im Kernholz 22,02 Proc, im Splint 2,85 Proc (vergl unten) Asche im Kernholz 0,6 Proc, im Splint 0,91 Proc

Handelswaare. Seiner grossen Härte wegen und, weil es so schwer zu bearbeiten, bezieht man das Holz geraspelt (*Rasura ligni Guajaci*, *Lignum Guajaci raspatum*). Man hat darauf zu achten, dass die Waare nicht allzuviel des hellfarbigen Splints enthält, den man bei genauerem Betrachten an seiner hellen Farbe leicht erkennt. Zur annähernden quantitativen Bestimmung desselben löst man 5 g trocknes Natriumchlorid in 15 g Wasser und schüttelt in dieser Lösung vom spec. Gew. 1,091 etwa 5 g der Droge. Die Spläne des Kernholzes sinken unter, die des Splintes bleiben oben und schwimmen.

Wirkung und Anwendung. Soll den Stoffwechsel befördern, gilt als Diaphoreticum und Sudorificum, speciell bei Syphilis; man benutzt es selten für sich als Abkochung (1:20), meist in Theemischungen. Soll ein Theil des Harzes in die wässrige Abkochung übergehen, so ist ein entsprechender Zusatz von Kalium- oder Natriumkarbonat erforderlich. — Seiner Härte wegen findet das Holz vielfach zu Drechslerarbeiten — Kegeln und dergl. — Verwendung.

Extractum Guajaci. *Extractum Ligni Guajaci aquosum.* Guajakholz-extrakt. *Extrait de gayac* (Gall.). 1 Th. geraspeltetes Guajakholz kocht man zweimal je 1 Stunde mit 9 Th. destill. Wasser, dampft die durch Absetzenlassen geklärten Seihflüssigkeiten zur Honigkonsistenz ein, mischt etwa $\frac{1}{5}$ ihres Gewichts Weingeist (80 proc.) hinzu und dampft weiter zu einem weichen Extrakt ein.

Man kann dasselbe auch aus grob gepulvertem Holz wie *Extr. Aurantii corticis* (S. 853), wobei etwa 13 Proc. Ausbeute erzielt wird, oder aus fein gepulvertem Holz im Verdampfungswege bereiten.

Sirupus Guajaci. *Sirupus de ligno Guajaci.* *Sirap de gayac* (Gall.). 300,0 geraspeltetes Guajakholz kocht man zweimal je 1 Stunde mit 3000,0 destill. Wasser, dampft die vereinigten Seihflüssigkeiten auf 600,0 ein, filtrirt, löst 1000,0 Zucker und bringt auf das spec. Gew. von 1,26. — *Ex tempore*: 10 Th. Guajakholztinktur, 90 Th. Zuckersirup.

Tinctura Guajaci Ligni (Ergänzb.). *Tinctura Guajaci* (Helv.). Guajakholztinktur. *Teinture de gayac (bois)* (Gall.). Ergänzb.: Aus 1 Th. fein zerschnittenem Guajakholz und 5 Th. verdünntem Weingeist. Helv.: ebenso, doch mit 94proc. Weingeist. — Gall.: Aus grob gepulvertem Holz mit 60 proc. Weingeist, ebenso. — Diet. verwendet Weingeist von 90 Proc. — Anwendung: Als Zusatz zu Zahn- und Mundwässern.

2) Das Harz des Kernholzes: *Resina Guajaci* (Anstr. Ergänzb. Helv.). *Guajaci Resina* (Brit. U-St.). *Guajacum*. *Gummi Guajaci*. — Guajakharz. Franzosenharz. Heiligharz. — *Résine de gayac* (Gall.). — *Gualac*. *Guaiacum resln*.

Darstellung. Das Harz fliesst zuweilen freiwillig oder nach künstlichen Einschnitten aus. Es bildet dann bis 5 cm grosse Körner (*Resina Guajaci in granis*). Oder man gewinnt es durch Ausschwülen, indem man 1 m lange Ast- und Stammstücke der Länge nach durchbohrt, am Feuer erwärmt und das aus dem Bohrloch ausfliessende Harz auffängt. Grosse, dunkelgrüne oder rothbraune, an der Oberfläche meist grünlich bestäubte, spröde, an den Kanten durchscheinende, glänzende Stücke, die wenig mit Rinden- und Holztheilen verunreinigt sind (*Resina Guajaci in massis*). Die Hauptsorte des Handels. Durch Lösen in Weingeist und Eindampfen der Lösung gewinnt man endlich ein gereinigtes Harz (*Resina Guajaci depurata*).




Fig. 279. Querschnitt durch Lignum Guajaci.
G Gefässe. M Markstrahlen. H Holzstrahlen.
P Holzparenchym.

Eigenschaften Spec Gew 1,22—1,26, schmilzt bei etwa 90° C mit schwachem Benzoeeruch, erweicht beim Kauen und ist von scharfem, kratzenden Geschmack. Löslich in Aether, Alkohol, Amylalkohol, Chloroform, Alkalien, Kreosot, Nelkenöl, in anderen ätherischen Ölen, in Benzol und Schwefelkohlenstoff nicht oder nur unvollständig löslich. Oxydirende Reagentien färbten es schon blau, reducirende und Erwärmung bedingen Entfärbung.

Bestandtheile Der in Alkohol lösliche Theil des Harzes besteht aus 10,5 Proc Guajakharzsaure $C_{20}H_{24}O_4$, krystallinisch, Schmelzpunkt 78° C, 70,35 Proc, Guajakonsäure $C_{20}H_{24}O_6$, amorph. Schmelzpunkt 74—76° C, färbt sich mit Oxydationsmitteln blau, 9,76 Proc Guajacinsäure (Guajak β -Harz) $C_{20}H_{22}O_7$, hellbraunes Pulver, schmilzt bei 200° C, wenig bekannt. Guajaksaure (Guajacylsäure), Guajakgelb $C_{20}H_{20}O_7$, krystallinisch, Schmelzpunkt 115° C, Guajaköl, dickflüssig, hellgelb, von aromatischem Geruch, Vanillin. Der in Alkohol nicht lösliche Theil besteht aus Holz und Rindentheilen, Gummi und einem in Alkalien löslichen Körper. Die Gesamtmenge dieser letzteren Bestandtheile ist bis zu 15,47 Proc gefunden worden. — Der durch Oxydation entstehende blaue Körper ist leicht zersetzlich, er hat die Zusammensetzung $C_{20}H_{20}O_4$. Asche 3,0—6,6 Proc.

Verfälschung Das Harz kommt mit Colophonium verfälscht vor. Zu dessen Nachweis wird eine fein zerriebene Probe mit der 4—5fachen Menge Petroläther 10—15 Minuten gut geschüttelt, abfiltrirt und das Filtrat mit einem gleichen Volumen wässriger Kupferacetatlösung (1:1000) geschüttelt, es soll keine Trübung eintreten.

Anwendung. Wirkt diuretisch und in grossen Dosen abführend. Findet Anwendung als schweisstreibendes Mittel bei sekundärer Syphilis, Rheuma, Skrophulose, Gicht. Dosis 0,25—1,0 mehrmals täglich in Pillen, Pulver, Emulsion, Tinktur etc.

Tinctura Guaiaci¹⁾ (Aust. U. St.) Tinctura Guajaci Resinae (Ergänzb.) Guajakharztinktur Guajaktinktur¹⁾ — Tincture ou Alcoolé de résine de gayac (Gall.) — Tincture of Guaiac. Ergänzb. Aus 1 Th gepulvertem Guajakharz und 5 Th Weingeist (87 proc) — Austr. Durch Digestion ebenso — U. St. Aus 200 g grob gepulvertem Harz und q s 91 proc Weingeist zu 1000 cem Tinktur — Gall. Aus 1 Th Harz und 5 Th Weingeist (80 proc) — Es empfiehlt sich, das Harz mit dem Weingeist anzureichen und von letzterem etwas zurückzustellen, um damit beim Filtriren den Filtrirrückstand auszuwaschen.

Dunkelbraune, angenehm riechende Tinktur, die mit wässrigen Flüssigkeiten Harz abscheidet.

Bei Rheumatismus mehrmals täglich zu 20—60 Tropfen in Wein, häufig mit Tinct. Colchici.

Tinctura Guajaci ammoniata Elixir guajacinum volatile. Ammoniakalische Guajaktinktur. Ammoniated Tincture of Guaiac. Germ. I 18 Th Guajakharz, 60 Th Weingeist (87 proc), 80 Th Ammoniakflüssigkeit (10 proc). Grünbraune Tinktur, die man zu 10—30 Tropfen in schleimigen Mitteln giebt. — Brit. 75 cem 32,5 proc Ammoniakflüssigkeit, 800 cem Weingeist (90 proc), 200 g gepulvertes Guajakharz stellt man 48 Stunden unter öfterm Schütteln bei Seite, filtrirt, löst 3,1 cem ätherisches Muskatnussöl und 2,1 cem Citronenöl und bringt mit q s Weingeist auf 1000 cem Flüssigkeit. Dosis 2—3,5 cem — U. St. 200 g Guajakharz zieht man 7 Tage mit 800 cem aromatischem Ammoniakspiritus aus, filtrirt und bringt unter Nachwaschen mit derselben Flüssigkeit auf 1000 cem Tinktur.

Anatherin-Mundwasser

Anatherina. Eau pour la bouche.

Rp	Tincturae Guajaci (lign)	Olei Salviae	
	Tincturae Chinae	Olei Origani	
	Tincturae Cinnamomi	Olei Caryophylli	℞ 2,0
	Tincturae Galangae	Olei Menth pip	7,5
	Tincturae Ratanhiae	Spiritus Aether nitros	100
	Tincturae Alkann acid	Spiritus (87 %)	1800,0
	Tincturae Santali rubri	Aquae destillat	880,0
	Olei Cinnamomi		0,5

¹⁾ Es ist zu beachten, dass Helv hierunter die aus dem Holz bereitete Tinktur versteht.

Anatherin Mundwasser

nach PORAK und STODERF

Rp	Tinctur Myrrhæ	160,0
	Tinctur Catechu	80,0
	Tinctur Guajac	
	Tinctur Ratanhiæ	AA 40,0
	Tinctur Caryophylli	30,0
	Spiritus Cochlear	20,0
	Olei Cinnamom	gits 2X
	Olei Rosæ	gits I
	Spiritus (90 proc)	
	Aquæ destill.	AA 315,0

Apozema sudatorium

Apozème sudorifique (Gall)

Schweißstreibender Trank

Rp	1 Ligni Guajaci rasp	600
	2 Rad Sarsaparill conc	300
	3 Ligni Sassafras conc.	10,0
	4 Rad Liquiritiæ conc.	200
	5 Aquæ destillat.	q s

in Mist 1 mit 3 l Wasser eine Stunde kochen,
fügt 2-4 hinzu und stellt 1 a 1 l Flüssigkeit her

Aqua (alcarina) composita

Carmichael

Aqua benedicta composita.

Rp	Ligni Guajaci	100,0
	Ligni Sassafras	10,0
	Fructus Coriandri	
	Fructus Anisi	AA 5,0
	Radix Liquiritiæ	20,0
	Aquæ Calcariae	1500,0

3 Tage digeriren, dann auspressen und filtriren

Aqua gingivialis JACKSON**Aqua balsamica JACKSON**

Rp	Cort. Aurant. fruct. recent.	
	Cort. Citri fruct. recent.	
	Radix Angelicæ	AA 100,0
	Ligni Guajaci	
	Radix Pyrethri	AA 500,0
	Balsam Tolutani	
	Benzoes	AA 150,0
	Myrrhæ	50,0
	Spiritus diluti (70 proc)	5000,0

Man macerirt, destillirt über 4500,0 und fügt hinzu

	Spiritus Cochleariæ	
	Spiritus Menthae pip	AA 500,0
	Vanillin	0,50

Colutorium antiscorbuticum AUDIBERTI.

Rp	Ligni Guajaci gr pulv	100,0
	Fruct. Anisi stellat.	25,0
	Herb Salviae	50,0
	Spiritus (90 proc.)	400,0
	Aquæ Cinnamomi	700,0

Man digerirt einen Tag, presst und stellt 1000,0
Filtrat her

Decoctum Guajaci compositum WALDENBURG

Rp	Ligni Guajaci	50,0
	Rad. Sarsaparill	
	Rad. Bardanae	
	Rhizom Graminis	AA 10,0
	Aquæ	q s
	Coque Colaturæ refrigeratæ	400,0 adde
	Tinctur aromat.	10,0
	Spir. Aether nitros	5,0

In einem Tage zu verbrauchen

Elixir antarthriticum EMÉRIGON

Ratafia des Caraïbes.

Rp	Tinct. Lign. Guajaci	100
	Spiritus Vin. Gallici	90,0

Emulsio guajacina

Mistura antarthritica BERGER

Rp	Resin Guajaci pulv	10,0
	Gummi arabici	5,0
	Sacchari albi pulv	15,0
	Aquæ Menthae pip	150,0

f. emulsa

Glyceritum Guajaci (Nat. form)

Glycerite of Guajac.

Rp	1 Resinae Guajaci pulv	85 g
	2 Tiquoris Potassæ (U-St.)	
	(Liq Kali caust 6 proc)	65 cem
	3 Glycerini	200 cem
	4 Aquæ destill q s ad 1000 cem	

f mit 2 und 300 cem Wasser 24 Stunden maceriren,
filtriren, 3 und 4 zufügen

Guiaë Jesuitarum

Jesuitertropfen

Rp	Tinct Guajaci rem	100,0
	Balsam Peruvian	10
	Oli Fœniculi	gits X

1-3 Theelöffel täglich

Mistura Guajaci (Brit.)

Guaiacum Mixture

Rp	1 Resinae Guajaci pulv	
	2 Sacchari albi pulv	AA 10,0
	3 Tragacanth pulv	1,5
	4 Aquæ Cinnamom (Brit.)	400,0 cem

Man mischt 1-3 und fügt nach und nach 4 hinzu
Dosis 15-30 g (Nat form schreibt statt Tra-
ganth = Gummi arabic 15,0 vor)

Pilulae alterantes QUARR

Rp	Resinae Guajaci	15,0
	Sulfuris depurat.	20,0
	Stibii sulfurati nigr	5,0
	Extract. Cardui bened	q s

Man formt Pillen von 0 15 Täglich 8-10 Stück.

Pilulae antarthriticae FRANK.

Rp	Hydrag et Stibii sulfurat.	
	Resinae Guajaci	
	Extracti Dulcamar	AA 5,0

Zu 120 Pillen. Dreimal täglich 5-10 Stück.

Pilulae guajacinae

Rp	Resinae Guajaci	10,0
	Sapon medicati	5,0
	Stibii sulfurati aurant.	0,75
	Spiritus	q s

Man formt Pillen von 0,15 Morgens und Abends
10-15 Stück.

Pilulae reducentes Marienbadenses

Marienbader Reduktions-Pillen.

I. Nach DIETREICH

Rp	Kali bromati	10,0
	Natrii bicarbonici	
	Extracti Scillæ	AA 20,0
	Ligni Guajaci pulv	
	Radix Senegae pulv	AA 40,0
	Extract. Taraxaci	q s

Man formt 0,15 schwere Pillen, die mit Zimmt-
pulver bestäubt oder versilbert werden.

II. Nach VONICKA

Rp	Kali iodati	
	Natrii bicarbonici	
	Extracti Scillæ	AA 35,0
	Ligni Guajaci pulv	
	Rad. Senegae pulv	AA 70,0
	Extract. Ferri pomat	q s

Man formt 0,15 schwere Pillen und versilbert
dieselben

Pilulae odontalgicae
Zahnpillen. (Wiener Vorsch.)
Rp Resinae Guajaci
Mentholi
Radix Pyrethri plv aa 2,5
Cerae flavae 7,5
Ol Caryophyllor
Ol Cajuputi aa gttis X
Man formt Pillen von 0,03 g In Stöpselgläsern
aufzubewahren.

Pilisana Guajaci (Gall)
Tisane de Gayac
Rp Ligni Guajaci raspat 50,0
Aque destillat q s ad colat 1000,0
Durch einständiges Kochen zu bereiten

Pulvis antiscotodynamicus ROMBERG
Rp Resinae guajaci 5,0
Sulfuris depurati
Tarleri depurati aa 20,0
Elaeosacch. Citri 10,0
Morgens und abends 1 Theelöffel

Pulvis depurans JUNGKEW
Rp Hydrarg et Stibi sulfurat
Resinae Guajaci aa 5,0
Rhizomatis Rhei
Magnes carbonic.
Sacchari albi aa 2,5
2—3 Theelöffel täglich

Pulvis depurans LEBERT
Rp Resinae Guajaci
Hydrarg sulfurat nigr
Rhizomatis Rhei aa 5,0
Magnesia ustae 20,0

Wie das vorige

Pulvis purificans Borollensis
Rp Resinae Guajaci 2,0
Hydrarg et Stibi sulfurat
Magnesi carbonic. aa 0,6
2. mal dos 6 2stündlich $\frac{1}{2}$ Pulver

Sapo guajacinus
Guajakharzeife
Rp Resinae Guajaci pulv 6,0
Kali caustici fus. 3,0
Aque destill q s
Zu 10,0 Füllmasse Dosis 0,1—0,4

Sirupus antirheumaticus RICORD
Rp Tinct Guajaci resin.
Tinct Colchici sem aa 7,5
Sirupi Sacchari 85,0
Dreimal täglich 1 Esslöffel

Sirupus depurativus compositus LARREY
Rp Sirupi depurativi LARREY 100,0
Hydrargyr bichlor corros
Ammon hydrochloric.
Extract Opii aa 0,05

Sirupus depurativus LARREY
Sirop dépuratif de LARREY
Rp 1 Radix Sarsaparillae 100,0
2 Ligni Guajaci 25,0
3 Ligni Sassafras
4 Rhizom Chinae aa 5,0
5 Follor Sennae 3,0
6 Succ Bambuci 20,0
7 Aque fervidae 850,0
8 Sacchari albi 635,0

Man digerirt 1—7 eine Stunde, preßt, bringt die
Flüssigkeit auf 855,0 und löst 8

Sirupus Guajaci ammoniacus.
Rp Tinct Guajaci ammoniac 15,0
Sirupi Sacchari 85,0
2—4mal täglich $\frac{1}{2}$ Esslöffel

Sirupus haemocatharticus DRYENORZ
DRYENORZ's blutreinigender Sirup
Sirop dépuratif de DRYENORZ

Rp 1 Radix Bardanae
2 Radix Lappathi acuti
3 Radix Saponariae aa 12,5
4 Ligni Guajaci 25,0
5 Stipit. Dulcamar 20,0
6 Follor Sennae 3,0
7 Aque fervidae 500,0
8 Melis depurati
9 Sacchari albi aa 65,0

Man digerirt 1—7 zwölf Stunden, preßt, dampft
auf 70,0 ein und bringt mit 8—9 zum Sirup
Täglich 3 Esslöffel

Species Lignorum (Austri Germ Helv)
Species ad decoctum Lignorum Species
purificantes s sudorificae Holzthee
Species zum Holzthee Holzstrank Blut-
reinigungsthee Espèces ligneuses ou
sudorifiques (Gall)

I Germ
Rp Ligni Guajaci gr conc 5,0
Radix Ononidis gr conc 3,0
Radix Liquiritiae gr conc 1,0
Ligni Sassafras gr conc 1,0

II Helvet
Rp Ligni Guajaci
Ligni Juniperi
Radix Sarsaparillae
Radix Liquiritiae
Corneis Sassafras aa.

III. Austr
Rp Radix Bardanae
Radix Sarsaparillae aa 50,0
Radix Liquiritiae
Ligni Santali rubri aa 20,0
Ligni Juniperi
Ligni Guajaci
Ligni Sassafras aa 100,0

IV Gall
Rp Ligni Guajaci raspat.
Rad Sarsaparilli sciss et conc.
Ligni Sassafras conc.
Phizom Chinae conc aa.

V Ph Suecic
Rp Ligni Guajaci 50,0
Ligni Juniperi 25,0
Rad Saponariae 10,0
Rad Liquirit 5,0

VI Ph. Norveg
Rp Ligni Guajaci 40,0
Ligni Sassafras
Radix Bardanae aa 20,0
Radix Liquirit mund 5,0
Stipit Dulcamar 10,0
Fruct Foeniculi 3,0

Tinctura antacrida (Nat form)
Antacid Tincture Dysmenorrhoea
Mixture. FENNER's Guaiac Mixture
Rp 1 Resinae Guajaci sub. pulv
2 Terebinth caudensis aa 125 g
3 Hydrargyr bichlorat corros 5,5 g
4. Olei Sassafras 80 ccm
5 Spiritus (81 proc.) q s ad 1000 ccm
Man erhitzt 1 und 2 mit 750 ccm von 5 in einem
lose verschlossenen Glaskolben im Wasserbade
bis zum Sieden, filtrirt, fügt 3 in 50 ccm von 5
gelöst und 4 hinzu und bringt durch Nach-
waschen des Filters mittels 5 auf 1000 ccm

Tinctura antarthritica
Chiaici Berolinensis
 Rp Tinctur kalmiae 80,0
 Tinctur Guajac. ammon 32,5
 Tinctur Opi simplic. 7,5
 10–20 Tropfen dreimal täglich

Tinctura antarthritica HATFIELD
 Rp Tinctur Guajaci resin 85 200
 Spiritus saponat. 85 200
 Dreimal täglich 1 Theelöffel

Tinctura haemorrhagica
Blutreinigungstropfen Holztinktur
 Rp Resinae Guajaci 20,0
 Terebinth. laurum 20,0
 Succ. Juniperi insip. 30,0
 Olei Juniperi fruct. 30,0
 Olei Foeniculi 2,0
 Spiritus dilut. (70 proc.) 1000,0
 Durch Digestion zu bereiten Theelöffelweise

Tinctura odontitis Francofurtana
Frankfurter Zahntinktur
 Rp Tinct. Guajaci ligni 40,0
 Aque vulnerar. vin. 10,0
 Spiritus 4,0
 Spiritus Cochleariae 20,0
 Tinctur Myrrhae 20,0
 Tinctur Cinnamomi 5,0
 Olei Menthae pip. 33 0,5
 Olei Carophyllor. 33 0,5

Tinctura Guajaci composita (Nat. form)
Compound Tincture of Guaiac. DWYER'S
Tincture of Guaiac
 Rp 1 Resinae Guajaci 12,0 g
 2 Kali carb. 6 g
 3 Fructus Pimentae pulv. 80 g
 4 Lapidis pumicea 60 g
 5 Spiritus (51 proc.) 435 ccm

6 Aque 435 ccm
 7 Spiritus dilut. (41 proc.) q s ad 1000 ccm
 Man mischt 1–4, rührt mit 5 an, setzt nach und nach 6 hinzu, filtrirt und bringt durch Nachwaschen mittels 7 auf 1000 ccm

Tinctura stomatica
Zahn- und Mundessenzenz
 Rp Tinct. Guajaci ligni 40,0
 Tinct. Myrrhae 10,0
 Mixtur oleoso-balsam. 85 5,0
 Tinct. Cinnamomi 10,0
 Aque Cinnam. v. 20,0
 Glycerin 20,0
 Sacchari Vanillini 10
 Olei Menthae pip. gtt. X
 1 Theelöffel unter das Mundspülwasser zu mischen.

Tinctura stomatica ALEXANDER
 Rp Tinct. Guajaci ligni 50,0
 Tinct. Chinae 10,0
 Spiritus Cochlear. 2,0
 Olei Menthae pip. 0,5

Tinctura stomatica VOLLER
Tinctura dentifricia VOLLER
VOLLER'S Zahn- und Mundessenzenz
 Rp Tinct. Guajaci ligni 50,0
 Tinct. Cinnamomi 15,0
 Tinct. Chinae 10,0
 Tinct. Opi simplicis 2,5
 Olei Menthae pip. gtt. III
 Spiritus Cochleariae 20,0

Trochiscus Guajaci Resinae (Brit.)
Guaiacum Resin Lozenges
 Rp Resinae Guajaci 97,2
 Mittels q s Fruchtgrundlage (Fruit basis, s unter Rubes) formt man 500 Pastillen, jede enthält 0,1944 Guajakharz.

Anatherin-Mundwasser von J G Popp in Wien 1) 4,0 rothes Sandelholz, 2,0 Guajakholz, 5,0 Myrrhe, 3,0 Nelken, 1,0 Zimmt, je 0,1 Nelken- und Zimmtöl, 290,0 Spiritus (90 proc.), 145,0 Rosenwasser (Hager) 2) 4,0 Guajakholz, je 1,0 Myrrhe und Salpeter, 120,0 Kornbranntwein, 180,0 Löffelkrautspiritus digerirt man eine Nacht, destillirt 240,0 ab, digerirt damit je 1,0 Rauten, Löffelkraut, Rosenblätter, Schwarzen Senf, Meerrettich, Bertramwurzel, Chinarinde, Bärlappkraut, Salbei, Veilchen- und Alkanna-Wurzel 14 Tage und mischt zu je 120,0 des Filtrats 1,0 Salpeteräther-Weingeist (Urvorschrift) 3) 160,0 Myrrhentinktur, 80,0 Catechutinktur, je 40,0 Guajak- und Ratanhiatinktur, 30,0 Nelkentinktur, 20,0 Löffelkrautspiritus, 20 Tropfen Zimmtöl, 1 Tropfen Rosenöl, 630,0 Weingeist von 50 Proc (Niederl. Gesellschaft)

Antiveneerel Elixir WOLKE'S entspricht obigen Guttas Jesuitarum (s S 1268).
Blutreinigungspulver von J U Hohl 1,0 Guajakharz, 2,0 Stiefmütterchen, 1,5 Ringelblumen, 0,5 Goldschwefel, 1,0 Sarsaparille, 2,0 Schafgarbe, 12,0 Zucker in 12 Pulver getheilt

Holztropfen Holztinktur Essentia lignorum, Königseer Mit Sassafrasöl versetzte Tinktur aus Holzthee

Kaiser-Zahnwasser, GOLDMANN'S Mischung aus Guajakholz- und Benzotinktur
Kaiser-Zahnwasser von GRÖSSLER Guajakharztinktur mit Spuren Benzol
Pain Killer, PERRY DAVIS' besteht aus 20 g Kampferspirit, 20 g Capsicumtinktur, 100 g Guajakharztinktur

Reinigungsthee, Jerusalem, von CAESCH und entharzte Guajakholzspähne
Salztropfen, Salztinktur, Königseer Eine Tinktur aus Holzthee, mit Perubalsam, Sassafrasöl, Tinctura kalmia und Ammon carbon pyrooleos versetzt
SCHLUMBERGER'S Thee und Salbe 1) 80,0 Sassafras, 15,0 Sarsaparille, 90,0 Holzthee, 7,5 Sennesblätter, 15,0 rothes Sandelholz 2) Je 20,0 Wermuth- und Kalmuspulver, 5,0 rothes Sandelholz, 200,0 Fett

Sirap antigoutteux de BOURGEE in Auch ist eine Lösung von Guajakextrakt in Zuckersirup

STANDISH'S diaphoretic Liquor ist eine mit Rum versetzte Abkochung von Holzthee und Rosinen.

Universalpillen, Dr MATTHAEY's, von JASPERS, gegen Nerven- und Hamorrhoidal leiden, sind 200 glänzende Pillen aus Guajakharz, Ammoniak und Senna. (3 M.)

Wundersaft von J. ZEIDLER in Berlin, in 5 Nummern Mischungen aus Zucker lösung und ammoniakalischer Guajakholztinktur

Zahnschmerzmittel von GOIZ in Berlin, besteht im wesentlichen aus Guajakholz und der Tinktur daraus

Zahntinktur, Dr JOHN BABEL's, ist Guajakharztinktur

Zahntinktur von VOGLER Eine Tinktur aus Guajakholz, Sassafras, Bertramwurzel, Pfeffer, Nelken- und Sandelholz

Zahntinktur von WEBER ist eine weingeistige Lösung verschiedener Harze mit Kampher und Terpentinöl

II Ausser den Arten der Gattung *Guajacum* enthalten auch andere *Zygophyllaceae* im Holz mit Oxydationsmitteln sich blau färbende Stoffe, also vermuthlich Guajakonsäure. Es kommen in dieser Beziehung in Betracht 1) Das Guajakholz von Chile von *Porteria hygrometrica* R et P, das in Form dünner Aeste, die nur wenig dunkles Kernholz haben, verwendet wird 2) Das Holz einer oder mehrerer *Bulnesia*-Arten (*B. Sarmienti* Lor und *B. arborea*) Es kommt in dicken Stücken mit reichlichem dunklen Kernholz nach Europa unter dem Namen *Palo balsamo*, *Bois de Gayac*. Es giebt bei der Destillation 5—6 Proc. ätherisches Oel, das im Handel auch den ihm nicht zukommenden Namen *Champacaöl* führt — Das Oel ist zäh, dickflüssig, bei gewöhnlicher Temperatur langsam krystallinisch erstarrend Spec Gew bei 30° C 0,965—0,975 Drehungswinkel bei 30° — 6° bis 7° Es enthält Guajakalkohol (*Guajol*), ein Sesquiterpenhydrat $C_{15}H_{26}O$, das nicht Träger des Geruches ist. Man verwendet es in der Parfümerie und neuerdings in Bulgarien zur Verfälschung des Rosenöles. Das Holz kommt gelegentlich als *Lignum Guajaci* in den Handel

Guarana.

Guarana (Ergänzb. Helv. Austr. U. St. Gall.) *Pasta Guaranae*. *Pasta seminum Paullinae*. — **Guarana**. **Guaranapaste**

Wird aus den Samen der *Paullinia Cupana* Kunth (*P. sorbilis* Mart.) (Familie der *Sapindaceae*—*Paullinieae*) gewonnen. Die Pflanze, ein Kletterstrauch, wächst in den Provinzen Para und Amazonas in Brasilien und scheint zuweilen auch kultivirt zu werden. Die glänzend braunen oder braunrothen Samen, die etwa 12—15 mm gross, eiförmig oder kurz kegelförmig sind, werden zerstoßen, nachdem sie schwach geröstet sind und aus ihnen unter Zusatz von wahrscheinlich heissem Wasser eine Paste geformt, die man in Walzen oder seltener Kugeln formt und trocknet.

Beschreibung. Die Paste ist aussen rothbraun, knochenhart, sehr schwierig zu pulvern, auf dem Bruch chokoladenfarbig und von groberen Bruchstücken der Samen ungleichmässig. Geruch und Geschmack erinnern an Kakao. Unter dem Mikroskop erkennt man neben aufgequollenen unversehrte kuglige oder zu 2—3 zusammengesetzte starke Körnchen, Parenchymzellen, Reste von Spiralgefässen, mässig verdickte, isodiametrische Steinzellen und kleine Krystallnadeln.

Bestandtheile. 3,1—5,0 Proc. Coffein (Guaranin). Asche etwa 2 Proc., erheblich höhere Angaben, z. B. 7,4 Proc., sind verdächtig.

Verfälschungen. Man soll der Pasta fremdes Stärkemehl (Mamok) und Kakao beimengen. Beides würde sich durch das Mikroskop ermitteln lassen. — Da nach den vorliegenden Untersuchungen Steinzellen im Samen der *P. Cupana* fehlen, so würden die selben, die in der Droge anscheinend ständig vorkommen, auch auf eine Beimengung schliessen lassen.

Pulverung. Die Guarana wird grob gepulvert, bei gelinder Wärme völlig ausgetrocknet, dann durch ein feines Sieb geschlagen. Das Pulver bewahrt man in gelben Stöpselgläsern auf.

Anwendung Gegen Migräne (Hemicranie) in Gaben von 0,5–2,0 mehrmals täglich in Pulver-, Pastillen- oder Tablettenform. In Brasilien als Genussmittel. Es ist von allen verwandten Genussmitteln dasjenige, das am meisten Caffein enthält.

Extractum Guaranae. Guarana depurata. Grob gepulverte Guarana digerirt man mit 45 proc Weingeist, filtrirt und dampft zum weichen Extrakt ein. Auch durch Eindampfen aus dem folgenden zu erhalten. Ausbeute 30–35 Proc. Gabe 0,25–1,0.

Extractum Guaranae fluidum (U-St.) Fluid Extract of Guarana. Aus 1000,0 gepulverter Guarana (No 80) und einer Mischung von 750 ccm 91 proc Weingeist und 250 ccm Wasser im Verdrängungswege. Man befeuchtet mit 200 ccm, kocht zuerst 800 ccm auf und stellt 1 a 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind etwa 6000,0 Lösungsmittel erforderlich.

Tinctura Guaranae. Tinctura Paullinae. Guarana-Tinktur. Wird aus 1 Th grob gepulverter Guarana und 5 Th verdünntem Weingeist bereitet.

Elixir Erythroxyl et Guaranae (Nat. form)
Elixir of Erythroxylon (or Coca) and Guarana
Rp Extract Cocae fluidi (U-St.) 125 ccm
Extracti Guaranae fluidi 125 ccm
Talcum pulverat. 15 g
Elixir Toraxaci comp. (Nat. form) 750 ccm
Man mischt, läßt absetzen und filtrirt.

Elixir Guaranae **Guarana Elixir**

I
Rp Pastae Guaranae
Glycerini aa 20,0
Aqua Cinnamomi spir 70,0
Tinctur Aurant cort
Tinctur Vanillae aa 5,0
Man macerirt 8 Tage, presst und filtrirt.

II Nation formul
Rp Extract Guaranae fluid. 300 ccm
Elixir aromatici (U-St.) 300 ccm
Elixir Toraxaci comp. (Nat. form) 600 ccm

Pasta Cacao cum Guarana
Guarana-Chokolade.
Rp Pastae Guaranae pulv sublt 50,0
Pastae Cacao 450,0
Sacchari albi pulv 500,0
Wie Pasta Cacao aromat (S 526) zu bereiten.

Pastilli Guaranae
Trochisci Guaranae Guarana-Pastillen.
Rp 1 Pastae Guaranae 100,0
2 Sacchari albi sublt liessime pulv succati 400,0

Anti-Migräne-Geist, KRAUSSER's, ist eine verdünnte Guarana-Tinktur. Guarana von GRIMAUDT & Co in Paris 12 Pulver, wovon jedes angeblich aus 1,75 g Guarana besteht.

WÄRNER's Safe Nervine. Nach neueren Angaben 5,0 Guarana, 3,0 Löwenzahn, je 1,0 Enzian, Süßholz, Pomeranzen, je 0,5 Cardamomen, Zimmt, 6,0 Bromkalium, 30,0 Zucker, 250,0 verd. Weingeist.

3 Sacchari Vanillini 2,0
4 Pastae Cacao 500,0
Man mischt 1, 2, 3 unter sich, dann mit der geschmolzenen Kakao-Masse und füllt mit 1000 Pastillen, indem man die abgewogenen Dosen auf erwärmte Platten setzt und durch Aufschlagen gütet.

Pulvis Guaranae compositus
Pulvis nervinus e Paullinae.
Rp Pastae Guaranae 1,0
Lulveris bromulac 0,25
Sacchari lactis 0,5
D tal dos. X. Täglich 2–3 Pn ver

Sirupus Guaranae
Guarana-sirup.
Rp Tinctur Guaranae 15,0
Sirupi Sacchari 85,0
oder Extr Guaranae liquid. 5,0
Sirupi Sacchari 95,0

Tabulettae Guaranae
Guarana-Tabletten.

I
Rp Pastae Guaranae pulv 25,0
Sacchari albi pulv 2,5
Mucilag Gummi arab q s
Man presst 0,3 schwere Pastillen

II
Rp Pastae Guaranae 10,0
Sacchari albi
Gummi arabici aa 2,0
Aqua destill gtt. VI
Man presst 30 Tabletten und bestreut mit Barlapp

Gummi.

Gummi Acaciae (Anstr.) **Acaciae Gummi** (Brit) **Gummi arabicum** (Germ Helv) **Acacia** (U-St.) **Gummi Mimosae.** — Arabisches Gummi. Akazien- oder Mimosengummi — Gomme arabique vraie (Gall) Gomme du Sénégal (Gall.) — Gum arabie (U-St.) Gum Acacia.

Die Stammpflanzen und die Heimath der Droge werden von den einzelnen Arzneibüchern wie folgt festgestellt. Germ. Hauptsächlich von *Acacia Senegal* aus dem oberen Nilgebiet und aus Senegambien. Helv *Acacia Senegal*. U-St *Acacia Senegal*. Gall *Acacia Senegal* Willd und *A. Arabica* Willd.

Abstammung. *Acacia Senegal Willdenow* (syn *Acacia Verec Guillemin et Perrottet*), Familie der Mimosaceae—Acaciaeae, ist ein kleiner, stacheliger, 6 m hoher Baum oder Strauch mit 3—4 cm langen, doppelt gefiederten Blättern, bis 8 cm langen Blütenständen und blassegelben Blüten. Heimisch in Senegambien, im Stromgebiete des weissen Nil und des Atbara in Kordofan und südlich bis nach Deutsch Ostafrika gehend, vermuthlich auch in den zwischen Senegambien und dem Nil gelegenen Ländern Innerafrikas. Wenn schon nur diese Art als Stammpflanze von den Arzneibüchern fast ausschliesslich genannt wird, so ist es doch nicht zweifelhaft, dass auch das Gummi anderer Arten mitgesammelt wird. Es werden als solche genannt speciell in Ostafrika *Acacia abyssinica* Hochstetter, *A. glaucophylla* Steud., *A. stenocarpa* Hochst., *A. fistula* Schweinf., *A. nilotica* Del., *A. Seyal* Del., *A. Ehrenbergiana* Hayne. Das Gummi bildet sich in der Rinde der Pflanzen durch Verschleimung und zwar zuerst der primären Membran, später der sekundären Verdickungsschichten. Wenn nach der Regenzeit trockene Winde wehen, so tritt das Gummi aus Rissen der Rinde aus und trocknet zu knolligen oder wurmförmigen Stücken.

Beschreibung. Das ostafrikanische Gummi bildet rundliche, knollige, eiförmige, auch längliche und durch Zerspringen eckige Stücke von verschiedener Grösse und Farbe. Sie sind farblos, weisslich, gelblich bis braunroth und von verschiedenem Grade der Durchsichtigkeit. Es bricht leicht in scharfkantige, muschlige, glasglänzende Stücke. Die ganzen Stücke sind meist von zahllosen Rissen durchsetzt. — Beim Senegal-Gummi treten die Risse weniger hervor, die Stücke sind häufig wurmförmig gekrümmt, und wenn auch das einzelne Stück farblos erscheint, in Masse etwas rothlich. — In der doppelten Gewichtsmenge Wasser soll es sich langsam aber vollständig zu einem klaren, meistens gelblichen, sauer reagirenden Schleim lösen. Mit Glycerin ist die wässrige Lösung mischbar. In Alkohol, Aether und Oelen ist es unlöslich, doch löst Alkohol von weniger als 52 Proc. eine seinem Wassergehalt entsprechende Menge auf. Mit Bleizuckerlösung ist der Schleim ohne Trübung mischbar, dagegen bewirkt Bleiessig auch in einer Verdünnung von 1 auf 10000 Wasser eine Trübung. Auf alkalische Kupferlösung wirkt Gummi bei 60—70° C nicht reducirend ein, scheidet aber nach dem Kochen eine geringe Menge Kupferoxydul ab. Spec. Gew. lufttrocken 1,487, bei 100° C 1,525. Es dreht die Polarisationssebene links, doch kommt auch rechts drehendes, sowohl bei arabischem (Kordofan, Gedda, Suakin), wie bei Senegal-Gummi vor. Ausserdem findet sich rechtsdrehendes unter Mogadorgummi und unter solchem aus Deutsch-Südwestafrika.

Bestandtheile. Es ist ein wechselndes Gemenge von wenigstens zwei Gummiarten, einem rechts- und einem linksdrehenden. Das linksdrehende ist das Calciumsalz der Arabinsäure $C_8H_{14}O_4$, CaO. Asche 3—4 Proc.

Sorten. Bis zum Beginn der Wirren in Oberägypten wurde der pharmaceutische Bedarf fast ausschliesslich durch das in diesen Ländern gesammelte Gummi gedeckt und nur dieses war von den Arzneibüchern zugelassen. Das hat sich seit dem fast völligen Aufhören von Zufuhren aus jenen Gegenden geändert, und das Senegal-Gummi gilt dem genannten gegenüber fast überall als gleichwerthig. Seit einigen Jahren haben aber Zufuhren wieder begonnen. Die im folgenden aufgeführten Sorten speciell des ostafrikanischen Gummis sind einigermaßen unbestimmt und wechselnd in ihrer Beschaffenheit.

I. Gummi von *Acacia Verec* und verwandten Arten

In Wasser löslich. Den Forderungen der Pharmakopöen meist entsprechend.

a Ostafrikanisches Gummi

1 Kordofan-Gummi. Beste Sorte. Ziemlich selten. Der obigen Beschreibung entsprechend. Diesem ähnlich das Berkam-Gummi.

2 Gezireh-Gummi, kommt über Kassala und Massaua in den Handel. Kleine Körner, wenig gelblich. Ebenfalls ziemlich selten. Schleim etwas weniger konsistent wie 1.

3 Sennaar-Gummi. Zwischen Sennaar und dem Rothen Meere gesammelt. Blassgelb.

4 Suakin Gummi (Samagk, Savakumi, Hidschodzi, Taler Gummi), hauptsächlich von *Acacia stenocarpa* Hochst kleine, gelbe oder braunliche Stückchen Schleim wenig klebend — Unter diesem Namen kommen auch kleine, von den besseren Sorten abgesetzte Stückchen vor

5 Geddah-Gummi (berberisches Gummi, vergl unten) Südlich von Arkiko gesammelt, kommt über Dschudda (Geddah) in den Handel Kleine Körner von meist dunkler Farbe und unangenehm Geschmack, schwer löslich Schlechte Sorte Unter diesem Namen allerdings auch bessere Sorten Anscheinend ähnlich das Aden-Gummi

b Westafrikanisches Gummi Senegal-Gummi

1 Gummi vom Unterlauf des Flusses (Gomme du bas du fleuve) Knollige oder wurmförmige Stücke von gelblicher bis gelbbrauner Farbe

2 Gummi vom Oberlauf des Flusses (Gomme du haut du fleuve) Kleinere, hellere Stücke, darunter mehr wurmförmige, besser in Wasser löslich wie 1

3 In dieselbe Gruppe gehören die ebenfalls aus Senegambien in den Handel gelangenden Sorten Salabreda (Gomme friable), Médiné vom Mittellauf des Flusses, Galam (von *Acacia vera* Willd u *A. albida* Del)

II Gummisorten anderer Herkunft,

aber ebenfalls ganz oder doch grossentheils in Wasser löslich und theilweise sehr wohl im Stande, die officinellen Sorten zu ersetzen

a Akazien-Gummi

α Aus Afrika

1 Nordafrikanisches Gummi (Mogador, Marokkanisches, Berberisches G, vergl oben) Von *Acacia gummifera* Willd und *A. arabica* Willd In Wasser unvollkommen löslich, mittelmässige Sorte Indessen kommt unter diesem Namen auch Gummi vor, das dem Gezirch Gummi nahesteht, und welches, vielleicht aus dem Sudan stammend, infolge der unsicheren Verhältnisse in Ostafrika, einen nordwestlichen Weg genommen hat

2 Gummi aus Deutsch-Südwestafrika Unter diesem Namen (auch Gummi von *Angra Pequena*) ist in den letzten Jahren ziemlich reichlich Gummi nach Europa gekommen, das wenigstens 2 Th in Wasser völlig löslich war und sich für die meisten Verwendungen trefflich eignete Es stammt von *Acacia horrida* Willd Andrea, nicht lösliches, dürfte von *Acacia Giraffae* Willd stammen

3 Kap-Gummi, wenigstens zum grossen Theil mit dem vorigen identisch Es kommt aber unter diesem Namen auch ganz unlösliches Gummi vor Soll auch von *Acacia Karroo* Hayne und *A. capensis* Colla gesammelt werden

β Aus Indien Amrad-Gummi

Von *Acacia arabica* Willd (Babool-Gummi), strohgelb bis braun, zu 95 Proc einen ziemlich dünnen, röhlichen Schleim liefernd Klebfähigkeit gut

Acacia leucophloea Willd, hellbraun, löslich Klebkraft ziemlich gut

Acacia Catechu Willd, hellbraun, säuerlich, nur theilweise löslich Klebkraft schwach

Acacia ferruginea D C braun, mit brauner Farbe löslich Klebkraft ziemlich gut

Acacia farnesiana Willd, braun, süsslich, mit brauner Farbe löslich Der Schleim gelatinit aber nach kurzer Zeit Klebkraft schwach

Acacia modesta Wall, hellbraun, löslich Klebkraft gut

γ Aus Australien Wattle Gummi

Für den Export soll nur von *Acacia pycnantha* Benth in Victoria in Süd australien gesammelt werden Das Gummi ist in Wasser löslich Ebenso liefert *A. decurrens* Willd, *A. homalophylla* Cunn, *A. pendula* Cunn, *A. sentis* F Müll, lösliches Gummi (Sidney-Gummi) Bei *A. binervata* D C, *A. dealbata* Lk, *A. elata* Cunn, *A. glaucescens* Willd, *A. penninervis* Sieber bleiben 4—12 Proc unlöslich, bei *A. decurrens* Willd, *A. mollissima* Willd, *A. vestita* Ker Gawl 9—41 Proc

δ Aus Amerika

Acacia Angico Mart

b Gummi von anderen Pflanzen

α Aus Indien

Anogeissus latifolia Wall (Ghatti-, Dhaura-Gummi), strohfarbene Stücke, die im Wasser zu 85 Proc löslich sind, deren Klebkraft aber nur mittelmässig ist

Bauhinia variegata L, braun, völlig löslich Klebkraft wie beim vorigen

Albizia amara Boiv, hellbraun, von süsslichem Geschmack, nur theilweise löslich Klebkraft sehr gut

Buchanania latifolia Roxb, gelblich bis braun, von süßem Geschmack, angenehmen Geruch, völlig löslich Klebkraft schwach

Odina Wodier Roxb (Jingan-Gum), dunkelbraun, von saurem Geruch und Geschmack Völlig löslich Klebkraft schwach

Terminalia tomentosa Wight et Arnott, gelb, nur zum Theil löslich Klebkraft gut

β Aus Australien

Panax Murrayi F Müll., *P. elegans* C Moore et F Müll, *P. sambucifolium* var *angustum* Sieber liefern in Wasser nicht völlig lösliches Gummi von aromatischem Geruch Das der erstgenannten Art scheint das beste zu sein

γ Aus Amerika

Anacardium occidentale L (Cajugummi), löslich in Wasser

Prosopis dulcis Gill (Mezquite-Gummi), löslich in Wasser, von süßem Geschmack

Hymenaea Courbaril L

Bunchosia glandulifera H B K (Ciruela-Gummi) aus Caracas Völlig löslich zu einem klaren, dicken Schleim

III. Gummisorten von geringer Löslichkeit oder unlöslich

a Aus Afrika

Prunus Bokhariensis Royle und *P. Puddum* Roxb Von der Ostküste des rothen Meeres Zur Verfälschung des Kordofan-Gummi benutzt Quillt im Wasser nur auf

Aus Deutsch-Ostafrika nach Europa gelangtes Gummi von Akazien, ist gelb bis braun Es löst sich, ist aber von geringer Klebkraft

b Aus Europa

Dahin gehört das gelegentlich auch bei uns gesammelte Gummi der Kirsch-, Pflaumen und Aprikosenbäume

c Aus Indien

Bombax malabaricum D C (Moscherus, Moschras) Quillt in Wasser nur auf Enthält Gerbstoff, daher als Adstringens benutzt

Moringa pterygosperma Gärtner (ebenfalls als Moscherus bezeichnet) Quillt nur in Wasser auf

Eriodendron anfractuosum D C, *Stereospermum chelonoides* D C, *Ailanthus malabarica* D C, *Macaranga indica* Müll Arg Alle dem vorigen ähnlich, wenig bekannt

d Aus Australien

Mezoneuron Scottchinii Fr M (Barrister-Gummi) Quillt in Wasser nur auf, in verdünnter Salzsäure lösen sich 69 Proc

e Aus Amerika

Acacia micrantha Benth (Guji-Gummi) aus Caracas Es lösen sich 26 Proc, der Rest ist Gallerte

Pereskia Guamacho (Guaramacho-Gummi) aus Caracas Zu 48 Proc löslich, der Rest ist Gallerte

Cedrela odorata L (Cedern-Gummi) aus Caracas 25 Proc lösen sich, der Rest ist Gallerte

Puya species (Chagual- und Maguey-Gummi) Chile In kochendem Wasser zu 18 Proc löslich, doch sind immer einzelne Stücke völlig löslich.

Surrogate für Gummi. Der grosse Mangel an Gummi in den letzten Jahren hat veranlasst, dass andere Stoffe und Kunstprodukte an seiner Stelle empfohlen wurden Kunstgummi wird aus Dextrin bereitet Aus der Frucht eines *Mesembryanthemum* hat man einen Schleim extrahirt und durch Abdampfen concentrirt Den in Wasser unlöslichen Theil des Kirschgummis behandelt man im Dampfbade mit einer wässrigen Lösung von 1 Proc NaHO und 2,5 Proc Na₂CO₃ und macht ihn so löslich

Diese und ähnliche Surrogate stehen an Klebkraft auch minderwerthigem Gummi nach In kaltem Wasser gar nicht oder nur zum Theil lösliche Gummisorten können häufig löslich und so für die Technik verwendbar gemacht werden, indem man sie entweder mit Wasser kocht, oder unter Druck bei höherer Temperatur mit Wasser behandelt, oder mit verdünnten Alkalien oder Säuren behandelt Auch Myrrhengummi, der bei Bereitung von Tinctura Myrrhae bleibende Rückstand, giebt in Wasser gelöst einen technisch gut brauchbaren Klebschleim

Prüfung Die Prüfung der officinellen Sorten ergibt sich aus dem oben unter Beschreibung Gesagten. Speziell das Verhalten beim Lösen in Wasser ist bei den einzelnen Gummisorten recht verschieden, die officinellen geben einen filtrirbaren Schleim, andere geben einen scheinbar völlig homogenen Schleim, der aber nicht filtrirbar ist, andere eine mehr oder weniger konsistente Gallerte, bei anderen wieder quellen die einzelnen Körnchen soweit auf, dass scheinbar ein gleichmässiger Schleim entsteht, in dem aber bei genügender Verdünnung die einzelnen Körnchen sich erkennen lassen, bei anderen trennt sich der Schleim bald in zwei Theile, einen gewöhnlich sehr konsistenten dicken und einen wasserigen, dünnen, und schliesslich kommen Sorten vor, die nur mehr oder weniger aufquellen.

Nicht selten ist Gummi mit *Bdellium* (*Bdellium d'Afrique* (Gall)), einem von *Balaamodendron africanum* Ait und *B. Mukul Hook* abstammenden Gummiharz verfälscht. Dasselbe ist zu etwa 30 Proc in Wasser löslich, der Rest in Aether und kochendem Alkohol. Ferner kommen Verfälschungen mit Dextrin nicht selten vor, die man nachweist, indem man 8 ccm einer Lösung, die aus 15 Tropfen Liq. Ferri sesquichlorati, 15 Tropfen gesättigter Lösung von rothem Blutlaugensalz, 5 Tropfen verdünnter Salzsäure (spec. Gew. 1,165) und 60 ccm Wasser besteht, mit 6 ccm einer 20procentigen Lösung des betr. Gummi zusammenbringt. Bei reinem Gummi wird die Mischung gelb und bleibt so 10–12 Stunden lang, im anderen Falle ändert sich die Farbe bald in Blau. Mit schwefliger Säure gebleichtes Gummi wird in der Lösung mit Baryumchlorid Fällung geben, ebenso durch Chlor gebleichtes mit Silbernitrat. Solches Gummi hat an Löslichkeit eingebüsst.

Für die Beurtheilung der technischen Verwendbarkeit eines Gummi ist die Bestimmung der Viskosität von grossem Werthe, man bestimmt dieselbe entweder mit dem Lunge'schen Viskosimeter, mit dem ermittelt wird, binnen welcher Zeit eine Spindel von bestimmter Grösse und Schwere bis zu einer bestimmten Marke in den Schleim einsinkt (Zeitschrift f. angew. Chemie 1895 p. 487), oder, wenn die Menge des zur Verfügung stehenden Gummi zu gering ist, bestimmt man, binnen welcher Zeit eine bestimmte Menge des Schleimes aus der Öffnung einer Burette oder eines cylindrischen Scheidetrichters ausfliesst (Apotheker Zeitung 1897 No. 75, 1898 No. 22). In beiden Fällen dient ein Kordofan-Gummi bester Beschaffenheit zum Vergleich.

Für Rezepturzwecke genügt allein das farblos und blank lösliche Gummi arabicum albißimum electum, für den Handverkauf hält man die helleren Sorten Senegal-Gummi vorrathig, die kaum halb so theuer sind und als Klebmittel völlig genügen.

Pulverung. Das Gummi wird durch Absieben vom anhängenden Staube befreit, gröblich zerkleinert, wobei Holztheile und dergl. herauszulesen sind, bei gelinder Wärme (höchstens 30° C, nach Gall bei etwa 40° C) einen Tag getrocknet, dann mittels sehr sauberer Siebe in ein feines Pulver (VI Germ. Helv.) verwandelt. Höhere Temperaturen und längeres Trocknen können das Gummi derart verändern, dass es zur Bereitung von Oelemlösungen untauglich wird. Der Verlust durch Trocknen und Verstauben kann bis zu 18 Proc. betragen.

Aufbewahrung An einem trocknen Orte in Holzkästen, das feine Pulver in dichtverschlossenen Hafenglasern, da es aus der Luft Feuchtigkeit anzieht und zusammenbackt.

Anwendung In der Pharmacie als Hauptbestandtheil vieler Hustenpastillen, als Bindemittel bei Emulsionen, Pillen, Pasten, Pastillen, als Hulfsmittel beim Pulvern mancher Drogen (Koloquinthen, Fructus Capsici), äusserlich als Streupulver, zum Stillen von Blutungen. Technisch als Klebmittel.

In flüssigen Arzneimischungen, falls man dieselben klar haben will, sind Gummilösungen unverträglich mit starken Säuren, Metallsalzen, besonders Bleiessig, Brom- und Ferrisalzen, mit Sulfaten, Oxalaten, Silikaten, ferner mit Aether, wie mit grosseren Mengen Weingeist und weingeistigen Tinkturen.

Basis simplex ad trochiscos. Simple Basis (Brit) Einfache Pastillen Grundlage 496 g Zuckerpulver und 19,5 g gepulvertes arabisches Gummi werden gemischt und mit 35,5 cem Gummischleim und q s Wasser zum Teig angestossen. Die Masse ist für 500 Pastillen bestimmt. Das aufzunehmende Arzneimittel wird zuvor sorgfältig mit den Pulvern gemischt, da Brit die Dosis für eine Pastille angibt, so ist die betreffende Zahl mit 500 zu vervielfältigen.

Decoctum album. Apozème blanc (Gall) Decoction blanche de Sydenham Je 10,0 Gummipulver und Calciumphosphat mischt man mit 20,0 Brodkrume und 60,0 Zucker, fügt etwa 1 l Wasser hinzu, kocht $\frac{1}{4}$ Stunde, seigt unter gelindem Pressen durch, setzt 10,0 Orangenblüthenwasser und q s Wasser zu 1 l Flüssigkeit zu.

Mixtura gummosa (Austr Ergänzb Helv) **Mistura Acaciae** (Nat form) **Potio gummosa s demulcens** **Julapium pectorale s bechicum** — **Gummimixtur** — **Potion gommeuse** (Gall) **Julep gommeux** **Mixture of Acacia**

	Austr		Ergänzb	Form		Helv	Gall
Gummi arab pulv	10,0	Mucil Gummi arab	25,0	20,0	Gummi arab	10,0	10,0
Sacchari alb pulv	5,0	Sirupi simpl	15,0	20,0	Sirup Sacch	10,0	30,0
Aquae destill,	135,0	Aquae destill	60,0	160,0	Aquae Aurant flor	5,0	10,0
					Aquae destill	75,0	100,0

Nat form Gummi arabici pulv, Sacchari aa 75 g, Aquae destillat 850 cem

Bei Bedarf frisch zu bereiten

Mucilago Gummi Acaciae (Austr) **Mucilago Acaciae** (Brit U-St) **Mucilago Gummi arabici** (Germ Helv) **Mucago cum Gummi** (Gall) **Mucilago Gummi Mimosae** — **Akaziengummischleim** **Gummischleim** **Gummiarabicumlösung** — **Mucilago de gomme** — **Mucilage of Gum Acacia** **Slime of Arabic gum**

	Austr	Germ	Helv	Brit	U St	Gall
Gummi arabici	1	1	1	3,4	1	
Aquae destillatae	2	3	1,5	6,6	1	

Nach Germ, Helv, Brit, U-St verwendet man Gummi in Stücken, dass man schnell mit Wasser abwascht, bis dieses klar bleibt, nach Austr und Gall löst man Gummipulver unter Anreiben im Wasser. Den fertigen Schleim seigt man durch Flanell. Das erstere Verfahren dauert zwar länger, liefert aber einen klareren Schleim. In jedem Falle ist die Anwendung von Wärme zu vermeiden, auch heftiges Schütteln ist nicht vorthellhaft. Arbeitet man mit grösseren Mengen, so giebt man das abgewaschene Gummi auf ein Porcellansieb und hangt dieses in das das Wasser enthaltende Ansatzgefäss, zur Darstellung im kleinen bedient man sich einer eckigen Medicinflasche, die man hinlegt und öfters wendet. Gummischleim muss klar und gelblich gefärbt sein, er darf weder sauer noch sauer schmecken, Fehling'sche Lösung nicht reduciren und durch Jodlösung nicht geblaut werden. Man bewahrt ihn in ganz gefüllten, kleineren Flaschen im Kühlen auf, wegen seiner begrenzten Haltbarkeit in nicht zu grosser Menge. Zusätze von Salicylsäure u. dergl. sind selbstverständlich unstatthaft.

Einen klaren Gummischleim zum Kleben bereitet man aus billigen Gummisorten (in Körnern), indem man die Lösung an einem etwa 80° heissen Ort 1—2 Tage absetzen lässt, die gebildete Haut entfernt und klar abgiesst. Ein Zusatz von 2—3 Proc Glycerin zu diesem Schleim erhält die damit bestrichenen Gegenstände biegsam (z B Papierkapseln zum Ausgieessen von Pflastern). Um das Gelatinniren des Klebschleims zu verhindern, wird empfohlen, demselben etwa 20 Proc Kalkwasser zuzusetzen.

Pasta gummosa (Austr Ergänzb) **Pasta Althaeae** **Massa cum Gummi** **Lederzucker** **Weisse Regline** **Eibischpaste** **Jungfernlleder** **Gummiteig** — **Pâte de gomme** (Gall) **Pâte dite de guimauve** Ergänzb Je 200,0 mittelfein gepulvertes arabisches Gummi und Zucker mischt man, dampft im kupfernen Kessel mit 100,0 Wasser zur Honigdicke ein, rührt 150,0 frisches zu Schaum geschlagenes Eiweiss darunter und erhitet unter fortwährendem Schlagen mit breitem Holzspatel, bis eine Probe von dem letzteren nur noch schwierig abfließt und nicht mehr an den Händen klebt. Man mischt 1,0 Pomeranzenblüthenölzucker zu, giesst in Formen und trocknet in der Wärme aus. — Austr schreibt auf je 500 g Gummi und Zucker das Eiweiss von 12 Eiern und 50 g Orangenblüthenwasser vor, sonst ebenso. — Gall 1000 g weisses Senegal-Gummi wäscht man, löst in 1000 g Wasser, dampft mit 1000 g Zucker ein und verfäht nach Zusatz von 100,0 Orangenblüthenwasser und 12 Eiweiss wie bei den vorigen. — Es ist wesentlich, dass das Eiweiss frisch und im kühlen Raume geschlagen ist! Die fertige Masse giesst man entweder auf eine Marmorplatte, oder in mit Stärke bestäubte Papierkapseln aus, trocknet bei etwa 40° C, schneidet in Streifen und trocknet nochmals. Auch kann man flache Kästen mit Stärkemehl füllen, in dieses behebige Formen andrücken und die nur bis zur Dickflüssigkeit eingedampfte Masse in letztere eingiessen. Sie muss dann vor dem

Trocknen zunächst einige Zeit kalt gestellt werden — Das Schneiden der getrockneten Paste erfolgt im Grossbetriebe durch kleine Kreissagen

Als Eibischpaste sollte diese Zubereitung nur dann bezeichnet werden, wenn man statt des Wassers einen wässrigen Auszug aus Eibischwurzel verwendete — Aufbewahrung in Blechkästen an einem trocknen Ort

Ptisana cum Gummi Tisane de gomme (Gall) 20,0 arabisches oder Senegal Gummi wäscht man, löst in 1000,0 kaltem Wasser und seigt durch

Sirupus gummosus (Erganzb) **Sirupus Gummi arabici** (Helv) **Sirupus Acaciae** (U St) **Sirupus cum Gummi** Gummisirup **Sirup de gomme** (Gall) **Syrup of Acacia** Ergänzb 1 Th Gummischleim, 3 Th weisser Sirup — Helv 10 Th arab Gummi (II, gewaschen), in 9 Th Wasser, 1 Th Pommeranzenblüthenwasser gelöst, 80 Th Zuckersirup — U-St 25 cem Gummischleim, 75 cem Zuckersirup — Gall Aus 1000 g gewaschenem, weissem Gummi, 1300 g Wasser und 8700 g Zucker macht man einen Sirup vom spec Gew 1,33 — Nach Ergänzb und U-St nur bei Bedarf zu bereiten

Bartwichse (Vom)

Rp	1 Gummi arabici	100,0
	2 Saponis medic	100,0
	3 Aquae destill	300,0
	4 Cerae flav	200,0
	5 Cetacei	20,0
	6 Glycerini	20,0

Man löst 1 und 2 in 3 unter Erwärmen, fügt 4 u 5 geschmolzen hinzu, rührt unter Zusatz von 6 kalt, parfümiert, färbt mit Umbra oder Klebruss, und füllt in Tuben

Charta adhaesiva

Ostindisches Pflanzenpapier

Rp	Gummi arabici	20,0
	Aquae destillatae	55,0
	Ol. Gummi ros	gtt. 1

Man löst kalt, streicht mit breitem Pinsel auf Seidenpapier und trocknet an der Luft. Die Bogen werden durch Bescheren geglättet, dann zerschnitten. Setzt man der Lösung 1,0 Salicylsäure und 2–3,0 Glycerin zu, so erhält man die **Charta adhaesiva antiseptica** s. salicylata, einen Ersatz für Englisch Pflaster

Linctus gummosus

(Münch Nosokom-Vorschr)

Rp	Mucilag Gummi arab	
	Aquae destillat	20,0
	Sirupi simplicis	10,0

Linctus pectoralis

Brusttrank

Rp	Mucilag Gummi arab	70,0
	Sirup Papaveris	30,0

Massa pectoralis (Gall)

Pâte pectorale

Rp	1 Specier pectoral. Gall (S 233)	100,0
	2 Aquae destillat ebull	8000,0
	3 Gummi Senegal loti	8000,0
	4 Sacchar albi	2000,0
	5 Aquae Laurocerasi	100,0
	6 Extracti Opi	1,5

Man übergiesst 1 mit 2, löst in der Seiflüssigkeit 3 unter Erwärmen, fügt 4 hinzu, und lässt, sobald gelöst, ohne zu rühren 12 Stunden im stehenden Wasserbade stehen. Hierauf entfernt man die Schaumschicht, rührt sorgfältig 5, in 6 gelöst darunter, giesst in geölte Blechformen aus und trocknet bei 40° C indem man die genügend erhärtete Paste wendet. Zuletzt wird sie mit Fließpapier abgerieben 100 g enthalten etwa 0,02 g Opiumextrakt

Mixtura gummosa FULLER

Rp	Mucilag Gummi arab	30,0
	Sirupi Althaeae	20,0
	Aquae destillat	50,0

Mucilago Gummi arabici ad usum technicum

I Flüssiger Leim

Rp	Mucilag Gummi arab ordinari	90,0
	Alumini sulfurici	20,0

Man löst, lässt einige Wochen im kühlen stehen und giesst klar ab

II Kontor-Gummi: Universal-Klebschleim

Rp	1 Gummi arabici	100,0
	2 Aquae destillat frigida	140,0
	3 Glycerini	10,0
	4 Acidi acetic dilut (30%)	20,0
	5 Alumini sulfurici	6,0

Man löst und mischt im obigen Reihenfolge und füllt nach dem Absetzen auf kleinere Gefässe. Zum Kleben von Papier auf Pappe, Holz, Glas, Porcellan, Metall

III Leim zum Aufkleben von Papier auf Blech.

Rp	Mucilag Gummi arab	90,0
	Glycerini	10,0

Das Blech ist zuvor mittels Salminägel zu reinigen

IV Wasserfester Gummilack

Man vermischt Gummischleim mit Kaliumbichromatlösung und setzt die damit überzogenen Gegenstände (Papierschilde, Glassachen etc) dem Sonnenlichte aus

Pastilli Gummi arabici

Pastilli s Trochisci gummosi s pectorales Gummipastillen Hustenpastillen.

Rp	Gummi arabici pulv	400,0
	Sacchari albi	595,0
	Elaeosacch Aurant. f.	5,0
	Sirupi simpl	q s.

Zu 1000 Pastillen.

Potio pectoralis (Gall).

Potion pectorale.

Rp	Infusi Specierum pectoralium (Gall)	120,0
	Sirupi gummosi	80,0

Pulvis antitarrhacalis (Nat. form)

Catarrh Powder **Catarrh Snuff.**

Rp	Morphin hydrochlor	0,41
	Gummi arab sublt. pulv	25,0
	Bismuth subnitrit	75,0

Pulvis contra tussim STRICKER

Pulvis antitarrhacalis s STRICKER s Hustenpulver

Rp	Gummi arabici pulv	
	Sacchari albi	ss 20,0

Pulvis diureticus (Gall.)
Poudre diurétique
 Rp Kali nitrid pulv
 Radices Althaeae „ 33 100
 Radices Liquiritiae „ 200
 Gummi arabici „
 Sacchari Lactis „ 33 60,0
 10,0 hiervon auf 1 l Wasser als Schüttelmixtur

Pulvis gummosus
Species Diatragacanthae Pulvis Aeneiae
 comp Gummipulver Zusammengesetz-
 tes Gummipulver Poudre gommeuse
 Compound powder of gummi

I Germ Nat form
 Rp Gummi arabici subit pulv 3,0
 Radix Liquirit „ 30
 Sacchari albi „ 1,0

II Helv
 Rp Gummi arabici pulv
 Tragacanth „ 33 2,0
 Sacchari albi „ 6,0

III Austr
 Rp Amyli Tritici pulv
 Radix Liquirit „ 33 50,0
 Gummi arabici „
 Sacchari albi „ 33 100,0

Pulvis gummosus alkalinus
Sapo vegetabilis
 Rp Kali carbonici pur 1,0
 Gummi arabici pulv 90
 Bei Darmverstopfung zu 2,0—3,0
Pulvis incrassans ICHER
 Rp Gummi arabici pulv
 Radix Althaeae „
 Radix Liquirit „
 Resinae Draconis „ 33
Sirupus pectoralis (Nat. form)
Pectoral Syrup JACKSON'S Pectoral
 or Cough (Syrup)
 Rp Morphin hydrochlor 0,55 g
 Olei Sassafras 0,5 cem
 Sirupi Aeneiae (U-St) q s ad 1000 cem

Sirupus pectoralis
Hustensaft (Wiener Handverkauf)
 Rp Mucilag. Gummi arab
 Sirupi Senegae
 „ Kermesini 33 20,0
 „ Aurant flor 63,0
 Aquae Amygdal amar dil 5,0

Tabellae cum Gummi (Gall.)
Tablettes de gomme
 Rp Gummi arabici pulv 100,0
 Sacchari albi 900,0
 Aquae Aurant flor 75,0

Man formt 1 a. Tabletten von 1 g

Colle blanche, Pariser Leim, ist ein dicker Gummischleim
Diamantine, GUIGNON'S Eine Mischung aus 5—8 Th arab Gummi, 3 Th Dextrin,
 2 Th Tragacanth, 3 Th Gelatine, q s Farbstoff wird gelöst, eingetrocknet und gepulvert
Emser Katarisipastillen Bestehen aus 66 Th Zucker, 33 Th arab Gummi, 0,6 Th
Emser Quellsalz, 0,4 Th island Moos (Pharm Zeitg 1835)
Epidermin ist eine Salbengrundlage aus Gummi, Wachs, Wasser und Glycerin
Pâte nutritive, Pastillen für Sanger, Redner, bestehen aus Gummi, Zucker und
 feinem Leim

Pectorin, Dr KENT'S, gegen Verschleimung Ein Pulver aus Kakao, Gummi und
 Zucker

Tegmin, Hautdeckmittel bei Impfpocken, ist eine Emulsion aus Wachs, Gummi
 pulver und Wasser (1 2 3) mit 5 Procent Zinkoxyd und wenig Lanolin (REDEL'S
 Mentor)

Gutta Percha.

Gutta Percha (Germ Gall.) Guttapercha. Guttapertscha. Gummi gettanla
Gutta Tuban.

Guttapercha ist der coagulierte und weiter verarbeitete Milchsaft von Bäumen einer
 Anzahl Arten aus der Familie der Sapotaceae Es kommen als solche hauptsächlich in
 Betracht **Palaequium Gutta (Hook) Burck**, früher in Uferwäldern auf Singapore
 heimisch, jetzt völlig ausgerottet und nur noch in Kulturen vorhanden, **Palaequium**
oblongifolium Burck, heimisch auf Malakka, Riouw, Sumatra und Borneo, **Palaequium**
borneense Burck auf Borneo, **Palaequium Treubii Burck** auf Banka Die beiden
 letztgenannten Arten sind vielleicht auch schon ausgerottet Die beste Droge liefert
 P oblongifolium. **Payena Leeri Benth et Hook**, auf Malakka, Sumatra, Borneo, Banka
 und Amboina liefert ferner vorzügliches, hellfarbiges Guttapercha, das aber leichter faserig
 wird, als das von Palaequium-Arten. **Payena macrophylla (Hassk.) Benth et Hook**
 liefert Gutta von minderem Werthe **Mimusops Elengi L.**, heimisch im westlichen Vorder
 indien und Ceylon, vielfach kultiviert (**Mimusops Balata Gärtn** in Surinam liefert haupt-
 sächlich die verwandte **Ballata**). Ausserdem liefern zahlreiche andere Pflanzen Guttapercha
 oder diesem ähnliche Stoffe, doch ist hier die Gewinnung über das Stadium des Experiments

nicht hinaus gekommen. Die Guttapercha ist in Form eines Milchsafte in zahlreichen Milchsaftschläuchen der Rinde und des Markes enthalten. Zur Gewinnung derselben macht man Einschnitte in den Stamm, oder fällt den Baum und macht dann Einschnitte. Der heraustretende Milchsaft erstarrt entweder schon am Baum, oder wird bei geringeren Sorten in Kokoschalen aufgefangen und durch Kochen allein oder mit Wasser coaguliert. Nöcherdings gewinnt man auch Guttapercha durch Extrahiren der Blätter mit Toluol etc., sie hat dann eine von Chlorophyll herührende grünliche Farbe, die aber bei weiterer Verarbeitung leicht zu beseitigen ist. So gewonnene Guttapercha ist aber für manche Zwecke so zu Isolatoren, nicht geeignet. Der Ertrag von einem Baum ist nach der Art der Pflanze, der Art des Anzapfens und der Jahreszeit ein sehr wechselnder, z. B. von 330 g bis 6 Kilo, durchschnittlich höchstens $1\frac{1}{4}$ Kilo.

Beschreibung. Rohe Guttapercha hat eine faserige, blätterige, zuweilen fast holzartige Struktur, lässt sich leicht schneiden, ist biegsam, aber kaum elastisch. Spec. Gew. 0,98—0,99. Da sie häufig verunreinigt zu sein pflegt, so erwärmt man sie in warmem Wasser, walzt sie zu Bändern aus, wobei sie von Steinen etc. befreit wird, und legt mehrere solcher Bänder zusammen, die man zu Spahnen zerschneidet. Diese werden von neuem erwärmt, in feine Stücke gerissen und zu Klumpen vereinigt. — Sie ist nun außerordentlich plastisch, sinkt in Wasser unter, lässt sich bei 45—60° C zu Röhren, Platten etc. ausziehen. Sie wird bei 100° C weich. Löslich in der Kalte in Chloroform und Schwefelkohlenstoff, in der Wärme in Petroläther, Benzol und Terpentinol, in Aether und Alkohol unvollkommen löslich, in Wasser und fetten Ölen unlöslich. Mit der Zeit wird sie durch Sauerstoffaufnahme brüchig, eine Mischung von 9 Th. Guttapercha und 1 Th. Kampfer soll diesen Uebelstand nicht besitzen.

Bestandtheile. Die Hauptmasse ist ein Gutta genannter Kohlenwasserstoff ($C_{10}H_{16}$)n. Man erhält ihn zu 75—82 Proc., indem man eine mit Thierkohle entfärbte Chloroformlösung mit Alkohol fällt. Ferner Oxydationsprodukte desselben 4—6 Proc. Fluavil $C_{20}H_{32}O$, in kaltem und siedendem Alkohol löslich, und 14—16 Proc. Alban $C_{40}H_{64}O_2$, nur in siedendem Alkohol löslich. Ausserdem enthält sie einen der Gutta nahestehenden Körper Guttan.

Verfälschungen und Surrogate. Guttapercha wird des hohen Preises wegen häufig verfälscht, alle solche Verfälschungen verändern die eben angeführten physikalischen Eigenschaften. Als Surrogat wird eine bei 120° C hergestellte Mischung aus 1 Th. Theer, 10 Th. Paraffin und 2 Th. Kautschuk genannt. Auch Mischungen aus Wachs und Harz werden als Ersatz angeführt.

Pharmaceutische Verwendung findet sie als

1) Gutta Percha depurata (Ergänzb.) Gutta Percha alba. Gereinigte Guttapercha. Zahnkitt. Gutta-Percha purifiée (Gall. Suppl.)

Darstellung. 1 Th. rohe Guttapercha erweicht man in warmem Wasser, zerzupft sie in kleine Flocken, löst in 6 Th. Schwefelkohlenstoff und filtrirt nach zweitägigem Absetzen lassen durch Glaswolle in eine Flasche, welche 6 Th. 90proc. Weingeist enthält. Die gut durchgeschüttelte Mischung stellt man bei Seite, bis sich zwei Schichten gebildet haben, hebet das obere, weingeistige Harzlösung ab, schüttelt die untere nochmals mit 5 Th. Weingeist, trennt wiederum durch Abhebern, bringt dann die Guttapercha-Schwefelkohlenstofflösung nebst 2—3 Th. destill. Wasser in den zinnernen Einsatz einer Destillirblase und destillirt bei höchstens 50° C unter sorgfältiger Kühlung (man lässt das Abflussrohr unter Wasser münden!) den Schwefelkohlenstoff ab. Die zurückbleibende Gutta knetet man mit heissem Wasser und formt sie in 3—5 mm dicke Stängelchen. Ausbeute 60—80 Proc.

Wegen der leichten Entzündlichkeit des Lösungsmittels ist diese Arbeit höchst feuergefährlich, man nehme sie unter Ausschluss offener Feuerungen vor und halte brennende Lichter u. dgl. vom Arbeitsraume fern (s. S. 630).

Gefahrlos, wenn auch kostspieliger, ist die Reinigung mittels Chloroform, man braucht davon 15—16 Th. auf 1 Th. Guttapercha, verfährt im Uebrigen, wie vorher angegeben. Eine helle Gutta erhält man aber nur, wenn man die Chloroformlösung mittels Weingeist ausfällt. Aus der Flüssigkeit scheidet man durch Wasser das Chloroform aus.

Auch durch Digeriren mit der 20—22fachen Menge Steinkohlenbenzin und kühlen mittels 90proc. Weingeist lässt sich die rohe Guttapercha reinigen.

Aufbewahrung. Anwendung. Vor Licht geschützt an einem kühlen Ort unter Wasser, dem man zweckmässig einige Tropfen Chloroform zusetzt, oder auch in einer Mischung aus 10 Th Wasser, 3 Th Glycerin, 2 Th Weingeist. Zum Gebrauch erweicht man ein Stückchen in heissem Wasser und drückt es dann in die vorher gereinigte, mittels Baumwolle getrocknete Zahnhöhle.

2) Als Grundlage für Guttapercha-Pflastermulle, Perchemplastra. Es sind Mullgewebe, die mit einer dünnen Guttaparchaschicht überzogen, daher für Wasser und durchlässig sind, ihre Vorzüge bestehen darin, dass sie die Haut nicht reizen, sich allen Körpertheilen leicht anschmiegen und eine grosse Genauigkeit in der Vertheilung des wirksamen Bestandtheils ermöglichen. Die in der Wärme erweichende Grundmasse nimmt von trockenen Arzneistoffen bis zu 70 Proc auf. Die Pflastermulle werden in vorzüglicher Beschaffenheit und grosser Auswahl besonders von P. BEIERSDORF & Co in Hamburg-Elmsbüttel in den Handel gebracht. Sie sind übrigens von begrenzter Haltbarkeit.

Auch für andere Formen, wie Stäbchen, Blättchen, Kugeln eignet sich eine Gutta percha, welche Arzneikörper aufgenommen hat.

8) Als Percha lamellata (Germ.) Gutta Percha foliacea s. chartacea. Charta Gutta Percha — Guttaperchapapier, -Blatt — Gutta Percha lamellense. Papier de guttapercha. Guttapercha tissu — Lamellated guttapercha. Lamellar percha — Wird aus der rohen, durch Kneten etc. gereinigten Handelsware auf Walzwerken hergestellt und kommt gewöhnlich in langen Streifen von 45 und 90 cm Breite und 3 verschiedenen Stärken, auf Holzstäbe gerollt, in den Handel. Gutes Guttaperchapapier soll bei Körperwärme nicht kleben. Es dient dazu, bei feuchten Umschlägen die Verdunstung zu vermindern, ferner in gleichen Fällen wie Gichtpapier (in Frankreich als Tissu electro-magnetique). Guttaperchapapier bietet einen billigen Ersatz für die theueren Kautschukstopfen zum Verschluss von Laugengefässen, am mit demselben umhüllter Korkstopfen erfüllt den nämlichen Zweck, wie jene. Ferner empfiehlt es sich, bei allen selten gebrauchten Reagentien, Laugen, Salzlösungen, Tinkturen einen Streifen Guttapercha zwischen Stöpsel und Hals der Standgefässe zu legen, bei Beobachtung dieser Massregel erzielt man einen dichteren Verschluss und wird nie fest verkittete Glasstöpsel vorfinden. — Zum Befestigen von Papierschildern auf Blechgefässen in Kellerräumen legt man eine Scheibe Guttaperchapapier zwischen Schild und Gefäss und erhitzt letzteres durch eine Flamme von innen, oder durch heisses Wasser, derart angeklebte Schilder sind nur mit Gewalt zu entfernen. (Auch bei Porcellan- und Glasgefässen ist das Verfahren anwendbar.)

Man bewahrt Guttaperchapapier kuhl, aufgerollt in Blechbüchsen, doch nicht zu lange auf, da es mit der Zeit brüchig wird. (Solche durchs Alter unbrauchbar gewordene Vorräthe sind immer noch für Hufkitt, zu Kitt für Gummireifen, Leder und dergleichen verwendbar.)

Traumaticinum (Ergänzb.) Gutta-percha Chloroformio soluta. Solutio Guttaperchae. Liqueur Guttas Perchae. (In England früher Chloropercha). Traumaticum Guttaperchalösung. Soluté chloroformique de gutta-percha (Gall Suppl.) Ergänzb. 1 Th Guttaperchapapier löst man in 8 Th Chloroform und filtrirt nach längerem Absetzen. Klare Flüssigkeit. — Gall. 1 Th gereinigte Guttapercha, 9 Th Chloroform. — Diet. 4 Th gereinigte Guttapercha, 16 Th Chloroform, 1 Th entwässertes Natriumsulfat. Man löst unter Schütteln und giesst klar ab. Soll die Lösung hellfarbig sein, so nimmt man weisse Guttapercha. — Nat form. 15 g Guttapercha in Scheibchen löst man in 75 ccm Chloroform, fügt eine Mischung von 17 g gepulvertem Bleiweiss und 25 ccm Chloroform hinzu. — sonst wie vorige. — Man kann diese Lösung auch aus roher Guttapercha bereiten. Vergl. darüber oben unter No 1. — Bei Frost-, Brand-, Schnittwunden wie Kollodium, entweder rein, oder mit arzneilichen Zusätzen. Die Klebkraft lässt sich durch Zusatz von Kautschuk erhöhen.

Aquariumkitt. 120 Th Guttapercha, 240 Th Schwarzes Pech, 8 Th Schellack schmilzt man zusammen und rollt in Stangen aus.

Flüssiges Pergament heisst eine ätherische Lösung von Guttapercha, die zum Ueberziehen von Bildern und Karten, zum Fixiren von Kreidezeichnungen u dgl. dient und mittels Zerstäubers aufgetragen wird.

Gewebe, elektro-magnetisches, ist ein mit Guttapercha überzogenes Baumwollengewebe. Es wird durch Guttaperchapapier vollständig ersetzt.

Gewebe, gas- und wasserdichtes, von HENR. HIRZEL. Zwischen zwei Stücke eines dichten Stoffes legt man Guttaperchapapier und lässt das Ganze durch heisse Walzen gehen. Zuletzt giebt man einen Ueberzug von Kopalack.

Guttapercha cum corporibus medicamentosis (MANNOURY & ROBIQUET). 2 Th Guttapercha schmilzt man auf dem Wasserbade und mischt 1 Th des vorgeschriebenen Arzneimittels hinzu.

Guttapercha incarnata Fleischfarbig erhält man die gereinigte Guttapercha durch Zusatz von 0,1 Proc Karmin. Sie wird von Zahnärzten gebraucht.

Kitt für helle Lederschuhe 45 Th Guttapercha, 30 Th Terpentinöl, 300 Th Schwefelkohlenstoff.

Kitt für Lederriemen, für Leder auf Holz oder Metall 20 Th Guttapercha löst man in 10 Th Terpentinöl und 50 Th Schwefelkohlenstoff, und fügt 20 Th gepulv. syrischen Asphalt hinzu. Das Leder wird an der zu kittenden Stelle zuvor mit CS_2 abgerieben.

Kitt für Pferdehufe Hufkitt 3 Th gerein. Ammoniakgummi, 1 Th Terpentin schmilzt man im Wasserbade und verarbeitet mit 6 Th Guttapercha. Zum Gebrauche wird die Masse in heissem Wasser erweicht, nöthigenfalls mit Kienruss gefärbt. Der auszufüllende Hufspalt ist gründlich zu reinigen. (Ditt.)

Vekril, ein Guttapercha und Kautschukersatz, wird aus Nitrocellulose und Nitrocinoleum dargestellt.

Volkanit ist eine dem Ebonit (S. 680) ähnliche Zusammenetzung.

* Bacilli caustici

Pp Guttaperchae depur.

Zinci chlorati aa

Man schmilzt im Wasserbade und presst die weiche Masse in Glasröhren oder rollt sie unter Bestreuen mit Stärkemehl in Stäbchen aus.

Bacilli medicamentosi BOUTHOV

Rp 1 Guttaperchae

2 Corporis medicamenti aa

Man schmilzt 1 im Wasserbade, mischt 2 hinzu und formt in Stäbchen.

Cementum odontalgicum

Schmerzstillender Zahnkitt

I

Pp 1 Acidi tannici

2 Catechu pulv. aa 9,0

3 Olei Caryophyllor 1,0

4 Opi pulverati

5 Caryophyll pulv. aa 3,0

6 Guttaperchae 7,0

Man erweicht 6 im Wasserbade und verarbeitet mit der Mischung von 1—5 zu Stäbchen.

II Nach DIETRICH

Rp 1 Salol

2 Terbinth lacern. aa 10,0

3 Guttaperchae 80,0

3 wird in warmem Wasser erweicht und mit 1 und 2 durchgeknetet.

Lacca conservatrix Heller

Heller's Leichenlack

Pp Guttaperchae concis 100,0

Carbonis sulfurati 800,0

Lacca Guttaperchae ad documenta et literas

Dokumenten-Lack.

Rp Guttaperchae conc et siccata 10,0

Benzol Lithanthracis rectif levior

Benzol Lithanthracis aa 50,0

Carbonis sulfurati 40,0

Olei Eucalypti citriodor 20,0

Man löst, lässt absetzen, filtrirt und verdünnt nöthigenfalls mit Benzol. Dient zum Überziehen von Schriftstücken, die gegen Feuchtigkeit, gegen saure oder alkalische Dämpfe geschützt werden sollen. Die betreffenden Gegenstände sind vorher zu trocknen.

Lutum ad corium

Lederkitt.

I

Rp Guttaperchae 15,0

Olei Terbinth 10,0

Carbonis sulfurati 100,0

II

Ip Guttaperchae 25,0

Oli Terbinth 10,0

Carbonis sulfurati 50,0

Asphaltus syriacus 20,0

Zum Kitten von Leder von Leder auf Holz oder Metall. Die zu kittende Stelle wird vorher mit Benzol gereinigt.

Vet. Lutum ad ungulam DEFAV'S

Corium artificiale DEFAV'S Hufkitt

Rp Guttapercha 100,0

Ammoniac d p 50,0

Im Wasserbade zusammen geschmelzen.

Massa elastica DUERK

DUERK'S Guttaperchamasse

Rp Guttaperchae crudae 100,0

Resinae Feni 30,0

Adipis suilli 40,0

Man schmilzt, seigt durch und walzt in Platten von 1,0—2,5 mm Dicke aus.

Solutio Guttaperchae ALTON

Pp Guttaperchae depurata 10,0

(Kautschuk) 1,5

Benzol Lithanthracis 150,0

Zum Schutze der Haut bei Schlangen etc.

Unguentum ad corium

Wasserdichte Lederschnüre

Ip 1 Olei Rayae crudae 1000,0

2 Guttaperchae concis 200,0

3 Cerse flavae

4 Paraffini aa 500,0

5 Adipis suilli 3500,0

6 Terbinth lacern aa 1000,0

7 I bones usui subit pulv 5—8 60,0

1 wird zum Sieden erhitzt, 2 gelöst, d nn 3—8 und zuletzt 7 zugefügt.

Vernix Guttaperchae ad corium

Lederfirnis

Ip 1 Guttaperchae siccata 100,0

2 Olei Lini 800,0

3 Olei Lithanthracis rect levior

4 Vernicis Copal aa 100,0

Unter Erhitzen wird 1 in 2 gelöst, 3 und 4 und ein beliebiger Farbstoff (Russ, Ocker, Umbra, Zinnober, Ultramarin) mit Oelangerieben zugesetzt.

Vernix ad texta gossypina et linaea

Wasserdicht machender Firnis für Gewebe

Rp Guttaperchae p 1

Vernicis Lini p 9—11

Man löst unter Erwärmen und seigt durch.

Gutti.

† Gutti (Germ. Helv.) Cambogia (Brit. U-St.) Gummi Guttae. Gummi resina Guttae. Gummide Gon. Gutta gambu Scammunium orientale — Gummigutti — Gommogutte (Gall.) — Gambogo ist das Gummiharz der in die Familie der Guttiferae — Clusioidae — Garcinieae gehörenden *Garcinia Hanburyi* Hook f (syn *G. Morella* var *pedicellata* Hanbury), heimisch in Cambodja, dann in zweiter Linie *G. Morella* Desr auf Ceylon, *G. Roxburghii* Engl in Canara, *G. Wightii* T Anders im südlichen Vorderindien, *G. heterandra* Wall, *G. Gaudichaudii* Planch. et Triana in Cochinchina, endlich liefert *G. pictoria* (Roxb) Engl nur wenig brauchbares Gummigutti. Es ist in Form einer Emulsion in schizogenen Sekretbehältern der Rinde, des Markes und auch der Blätter und Früchte enthalten. Man gewinnt es, indem man Einschnitte in die Rinde macht und das ausfließende Gutti in Bambusrohren auffängt, oder indem man grössere Stücke der äusseren Rindentheile abläst und jeden Morgen das ausgetretene Sekret abkratzt. Eine geringe Sorte wird durch Auskochen der Blätter und der Schale der unreifen Frucht erhalten — Das getrocknete und aus den Bambusrohren herausgestossene kommt als Röhrengutti, eines in Klumpen als Schollen gutti, Caka-Gambogi in den Handel, es ist auch ein Gutti in lacrimis vorgekommen.

Beschreibung. Cylindrische oder unregelmässige, gelblich-gelbe, zerreibliche Stücke, im Bruch breitmuschelig, glatt und wachsglänzend, an den Kanten etwas durchscheinend, zerrieben dunkelcitronengelb, geruchlos, anfangs geschmacklos, hinterher süsslich und im Munde brennend. Mit Wasser (1:2) angerieben, entsteht eine gelbe Emulsion, in der sich unter dem Mikroskop Harztröpfchen erkennen lassen. Die Emulsion wird durch Ammoniak klar feurigroth, dann braun. Wird das Ammoniak neutralisirt, so entfärbt sich die Lösung und es fallen gelbe Flocken aus. In Weingeist bis zu 80 Proc., in Aether zu einem geringeren Theile löslich. Jodzahl nach E. DINTERICH 94,28—108,72. Nach KREMEL Säurezahl 100, Esterzahl 56,7, Verseifungszahl 156,7.

Bestandtheile. 72 Proc Gambogiasäure $C_{20}H_{24}O_4$. Dieselbe bildet eine fast undurchsichtige, kirschrothe, geruch- und geschmacklose, sauer reagirende Masse, die sich bei 260° C, ohne zu schmelzen, zersetzt. Unlöslich in Wasser, löslich in Weingeist und Aether. Ferner enthält die Droge 25 Proc Gummi, 5 Proc Wasser und weniger als 1 Proc Asche.

Prüfung. Gutti kommt mit Reismehl, Sand und gepulverter Baumrinde verfälscht vor, welche Verfälschungen man erkennt, wenn man die Droge mit Wasser anreibt, absetzen lässt und den Bodensatz auswascht. Das Genauere ist dann mit dem Mikroskop festzustellen.

Die ammoniakalische Lösung mit etwas Silbernitrat versetzt und aufgeköcht, erleidet keine Reduktion, andernfalls liegt wahrscheinlich Verfälschung mit Dextrin vor, die beim Schollengutti beobachtet ist.

Zum Nachweis des Gutti in Gemischen, z. B. in Geheimmitteln, empfiehlt HIRSCHMANN, wenn eine Flüssigkeit vorliegt, dieselbe mit Glaspulver einzutrocknen, zu zerreiben und mit Petroläther zu behandeln. Ist der Auszug farblos, so wird die Extraktion nach dem Zusatz von HCl bis zur sauren Reaktion wiederholt, da bei Gegenwart von Seife (z. B. in Pillen) Gutti sonst nicht aufgenommen wird.

Ist auch jetzt der Auszug farblos, so fehlt Gutti. Andernfalls wird der Auszug mit Wasser und einigen Tropfen Ammoniak versetzt und geschüttelt, die wässrige Schicht erscheint dann gelbgefärbt und der Petroläther farblos.

Aufbewahrung. Abgabe. Gutti gehört zu den vorsichtig aufzubewahrenden Mitteln. Man hält es in Stücken, einen kleinen Vorrath fein gepulvert für Rezepturzwecke vorrätig und giebt es im Handverkauf nur als Malerfarbe an zuverlässige Personen in kleinen Mengen und gegen Giftschein ab.

Anwendung Als starkes Abfuhrmittel zu 0,1 bis 0,3 g mehrmals täglich in Pillen oder Emulsion, als harntreibendes Mittel in kleineren Gaben meist mit Scilla oder Alkalien. Starke Dosen können den Tod herbeiführen. — Als Bandwurmmittel ist es veraltet. In der Technik zu Lacken und Goldlacken.

Grosste Einzelgabe Germ 0,5 g Helv 0,2 g

" Tagesgabe " 1,0 " " 1,0 "

Bei Thieren wirken tödlich 5—10 g bei Schafen, 20—30 g bei Pferden, 50—80 g bei Rindern.

Ultramentum
Gelbe Tinte

Rp Gutt	5,0
Alumina	1,0
Gummi arabic	4,0
Acidi acetici diluti (50 pice)	4,0
Olei Caryophyllor gttis	V
Aquae destillatae	80,0

Wird zweckmässiger durch eine wässrige Lösung von Amlin Orangi (Chrysoidin) (1,5 100,0) nebst 2,0 Zucker) ersetzt.

Liquor Gutt Alkalinus
Elixir Gambogiae alkalinum Solutio

Rp Gutt pulverat	1,0
Liquor Kali carbonici	6,0
Aquae destillat	8,0

Zu 20—30—40 Tropfen mehrmals täglich

Pilula Cambogiae composita (Brit)
Compound Pill of Gamboge

Rp Gutt pulver	
Aloë Barbaden is	
Pulv Cinnamon comp aa	25,0
Saponis duri pulv	30,0
Sirupi Glucosi	25,0

Man stösst zur Pillenmasse Gabe 0,25—0,5 g.

Pilulae D Bontius (Gall)
Pilulae de Bontius

Pp 1 Aloë gr pulv	
2 Gutt gr pulv	
3 Ammoniac pulv aa	1,0
4 Aceti	6,0

AYER'S Pills. Ueberzuckerte Pillen aus Aloë, Gutt, Koloquinthen und Pfeffer.
BRANDRETH'S Pillen, aus Amerika, bestehen aus Gutt, Podophyllin, Safran, Nelken, Gelbwurzel, Minzöl und Kermessaft.

Caignano-Pulver, von PYAT und DEXEUX, angeblich nach einer Vorschrift der Prinzessin CAIGNANO, besteht aus 25,0 Gutt, 37,5 Bernstein, je 12,5 rother Koralle und Siegelerde, je 1,2 Zinnober, Mineralkermes und Beinschwarz. Es sind abgetheilte Pulver zu 0,1 g.

Gesundheitspillen von FRANK in Paris sind versilberte Pillen aus 1 Th. Gutt und 4 Th. Aloë.

Horses purging balls, Englische Pferdepillen, sind 30 g schwere Pillen aus 500 Th Aloë, 50 Th Gutt, 120 Th Seife, 15 Th Anisöl, 10 Th Glycero, 5 Th Anispulver.

Kaiserpillen, KERSSER'Sche Pillen. Wasserpillen, Königssee, *Pilulae imperiales*. Je 10,0 Gutt, Jalapenharz, Scammonium, Aloë, 2,0 Koloquinthenextrakt, 5,0 Seife, 12,5 Enzianwurzel zu 500 Pillen gemacht. Die Bestandtheile wechseln, bisweilen ist Kalomel, selbst Crotonöl darunter. Mit diesen stimmen die

Magen- und Gallenpillen ziemlich überein.

KNIGHT'Sche Pillen, in Amerika gebräuchlich, sind Pillen von 0,27 g und enthalten 1 Th Gutt, 3 Th Scammonium, 6 Th Aloë.

Magentropfen, Dr SPRANGER'S. Ein schwach wingeistiger Auszug aus Aloë, Gutt und Rhabarber.

Pillen von CAUVIN in Paris 30 Pillen aus 1,25 Gutt, je 2,0 Aloë und Jalape, 0,6 Rhabarber.

Bereinigungspillen von Dr LANGE in München 48 Pillen aus 1,0 Gutt, 5,0 Schwefelquecksilber, 0,5 Eibisch- und Gumpipulver.

Man kst unter Erwärmen 1—3 in 4, seht durch, dampft zur Pillenmasse ein und macht daraus Pillen von 0,2 g. Ebenso zusammengesetzt sind die *Pilulae hydragogae LEMOIR*.

Pilulae laxantes
(Your Remède)

Rp Gutt	
Podophyllum aa	0,3
Extract Hyoscyami	0,9
Sapon amygdal	q s

Zu 30 Pillen. Abends eine Pille.

Sapo Gutt

Pp Gutt sublt pulv	8,8
Saponis medicati	6,6
Spiritus guttas liquat.	

Man dampft im Wasserbade zur Trockne.

Vernisum aureum

Lack für vergoldete Gegenstände

Rp Gutt	80,0
Extract lign Santal spir	3,0
Laccæ in talchis alb	200,0
Sandarac	50,0
Terebinth larcin.	25,0
Alkohol (85%)	600,0

Viridamentum

Grüne Tinte.

Rp Gutt pulverat	1,0
Cocculament	10,0—20,0

Diese Mischung ersetzt man besser durch eine wässrige Lösung von Methylgrün, 1,0 100,0, dazu 2,0 Zucker.

Gymnema.

Gattung der Asclepiadaceae — Cynanchoideae — Tylophoreae — Marsdeniinae

I Gymnema silvestre (Willd) R Br Heimisch von Westafrika durch das südliche Asien bis Australien. Die Pflanze ist ein holziger Schlingstrauch mit gegenständigen, ganzrandigen, 4—9 cm langen und $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ cm breiten, elliptischen oder eirunden, spitzen, am Grunde abgerundeten oder herzförmigen Blättern, die etwas lederartig und auf beiden Seiten kurzflaumig sind. Man verwendet die Blätter, selten die Wurzel.

Bestandtheile der Blätter 6 Proc Gymnemasäure $C_{20}H_{38}O_{12}$, ferner Weinsäure, Zucker, ein Bitterstoff. Die Gymnemasäure ist in Alkohol und Wasser löslich, in Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff unlöslich. **Gymnema hirsutum Wall** und **G montanum Hook f** enthalten ebenfalls Gymnemasäure.

Anwendung. Die Blätter haben, wenn man sie kaut, die Eigenthümlichkeit, die Geschmacksempfindung für „süss“ aufzuheben für 1—2 Stunden. Sie verdanken das der Gymnemasäure. — Der Grund dafür liegt nicht in der Bildung unlöslicher Niederschläge mit den süßschmeckenden Substanzen, sondern beruht auf einer temporären Lähmung der süß empfindenden Geschmacksfasern. Die Empfindung für bitter, salzig und sauer wird nicht aufgehoben, höchstens die für „bitter“ in minimaler Weise bei manchen Individuen abgeschwächt.

Die Wurzel wird gegen Schlangengift angewendet.

II Gymnema latifolium Wall In Niederländisch-Indien. Enthält in den Blättern Laurocerasin.

Gynocardia.

Gattung der Flacourtiaceae — Pangicae — Hydnocarpeae

Einzige Art **Gynocardia odorata R Br** Heimisch in Hinterindien. Verwendung finden die Samen. Samen Gynocardiace Samen Chaulmugrae.

Beschreibung Dieselben sind $2\frac{1}{2}$ —3 cm lang und ungefähr halb so breit, unregelmäßig eiförmig-kantig. Die dünne Samenschale umschliesst das ölige Endosperm mit dem Embryo, dessen Kotyledonen blattförmig, flach und herzförmig sind.

Bestandtheile. 51 Proc fettes Öl, von dem man 25—30 Proc durch Auspressen gewinnt. Bei gewöhnlicher Temperatur ist das Öl salbenartig, von grüngelber Farbe, charakteristischem Geruch und angenehmem Geschmack. Es enthält 18 Proc Gynocardiensäure. Die Säure ist leicht löslich in Alkohol und Aether, sie schmilzt bei 29°C.

Anwendung. Man verwendet die Samen, das Öl und die Säure (Dosis 1—3 g täglich) in Indien gegen Lepre, angeblich mit grossem Erfolg. Die Pulpa der Frucht dient als Fischgift und nach dem Auskochen als Nahrungsmittel, die Rinde als Fiebermittel.

Sapo Gynocardiace 1000 g Chaulmugraöl verseift man im Dampfbade mit einer Lauge aus 175 g Aetznatron und 750 g destill. Wasser, löst den Seifenleim unter Erhitzen in 2500 g destill. Wasser, setzt eine Lösung von 300 g Kochsalz in 900 g Wasser zu und lässt erkalten. Die ausgeschiedene Seife wird gewaschen und getrocknet. (P G URNA)

Pilulae Saponis Gynocardiace URNA	
Rp Saponis Gynocardiace	30,0
Aquae destillatae	20,0
solve in balneo vaporis, adde	
Massae Sibi pro pilulis keratinatis ¹⁾	20,0
Terrae siliceae	10,0
M I massae, e qua form. pilul. keratinatae pond.	
0,45. Jede Pille enthält 0,18 g Gynocardiaseife.	
Bei Lepre täglich 10 Pillen	

Unguentum contra combustiones Brandsalbe

Rp Aristolli	5,0
Olei Gynocardiace	50,0
Adipis Lanae	45,0

Unguentum Gynocardiace

Rp Olei Gynocardiace	
Unguent. Paraffini	33

¹⁾ Sibi taurini 500, Cerae flavae 100, Liquatus et colatus adde Cumarini 0,5 in Spiritu 5,0 soluti. (P G URNA)